


殿西宗必讀六



庫文閣内	
函	漢書
架	冊號類




内閣文庫	
番號	漢 12439
冊數	18 ( 9 )
函號	301 48







醫宗必讀卷之六



門人朱天定道力父叅  
姪孫李廷芳蘅伯父訂

真中風

靈樞經曰虛邪偏客于身半其入深者內居營衛營衛衰則真氣去邪氣獨留發為偏枯此言深而中其邪氣淺者脉偏痛此言邪氣淺而中其邪氣也又曰痺之為病也身無痛者四肢不收志亂不



甚其言微知可治甚則不能言不可治也此亦言中

藏之證其名曰痲身無痛者也以志不甚亂微能言者可治若志亂而不能言則不可治矣

偏枯身偏不用而痛言不變志不亂病在分腠

之間巨針取之益其不足損其有餘乃可復也

此亦言中府之證肢體必痛且能言而神氣清明淺而可復也

愚按中風者言為風邪所中其受病重非若傷

風之輕也風是四時八方之氣常以冬至之日

自坎而起候其八方之風從其鄉來者主長養

萬物若不從其鄉來者名為虛賊風害萬物體

虛者則中之當時未必即發重感風邪病遂發

焉藏府有俞俞皆在背中風多從俞入者也而

有中府中藏中血脉之分中府者其病在表多

着四肢故肢節廢脉浮惡風拘急不仁外有六

經之形證大陽經證頭疼身熱脊強陽明經證

痛寒熱嘔口苦太陰經證腹滿自利咽乾少陰經證舌乾口燥厥陰經證煩滿囊縮以小

續命湯及疎風湯汗之中藏者其病在裏多滯

九竅故唇緩二便閉脾不能言心耳聾腎鼻塞

肺目昏所以三化湯及麻仁丸下之中血脉者



病在半表半裏外無六經之證內無二便之閉  
但見口眼喎斜半身作痛不可過汗恐虛其衛  
不可大下恐損其營惟當養血順氣以大秦丸  
湯羌活愈風湯和之中府者多兼中藏如左關  
脉浮弦面目青左脇痛筋脉拘急目瞶頭目眩  
手足不收坐踞不得此中膽兼中肝也用犀角  
散左寸脉浮洪面赤汗多惡風心神顛倒語言  
蹇澁舌強口乾怙悸恍惚此中胞絡兼中心也  
加味牛黃散右關脉浮緩或浮大面黃汗多惡

風口喎語澁身重怠惰嗜臥肌膚不仁皮肉瞶  
動腹脹不食此中胃兼中脾也防風散右寸脉  
浮濇而短鼻流清涕面白多喘胸中冒悶短氣  
自汗聲嘶四肢痿弱此中大腸兼中肺也五味  
子湯左尺脉浮滑面目黧黑腰脊痛引小腹不  
能俛仰兩耳虛鳴骨節疼痛足痿善恐此中膀胱  
兼中腎也獨活散此皆言真中風也而有氣  
血之分焉氣虛者右手足不仁用六君子加鈎  
藤薑汁血虛者左手足不仁四物湯加鈎藤竹



瀝薑汁氣血俱虛者左右手皆不仁入珍湯加  
鈎藤竹瀝薑汁凡中風昏倒先須順氣然後  
治風用竹瀝薑汁調蘇合香丸如口噤挾開灌  
之如挾不開急用牙皂生半夏細辛為細末吹  
入鼻內有嚏可治無嚏則死最要分別閉與脫  
二證明白如牙關緊閉兩手握固即是閉證用  
蘇合香丸或三生飲之類開之若口開心絕手  
撒脾絕眼合肝絕遺尿腎絕聲如鼯肺絕即是  
脫證更有吐沫直視肉脫筋骨痛髮直搖頭宜  
上攬面赤如糞汗出如珠皆脫絕之證

大劑理中湯灌之及灸臍下雖曰不治亦可救  
十中之一若誤服蘇合香丸牛黃至寶之類即  
不可救矣蓋斬關奪門之將原為閉證設若施  
之脫證如人既入井而又下之石也世人蹈此  
弊而歿者不可勝數故特表而出之惟中藏之  
證是閉而  
非脫者宜蘇合香丸牛黃丸至寶丹治命金丹  
之類若中府與中血脈之證斷不宜用為內有  
麝香入脾治肉牛黃入肝治筋龍腦入腎治骨  
恐反引風邪深入骨髓如油入麵莫之能出  
**角弓反張** 陰陽經絡周環于身風氣乘虛入于  
諸陽之經則腰背反折攣急如角弓之狀宜小



續命湯有汗不惡寒日晡瘧無汗惡寒日剛瘧

**口噤** 手三陽之筋結入于頤頰足陽明之筋上夾于口風寒乘虛入其筋則攣故令牙關急而口噤也秦艽升麻湯 用甘草二段每段長一寸炭火上塗麻油炙乾扶開牙關令咬定約人行十里許又換甘草一段然後灌藥極效 或以蘇合香丸擦牙或南星冰片擦之

**不語** 脾脉絡胃夾咽連舌本散舌下心之別脉系舌本心脾受風故舌強不語亦有因腎脉不

上循喉嚨挾舌本者喉嚨者氣之所以上下會厭者音聲之戶舌者聲之機唇者聲之扇風寒客于會厭故卒然無音若因痰迷心竅當清心火若因濕痰當清脾熱若因風熱當清肝火若因風痰當導痰涎若因虛火上炎當壯水之主若因虛寒厥逆當益火之原神仙解語丹滌痰湯加味轉舌膏八味丸隨證選用 取龜尿少許點舌神效置龜于新荷葉上以指髮鼻內截之立出

**手足不隨** 肌膚盡痛諸陽之經皆起于手足而



循行于身體風寒客于肌膚始為痺復傷陽經  
隨其虛處而停滯與血氣相搏故風痺而手足  
不隨實者脾土大過當瀉其濕虛者脾土不  
足當補其氣血枯筋急者四物湯木旺風淫者  
四物湯加鈎藤秦芫防風痰多者六君子加秦  
芫天麻竹瀝薑汁

**自汗**風多者桂枝湯若表虛者玉屏風散陽氣  
虛者者附湯若兼盜汗者補中益氣送六味地  
黃丸或當歸六黃湯

**半身不遂**譬如樹木或有一邊津液不蔭注而  
枝葉偏枯故知偏枯一證皆由氣血不周經曰  
風氣通于肝風搏則熱盛熱盛則水乾水乾則  
氣不榮精乃亡此風病之所由作也故曰治風  
先治血血行風自滅古方有順風勻氣散虎骨  
散虎脛骨酒外用蠶沙二石分作三袋蒸熱着  
患處冷再易以瘡為度內用羊脂入粳米蔥白  
薑椒豉煮熟日食一具十日止大效

**口眼喎斜**多屬胃土而有筋脈之分經云足之



陽明手之太陽筋急則口目為僻皆急不能卒  
視此胃土之筋病也又云足陽明之脉挾口環  
唇此胃土之脉為病也口目常動故風生焉先  
耳鼻常聾故風息焉  
燒皂角熏之以逐外邪次燒乳香熏之以順血  
脉酒煎桂枝取汁一椀軟布浸收左嚼搗右右  
嚼搗左服清陽湯秦艽升麻湯或二方合用外  
感加蔥白

**小便不利**

中風小便不利不可以藥利之自汗  
則津液外亡小便自少清熱止汗小便自行也

**遺尿**

多屬氣虛宜參耆湯少加益智頻頻啜之

**多食**

風木盛則尅脾脾受尅求助于食當瀉肝

理風以安脾脾安則食自如常也

**痰涎壅盛**

宜用吐法稀涎散或橘紅一斤逆流

水七碗煎至二碗頓服白湯導之吐痰之聖藥  
也二陳湯星香散加竹瀝薑汁虛者六君子同  
星香散脉沉伏無熱者三生飲加全蝎一个養  
正丹可以墜下痰涎鎮安元氣 肥人多中氣  
盛於外而歉于内也人肥必氣急而肺盛肺金



尅肝木故痰盛治法以理氣為急

**身痛** 中府者多身痛為風氣所束經脉不和宜

鐵彈丸虛寒者十味剉散

**昏冒** 心神不足痰滯于心胞絡宜至寶丹或牛


黃清心丸

**豫防中風** 寶鑑云凡大指次指麻木或不用者

三年內有中風之患宜服愈風湯天麻丸薛立

齋云豫防者當養氣血節飲食戒七情遠幃幙

若服前方適所以招風取中也



**脉** 中風之脉每見沉伏亦有脉隨氣奔指下洪

盛者浮遲者吉堅大急疾者凶 浮大為風

浮遲為寒 浮數無熱亦為風 大為火

滑為痰

三生飲 治卒中昏冒口眼喎斜半身不遂痰

氣上壅或六脉沉伏或浮盛者並宜服之但

脫絕證見者難治

南星 生用 川烏 去皮生 生附子 五錢

木香 二錢 五分



每服五錢水二盞薑十片煎六分服

小續命湯 通治八風五痺痿厥等疾春夏加

石膏知母黃芩秋冬加桂附芍藥

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐

芍藥炒 甘草炙 川芎

杏仁去皮尖炒 防已 官桂 各一兩

防風一兩五錢 附子炮去皮臍五錢

每服五錢水一盞半生薑五片煎一盞服

疎風湯 治表中風邪半身不遂語言微澀

麻黃去節三兩 杏仁去皮尖炒 益智仁 各一兩

升麻 各五錢

每服五錢水煎熱服

三化湯

厚朴薑炒 大黃 枳實麩炒

羌活 各三錢

大水二碗急火煎至一碗服

麻仁丸

厚朴去皮薑汁炒 芍藥炒 枳實麩炒各四兩



大黃

蒸焙 八兩

麻仁

別研 三兩

杏仁

去皮尖 炒三兩

右為末，蜜丸，梧子大，每服三錢，溫水下。

大秦芫湯

秦芫

各二錢

石膏

各一錢

甘草

炙

川芎

當歸

芍藥

炒

羌活

獨活

防風

黃芩

炒

白朮

土炒

白芷

茯苓

生地黄

熟地黄

各五分

細辛 三分

水煎服。天寒加生薑五片，春夏加知母一兩。

羌活愈風湯

治肝腎虛，筋骨弱，語言難，精神

昏憤，或肢體偏枯，多思健忘。

羌活

甘草

炙

防風

黃耆

蜜炙

蔓荊子

川芎

獨活

細辛

枳殼

炒

麻黃

去根

地骨皮

人參

知母

酒炒

甘菊花

去蒂

薄荷葉

白芷

枸杞子

當歸



杜仲 炒

半夏 製

熟地黄 各二兩

生地黄

芍藥 各四兩

每服一兩水煎服大寒之後加半夏人參柴

胡木通迎而奪少陽之氣也穀雨之後加石

膏黃芩知母迎而奪陽明之氣也季夏加防

已白木茯苓勝脾土之濕也大暑之後加厚

秦艽

厚朴 薑汁炒

白茯苓

蒼朮 炒

官桂 一兩

柴胡

前胡

黃芩 各三兩

石膏

朴藿香桂迎而奪大陰之氣也霜降之後加  
當歸桂附勝少陰之氣也

大麻丸 熱勝則風動宜靜是養血也宜和是

行營衛壯筋骨也非大藥不能治

附子 一兩炮

草薺 另研

當歸 十兩全用

獨活 五兩

天麻 酒浸三宿晒乾

玄參 各六兩

羌活 十兩

牛膝 酒浸一宿焙乾

杜仲 七兩炒去絲

生地黄 十兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服五錢空心白湯



手服藥後饑則食不饑且止大忌壅塞

犀角散 治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛

言語謇澁上焦風熱口眼喎邪脚膝軟痛

犀角 鎊 石膏 各一兩 羌活 去蘆

麋羊角 各七錢半 人參 去蘆 甘菊花

獨活 去蘆 黃耆 川芎

白朮 土炒 黃芩 天麻

枳殼 去穰 炒 當歸 去蘆 酸棗仁 炒

防風 去蘆 白芷 各五錢 甘草 灸一二錢半

每服五錢水 盞生薑五片煎服

牛黃散 治心臟中風恍惚恐懼悶亂不得睡

臥語言錯亂

牛黃 另研 麝香 另研 犀角

羚羊角 龍齒 另研 防風

天麻 煨 獨活 人參

沙參 茯神 去木 川升麻

甘草 炙 白鮮皮 遠志 去木

天竺黃 各二錢半 龍腦 一錢 朱砂 水飛



鐵粉另研

麥門冬各五錢

右為細末研令勻每服二錢麥門冬湯下

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澁胸

膈煩悶志意恍惚身體沉重

防風

麻黃去節

人參

川芎

附子炮去皮

桂心

黃耆去蘆

赤茯苓去皮

酸棗仁炒

白朮炒

獨活去蘆

桑白皮蜜炙

羚羊角

各七錢半

甘草

炙五錢

每服四錢水一盞薑五片煎服

五味子湯

治肺藏中風多汗惡風時咳短氣

晝瘥夜甚偃臥胸滿息促鼻兩邊下至口上

至唇色白急灸肺腧百壯若色黃其肺已化為血不治

五味子

杏仁炒去皮

桂心

防風

炙甘草

赤芍藥

川芎

各一兩

川椒

二錢五分

每服五錢水一盞煎至一盞服



獨活散 治腎藏中風腰脊疼痛脚冷痺弱頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

獨活 附子 當歸

防風 天麻 桂心 兩各一

川芎 甘菊花 枳殼

山茱萸 黃耆 酒炒 丹參 其細切

牛膝 酒浸 草薺 酒浸 甘草 炙

細辛 去苗 菖蒲 白朮 各五錢

每服四錢水一盞半生薑五片煎服

四君子湯 治氣虛脉弱

人參 白朮 茯苓

甘草 各等分

水煎服加陳皮名異功散加橘紅半夏名六

味君子湯

四物湯 滋陰補血

熟地黄 川芎 芍藥

當歸 各等分

水煎服四物四君子兩方合用名八珍湯更



加黃耆肉桂名十全大補湯肉桂芍藥甘草  
小建中湯也黃耆肉桂芍藥甘草即黃耆建  
中湯也半夏橘紅茯苓甘草即二陳湯也

附子理中湯治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉  
利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷  
腹中雷鳴一切虛寒之證並皆治之

人參 附子 炮 乾薑 炒  
甘草 炒 白朮 各等分  
水煎服

蘇合香丸 治傳屍骨蒸疰忤鬼氣卒心痛霍

亂吐利時氣鬼魅瘴癘疫痢痧血月閉痞癖  
疔腫驚癇中風中氣痰厥昏迷等證

白朮 青木香 犀角  
香附 炒去毛 朱砂 水飛 訶梨勒 煨取皮

檀香 安息香 酒熬 沉香  
麝香 丁香 草撥 各二兩

龍腦 薰陸香 別研 蘇合香 各一兩  
右為細末研藥勻用安息香膏并蘇合香油



煉蜜和劑丸如彈子大以蠟匱固緋絹當心帶之一切邪神不敢近

至寶丹 治中風不語中惡氣絕中諸物毒疫

毒瘴毒蠱毒產後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難產悶亂死胎不下並用薑汁磨服又療心肺積熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神竟恍惚頭目昏眩眠睡不安唇口乾燥傷寒讖語

人參

天竺黃

犀角

朱砂 水飛

雄黃 水飛

玳瑁

琥珀 各一

麝香

龍腦 各二錢五分

金箔

半入藥半為衣

銀箔 各五片

牛黃

天南星 各五錢

安息香

一兩五錢為末無灰酒攪澄飛過去沙土

約得淨數一兩火熬成膏

右為細末將安息香膏重湯煮烱入諸藥中和搜成劑丸如龍眼核大人參湯磨服

牛黃清心丸 治諸風緩縱不隨語言蹇澁怔

忡健忘頭目眩冒胸中煩鬱痰涎壅塞精神



昏憤心氣不足神志不定驚恐怕怖悲憂慘  
感虛煩少睡喜怒無時癲狂昏亂

白芍藥 麥門冬 去心 黃芩

當歸 防風 白朮 各一兩半

柴胡 桔梗 芎藭

白茯苓 杏仁 去皮尖雙仁炒黃別研各一兩二錢五分

神麩 蒲黃 炒 人參 各二兩半

羚羊角 麝香 龍腦 各一兩

肉桂 大豆黃卷 碎炒 阿膠 碎炒各二兩七錢半

白歛 乾薑 炮各七錢五分 牛黃 一兩二錢

犀角 二兩 雄黃 水飛八錢 乾山藥 七兩

甘草 炒五兩 金箔 一千二百片 大棗 一百枚 蒸研膏

右除棗杏仁金箔犀角羚羊角牛黃雄黃腦  
麝外為細末入餘藥和勻煉蜜與棗膏為丸

每丸一錢即于內分金箔四百片為衣溫水  
化服

養正丹 一名來復丹 一名黑錫丹 一名三和丹 治上盛下虛裏寒

外熱及伏暑泄瀉如水



硝石

一兩同硫黃為末入磁碟內微火炒極細名太陰玄精石

極細名

水飛船上硫黃各一兩

五靈脂

水澄去沙晒乾青皮去白陳皮去白各

右用五靈脂青皮陳皮為末次入玄精石末

及前二氣末拌勻好醋打糊為丸豌豆大每

服三十丸空心米飲下

稀涎散

治中風口噤單蛾雙蛾

江子仁

六粒每粒分作兩半牙皂三錢

切片 明礬

右先將礬化開却入二味攪勻待礬枯為末

每用三分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者燈心

湯下五分在喉者即吐在膈者即下

星香湯

治中風痰盛服熱藥不得者

南星

四錢

木香

五分

水一盞薑十片煎七分服

藿香正氣散

治傷寒頭痛憎寒壯熱或感濕

氣霍亂吐瀉伏暑吐瀉轉筋

加香藿香扁豆黃連各藿香湯

大腹皮

洗

白芷

茯苓

紫蘇

藿香

各一錢

厚朴

薑汁炒



醫方類聚卷之六

白朮

土炒

陳皮

去白

桔梗

半夏

各七分

甘草

四分

生薑三片棗一枚煎服

清陽湯治口眼喎斜頤緊急胃中火盛汗

不出而小便數

黃耆

當歸身

升麻

各二錢

葛根

一錢五分

甘草

炙

紅花

黃檗

桂枝

各一錢

蘇木

生甘草

各五分

酒三盞煎一盞服炒香附熨摩緊急處即愈

秦艽升麻湯治口眼喎斜四肢拘急惡風寒

升麻

葛根

甘草

炙

芍藥

人參

各五錢

秦艽

白芷

防風

桂枝

各三錢

每服一兩水二盞煎白三莖煎一盞服

順風勻氣散治中風半身不遂口眼喎斜

白朮

二錢

人參

天麻

各五分

沉香

白芷

紫蘇

各二分

醫方類聚

卷之六

九

真中風



木瓜 青皮 甘草炙各三分

烏藥一錢五分 續斷

生薑二片水煎服

虎骨散 治半身不遂肌肉乾瘦為偏枯忌用

麻黃發汗此方潤筋去風

當歸 二兩 赤芍藥 續斷

白木土炒 藁本 虎骨各一兩

烏蛇肉五錢 右為末每服二錢食後溫酒調下骨中煩疼

加生地黄一兩藏寒自利加天雄五錢

虎脛骨酒

石薺去根 石楠葉 防風

虎脛骨酥炙 當歸 茵芋葉

杜仲炒 川牛膝 川芎

狗脊燎去毛 續斷 巴戟去心各一兩

右剉以酒一斗漬十日每熱服一碗

地黄飲子 治舌瘡不能言足廢不能行腎虛

弱其氣厥不至舌下



熟地黄 去心 山茱萸

肉苁蓉 酒浸 石斛 酒浸 附子 炮

五味子 白茯苓 菖蒲

遠志 去心 官桂 麥門冬 去心 各五分

薑五片 棗二枚 薄荷七葉 水二盞 煎八分服

滌痰湯 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星 薑製 半夏 湯洗七次 枳實 炒

橘紅 一錢二分 石菖蒲 人參 各八分

竹茹 六分 甘草 三分 茯苓 二錢

水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

加味轉舌膏

連翹 遠志 去木 薄荷

柿霜 各一兩 菖蒲 六錢 梔子 炒

防風 桔梗 黃芩 酒炒

玄明粉 甘草 酒大黃 各五錢

犀角 川芎 各三錢

右為末煉蜜丸彈子大珠砂五錢為衣食後

臨臥薄荷湯送下丸



鐵彈丸 治中風昏愖口噤直視瘕瘕口眼喎

斜涎潮語澁筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木或

瘙癢此藥極止疼痛通經絡活血脈

乳香另研 沒藥另研 川烏頭一兩五錢

五靈脂淘淨 麝香一錢

先將乳香沒藥陰涼處細研次入麝香次入藥

再研勻滴水和丸如彈子大每服一丸食後

臨臥薄荷酒磨服

十味判散 治中風血弱筋骨疼痛舉動艱難

附子三兩炮 當歸 黃耆炙

白芍藥各二兩 川芎 防風

白朮各一兩五錢 肉桂一兩 茯苓

熟地黄各七錢半

每服四錢水一碗薑八片棗三枚煎六分臨

臥服

醫案

徽商汪華泉忽然昏仆遺尿手撒汗出如珠衆  
皆以絕證既見决無生理余曰手撒脾絕遺尿



腎絕法在不治惟大進參附或黃萬一遂以人參三兩熟附五錢煎濃灌下至晚而汗減復煎人參貳兩者木附各五錢是夜服盡身體稍稍能動再以參附膏加生薑竹瀝盞許連進二三日神氣漸爽嗣後以理中補中藥湯調養二百日而安

延平太守唐東瀛多鬱多思又為府事勞神昏冒痰壅口喎語澁四肢不隨時欲悲泣脉大而軟此脾肺氣虛風在經絡余以補中益氣去黃

耆加秦朮防風天麻半夏十劑證減二三日更加竹瀝薑汁倍用人參兼與八味丸兩月乃愈燕邸張可真自遠方歸忽然中風昏冒牙關緊閉先以牙皂末取嚏次以筋挾開灌蘇合丸二丸然後以防風散投之連進三服出汗如洗此邪自外解也去麻黃獨活羚羊角加秦朮半夏膽星鈎藤薑汁十劑痰清神爽服六君子加竹瀝薑汁鈎藤六十日而痊

吳門太史姚現聞中風昏憤語言不出面赤時



笑是心藏中風也乙亥孟秋延余診之六部皆  
得石脉余歸謂唐名必曰石者冬令之脉也新  
秋見之非其時矣其象先見于非時當其時豈  
能再見耶果至冬月而歿

錢台石年近六旬昏倦不能言鼻塞二便閉此  
心肺二藏中風也服順氣疎風化痰之劑已瀕  
于危矣比余診之六脉洪大按之搏指乃至虛  
反有盛候也宜補中爲主佐以祛風化痰方可  
回生舉家惶懼兩日不決余瞋目而呼曰今日

無藥則斃矣若服參而病進余一人獨任其咎  
乃以大劑補中益氣加秦艽鈎藤防風竹瀝再  
劑而神爽加減調治五十日始愈



醫宗必讀 卷之六

類中風者有類乎中風實非中風也或以風為他證或以他證為風投治混淆傷生必矣茲以相類之證八種總彙于此使學者臨證洞然也

類中風 火中 暑中 虛中 濕中 寒中 氣中 食中 惡中

類中風者有類乎中風實非中風也或以風為他證或以他證為風投治混淆傷生必矣茲以相類之證八種總彙于此使學者臨證洞然也

**火中**

河間曰癱瘓者非肝木之風亦非外中于風良由將息失宜心火暴甚熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用卒倒無知因喜怒哀愁恐五志過極皆為熱甚也 心火盛者涼膈散肝火動者小柴胡湯水虛火炎者六味地黄左痰多者貝

醫宗必讀 卷之六 類中風



母瓜萸散

涼膈散 見真中風

小柴胡湯 治肝膽有熱往來寒熱

柴胡 一錢 黃芩 六分 人參 一分

半夏 各八分 生姜 三片 大棗 二枚

水煎溫服 甘草 四分

六味地黄丸 治腎水不足發熱作渴小便淋

閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽乾齒動

腰腿痿軟便血吐血盜汗失音水泛為痰

熟地黄 八兩 山茱萸肉 各四兩

牡丹皮 各三兩 白茯苓 各三兩

右為末和地黃膏加煉蜜丸如桐子大每服

五錢空心食前滾湯下

貝母瓜萸散 治痰多口眼喎斜手足麻痺

貝母 去心 瓜萸 南星泡

荆芥 防風 羌活

黃礞 炒 黃芩 炒 黃連 炒

白朮 土炒 陳皮 去白 半夏 湯泡七次



薄荷

甘草 炙

威靈仙

天花粉

各五分

水二鍾薑三片煎八分至夜服

**虛中**

東垣以卒倒昏憤皆屬氣虛過于勞役耗損真元脾胃虛衰痰生氣壅宜大君子湯虛而下陷者補中益氣湯因于房勞者六味地黄丸

六君子湯

見真中風

六味地黄丸

見火中

補中益氣湯

黃耆

一錢五分

人參

一錢五分

甘草

五分

橘皮

七分

白朮

一錢

升麻

三分

柴胡

歸身

水二盞煎至一盞食遠服

**濕中**

丹溪曰東南之人多由濕土生痰痰生熱

熱生風清燥湯主之  
內中濕者脾土本虛不能制濕或食生冷濕之物或厚味醇酒停于三焦注于肌肉則濕從內中矣宜滲濕湯  
外中濕者或山嵐瘴氣或天雨濕蒸或遠行涉水



或久臥濕地則濕從外中矣其證頭重體痛四肢倦怠腿膝腫痛身重浮腫大便泄瀉小便便黃赤宜除濕羌活湯虛者獨活寄生湯清燥湯治氣虛濕熱肺金受邪絕寒水生化之源小便赤少大便不實腰膝痠軟口乾作渴體重麻木頭目眩暈飲食少思自汗盜汗倦怠氣促

黃耆 一錢五分

五味子 九粒 杵炒

黃連

神麩 炒

猪苓

柴胡

甘草 二錢

蒼朮 炒

白朮 炒

麥門冬 去心

陳皮

生地黄

澤瀉 各五分

茯苓

人參

當歸

升麻 三分

黃柏 酒炒 一分

水二鍾煎一鍾服

添濕湯

蒼朮 泔浸 炒

白朮 土炒

茯苓 各一分半

陳皮

澤瀉

猪苓 各一分

香附

撫芎

砂仁



厚朴 去皮各七分 甘草 三分

水二鍾薑三片燈草十尺煎八分服

除濕羌活湯 治風濕相搏一身重痛

蒼朮 泔浸炒 藁本 各二錢 羌活 七分

防風 升麻 柴胡 各五分

水煎溫服

獨活寄生湯 治腎虛卧濕腰背拘急筋癱骨

痛脚膝冷痺緩弱偏枯腫重艱步

獨活 桑寄生 牛膝

桂仲 炒 秦艽 細辛

白芍藥 炒 茯苓 人參

當歸 熟地黄 防風 各等分

甘草 減半

水二鍾生薑三片煎一鍾空心溫服

**寒中** 身體強直口噤不語四肢戰掉卒然眩暈

身無汗者此寒毒所中也宜薑附湯或附子麻

黃湯

薑附湯 治中寒昏倒及陰證傷寒大便自利



乾薑 熟附子 各等分

水煎服

附子麻黃湯 治中寒昏冒口眼喎僻

麻黃 白木 人參

甘草 附子 乾薑 各等分

水煎服

**暑中** 面垢悶倒昏不知人冷汗自出手足微冷

或吐或瀉或喘或滿或渴先以蘇合香丸抉開

灌之或以來復丹研末白湯灌下或研蒜水灌

之或剥蒜肉入鼻中皆取其通竅也 不醒皂

角刮去黑皮燒過存性每皂角灰一两甘草末

大錢和勻每服一錢新汲水調下待其稍甦辨

證與藥 靜而得之謂之中暑中暑者陰證也

當發散也或納涼于廣廈或過食于生冷頭痛

惡寒肢節疼痛大熱無汗此陰寒所遏陽氣不

得發越輕者香薷飲重者大順散 動而得之

謂之中熱中熱者陽證也熱傷元氣非形體受

病也或行役于長途或務農于赤日頭痛躁熱



肌膚大熱大渴多汗少氣蒼木白虎湯主之熱

人切勿勿便與冷水及臥冷地宜置日中或含近火以熱湯灌之即活

蘇合香丸 見真中風

來復丹 見真中風

香薷飲 本方加人參白朮陳皮茯苓木瓜黃耆各名半味香薷飲虛者宜之

香薷 去根 三錢 厚朴 一錢 五分 白扁豆 微炒 一錢

甘草 五分

水二盞煎一盞沉冷服 此暑月發散之劑

惟中暑者宜之若奔走勞役而中熱者用此

溫散之劑復傷其氣如火益熱矣世多不知而混用故特表而出之

大順散 治納涼太過飲冷太多脾胃受寒霍亂吐瀉此捨時從證之劑也

甘草 三兩 乾薑

杏仁 去皮尖

肉桂 去皮各 四錢

右先將甘草炒熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁同炒令杏仁不作聲為度後入桂磨篩每服二錢井花水調服沸湯點服亦得



蒼朮白虎湯

知母 一錢

石膏 二錢

甘草 三分

粳米 一錢

蒼朮 一錢

水二杯煎至一杯服

**氣中**

七情內傷氣逆為病痰潮昏塞牙關緊急極與中風相似但風中身溫氣中身冷風中脉浮應人迎氣中脉沉應氣口以氣藥治風猶可以風藥治氣則不可急以蘇合香丸灌之候醒以八味順氣散加香附或木香調氣散有痰者

星香散若其人本虛痰氣上逆關不通宜養

**正丹**

蘇合香丸 見真中風

八味順氣散

白朮 炒黃

白茯苓

青皮 去白

白芷 橘紅

烏藥

人參 各五分

炙甘草 二分

水一碗煎七分服

木香調氣散



木香白豆蔻 研

丁香

檀香

木香 各二兩

炙甘草 各八兩

砂仁 四兩

右為細末每服二錢沸湯入鹽少許點服

星香散 見真中風

養正丹 見真中風

**食中** 醉飽過度或感風寒或着氣惱以致填塞

胸中胃氣不行忽然厥逆昏迷口不能言肢不

能舉若慢作中風中氣治之必死宜煎薑鹽湯

探吐風寒者藿香正氣散氣滯者八味順氣散  
吐後別無他證只以蒼朮白朮陳皮厚朴甘草  
之類調之

藿香正氣散 見真中風

八味順氣散 見氣中

**惡中** 登塚入廟弔死問喪飛尸鬼擊卒厥客忤

手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或錯

言妄語牙閉口噤昏暈不知人宜蘇合香丸灌

之俟少甦服調氣平胃散



蘇合香丸 見真中風

調氣平胃散

木香 川椒 粟烏藥 面青 黑白豆蔻 石菖蒲

檀香 各一錢 砂仁 各一錢 藿香 一錢

蒼朮 一錢 厚朴 薑汁炒 陳皮 各一錢

甘草 五分

水二鍾生薑三片煎一鍾食前服

醫案

太史楊方壺夫人忽然暈倒醫以中風之藥療

乏不效迎余診之左關弦急右關滑大而軟本

因元氣不足又因怒後食停先以理氣消食之

藥進之得解黑屎數枚急以六君子加薑汁服

四劑而後暈止更以人參五錢耆耒半夏各三

錢茯苓歸身各二錢加減調理兩月而愈 此名虛中

亦兼食中

邑尊張太羨令郎丙子六月間未申時暈絕不

知人至更餘未甦此得之生冷太過也皂角末

吹鼻中無嚏舉家驚惶余以皂角灰有性新汲



水灌之更取沉檀焚之俾香氣滿室以達其竅  
至于後方甦服十味香薷飲而安此暑中挾虛  
給諫晏懷泉夫人先患胸腹痛次日卒然暈倒  
手足厥逆時有醫者以牛黃丸磨就將服矣余  
診之六脉皆伏惟氣口稍動此食滿胸中陰陽  
痞隔升降不通故脉伏而氣口獨見也取陳皮  
砂仁各一兩薑八錢鹽三錢煎湯以指探吐得  
宿食五六碗六脉盡見矣左關弦大胸腹痛甚  
知為大怒所傷也以木香青皮橘紅白朮香附

煎成與服兩劑痛止更以四君子加木香烏藥  
調理十餘日方瘥此食中兼氣中

章仲輿令愛在閣時昏暈不知人蘇合香丸灌  
醒後狂言妄語喃喃不休余診其左脉七至大  
而無倫右脉三至微而難見正所謂兩手如出  
兩人此崇憑之脉也線帶繫定一大拇指以艾  
炷灸兩介甲至七壯鬼即哀詞求去服調氣平  
胃散加桃奴數日而祟絕此名惡中







