

褚氏謹

謹

中華民國三十二年十一月一發行

NOV 1 1943  
454  
華北醫藥月報

新華社總社社長司徒明

純結晶維他命B<sub>1</sub>劑

含量確實 效果優超

「新巴拉勢安林」者乃按照國際標準單位  
嚴密定量而製之純結晶維他命B<sub>1</sub>注射劑  
凡腳氣・神經炎等之維他命B<sub>1</sub>缺乏現象以及  
結核・虛弱等營養失調症 均能迅速治癒之

規 格


1號 2號 3號 4號 5號 6號 7號 8號

新野製藥株式會社  
天津出張所・英空第一區新華路一丁目五・五

號 月 二 十

期 一 九 四 三 年 第 二 期

# 荷爾蒙 療法的進步



各大藥房均有販售



北京·天津·青島  
會社

達·公司

## (主治)

豐滿的頭髮，具有強烈的頭髮再生作用，對於英吉西氏病有奇效，雖可與垂體素並列，但其效果，尤其是只對垂體素而無反應者，則效果更佳。因爲係一純粹的蛋白質體，所以一氣吸食之，即能吸收，而起作用，更勝本品。此無異的妙効。

新合成荷胞卵蒙爾

豐滿頭髮  
增強性能力  
改善皮膚  
改善消化功能



# 食母生

開胃健脾  
增添營養  
老人得此  
最為歡迎



## 婦女之福，誰他賜保命後幾個顯明的徵象

操勞家務不倦 經期按月準確 青春不易衰老 夜間睡眠甚酣 晨起精神愉快



信誼化學製藥廠著名出品

藥房  
均售

BV

男用分補  
女用二種  
針補丸

信誼藥廠華北辦事處

(天津)興華三號中街八十二號電話三〇六七四號(北京)西四牌市九  
號電話南局二三六九號(濟南)經五路三號電話四〇二八號(青島)  
山東路八十六號電話二八三九號(廈門)北極路海防路三三三號

強力男性荷爾蒙

# 英男兒萌

主治：性慾缺乏 早洩 陽痿 濕潤 精液漏  
頭痛 倦怠 精力減退 記憶力減退 不眠症  
及初老期 一般表現老象 男子脂肪過多症

包裝：注射液 錠劑

製造本廠

日本川崎市大宮町

帝國社臟器藥研究所

北京市前外西經路三號

北京臟器藥廠

發行總行

大阪市東區道修町

武田長兵衛商店

新亞藥廠華北辦事處

國產有機性砒素梅毒治療劑

# 新消梅素


*'Neosars'*

本品係淡黃色粉末易溶於水其化學成份為二羧基二氨基砷苯甲  
碘酸鈉。(SODIUM 3;3'-DIAMINO-4;4' DILHY-  
DROXYARSENOBENZEN-N-METHYLENE SULPH-  
OXYLATE) 含有 19% 之砒素

主治：各期梅毒、瘧疾、回歸熱、猩紅熱  
各種熱帶病、各種螺旋菌病，

用法：依照病情年齡體質而隨時酌定。

包裝 0.15 0.3 0.45 0.6 0.75 0.9  
每盒一支、十支、五十支。



新亞藥廠製造

標示均舊

柳屯補藥內含大多量利於人體組織之特效成分，

故直接間接有增加紅血球及血色素，以及興奮神經系統，增加體重，旺盛精力，煥發精神等功能，及於治療諸虛百損，健胃補肺，造血固精，效果無不顯著者，近幾年來，購用者日形膨脹者，此是之故也。

(各地藥房均代售)

效果 本位



包裝：850西西

柳屯洋行

天津市義界五馬路元號

聯行：大連、奉天




### 主治

結核，食慾不振，急慢性支氣管炎，食血，一時性頭痛，頭暈，精神不振，營養不良，神經衰弱，產前產後。



NEOTONE

驚人的淋葉成分見  
曾獲諾貝爾醫學賞金  
NOBEL.



1. 為杜福克博士發現而受賞者

2. 治療止癆效果無比

3. 男淋女漏三五日內迅速斷根

包裝：內服藥24片 (各地藥房代售)

包裝：內服藥  
24片

國內藥房均售

治尿病 G-U-CIDE

另有醫藥用品多種，詳細目錄文請函索取。

# NORD- CHINA MEDIZINISCHE MONATSSCHRIFT

BAND 2 NR. 11 NOVEMBER 1943

華北醫藥月報 第一卷第十一期目錄

• 卷頭語 •

採用國藥應付非常時期之代用國藥論

葛藤東(一九)

男性刺戟素與女性刺戟素

葛藤東(一九)

精神病及遺傳

• 病理 •

精神病及遺傳

• 治療 •

不妊症之對策

• 生理 •

肝臟病及色素異常

葛藤東(一九)

皮膚科護病學常識(六)

葛天光(一九)

• 論述 •

醫藥圈播音臺

本社(三三)

# 阿早 AZO 色素化學療法劑



「阿早疾早呢」係占於化學療法界王座之AZO色素劑，以其藥質之後超效果之神速，早已風行於中外矣。本劑特有之殺菌力，直接作用於身體深部之連鎖狀、葡萄狀球菌及其他桿菌類，立即殺滅之，同時發揮解熱、消炎、鎮痛等之功效，得賴控其化學後轉，於短時日內奏顯著之效果。

主治 丹毒·膿腫·蜂窩織炎·淋巴性膿道炎

每瓶 二兩 100片 500片  
五兩 五兩 100片 500片  
一斤瓶 100片 500片

總經理總經理總經理會社  
大同市東區新華街三丁目  
天 晴 四 開 售  
天晴公司第一總經理會社子四二



# 採用國藥應付非常時期

趙家民



研究自然科學應付非常時期之需要者，莫不知有國防化學，與國防化學同處於重要地位者，會有國防醫學及國防藥學。夫醫藥之國防，非醫藥家詳熟注意及之也。若無事前之準備，臨時必有告匱之一日，尋若告匱，醫亦無所施其技矣。

自歐戰爆發，歐洲製藥工廠同時停頓，吾國藥市素仰給於外來之西藥者，顯形恐慌如金雞那霜（Quinine）阿司匹林粉（Acid Acetyl Salicylic）沙酸（Acids Alieitic）精精（Sachet）每磅數元漲至數百元之巨，此因來源斷絕市貨缺乏世不謀求之故耳。幸有日本醫藥界之憂懼，能以大量供給，目下尚可維持。吾國科學落伍之國家，固難圖內之制藥事業，實屬幼稚。昔上海有純礦藥廠首先開創機械製藥之先河，依古法製為丸散水膏，為國藥科學化之嚆矢，今者佛慈藥缺乏已。

## 本社董事

名譽董事長 楊民謹 藥學博士  
顧民政府外交部長  
大井清 藥學博士  
北大醫學院名譽教授

胡連橫 軍醫上校  
內務部衛生局局長  
周頤慶 藥學博士

華北衛生研究所所長  
侯鍾文 藥學博士  
中華民國醫學會會長  
傅汝勤 藥學博士  
前天津市衛生局局長


賀向初 藥學博士  
河北衛生事務局局長  
張恒志 藥學博士  
北京市衛生局局長

德鑑清 藥學博士  
北京大學醫學院院長  
劉光耀 藥學博士  
馬志遠 藥學博士

北大醫學院教授兼秘書  
姚鴻基 藥學博士  
沈德 藥學博士  
華北衛生局局長

醫科器械一船

北京內二區旗守衛五一號



# 男性刺戟素及女性刺戟素

醫學博士 葛 啟東

## 結

性刺戟素療法，中之論文，於近十年來，實謂「汗牛充棟」，對於一般療法，亦因之形成一新局面，雖然，他方多重刺戟素製劑，往往不能奏效，而使用者失誠，遂致對刺戟素療法，亦以為有可疑之結果者。

又多數之臨床家，往往以其物理學的或生物學的檢查法，而對自覺症狀，不甚注意。若此等方法不能說明之症狀，例如一見之下，頗為康健者，但近竟有逐房逐室以退寒，此際若對於胃腸或初期肺結核等症亦無所得到，即在刺戟素之處所而不施何等之處置。患者之症狀，自不消失，而旁走於多數疾病之門前，謬水治療。此際未注意混合之年齡及症狀，而憶及更年期症狀時，施行刺戟素療法，忽告痊癒。因是世人深信普通醫學書籍中，有設置更年期症狀之必要。

診斷雖的確，而施行治療時，亦應注意。因近代刺戟素製劑，為數甚多，往往誤大其詞，殊不知採刺戟素之際，須注意學術的研究報告之結果，勿輕信製藥者之耳飾也。

因內分泌異常所發生之身體異常，原因於單一臟體者，極為少見，是因各內分泌腺間，皆有相互連環之關係。其腺中之乾刺戟素，有異常時，則立即影響全體之其他刺戟素。故因刺戟素異常而發生之症狀，頗為複雜。雖然，此多數內分泌中，其在生理上，佔優越地位者，其異常所發生之症狀，亦較之其他內分泌對所發生之症狀，為著明，故調整其優越內分泌之機能，則其他內分泌之機能，亦因而調整。而身體恢復為生理狀態，性內分泌，即為其最優勢者之一也。

性刺戟素，既有此等之優勢，則對於身體之影響，甚為頗大，其異常結果，立即發生著明之症狀，尤以女性更為著明。月經時，更年期皆發現著明之症狀，故對於女子，應常憶及此點。

## 性刺戟素

性刺戟素有四種，即卵巢源刺戟素，黃體刺戟素，男性刺戟素，及腦下垂體刺戟素中之向性刺戟素者矣，黃體刺戟素，僅於特殊時期應用之。向性刺戟素，對於卵巢源刺戟素及男性刺戟素之生成，有促進及增強之作用，且可轉為二者之代用品，故女性刺戟素，只

謂為性刺激素，亦無不可。至性刺激素之作用，則可分為局部的對性官之作用，及一般的對全身之作用二種。

局部作用，為調整機能障礙，補足性器發育之不全，機能障礙，例如陰萎，早泄，勃起力不足，性慾缺乏，快感缺乏，遺精，攝護腺炎，精液漏，或殘尿感，排尿時尿道異常感等，對此等症狀，可有百分之八十有効，對性等發育不全，例如滑伏丸，使之入於陰囊中，子宮或陰莖增大，促進第二次性徵等。

對於性等機能障礙，數次性刺激素使用，可得有著明之効果，但亦有因於精神異常，而不奏効者請注意。

一般作用，較為廣泛，從來認為宿病，以苦惱度其歲月者，應用性刺激素後，一若忽脫離而享生育之樂矣。

### 頤天閑病

性腺先天性發育障礙時，則發生性器發育不全，及機能障礙二種，而有身心兩方面之發育不全，此狀態是即頤天閑症也。早期指出睾丸之缺，亦可發生之。第二次性徵，缺如，即陰毛腋毛發育皆稀少，或全不發生，陰莖短小，有如幼兒，睾丸難於觸知，號為男子，而容貌似婦人，皮膚蒼白，乾燥落屑，缺乏彈性，被有皺紋，因皮脂自身之缺陷，陷陷於精神憂鬱，舉動不活潑，應答緩慢，喜孤獨，不與人交，心臟為滴心狀，血壓低落，血球血色未減少，血糖減低。此點若應用性刺激素時，則一般症狀輕快，呈激狀態，入於老境者，性器之恢復為不可能，而在青春期者，施行此種療法，則可著明恢復，具性刺激素之應用，須相當長之時間而已。

男子較之女子，其症狀並非為輕度，但亦可視為輕微起狀。若小注重時，而誤以為脾經與更年期經病治療時，多不奏效，只增重者之苦惱而已。

更年期症狀，兩性相同，為性刺激素分泌缺乏之結果。因自精神經之異常，而致生血管神經機能障礙，即循迴障礙，為其主要之症狀。茲特列舉之如下：

1. 逆上，顏面潮紅，難寒天亦覺熱感，顎動脈搏動清晰，頤面，髮際，腋下，手掌，足底等處，發汗，或至淋漓不止。其項圓滿，難夜間亦發汗，而須數次易其被衣。余曾見一患者，一夜之間，凡八易其衣，此種發汗，與盜汗不同，全身竟有熱感，但體溫却平溫。

2. 頭痛，頭暈或偏頭痛等，可有極烈型頭痛，且頑固繼續，血管神經機能異常之症狀，最為不快，又偏頭痛之發生，由於過敏性者，亦可因性刺激素應用，而見有効果，是於發生時，血管擴張，而性刺激素，有血管擴張之性質，故可恢復也。

3. 半身冷感或純麻，四肢末端冷感等，末梢血管擴張之結果，與上述者相反，尤以左側及朝起時，最為強度，指趾末端蒼白，或呈紫藍色，有時有燒走感。

4. 浮腫，血管神經緊張異常之結果，除前述之症狀外，於早晨起床時，眼瞼及顏面，皆呈浮腫狀態，半身之上下肢，亦現有浮腫，屈曲手指，則竟有緊繃感，且感覺握力不堅，其半身亦感覺程度異常，至正午，則浮腫去，感覺恢復，手指得緊握，此種疾患，誤診為心臟或胃腸疾患，而施行安靜療法，或食制療法者不少。

5. 眩暉，頭暉，眩暉，頭暉與上衝，皆為併發現象，起立時，乘電車汽車，或昇降梯時，多感覺有眩暉，又發達之高血壓及低血壓。

與本症之關係甚多。

6.耳鳴，更年期始為必發之症狀，有時且為頑固之單一症狀發現之，其耳鳴之性狀，則或如流水或如蟬鳴，或如金屬音等種種感覺。

7.疲勞感，為最初發生之症狀，從來甚愉快者，現在則甚易倦怠，讀書研究，亦甚易疲勞，此際身體方面，不見有何異常，常誤診為神經衰弱云。

此種睡眠不安，即睡眠時不能熟睡，早晨覺醒時，精神反不爽快，反之晝間反易被睡魔侵襲，食慾不振，便祕，用性刺激藥治療時，則疲勞感立即消失。

8.眼精疲勞，與全身疲勞感同時發生，或眼前有刺痛感，或讀書之際，字跡模糊，易疲勞，婦人於歲經之際，往往不能穿針，此際多就眼科請求診療。

9.皮膚炎，於皮膚上，生有紅麻疹，或痒疹等，雖有為食餌性者，但多原因為內分泌腺異常，因皮膚發炎之故，往往就診於皮膚科醫師，且數年，不能治愈，且發病蔓延及於全身，或局部病變增大，患部搔扒，發疹出現不定，於顏面上變現有出沒不定之色素斑，此際若應用性刺激素，則忽消失，而使患者驚喜異常。

10.關節痛，於四十歲者往往兼有肩背關節疼痛，上肢不得上舉，不得向後方迴轉，在婦人則乳房結節，甚為困難，在男子則以手伸入洋服袖中時，亦感有苦痛，又用手觸物體衝擊時，則肩背關節及臂關節，亦感有苦痛，又用手觸物體衝擊時，則肩背關節及臂關節，且竟有灼熱感，肩背關節，外觀上不見異常，不有腫脹。

發於膝關節者，多為石鈣甲獨發生之。初於坐位立起時，突覺膝痛，膝關節不能伸展，強忍苦痛而直立時，則疼痛減少，步行則兩膝忘去疼痛，得堪長途之步行，又局部可見有灼熱感及輕度之腫脹等，初起時頗似急性炎症症狀，但其徵象呈慢性狀態，而多誤認為慢性風濕症。

其次烟多發生成織繩，其特徵亦為突然發生，著於擡重物時發生，則可誤診為腰斷裂，此亦與其他之疼痛相同，其發生之本態，難以說明，只為利尿素脫落症狀之一，而以持重物，為其過敏之誘因者不少。

又早晨起床時，腰部感覺非常沉重，於極度努力之下，始能起立，但起立後工作時，則忘去疼痛，不感有動作之不便，數日或十數日繼續之後，自然消失。

應行鑑別之疾患，為喚神性脊椎炎，婦人性生殖器之位置異常，內臟下垂症等，此可因體格之檢查及其他方法，鑑別之。

常而發生腰椎性骨炎之骨痛等，非常苦惱，此際只能用強力之鎮痛劑

療法，毫不見効。應用性刺載素時，忽歸於治愈。

11 心肌炎，關節症狀併發之心肌炎，心臟瓣膜症等，因年齡增強而增強，此在文獻上，已多數報告矣。此則因性刺載素之缺乏，心肌內  $Krissin$  減少，心臟機能減退而發生之，同時因心臟機能代償障礙，而發生紫黑色，呼吸困難，心悸亢進，期外收縮，頻數脉，狹心症狀等。狹心症狀，為更年期症狀中之最重要者。

12 狹心症，於夜間忽覺胸部左側心窩部等處有壓迫疼痛，呼吸困難，此在更年期多發生之，其他左側喉頭部有放散性絞扼感，胸悶困難，四肢冰冷，日發冷汗，與真性狹心症無何不同，最初不能區別，其緣由具經過，漸漸得鑑別之。

此等症狀，於夜間飽食之後，恐怖之後發作，左側上肢，不覺異常，同性刺載素，得抑制其發作，或發作停止，而使心肌之  $Krissin$  恢復。

13 高血壓症，本症尚為未解決之問題，內分化泌腺機能異常，尤以性刺載素缺乏時，實為其主要原因之一，多數例證，已證明之。近於更年期，任何人我均陷於高血壓症，可以此種理由說明之。 $Borsig$  告氏病， $Cushing$  氏病等，性腺機能低下之際，可見有高血壓，性刺載素下垂體前葉，及副腎皮質載素失去平衡之結果，而發生之，眩暈耳鳴，則為其併發症狀。

此際應用性刺載素，則可與其他之拮抗載素，恢復平衡，而血壓復歸於正常。應用性刺載素，而使高血壓下降者，其理由即在斯故。此際對於血壓上升之因子，亦須除去，即身心安靜，適當之食量，且應用普通治療劑，以補助之。

計測血壓，須有種種之注意，不宜於冷室測量，運動直後，或食

後等測量時，則甚易發生錯誤結果。平溫之室內，至少亦須三十分鐘之安臥，食前，或精神興奮安靜之後，數度反復計測，則血壓可漸漸自然下降，若對於上述條件毫不加注意，則所測量之結果，不確實，又他處測量之結果，亦不能否定，因本病之高血壓症，往往有著明之差異也。


又更年期高血壓症，不能只依賴性刺載素治療之，一般生活狀態等，亦須加以改善，避免酒煙草過勞飲食過度等之刺激，則性刺載素之作用，當益見強大。

減鹽食，可使血壓者明降，因其結果，可使血中之鈉量增加也。


14 低血壓症，於更年期亦可發生之，此自為無力或衰弱體質之人，自驗之結果，事實上多為此種體質之人見之，雖為低血壓，而自覺症狀完全缺如者亦不少，但達於更年期，則發現症狀，即緩慢且內臟下垂等，四肢冰冷，疲勞，眩暈，頭重，頭痛，食慾不振，睡眠不安，皮質蒼白，此多與腦下垂體前葉，副腎皮質，及甲狀腺等機能之低下同時現之。胃腸下垂時，用腹帶調整腹壁，則血壓可有幾分上昇，若同時投與性刺載素或副腎皮質刺載素時，則血壓上升，各種症狀消失。

15 消化管之障礙，為鼓腸，放屁，便祕等，高度發生時，則於所謂胃腸心症狀群見之。

16 精神異常，入於更年期，則更性生活較遲，對於生命之興奮，發生懷疑，而精神上發生變態者不少，即沈鬱，厭棄職業，現有繪畫，及被寄妄想，而陷於精神錯亂，其較為後性者，可檢驗數年發現之，女子之更年期症狀，於閉經期五十歲或六十歲之際發生之，與此同樣之症狀，在其他時期，亦可見之，閉經期發現者，為更正之更年期，其在閉經期以前發現者，可稱之為第一或第二閉經更年期。



# Anti-Tuberculosis Vaccine



# 紅 口 核 免 疫 元

元寶發達製  
所 安研馬有  
七五〇丁二上江老海貿易公司

天下馳名  
治淋第一

# 都 菜 房 淋 藥

贈  
呈廣告  
本社

## 中央藥房股份有限公司

天津東北城角 天津法租界二十七號路  
電話三局一五六九號 電話三局一五二一號

# 娃 娃 宁

小兒良藥。娃娃寧。成分名貴。  
配合精密。藥量小。效力大。無苦味。容易服。  
主治小兒消化不良。便祕。  
。痢疾。咳嗽。吐乳等症。  
定價每錢二角。每打二元四角。  
天津寶德氏製藥廠出品。

## 華康新藥行

(北京西琉璃廠一百五十九號)  
調劑處方  
醫院用  
玻璃儀器  
化學用品  
衛生材料  
射新藥器  
馳名成藥  
各國器械  
藥材

## 興亞製藥廠

本廠敦聘名藥劑師與名醫  
師會同處方配製各種特效良藥  
名目繁多不及備載印有出品要  
覽函索即寄

廠址：天津特別一區花園路二號  
電話八局〇一〇九號  
營業部：天津法租界華中路三六號  
電話三局〇〇五二號



# 精神病及遺傳

華北衛生行政學院 楊群倫

## 一、外因與內因

遺傳之精神病之遺傳關係而略述之。至於所謂外因性精神病者例如進行性麻痺及中毒性精神病，然非所有之患者皆成進行麻痺，而酒客亦非皆成慢性中酒性精神病者不過其中之一部而已。若此等精神病之原因不能以簡單之特殊型（所謂精神分裂症（Luescher-Schiz.-Theorie）或酒之

精神成分說等）時，則不能不歸他條件如遺傳的關係乃要素因素。以同樣之關係，以身體，精神為主之外因性精神病，亦可多少見之。

再者發病條件上，遺傳及直接誘因以外，身心之諸條件年齡之關係等在種種程度之下亦可參與之。又此等諸要因之關係，如以不同之程度，殆於所有之精神病上皆可認出其為原因之一。

此外因，內因之關係之最明顯者莫過遺傳因子相同之一卵雙生兒，其一致及不一致

## 二、遺傳研究方向之變遷

上記之所謂內因精神病及精神狀態狀態表現不一致者佔二〇—三〇%（Luescher-Schiz.-Theorie），此範圍恐為受極廣義之外的條件之影響，精神為主之外因性精神病，亦可多少見之。

如斯外因及內因對精神有之發揮，一般

茲專就所謂內因精神病，即以遺傳為主原因之精神分裂症，躁鬱症，情感性癲癇及

如擴大外有時尚能避過之。

再者發病條件上，遺傳及直接誘因以外

恰如幾何學上補角之相互關係。即內因濃厚

十九世紀末葉，即以為不論那種精神病皆者

我國病之原因，所謂多形說 (Polyphl. Ph.

V. Wimmer, Vitternsgen.) 認爲病之原因

(Phen) 是也 Morel (1809—1873) 之觀

始達確實之觀點。

曾說如第一代出現精神質等之性格，第二代  
現重鉅神經症，酒精中毒等，第三代則出現  
諸種之精神病者，自殺者，低能者，第四代  
則成白癡，精神錯亂等，甚至血緣斷絕。 Rhem  
氏等亦上言：精神病皆為遺傳之本質。從之  
Dierm. Koller (1805) 當時之遺傳統計  
學者 (Manifestation Maschahalttheorie)  
上，以精神病及精神缺陷之遺傳為因，不稱  
其種別如何，均認爲遺傳負因而舉出之。

然自 Gregor Mendel (1822—1864)

以植物實驗而發見遺傳法則之存在，多數學

者以此基礎，一般生物之遺傳關係之研究始  
見發展，人類及其他之遺傳的身體缺陷及身  
體疾病及同樣各種精神病，精神缺陷狀態  
之遺傳，始有從其種別依別個之遺傳因子群  
而規定之，所謂同鄉遺傳說始為一般人所相  
信。

果如是則精神病之遺傳有 Mendel 法則以  
何等式行之？經幾多研究之結果 (Ruedin,

乃有 Muenchen Ruedin 等研究，全據  
統計上各種精神病患者之子、孫、曾孫  
、兄弟、堂兄弟、甥、姪等之中各種制病  
之病者乃至病質發現之所謂顯家型 (Pheno-

typus) 之數字，証明因一卵雙生兒之顯現

確率 (Manifestations Maeschahalttheorie)

之因子型 (Genotypus) 之頻度。又以平均人

口中之病者有病者之發現程度與之比較，而

成所謂遺傳顯後 (Gen. Prognosis)。

### 三、遺傳性之諸說

茲先述主要之遺傳性精神病及遺傳性精  
神薄弱之型式，於次章再述遺傳顯後之統計  
概說。但遺傳型式不過為想像而不能加以統  
計因子中各優性，劣性而稱因子，如並不完  
全優性，Lange 亦主張不能為優良性或稱  
為劣性，而為顯要因子合併之多對性者也。

(甲) 精神分裂病 (早發性癡呆)  
神薄弱之型式，於次章再述遺傳顯後之統計  
概說。但遺傳型式不過為想像而不能加以統  
計因子中各優性，劣性而稱因子，如並不完  
全優性，Lange 亦主張不能為優良性或稱  
為劣性。

(乙) 精神分裂病 (早發性癡呆)  
Ruedin 著以為是一對劣性，據 Larenburg  
er und Kallmann 等推定為單對劣性，

Lange 認謂既非優性又非單對劣性而為  
二對劣性，Leuz 認謂最低限度亦加一部優  
性之優性，Kahn 認謂分裂性精神病之素因  
為優性，精神分裂病為劣性，Patisse 認單謂  
劣性為分裂病質之主要因，而對精神病則為  
次要因。

(丙) 精神分裂病：大體與精神分裂病之  
遺傳型類似 (Lange u. s. w.) Luxenburg  
假定其為劣性。

(丁) 遺傳性精神病：此極遺傳不能  
產生為單位性者即各種種之夢，即，既有優  
性而或無者 (Pleiger)，亦有劣性傾向而無實

(Lakay Jules) o Lange 認其大部患者劣性，而一部為優性且輕度者。Lauenberger 為多。

#### 四、遺傳豫後之統計

茲將 Lauenberger N 數字摘錄而總括之如下列

	精神分裂症		躁鬱病		異性精神病		精神運動病		精神之殘疾	
	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子	男子	女子
子	14.4 (22.2)	24.4 (23.0)	11.0 (21.1)	14.3—57.9						
女	3.0 (4.1)	—	—	18.0						
兄弟	1.8 (—)	13.7 (15.9)	4.1 (4.6)	18.0—37.6						
妹兄弟	1.8 (2.4)	8.6 (3.1)	—	12.3						
姪姪	1.8 (2.4)	2.4 (1.0)	1.2 (1.3)	7.0—31.6						
姪姪之子	1.6 (2.2)	—	—	6.4						
平均成員	0.86 (1.2)	0.44 (0.6)	0.3 (0.3)	—						

(Nach Lauenberger)

據以形態上之精神病，智能，和兩者之間係，其遺傳之性質之判定以爲極易，然有極諸人種之遺傳研究因兄弟數目少，世代之數多，不能行交配實驗而有各種之不便。

是否爲各各單體之疾病繼發，不然多少之關係也。又考察此等疾病單位的原因，其範圍極有種種不定型者，類似現狀，混合遺傳等，則不易說明之。又如 Schuster 之量表以健康與病相對照質，即病的性質異常及精神病之程度，因其各自之特徵，而各就之進行觀察，則解說之。如精神病與社會之移行關係甚者，可以自然個與解之，與其記之疾病遺傳則迥異。

再者由此等疾病達生活後某一年齡始發病之關係上，未達所謂危險年齡而死者，不論生存者死亡者，其是全健康無從追尋者，生植物等之遺傳研究上亦各相當複雜之關係，例爲單一因子並不止於一形質，經可見對多形質規定之影響，復有對一形質參與多種因子之際，又因與因子可見同樣之規律者亦有之，如是數之則精神病及精神運動病之遺傳模式，遺傳行結果以如何條件決定之，而生傳播之變異。

再有由於胚源之損害，而成立謂之遺傳者，精神，智力低，智各低可能性，然精神之遺傳尚不言不論。

以上簡略述其梗概，因精神關係，無以詳細而述所詳，僅就名義之主要摘要述之，以介紹於牧區之醫之精神病遺傳學者。

#### 五、精神病遺傳問題

人類之遺傳研究因兄弟數目少，世代之數多，不能行交配實驗而有各種之不便。

精神分裂症，躁鬱症，異性精神病，據其發

肺 痰 之 救 星  
上海天一公司出品  
安 肺 星 錐 刷  
此藥為最進步之治肺病劑  
前據斯林芬氏、羅威氏及施米德氏等家研究，採取各中藥品  
製成此完美藥物，對於肺病疾患者，則有立竿見影  
主治：肺癆及肺病之一切副作用。  
用法：每日三次，每次服六片。  
包裝：大瓶二百七十片定價，小瓶九十八片定價。  
江三元  
華北總經理處  
**北方大藥房** 北京西單北大內  
各大藥房均有代售  
電話四局二三六



品質極美効果至確  
獨占最高水準線

成程之劑醫藥素段



NEOARSAMINOL



三共株式會社  
本社 東京市日本橋區  
支社 天津兩營島街一ノ五

每瓶 0.25元 0.5元 0.75元 1.0元  
0.25元 0.5元 (各管 10管 20管)

本品為日本藥局方 Neo-Arsenolate  
之化學的製劑，在日本此種製劑  
之中特有始祖之名譽也。

自本劑問世以來，已博實驗諸家讚美。  
為效力最佳之良藥，新阿兒佐梅諾爾  
其品質合於國際標準以外即日本藥局  
方試驗尤以效力試驗特有超越性能，  
真可稱之為效力第一而無愧焉。

# 三省製藥出品一覽

藥名

氯毒特效藥

新新愛伊拔柳散

淋病根治神藥

保樂因

新淋打兒

葡萄糖注射液

鐵基司脫弱劑

古露得泥骨

葡萄糖E片及液  
古羅鈣托兒  
古露得泥骨

葡萄糖注射劑  
參茸愛利多濟

解疫良藥（解熱藥）

烏麥得民

婦女病根藥

三省調血精

鐵粉劑

新海洛斯達

構成內客  
此劑為SALAKLSAN NATORI  
UM之化學構成及同一之生理作  
用乃經實驗研究中之最新出品絕  
對無副作用確能止滌靜脈注射良  
藥也

本劑主要成分為NH<sub>2</sub>—SO<sub>2</sub>N  
H<sub>2</sub>P—AMINO BENZOL SULF  
TNAMIDE對於速與狀球菌及葡  
萄球菌有決定作用之無色注射良  
藥也

純良藥物（G. ECOSUM）精  
之原料以及特殊方法製造而成之  
滅菌靜脈注射液

9% CHROLCALCIUN  
10% DEXTOSE

高流大參，佛手及其他含有VIT  
AMIN A, B, C, D, 之江學原藥  
物抄製成之補虛壯體造良藥

細胞原形質試活及免疫元氣合作  
用下含有其反應性蛋白體之異丙  
LIVOT 动物性脂肪之有效成分  
以中西藥材由化學研究浸泡精華  
液體製成

COPARNIN 及DITHIOTETRA  
之溴代雙A—BUTYLXYCINE  
YONINSAURE DIACRYLIC  
THIURAMID 之藥及他含有效  
良藥之原製成

滴眼症  
各類風寒其餘固

耳熱，鼻較通，

肺虛，溫瘡等

包裝  
1號 0.15cc.  
2號 0.3cc.  
3號 0.45cc.  
4號 0.6cc.  
5號 0.75cc.  
6號 0.9cc.

靜脈用：  
3~20cc×10管入  
AMP  
5~20cc×10管入  
化膿性創傷，四肢炎筋肉用：  
6~16cc×10管入

連鎖狀球菌，葡萄  
球菌，肺炎菌等  
所患諸疾，急慢性  
淋病，淋菌性膀胱炎  
炎，膀胱炎，化濃  
淋巴腺炎，變紅熱  
等

30片裝（瓶）  
10片裝（瓶）  
25cc裝（瓶）

養生強心，利尿導  
水，榮養細胞，  
水分缺乏之急性傳  
染病，失血，藥物  
中毒，新陳代謝之  
障礙中等

20% 5管入  
20cc 50管入  
20  
20cc 5管入

CHROL-CALCI  
UM  
及愈癒之藥學

一切虛弱各類，肺  
結核，貧血症，動  
脉炎，其他嚴重不  
足之病

195cc 瓶裝  
250cc 瓶裝  
500cc 瓶裝

各種慢性傳染疾患  
其他高齡性之諸症

5cc 5管入  
195cc 瓶裝  
250cc 瓶裝  
500cc 瓶裝

婦女一切百病，子  
宮病，各項盆腔炎  
症，藥者，調經，消炎  
，減輕小便，通暢大  
便，改善消化功能，  
神經症，手術後恢復  
，火燄病，腰痛，腰  
痛，其他。

注射用  
1cc 10管入  
4cc 100管入  
50cc 瓶裝  
內服用  
50片 瓶裝

華北各地大藥房均代銷  
總批發處：北京西四北沿東門牌甲一號

三省製藥北京出張所

（原名三省聯合新藥北京出張所）

電話西馬三〇一九號

# 不 妊 之 對 策

朱 執 中

一、不妊對策之進步  
關於不妊學之治療法，過去曾有多數學者研究檢討，已有相當之進步，但仍未臻最圓滿之城。此乃人政策上最重要之一事，尤在戰時下增殖人口，養育多數健民健兵，實為當前急務。爰草此文，以供醫界同仁之參考焉。

不妊症有兩種，一為原發性，一為繼發性。前者為絕嗣不妊症，自結婚後終生不能懷孕。後者為後子的妊娠，結婚後僅生一二子即不復妊娠者。

## 二、不妊之原因

不妊症之原因有二：一為全身一為局部。一般人常以不妊為女性之缺陷，與男性無關，實為極大錯誤。男性對於妊娠異否，亦有很大關係。

全身的原因與男女雙方皆有關係。凡患有肺病、腫瘤、中暑、頭痛、中寒，精神氣素中寒，過度肥胖，惡性貧血，營養不良，下產期中止產等之懷孕，其不妊娠者，有不妊症之可能。但亦有經過五年七年始妊娠者，故兩三年不妊娠未必一生不能懷孕，吾人實可斷言。

全身的原因與男女雙方皆有關係。凡患有肺病、腫瘤、中暑、頭痛、中寒，精神氣素中寒，過度肥胖，惡性貧血，營養不良，下產期中止產等之懷孕，其不妊娠者，有不妊症之可能。但亦有經過五年七年始妊娠者，故兩三年不妊娠未必一生不能懷孕，吾人實可斷言。

## 三、不妊之種類

係再將局部之原因述之。此因男女而異。男性之生殖器畸形，外傷，或有淋病性炎，皆為不妊之主因。又因淋病而得攝護腺炎，兩側精囊炎，兩側副睾丸炎，致精子異常，生殖能力減退。先天的精子異常，無精子等症極少，幾皆因淋病性疾所致。

女性之性器官畸形亦為不妊之要因。子宮口及頸管狹窄，妨礙精子上昇，又卵管狹窄或閉鎖皆不能受孕。子宮位置異常，子宮發育不全時，卵巢卵管等之位置亦隨之失常，終而使卵管呈屈折，閉鎖狀態。

上述多種原因中常有時一二否或二三種合併而成。故患不妊症時，須先請婦科醫生詳細診斷其原因，分別輕重，及間接或直接關係，以適當處理之。

## 五、治療法

患全身病之男女必須完全治愈。至於局部之病因，在未明瞭是男抑為女之疾時，應先檢查男性。據調查男子不妊症患者約占百分之六三，確定男性並無病狀後再檢查女性有無局部疾病。欲根本解決不妊症，不可疏於其夫之檢查，必須詳細其曾患淋病或副睾丸炎否；男子如有疾病，女性之內外性器官縱令如何健全，亦不能妊娠。故應首先詳細檢查存在之有無，更進而觀察其數目之多寡，運動狀態（生活力）之活潑與否。

婦人之外陰部畸形或障礙時，可用適當之治療，使之妊娠。陰戶分泌物中酸性過多時，可用鹼性液洗滌之。子宮口，頸管等狹窄時，亦可用手術鬆張之。


子宮位置異常，雖非不妊之主要因子，如經堵止，不但易於妊娠，且可預防流產。某婦人曾因子宮位置之異常，每受胎後三月，自驗流產達數次之久，經單者施以子宮後，經無而孕，則懷皆順利分娩。此為不妊治療重要之事。其決定亦甚難。利用喇叭管通氣術，喇叭管通水術等法決定其通否，更由子宮卵管造影法，可確實判定其障礙之部位。同時亦可證明子宮腔之形狀大小，以之確定治療力針刺等方法。

確證閉鎖部位後，可用輸卵管疏通術或輸卵管修復術將閉鎖部分切除，使卵管連接導入子宮內，或將卵巢移入子宮內皆可。子宮發育不全，亦有妊娠的可能性。其治療法甚多，現在常用者有子宮內膜搔爬術及內分泌療法治，皆能使之妊娠。前者比較簡單，亦無危險，但內如過度除去，亦不能妊娠。後者必須於一定期間注射適當之單位量，並須用卵胞內分泌與腦下垂體與葉內分泌，始能完全治療。至於注射法，亦不應於時期過度注射，須有一定之休止期，然後再繼續注射。常有人以為注射一次不能受孕，即擬中止治療，實為大誤。此種治療法因人而異，且須有忍耐與相當毅力而其效果則不能絕對保障。

最後尚有所謂「人工受胎法」，此乃男女雙方經嚴密檢查無疾病，且用種種不妊症之治療法治療，仍不見効時，使用之。根據經驗，用此法一定可以簡單的受胎。但實際如何，並不可測。

總之不妊症之治療法至今日，已大有進步。但治療時仍須由多方檢查其不之原因，如不明其原因無論如何治療亦屬無效。判明原因則可一舉成功。

# 蘇伯蘭丁外素



分 成

蘇伯蘭丁外素係特殊方法將珪藻鈷元素溶成分子及砂狀物質完全除去並用特殊之方法將活性化之活性珪酸鋁加以適當電氣純銀哥雷土配合而成為一種無味無臭之白色沫細粉末研雷土

適應症

胃酸過多症。  
胃癰。對於瀉吐及腹加多兒諸症。細菌性中毒。腸毒自發。腸內異狀及腐敗醣酵。綠便。血便。粘便。大便不通。

製造發賣元  
中村新瀉本區本店  
東京市日市本橋區三丁目  
代理理代店  
野望義高店津浦伊保所  
天津日界西宮島一街一丁目  
五ノ三

# Minophagen A.L

關於驅梅療法。吾人當改從來之陳腐常識。莫過信 *Selvaran*

(六〇六號) 之效力。要真擊檢討新式療法 Minophagen A.L 乃確認 *Selvaran*，(六〇六號) 對於頑固性血清陽性梅毒之缺點。研究創製之藥劑。由是 Minophagen A.L 之適應症如次。

頑固之第二期及第三期血清陽性梅毒，先天性梅毒，*Selvaran* 無效體質者之梅毒及其他早期神經梅毒（主訴頭痛，神經痛，復視，口角異常），聽器梅毒徵，角膜實質炎，發作性血色素眼，青筋等尤是電擊性疼痛，單純性或神經萎縮，內科的梅毒症（心筋肉炎，肝脾腫大）。

## MINOPHAGEN A.L 之發明者

東京帝國大學醫學部助教授

理學博士 梶野松 理學士 高木謙輔

醫學士 高木謙輔 理學士 佐藤靜樹

華中北包辦處

高岡商店

日本大阪市東區伏見町三

華中包辦處

重松大藥房

上海鳳山路一二八

華北包辦處

渡邊春陽堂

青島市寧天路二三五

## 製造發賣元

合資會社

MINOPHAGEN 製藥本鋪

東京市四谷區內藤町一番地

## 句裝

2瓶	5管
刀	10管
粉	50管
1.5瓶	5管

# 肝臟病及色素異常

華北衛生行政學院 楊群倫

皮膚粘膜之色素異常以 Melanin

Hemosiderin 等之血色素

例見於皮膚科。茲本經主要為屬於內科之肝臟病之伴隨症狀而已。

外陰部、或腋窩等此增生檢驗觀之，而黑色素散至全身。

生成之色素沈着而起者最多，與此變化如直

接關係者為副腎，而肝臟與副腎造血機關關係

故亦佔重要之地位，能起血性色素之色素異常。

常。

全身所見：多伴肝硬變肥大，在肋骨下可觸知表面平滑之肝臟，脾臟不腫脹。

患者煩渴、食食、羸瘦、倦怠，而次第色調因人而異。主要為有金屬性光澤，初期為黃褐色，末期則呈暗黑色。

○實驗言之一般皆是青銅色。組織所見：表皮基底層，真皮網狀層皆有多量 Melanin 存在，此外鐵反應陽性之 Hemosiderin 沈着於

血性色素增生症 Hemosiderosis

皮膚之變化：皮膚之色素增生為其主徵，本病併於內臟亦有多量色素沈着，有時皮膚鷄冠狀，汗腺、血管之內被層。此外亦可見此現象，故皮膚色素增生稱為必發之 Hemostasis。

本病為極不常見之疾病，其發生率在獸

類僅有百數十例之報告，中國、日本皆無記

載生部位為牛乳上色素多之處如面部，

原因：肝臟先起病變，其結果生鐵之代

謝異常，皮膚有破壞血色素沈着，本有一部

分人謂傳染病為本病之原因，而以動物  
有傳染否者說者亦不少。

診斷及鑑別：以全身之青銅色色素沈着

、癲風、肝臟之變化為診斷之目標。細檢學  
上試驗反應而證明 *Hemo-tein* o

需要鑑別者為 *Addison's Krankheit*

，有時本病與 *Addison'sche Krankheit* 合併

，僅以此來鑑別之。組織學上

*Addison* 氏病之色素由 Melanin 構成之  
，可由顯微鏡檢出，又 *Addison* 氏病無肝硬

、癲風、肝臟之變化為診斷之目標。

鑑別：

後：一般不良。

治療：Iodoquinol 治療，或行鈉尿病之食

飲療法。

肝斑 Chloasma

色素性母斑不同者為本病為對稱限局性。

等。

臨病子代發牛於面部之限局性色素斑  
。本病多於中年男為，前額、頰部及眉毛或

子宮性肝斑。

臉裂之周圍。

### 黑色表皮腫

為左右對稱性，鄰面圓之界限甚清楚。  
亦如較為深浸性者。

色調皆為褐色或牛奶巧克力色，於健康  
之人多，有時見於多少貧血之人。

粘膜無色素。

患者全身症狀良好，高田氏反應，葡萄  
糖負荷試驗多為陽性。

本病果為單純之肝臟機能不全或由於其

他之內分泌腺之障礙之合併症之小病。

診斷：發生於男子，無其他特定之障礙

，僅面部之色素沈着為診斷之目標。

鑑別：不似 *Addison* 氏病之有全身障礙

色素性母斑不同者為本病為對稱限局性。

等。

子宮性肝斑。

出生時成年期，再者本病發生於男子並無非

子宮性肝斑。

病變子代發牛於面部之限局性色素斑

。本病多於中年男為，前額、頰部及眉毛或

子宮性肝斑。

含併病口本病在肝臟以外之惡性腫瘤亦現之

。年齡為中年以後，男女皆發，著色於腋窩

，外陰部，顏面等處是暗褐色，間的表皮餘

物肥厚表面粗糙，底座多發乳頭瘤。全身症

狀為貧弱，貧血，脫力等早期死亡。

病理：本病皮膚肉質層肥厚，基底層及

鱗皮上層 Melanin 增生者明。深部上計膜

，則腫在見腫瘤。

診斷：全身皮膚之色素增生，惡液質，


治療：Iodoquinol 治療，或行鈉尿病之食

飲療法。

後：不良。

治療：原發腫瘤剔除 *excision* 之技術

# SULFOLID G.B.



粉劑：每瓶二十五公分  
包裝

或一百公分

片劑：每瓶二十五粒或

一百粒每粒含量

五毫克

注射液：每支五支每支五

公升或每盒二十

五支每支五公升

— 許特齊齊 —

(滿・佛・米・英・日)

用採御院病學大谷・道鐵・軍海・軍陸

ワセルジ反應に劣らぬ創期的大發見

即時反應



微毒血液・着色法

本劑は各科領域に亘る諸大家が各自専門的追試實驗で検討され、その效果の偉大なるを決してワフセルジ反應に劣らぬと證明されて、既に百に餘る文獻が世に公にされて居ります。

試驗器具

イチチゲン (試薦)	二十アンプル入 〔使用説明書附〕 四〇〇
イチチゲン (試薦)	十アンプル入 〔使用説明書附〕 二・三〇
井出機反應試験器具 (使用説明書附)	五・七五
イチチゲン (試薦) 英文解文 (説明書附)	五・七五

井出機 大鏡 金箱六個也

(全國著名器械及藥店  
にて販賣實驗用具  
第一製造第二製造等)

販賣元 東京 いわしや 大磯商店製品部

馬博士著文

定價 國幣 貳圓 (分六角四錢)

發財之道

四號

發行所 北京石牌胡同 大西醫藥局

選材製造純潔可觀

正民平散

維他命劑總經理

維他命片

維他命針

止血K類注射劑

維他克

防癌鈣

魚肝油精與鈣合劑

維他素

本廠榮譽出品

蒂阿素 (Thiamine)

一四五二局東近畿鐵十六甲南小內青京北：並購

# 皮科護病學常識（六）

國立北醫學院皮科教授 蘆光天

## 第二：外用局部療法

### 1. 使用藥物之基本原則：同一藥物之劑

劑，以其製法之不全，其治療效果則迥異，

而其使用方法亦各不同，例如同為亞鉛華製

外用局部療法者，即將藥物直接作用於

病患之局部，而更其練治療目的之方法也，

劑，粉末與泥膏，不但效果大有出入，連藥

物亦各自不同，其使用方法更各異其趣，況

病症自易，適於此時此劑之藥物，未盡適合

彼時彼處之疾患，而以個人之皮膚感受性不

同，適於此人之藥物，未必適彼人，且使用

技術之均拙，影響尤劇，故且以不令患者自

己用藥為原則。

### 2. 藥物之深遠作用與其使用法之關係：

層因之而軟化而膨脹，皮膚因被擴之變調，

## 一、皮膚病治療之手技

細胞間隙及淋巴管擴大，因之新藥劑之吸收

力增強，而其擴張作用增大，茲按最主要擴

張方法之擴張度，順列於后：

• 粉末劑之擴張 Pulver Behandlung

• 酒精或以脫脂之浴布 Spiritus

Oder Alkoholische Pisselung (於浴液氧化

後有標示粉末之殘留。)

• 指導浴液 Schuettelbaden.

d. 浴液 Linsen.

e. 泥膏 Paste.

f. 軟膏 Salben (於軟膏綿帶下，其深達

於附着物較少時之除去：附着物較多，

如輕度鱗屑的成等，則以脫脂棉蘸油脂帶

輕輕拂拭，已可充分達其目的。

g. 硬膏 Plaster

此外不適適性素謂 Underplastik

Pinselung 及油紙等並用，再加之濕布綿帶

Festlicher Verband，使繩綁於氣體之通道

，得以完全防止，則藥劑能更深處作用。

h. 皮膚創面之清拭及其上或有藥劑之擦

去法：交換綿帶之際，其局部殘存藥劑與分

泌物之拭除，固屬細事，然其與治療效果之

影響，實分毫不容忽視，蓋不將其相當清拭

，不祇藥劑不能揮發如吾等所期，反而易將

N. 清潔效果減低，即對於診斷上，亦難得正

確，是以必須設法除去之，若以器械之除去

，有時反惹起局部之刺激症狀，極少應用

，而若以石鹼等洗除之，則每致症狀增強，

故統言藥忌，其最理據之除去方法，猶附庸

物多寡之不全，可分為二，茲分述於次：

a. 附着物較少時之除去：附着物較少，

如輕度鱗屑的成等，則以脫脂棉蘸油脂帶，

輕輕拂拭，已可充分達其目的。

b. 附着物較多甚至肥厚堆積時之除去法

：附着物頗多，尤如頭之鱗皮，殊於手掌足

指附着之角化物質，則非據其堆積之程度，

施以油脂，軟膏，硬膏，濕布等軟化而除去

之不可，然斯法固非一時即可除去。

c. 皮膚創面之清拭及其上或有藥劑之擦

去法：交換綿帶之際，其局部殘存藥劑與分

泌物之拭除，固屬細事，然其與治療效果之

影響，實分毫不容忽視，蓋不將其相當清拭

，不祇藥劑不能揮發如吾等所期，反而易將

其藥劑，變狀更為惡化，故當特別注意，

其除去之方法，惟局部藥敷之如側，亦可分

為二，茲述於后：

1. 陳性炎症性疾患或無刺激性疾患：如

黃疸，紫風，乾癬，魚鱗病等，其清拭時無

何顧慮之必要，即以 Benzio，后離，酒等

，用力擦拭，可連除而無害。

b. 刺激性藥物之疾患：如急性溫疹，皮

膚炎，新鮮白癬等，其清拭法則極應注意，

當在微量避開摩擦下，以無刺殺性之油脂，

如橄欖油等拭除之，但不易拭除時，寧可擦

拭，以免炎症狀之增劇耳。

總之，無意味而用水，石鹼等洗滌清拭

患部，實絕對禁忌，並因此頗易使局部之病

狀增惡，恢復不但不能夠，且惡化之傾向

頗多耳；反之，某種疾患，因行局部浴而得

早期痊癒者有之，例如手掌，足蹠，肛門等

局部，患某種疾患時，以短時間——十五十

五分鐘——之溫水浴，清拭後再以應用之藥

劑塗布，時效倣效。若於該溫水中加適量之

明礬，細砂或來蘇兒等消毒劑尤妙。



# 北京市著名医院

<p>各科診療 諸科住院</p>	<p><b>大生醫院</b></p>	<p>專治產科婦科內科兒科花柳科及傳染病科 新舊聯合收容先導</p>
<p><b>東亞醫院</b></p> <p>醫學博士 周瑞庭 眼科醫師 張善民 電話四局〇九一四</p>	<p>內科 小兒科 X光科 小兒科 住院 接生 諮問</p>	<p>長女醫學士 錄一德 院址：和外城家橋十六號 電話南局四八二八號</p>
<p><b>兒童醫院</b></p> <p>兒科專門醫師 吳瑞萍 電話：東局四五八號</p>	<p>花柳淋病 確具把握 看責根治</p>	<p>診所北京西單轉角 路西時間：上午八至十二時 下午二至十時</p>
<p><b>燕中診療院</b></p>	<p>普通外科 專門神經科 正骨外科</p>	<p>院址北京府西六號 電話五二二五八六</p>
<p><b>明正醫院</b></p>	<p>普通外科 專門神經科 正骨外科</p>	<p>院址：北廣場西安門小六郎口 電話三局五六七八</p>
<p><b>志仁診療院</b></p> <p>不分時間 急診接生 專門醫師 院長：周志仁</p>	<p>普通外科 專門神經科 正骨外科</p>	<p>院長前中央醫院外科主任周志仁 院址：北京東城弓弦胡同八號 電話：西長安街一〇四號 電話：南(3)局一三三三</p>



本欄歡迎

大會，閉會之前召開全體會，王錫桓，黃繼伯四氏介紹佈樂謹之討論於月前在太極議，討論會初今後施行方針，與學家京大學教授團逝世。

持，國府署衛生監制之署長，兩組令妹教育女士吸烟，結婚典禮於十月三十日在北京飯店舉行，謝女士畢業於輔仁大學。

北市京之中華醫學會聯合會，與南京之中華醫學會聯合會合，趙家先生醫：大病已至，先列席參加，當時並提出請辭令妹教育女士吸烟，結婚典禮於十月三十日在北京飯店舉行，謝女士畢業於輔仁大學。

本期卷頭評論，惟教考北大藥學系事，請直接函該校詢問是荷。

△北大醫學院內科專任講師是荷。

△北京市自發生鼠疫以後，關有且孽疫源，爰飭屬將，流之勸諭，全場會員一致通過。至於兩會合流後之組織

死亡者共百餘人，現在該病

流行，已完全終熄矣。

△衛生署長陳潤之，十月細則等商討諸項，則俟下月

△北京市衛生局局長張恒

濟南，天津，及北京各地考政會議後，再由格外長召集

龐氏，指揮防疫工作，積勞

成疾，遺已經逝。

△北京市衛生局防疫科長

，於十一月中旬，隨同該署政要職員，均將赴南京出席該

黃成印亦因防疫工作，備極費力，北京觀察，現已返寧。

辛勞，月前一度橫勞臥病。

△東市防疫本部因任務繁

大任務，既興公共衛生

△中華民國醫學會第二屆至，經名流常鍾九，齊公頤



投 稿 簡 章

- 一、本誌為醫藥學研究專稿發表之機關雜誌、歡迎各執著述、治療經驗或特原者者所承認之論譜等稿件。

二、用語以華文為主、文言語體均可、對日文稿件由本社轉為華文而登載之、但可依著者之希望、亦可以其原著日文而登載之。

三、本報每期之稿件、係每一論文在五頁以內者。超過此限者、或需特別製版、耗色印刷等費用、請由投稿人擔負負責之一部分。

四、掲載後之原稿其版權即歸本社所有。

五、來稿已經登載、均致謝意。每千字酬現金一元至六元。(但希望印別冊者其費用由作者負擔)

六、原稿截止期限每期以前月月末為準、依投稿次序而登載之。

七、投稿處、北京市石駒馬大樹藤緣胡同四號「華北醫藥月報社」。

一、本誌為醫藥學・醫學研究專稿發表機關雜誌、歡迎各執著述、治療經驗、或為原著者所承認之論譜等稿件。

二、用語為日本語、華文何れアモ可及文語、口語何れアモ可ナリ  
日文ノモノハ當方ニ於テ華語ノ上掲載フナスモ希望ニヨリナヘ日文ノ上掲載ス

三、原稿為本誌上ニテ一論文五頁以内トス、超過セルモノ及特殊製版及耗色印刷等アモ著シタ費用ヲ要スルモノハ實費ノ幾分フ申受けケル事アルベシ

四、掲載サレタル原稿ノ著作権為本社ニ屬ス

五、投稿者ニ對シテハ謝意ヲ呈ス(但シ別冊要スル場合ハ投稿人ニ於テ實費ヲ負担ス)

六、原稿截止ハ毎號前月末日トシ申込順ニヨリ掲載ス

七、原稿送附先為北京市石駒馬大樹藤緣胡同四號「華北醫藥月報社」宛。

內政部登記證字第五十二號（三十一年正月新刊）  
民國三十二年十一月出版（專明一四版行）

卷之十一

第二卷

北京市石景山大山莊編號  
元

華北醫藥月報社

北京布匹二區總經理三十號

△本社及各地分社一覽

(本社) 北京市石景山大洋路 联合邮局  
电话西局三九五三

(北京分社) 北京市府右街福賢胡同六  
號

(天津分社) 天津市河東區號碼大同福胡同

（日本分社）  
大阪市西區東町根上通一丁目二  
九三

(大阪分社) 大阪市阿倍野區豊中町東一丁目  
電話番号 06-221-7171

詩經卷五十一

代一書  
明倫彙編元佑外編

表紙之一  
一九四九年八月八日  
表紙之二  
一九四九年八月八日

八八  
一〇〇  
一

吉  
致誠之四

普通圖  
一ヶ月四拾伍圖  
一年  
合人(次訂)  
一ヶ月十圖  
一年

卷之三

(株式会社新日本興業(株)事務部  
（時代及廣告料金へ従う前金ノ事）

注意　輸出費及廣告費均係先付  
（社代及廣告料金へ繋げ前金ノ事）

食  
者  
生

失  
者  
死

吃飯是人生的義務，誰會見過不吃飯能活著的？

食物是列臍離胃腸的消化，胃腸消化機能健全的人，其身體自然也很強壯，所謂「人是鐵，飯是鋼」，當然三天吃不下一頓飯，兩天喝不下一盤湯的，絕對不會有好結果了。

若素是營養胃腸的家珍，常服若素能使胃腸的吸收及消化機能健全，身體瘦弱者，並且若素更對青年肺病，老年發福，婦女小兒諸病都有特效。

若素為人類打開生之路封閉死之門，加福給你了。

中板若素一元七角五分  
各地藥房均有代售

中國若素製藥公司

濟南營業所之標三路九十七號

北京東單新開橋

# PRONTOSIL



鏈球菌葡萄球菌疾病治療之最大成功即

## 百浪多息 之證明

本品功力強大持久，即有菌滅殺退之功。雖嚴重萬分之病症用之亦能獲愈。內服注射，同樣有效，和平耐受。  
主治：各種敗血性症候，流產，膀胱炎，腎盂炎，喉炎，丹毒等。

包裝：內服丸劑及注射劑

## PRONTALBIN 百浪太平

內服治療一切由於鏈球菌葡萄球菌釀致病症。  
凡「百浪多息」適應之處，均能應用本品。本品價目經濟。

包裝：內服用丸劑

