

醫方類聚卷之一百四十一

諸痢門

瑞竹堂方

兩湖瀉痢

木香湯治赤白痢久不瘥

黃連 木香 枳實 乾薑

右四味為細末每服二錢空心用米飲湯

調服大有効驗

神効雞清丸治一切瀉痢



木香二兩 苝連二兩 肉豆蔻十個大者生

右三味先為細末取雞子清搜藥作餅子

於慢火上炙令黃色變紅者稍乾再為末

麩糊為丸如桐栝子大每服五十九空心

米飲湯下 方同 經驗秘

固腸丸治瀉痢及泄瀉史橋齋家傳

肉豆蔻麩裏 龍骨煨所 阿膠蛤粉炒 亦石脂

煨十次 附子炮 乾姜炮 木香濕紙裏煨 人參去

醋上各 沉香不見火 白木二兩 訶子二核

右為細末粳米糊為丸如栝桐子大每服

七八十九空心米飲湯送下服藥後覺熱

去附子加茱萸壹兩黃連壹兩

椒紅固腸丸治脾胃積冷腸鳴快便滑泄腹

痛藥 神麩六兩 白木壹兩 川姜炮

三川椒紅淨 厚朴去麩皮 肉

豆蔻裏煨 厚朴去麩皮 肉

右為細末別用蒜不拘多少濕紙裹煨香

木香二兩 肉豆蔻二兩 肉豆蔻十個大

右三味先為細末取雞子清搜藥作餅子

於慢火上炙令黃色變紅者稍乾再為末

麩糊為丸如桐栝子大每服五十九空心

米飲湯下 方同

固腸左治瀉痢及泄瀉史橘齋家傳

肉豆蔻麵裏 龍骨煨 阿膠炒 亦石脂

煨十次 附子炮 乾姜炮 木香濕紙 人參去

已上各沉香 半兩 白木二兩 訶子去核

一兩不見火 炒

右為細末粳米糊為丸如栝桐子大每服

七八十丸空心米飲湯送下服藥後覺熱

去附子加茱萸壹兩黃連壹兩

椒紅固腸丸治脾胃積冷腸鳴泄滑泄腹

痛

神麩六兩 白木壹兩 川姜炮

三川椒紅 厚朴去 薑皮姜 肉

豆蔻裏 煨

右為細末別用蒜不拘多少濕紙裹煨香

熟剝淨研如泥熟湯化開濾去滓少入麵打糊搜藥為丸如梧桐子大每服七八十丸空心米飲湯送下日進二服

紅豆丸治臟腑泄瀉名為殄泄

麥蘖 半夏湯泡七次砂仁 神麴各一兩 硃砂各半炒

砂化甘草 青皮去穢陳皮去穢白鬱金 紅豆

藿香 棠棣 蓬朮各一兩 良姜 草撥各二兩

丁香半兩不見火 右為細末水煮麴糊為丸如梧桐子大每

服壹百丸米飲或隨物空心送下病甚者

日進三服

白朮調中丸治脾胃不和心下堅痞兩脇脹

滿臍腹痛噫宿腐氣霍亂吐瀉米穀不消

久痢赤白膿血相雜多日羸瘦不思飲食

神麴四兩白朮半兩人參去白茯苓去猪苓

皮去澤瀉各三錢木香二錢官桂乙錢乾薑

皮去甘草各乙兩 右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五

丸

七十九空 心淡姜湯送下

神應丸治水瀉食瀉積瀉赤白痢休息痢無問遠年日近並皆治之

黃連

二兩膏半生用

吳茱萸

淨二

罌粟殼

二兩去筋末

木香

二兩俱要分淨炒黑黃色

右為細末用陳倉米粉同好米醋打糊為

丸如梧桐子大每服五七十九空 心米飲

湯送下

經驗秘方同

乳豆丸治臟腑泄瀉不調

常州詹教授傳

乳香

乙酉別研

肉豆蔻

二兩麩裏煨熟取豆蔻切碎別研為末

右為細末相和用陳米粉糊為丸如梧桐

子大每服五七十九空 心用米飲湯送下

二神丸治脾腎泄瀉不止

程裕卿推官傳

破故紙

生炒

肉豆蔻

四兩

右為細末用肥棗取肉研膏和藥杵丸如

梧桐子大每服五七十九空 心用米飲湯

送下二神丸論加木香二兩名木香三神

丸孫真人云補腎不若補脾許學士云補

脾不若補腎蓋腎氣怯弱則真陽衰劣不能蒸脾胃脾胃多寒令人胃膈痞塞不進飲食遲於運化或腹脇虛脹或嘔吐痰涎或腸鳴泄瀉譬如鼎釜之中有諸米穀無火力雖終日不熟其何能化用破故紙則補腎用肉豆蔻則補脾愚見之二藥雖兼補脾腎但無斡旋往往常加木香以順其氣使之斡旋空虛倉廩倉廩空虛則受物屢用見效加至百九空心用米飲湯入塩

少許送下

經驗秘方同

五味子散專治白瀉不止

五味子

二兩

吳茱萸

五錢細粒綠色者佳

右二味同炒香熟碾為細末每服三錢陳

常粟米飲湯空心臨臥調服日進二服至三

日臟腑微利至七日痊愈

經驗秘方簡奇方同

王氏集驗方

喉末空心陳米飲湯調服

瀉痢

麩朮丸治時暑暴瀉不止

方見脾胃門

治久痢不差黑神散

陳槐花炒 百草霜

右等分爲細末空心粥飲調下二錢數服

立效

治酒痢便血及一切風熱皮膚瘙痒葛粉丸

黃蘗 苦參 葛粉 枳殼 荆芥穗

右等分爲細末米糊丸如梧桐子大每服

五十丸空心米飲下

又方黃連丸治酒痢便血

黃連二兩 赤茯苓

赤芍藥

枳殼各壹兩

右爲末米糊丸如梧桐子大每服五十丸

空心米飲送下嘗以治酒後嘔逆惡心不

思飲食極效

又方黃連酒黃連半斤用無灰酒三升煮至

黃連心透將黃連細剉日乾爲細末米糊

丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲下

治赤白痢并小便不通篇蓄散地篇蓄爲末

水調服小便不通加鹽少許

積年赤白痢不差雲母石散雲母石末米飲
調方寸匕二服差

治血痢膩粉丸

膩粉錢五定粉錢三

右研勻水浸蒸餅心為丸如菜豆大每服

七丸或十九空心煎艾湯下

治丈夫婦人小兒下利觀音散

木香壹塊方寸黃連兩半

右用水半升煎乾去連薄切木香為末作

三服第一服橘皮煎湯下第二陳米飲下

第三甘草湯下此方李景純傳有一婦

人久患痢欲死夢中觀音授此方服之愈

治久痢累醫不差方黃連膏黃連末壹兩雞

子白和為餅炙令如紫肝色碎為末以漿

水三升慢火煎成膏子每服半合濕米飲

調下白痢加酒半盞同煎

治水穀痢不止方厚朴湯厚朴黃連各三兩

水三升煎取壹升空心服

治腸風下痢膿血相雜槐花散

槐花 蘇木 敗荷葉 赤芍藥 黃連

甘草 枳殼 乾蓮蓬 石榴皮 當歸

石等分咬咀每服五錢水壹觔半煎壹觔

空心服 白痢用白薑棗子煎 紅痢白

茄根煎 五色痢淡竹青煎 噤口痢石

蓮肉煎 小便不通木通澤瀉滑石車前

子煎 水瀉御米殼煎 渴者木瓜烏梅

煎 身有熱柴胡黃芩麥門冬煎

醫方大成

痢

和劑方生料五苓散治伏熱下痢分利陰陽

醫方集成南北經驗方補珍方系類鈐方同方見諸暑門

和劑方黃連香薷散治感暑下痢鮮血醫集成

南北經驗方補珍方系類鈐方同方見諸暑門

和劑方敗毒散加石蓮肉治下痢熱毒衝心

醫方集成南北經驗方不進飲食補珍方同方見傷寒門

楊氏家藏方聖棗子治一切下痢臍腹疔痛

木香二錢 乳香別研 沒藥別研 各肉荳蔻二枚
麩裏

右為末每服壹錢入乾棗壹枚去核先入
壹半藥末在內次入水浸巴豆半粒再入
藥末半錢合定用油餅麵裹壹指厚火煨
麵熟為度去麵并巴豆不用只細嚼棗藥
米飲空心下
醫方集成南北經驗方袖珍方同承類鈔方又云一方乳香壹兩研肉豆蔻二兩煨作末陳倉米糊圓効

南北經驗方

痢

經驗秘方三味黃丸子止諸痢

黃連八兩 枳殼四兩 大黃皮栢四兩

右件為細末麵糊為丸空心飯湯下如裏

急後重加枳殼湯下袖珍方同

張子和方桂苓甘露散

官桂半兩 人參 藿香各半兩 茯苓 白朮

甘草 葛根 澤瀉 石膏 滑石二兩

香寒水石三錢 白朮三錢 干灰半錢 姜半錢

右為末用炒面四兩入前藥一同舊內杵
 千余下丸桐子大服五十加至七八十丸
 空心米飲下如硬入梅水和之
 升陽除濕防風湯如大便閉或裏急後重如
 至圍而不便或少白膿少有血慎勿利之
 蒼朮四兩防風三錢白朮一錢茯苓一錢白芍藥一錢
 右咬咀每服膏兩水二盞先煎蒼朮汁煎
 至膏盡去滓溫服食前
 聚金丸治大腸畜熱或因酒毒下血不已

黃連四兩淨內一兩水浸晒干去蘆黃
 芩各一兩生一兩炒一兩炮山蘇

右為末醋糊為丸如梧子大每服七十

丸米飲無時服黃

地榆散治下血遠年不癒血痔

地榆洗卷柏洗等分

右段粗剉水沙瓶煮數十沸通服不拘

時猴服法

積實三百丸治腸風久而下膿血日數十度

者

枳實 槐花 正各五錢 皂角刺

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服三十丸米飲下酒亦可

藥公湯治傷寒下痢亦治血熱痢

藥皮 三 黃芩 二 黃連 一

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞 經驗良方

每服三錢水一盞煎八分 去滓通口服腹痛加山梔子

小便不利加赤茯苓阿膠煎服

三黃湯治赤白痢多赤少白

黃連 黃芩 黃柏 等分

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓

食前溫服

神效丸治休息痢膿血不止疼痛困弱

常歸 烏梅肉 黃連 等分

又方加阿膠珠為末大蒜成膏丸如桐子

大每服二十九煎厚朴湯送下食前

倉廩湯治下痢赤白或因先是寒邪中臟腑

致發熱者敗毒散加陳米姜棗同煎
當歸導氣湯治膿血痢無度小便不通腹中
痛

當歸 芍藥 各一錢 甘草 半一錢 生地黃 酒浸 陰乾

或二錢 青皮 七錢 槐花 七分

右改咀水二盞煎至壹盞去滓溫服食前
如後重加木香檳榔末各三分澤瀉半錢
如小便利去澤瀉

槐花散治腸風臟毒下血

槐花 柏葉 爛杵 荆芥穗 枳殼 等分

右為末每服二錢空心米飲調下

槐角散治腸胃不調脹滿下血

蒼朮 厚朴 陳皮 當歸 枳殼 各一兩

槐角 甘草 烏梅 錢五分 蘇合香 錢五分

右咬咀水煎服

蒜連丸治臟毒下血黃連不以多少為末用

獨蒜煨熟杵爛丸如桐子大四十九空心

米飲下

加味四物湯治腸風下血不止

側柏葉 生地黃 當歸 人川芎 各一枳

殼 荆芥 槐花 炒 甘草 炙各五錢

右咬咀每服一兩水一盞煎至壹盞去滓

通口服食前用姜三片烏梅少許煎

秘方痢藥

粟殼 夫穰蜜 陳皮 去白 甘草 五錢 乳香 沒

藥 各三錢

右咬咀水二盞煎至壹盞去滓溫服食前

如白痢熱服紅痢冷服如痢不止加青皮
四錢煎

紅丸干治痢

巴豆 四十九粒 去木香 四錢 乳香 四錢 槐

花 一錢 撫丹 一兩 黃蠟 兩

右將蠟石器溶開濾淨再化却入前藥末

勻入丹勻待冷自然成膏油紙包旋丸如

粟米大服三五十九白干姜湯赤甘草湯

香水瀉煨姜飲子

香連丸

黃連

五兩

粉草

二兩

木香

一兩

不

右先將草連用蜜水略拌濕安在銚中重

湯熏之良久取出晒焙干再依上法熏之

再晒得九熏九爆九炒再晒十分干與木

香一處為末水糊丸桐子大每服五十九

食前酒或飲下

治白痢

酸榴皮

半斤

草菓

一斤

陳皮

三斤

烏梅

一斤

甘草

乾姜

塊

又有咬明每服壹兩水三盞煎至壹盞去滓

瀉服食前

勝金丹 煎取正苓 三頭六日 早晚各服

乾姜末

水

黃蠟

等

分

煎

盡

去

右銀石器化蠟入姜末均丸如芥子大服

專治九四七白酒下赤井水下

又左烏梅茶白梅各

又右件去梅仁瓦上焙乾為末搗梅肉爛同

乳香末少許九桐子大以茶為末每服二
三十九茶湯下食前

專治赤痢

黃連

壹兩

朱香

壹兩

甘草

各三錢

水煎

服食前

右峻唯水立蒸煎至壹盞去滓溫服食前

先一日服五苓散三貼次日早服即止如

神效

又方用帶連白青韭夫握去青葉多研取汁
和煮酒一盞溫飲之極驗

又方大七氣湯加延胡索丁香木香煎

補遺治赤白痢續斷木三錢平胃散一貼水煎

食前服

治一切痢

巴豆

一粒

杏仁

一粒

砂仁

末

白芷

末

右二味俱於香油燈上燒存性先將二味

研同砂仁勻黃蠟汁和前藥三百杵丸如

菜豆大服五七丸水下

又方黃連

多

枳殼

心

甘草

烏梅

煎

水

服

之

效

如

神

驗

右咬咀水煎空心服忌魚猪肉油生冷菓
子凡人泄而止水不

治痢

木香二錢 巴豆四十九粒 豉壹兩 洗淨研

爛和勻丸如葡萄子大服壹丸白乾姜下赤

甘草浸水下赤白用井水下

端效小紅丸治瀉痢腹痛膿血赤白

明信明用 各一木三錢 平胃壹兩 一散水煎

右研極細溶蠟一兩 油五七點 為劑旋丸

如莞豆大每服二丸泄痢冷水下痢甘草
水冷下痢後下血者胃風湯下

治痢後手足疼痛名痢風敗毒散加檳榔木

瓜煎服若早不治有成鶴膝風

黑參丸治血痢右以苦參不已多少炒焦如

桐子大服五十九米飲下

黃連補湯治大腸虛冷痢下青黃腹中雷鳴

相逐如痢 水一兩 薑壹兩 正壹兩 薑壹兩 薑壹兩

黃連四兩 茯苓 川芎三兩 酸榴皮壹兩 地榆五兩

類聚 卷之 十七

伏龍肝 雞子大

右咬咀每服一兩水二盞煎至壹盞去滓

通口服食前

治白痢肚腹疼痛

黑荆百草霜 錢五

右為末熱酒調下食前

白朮黃芩散服前藥痢疾雖除更宜調和

白朮 壹兩 黃芩 七錢 甘草 三錢

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓

通口服食前

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜服

白朮 壹兩 黃耆 七錢 甘草 三錢

右咬咀每服壹兩水二盞煎至壹盞去滓

通口服食前

治痢血方昔曾魯公痢血百餘日國醫無能

療者陳應之取塩水梅除核研壹枚合臘

茶加醋湯沃服之一啜而瘥大丞相莊肅

梁公亦痢血應之曰此挾水穀當用三物

類聚 卷之 十七

散亦數服而愈三物散用胡黃連烏梅肉
竈下土等分為末臘茶清調下食前服經

良方

又方治下痢純血

黃栢蜜炙令黃
色壹兩

右為末每服三錢空心溫漿水調下

經
良方

石榴皮散治暴瀉不止及痢赤白右酸石榴

經
良方酸石
榴皮燒灰存性不以多少為末空心米飲

調二錢

椿皮丸治下痢青白經
良方腸中刺痛右椿

根皮不以多少為末良
方白皮晒米醋糊

九桐子大米飲下三四十九

宿露湯治風痢青經
良方血純下

酸榴皮各一
介草菓各一
介青皮二
介甘草二
介杏仁

七粒去椿根皮二錢
半

右咬咀每服壹兩水二盞姜三片烏梅壹
个煎至壹盞去滓露一宿早晨服○良方

類聚聖

十一

右咬咀水二椀姜三片烏梅二箇煎七分
露星一宿次早空心溫服
解毒金花散治下痢膿血熱毒

黃連 各壹兩 黃蘗 各壹兩 赤茯苓 黃芩 白朮

赤芍藥 各五錢

右咬咀每服一兩水二盞煎至一盞去滓

溫服食前 一經驗良方每服四錢水如腹痛

加梔子二枚煎

朴連湯治下痢久不瘥

厚朴 製 黃連 分

右咬咀水二盞煎至一盞去滓溫服食前

○經驗良方右咬咀每服四錢水一盞半

煎八分空心溫服

永類鈴方 管閉而水不流者口不食或又長

治痢欲投補藥必擇溫通之劑如四君理中

須用木香白豆蔻伏蘇肉桂厚朴之類可

以散厥邪外水道開胃脘治纏擾利閉澁

此攻守之意爾金奩若虛損厥逆六脈沉

黃連

十一

絕不可拘此當重補兼收胃氣守而不攻
可也宜四順附子湯參附三建之類若厥
而有痰或所下純白黑錫姜附皆可用治
命痢當以開胃進食爲急若行止澁非惟養
示痢必胃管閉而不通噤口不食危矣又易
簡斷下湯罌粟殼用醋炙加烏梅得法且
有四君料不致閉悶妨食本事用生姜炒
敗毒散加蓮肉治下痢熱毒沖心不進飲食
禁口加陳糯米百五十粒最效 下痢時

當風中手足疼名痢風本方加檳榔木瓜

煎 方見傷寒門

治痢胃苓湯姜棗煎七分嚼姜棗和碎服

陳良甫管見神仙斷下元治三色痢

黃連 淨一斤 南木香 斤 三 日 外 以 水 煎 不 實

右二味人判用水壹斗五升銀石器內同

煮乾分作三處 赤痢用黃連爲末神麩

打糊元梧子大名黃連斷下元人白痢用

木香爲末神麩糊元名木香斷下元赤

類聚

二十七

白痢木香黃連末神麩糊元各件每七十元米飲空心下小兒元如黍米大加減服經驗秘方

瀉痢

治大人小兒婦人瀉痢兩三月後皮膚不實遍身四肢虛腫諸藥不效者

木通四兩陳皮四兩桑白皮二兩葫蘆干用下截打碎

地骷髏五枚即種黑豆一升

右粗末用水五大碗煎至二碗空心溫服

壹椀午前服壹椀二三次依方全料煎服無不效者只宜食淡忌油塩醬肉食但可喫飯魚為妙

治痢以半夏二介巴豆七粒去殼百草霜一

錢好墨壹豆大同研末手心溶黃蠟丸如

黍米大每服四丸紅痢甘草湯下白痢乾

薑湯下大瀉冷水下

治久患脾泄以生薑四兩黃連壹兩剉如豆

大慢火炒令乾薑至乾脆深赤色去生薑

取黃連為末每服二錢空心臘茶清調下
燒肝散治年深泄瀉滑腸一切痢

赤芍藥 桔梗 紅豆 白朮 川椒炒去

目胡椒 肉豆蔻 陳皮去白各半兩 縮砂仁

南附子炮 茴香炒 良薑炒 乾薑炮 蒼朮炒

官桂各一兩 丁香二錢 乾山藥四兩 木香二錢 吳茱

萸三錢炒

右為末每服三錢用羊肝或猪肝三兩薄
批開糝藥在上鋪生薑葱絲一重捲定麻

札紙數重水濕慢火內燒熟細嚼從意食
前米飲湯下日三服

丁香和胃丸治赤白痢

御米殼七片 生薑七片 丁香七介 燈草根七 甘草根七

棗子七介 栢苓兒七介

右先將各味為末後將棗薑同搗千杵以

水丸如彈子大每服一丸赤痢甘草湯下

白痢乾薑湯下五色痢甘草乾薑湯下食

前

薑棗胃苓湯治瀉用生薑棗子煎湯調五苓散平胃散服之大效

治痢疾

乾椿樹根皮兩乳香錢一丁香錢壹柯子二介

水濕慢火煨熟去核用肉

右為末粟米飲湯調下分作二服空心

又方臘茶即夸多年塩梅擣碎

右為丸桐子大每服七丸或十九丸凉水送

下

治赤白痢不止者以地錦草不以多少取自

然汁用糖水調服赤涼服白溫服有效

溫白丸治血痢不止用椿樹根北邊者取來

去粗皮用椿白皮酒浸晒乾熟棗肉好酒

丸如桐子大每服五十九空心溫酒下

治赤白痢

御米殼九烏梅七陳皮一錢青皮一錢

右細末醋糊丸之每服五六十丸臨卧溫

水

一方訶子十二介六介煨香熟六介生用各去核取內焙乾為末

右赤者甘草湯下白者熟炙甘草湯下空

心

治禁口痢用蘿蔔取自然汁壹盞入鹽少許

徐徐呷服

治赤白痢用好米醋壹大盞好末茶半匙煎

至數沸白熱服赤涼服亦白溫服

治痢疾以有節樺皮火燒為灰研為細末溫

酒送下亦治心氣痛

如意丸治赤白痢并酒食傷能消食化氣

黑牽牛頭末八兩官桂三錢丁香二錢木香三錢白豆

蔻三錢縮砂仁三錢人參三錢白茯苓一錢南木香

三香附子五錢淨乾山藥五錢甘草少許

治泄瀉不止以肉豆蔻壹二枚以麩餅子包

裹火煨麵熟去麩將豆蔻為末米飲湯下

乾喫亦可豆蔻用不蛀者溫同六十一

治瀉不止熨臍方艾兩艾葉兩艾灰兩艾炭兩

艾木驚子二兩對蛇床子兩圓御藥艾葉

右爲末指頭粗紙條作圈圍臍填艾藥臍
內上用熨烙口鼻內艾烟透爲妙大効江
東副使相公經驗又云一監同六十之上
患背瘡瀉不止以前方熨臍瀉止瘡亦減
後致安痊

治痢疾

黃連末

蒜去皮

右取五月五日午時同搗成膏丸如桐子
大每服三十九赤甘草湯白生薑湯赤白

甘草生薑湯並食前送下

治瀉不止

小油二兩生薑四兩

去皮切

宿蒸餅

去皮碎

右先將油煉熟香入薑炒熱後下宿蒸餅
炒黃熟乘熱食之如渴米飲湯下

安西五止瀉方

黃蠟

二錢少

黃丹

三錢半

右丸如棗豆大井花水吞下每服七丸五

六月五日臈月十五日合

類聚

三

治痢疾用真綠豆粉皮休過水約一小碗十分釀米醋調下立効運司書吏吳愛泉經驗

治泄瀉不止用千年石灰將大指頭尖大研細好酒調下即止吐瀉不止並治

又方好江茶白塩梅多年同檮丸茶豆如大每服三四十九米飲湯送下

治脾泄養齊治右平章換在大効人參一兩白朮二兩茯苓二兩甘草兩木香兩

訶子肉一兩厚朴二兩皮薑製

右咬咀每服壹兩水二盞生薑三片煎至八分去滓通口服食前

黃連九治瀉痢不止

宣連書兩六吳茱萸去枝梗白芍藥一兩訶子肉五錢

右爲末用大蒜兩介去殼將紙包裹灰火煨熟取出搗細加白米糊少許和成劑丸如桐子大每服五六十九空心米飲湯送

下與治痢紅丸子間服

黃連丸止瀉

黃連三兩陳倉米六錢生薑三兩取自然汁吳茱萸

一兩去枝梗白朮壹兩白茯苓兩一

淨湯泡一過右將黃連剉作小塊如米粒大以薑汁浸

令乾次同陳米炒至色變却入茱萸再炒

略黑色取出與芩朮同碾為末陳倉米糊

丸如桐子大每服五七十九溫湯送下無

時夏月常服去暑肥腸消酒毒化食

治久積痢以烏藥順氣散或自己小便或童

子小便溫熱調服

治積痢以老酒二盞白沙蜜一盞同熬至一

盞白熱服赤冷服紅白溫服

博金散治脫肛自泄

人參一兩白茯苓二兩絡石二兩龍骨壹兩

赤石脂一兩白朮壹兩白茯苓二兩龍骨壹兩略煨

碎右為末每服三錢空心米飲湯服臨卧再

服秘傳神效紅丸子治大人小兒腸胃虛弱內

受風寒或飲食生冷傷於脾胃嘔吐泄瀉臍
腹痛脇肋脹滿腸內虛鳴積痢赤白并酒
積痢並治廉方戶經効

巴豆

四十九粒去殼并心膜及油存性炒熱於銀石器內慢火熬令黃色乳細

以紙包壓去盡油杏仁十五粒須是真者細研冬月少去油

油和巴豆木香三錢半慢沉香壹錢滴乳

香三錢為槐花一錢半

右相和於乳鉢內乳令勻細用真黃蠟一兩一錢於銀石器內慢火化開將好絲濾

淨再將蠟溶開却投前藥於內將竹篦不住手攪令勻次下真抗州黃丹五錢再攪令極勻為度傾出椀內自凝捏成塊如硬入蜜少許如不紅加黃丹如用旋丸如棗豆大用油紙密包每服十九加至十五丸白湯薑湯任下米飲亦可小兒量歲數加減服如小兒泄瀉不可服之如常飲食停滯膨脹熱湯下溫酒亦可如合此藥忌婦人雞犬或男女身上不淨有臭氣皆宜迴

避宜於靜室內閉門用心修合未有不效
可忌數等人

治脚轉筋瀉以艾木瓜煎湯入醋少許搥一
捻服之

經驗良方

諸痢 夏月凡有瀉痢必先服
去暑藥然後用治痢藥

地榆散治下痢純血臍腹疴痛裏急後重日
夜頻併

地榆 枳殼 甘草 各五錢 白芍藥 赤芍

藥 黃芩 各二錢 訶子肉 七箇 鶯粟殼 十四箇

右為細末每服三錢空心倉米飲調下

治痢止腹痛不可忍者右良姜芍藥等分為

末煮姜搥取湯調下

神妙散治赤白痢疾

大黃 人參 枳殼 火麻子 各等分

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十

圓白湯下

治痢不問赤白

大艾 黃連 甘草節 各等分

右法煎令有味溫冷任下數服即愈

二靈散治久痢腸胃俱虛肛門自下

龍骨 半兩煨 木賊 二錢半燒灰存性

右為末每服半錢乾摻候少時以托上

凡卒暴注下皆因飲食不節脾胃傷胃濕熱水谷不分洞然下行夏月飲冷嗜水尤多有之不可便服止瀉藥及溫熱之劑服之恐成

裏急後重而為積痢也得效方法如後

凡痢疾不進飲食投以痢藥則不能療俗名

禁口痢十有九死此乃疫氣傳入臟經當

用人參敗毒散加陳糯米一百五十餘粒

如常法煎服立愈此方活人多矣 敗毒散方見傷

寒內 三錢米為底煎成車前下積散末水煎

秘方香連圓治瀉及痢下膿血日夜不止

木香 三錢 黃連 七錢

右為細末以雞子黃為丸如梧子大每服

五十九煮飯湯下空心食前日三四服

治瀉石用向東方日曬久年陳壁土和車前

子同炒篩去土止將車前子研為細末每

服三錢米飲調服如車前子難為末米湯

濃煎絹濾去滓服亦效

治瀉胃苓散右川平胃散五苓散各二錢水

一盞棗二枚姜三片煎七分嚼姜棗和滓

嚥服少刻又服平胃五苓熟藥鋪皆有辰砂五苓散亦可用

醫林方

泄痢米水研散水調服大黃檳榔

大黃檳榔丸治便血久不可止臍腹痛裏

急後重諸藥無效者

大黃半兩細墨半兩大檳榔二個蕎麥一錢

右為細末醋和丸分為三丸用灰火內燒

令紫色醋內磨開臨卧都作壹服早晨取

下惡物為效

白朮散治米穀不化瀉痢不止中氣淋不可

白朮芍藥各壹兩甘草五錢

類聚百

三十一

右為細末每服三錢白湯調下

越桃散流下痢之後小便利腹中虛痛不可忍者此為陰陽交錯不和之甚也

梔子壹錢 良姜壹錢

右為細末每服三錢米飲調下飲酒者酒

下黃連壹錢

阿膠丸治便血先便而後血謂之濕毒

阿膠壹錢 白朮壹錢 黃連三錢 白芍藥四錢

右為細末水和為丸如桐子大每服五十

如加至壹百丸溫水送下日進四五服

芍藥皮丸治先血而後便為之臟毒

芍藥壹斤 黃蘗壹斤 黃芩壹斤 歸身壹斤

右為細末滴水為丸如桐子大每服五七

十丸煎甘草湯送下大小便未入於此

茜根湯治便血不止諸藥無效者煎取

茜根 黃蘗 阿膠 黃連 赤石脂

二 甘草 地榆各壹斤

右為細末每服五錢水壹盞同煎和滓服

食前

二勝丹治膿血痢

巴豆 杏仁 各等分

右二味砂鍋內慢火燒令煙盡取研為細

末黃臘為丸如沙豆大小兒如米大每服

二丸膿多乾薑湯下血多天黃湯下五小

水煮木香丸治水痢不止者

木香 人參 白朮 白茯苓 陳皮

呵子皮 藿香 厚朴 乾薑 青皮

乳香 沒藥 官桂 當歸 甘草 肉

豆蔻 麩裏燒已 白芍藥 御米殼 去穢隔

味各壹兩 丁香 半兩

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸

水膏盞銀石器內煮散和滓服

退陰如聖散治水痢脉微而遲

白芍藥 二兩 陳皮 一錢 乾薑 半錢 良薑 半錢

右為細末每服三錢白湯調下食前

四白燒肝散治久虛飲食不進瀉痢不止其

類聚

卷四

方出蔡州天賜雷震碑上

桔梗 香白芷 白朮已上各壹兩 白芍藥三兩

縮砂仁二錢

右為細末每服五錢用白羊肝四兩去了

膜用竹刀子刮為漚用鹽少許葱白三根

剉碎與肝藥末同和荷葉裹紙封數重用

漚潤濟了灰火內燒令肝熟取出細嚼米

飲湯送下都為壹服

至聖散治憂息痢久不差者

呵子皮壹兩 丁香半兩 椿根白皮半兩

右為細末每服三錢白湯調下三洲城山

五槐丸治腸風臟毒酒痢下血城隍寺大佛

五倍子 槐花 百藥煎各等分

二右三味為細末酒糊為丸如桐子每服三

十九至四十九煎黃連生薑等分一錢水

送下空心服之

烟霞聖效方黃連 川芎 刺艾 川椒 薑 一

泄利

四聖散治赤白痢

御米殼

四兩蜜炒黃色

甘草

二兩

陳皮

二兩

乾薑

一兩炮裂

右件為細末每服三錢水一大盞煎三五

沸食前溫服大有神效

二毒丸治腸風瀉血裏急後重

白土硫黃

壹兩

茶

壹兩

右為細末用新炊熱飯為丸如桐子大每

服十九至十五丸米飲湯下日三服加丸

數服

阿膠湯專治便血不止

真阿膠

七片於鐵器內炮盡膠性

右研為細末都作一服用水一中盞煎三

五沸溫服

奪命散治膿血瀉利遍數頻多腹痛欲絕者

服藥如神

精明乳香

五錢

沒藥

半兩

右為麝末每服抄壹錢半水壹盞煎三四

沸和滓稍熱服不計時候只一服取效

二薑湯治瘧疾膿血瀉痢

乾薑一兩良薑一兩

右二味同為細末每服二錢熱醋調下如

治瘧疾未發前服又治瀉痢不計時候服

烏龍丸治一切痢疾

巴豆七杏仁七介已上二味用文武火燒存性

右為泥百草霜抄壹錢黃蠟壹兩化開和

丸臨卧服朱砂為衣梧桐子大每服五七

丸新水送下

朱砂丸治一切痢右用好信不以多少研爛

燒乾餅為丸如米大朱砂為衣每服大人

二三丸小兒五痢薑湯送下赤白痢煎

草湯調乾薑末送走解米飲湯送下

玉乳散治泄血痢

黃丹壹錢白麵壹錢精猪肉四兩作片子撒藥在內紙裏了

右件藥用文武火燒熟用米飯壹大匙

喫立驗

燥腸丸主臟腑虛滑冷痢不差黃丸

烏頭炮去皮 硫黃一个焙應去滓再炒為末 黃丹 礬灰

各四兩

右同為末醋糊丸桐子大空心米飲下五

十九白

壽親養老書

震靈丹老人血痢白梅茶下

治瀉痢乳香散和氣止藏毒瀉血腹內痔痛

等乳香

乳香少許 阿子皮分 常歸半 木香分

右細判與乳香微炒候當歸乾為度杵為末

每服二錢用陳米第三度泔六分壹盞煎

至五分空心午前服此方最妙患及百餘

日者服之皆愈

治赤白痢方三兩 南青艾白 車前兩

黃連半兩 漢椒兩壹

右同炒令黃色去火毒為末以多年水梅

肉圓如棗豆大每服二十元鹽湯下小兒

加減用之

施圓端效方

瀉痢

和胃散治冷熱不調瀉痢膿血腹痛後重米

穀不化 范師方

御米殼 去帶蜜浴炒三兩

南青皮 去白 車前子 炒 廿

草 生各書兩

右為細末每服二錢煎橘皮蜜湯調下

換腸丸治大人小兒瀉痢膿血腹中疴痛困

倦減食裏急後重日夜不止

當歸 切焙半兩 青皮 去白 木香 各壹分 陳皮 去白 阿子

皮 各七錢 甘草 炒 豆蔻 各四錢 御米殼 蜜浴炒

右為細末煉蜜丸如彈子大小兒櫻桃大

薑湯化下壹丸

當歸四聖散治一切下痢膿血頻併臍腹絞

痛不可忍者

當歸 切焙 芍藥 各二兩 御米殼 蜜炒 甘草 炒

茯苓 兩 黃耆 三兩 二錢如無地榆同用

右咬明每服三錢水壹盞半煎至六分去

滓食前溫服

加減當歸地榆散治冷熱不調氣毒惡毒濕

熱腸垢毒痢休息膏痢腥穢乾嘔不食肌熱

小便瀰范師天

御米殼蜜炒當歸培地榆黃連揀淨芍

藥甘草炒各

右咬咀每服三錢水一盞半煎至七分去

滓溫服食前日進二服氣毒痢加黃連當

歸一倍

歸連散治冷熱不調下痢膿血頻併後重腹

內疔痛飲食不下以至危困三服立止此散

黃連揀淨黃栢當歸乾薑炮等

右咬咀每服四錢水二小盞烏梅一箇切

碎同煎至壹盞去滓溫涼隨意服食前

蔚金散治一切熱毒痢下血不止潭頭張

川蔚金槐花炒各甘草炒

右為細末每服壹二錢豆豉湯調下食前

神聖丸治瀉痢膿血腹痛後重

川當歸焙 枳殼去穢 黃耆 陳皮各四錢

甘草炒三錢 乾薑炮一錢半 御米殼去蒂蜜炒二兩半

右為細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸細

嚼米飲食前下日進二服不吐

辰砂丹治冷熱不調赤白毒痢久不愈者陰陽

樊元真方 朱辰砂明 信砒粉霜 各半

右研極細鎔蠟七錢油七點為劑油紙裏

旋丸如小豆大小兒如菜豆大每服壹丸

六月草水冷下食前小兒

鶴頂丹治大小一切瀉痢無問冷熱赤白瀉

絲不差愈而復發腹中痛疼方

白膠香米 鱉子淨 黃丹生 商陸砂 粟

黃蠟各一 杏仁各一 信砒各一 硃

砂各一 乳香各一 各半

右為細末鎔蠟為劑入油二十點令軟油

單裏旋丸麻子大每服一丸小兒半丸泄

瀉冷水下赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下

類聚

赤白痢雜乾薑甘草湯下忌物壹時辰孕婦不可服

斷痢散治一切瀉痢腹痛久不差火名玉國祥方

肉豆蔻 丁香 乾薑 各二錢 半兩 甘草 炙 陳

皮 呵子 去核各 御米殼 去穢 淘

右咬咀每服二錢半水壹盞煮乳香壹粒粟

米百粒同煎至七分去滓溫服食前霍亂

吐瀉水冷服

六神散治瀉痢腹痛不可忍泊頭賀潤輔方

御米殼 蜜炒 青皮 去 陳皮 去 烏梅 肉 乾薑

炮甘草 炙各半兩

右為細末每服四錢水壹盞半乳香一粒

同煎至六分去滓溫服食前日進二服

定粉散治小兒瀉痢腸滑日久高唐田子玉方

瓦粉 炒 蜜陀僧 四錢 烏魚骨 壹錢

右同研為細末每服半錢至壹錢米飲調

下

黃連丸治一切熱毒血痢大人小兒另丸全魏

寶伯
祥方

黃連去須黃栢 槐花炒栴白各壹兩

右為細末軟粟米飯為丸如梧子大每服三十丸米飲下食前日三服

藥皮丸治藏毒便血疼痛嘔噦

黃連 黃藥 芍藥 槐花炒各二兩

右為細末滴水為丸如梧子大每服三十丸米飲下食前日進二服

小紅丸治瀉痢腹痛膿血赤白樂德全

明信 明丹各壹兩

右研極細鎔明蠟一兩油五七點和為劑

旋光如豌豆大每服二丸泄瀉冷水下痢

甘草水冷下痢後下血者局方胃風湯

小聖散治赤白冷痢腹痛後重涇川趙彥和方

御米殼去蒂蜜浴炒黃三兩陳皮去白乾薑炮甘草炙各壹兩

右為籠末每服三錢水壹盞半煎至七分

去滓入蜜少許食前溫服

濕熱垢毒惡痢

天行時氣斑疹瘡病中間前後濕熱毒痢等多與雜病不同須當照依中景活人傷寒論中治法臨時加減主治之不可一例執方療治差錯反傷害人性命矣

黃連阿膠湯 地榆散 三黃熟艾湯

四逆薤白散 葛根黃芩湯 黃連阿膠

丸

右前藥等輩消詳選用而用之

吳氏集驗方

瀉痢

秘臙圓止瀉痢

巴豆十四粒燈肉荳蔻一箇半黃丹少

右同搗為末用蒸餅為圓棗豆大如水瀉

冷水下兩圓赤痢甘草湯白痢乾薑湯各

各二圓

斗門散治水瀉吐逆脚轉筋

附子壹隻胡椒壹百粒

右爲末每服三錢漿水壹碗煎四分溫服

空心

香連散治痢

木香壹分麩裏火煨黃連壹分焙

右爲末每服三錢米飲下空心

根花飲治臟毒酒病便血

槐花半兩炒山梔子壹兩去皮焙

右爲末每服二錢新汲水調下食前

絲瓜散治酒痢便血腹痛或如魚腦丘色腥

穢者

乾絲瓜壹枚連皮燒作灰

右爲末煮酒調二錢空心

化酒飲子治酒毒使血黃連焙乾爲末每服

二錢空心溫酒下

角子湯治腸風下血

黃牛角心一兩火煨存性檳榔壹分

右爲末每服三錢食後陳米飲下

燒梅飲治便血烏梅壹兩入火燒去核研爲

末每服二錢空心米飲調下

針頭圓治痢瀉

黃蠟一槐如指人 巴豆七粒燈上燒出油 杏仁七箇去皮尖

百草霜錢 黃連許

右為末研令和圓如小棗豆大赤痢甘草

湯白痢乾薑湯吐瀉新汲井水各下三圓

神效名方

下痢

治痢

紫苑 桔梗 赤芍藥 白朮已上等分

右為細末每服三五錢細切羊肝拌之作

麵角兒燒服之後用白湯送下食前

治痢杜蒺藜炒碾為末酒調下三兩服

立應九治藏府泄痢膿血不止腹中疼痛

乾薑一兩炮 百草霜壹兩 連皮巴豆炒一兩 杏

仁壹兩 色榨為泥後入霜研

右用黃臘四兩鎔開臘次入前四味用鐵

器攪勻旋丸桐子大每服三五丸甘草湯

下白痢用乾姜湯下食前若水瀉溫水下
事林廣記

泄痢敗毒散加陳米五十粒煎服治禁口痢

妙

冷痢附子炮去皮臍烏梅燒灰等分姜棗煎

服

赤白痢連翹丸

赤痢用黃連湯下
白痢用白薑湯下

食前

治痢黃丹不拘多少熔黃蠟和劑為丸如豌豆

豆大每服三丸赤痢甘草湯下白痢乾薑

湯下赤白痢甘草乾薑兼用之

山居四要

痢五倍子末為丸赤痢甘草湯下白痢乾薑

湯下各三十丸

又方以陳皮艾葉濃煎湯服衛生易簡方同

急救仙方

治赤白痢方訶子

六介煨熟
六介生用

去核取肉焙干

為末下赤痢用生甘草煎湯調下白痢

用炙甘草煎湯下只空心服之甚者不過

再進 衛生易簡方同

治癩丸子

大半夏仁 巴豆七粒 百草霜壹錢 京墨壹粒 如半

下

又右並碾為末用黃蠟三錢仲清油少許溶

和為丸如菉豆大每服七丸紅痢甘草湯

下白痢干姜湯下裏急後重枳殼湯下爽

食感冷泄瀉干姜湯冷吞下暑瀉冷熟水

吞下神効難盡 衛生易簡方同

治禁口痢其証有冷有熱有冷熱不調皆須

先發散表裏如手心熱目赤是熱宜用敗

毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢

者是寒宜以蓮肉不去心為末用米飲調

每服三錢仲候進飲食然後隨証冷熱治

之

又方用紅木槿花不用蒂陰干為末先用麩

煎餅兩箇以花末糝其上食之食時先以

湯灌開其口 衛生易簡方同 為末

又方治熱痢柴胡黃芩等分半酒半水簡生

方柴胡黃芩各二錢酒各一盞煎七分浸冷空心或早

服若血痢多加黃芩

玉機微義 滯下

治熱之劑

仲景白頭翁湯治熱利重下者方見金匱

按此治利在下焦腎虛有熱也經云腎欲

堅故用純苦之劑以堅之出太陰例藥也

以其下利屬太陰故也

機要黃芩芍藥湯方見金匱

按此手足太陰經之藥也仲景用芍藥甘

草湯以後其陰酸以收之甘以緩之酸甘

相合以補陰血也芍藥白者補赤者瀉出

太陽芍藥甘草例

大黃湯方見金匱

按此乃陽明調蕩滌邪熱之藥用酒煎者

欲其上至頂顛外徹皮毛也

芍藥湯方見金匱

按此行血調氣不熱之藥也大凡用藥之雜與品味之多者難以細分經絡當觀其大體如何此則太陽桂枝例藥也

白朮黃芩湯 方見衛生寶鑑

按此去濕熱和中活血之藥也

錢氏芍藥藥皮丸守真芍藥藥皮丸 方並見衛生寶鑑

按此二方補陰降火下焦之藥也由太陽

例

局方黃連阿膠丸 方見本方

按此補虛退熱除濕之藥也由太陽例薄

藏云以上苦寒之劑元病不經內傷冷物

者宜察亦當服入之虛實及以脉別之

治寒之劑 其酸味甘與三邪果論

局方桃花丸 方見千金方

按此出陽明例藥方 謂胃不消滯

丹溪曰桃花丸即要略桃花湯也仲景以

治便膿血用赤石脂丸者葦薑粳米同煮

作湯一飲病安便止後藥意謂病下焦血
虛且寒非乾姜之溫不脂之澁且重不能
止血粳米味甘引入腸胃不使重澁之體
少有凝滯藥行易散余毒亦無局方不知
深意改爲丸藥劑以麴糊日與三服果能
與仲景之意合否也

嚴氏當歸丸

方見本方

局方詞黎勒散

方見本方

按局方以白朮爲寒多用辛熱燥毒之藥
若用之於下痢清穀腸虛感寒者或可矣

若膿而稠粘屬火之証用之非殺而何但
感寒之証吾恐什百而一二也

冷熱之劑

右方駐車丸

方見千金方

局方香連丸

方見本方

按此由太陰例藥也

戊巳丸

方見和劑局方

按此出厥陰已寒例以上三方出証治冷
熱下痢蓋冷熱異氣水火相反豈能同在
腸胃爲病耶論中辨之詳矣但其製方亦

有暗合妙理惜乎世人莫知其深意也三方皆以黃連苦寒之藥為君正治濕熱之氣佐以辛苦溫藥所以開鬱行滯氣血宣通病亦自已乾姜木香茱萸三者各隨經合宜而用要在學者臨機應變又不可拘執於此也

治風之劑

機要防風芍藥湯治泄利殮泄身熱脉弦腹痛而渴及頭痛而微汗

蒼朮防風湯治泄利脉弦頭痛

良方神朮散治春傷於風夏必殮泄已上三

泄瀉門

澹寮方倉廩湯治下痢頭疼心煩不食局方

敗毒散錢四加陳倉米百粒姜棗煎服

按此乃發散風寒之劑出太陽例藥也

治濕之劑

機要白朮芍藥湯治脾經受濕水泄注下蒼

朮芍藥湯同

仲景五苓散 宣明益元散 已上四方並見泄瀉門

治暑之劑

局方黃連香薷飲治感暑下痢鮮血 方見諸暑門

按此解散暑熱心肺藥也出太陰厚朴例

宣明桂苓甘露飲 方並見諸暑門

按此二方解表利小便大瀉濕熱氣分藥

也太陽經藥也

攻下之劑

仲景大承氣湯 方見心腹瀉門

按此泄熱蕩滌腸胃之劑痞滿燥實四証者可用出陽明例藥也

宣明玄青丸 方見本方

機要厚朴枳實湯治虛滑久不愈多傳變為痢先以此湯防其傳變

厚朴 枳實一兩 訶子皮 生熟各半 木香 兩

黃連 大黃 甘草 各三錢

右為末每服三五錢水煎服

五三

五三

五三

五三

五三

五三

按已上三方逐積去熱之藥也大黃瀉血也牽牛瀉氣也甘遂大戟芫花泄水也厚朴枳實泄痞滿也各隨其病所宜選而用之

局方蘇感丸方見朱氏前八不愈多辨

按局方之學多以此治痢去積故錄於此然二藥之類聚溫熱用於傷寒冷之物者則可然有熱之人積滯雖去熱毒必行其害何可勝言哉

本事方靈砂丹方見嚴氏濟生續方

消積之劑

脾胃論聖餅子方見衛生寶鑑

元戎聖功丸專治血痢

膩粉三錢定粉二錢之法如蛤粉

右研勻水浸蒸餅丸茶豆大艾湯下

止瀉之劑

仲景桃花湯方見金匱

按此方出手陽明例藥也但赤治內而白

治庚也

嚴氏禹餘糧丸治腸胃虛寒滑泄不禁

禹餘糧石煨赤石脂煨龍骨 畢撥 乾

姜炮訶子麩裏煨肉豆蔻麩煨附子炮去皮臍各等分

右為末醋糊丸桐子大每服七十丸空心

示米飲下

局方真人養臟湯水煮木香丸方並見本方

秘藏呵子散治腸胃虛寒泄瀉米穀不化腸

鳴腹痛脫肛及作膿血日夜無度

御米殼去蒂蓋蜜炒半兩訶子煨去皮七分乾姜炮六分

橘皮半錢

右為細末分作二服水煎和滓熱服空心

下十劑云澁可以去脫以米殼之酸徵澁

上收固氣去脫主用為君以訶子皮之微

酸上收固血治其形脫橘皮微苦溫益真

氣升陽為之使以乾薑大辛熱除寒為臣

亦為主治也

按以上諸方皆行溫熱之藥固氣止血緊

澁腸胃當為腸虛感寒而成滑者設也且滯下之証多屬於熱兼有積滯局方一門

專主澁熱似難例用

宜明香連丸

木香

同訶子肉

麩黃連

各二錢

文

右為細末飲丸黍米大每服二十九米飲

湯下

機要訶子散

方見拔粹方

脾胃論訶梨勒丸

方見衛生寶鑑

按以上諸方用溫涼之藥以止痢較之局

方專用澁熱則變法矣夫脫則用澁理所

當然脫而挾寒溫之熱之可也脫而挾熱

涼而澁之可也寒熱各隨所並而用似難

偏執一說

宜明三聖散治產後下血痢不止

烏魚骨

炒燒酥灰

血餘灰

汁脂者各等分

右細末每服一錢煎石榴皮湯調下熱服

按此專主止血之劑

收斂之劑

嚴氏烏梅丸 方見本方

元戎烏梅散治下利津少大渴引飲不休

烏梅 焙干 茯苓 木瓜 各一兩一法加桂三錢半

右咀每服五錢生姜三片煎

按仲景烏梅丸治傷寒吐衄後人川治下利此皆酸收之義出太陽桂苓例藥也

血劑

局方胃風湯 方見本方

按此方名為治風而實非治風乃補血和

血益胃氣之藥下血痢而狹虛者實可倚

仗出太陽桂苓例藥也

良方加味四物湯治血痢

四物加阿膠 艾葉 保命集一方四物

內加槐花黃連御米殼等分

按此補血溫血之藥出厥陰例藥也

宜明白朮湯治孕婦痢膿血

白朮 黃芩 當歸 各等分

右為末每服三二錢水煎食前服

補劑

良方十全大補湯治一切婦人病痢四十日
諸藥不愈六脉沉弱大凡痢脉宜沉宜弱
但服此藥而愈方見諸虛門右姜棗煎成加白
蜜半匙再煎數沸服

良方治妊娠下痢腹痛小便澀

糯米

青

當歸

炒

黃芪

各壹兩

各壹兩

各壹兩

各壹兩

各壹兩

各壹兩

各壹兩

各壹兩

右細切和勻水煎服

按此二方不分經絡補血之劑令人治痢
而用此者蓋鮮矣殊不知血氣虛脫之人
與夫胎前產後之証此法不可無也故特
立條目以表章之

雜方

良方治疫毒痢敗毒散多加人參甘草陳皮
姜棗煎服

按此方詳見論中

嚴其茜根丸

本方見血補丸

按此方消化死血解飲食毒之藥

百一選方治禁口痢方見是齊醫方

澹察方治禁口痢毒氣上衝心肺者

敗毒散錢四陳倉米粒一姜三片棗壹枚煎

右方治脾胃虛弱禁口痢用山藥壹味判如小豆大壹半銀器內炒熟壹半生用同為末米飲調下

按禁口痢古人論之者少故留此三方以備急然石蓮之通心氣敗毒散散表邪山

藥之補脾胃果能開胃口而進食乎

導氣湯治下痢膿血裏急後重腹疼作渴日

夜無度

黃連赤黃芩甘草大黃白芍不當歸

木香木檳榔

石咬咀水煎

此方即前芍藥湯減桂甘草三味令人多

如此用故收入

臞仙活人心

瀉痢

感應丹治大人小兒脾虛瀉痢水穀不分肚腹急痛此藥不損元氣其消磨疾滯旋凡如菜豆大每服五九乾姜湯下大人如豌豆大水瀉冷水下頭疼葱白湯下如要取汗葱白姜湯下赤白痢甘草乾姜湯送下當用

丁香錢一木香二錢肉豆蔻壹筒巴豆七箇去

油錢青乾姜錢青杏仁七箇去百草霜二錢并斷日

右七味除巴豆百草霜杏仁餘為末前三

味別研銀器內酒煮黃蠟壹兩放冷蠟浮

用香油二錢先煎香熟用蠟和藥湯所作

錠可旋丸抹入於人肉內以蠟入搽於

運化玄樞附干大轉如三北求於心求得效

五月五日取鮠鰻鱓似蛇等魚骨燒服治久

痢代同煎至十餘洲之立效

立秋日以水吞小豆止白痢一代半煎以入

壽域神方三之真又以煎火之時俱上

附本痢部附日中宜只食藥每以煎以入

治赤白痢用甘草壹尺炙擘破以漬簡方作

淡漿水蘸三二度又以慢火炙之後用生

姜去皮半兩二味以漿水一升半煎取八

合易筋方漿水壹升同煎至七分服之立效

一方以宜連青木香等分搗為末煉油蜜為

丸如梧桐子大每服三十九空心米飲送

下日再服若久冷人即用煨熟大蒜作片

嬰兒用之亦效煎香熟以漿水煎服

一方以麩熬粟米粥服方寸匕日蒸四服止

一方衛生易簡方治氣痢瀉裏急後重用生薑切如麻粒大

和好茶水煎壹兩碗任意呷之便差若是

熱痢即留薑皮冷痢去皮妙入蜜壹合煎

赤痢熱下久不止用黃連為末雞彈白丸如

梧桐子大每服二三十丸空心米飲送下

即安臥三穴入喉內強之

白痢後或赤如鵝鴨肝者痛不可忍用黃連

黃芩各壹兩以水二升煎取一升分作三

服食前服煎宜少

氣痢裏急後重用宜連乾薑各為細末每服
用黃連二錢乾薑半錢令勻酒調下
血痢用濕紙包楸如胡桃火內燒少時取
出分為三次入粥飲內服之

一方用地錦草不以多少晒乾碾為細末每
服二錢空心米飲調下

熱痢不止擣車前葉絞汁壹盞入蜜壹合煎
服

麻衛生易簡方作疳痢用薤白壹握生擣如泥以粳

米粉蜜調和捍作餅炙熟喫不過三四度

易簡方
三四度

冷熱痢用甜菜絞汁服之衛生易簡方又止
血生肌人及禽獸

有傷折
傳之立愈

久痢用烏梅二十箇水二盞煎六分去滓食

前分為二服或川梅葉煮濃汁服亦好衛生

膿痢衛生易簡方同用白石脂為末醋糊丸如

小豆大每服十九米飲送下日三服

五色痢 衛生易簡方并血痢 用刺蝟皮燒灰為末每服

壹錢 溫酒調下

惡毒痢用白頭翁草 衛生易簡方一名野丈人 煎湯服之

立愈

水穀痢用厚朴黃連各三兩水三升煎一升

空心服 衛生易簡方同

瘡痢交作用赤小豆花不拘多少同豆豉煮

五味羹任性食之

痢後氣滿不能食用赤小豆煮一頓服之即

愈 衛生易簡方同 不禁

治諸般痢疾用五倍子新瓦焙乾碾為末水

丸如梧子大每服三十九粒紅痢茶下白痢

下小兒二十九粒忌魚腥等物

衛生易簡方

諸痢

治初得痢冷熱赤白及霍亂用甘草一兩炙

豆蔻七箇剉水三升煎壹升分服

治赤白痢多用艾葉醋煎服或入生薑同煎

此一切瀉痢亦止心腹痛及五臟痔瀉血并療疥癬

治寒痢水瀉乾姜為長米飲調壹錢服立效

治大熱毒純血痢用宜黃連六兩水七升煮

前三升半夜露星月下平旦空腹頓服

治冷痢腹痛不能食用肉豆蔻一兩去皮以

醋和麩裏煨麩熟為度搗為末粥飲下

治冷滑下痢不禁虛羸用縮砂日乾為末羊

子用薄切以末逐片摻勻瓦上焙乾為末

入乾姜末等分米飲圓如桐子大每服五

錢十圓日二服

治氣痢瀉裏急後重每服用黃連末壹錢乾

姜末半錢空心溫酒調下

治赤白痢積久不差用雲母粉方寸匕米飲

調服

治痢色白物不消者煮米粥入炒麩方寸匕

調服

治痢色白物不消者煮米粥入炒麩方寸匕

調服

治痢色白物不消者煮米粥入炒麩方寸匕

調服

赤白痢下水穀食不消煮粟米粥和麩末
方寸匕日四五服

治重下即赤白痢用豉熬焦為末服一合日

治三無比

又方用豉熬焦水壺并淋汁冷服冷痢洒淋

治患痢日久津液枯竭四肢浮腫口乾用冬

瓜壹枚黃土泥厚裹五寸煨冷爛熟去土

絞汁服之

治赤白痢用薺菜根葉燒灰為末調服極效

治痢用烏賊魚骨炙黃去皮細研粥飲調服

治熱痢用蚯蚓糞壹升炒煙盡水沃取淨升

濾去滓空肚服之

治赤白痢下部疼痛腫用烏梅三十箇打碎水

二升煮壹升頓服

治赤白痢用酸石榴皮炙黃為末棗肉圓如

芡實大空腹吞三圓日二服

治赤白痢用李根濃煎汁服

治赤白痢用李根濃煎汁服

治赤白痢用李根濃煎汁服

治赤白痢用李根濃煎汁服

治赤痢臍下痛用黑豆茱萸二件搓摩吞嚥
之

治水穀痢用赤小豆壹合和蠟三兩頓服愈
治赤白痢用山豆根為末蜜圓如桐子大每

服空心水下二十圓三服自止
治痢用青蒿為末米飲調五錢匕服

又方用巴豆壹兩和穀爛搗菘豆壹升爛煮
同搗勻圓如菘豆大每服八九圓小兒量

減紅痢甘草白痢乾姜紅白姜草煎湯下

治疳痢困重用檇白皮搗末麩拌作小顆子

日晒少時又拌凡三過水煮熟加塩醋少

許酒亦得頻服多少量入大小

治暴痢用小鯉魚一枚燒灰米飲調服

治久痢不止成休息用龍骨四兩碎如小豆

水五升煮二升半令冷分為五服

又方用龍骨為末米飲和圓每服廿圓米飲

治氣痢用牛羊乳汁煎葦撥服立差凡乳與

酸物相反若同食令人結瘕

治久痢勞痢用狗頭骨燒灰爲末和乾姜葛
芩炒焦見煙爲圓空心下十圓極效
治久痢不愈名休息用虎骨炙黃搗末米飲
調方寸匕服日三卽愈
治赤白痢用雞子醋煮熟空心食之
治血痢用栢葉四兩芍藥一兩半二味微炒
爲末每服二錢匕水一盞煎五分溫服無
時日三服
又方用黃蘗黃連各四兩苦酒五升煎二升

半溫分服無時

白痢神效

治下痢不可禁止垂死者用羊子肝一具去
脂筋膜切作片止糝白礬末緩火炙熟空
心食之
治血痢疳痢用臭椿根爲末蜜圓如桐子大
每服二十圓空心溫米湯送下
治久痢水穀不消者用枳實爲末米飲調日
三服每服二三錢尤療小兒
治一切瀉痢用黃連黃芩各半斤木香一兩

爲末每服四錢清晨井花水調下小兒量

減服試過二三發火熱小兒

又方用白穉豆花不拘多少擇淨不洗滾湯

焯過和小猪脊脊肉葱一根胡椒七粒醬

拌勻將焯花汁和麵包作小饅飽煮熟食

又方用枯白礬壹兩乳香四錢麝香少許黃

丹壹兩炒過研細淨黃蠟壹兩鎔開投藥

末攪勻圓如桐子大每服五七圓空腹服

紅痢甘草湯下白痢乾姜湯下泄瀉煨姜

汁下

又方用巴豆四十九粒去殼油木香乳香各

四錢槐花二錢黃丹炒壹兩淨黃蠟壹兩

於鐵銚內鎔開入藥末和勻圓如粟米大

每服三十五圓引同前

又方用丁香胡椒各七十二粒烏梅巴豆各

六顆爲末糯米飯圓如菜豆大每服七圓

或九圓小兒三圓忌生冷引同前瀉米湯

下

又方川椿莢粟殼各二兩烏梅肉乾姜各壹
兩木香甘草各半兩共爲末每服三錢赤
荆蜜湯調下白痢沙糖湯調下
又方用枯白礬同五倍子末等分爲丸服尤
效
又方用烏梅棗子粟殼各七枚甘草七寸燈
草二十根酒鐘半煎壹鐘服
治血痢用揀豈兩濕紙裹火內燒透研細作
三次粥飲調服

治禁口痢用丁香半兩蓮肉壹兩爲末陳米
湯調下
治冷熱不調下痢赤白膿血相雜寒急後重
用黃連去蘆十兩以吳茱萸五兩同炒色
赤去茱萸木香二兩四錢不見火爲末醋
糊丸如桐子大每服二十九空心米飲湯
下

治洩痢腹痛用薔薇根搗汁服
治赤白痢用雞腸草取汁壹合和蜜服之

治瀉痢不止裏急後重用鬼豆晒乾為末每服壹二錢甘草湯調服

治瀉痢日久不止用薺菜花晒乾為末每服二錢空心棗湯調服

治赤白痢用木槿花炒作湯代茶喫亦治風令人得睡

又方用金剛根和好蠟茶等分為末白梅肉如雞頭大每服五七丸小兒三丸赤痢

甘草湯下白痢烏梅湯下赤白痢烏梅甘

下草湯下

治臟毒赤白痢用香椿白皮日乾為末飲調一錢下大效

治熱痢并久痢用好茶炙搗為末濃煎壹二

金匱鈎玄

初下痢腹痛不可用參木然氣虛者亦不可不用亦有胃虛可用

初得之必用大承氣調胃承氣下之看其氣
病血病而用氣用參朮減血用四物
因積作後重者保和丸五日後不可下脾胃
虛故也

下痢初發熱必用大承氣下後看証用藥
下痢不止發熱者屬陰虛用寒涼藥必兼升
藥并熱藥用

下痢身發熱亦有外感者
不治証

下如魚腦者半生半死下如塵腐者死

下純血者死下如屋漏者死

下痢大孔痛者因熱流於下檳榔木香

連炒乾薑下痢如竹筒出者不可治

噤口痢胃口熱結甚故也黃蓮多加人參

終日呷之如吐了再喫

當開以降之人不知此多川溫藥甘味是

火濟火滯益滯也

又方臍中用田螺研爛盒之以引下其熱亦

有誤服熱藥之毒以犯胃氣者當推明以祛其毒

治痢方大黃黃連黃芩黃柏枳殼白芍藥當歸滑石甘草桃仁白朮等分為末神麩糊

孫郎中因飲水過多腹脹泄痢帶白蒼朮白朮厚朴茯苓煎湯下保和丸

小兒八歲下痢純血以食積治蒼朮白朮黃芩白芍藥滑石茯苓甘草陳皮炒神曲煎

下保和丸

御醫撮要

駐車在調和寒熱能止泄痢兼除腹中諸疾

黃連四兩乾薑四兩當歸三兩阿膠三兩

烏梅三兩

右為末煉蜜和丸如桐子大每服五丸

丸以粥飲下不計時候

阿膠丸理冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍

阿膠搗碎乾薑炮裂木香黃芩黃連

大鬚當歸各龜骨炙赤石脂各厚

朴生薑汁炙令熱連

右件為末煉蜜和丸如桐子大每服以粥

飲下三十九不計時候

內補丸理冷熱氣不和腹痛下痢不止

黃連壹兩當歸三分阿膠三分乾薑半兩

右件為末煉蜜和得百餘杵丸如桐子大

每服以粥下三十九不計時候

栢葉丸理膿血久痢腹內疼痛

乾栢葉微炒黃連微炒地榆去苗阿膠搗碎如

兩當歸兩

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服二十

丸溫米飲下不計時候日進三服

石榴皮湯療冷痢泄及白瘧下

石榴皮炙黃連去毛阿膠炙各乾薑炮

三分

右件羅為末每服五錢匕用水一升煎至

四合去滓空心溫服日午服忌生冷猪肉

油膩

備預百要方

冷熱痢及赤白痢方

雖聖人不理也

孫真人曰凡痢克慎口味若不能慎

凡痢色青者為冷赤黃者為熱但下白如鼻

涕而腹絞痛氣塞難下者為氣痢是為冷熱

相結當以氣痢藥理之

冷痢洞泄方乾柿子十枚擘破以法油煎熟

食之小兒尤佳及炒車前子細末以糯米

作粥一椀下車前子末五錢和服日三

又冷痢腹痛方作薑細切如粟米三大錢好

臘茶一椀同煎服不差更服

又麩末半升炒以五錢淳酒壹椀同煎兩三

沸溫服

熱痢水穀俱下色黃方

阿膠二兩黃蘗皮一兩梔子二十枚當歸

膏

右四味麤末以水壹椀煎至七分去滓入膠温服

又地榆末每用六錢以水壹椀大盪煎至六分去滓温服此藥冷熱痢血痢通用妙

冷熱痢方置銚于於火上以黃蠟灼之後以雞卵倒瀉如煎餅法炒熟喫之

又血痢方取大升入於車前下明米以醋米赤小豆三升炒令熟當歸三兩

又右二藥篩為散服方日三薄粥温下

又氣痢白膿日夜數行方大蒜去皮絞取汁黃蘗皮細末和蒜汁搜為丸如豆大温薄

粥飲三十九或四五十丸或謂痢通用赤白痢方乾薑好墨各五兩細末以好醋漿和

丸服三五十九晝夜六七服又黃蘗為末粥服差為度

又菖實為末常服尤佳又狼芽煎服亦焙乾末蜜丸粥下

又野苣根煮汁常服木煎水可

又菴草汁服

又合明草汁服

又薄荷汁常服

又馬齒莧搗取汁

三蜜合

右二和微煖空心頓服

赤白崩漏方龍腦薄荷煎服

又絡石煎服

又地榆煎服

又大荆根煎服

又酢漿草陰乾為末酒下空心三錢差為度

簡奇方

治痢疾

乾椿樹根皮

半斤乳香

壹分丁香

壹分柯子

二介紙裏

水濕慢火煨熟去核用肉

右為末粟米飲湯調下分作二服空心

治赤痢以老酒二盞白沙蜜一盞同熬至一

盞白熱服赤冷服紅白溫服

治瀉不止

小油二兩生薑四兩

去皮切宿蒸餅去皮碎

如菜豆大

右先將油煉熟香入薑炒熟後下蒸餅炒黃熟乘熟食之如渴米飲湯下

治赤白痢用好米醋壹大盞好茶末半匙煎至數沸白熱服赤涼服赤白溫服

諸痢食治

食醫心鑑

論五痢赤白腸滑食治諸方

赤白痢者皆由榮衛不足腸胃虛弱冷熱之氣乘虛入胃客風於腸間腸虛則泄然其赤白者是熱乘於血血滲腸內則赤冷氣入腸津液凝滯則白冷熱交爭故赤白相雜凡痢有胃痢脾痢大腸痢小腸痢大瘕名曰後重胃痢者飲食不化色黃脾痢者腹肚脹滿泄注無度食即嘔吐大腸痢者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸痢者溲便膿赤血小腸刺痛大瘕痢者裏急重數至固而不能便莖

中痛是腎痢也案諸方痢有三十餘種而此
唯具五種者蓋是舉其宗維者
治脾氣弱大腸虛冷痢白如膿涕腰臍切痛
方
以橘皮胡椒時蘿等末熟煎豉汁投鱸
於中空心食之

鱸魚作鱸

治胃腸冷痢不止方

赤石脂二兩 雲母粉二兩 麴二兩

右相和溲作飪餽熟煮食之著鹽醋調和
亦得

治脾胃氣虛腸滑下痢方

黃雌雞一隻治如食法

右炙槌更以鹽醋刷炙之令通透熟空心
食之○必用全書黃雌雞炙方治老人脾
胃氣冷腸數痢黃雌雞一隻右五味椒醬刷
炙之令熟空心漸食之亦甚補益藏府用
必
之書壽親
養老書同

治脾胃氣下痢瘦方

猪肝一片 蕪荑末六分

右薄起肝糝蕪荑末麵裹更以濕紙裹煨

熟去麪空心食之

治脾胃氣虛食則嘔出猪肝丸方

猪肝一斤薄起於瓦上爆令極乾

右擣為末煮白粥絞取汁和之衆手丸如

梧桐子大空心飯飲下三十丸

又方猪肝半斤薄起瓦上爆令極乾野雞臆臆前肉四

兩曝令乾

右擣為末以粥飲和為丸如梧桐子大空

心以飲下三十丸治脾胃氣虛

治腸胃冷下赤白痢鯽魚粥方

鯽魚切如鱠四兩粳米二合米二合蘇白

右浙米和鯽魚煮粥椒搗葱白任意食之聖惠

方神巧萬全方同

治久痢赤白鯽魚鱠方鯽魚鱠者去鱗鱠腸

作鱠蒜齏食之

治脾胃氣弱食不消化下赤白不止方

麴三片為末○聖惠方一兩微炒紅米二合○聖惠方一兩

右煮作粥空心食之亦治小兒無辜痢

治腸滑赤白下痢白樹雞粥方白樹雞

白樹雞三兩洗澤細切一名白木耳米二合 薤白

五合切下米白樹雞煎粥

右相和於豉汁中煮作粥空心食之

治脾虛冷下白膿痢及水穀痢薤白粥方

薤白五合切○聖惠方去鬚粳米三合○聖惠方二合

右相和煮作粥任著葱椒攪令熟空心食之○聖惠方右二味作粥入薑椒煮令熟

空腹食之

治血痢日夜百餘行方

葛粉三兩○聖惠方二兩蜜一兩○聖惠方一合

右以新汲水四合聖惠方二合攪調空心頓服

之聖惠方分兩度服之神巧萬全方同

治諸痢不差黍米粥方

黍米二大合 蠟 羊脂 各一

右煮黍米臨熟投蠟羊脂攪令消空心食之

治赤白痢及血痢小便不通方

蜜合馬齒菜搗取汁合三

右相和微煖空心頓服之

治水痢方

林檎十顆切作片

右以水一升半煮取六合林檎并汁並食之○聖惠方右以水一大盞煮取六分去

滓每取一合攪粥食之

治赤白痢及熱毒痢方右好茶濃煎服三椀

聖惠方

食治一切痢疾諸方

夫一切痢者由榮衛不足腸胃虛冷冷熱之氣乘虛入胃客於腸間腸虛即洩也此皆由飲食生冷脾胃虛弱不能制於水穀故糟粕不結聚而變為痢也宜以食治之也
治積冷氣痢下膿血肌瘦不能飲食炙肝散

方

猪肝去其筋木香半兩烏梅肉三分人參半兩

去蘆白朮半兩黃連半兩乾薑半兩陳

橘皮半兩訶梨勒半兩燕荑半兩

右件藥擣細羅為散將肝切作片子以藥

末一兩摻令勻即旋以串子炙令香熟空

腹食之如渴即煎人參湯溫服之

治赤白痢久不差困劣煩渴甚者宜服羊脂

粥方

羊脂壹兩猪脂壹兩黃牛脂三兩葱薤各五莖漢

椒去目及閉口者生薑一分時蘿末壹錢

右先將脂等與葱薤生薑同炒次用水入

粳米三合煮成粥入時蘿椒末攪令勻空

腹頓服之

治脾胃久冷氣痢瘦劣甚者宜食猪肝鰾鱠

方

猪肝壹具乾薑半兩燕荑兩訶梨

勒三分陳橘皮三分白穰一分縮沙三分

類聚百病

右搗諸藥為末肝細切入藥末壹兩拊令
勻依常法作餅饌熟燂空心食壹兩枚用
粥飲下亦得

治赤白痢蠟煎餅方治赤白痢宜食餅煎蠟

雞子五枚取黃○神薤白三葉去白麵四

白蠟一兩巧萬全方三枚薤白鬚細切白麵兩

右將雞子并薤白調和麪作煎餅用蠟搗
唯熟為妙空腹任意食之

治積冷下痢腹痛宜喫醋煮猪肝方

獾豬肝一具去蕪荑末半

右以醞醋二升入蕪荑末煮肝令熟空心

任性食之

治赤白痢休息氣痢久不差者宜喫撥粥方

薤白壹握去葱白壹握去白麵四

右已上和麪調令勻臨湯以筋旋撥入鍋

中熟煮空腹食之神巧萬全方同

治赤白痢及水痢生薑粥方

生薑半兩濕紙裏白麵可拌薑

右將薑於麩中拌如作婆羅門粥法於沸湯中下煮令熟空腹溫溫吞之

治冷痢飲食不下宜喫附子粥方

附子嘗分炮裂去皮臍乾薑嘗分炮裂到

右件藥搗細羅為末每日空腹煮粥內藥

二錢食之以差為度神巧萬全方同

治諸痢不差黍米粥方

黍米二合蠟取羊脂壹兩阿膠壹兩搗碎炒令黃燥搗末

右煮黍米作稀粥臨熟投阿膠蠟羊脂攪

令消空腹食之

治血痢馬齒粥方

馬齒菜二大握切粳米三合折細○神巧萬金方二合折洗

右以水和馬齒菜煮粥不著塩醋空腹淡

食一頓效

大全本草

孟詵云冷痢取椒焙之為末共乾薑末等分

以醋和麵作小餛飩子服二七枚先以水

煮更之飲中重煮出停冷吞之以粥飲下

空腹日一度作之良
 唐劉禹錫著樗根餽餽法云每至立秋前後
 即患痢或是水穀痢兼腰疼等取樗根壹
 大兩擣篩以好麵捻作餽餽子如皂莢子
 大清水煮每日空腹服十枚並無禁忌神
 良

楊氏產乳近效療久痢及疳痢棟樗根白皮
 不限多少常取土際不用見狗及風細切
 擣如泥取麵捻作餽餽子如小棗大勿令

破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌
 油膩熟麵毒物

必用全書

食治老人瀉痢諸方

鯽魚熟膾方治老人脾胃氣冷痢白膿涕腰
 脊疼痛瘦弱無力宜食

鯽魚肉

九兩

鼓汁

合

乾薑末

半

橘皮末

半

右以椒醬五味調和鼓汁沸即下鯽魚煮
 熟下二味空心食之日一服其效尤益

必用

之書壽親
養老書同

赤石脂罇飴方治老人腸胃冷氣痢下不止

宜三四服皆愈

赤石脂 五兩碎 罇飴 六兩 ○壽親
養老書七兩

右以赤石脂末和麵搜作之陳熟下葱醬

五味臙頭空心食之 必用之
書同

甘草湯方治老人冷熱不調下痢赤白腹痛

不止

甘草 壹兩 烏頭 壹兩 生薑 壹兩 剉
去皮切

右以水壹升煎取七合去滓空心服之不

過三兩服愈 壽親養老書不
過三日服愈

薤白粥方治老人腸胃虛冷泄痢水穀不止

薤白 一升細切 ○壽親
養老書一握 粳米 四合 葱白 三合
細切

右相和作羹下五味椒醬姜空心食常作

之效 必用之
書同

麩末粥方治老人脾虛氣弱食不消化泄痢

無定

神麩 二兩炙搗 青梁米 四合
羅為末 淨淘

右相和煮作粥空心食之常三五服溫中

極愈必用之書壽親養老書同

車前子飲治老人赤白痢日夜無度煩熱不

止

車前子五合綿裹用水二升半汁煎取一升半汁青梁米三合

右取煎汁煮作飲空心食之日二壽親養老書作

三服最除熱毒必用之書同

壽親養老書

食治老人瀉痢諸方

食治老人脾胃虛氣頻頻下痢瘦乏無力猪

肝煎

獾豬肝壹具去膜切好醋升

右以醋煎肝微火令泣盡乾卽空心常服

之亦明目溫中除冷氣卽醫患腸鳴空心

食治老人脾胃虛弱冷痛泄痢無常不下食

椒麵粥方

蜀椒壹兩熬白麵四兩

右和椒拌之令勻卽煮空心食之日壹服

尤佳

食治老人赤白痢刺痛不多食痿瘦鯽魚粥

方 鯽魚肉七兩青梁米四兩橘皮末壹分當歸壹分

右相和煮作粥下五味椒醬葱調和空心

食之二服亦治勞和臟腑虛弱空心當歸

食治老人痢不止日漸黃瘦無力不多食黍

米粥方

黍米四合阿膠壹兩炙甘草壹兩麻黃壹兩

右煮粥臨熟下膠未調和空心食之一服

尤效

食治老人下痢赤白及水穀不度腹痛馬齒

菜方

馬齒菜壹斤淨淘洗

當在釜令熟及熟以五味或薑醋漸食之其

功無比

衛生易簡方世壽難求此粥最宜

治一切痢并腹痛用薤白三握洲切煮粥食

衛生易簡方世壽難求此粥最宜

治一切痢并腹痛用薤白三握洲切煮粥食

治泄痢寒熱瘴瘧陰氣不足消渴病酒頭痛
 邪氣小兒丹毒熱腫並用腐婢即赤小豆
 花於豉汁中煮五味調和作羹任性食之
 治赤白痢用葱白一握細切和米煮粥空心
 食之

治一切痢并腹痛用馬齒莧細切煮粥食之
 諸痢禁忌下痢赤白久不愈者宜服此
 千金方

凡痢病通息生冷酢滑猪雞魚油乳酪酥乾
 脯醬粉鹹所食諸食皆須大熟爛為佳亦
 不得傷飽此將息之大經也若將息失所
 聖人不救也

凡疳在慎搗醬酢酥油棗等一切皆忌惟白
 飯豉苜蓿苦苣蕪菁不在禁限

千金方
 泄痢久下失氣勞冷灸下腰百壯是報穴在
 八魁正中央脊骨上灸數多尤佳三宗骨

是忌針... 泄痢赤白漏灸足太陰五壯壯三報... 又屈竹量正當兩膀胱上點訖下量一寸點
兩傍各壹寸復下量一寸當脊上合三處
一灸三十壯灸百壯以上一切痢皆斷亦
治濕墜冷脊上當膀胱處不灸皆忌
神巧萬全方

諸痢... 交信主泄痢赤漏血... 灸背脊大熱... 治

關元火谿主泄痢不止... 天樞主冬月重感於寒則泄瀉臍痛腹胃間
遊氣切痛... 尺澤主泄止下血兩脇下痛... 太白主腹食不化喜嘔泄有膿血... 腎俞章門二穴主寒中洞泄不化... 凡暴泄心痛沈甚此胃氣痛痛灸刺大都并
太白石灸穴內天樞二穴熙寧四年予親
老在邵陽忽患水瀉百藥無效遂灸天樞

三穴位此故述之
衛生廣鑑灸穴以天畤二穴
陰陽皆虛灸之所宜
至元也亥廉臺正年
漣水此地卑濕因勞役過度飲食失節至秋
深瘡痲併作月餘不愈飲食全減形容羸瘦
乘馬輻以歸時已仲冬求予治之具陳其由
診得脉弦細而微如蛛絲身體沉重手足寒
逆時復麻痺皮膚痲疥如癘風之狀無力以

動心腹痞滿嘔逆不止此皆寒濕為病久淹
真氣衰弱形氣不足病氣亦不足陰陽皆不
足也鍼經云陰陽皆虛鍼所不為灸之所宜
內經曰損者益之勞者溫之十劑云補可去
弱先以理中湯加附子溫養脾胃散寒濕澁
可去脫養熾湯加附子固腸胃止瀉痢仍灸
諸穴以併除之經云府會太倉即中脘也先
灸五七壯以溫養脾胃之氣進美飲食次灸
氣海百壯生發元氣滋榮百脉充實肌肉復

灸足三里胃之合也三壯引陽氣下交陰
 分亦助胃氣後灸陽輔二七壯接續陽氣令
 足脛溫暖散清濕之邪迨月餘病氣去漸平
 復今累遷特衛親軍都指揮使精神不減壯
 年矣以時中諸賦用之或養胃始末焉
 內難諸痢導引之灸水瀉之十腫云脈下太
 巢氏病源云劍刺汗流熱退不為灸之謂宜
 其原水穀痢候不為瀉也亦宜刺也
 養生方云秋三月此謂容平天氣以急地氣

以明早卧早起與雞俱興使志安寧以緩
 秋刑收斂神氣使秋氣平無外其志使肺
 氣精此秋氣之應也收養之氣也逆之則
 傷肺冬為餐泄

冷熱痢候

養生方導引法云泄下有寒者微引氣以息
 內腹徐吹欲息以鼻引氣氣足復前即愈
 其有熱者微呼以去之

三虛寒泄瀉治法

桂香丸 香朴丸 建脾丸 豈蔻分氣

飲入羊肉扶羸丸 川椒丸

實熱泄瀉治法

小承氣湯

冷熱泄瀉治法

香姜散 建脾散 如神丸 戊巳丸

補脾散

助道方

日殺

瀉痢治冷泄腹中疼

蘇是齋醫方

藥吐瀉

肉附元 椒附湯 平欬腸元 厚腸元

沒石子元 固腸元 斷下元 加訶子

四柱散 荳蔻散 大斷下元 補脾元

草撥元 柴萸斷下元 養婆湯 神授

元按本亦香透通久輪圓 白木附子湯

暑瀉 山梔 天麻 玉振 天南 蘇鐵 蘇

類聚

穀神散 康附元 玉連元 養臟湯

神妙木香煮散

直指方 寒濕瀉下天 養臟湯

泄瀉證治 治大瀉下天 養臟湯

理中湯 調中散 肉蔻散 治要除濕

湯 香薷散 平胃散 黃連阿膠圓

藜皮湯 薑附湯 木附湯 大己寒圓

養臟湯 雞舌香散 三稜散 固腸散

實腸散 安腎圓 震靈丹 木香散

二神圓 當歸厚朴湯 五皮湯 木香

朱氏集驗方 胃氣丸 白木圓

泄瀉 醫心方 六味丸 木香

車前散 固腸丸 康附元 二宜丸

香茸丸 補豆附散 壯氣丸 猪肚丸

嚴氏濟生方

泄瀉

麻味五冷湯 火輪圓 白木附子湯

四柱散 禹餘糧圓 加味治中湯

類聚

卷五

四修月魯般經後錄

舟車神祐丸

得效方

泄瀉

香薷香蘇散 不換金正氣散 胃風湯

火炊圓 理中湯 加味治中湯 香薷

散 胃苓湯 通苓散 六和湯 水浸

丹 藿香正氣散 胃苓湯 白木附子

湯 麴芎圓 加味藿香正氣散 木香

散 茵連香薷散 五苓散 黃連阿膠

圓 升麻葛根湯 小柴胡湯 藜皮湯

調胃承氣湯 去麻黃五積散 豆附圓

薑附湯 大已寒元 加味四柱散 加

味三建湯 來復丹 香猪臟圓 猪肚元

椒艾圓 茱萸湯 大理山圓 去君子

湯 養氣丹 參連圓 成已圓 安腎

圓 震靈丹 金鎖正元丹 炙肝散

和氣散 朴附圓 木香散 二神圓

香蘇散 縮砂香附湯 香茸圓 轉平胃

散 香薷散 五味子散 大斷下圓

乳豆圓 華撥圓 固腸圓 硫黃散

車前散 針頭圓 神麴圓 肘蒜圓

粟殼圓 養臟湯 香蓮圓 人參散

澹察方 大山 瓜 瓜 瓜

泄瀉 去積 正 蘇 蘇

理中圓 加味四柱散 附龍圓 訶梨

勒圓 四神圓 五苓散 黃連圓

衛生寶鑑

濡泄 白木 瓜 瓜 瓜

對金飲子 瓜 瓜 瓜 瓜

飧泄 瓜 瓜 瓜 瓜

加減木香散

聖濟總錄 瓜 瓜 瓜 瓜

水瀉 瓜 瓜 瓜 瓜

木香散 厚朴散 代赭丸 肉豆蔻散

礞砂丸 對門散 木香丸 黑神丸

立效丸 杏人丸 玉霜丸 針頭丸

如聖丸 如聖丸 黃蠟丸 訶梨勒丸

厚朴散 木香丸 蕪荑丸 訶梨勒丸

訶梨勒丸 正氣散 白聖丸

肉豆蔻散

豆蔻散 當歸散 桂附丸

豬苓丸 訶梨勒散 白豆蔻湯 枳殼

湯 附子湯 白朮丸 附子丸 厚朴

湯 附子丸 樗根散 建脾湯

六味丸 養泄 脾中 藥 豆 來 對 世 金 大 濟 養 道

白朮湯 地榆湯 乾薑丸 茯苓湯

茱萸湯 大乾薑丸 葶撥散 桂心丸

地榆湯 高良薑湯 豆蔻散 訶梨勒

散 木香散 薑米散 骨黃散 木香

洞泄寒中

附子丸 熟艾湯 如神散 當歸建脾湯

天仙子丸 附子湯 紅豆散 豆蔻湯

溫中丸 肉豆蔻丸 厚朴乾薑丸 神豆

蔻附子散
肉丁香散
火輪散
木香訶

梨勒丸
白芷黃連湯
珠烏梅丸
豆黃連

阿膠湯
訶梨勒丸
黃連當歸湯

驚漚
氣散
白聖丸

茱萸丸
龍骨散
朱龍骨黃連湯
木香

丸
附子散
芫華撥丸
豆黃連
降燥散

藥醫方大成
草藥類
林心丸

白木泄瀉
餅餅
草黃水
芥冬散

六和湯
理中湯
來復丹
大藿香散

藿香正氣散
肉豆蔻散
金鎖正元丹

椒艾圓
豆附圓
訶梨勒圓
九寶飲

子
香薷散
五苓散
人參湯

南北經驗

檳榔散

姜泄瀉門
三
艾元木

袖珍方

泄瀉
艾元木

升麻除濕湯
益胃湯
白朮芍藥湯

升麻湯 神聖香姜散 軟紅丸

承類鈴方

泄瀉

姜附湯 木附湯 椒艾元

經驗良方

南瀉

如神散 香薷散 五苓散 人參散

四君子湯

神效名方

泄瀉

新效方前代

補脾丸

玉機微義

泄瀉

白朮芍藥湯 茯苓湯 蒼朮芍藥湯

胃苓湯 五苓散 益元散 助風芍藥

湯 蒼朮防風湯 神木散 胃風湯

戊巳丸 來復丹 香薷散 桂苓甘露

類聚

飲日漿水散 白朮湯 薑理中湯 參朮湯

光 溫脾湯 風升陽 輪濕湯 升陽 除濕

防風湯 白朮散 白朮湯 橫麻補劑

湯 肉豆蔻丸 非五味子散 朱塗續証 固

丹

壽域神方

瀉部

衛生易簡方

泄瀉

金匱鈞玄

泄瀉

薑麴丸

御醫撮要

無比丸

餘藥無名者散見本方

鍼灸

類聚

論瀉疾證候
暴瀉水瀉此二證秋夏間多有之皆因飲食
所傷及食生冷之物暴瀉不止須用子細詢
問若噫氣吞酸乾嘔氣臭者此是傷食也可
先與感應圓一二服次與理中圓人參豆蔻
散守中金圓來腹丹溫胃圓已上藥性皆溫甚者與
附子理中圓理中丸四柱散已寒圓溫中良

辨其式

論瀉疾證候

葛鏗丸

金圓散

泄瀉門一

和劑指南

論瀉疾證候

暴瀉水瀉此二證秋夏間多有之皆因飲食
所傷及食生冷之物暴瀉不止須用子細詢
問若噫氣吞酸乾嘔氣臭者此是傷食也可
先與感應圓一二服次與理中圓人參豆蔻
散守中金圓來腹丹溫胃圓已上藥性皆溫甚者與
附子理中圓理中丸四柱散已寒圓溫中良

薑圓二薑圓火輪散朝真丹正元散金液丹
 二氣丹已上藥性皆熱丁香蔻散微熱須用干細
 審實無傷食者不可與感應圓便用止瀉藥
 吐瀉有腹痛者可與服木香推氣圓沉香圓
 丁香圓感應元久病虛怯年高及氣弱人
 藏府泄瀉久不止者可與人參豆蔻散厚腸
 圓參苓白朮散不換金正氣散四君子湯之
 類
 三因方門

泄瀉敘論

方書所載瀉利與經中所謂洞泄飧泄溇泄
 溢泄濡泄水穀注下等其實一也仍所因有
 內外不內外差殊耳經云寒甚為泄春傷風
 夏傷泄論云熱濕之氣久客腸胃滑而利下
 皆外所因喜則散怒則激憂則聚驚則動藏
 氣膈絕精神奪散必致溇泄皆內所因其如
 飲食生冷勞逸所傷此不內外因以此類推
 隨證主治則不失其病源也

凡治瀉須先理中焦如理中湯丸等是也次
卽分利水谷如五苓散等是也治中不效然
後斷下卽用禹餘糧赤石脂等是也玉機真
臟論云五虛死謂脈細皮寒少氣前後泄利
飲食不入得此必死其有生者漿粥入胃卽
注止則活也又金匱云六腑氣絕於外者手
足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者下利不禁
甚者手足不仁脈沉弦者爲下望脈大者爲

未止泄利手足厥冷無脈灸之不溫脈不還
微喘者死有微熱而渴自汗脈或微弦數弱
法並當自愈或脈沉遲而面少赤身微熱鬱
胃汗出而解必微厥所以然者以其面戴陽
下虛故也泄利後腹脹滿身體疼痛者先溫
其裏宜四逆湯後攻其表宜桂枝湯上件金
匱節文雖於三因不甚分明其脈不可不究
旣用四逆治傷寒不妨用桂枝加附子治傷
風木附加桂治傷濕五苓散治傷暑皆可類

推本又古方泄利與滯下共為一門千金又
以宿食不消在熱痢類門類混濫後學難明
不可甄別也三四不其也則其利不四不其
斷病提綱並其外其夫宜辨其利上其金
不其五泄謂以非則其利不其也
脾胃大腸并小腸更兼火瘕五般詳食吐腹
脹為脾泄胃食不化瀉色黃大腸色白食已
迫腸鳴切痛證非常小腸膿血洩便出小腹
中疼不可當裏急後重不能便濁陰結聚內

留連大瘕泄必莖中痛五泄分明載簡編

難經云有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸
泄有大瘕泄名曰後重監簿王誠叔云胃
者謂黃腸水穀之海也故瀉則色黃食飲
不化脾者為胃行其津液者也故泄則腹
脹滿嘔吐大腸謂白腸故泄則大便色白
腸鳴切痛小腸者謂赤腸故泄則便膿血
小腹痛瘕者血聚也濁陰之氣結聚於內
留滯而不行則裏急後重數至圍而不能

便壅中痛故謂之大瘕泄也

直指方

飯後隨即大便

脾腎交濟所以有水穀之分脾氣雖強而腎氣不足故飲食下咽而大腑為之養泄也治法二神圓用故紙肉豆蔻修合或不換金正氣散吞安腎圓主之蓋脾腎之氣交通則水穀自然剋化此所謂妙合而凝者也

脾泄腎泄

有脾泄有腎泄脾泄者肢體重著中脘有妨面色虛黃腹肚微滿腎泄者膚腠怯冷腰脊酸疼上咳面鰲臍腹乍痛治脾泄用蒼朮白朮厚朴乾薑木香生肉豆蔻輩治腎泄用補胃脂及安腎圓震靈丹輩

腎泄

諸有泄瀉用不換金正氣散除濕湯之類以去風濕以安腸胃此上品藥也次則瀉脾養胃之劑投之是為正法然用之而不作效抑

且腹痛走上走下或臍間隱痛腰脊疼酸骨節軟弱面色黧悴尺脉虛弱病安在哉曰此腎泄也當以炒故紙生乾薑官桂木香當歸輩主之仍川安腎圓爲佐其或腎水下涸心火上炎燥渴溺多引飲無度此陰陽離絕也識者憂焉

泄瀉方論

胃爲水穀之海其精英則流布以養臟腑其糟粕則傳送以歸大腸腸胃虛弱或挾風挾

寒或傷暑傷濕停冷蓄熱冷熱不調泄瀉諸證皆能致之挾風者自汗惡風痛引腰背挾寒者筋節拘急身體怯寒傷暑者面垢燥渴泛引水漿傷濕者肌肉虛浮肢體重著冷則腸鳴肚冷而手足清熱則煩燥肚熱而手足溫冷熱不調者由熱積於內不能去其積徒以冷藥水之熱氣無所發泄故冷與熱搏而下注其或冷積於中不能去其滯徒以熱藥壓之冷積不得宣行故熱與冷干而成泄或

澁或溇裏急後重是其候也外此則傷食一
證失肌傷飽胃不能消心腹膨脹所下酸臭
可驗焉治法當究其感受之源然後爲之固
實不察其源吾恐決潰四出莫知其終者矣
雖然脾胃合氣以消水穀水穀既分安有所
謂泄人皆以泄爲脾恙而不知腎病有泄焉
腎泄何如曰腹痛無定處似痢非痢骨弱面
顴脚下時冷者是也前件諸方條例于后至
若泄利之後腹滿身疼是則爲表裏俱病先

當溫裏急與四逆湯然後解表急以桂枝湯
與之活人書言之詳矣抑猶有緒餘之論焉
肝者脾之賊木能勝土古人慮之固也經曰
肝腎氣虛爲病泄瀉亦孰知腎者所以守司
於下而肝者又門戶要束之具束則不泄也
不然泄瀉而面色青慘者古書謂肝經受寒
所致特設當歸厚朴湯以主之果何意哉下利
惡證具載
活人總括
嚴氏濟生方

泄瀉論治

素問云春傷於風夏必飧泄邪氣留連迺為洞泄此由榮衛不足痿理空疎春傷於風邪氣留連於肌肉之內後因腸胃虛怯以乘襲之遂成泄瀉又云濕勝則濡瀉寒甚為泄暑熱乘之亦為泄至干七情傷感臟氣不平亦致溏泄邪氣久客腸胃則為不禁之患矣醫療之法寒則溫之風則散之熱則清之濕則分利之此不易之法其如飲食不節過食生冷而成泄瀉者迺由中州不運脾胃有傷也但停滯泄瀉一證直須積滯已消然後用以斷下藥今人往往使固止之蘊積於中而成痢疾者多有之其如七情傷感所致兼以調氣藥隨證主治則不失其機要矣大抵滑泄一證最忌五虛五虛者脈細皮寒少氣前後泄利飲食不入得此必死其有生者漿粥入胃泄注止則虛者活誠哉斯言也

管見大全良方

泄瀉證治

經云春傷於風夏生飧泄又云濕多成五泄
又云濕勝則濡瀉火抵風喜傷肝春時肝木
正旺而不受邪移氣尅於脾土脾土既虧又
乃飲食不節居虛失宜致令夏秋之間洞泄
水瀉宜矣若有是證不可輕易便投硫黃附
子肉豆蔻呵子鶯粟殼骨龍石榴皮等藥若
用此藥變為滯下者多矣宜先與五苓散和
平胃散姜棗陳米煎服兼吞戊己圓此藥大

能溫中分利水穀或先與蘇合香圓和理中

圓煎服亦妙若覺傷於飲食則腹脹時噫

酢氣宜用蘇感圓主之用蘇合香丸半錢重

如綠豆大生吞下二十圓若心中煩渴手

足心熱瀉下赤黃色米穀不化六脉實大此

協熱下利也宜以五苓散吞黃連阿膠圓古

若身體惡寒四肢逆冷腹中疼痛或不痛飲

食欲溫而惡冷下利鶩溇六脉沉微此虛冷

證也宜服附子理中圓金液丹呵利勒圓木

香散桃花圓下若夏月洩泄水瀉括齒者可
與朝真丹半碗圓又不止者以大肉豆蔻五
枚麵裹煨令香熟去麩爲末入少白米飯爲
圓如綠豆大飯飲吞下一百粒卽安圓古
人治瀉先當溫中理中圓散是也不止當分
水穀五苓散是也又不止却當治下焦赤石
脂禹餘糧湯是也止又有泄瀉前後不止肝
腎虛也宜鍾乳建脾圓阿梨勒圓木香散煎
若日中飲食如故但五更初或侵晨泄利一

次便止者此是腎泄宜與金鎖正圓片瀉止
住服 若病脾泄腸滑不禁日夜無度虛羸
者可與平胃散空心送下茴香圓兼服阿梨
勒圓丁香豆蔻散萬一服已止之藥無效多
服人參豆蔻散有效

治病百法

泄痢

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也
注下者水利也火運太過之病火主暴逆之

故也急宜用冰調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎過放冷服則愈慎不可驟用鶩粟殼乾薑豆蔻聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

痢利

夫病痢利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹攻散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發

汗則愈矣內經曰久風入中為腸澼飧泄啓玄子云風在腸中上薰於胃所食不化而出又云飧泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必飧泄故可而汗愈內經曰風隨汗出痛隨利減若服豆蔻鶩粟殼之類久而不輟則變為水腫以成不救也

水泄不止

夫男子婦人病水濕瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附峻熱之齊遂令三焦閉溢水道不行

水滿皮膚身體否腫面黃腹大小便赤澀兩足按之陷而復起內經曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒涼宜於煖室不透風處用火一盆以藉火力出汗次以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣是汗下吐三法齊行既汗下吐訖府藏空虛宜以淡漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯調下如勢未盡更宜服神助散舊名葶藶散可以流濕潤燥分陰陽利小便

不利小便非其法也既平之後宜大將息忌魚塩酒肉菓木房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

治法雜論

凡泄瀉米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀可用導水左禹功散泄之或病人老弱氣虛可用無憂散泄之再觀病勢強弱候一二日可服胃風湯以治其風如不愈者更服桂枝麻黃湯汗之則愈內經曰夫風之中為

腸風飧泄啓玄子云風入胃中上薰於胃故
 食不化而下泄又云暮食不化為飧泄又經
 云春傷於風夏為飧泄故風宜出汗腸中鳴
 者風以動之動而有聲慎不可用鶩粟豆蔻
 乾薑太燥之藥病漸者燥之去其濕則愈病
 甚者攻之不動反能為害經曰其減則漸其
 加則甚可用五苓散去豬苓加人參散
 十形三療
 不思反忌 不思口得愈

一男子病泄十余年豈菘阿膠呵子龍骨烏
 梅枯礬皆用之矣中腕臍下三里歲歲灸之
 皮肉皴槁神昏足腫泄如泔水日夜無度戴
 人診其兩手脉沉且微曰生也病人忽曰羊
 肝生可食乎戴人應聲曰羊肝止泄尤宜服
 病人悅而食一小盞許可以漿粥送之病人
 飲粥數口幾半升續又食羊肝生一盞許次
 日泄七分如此月餘而安此皆忌口太過之
 罪也戴人常曰胃為水穀之海不可虛怯虛

快則百邪皆入矣或思葷茹雖與病相反亦
令少食圖引漿粥此權變之道也若專以淡
粥責之則病人不悅而食減久則病增損命
世俗誤人矣

六氣屬天無形

內風 暑 濕 燥 寒

經五形 濕入

濕 濕屬 肺經 為實

胃

夫胃者泄飲食

不化完穀出色

黃風乘胃也宜

化齊之類

夫脾泄者腹脹

變

五

泄

金

櫃

濕

燥

濕

暑濕

脾

滿注實則生嘔

逆三證宜和齊

淡齊甘齊清齊

之類

夫大腸泄者腸

鳴切痛先宜寒

齊奪之次以甘

夫小腸泄者溲

類聚

百

十		全		之		圖	
五臟	濕屬	脾胃	大腸	酸	苦	辛	鹹
濕入	為虛	六味屬地有質	寒濕	甘	淡		
小腸		泄		大		瘦	
而便膿血少腹	痛宜寒劑奪之	次以酸劑收之	淡劑甘劑分之	大裏急後重者	數至窘而不能	便先宜清劑寒	劑奪之後以淡
						劑甘劑分之或	

春傷於風夏		必殮泄暮食		不化亦成殮		泄風而殮泄	
者先宜發劑	次宜淡劑甘	劑分劑之類	春傷於風	邪氣留連	乃為洞泄	瀉下褐色	治法同上
又宜灸水	分穴濕氣寒	在下又宜	洞泄寒中俗	呼曰休息痢	洞泄屬甲乙	風木可灸氣	海水分三里
慎勿服峻熱	之藥小便澀	則生足腫腹	莖中痛亦同				

類聚

耳

吐瀉水穀不化陰陽錯亂

以苦劑越之

滿之病死於庚辛之日如屍臭者不治

吐瀉水穀不化

火氣太過

三焦閉溢水道不行水滿

可服淡劑調

宜淡劑日

皮膚身體否

以冰水令頓

劑調為冰

腫宜越劑發

服之則愈

水令頓服

劑奪劑

亂	霍
吐瀉水穀不化	吐瀉水穀不化
可服淡劑調	可服淡劑調
以冰水令頓	以冰水令頓
服之則愈	服之則愈
注	注
宜淡劑日	宜淡劑日
劑調為冰	劑調為冰
水令頓服	水令頓服
之則愈此	之則愈此
腫	腫
皮膚身體否	皮膚身體否
腫宜越劑發	腫宜越劑發
劑奪劑	劑奪劑

濁氣在上不

為暴下不止也

上滿而後泄下泄而後復

穢可服木香

為腸鳴中

下泄而後復

檳榔丸青皮

有濕亦為

上滿治法同

陳皮之屬大

腸鳴火濕

上久則反寒

腸下濁氣逆

相攻亦為

治法同寒中

肺金為清氣

腸鳴治法

如驚瀉而腸

逆氣化則愈

同上治之

寒者亦同斯

脹	膜
逆氣化則愈	濁氣在上不
肺金為清氣	穢可服木香
腸下濁氣逆	檳榔丸青皮
陳皮之屬大	陳皮之屬大
腸鳴	腸鳴
為腸鳴中	為腸鳴中
有濕亦為	有濕亦為
腸鳴火濕	腸鳴火濕
相攻亦為	相攻亦為
腸鳴治法	腸鳴治法
同上治之	同上治之
驚	滿
如驚瀉而腸	如驚瀉而腸
寒者亦同斯	寒者亦同斯
治法同寒中	治法同寒中
上久則反寒	上久則反寒
上滿治法同	上滿治法同
下泄而後復	下泄而後復
上滿而後泄	上滿而後泄

類聚

類聚

也	大小便膿血	治法同上又	宜不二九地	榆散駐車凡	及車前子等	藥次宜淡劑	甘劑分劑之
大效	下血治法	同上又宜	苦劑奪劑	以苦燥之	如酒毒下	血同	血
唐義風濕亦有	大便血治法	同上血溫身	熱者死火之	成數七至七	日而死如屍	臭者不治	血

類	大腸熱甚也	脫用酸漿水煎	三五沸稍熱	肛深洗三五度	次以苦劑堅	之則愈	類
廣	治法同上	又大黃牽	牛儿散奪	之法燥瀼	亦同痔漏	廣腸痛腸	類
乳	肛門左右有	核內經曰因	而飽食筋脉	橫解腸辟為	痔屬大腸經	可服枳殼之	類
風	屬太癖生腸	風乳痔相連					類

金櫃十全五泄圖傳總論

天之氣一也一之川為風火燥濕寒暑故濕
 之氣一之一也相乘而為之五變其化在天
 為雨在地為泥在人為脾甚則為泄故風而
 濕其泄也胃暑而濕其泄也脾燥而濕其泄
 也大腸熱而濕其泄也小腸寒而濕其泄也
 大瘕若胃泄不已變而為飧泄飧泄不已變
 而為洞泄洞泄不止變而為洞泄寒中此風乘

濕之變也若脾泄不已變而為霍亂霍亂不
 已變而為注下注下不已變而為腫蠱此暑
 乘濕之變也若大腸泄不已變而為腹脹腹
 脹不已變而為腸鳴腸鳴不已變而為支滿
 驚洩此燥濕乘之變也若小腸泄不已變而
 為腸澼腸澼不已變而為臟毒臟毒不已變
 而為前後便血此熱乘濕之變也若大瘕泄
 不已變而為脫肛脫肛不已變而為廣腸痛
 廣腸痛不已變而為乳痔腸風此寒乘濕之

變也凡此二十五變若無濕則終不成痰况
脾胃二土共管中州脾好飲脾亦惡濕此泄
之所由生也凡下痢之脉微且小者生浮大
者死水腫之脉反是浮大者生沉細者死夫
病在裏脉沉在表脉浮裏當下之表當汗之
下痢而脉浮滑水腫者沉細表裏俱受病故
不治也凡臟血使兩手脉俱弦者死絕俱滑
大者衄血溫身熱者死王太僕則曰若下血
而身熱血溫是血去而外逸也血屬火故也

七日而死者火之成數也夫飧泄得之於風
亦汗可愈或伏驚怖則膽木受邪暴下綠水
蓋謂成已見伐於甲木也嬰兒泄綠水素問
有嬰兒風理亦如之洞泄者飧泄之甚但飧
泄近於洞泄洞泄久則寒中溫之可也治法
曰和之則可也汗之則不可蓋在府則易治
入臟則難攻洞泄寒中自府而入臟宜和解
而勿爭水腫之作未遽而然也由濕遍於
人腸小洩自嗇水濕既瀦腫滿日倍面黃腹

大肢體如溼濕氣周身難專一法越其高而奪其下發其表而滲其中酸收而辛散淡滲而苦堅用攻劑以救其甚緩劑以平其餘如是則孤精得氣獨魄反陽亦可保形陳莖去而淨府絮矣彼荳蔻烏梅鶯粟囊勿驟用也設病形一變必致大悞或通而塞或塞而通寒塞通通豈限一法世俗止知寒劑之能塞而不知通劑之能塞者拘於方也凡治濕皆以利小溲為主諸泄不已宜灸水分穴謂水

穀之所別也臍之上二寸半灸五七壯腹鳴如雷水道行之候也凡濕勿鍼內經雖云繆刺其處莫若以張長沙治傷寒法治之蓋泄者亦四時傷寒之一也仲景曰上湧而下泄表汗而裏攻半在表半在裏則宜和解之表裏俱見隨證滲泄此雖以治傷寒其於治濕也同仍察脉以視深淺問年壯以視虛實所投必如其意矣頃商水縣白堤酒監單昭信病飧泄逾年此邑劉繼先命予藥之為桂枝

醫方類聚

卷之十一

麻黃湯數兩一劑而愈因作五泄圖據難素
本意書錄于上刊而行之誠有望于後之君
子戴人張子和述

醫方類聚卷之一百四十一

此方類聚卷之一百四十一
麻黃湯數兩一劑而愈因作五泄圖據難素
本意書錄于上刊而行之誠有望于後之君
子戴人張子和述