

敗弩筋散

治筋被弓弩傷不能屈伸者

敗弩筋

燒存性

秦艽

去苗

杜仲

熟地

續斷

各五錢

當歸

大附子

炮去皮臍各一兩

共為末每服二錢溫酒調服日三次

古方玉貞散

理刃傷并破傷風

生南星

防風

等分

為末每服一錢黃酒下

一童被牛傷腸出用桑皮線縫之黃龍散敷之

愈數日後肢厥腹痛服此散立驗

金瘡中風掣痛并手足不仁者用艾葉採作團入瓦

器內點着上蓋留一孔以孔對患處薰之良久自

瘡口着水肉如番花者着風肉硬不消者用截

血膏敷之

見跌撲門

螻蛄散

治中矢在咽喉胸膈不出者鉛子入肉不出者針悞刺肉不出者

用螻蛄一箇焙爲末黃酒調服少時作痒自動自出再用螻蛄末香油調塗瘡口或煎濃汁滴患處如鮮者取腦塗之立出

衣針入腹入肉者用黃蠟靈磁石等分溶合撚如針大以涼水送下藥裹針自大便而下

酸棗核數十枚煎湯服針從原孔出外以雙仁

杏仁研如泥以車脂調塗傷處自出 綉針刺

足針以出而作痛者用黃泥罨之

砲刃等傷危重幾絕者急剖水牛腹將傷者牛入

腹中良久即甦按此以氣血補氣血之良法也

業醫者守一定之方而治無窮之病愧矣

八珍湯

十全大補湯 見首卷

七真膏

見杖丹門

烏金丸

杖傷

杖傷形傷症也凡未杖之時用受杖丹等服之能令血不攻心已杖後不問已破未破即服瓊液散力

能化瘀除疔止痛消腫而不潰且易於結痂功勝
他藥多矣氣質弱者繼之大補以培其元使脾胃
健自能營達於下也外則未破者斫之已破者玄
珠膏塗之去瘀甚速次以瑩玉膏七真膏等生肌
如肉滿而不生皮者青黛珍珠散如刑重肉糜黯
腫昏憤者剥黑羊皮乘熱貼之熱童便灌之繼以
獨參湯補之

代杖散

野紅花

卽小薊
半觔

用燒酒四觔半浸之晒之以乾

爲度臨刑時絹包二錢含口內嚙其汁任

刑不
知痛

代杖湯 臨刑時先服

土鱉 正箇

蘇木

乳香

沒藥

錢二

木耳

川山甲

丹皮

枳殼

蒲黃

歸尾

木通

甘草

各一錢

酒水煎服

如不受杖服靛花水二鍾解之

代杖丹

治情不由已事出不虞受害一身重刑難

免當預服之受刑可忍能保血不攻心

乳香

沒藥

無名異

地龍

去土

木鱉子

丁香

丹皮

肉桂

自然銅

煨醋碎七次

蘇木

右爲末煉蜜爲丸二錢重臨刑時預服一九黃
酒化下

椒鱉丸 初杖服之散血消腫輕者不用

胡椒 二兩 土鱉 三十箇 歸尾 一兩 木耳 灰一兩

乳香 沒藥 杏仁 桃仁

髮灰 血竭 各三錢 自然銅 醋碎七

右爲末另用胡椒 兩半 煮汁打糊爲丸桐子大每

責十板服藥二錢熱酒送下

七真膏

乳香 去油 沒藥 去油 三七 焙 輕粉

兒茶 各三錢 射香 四分 冰片 三分

右為末 確收聽用 遇杖者 勿經湯水 用白蜜調敷 疔自化 癩自散 只此一敷 不須再換

六真膏 治一切刑傷各樣癰疽

乳香 沒藥 血竭 三七

兒茶 各三錢 樟冰 三兩 猪脂 十二兩

碗盛承 煮化入藥和勻 攤敷 先將乳沒竭七等研極細 再將桂油熬化 去滓入而六味攪勻 听用

瑩玉膏 治杖傷消癩定痛亦治臙瘡

猪脂油 三兩 白蠟 一兩 離火入 樟冰 一兩

輕粉 五錢 冰片 三分 射香 二分 銀硃 五錢

爲未加入和勻收用

黃白散 洗杖瘡

大黃

白芷

各兩許

水煎濃汁揉洗傷處以痒至痛痛至痒瘕散見

紅爲度拭乾貼藥

一用葱薑各四兩杵爛揉去血水次貼藥

瓊液散

見夾傷

青黛珍散

玄珠膏

俱見首卷

夾傷

夾傷者禁用敷藥膏藥及泥塗等法後必作腫成膿未受刑時預服代杖丹以護心已夾後隨用銀珠

或硃砂末用燒酒調敷傷處用一人以十指尖輕
啄患者脚底先覺痒次覺痛爲止再用一二人以
筆管於患者脚面上輕輕趕之助通血脉候傷處
凹者突起四圍腫大爲度卽服瓊液散隨飲至醉
爲度次日去敷藥只用洗藥日盪三二次次日再
服瓊液散則腫易消痛易止矣如復受重刑以至
破潰者貼瓊液膏服代杖湯弱者繼之大補使氣
血壯自能營達於下則易於收功生肌時易貼太
真膏甚捷

瓊液散 治夾傷撥傷杖傷跌傷并寒濕筋骨疼痛

鬧楊花

擇去梗蒂蓋葉洗去灰沙晒乾砂鍋內微焙

為末每服五分壯者七分先飲酒至半酣次服藥再飲至大醉為度靜臥勿語語則發麻次日午時其麻方解消腫止痛其功甚捷連服三次全愈弱者間一日再服

洗杖傷方

夾傷腫痛用此洗之

透骨草

天門冬

天靈蓋

南星

地骨皮

陳皮

等分

象皮

切碎倍用

水煎浸洗日二二次

瓊液膏

夾撥所傷立能止痛活瘀

鬧楊花

紅花

蒲黃

白芷

歸尾

各二兩

蘇油

一兩

浸藥七日燥枯瀉去渣

入黃蠟

白蠟

各一兩

溶化稍溫入乳香

沒藥

末各六錢

冰片

六分

和勻收用

代杖湯

六真膏

俱見杖傷

破傷風

破傷風者因皮肉破被風寒外襲漸傳入裏則寒濕

交作口禁咬牙角弓反張口吐涎沫入陰則身涼

自汗傷處反為平陷其毒內攻矣宜鉗珠丹玉真

散汗之外仍貼玉真散得膿為効如汗後前症不

退傷處不高漸醒漸昏時發時止口禁不語者不

玉真散 治破傷風牙關緊急角弓反張甚則咬牙縮舌

南星 防風 白芷 天麻

白附子 羌活等分

右爲末每服二錢熱酒一鍾調服更敷傷處牙

緊反張者每服二錢熱童便調服雖內有瘀血

者亦愈至於昏厥心腹尚溫者連進三服亦可

保全 風犬咬傷用漱口水洗淨搽之効

鎮風散 破傷風諸藥罔効危急者及一切猪羊等

魚鱉焙 杭粉焙 皂礬妙紅 硃砂三錢

各二兩 另研

右爲末每服二錢無灰酒調服外灸傷處知痛
爲吉 猪羊等風發時昏倒不省人事者每服
三錢服二次不再發

臭靈丹

治破傷風及金瘡跌打

大蒜

一升 搗

黃酒四升煮一升服之須臾

汗出 立愈

杏仁膏

治破傷風發熱紅腫者

杏仁

去皮 研

飛羅麩

等分

新汲水調敷

紺珠丹

見首 卷

艾燻法

見金 瘡門

截血膏

見跌 傷門

類破傷風

類破傷風者由潰瘍膿血大瀉陽隨陰散或筋脉拘

攣惡寒惕慄甚者舌強口禁項背反張痰壅便閉
汗出發熱此因虛而傳變所致形類破傷風也法
當大補氣血諸症自退如果係風症亦宜大補兼
以治風可也余每見潰瘍貼膏剪孔而患破傷風
者及用歛藥生肌反助餘毒致成敗症者多矣

發瘧

發瘧者形類破傷風是以牙緊體強肢搐背反有汗
曰柔瘧風能散氣也無汗曰剛瘧寒能瀆血也由
潰瘍亾血過多所致仲景曰瘡家不可發汗汗之
則瘧乃敗症也若大補氣血則生悞作風治則殆

治如四君六味八珍十全補中逍遙聖愈等湯俱
加鈎藤丹皮枝子天麻等藥如未應獨參湯手足
冷者加以桂附

四君子湯

六味地黃丸

八珍湯

十全大補湯

聖愈湯

補中益氣湯

俱見首卷

逍遙散

見瘰癧門

湯火傷

湯潑火傷者患自外來也然熱甚則火毒攻內令人

煩燥口乾昏憤而悶絕初傷時用冷燒酒一鍾於

無意中望患者胸前一潑被吃一驚其氣一吸一

呵則內之熱毒隨呵而出矣如仍作煩悶者取新
童便二碗灌之由煙燻欲灰者搗水蘿蔔汁灌之
外以燒酒蘸洗湯火傷處其冷如冰或以鹽末摻
之能護肉不壞然後敷保膚等膏二便秘者四順
清涼飲下之慎用冷水并泥浸溺致使熱毒伏於
內寒滯束於外因而不救者多

四順清涼飲

治湯火傷熱毒入裏或外被寒涼所

汲火毒內攻致生煩悶內熱口乾大便秘實者

當歸

赤芍

羌活

防風

連翹

枝子

甘草

各一錢

大黃

炒二錢

水二鍾燈心二十根煎八分服

保膚膏 治湯泡火燒及廉瘡禿瘡

大蜂房一箇 血餘一元 香油半 燥枯半 瀘去渣入

黃蠟二兩 溶化離火待温入大黃未二兩

朝腦末一兩 二味研勻和入任用

嬰粟膏 治湯潑火燒皮肉損爛疼苦焮熱起泡流水者

蘇油半 嬰粟花三十朶無花以殼代之 浸油內煎枯

瀘去渣入白蠟六錢

熬化傾碗內待四邊將凝時下真輕粉細末四錢

攪勻坐冷水內用時挑破水泡攤薄紙上貼之

清涼等膏

治湯潑火燒火藥傷痛不可忍者

石灰

升一

以水升開加水二碗攪混澄清取清汁

半碗加香油減半以筋攪打千百下如糊取面

上稠者用鷺翎蘸掃傷處

一用雞子清一鍾

香油半鍾筋打千百下掃之 一用石灰未生

桐油調敷

菜服膏

治未潰紅腫熱痛者

鮮蘿蔔英杵爛罨之腫消痛止

凍瘡

凍瘡者出寒極氣凝血滯肌死而成也甚則手足耳

鼻受冷至不知痛痒者宜置温處以綿厚裹之或用熱手熨之切忌火烘湯泡犯之則肉死至春月必落宜服內托之藥以助陽氣則腐肉自潰良肉自生外用瑩珠等膏生肌斂口如骨脫筋連者急剪去筋否則侵淫好肉難醫凍耳成瘡生薑自然汁煎膏塗之凍足瘡腫麥草連根葉煎湯洗之每逢冬月原凍處卽發者獨勝膏搽之晒之庶不發

獨勝膏

遇冬月凍處卽發者

於六月初六十六二十六日用獨頭蒜杵爛日中晒熱塗於凍發之處卽於日中晒乾息見湯

水如式三次永不復發

靈異膏 治凍瘡湯火瘡杖瘡多年惡瘡

鬱金 三兩

生地 二兩

粉草 一兩

猪脂油 一兩

浸七日燥藥枯濾去渣入黃蠟 四兩 溶化成膏浸

水內久之任用

骨哽咽喉及悞吞針鐵

哽喉者為悞吞針鐵諸刺諸骨哽於咽喉也微者用

薤白煮半熟以線扎之手執線頭將薤白入口微

嚼嚙之度薤過哽處便牽薤出而哽亦隨薤出矣

或用亂麻筋一團搓龍眼大以線穿繫雷線頭

在外湯濕急吞下咽頃刻扯出其針頭必刺入
中同出如不中卽再吞再扯以出爲度

烏龍針 治骨哽於咽下難出者

用鐵線燒軟雙頭處用黃蠟作丸龍眼大裹鐵
線頭上外用絲綿裹之推入喉內哽骨處其骨
自下矣不下再推

悞吞銅物者多食葶薺化堅爲軟悞吞鐵骨等物腸
中不能轉送覺墜者多食青菜豬脂自然送入大
腸從糞同出再諸骨哽喉用玉簪花根八錢各隨
所犯之肉爲引煎湯服之轉出乃愈

竹木刺入肉

諸刺入肉外傷之症也軟而淺者以針頭撥出則愈硬而深者搗螻蛄塗之少時卽出如刺已出而仍痛者亦以螻蛄塗之愈或以草麻子仁搗如糊先以絹襯傷處次罨之覺刺出卽去之一少加新絹羊糞和敷

桂蠟丸 桂心爲末溶黃蠟爲丸置丸於傷處搭濕紙三五層火焙藥化刺卽出矣

大牙散 生象牙末水調敷之立出

諸刺入喉者水調徐徐呷之

咬傷

人齒之食物無不燐爛下咽由灸燐之毒無不侵襲之也故受其傷則腫痛臭爛異於平常者感牙之毒也初咬時用熱童便侵傷處洗去牙黃汚血貼蟬酥餅以膏蓋之出微膿漸愈如失治則爛痛發胖仍用小便浸洗次用油紙撚點火於傷處薰之良久插蟬酥條膏蓋候腫消時用葱白二兩粉草五錢水煎日洗一次換紅黑二膏完口

金箔膏 貼咬傷

四兩猪脂二兩占騰黃半兩金中煎

占黃
蠟也

風犬咬

犬之風也由感肅殺之氣而成如心受之則舌出肝受之則目矇脾受之則流涎肺受之則音啞腎受之則尾拖此五臟之受毒也故經其嚙必致傷人初被咬時卽服救生散逐血片從小便中出忌諸口味麻物赤豆等百日乃安遲則毒大而小便難出必攻臟腑久則腹脹攻急人聲若犬眼神露白者不治有愈後復犯前禁觸之仍次

救生散

治犬傷

生班毛

七箇去頭翅足

杭粉

錢一

同研爲末空心酒調

服一疇許小便行出血片白脂乃惡物也如便
痛煎甘草湯飲之自利如毒未盡次早再一服
以小便清白方爲毒盡 一法看其人頂中必
有紅髮一根急須拔去以追風散敷之前救生
散服之

追風如聖散 敷風犬咬處以拔其毒

細辛

防風

川烏

薄荷

草烏

川芎

白芷

蒼朮

各一兩

雄黃

四錢

共爲末溫酒調敷傷處紙蓋之扎之日換二次

風犬咬傷用燈心一把黑豆一合水煎豆熟取湯調

救生散服外以川山甲炒斑毛等分艾和為炷黃

豆大隔蒜灸之此一貫子秘法也灸畢用漱口水

洗淨以玉真散敷之不發無膿見破傷風

一用番木鱉一箇水磨服之

風犬咬傷久而復發者雄黃二錢射香二分為末酒調灌

之得睡勿驚任其自醒利下惡物再進一服驗

虫獸傷

黃石公云禽之制在氣如人汗粉犀蟹黃破漆蛇胆

寧蛙馬骨驅虫之類是也何則以其所不勝及其

所畏者治之耳如馬咬傷用原打馬的皮鞭燒灰
敷之蜈蚣咬傷以手指蘸雞口內涎塗之蝎子蜇
傷取蝸牛一箇搗爛塗之俱能立愈者以此推之
非尋類而治者乎○一法治一切虫傷先問傷者
是何虫傷答曰某虫傷師即默念云火德星君黑
煞捩吹氣一口在傷處其痛立止

犬咬傷 搗大蒜敷之

久不收口者經布燒灰香油調敷

蛇咬傷○即飲好醋一二碗使氣不隨血走以繩扎

傷處兩頭再次用白芷末

五錢

水調服少時咬處

出黃水水盡則腫消口合而愈

○一用雄黃錢五五靈脂兩一為末每服三錢温酒調

服仍以此藥敷患處或用神燈照燃子薰之

馬咬傷 栗子嚼爛敷之

毒氣入裏者馬齒莧煎湯飲之

蜈蚣傷 取雄雞倒漑少時以手蘸雞口內涎抹傷

處其痛立止危者生雞血乘熱灌之

蝸子蜚 取蝸牛一箇搗爛塗之立止 籐黃

青黛

雄黃

蝸牛

蟬酥等分

右為末水和成錠水磨塗傷處立止

天蛇毒

外草間花蜘蛛也

人被其傷則腫痛有赤絲纏繞用

羊乳飲之藍汁和射香雄黃末塗之 若為露

水所濡則生瘡似癩非癩煮秦皮汁飲之

射工傷

即樹間雜色毛虫也

人觸着則能放毛射人初痒次痛

久則外痒內痛骨肉皆爛諸藥罔効用豆豉加

清油搗敷痒處少時則毛出可見去豉用白芷

煎湯洗之如肉已爛用海螵蛸末摻之

蚯蚓傷

畏受其毒

則眉鬚皆落狀如大風但夜則蚓鳴於

身為異耳用鹽湯洗之

蚕咬 搗苧根汁塗之

芋近蚕種則蚕不生取其畏也

六畜損傷夏月臭不可近者

蛇蝎一兩燒存性 蟬蝎五錢 青黛五錢 細辛二錢五分

右為末每服三錢黃酒調服則瘡內蛆化為水
蠅不敢落外以寒水石末慘之佳

蝎螯法 端午日午時向太陽立定左手恰指卵紋當

胸右手捏雞嘴訣開訣口舉向太陽念咒一遍即
收氣一口吹於左肩其訣亦閉口回向左肩開口

如吐氣之狀如式四十九遍畢即向太陽拜謝此

候用時如前作用一遍吹向痛處一捻一丟其痛
即止 咒曰日裏金雞鳳食蝎太上老君只一捻

小兒部

小兒天真未鑿，五發之毒亦無善惡之胗。其輕小瘡瘍，自可淋漓敷貼之，所謂頻沐更衣，外宜無病不得已而藥之，乃下法也。然必兼調乳母為確。其有大症載前，此字作積科無異第，以小兒所司者莫如丹毒等類，今則獨加詳焉。

赤遊丹毒

丹者受毒於未形之先，發病於有生之後，由胎養失宜所致。預辨之法，小兒無故眼生厚眵，或眼胞紅暈，微有氣喘，夜則煩啼，此欲發丹之候也。急服藍

根等藥潛消其毒已有赤腫者卽用芸薹等類外
銼其鋒然必兼吮砭洗貼等法治之始護全効

胎熱丹毒

初發赤腫光亮遊走遍身者由熱毒之

氣極與血相搏而風乘之也故又名之曰赤遊風
也初宜升麻葛根湯表之次用百解散驅風散清
之甚者大連翹飲如腹脹不乳毒氣入裏也紫雪
散下之外則吮之砭之淋洗之隨用精猪肉片貼
之一時許換藥敷之甚者日換二次三日後身涼
腹軟聲清乳哺如常砭處肉活者順返此者逆
丹起於腹背流入於四肢者順起於四肢流入於

腹背陰囊者逆

胎驚丹毒

初則面生水豆根脚微紅出沒無定次

至頸項丹赤如珠再次延及胸乳間者由孕母受驚傳襲於兒胎也先用四聖散洗目內服之藥照前胎熱如微有痰喘作搐者少加解驚藥

食滯丹毒

初發赤暈行而緩慢非若胎熱之暴速

者此由食滯所致治宜先消其食食滯消而丹仍作者用藥與胎熱藥同

吮法砭法

丹毒之法急令人用甘草煎濃汁漱口

淨隨患處遍吮之使毒各聚一處淋洗之敷貼之

自効甚者吮畢隨行砭法如赤暈走徹遍身難以
悉砭者令人吮胸背四肢等數處而砭之令微出
血以瀉其毒血紅者輕紫者重黑者死或出白汁
如珠亮如水晶手粘起絲者重砭畢隨以藥水淋
洗之用精猪肉薄片貼之一時許換藥敷之甚者
日換敷二次次日如腫未全消再量行砭法洗敷
照前第砭時不可刮盡其血血盡則出黃水矣若
身弱者有不慚之變蓋爲血去而氣不能獨居也
一又兒生百日之內不可砭之以其肌肉不能任
也如患在頭令兒倒臥頭要低些用披針自下而

上偏針挑之出血令毒從頂出不行使法敷藥同
前丹名雖多其源則一總以右法施之自驗

使法見首

卷針使門

凡治風丹宜解毒托裏令微通利使元氣內護而排
外邪慎用硝黃等大下之劑若夫發散太過則表
虛熱赤不退者補中益氣湯加防風白芷寒涼太
過則胃虛熱赤不退者異攻散加升麻柴胡或兼
發搖者四君子湯加升麻當歸鈎藤如丹毒已解
發熱作渴不食者七味白朮散

主治方

升麻葛根湯

治丹毒面紅發熱氣急啼叫驚搐

等症

升麻

葛根

白芍

柴胡

黃芩

枝子

各一錢

木通

甘草

各五分

用水二鍾煎一中母子同服

百解散

治一切丹毒

升麻

葛根

赤芍

黃芩

連翹

麻黃

薄荷

半夏

荆芥

金銀花

甘草

水煎母子同服

驅風散

治紫赤丹毒及諸瘡咽喉腫痛并傷風發

熱煩燥鼻塞氣喘痰嗽驚啼等症

金銀花

三錢

牛旁子

炒

防風

荆芥

當歸

川芎

白芍

黃芩

連翹

各八分

木通

甘草

各四分

甚加大黃

丹毒加麻仁

炒研

水二鍾煎八分母子同服

大連翹飲

丹毒發熱痰涎壅盛一切諸瘡痧疹頸

項生核或傷風傷寒時行發熱等症

連翹

牛旁子

防風

荆芥穗

黃芩

柴胡

枝子

蟬蛻

當歸

赤芍

石膏

滑石

木通

瞿麥

車前子

甘草

等分

用燈草二十根水煎母子同服

紫雪散

治小兒赤遊丹毒甚者毒氣入裏肚腹膨

脹氣急不乳宜此救之又治傷寒熱燥發狂及

外科一切蓄毒在內煩燥口乾恍惚不寧等症

升麻

寒水石

石膏

犀角

羚羊角

各一兩

玄參

二兩

沉香

木香

各五錢

甘草

八錢

用水五碗煎至一碗濾清再煎滾

投提淨朴硝

三兩六錢

微火慢煎水氣將盡欲凝結

之時傾入碗內下硃砂冰片

各二錢

金箔

百張

各預

研細末和勻將碗頓水內候冷凝成紫雪收用
如大人每用一錢小兒用二分十歲者用五分
哈口內徐徐嚙之即効甚者倍服之或用淡竹
葉燈心煎湯化服亦佳

四聖散

治胎受熱毒兩目不開及丹毒眼胞紅暈

黃連

秦皮

木賊

燈心

棗子

等分
覺片

每用二三錢水一盞煎七分澄清去渣不時

洗目

淋洗丹毒等方

丹毒赤暈漸開或暈有碎奪者用甘草兩許水一大鍾煎半鍾待溫令乳母乳之含漱徐徐吐淋病處以手掌并指揩洗之勿犯指甲仍與小兒些須飲之只一次則暈不開大矣良久再淋三淋必瘥
一用柳葉或桑白皮每取一升用水一斗煎三升於避風處淋洗之日五七次

敷丹毒類方

芸薹菜子研末酒調澄清飲之渣塗之 或輕粉末杵芫荽汁調稀鷺翎醮掃患處須臾赤色變白或生癰或白破而愈 或景天草杵汁加陳醋塗

之 或紫檀香一塊水磨汁塗之 丹流入腹者

杵馬齒莧汁飲之渣敷 丹流入陰赤腫出血者

用牛膝兩生甘草五錢水一鍾煎五分加雞子清調

伏龍肝未塗之伏龍肝即鼈心燒紅之土也

胎毒瘡瘍

寶鑑云初生芽兒一塊血也無形證也無脉有驚即

係是胎驚有熱即係是胎熱蓋嬰兒在腹與母一

體凡患瘡疾但審乳母之症為確如乳母肝經有

熱加味小柴胡湯之類肝經虛熱加味逍遙散之

類腎水不能生肝木者六味地黃湯心經積熱者

柴胡枝子散 心經虛熱者茯苓補心湯膏梁積熱者東垣清胃散脾經鬱熱者錢氏瀉黃散脾經虛熱者錢氏異攻散如式治之自能護効若緊用犀角丸化毒丹及外敷寒涼等藥復傷元氣反促其危也

柴胡枝子散 治三焦及肝胆二經風熱以致耳內作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛寒熱瞞熱

柴胡

枝子

炒

丹皮

各一錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛旁子

炒各七分

甘草

三分

水鍾半煎七分服

茯苓補心湯

治心氣不足氣血不和虛熱瘡瘍

酸棗仁

炒

茯苓

各二錢

人參

一錢五分

白朮

五味子

炒

當歸

各一錢

遠志

六分

石菖蒲

甘草

炙各五分

右分二三服水煎服

東垣清胃散

治胃經有熱齒牙作痛或飲冷作渴

口舌生瘡或唇口腫痛熾連頭面或重舌馬牙

流涎吐舌等症

升麻

五分

生地

四分

黃連

三分

丹皮

三分

歸尾

四分

水煎母子同服如加柴胡枝子則

為加味清胃散

錢氏瀉黃散

治脾經鬱熱作渴飲冷臥不露睛手

足熱遍身黃者宜之

藿香葉

七錢

枝子仁

一兩

石膏

五錢

甘草

三兩

防風

四兩 兩右對同窰酒微炒香為末

水一中煎五分澄去渣服

錢氏異攻散

治吐瀉不思食溫中和氣

人參

茯苓

白朮

陳皮

甘草

等分為末

每服二錢水一中生薑二片棗一枚煎五分服

加味小柴胡湯

加味逍遙散

見瘰癧門

六味地黃丸

見首卷

熱毒瘡瘍

熱毒者因膏梁厚味或乳母七情鬱火所致宜宣風

毒涼心火解胃熱如加味當歸散牛旁子湯塗以

四黃散一抹金及用四時洗法如結腫焮痛有

表症者解表消毒散裏症者攻裏消毒散邪在經

絡者托裏榮衛湯欲作膿者托裏消毒散膿成不

潰者八珍湯宜分始末攻補隨時藥之對症無不愈也

加味當歸散 順調氣血和解表裏爽利心腹疎理

百病及治溫熱停積自利煩燥不寧等症

當歸

酒洗

赤芍

各二兩

川芎

五錢

甘草

半生半熟

大黃 半生半 炮各二兩 麻黃 製五錢 加黃連 升麻

葛根 丹毒再加連翹 荆芥

每服三錢薑葱燈心水煎服 丹毒不用葱

牛旁子湯 治傷風發熱煩燥鼻塞氣喘痰嗽驚啼

及諸瘡紫赤丹毒咽喉腫痛

牛旁子 炒研 三兩 防風 去蘆 一兩 薄荷葉 一兩 荆芥穗 去梗 四兩

大黃 一兩 五錢 甘草 一兩 二錢 丹毒加麻仁 炒研

每服三錢水煎服

四黃散 治小兒一切熱毒瘡疾燥痒流汁不乾者

黃連 黃栢 黃芩 大黃

滑石 各一兩

文蛤 去五屑五錢

右為末清油調塗

一抹金 治小兒遍身生瘡糜爛燥痛流水不乾者

多因風化虫結於皮膚侵淫不已治以殺虫藥

是究其源也

藜蘆 洗淨焙

蛇床子 去土

黃丹 水飛各兩

硫黃

赤石脂

白礬 枯

黃栢

五倍子

去虫各五錢

輕粉 五兩五錢

各為末研勻加生豬脂再杵如膏塗抹患處或

清油調塗

解表消毒散

治小兒瘡毒腫高焮痛便利調和脉

浮洪而有表症者

黃芪 上部酒拌炒中部米泔水浸炒下部鹽水拌炒 升麻

葛根

赤芍

玄參

牛旁子

炒研

麻黃

去節

甘草

各五分

連翹

一錢

更看分野加以引經

手少陰加細辛 三分

足少陰加獨活 七分

手太陰加 桔梗白芷各五分

足太陰加蒼朮 七分

手厥陰加柴胡 七分

足厥陰加柴胡青皮 各五分

手太陽加藁本 五分

足太陽加羌活 七分

手陽明加白芷 五分

足陽明加升麻葛根 各七分

手足少陽經俱加柴胡七分

用水一中生薑三片葱白一根煎七分服

攻裏消毒散 治小兒瘡瘍腫硬痛深大便秘結脉

沉實而有裏症者

牛旁子炒研連翹 當歸 白芍各一錢

大黃一錢五分芒硝五分甘草七分瓜萋連皮子細切三錢

用水一鍾煎七分服未利再服

托裏榮衛湯 治小兒瘡毒外無焮腫內亦便利調

和知邪在經也

黃芪炒一錢紅花一錢蒼朮米泔炒柴胡

外科大成 卷之四 小兒瘡毒 函三堂藏板

連翹

羌活

防風

歸身

甘草

炙

黃芩

人參

各一錢

桂枝

七分

用水一鍾酒半鍾煎八分服

四時洗惡瘡法

春用柳條荆芥 夏用棗葉槐枝 秋用苦參

冬亦苦參 隨兒大小量用三二兩煎湯洗之

垂癰

附重舌重腭重齒

垂癰小兒初生五七日間喉裏舌上有物如蘆籜盛

水狀如懸癰以綿裹長針留鋒粟許刺出青赤黃

汁一刺止如未消次日又刺三刺自消刺後用鹽

湯洗之摻一字散甚者服金硃散如生於舌下者
爲重舌生於頰裏及上腭者爲重腭生齒斷者各
重齒皆刺敷如前

一字散 治垂癰重舌重腭重齒

硃砂

礪砂 各五分

朴硝

冰片 各一分

右爲末用蜜少許調刷口內

金硃飲

治胎驚壯熱傷寒伏熱上焦虛熱及重舌

赤眼口鼻生瘡等症

天竺黃 馬牙硝

甘草

灸各五錢

鬱金

剉皂角水煮五錢

蟬蜋

十四箇洗去土

硃砂

五分

射香

少許

右爲末每服三五分蜜湯調下

胎風

胎風者小兒初生身如湯潑火傷之狀由孕母厚味太過所致令母服清胃散逍遙散清其氣或嬰兒亦飲少許熨赤發熱者胃火也用石膏粉敷不熨赤者胎母脾虛也粳米粉敷之 兒大者由臟熱內蒸濕氣外襲所致則名王爛瘡也宜金黃散蜜水調敷

逍遙散

見瘰癧門

清胃散

見胎前瘡瘍

胎赤

胎赤者初生月裏肌膚忽然發赤如丹由胎熱所致
宜清母熱外以藍葉末塗之與赤遊丹門參考又
初生浴兒洗目不淨則眼邊赤爛至長不瘥亦名
胎赤宜二金散洗之

二金散 治胎赤眼

黃連

黃柏

等分爲粗末乳
浸一宿焙乾

每用小許綿裹用荆芥湯浸時時洗之

胎瘤

胎瘤者初生頭背胸乳間腫起如梅如李如饅頭者
乃胎中瘀滯也候滿月外方可刺之出赤汁而安

內服五福化毒丹

臍瘡臍突

初生之兒啼哭過甚腸帶極後腸道不乾突出用枯凡搽之外以生油抹
白紙上貼之外再傳以絹幅隔日易之三日腸乾而愈 試驗過

臍瘡因水濕傷臍所致久不愈則發搖由風邪外襲

也恐變風癩用乾蝦蟆燒敷之或加枯礬或再加

龍骨或舊綿燒當頭末等射香少摻之

臍突者腫赤虛由胎母失養兒受積熱所致宜調其

母清其熱不必敷治恐反為害如旬日外忽腫如

吹不赤捻動微响或驚悸作啼者宜白芍藥湯加

意苡仁外以消散敷之

白芍藥湯 治臍突及冷疝腹疼

白芍藥一兩澤瀉五錢

甘草一分薄桂去粗皮一錢為粗末

每服二錢水一鍾煎六分空心服臍下痛加鉤

藤生薑食鹽

外消散 治臍突叫啼及感濕熱陰器膚囊浮腫者

大黃 牡蠣各五錢朴硝二錢

為末用田螺洗淨再以清水半碗養之過宿取

水調藥塗之其螺仍放水中勿害方効 陰器

膚囊腫者車前子煎湯候冷調敷

陰腫

陰腫者為陰囊腫大也古為之脫囊由久坐陰濕之地為風寒

臍疝疝突性腫

西三堂藏板

所襲也間有怒叫氣閉結聚於下者桃仁丸王之
若寒氣客於厥陰少陰者則陰囊腫痛腹痛冷
汗引縮二子入腹痛止方出爲之內吊烏梅散勻
氣散王之 有陰莖全縮不見或不縮而陰囊腫
大光亮不燥不疼者肝腎氣虛也橘核煎湯調勻
氣散王之 囊腫及四肢俱腫二便不利者膀胱
蘊熱風熱相乘也三白散王之 女兒陰戶腫脹
者心熱相傳也木通散導赤散或五苓散用薏苡
仁車前子前湯調服俱外敷立消散

桃仁丸

治坐感陰濕或因怒氣閉

桃仁 七錢五分 去皮 尖 麩炒 微黃 丹皮 白蒺藜 微炒 去刺

桂心 各五錢 牽牛 頭末二錢 五分

為未蜜丸黍米大每服十九黃酒送下

烏梅散 治腹痛臍下痛痲氣等症

烏梅肉 玄胡索 粉甘草 半生半炙 各五錢

釣藤 沒藥 乳香 各二錢 五分

為粗末每服二錢用水一鍾煎七分服

勻氣散 治氣滯不和冷痲腹痛

桔梗 二兩 炒 陳皮 去白 一兩 砂仁 茴香 各五錢

粉草 炙四錢 白薑 炮二錢 五分

小兒... 三堂藏板

為末每服五分或一錢如調氣用滾水下如腹痛疔痛用燒鹽湯下

三白散 治囊腫肢腫及大小便不利

桑白皮 白朮 白丑半生 陳皮去白

木通去皮 甘草炙各一錢 水煎服

立消散 治膀胱久受熱毒以致陰器膚囊赤腫脹痛

赤小豆 赤芍藥 枳殼 商陸

風化硝各五錢俱不見火晒為末

用栝葉煎湯候冷調塗

臘茶散 治陰囊生瘡疼痛出水久不瘥者

臙茶

文蛤

各五錢 臙粉 許少

為未先用葱椒煎湯洗之次以香油調敷 或

紫蘇葉煎湯洗之及紫蘇末搽之托之

地龍散 治陰囊腫大

甘草煎汁調地龍末塗之

脫肛

脫肛者肺實熱則秘結肺虛寒則脫出用補中益氣

湯加羌活白芍煨薑主之又緋紅作痛者血虛有

熱也佐以丹皮四物微紅作痛者氣虛有熱也佐

以丹皮四君再審手足指熱屬胃熱指寒屬胃寒

宜消息之 積熱者升麻兩條芩六錢水煎服

蛤硝散 洗脫肛

文蛤兩水五碗煎湯入朴硝兩通手淋洗至水

冷方止若覺熱痛用熊胆加冰片水化塗之或

用 收肛散見痔漏門 一用荔枝核為末托之

一用陳年醬蘿蔔片托之 一用坎宮錠子塗之

肛門作痒 此症必廁受風濕示市肛門作痒宜用凍風石洗之痒即止示否概作虫症治也

肛門作痒重也視其下唇內必生小白瘡或耳之前

後結小核如貫珠者是也書云下唇有瘡虫蝕其

肛宜九味蘆薈丸服之外以雄黃銅綠等分為末摻之

蘆薈丸

見痘症門

遺毒

遺毒者初生如點次成爛斑甚則口角眼眶面鼻及
穀道等處俱傷由乳母傳染者輕父母遺體者重
初生時用井水調白礬令母口哈水吮之一吸一
換使毒聚一處磨紫金錠塗之破爛者用黃栢蜜
灸爲末摻之乾用香油調搽內以人中黃末每用
分許每日五七次煎土茯苓湯調服或服二黃散
再與痘裏夾瘡門參考

二黃散

治小兒遺毒

牛黃七分

胡黃連

山茨菇

各三錢

甘草

一錢五分

右為細末每服三二分蜜湯調服

紫金錠

葡萄疫

葡萄疫者形如青紫葡萄大小不一頭面身體隨處可生由感四時不正之氣鬱於皮膚乃腑症也初起服羚羊角散清熱涼血久則牙根出血邪傳入胃也服胃脾湯滋益其內如牙腐爛者於牙

疳門參考

羚羊角散

羚羊角

牛旁子

防風

麥門冬

知母

玄參

黃芩

各八分

甘草

二分

水鍾半淡竹葉十片煎七分服

胃脾湯

沙參

白朮

陳皮

茯神

遠志

麥冬

各六分

五味子

甘草

各五分

水煎服

有汗去沙參加人參黃芪

痘裏瘡瘍

痘裏夾癭

結於頸項或生耳後腹下

形如桃李棗瓜身烙煩渴由

痰氣凝結所致治在審日期之先後視元氣之厚

薄紀男女之大小範時令之寒暑度幾免紊亂之

愈 痘初起卽發癩者治宜托裏消痰解毒如木

通桔梗解毒而徹開鎖惡實生地除梟而祛榮炎

甘草清理諸邪蟬蜋祛風辟毒芍藥洩諸經之鬱

火荆芥散陽明之風邪如是之藥缺一不可若苓

連等藥及耗燥之劑俱不宜用 痘發在三四日

而癩作者則毒隨痘洩毒隨痘灌自可挽全而無

害宜服三消散倘斯時紅腫將膿一潰則元氣洩

而痘焉能克灌乎七八日之期急用黃芪衛元湯

補之 痘至七八日克灌時而發癩者冲和飲子

至之是痘黃蠟色而作癩者只保元兼以消毒雖

消金妨

三消散

治痘發至三兩日而作癩者

半夏

當歸

茯苓

甘草

木通

紅花

生地

芍藥

牛旁子

天花粉

蟬蜋

燈草水煎服

黃芪衛元湯

治痘發三四日而癩潰者宜此補之

黃芪

人參

當歸

紅花

芍藥

桔梗

甘草

防風水煎服

冲和飲子

治痘至七八日而發癩者

人參

黃芪

麥門冬

芍藥

柴胡

防風

荆芥

白茯苓

白朮

桔梗

連翹

當歸

天花粉

水煎服

痘裏發丹

由內熱之極也宜生地牛旁子芍藥甘

草木通荆穗其毒自消腫痛加柴胡羌活頭頂盛
者毒膜於上焦也宜炒黃連柴甘車前枝子等類
外以化斑湯浴之慎服寒藥及用猪胆京墨冰片
等塗抹之類

痘裏夾瘡

宜紫蘇荆芥煎湯浴之隨用升麻黃芪

為君芍藥生地白朮為臣羌活防風為佐甘草姜

蚕蟬蠅爲使此準則也 若楊梅瘡如皂角子仁

肥疔瘡如松香輕粉黃丹雄黃俱不可用

痘夾損傷

宜拱元散人參黃芪伏鳳雞當歸紅花

芍藥蟬蠅防風甘草一加橘紅生地土鱉以補其
內用文蛤棕灰罨之收斂其外若損而未破者蝦
蟆皮貼之痕潤弗收者白芨白斂象皮末摻之慎
用峻利及敗血等藥如湯火傷者忌敷涼藥

痘疔

俗謂之賊痘生於五六日之間或三五枚六

七枚雜於諸痘之間其色紫黯甚則黑硬於石有
此以致諸症蜂起不能灌膿甚至不救由熱毒勢

甚併結之也。有中心黑陷，四畔突起戴漿者，有中

心戴漿，四畔乾陷焦黑者，有頭戴白漿，自破潰爛

者，有水泡溶溶易破者，有血泡色紫易破者，有瘡

頭針孔，漿水自出者，已上數症，生於四肢，身溫音

清，浮高而潤者，輕，生於腰腹，身熱音啞，深陷而焦者重

看疔秘法 天庭承漿黑陷男應陰囊女應陰戶兩顴兩頤有

黑陷應在腰下人中黑陷應在臍下太陽有黑陷應在腿足耳

上有黑陷應在手足輕則黑陷，重則疔也。

捲簾疔生於舌根小如黑豆，大似葡萄，令兒舌捲喉痛，急

用鉄鉤破儘淨，惡血隨以苦茶漱口，搽龍宮丹

水片礪砂青黛黃連薄荷荆芥姜蚕炒右爲細末吹用

火珠疔生鼻孔內闔塞噴火面赤眼紅用鈎鈎破用黃連

膏加冰片滴鼻內服瀉金散犀角牛旁子桔梗芍

藥生地紅花紫蘇甘草煎服

忘汲疔生於眼沿封蛤腫脹煩熱面紫治宜挑破用瓦葱

搗爛燬之

參虎疔生於耳內於會膿之時宜挑破搽拔疔散

燕窩疔生於腋腫硬面赤諺語如在左腋潛注則右體

之瘡沉伏失色右則反之宜銀針挑破去其根用

拔疔散服消毒飲子牛旁子犀角芍藥生地紅花

甘草木通茯苓連翹燈心水煎服

注命疔

生兩足心

於痘期裏腫硬如錢如豆如椒有紫筋

直透足股挑之去血淨用田螺水調冰片點之次

用慎火草豨豆

浸脹搗爛敷之

透腸疔

生肛門旁

在六七朝腫痛如錐挑之煎金銀花防

風湯冷洗之次用輕粉珍珠冰片白歛末塗之內

服黃連解毒湯

驪龍疔

生尿孔內

於五六朝身熱譫語眼翻肢厥腹脹小

便閉是也急用蟬酥牛黃銀硃冰片射香研末次

用黃連細茶濃煎候冷取半匙調藥用細軟棉心

蘸藥送於孔內內服水通敗毒散

痂後痘疔潰見筋骨者

密陀僧二錢 赤石脂 賦粉 黃柏

杭粉炒 伏龍肝 血竭各一錢 飛丹八分

髮灰五分 乳香 沒藥各五分 冰片半分

有臭氣加阿魏三四分

為極細末摻之外用膏藥蓋之內服人參敗毒

散加川山甲 蟬蛻 連翹

痘爛身無完膚膿水浸淫粘枯衣被者用茶葉揀去

梗入滾水一燂即撈起再揀去梗濕鋪床土上鋪

草紙一層令兒臥之一夜則膿乾此秘訣也

痘爛生蛆及夏月諸虫咬傷臭穢不堪者用蛇蠅一兩

燒存性蟬蜋用水洗淨焙之青黛飛各五錢細辛一二錢半為末每

服三錢酒下仍以生寒水石細末摻之則虫化為

水蠅亦不敢近

蛆痘 形化氣化兼之也先哲云蛆痘不灰以其臭

毒盡化於外也用經霜艾葉野薄荷煎湯洗之或

紫蘇甘草煎湯洗之或用艾薰之其蛆自去禁用

雄黃礬石等藥

痘痂不脫久之必成癍陷用生蜜蘇合油二味調勻

敷痂沿處其痛立止其痂速脫

無蘇合油以線雞油代之

痘痂落後其面癍或赤或黑用四白滅癍散臨臥搽

之至曉洗去自然白瑩更不得早見風日經年不

滅如瘡癍凸者熱毒未盡也解毒防風湯外用

蜆子肉水塗之如瘡癍凹者脾胃虛也人參白朮

散加黃芪主之

四白滅癍散搽面點効用白芷白附子白姜蚕虻

屎白密陀僧等分爲末清蜜水調搽

滅癍散治癍黯或凸或凹者韶粉一兩輕粉一錢爲末

猪骨髓熬熟調敷

痘癰

痘癰發於收靨之後由毒氣畱藏於經絡虛處或關
節動處輕者止生結核腫癰甚者頭項胸背盡皆
流注難醫由實熱者用赤芍甘草節連翹桔梗之
類上引升麻葛根下引栝榔牛膝更助以貝母忍
冬瓜婁白芷寒熱加苓栢散瘀加蘇木紅花便閉
加大黃 氣血虛者身涼不渴慎用苦寒反傷中
氣兼服保元湯爲要外用馬齒莧杵汁豬脂石蜜
共熬成膏塗之或天麻子肉搗松香末爲膏貼之
膿者針之潰者煨海巴兒摻之乾用油調

射干粘子湯 治痘疹後癰疽瘡毒

鼠粘子 一二錢 射干

升麻

甘草 各五分

水一鍾煎六分服

痘風瘡

痘風瘡先則細瘡作痒次沿成片脂水浸淫由痘後
遇風所致宜麥餞散搽之兼避風戒口甚者搔痒
浸淫肌無完膚而成痘癩急用十全大補湯大補
氣血苦參丸清熱解毒二方合而服之外塗滅癩
救苦散

麥餞散 小麥一合炒枯黃色乘熱入鉢內和硫黃

四錢 白砒錢一 為末攪勻待冷加煙膠八錢 川椒三錢 枯礬

二錢 共末和勻先用葱湯洗淨麻油調搽油紙蓋扎

三日一換三次愈

苦參丸

苦參一兩 白蒺藜 胡麻 牛旁子各五錢

甘草二錢五分 為末酒糊為丸竹葉湯送下

滅癩救苦散

蜜陀僧 滑石各二兩 白芷五錢

右為末濕則乾摻乾用白蜜調敷

痘後疔蝕瘡 毒壅肌肉內透筋骨外連皮膚時痛

出血日久不瘥宜十全大補湯擦綿繭散

綿繭散

痘後便膿

熱毒入於大腸也宜四物湯加黃芩黃

連枳殼荆芥穗或黃連解毒湯加生地

右痘症自有專科因其形有外科之名又似屢
外科也採錄數條以備參考云爾

昇打靈藥固確封口法

固確法 近少陽城確以雙耳茶葉確代之將確烤

熟搗大蒜於確外遍擦之再烤再擦如式三四次

次以薑醋入確內盪之煮之以乾爲度次用黃土

二分煤灰一分雜以馬毛以鹽水和之固確一指厚爲則陰乾聽用

封罐口法

入藥畢蓋鐵盞用鐵絲判畢用石膏無

名異等分食鹽減半俱煨過爲極細末醋調成膏
次加炭火三二塊於盞內燒盞熱以筆蘸藥周圍
塗之隨乾隨塗以口平爲率 一用生石膏生白
礬食鹽三味等分爲末水調塗之如前

煉取諸藥法

煉玄明粉法

冬至後用潔淨朴硝十觔用水一斗

五升白蘿蔔五觔打碎同硝入鍋內煮化候湯滾

足撈去蘿蔔將竹絲箕以綿紙二層攤鋪箕內架
在新缸上將硝湯徐入箕內候折再添以湯濾盡
爲度將缸搭在天井露三日其硝結在缸邊傾去
餘水漉乾爲止將硝取下再用砂鍋頓炭鑪上將
硝一碗化開煎滾以銅匙鏟攪將成凝結時鏟入
小魚酢罐內上空寸許再下硝煉如此已畢每一
罐下用三丁品字樣釘入土地上畱寸半在外將
罐浮頓釘頭上用瓦片蓋口周圍用段磚砌百眼
鑪圍遶離罐寸半許將着炭安入鑪內四圍底火
頂火一槩相護候罐硝紅爲度次日取出硝來頂

用大綿紙攤在潔淨陰土地上將硝碾細用絹篩
篩在紙上一錢厚再不許多將門榻俱已關閉不
許與人見之二三日後其硝自然復活色白如粉輕
虛成片將鉢盛收紙蓋之上再用亂紙寸許以收
潮氣庶不凝結此品最能降火化痰清利臟腑怪
症服之可蠲狂燥用之卽愈搜除百病安欽心神
况此服之不傷元氣惟久病瀉痢者不宜大人每
服三四錢小兒五分至一錢皆可俱用白滾湯或
葱湯空心化服候行二三次隨飲稀粥自然爽健
精神調和臟腑津液頓生百病如失又煨過硝石

六兩加硃砂三錢青黛一錢水片一錢五研共碾
細末照前篩紙上再用紙蓋二層四邊以戒尺壓
緊勿令走氣候三日外取起密收又名陽春紫雪
最治失心忘志顛癲健忘小兒急驚大人異症每
服五分至一錢俱用淡竹葉燈心湯化服屢有奇
効不可盡述玄明粉乃神仙保命服食每一筋加
生熟甘草末一兩葱湯化服二三錢令人悅澤容
顏輕身耐老矣

取紅鉛法 女子十四歲而天癸至此陰中之真陽

氣血之元稟遇此將行時兩顙先若桃花之狀陽

此乃傍門
非王道之

品且穢惡
之甚切不可

可用

獻陰藏其經只在半月之裏必來預用白綿紬一尺五寸洗淨時常用綿帶一條束臍下綿紬兩尖頭前後繫帶上中間常兜陰器小便解一頭便罷卽繫之經至盡染紬上取初至紅鉛一顆大如魚眼紅色明亮如珠此爲接命至寶隨與好酒一杯和服一時後如醉不醒只以人乳飲之一日後自甦已後能絕房事者延壽一紀餘經換紬兜取陰乾浸上白童便內片時其經自然脫下取置磁盤內陰乾聽用如不昇煉者謂之空紅鉛亦可補益虛癆接續命脉如次經已後但未破身者俱可取

聚陰乾磁盞昇煉色如紫霜一般合入二元丹內
人乳服之接命長年却除百病此方神秘不宜輕
泄故不可傳但取紅鉛之女生平愛惜飽煖適時
無拘束爲上

煉金頂砒法 用鉛一觔小罐內炭火煨化投白砒
二兩於化洋鉛上煉煙盡爲度取起冷定打開金
頂砒結在鉛面上取下聽用

煉消石法 用潔淨朴硝半觔罐內炭火鎔化煎乾
煨紅住火冷定取出卽成硝石罐收聽用利實火
不利虛火也

取蟾酥法

用蟾不拘大小其酥俱有用潤銅鑷

蟾脣稜高肉上微緊拔出酥來凝聚鑷裏多則括

下陰乾聽用其取過之蟾避風二日仍送青草園

中自然不傷其生如取之便見風下水俱成破傷

風顛損而灰

取金汁法

用大毛竹一連二節用刀劈去外青一

半用傳扎節中沉入大糞池內一年後取起以長

流水浸一日取起鑽開節孔內蓄糞清磁確收貯

凡遇有中砒毒河魴傷寒陽毒發狂疔瘡痧症毒

氣入裏煩燥口乾渴欲飲水脉大有力者並宜

此藥

製附子法

大附子一兩之外方用隨數幾枚以童

便浸泔三寸每日換便浸至夏三冬五再換童便
煮盡二香爲度去皮臍線穿陰乾或日中曬硬亦
可收藏聽用

製寒食麩法

用白麩一觔外再以麩半觔調稠厚

捍成薄片二塊將前麩包合於中周圍捏緊合口
於清明正日蒸熟掛透風處陰乾用麩包藏勿經
女手越久越効

製炒諸藥法

前方諸藥未註炮炙如人食餚饌不用烹炮也是以

凡藥必尊雷公炮製入藥乃効今開於後

人參 潤色明亮堅實 為上輕麅不堪

天門冬 湯泡 去心 麥門冬 去心

生地黃 酒浸 熟地黃 酒蒸

白朮 米泔 浸炒 蒼朮 米泔 浸炒

黃芪 蜜水 拌炒 甘草 消毒生用 補托炙熟

酸棗仁 研炒

遠志 湯泡去 心微炒

五味子 炒 研

肉蓯蓉 去鱗 酒洗

牛膝 酒洗 破故紙 炒

當歸 酒洗

白芍 微炒 黃色

白蒺藜 去刺 玄參 去根

香附 童便 浸炒

柴胡 去蘆

黃芩 酒炒 黃連 解毒生用 止嘔薑汁拌炒

龍膽草 酒炒

知母 鹽水 拌炒 瓜蒌仁 去殼 去油 貝母 去心

陳皮 去白

桔梗 微炒 防風 去蘆

乾薑 炒 黑

附子 壘便 浸煮

半夏 薑汁水 煮 湯泡 去皮

草烏 湯泡 去皮 尖 巴戟 湯泡 去皮 心微焙

南星 煨有為末 入牛膽內者

葳靈仙 去根 仙茅 米泔浸 蒸去皮

三稜 湯泡 澤瀉 蒸

大黃 實人 生用 虛人 炙用

海藻 酒洗 昆布 酒洗 切絲

牡丹皮 去枯 王不留行 炒 碾

牛旁子 炒 連翹 去梗

金銀花 去梗 生用 炒用

地骨皮 去硬 肉桂 去麤皮

茯苓 去麤皮 枸杞子 去蒂

琥珀 布包 搥碎 燈心 同碾 研如麪 細

山梔 碾炒 黃栢 鹽水 拌炒

山茱萸 去核 杜仲 鹽水 拌炒 斷絲

桑皮 蜜水 炒 辛夷 去蒂

乳香 去油 沒藥 去油 為末

枳殼 麩皮 炒 厚朴 薑汁 製炒

巴豆 去油 為霜 皂莢 去皮 弦

五倍子 去殼 炒 蓮肉 皮去 心

山查

去核

桃仁

泡去皮尖

杏仁

泡去皮尖微炒

芒硝

湯煮提淨

石膏

煨碾末

雄黃

透紅明亮

硫黃

去脚

硃砂

淨明潔白

硼砂

白色透明

砒霜

白色明亮者有生濃兩用

自然銅

醋煨七次

黃丹

水飛炒紫

龍骨

生用煨用

牛黃

輕虛色黃

麝香

去毛皮

犀角

未鎊

羚羊角

未鎊

龍齒

煨存性

蜂蜜

煉去白沫

蟬脫

去土

斑蝥

用米炒去翅足

姜蠶

去絲微炒

全蝎

酒洗去毒

蜈蚣

炙去頭足

蚯蚓

翻去腹土

田螺

去殼曬乾

牡蠣

煨研

石決明

煨

珍珠

豆腐內煮數滾布包搥碎同燈心碾末

人中白

煨研

紅鉛

法註末卷

以上藥品凡本書內應用製炒泡炙者錄之不泡炙

者未錄

針灸人神宜忌歌訣

逐日人神歌

初一十一二十一。大拇鼻柱手小指。

初二十二二十二。外踝髮際外踝位。初三十三三

十三。股內牙齒足股肝。初四十四二十四。腰間胃

腕陽明手。初五十五二十五。口舌遍身陽明足。初

六十六二十六。手掌育前又在育。初七十七二十

七。內踝氣冲及在膝。初八十八二十八。手腕股內

併在陰。初九十九二十九。在尻在足膝脛後。初十

二十三三十日。腰背內踝足趺覓。此爲太古相傳針

灸莫犯爲吉

十二時人神歌

子踝丑腰寅在目

卯面辰頭巳手熟

午胷未腹申在心

酉背戌頭亥股續

十二支日人神所在歌

子不治頭君須認

丑日腰耳寅胸應

卯日鼻脾辰膝腰

巳手午心真捷徑

未頭手足申頭背

酉行膝背同其類

戌日在陰頭面間


亥日遊行頭頸位

十二支神禁灸歌

男除女破應該會

屍神歌訣

屍神圖



此神農所置一歲起坤
 二歲震逐年順飛九宮
 週而復始行年到處則
 所至敗切忌針灸慎勿
 犯之否則變生他病慎
 之

右九宮屍神歌

屍神所在有根由

坤內外踝聖人留

震宮牙牘分明記

巽位還居乳口頭

中宮肩骨連屍骨

面目還從乾上遊

手膊兌宮難砭灸

艮宮腰項也須休

離宮膝脇針難下

坎肘還連肚脚求

為醫精曉屍神訣

萬病無干禁忌憂

十干日不宜用針犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉

丙肩丁背與心求

戊巳腹脾庚腰肺

辛膝壬當腎脛收

癸日不宜針手足

水干不犯即無憂

五戒

一南方人每延醫至胗脉後止索一方構藥於市不擇藥之真偽炮製有無分兩顛倒且侍奉匪人煎烹失法服之稍有罔効則明日更醫如是者數致使病愈深醫亦惑然莫知其所所以悞呀此患者之過歟醫者之過歟

一北方人每延醫至止索藥一二劑務期刻時見効否則更醫朝秦暮楚孰不詳症有淺深効有遲速而可槩求速愈者乎吁此習俗之弊自取其悞也

惟智者而能辯之

一病家延醫非小可之比何則爲症之輕者救之以
苦難重者寄之以性命是以禮宜欽敬財宜厚施
所爲贖苦難而重性命也今則不然擅於諱疾忌
醫言不由中然本得其醫之力借言昨得某人之
奇藥祈某神之默佑而得保全嗟乎使其不得其
利更不獲其名是可忍耶孰不可忍耶

一醫爲仁術原謂活人何今之醫每於富者用心而
貧者忽之耶孰不究醫乃生死所寄責任匪輕希
勿以貧富而分厚薄惟體太上好生之德均施活

入之心則天神默鑒必嗣續繁昌

一今之爲醫自恃已長恒談彼短一至病家不問何疾卽毀前醫之悞治設使前醫盡是何復他求蓋爲一時權便或有所偏未能奏効豈可槩爲前醫之所悞耶且夫授受相傳原係一體願同志者毋分人我之心共藏仁風之道則天人欣羨必祿壽

綿昌