

增注類證活人書卷十七

五味子湯二十五治傷寒、喘促肺伏而厥

人參一分

五味子半兩

麥門冬去心一分

杏仁去皮尖一分

橘皮去白一分

右剉如麻豆大，生薑十片，棗子三枚，以水三大盞煎至一盞半，去滓分二服。

獐鼠糞湯二十六療傷寒病後，男子陰易方

荳根一大把

獐鼠糞十四枚

右二味以水二升煎取半升去滓再煎三沸，溫溫盡服，必有黏汗出爲效。未汗再作服亦可。理諸般勞

復鼠屎兩頭尖者是也

竹皮湯

二十七

療交接勞復卵腫腹中絞痛欲絕

刮竹青皮

一升

右一味以水三升煮一升半絞去滓分服立愈
續添乾薑湯

出百問方

療婦人得溫病雖差平復未

滿一百日不可與交合交合爲陰易之病病必拘急
手足拳皆死丈夫病以傷婦人名爲陽易速當療之
可差滿一百日不可療也宜令服此藥

乾薑

一分炮

右剉如麻豆大水二盞煎至六分溫服汗出得解

止手足伸遂愈

續添青竹茹湯出百問方婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胷手足拘急搐搦如中風狀方

栝樓根

無黃根者二兩

青竹茹

淡竹者刮半升

右以水二升半煮取一升二合去滓溫溫作二三

服喫立有效

續添當歸白朮湯

出百問方

婦人未平復因有所動

小腹急痛腰胯疼四肢不任舉身無熱發者

白朮

一分

當歸

一分

桂枝

一分去皮

附子

一枚破分八片去皮

生薑

半兩

甘草

一分炙

芍藥

一分

人參

一分

黃蓍

一分
蜜炙

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓通口
服一湯蓋食頃再服一湯蓋溫服微汗便差
知母麻黃湯二十八傷寒差後或十數日或半月二十
日終不惺惺常昏沈似失精神言語錯謬又無寒熱
醫或作鬼祟或作風疾多般治不差或朝夕潮熱頰
赤或有寒熱似瘧都是發汗不盡餘毒在心胞絡之
間所致

芍藥

知母

一兩

黃芩

各半

桂枝

去皮半兩

盛暑

可減作一分

甘草

去節

炙

右剉如麻豆大每服抄五錢以水一盞半煎八分去滓溫服半日可相次二三服溫服令微汗若心煩不眠欲飲水當稍稍與之令胃中和卽愈未汗須再服之

鱉甲散二十九 傷寒八九日不差名曰壞傷寒不能治者宜此療之

升麻

前胡

去蘆

烏梅

去核

枳實

炒

犀角

鎊

黃芩

各半

生地黃

切兩合

甘草

一分炙

鱉甲

去裙米醋炙赤黃杵碎用半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎八分右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎八分

分去滓溫服

人參順氣散三十治傷寒頭疼增寒壯熱四肢疼痛

麻黃

去節秤一兩半

乾葛

一兩

白术

一兩

甘草

炙半兩

桔梗

去蘆一兩

人參

一兩

白薑

炮半兩

香白芷

一兩

蒼术散

三十

治傷一二日頭疼發熱憎寒身體疼痛

麻黃

一兩過焙乾秤

蒼术

半兩米泔浸去皮切

石膏

一兩煅

桔梗

半兩

山茵陳

半兩去梗

甘草

半兩炙

右爲細末每服二錢水一盞煎至八分連服出汗

麻黃葛根湯

三十二

治傷寒一日至二日頭項及腰脊

拘急疼痛渾身煩熱惡寒

麻黃

用沸湯泡一二次焙乾秤

芍藥

各三兩

乾葛

四分

葱白

七莖

豉

一合

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎一中盞去滓溫服服了以厚衣蓋覆如人行四五里間再服良久如未得汗出更煮葱粥少許熱投之取汗

敗毒散

三十三

治傷風溫疫風濕頭目昏眩四肢痛憎

寒壯熱項強目睛疼尋常風眩拘倦風痰皆服神效

羌活洗去土

獨活去蘆

前胡去蘆

柴胡去苗

芎藭

枳殼

麸炒去穰

白茯苓去皮

桔梗

去蘆頭

人參

已上各一兩

甘草半兩炙

右件搗羅爲末每服三錢人生薑二片水一盞煎七分或沸湯點亦可老人小兒亦宜日三二服以知爲度瘴煙之地或溫疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也

獨活散三十四去蘆治傷風溫瘴等疾

羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

人參

細辛

去灰土
陰者佳

白茯苓

去皮

枳殼

去心
通黃
炒
炒
泡三
用

防風

去蘆

甘草

細剉
炒赤

黃芩

細堅者
水飛過

麻黃

沸湯泡三
次焙乾秤

右十三味搗羅爲末每服三錢水一盞生薑三片
薄荷四五葉同煎至七分去滓微熱呷如年高者
以川芎代黃芩

桂枝石膏湯三十五治傷寒三日外與諸湯不差脉勢
仍數邪氣猶在經絡未入臟腑者桂枝石膏湯此方
可夏至後代桂枝證用若加麻黃去節半兩可代麻

黃青龍湯用之也有汗脈緩爲桂枝證無汗脈緊爲
麻黃青龍證

桂枝

半兩去皮

石膏

二兩碎

黃芩

半兩

甘草

半兩

梔子

四枚小者可用八枚

白藥子

升麻

三分

乾葛

三分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片水一盞半煎取八分去滓食頃再服若得汗卽停後服
梔子升麻湯三十六治晚發傷寒三月至夏爲晚發

梔子

十枚切碎

升麻

一兩半

生地黃

半斤切碎用

柴胡

去蘆

石膏

各二兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓頻服病不解更作若頭面赤去石膏用乾葛二兩無地黃用豉代之

橘皮湯三十七治傷暑痰逆惡寒

甘草

半兩

人參

一分

陳橘皮

去白二兩

右爲粗末每服五錢用青新季竹輕輕刮上面青茹一團薑四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓熱服如不惡寒卽宜竹葉湯

解肌湯三十八治傷寒溫病天行頭痛壯熱

葛根

一兩

黃芩

半兩

芍藥

半兩

甘草一分

桂心一分

麻黃三分去節湯泡

一二沸焙乾用

右六味剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半棗子一枚煮取八分去滓日三服三四日不解脉浮者宜重服發汗脉沈實者宜下之

小柴胡加桂湯三十九治癰疾先寒後熱兼治支結

柴胡八兩

人參

甘草炙

半夏

湯浸七次切

黃芩

桂去皮已上各三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑七片棗二枚煎至八分去滓取六分清汁溫服日三夜二若渴者去半夏加入參桔梗根同煎服之

白虎加桂湯四十治瘧疾但熱不寒者

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

一斤

粳米

二合

桂

去皮秤三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎八分去滓
服

柴胡桂薑湯

四十一

治寒多微有熱或但寒不熱亦治

勞瘧之證

柴胡

四兩

黃芩

一兩

桂枝

一兩半

桔梗根

二兩

牡蠣

杵碎

甘草

炙

乾薑

各二兩

右七味剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半煎至

一盞去滓溫服初服微煩汗出愈

瘧母前

四十二

治久瘧不愈結爲癥瘕寒熱

鱗甲

十二分炙

黃芩

三分

烏扇

三分燒存性用

柴胡

去苗六兩

鼠婦

三分炒

乾薑

三分泡三分

大黃

三分

芍藥

五分

肉桂

三分去皮

葶苈

二分炒

石葦

二分去毛

紫葳

三分

人參

一分

厚樸

三分炙

牡丹皮

五分

瞿麥

一分

蟲蟲

五分炒

阿膠

炒六分

蜂窠

各四分炒

林硝

十二分

蟻蟬

六分炙

半夏

湯洗一分

桃仁

皮尖二分去

右搗羅爲末鋟竈下灰一斗清酒一斗五升浸灰
候酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取
汁內諸藥煎爲丸如梧桐子大空心服七丸日三
服有一方無鼠婦朴硝加海藻三分大戟一分

祛邪丸

四十三

治瘧疾脉浮大寒熱往來用此吐之衛

州書云瘧寒多熱少者痰多也然寒多熱少而脉浮
則痰無疑矣可吐之也若脉遲微者惡寒瘧耳宜用

柴胡桂薑湯

恒山

甘草

炙

大黃

知母

各二兩

麻黃

四兩去節湯泡一
沸焙乾秤用

右搗羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五丸
面向東清淨水吞下

猪膽雞子湯

四十四兩

治傷寒五六日斑出者

猪膽二合

雞子一枚

苦酒

三合

右三味和合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服
汗出卽差

萎蕤湯

四十五兩

治風濕兼療冬溫及春月中風癩寒發

熱頭眩痛喉咽乾舌強脣內疼痞滿腰背強

萎蕤

三分

石膏

一兩
杵碎

白薇

半兩

麻黃半兩湯泡

川芎半兩

葛根半兩生者可用二兩尤佳

大羌活

去蘆半兩

甘草兩炙半兩

杏仁者搗碎半兩

青木香

春用半兩炒一分冬一兩始

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四服

知母乾葛湯

四十六治風濕身體灼熱甚者

知母三錢

乾葛八錢

石膏六錢

甘草二錢

炙

黃芩二錢

木香二錢

升麻二錢

炙

萎蕤五錢

天南星二錢生

人參二錢

炙

防風二錢

麻黃去節四錢

湯泡焙秤

杏仁

二錢
炒

川芎

二錢

羌活

二錢

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至一盞去滓服未知再服之

栝樓根湯

四十七

治風溫加渴甚者

栝樓根

三分

石膏

二兩

人參

半兩

防風

半兩

甘草

半兩

葛根

一兩半生用乾者只三錢

右剉如麻豆大每服抄五錢七用水一盞半煎至

一中盞去滓溫服

漢防已湯

四十八

治風溫脉浮身重汗出者

漢防已

四兩

甘草

二兩

黃蓍二兩
炙用

白术三兩

右剉如麻豆大每服五錢匕生薑四片大棗一枚水一盞半煎取一中盞去滓飲訖仍坐被中汗出如蟲行或被卧取其汗

老君神明散

四十九

白术

二兩

桂梗

一兩

附子

二兩炮去
黑皮用

烏頭

四兩炮
去皮臍

真華陰細辛

一兩

右五味搗粗篩縫絹囊盛帶之居閭里皆無病若有疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗得吐卽差若經三四日抄三寸匕以水二碗煮令大沸分三服

務成子螢火丸五十主辟疾疫惡氣百鬼虎狼蛇虺
蜂蠻諸毒五兵白刃盜賊凶害皆辟之

螢火

鬼箭

削取皮羽

蒺藜

各一兩

雄黃

雌黃

礬石

各二兩
燒汁益

羖羊角

鋸竈灰

鐵錘柄

入鐵處燒焦各一兩半

右九味搗篩爲散以雞子黃并丹雄雞冠一具和
之如杏仁大作三角絹囊盛五丸帶左臂仍更掛

戶上

續添

聖散子方

此藥性溫若陽證有熱不可輕服之

聖散子蘇內翰云昔嘗覽千金三建散方於病無所

不治而孫思邈特爲著論以謂此方用藥節度不近人情至於救急其驗特異乃知神物效靈不拘常制至理開感智不能知今予所謂聖散子者殆此類也自古論病惟傷寒爲至危急表裡虛實日數證候應汗下之類差之毫釐輒至不救若時毒流行用聖散子者一切不問陰陽之感連服取差不可與傷寒比也若疾疫之行平旦輒煮一金不問老幼良賤各一大盞卽時不入其間平居無病能空腹一服則飲食快美百病不生濟世衛家之寶也其方不知其所從出而故人巢君世寶之以治溫疫百不失一子旣得

之謫居黃州連年大疫所全活者不可勝數巢君初
甚惜此方指江水爲盟約不傳人余切隘之以傳
蕲道人龐安常龐以醫聞於世又善著書故以授之
且使巢君之名與此方聞不朽東坡居士序

草豆蔻

十枚去皮
麵裹炮

木猪苓

去皮

石菖蒲

茯苓

高良薑

獨活

去蘆頭

附子

炮去皮臍

麻黃

去根節

厚樸

去皮薑汁炙

藁本

去土沙

芍藥

枳殼

去穰炒

柴胡

去頭蘆

澤瀉

細辛

華陰者

防風

去頭蘆

白术

藿香

半夏

薑製各半兩

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取八分去
滓熱服餘滓兩服合爲一服重煎空心服之

調中湯

五十

治夏月初秋忽有暴寒折於盛熱熱結

於四肢則壯熱頭痛寒傷於胃則下利或血或水或
赤壯熱迷悶脈數宜下之

大黃

去皮三分

葛根

黃芩

芍藥

去蘆三分

桔梗

去蘆

藁本

真者無則以芍代之

茯苓

去皮三分

白术

甘草

炙已上各半兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煮取一中盞

移時再服之得快利壯熱便歇小兒輩減與服之
凡秋夏旱熱積日或有暴寒折之熱無可散喜搏
着肌中作壯熱氣也胃爲六腑之表最易爲暴寒
傷之而下也虛冷人亦不壯熱但下利或霍亂也
不宜服此少實人可服五石人喜壯熱適與藥斷
下則加熱喜悶而死矣亦不止便作痺熱毒壯熱
甚不歇則劇是以宜調中湯下和其胃氣也調中
湯去大黃卽治風溫證兼治陽病因下遂協熱利
不止及傷寒不因下自利表不解而脉浮數者皆
可去大黃煎之殊驗也

射干湯五十二治初秋夏月暴雨冷及天行暴寒其熱喜伏於內欬嗽曲折不可得氣息喉啞失聲乾嗽無唾喉中如哽

射干二兩

半夏五兩

杏仁三兩去皮

生薑四兩

甘草二兩

炙尖雙仁炒

肉桂二兩

枳實二兩

當歸二兩

橘皮二兩

獨活二兩

麻黃二兩去節

湯泡焙秤

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

半夏桂枝甘草湯五十三治伏氣之病謂非時有暴寒

中人伏氣於少陰經始不覺病旬月乃發脈便微弱
法先咽痛似傷寒非咽痺之病次必下利始用半夏
桂枝甘草湯主之次四逆散主之此病只二日便差
古方謂之腎傷寒也

甘草

炙

半夏

湯洗

桂心

右等分剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至
七分放冷少少含細嚥之八生薑四片煎服

麻黃杏子薏苡甘草湯

五十四

病人一身盡疼發熱日

晡所劇者名風濕此病因傷於汗出當風或久傷取
冷所致之也

麻黃去節秤湯
泡二分

甘草一分炙

薏苡仁半兩

杏仁十枚去皮尖炒

右剉如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至八分
去滓有微汗溫服避風

防已黃蓍湯

五十五治風濕脉浮身重汗出惡風

防已一兩

甘草

半兩炙

白术

三分

黃蓍

一兩一分去蘆

右剉如麻豆大每服抄五錢匕生薑四片大棗一
枚水一盞半煎至八分去滓溫服良久再服喘者
加麻黃半兩胃中不和者加芍藥三分氣上衝者

加桂枝三分下有陳寒者加細辛三分服後當如
蟲行皮中從腰下如冰後坐被上又以一被繞腰
以下溫令微汗差

杏仁湯五十六療風濕身體疼痛惡風微腫

桂心

二兩

麻黃

一兩去節湯泡焙秤用

芍藥

二兩

天門冬

一兩去心皮尖雙仁炒

右剉如麻豆大每服五錢匕生薑四片水一盞半
煎至八分去滓溫服

小續命湯

五十七

治中風及脚氣痺弱不能轉側者又

兼治小兒慢驚風

附子生削去皮
臍五錢 防風 一兩半

芍藥

白术

人參

川芎

麻黃

去節湯泡
三次焙乾 防已

黃芩

桂枝

甘草

各一兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓取八分清汁入生薑汁再煎一二沸溫服日三夜二若柔痓自汗者去麻黃夏間及病有熱者減桂枝一半冬及始春去黃芩

附木散五十八 傷寒手足逆冷筋脉拘急汗出不止項

強直搖頭口噤

附子一兩

炮

白朮一兩

川芎三錢

獨活半兩

桂心二錢

右搗羅爲末每服三錢水一中盞棗子二枚同煎

至五分溫服

桂心白朮湯

五十九

治傷寒、陰瘻手足厥冷筋脈拘急

汗出不止者

白朮

桂心

附子

炮去皮臍

防風

去蘆頭

芎藭

甘草

炙微赤各一兩

五錢

右剉如麻豆大以水二盞藥五錢生薑四片棗三枚同煎至八分去滓溫服

附子防風散六十治傷寒陰瘻閉目合面手足厥逆
筋脉拘急汗出不止者

白术

一兩

白茯苓

三分

柴胡

一兩半

五味子

二兩

乾薑

三分炮裂切

甘草

三分炙微赤切

附子

三分炮裂去皮臍

桂心

半兩

防風

三分去蘆頭

右件藥搗篩粗散每服三錢以水一盞入生薑四
片煎至六分去滓不計時候溫服

八物白术散

六十

治傷寒陰瘻三日不差手足厥冷

筋脉拘急汗不出恐陰氣內傷

白术

半兩

白茯苓

半兩

麻黃

半兩去節

泡三沸焙

五味子

半兩

桂心

三分

高良薑

一分

羌活

半兩

附子

三分炮
去皮臍裂

右件藥搗篩粗散每服四錢以水一大盞入生薑四片煎至五分去滓不計時候溫服

柴胡半夏湯

六十二治痰熱頭疼利膈除煩悶手足煩熱榮衛不調肢節拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五飲消痰癖

柴胡

八兩

人參

三兩

半夏

二兩
半洗

甘草

三兩
炙

黃芩

三兩

白朮

二兩
半洗

麥門冬

三兩
去心

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半生薑五片棗子一枚煎至八分去滓溫服

金沸草散六十三治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風但不頭痛爲異耳

前胡

三兩

荆芥

四兩

半夏

一兩淨洗
薑汁浸

赤芍藥

二兩

細辛

一兩

甘草

一兩炙

旋復花

三兩

右件搗羅爲末每服二錢水一盞生薑五片棗子一枚同煎至六分去滓熱服未知再服

增注類證活人書卷十七終

增注類證活人書卷十八

大半夏湯

空心

治痰飲及脾胃不和

半夏不拘多少如法湯洗了薄切乾焙每遇膈間
有寒痰用半夏白茯苓生薑各一分細切水二盞
半煎至一盞瀝去滓臨睡溫呷如有熱痰加炙甘
草一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎
越婢湯六十五 治風痺脚弱

石膏

四兩

附子

一兩炮去皮臍

白朮

二兩

甘草

一兩炙微赤

麻黃

二兩泡焙去節

右件剉如麻豆大每服四錢以水一盞半生薑三

片棗子一枚煎至八分去滓服

脾約丸

六十六

治老人津液少大便澀及腳氣有風大

便結燥者

大黃

二兩酒浸焙乾

厚樸

刮去皮用薑汁炙

枳殼

炒去穰

白芍藥

已上各半兩

麻子仁

一兩半微炒

杏仁

去皮尖炒三分

右爲細末煉蜜和杵干下丸如梧桐子大每服二十太溫水下不拘時候未知加五丸十九丸止下利

服糜粥將理

治溫疫時氣有積食者

六十七

巴豆

新好者一兩輕搗去皮以急流水約二碗浸一宿然後更煮三五十沸後冷濾出去

心膜以帛子拭去水然後研如膏
用厚紙十數重裏以重物捍去油

五靈脂

二分黑色者爲上

杏仁

半兩燒過後研入藥再研

大戟

半兩生用去皮裏面如粉白者爲妙

荆三稜

半兩生用

豆豉

二兩須要新軟者爲妙不得令曬乾與巴豆膏同研勻細

右三味爲極細末方始入巴豆豆豉研勻後入杏仁更研令勻細別入飛羅麵半匙以井花水調如糊漸次拌藥搜和得所入臼中搗三千下丸如菉豆大曬乾入甕合內頻曬或微火焙亦得如遇傷寒有食積者脉沈結身體不熱飄下之量患人臟腑虛實加減丸數服用煎薑棗湯吞下取微利

爲度不可太過溏泄身熱下之則爲痞氣結胷若病在上可吐者同生薑乾嚼三五丸

神功丸

六十八

治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便

不通津液內枯大腸乾澀裡急後重或下鮮血痰唾稠黏風氣下流腰疼脚重臍下脹痛溺赤如金

大黃

三兩

人參

半兩

麻子仁

五兩另研

訶子皮

炮取二兩

右杵研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服二十丸溫水下日三服以通爲度產後大便秘者每服

十丸米飲下

五柔丸

六十九

治老人虛人腳氣亡津液虛秘大便結

調補三焦

大黃

四兩

前胡

一兩

半夏

洗七次

蕶蓉

酒浸

芍藥

蒺藜

去皮

細辛

當歸

葶藶

炒各半兩

右搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大溫水下二十九丸以通利爲度

大三院散

七十

治三焦氣逆脅膈虛痞兩脇氣痛面

手浮腫大便秘澁兼治脚氣

獨活

一兩

白术

三分

甘草

三分

微炙

乾木瓜切焙乾秤一兩

大腹皮一兩炙

黃用

陳橘皮三分

沈香一兩

木香三分

川芎三分

枳榔三分

右十一味同一處杵爲粗散每劑秤一兩水二盞同煎至一盞去滓分二服帶溫服取便利爲效如能臨晚常進半劑依法煎服卽腹臟調和風氣人多秘滯數宜服之未通利者依法煎服此藥極不虛人氣經驗多矣脚氣心腹氣悶大便秘滯者良

枳榔散七十二治脚腫

橘葉一大握

沙木一握

小便一小盞

酒半蓋同已
上藥煎

右煎數沸調柂榔末二錢食後服

薏苡仁酒法

七十二

治腳痺

薏苡仁

牛膝

各二兩

海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲

薑汁炙上各一兩

白术

半兩

枳殼

炒一兩

生乾地黃

二半兩

右剉爲籠末以生絹袋內無灰酒五升浸春夏秋冬二七日夏月盛熱分作數劑逐旋浸酒每日空心溫服一蓋或半蓋日三四服常令酒氣醺醺不

絕久服覺皮膚下如數百條蟲行卽風濕氣也

木瓜散

七十三

治腳氣

大腹皮一枚

紫蘇一分

乾木瓜一分

甘草

炙一分

木香一分

羌活一分

右細剉爲散分作三服每服用白水一盞煎至半
盞去滓通口服

葱豉湯

七十四

治傷寒一二日頭項腰背痛惡寒脉緊無汗者此湯主之

豆豉

二合大

葱白十五莖

麻黃

四分去節

乾葛八分

右件以水二升先煎麻黃六七沸掠去白沫乾葛
煎二十餘沸下豉煎取八大合去滓分二次溫服
如人行五六里服訖良久煮葱豉湯熱喫卽取汗
連鬚葱白湯七十五治傷寒已發汗或未汗頭疼如破

生薑

二兩

連鬚葱白

寸切半升

右以水二升煮一升去滓分作二三服服此湯不

差者服葛根葱白湯

葛根葱白湯

七十六

治頭疼不止

葛根

芍藥

知母

各半兩

葱白

一把

川芎

一兩

生薑

一兩

右剉如麻豆大水三升煎一升半去滓每服一湯

蓋

雄鼠屎湯

七十七

治勞復

梔子

十四枝劈

枳殼

三枚炒

雄鼠屎

二十七枚卽兩頭尖

右爲粗末每服四錢水一盞半八葱白二寸香豉三十粒同煎一盞分作二服勿令病人知鼠屎

黃芩芍藥湯

七十八

治鼻衄

黃芩

三分

芍藥

甘草

炙各半兩

右爲粗末每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

酒蒸黃連丸

十九

治暑毒伏深累取不差無藥可治

伏暑發渴者此方尤妙

黃連

四兩以無灰好酒浸面上約一寸以重湯熬乾

右搗羅爲細末糊爲丸如梧桐子大滾水下三五十丸暑膈涼不渴爲驗

茅花湯

八十治鼻衄不止

茅花一大把水三盞煎濃汁一盞分作二服卽差如無花以根代之

枳實理中丸

八十一

治傷寒結脅欲絕心膈高起手不得近者宜此治之

茯苓

二兩

人參

二兩

枳實

十六片
麸炒

白术

二兩

乾薑

二兩
炮

甘草

二兩
炒

右搗羅爲細末煉蜜爲丸如雞子黃大每服一丸
熱湯化下連進二三服胷中豁然渴者加栝樓根
二兩下利者加牡蠣二兩煅之

小半夏加茯苓湯

八十二

治諸嘔噦心下堅痞膈間有

水痰眩悸者

半夏

五兩
湯浸
洗七遍

白茯苓

三兩
去皮

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞秤生
薑四錢取自然汁投藥中更煎兩沸熱服不拘時

桔梗枳殼湯

八十三

治傷寒痞氣胷滿欲絕

桔梗

枳殼

麸炒去穰各一兩

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓分二服
赤茯苓湯八十四治傷寒嘔噦心下滿胃膈間宿有停
水頭眩心悸

赤茯苓

一兩

菖蒲

半兩

半夏

半兩湯洗七遍去滑

人參

一兩去蘆頭

白术

半兩

陳橘皮

一兩湯浸去白穰焙

右件藥搗羅爲粗末每服四錢水一盞半生薑五
片煎至七分去渣溫服不拘時候

香薷散

八十五

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲霍亂此皆由飽食腥膾復啖乳酪海陸百品無所不

數詞 河書 十一
餐多飲寒漿眠卧冷席風冷之氣傷於脾胃諸食結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利不已百脉昏亂榮衛俱虛令搏於筋令轉筋宜服此方

厚樸去皮二兩

香薷穗一兩半

黃連

二兩二味入生薑四兩同杵炒令紫色用

一方有白扁豆尤良

右搗爲粗末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則效速也仍煎服時不得犯鐵器慢火煎之兼治非時吐利霍亂腹中撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷

汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須井中沈令極
冷頓服之乃有神效

犀角地黃湯八十六治傷寒及溫病應發汗而不發汗
內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血
兼治瘡疹出得太盛以此解之

芍藥

三分

生地黃

半斤

牡丹皮

去心一兩

犀角

一兩屑如無以升麻代之

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取一盞
有熱如狂者加黃芩二兩其人脉大來遲腹不滿
自言滿者爲無熱更不用黃芩也

黃連解毒湯

八十七

治時疾三日已汗解或因飲酒復

劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧

黃連

三分

黃蘖

半兩

黃芩

一兩

梔子

四枚
擘

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎取一湯盞去滓服未知再服進粥以此漸差外臺云凡大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠皆傳此方諸人用之亦效此直解熱毒除酷熱不必飲酒劇者

酸棗湯

八十八

治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠

酸棗仁

四升

甘草

一兩

知母

二兩

茯苓

三兩
去皮

川芎

三兩

乾薑

三兩

麥門冬

一升
去心

右爲粗末每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

梔子烏梅湯

八十九
治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

梔子

半兩

黃芩

半兩

甘草

半兩
炙
微赤

柴胡

一兩

烏梅肉

十四枚
微炒用

右爲粗末每服四錢水一盞半生薑三片竹葉十

四片豉五十粒煎至七分去滓溫服

橘皮乾薑湯

九十
治噦

橘皮

通草

乾薑

炮

桂心

各二兩

人參

一兩

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓

溫服日進三服

羌活附子散

九十一治欬逆

羌活

附子

炮

茴香

微炒各半兩

木香

乾薑

炮各大許大

右爲細末每服二錢水一盞鹽一捻同煎一二十分沸帶熱服一服卽止

半夏生薑湯

九十二

治嘔欲死

生薑

二兩切

半夏

洗一分一兩

右以水二盞煎至八分去粗分二服

黑膏九十三療溫毒發斑

好豉一升

生地黃半斤切

右二味以猪膏二觔合露之前令三分減一絞去滓用雄黃射香如大豆者內中攪和盡服之毒便從皮中出則愈忌薰蒸

葛根橘皮湯九十四

療冬溫未卽病至春被積寒所折

不得發至夏得熱其寒解冬溫始發肌中斑爛癰疹如錦紋而欬心悶但嘔吐青汁服此湯卽靜

葛根

橘皮

杏仁

去皮尖
研炒

知母

黃芩

麻黃

去節
湯泡

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大每服五錢以水一大盞半煎至一

中蓋去滓溫服

玄參升麻湯

九十五

治傷寒發汗吐下後毒氣不散表

虛裏實熱發於外故身班如錦紋甚則煩躁譫語兼治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢以水一盞半煎至七分去滓服

大青四物湯九十六 治傷寒熱病十日已上發汙及吐利後熱不除身上斑出者

大青

四兩

豆豉

八合

阿膠

一兩炙

甘草

一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至一盞旋入膠再煎令烊

知母桂心湯

九十七

治傷寒後不差朝夕有熱如瘧狀

知母

一兩

麻黃

一兩去節

甘草

一兩炙

芍藥

一兩

黃芩

一兩

桂心

一兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑四片煎

一盞去滓取八分清汁溫熱服日三溫覆令微汗
若心煩不眠其人欲飲水當稍與之令胃中和則
愈

三黃丸九十八治吐血黃疸

黃連

三兩

大黃

一兩

黃芩

二兩

右搗羅爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服十五
丸滾白湯送下

桔梗半夏湯九十九治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發
疼痛順陰陽消痞滿

桔梗

一兩微炒細切

半夏

一兩薑汁製

枳實

牛爾燒
炒赤用

陳橘皮

湯浸去穰焙乾
已上各一兩

爲末每服四錢水一鍾薑三片煎七分去滓熱服
三黃熟艾湯一百治傷寒四五日而大下熱利時作
白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩

黃連

黃蘖

三分

熟艾

半雞子大

右剉如麻豆大以水二大盞煎至七分去滓溫服
薤白湯一百一傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛
諸熱毒悉皆治之

豉

牛筋
綿裹

薤白

一把

梔子

七枚大者
破之

右剉如麻豆大以水二升半先煎梔子十沸下薤
白煎至二升許下豉煎取一升二合去滓每服一
湯盞

赤石脂丸一百二十傷寒熱利

黃連

當歸

各二兩

赤石脂

乾薑

炮各一兩

右搗羅爲末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十九
米飲吞下日三服進之

地榆散二百三治傷寒熱毒不解日晚卽壯熱腹痛便

痢膿血並宜治之

地榆 一兩切

犀角屑 一兩

黃連 一兩去須微炒

茜根 一兩

黃芩 一兩

梔子仁 半兩

右件藥搗爲粗末每服四錢以水一盞入薤白五寸煎至六分去滓不計時候溫服

黃連阿膠湯

一百四

治傷寒熱毒入胃下利膿血

梔子仁 半兩

黃蘖 一兩炙切

黃連

二兩去鬚微炒

阿膠 一兩切碎炒令黃

右件藥搗爲粗末每服四錢用水一盞煎至七分去滓不拘時候溫服

桃仁湯

一百五

治瘻蟲食病

槐子

碎一兩

艾葉

一兩

大棗

十五枚去核

桃仁

一兩去皮尖雙仁炒

右以水二大盞半煎至一盞半分三服

黃連犀角湯

一百六

治傷寒及諸病之後內有癰出下

部者

黃連

半兩

烏梅

七箇

木香

一分

犀角

一兩如無以升麻代用之

右以水二大盞半煎至一盞半分三服

雄黃銳散

一百七

治下部癩瘡

雄黃

研

青相子

苦參

黃連

桃仁

去皮尖研一分

右爲散以生艾搗汁和如棗子核大綿裹內下部
扁竹汁更佳冬間無艾只用散綿裹內下部亦得
百合知母湯一百八治百合病發汗後者

百合

七枚

知母

三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母
每取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯一百九治百合病下之後者

百合

七枚

滑石

三分碎
綿裏

代赭

如彈丸大
一枚綿裏

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石
代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫
服

雞子湯

一百十

治百合病吐之後

百合

七枚
擘

雞子黃

十枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎一升去滓內雞子黃攪勻煎五分溫
服

百合洗方

一百十一

治百合病一月不解變成渴者

右以百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已
食煮餅勿以鹽豉也

百合地黃湯一百十二治百合病不經吐下發汗病形如
初

百合

七枚
劈

生地黃

汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉
水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合
分溫再服中病勿更服大便當如漆

栝樓牡礪散

一百十三

治百合病渴不差

栝樓根

牡礪熬等分

右搗羅爲散飲服方寸匕日進三服

滑石散

一百十四

治百合病變發寒熱

百合

一兩炙

滑石

三兩

右杵羅爲散飲服方寸匕日進三服當微利者止勿服之寒熱則除

治中湯

一百十五

治脾胃傷冷物晉膈不快腹疼氣不和

人參

乾薑

炮

白朮

甘草

炙

陳橘皮

湯洗

青橘皮

右各等分爲細末每服三錢水一中盞煎數沸熱服尋常八鹽點之

陽旦湯

一百十六

治中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風

項強鼻鳴乾嘔

桂心

芍藥

已上各三兩

甘草

黃芩

各二兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半棗子一枚生薑三片煎至一盞取八分清汁溫服自汗者去桂心加附子一枚炮渴者去桂心加栝樓三兩利者去芍藥桂加乾薑三兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裡急者正陽旦湯主之前時入膠餡爲佳若脉浮緊無汗發熱者不可與也

白虎加蒼朮湯

一百十七

治濕溫多汗

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

一觔

蒼朮

三兩

粳米

三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八九分

去滓取六分清汁溫服

七味葱白湯

一百十八

許仁則治傷寒或因起動勞復或

因喫食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒初有此證宜服此湯

乾葛

切三合

新豉

半合綿裏

葱白

連鬚者切半升

生薑

切一合

麥門冬

去心

乾地黃

三兩

勞水

四升以杓洋之
千過名曰勞水

右七味用勞水煎之三分減去滓分二服漸漸服
取汗

增損四順湯

一百十九

治少陰下利手足冷無熱候者

甘草

二兩炙

人參

二兩

龍骨

二兩

黃連

乾薑

一兩炙

附子

一枚炮去皮臍

爲細末每服三錢水一盞煎至七分日三服不差
復作甚良若下利腹痛加當歸二兩嘔者加橘皮

一兩

化班湯

一百二十

人參

牛兩

石膏

半兩

萎蕤

知母

甘草

各一
分

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半八糯米
一合煎至八分取米熟爲度去滓溫服

官局桔梗湯

一百二十

治乾嘔

桔梗

半夏

陳橘皮

各一
兩

枳實

半兩

爲粗末每服三錢水一盞生薑五片煎七分服之

麻黃加术湯

一百三十二

治中濕

麻黃

一兩半去
節湯泡

甘草

半兩
炙

桂枝

一兩
去皮

蒼朮

半兩

杏仁

三十五枚
去皮尖

右剉麻豆大每服五錢水一盞半煎八分溫服

竹皮大丸

百三

治虛煩

生竹茹

二分

石膏

三分

桂心

一分

甘草

三分炙

白薇

一分

右爲細末棗肉丸彈子大米飲服一丸日三夜一

有熱者倍白薇煩喘者加枳實一分

古今錄驗橘皮湯

百十四

療春冬傷寒、秋夏冷濕欬嗽

喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

陳橘皮

紫苑

麻黃

湯去節

杏仁去皮

當歸

桂心

甘草炙

黃芩各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓服

黃連橘皮湯

一百十五治溫毒發班

黃連四兩去毛

陳橘皮

去白

杏仁去皮尖

枳實

炙

麻黃去節湯泡

葛根各二兩

厚樸

薑汁製

甘草

各一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢匕用水一小盞半煎

至一盞去滓服下利當先止

麥門冬湯

一百三十六

治勞氣欲絕

麥門冬

一兩
去心

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大先用水二小盞入梗米半合煎令
米熟去米約得水一小盞半入藥五錢棗二枚竹
葉十五片同煎至一盞去滓溫服不能服者綿滴
口中

增注類證活人書卷十八終

增注類證活人書卷十九

此一卷論婦人傷寒古人治病先論其所主男子
調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血室
凝結水火相刑傷寒氣口緊盛卽宜下人迎緊盛
卽宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救其
血室榮衛得和津液自通浹然汗出而解仲景云
婦人傷寒經水適斷晝曰明了暮則譏語如見鬼
狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣
者言不可下也小柴胡湯主之若行湯遲則熱入
胃冷津燥中焦上焦不榮成血結脅狀須當針期

門也五行相尅以生相扶以出平居之日水常養

於木水木相生則榮養血室血室不畜脾無蘊積

脾無蘊積則剛燥不生剛燥旣生若犯胃氣則晝

夜讞語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯證也

傷寒實胃

譖語宜下之婦人熱入血室譖語者不可下耳雖然婦人傷寒與男子治

法不同男子先調氣婦人先調血此大略之詞耳

要之脉緊無汗名傷寒脉緩有汗爲傷風熱病脉

洪大中暑脉細弱其證一也假如中暎用白虎胃

實用承氣豈必調血而後行湯耶仲景傷寒論所

以不分婦人良亦以此學者皆可隨病於男子藥

證中以意選用也

若姪婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡

去半夏名黃龍湯蓋爲姪婦而去也大抵產前先

安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥

不可盡劑此爲大法黃帝問婦人重身毒之何如

岐伯曰有故無殞亦無殞也大積大聚其可犯也

衰其大半而止過者死

婦人傷寒藥方

男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和爲之序以法考之間有可取疑非古方也特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列爲一卷雖不足以盡婦人傷寒之

詳並可於百問中參用也

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譏語如見
鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴

胡湯

方見第十卷中

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此
爲熱入血室其血必結故使如瘧狀宜以小柴胡湯
服之

方見第十卷中

婦人傷寒發熱惡寒經水適來得七八日熱除脉遲
身涼和胷脇下滿如結胷狀譏語者此爲熱入血室
也當刺期門隨其實而取之

期門穴見第二卷中

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譏語目赤毒氣閉塞不得流通宜瀉心三黃湯

蜀大黃

鼠尾黃芩

雞爪黃連

各等分

右搗爲粗末每服四錢水一盞煎八分去滓服取微利如目赤睛疼加白茯苓嫩竹葉瀉肝餘之氣婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不得往來宜桂枝紅花湯

桂心

芍藥

甘草

炙各三兩

紅花

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半生薑

四片棗二枚煎至七分去渣服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯治婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩

白芍藥

白术

乾地黃各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑同前服

柴胡當歸湯婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下

柴胡三兩

白术二兩

人參

甘草 炙

當歸

赤芍藥 各一
兩

五味子

木通

各半
兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半生薑四片棗子二枚煎至七分去滓溫服

乾地黃湯婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺熱
乾地黃 大黃 黃連

黃芩

各一
兩

柴胡

去蘆

白芍藥

甘草

各一
兩

右搗爲粗末每服抄四錢匕以水一盞半煎至七分去滓溫服取溏利汗出解

燒裯散婦人傷寒未平復因交合裏急腰胯連腹內
痛名曰陰陽易

男子裯禍燒灰

右一味以水和服方寸匕男子用婦人裯燒灰小
便利陰頭腫卽愈

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣上衝脅
手足拘急搐搦如中風狀

栝樓根

無黃根者二兩

青竹茹

刮半升淡竹者

右以水二升半煎取一升一合去滓作二三次

服

當歸白朮湯婦人未平復因有所動小腹急痛腰胯
疼四肢不任舉動無力熱發者

白朮 一分 當歸 一分 桂枝 一分

附子 一分 生薑 半兩 甘草 一分

芍藥 一分 人參 一分 黃蓍 一分

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓通口
服一湯蓋食頃再服溫覆微汗差

姪婦傷寒藥方

姪婦傷寒仲景無治法用藥宜有避忌不可與尋
常婦人一槩治之也

加減四物湯姪婦產前腹痛及治月事或多或少或
前或後胎氣不安產後血塊不散或亡血過多或惡
露不下宜此服之

當歸切焙

川芎

熟乾地黃

白芍藥

各一兩

右搗爲粗末每服四錢水一盞半煎至八分取六
分清汁帶熱服日二三以知爲度若姪孕下血卽
入艾五七葉阿膠末一錢匕同煎服如前法疾勢
甚大散藥不支以四味各半兩細剉以水四盞煎
至二盞半去滓分四服熱喫食前服一日之中令

盡以知爲度平常產乳服至三臘止如虛弱血臟
不調至一月止因虛致熱熱與血搏口舌乾渴欲
飲水加桔梗一兩麥門冬三分腹中刺痛惡物不
下加當歸芍藥各一分血崩加地黃蒲黃各一兩
因熱生風加川芎一分柴胡半兩身熱脈躁頭昏
項強加柴胡黃芩各半兩秘澁加大黃半兩桃仁
一分炒滑瀉加桂附各一分發寒熱加乾薑牡丹
皮芍藥各一分嘔加白术人參各半兩腹脹加厚
樸枳實各一分虛煩不得眠加竹葉人參各一分
躁大渴加知母石膏各半兩水停心下微吐逆加

猪苓茯苓防已各一分虛寒狀類傷寒加人參紫

胡防風各三分

阿膠散姪婦傷寒安胎

阿膠炒

桑寄生

吳白术

人參

白茯苓各等分

右爲細末煎糯米飲調下二錢七日進二服愈

白术散姪婦傷寒安胎

白术

黃芩

各等分新瓦上並同炒香

右搗羅爲末每服三錢匕水一中盞生薑三片大棗一枚拍破同煎至七分溫服但覺頭疼發熱便

可服三二服卽差唯四支厥冷陰證見者未可服

葱白湯姪婦傷寒憎寒發熱當發其汗

葱白

十莖

生薑

二兩切

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞連服取汗

蘇木湯姪婦傷寒或中時行酒淅作寒振慄而悸或

加噦者

赤芍藥

陳橘皮

黃芩

宣黃連

甘草

炙

蘇木

各一
兩

右爲粗末每服抄五錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服汗出差若胎不安兼服阿膠散

黃龍湯 姦婦寒熱頭疼嘿嘿不欲飲食脇下痛嘔逆
痰氣及產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來
適斷病後勞復餘熱不解

柴胡一兩

黃芩

人參

甘草

炙各半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞去滓
溫服

柴胡石膏湯 姦婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四肢疼痛
背項拘急唇口乾燥

柴胡

四兩

甘草

二兩

石膏

八兩

右爲粗末每服三錢水一盞生薑五片煎至六分
去滓溫服不拘時若氣虛體冷者加人參四兩
枳實散姪婦傷寒四日至六日已來加心腹脹上氣
渴不止飲食不多腰疼體重者

枳實

一兩炒微黃

麥門冬

半兩去心

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

右粗末每服三錢以水一中盞八生薑半分葱白
七寸煎至六分去滓溫服

旋覆花湯姪婦傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花

半兩

白术

三分

前胡

一兩去蘆

黃芩

三分

人參

三分去蘆

麻黃

三分去根節用

赤芍藥

半兩

石膏

一兩

甘草

半兩炙
微赤

右搗爲粗末每服四錢用水一盞半八生薑半分煎至六分去粗服

麥門冬湯姪婦傷寒壯熱嘔逆頭疼不思飲食胎氣不安者宜此主之

人參

一兩

石膏

一兩

前胡

三分

黃芩

三分

葛根

半兩

麥門冬

半兩去心

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半八生薑四片棗子二枚淡竹茹一分煎至八分去滓溫服

梔子大青湯姪婦發班變爲黑色

升麻

梔子仁各二兩大青

杏仁

去皮尖

黃芩

各一兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕以水一盞半細切葱白二寸煎至一盞去滓溫服

蘆根湯千金姪娠頭痛壯熱心煩嘔吐不下食

知母

四兩

青竹茹

三兩

右剉如麻豆大每服五錢水一小盞半入生蘆根一握粳米一撮煎至一盞去粗服盡更作差止

塗臍法治姪娠遭時疾令子不落

取竈中黃土水和塗乾復塗之方酒和塗方五

寸又汨清和塗之並佳

葱白豉湯治姪娠熱病

葱白

二兩半

豉

半升

右以水三升煎取一升分二服取汗

葱白一物湯

葱白一把水一升煮令熟服之取汗食令盡亦主安胎若胎已死者須臾卽胎出也

伏龍肝散

用伏龍肝雞子許水調服之

伏龍肝卽竈下黃土是也

葛根一物飲治熱煩悶

葛根汁每服一小盞如人行五里進一服無生葛
用乾葛咬咀煎服

梔子五物湯廣濟涼姪娠傷寒頭痛壯熱

梔子

前胡

知母

各二兩

黃芩

一兩

白石膏

四兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕用水一小盞半煎
至一盞去滓服

前胡七物湯治姪娠傷寒頭痛支節痛壯熱

前胡

知母

梔子仁

各二兩半

石膏

四兩

大青

黃芩

各二兩半

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入葱白三
莖煎至一盞去滓溫服

升麻六物湯急救療姪娠七月傷寒壯熱赤班變黑
溺血

升麻

梔子仁

各二兩

大青

杏仁

去皮尖

黃芩

各一兩半

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入葱白三莖
煎至一盞去滓溫服

產後藥方

陽旦湯治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒

時時有熱心下堅乾嘔汎出宜用陽旦湯方見第六卷中

療婦人產後血虛多汗言中風身體強直口噤背反

強作瘡治之

法見第六卷中第十三問中

又方用荆芥末三錢溫酒調下不過再服

治婦人產後亡津液大便多秘或譫言煩躁不可用

湯液宜神功丸用米湯吞下

方見第十卷中

桂心牡蠣湯婦人產後頭疼身體發熱兼治腹內拘

急疼痛

桂心

三兩

牡蠣

煅

白芍藥

乾地黃

各五兩

黃芩

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至
一盞去滓溫服

蜀漆湯治婦人產後寒熱往來心腎煩滿骨節疼痛
及頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀

蜀漆葉

一兩

黃芪

五兩

桂心

甘草

炙

黃芩

各一兩

知母

芍藥

各二兩

生地黃

一斤

右剉如麻豆大每服抄五錢匕用水一盞半煎至

一盞去滓溫服

增損柴胡湯婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹等

疾

柴胡 三錢

人參

甘草 炙

半夏 湯泡

白芍藥

陳橘皮

川芎 分各三

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一大盞生薑
三片棗子一枚煎至七分去滓食後溫服日三服
竹葉 防風 溫婦人產後傷風發熱面赤喘而頭疼者

竹葉 半把

葛根

一兩半

防風

桔梗

桂枝

去皮半

人參

甘草

炙各半兩

右爲粗末每服四錢水一盞半生薑三片棗子一枚煎至八分去滓溫服使汗出頸項強用附子炮去皮臍剉如豆大炒一大錢同煎嘔加半夏一錢三物黃芩湯治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯頭不疼但煩宜用此服之

黃芩

半兩

苦參

一兩

乾地黃

二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎八分服之治婦人產後亡血汙多故令鬱冒其脉微弱不能食大便反堅但頭汙出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汎出以血虛下厥孤陽上出故但頭

汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當
汗出陰陽乃復所以便堅者嘔不能食也宜小柴胡
湯主之

乾薑柴胡湯治婦人傷寒經脉方來初斷寒熱如瘡
狂言見鬼者

柴胡

四兩去蘆

栝樓根

二兩

桂枝

一兩半

牡蠣

熬一兩

乾薑

一兩炮

甘草

多一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去
滓溫服初服微煩再服汗出而愈

海蛤散治婦人傷寒血結脅膈揉而痛不可撫近人

婦

血結胷法當刺期門仲景無藥方治法
此方疑非仲景然其言須有理姑存焉

海蛤

滑石

甘草

各一
兩炙

芒硝

半兩

右搗羅爲散每服二錢雞子清調下小腸通利則
胷膈血散膻中血聚則小腸壅小腸旣壅膻中血
不流行宜此方小便利之數行宜桂枝紅花湯發
其汗則愈

增注類證活人書卷十九終

增注類證活人書卷二十

此一卷論小兒傷寒小兒大人治法一般但小分劑藥性差涼耳尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩渴惺惺散主之咽喉不利痰實咳嗽鼠黏子湯主之頭額身體溫熱大便黃赤腹中有熱四順散連翹飲三黃丸主之頭額身體溫熱大便白而酸臭者胃中有食積雙丸主之小兒無異疾唯飲食過度不能自節心腹脹滿身熱頭痛此雙丸恐治之小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主之頭疼發熱而悶

人惡寒者此傷寒證也升麻湯主之無汗者麻黃
黃芩湯有汗者升麻黃芩湯皆要藥也小兒尋常
不可過當服涼藥胃冷蟲動其證與驚相類醫人
不能辨往往復進驚藥如腦射之類遂發吐胃虛
而成慢驚者多矣小兒須有熱證方可疎轉仍慎
用丸子藥利之當以大黃川芎等㕮咀作湯液以
蕩滌蘊熱葢丸子巴豆乃攻食積耳

洗心散 治遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝
上口苦唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛涕唾稠黏痰壅喫
食不進心神躁熱眼澀睛疼傷寒鼻塞四肢沈重語

聲不出百骨節痛大小便不利麩豆瘡時行溫疫狂語多渴及小兒天弔風夜驚並宜服之

當歸

四兩炒

芍藥

四兩生用

甘草

四兩炙

荆芥

四兩

白朮

一兩炒

麻黃

四兩去節炒

大黃

四兩以米泔水浸一晚出令乾慢炒取熟

右搗羅爲細末每服抄二錢水一盞八薑一片薄荷二葉同煎至八分放溫和滓服了仰卧仍去枕少時如五臟壅實煎四五錢匕若要塘轉則熱服惺惺散治小兒風熱及傷寒時氣瘡癥發熱

桔梗

細辛

人參

白术

桔梗根

甘草炙

白茯苓

川芎各等分

右搗羅爲末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上分二服凡小兒發熱不問傷風風熱先與此散數服往往輒愈

四順散解大人小兒膈熱退壅盛涼心經

大黃

蒸

甘草

炙

當歸

洗

芍藥

右各等分爲細末每服二錢以水一盞薄荷二葉

煎至七分溫服小兒量歲數與之

麻黃黃芩湯小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃

去節一兩

黃芩

赤芍藥

各半兩

甘草

炙

桂枝

去皮各一分

右搗羅爲細末每服二錢滾水調下日三服兼治
天行熱氣生豌豆瘡不快益煩躁昏潰或出尙身
疼熱者

升麻黃芩湯治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻

葛根

黃芩

芍藥

各三錢

甘草

一錢半炙

右剉如麻豆大每服二錢以水一中盞煎至六分
去滓溫服若時行瘡豆出不快煩躁不眠者加木
香一錢五分

甘露飲子治胃中客熱口臭不思飲食或饑煩不欲
食齒齦腫疼膿血舌口咽中有瘡赤眼目臉重不欲
開瘡疹已發未發並宜服

熟乾地黃

生乾地黃

天門冬

麥門冬

並去心焙

枇杷葉

去毛

枳殼

炒去穰

黃芩

石斛

去苗

山茵陳

甘草

炙各等分

右爲細末每服一錢水一盞煎至六分去滓溫服
食後臨卧

雙丸治小兒身熱頭痛飲食不消腹脹滿或心腹疼痛
大小便不利或下重數起未差可再服小兒蒸候
哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜用
此丸下之

甘遂

半兩

朱砂

一錢另研

麥門冬

二兩半去心

蕤核

去仁四兩生

牡蠣

二兩煅

甘草

一兩分炙

巴豆

六十枚去油

日中曬之白如霜者

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味爲細末入巴豆朱

砂粃仁合和搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋丸
半歲兒服如桂子大一雙一歲兒服如半麻子大
分爲一雙服如二歲麻子大一枚分一雙三四歲
者服如麻子大二丸五六歲者服如大麻子大二
丸七八歲者如小豆大二丸十歲微大於小豆二
數合投之卽下藥丸皆雙出也下利甚者濃煎冷
粥飲之便止

石膏麻桂湯治小兒傷寒未發熱咳嗽頭面赤

麻黃

一兩去
節湯泡

甘草

半兩
炙

石膏

半兩

芍藥半兩

桂心一分

黃芩二兩

杏仁

十枚去皮尖

右七味爲散每服二錢水一中盞入生薑二片煎半盞去滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲治小兒一切熱

連翹

防風

甘草

山梔子

各等分

右件搗羅爲末每服二錢水一中煎七分溫服

麥門冬湯治小小未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬

三分去心

石膏

寒水石

甘草

各半
雨炙

桂心

三錢
半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分溫服
十物升麻湯治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥
心腹堅急大小便不利或口瘡或因壯熱便四支攀
掣驚仍作癇疾時發時醒醒後身熱如火者

升麻

白薇

麻黃

去根
節

萎蕤

柴胡

甘草

各半
雨炙

黃芩

朴消

大黃

鈎藤

各半
分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓

下硝再煎化溫服

六物黃芩湯治少小腹大短氣熱有進退食不安穀爲之不化

黃芩

大青

甘草炙

麥門冬

石膏

各半兩

桂心三錢

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分溫服
五物人參飲治小兒天行壯熱欬嗽心腹脹滿

人參

甘草

炙各半兩

麥門冬

一兩去心

生地黃

一兩半用生乾地半兩

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎

至七分去滓溫服

治小兒八物麥門冬飲

麥門冬三兩去心

甘草炙

人參各一分

紫苑

升麻各二兩

貝母半分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞人茅根半握煎至七分去滓再入竹瀝少許重煎服

棗葉飲治小兒天行五日以後熱不歇者

棗葉

半握

麻黃

半兩去根節

豉一合

葱白

切一合

右件共童子小便二盞煎至一盞去滓分二服

增注類證活人書卷二十一

此一卷論小兒瘡疹瘡疹與傷寒相類頭疼身熱足冷脉數疑似之間只與升麻湯緣升麻湯解肌兼治瘡子已發未發皆可服但不可疎轉此爲大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不可轉世人不學乃云初覺以藥利之宣其毒也誤矣又云瘡豆已出不可疎轉出得已定或膿血大盛却用疎利亦非也大抵瘡疹首尾皆不可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥卽毒氣入裏殺人但與化毒湯紫草木通湯鼠黏子湯出得大盛卽用

犀角地黃湯解之若瘡豆出不快煩躁不得眠者
水解散麻黃黃芩湯升麻黃芩湯活血散主之黑
瘡倒厭猪尾膏無比散龍腦膏子無不驗也若熱
毒攻咽喉痛如聖湯瘡豆八眼決明散撥雲散蜜
蒙花散通聖散蛤粉散主之治瘡疹法無由此矣
升麻湯治傷寒中風頭痛增寒壯熱支體痛發熱畏
寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆可
服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫着及暴熱之次
忽變陰寒身體疼痛頭重如石

本方四味見雜方第十六卷中

犀角地黃湯治傷寒及溫病應發汗而不發汗內有

瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血面黃大便黑
者此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此方解
之

本方四味方在雜方第十八卷中

麻黃黃芩湯治小兒天行熱氣生豌豆瘡不快益煩
躁昏憒或出尙身疼熱者

本方五味在小兒方第二十卷中

升麻黃芩湯治小兒時行瘡豆出不快煩躁不眠加
木香一錢五分

本方五味在小兒方第二十卷中

化毒湯治小兒瘡豆已出未出並皆服之

紫草

嫩者

升麻

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大以水二盞糯米五十粒煎至一盞

去滓溫服

紫草木通湯治小兒瘡疹

紫草

去蘆

木通

人參

茯苓

去皮

糯米

各等分

甘草

半之

右剉如麻豆大每服四錢匕以水一盞半煎至一

盞去滓溫服

鼠黏子湯治疹豆欲出未能得透皮膚熱氣攻咽喉
眼赤心煩者

鼠黏子

四兩炒香

甘草

一兩炙

防風

半兩

荆芥穗

二兩

右搗羅爲末每服二錢沸湯點服食後臨卧逐日
三服大利咽膈化痰涎止嗽若春夏間常服免生
瘡癧老幼皆宜服

水解散治天行頭痛壯熱一二日兼治痘瘡未出煩
躁或出尙身體發熱

大黃

黃芩

桂心

甘草

炙

芍藥

各二兩

麻黃

四兩去節
湯泡焙秤

右搗羅爲末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二
錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸匕此
調風實之人三伏中宜用若去大黃卽春夏通用

活血散治瘡子或出不快

用白芍藥末一錢酒調如欲止痛用溫熱水調下

猪尾膏治瘡子倒厭

用小猪兒尾尖刺血一兩點入生腦子少許同研
新水調下立效

無比散治瘡疹惡候不快及黑瘡子應一切惡候

牛黃

麝香

龍腦

膩粉

各一分研細

朱砂

一兩先研如粉

右爲極細如有患者小兒一字大人半錢水銀少
許同小瀆猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服
許同小瀆猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服

先寧穩得睡然後取轉下如爛魚腸蒲桃穗之辦
涎臭惡物便安小兒用妳汁滴尤妙

龍腦膏子治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不爾毒入臟必死

生龍腦 一錢

右細研旋滴猪心血和丸雞頭肉大每服一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫酒化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息也如聖湯治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

一兩

牛蒡子

炒一兩

甘草

生一兩

麥門冬

去心半兩

右爲細末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉煎

服尤妙

決明散治疹痘瘡入眼

決明子

一分

瓜蔞根

半分

赤芍藥

一分

甘草

一分炙

右搗羅爲末每服半錢蜜水調下日進三服
撥雲散治疹痘瘡入眼及生翳

桑螵蛸

真者一兩
令焦細研

右搗羅爲細末八射香少許令勻每服二錢生米

泔調下臨卧服之

蜜蒙花散治疹痘瘡并諸毒氣入眼

蜜蒙花

二錢半淨

青箱子

決明子

車前子

各半錢

右爲細末用羊肝一片破開作三片摻藥令勻却
合作一片以濕紙七重裹塘灰火中煨熟空心食
通聖散治疹痘瘡入眼及生翳

白菊花

一兩如無則甘菊花代之然不如白菊

菉豆皮

穀精草

去根各一兩

右搗羅爲末每服用一大錢乾柿一個生粟米泔

一蓋共一處煎候米泔盡只將乾柿去核喫之不拘時候一日可喫三枚日淺者五七日可效遠者半月餘矣

蛤粉散治小兒瘡子入眼

穀精草

蛤粉各等分

右爲末每服一錢匕豬肝二兩許批開摻藥卷了青竹葉裏麻縷纏定水一椀煮令熟入收口甕瓶內熏眼候溫取食日作不過十日退

秣陵吳鳴鳳重校

增注類證活人書卷二十一終

增注類證活人書卷二十二

無閑居士李子建撰

新安師古吳勉學校

傷寒十勸

一傷寒頭疼又身熱便是陽證不可服熱藥

傷寒傳三陰三陽共六經內太陰病頭不疼身不熱少陰病有反發熱無頭疼厥陰病有頭疼而無發熱故知頭疼又身熱即是陽證若投熱藥必不救

二傷寒當直攻毒氣不可補益

邪氣在經絡中若隨證早攻之只三四日痊安醫者乃妄謂先須正氣却行補益使毒氣流熾致殺人

三傷寒不思飲食不可服溫脾藥

傷寒不思飲食自是常事終無饑死之理如理中圓之類亦不可輕服若陽病服之致熱氣增重或致不救

四傷寒腹痛亦有熱證不可服溫暖藥

難經云痛爲實故仲景論腹滿時痛之證有曰痛甚者加大黃夫痛甚而反加大黃意可見也惟身

冷厥逆而腹痛者方是陰證須消息之每見醫者
多緣腹痛便投熱藥而致殺人也

五傷寒自利當看陰陽證不可例服補暖及止瀉藥
自利惟身不熱手足溫者屬太陰身冷四逆者屬
少陰厥陰外其餘身熱下利皆是陽證當隨證依
仲景法治之每見醫者多緣下利便投暖藥及止
瀉藥而殺人

六傷寒胸脇痛及腹脹滿不可妄用艾炙

常見村落間有此證無藥便用艾炙多致毒氣隨
火而熾膨脹發喘而死不知胸脇痛自屬少陽腹

膨脹自屬太陰也此外惟陰證乃可炙耳

七傷寒手足厥冷當看陰陽不可一例作陰證治有
陰厥有陽厥醫者少能分辯陽厥而投熱藥殺人
速於用刃蓋陽病不至於極熱不能發厥仲景所
謂熱深者厥深也熱深而更與熱藥寧復有活之
理但看初得病而身熱至三日以後熱氣已深大
便秘小便赤或譫語昏憒及別有熱證而反發厥
者必是陽證也宜急用承氣湯下之若初得病身
不熱大便不秘自引衣蓋身或下利或小便數不
見熱證而厥逆者卽是陰厥也方可用四逆湯之

類二厥所以使人疑者緣脈皆沈然陽厥脈沈而滑陰厥脈沈而弱又陽厥時復指爪却溫陰厥常冷此爲可別也

凡傷寒已在裏卽不可輕用藥發汗

傷寒證須看表裏如發熱惡寒則是在表正宜發汗如不惡寒反惡熱則是裏證若醫者一例發汗則所出之汗不是邪氣皆是真氣邪氣未除而真氣先涸死者多矣又半在表半在裏之證及無表裏之證不惟皆不可下仍亦皆不可汗但當隨證而治之可也

九傷寒飲水爲欲愈不可令病人恣飲過度

病人大渴當與之水以消熱氣故仲景以飲水爲欲愈人見此說遂令病人縱飲由是爲嘔爲哕逆爲下利爲腫爲悸爲水結爲小便不利者多矣且如病人欲飲一椀只可半椀之水少少與之爲善也

十傷寒初差不可過飽及勞動或食羊肉及行房事與食諸骨汁并飲酒

病方愈脾胃尙弱食而過飽不能消化病即再來謂之食復病方愈氣血尙虛勞動太早病亦再來

謂之勞復又傷寒食羊肉行房事竝死食諸汁飲酒者再病之也

予每念父祖俱死於傷寒乃取仲景所著深繹熟玩八年之後始大通悟陰陽經絡病證藥性俱了然於胸中緣比年江淮之民冒寒避寇得此疾者頗眾茲依仲景法隨證而施之藥所活不啻數百人仍知傷寒本無惡證皆是妄投藥劑所致因追悼父祖之命皆爲庸醫所殺而又歎人無間於貧富貴賤於此不能自曉則輕付一命於庸工之手也今輒摭其流弊多誤有害於命者略開其說目曰傷寒十勸其言不

欲成文冀人易曉而以爲深戒云