

廣相似而有毛花晚而實亦極經云抹實中子至細燥熱便脫盡今
 市人惟合莖葉用而實正空殼無復子爾呂氏遺書論云
 瞿麥月味甘辛石淋白華子云瞿麥催生又名杜母草麥論麥又
 云石竹葉治痔瘻并瀉血作湯粥食並得子治月經不通破血塊排
 膿藥治小兒蛔蟲痔疾煎湯服丹石藥發并眼圖經曰瞿麥生泰
 日腫痛及腫毒搗傳治浸淫瘡并婦人陰瘡山川谷今
 處處有之苗高一尺以來葉尖小青色根紫黑色形如細蔓菁花紅
 紫赤色亦似映山紅二月至五月開七月結實作穗子頗似麥故以
 名之立秋後合子葉收採陰乾用河陽河中府出者苗可用准甸出
 者根細村民取作刷帚爾雅謂之大菊廣雅謂之莖萎是也古今方
 通心經利小腸為最要張仲景治小便不利有水氣枯樓瞿麥丸主
 之枯樓根二兩大附子一箇扶苓山芋各三兩瞿麥一分五物并末蜜
 丸如梧子大一服三九日三末知益雷公云凡使只用葉殼不
 至七八九以小便利腹中端為知也外臺秘要治腹以瞿麥為
 即空心令人氣喘小便不禁凡欲用先千金方治產經數日不出或子死腹為
 須以葶竹淋浸一伏時漉出懸乾用千金方中母欲死以瞿麥煎汁服之梅
又方治石淋取子酒服方寸匕千金方治產經數日不出或子死腹為
師方治竹木刺入肉中不出瞿麥為末水服崔氏治魚鱗瘡毒腫燒灰
 方寸匕或者瞿麥汁飲之曰三千金同和油傅於腫上甚佳
衍義曰瞿麥八政散用瞿麥今人為至要藥若心經雖有熱而小
 腸虛或服之則心熱未退而小腸別作病矣料其意者不

心熱大熱則當止治其心若或制之不盡衍義曰瞿麥並下流
 意者其
 意如此

衡州玄參

邢州玄參



江州玄參

玄參味苦鹹微寒無毒主腹中寒熱積聚女子產

乳餘疾補腎氣令人目明主暴中風傷寒身熱支滿

邪忽忽不知人温瘡洒洒血瘕下寒血除胃中氣下

止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥疔五藏久服補

明目強陰益精一名重臺一名玄臺一名鹿腸一名

馬一名咸一名端生河間川谷及冤句三月四月採

暴乾惡黃者曰乾薑大東山菜莖反藜蘆陶隱居云今出近道

本注云玄參根苗並臭莖亦不以入參陶云道亦以

理也今注詳此藥在方大高四五尺紫赤色而有細

尖長根生青白乾即紫者謂之合香用之俗呼為

之療諸毒疔瘡陶云以

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補

傷寒復勞散補



石州秦艽

廣利方治瘰癧年久不差生云

雷公云凡採得後須用酒洗

重相隔入瓶蒸兩伏時

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

取出再蒸如前法

寧化平秦艽

秦艽



秦艽



秦艽味苦辛平微温無毒主寒熱濕痺風寒濕風

山石谷二月八月採根是乾乾地名今出甘肅岷州長

大黃白色為佳根皆作文多衛士用之熟飲時去方家多

政州者良本亦作云今出涇州鄜州

秦艽解米積云

解酒毒去頭風云本經名秦瓜世人以療酒黃黃疸大効

經曰秦艽生飛鳥山谷今河陝州軍多有之根土黃色而相交糾

色如蒿苣華六月中開花紫色似葛花當月結子每於春秋採根陰

乾正元廣利方療黃心煩熱口乾皮肉皆黃以秦艽十二分牛乳一

大外同煮取七合去滓分溫再服差此方出於許仁則又崔元亮集

驗方凡發背似者須便服秦艽牛乳煎當得使利三五日即差法

並同此又治黃方用秦艽大兩細剉作兩貼子以上好酒一外每

貼半外酒絞取汁去滓空腹分兩服或利便止就中好酒人易治凡

黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤食用糞亦作黃因勞發黃多痰涕目

有赤暎曰益焦悴或面赤惡心者是元亮用之及治人皆得力極効

秦艽須用新雷公云凡使秦并凡須於脚文處認取左文列為

好羅文者秦即治疾凡即發脚氣凡用秦先以布拭

上黃肉毛盡然後用湯浸一宿至明出日乾用

聖惠方

治傷寒心熱神躁口乾煩渴

又方

治小便難腹滿悶不急療之殺人用

孫真人

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦艽

徐州百合

五兩牛乳三外煮取一外去滓內芒消兩服

徐州百合

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦艽

徐州百合

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦艽

徐州百合

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦艽

徐州百合

治黃疸皮膚眼晴如金色小便赤取秦艽



百合味甘平無毒 氣腹脹心痛利大小便補中益

氣除浮腫臃脹痞滿寒熱通身疼痛及乳難喉痺止

涕淚一名重箱一名摩羅一名中逢花一名強瞿生荆

州川谷二月八月採根曝乾 陶隱居云近道處處有根如胡蒜

初是蚯蚓相纏結變作之俗人皆呼為強仇仇即瞿也聲之訛爾亦

堪服食曹奉注云此藥有一種細葉花紅白色一種葉大莖長

根鹿花白宜入藥用目馬等謹按藥性論云百合使有小毒主百

邪鬼魅涕泣不止除心下急滿痛治脚氣熱數逆吳氏云百合一名

重蓮一名中庭生宛胸及荆山日華云白百合安心定膽益志養

五藏治癲癩瘡泣狂叫驚悸殺毒氣熾乳癰發背及諸瘡腫并治

洋後血狂運又云紅百合涼血毒治

瘡腫及瘰癧此花紅花者名連珠

前高數尺莖葉如薊四向有葉如雞距又似柳葉青色葉近莖微紫

莖端碧白四五月開紅白花如石榴齒而大根如葫蘆重疊生二三

十瓣二月八月採根暴乾亦蒸食之甚益氣又有一種花黃有黑

斑細葉葉間有黑子不堪藥除錯歲時廣記二月種百合法宜雞

糞或去百合其細細而反好雞糞理不可知也又百合作麩最

益人取根暴乾搗細篩食之如法張仲景治百合病有百合知母湯

凡四方病名百合而用百合治之不識其義

食之作粉尤佳紅花

者名山丹不甚良

聖惠方

治疔藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半

益和蒸令軟時時舍一棗大燕津一

又方

治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃

傷寒者

孫真人食忌

傷寒者

行義曰

仲景用

百合張

治傷寒腹中滿痛用百合一兩炒令黃

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

傷寒者

徐州知母



衢州知母



解州知母



隰州知母



威勝軍知母



知母味苦寒無毒主消渴熱中除邪氣肢體浮腫下水

補不足益氣瘵傷寒久瘧煩熱骨下邪氣膈中惡風汗

內疽多服令人瘦一名蚘一名母一名連母一名野麥一

名地冬一名水冬一名水浚一名貨母一名蟻首提云

母一名女雷一名女理一名兒草一名雁列一名韭逢杜

一名兒蓮草一名東根一名水頭一名沈燔一名蕘杜

生河內川谷三月八月採根曝乾陶隱居

彭城形似薑蕪而柔潤葉至難死掘出隨生須枯燥乃止甚療熱結

亦主瘰癧也日馬錫等按雨雅大蕘流蕘釋曰知母也一名蕘

一名蕘蕘云生山上葉如韭陶隱居按母出三輔黃白者善吳氏

太知母神農桐君無毒補不足益氣藥性論云知母君性平主治心

煩躁悶鬱熱勞往來生後後勞腎氣勞傷寒虛損患人處而口乾

加而用之日華子云味甘治熱勞傷腎氣勞傷通小腸消痰止咳潤

心肝補虛之圖經曰亦母生河內川谷今類河諸郡及解州潞州

安心止驚悸

出隨生滿地乃止四月開青花如韭花八月結實二月八月採
 用藥謂之毒從南切又謂之洗直林切滿是也肘後方用此一
 物治暑毒大勝其法連根葉搗作散服之亦可投水攪飲一二
 外夏月出行多取此屑自隨欲入水先取少許投水上流便無畏
 辟射工亦可和水
 作湯浴之甚佳
 治妊娠月未足似發產腹中痛用知母二兩末蜜丸
 如梧桐子大不計時候粥飲下二十九湯氏產乳詞
雷公云 乾木曰杵搗勿令犯鐵器
聖惠方

貝母



峽州貝母



越州貝母



貝母味辛苦平微寒無毒主傷寒煩熱淋瀝邪氣死腹

唯痺乳難金瘡風癩腹中結實心下滿洗洗惡風寒

日眩項直欬嗽上氣止煩熱渴出汗安五藏利骨髓

一名空草一名藥實一名苦花一名苦菜一名商草一名勤

母生晉地十月採根暴乾厚朴白薇為之使惡桃花畏秦艽

近道原似聚貝子故名貝母漸穀服之不飢


四月蒞熟時採良若十月苗枯根亦不佳也出澗州荆州襄州者最
佳江南諸州亦有味甘苦不辛按爾雅一名箇位度切也
士箇貝母注根如小貝負而白華葉似韭疏引陸機云其

取上枚末燻下未點眼去膚醫主胃骨通氣瘵時疾黃疸與連翹同
油得人圖經曰貝母生晉地今河中江陵府鄧壽園藥蔡潤除
生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色飛如鼓子
此八月採根曬乾又六月四月採熟時採之良此有數種廡詩言采其
茵音高陸機疏云貝母也其葉如括樓而細小其在根下如芋子
正白四方連緊相著有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅云白
花葉似非此種罕復見之此藥亦治惡瘡唐人記其事云江左嘗有
兩人去膊上有瘡如人面亦無定苦商人戲稱酒口中其面亦赤色
以物食之亦能食食多則覺臍內肉脹起或不食之則一臂痺有善
醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母甘瘡乃聚
瘡開口商人喜曰此藥可治也同以小葦筒毀其口灌之數日
成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟
公云凡使先於柳木灰中灼令黃擘破去內口鼻上有米許大者
中有一小團不作兩片無皺者寫曰川龍精不入用
平誤服令人物除水不收用黃精小藍汁合服立愈
能散心胃結氣味什功則詩所謂言長其福者足也蓋作
字以不




臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY

重修政和經史證類備用本草



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

澤州白芷



白芷味辛温無毒主女人漏下赤白血閉陰腫寒熱風
 頭侵目淚出長肌膚潤澤可作面脂療風邪久渴吐嘔
 兩脅滿風頭痛眩目痒可作膏藥面脂潤顏色一名芫
 香一名白芷一名芫許驥一名莞一名符離一名澤芬葉
 名藺歷麻可作浴湯生河東川谷下澤二月八月採根

暴乾 當歸為之使惡旋復花 今出近道與有下濕地

東間甚多藥亦可作浴湯道家以此香者去尸蟲又用合香

也 白芷君能治心腹血刺痛除風邪主女人血崩及嘔逆目

止淚出瘰癧人瀝血腰痛能飽臍 治目赤努肉及補胎漏

滑落破宿血補新血乳癰發背瘰癧腸風痔瘻疝瘕瘰癧疥癬止痛

生肌去面 圖經曰 根長尺餘白色細細不等枝葉去地五寸已上春

生葉相對姿姿紫色開三拍許花白微黃入伏後結子立秋後苗枯

二月八月採根暴乾以黃澤者為佳楚人謂之葍九散云辛夷楮

葍房王逸注六 雷公云 凡採得後勿用四條作一處生者此名表

葍白芷是也 劑上皮細剉用黃精亦細剉以竹刀切二味等分

兩度蒸一伏時後出於日中曬乾去黃精用之 外臺秘要丹

應庵白芷及根 子母秘錄 治小兒身熱白芷 煮湯浴兒避風

衍義曰 白芷補是也出於地者良經曰能飽臍今人用治帶下腸

敗膿血所致卒然已期頃以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩


為藥根白者白鬱各半兩焙燒枯別研餘為末同以蠟丸如梧子大

空肚及飯前米飲下十九丸或十

五丸俟膿盡仍別以他藥補之



永康軍淫羊藿



沂州淫羊藿

淫羊藿味辛寒無毒 主陰痿絕傷莖中痛利小便益氣

力強志堅筋骨消瘰癧赤癰下部有瘡洗出蟲丈夫

久服令人無子 一名剛前生上郡陽山山谷 署預為之使

此使人好為陰陽西川北部有淫羊一日百通合蓋食養所致故名

淫羊藿 實本送 云此草葉形似小豆而圓薄莖細亦堅所在皆有俗

名仙靈脾者是也 目為錫等諸按蜀本 云淫羊藿温注云生與不聞

水聲者良 論云淫羊藿亦可單用味甘平主堅筋益骨 日華子

玄仙靈脾紫芝為使得酒良治一切冷風勞氣補腰膝強心力丈夫
 絕陽不起女人絕陰無子筋骨學急四肢不任老人昏聩中年健志
 又名黃連祖千兩金乾
 藥筋汝杖草葉枝節
 圖經曰 滎羊善俗各仙靈脾生上郡陽山
 間皆有之葉青似杏葉上有刺莖如栗根紫紫色有積四月開花白
 色亦有紫色碎小獨頭子五月採藥曬乾湖湘出者葉如小豆枝莖
 緊細經冬不凋根似黃連開中俗呼三
 枝九華草苗高二二尺許惟葉俱使
 雷公云 凡使時呼仙靈
 去葉四畔花枝盡後細用羊脂相對并炒過待
 羊脂盡為度每將事一斤用羊脂四兩為度也
 聖惠方 治偏風
 逐皮膚不仁宜服仙靈脾浸酒方仙靈脾一斤好者細剉以生絹袋
 盛於不津器中用無灰酒三斗浸之以厚紙重重密封不通氣春夏
 三日飲冬五日後旋煎每日隨性煖飲之常令醱醲不得
 大醉若酒盡再合服之無不効驗合時切忌鷄犬見之
 經驗方
 右瘡子入眼以仙靈脾煎靈仙等分為
 末食後米湯下二錢匕小兒半錢匕
 羊糞一斤酒一斗
 浸經二日飲之佳
 食醫心鏡 益丈夫興陽
 理脚膝冷淫

黃芩



耀州黃芩



潞州黃芩

黃芩味苦平大寒無毒主諸熱黃疸腸澼洩痢逐水下
 血閉惡瘡疔蝕火瘍療痰熱胃中熱小腹絞痛消積
 利小腸女子血閉淋露下血小兒腹痛一名腐腸一名
 空腸一名內虛一名黃文一名經芩一名妬婦其子主
 腸澼膿血生種歸川谷及冤句三月三日採根陰乾
 厚得

并黃連止腹痛得五味子牡蠣牡蠣令人有子得黃者白黃赤小豆
 療屬瘦山菜莫龍骨為之使惡葱實畏丹砂牡丹熟地黃
 歸屬建平郡今第一出鼓城鬱州亦有之圖者名子本為勝破者名
 宿琴其腹中皆關故各病腸准取深色堅實者為好俗方多用道家
 不須圖本云葉細長兩葉相對作叢生亦有獨莖者今出宜州
 州溼州者佳充州者大實亦好名純尾茶也
 云黃芩目味苦甘能治熱毒骨蒸寒熱往來腸胃不利破瘰癧治五
 淋令人宣暢去關節煩悶解熱渴治熱腹中疝痛心腹堅脹
 云下氣主天行熱疾
 瘡排膿治乳癰發背
 莖葉如筋葉從地四面作叢生類紫草高一尺許亦有獨莖者葉
 細長青色兩兩相對六月開紫花根黃如知母屬細長四寸二月
 八月採根暴乾用之具普本草云黃芩又名印頭一名黃連二月生
 赤黃葉兩兩四四相值其莖空中或方圓高二四尺葉紫紅赤五月
 質黑根黃二月九月採與今所有小異張仲景治傷寒心下痞滿為
 心湯四方皆用黃芩以其主諸熱利小腸故也又太陽病下之利不
 止有葛根黃芩黃連湯及主姪娠安胎散亦多用黃芩今醫家嘗謂
 有效者因著之又千金方巴郡太守奏加戒三黃丸瘡男子五勞七傷
 傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者春三月黃芩四兩大黃三兩
 黃連四兩夏三月黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩
 大黃二兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃五兩黃連二兩三物
 時合搗下篩蜜丸大如烏巨米飯服五九日三不知精增七九飯一

成德軍狗脊



溫州狗脊

眉州狗脊

眉州狗脊

月病愈久服及奔馬近頰有驗食禁豬肉又陶
 隱居云黃芩者名子本仲景治雜病方多用之
 四兩袋貯之水五
 外黃三分三服
 梅師治火月折黃芩末水調傳之
 千金翼治

狗脊味甘平微溫無毒主腰背痠痛

濕腰痛頰利老人瘵失溺不節男子脚弱腰痛風邪淋

露少氣自闇堅脊利腕仰女子傷中關節重

一名強脊一名扶蓋一名扶筋生常山川谷二月八月採

根暴乾車蘼為之使惡晉陶隱居云今山野處處有與菘菜相

赤脉根四為交切凸從結切龍從如羊角細強者是唐本注云此藥

苗似貫眾根長多歧狀如狗脊骨其肉作青綠色今京下用者是陶

所說乃有刺草蘼非狗脊也今江左俗猶用之臣禹錫等謹按

云狗脊一名狗青一名赤節神農本草經黃帝岐伯雷公扁鵲并無

毒季氏小温如草解蕙節如竹有刺葉黃白亦如竹根毛有

刺岐伯經云莖無節葉端負青赤皮白有赤脉性論云狗脊味苦

辛微熱能治男子女人毒風軟脚邪圖經曰狗脊生常山川谷今

有根黑色長三四寸兩指許大苗尖細碎青色高一尺已來無花其

莖葉似貫眾而細其根長而多歧似狗脊骨故以名之其肉青綠春

秋採暴乾用今雷公云凡使勿用透山藤其大細根與透山

方亦用金毛者雷公云凡使勿用透山藤其大細根與透山



兗州石龍芮

事一判了酒拌蒸從
已三申出嫩蘇川

石龍芮味苦平無毒主風寒濕痺心腹邪氣利關節止

煩滿平腎胃氣補陰氣不足失精莖冷及服輕身明目

不老令人皮膚光澤有子一名魚鼻能一名地精一名

心能一名彭根一名天豆生太山川澤石邊五月五日

採子二月八月採皮陰乾大戟為之使畏蛇蝎皮具葉並隨

子而扁非真好者人言是菘菜子爾東山石上所生其葉芮芮短小

子狀如葶藶黃也而味小辛此乃實是也唐本注云今用者俗名

石龍芮山南者粒大如葵子關中河北者細如葶藶氣力劣於山南者

方取茅一莖正全煎十數沸服之立清若兩莖即生兩孔
 斷一莖為二亦生兩穴白茅花亦主金瘡止血又有管亦茅類也
 草木疏云管似茅而骨無毛根下五寸中有白筋者柔動宜
 瀉之尤善其未種者名野管詩所謂白茅菅者是此也入藥與茅等
 其尾管茅經久者主卒吐血肘後方取茅根四外對之以水十五
 細對三升酒浸煮服一升良已外者取五外道冷煖飲之日三服
 又方請竹木刺在肉中不出取白茅根
燒末脂膏和塗之亦治因風致腫

成州紫苑



解州紫苑



泗州紫苑



味苦辛 溫 無毒 主效逆上氣胃中寒 欬逆氣
 聖毒痿廢安五藏 疥效唾膿血止喘悸五勞體虛補下

足小兒驚癇一名紫菀一名青苑生房陵山谷及真

邯鄲二月三月採根陰乾

有生布地花亦紫木白根細柔細有白者名白苑不復用
 注云白苑即女苑也 瘰癧與紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不
 用或足未悉 日馬 瘰癧與紫苑同無紫苑時亦用白苑陶云不
 虛下氣及腎脊通氣治白邪鬼魅勞心虛熱 日華子云調中及
 吐血消痰止渴潤肌膚添骨髓 圖經曰紫苑生房陵山谷及真
 似重臺根作節紫色潤較者佳 定邯鄲今耀成如壽

孟州興國軍皆有之三月內布地生苗葉其葉三四相連五月六月
 內開黃紫白花結黑子本有白毛根甚柔細二月三月內取根

用又有一種白者名白苑蘇恭云白苑即女苑也瘰癧並同無紫苑
 時亦可通用女苑下自有條今人亦稀用古今傳信方用之最要

療久數不差此方甚佳紫苑去蘆頭欬冬花各一兩百部半兩
 搗羅為散每服三錢匕生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後服
 各一 唐本餘 治氣喘 雷公云 日羊鬚草自然不同採得

願土了用東流水淘洗令淨用蜜浸一宿治婦人
 至明於火上焙乾用凡修一兩用蜜二分小便紫
 并花水服三撮便通治喉風喉閉飲食不通
 小便血脈五撮立止斗門方
 惡延出即差神効更以馬牙清津燕之即絕行義曰
 根本一名紫莢又兩中呼為液牽牛是也單州武進
 益肺氣經具言之唐本注言無紫莢時亦用白菟白菟即
 女菟也今本草無白菟之名蓋唐修本草時已刪去

紫草



紫草味苦寒無毒生... 氣五種補中益氣利九

竅通水道療腹腫脹滿痛以合膏療小兒瘡及面皴

切加一名紫丹... 生礪山山谷及楚地三月採

根陰乾... 梁紫者方藥家都不復用博物志云平氏陽山紫草特好

魏國以紫色殊黑比年東山亦種色小淺於此者唐本草云紫草所

在皆有爾雅云一名菝苗似藟香莖赤節青花紫白色而實白

錫等... 云紫草亦可單用味甘平能治... 圖經曰

云紫草亦可單用味甘平能治... 紫草生陽山山

處有之人家園圃中或種時其根所以染紫也爾雅謂之藟廣雅謂

之菝莢苗似蘭香莖赤節青二月有花紫白色秋實白三月採根陰

乾古方稀見使今醫家多用治傷寒時疫發瘡癩不出者以此作藥

使其發出韋宜獨行方治豌豆瘡紫草湯飲後人相承用之其効

雷公云

聖惠方

經驗後方

凡使須用鐵水蒸之待水乾取去頭并兩畔細剉

治惡蟲咬人用紫草油塗之

治嬰兒童子患疥豆疾用紫

草二兩細剉以百沸湯一大

蓋泡便以物合定勿令氣漏放如人體溫量兒
大小服半合至一合服此瘡雖出亦當輕減

終州前胡



江寧府前胡



連州前胡



淄州前胡



前胡味苦微寒無毒主療痰滿脅脅中痞心腹結氣風
頭痛去痰實下氣治傷寒熱推陳致新明目益精二

月八月採根暴乾

半夏為之使惡皂莢畏藜蘆

品有莖胡而無此晚來醫乃用之亦有畏惡明畏惡非盡出本經也
此近道皆有生下濕地出長脚者為勝
胡使味甘辛能去熱實下氣主時氣內外俱熱單者服佳
治一切勞下一切氣止嗽破癥結開胃下食通五藏主霍亂轉筋骨
節煩悶反胃嘔逆氣喘安胎小兒一切疳氣
越備發時等處皆好七八月採外黑裏白

圖經曰

前胡舊不著所出州土今

陝西梁漢江准荆襄州郡及相州孟州皆有之春生苗青白色似斜蒿初出時有白芽長三四寸味甚香美又似苣蒿七月內開白花與蔥花相類八月結實似細青紫色二月八月採暴乾今鄆延將來者大與紫胡相似但紫胡赤色而脆前胡黃而柔較不同耳一說今諸方所用前胡皆不同京師北地者色黃白枯脆絕無氣味江東乃有三四種一種類高歸皮斑黑肌黃而脂稠氣味濃烈一種色理黃白似人參而細短香味都微又有如草烏而虛黑而堅有兩三蔓為一本者食之亦戟人咽喉中破以薑汁漬搗服之甚下搗碎皮實然皆非前胡也今最上者出吳中又壽春生者皆類紫胡而大氣芳烈味亦濃苦燥痰下氣最要都勝諸道者

雷公云使勿用野蒿根緣真似前胡只是味粗酸若誤用令人胃反不受食若足前胡味其微苦凡修事先用刀刮上蒼黑皮并鬚土了細剉用甜竹瀝浸令潤於外臺秘要治小兒夜啼前胡搗篩蜜丸如小豆口中燃乾用之

江寧府敗醬



敗醬味苦鹹平微寒無毒主暴發及瘡赤氣疥癩疽

青馬鞍熱氣除癰腫浮腫結熱風痺不足產後疾痛

一名鹿腸一名鹿首名馬草一名澤敗生江夏川谷

八月採根暴乾雷公云出近道葉似稀莧根似芷胡氣

生尚弱間卑似水良及敗醬生花黃根紫作味苦色其禁外不似

稀莧也臣禹錫等論云敗醬是也味辛苦微寒治

毒風癰疽主破多年痲血能化膿為水及產後諸病止腹痛餘疹煩

渴日華子云味酸治赤眼得膜勞內障耳血氣心腹痛破癥瘕產前

後諸疾能生落胎而彈排膿補虛羸其吐血方圖經口敗醬生江

白帶下瘡瘕疥癩丹毒又各酸益七八十月採雷公云今

江東亦有之多生尚嫩間葉似水良及微淘葉生花黃根紫色似紫

胡作陳敗豆醬氣故以為名八月採根暴乾用張仲景治癰腫腹有

公去

只使收得後便鹿角入甘草相拌對雷

物搗為末取方寸匕以水二外煎取一分附子二分收醬五分

繞腰者煎敗醬汁塗之差

江寧府白鮮



涇州白鮮



白鮮味苦性寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中

腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生

上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾惡增則其根更苦

道處有以蜀中者為良俗呼為白羊鮮氣息正似羊糞或名白羶唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實花紫白色

根宜二月採若四月五月採便虛惡也目為錫等謹按藥性論云白

鮮皮臣治一切熱毒風惡風風癘疥癬赤爛疥癩脫皮肌急壯熱

惡寒主解熱黃酒黃急黃軟黃勞黃等良曰華子云通關節利九竅

及血脈并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼癢根

皮良花功用同上亦可圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河中

作菜食又名金雀兒椒江寧府涇州潤州亦有之苗高尺

餘草青藥稍白如槐亦似某黃四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓

菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又去宜二月採差晚則虛

惡也其氣息都似羊糞故俗呼為白羊鮮又名地羊糞又名金爵兒

嫩其苗山人以為菜茹葛州治鼠瘻已有口膿血出者白鮮皮煮汁

服一外當吐鼠子乃愈李兵部手

酸漿



酸漿味酸平寒無毒主熱煩滿定志益氣利水道產

難吞其實立產一名醋漿生荆楚川澤及人家田園中

五月採陰乾

陶隱居云處人家家多有葉亦可食子作房房中

黃病多效目... 治黃病多效爾雅云葳蕤... 酸漿草江東人呼曰苦蕒

經曰

酸漿生荆楚川澤及人家田園中今處處有之苗似水茄而

兒食之尤有益可除熱根似菹芹色白絕苦搗其汁飲之治黃病多

效五月採陰乾爾雅所謂葳蕤音針寒漿郭璞注云今酸漿草江東人

呼為苦蕒是也千金方治婦人赤白帶下三葉酸草靈苑方治

今醫方稀用

患諸淋遺瀝不止小便赤澀疼痛三葉酸漿草人家園林亭檻中著

地開黃花味酸者是取嫩者淨洗研絞自然汁一合酒一合攪湯煖

滁州紫參



晉州紫參



濠州紫參



眉州紫參



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN

紫參味苦辛寒微寒無毒主心腹積聚寒熱瘧疾通

九竅利大小便療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫

諸瘡止渴益精一名牡蒙一名衆戎一名童腸一名馬

行生河西及兔甸山谷三月採根火炙使紫色畏辛夷

云今方家皆呼為牡蒙用之亦少唐本注云紫參葉似羊蹄紫花青穗

皮紫黑肉紅白肉淺皮深所在有之牡蒙葉似及已而大根長尺餘

皮肉亦紫色根苗並不相似雖一名牡蒙乃王孫也紫參京下見用

者是出蒲州也目為錫等謹按吳氏云牡蒙神農黃帝苦李氏小寒生

河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫五月華紫赤實黑大如

巨露性論云紫參使味苦能散瘀血主心腹堅脹治婦人血閉不通

紫參本

似槐葉亦有似羊蹄者五月開花白色似蔥花亦有紅紫而似水慈者根皮紫黑肉紅白色肉淺而皮深三月採根火炙令紫色又云六月採曬乾用張仲景治痢紫參湯主之紫參半斤甘草二兩以水五升煎紫參取二升內甘草煎取半升分溫三服

云州紫參本



威勝軍紫參本



寧化軍紫參本

紫參味辛苦溫微溫微寒無毒主婦人血虛陰中寒腫

痛腹中急除風頭痛長肌膚悅顏色辟霧露潤澤療

風邪痺曳金瘡可作沐藥面脂。實主風流四肢一名鬼

御一名地新 一名微莖生崇山谷正月二月採根暴乾

三十日成 惡菌茹 陶隱居云浴中皆用芎藭根其氣乃相類

而桐君藥錄說芎藭苗似葉本論說花實皆不同所生

處又異今東山別有葉本形氣甚相似惟長大爾陶隱居云葉本莖

根味與芎藭別以其根上苗下似葉根故名葉本今出宕州者佳

也 目 論云葉本日微溫畏青葙子能治一百六十

種惡風風在流八腰痛冷能化小便通而去頭風野地 日華子云治


痲疾并皮膚癢 圖經曰 葉本生崇山谷今西川河東州郡及宛

州治驢粉判 州杭州有之葉似白芷 百又似芎藭但芎

藭似水芹而大葉本葉細耳根上苗下似禾葦故名之五月

至白花七八月結子根紫紅色正月二月採根暴乾三十日成

海州石韋



石韋味甘平無毒主勞熱氣五癆閉 通利小

便水道止煩下氣通膀胱滿補五勞安五藏去惡風

積氣 一名石韋 以凍 一名石皮用之去黃毛毛射人肺

令人欬不可療生華陰山谷石上不開水及人聲石良

二月採葉陰乾 得是補良陶隱居云蔓地石上生葉皮名

石韋 陶隱居以不開水聲人聲者為佳出建寧者葉長丈而可

本草云此物叢生石傍陰處不受延生生古瓦屋上名石韋用煎

亦好也 目 論云石韋使微寒治勞及石韋 圖

經曰 石韋生華陰山谷石上今晉絳餘海福州 江寧府皆有之叢

生石上葉如柳背有毛而斑點如皮故名以不開水聲者

良二月七月採葉陰乾用南中醫人炒末冷酒服療發痔甚効石

韋一名石皮而福州自有一種石皮三月有花其 採葉煎治腸去風

又有生古瓦屋上者 名石韋用治淋亦佳 荆門軍草辭

興元府草解



成德軍草解



印州草解



草解味甘平無毒主腰背痛強骨節風寒濕痺惡

瘡不瘳熱氣傷中悲陰痿失溺閉節老血老人五緩一

名赤節生真定山谷二月八月採根暴乾慧效為之使畏

牛蠲毒居今今與有似效莫而小異根大不甚有角節色小

為勝單似署爾蔓生目等藥等按藥性論云草能治冷風痺腰

補水藏堅筋骨益精明口中風失音時人呼為白菽黃白多節三指許大

亦有無花結白子者春秋採根暴乾舊說此藥有二種莖有刺者根

白質無刺者根虛軟以較者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體


硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜不拘時月採其根用利刀切作片子

十四分合杜仲八分搗篩每旦酒和服三錢匕

如聖散草解細劉買眾逐葉擊下了去土等

孫尚藥 治腸風痔

杜衡



杜衡味辛溫無毒主風錢欬逆香入衣體生山谷三月

三日採根孰洗暴乾

杜衡之方藥少用惟道家服之令人身衣

百山海經云可療癩瘡本注云杜衡葉似葵形如馬蹄故俗云馬蹄

已獨草莖端四葉葉卵白似細辛白而青今俗以及已代之謬矣

齊不可亂杜衡也目古藥書云杜衡有毒服之令人吐酸瘡瘡

香山無經云天帝山有草其葉如葵其臭如藤藟名曰杜衡可以入馬

之已慶郭璞注云帶之令人便馬或曰馬得之而健走藥性論云

香氣小異而根亦黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香三月三日採

日走衡可以走馬食之已癩郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之

而健走爾雅謂之杜又名土鹵然杜若亦名杜衡或疑是杜若據郭

璞注云似葵而香故知是杜衡行義曰杜衡用根似細辛但根色

比今人用作浴湯及衣香其佳性細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜衡與細辛相對

便見其偽况細辛性出華州者良杜衡其色黃白拳扁而脆乾則依圓

滁州白薇



白薇味苦鹹平大寒無毒主暴中風身熱肢滿忽忽

不知人狂惑邪氣寒熱酸疼溫瘧洗先發作有時瘰

溪中淋露下水氣利陰氣益精一名白菴一名菴草一
 次春草一名骨美久服利人生平原川谷三月三日採
 根陰乾惡黃者大黃大戟乾葛山茱萸大麥圖經云近道
 有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月結實根黃
 色類牛膝而短小三月三日採根陰乾用今云八月採
 去凡採得後用糯米泔汁浸一宿至明取出
 去鹽了於楓砧上細剉熟從已至申出用

成德軍菝葜



海州菝葜



江州菝葜



江寧府菝葜



菝葜蒲八切 葉八切味甘平溫無毒主腰背寒痛風痺益血氣

止小便利生山野二月八月採根暴乾圖經云此有三種大略根苗並相

類菝葜莖紫短小多細刺小莖草薺而色深人用作飲唐本草云陶
 云三種相類非也草薺有刺者葉粗相類根不相類草薺細長而白菝
 葜根作塊結黃赤色殊非狗脊之流也目録云云治
 時疾瘋瘡葉治風腫止痛撲損惡瘡以鹽塗傳信又名金剛根又名

玉瓜 **圖經**曰 獲藥舊不載所出州土但云生山野今近京及江浙
 草 州郡多有之苗莖成蔓長二三尺有刺其葉如冬青
 烏藥葉又似菱葉差大秋生黃花結黑子攪挑許大其根作塊赤黃色
 二月八月採根暴乾用江浙間人呼為金剛根浸赤汁以煮粉食云
 噉之可以辟瘴其藥以鹽搗傅風腫惡瘡等俗用有效
 田舍貧家亦取以釀酒治風毒脚弱痺滿上氣殊佳

信州大青



大青味苦大寒無毒主療時氣頭痛大熱口瘡三四月採
 莖陰乾 **陶隱居**云療傷寒方多用此本經又無今出東境及近道
 不獨用莖也 **日華子**云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風癩天行
 寒熱 **日華子**云治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風癩天行
 熱疾及金石毒 **圖經**曰 大青舊不載所出州土今江東州郡及
 毒非塗罽腫毒 **圖經**曰 南眉蜀濠濳諸州皆有之春生青紫莖似石

竹苗葉花紅紫色似馬蔘亦似芫花根黃三月四月採莖葉陰乾用
 古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根
 湯亦用大青大熱
 時疾藥多用之

女萎



女萎味辛温主風寒洒洒霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無
 常驚瀉寒熱百病出汗李氏本草云止下消食 **唐本附**

似白敏蔓生花白子細荆襄之間名為女萎亦名蔓蕤止痢有效用
 苗不用根與萎蕤全別今太常謬以為白頭翁者是也唐本先附
圖經 文具萎蕤條下 **雷公云** 凡採得陰乾去頭并白藥於槐砧上剉
 拌豆淋酒蒸從已至未出點令乾用

石香菜



石香菜味辛香温無毒主調中温胃止霍亂吐瀉心腹脹
滿臍腹痛腸鳴一名石蘇生蜀郡陵榮資簡州及南中
諸處在山巖石縫中生二月八月採苗莖花實俱用附今
衍義曰石香菜與石蘇有之不必山巖石縫中但山
中臨水附崖處或有之九月十月尚有花

二十二種陳穢器餘

兜納香味甘温無毒去惡氣温中除暴冷廣志云生剽
國魏略曰大秦國出兜納香謹按廣志云生西海
海藥諸山味辛平無毒主

治癰腫癩止痛生肌並入膏用燒之能辟邪近惡氣帶
之夜行壯膽安神與如香柳枝合為湯浴小兒則易長

風延母味苦寒無毒小兒發熱發強驚癩寒熱熱淋解
煩利小便明目主地大毒惡瘡癰腫黃疸並煮服之綱
蔓生纓繞草木南都賦云風行蔓延於衡臯是也海

謹按徐表南州記生南海山野中主三消五淋下痰小兒赤白
毒痢蛇毒癩瘡等毒一切瘡腫並煎服祇出南中諸無所出也

新香味辛温無毒主臭鬼氣調中生烏澗國南方草木
狀曰耕香莖生細葉

大瓠藤水味甘寒無毒主煩熱止渴潤五藏利小便藤

如斷之水出生安南太康地記曰朱崖儋耳無水處

用此藤取汁用之海藥云謹按太原記云生安南朱崖

香美主解大熱止煩渴潤
水逆後入造飲藥皆效也

子根味苦温無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣
注刺痛霍亂蠱毒暴下血腹冷不調酒飲磨服生四明山
苗意尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子
土芋味甘寒小毒解諸藥毒生研水服當吐出惡物盡便
止養食之甘美不飢厚人腸胃去熱噉蔓如豆根圓如
卵鵝鳩食後彌吐人不可食

根味辛温去惡氣温中消食生安南人種為茹南方

草本狀白合浦有浸殿人種之以薑醬汁食芳香味

土草味甘温無毒主腹冷疼氣疼作煎酒亦搗絞

汁酒服藥如長生嶺南山谷工人服之

草味甘温無毒主冷氣腹內久寒食之不消令

人能食字林曰倬辛菜南人食之去冷氣

必似勒味辛温無毒主冷氣胃閉不消食心腹脹滿

生崑崙似馬蘭子

胡面莽味甘温去痰癖及冷氣止腹痛煮之生嶺南葉

如地黃

海蘊味鹹寒無毒主癭瘤結氣在喉間下水生大海中

細葉如馬尾似海藻而短也

百丈青味苦寒平無毒主解諸毒物天行瘴瘧疫毒

並者服亦生楊絞汁生江南林澤藤蔓緊硬葉如署預

對生根服令人下痢

斫合子無毒主金瘡生膚止血搗碎傅瘡上葉主自熱

赤按碎滴目中云昔漢高帝戰時用此傳軍士去瘡故
云研合子離落間藤蔓生至秋霜子如柳絮一名薰桑
一名鷄腸

獨自草有大毒前傳箭鏃人中之立死生西南夷中獨
莖生續漢書曰出西夜國人之輒死今西南夷獠中
猶用此藥傳箭鏃解之法在拾遺石部鹽藥條中

金釵股味辛平小毒解諸藥毒人中毒者煮汁服之
亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰癰瘡天行
蠱毒喉閉生嶺南山谷根如細辛三四十莖一名三十
根釵子股嶺南人用之

博洛迴有大毒主惡瘡癰根癩贅癭肉白癩風蠱毒精

魁溪毒已上瘡癩者和百文青雞桑灰等為末傅癩瘡
蠱毒精魁當有別法生江南山谷莖葉如草麻莖中空
吹作聲如博洛迴折之有黃汁藥人立死不可入口也

毛建草及子味辛溫有毒主惡瘡癰腫痲痛未潰前擣
葉傅之不得入瘡令人肉爛主瘡令病者取一握微碎縛
臂上男左女右勿令近肉便即成瘡子和薑搗破破
冷氣田野間呼為猴蒜生江東澤畔葉如芥而大上有
毛花黃子如蒺藜又有建有毒生水旁葉似胡芹未
聞餘功大相似

數低味甘溫無毒主冷風冷氣下宿食不消脹滿生西
蕃北土亦無有似茴香胡人作羹食之

仰益味辛溫有小毒主蠱飛尸喉閉水磨服少許亦
磨傅皮膚惡腫生東陽山谷苗似承露仙根圓如仰盆
子大如鷄卵

離草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒
熱大腹痞滿痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出背
膈間宿物生人家階庭濕處高三二寸苗葉似幕靡去
瘡為上江東有之北土無

盧藥味鹹溫無毒主折傷內損血瘀生膚止痛主產後
血病治五藏除邪氣補虛損乳及水者服之亦擣碎傅
傷折處生胡國似乾茅黃赤色

重修政和經史證類備用本草卷第八

重修政和經史證類備用本草

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第

成 都 唐 慎 微 續 證 類

唐 蘇 頌 撰 經 史 證 類 備 用 本 草 卷 第 一 臣 曹 孝 奉 敕 校 勘

草部中品之下總七十八種

一十四種神農本草經白字


一十三種名醫別錄墨字

一十二種唐本先附注云唐附

二十二種今附皆醫家書用有效注云

四種新補

二種新定



一種新分條

十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

艾葉

實續注

惡實

牛蒡藥續注

水萍

王瓜

地榆

大小薊

海藻

石帆水松石
髮瓦松續注

澤蘭

昆布

紫菜續注

防已

木防已
續注

天麻

附今

阿魏

附唐

高良薑

百部根

懷香子

亦名茴香
唐附

款冬花

紅藍花

紅花也
今附

牡丹

京三稜

今附雞爪
三稜等附

薑黃

唐附
續注

華撥

根續注
今附

茵

音矩
附唐

蘿摩子

附唐

青黛

附今

鬱金

附唐

盧骨

附今

馬先蒿

延胡索

附今

肉豆蔻

附今

補骨脂

附今

零陵香

附今

縮沙蜜

附今

蓬莪茂

有律切
今附

積雪草

連錢
附

白前

薺芫

白藥

附唐

荳草

莎草

根即香附子也
水香稜附

萹澄茄

附今

胡黃連

附今

船底苔

新

紅豆蔻

附今

蔣蘿

附今

艾納香

附今

甘松香

附今

垣衣

地衣
續注

陸釐

音商

鳧葵

苦菜也
唐附

女苑

王孫

土馬鬃

新

蜀羊泉

菟葵

附唐

薺草

附唐

鱧腸

蓮子草也
唐附

爵林

今名

井中苔萍

茅香花

馬

使君子

附今

乾苔

補新

百脉根

附唐

白豆蔻

附今

地笋

補新

海帶

新定

陀得花

附今

翦草

元附白藥條下今分條

一十種陳藏器餘

迷迭

故魚網

故繳脚布

江中採出蘆

虱建草

含生草

菟肝草

石芒

蠶網草

問荆

明州艾葉



艾葉味苦微温無毒主灸百病可作煎止下痢吐血下部

蟹瘡婦人漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子一名冰

臺一名醫草生田野三月三日採暴乾作煎勿令見風

居云博葉以灸百病亦止傷血汁又殺蚊蟲苦酒煎藥療癰甚良

本注云別錄云艾生寒熱主下血衄血腫血痢水煮及丸散任用

治癰止赤白痢及五藏痔瀉血煎藥主吐血實主明目療一切鬼氣

初生取作乾菜食之又除鬼氣炒艾作餅飽吞三五枚以飯壓之良

長服止冷痢又心腹惡氣取葉搗汁飲又搗末和酒服末為丸服三

十九飯歷日再服治一切冷氣鬼邪毒氣去惡氣云艾實與乾
薑為末蜜丸消一切冷氣田野人尤與相宜云止痛神效治
心痛鼻衄并帶下及患痢人後分寒熱急痛和燥并詞圖經曰艾
子燒熏神驗艾實暖無毒壯陽助水藏腰膝及暖子宮
舊不著所出州土但云生田野今處處有之以複道者為佳云此種
灸百病尤勝初春布地生苗類蒿而葉背白以故短者為佳三月
三日五月五日採葉暴乾經陳久方可用俗間亦生摘葉取汁飲止
心腹惡氣古方亦用艾煎艾湯金瘡又中風痺痛不仁不隨並以艾
斛許無團之內瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處苦飲目下燒
艾一時以知矣又治癩取艾隨多少以艾煎酒如常法飲之覺
痺即差近世亦有單服艾者或用蒸木瓜丸之或作湯空腹飲之甚
補虛羸然亦有毒其毒發則熱氣衝上狂躁不能禁至攻眼有瘡出
血者識不食瘡云乾餅子并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為
可安服也

食瘡 乾餅子并煎者金瘡崩中霍亂止胎漏春初採為
前甚治冷苦患冷氣取艾煎艾湯或作餅餅可大如彈許又治百惡氣
取其子和葛葛搗作末蜜丸如梧子大空心三十九丸服以飯三五匙
也又產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熟老生薑半兩煎湯一服
便止

外臺秘要 治霍亂洞下不止艾一把
妙一斗者取四外 肘後方 鬼擊之病得之無漸卒著人如刀刺狀
稍飲之良

血鼻中出血下血一名鬼刺以熟艾如
鷄子三枚水五外煎取二外頓服之 又方 治卒心痛白熟艾或
者取一外去淨搗服若為 又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈
客氣所中者常吐蟲物 又方 治傷寒及時氣溫病頭痛壯熱脈
外去淨頓 又方 治病人齒無色舌上白或喜睡不知痛痒處或下
服取汗 又方 治急治下痢不曉此者但攻其上不以為意下部
生蟲食其肚爛見五藏便死燒艾於 葛氏方 治蛇蟲或心如刺
管中熏下部令煙入更入小雄黃良 又方 治吐清水棉生艾
取汁宿勿食但取肥香脯一方寸片先 又方 治腰痠或胎轉搶心
與令蟲聞香然後即飲一外蒿下梳 又方 治喉痺青艾和莖葉一握
或下血不止艾葉一鷄子大以 經驗方 治喉痺青艾和莖葉一握
酒四外煮取二分分為二服良 又方 治喉痺青艾和莖葉一握
乾艾亦得 又方 王岐州傳野雞痔病方用槐柳湯洗便以艾灸其
李亞傳 又方 上七壯以知為度王及部中充西川安無判官乘
驟入洛谷數日而痔病因是大作如胡菰貫於腸頭其熱如燒煖火
至一驛傳什無計有主郵者云須灸即差及命所使為槐柳湯熱洗
或上因用艾灸三五壯忽覺一道熱氣盛入腸中因大 孫真人 後
轉瀉鮮血穢物一時出至楚痛瀉後遂失胡菰所在 孫真人 後
有血濃煎艾葉 斗門方 治火眼用艾燒令煙起以碗蓋之候煙上
生薑汁三合服 又方 治癩癩用艾於陰囊下敷道 勝金方 治中風口喎
入黃連 又方 正門當中間隨年歲灸之 勝金方 以葦筒子長
甚妙

五寸一頭刺於耳內四面以麪密封塞不透風一頭
以艾灸之七壯患右灸左患左灸右耳痛亦灸得
中連日不止熱艾鷄子大阿膠炒為末半兩乾薑一錢劉右以水
五盞先煮艾薑至二盞半入膠消揚湯分三服空腹服一日盡

部手集 治發背頭未成瘡及諸熱腫以濕紙摺上先乾與是熱
氣衝上欲作瘡子便灸之如先疼痛灸即不痛即以痛

錢相公篋中方 治誤吞錢取艾蒿一把細剉用
水五升煎取一升煖服便下

傷寒類要 治婦人姓娥七月若傷寒壯熱赤斑變為黑斑溺血
用艾葉如雞子大酒三升煮取一升半分為二服

又方 墮蟲蝕
泥作甕以竹筒如指大一頭坐甕缸中一頭內下部孔中以雞子
大艾一團燒之以泥作甕口吹之常令艾煙熏下部強人可益久良

母秘錄 胎動上迫心痛取艾葉如雞子
大以頭醋四升煎取二升分溫服

又方 治倒產子死腹中
煮取一 艾葉黃芩各燒
外服 艾葉灰傳

荆楚歲時記 端午四民踏百草
戶上穢毒氣又宗士炳之祿常以端午
日雞未鳴時採似人者縛於灸有驗

衍義曰 艾葉乾搗篩去青滓取白入石硫黃為硫黃艾灸家
用得米粉少許搗為末入服食藥入硫黃別有法

蜀州惡實



蜀州惡實

惡實味辛平主明目補中除風傷根莖療傷寒寒熱汗
出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老生魯山平澤

陶隱居 云方藥不復用

子殼似粟狀實細長如芫荽子根主牙齦疼痛癆瘵脚氣弱風毒癰

疽効嗽傷肺腫面癢積血主諸風癢癩令氣吞一技出癰疽頭別

錄名牛蒡一名用粘草本按陳藏器本草云惡實根莖乾不爾令

人欲吐浸酒去風又主惡瘡子名鼠黏上有艾葉葉味苦主風毒
腫諸瘡根可作茹食之葉亦搗傅杖瘡不腫辟風
性寒云牛蒡亦可單用味甘無毒主面目煩悶四肢不健通十二經
脉沈五藏惡氣可常作菜食之令一身輕子研末投酒中浸三日每

日服三二蓋任性飲多少所請風去丹石毒主明目利腰脚又食煎
吞三枚熱接下散諸毒節筋骨熱毒又根細切如豆麩拌作飯食
之消脹壅又莖葉煮汁釀酒良又取汁夏月多浴去皮間習習如蟲
行風洗了慎風少時又能搗一切腫毒用根葉入少許益花膏

圖經曰

惡實即牛蒡子也生魯山平澤今處處有之葉如芋而長
實似葡萄核而褐色外殼如栗抹小而多刺鼠過之則緩

惹不可脫故謂之鼠粘子亦如羊負束之比根有極大者作菜茹尤
益人秋後採子入藥用根葉亦可生搗入少蓋花以搗腫毒又冬月
採根蒸暴之入藥劉禹錫傳信方療暴中風用緊細牛蒡根取時須
避風以竹刀或荊刀刮去十用生布拭了絞取汁一大外和灼然

好蜜四大合溫分為兩服每服相去五六里初服得汗汗出便差此
方得之岳鄂鄭中丞鄭頊年至頴陽因食一頓熱肉便中暴風外生
廬氏為頴陽尉有此方當時使服得汗隨差神效又篋中方風頭及
腦掣痛不可禁者摩膏主之取牛蒡草搗取濃汁二外合無灰酒
一外蓋花一匙頭燒火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦主
時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效冬月無苗用根代之亦可

雷公云

凡使採之淨揀勿令有雜子然後用酒拌蒸待上有
薄白霜重出却用布拭上然後焙乾別搗如粉用

療云

根作肺食之良熱毒腫搗根及葉封之杖齋金瘡取葉貼之
永不畏風又難緩及丹石風毒石熱發毒明目口利腰膝則

取其子末之投酒中浸經三日每日飲三兩蓋隨性多少欲散支節
筋骨煩熱毒則食前取子三七粒熟後吞之十服後甚良細切根如

小豆大其種作餅者食亦良又皮毛間習習如虫行者煮根汁
浴之便消風如入其子炒過木之如茶煎三七通利小便 **聖惠**
方 治時氣餘熱不退煩發渴四肢無力不能
飲食用根搗取汁不計時候服一小蓋効外臺秘要治
痺牛蒡子六分馬蘭子八分搗為散每空 **經驗方** 治風熱閉塞咽
心暖水服方寸匕漸加至 **七半日再服** 喉痛身浮腫以
牛蒡子一合半生半熟拌為 **孫真人食忌** 主天行以生牛蒡根搗
末熱酒調下一錢七立差 **食醫心鏡** 治熱攻心煩
兩服服訖取桑葉一大把炙令黃水一外
者取五合去滓頓服暖覆取汗無華用枝 **食醫心鏡** 治熱攻心煩
勞損出汁一外食 **斗門方** 治頭面忽腫熱毒風內攻或手足頭面
後分爲三服良 **赤腫** 解若痛用牛蒡子根一名編蝠刺
游名編蝠研酒煎成膏攤在紙上貼 **王氏博濟** 治瘡癩疔出以牛蒡
腫處仍執酒調下一服腫止痛滅 **初虞世** 治皮膚風熱遍身生
服一錢入荆芥二穗水一盞同煎至 **初虞世** 治皮膚風熱遍身生
七分放溫服如瘡癩已出更服亦妙 **初虞世** 治皮膚風熱遍身生
分以薄荷湯調 **初虞世** 治皮膚風熱遍身生
下二錢日二服

衍義曰

惡實異于也今謂之牛蒡未去莖時又謂之鼠粘子根謂
之牛蒡疎風癰疽多咽腫不利微炒同入荊芥穗各兩

其草炙半兩同為末食後夜臥湯點二錢服當緩取效子在莖中莖
上有細鈎後至百十謂之莖則誤矣根長三尺能如細搗者爛為菜

水萍



水萍味平酸寒無毒主暴熱身痒下水氣勝酒長

隨髮止消渴下氣以沐浴生毛髮又服輕身一名水花一

名水白一名水蘇生雷澤池澤三月採暴乾陶隱居云此是水中大萍爾非

今浮萍子榮錄云五月有花白色即非今滿渠所生者楚王渡江所得非斯實也唐李時珍云水萍者有三種大者名蘋水中又有荇菜亦相似而葉圓闊寸許葉下有一點如水沫一名某某暴乾與荇菜亦大者口荇菜圓闊寸許葉下有一點如水沫一名某某暴乾與荇菜亦等分以人乳為丸主消渴瘧疾取汁飲主喉咬毒入腹亦可傳熱瘧小萍子其葉圓用者末傳而煎汁服之主水腫利小便又人中毒取萍子葉乾酒服方寸匕又為膏長鼠本經云水萍應是小者臣高楊葉謂之爾雅云萍萍其大者蘋注水中浮萍江東謂之萍陸機

毛詩義疏云其鹿大者謂之蘋小者曰萍春季始生可慘蒸為茹又可苦酒淹以就酒曰萍子云治熱毒風熱疾熱狂癩腫毒湯火瘡風癩

圖經曰水萍生雷澤池澤今處處溪澗水中皆有之此是水中大萍華其大者曰蘋是也周南詩云于以采蘋陸機云海中浮萍鹿大者謂之蘋春季始生可慘蒸以為茹又可用苦酒淹以按酒三月採暴

乾蘇恭云此有三種大者曰蘋中者荇菜即下鳧葵是也小者水上浮萍即溝渠間生者是也大蘋今醫方鮮用浮萍俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍草一兩四月十五日者麻黃去節根桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六分不計時候和滓熱服汗出乃差又治惡疾遍身瘡者取水中小浮萍濃煮汁漬浴半日多效此方甚奇古也

聖惠方治少年面上起細胞接浮萍又方發背初得毒腫焮熱盒之亦可飲少許汁良也赤爛瘡和鷄子清貼

之千金方治中水毒手足指冷即是或至千金翼勝脫水氣流滯以浮萍口乾末服孫真人食忌五月取浮萍陰乾燒煙去蚊

子母秘錄熱毒浮萍瘡高供奉採萍時日歌不在山不在

癩風與緩風此小微風都不算巨淋酒內下三九鐵樽頭上也出汗

採萍我之時七月半選其

均州王瓜



王瓜味苦寒無毒主消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼

益氣愈毒療諸邪氣熱結鼠癩散癰腫留血婦人帶

下不通下乳汁止小便數不禁逐四股骨節中水瘰馬

骨刺人瘡一名土瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間

三月採根陰乾陶隱居云今土瓜生籬院間亦有子熟時赤如

大方正單行小小兩禮記月令云王瓜生此之謂也鄭玄云菘蕘殊為

膠矣厚本注云此物蔓生葉似括樓圓無義缺子如槐子生青熟亦

但無凌兩根似葛細而多條此間者累累相連大如棗皮黃肉白苧

子相似根狀不同試療黃疸破血而者大勝也今按陳藏器本草云

丁瓜主蠱毒小兒閉辟疔滿并瘡取根及葉將絞汁服當吐下宜少

進之有小毒故也區南錫等雜說云鉤藤姑釋曰鉤一名藤姑

郭云鉤藤也一名王瓜實如的瓜正力味苦藥性論云土瓜根使平

病生用肺癆吐血腸風瀉而赤白痢炒用又云土瓜根通血肺天行

熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧熱勞治撲損消痰血破癥

瘕瘵

圖經曰王瓜生魯地平澤田野及人家垣墻間今處處有之

如毛五月開黃花在下結子如彈丸生青熟亦根似葛細而多條謂

之土瓜根其間者其實累累相連大如棗皮黃肉白苗葉都相似但根

狀不同耳三月採根陰乾均房間人呼為老鴿瓜亦曰菘瓜謹按兩

雅曰黃羊善切菘瓜郭璞注云似土瓜而土瓜自謂之藤與藤同菘

聖惠方

治黑疸多死宜急治用瓜根

小兒四歲發黃生瘡絞汁

三合與飲不過三飲已

黃水隨小便出外臺秘要治蠱土瓜根大如母指長三寸切

時後

方治黃疸癰疽疔毒不能治土瓜根汁換服一方治小便不

方生去根搗取汁以少水解之高中吐下取通產書下乳汁土瓜根為

衍義曰王水體如栝樓其殼徑寸一種長二寸許上微圓下尖長

七八月開紫紅色殼中子如蠟蟬頭者今人又謂之赤

江寧府地榆



衡州地榆



地榆味苦甘酸微寒無毒主婦人乳癰痛七傷帶下病止

消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏生桐栢及冤句山

谷二月八月採根暴乾得賦良惡麥門冬去今近道處處

色如政故名王破一莖長直上根亦入釀酒道方燒作灰能爛石也

受暑時用藥作餅亦好別本注云今人止冷熱劑及疔熱極

效臣禹錫等謹按藥性論地榆味苦平能治產後餘瘀痛七傷

治金瘡止血痢血腫痛今方用共樹皮同療赤白痢日華子云

排膿止血鼻共月經不血崩產前後諸血疾赤白崩并圖經

水瀉濃煎止腸風但足平原川澤皆有獨莖花紫七八月採

曰地榆生桐栢及冤句山谷今處處有之宿根三月內生的初生

色七月開花如椶子紫黑色根外黑裏紅似柳根二月八月採暴乾

藥不用山人之若時採此藥作飲亦好古斷下方多用之葛氏載徐

平療下血二十年者取地榆尾草各三兩水二外煮半頓服不斷

藏堅六日子門解七日合陰陽悉痛八日小腹寒痛九日子門閉子

日子宮冷十日夢與鬼交十二日五臟不定用藥作飲代茶甚解熱

絞濾空腹服唐本注云主帶下十二病孔氏音義云一日多赤二

三合日再日多白三日月水不通四日陰蝕五日子

藏堅六日子門解七日合陰陽悉痛八日小腹寒痛九日子門閉子

日子宮冷十日夢與鬼交十二日五臟不定用藥作飲代茶甚解熱

聖惠方

治婦人漏下赤白不止令人黃瘦虛渴以地榆三兩細對米醋一外煮十餘沸去滓食前稍熱服之亦治吐血

千金翼

伐指逆腫單者地榆作湯漬之半日愈

葛氏

毒地榆人樽地榆根絞取汁飲之無以清澆

齊民要術

地榆汁釀酒治風痺補腦

衍義曰

地榆性沈寒入下焦熱血痢則可用若虛寒人及水瀉白痢即未可輕使

冀州小薊根



大小薊根味甘温主養精保血大薊主女子赤白沃安

胎止吐血衄鼻令人肥健五月採

田野甚多方藥不復用是賤之故大薊根甚療血亦有毒

大小薊葉攸相似功力有殊並無毒亦非虎猫薊也

療癰腫小薊生平澤俱能破血小薊不能消腫也

云小薊破宿血止新血暴下血而驚癩出血嘔血等症取汁温服

作煎和糖合金瘡及如蛇蝎毒服之亦佳

云大薊亦可單用味苦平止崩中血下生取根搗絞汁服半外許多

立定

熱補虛損去煩散生研汁服小薊力微只可退熱不似大薊能補

養下氣云大薊葉涼治腸腹藏瘀血血運壞損可生

研酒并小使任服惡瘡疥癬益研膏傳又名刺刺山牛蒡

肘後方

瘰癧犬咬人地榆根末服方十七日一二服傳

梅師方

治獒犬咬人煮地榆飲之兼末傳倉上服方寸

三洞要錄

地榆汁釀酒

陳藏器云

刺門以薊為名

食

比方者勝也

療云

小薊根主養氣取生根葉搗取自然汁服一盞立佳又取葉煮

食

食之除風熱根上崩中又女子月候傷過搗汁半外服之金瘡

本道

本道

血不止按葉封之夏月熱煩悶
不止搗葉取汁半外服之立差
聖惠方 治心熱吐血口乾用刺刺
葉及根搗絞取汁每服一

小盞 **又方** 取乳石動難熱心悶吐血以生刺刺搗
頓服 取汁每服三合入蜜少許攪勻服之 **外臺秘要**

治鼻室塞不通小劑一把水二外者取一外去滓分服曾有人除冷
漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼悶不得眠煮大劑根汁服立差

梅師方 治卒吐血及馮鮮血取
小劑葉搗絞取汁溫服 **簡要濟眾** 治九竅出血以刺刺
搗碎者為末分水調三錢匕 **又方** 治小兒浸淫瘡疼不可忍發寒熱

盜調和頓服之如無清汁只 **又方** 刺刺末新水調傳瘡上乾即易之

衍義曰 大小薊皆相似花如磨似大
薊高三四尺葉皺小薊高一

尺許葉不皺以此為異小薊山野人取
為蔬其適用雖有微苦亦不能害人

海藻



海藻味甘鹹寒無毒主癭瘤氣頸下核破散結氣癰

腫腹腹堅氣腹中下鳴下十二水腫療皮間積聚暴

積留氣熱結利小便一名落管一名薄生東海池澤七

月七日採暴乾 反其草 反其草 反其草 反其草

又有水松狀如松療瘰癧 反其草 反其草 反其草

用之當浸去鹹大葉藻生深海中及新羅葉如水藻而大本經云主

結氣癭瘤是也 反其草 反其草 反其草 反其草

正在深海底以繩繫繫及水下引得旋繫繩上五月已後當有大魚

傷人不可取也 反其草 反其草 反其草 反其草

如亂髮生海中 反其草 反其草 反其草 反其草

疾急滿臉氣下墜疔痛核腫去腹中雷鳴幽幽作聲 反其草 反其草

主起男子除氣常食之消男子積痰南方人多食之傳於北人北人

食之倍生諸病更不宜矣 反其草 反其草 反其草 反其草

火焮熱瘡搗絞汁服去暴熱熱痢止渴生水如馬齒相連 反其草

帆高尺餘根如漆上漸軟作交羅文生海底煮汁服主婦人血結月

閉石林又云水松葉如松半茸食之生水腫亦生海底具都賦云石

帆水松是也 反其草 反其草 反其草 反其草


如藤多人飾
作珊瑚裝
圖經曰海藻生東海池澤今出登萊諸州海中凡水中

陸機云藻水草生海底有二種一種葉如雞蘇莖如莖長四五尺一
種葉如銀股葉如蓬蒿謂之紫藻扶風人謂之藻聚為發聲也二藻
皆可食熟授其腥氣米麩糝蒸為茹其佳美荆揚人饑荒以當穀食
今謂海藻者乃是海中所生根著水底石上黑色如亂髮而麤大小
許葉類水藻而大謂之大葉藻本經云主癰癤是也海人以繩繫腰
沒水下刈得之旋繫繩上又有一種馬尾藻生淺水中狀如知馬尾
細黑色此主水瘧下水用之陶隱居云爾雅所謂綸似綸組似組東
海有之今青苔紫菜皆似綸昆布亦似組恐即是此也而陳藏器乃
謂綸組正謂此二藻也謹按本經海藻一名藻而爾雅謂藻為石衣
又謂藻從南如名海藻與藻同是海藻自有此二名而注釋皆以為
藻草謂綸組乃別草若然隱居所云似近之藏器之說亦未可的據
又注釋以石衣為水苔一名石髮石髮即陟釐也色類似苔而鹿漣
為異又云薄葉似蠶音菴而大生海底日陟釐下自有條味性功用
與海藻全別又生江南池澤乃是水中青苔古人用以為紙亦青黃
色今并以為石髮是也然則藻與海藻皆名石髮別是一類
無疑也昆布今亦出登萊諸州功用乃與海藻相近也陶又云凡海
中菜皆瘰癧癩結氣青苔紫菜輩亦然又有石帆如柏主石淋水於
女松王溪毒吳都賦所謂草則石帆水松劉涓子注云石帆生海邊
石上草類也無葉高尺許其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊
得之稀有見其生者水松藻草生水中出南海交趾是也紫菜附石

生海上正青取乾之則紫色南海有之東海又有一種海帶似海藻
而鹿且長登州人取乾之煮韌可以繫東物醫家用下水速於海藻
昆布之類石髮今人亦乾之作菜以醃臠噉之尤美青苔可以作脯
食之皆利人苔之類又有井中苔生處井中并井簾皆主熱毒又上
有垣衣條云生古垣陰陰結茶云即古牆比陰青苔衣也生石上者
名昔邪屋上生者名屋游大抵主瘰癧略同陸龜蒙詩云高有瓦松
甲有澤葵散巖簪者曰石髮補空山者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰
陟釐是也瓦松生古瓦屋上若松子作層澤葵是葵也雖曰異類而
皆感瓦石而生故味推類而云耳今人罕復用之故但附見於此
松脚下降昨葉何草也唐志謂之蘭香段成式云或言備木上多松
栽土木氣洩則生瓦松然亦不必爾今醫家或用作女子行經絡藥
陟釐古方治虛冷下痢最要范汪治腹中留飲有海藻丸又有雙酒
方用海藻一斤納袋盛以清酒二外浸春夏二日秋冬三日一服兩
合日三酒盡更合飲之如前澤暴乾末服方寸匕日三不過兩劑皆
差廣濟瘰癧氣勝脫急妨宜下氣昆布膠法高麗昆布一斤白米海浸
一宿洗去鹹味以水一斗煮令昆布極爛仍下鹽酢鼓攪調和依膠
法不得令鹹酸以生薑橘皮椒末等調和宜食梁米飯海藻亦
依此法極下氣
大効無所忌
用生烏豆并紫貝天葵和海藻
三件同蒸一伏時候日乾用之
海藥云
氣浮腫脚氣貫純氣並良
雷公
凡使
治頰下瘰癧如梅李宜速
時後方
消之海藻一斤酒二外漬

數日稍
又方
治下
藥一
消飲之

徐州澤蘭



梧州澤蘭



澤蘭味甘微溫無毒主乳婦內切中風餘疾大腹水

腫身面四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿產後金瘡

內塞一名虎蘭一名虎蒲生汝南諸大澤傍

三月三日採陰乾防已為之使阿膠居云今更復有下濕

都梁香可作浴湯人家多種之而華小異今山中又有一種甚相似
並方藥小強不甚香既云澤蘭又生澤傍故山中者為非而藥家乃

採用之唐本注云澤蘭葉方條紫色葉似蘭草而不香今京下用之

者是陶云都梁香乃蘭草類俗名蘭香煮以洗浴亦生澤畔人家種

之花白紫黃莖圓珠片澤蘭也陶注蘭草復云名都梁香並不深識

也目黃錫等澤蘭一名水香神農黃帝岐伯桐君酸無

毒子八溫生下地水傍葉如蘭二月生香赤節以葉相值枝節間

氣破宿血消機腹產前產後腹痛通九竅利開味養血

大面黃四月五月採作經子圖經曰澤蘭生汝南諸大澤傍

中用皆有之根紫黑色如栗根二月生苗高三三尺葉青紫色作

四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫白色莖通紫色亦似薄

荷花三月採苗陰乾荆湖嶺南人家多種之壽州出者無花子此與

蘭草大抵相類但蘭草生水傍葉光潤陰小紫五六月成而澤蘭生
水澤中及下濕地葉尖微有毛不光潤方葉紫節七月八月採微
辛此為異耳今婦人方中最急用也又有律馬蘭生水澤傍頗似
澤蘭而氣臭味辛亦主破血補金創漸下血陳藏器以為是詞所論
惡草即是也北人呼為紫菊以其花似菊也又有二種山蘭生山側
似劉寄奴葉無根不測生花雷公云凡使酒要別識雄雌其形
心微黃赤亦能破血皆可用雷公云不同大澤蘭形葉皆圓根
青黃能生血調氣與祭台小澤蘭別採得後看葉上斑根頭尖此
藥能破血通凡積事大小澤蘭頭細判之用絹袋盛懸於屋南

令乾用 **子母秘錄** 治小口瘡瘡

衍義曰 澤蘭按補注云草如蘭今蘭葉如菱門冬稍闊而長及二

菊但交長若中香臭則稍相類既謂之澤蘭又曰

生致南大澤傍則其種不別如蘭之誤誤矣

昆布味鹹寒無毒主十二種水腫癭瘤聚結氣瘰瘡

生東海 今惟出高麗繩把索之如春麻作黃黑色柔韌

皆似編此昆布亦似組恐即是也凡海中菜皆瘰癧結氣青苔紫

菜輩亦然乾苦性熱柔苔甚冷也 **陳藏器** 本草云昆布主陰癭

含之咽汁生南海葉如手大如蕩葉紫色 **圖經** 文貝海

昆布臣有小毒利水道去腫治癭瘰瘡 **醫方** 云紫菜味甘

醋消之 **唐本注** 又有石帆狀如柏石淋 **陳藏器** 云

海藥如手執葉赤色大似蕩葉 **陳藏器** 云出新羅黃黑色葉系細陶解

昆布乃是馬尾海藻也 **新羅** 云如廢氣取末密丸含化自消也 **海**

藥云 謹按異志生東海水中其草啣吮而生新羅者黃黑色葉如

人按得堪之馮素陰乾船上求中區性温主大腹水腫諸

氣并瘰癧 **雷公** 云凡使先焯數節同者去鹹味焙細到用每修事

氣結等良 **雷公** 云一斤用斲節大小十箇同昆布細到二味各一

匙下東流水從已煮 **食療** 云下氣又服瘦人無此疾者不可食海

菜及水漬添勿令少 **食療** 云下氣又服瘦人無此疾者不可食海

菜及水漬添勿令少 **食療** 云下氣又服瘦人無此疾者不可食海

又云紫菜下熱氣多食服人若熱氣寒則佳者汁飲之此是海中之

物味猶有毒性凡昆布 **聖惠方** 治瘰癧結核癭癧腫硬昆布一兩

中藥所以有增人食 **聖惠方** 治瘰癧結核癭癧腫硬昆布一兩

興化軍防已

千金翼

治五癭昆布一兩並切

黔州防已



防已味辛苦平溫無毒去風寒溫瘧熱氣諸癰除邪利

大小便療水腫風腫去膀胱熱傷寒寒熱邪氣中風手脚

攣急止洩散癰腫惡結諸蝸疥癬蟲瘡通廢理利九竅

一名解離文如車輻理解者良生漢中川谷二月八月

採根陰乾殷尊為之使殺雄黃毒惡細辛畏車輻圖經云今

佳服食亦瀕之是療風水家要藥漢書云防已本出漢中者作

車輻解黃實而香其青白虛散者名防已云漢防已君味苦有小毒

蓋未見漢中者能治濕風口面喎斜手足攣散留痰于肺氣嗽喘又云木防已使畏

能治濕風口面喎斜手足攣散留痰于肺氣嗽喘又云木防已使畏

女苑鹵鹹味苦辛能治男子肢節中風毒風不語主散

結氣擁腫濕癘風水腫治勝脫云木防已出華州圖經曰防

生漢中川谷今黔中亦有之但漢中出者破之文作車輻解黃實而

香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頭吹之氣從中貫如木通類

它處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁足子名木防已二月八月

採陰乾用木防已雖今不入藥而古方亦通用之張仲景治傷寒有

增減木防已湯及防已地黃五物湯防已黃者六物等湯深師療隔間

支滿其入常滿心下痞堅而物重其脉沈緊得之數十口吐下之乃

愈木方已湯主之木防已一兩石膏二枚雞子大碎綿裹桂心二兩

人參四兩四物以水六升煮取二升分再服虛者便愈實者三日復

發汗至三日復不愈者宜去石膏加芒消三合以水六升煮三味取

二升去滓內芒消分再服微下利則愈禁生葱孫思邈療遺溺小洩


亦用三物木防已湯陳藏器如陶所注即是木防已用體小同按木

雷公云凡使勿使木條以其木條已黃肘後方服雄黃中

初虞世方右肺痿咯血多痰防已葶藶

茶法煎服俗用治脫肛

邵州天麻



生次氣通一頭如通草雷公云凡使勿使木條以其木條已黃

已要心花文黃色者然細對又對車前草根細對用之

對蒸半日後出曬去車前草根細對用之

解之防已膏倍乾為末如

茶法煎服俗用治脫肛