


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷

八至
十一



詳校官太醫院吏目臣宋桂

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷八

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

序例第一

論曰夫生民之

人故方稱積小

公此之一義即是從微至著自少及長人情共見不待

道莫不以養小為大若無于小卒不成

以成大壽有初生民傳云聲子生隱

欽定四庫全書

備急千金要方

經史故今斯方先婦人小兒而後丈夫者老者則是崇
 本之義也然小兒氣勢微弱醫士欲留心救療立功差
 難今之學者多不存意良由嬰兒在於襁褓之內乳氣
 腥臊醫者操行英雄詎肯瞻視靜言思之可為太息者
 矣小品方云凡人年六歲已上為小十六歲已上為少

巢源外臺作十
八已上為少

三十已上為壯

巢源外臺作二
十已上為壯

五十已

上為老其六歲已下經所不載所以乳下嬰兒有病難
 治者皆為無所承據也中古有巫妨

巢源作
巫方

者立小兒

顧顛經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方
焉逮于晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流于人間齊有
徐王者亦有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐
氏位望隆重何暇留心于少小詳其方意不甚深細少
有可採未為至秘今博撰諸家及自經用有效者以為
此篇凡百居家皆宜達茲養小之術則無橫夭之禍也
又曰小兒病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇
客忤解顛不行等八九篇合為此卷下痢等餘方並散

在諸篇可披而得之

凡生後六十日瞳子成能咳笑應和人百日任脉成能

自反覆

一作百五十日

百八十日尻骨成能獨坐二百一十日

掌骨成能匍匐三百日臄骨成能獨立三百六十日膝

骨成能行此其定法若不能依期者必有不平之處

凡兒生三十二日一變六十四日再變變且蒸九十六

日三變一百二十八日四變變且蒸一百六十日五變

一百九十二日六變變且蒸二百二十四日七變二百

五十六日八變變且蒸二百八十八日九變三百二十
日十變變且蒸積三百二十日小蒸畢後六十四日大
蒸蒸後六十四日復大蒸蒸後一百二十八日復大蒸
凡小兒自生三十二日一變再變為一蒸凡十變而五
小蒸又三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人
小兒所以變蒸者是榮其血脉改其五臟故一變竟輒
覺情態有異其變蒸之候變者上氣蒸者體熱變蒸有
輕重其輕者體熱而微驚耳冷尻冷上脣頭白泡起如

魚目珠子微汗出其重者體壯熱而脉亂或汗或不汗不欲食食輒吐喎目白精微赤黑精微白又云目白者重赤黑者微變蒸畢自精明矣此其證也單變小微兼蒸小劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日為十日之中熱乃除耳兒生三十二日一變二十九日先期而熱便治之如法至三十六七日蒸乃畢耳恐不解了故重說之且變蒸之時不欲驚動勿令傍多人兒變蒸或早或晚不如法者多又初變之時或

熱甚者違日數不歇審計變蒸之日當其時有熱微驚
慎不可治及灸刺但和視之若良久熱不可已少與紫
丸微下熱歇便止若於變蒸之中加以時行溫病或非
變蒸時而得時行者其診皆相似惟耳及尻通熱口上
無白泡耳當先服黑散以發其汗汗出溫粉粉之熱當
歇便就瘥若猶不都除乃與紫丸下之兒變蒸時若有
寒加之即寒熱交爭腹腰夭札啼不止者熨之則愈也

熨法出下篇矣
粉絮熨者是

變蒸與溫壯傷寒相似若非變蒸身熱

耳熱尻亦熱此乃為他病可作餘治審是變蒸不得為餘治也

又一法凡兒生三十二日始變變者身熱也至六十四日再變變且蒸其狀卧端正也至九十六日三變定者候丹孔出而泄至一百二十八日四變變且蒸以能咳嗽也至一百六十日五變以成機關也至一百九十二日六變變且蒸五機成也至二百二十四日七變以能匍匐也至二百五十六日八變變且蒸以知欲學語也

至二百八十八日九變以亭亭然也凡小兒生至二百八十八日九變四蒸也當其變之日慎不可妄治之則加其疾變且蒸者是兒送迎月也蒸者甚熱而脉亂汗出是也近者五日歇遠者八九日歇也當是蒸上不可灸刺妄治之也

紫圓治小兒變蒸發熱不解并挾傷寒溫壯汗後熱不歇及腹中有痰癖哺乳不進乳則吐覘食癩先寒後熱方

赤石脂

代赭

各一兩

巴豆

三十枚

杏仁

五十枚

右四味為末巴豆杏仁別研為膏相和更搗二千杵當自相得若硬入少蜜同搗之密器中收三十日兒服如麻子一丸與少乳汁令下食頃後與少乳勿令多至日中當小下熱除若未全除明旦更與一丸百日兒服如小豆一丸以此準量增減夏月多熱喜令發疹二三十日輒一服佳紫圓無所不療雖下不虛人

黑散治小兒變蒸中挾時行溫病或非變蒸時而得時行者方

麻黃

杏仁 各半兩

大黃 六銖

右三味先擣麻黃大黃為散別研杏仁如脂乃細細內散又擣令調和內密器中一月兒服小豆大一枚以乳汁和服抱令得汗出溫粉粉之勿使見風百日兒服如棗核以兒大小量之

擇乳母法

凡乳母者其血氣為乳汁也五情善惡悉是血氣所生也其乳兒者皆宜慎于喜怒夫乳母形色所宜其候甚多不可求備但取不胡臭癭瘻氣嗽痲疥癩癰白禿癧瘍瀰脣耳聾聾鼻瘖癩無此等疾者便可飲兒也師見其故灸癧便知其先疾之源也

備急千金要方卷八

欽定四庫全書

備急千金要方卷九

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

初生出腹第二 論

論曰小兒初生先以綿裹指拭兒口中及舌上青泥惡
血此為之玉衡一作若不急拭啼聲一發即入腹成百
病矣兒生落地不作聲者取暖水一器灌之須臾當啼

兒生不作聲者此由難產少氣故也可取兒臍帶向身
却將之令氣入腹仍呵之至百度啼聲自發亦可以蔥
白徐徐鞭之即啼兒已生即當舉之舉之遲晚則令中
寒腹內雷鳴乃先浴之然後斷臍不得以刀子割之須
令人隔單衣物咬斷兼以暖氣呵七遍然後纏結所留
臍帶令至兒足趺上短則中寒令兒腹中不調常下痢
若先斷臍然後浴者則臍中水臍中水則發腹痛其臍
斷訖連臍帶中多有蟲宜急剔撥去之不爾入兒腹成

疾斷兒臍者當令長六寸長則傷肌短則傷藏不以時
斷若按汁不盡則令暖氣漸微自生寒令男臍風生兒
宜用其父故衣裹之生女宜以其母故衣皆勿用新帛
為善不可令衣過厚令兒傷皮膚害血脉發雜瘡而黃
兒衣綿帛特忌厚熱慎之慎之凡小兒始生肌膚未成
不可暖衣暖衣則令筋骨緩弱宜時見風日若都不見
風則令肌膚脆軟便易中傷皆當以故絮衣之勿用新
綿也凡天和暖無風之時令母將兒於日中嬉戲數見

風日則血凝氣剛肌肉牢密堪耐風寒不致疾病若常
藏在幃帳之中重衣溫暖譬猶陰地之草木不見風日
軟脆不堪風寒也凡裹臍法推治白練令柔軟方四寸
新綿厚半寸與帛等合之調其緩急急則令兒吐覘兒
生二十日乃解視臍若十許日兒怒啼似衣中有刺者
此或臍燥還刺其腹當解之易衣更裹裹臍時閉戶下
帳然火令帳中溫暖換衣亦然仍以溫粉粉之此謂冬
時寒也若臍不愈燒絳帛末粉之若過一月臍有汁不

愈燒蝦蟆灰粉之日三四度若臍中水及中冷則令兒
腹絞痛夭紅啼呼面目青黑此是中水之過當炙粉絮
以熨之不時治護臍至腫者當隨輕重重者便灸之乃
可至八九十壯輕者臍不大腫但出汁時時啼呼者擣
當歸末和胡粉傅之炙絮日熨之至百日愈以啼呼止
為候若兒糞青者冷也與臍中水同兒洗浴斷臍竟禡
抱畢未可與朱蜜宜與甘草湯以甘草如手中指一節
許打碎以水二合煮取一合以綿纏沾取與兒吮之連

吮汁計得一蜺殼入腹止兒當快吐吐去心胸中惡汁也如得吐餘藥更不須與若不得吐可消息計如飢渴須臾更與之若前所服及更與並不得吐者但稍稍與之令盡此一合止如得吐出惡汁令兒心神智慧無病也飲一合盡都不吐者是兒不含惡血耳勿復與甘草湯乃可與朱蜜以鎮心神安魂魄也兒新生三日中與朱蜜者不宜多則令兒脾胃冷腹脹喜陰痼氣急變禁煙而死新生與朱蜜法以飛鍊朱砂如大豆許以赤

蜜一蚬殼和之以綿纏筋頭沾取與兒吮之得三沾止
一日令盡此一豆許可三日與之則用三豆許也勿過
此則傷兒也與朱蜜竟可與牛黃如朱蜜多少也牛黃
益肝膽除熱定精神止驚辟惡氣除小兒百病也新生
三日後應開腸胃助穀神可研米作厚飲如乳酪厚薄
以豆大與兒咽之頻咽三豆許止日三與之滿七日可
與哺也兒生十日始哺如棗核二十日倍之五十日如
彈丸百日如棗若乳汁少不得從此法當用意小增之

若三十日而哺者令兒無疾兒哺早者兒不勝穀氣令生病頭面身體喜生瘡愈而復發令兒尪弱難養三十日後雖哺勿多若不嗜食勿強與之不消復生疾病哺乳不進者腹中皆有痰癖也當以四物紫丸微下之節哺乳數日便自愈小兒微寒熱亦當爾利之要當下之然後乃瘥凡乳兒不欲太飽飽則嘔吐每候兒吐者乳太飽也以空乳乳之即消日四乳兒若臍未愈乳兒太飽令風中臍也夏不去熱乳令兒嘔逆冬不去寒乳令

兒欬痢母新房以乳兒令兒羸瘦交脛不能行母有熱
以乳兒令變黃不能食母怒以乳兒令喜驚發氣疝又
令上氣癩狂母新吐下以乳兒令虛羸母醉以乳兒令
身熱腹滿凡新生小兒一月內常飲猪乳大佳凡乳母
乳兒當先極按散其熱氣勿令汁奔出令兒噎輒奪其
乳令得息息已復乳之如是十返五返視兒饑飽節度
知一日中幾乳而足以為常又常捉去宿乳兒若卧乳
母當以臂枕之令乳與兒頭平乃乳之令兒不噎母欲

寐則奪其乳恐填口鼻又不知饑飽也浴兒法凡浴小兒湯極須令冷熱調和冷熱失所令兒驚亦致五藏疾也凡兒冬不可久浴浴久則傷寒夏不可久浴浴久則傷熱數浴背冷則發癩若不浴又令兒毛落新生浴兒者以猪膽一枚取汁投湯中以浴兒終身不患瘡疥勿以雜水浴之兒生三日宜用桃根湯浴桃根李根梅根各二兩枝亦得呔咀之以水三斗煮二十沸去滓浴兒良去不祥令兒終身無瘡疥治小兒驚辟惡氣以金虎

湯浴金一斤虎頭骨一枚以水三斗煮為湯浴但須浴
即煮用之凡小兒初出腹有鵞口者其舌上有白屑如
米劇者鼻中亦有之此由兒在胞胎中受穀氣盛故也
或妊娠時嗜糯米使之然治之之法以髮纏筋頭沾井
花水撩拭之三日如此便脫去如不脫可煮粟菰汁令
濃以綿纏筋頭拭之若春夏無粟菰可煮栗木皮如用
井花水法小兒初出腹有連舌舌下有膜如石榴子中
隔連其舌下後喜令兒言語不發不轉也可以爪摘斷

之微有血出無害若血出不止可燒髮作灰末傅之血便止也小兒出腹六七日後其血氣收斂成肉則口舌喉頰裏清淨也若喉裏舌上有物如蘆籜盛水狀者若懸癰有脹起者可以綿纏長針留卽處如粟米許大以針刺決之令氣泄去青黃赤血汁也一刺之止消息一日未消者來日又刺之不過三刺自消盡餘小小未消三刺亦止自然得消也有著舌下如此者名重舌有著頰裏及上腭如此者名重腭有著齒斷上者名重斷皆

刺去血汁也

小兒生輒死治之法

當候視兒口中懸癰前上腭有胞者以指摘取頭決
令潰去血勿令血入咽入咽殺兒急急慎之

小兒初出腹骨肉未斂肌肉猶是血也血凝乃堅成肌
肉耳其血沮敗不成肌肉則使面目繞鼻口左右悉黃
而啼閉目聚口撮面口中乾燥四肢不能伸縮者皆是
血脉不斂也恐不育若有如此者皆宜與龍膽湯也

出方

下驚
痢篇

相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍小者不壽

通身軟弱如無骨者不壽

鮮白長大者壽

自開目者不成人

目視不正數動者大非佳

汗血者多厄不壽

汗不流不成人

小便凝如脂膏不成人

頭四破不成人

常搖手足者不成人

早坐早行早齒早語皆惡性非佳人

頭毛不周匝者不成人

髮稀少者強不聽人

一作不聰

額上有旋毛者早貴妨父母

兒生枕骨不成者能言而死

尻骨不成者能倨而死

掌骨不成者能匍匐而死

踵骨不成者能行而死

臏骨不成者能立而死

身不收者死

魚口者死

股間無生肉者死

頤下破者死

陰不起者死

陰囊下白者死赤者死

卵縫通達黑者壽

論曰兒三歲已上十歲已下視其性氣高下即可知其夭壽大畧兒小時識悟通敏過人者多夭大則項橐顏回之流是也小兒骨法成就威儀迴轉遲舒稍費人精

神雕琢者壽其預知人意迴旋敏速者亦夭即揚修孔
融之徒是也由此觀之夭壽大畧可知也亦猶梅花早
發不覩歲寒甘菊晚成終于年事是知晚成者壽之兆
也

備急千金要方卷九

欽定四庫全書

備急千金要方卷十

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

驚癇第三

論 候癇法
方 灸法

論曰少小所以有癇病及瘵病者皆由臟氣不平故也
新生即癇者是其五臟不收斂血氣不聚五脉不流骨
法不成也多不全育其一月四十日已上至期歲而癇

者亦由乳養失理血氣不和風邪所中也病先身熱掣
癡驚啼叫喚而後發癇脉浮者為陽癇病在六腑外在
肌膚猶易治也病先身冷不驚掣不啼呼而病發時脉
沉者為陰癇病在五臟內在骨髓極難治也病發身軟
時醒者謂之癇也身強直反張如弓不時醒者謂之瘖
也諸反張大人脊不容側手小兒容三指者不可復治
也凡脉浮之與沉以判其病在陰陽表裏耳其浮沉復
有大小滑澁虛實遲駛諸證各依脉形為治神農本草

經說小兒驚癇有一百二十種其證候微異於常便是
癇候也初出腹血脉不斂五臟未成稍將養失宜即為
病也時不成人其經變蒸之後有病餘證並寬惟中風
最暴卒也小兒四肢不好驚掣氣息小異欲作癇及變
蒸日滿不解者並宜與龍膽湯凡小兒之癇有三種有
風癇有驚癇有食癇然風癇驚癇時時有之十兒之中
未有一二是風驚者凡是先寒後熱發者皆是食癇也
驚病皆按圖灸之風癇當與猪心湯食癇當下乃愈紫

丸佳凡小兒所以得風癇者緣衣暖汗出風因入也風
 癇者初得之時先屈指如數乃發作者此風癇也驚癇
 者起于驚怖大啼乃發作者此驚癇也驚癇微者急持
 之勿復更驚之或自止也其先不哺乳吐而變熱後發
 癇者此食癇早下則瘥四味紫丸逐癖飲最良去病速
 而不虛人赤丸 本無赤丸方諸醫方並無按此服四味
紫丸不得下者當以赤丸赤丸差駛病
重者當用之今次後癖結脹滿篇中第一方八味名紫
雙丸者用朱砂色當赤用巴豆又用甘遂比紫丸當駛
疑此即赤丸也 差駛病重者當用之凡小兒不能乳哺當與紫

丸下之小兒始生生氣尚盛但有微惡則須下之必無
所損及其愈病則致深益若不時下則成大疾疾成則
難治矣凡下四味紫丸最善雖下不損人足以去疾若
四味紫丸不得下者當以赤丸下之赤丸不下當倍之
若已下而有餘熱不盡當按方作龍膽湯稍稍服之并

摩赤膏

方見本
篇末

風癩亦當下之然當以猪心湯下之驚

癩但按圖灸之及摩生膏

方見本
篇末

不可大下也何者驚

癩心氣不定

一作
足

下之內虛益令甚爾驚癩甚者特為

難治故養小兒常慎驚勿令聞大聲抱持之間當安徐
勿令驚怖又天雷時當塞兒耳并作餘細聲以亂之也
凡養小兒皆微驚以長其血脉但不欲大驚大驚乃灸
驚脉若五六十日灸者驚復更甚生百日後灸驚脉乃
善兒有熱不欲哺乳卧不安又數驚此癩之初也服紫
丸便愈不愈復與之兒眠時小驚者一月輒一以紫丸
下之減其盛氣令兒不病癩也兒立夏後有病治之慎
勿妄灸不欲吐下但以除熱湯浴之除熱散粉之

除熱湯散

見下篇傷寒條中

除熱赤膏摩之又以膏塗臍中令兒在涼處
勿禁水漿常以新水飲之小兒衣甚薄則腹中乳食不
消不消則大便皆醋臭此欲為癖之漸也便將紫丸以
微消之服法先從少起常令大便稀勿大下也稀後便
漸減之不醋臭乃止藥也凡小兒冬月下無所畏夏月
下難瘥然有病者不可不下下後腹中當小脹滿故當
節哺乳數日不可妄下又乳哺小兒當令多少有常劑
兒漸大當稍稍增之若減少者此腹中已有小不調也

便微服藥勿復哺之但當與乳甚者十許日微者五六日止哺自當如常若都不肯食哺而但欲乳者此是有癖為疾重要當下之不可不下不下則致寒熱或吐而發癩或更致下痢此皆病重不早下之所為也此即難治矣但先治其輕時兒不耗損而病可速愈凡小兒屎黃而臭者此腹中有伏熱宜微將服龍膽湯若白而醋臭者此挾宿寒不消也當服紫丸微者少與藥令內消甚者少增藥令小下皆復節乳哺數日令胃氣平和若

不節乳哺則病易復復下之則傷其胃氣令腹脹滿再三下之尚可過則傷矣凡小兒有癖其脉大必發癩此為食癩下之便愈當審候掌中與三指脉不可令起而不時下致於發癩則難療矣若早下之此脉終不起也脉在掌中尚可早療若至指則病增矣凡小兒腹中有疾生則身寒熱寒熱則血脉動動則心不定心不定則易驚驚則癩發速也

候癩法

夫癩小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然氣發于內必先有候常宜審察其精神而採其候也

手白肉魚際脉黑者是癩候魚際脉赤者熱

脉青大者寒脉青細者為平也

鼻口乾燥大小便不利是癩候

眼不明上視喜陽是癩候

耳後完骨上有青絡盛卧不靜是癩候青脉刺之令血出也

小兒髮逆上啼笑面暗色不變是癇候

鼻口青時小驚是癇候

目閉青時小驚是癇候

身熱頭常汗出是癇候

身熱吐哕而喘是癇候

身熱目時直視是癇候

喜欠目上視是癇候

身熱目視不精是癇候

目瞳子卒大黑于常是癩候

卧惕惕而驚手足振搖是癩候

卧夢笑手足動搖是癩候

意氣下而妄怒是癩候

咽乳不利是癩候

身熱小便難是癩候

吐痢不止厥痛時起是癩候

弄舌搖頭是癩候

已上諸候二十餘條皆癰之初也見其候便爪其陽脉
所應灸爪之皆重手令兒驟啼及足絕脉亦依方與湯
直視瞳子動腹滿轉鳴下血身熱口噤不得乳反張脊
強汗出發熱為卧不悟手足掣癡喜驚凡八條癰之極
者也如有此非復湯爪所能救便當時灸之

論曰若病家始發便來詣師師可診候所解為法作次
序治之以其節度首尾取瘥也病家已經雜治無次序
不能制病病則變異其本候後師便不知其前證虛實

直依其後證作治亦不得瘥也要應精問察之為前師所配依取其前蹤跡以為治乃無逆耳前師處湯本應數劑乃瘥而病家服一兩劑未效便謂不驗已後更問他師師不尋前人為治寒溫次序而更為治而不次前師治則弊也或前已下之後須平和療以接之而得瘥也或前人未下之或不去者或前治寒溫失度後人應調治之是為治敗病皆須邀射之然後免耳不依次第及不審察必及重弊也

龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱大吐哕者若已能進哺中食實不消壯熱及變蒸不解中客人鬼氣并諸驚癇方悉主之十歲已下小兒皆服之小兒龍膽湯第一此是新出腹嬰兒方若日月長者以次依此爲例若必知客忤及有魃氣者可加入參當歸各如龍膽多少也一百日兒加三銖二百日兒加六銖一歲兒加半兩餘藥皆准耳

龍膽

鈎藤皮

柴胡

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

一作茯神

甘草

各六銖

蜣螂

二枚

大黃

一兩

右十味㕮咀以水一升煮取五合為劑也服之如後
 節度藥有虛實虛藥如足數合水也兒生一日至七
 日分一合為三服兒生八日至十五日分一合半為
 三服兒生十六日至二十日分二合為三服兒生二
 十日至三十日分三合為三服兒生三十日至四十
 日盡以五合為三服皆得下即止勿再服也

大黃湯治少小風癇積聚腹痛夭矯二十五癇方

大黃

人參

細辛

乾薑

當歸

甘皮各三銖

右六味㕮咀以水一升煮取四合服如棗許日三

白羊鮮湯治小兒風癇胃中有疾

白羊鮮

三銖

蚱蟬

二枚

大黃

四銖

甘草

鈎藤皮

細辛

各二銖

牛黃

如大豆四枚

蛇蛻皮

一寸

右八味㕮咀以水二升半煮取一升二合分五服日

三若服已盡而痼不斷者可更加大黃鈎藤各一銖
以水漬藥半日然後煮之

增損續命湯治小兒卒中風惡毒及久風四肢角弓反
張不隨并躄瘦僻不能行步方

麻黃

甘草

桂心

各一兩

芎藭

葛根

升麻

當歸

獨活

各十銖

人參

黃芩

石膏

各半兩

杏仁

二十枚

右十二味㕮咀以水六升煮麻黃去上沫乃納諸藥

煮取一升二合三歲兒分為四服一日令盡少取汗得汗以粉粉之

石膏湯治小兒中風惡瘵不能語口眼了戾四肢不隨方

石膏

合一

麻黃

八銖

甘草

射干

桂心

芍藥

當歸

各四銖

細辛

二銖

右八味㕮咀以水三升半先煮麻黃三沸去上沫內餘藥煮取一升三歲兒分為四服日三

治少小中風狀如欲絕湯方

大黃

牡蠣

龍骨

栝蒌根

甘草

桂心

各二
十銖

赤石脂

寒水石

各六
銖

右八味㕮咀以水一升內藥重半兩煮再沸絞去滓

半歲兒服如雞子大一枚大兒盡服入口中即愈汗

出粉之藥無毒可每日二服有熱加大黃不汗加麻黃

無寒水石朴消代之

二物石膏湯治少小中風手足拘急方

石膏

如雞子大一塊碎

真珠

一兩

右以水二升煮石膏五六沸內真珠煮取一升稍稍

分服

桂枝湯治少小中風脉浮發熱自汗出項強鼻鳴乾嘔

方

桂心

生薑

甘草

芍藥

各一兩

大棗

四枚

右五味以咀三物以水三升煮取一升分三服

此方與傷

寒篇中
方相重

二物驢毛散治少小新生中風方

驢毛一把

取背前交脊上會中枚
取如手母指大一把

麝香

二豆
大

右以乳汁和銅器中微火煎令焦熱出為末小兒不
能飲以乳汁和之葦筒貯瀉著咽中然後飲乳令入

腹

茵芋圓治少小有風痼疾至長不除或遇天陰節變便
發動食飲堅強亦發百脉攣縮行步不正言語不便者

服之永不發方

茵芋葉

鉛丹

秦朮

鈎藤皮

石膏

杜蘅

防葵

菖蒲

黃芩

各一兩半

松蘿

半兩

蜨娘

十枚

甘草

三兩

右十二味為末蜜丸如小豆大三歲已下服五丸三

歲已上服七丸五歲已上服十九丸十歲已上可至十

五丸

鎮心圓治小兒驚癇百病鎮心氣方

銀屑十二銖

水銀二十銖

牛黃六銖

大黃六分

茯苓三分

茯神

遠志

防已

白斂

雄黃

人參

芍藥各二分

紫石英

真珠

防葵

鐵精各四分

右十六味先以水銀和銀屑如泥別治諸藥和丸二

歲兒如麻子二丸隨兒大小增之一方無牛黃一味

丹參赤膏治少小心腹熱除熱方

丹參

雷丸

芒硝

戎鹽

大黃 各一兩

右五味㕮咀以苦酒半升浸四種一宿以成鍊猪肪一斤煎三上三下去滓乃內芒硝膏成以摩心下冬夏可用一方但用丹參雷丸亦佳

五物甘草生摩膏治少小新生肌膚幼弱喜為風邪所中身體壯熱或中大風手足驚掣方

甘草

防風 各一兩

白朮

桔梗 各二十銖

雷丸

半二兩

右吹咀以不中水猪肪一斤煎為膏以煎藥微火上煎消息視稠濁膏成去滓取如彈丸大一枚灸手以摩兒百過寒者更熱熱者更寒小兒雖無病早起常以膏摩額上及手足心甚辟寒風

灸法

論曰小兒新生無疾慎不可逆針灸之如逆針灸則忍痛動其五脉因喜成癩河洛關中土地多寒兒喜病瘕其生兒三日多逆灸以防之人灸頰以防噤有噤者舌

下脉急牙車筋急其土地寒皆決舌下去血灸頰以防
噤也吳蜀地溫無此疾也古方既傳之今人不詳南北
之殊便按方而用之是以多害於小兒也所以田舍小
兒任其自然皆得無有天橫也小兒驚啼眠中四肢掣
動變蒸未解慎不可針灸爪之動其百脉仍因驚成癩
也惟陰癩噤瘳可針灸爪之凡灸癩當先下兒使虛乃
承虛灸之未下有實而灸者氣逼前後不通殺人癩發平
旦者在足少陽晨朝發者在足厥陰日中發者在足太

陽黃昏發者在足太陰人定發者在足陽明夜半發者在足少陰

右癰發時病所在視其發早晚灸其所也

夫癰有五藏之癰六畜之癰或在四肢或在腹內當審其候隨病所在灸之雖少必瘥若失其要則為害也

肝癰之為病面青目反視手足搖灸足少陽厥陰各三壯

心癰之為病面赤心下有熱短氣息微數灸心下第二

助端宛宛中此為巨闕也又灸手心主及少陰各三壯
脾癰之為病面黃腹大喜痢灸胃管三壯俠胃管傍灸
二壯足陽明太陰各二壯

肺癰之為病面目白口沫出灸肺輪三壯又灸手陽明
太陰各二壯

腎癰之為病面黑正直視不搖如尸狀灸心下二寸二
分三壯又灸肘中動脈各二壯又灸足太陽少陰各二
壯

膈癰之為病目反四肢不舉灸風府又灸項上鼻人中
下脘承漿皆隨年壯

腸癰之為病不動搖灸兩承山又灸足心兩手勞宮又
灸兩耳後完骨各隨年壯又灸臍中五十壯

右五藏癰證候

馬癰之為病張口搖頭馬鳴欲反折灸項風府臍中三
壯病在腹中燒馬蹄末服之良

牛癰之為病目正直視腹脹灸鳩尾骨及大椎各三壯

燒牛蹄末服之良

羊癩之為病喜揚目吐舌灸大推上三壯

猪癩之為病喜吐沫灸脊骨兩傍各一寸七壯

犬癩之為病手屈拳攣灸兩手心一壯灸足太陽一壯
灸肋戶一壯

雞癩之為病搖頭反折喜驚自搖灸足諸陽各三壯

右六畜癩證候

小兒暴癩灸兩乳頭女兒灸乳下二分

治小兒暴癇者身軀正直如死人及腹中雷鳴灸太倉
及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當腹度取背以
繩繞頸下至臍中竭轉繩向背順脊下行盡繩頭灸兩
傍各一寸五壯

若面白啼聲色不變灸足陽明太陰

若目反上視眸子動當灸顙中取之法橫度口盡兩吻
際又橫度鼻下亦盡兩邊折去鼻度半都合口為度從
額上髮際上行度之灸度頭一處正在顙上未合骨中

隨手動者是此最要處也次灸當額上入髮二分許直
望鼻為正次灸其兩邊當目瞳子直上入髮際二分許
次灸頂上迴毛中次灸客主人穴在眉後際動脉是次
灸兩耳門當耳開口則骨解開動張陷是也次灸兩耳
上捲耳取之當捲耳上頭是也一法大人當耳上橫三
指小兒各自取其指也次灸兩耳後完骨上青脉亦可
以針刺令血出次灸玉枕項後高骨是也次灸兩風池
在項後兩轅動肋外髮際陷中是也次灸風府當項中

央髮際亦可與風池三處高下相等次灸頭兩角兩角當迴毛兩邊起骨是也

右頭部凡十九處兒生十日可灸三壯三十日可灸五壯五十日可灸七壯病重者具灸之輕者惟灸顛中風池玉枕也艾使熟炷令平正著肉火勢乃至病所也艾若生炷不平正不著肉徒灸多炷故無益也

若腹滿短氣轉鳴灸肺募在兩乳上第二肋間宛宛中懸繩取之當瞳子是次灸臏中次灸胃堂次灸臍中次

灸薛息薛息在兩乳下第一肋間宛宛中是也次灸巨
闕大人去鳩尾下一寸小兒去臍作六分分之去鳩尾
下一寸是也并灸兩邊次灸胃管次灸金門金門在穀
道前囊之後當中央是也從陰囊下度之大孔前中分
之

右腹部十二處胃堂巨闕胃管十日兒可灸三壯一月
已上可五壯陰下縫中可三壯或云隨年壯

強反張灸大椎并灸諸藏輸及督脊上當中從大

推窮骨中屈更從大椎度之灸度下頭是督脊也

右背部十二處十日兒可灸三壯一月已上可灸五壯
若手足掣癱驚者灸尺澤次灸陽明次灸少商次灸勞
宮次灸心主次灸合谷次灸三關次灸少陽

右手部十六處其要者陽明少商心主尺澤合谷少陽
也壯數如上

又灸伏兔次灸三里次灸腓腸次灸鹿溪次灸陽明次
灸少陽次灸然谷

右足部十四處皆要可灸壯數如上

手足陽明謂人四指凡小兒驚癇皆灸之若風病大動
手足掣癡者盡灸手足十指端又灸本節後

備急千金要方卷十

欽定四庫全書

備急千金要方卷十一

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

客忤第四

論灸法

方呪法

論曰少小所以有客忤病者是外人來氣息忤之一名
中人是為客忤也雖是家人或別房異戶雖是乳母及
父母或從外還衣服經履鬼神麤惡暴氣或牛馬之氣

皆為忤也。執作喘息，乳氣未定者，皆為客忤。其乳母遇醉及房勞喘後，乳兒最劇，能殺兒也。不可不慎。凡諸乘馬行得馬汗氣臭，未盥洗，易衣裝，便向兒邊，令兒中馬客忤。兒卒見馬來，及聞馬鳴驚，及馬上衣物馬氣，皆令小兒中馬客忤。慎護之，特重。一歲兒也。凡小兒衣布帛綿中，不得有頭髮履中，亦爾。白衣青帶，青衣白帶，皆令中忤。凡非常人及諸物從外來，亦能驚小兒，致病。欲防之法，諸有從外來人，及有異物入戶，當將兒避之，勿令

見也若不避者燒牛屎令常有煙氣置戶前則善

小兒中客為病者無時不有此病也而秋初一切小兒
皆病者豈是一切小兒悉中客邪夫小兒所以春冬少
病秋夏多病者秋夏小兒陽氣在外血脈嫩弱秋初夏
末晨夕時有暴冷小兒嫩弱其外則易傷暴冷折其陽
陽結則壯熱胃冷則下痢是故夏末秋初小兒多壯熱
而下痢也未必皆是中客及魘也若治少小法夏末秋
初常宜候天氣溫涼也有暴寒卒冷者其少小則多患

壯熱而下痢也慎不可先下之皆先殺毒後下之耳玄

中記云天下有女鳥名曰姑獲

肘後子母祕錄作鳥獲

一名天帝

女一名隱飛鳥一名夜行遊女又曰鈞星鬼喜以陰雨
夜過飛鳴徘徊人村里喚得來者是也鳥淳雌無雄不
產陰氣毒化生喜落毛羽於人中庭置兒衣中便令兒
作癩病必死即化為其兒也是以小兒生至十歲衣被
不可露也七八月尤忌

凡中客忤之為病類皆吐下青黃白色水穀解離腹痛

大紅面色變易其候似癰但眼不上插耳其脉急數者
是也宜與龍胆湯下之加人參當歸各如龍膽秤分等
多少也小兒中客急視其口中懸癰左右當有青黑腫
脉核如麻豆大或赤或白或青如此便宜用針速刺潰
去之亦可爪摘決之并以綿纏釵頭拭去血也少小中
客之為病吐下青黃赤白汁腹中痛及反倒偃側喘似
癰狀但目不上插少睡耳面變五色其脉弦急若失時
不治少久則難治矣欲療之方用鼓數合水拌令濕擣

熟丸如雞子大以摩兒顙及手足心各五六遍畢以丸
摩兒心及臍上下行轉摩之食頃破視其中當有細毛
即擲丸道中痛即止

治少小中客忤強項欲死方

取衣中白魚十枚為末以傅母乳頭上令兒飲之入
咽立愈一方二枚著兒母手掩兒臍中兒吐下愈亦
以摩兒項及脊強處

治少小客忤二物黃土塗頭方

竈中黃土蚯蚓屎等分搗合水和如雞子黃大塗兒
頭上及五心良一方云雞子青和如泥

又方

吞麝香如大豆許立愈

治少小犯客忤發作有時者方

以母月衣覆兒上大良

治小兒卒中忤方

剪取驢前膊胛上旋毛大如彈子以乳汁煎之令毛

消藥成著乳頭飲之下喉即愈

又方燒母衣帶三寸并髮合乳汁服之

又方取牛鼻津服之

又方取牛口沫傅乳頭飲之

一物猪蹄散治小兒寒熱及赤氣中人方

猪後脚懸蹄燒末擣篩以飲乳汁一撮立效

治少小卒中客忤不知人者方

取熱馬屎一丸絞取汁飲兒下咽便愈亦治中客忤

而嘔啼面青腹强者

二物燒髮散治少小見人來卒不佳腹中作聲者方
用向來者人顙上髮十莖斷兒衣帶少許合燒灰細
末和乳飲兒即愈

治小兒卒客忤方

銅鏡鼻燒令赤著少許酒中大兒飲之小兒不能飲
者含與之即愈

一物馬通浴湯治少小中忤方

馬通三升燒令煙絕以酒一斗煮三沸去滓浴兒即愈

一物猪通浴湯治小兒中人忤嘔啼面青腹强者方
猥猪通二升以熱湯灌之適寒溫浴兒

治小兒中馬客忤而吐不止者方

灸手心主間使大都隱白三陰交各三壯可用粉丸
如鼓法並用唾唾而呪之呪法如左

呪客忤法

呪曰摩家公摩家母摩家子兒苦客忤從我始扁鵲
雖良不如善唾良呪訖棄丸道中

又法取一刀橫著竈上解兒衣發其心腹訖取刀持向

兒呪之唾輒以刀擬向心腹啡啡曰音非出煌煌日

唾貌

煌煌日

出東方背陰向陽葛公葛公不知何公子來不視去
不顧過與生人忤梁上塵天之神戶下土鬼所經大
刀鏢犀對竈君二七唾客愈兒驚唾啡啡如此二七
啡啡每唾以刀擬之呪當三遍乃畢用豉丸如上法

五六遍訖取此丸破視其中有毛棄丸道中客忤即愈矣

小兒魘方

論曰凡小兒所以有魘病者是婦人懷娠有惡神導其腹中胎妬嫉他小兒令病也魘者小鬼也妊娠婦人不必悉招魘魅人時有此耳魘之為疾喜微微下痢寒熱或有去來毫毛鬚髮蒼擊不悅是其證也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有娠使兒飲此乳亦

作魃也令兒黃瘦骨立髮落壯熱是其證也

治魃方

灸伏翼熟嚼哺之

又方燒伏翼未飲服之

又方以水二升煮菡萏冬瓜各四兩取浴之

白鮮皮湯治少小客魃挾實方

白鮮皮

大黃

甘草

各一兩

芍藥

茯苓

細辛

桂心

各十銖

右七味呔咀以水二升煮取九合分三服

小兒夜啼

龍角圓治小兒五驚夜啼方

崔氏名
五驚丸

龍角

六銖

牡蠣

一作牡丹

川大黃

各九銖

黃芩

半兩

蚱蟬

二枚

牛黃

如小豆
五枚

右六味末密丸如麻子葶裏兒服二丸隨兒大小增

減

芎藭散治小兒夜啼至明即安寐方

芎藭

白朮

防已

各半
兩

右三味治下篩以乳和與兒服之量多少又以兒母
手掩臍中亦以摩兒頭及脊驗二十日兒未能服散
者以乳汁和服如麻子一丸兒大能服散者以意斟酌
酌與之

一物前胡圓治少小夜啼方

前胡隨多少擣末以蜜和丸如大豆服一丸日三稍
加至五六丸以瘥為度

又方以妊娠時食飲偏有所思者物以此哺兒則愈

又方

伏龍肝

交道中土

各一把

右二味治下篩水和少許飲之

又方取馬骨燒灰傅乳上飲兒啼即止

治小兒夜啼不已醫所不治者方

取狼屎中骨燒灰為末水服如黍米粒大二枚即定

治小兒驚啼方

取雞屎白熬末以乳服之佳

又方酒服亂髮灰

又方車轄脂如小豆許內口中及臍中

又方臘月縛猪繩燒灰服之

又方燒蝟皮三寸灰著乳頭飲之

千金湯治小兒暴驚啼絕死或有人從外來邪氣所逐
令兒得疾衆醫不治方

蜀椒

左顧牡蠣

各六銖碎

右二味以酢漿水一升煮取五合每服一合

傷寒第五

論方
灸法

論曰夫小兒未能冒涉霜雪乃不病傷寒也大人解脫
之久傷於寒冷則不論耳然天行非節之氣其亦得之
有時行疾疫之年小兒出腹便患斑者也治其時行節
度故如大人法但用藥分劑少異藥小冷耳

麥門冬湯治小兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆方

麥門冬

十八銖

石膏

寒水石

甘草

各半兩

桂心八銖

右五味以水二升半煮取一升每服一合日三

芍藥四物解肌湯治少小傷寒方

芍藥

黃芩

升麻

葛根

各半兩

右四味以水三升煮取九合去滓分服暮歲已上分三服

麻黃湯治少小傷寒發熱咳嗽頭面熱者方

麻黃

生薑

黃芩

各一兩

甘草

桂心

石膏

芍藥

各半兩

杏仁

十枚

右八味㕮咀以水四升煮取一升半分二服兒若小
以意減之

治小兒傷寒方

葛根汁

淡竹瀝

各六合

右二味相和二三歲兒分三服百日兒斟酌服之不

宜生煮服佳

治小兒時氣方

桃葉三兩搗以水五升煮十沸取汁日五六遍淋之
若復發燒雄鼠屎二枚燒水調服之

五味子湯治小兒傷寒病久不除瘥後復劇瘦瘠骨立
方

五味子

十銖

大黃

黃連

黃芩

麥門冬

前胡

各六銖

芒硝

五銖

石膏

一兩

甘草

當歸

各十銖

右十味㕮咀以水三升煮取一升半服二合得下便

止計大小增減之

莽草浴湯治小兒傷寒方

莽草

斤半

牡蠣

兩四

雷丸

三十枚

大黃

兩一

蛇牀子

一升

右五味以水三斗煮取斗半適寒溫以浴兒避眼及

陰

又方治小兒卒寒熱不佳不能服藥方

莽草

丹參

桂心

各三兩

菖蒲

斤半

雷丸升一

蛇牀子兩二

右六味以水二斗煮三五沸適寒溫以浴兒避眼及

陰

雷丸浴湯治小兒忽寒熱方

雷丸二十枚

大黃兩四

黃芩兩一

苦參

石膏各三兩

丹參兩二

右六味以水二斗煮取一斗半浴兒避眼及陰

浴訖以粉粉之勿厚衣一宿復浴

李葉浴湯治少小身熱方

李葉無多少咬咀以水煮去滓將浴兒良

柳枝浴湯治小兒生一月至五月乍寒乍熱方

細切柳枝煮取汁洗兒若渴絞冬瓜汁服之

青木香浴湯治小兒壯熱羸瘠方

青木香

兩四

麻子仁

竹葉

各一升

虎骨

兩五

白芷

兩三

右五味咬咀以水二斗煮取一斗稍稍浴兒

十二物寒水石散治少小身體壯熱不能服藥方

寒水石 芒硝 滑石 石膏

赤石脂 青木香 大黃 甘草

黃芩 防風 芎藭 麻黃根

右各等分合治下篩以粉一升藥屑三合相和復以篩篩之以粉兒身日三

李根湯治小兒暴有熱得之二三日者方

李根 桂心 芒硝各十 麥門冬八銖

甘草 各一兩

右五味呿咀以水三升煮取一升分五服

升麻湯治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅

急大小便不利或口瘡者或因壯熱便四肢攣掣驚仍

成痼疾時發時醒醒後身熱如火者悉主之方

升麻

白薇

麻黃

萎蕤

柴胡

甘草 各半兩

黃芩 一兩

朴消

大黃

釣藤 各六銖

右十味㕮咀以水三升先煮麻黃去上沫內諸藥煮
取一升兒生三十日至六十日一服二合六十日至
百日一服二合半百日至二百日一服三合

大黃湯治小兒肉中久挾宿熱瘡瘡熱進退休作無時

方

大黃

甘草

芒硝

各半兩

桂心

八銖

石膏

一兩

大棗

五枚

右六味㕮咀以水三升煮取一升每服二合

蜀漆湯治小兒潮熱方

蜀漆

甘草

知母

龍骨

牡蠣

各半兩

右五味㕮咀以水四升煮取一升去滓一歲兒少少

溫服半合日再

治小兒腹大短氣熱有進退食不安穀為不化方

大黃

黃芩

甘草

麥門冬

芒硝

各半兩

石膏

一兩

桂心

八銖

右七味㕮咀以水三升煮取一升半分三服期歲已下小兒作五服

竹葉湯治小兒夏月患腹中伏熱溫壯來徃或患下痢色或白或黃三焦不利方

竹葉

切

小麥

各五合

柴胡

麥門冬

人參

甘草

各半兩

茯苓

十八銖

黃芩

一兩六銖

右八味㕮咀以水四升煮竹葉小麥取三升去竹葉小麥下諸藥煮取一升半分三服若小兒夏月忽壯

熱燒人手洞下黃澹氣力憊然脉極洪數用此方加
大黃二兩再服得下即瘥

又方治五六歲兒温壯腹中急滿息不利或有微腫亦
治極羸不下飲食堅痞手足逆冷方

竹葉切一升 小麥半升 甘草 黃芩

括萎根 澤瀉 茯苓 知母

白朮 大黃各一兩 桂心二銖 生薑一兩半

人參 麥門冬 半夏各二兩 當歸十八銖

右十六味呔咀以水七升煮竹葉小麥取四升去滓
內藥煎取一升六合分四服

治小兒連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸方

大黃

一兩

黃芩

栝蔞根

甘草

各十
八銖

滑石

二兩

桂心

牡蠣

人參

龍骨

凝水石

白石脂

消石

各半
兩

右十二味呔咀以水四升煮取一升半每服三合一
日一夜令盡雖吐亦與之

一本加紫
石英半兩

調中湯治小兒春秋月晨夕中暴冷冷氣折其四肢熱不得泄則壯熱冷氣入胃變下痢或欲赤白滯起數去小腹脹痛極壯熱氣脉洪大或急數者服之熱便歇下亦瘥也但壯熱不吐下者亦主之方

葛根

黃芩

茯苓

桔梗

芍藥

白朮

藁朮

大黃

甘草

各六銖

右九味㕮咀以水二升煮取五合服如後法兒生一

日至七日取一合分三服生八日至十五日取一合
半分三服生十六日至二十日取二合分三服生二
十日至三十日取三合分三服生三十日至四十日
取五合分三服恐喫五合未得更以意斟酌百日至
三百日兒一如前篇龍膽湯加之

生地黄湯治小兒寒熱進退啼呼腹痛方

生地黄

桂心

各二兩

右二味以水三升煮取一升暮歲已下服二合以上

三合一方七味有芍藥寒水石黃芩當歸甘草各半

兩

治小兒傷寒發黃方

搗土瓜根汁三合服之

又方搗韭根汁澄清取如大豆許滴兒鼻中即出黃水

瘥

又方搗青麥汁服之

又方

小豆 三七枚

瓜蒂 十四枚

糯米 四十粒

右三味為末吹入鼻中

二物通汗散治少小有熱不汗方

粉 半斤

雷丸 四兩

右擣為細末和下篩以粉兒身

二物茯苓粉散治少小頭汗方

茯苓

牡蠣 各四兩

右治下篩以粉八兩合擣為散有熱輒取粉汗即自

止

三物黃連粉散治少小盜汗方

黃連

牡蠣

貝母 各十八銖

右以粉一升合擣下篩取粉兒身佳

犀角飲子此由心臟熱之所感宜服此方

犀角 十八銖

茯神 一兩

麥門冬 一兩半

甘草 半兩

白朮 六銖

右五味㕮咀以水九合煎取四合分服加龍齒一兩

佳

恒山湯治小兒温瘧方

恒山

兩切一

小麥

二合

淡竹葉

升切一

右三味以水一升半煮取五合一日至七日兒一合
 為三服八日至十五日兒一合半為三服十六日至
 二十日兒二合為三服四十日至六十日兒六合為
 三服六十日至百日兒一服二合半百日至二百日
 兒一服三合

又方鹿角末臨發時先服一錢匕

又方燒鼈甲灰以酒服一錢匕至發時服三匕并以火

炙身

又方燒雞臆脰中黃皮為末和乳與服男雄女雌

又方炙兩乳下一指三壯



備急千金要方卷十一

總校官中書臣朱鈺

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣汪師曾