

卷之三

四卷

七

當歸

黃芪炒

麻黃根

牡礪煅

炙甘草

人參

各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸

炙甘草

兩

附子

炮

五

桂心

白芍

炒各一
兩五錢

每服三五錢加姜枣水煎服以效為止

止汗散

牡礪煅五錢

小麥芽

兩

右為紳末

每服三五錢猪油汁調下

人參湯 產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症 人參 當歸 等分為末猪腰子一枚切

片水二鐘糯米半合葱白二根煮取汁八分入藥三錢煎服

當歸六黃湯 治氣血虛熱盜汗不止如不應加

人參白朮心血不足加炒酸棗仁

當歸

熟地

黃芪炒各

生地

黃柏炒

黃芩炒

黃連炒黑各

一錢

水煎服

參附湯 治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便

自利或膝腹疼痛吃逆不食或汙多發癰等症

人參一兩

大附子

炮五錢

作一服

加姜枣水煎徐飲下

人參一兩

大附子

炮五錢

作一服

加姜枣水煎徐飲下

當歸補血湯 治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲
晝夜不息脉洪大而虛重按全無者 當歸三
黃芪炙一 水煎服

芪附湯 治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰渴四肢遂冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等症 黃芪兩 附子炮五錢 作一服加姜棗水煎如不應倍加附子乃得全濟

○汗多變瘻

產後汗多變瘻因氣血虧損肉理不密風邪所乘

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以致牙關緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔瘻君無汗而惡寒者曰剛瘻由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多及潰瘍而膿血大泄者多患此乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加

太附子多有復甦者

丁產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐而自連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜一劑而甦數劑而安

小續命湯 治劄痙或腳氣痺弱不能轉舒行步欹側或口眼喎邪牙關緊急角弓反張

麻黃

桂心

甘草

各五錢

防風

白芍

炒

白术

炒人參

川芎

大附子

炮

防已

酒洗

黃芩

炒等分

每用五錢水煎入姜汁少許溫服

若自汗為柔症者去麻黃有熱去附子減桂丁半盛冬初春去黃芩

○產後口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋

手三陽之筋循結于領得風冷則筋急故致口噤腰背牽急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

薛氏曰若因血氣耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血為主佐以本方丹溪

謂產後當大補氣血為先。雖有空証以未洽之
如惡寒發熱等症，乃氣血虛甚之極也。宜大劑
參芪歸木肉桂以培養之。如不應用炮附子，
再不應用人參一兩附子二三錢，名參附湯。倘
猶不應，乃藥力未能及也。宜多用之。

婦人產後不省人事，吐涎癲痰。

當歸、荆芥穗等分三錢水一盞酒少許煎，
灌之下即甦。倘未應者，當改用大補氣血藥。
張文仲治前症用白朮四兩，以酒濃煎，頓服。

○產後中風

產後中風或氣血未復，風寒所感以致筋挛拘急，
口眼歪斜，或肢體緩弱，入臟則恍惚驚悸，或稽
中云：產後強力下床，或悞入房，或憂怒內傷，臟
腑陳無擇，曰當以脉辯而治之。若努力下床，月
內入房，憂怒者，著矣，非中風類，乃蓐勞火邪之
症。

薛氏曰：若果外邪所屬，形氣不足，病氣有餘，當補
元氣為主，稍佐以治病之藥。若強力下床，月內

入房屬形氣病氣俱不足當雜補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘挾不時驚悸

川芎

羌活

羚羊角

酸棗仁

炒芍藥

炒各四兩

桑白皮

一錢

防風

一兩

鐵

五分

每服

六七錢水

煎服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服愈

產後中風煩渴用紅杏子

五個

合水煎徐

呷之

○產後四肢筋挛

產後中風四肢筋脉挛急乃氣血俱虛或風邪客

於皮膚則頑痺羸乏若入於筋脉則四肢挛急皆由大經空虛風寒乘虛而漸入也

薛氏謂肝屬木而主筋若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味丸以補腎水

一產婦筋挛臂軟筋肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安

一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠乃氣血虛弱以十全大補湯加炮姜數劑漸愈去姜繼服而安

○產後遍身疼痛

產後遍身疼痛者，由氣虛，百節開張，血流骨節，以致肢體沉重，不利筋脉，引急發熱，頭痛，宜用藜痛散。治之陳無擇云：若兼感寒，傷食，宜用五積散。若誤作傷寒發汗，則筋脉抽搐，手足厥冷，則變為症，當補氣血為主。

薛氏曰：若以手按而痛益甚，是血瘀滯也。用四物炮姜紅荳，杏仁澤蘭，補而散之。若按而痛稍緩，此是血虛也。用四物炮姜，人參，白术，補而養之。

○趣痛散 產後骨節疼痛，發熱頭重，四肢不舉。
牛膝酒 甘草炙 薤白各兩 一當帰 桂心
白术炒 黃芪炒 獨活 生姜各半

每用五錢水煎服。

○五積散 治風寒所傷，遍身疼痛，腳氣疼痛，或寒熱拘急，嘔吐，不食等症。
桔梗略厚朴姜乾姜 人參 茯苓 陳皮
白芷 蒼朮 半夏姜制 肉桂 麻黃 炙甘草
各五分 入姜炭水煎服。

○產後腰痛

腎主腰脚，產後腰痛者，蓋腎為胞胎所繫，此因產勞傷腎，以致風冷客之。若連背脊痛久未已，遇有孕必至損動。

薛氏曰：若真氣虛而邪乘之者，當歸黃芪湯或十全大補為主佐，以寄生湯如不應，湏十全大補加附子。

十產婦腰痛腹脹，善噫，諸藥皆嘔，乃脾虛血弱，用白术一味炒黃，每劑一兩米泔煎時飲一匙，四

劑後漸安，服百劑全愈。

如神湯即生料五積散

加菟仁逐敗血去風濕

產後惡露不盡，腰重痛，或兩股痛如錐刺，宜服菟

仁湯，若作癰，用五香連翹湯。

菟仁湯 治產後惡露不盡，腹中作痛，或流注腿股，作痛急，用此湯治之，如未應，多變作癰，湏用

五香連翹湯 菟仁去皮尖蘇木 生地各半兩

蟲去足翅炒

水蛭炒各三十枚

每服五錢姜

水煎空心熱服，以惡露下為度。

卷之四

十四

五香連翹湯 木香 丁香 沉香 射香

升麻 獨活 連翹 木通 桑寄生各二

每劑五錢水煎入竹瀝少許服

當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出壯熱氣

短 黃芪炒 白芍藥炒各二兩

當歸三兩

每劑五錢水煎服

○產後腰痛兒枕痛

產後腹痛或因外感內傷瘀血壅滯所致瘀血以朱紫散風寒外感以五積散內傷飲食以養胃

湯加山楂治之

產後兒枕痛者乃母胎中宿血也其痛在小腹未抵小腹痛多由惡露凝滯或外寒相搏若久而不散必成血瘕月水因之而不調也

生生子曰設以手按之痛甚者瘀血也按之而痛緩者或喜熱物慰之者此虛中有寒也當補而溫之

○山楂濃煎汁入砂糖少許服之極治兒枕痛以其能消瘀血故痛止也

隱居澤蘭湯 產後惡露腹痛或胸滿少氣

澤蘭

生地

當歸

芍藥炒

生姜各一錢

甘草炙五分

大棗四枚

水煎服

失笑散

治心腹痛產後瘀血上攻心腹疼痛而牙關緊急

一服而愈

五靈脂

蒲黃各一錢

醋水煎服五灵脂一味尤妙

大岩密湯

治陽氣虛寒心腹作痛不食四肢厥冷

生地

當歸

獨活

吳茱萸

炮姜

白芍藥炒

甘草炙桂心

小草各一錢

細辛半兩

每帖五錢水煎服

延胡索散 產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索

桂心各半兩

當歸一錢

為末食前熱酒調下二錢

失笑散丸

當歸養血丸 產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸

赤芍

丹皮

延胡索炒各二兩

桂心一兩

為末蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下

金黃散 治惡露上冲肚腹作痛或發熱口渴

延胡索

蒲黃各一錢

桂心二分

為末酒調下

○產後寒疝腹痛

良方曰：產後臍腹作痛，乃冷氣乘虛也。用當歸建中湯治之。陳無擇云：若產當寒月，入門臍下脹痛，手不可近者，用羊肉湯治之。

生生子曰：若驗其無瘀血而果為寒氣所侵，蟠葱散亦佳。如小水短濶，口渴內熱，以龍胆瀉肝湯加青蒿、徹其熱，從小便出也。亦有陽氣下陷者，以補中益氣湯加芍藥桂心荔枝核。

羊肉湯 產後脾虛寒邪所乘，以致腹痛或頭眩。

膀胱急痛 精羊肉四兩 當歸 川芎各半
生姜一兩 水十盞煎，四盞分四次服。

蟠葱散 方見

○產後兩脇脹痛

良方曰：此因惡露不盡，或肝經血虛，或肝經氣滯，當分而治之。宜與脇痛門參治。

丁產婦因怒，兩脇脹痛，吐血甚多，發熱惡寒，胸腹脹痛，乃氣血俱虛。用八珍加柴胡丹皮炮姜，而血頓止。又用十全大補湯，而寒熱退。此症苟非溫姜桂辛溫

助脾肺以行藥勢，不惟無害，
以施其功而反助其脹耳。

經効方

治產後肝經氣滯，不平脇肋腹痛或寒熱往來，內熱晡熱。當歸一錢，芍藥炒苦梗炒枳壳八分，桂心，青木香，柴胡各六分水煎服。

當帰散

治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發熱腹痛，或腹脇脹滿。以當歸干姜等分，每服三錢水煎服。

○產後血瘕

良方曰：產後瘀血與氣相搏，名曰瘕。謂其痛而無定處，此因風有風冷而輕，則否；濕重則不通。薛氏曰：前症乃寒邪乘客，氣血壅滯，此因氣病而血病也。當補養胃氣，調和月經，寬緩靜養為善。難經云：任脈為病，男子內結七疝，女子為瘕聚，然當與瘕聚門叅治。

治血瘕作痛，脅下脹滿，或月經不行，發熱，体倦。

當歸八分，桂心，芍藥炒血竭，蒲黃炒各四分，延胡索分，為末，空心酒調分二次服。

葛氏方 治前症桂心為末每服一錢空心酒

調

○產後發熱

大全人參湯 治產後諸虛不足發熱盜汗
人參 當歸 等分為末以豬腰子一具去脂
膜切小片子以水三升粳米半合葱白二條煮
米熟取清汁一盞入藥末二錢煎至八分不拘
時溫服

羅氏犀角飲子 治產後亡津液虛損時自汗出
發熱困倦唇口乾燥 犀角 麥冬 白朮

兩

柴胡一兩 枳壳炒 生地 地骨皮 炙甘草
當歸 人參 茯苓 黃芩 黃芪一錢

右每服六錢入浮小麥七十粒姜三片水煎服
產後發熱多屬不足虛中有寒舟溪每以乾姜加
入補藥中取効不可不知

○產後虛煩發熱

薛氏曰虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒
發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急
加桂附若作渴面赤宜用當帰補血湯若誤認

為火症，投以涼劑，禍在反掌。王冰先生云：大寒而甚熱之，不熱是無火也；熱來復去，晝見夜伏，夜發，晝止，不時而熱，是無火也；熱來，當治其心，如大熱而甚寒之，不寒是無水也；熱動復止，條急，往來時動時止，是無水也；當助其腎，故心盛則生熱，腎盛則生寒，腎虛則寒，動於中心虛，則熱收於內，又熱不勝寒，是無火也；寒不勝熱，是無水也。治法前症無水者，六味丸無火者，八味丸氣血俱虛者，八珍湯或十全大補湯。

人參當歸湯 治產後虛煩短氣發熱

人參
當歸
麥冬
桂心
生地 各二

大棗 四枚
梗米 一合
淡竹葉 錢芍藥炒一錢

水煎服

產後血弱虛煩，四物加茯神遠志服之。

產後餘血不盡，心煩悶，生藕汁飲一二盞，甚妙。

竹瀝亦佳

竹葉湯 產後短氣欲絕，心中煩悶，以此補之。

竹葉
麥冬
小麥各一升
甘草一兩

生姜二兩

大棗十四枚
水一斗煮小麥竹葉至八升去渣納

餘藥煮取三升去渣溫服虛悸加人參二兩氣力少加糯米五合

○產後血渴

薛氏曰若出血過多虛火上炎用童子小便或四物白术麥冬丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥冬五味若血脫發熱煩躁用當帰補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白术散

七味白术散 治中氣虛弱津液短少口乾作渴

或因吐瀉所致 人參 白木炒 白茯苓
木香 灸甘草 霍香 葛根錢各一水煎服
竹葉歸著湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食
竹葉半錢 當帰一錢 黃芪錢 白术 人參
各一 麥冬七分 灸甘草五分 水煎服

○產後乍寒乍熱

產後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則乍寒陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹內作痛宜用奪命丹後用增損四物湯

隨病加減陳無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散

薛氏謂陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於阴中而發熱者用六味丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯下產婦惡寒發熱此血氣虛寒用十全大補加炮姜而寒熱愈繼以補中益氣而肢體安

○增損四物湯 人参 當歸 芍藥 炒 川芎

乾姜 炒各

甘草 四錢

每劑五錢姜水煎服

○大調經散

治產後惡露未消寒熱自汗或肚腹

作痛

大荳 炒去皮 一兩半

茯神 一兩

真瑰珀 一錢

為末每服二錢空心濃煎烏荳紫蘇湯調下

○產後癰疾

郭稽中曰產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽不和若繫作癰疾治之誤矣

陳無擇曰產後寒熱或一二日或二三日一發或

先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或純寒純熱者皆是癰疾最難治療可用草果飲生熟飲四獸飲選而用之

薛氏曰此症當以補胃氣為主佐以草果飲之類若胃氣稍充以草果飲為主佐以補胃之劑大抵產後癰疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君子加桔梗蒼术藿香如外邪多而飲少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯勞

後所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮姜中氣虛寒用六君加姜桂元氣脫陷急加附子益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐鳴不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退

增損柴胡湯產後虛熱寒熱如癰食少腹脹柴胡 人参 甘草 半夏 陳皮 川芎 白芍炒各等分每帖大錢八錢入姜枣水煎

白茯苓散

產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如癲

白茯苓

當歸

人參各半

熟地

右先以水三錢

黃芪

炒

川芎

桂心

白芍

炒

蓋入豬腎一雙姜東各三煎至二盞

入前藥半兩再煎至一盞許服之

豬腰子粥

產後蓐勞發熱用豬腰子一枚去膜

切片用鹽酒拌先用粳米一合入葱薑煮粥鹽醋和將腰子鋪在碗底以熟粥傾蓋之如作盒生狀空心服

黃芪建中湯

產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪

炒一兩

白芍

炒二兩

甘草

錢七

肉桂

一兩

每服五錢姜東水煎日二三服虛甚者

須下加附子為要

藿香正氣散

治外感風寒內傷飲食頭痛寒熱

或霍亂泄瀉或作瘧疾

藿香

一錢半

桔梗

炒

大腹皮

紫蘇半夏曲

茯苓

白芷

陳皮

白术

炒

厚朴一錢

制各

炙甘草五分

加姜枣水煎服

人參當帰散

治去血過多內熱短氣頭痛悶亂

骨節作痛或虛煩咽燥有似瘧者人參

當歸

生地

桂心

麥冬

白芍

酒炒

各等

分梗米一合竹葉十片水三鍾煎二鍾納前藥五錢東二枚煎至八分服虛甚者用熟地

生生子曰按病机要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早証利大便則脉數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥治之方法能無犯此三禁則營衛

自和而寒熱自釋矣

又有惡露不盡或風邪乘虛陷入血室者則晝日清明夜則譖語寒熱或只發熱如見鬼狀此為熱入血室用小柴胡湯加生地丹皮或四物加柴胡菟丝

○嘔吐腹脹及嘔逆不食

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之

薛氏謂若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷

於胃宜用六君子湯或加砂仁神曲之類尤
損其脾者當減其飲食為善

抵聖湯

赤芍藥 半夏

澤蘭葉

人參

陳皮 炙甘草各一錢

生姜半兩

水煎服

胃為水穀之海以養臟腑產後胃氣虛弱飲食所
傷必致嘔逆不食也治法不過溫養脾胃審其
所傷之物而推治之或有陽氣衰微火不生土
者八味丸若嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛
乃虛寒極剎急用理中湯加附子桂心而甦者
乃虛寒極剎急用理中湯加附子桂心而甦者

一產婦朝吐痰夜發熱日夜無寐或用清痰降火
肌體日瘦飲食日少前症愈甚詎思早吐痰脾
氣虛夜發熱肝血虛晝夜無寐脾血耗也遂用
六君子加逍遙散歸脾湯以久調補而痊

開胃散 治產後胃虛嘔吐胸滿不食

詞子肉

半兩

人參一兩

炙甘草

半兩

每劑五錢姜水煎服

產後胃虛嘔逆

橘紅一兩

半夏

炙甘草

各半兩

藿香三兩

每劑五錢姜水煎服

治產後嘔逆不食

白术

錢五

生姜

錢六

水煎

徐溫

服

石蓮散

半

茯苓

一

丁香

半

石蓮肉

一

丁香

半

為末每二錢姜湯或米飲調下日三次

錢氏益黃散

脾土虛寒

水反來侮

以致嘔吐不

食或肚腹作痛或大便不時手足逆冷等証

陳皮

兩一

青皮

一

調子肉

一

炙甘草

一

丁香

錢三

每服四五錢水煎服

人參養胃湯

治外感風寒

內傷飲食寒熱頭痛

或變瘧疾

半夏

厚朴

制

橘紅

各八

藿香葉

草果

伏苓

人參

各五

分

蒼朮

一

炙甘草

三分

右姜七片烏梅一箇水煎服

○產後喉中氣急喘促

產後喉中氣急喘促因營血暴竭衛氣無主獨聚於肺名曰狐陽竈為難治若因敗血停凝服奪命丹若因營血暴絕服芎芻湯若因風寒所傷服旋覆蒼湯因氣鬱結小調經散若傷飲食服見現丸

薛氏曰若脾胃氣虛用六君桔梗若兼外邪更加紫蘇中氣虛寒補中益氣加炮姜肉桂若陽氣虛脫更加附子若瘀血入肺急用二味參蘇飲一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護脐腹此陽氣虛脫用參附湯四煎而愈

二味參蘇飲 治產後血入於肺面黑發喘欲死人參一兩 蘇木二兩 水煎頓服

旋覆卷湯 治傷風寒暑溫喘嗽太盛坐卧不寧旋覆卷 赤芍葉 半夏曲 前胡 甘草

荆芥穗 五味子 茶芩 麻黃 杏仁各等分每以五錢姜棗水煎服有汗者勿服五味子湯 治產後喘促脉伏而厥五味子半錢人參 杏仁各二錢 麥冬 陳皮各一錢右姜三片東二枚水煎服

芎藭湯 芎藭 當歸 白芍半錢每五錢水煎服○產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脈之海起

產後口鼻起黑氣及鼻衄者蓋陽明經脈之海起於鼻交額中還出頰口交人中左之右之左

此產後氣虛營血散亂，胃絕肺敗之症也。急取
絆線一條，並產婦項心髮二根，緊繫中指節，更
無可療。

薛氏曰：按胃脉，俠口繞承漿，蓋鼻準屬脾土，鼻孔
屬肺金，誠胃虛肺損氣脫血死之症，急用二味
參蘇飲加附子五錢，亦有獲生者。

○產後月水不通

產後乳子周歲而經不行，是其常也。若半歲而經
行，此血有餘也。若一二歲不行而無疾，不必服

藥。若肢體倦怠，食少內熱，是血少也。宜健脾胃。
若以藥通之，則誤矣。

薛氏曰：脾胃虛弱，用六君子。若兼鬱火傷脾，用歸
脾湯加丹皮、山梔。若怒火傷血，宜四物合小柴
胡。氣血俱虛，八珍湯加丹皮。

○產後四肢浮腫

產後四肢浮腫者，乃敗血乘虛，流注宜用小調經
散陳無擇云。若風邪乘於氣分，皮膚腫而浮虛，
乃氣也。若皮膚腫如熟李，乃水也。蓋氣腫者宜

發汗水腫者宜利小便

薛氏謂若寒水侮土宜養脾胃若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣仍參水分血分而治一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫乃中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君子而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金櫃加減腎氣丸而愈

小調經散 没藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸

各一錢為末每服五分姜汁溫酒調

大調經散 最治腫滿喘急煩渴小便不利
方具乍寒乍熱卷

治血虛氣腫水腫澤蘭葉 防己

等分

為末每

以二錢溫酒調下或醋湯亦可

金櫃加減腎氣丸 治脾胃虛寒腰重脚腫濕飲留積小便不利或肚腹脹腫四肢浮腫氣喘痰甚或已成水症其効如神 白茯苓

兩三

牛膝

附子

五錢

桂心 車前子

山茱萸

兩

丹皮

附子

五錢

桂心 車前子

山茱萸

兩

丹皮

山藥 澤鴻各一兩 熟地黃四兩 為末，煉蜜丸梧子大，每服七八十丸，空心米飲下。

○產後腹痛鴻利

產後腹痛鴻利，因腸胃虛弱寒邪乘襲，或水穀不化，洞泄腸鳴，或手足逆冷，用調中湯治之，陳無擇謂若六淫七情而致者，當隨所感而治之。若胸膈飽脹，或惡食，吞酸，此飲食停滯，用六君子枳實山楂，以消導之。若食既消而仍痛，更或頭痛熱渴惡寒，欲嘔，此中氣被傷，用補中益氣半夏。

菝葜以益脾胃

調中湯

良姜

當帰

桂心

芍藥

附子 炮

川芎

各二兩

甘草

炒五錢

每服五錢水煎

五味子散

產後泄瀉或腎泄在五更，侵晨作鴻

飲食不進，或大便不實，登廁無時。

五味子

炒三兩

吳茱萸

炒五錢

共為末，每以二錢白

湯調下，為丸，妙。

西神丸 治脾腎虛弱，侵晨五更作瀉，或全不思食，或食而不化，大便不實，破紙故炒四兩

肉荳蔻一兩
生用

五味子二兩

吳茱萸兩
炒

四為末

用大紅棗四十九枚生姜四兩以水共煮爛去姜以枣肉和藥搗為丸梧子大空心鹽湯下

○三神丸 治同即前四神丸減去五味子吳茱萸

○產後赤白痢

產後痢疾因飲食六滯七情傷於脾胃或滲入大腸皆為難治若飲食不進謂之虛痢氣宇不順謂之氣痢寒熱溫良升降調補各隨所宜而施治之○白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用

六君加穀蘖若麵食所傷加麥蘖若肉食所傷加山楂神曲瓦薑嘔吐俱加霍香若薑喫酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木克脾土用六君加柴胡炮姜若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若鴻痢色黃乃脾土真色宜加木香肉荳蔻用補中益氣湯及四神丸若下元虛寒用八味丸以補土母若以小便澀滯肢體漸腫或兼喘

咳用金櫃腎氣丸以補脾胃利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫須補胃為主若久而不愈是氣虧損也必用四神丸六味丸八味丸三方以補

足三陰若用分利導水之劑是虛其虛也

產後痢疾作渴者乃內亡津液或胃氣虛不生津液但止其渴其痢自瘥○若渴而不喜冷飲屬胃氣虛故無津液宜用七味白朮散或錢氏白朮散如夜間發熱口渴屬腎氣虛而不能潤宜六味丸並佐以益氣湯以滋化源

丁產婦漏痢發熱作渴吐痰肌膚消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣乃脾腎之漏朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

丁產婦患前述形躉倦急飲食不進與死為鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

○產後大便秘澀

產後大便秘澀因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若用寒藥則促其危矣

薛氏曰若計其日期飲食數多即用藥通之禍在

婦人全書
反掌之間必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪胆汁導而潤之若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞症若去血過多宜用十全大補血虛火燥用加味四物氣血兩虛用八珍湯雞數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加杏仁杏仁治之若泥其日期飲食而強通之則誤矣

千產婦大使七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也用八珍加杏仁至三十日腹滿欲

行用猪胆汁潤去而安

國立臺灣圖書館/NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ROC

一婦大便秘澁諸藥不應苦不可言飲入乳而安

麻仁丸

火麻仁研如泥

枳壳

人參各四分

大黃二分右為末入麻仁、煉蜜丸如梧子大每服

二十九空心溫酒下未通漸加不可過服

阿膠枳壳丸 治產後大便秘澁以阿膠枳壳二味等分為末蜜丸梧子大滑石末為衣白湯送下二十九未行再服

○產後大小便不通

良方曰此因腸胃虛弱津液枯竭故也宜參前秘
一產婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳
一日稍通三日而痊人乳亦善

燕花散 治膀胱氣滯血澀大小便秘

杏仁 薏子 滑石 桃郎 各等分為末每
以三錢空心葱白煎湯調下

○產後遺糞

良方取故燕窠中草燒為末或枯藜牡礪或白歛
芍藥各等分為末俱用酒調服或用蜜固腸亦可

薛氏曰若脾胃虛弱用還少丹仍以補中益氣湯
為主虛寒加肉草蔻補骨脂或四神丸若脾胃
虛寒兼八味丸仍佐前二方

一產婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虛失行
常道先用六君子湯二劑又用五苓散一劑而
痊循常陽爻亦可微治

還少丹 治脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精
白濁又治真氣虧損肌体瘦弱等症 肉蓴蓉
遠志心 苔香 巴戟 山藥 牛膝 熟地

枸杞子

石菖蒲

山茱萸肉

楮實子

五味子

杜仲去皮姜炒

白茯苓各二兩

各另為末

東臘百枚

加煉蜜為丸

如梧子大

每服五七十丸

空心酒下

○產後諸淋

良方謂乃熱客於脾虛則頻數熱則澁痛氣虛兼熱血入胞中則血隨小便出而為血淋也薛氏云若膀胱虛熱用六味丸若陰虛而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生五金生水當滋化源

也與小便淋瀝頻數卷參治

滑石散治熱淋

滑石

五分

通草

車前子

葵子各四分

右為細末

漿水調服

治小腸有熱小便澁痛或為血淋

瞿麥 黃芩 冬葵子各二兩

通草

二兩

大棗

十二枚

右水六升煎二升半分三服

治脾氣不利小便不通

橘紅為末以二錢空心溫酒下

治肺氣不利小便不通

杏仁十四枚

去皮尖炒

食

治脾轉小便不利

滑石

一錢半

寒水石

一錢

煎服

丁產婦小水淋瀝或時自出用分利降火之劑二年不愈此肺腎氣虛用補中益氣湯六味地黃丸而痊

九而痊

凡產婦小便頻數者乃氣虛不能制故也

○小便不禁

廣濟方治產后小便不禁用雞毛燒灰千金翼用白薇芍藥為末俱用溫酒下日三服或桑螵蛸半兩龍骨一兩為末每二錢粥飲調下

薛氏謂若脾肺氣虛用補中益氣湯若肝腎陰虛六味地黃丸若肝腎虛寒用八味丸

補脾飲

治胞破小便淋瀝

生絳

黃色者

白牡丹

用根

白芨

各一錢

水一盃

煎至一尺

溫

服服後忌言語否則無功

雞內金散治氣虛溺床用雄雞肚腔并腸燒為

末以溫酒調下

○產後小便出血

此因虛熱血滌於脬也以亂髮洗淨燒為末米飲

調服或滑石末一錢生地黃汁調下

丁產婦尿血面黃脇脹少食此肝木乘脾土也用加味逍遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不禁食少躊躇驚悸無寐便血復出用加味歸脾湯二十餘劑將愈感于衆論服犀角地黃湯諸症復作仍守前湯而愈

○產後陰脫玉門不閉

此因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫腫痛小便淋瀝

薛氏謂氣血虛弱宜用十全大補湯若腫脹發痛肝經虛熱也加味逍遙散若憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若暴怒肝火血傷也龍胆鴻肝丁產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉矣

硫黃散

產後四肢虛寒

硫黃

烏賀魚骨

五味子

各半

為末摻患處

一方蛇床子

炒熟帛包熨患處亦治陰腫

○產後乳少或止

乳汁乃氣血所化者。元氣虛弱，則乳汁短少。初產乳房焮脹，此乳未通。若暴怒，乳出肝經風熱，若累產無乳，此內亡津液，蓋乳汁資於衝任。若婦人疾在衝任，乳少而色黃。生子則怯弱而多疾。薛氏云：此氣血虛弱，而不能化生。宜壯脾胃，怒動肝膽，而乳腫汁出。宜清肝火，屢產無乳，或大便滯滯，當滋化源。氣血旺，則乳汁溢。

○產婦因乳少服藥，通之致乳房腫脹發熱作渴。

此氣血虛以至露散補之而愈。

湧泉散

能通乳

王不留行 麥門冬 薤麥

龍骨

各二錢

右用猪蹄汁一碗酒一杯煎服良

玉露散

乳脉不通，身熱，壯熱，頭目昏痛，大便滯

滯

人參 茶芩 桔梗

炒芍藥各一錢

甘草各三分

右㕮咀水煎服愈。

凡未產而乳先出，謂之犯乳。生子多不育。

產婦氣血方盛，乳房作脹，或無兒飲，因而脹痛增

寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服之立消

一產婦勞役或乳汁來如沸泉昏昧吐痰此陽氣虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯數劑而安矣

一婦乳頭裂破以秋茄子梨開者陰乾燒存性為末水調塗之而愈

○婦人繭唇

內經曰脾氣開於口又曰脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則瞤寒則揭若腫起白皮皺裂如蚕

繭名曰繭唇有腫重出如繭者有本細末大如繭如瘤者其因或胎產經行而陰血損或七情動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱傷脾大要審本症察兼症補腎水生肝血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察內用清熱消毒之藥外用追蠶線繕之法反為敗症慎哉

一婦懷抱久鬻或時胃中嘈辣胸膈不利月水不調晡熱食少躰倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火

傷血用歸脾湯加姜汁炒黃連、山梔少佐吳茱萸、嘈辣頓去，飲食少進，乃去黃連，加貝母遠志，胸膈通利，飲食如常，又用加味逍遙散歸脾湯，間服百餘劑，月水調而脣瘡愈。

一婦月經不調而足發熱至年餘，而身亦熱，勞則足腿痠疼，又年餘唇腫裂痛，又半年唇裂出血，形躰瘦倦，飲食無味，月水不通，唇下腫如黑棗，此肝脾血虛火症也，彼不信用通經藥而效。

一婦口苦脇脹，此肝火之症也，用小柴胡加山梔

黃連少愈，更以四君子加芍藥當歸柴胡，調補脾胃，而瘥。

一婦每怒口苦，發熱晡熱，此肝火盛而血傷也，以小柴胡合四物二劑，以清火而生血，更以四物加柴胡白朮菝葜丹皮，生血健脾而安。

一婦因怒齒痛寒熱作嘔，用清胃寺藥，甚乃肝火傷胃，寒涼復傷，故也，用六君子加芍藥柴胡山梔而安。

一婦胃中嘈辣甚，則熱痛後患齒痛，此胃中瘀火，

也以二陳加芩連吞越鞠丸而瘳

一婦因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加芎歸芩术山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒熱退

清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或連頭面頸項作痛黃連錢半川帰生地丹皮錢一升麻錢右水煎服如寢熱便秘加

大黃

加味清胃散 即前方加犀角甘草連翹

涼膈散 治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺

赤澁狂言譖語睡卧不安

大黃

朴硝各一錢

甘草一錢連翹二錢

梔子黃芩薄荷各一錢水煎服

人參白朮炒各一錢

白芍炒各一錢

陳皮甘草各一錢

右姜棗水煎服

四順清涼飲 加山梔大力子名加味清涼飲

治臟腑寢熱秘結口舌生瘡當帰赤芍

甘草大黃錢各一錢右水煎服

人參安胃散

治服峻劑損脾胃口舌生瘡

人參 茶芩

各一錢

黃連 炒各五分

黃蓍 炒二錢

生甘草

炙甘草

黃連

炒各一分

白芍 炒七分

水煎服

溫中丸

一名人參理中丸

治中氣虛熱口舌

生瘡不喜飲冷肢體倦怠少思飲食

人參 炙甘草 白朮

炒各等分

為末姜汁糊為

丸梧子大每服五十九白湯送下

柳華散

治熱毒口瘡

黃柏 炒

蒲黃

青黛

人中白 滾

右等分為細末敷之

四物湯

治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰發熱煩

躁不安

加味四物湯

即四物加丹皮柴胡山梔

四物二連湯

治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸

熟地

白芍 炒

川芎

胡黃連

川連 炒各一錢

水煎服

甘桔湯

治咽喉腫痛

甘草 炒

苦梗 錢三錢

右水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參

各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分

黃蓍

炒二錢

生甘草

各三錢

水煎服

人參


各一錢

茶芩

各一錢

黃連

炒各五分



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

卷

大宮詹少溪吳馭閣校

赤水玄珠婦人門第二十九卷目錄

卷之六

耳

雜方

赤白遡風

婦人瘡疾

婦人足跟瘡腫

肺瘡

卷之五

十一卷非金

乳瘡乳岩

終

婦人全書卷之五

新安生生子孫一奎著輯

耳

立齋曰耳瘡屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛風熱或怒動肝火而致若發熱煥痛屬三焦厥陰風熱用柴胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐乃肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱為肝腎阴虛用益陰腎氣丸若月經先期為血熱用加味逍遙散過期為血虛用八珍湯食少脉倦

為鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦急為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味逍遙散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際火血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間

結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味道逍遙散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯治肝膽經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡

二錢

黃芩

炒一錢

人參

半夏

各七分

炙甘草

五分

姜三片水煎服

加味小柴胡湯

治肝胆經風熱前後脰痛或

結核癰痛或寒熱嘔熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散

治肝經之症寒熱脢痛脾胃虛

弱

炙甘草

人參

柴胡

各五錢

白术

炒一錢

茯苓

各一錢

川芎

丹皮

七分

水煎服

黃蓍

各一錢

丹皮

七分

水煎服

柴胡

各五錢

白术

炒各一錢

川芎

丹皮

七分

水煎服

炙甘草

人參

柴胡

各五錢

白术

炒各一錢

川芎

丹皮

七分

水煎服

梔子清肝散

治三焦及肝膽經風熱耳內作痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往来

柴胡

山梔炒

丹皮

各一錢

茯苓

川芎

芍藥

當歸

牛蒡子

炒各七分

白术

炒

甘草

各五錢

水煎服

柴胡清肝散

治肝膽三焦風熱怒火以致項脰痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱脢

痛

柴胡

黃芩炒

甘草

各五錢

人參

山梔炒

川芎各一連喬

桔梗

各一分

水煎服

犀角地黃湯

治上焦有熱口舌生瘡發熱或

血妄行或吐衄或下血

犀角

生地

白芍藥

黃芩 炒

牡丹皮

黃連 炒各一錢

水煎服

因怒而患者

加柴胡山梔

犀角升麻湯

治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足少陰經風熱連耳作痛

犀角

升麻

防風

羌活 各一錢

白附子 五分

川芎

白芷

黃芩 炒各七分

甘草 五分

水煎服

當帰川芎散

治手足少陽經血虛瘡症或風

熱耳內痺痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈不利腹脇疼痛小便不調

當歸

川芎

柴胡

白朮 炒

丹皮

茯苓 各八分

炒各一錢

山梔

炒一錢二分

丹皮

茯苓 各八分

蔓荆子 甘草 各五分

水煎服

○雜方

加味地黃丸

治肝腎陰虛諸症或耳內痺痛

卷之三

三

五

出水或眼昏痰喘或熱渴便澀等症

乾山藥

山茱萸

牡丹皮

澤瀉

柴胡

白茯苓

熟地黃

生地

五味子

各等分
為未

右將煉蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯
下如不應用加減八味丸

人參養榮湯

治潰瘍寒熱四肢倦怠肺瘦少氣面黃氣短不能收斂太瘡愈後多服之庶不變他症也

白芍藥

五錢

人參

陳皮

黃蓍

炒

桂心

川歸

白朮

炒

炙甘草

各一錢

熟地

五味炒

茯苓

各七分

遠志

去心五分

入姜棗水煎服

瀉青丸 治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱
太便秘結

川帰

龍胆草

炒焦

川芎

山梔

炒

大黃

炒

羌活

防風

各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下

○若

陰血不足肝火血燥

用四物加山梔柴胡或逍

市人全集

卷之三

六

遙散加丹皮山梔○若腎水虧損不能生肝木
而筋挛結核或肢節挛搐或似中風癇疾上瀉
用六味丸料煎服

生地黃丸 治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸
間結核肝脉弦長直出魚際

生地 秦艽 黃芩 硬柴胡各五分
赤芍藥一兩 右煉蜜為丸梧子大每服三十
丸烏梅湯下

連翹飲子 治肝胆經氣滯瘰疬結核或乳內

結核者 連翹 川芎 丹葵仁
橘葉 皂角刺炒 青皮 甘草節
桃仁各一錢 水煎服
散腫潰堅湯 治瘰疬堅硬氣血無虧者
升麻 連翹 川帰尾 白芍
葛根 三棱酒拌炒 廣朮各三分 龍胆草
桔梗炒 昆布 知母酒炒 瓜萎仁各五分
柴胡四分 黃芩酒炒 炙甘草二分

必效散 治瘰癧未成者消已潰者歟湏元氣
無虧者可服孕婦勿服

南蓬砂二錢 半

輕粉一錢

斑猫四十枚去頭足同換米炒

去米

射香五分

巴豆五粒去壳心膜

白梔榔一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水滯滯或微疼此癰毒散下也進益元散一服

即下

此方班猫巴豆似為峻厉然用巴豆

乃解斑猫巴豆用者勿畏也

益元散

滑石飴六錢

甘草

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏

治頸項或腋下初結小核漸如連珠

潰而膿水不絕或漏症者

琥珀

一兩

丁香

桂心

硃砂

木香

松香

俱為末

白芷

防風

當帰

木通

木別子肉

各五錢

麻油

二斤

將后五味入油煎熬去渣徐徐入黃丹

再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散

治一切頑瘡內有瘀肉或癰核不化

瘡口不合宜此藥腐之

赤石脂

五錢

乳香

白丁香

砒霜生用

黃丹

各一錢

輕粉

射香

各五錢

蜈蚣

一條

為末搽肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細条陰乾縫之凡瘡久不癒者內有膿管必須用之

○結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調護或因暴怒觸動肝火若結於項側耳前

後或胸脇腫痛或發寒熱屬胆經風熱怒火宜用柴胡清肝散加鈎藤山梔以養血氣清肝火卷結于肉理其色不变肺熱內熱屬肝火血虛宜加味逍遙散加龍胆草以養肝血清肝火或結于肢節或累如貫珠其色不变亦肝火血燥而筋挛宜用柴芍參參散加鈎藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾肺之氣並佐以海藻丸君潰而核不腐或肉不生或膿水

清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色癟黃
食少神倦便利不調者五臟皆虛也但用補中
益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則
各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可
輕用行氣破血而復傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便
頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味
逍遙散調補肝脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不

調火肝胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮
及六味丸而愈

一婦項患五核時常寒熱肝脉弦長而出寸口此
血盛無偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而
愈

加味道逍散 治肝脾血虛有熱遍身搔癢或
口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧小便澀滯等症
又治瘰癧流注虛熱等瘡

炙甘草

當歸炒

芍藥酒炒

茯苓

白术炒各一錢

柴胡

牡丹皮

山梔炒分五

水煎服

逍遙散

即前方減丹皮山梔

歸脾湯

治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致夜行或健忘怔忡驚悸不寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂恚傷脾血虛發熱或肢躰作痛大便不調或經渙不准晡熱或癆瘻流注不能消散潰斂

人參

白术炒

黃耆炒

茯苓

當帰

遠志

酸棗仁炒各一錢

木香

炙甘草各

分

龍眼肉

三枚

姜棗水煎服

加味歸脾湯

即前方加山梔柴胡

柴木參芩湯

治肝火血熱遍身搔痒或起赤

翬或筋挛結核

白术

人參

茯苓各一錢

柴胡

川芎

山梔炒

芍藥炒

甘草

炒各五分

熟地

當帰

分各八

水煎服

柴芍參芩散

治肝胆經部分結核癩瘍

金匱

卷之三

二十一

一

等症或肝血燥脾氣虛弱發熱少食

柴胡 药藥 炒 入參 茯苓 白朮 炒

山梔 炒

陳皮

當帰 錢一

丹皮

甘草

分各五

姜棗水煎服

清肝益榮湯

治肝胆經風熱血燥筋挛結核

或作癩子

柴胡

意苡仁

茯苓

木瓜

熟地 錢各一

山梔

龍胆草

白朮

炒各五分

川芎

川歸

芍藥 炒各

甘草

三分

水煎服

清熱涼血飲

結

當帰

治風熱血燥丹毒等症大便秘

生地 錢各一

水煎服

消瘦塊甚効

神効開核散

消瘦塊甚効

沉香

木香各二錢

橘紅

四兩

珍珠

桂入十九

封固

赤存性出火毒

為末每服一錢臨臥

酒調徐徐嚥下輕者三

五服重者十服可愈切忌酸鹹油膩滯氣之

物須用除日于靜室修合

上

海藻散堅丸

治肝經癰瘤

海藻

昆布各二兩

小麥四兩

醋

柴胡二兩

龍胆

酒拌炒焦二兩

為朱蜜丸

梧子大

每服三十

丸臨臥白湯送下噙化

之尤妙

凡患癰

癰腫調治之藥未應宜佐

以前二藥

益氣養榮湯

懷抱抑鬱癰癰流注或四肢患

腫肉色不變

或日晡發熱或潰而不

斂

人參

茯苓

陳皮

貝母

香附

川歸

川芎

黃蓍

鹽水熟地拌炒

芍藥

一錢炙甘草

桔梗

炒各五分

白朮

炒二錢

入姜水煎服

木香餅

治氣滯結腫閉胸風寒所傷作痛

木香為末

生地一兩

搗

地黃膏和勻量患

五錢大小作餅子置患處

以熱熨斗熨之

共

之腫痛悉退

當帰飲

治熱血癰疹痒痛膿水淋漓發熱等

症

當帰

白芍藥

川芎

生地

白艾黎

炒一錢

黃耆各一錢

防風

荆芥

何首

烏忌鉄

甘草各五分

水煎服

○赤白遊風

婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱結血虛生熱或腠理不密風邪外襲其症或疮瘡癰癧或膿水淋漓白屬氣而赤屬血日得風而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝火血虛六味丸肝經鬱熱加味歸脾湯肝脾虛風熱加味逍遙散若因風邪鬱熱所致用荆

防敗毒散或專用祛風之劑肝血愈燥則血隨火化反為敗症矣

一婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暉晡時益甚用加味逍遙散而愈

一女赤暉如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈。大凡女子未癸未至婦人月經不調受驚着惱多有此症

消風散治風寒癰疹癰癧或膿水淋漓頭皮

腫庠

荆芥穗

冬甘草

陳皮