特 1
3432

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』 請求記号 特1-3432

ガラス使用

特1-3432

帝國圖書館藏

古方藥議卷三目次

茈胡　栝蔞根　牡蠣　桃人　鉛丹　水蛭　蠐螬　白蜜　文蛤

栝蔞實　土瓜根　膠飴　餳　龍骨　蜀漆　蝱蟲　葶藶　甘遂　桔梗

昭和十七年十五圖書之藏

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』 請求記号 特1-3432　ガラス使用

巴豆　貝母
芫花　大戟
赤石脂　禹餘糧
太一餘糧

古方藁議

信濃　淺田惟常識此著

宮内省圖書寮

白井氏藏書

茈胡

〔釋品〕和名波万阿加奈、本邦所在有之、自秋生新苗、其葉似瞿麥青紫色、至春漸長如竹葉、秋岐數枝發小黃花、結細子、至冬莖葉枯、市肆以西州產者呼鎌倉柴胡、以關東產者呼三嶋柴胡、並宜擇用、枳實如鼠尾氣味苦芳、發而無油臭者、又間有舶來、形味如鎌倉柴胡而肥大耳、

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』　請求記号 特1-3432
ガラス使用

〔釋性〕主心腹去寒熱邪氣除煩止驚消痰止嗽治婦人産前後諸熱及熱入血室經水不調宜暢血氣下氣消食

議曰、芫胡味苦平、驅表裏之熱、逐胸脇之邪、故能除煩止驚消痰止嗽治眩運目昏耳聾鳴、宜矣仲師用為少陽之主藥也、蘇頌曰、張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨牡蠣芫胡加芒消等湯、故後人治寒熱此為最要藥、夫邪氣在表裏之間、則為少陽所主之界、故其證主心腹、其熱為往來、方此時非發汗吐下之所宜、惟芫胡能驅逐以達于外也、後人弟知芫胡和解外而不知芫胡最能和裏、今夷攷仲師方、如小芫胡湯芫胡桂枝湯芫胡桂薑湯芫胡去半夏加栝蔞湯、則專于少陽者也、故當其奏功、蒸々而振、或微煩發熱汗出而解矣、如大柴胡湯芫胡加芒消湯芫加龍骨牡蠣湯、則併制陽明者也、故曰下之則愈、曰先宜小芫胡湯以解外後以芫胡加芒消湯主之、可見裏亦芫胡之所關係也、芫胡不徒驅逐表裏之邪氣、亦能走于血分而退血熱、是以小柴胡湯又治熱入血室及産後血厥、薨風諸証、後世勞藥血藥亦有往々用之者、張潔古曰、婦人産後血熱必用之藥、蓋

産後血熱亦有虛実若固執以投之不能無害要之
本經主心腹之語實為芵胡之標準又如四逆散治
少陰裏熱芵胡飲子退五藏虛熱雖有陰狀虛候係
邪本壅正氣其主芵胡者乃苦以發之也
按仲師治瘧母鼈甲煎丸治勞瘧芵胡去半夏加栝
樓湯皆用芵胡而註家未有明晰之者獨龐元英談
藪載張知閤久病瘧熱時如火年餘骨立醫用茸附
諸藥熱益甚召醫官孫琳脉之琳投小柴胡湯一帖
熱減十之九三服脫然琳曰此名勞瘧熱從髓出加
以剛劑氣血愈虧安得不瘦蓋熱有在皮膚在藏府
在骨髓非芵胡不可若得銀芵胡只須一服南方者
力減故三服乃効也可謂孫琳善得仲師之旨矣

附前胡

〔釋品〕和名无万世利肥後州武州産為上品
〔釋性〕味辛甘治傷寒寒熱痰滿胸脇中痞心腹結
氣風頭痛去痰下氣開胃下食
議曰外臺秘要引崔氏載大前胡湯小前胡湯即是
傷寒論大小柴胡湯惟前胡代芵胡耳其他晉唐諸
方用前胡大氐與芵胡療體相近陶弘景曰與芵胡
同功而今所謂前胡者芳香微苦絶不似芵胡之苦

臊古之所用果是耶或曰苞前音通即一物耳余未知其可否姑書以俟來哲徵驗

栝蔞實

〔釋品〕和名岐迦良須宇利本邦所在有之春生苗蔓延狀如土瓜而葉薄澤作又無毛夏開白花結實如拳生青熟黃內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁多脂古方完用後世乃分子瓤各為用也其根長數尺秋末掘采結實有粉切之有花文者為真

〔釋性〕味苦冷主胸痺潤心肺利咽喉去胸膈鬱熱滌痰結為治嗽之要藥

議曰栝蔞實味苦冷能利胸膈散滯結故與半夏黃連相配治結胸與桂枝薤白相合除胸痺小陷胸湯及栝蔞薤白白酒湯栝樓薤白半夏湯枳實薤白桂枝湯之所主可以見焉陶弘景曰主胸痺朱震亨曰治嗽之要藥蓋栝蔞實性滑潤能洗滌胸膈中痰沫膩垢猶如油之洗物是以結胸胸痺欬嗽凡胷中疾非是品不能蠲也惟如小結胸則邪結固小未及畜水故不用芒消甘遂鹹寒逐水之品而用半夏栝樓實辛溫滑潤之物是以其所下不在畜水而在黃涎小陷胸湯方後云下黃涎便安也亦可以見大小結

胸軽重之別耳、
按栝蔞後世唯用人而不用實、然證治雖繩云、肥大結實連子皮細切用、仲景方乃稱一枚、又曰一個、而不言分量、則古子瓤偕用者明矣、

栝蔞根

〔釋品〕和名岐迦良須宇利乃称、詳于前栝蔞實條下、

〔釋性〕味苦寒、主消渴身熱煩滿大熱、止小便利排膿消腫毒、行津液、心中結痼者非是不能除、
議曰、栝蔞根味苦寒、能潤中以行津液、故津液枯燥、筋脉失養、身體几々然為柔痓者、桂枝湯方中加此品、又瘧病津液枯竭、引水飲及勞復不止者、小茈胡湯方中去半夏加此品、小茈胡湯方後亦云、若渴者去半夏加人蔘合前成四兩半、栝蔞根四兩、乃知其所主在滋津也、圖經云、栝蔞主消渴、古方亦單用之、即不過此義、又與牡蠣滲泄之品相配、以治小便不利渴而不嘔、柴胡桂枝乾薑湯、牡蠣澤瀉散、栝蔞牡蠣散之所主、可以推知耳、其他如栝蔞瞿麥丸、亦以其行津液併之於利水之品而導水氣者也、李果曰、與辛酸同用導膓氣、可謂泥矣、產寶云、治產後乳無

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』　請求記号 特1-3432
ガラス使用

汁、栝蔞末并花水服方寸匕、日二服、夜流出、足以見其滋津一端矣、

按栝蔞根搗作粉者名天花粉、天花即雪也、取之於潔白之義、明吳有性因外臺天行門栝蔞湯制紫胡清燥湯、而方中用天花粉、蓋天花粉出於栝蔞根、清熱滋燥之功却優於本性、可謂出藍矣、蘇恭曰、用根作粉、潔白美好、食之大宜虛熱人、吳氏恐本于此、

土瓜根

〔釋品〕和名加良須宇利、乃稱即王瓜根、王瓜春生芽、葉似栝蔞、有尨茸、蔓延累竹木、晚夏開白花、似瞿麥而濶大、秋結瓜如雞子大、熟赤色、內有黑核、形似結書、故名多未都佐、根結數塊、頗似栝蔞根、但橫切之無花紋為異、野人作粉、混衍天花粉中、蓋王瓜粉黯淡不潔白、握之無雪聲、又以銀匙抄之、粉附著其背面、天花粉則否、是為辨、

〔釋性〕味苦寒、主消渴內痺瘀血、月閉帶下、下乳汁、散癰、止小便數不禁、

議曰、王瓜根味苦寒、其性畧似栝蔞、而行瘀血利大小腸之效却優、是以治瘀血帶下、方中主之、又治陽明津液內竭、導法用之、土瓜根散及蜜煎導條下可

以徵爲、
按土瓜正是王瓜訛、禮記月令王瓜生、呂氏春秋王
菩淮南子王瓜皆同物、金匱土瓜根散脉經引作王
瓜根散、益足以徵其訛爲、本草云或王瓜、似未晰、

牡蠣

〔釋品〕和名迦岐、諸州海旁多有之、皆附石生、磈礧
相連、嶄巖如山、俗呼磯迦岐、寧波府志所謂梅花
蠣是也、一種生海中、大如馬蹄者、曰海牡蠣、又曰
草鞋蠣、俗呼沖迦岐、入藥最佳、不必拘左顧右顧
者、臨用須泥固燒、使色潔白耳、段成式曰、牡蠣言

マガキ 淡水多キ所
イタボ 小ナルモノ 堅海
ナガガキ
スミノエガキ 大ナルモノ
九州有明海

牡非謂雄也、且如牡丹豈有牝丹乎、此物無目更
何顧盻、此說真快可從、

〔釋性〕味鹹平、主傷寒寒熱溫瘧洒々驚恚怒氣、止
盜汗、療洩精、治心脇下痞熱、
議曰牡蠣味鹹平、能鎮驚泄水、故柴胡龍骨牡蠣湯
救逆湯治煩驚及狂驚、而柴胡龍骨牡蠣湯與柴胡
桂枝乾薑湯、皆有小便不利證、蓋牡蠣海氣所化成、
性鹹質重、能重墜其病而泄之下焦、故胸滿煩驚及
胸脇滿微結、從此而解矣、夫重墜者必能收脫除溢、
是以柴胡桂枝乾薑湯之頭汗、桂枝加龍骨牡蠣湯

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』　請求記号 特1-3432
ガラス使用

之失精皆牡蠣之所任矣又至于牡蠣澤瀉散治水氣則其重墜滲泄之性配諸利水之品以利下焦之濕濁者也張子和以為蠲飲泄水之劑可謂得古方之旨也今世俗治吞酸嘈雜以牡蠣一味又諸鳥糞閉則碎牡蠣以與之乃得通亦足以見其效用一端矣

膠飴

〔釋品〕和名美都阿女用糯米飯和麥蘖熬煎而成濕軟如厚蜜作琥珀色者是也其色白而堅硬成塊者謂之餳又曰硬糖和名加多阿女陶隱居曰方家用飴糖乃云膠飴皆是濕糖如厚蜜者建中湯多用之其凝強及牽白者不入藥

〔釋性〕味甘温補虛乏益氣力消痰止嗽潤五藏

議曰膠飴味甘温其能略類甘艸蜜而和潤之力則為優故仲師大小建中湯及黃蕷建中湯當歸建中湯等用之以和胃氣緩諸急也其証曰腹中急痛曰上下痛而不可觸近曰裏急曰疞痛是皆中氣不振腹裏拘急之所致也非膠飴之甘以和潤中則安能奏其效乎蓋仲師治中焦之方有建中有理中而一和一温一潤一燥相對以立温養之法後世補益之

方雖千萬皆不能出此範圍矣

附餳

〔釋品〕和名詳于前傷寒蘊要云膠飴即餳糖也誤矣釋名云饎之清者曰飴形怡々然也稠者曰饎強硬如餳也如餳而濁者曰餔方言謂之餱饙是說適當可從

議曰金匱治蛟龍病用寒食餳蓋蛟龍病係蚘之變動其用餳糖者即與甘草粉蜜湯同旨不過安蚘之策耳

時珍曰古人寒食多食餳故医方市收用也

桃人

〔釋品〕和名毛々桃品甚多惟山中毛桃小而多毛其人充滿多脂用之佳蓋外不足者內有餘也然此品難得宜用尋常單葉者今藥舗所賣多是油桃人及諸桃人混雜不可分而亦非不可

〔釋性〕味苦平主瘀血閉痕止欬逆上氣疼痛通潤大便

議曰桃人味苦平能破血潤燥本經云主瘀血別錄曰破癥瘕仲師用桃人亦不過于此義桃核承氣湯曰少腹急結血自下抵當湯曰少腹硬滿曰經水不利下瘀血湯曰腹滿經水不利大黃蠐螬丸曰內有

桑槐楮桃柳

乾血鱉甲煎曰癥瘕桂枝茯苓丸曰癥痼大黄牡丹湯曰少腹腫痞按之則痛葦莖湯曰煩滿胸中甲錯是皆屬瘀血者也蓋癥痼癰腫已敗之血非生氣則不能流通夫桃者為五木之精花人枝葉並能辟邪而其生氣皆在于人故能開洩以去瘀滯也雖然其性緩慢不假駛駿之品則不能入其血窠而拔其兇魁於是欲下瘀血之新凝結者佐大黄芒消欲下其舊凝結者佐水蛭䗪蟲至于癥瘕癰腫則鱉甲瓜瓣牡丹亦各助其力以奏効矣汪昂曰行血連皮尖生用潤燥去皮尖炒用桃人雖緩慢自有配合之妙豈以皮尖與生炒異其效者哉

旧象 Stegodon orientalis Swinho.
" sinensis (Owen)

龍骨

〔釋品〕龍骨本經以為死龍之骨陶氏以為蛻化之骨朱氏(倪中漢)獨斷然曰石燕石蟹之倫蒸氣成形石化而非龍化也得之蓋以形容如奇骨有龍骨之名故擇之以能化者為上品有半骨半石之狀者是未化也其色潔白輕虛而軟有一條竅者最為上品微黄者次之黑者下又有龍齒龍角即同類而功用亦不異本邦讃州小豆島產形若大魚骨而外黯黑粘蠣殼中灰色或以為大魚骨未知孰真

薩州龍尾産、形如浮石而重、中有針眼、質軟白色、著舌、恐是上品、然未廣布于世、

〔釋性〕味甘平、主小兒熱氣驚癇、心腹煩滿、寒夢寐洩精、小便洩精、

議曰、龍骨味甘平、能鎮驚止滑、洩其効與牡蠣相近、蓋牡蠣主利水、故芪胡桂枝乾姜湯牡蠣澤瀉散、有牡蠣而無龍骨、龍骨主固氣、故天雄散有龍骨無牡蠣、而二味相配、則固上氣攝下脫之力、復更優矣、徐之才藥對云、澀可去脫、即龍骨牡蠣之屬是也、此說一出、而世之論龍骨者、皆以收斂為千古定論、安知此物雖形容如骨、本是蒸氣成形、石化而非龍化、故其能不過于重墜也、夫質重者固有鎮驚之力、而又能分利軀殼之濕濁、是以柴胡加龍骨牡蠣湯、桂枝甘草龍骨牡蠣湯、救逆湯等、皆與牡蠣偕力、以治胸滿煩驚及驚狂起臥不安、又桂枝加龍骨牡蠣湯、治夢交失精、余以此方治小便白濁頻數、効亦同義、可見上焦一鎮濁氣、自澄、驚狂夢交之證、洒然而除也、乃足以破世醫之疑城矣、

鉛丹　過酸化酸化鉛

〔釋品〕鉛和名奈萬利、鉛丹即化鉛而成者、又謂之黄丹、

今俗單呼丹丹乃朱砂名勿訛混泉州堺攝州浪華多製之以坊間呼長吉丹勝吉丹者為上光明丹次之菊丹又次之

〔釋性〕味辛寒墜痰去怯消積殺蟲治驚痟瘧痢外用解熱拔毒去瘡長肉熬膏必用之藥

議曰鉛丹味辛寒能解熱墜痰以鎮驚故此胡加龍骨牡蠣湯方中與牡蠣龍骨相配以治胸滿煩驚蓋三物性質均重墜似難分解然細論之則牡蠣主泄水龍骨專固氣鉛丹專墜痰是以三物相依治下後邪在心胸痰飲爵塞心氣不寧為煩驚及譫語者也

若夫入膏治惡瘡腫毒則八石之祖解毒之最此其所專長矣

蜀漆 Dichroa febrifuga Lour. 常山、蔵王草科

〔釋品〕乃常山苗也漢土嘗送蜀漆其苗與本邦所產呼久佐木者同即藤頌所言海州出者是也故名為海州常山其葉如小桐八月開花白色紅蕚花卸蕚上含碧実今觀西船所載来常山細実黄色即弘景所謂雞骨常山又藤恭謂似茗葉狹長者皆是也根狀與和名曰古久佐木者同故當使常山以古久佐木使蜀漆以久佐木為良

〔釋性〕味辛平、主瘧及欬逆寒熱、腹中癥堅、痞結積聚邪氣、療胸中邪結氣吐出之、

議曰、蜀漆味辛平、性暴悍、輕揚、能驅逐痰水、發散邪結、是以截瘧救火逆、又去下部之水也、乃徵之於古方、如蜀漆散牡蠣湯則截瘧者也、如桂枝加龍骨牡蠣蜀漆湯則救火逆者也、如牡蠣澤瀉散則去水者也、夫瘧之為邪、挾頑痰以蟠結于少陽之部、是其所以劫痰而邪祛也、火逆之為証、亦不過于陽氣失守、痰飲逐火升、使人迷亂驚狂、於是蜀漆之暴悍、激而奪之、龍蛎之重墜鎮而攝之也、蓋水與痰同類、故腰以下有水氣者、又與牡蛎相配、以導湿濁於小便者也、後世或恐其暴悍、為老人久病之所忌者、非矣、

按常山蜀漆根也、又截瘧吐痰、其効與蜀漆同、故千金方云、無蜀漆、以恒山代之、可見晉唐之間相代用也、蓋本經載常山云、主傷寒寒熱熱發、温瘧鬼毒胸中痰結吐逆、別録又云、療鬼疰往來、水脹洒々惡寒、鼠瘻、則其由來尚矣、夫苗之於根、性之太近者也、故苗根往々並用、今桂根竹根等試之、其効與枝葉相髣髴、亦理之不可誣者也、醫家宜兩存而擴其用矣、

水蛭

〔釋品〕和名比流、有數種、和名抄曰、水蛭、和名比流、馬蛭、和名蚫、末比流、蘇恭曰、有水蛭、艸蛭、大者長尺許、並能咂牛馬人血、是也、今取水中小者用之、即儒門事親所謂金絲水蛭、六七月采曝乾、

〔釋性〕味鹹、平、主逐瘀血、月閉、破血癥、積聚、

議曰、水蛭味鹹平、能行瘀血、破結滯、故抵當湯以此品為主、驅逐舊瘀血也、若夫新瘀血、則桃人牡丹皮其力猶足能破之、而至乎其瘀畜之久、則盤根錯節、非草毛木屑之所能拔、於是撰用蝎、飛蠕動之中最銳於咂血者、同氣相求、同類相推、以奏績、殆是醫聖不傳之妙用矣、貫誼新書嘗載楚惠王食寒葅得蛭事、王充論衡云、蛭乃食血之蟲、楚王殆有積血之病、故食蛭而病愈也、是也、又如蟜鍼之咂惡血、施之於墜損瘀血結核人、不消者、則可用之於腫瘍初起者、則正瘀相激為害不鮮、不可不知焉、

蟲蟲

〔釋品〕和名阿乎阿布、大如蜜蜂、頭緑色、嘴銳而利、如鋒鑽、偶飛來家園中、乃與西舶所載来無異、今出紀州熊野及丹波州者、即蘇恭所說木蟲、俗呼為於保宇之波伊、形如大蠅、嚙牛馬尤猛、凡此類

同體以療血為本雖有小異同代用不為嫌

〔釋性〕味苦寒主逐瘀血破積聚堅痞癥瘕寒熱通利血脉及九竅除賊血在胸腹五藏者

議曰蟲蟲味苦寒其效與水蛭畧同段成式曰南方溪澗多水蛆按蛆恐蛭訛長寸餘色黑夏末變為蟲然則二物本同性以善噉牛馬之血並拳治畜血所謂因其性而成用者也淮南子曰蟲散積血斲木愈齲此以類推之者也是也抵當湯及丸逐下焦瘀畜大黄蠐螬丸治乾血為勞其所主雖有内外之異皆取義於此耳成無已曰苦走血血結不行者以苦攻之故治畜血用蟲蟲穿鑿殊甚

蠐螬

〔釋品〕凡用蠐螬取漢舶所來貨形扁如鼈背有横紋蹙起圓如棊子者為真市肆以蜚蠊去翅者為和蠐螬或以龍虱偽充之龍虱多生止水中形似金龜子而長大有甲翅播州人呼為止牟加女死之并不可入藥

〔釋性〕味鹹寒主心腹寒熱洗々血積癥瘕破堅下血閉

議曰蠐螬味鹹寒能破堅積下血其效與水蛭蟲蟲

相近故三物每相配以奏績蓋二物耑長挫畜血而
蠐螬則更擅破堅之力是以鱉甲煎持用此品不假
蟲蛭之威也又按蠐螬雖善走血分其所主專在一
乾血大黃蠐螬丸云內有乾血下瘀血湯云腹中有
乾血著臍下土瓜根散之於經水不利少腹滿痛亦
不過于乾血之候不然則與抵當諸劑何別乎或曰
乾血與瘀血何以別之曰肌膚甲錯或身體羸瘦無
血色但不能飲食而無論乎其二便是為乾血之候
也其人發狂或喜忘或消穀善飢少腹鞕滿小便自
利或大便色必黑是為瘀血之候也雖然乾血與瘀
血皆以破血之品為主則事似為婦人設之惟下瘀
血湯曰陰癪瞳則何必婦人雖男子亦可用之

葶藶

〔釋品〕葶藶有甜苦二種本邦以伊奴奈都奈充苦
葶藶以之呂伊奴奈都奈充甜葶藶是皆菥蓂子
狗芥艸之類並非真船渡者亦皆甜葶藶乃薺與
菥蓂也不能破氣下水別錄云味苦雷斅云苦入
頂冠宗奭曰經既言味辛苦即甜者不復更入藥
也是說可從僊源藥鑑云苦者行水迅速甘者行
水遲緩要在看病症之輕重而用之也誤矣

〔釋性〕味辛寒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道止喘息

議曰葶藶味辛苦治體大概以行水走泄為用故金匱云與葶藶丸下水瀉肺湯又以此物為主蓋肺為水源瀉肺之功即在瀉水豈啻一咳喘癥瘕積聚結氣寒熱凡從水氣來者皆能治之本經所說可以徵焉本草十劑云洩可去閉葶藶大黃之屬夫二味雖均苦寒主洩其位不同大黃之洩在中焦葶藶之洩在上焦是以承氣湯用大黃而陷胸丸用葶藶也若夫巴椒藶黃丸治腸間有水腹滿則是淮南子所謂大戟去水葶藶愈脹者亦葶藶之特効耳

白蜜

〔釋品〕蜜即蜂蜜白是上等稱以色白甘美者為良本邦處々有之以筑州紀州出者為最用時稍々慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃止謂之煉蜜

按蜜本經作石蜜蓋以生巖石者為良故有此偁而冠氏喋々致疑辨概屬無用仲景唯稱白蜜陶氏別錄所謂石蜜生武都山谷河源山谷及諸山石間色白如膏者良也是也備要云西京有梨花蜜色白如脂是自別品不可混

〔釋性〕味甘平、止痛解毒、除衆病、和百藥、止嗽治痢、能清腸、

議曰、蜜之為物、鍾草木之精英、合露氣釀成之、故其味甘美、其質柔潤、能和痛、潤燥、解急也、今徵之於併師所用、如大烏頭煎、烏頭湯、烏頭桂枝湯、則和痛解急者也、如蜜煎則潤燥通便者也、如大陷胸丸、甘遂半夏湯、則善和峻藥寬猛得宜以適病者也、蓋蜜與甘艸其功相似、而安胃之力則長矣、是以大半夏湯白蜜入水揚之、使甘味散於水中、水得蜜而和緩、蜜得水而淡滲、便使胃反平而嘔吐立止、誠千古妙策也、若夫甘草粉蜜湯之於蚘蟲、則毒藥後和中氣、以歸其所喜者也、其他如理中丸、八味丸、括蔞瞿麥丸、半夏麻黃丸、赤丸、桂枝茯苓丸、麻子仁丸、礬石丸、皂莢丸、當歸貝母苦參丸、烏頭赤石脂丸、皆和以蜜者、取其能固氣不走也、茶餘客話云、鼎俎家蒸玉面貍與烹黃雀、必先以蜜塗之、雖沸爍而其膏不走、即此義耳、李東垣曰、煉蜜為丸者、取遲化而氣循經絡也、可謂鑿矣、要之蜜性為和潤、故能和諸藥、又能固藥氣以奏効也、豈非真腐生神奇者哉、

甘遂

〔釋品〕和名奈都止字多委生諸州山中孟春生紅芽高七八寸苗葉似大戟晚春發細緑花其根瘦小色黑破之則有白汁然其效不如漢產皮赤肉白作連珠狀者但須擇新近者年久者蛀孔縱横氣味既脫不堪用

〔釋性〕味苦寒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食癥堅積聚利水穀道

議曰甘遂味苦寒能破結通水故以遂名遂即通水之道也凡人身之有水氣苟不得其道則為結胸為懸痛為心下堅滿為少腹鞕滿於是甘遂直達其所結之處以通游水則軀殼融而氣血可和亦猶千夫之曰有遂而稼穡不乏矣是以大陷胸湯十棗湯甘遂半夏湯大黃甘遂湯皆用之也蓋甘遂性猛烈非得甘和之品則不勝瞑眩故大棗甘草蜜阿膠相配適其宜但如大陷胸湯以急於攻決不俟甘和也李時珍不辨此意漫以相反為說恐非古義保命集云凡水腫服藥未全消者以甘遂末塗腹繞臍令滿內服甘草水其腫便去殆是甘遂半夏湯之意病者虛羸不勝瞑眩者或可為權用

文蛤

〔釋品〕和名波萬久利、生海沙中、形似栗子、故名焉、大一二寸、背有斑文者為上品、方有執曰、文蛤即海蛤之有文理者是也、金鑑以川文蛤充之非矣、

〔釋性〕味鹹平、能止煩渴、利小便、化痰軟堅、

議曰、文蛤即花蛤、以背有花文得名、其味鹹平、能除煩渴、利小便、故太陽病用水却益煩、意欲飲水反不渴者、及渴欲飲水不止、並用文蛤散、若夫反胃吐後渴欲飲水而貪飲者、用文蛤湯、此方又治微風脉緊頭痛、總取鹹寒清熱滌飲之義也、蓋牡蠣蛤蜊海蛤文蛤之類、並出海中、其質沉降潤滑、性味鹹寒、功用畧同、金鑑不辨此意、一概以為不効、曰嘗考五倍子亦名文蛤、按法製之、名百葉煎、又能生津止渴、故嘗用之、屢試屢驗、是說雖本於三因方、恐非古義、千金翼文蛤散小注云、即海蛤粉也、可以徵焉、

桔梗

〔釋品〕和名阿利乃以布岐、今通名桔梗、有數品、入藥以山生單辨紫碧花根不去粗皮者為佳、俗呼皮付桔梗者是也、世醫唯尚根白、故堀采米泔漬或流水浸數日、爛去其皮而後晒乾、俗謂之晒桔梗、其制如此、則苦味既脫、何以能奏其效乎、古人

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』 請求記号 特1-3432
ガラス使用

嘗名曰苦梗又稱苦桔梗其意可以知矣

〔釋性〕味辛温主胸脇痛如刀刺瘡喉咽痛消痰破癥瘕養血排膿利竅治嗽逆口舌生瘡赤目腫痛

議曰桔梗味苦温能下氣排膿今攷仲師所用有兩義一則利膈下氣如桔梗白散是也一則排膿和痛如桔梗湯是也蓋桔梗性輕浮開提氣血以為托膿之良藥故至于肺癰之證則二方互用以治之唯其輕者藉甘草和痛消毒其重者載巴豆搜逐胸邪悉盡無餘耳其他如排膿湯排膿散載在瘡癰篇且以排膿為名則其証雖闕亦可以類推而知焉

巴豆

〔釋品〕西舶所載來唯一品帶殼者良本邦薩州有之木高丈餘似臭梧桐互生無毛葺嫩葉帶黄赤經冬不凋酷恶霜三月新枝上出穗發小黄花夏結實作房類蓖麻而無刺每房有三子頗如蓖麻子而無斑文其功用與漢産無異用時不壓油而用宋王碩曰巴豆之功多在于油是也

〔釋性〕味辛温破癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹開通閉塞利水穀道治恶瘡臭肉及疥癩丁腫喉痺牙痛

議曰巴豆味辛温性猛烈能攻寒逐毒殆為斬關奪門之將是以仲師之用巴豆皆急卒寒實之病單刀直入以驅逐胸膈之壅滯蕩滌腸胃之閉塞也惟因其配合而不無小異同於是配枯梗則下氣排膿配貝母則開結豁胸如枯梗白散是也配杏仁則驅心胸之毒如走馬湯是也千金紫圓亦同義其用代赭等者專主鎮墜降下也配大黄乾薑則蕩滌心腹結實急痛如備急圓是也配附子吳茱萸則去心中寒冷毒痛如九痛丸是也蓋大黄巴豆同為峻下之藥但大黄性寒熱實者宜之巴豆性熱寒實者宜之故傷寒傳裏多熱者多用大黄水寒結實者多用巴豆而其証極暴極實者二物戮力咄嗟奏凱乃知備急丸一方為攻瀉諸方之冠而諸急卒証非此不能抵當也若夫胃中有寒積而下利者巴豆反可止其利東壁李氏曰巴豆峻用則有戡亂劫病之功微用亦有撫綏調中之妙譬之蕭曾絳灌乃勇猛武夫而用之為相亦能輔治太平善夫此言也然而世之愚者畏之如蛇蝎終身舍而不顧王碩易簡方曰巴豆治揮霍垂死之病藥至病愈其效如神真衛生伐病之妙劑參朮雖號為善良却能為害亦見尊貴之人服藥只求平穩而於有瞑

眩之功者不敢輙服醫雖知其當用亦深慮其相信之不篤稍有變症或恐歸咎於已姑以參朮湯藥迎合其意倘有不虞亦得以藉口而不知養病喪身莫不由此是說真為後世龜鑑為醫者可不鑒哉

貝母

〔釋品〕和名阿美加佐由利晚冬生苗葉似卷丹而對生三月開黃白花斜懸如鈴根如水仙色白若貝子狀又有和名迦和由利者即蘇頌所說貝母畿內山中多有之西船所來貨有大小二種小者方家所謂川貝母入藥最良大者本草彙箋所謂象山貝母皆同類俱可用

〔釋性〕味辛平主傷寒煩熱淋瀝喉痺欬嗽上氣吐血咯血肺痿肺癰瘡腹中結實心下滿胸脇逆氣

議曰貝母味辛平能開鬱結行淡水故三物白散治寒實結胸又治肺癰吐膿當歸貝母苦參丸治婦人妊娠小便不利皆足以徵開結行利之效矣蓋貝母者詩所謂蟲也詩本以不得志言而此物能散心胸鬱結不舒之氣則作是詩者其知藥性乎仲師所用亦不過于斯義世醫不識古意動輙至于半夏貝母漫然迭代用以為痰家通藥汪機辨駁之是矣

按當歸貝母苦參丸治妊娠小便不利諸家無明解
本經云主乳難甄權曰主難產兼治胞衣不出因此
觀之貝母亦與葵子牛膝滑石輩同有滑子胞之能
乎雖然古方有一藥治兩症者又有兩藥治一証者
配合之妙殆不可端倪是以有往々與諸本草不脩
合者學者苟於其不脩合處而講求則自得理外之
理矣

芫花

〔釋品〕和名布之毛止木俗呼為丁子櫻蓋以其花
似丁子與櫻也木高三五尺春發紫縹花四瓣狀
如丁香未全開時收采日乾用味苦辛者極良漢
產最優

〔釋性〕味辛温主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣泻水
氣脹滿殺蟲

議曰芫花味辛温能行水故一名去水楊士瀛曰破
癖須用芫花行水宋謨曰行水消脹之藥也是其所
以得名乎仲師十棗湯與大戟甘遂相配以使懸飲
從二便出殆其義也又淳于意治蛣瘕用芫花則知
此物不啻去水亦併驅蟲也是猶巴豆能下水亦能
殺蚘不可不知

Euphorbia Esula, L. ハギッサウ 乳漿草
E. Chamoesyce, L 大戟

大戟

〔釋品〕舶來有二種其一紫大戟皮紫赤色而肉柔如綿此為上其一綿大戟皮赤黑色而肉亦韌如綿此二種味辛苦綿者最戟咽喉今不來貨偶於舶來黃芩白鮮皮中得之本邦有享保中所傳漢種春生紅芽莖漸長三四尺葉似金絲桃而狹叢生夏開細黃花根細長柔韌破之有白汁秋冬採根蒸曝乾可用舊說以土大戟草藺茹充大戟者非

〔釋性〕味苦寒主十二水腫滿急痛破癥結

Fuller's earth
漂布泥
硅酸礬土石灰、苦土
酸化鉄等ヨリ成ル土
ニメ石鹸ノ代用トスベシ

議曰大戟味苦寒辛烈能行水其功與芫花甘遂相近但細分之則芫花能散胸中之痰涎飲積大戟能泄藏府之水濕甘遂能行經隧之水故十棗湯三物相依以達于水飲窠囊隱僻之處使之自大小便而洩也蓋三品皆峻駃恐害內也於是大棗之甘平維持其中胃以致績殆是古方之妙用矣陳無擇以此方為丸沿水腫喘急浮腫之証亦能活用者

赤石脂

〔釋品〕和名伊志之氣即石上所涌出之脂也其狀絳滑如脂舐之粘舌以爪微研之見光澤者真也

生佐州羽州能州攝州者皆良西船載來者其質枯白微帶紅無絳滑之狀疑是山土也不堪用

〔釋性〕味甘平主洩痢腸澼膿血腹痛小便利崩中漏下

議曰赤石脂味甘平能入於血分而止痛固下為石中溫藥仲景治下利便膿血桃花湯則石脂之重澁與乾姜之辛溫相依牢固下焦虛脫之氣粳米佐二味而潤腸胃奏全效也赤石脂禹餘糧湯亦同義但鎮固之力稍為優耳蓋此品不徒牢固下焦又能鎮墜上焦除寒飲故風引湯寒溫相依赤白並用以治熱癲痫烏頭赤石脂丸溫澁相兼以治心痛徹背也千金翼以赤石脂一味治痰飲吐水無時節者亦足以見溫藥除飲之功矣

按石脂五種性味主療大抵相同但以赤白為通用耳如桃花石亦其類也桃花石唐本草云主治大腸中冷膿血痢久服令人肥悅能食時珍曰此即赤白石脂之不粘舌堅而有花點者非別一物也故其氣味功用皆同石脂昔張仲景治痢用赤石脂名桃花湯和劑局方治冷痢有桃花丸皆即此物耳可從

禹餘糧　粘鐵石、赤鐵鑛ノ一種粘土ノ含ム酸化鉄

〔釋品〕和名古毛知委之但州能州日州山中產視之小石也外面堅黃黑色破之中虛有粉塊與舶來者不異惟舶上多去其殼來以其色白嚼之不磣者為佳正黃淡青者俱可用黑色者尤劣

〔釋性〕味甘寒主煩滿下赤白少腹痛崩中固大腸

議曰禹餘糧味甘寒能利水固下焦蓋此物得水土之專精而成矣故平水土以固下焦其績如神禹宜矣謂為禹也三因方治十二腫水氣禹餘糧丸中主用之可以徵焉夫有利水之能者皆克治下利以其去濕也然白术茯苓輩徒燥中胃之濕而不能及下焦於是乎有餘糧石脂之設蓋以下焦滑脫之利非重墜之品則不能達病也李知先詩曰下焦有病人難會須用餘糧赤石脂仲師赤石脂禹餘糧湯亦不遇于此意潔古以此方治欬則遺矢者可謂善運用者矣如禹餘糧丸其方雖闕審證治亦分利鎮固之義耳

太白山ハ陝西省鳳翔府ニアリ或ハ太乙、太壹トモ言フ

太一餘糧

〔釋品〕和名伊波都保與利也字其殼若瓷方圓不定黃黑色外多粘綴碎石殼中有黃粉又有凝結

特1
3432

如石者撼之則鳴如鈴鐸故俗稱鈴石入藥用其粉

議曰赤石脂禹餘糧湯宋板作太一禹餘糧金匱雜療方寒食散亦用太一餘糧陶弘景曰療體亦相似蘇恭曰太一餘糧及禹餘糧一物而以精麤為名爾乃知古方二物通用也

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』 請求記号 特1-3432
ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『古方薬議 5巻』 請求記号 特1-3432

ガラス使用