

廿四九月十六日

中華民國二十四年十一月出版

輯編穆謳謝 任主雷淵陸

號五十第

錄　　目　　期　　本

不以面報怨	章太炎先生古方權量考補證	徐瀛芳	孔伯毅
漢藥之知識	久保田晴光	中醫病名之研究	本刊
冷廬醫話補	陸定圃	胃病醫案選	章次公
近世內科國藥處方集序	陸淵雷	麻疹併發肺炎治驗	王惠蒼
吳山散記	沙仲圭	醫案	陸淵雷
偶然隨筆	楊子鈞	答問一	良定
海南醫談	黃仲賢	答問二	邱倩尹
驗方叢話	孔伯毅	答問三	張偉弢
中醫僞書考	衛原	答問四	前人
當歸素藥理研究	李克蕙	課卷	
聞話桂枝	吳凝軒	來簡一束	
臨證雜記	謝誦穆	醫學新聞	
流行病須知	陸淵雷		



國立北平圖書館藏

減費函授中醫學

本醫室開辦遙從。函授科學化之中醫學。業已二年。學者皆深表滿意。今續招新學員。凡國文通順。有志學醫者。不限年齡性別。皆可入學。尤宜於後開各界人士。（一）謀家庭衛生。欲得醫藥知識者。（二）感中醫學說太玄奧。欲得科學化合理化之醫學學說者。（三）西醫欲兼學中醫者。（四）舊中醫欲補充新學說。及臨診上之知識技能者。

今應外來要求。適應衰落之社會經濟。將學費減輕。計三十箇月習完。只費銀七十一元五角。可謂學醫之最低代價。交費法詳章程中。函索附郵五分空函不答。欠資信不收。

凡於廿四年國歷年內交費入學者。每月贈本刊一冊。一次交五箇月費者。課業應用之細菌學綱要一冊。或本刊七冊。一次交十箇月費者。贈陸氏論醫集一部。或本刊十六冊。舊生於期限內續交費者同贈。

上海牯嶺路人安里陸淵雷醫室啓

陸著醫書

金匱要略今釋 本書比傷寒論爲難讀。故古今注解極少。近出參以新理者尤渺不可得。遑論精粗。淵雷此著。後於傷寒今釋三年。自謂發明新義極多。比傷寒今釋更善。連史紙精裝八厚冊。定價十二元。實售七折。郵費四角。國外酌加。

傷寒論今釋 用科學解釋最有價值之舊醫書。說解詳明。徵引極博。可以作研讀古書之鎖鑰。亦可以實際應用。與金匱今釋同爲中醫學必讀之書。連史紙精裝八厚冊。定價十元。實售七折。郵費三角。國外酌加。

陸氏論醫集 淵雷歷年論醫文字。文言白話。長篇短篇都有。議論精警。趣味雋永。連史紙精裝四大冊。定價五元。實售六折。郵費二角。國外酌加。發行處~~~上海牯嶺路人安里陸淵雷醫室內
代售處~~~上海三馬路千頃堂書局
上海四馬路二八三號國醫印書館

國醫藥界最切實用之刊物

中醫改進研究會出版
常務理事時逸人主編

醫學雜誌

風行中外 信用昭著
全年六期 特價一元

宗旨——發揚中國醫學之精粹
促進中國醫學之建設
內容——蒐羅宏富取材嚴謹
注重實用不尚空談

本雜誌自民國十年發行。為國醫界歷史最久之刊物。兩月一期。全年六期。現出至第八十五期。首尾齊全。優待讀者。特價發售。自第一期至第五十四期。

每期一角五分。五十五期至現期。每期二角。預定全年。特價一元。郵費在外。
郵票九五折算。以一分至五分為限。

優待特價

■發行處：山西太原市中醫改進研究會

研 究 中 國 考 參 必 須 之 書 學 者

方 驗 集 徵 查 審

爲山西全省民間驗方之結晶分門別類秩序井然藥味簡單價值低廉配合容易功效神奇既可供醫家之選用又便於病家之檢查凡留心醫藥注意衛生者不可不備全書四厚冊定價三元三角特價二元四角郵力外加

中 國 傳 染 痘 學

此書羅列霍亂赤痢白喉麻疹流行性感冒丹毒（大豆瘟）流行性耳下腺炎（痄腮）瘧疾麻瘋等二十四種傳染病每病項下將其原因症候病理診斷治法預防及調護處方等逐條詳述纖細靡遺無論醫家病家苟能人手一鑑當可防病於未然又能治病於既發一舉兩得洵善本也全書上下兩卷定價二元特價只售一元二角郵力外加

中 國 時 令 痘 痘 學

本書對於傳染病有明確之分析，對於傷寒溫病有嚴格之界限。於時令病尤有舉凡時令氣候之變遷，令人感之成病者，如春溫風燥，夏暑濕溫，秋溫傷寒，冬溫病暑溫等。人感之成病者，如春溫風燥，夏暑濕溫，秋溫傷寒，冬溫病暑溫等。人感之成病者，如春溫風燥，夏暑濕溫，秋溫傷寒，冬溫病暑溫等。

醫學誌雜

現出至第八期第一期自至第五期十四期每期二角五分五十五期至現期每期二角預定期全年定外加元郵力特價二(六期)

學雜誌量訂

外郵一特五一定每厚訂期每期八起一五集共
加力元價角元價集冊一裝六止十至期十自五

不請寄現洋
收郵票

售書地址：山西太原市新民中正街中醫改進研究會

小言論

不以直報怨

陸淵雷

近日首都新民報與中國日報。登載「金醫生誤人性命」、「金真如診斃一命」之文。其根據爲死者之姊黃女士之投函。而金醫生亦投文救國日報。題爲「黃家病人究死誰手。」觀雙方文字。可知病人之死。實非金醫生之誤治。惟金醫生熱心過分。盛氣向人。嘗予病人之母以難堪。遂令病家不歸咎於一同診治之醫。不歸咎於最後診治之醫。不歸咎於自己亂給食餌。而獨歸咎於金醫生。此雖報怨不以直。猶是凡夫之常情。報紙代表輿論。宜如何鄭重登載。而乃徒據一面之辭。遽爲發表。且加以副標題。大書特書。則誠何意哉。若謂編輯人與金醫生有隙。亦不致兩報不約而同。吾因此回憶吾身所經歷之事矣。鄙人初改業中醫時。尙未學佛。尙有人我之見。見西醫之幅侮日亟。不勝憤憤。因欲禦外侮。必先自強。除自己努力學問外。對於同業中之江湖滑頭。只思騙錢。不顧全體臉面者。甚爲憂慮。於是苦口勸諫。勸諫不從。繼以警告。豈知受我勸諫警告者。不感我熱心。反恨我多事。常無中生有。肆其抵排誣蔑之伎倆。又藉故於上海大日報中登載謗毀文字。鄙人是草莽細民。敝姓賤名。本無登載大日報之資格。此次乃蒙特刻號外大字於新聞欄。與大人

先生及淫亂殺盜諸案同一待遇。至今猶覺榮幸。大日報之編輯先生。與我無怨無德。甚至彼此不通姓名。所登載之似是而非之事實。又萬萬無特刻號外標題之價值。其有人授意不言可知。江湖滑頭中醫。亦小有材智。惜其不用於學術。而用於手段。交際聯絡。彼固認為無上至要手段者。平時拉攏報紙編輯。酒食徵逐。亦不言可知。賤名之榮膺大字標題。煌煌刊載大日報之新聞欄。其因乃出於我昔日對於只思騙錢不顧臉面之同業之勸誠警告。亦不言可知矣。金醫生熱心勝我十倍。其木強盛氣。徑情直行。亦勝我十倍。則其平日之開罪西醫。開罪同業。自必更甚鄙人。由是言之。首都兩日報之文字。安知其不有所受之。且所載尙算高雅客氣。以吾經驗。怨吾者之手段。其卑劣齷齪。有十倍於是者。如村婦打罵。持糞穢以向人。雖有拳勇。惡其糞穢。惟有走避。故吾近年作事。不敢熱心。不敢望中醫同業之自強爭存。一切隨緣。轉覺安靜。詩云。「憂心悄悄。惄惄於羣小。遭閔既多。受侮不少。」願金醫生誦之。無事斤斤辯論爲也。抑吾對於近日之報紙文字。亦有感焉。軍國大事。關係祕密。則不便登載。大人先生之行動云爲。又但有頌揚。絕無諍諫。此或有所不得已。猶可原也。至於私人之交涉爭訟。乃常有偏利一方之左袒記載。雖素不相識之局外人視之。亦顯然見其有曲筆。若遇淫亂殺盜諸事。則大書標題。描摹盡致。初不慮其誨淫誨盜。此外悉是油腔滑調之「報屁股。」若是者不知何所取義。豈亦所謂報紙之天職耶。吾不閱首都日報。不敢謂其亦煽此風。但善人能受盡言。頗有則改之。無則加勉焉可也。

觀書一卷。則有一卷之益。觀書一日。則有一日之益。

陳眉公

研究

章太炎先生古方權量考補證

徐瀛芳

章氏云。『欲求權衡之差。當先知尺度之差。漢尺在者。有建初銅尺。孔氏謂當今量地官尺六寸六分。所謂量地官尺者。未知即營造尺否也。』……

瀛芳按。清代量地官尺爲藩尺。五尺爲一弓。如畝法二四〇。言弓尺也。所謂藩尺者。疑爲藩司主管。內屬戶部。與工部營造尺不同。其後海關尺略與相等。（民國未改新器以前。南中布帛尺尙與之同。北京裁尺已縮爲九五折。而稱此爲南尺。）營造尺當藩尺九寸。爲衡量所從出。如斛法二・五。言營造尺也。余於清末在杜豫堂（灝光）先生處。見一方尺。四面刻歷代尺度五六種。云係光緒中宰金谿時。照某幕客舊器所製者。余當時亦命工仿製一具。今猶存笥中。其器長準藩尺。而圍刻各種尺度相比較。上刻文曰。量地藩尺。與灝尺同。另一方刻漢尺。文曰。漢建初六年銅尺。曲阜孔氏藏。晉尺同度之。約當藩尺六寸八分。與孔氏所言相差不遠。又一方刻營造尺。文曰。乾隆六年工部庫較準營

中醫新生命 第十五號 研究

四

造鐵尺。則與孔說相差寸許矣。下端復刻曰。今河工尺加長二分半。清世治刑名錢穀學者。爲專門之業。遞相授受。於當代制度。自爲覈實。灘尺者。長江木商買賣材木所用。清末農工商部會頒劃一度量衡章程。未及推行。亦有灘尺之名。非盡俗稱也。自余更事以後。亦見贛鄂兩省。木工用營造尺。木商用灘尺。竊揣勝朝制度。於丈量面積容積極大者。如量地海關。皆準藩尺。繕修製器。如河工營造。金木之工。皆準工部尺。惟乾隆全盛。釐定百度。又與康熙不同。而比較差小。卽制錢輪廓。亦康大而乾小。清末擬劃一度量衡章程。皆以營造尺爲根。而準以康熙時祖模。其所繪尺度。余曾以乾隆營造尺度之約長二分許。今此書亂後已佚。亦不甚省記矣。至民間輾轉仿造。歲久不免盈朶之差。而沿習違制者不論。太炎先生謂古衡量之難定者。在當代自有出入。蓋不獨漢一代爲然也。但古方折合時制。於應用上固無取乎過事推算精密。只須略準大概。如所謂古方一兩。當清制三錢者可矣。而章氏此考。爲歷來醫家所不及。故於其存疑處。一補證之。

又案。草此稿時。試取十年前在北京所購。刻有分釐之老庫平細戥。用舊藏極清晰之五銖五枚稱之。得四錢。貨泉一枚。稱之。得九分二釐半。布泉一枚。稱之。得七分一釐。其輪廓。布泉等五銖。貨泉差小而較厚。附記於此。

新生命第十四號臨病實紀勘誤

二三頁 第七第九行 甘草梢均誤稍

二四頁 第五第十行 海蛇均誤海蛇

二五頁 第二行 桃誕誤桃延 第九行 潤糞誤潤糞

二九頁 第五行 人中誤人學

漢藥之知識（續）

久保田晴光

謂出現而有藥效者。乃當時畏懼自然物之迷信狀態也。其次有藥效。或有他效用之五十五種之中。有藥效者三十三種。其餘二十二種。爲防災害者也。三十三種之有藥效者。乃根據經驗。認有一定之藥效也。從一無醫藥知識之原始時代相比觀。頗覺進步。又防災害之藥品。亦用自然物。可見當時視種種災害。亦與疾病同理由而致者也。

其次所注目者。爲山海經藥品中之動物性者。比植物及礦物尤多。陶宏景校定之神農本草經。及中國歷代本草書。皆植物性藥品占絕對多數。獨山海經之動物。比植物尤多。諒爲此書非藥物專門之書故也。另一方面。可見當時醫藥知識之幼稚。如食之有效。或出現而有効之類。此爲古代之食餌療法。及迷信之舉動。要之。以山海經與後世之本草相比較。一則單純。一則複雜。相差不知幾許。由是以推想先秦時代之醫藥狀態。殆不越原始時代範圍之外也。

其次。擬就山海經出世之戰國時代所起之神仙說。一言之。神仙說本與中國之醫學。無何等關係。然其處理藥品之方法。對後世及本草學。遂有非常影響。志在研究漢藥者。應不可度外視之。漢武帝時。司馬遷著史記。謂神仙說起自齊威王（西紀前379—343年）。宣王（西紀前342—314年）及燕昭王（西紀前312—279年）之時代。大概即西紀前

350 年前左右也。神仙說之起源。甚爲簡單。後世則漸複雜。大意謂東海中有蓬萊方丈瀛洲三仙山。神仙居焉。其處有不死之藥。宮殿以金銀作之。於是如何而後可到。如何而後得求其不死之藥。說仙而講究其法者。是謂之方士。此等神仙思想之發生。亦非偶然。在中國自古有天國之思想。如黃帝封禪既畢。鼎成而天龍下降。黃帝乘龍昇天。自古傾心於昇天之祕術者。不乏其人。則神仙說之發生。固非偶然也。關於三仙山之史記所載。謂渤海方面。常現海市蜃樓。是謂發生神仙說之直接動機。又神仙說起於燕齊地方。即今之山東省及河北省一部。亦可以想像其一端。在未開化時代。應不知海市蜃樓之原因。忽然出現於海中。時或現於海水之下。近之則隨風飄渺。目擊此奇怪現象。遂發生種種附會臆說。秦始皇用方士之言。造阿房宮。一面遣徐福至蓬萊島。以求不死之藥。爲歷史上有名之話柄。漢武帝（西紀前 140—87 年）尤甚。重用種種方士。依其言而作種種愚魯之事。結果方士之言不能實行。遂有許多見殺者。武帝一死。人莫之信。至後四代之成帝時。（西紀前 87—7 年。）方士之勢力。全然不及於宮庭。然非以此而終熄也。及魏晉南北朝以後。混入道教。與房術養生辟穀導引等之思想結合。雖受種種時代潮流之波盪。究竟至今仍存。其所謂神仙也。道教也。皆以輕身延年羽化登仙爲主眼。而以藥物之燒煉。自神其術。葛洪陶宏景孫思邈等。於醫學本草上。皆有貢獻。可見著名學者。亦醉心道教。又古來尊爲醫經之祖之靈樞素問。亦含有道家思想。故中國之醫學及本草。多有神仙或道教的要素者。宜誌之勿忘也。

(四) 將來漢藥研究之進路

其次。擬就將來研究漢藥。宜取如何方針一言之。爲研究中國之生藥而大成之。第一必須有現行漢藥之知識。即就中國現在所用各種漢藥。知其產地。明其學術上種名。究其產地之異同。是爲先決問題。歐美人之研究中國藥物或博物者不少。皆親歷中國各地。接其實物。故多可信。然其足跡猶難遍中國全土也。如此之研究。實屬難中之難。且屬根本的問題。故擬徐以部分的漸進之。

其次。爲古今藥品異同之研究。雖同一藥名。而古代之藥品。未必與今日之藥品同一種者。視歷代本草之常有爭論。亦可以明矣。

其次爲自生藥中抽出有效成分。及其藥理學的研究。然漢藥中大都作用緩慢。間有不能發見有效成分者亦不少。故如此之物。雖經動物實驗。自然不見明確效果。是以其實驗方法。亦自不可不異。宜就個個藥品。研究其配劑。進而複合藥理。然關於配劑之研究。所不可缺者。爲臨床之知見。現在不論中國東北。大多數皆依漢醫用漢藥。聞日本近時。亦有專用漢藥之醫家。吾人如不另設研究機關。以組織的研究之。學問的諒不能多期待也。在滿洲醫科大學之東方醫學研究室。目下正綜合的研究文獻上之處方。與現行中國賣藥之處方內容。此研究若完成。他日對於漢方醫學之開拓。諒必大有貢獻也。（未完）

冷廬醫話補（續）

陸定圃原著
吳楚輯

中醫新生命 第十五號 研究

八

五聖丹

癩狗毒蛇咬人者多死。方書雖有治法。不甚著效。惟蕭山韓氏所傳五聖丹。獲效如神。救人不可勝數。韓氏惟製藥施送。祕不傳人。鄭拙言司鐸間化。從其同寅汪睦齋世鈴處。得此方見示。汪喜錄單方。製良藥施人。此方得之於其至戚。乃自韓氏竊得者。汪按方製藥以拯人。無不應手取效。因錄之以廣其傳。

上號當門子一錢 梅花冰片一錢 火硝三分 上號腰面雄黃一錢 九製爐甘石一錢

右藥共研細末。男左女右。用竹挖耳點近鼻處大眼角七次。隔一日再點七次。再隔一日。又點七次。雖重傷者自愈。若大敵至二十日外者不治。若用藥後誤喫羊肉。用藥再治。遲至二十日外者亦不治。宜忌羊肉發物四十九日。兼治痧症悶死時疫傷寒癰發不出者。亦用此藥點眼角。男左女右。

續名醫類案

錢塘魏玉橫之琇續名醫類案六十卷。世無刊本。余從文瀾閣借四庫本錄一部。凡六十六萬八千餘言。採取繁富。間有辨論。亦皆精當。玉橫自述醫案數十。其治病尤長於脅痛（肝燥）胃脘痛（肝木上乘）疝瘕等證。謂醫家治此。每用香燥藥耗竭肝陰。乃自創一方。名一貫煎。統治脅痛吞酸吐酸疝瘕。及一切肝病。惟因痰飲者不宜。方用沙參麥冬地黃歸身枸杞子川棟子六味。出入加減。投之應如桴鼓。口苦燥者。加酒連尤捷。余仿其法治此數證。獲效甚神。

弔脚痧

弔脚痧證至速。服藥不及。必先外治。急用糟燒一大碗盪熱。入斑貓末攪勻。乘熱熨四肢。數人用手連拍之。冷則更易熨。至小便通轉筋自止。再飲煎藥。可以獲痊。此方同邑張雨杉茂才光裕所傳。云其親歷療多人。世俗所傳之方。僅用燒酒。用此神應。

沈姬傳方

單方之佳者。不必出自方書。往往有鄉曲相傳。以之治病。應手取效者。吳江沈姬。服役余家。曾傳數方皆效。備錄之。痔瘡。用皮硝煎湯。乘熱薰洗。此方治熱毒皆效。小兒雪口瘡。馬蘭頭汁擦之。眼癬。大盤幕布。以晚米糠置布燃糠。有汁滴盤。取抹患處。(未完)

近世內科國藥處方集序

陸淵雷

近世論醫事者。輒較量中西優劣。謂識病探原。西醫之所見誠是。其用藥治療。乃弗逮中醫舊法。此誠有識者持平之論。視彼影附素靈。覩然自詡氣化哲學。非西國所及知者。其是非情誕。相去奚翅雲泥哉。雖然。此特就方術言之耳。其人存則其政舉。顧用此方術之人則何如。吾嘗見並世中醫之處方矣。習用桑葉菊花者。桑葉菊花十方而九。習用豆豉山梔者。豆豉山梔十方而九。乃至習用附子者。附子亦十方而九。附子有絕淡薄者。惟指定藥鋪有之。病之弗藥可自愈者。及期而愈。醫者攘爲己功。其不藥不得愈者。不愈。則方案固已危詞聳聽。醫藥不任其咎也。又有病經久不愈而不自識者。私意得無勞瘵乎。就

勞療專科。則病誠勞療也。與勞療藥。如法服之。病如故。又意得無傷損乎。就傷損專科。則病誠傷損也。與傷損藥。如法服之。病又如故。嗚呼。使用方術之人。如是。雖有奇方神藥。其能與西醫較一日之短長哉。或辯之曰。子何明於責己而昧於責人也。彼設肆通衢。輪奐耀目。恃電療器。注射鍼。以業西醫者。果能識病探原。如論者所許乎。應之曰。誠有之。誠有之。然吾聞彼中組織。有醫師公會。又有西醫公會。子所指斥。乃西醫公會中人。至於醫政之推行。醫事之設施。皆出醫師公會。而西醫公會弗與焉。顧中醫則何如。向所謂習用某藥。與某科專門者。方且負盛名。執牛耳。居高臨下。號召黨徒。儼然中醫之模範也。遇職位而擇人。則羣相把持。於學術之改進。則羣相撓阻。而篤實力學之士。真能擇用方術。施於治療。如葉君橘泉者。反屈居草茅。不能自表見。若是而謂中醫之功效勝西醫。徒虛語耳。葉君浙之吳興人。錢塘天目靈氣所鍾。其材質固異乎常人。其治醫也。理論取遠。藥治從中。與鄙見不謀而合。旣徵集丹方。刊行利世。復著近世內科國藥處方集。取科學以類病名。每病繫以古今效方。嘗於雜志醫刊中見其稿。雖一鱗一爪。而其議論擇方。與鄙見相左者。絕少。今將刊行。馳郵索序。夫中醫所以勝西醫者。厥惟功效。苟求功效。必將慎擇方藥。對病以施。不可執一二平淡藥。以敷衍。此理斷然。不待告語而知。然則葉君之書。其中醫爭勝之嚆矢乎。中醫果能勝西醫耶。吾將於此書之推行卜之。乙亥孟冬陸淵雷序。

吳山散記

沈仲圭

碘質治肥胖病

碘質能改進人體新陳代謝。減少蓄積脂肪。以治肥胖病之效。致海藻含碘〇·三三九。昆布含碘一·二三四。海帶含碘一·一六八。皆富於碘質之海產植物也。故以昆布海藻煎湯代茶。海帶海蜇作為佐膳。乃減肥之簡便單方也。民廿二。余在上海中國醫學院執教。有女生張嘉卉。貌端好而體豐盈。張恐減損綽約芳姿。詢余有無中藥可以消肥。余搜索枯腸。一無所得。今閱中醫新論彙編引本草「多食昆布。令人消瘦」之語。遂悟碘之作用。用著於編。以告世之苦肥者。並望張生盍一試之。

痛瘋單方

韋陀鞭鮮者二三兩。白附子防風各三錢。治痛瘋甚靈。此民間單方也。醫生多不取用。惟適應症如何。傳者未詳。愚意此方症實體強而又屬於古人所謂痛痺者。確甚佳妙。傳者又云。韋陀鞭即鬼箭羽。藥肆備售。因已曬乾。一兩已足。如病在下肢。加牛膝三錢。

理中湯

因多進生冷瓜果而致胃呆泄瀉。或感寒泄瀉日久不差者。理中湯最妙。如兼嘔吐。去朮加半夏（生用）。姜汁。如兼腹痛。加木香。惟用此方。以脈沈無力為據。否則。夏秋常見之假性霍亂。治以溫藥。或將助其病勢矣。民廿一夏。余服務復旦實中。某生因過啖冷食。得河魚疾。同事俞東君為處理中湯。一服而起。蓋俞君於傷寒今釋一書。反復探索。頗多心得也。

燕窩

燕窩係金絲燕所營之巢。以備產卵哺雛之用也。以其營巢之材料。純由黏稠如阿拉伯樹膠之唾液而成。故久浸水中。則膨大而柔軟。此物入藥年代未遠。方書著其功用。謂能養胃液。滋肺津。止虛嗽。虛痢。理膈上熱痰。時醫治虛損勞瘵。咳吐紅痰。每以此物加入藥劑。或勸病家羹食。惟據西醫言。燕窩治病之功效。實微乎其微。不能與其高昂之代價相稱。余意本品既係燕之唾液造成。似有裨於胃臟之消化。又以是項唾液濃厚如膠。或可減少支氣管之分泌而為滋養化痰藥。促進血液之凝固而為止血藥。惟功效既弱。自非長食不可矣。是物本草雖有載及。但記述簡略。近人曹炳章等。皆有詳細之論文。發表於早年醫刊。論之甚詳。

偶然隨筆（續）

楊子鈞

近來巴克露德發現脾臟為很重要的機能。就是能伸能縮。有輸藏的作用。當身體其他部分需要血液時。他便收縮起來。（如運動等時。）把存在他裏頭的血。趕到循環上去。若不需要時。他仍原樣伸張起來。再把極多的血液。特別是紅血素。貯藏在裏頭。以備不時之需云。使巴氏此言為不謬。則內經所謂脾藏營。營舍意。脾氣虛。則四肢不用。及脾者心君儲精待用之府。贍運用。散精微等語。亦非無徵不信明矣。

熱氣並不能直接影響汗腺底分泌。倘將汗神經切斷。無論皮膚上氣候怎樣高。汗腺底分泌總不會增加的。所以必須

熱氣刺戟皮膚底氣候神經經過中樞後。激動汗神經。然後能使汗腺分泌增加。準此。則汗腺之分泌是必由中樞所激。動而後行。然則感情用事。當羞愧之際。無端汗流夾背者。可以知其故矣。曹操見陳琳之檄。渙然一汗以愈頭風。亦不煩言而可釋矣。（未完）

海南醫談

中山黃仲賢

辨舌之法。前賢論之甚詳。如杜清碧金鏡錄張誕先傷寒舌鑑梁特巖舌鑑辨證皆屬專書。他若周濬之形色簡摩章虛谷醫門捧渴馬氏醫悟徐氏醫統亦有所論列。以吾觀之。辨舌之黑色者最難。然亦辨之最易。大抵黑而乾焦腫鞭捲縮芒刺者。屬實熱證。其脈必洪數沉實。證必大熱狂躁。宜白虎承氣等方。黑而白。黑而灰。黑而紫。濕潤滑軟者。屬虛寒證。脈必微弱。證必惡寒。宜四逆輩。此辨黑舌之大較也。失之毫釐。謬以千里。執匕臨病者。可不慎哉。

吾祖伯平公。澹泊名利。棄儒業醫。現年八十一歲。行道五十餘年。本其學識經驗。活人無算。吾侍診已數載矣。嘗聞吾祖云。廿年前曾治一磨豆腐老人。抱病兼旬。目不能視。體不能動。語言無聲。四肢厥冷。察其舌色。黑而潤澤。脈極微細。蓋傷寒陰證也。毅然投以大劑四逆湯。附子用至兩許。二劑而諸證悉除。

葆光道人龍木集序云。「醫之攻疫。猶將之制敵。善將者不擇人而戰。善醫者不擇病而治。」旨哉斯言。觀今之名醫。多喜治尋常小疾。用輕淡方藥。所謂不求有功。但求寡過者。若遇危病。則掉首逕去。此擇病而治也。擇病而治。而自號爲名

醫。猶擇人而戰。而自稱爲名將者。自欺欺人乎。抑名實相符乎。

眼科之書。有分眼球爲五輪八廓者。有謂五藏六府之精。上注於目者。其實皆穿鑿附會之談。惟孫真人云。「目之系上屬於腦。」此語頗與生理學相符合。攷目之與物有關者。惟大腦所出之十二對神經中之五對神經。曰視神經。曰動眼神經。曰滑車神經。曰三叉神經。曰外展神經。此五對神經。皆系連眼球。故腦神經之病變。往往顯現於目。觀其眸子。可以察病毒之侵腦與否。故孫真人謂「目之系上屬於腦」者。誠經驗有得之言也。

驗方叢話（續）

孔伯毅

（五）脚氣

十五年前家舅父陳文鈞。嘗患脚氣。兩脚浮腫過膝。困頓痛苦。不能下床。胃納日弱。精神日衰。屢醫不效。舉家惶惶。不可終日。舅父自料必死。且囑後事矣。忽其舊同事王才來探病。並攜一藥方。云得自潮州友人者。治脚氣百發百中。已經驗多人。囑速試之。詎一服而比較舒暢。再服而腫消痛減。三服而其病若失。藥到病除。應如桴鼓。時母氏亦歸寧視疾。亟將其方抄錄。十五年以內。以此方救人於垂危之中者。達數十人。蓋粵人往南洋羣島者。綦多。南方卑濕。多患脚氣之故也。其方如下。

水魚（即鼈）一隻。約重一觔。切勿放血。用小繩索頸。預備清水一鍋。將水魚放入。燒至將滾。待其死後。去清其背。

黑衣。並肚頸足衣。洗淨後。用滾水煮透。用手指開其肚甲。（忌用鐵器。）不要內臟。勿過水洗。分爲四段。連甲放在一大瓦鉢內。（勿用鐵器。）和綠豆薏苡仁（用量見下文）藥水（方見下文）同燉。（隔水謂之燉。）外用滾水一鍋。約燉四點鐘爲度。取出食之。不用油鹽。宜用鹹檸檬一個（廣東雜貨店有售）。榨汁。取其汁代替油。趁熱點食。水魚之汁亦可飲。味頗甘美。若冷食則腥矣。切忌飲酒。藥方如下。

山菩提（鮮者用二兩如乾者則用四錢） 鮮崩大碗七錢 牛七一錢 金釵斛 木瓜 陳皮各一錢五分
右六味。用水三碗。煎爲半碗。去渣取水用。又加綠豆八錢。薏苡仁一兩五錢。和藥水水魚。載於大瓦鉢內隔水燉之。

上藥山菩提。乃生草藥名。以潮州產者爲道地。須要認識清楚。勿誤用「老鼠拉冬瓜」（亦生草藥名。）鮮崩大碗亦生草藥。以上兩藥。生草藥店常備。全愈之後。宜服左列水藥數劑。方爲盡善。忌服參朮芪。

製首烏二錢 生薑二片 金釵斛 茯神 炒穀芽各一錢五分 當歸 陳皮 木瓜 澤瀉 海桐皮 獨活
防己各一錢

凡腳氣浮腫軟痺。小便短而黃。急服此方。百發百中。水魚可隔一二日食一次。因其過於滋陰也。如腫已盡消。舉步輕便。小便清白。可不用食水魚。單服此水藥以善其後便得。

（六）瘧疾

余客欽州時。有同事陳景民。患瘧疾。延醫服藥。耗去多金。久而不愈。彷徨無策。鄰居曾仲鳴曰。此病余有驗方。百發百中。

如相信者。預先二小時服之。一服即效。陳固貧士。因思可省診金。計亦良得。遂遵囑服之。病竟霍然。余奇之。亟鈔其方。後遇患瘧疾者。投之輒效。因表而出之。以廣流傳。

法半夏 常山 草果 黃芩 烏梅 茯苓 當歸 陳皮 白芷各一錢 知母 柴胡各一錢五分 首烏二錢 生薑三片

右藥十三味。清水二碗。煎至半碗。加料半酒（廣東雜貨店有售）一二杯。提早二小時服之。服後須尋活動工作。或運動。或出外步行。以助體工之抗毒力。能令微汗出尤佳。必須過了發作之時間。約一時許。乃得休息。能依此條件。無不見效。服藥後。最忌在家靜坐。尤忌眠睡。犯之即不驗。愈後切戒食扁豆一個月。犯之病必復發。須慎之。（未完）

中醫偽書考（續）

中藏經

衛原

中藏經之由來 中藏經三卷。舊題漢華佗元化撰。考後漢書方術傳。謂「佗臨死。出一卷書於獄吏曰。此可以活人。吏畏法。不敢受。佗亦不強索火燒之。」是佗所著書已刲灰沉沉。歸于烏有。三國志本傳及華佗別傳。皆不言別有遺著。隋書經籍志有華佗方十卷云。「吳普撰。梁有華佗內事五卷亡。」亦無中藏經之名。其爲偽託。固在意中。

中藏經卷首。有應靈洞主探微真人少室山鄧處中序。其序云。「華先生諱佗。字元化。性好恬淡。喜味方書。多游名山。


幽洞往往有所遇。一日因酒息於公宜山洞前。忽聞人論療病之法。先生甚訝其異。潛逼洞竊聽。須臾有人云。華生在。病可付焉。後有一人曰。此生性貪。不憫生靈。安得付也。先生不覺愈駭。躍入洞。見二老人衣木皮頂草冠。先生躬趨左右而拜曰。適聞賢者論方術。遂乃忘歸。况濟人之道。素所好爲。所恨者未遇一法可以試驗。徒自不足耳。願賢者少察愚誠。乞與開悟。終身不負恩。首坐先生云。術亦不惜。恐異日與子爲累。若無高下。無貧富。無貴賤。不務財賄。不憚勞苦。矜老恤幼。爲急然後可脫子禍。先生再拜謝曰。聖賢之語。一一不敢忘。俱能從之。二老笑指東洞云。石牀上有一書函。子自取之。速出吾居。勿示俗流。宜祕密之。先生時得書。回首已不見老人。先生懼怯離洞。忽然不見。雲奔雨瀉。石洞摧塌。旣覽其方。論多奇怪。從茲施試。無不神效。先生未六旬。果爲魏所戮。老人之言。預有斯驗。余迺先生外孫也。因弔先生寢室。夢先生引余坐。語中藏經真活人法也。子可取之。勿傳非人。余覺驚怖不定。遂討先生舊物。獲石函一具。開之得書一帙。乃中藏經也。予性拙於用。復授次子思。因以志其實。甲寅秋九月序。(未完)

當歸素藥理研究

李克蕙

當歸爲婦科特效藥。應用於子宮病。調經行血。頭尾之功用復微有差異。中醫在千餘年前。早經發明。自一九一〇年德國伊默克藥廠。提鍊其有效成分。製成一種爲婦科調經藥。名曰「郁門那」。其效能益大顯於世。最近衛生署藥物研究室劉紹光。張發初。張耀德三君。對當歸素研究之結果。謂有弛緩子宮肌之特效作用。與中醫之認爲血分藥。有無衝

突之處。斯亦有一研究之價值。不佞以爲子宮痙攣與血行系有重大關係。而其效用。且不僅範以弛緩子宮肌而止。子宮係平滑肌所組成。亦名不隨意肌。屬交感神經管轄。凡內臟如腸胃之蠕動。膈膜之伸縮。血管之弛張。皆不由意識運用或半意識動作。此不隨意肌稱名之由來也。（心臟例外。）當歸能弛緩子宮。連類而及。則凡血管痙攣。肌肉痙攣。均能弛緩鬆解之。考慮痙攣之一般原因。有因器械的刺激者。（挫傷。牽引。壓迫。）化學的刺激者。（斯篤利。規尼涅。鉛汞。尿素。炭酸等。）傳染毒之作用者。（破傷風。狂犬病。）血行障礙者。（貧血。鬱血。）精神感動者。（驚怖。苦悶。）而當歸治痙攣之效用。特著於貧血鬱血。茲就其效能。列表如次。



當歸用以補血和血者取其身。行血破血者用尾。此固極合事實而又暗合學理者。在化學尚未檢查明白以前。單

就國醫應用上加以注意。必有新的發現。可斷言也。

現在化學分析所得。僅知當歸之主要成分爲芳香性揮發油。及多量之蔗糖。取而嘗之。則近根部分味甜。近尾部分味苦。再驗之久經擱置而走油者。則皮部色變。中心黃白如故。試將其皮質與中心質分別嘗之。覺皮質味苦。中心質則甜甚。於是知揮發油之成分在皮。蔗糖之成分在心。明乎此。則古人用身與尾之原理。可得而言矣。

當歸尾梢皮質多。故味苦。身部中心質厚。故味甜。尾行血。取其揮發油也。身補血。取其富有蔗糖之滋養成分也。古人實驗分析之藥效。吾無以名之。姑名之曰。「經驗的化學。」質之劉君。以爲然否。

附方劑主治

加味芍歸湯（得效） 當歸 川芎 龜甲 婦人頭髮

主治。治產不下交骨不開。人行約五里許。即生死胎亦下。

走馬散。（醫林方） 當歸 没藥 紅花 官桂 芍藥 蘇木 青皮

主治。婦人血氣發來。似刀攬腸胃刺痛。及熱氣衝心。疼痛欲死。

三聖散。（澹寮） 當歸 延胡索 桂枝

主治。手足拘攣。口眼喎邪。左癱右瘓。骨節酸痛。脚弱無力。行步不正。

當歸芍藥散。（金匱） 當歸 芍藥 茯苓 白朮 川芎 澤瀉

主治。婦人懷妊。腹中疼痛。

芎歸膠艾湯。（金匱）當歸 川芎 阿膠 地黃 茵藥 艾葉 甘草

主治。婦人有漏下者。有半產後。因續下血都不絕者。有妊娠下血者。假令妊娠腹中痛。爲胞阻。主之。

劉涓子排膿散。（外台）當歸 桂心 人參 芎羈 厚樸 防風 甘草 白芷 桔梗

閒話桂枝

吳凝軒

本文所講的桂枝。乃是傷寒論中桂枝湯的簡稱。桂枝湯的真義。早經大白於天下。不用在下再事饒舌。本文只算是閒話的性質。非敢好奇立異也。

太陽三綱鼎立的學說。現在已經根本摧毀了。寒傷營風傷衛的見解。也被認為是無謂的了。然而另外還有一件含糊的事。還沒有得到徹底的解釋。就是桂枝湯發汗的問題。

桂枝湯的功用。在傷寒論中。有時稱爲解肌。也有時稱爲發汗。我們試舉二條來比較一下。

桂枝本爲解肌。若其人脈浮緊。發熱汗不出者。不可與之。常須識此。勿令誤也。

照上面的條文看來。桂枝湯只能解肌而不能發汗。倘使逢到麻黃湯證應該發汗的時候。反把桂枝湯去解肌。那麼一定要鬧出亂子來了。

傷寒發汗已解。半日許復煩。脈浮數者。可更發汗。宜桂枝湯。

這裏。把桂枝湯用於桂枝證。又稱做發汗了。可見桂枝湯的發汗。乃是解肌式的發汗。不可與麻黃湯的發汗混同立論。
（外臺祕要及名醫別錄。有時麻黃亦稱解肌。但研究傷寒論。當以經釋經。不可妄參他書。）

在下認定發汗的意義。是要把體內過剩的水分。望皮膚外面排泄出去。如麻黃湯證。因寒鬱皮毛。水毒不得宣泄。影響及於神經。則為一身盡痛。影響及於肺。則為喘息。這才需到發汗。汗出則水毒盡去。所以也可以說是逐水式的發汗。至於桂枝證。體內原沒有過剩的水分。而且汗腺也不閉塞。實在不合發汗的原則。只可稱為解肌式的發汗。

什麼叫做解肌呢。丹波氏云。「解肌者。解散肌表之邪氣也。」這種空泛的注釋。實在不足深取。我們要知道解肌的真義。須要從養服法中去探索出來。

我們在養服法中。只看到許多「不汗」「更服」「又不汗」「更作服」。但是經文中不是告訴我們桂枝證是有汗的麼。為什麼在服藥的時候又變成無汗了呢。即使說桂枝湯的目的。是要在自汗之外。再加一層藥汗。（由藥力發出來的汗）然後可以病除。那麼試問同是汗液。同由汗腺而來。何者是自汗。何者為藥汗。倘使不能辯別的話。那麼怎麼可以斷定其為藥汗而可以不必盡劑呢。這真是解人難索了。

柯鈞伯的注釋。頗為奇特。他說「前自汗乃衛中邪汗。服湯後反無汗。是衛中邪汗已盡。但穀氣未充。精氣未敷於營分耳。依前法。便精勝而邪却。藥勢促則病除矣。」他認定自汗是邪汗。桂枝湯服下去。先把邪汗趕走了。便變為無汗。再服

下去。把穀氣充實起來。精氣就能敷於營分。再來一身藥汗。病就霍然而愈了。這樣注釋。未免過於神祕。鄙見與他頗有不同。容我慢慢的說來。

我以為大論中的自汗。有二種不同的意義。有遍身之自汗。有局部之自汗。白虎證的自汗。是遍身之汗。桂枝證的自汗。乃係局部之汗。何以見得呢。只要看養服法中「遍身漙漙」四字。就可知道。因為服湯以後可以遍身漙漙。就可推想到未服湯時。一定是局部溼溼。桂枝湯的功用。就是把局部之汗。化為遍身之汗。服湯後的不汗。乃是不見遍身之汗。並非連帶未服湯前的局部之汗也沒有了。雖然同是汗也。為什麼有遍身與局部之異呢。這就須先行明白桂枝證的生理上之變態了。

我們要討論桂枝證的病理。須要拋開了前人的議論。把桂枝湯內的藥味。分析出來。做一個拆字式的探索。

桂枝甘草

芍藥甘草

甘草生姜大棗

桂・甘・他們在大論裏。就是桂枝甘草湯。論曰「發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。桂枝甘草湯主之。」憲

鐵樵氏釋此條為真武湯證之輕者。那是不對的。因為真武湯證挾有水邪。此條則因發汗過多所致。非但無水。且有傷津之慮。活人書云「悸者。動氣也。」什麼叫做動氣呢。傷寒今釋云「發汗過多。血液衰少。心房大張大

縮。以維持血壓。」據此可知此條症是上部虛性充血。桂枝甘草湯是治上部虛性充血之方。並非爲發汗而設。

倘使桂甘可以發汗的話。那麼已經過汗。再發其汗。一定要大汗亡陽了。

芍甘。論曰「……若厥愈足溫者。更作芍藥甘草湯與之。其脚即伸……」爲什麼未服湯前腳不得伸呢。因爲下部貧血。血不養筋的緣故。芍甘二味能使下部血脈通暢。所以前人多認爲是養血之品。凡是下部之病。如腹中疼痛。腹肌緊急。多是芍甘的主證。

甘姜棗。這三味一向被人輕視。前人注釋湯方。多把他們等閒視之。和擧旗打傘的跑龍套相似。所以要找一個滿意注解。十分困難。在下敝帚自珍。把鄙見寫上。敷衍了事。

大棗攝持胃中津液

甘草安腸

生姜溫胃

總之。這三味多是安和腸胃之藥。這樣看來。桂枝證的腸胃狀況。雖不敢說大虛。要亦不會十足健全罷。

綜合以上三組藥味看來。我們可以知道桂枝證的生理上之變態。原來是（一）上部虛性充血（二）下部貧血（三）腸胃不健全。換句話說。一二兩項就是古人所說的營衛不和。第三項古人謂之脾病。營衛不和是肌肉間的事。脾病則肌肉亦病。所以把桂枝湯充實脾胃。調勻血運。也可以稱爲解肌了。在下信口胡謔。杜造典故。請讀者諸君切勿見笑。

中醫新生命 第十五號 研究

二四

我們既然知道了解肌的意義。連帶還可以知道。原來桂枝湯中五種藥味多沒有發汗的能力。因爲桂枝證的焦點。是在於血運之不調勻。汗生於血。血運不勻。則充血之處有汗。而貧血之處無汗。桂枝湯的目的。是要通調血脉。使畸形的局部的汗態。入於正常的遍身的汗態。換句話說。服湯後遍身繫繫的汗。是血運調勻的結果。是由溫覆和啜粥蒸發出來的。並不是桂枝湯真有發汗的能力。

謝誦穆先生在他的溫病論衡裏說。溫病應該分爲肺系的溫病。和腸胃系的溫病。我對於桂枝湯。也有同樣的感想。我以爲麻黃證是肺系的太陽病。桂枝證乃是腸胃系的太陽病。凡腸胃之病。實則陽明。虛者太陰。所以桂枝證也可以說外連太陽。而內繫太陰。要是不然的話。那麼大論太陰篇中的桂枝湯。真要變成如舒詔所說的「大不合法」了。倘使時間應許。將來再寫出來。請讀者諸君指教。現在就借曹師穎甫的一個醫案。來結束閒話罷。

湖北葉君住霞飛路。大暑之夜。遊大世界屋頂花園。披襟當風。兼進冰飲。此時由你快活等會兒就有苦頭來了。不久即覺惡寒頭痛。忽忽返家。擁被就寢。適有客來。勉起酬應。夜半送客。頭痛惡寒更甚。涼風冰飲在內作怪。自作柴蘇生姜煎服。雖得微汗。病仍不解。原不是發汗的事。次晨邀診。病者兩手臂汗出。局部之汗也。吐出綠色痰濁甚多。內繫太陰。因與桂枝湯加浮萍一劑愈。

臨證雜記（續第六號）

穆

（十）麻疹之充分發疹

麻疹之發疹透澈與否。與預後之險夷。有相當關係。其事實為吾儕所熟知。其學理則難索解。已停刊之社會醫報。有西醫徐元甫君。曾對此加以解釋。錄之如次。

常人的經驗。麻疹不能充份發疹。或竟不發疹。對於病者一定有生命的危險。所以每逢有人害麻疹。總希望發疹透澈。且同時用藥表發。促成充分發疹。可能得到佳良的經過。此種不可磨滅的事實。是為我們公認的。但麻疹發疹與否。和預後關係。他的學理怎樣。吾敢斗胆的說。國醫中之痧痘科專家。恐怕知其然而不知其所以然罷。不但是麻疹。就是各種傳染病。當皮膚過度感覺的時候。就發出一種疹斑。同時病症轉變緩和。大約皮膚產生某種物質。使起病體變化。所以病症亦自行消退。此種作用。可以叫做皮膚免疫。——社會醫報第一百二十六期

(十一) 發熱九日身現疹點

麻疹之潛伏期為十日。發熱之第四日。熱更高昇。而面頰周身之麻疹隨現。此為發疹之常型。有袁姓女孩。發熱至第九日。面頰始現疹點。疑病者有輕性肺炎。疹點故不遽發出。或格於體弱及醫藥。遂遲遲迸出耶。其後常遇發熱五六日見點者。此與病體及攝生藥餌等。皆有連鎖之關係。不得以常型拘也。要之。在麻疹流行時。小兒發熱在四五日以外者。面頰雖未見疹點。方藥亦應帶表勢。不得一味清涼。防其有發疹之傾向也。

(十二) 發疹之覈驗

麻疹初起。多挾有鼻炎咳嗽等呼吸器病。其有目眵膠粘。眼淚盈盈。大抵發疹。西醫謂發熱之第二日。結膜鼻腔咽頭氣

管並氣管枝等處發內疹。是謂前兆發疹。（按目眵膠粘。眼淚盈盈。殆即眼結膜發炎發內疹之故。）又謂該疹在硬口蓋及軟口蓋等部最著。大如扁豆。色呈朱紅。強壯小兒。其色尤著。同時在臼齒相對之頰黏膜上。生大類帽針頭之白色小斑。繞以赤暈。是即所謂本病特異之 Koplik 斑。（按此斑為西醫測定麻疹之要點。）

（十三）麻疹經過中之肺炎

麻疹『合併症中之主要者。為氣管枝炎。此症常波及微細氣管枝。誘起毛細氣管枝炎。或氣管枝肺炎。虛弱小兒。往往在前兆期中。陷此悲境。竟有未及發疹而先已死亡者。』（按有肺炎證狀者。其重心在肺炎。照肺炎治法。宜麻杏石甘湯加味。）『較輕者亦延遲其發疹期。』（按兩句宜注意。）『惟普通在發疹後。始發此合併症。』（按小兒多不死於麻疹。而死於疹後之肺炎。達百分之八十。）

（十四）麻疹之失音

麻疹失音。大抵皆在疹後肺炎重篤之際。失音者多不治。以肺炎已劇也。

（十五）走馬牙疳

走馬牙疳。為疹後四大症之一。曰走馬者。狀其病勢急而死亡速也。其病牙根臭爛。血出頰腫。環口黯黑。久則腮穿齒落。唇缺鼻壞。內治以清血解毒為主。生首烏丹參生地玄參丹皮赤芍板藍根銀花芩連等擇用。外治以消炎去腐為主。黃柏末稍加冰片。時時塗敷。西藥房中有硼酸（為白色之小葉狀結晶。溶解於水。作為洗滌料）。雙養水可購取。時時漱

口。使患部清潔為要。鄉村無西藥房。則冰硼散之溶液。亦可庖代。

舊法用砒納聚肉內。煅存性研末外敷。又曹拙巢先生用蠅蟲洗淨。焙乾研末。和青黛外敷。兩方曾試用。皆不驗。(未完)

習醫日記

孔伯毅編著

細菌之繁殖

細菌雖非絕對的病源。要亦為重要病源之一。既承認其為重要病源之一。則吾人研究醫學。對於細菌學自不能不有相當之認識。與徹底之了解。吾日記開宗明義即談細菌。義實在此。非為西醫張目也。

細菌為最微小之單細胞植物或動物。以形狀區別。大概可分三種。(一)桿形菌。(二)球形菌。(三)螺旋體。(第一)(二)兩種屬植物。第(三)種屬動物。其內部體質之結構。非常簡單。惟含細胞之原漿。其外部僅包以一層薄膜。若尋常之細菌。其包膜不甚分明。惟有數種細菌。如肺炎雙球菌等。其包膜可用染色法察見之。細菌於液體中。能顯其運動者。乃因其有線狀之鞭毛。其毛有生於細菌之一端或兩端。亦有生於菌體之四圍者。其能運動之細菌。大概以桿形或螺旋體為最多。細菌於環境適合之時。能使其體舒長擴大。而行其分裂孳生法。先由一細菌分裂為二。後由二而分為四。如是分生不已。其桿形菌與螺旋體。則作橫斷分裂。此二菌本作圓筒形。將分裂時。先將其圓筒伸長一倍。然後中斷分裂為二。謂之橫斷分裂。球形菌則作平面分裂。平面分裂。又分三種。即(一)球形菌先伸長作橢

圓形。然後中斷分裂為二。若始終向一個方向分裂。則分裂後。相連如算盤珠。尤像鎖鍊。故謂之鍊形菌。是為一平面分裂。（二）先向左右分裂為二。再向各上下分裂。二分為四。如是上下左右遞分者。則分裂後成為四聯球菌。是為二平面分裂。（三）如上法分裂為四之後。再各向前後分裂。如是上下左右前後遞分者。則分裂後成為八聯球菌。（即立方球菌。）是為三平面分裂。每分裂一次。約需二十乃至三十分鐘左右。以乾草熱桿菌論。其孳生之速。於二十四小時之內。一菌分裂可繁殖至百兆之多。以霍亂菌論。二十四小時之內。其繁殖之數。可至二十一位數目字。其首三位為一五四。質言之。即一個霍亂桿菌。於二十四小時以內。繁殖至一萬五千四百萬萬億。每一個霍亂菌之長度。平均為一個半「米克倫」。一個米克倫等於一米達之兆分之一。亦即一英寸之二萬五千分之一。設將上述數目之霍亂菌接連之。可環繞地球赤道五七八四萬萬餘周。其數目之多。誠令人驚異不置。設聽其自由生殖。不加制止。則地球之上。早成細菌之世界。而人類無立錐之地矣。雖然。若處於不適宜之環境中。即能阻止其繁殖。然細菌在不適宜環境之場合中。其菌體立能成一長圓形堅實明亮之芽胞。以為抵禦外來撲滅損害之用。而適應其不良之環境。芽胞之生活力甚強。能保全細菌之種類。雖細菌遇大冷或大熱而死。但芽胞仍可生存。細菌傳於人體而致病。固為醫學上之嚴重問題。若芽胞傳於人體。則其致病之力。尤強於細菌。不容不加以注意也。倘芽胞遇有潮濕。或溫度合宜之時。則立能生長成一大菌。漸次分裂繁殖。一而二。二而四。四而八。以至於恆河沙數。以至於無量數。結果終為人類之勁敵。故細菌之形體雖小。而其孳生繁殖之數目。殊出人意料之外也。

細菌之生活

細菌在溫度適宜之環境中。最易於孳生繁殖。反是在失宜之場合。則細菌又最易於死亡。此種適應。實含有物理性及化學性之變遷與作用。茲分述如下。

(一) 溫度——細菌在低溫度(寒冷)中。死亡居多數。但亦有能生殖者。若在高溫度(大熱)中。則惟有死亡。絕對不能生殖。若在合宜溫度(寒熱適中)中。則孳生最速。尋常之細菌。能生殖於攝氏表五度半至四十三度(華氏表四十一度九至百〇九度四)之間。然有一種細菌能生殖於零度之下。或生殖於七十度之間者。

白喉桿菌。傷寒桿菌。其耐寒之力。能在冰雪中存活數星期之久。惟在高溫之場合。則不免死亡。凡能致人病之細菌。最適宜其生存之溫度。為攝氏表三十七度(華氏表九十八度六)。此種溫度。即是健康人體溫之常度。而又最適合於病原菌之生活。人體所以易染疾病。此實一大原因。而無法可以變更及避免者也。

至居於溝內污物中之細菌。在攝氏表六十度(華氏一百四十度)以下。即不能生活。換言之。即須生活於攝氏表六十度以上。如此大熱。人不能耐。而此種細菌。獨能生活。寧非異事。因其宜於高溫。謂之「好熱菌」。非病源菌也。好熱菌在攝氏表八十度以上。亦不易生存。以溫度過高也。

又有一種發熱菌。居於土壤糞堆中。因分解有機體。以供自己之食用。遂發出熱度。糞便肥料之發熱。皆此等菌為之。然發熱菌與好熱菌不同也。(未完)

中醫病名之研究（續）

本刊

（二）麻疹

麻疹與風疹痘瘡水痘猩紅熱等。西醫皆不明其病原。其始且不能分別。初無異於中土之舊也。六朝以前。麻疹無徵。尋繹靈素諸書。皆未言其爲病。請略陳之。

素問生氣通天論云。『汗出見溼。乃生溼痹。』王太僕注。『溼風癰也。』風癰乃風疹之類。雖近似麻疹。然究非麻疹之證也。傷寒論辨脈法云。『脈浮而大。浮爲風虛。大爲氣強。風氣相搏。必成癰疹。身體爲痒。痒者名泄風。久久爲癰癩。』金匱要略云。『陽毒之爲病。面赤斑斑如錦文。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。升麻葛根湯主之。』保赤全書以辨脈法之癰疹金匱之陽毒。指爲麻疹。癰疹容有麻疹相溷雜。然久久爲癰癩。則又非是。陽毒之咽喉痛唾膿血。亦與麻疹不類。

隋唐之際。天痘之著錄甚詳。麻疹則闐寂無聞。蓋天痘之形顯。易爲醫者所注目。麻疹之體小。易爲恆人所藐忽也。巢氏病源卷二風瘡身體隱軫候云。『邪氣客於皮膚。復逢風寒相折。則起風瘡隱軫。若赤軫者。由涼濕折於肌中之極熱。熱結成赤軫也。』赤軫似是麻疹。然氣候之寒溫。可增減其病。則麻疹固不如此也。又巢源卷四十六患斑毒病候云。『斑毒之病。是寒氣入胃。而胃主肌肉。其熱挾毒。蘊積於胃。毒氣熏發於肌肉。狀如蚊蠅所噏。赤斑起周匝偏體。此病或是傷

寒。或時氣。或溫病。皆由熱不時歇。故熱入胃變成毒。乃發斑也。凡發赤斑者。十生一死。黑者十死一生。」曰傷寒時氣溫病。是其病能相染易。赤斑起周匝偏體。狀如蚊蚤所齧。此略似麻疹矣。顧敍證簡略。猶未得確指其爲麻疹也。

千金方卷二十二癰瘍第五云。『論曰。素問云。風邪客於肌中。則肌虛。真氣發散。又被寒搏。皮膚外發。腠理開。毫毛溼氣妄行。則爲瘡也。所以有風疹搔瘡。皆由於此。』又甄權本草枳壳條。『治遍身風癰。同疹。肌中如麻豆。』華昌伯痧癰明辨。謂麻豆卽今之天痘。疹卽今之痧子。此望文生義之說耳。

北宋而下。幼小始蔚爲專科。名手錢仲陽董及之陳文中。先後輩出。其論麻疹。亦粲然可觀。第麻疹痘瘡。猶時相牽混。創始者難。固無足怪。錢仲陽名乙。宋東平人事。具宋史方技傳。宣和間。以巫方氏顱頸經治小兒。甚著于時。大梁閻季忠集其遺論爲小兒藥證直訣三卷。直訣論五藏瘡疹證治云。『小兒在胎食五藏血穢。伏于命門。若遇天行時熱。或乳食所傷。或驚恐所觸。則其毒當出。初起之候。面燥頸赤。目胞亦赤。呵欠頓悶。乍涼乍熱。欬嗽嚏噴。手足稍冷。驚悸多睡。宜究其何臟所發。察其何因所起。五臟各有一證。肝臟水疱。青色而小。肺臟膿疱色白而大。心臟癰色赤而小。脾臟疹小次痏。故色赤黃淺也。所謂膿疱。卽是天痘。疹則其義不移。仲陽於天痘麻疹之辨。立說清晰。真可喜也。』

東平董汲。字及之。與仲陽同里。所著小兒斑疹備急方論云。『小兒斑疹一候。其初作時。卽斑疹見於皮下。其已出者變黑色而倒陷。未愈不可當風。卽成瘡痂如膿疱出。』考其證候。實爲天痘。又云。『其府熱卽爲疹。蓋熱淺也。臟熱卽爲疱。半輕半重也。』是瘡又卽天痘。疹則其義不移。仲陽於天痘麻疹之辨。立說清晰。真可喜也。

蓋熱深也。」是及之雖以痘疹相牽混。猶心識疹疮之不同。亦難能可貴矣。附方白虎湯。治痘疮。數疹斑瘡。亦黑出不快。一數瘡。卽麻疹。似無疑義。陳文中小兒痘疹方論云。『嘗謂小兒病證雖多。而瘡疹最爲重病。一五臟六府穢液之毒。發爲水泡瘡。一皮膜筋肉穢液之毒。發爲膿水泡瘡。』又云。『凡小兒斑駭疹毒之病。俗言疹子。是肺胃蘊熱。因時氣發於外。』案疹子。卽當時麻疹之俗名。陳氏以此與膿水泡瘡相區別。誠兒科之高手醫矣。

金元四家之論麻疹。丹溪最爲傑出。河間東垣。差強人意。子和則不見特長。劉獻庭廣陽雜記。稱子和爲醫家之申韓。麻疹之治宜靈活。與子和之大刀闊斧不中。故了無表見。河間保命集小兒斑疹論云。『斑疹之病。其狀各異。瘡發焮腫於外。屬少陽三焦相火。謂之斑。小紅翳行于皮膚之中不出者。屬少陰君也。謂之疹。』斑卽天痘。疹卽麻疹。已不待煩言而解。李東垣蘭室祕藏卷下痘疹論云。『夫痘疹始出之證。必先見面燥腮赤。目胞亦赤。呵欠煩悶。乍涼乍熱。咳嗽嚏噴。足稍冷。多睡驚。並瘡疹之證。或生膿胞。或生小紅癰。或生癰疹。』又桔梗湯條下云。『恐痘子不出。』是小紅癰及痘子殆卽麻疹。而又以痘疹爲膿胞癰子癰疹之總稱。其義含糊不析。遜河間遠矣。

丹溪幼科全書云。『斑疹俗呼麻子。』又云。『疹雖毒結。多帶時行。其發也。與痘相類。其變也。比痘匪輕。初則發熱。亦似傷寒。日出泊而不止。鼻流涕而不乾。咳嗽太急。煩躁難安。以火照之。隱隱皮膚之下。以手摸之。磊磊肌肉之間。其形若疥。其色若丹。隨出隨沒。乍隱乍現。』描繪麻疹之證狀。維妙克肖。蓋至是而有具體之認識。病名亦漸次確立矣。綜觀有明以前。麻疹、或混稱爲瘡疹斑疹。或呼爲麻子疹子。明以後。則綜合之而定名爲麻疹。萬全片玉痘疹龔信醫鑑王肯堂證

治準繩馬之騏疹科纂要。董久吾痘疹心法。翁仲仁痘疹金鏡錄等。皆以麻疹立名。其他數疹（董汲）膚疹（方賢奇效良方）糠瘡（馬之騏疹科纂要）嫌其隱僻。痧癰（華昌伯）痧疹（繆仲醇廣筆記。秦皇士痘疹考衷）病其詰屈難讀。郭子章稀痘方論。張景岳痘疹證。張隱庵侶山堂類辨。朱濟川痘疹傳心錄。費建中救偏瑣言。皆單稱爲疹。慎齋遺書。夏禹鑄幼科鐵鏡。則單稱爲疹。皆片詞隻義。不足以垂世。終不若麻疹一名之便於稱誦也。

中國漢族爲多數民族所合成。血型固異。方言亦省縣不同。甚至數里數十里之差。亦各異其趣。蓋世界方言之複雜。無有過於吾國者。西漢楊雄所著之方言。爲吾國方言學之祖。其中有不少病名。皆地域不同而產生。惜案頭無此書。無從翻檢耳。麻疹因方言不同而異其名稱者。諸書多有記載。今彙錄於後。雖間有雷同。亦徵古者之所不廢也。

王肯堂云。北人謂之糠瘡。南人謂之穀瘡。吳人謂之痧。越人謂之癰。古所謂麻聞人氏所謂膚疹是也。（又云。『小兒有出一二次者。出輕而日數少。名妳疹子。出稍重而日數稍多者。名正疹子。又出於痘前者。名妳疹子。出於痘後者。名正疹子。』案芝嶼樵客兒科醒卷十二。與此同。）

張景岳云。疹者痘之末疾。是皆天地間診戾不正之氣。故曰疹也。（音同癰。）然其名目有異。在蘇松曰痧子。在浙江曰瘡子。（音同錯。）又曰癰子。在江右湖廣廣東安徽曰麻子。在山陝曰糲瘡。曰糠瘡。曰赤瘡。在北直曰疹子。（音同軫。）名雖不同。其證則一。

沈金鰲幼科釋謬曰。方書名麻疹者。北人單謂之疹。吳人謂之痧子。浙人謂之瘡子。名各不同。其實則一。

葉桂幼科要略云。吳音爲痧。浙音爲瘡。北音爲疹爲丹。

華昌伯云。痧子今江甯蘇松一帶所稱是也。昔謂之疹子。又謂之麻。江西湖廣安慶亦謂之麻。瘡子亦作醋。浙江所稱也。膚瘡以其發於皮膚也。糠瘡以其細粒爲糠也。赤芍義未詳。以上三者皆山陝所稱也。（未完）

治 驗

胃病醫案選（續）

章次公著
張德正藏

喻嘉言寓意草膈氣危證再生治驗

倪戾雲病膈氣十四日粒米不入咽。始吐清水。次吐綠水。次吐黑水。次吐臭水。呼吸將絕。醫已歟手。余適診之。許以可救。渠家不信。余曰。儘今一晝夜。先服理中湯六劑。不令其絕。來早轉方一劑全安。渠家曰。病已至此。滴水不能入喉。安能服藥六劑乎。余曰。但得此等甘溫入口。必喜而再服。不須過慮。渠諸子或庠或弁亦知理折。僉曰。既有妙方。何不卽投見效。必先與理中。然後乃用。此何意也。余曰。金匱有云。病人噫氣不除者。旅覆代赭湯主之。吾於此病分別用之者有兩道。一者以黑水爲胃底之水。臭水爲腸中之水。此水且出。則胃中之津液久已不存。不敢用半夏以燥其胃也。一者以將絕之

氣止存一線。以代赭墜之。恐其立斷。必先以理中分理陰陽。俾氣易於降下。然後代赭得以建奇奏績。一時之深心。即千古之已試。何必更疑。及閱仲景方。見方中止用煨薑不用乾薑。又謂乾薑比半夏更燥。而不敢用。余曰。尊人所噫者。下焦之氣也。所嘔者腸中之水也。陰乘陽位。加以日久不食。諸多蛔蟲必上居膈間。非乾薑之辣。蛔蟲不下轉。而上氣亦必不下轉。妙處正在此君。何可泥哉。姑進是藥觀其驗否。進後果再索藥。三劑後病者能言。云內氣稍接。但恐太急。俟天明再服。候旦轉方爲妥。至次早未及服藥。復請前醫參酌。衆醫交口極沮。渠家并後三劑。不肯服矣。余持前藥一盞。勉令服之。曰吾卽與衆醫前立地轉方。頃刻見效。再有何說。乃用旋覆花一味。煎調代赭石末二茶匙與之。纔一入口。病者曰好藥。吾氣已轉入丹田矣。但恐此藥難得。余曰易耳。病者十四日衣不解帶。目不交睫。憊甚。因圖脫衣安寢。冷氣一觸復嘔。與前藥立止。思粥令食半盞。渠飢甚。竟食兩盞。少頃已食六盞。復嘔。與前藥立止。又因動怒。以物擊婢。復嘔。與前藥立止。以後不復嘔。但困倦之極。服補藥二十餘劑。丸藥一効。將息二月。始能遠出。方悔從前少服理中三劑耳。

按 自西昌有此驗案。後世遂視旋覆代赭石湯爲治膈氣之要方。其實旋覆代赭石湯所治愈之膈氣。必非食道狹窄食道癌之膈氣。僅是神經性嘔吐而已。細玩本案所述。病者所以粒米不能入咽。則以吐清水吐綠水吐黑水之故。與旋覆花代赭石嘔止。便食粥兩盞。設爲膈氣危證。雖不嘔。亦絕對不能飲食。旋覆代赭石湯將何從施其妙用。然西昌謂旋覆代赭石湯治愈膈氣危證。此誇大之說也。

附喻嘉言論進退黃連湯法（治關格）

中醫新生命 第十五號 治驗

三六

喻嘉言曰。黃連湯者。仲景治傷寒之方也。而濕家下之。舌上如胎者。丹田有熱。胸中有寒。亦用此方何耶。蓋傷寒分表裏中三治。表裏之邪俱盛。則從中而和之。故有小柴胡之和法。至於丹田胸中之邪。在上下而不在表裏。則變柴胡爲黃連湯。以桂枝代柴胡。以黃連代黃芩。以乾薑代生薑。飲入胃中。聽胃氣之上下敷布。故不問下寒上熱。上寒下熱。皆可治之也。夫表裏之邪。則用柴芩。用生薑之辛以散之。上下之邪。則用桂連。用乾薑之辣以開之。仲景聖法灼然矣。昌欲進退其上下之法。操何術以進退之耶。前論中求之於中。握樞而運。以漸透於上下。俟其榮氣前通。衛氣前通。而爲進退也。然而難言之矣。格則吐逆。進而用此方爲宜。蓋太陽主開。太陽不開。則胸間窒塞。食不得入。入亦復出。以桂枝爲太陽經藥。和榮衛而行陽道。故能開之也。至於五志厥陽之火上入。桂枝又不可用矣。用之則以火濟火。頭有汗而陽脫矣。其關則不得小便。退之之法。從胃氣以透入陰分。桂枝亦在所不取。但胃之關門一開。少陰主闔。少陰之氣不上。胃之關必不開矣。昌意中尤謂少陰之脈沉而滯。與趺陽之脈伏而濇。故足廬也。內經常兩言之。曰腎氣獨沉。曰腎氣不衡。夫真氣之在腎中。猶權衡也。有權有衡。則關門時開時閉。有權無衡。則關門有閉無開矣。小溲亦可從而出耶。是則腎氣丸要亦退之之中所有事矣。腎氣交於胃。則關門開。交於心。則厥陽之火隨之下伏。有不得不用之時矣。進退一方。於中次第。若此。夫豈中人所能辨哉。

進退黃連湯

黃連姜汁炒五分 乾姜泡一錢 人參乳拌蒸一錢五分 桂枝一錢 半夏姜製一錢五分 甘草五分 大棗二枚

進方用本方七味。俱不製水三茶盞。煎一半溫服。退法不用桂枝。黃連減半。或加肉桂五分。如上逐味製熟。煎服法同。但空朝服崔氏八味丸三錢半。飢服煎劑耳。

資液救焚湯（喻氏治五志厥陽之火）

生地黃二錢取汁 人參一錢五分乳拌蒸 胡麻仁一錢 阿膠一錢 麥門冬二錢取汁 甘草炙一錢 柏子仁七分炒 滑石一錢 紫石英一錢 寒水石一錢三味俱敲碎不爲末 生犀汁研三分 生薑汁二茶匙右除四汁及阿膠。其八味用名山泉水四茶杯緩火煎至一杯半去滓入四汁及阿膠。再上火略煎至阿膠烊化斟出。調牛黃細末五釐。日中分二三次熱服。空朝先服崔氏八味丸三錢。

按 觀喻氏立方之旨所在。兩方治關格恐皆不效。充其量進退黃連湯可治傷食嘔吐。或神經性嘔吐。資液救焚湯用於胃潰瘍或有效。若食道狹窄食管癌等難矣。（未完）

麻疹併發肺炎治驗

王惠蒼

癩疹。又名痧子。爲小兒科易見之病。經過良好者。不須服藥。亦能痊愈。其或出疹時。感受風寒。或資稟薄弱。或併發他病。經過不順時。則有賴乎藥石之糾正矣。

小兒肺臟嬌嫩。其鼻咽腔及喉頭。皆較爲狹小。若粘膜稍有腫脹。則呼吸必生障礙。以故小兒最易罹犯肺炎。——肺炎。

即舊醫書中所謂肺脹。亦即葉吳書中風溫犯肺之症也。其症大多發高度之稽留熱。咳嗽。呼吸促迫。痰粘稠。色黃褐而不易喀出。肋膜疼痛。兼發腦症狀者。謂之夾驚肺脹。

愚于前月曾遇癰疹而併發肺炎一案。以麻杏甘石湯主治而愈。收效之捷。出於意料。茲記其經過如次。

李姓孩。年甫七歲。平日身體本不甚壯實。日前因鄰兒患痧子。遂被感染。初起微覺惡寒。不移時。即發熱。咳嗽不爽。噴嚏。頻發流淚。顏面見疹子。其母見狀。知其將發痧子。乃令彼安臥。詎知幼兒無知。誤起牀外出。而當日適值大風。以致風寒交襲。迨其母知。已無及矣。嗣後疹出若隱若現。背部雖稍有。而胸膺無點粒。咳亦加劇。氣急促。甚至鼻搊。熱壯不汗出。面赤唇紅。余往診治。檢其體溫達四十一度五。痰呈赤褐色鐵锈樣。聽診之。有濁音。散在性氣管呼吸音。濕性小水泡音。脈搏浮數。每分時一百四十二至。舌苔白膩。邊緣較紅。大小溲尚可。余診視畢。謂其母曰。此痧疹之合併急性肺炎者也。症頗危急。如能任余主治。則尚有挽回之希望。若欲干涉或懷疑余方者。余當敬謝不敏矣。病家素信余。又已延過所謂小兒科名醫某者。已無效。遂乃一任余治。余乃爲之處下方。——麻杏石甘湯加味。

淨麻黃八分 光杏仁四錢 葛根一錢 天竺黃二錢
生石羔八錢 炙甘草二錢 柴胡錢半 瓜蔞皮三錢

又另與西藥阿司必林四片。日二次。每次一片。——按另服阿司必林者。因該藥能發汗解熱。具透發癰疹之偉效。加天竺黃者。因其有化痰消炎清熱之功。——業師周藥和先生言。此藥爲治肺脹之要藥。效驗殊宏偉。——葛根解肌發散。

柴胡疏導血循環。瓜蔞清熱消炎。——麻黃用小量者。因天時炎熱。恐被「夏日不宜麻桂之市醫」有所滋議也。且兼服阿司必林。事實上亦不須大量也。服藥後。一劑而喘定。氣平。熱退。再劑則痧粒全透。諸症輕快。乃續進小劑清涼疎肺藥。不日而愈。

醫案

陸淵雷

袁姓成衣鋪主婦。年五十許。住南市王家嘴角三十四號。往年余在王家碼頭施診時。曾來診治。及余遷居人安里。南市之老病客幾於絕迹。此不但路遠。亦因南市與公共租界中區。生活程度懸殊。公共租界之病客。見診金低廉之醫生。以爲賤工。不屑就診。南市之病客。見診金高昂之醫生。亦不肯就。故有一醫於南北兩診所取高下懸殊之診金者。雖若可異。乃不得不爾也。余旣居北市。診費不得不稍昂。近袁婦患病。經南市甚時行之中醫累治不愈。乃不惜破費。遠來邀余。余詢知是舊病客。况不甚裕者。遂卻還少半診金。爲之往診。則臥病已兩月。不能食飲已五十四日。體本肥。又略帶浮腫。故不甚覺瘦。雖神識甚清。已不能下床。大小便俱承以盆。凡診六次。服藥二十餘劑而病除。錄其歷次案方如下。 淵雷

初診 九月廿五日

痢疾之後。心下痞滿。水米不入。輒吐酸苦水。舌色甚淡。脈亦遲緩。病將兩個月。頗不易速愈。今當溫通降痰。

中醫新生命 第十五號 治驗

四〇

太子參三錢

川連三分

吳萸錢半

旋復花二錢

淡芩錢半

姜夏四錢

代赭石四錢

乾薑錢半

小朴一錢炒

赤白芍各二錢

炙草一錢

黑附塊二錢

生薑銅元大五片

二診

九月廿八日

稍稍能食。不復苦脹。吐及呃逆亦較稀。脈仍軟而遲。舌仍白。中後稍有黑苔而潤。前方中肯。

太子參四錢

炙草一錢

淡芩錢半

乾薑錢半

旋復花二錢

姜夏四錢

白朮三錢

代赭石四錢

吳萸錢半

陳皮三錢

生薑銅元大五片

黑附塊二錢

廿九日改方 服前方感滿。加小朴一錢。白朮改生用二錢。

三診 九月三十日

胸腹不復感滿悶。亦不復吐。但仍不思食。脈舌仍多粘液。腹皮軟重。按則裏甚痞軟。急。

黑附塊三錢
先煎
茅白朮各二錢
生用
太子參四錢
赤 茄三錢
雲 茶四錢

旋復花三錢包

陳 皮三錢

乾 薑一錢
炒穀芽四錢

小 朴一錢
枳 實二錢

赤 茄三錢
生薑銅元大五片

四診
十月四日

進步雖遲。卻甚順利。脹滿全除。漸知飢。漸知味。惟吃逆未淨。痰雖少。仍有脈仍弱。

太子參四錢
黑附塊三錢
先煎
代赭石四錢
旋復花二錢包
炒穀芽四錢
研後下
丁 香六分

乾 薑一錢
生白朮二錢
朴 花錢半
姜 夏四錢
雲 茶五錢
陳 皮三錢
生內金三錢
炙 草一錢

五診
十月七日

寒證漸除。口味甜而舌潤。是溼痰盛。夜不能寐。故頭痛。雖不甚知飢。食入卻已不脹。脈稍遲。已有胃氣。

中醫新生命 第十五號 治驗

四二

雲 荸五錢	太子參四錢	柴 胡一錢	陳 皮三錢
茆白朮各二錢	製南星錢半	朴 花錢半	黑附塊三錢
桂 枝一錢 <small>後下</small>	姜 夏四錢	炒穀芽四錢	炙 草一錢
夜交藤三錢	生內金三錢		

六診

十月十四日

食量將恢復常度。亦稍能行動。至此危險已過。只須調養。慎勞動飲食。今有偏頭痛。貧血有痰。

人參鬚 <small>另煎冲</small> 二錢	川 莖錢半	姜 夏三錢	炙 草一錢
土炒白朮三錢	生 著五錢	縮砂仁 <small>研後下</small> 一錢	
雲 荸四錢	生熟地各五錢	黑附塊 <small>先煎</small> 三錢	
當 歸三錢	陳 · 皮二錢	炒穀芽四錢	

朱居士 佛教居士林 十月四日

痢後重腹痛。晝夜無度。身熱嘔惡。不思食。舌白無苔。病勢頗不廉。爲其脈大也。

煨葛根三錢 <small>酒洗</small>	川 柏八分	赤 茄四錢	桔 梗二錢
川 連五分	枳 實二錢	油當歸三錢	
白 頭翁三錢		炙 草一錢	

秦 皮錢半

淡 茗二錢

木 香一錢

乾 薑一錢

按此後不復來邀。後問他人知服此一方竟愈矣。余嘗自謂善治病。非誇也。

淵雷

袁太太 勞爾東路六十六弄卅七號 十月十七日

坐骨神經痛。脚常常攣急作劇痛。又貧血致種種液乾證。脈細舌白。

赤白芍各三錢

炙 草二錢

當 歸三錢

赤白芍各三錢

炙 草二錢

當 歸三錢

梁先生

畏光亦差。小腹微痛。大便間日或三日一行。脈細而遲。舌質略絳。腎虛血少。有浮熱。

枸杞子四錢

生 耆八錢

白 芍三錢

生熟地各四錢

當 歸二錢

黑附塊二錢

菟絲餅三錢

杭 菊三錢

炒梔仁三錢

陳 皮二錢 枳 壳二錢

又診 諸恙俱差。惟不能思索。思索則頭昏。仍是腎虛血少之故。脈略起。舌絳略退。稍有苔。皆進步之象。

枸杞子四錢

當 歸二錢

炒潞黨三錢

中醫新生命 第十五號 治驗

製首烏四錢

生耆八錢

生白朮三錢

生熟地各四錢

菟絲餅三錢

炙草八分

枳壳二錢

蘇梗二錢

炒穀芽四錢

梁君粵人。經商海上。服淵師方藥。疾日減。初診方已佚。今錄其二三兩方。餘從略。

編者

凌君 失眠愈半載。今又見脈舌自平。

真珠母八錢先煎 川連五分 穀米三錢包煎

生地五錢 肉桂四分飯丸吞 川芎一錢

當歸三錢 姜夏三錢 夜交藤三錢

硃茯神四錢 薄荷八分後下

張世兄 初次病瘡。俗名胎瘡。曾服規寧及他中藥。雖中止。仍反復不已。今脈遲舌白。貧血甚。卻不脾腫。瘡破後小便頻數。

數。

柴胡錢半

淡芩錢半

白朮三錢

草果一錢

姜夏三錢

雲苓四錢

常山錢半 滌黨二錢 次草一錢
陳皮二錢 紅棗五枚

再診 服藥四劑。瘡遞輕。僅微有寒熱意。小便亦不復失禁。今貧血虛寒。時時汗出。

黑附塊二錢先煎 白芍三錢 雲苓四錢
生耆四錢 滌黨三錢 炙草一錢
桂枝錢半 白朮三錢 柴胡錢半

草果一錢 生常山錢半

陳皮三錢 紅棗五錢

李先生 時時寒熱起落。左脅下痛。左腿又有淋巴腺腫。面色萎黃。脈弱不任。按舌淡。略有薄黃苔。當從瘡治。
生常山二錢 柴胡二錢 炒白朮三錢

草果一錢 姜夏四錢 象貝三錢

檳榔錢半 炒潞黨三錢 桔梗錢半

鼈甲煎丸五錢包煎 紅棗五枚

王君 痘一候。頭痛身熱。胸悶口渴。唇乾舌白。不大便六七日。脈數微弦。

中醫新生命 第十五號 治驗

四六

柴 胡二錢 赤 苓二錢 川 軍錢半後下

淡 苓三錢 花 粉四錢 炙 草一錢

枳 實二錢 生薑銅元大三片

再診 大便已行。胸悶差減。今尙頭脹。夜間有熱。今雖脈靜身和。恐入夜再發。脈略弦。舌絳苔白而乾。

柴 胡錢半 炒山梔三錢 青 蒿二錢後下

淡 苓二錢 香 贊三錢 玄 參三錢

花 粉四錢 炙 草一錢

趙太太 小腹起塊。閱八年。月事如常。恐是子宮疣。難以服藥治愈。肥人故脈細。舌上有浮黑。

桂 枝一兩 丹 皮二兩 川 莖兩半

雲 茶四兩 赤白芍各兩半 三 穰兩半

桃 仁四兩 當 歸三兩 義 芎兩半

右藥共研細末。水法丸。如菉豆大。每早晚空腹服二錢。漸加至三錢。

李先生 精神漸好。飯量未復。言語尙較平時蹇澀。去瀉藥後。大便又二日不行。此或因食少之故。脈遲沈細。舌尙略胖。

淡 蕓蓉四錢 蒜白朮各二錢 姜 夏三錢

仙靈脾三錢

人參鬚三錢

乾薑錢半

金狗脊三錢

苡仁六錢

陳皮二錢

蕤仁折四錢

鬱金錢半

(未完)

誦穆謹案。李君業商寓北武定路。日前因商務發生變化。日益憂煎。遂致精神錯亂。神識不清。飲食數日不進。病勢極為危險。經翁子光先生介紹。延淵師往診。藥再投。神識即清楚如常人。險狀悉去。前兩方在病家聞已遺失。此第三方則登門就診時所錄也。又案。近年因就診者輾轉介紹。淵師處病人日增。惟誦穆事多方案不能悉錄。故首尾或殘闕不全。且新生命篇幅隘。所錄亦不能悉載也。

合明

良定問導字第二五七號

大論葛根加半夏湯。小青龍湯。半夏均用半升。不知折今秤多少。時下風尙止血藥類多炮炭。如炮姜炭。地榆炭等。敬懇以科學原理闡釋之。

答良定和尚

半夏今以錢計。通常用三錢。現行新秤可四錢。若專門止嘔劑。如小半夏加茯苓湯等。鄙人用生半夏熱湯洗去滑。五錢至七八錢。惟須等量之生薑。否則乾咽聲喑。

炭末傅着於破裂之血管壁或創傷面。有直接止血之效。世俗用香灰等類傅小小割刺傷。亦是此意。若止血藥則藥力與炭力合併奏功矣。 淵雷

邱倩尹問

太陽中風有汗。用桂枝湯。太陽傷寒無汗。用麻黃湯。中風有汗而項背強。則用桂枝加葛根湯。傷寒無汗而項背強。何以不用麻黃湯加葛根。

答邱倩尹

葛根湯中有麻黃。與麻黃湯加葛根比較。惟少杏仁。多芍藥薑棗耳。抑病象參錯。不能如理想之劃一。麻黃湯證較重。不但無汗。且有喘。若有微汗者。麻黃湯為禁劑。葛根湯證較輕。不喘。即使有時微汗。但病勢仍須發汗者。葛根湯仍可用。故通常無汗之表證。屬葛根湯者多。屬麻黃湯者少。此經驗上所得。初學大論者。往往斤斤於有汗無汗。以分別桂枝麻黃。其實此乃概說。不宜太拘也。 淵雷

張偉發問

生理補證三卷五十八頁一行。『除虛內熱』與『陽盛陰衰』同是缺乏榮養分。同有高於常人之體溫。特前者因缺乏榮養分故。已影響及各器管機能之衰弱。後者雖缺乏榮養分。而各器管機能未至衰弱。是可為二者之區別否。

淵雷先生答

陽盛陰衰。只是陽太盛。而不盛之陰。不足以副之。陰實未致於衰。此義補證中似已言及。

張偉弢問

藥物學二卷三十九頁十二行。何謂『交流作用及水分脫却』

答張偉弢君

糖之融液滲入於皮膚。膚內纖維。由溶解而入於糖之融液中。此是交流作用。創傷處之水分。溶入於糖中。水分遂為糖吸收。此是水分脫却。(水分指滲出物) 諸穆

課 卷

腺體之研究(續)

下編——無管腺（內分泌）

上皮細胞與他細胞變形團結成內分泌系統之無管腺。生出內分泌。不由導管輸出。而吸收入血循環全身。以行其調節之功。此種特殊腺體。其種類與功效。尙未盡明瞭。其已知者。爲（1）甲狀腺。（2）甲狀旁腺。（3）胸腺。（4）大腦垂體。（5）松果腺。（6）扁桃腺。（7）肝腺。（8）消化腺。（9）腎上腺。（10）性腺。（11）胎盤等等。凡此皆爲無管之腺體。其所分泌之物。謂之內分泌。

（1）甲狀腺

甲狀腺亦名牌腺。有兩葉。位於喉際氣管上部之兩側。由中部使兩葉相連。此中部名曰甲狀腺峽。爲重要之內分泌。一切脊椎動物均有之。有腺狀之構造。富於血管而無排泄管。其腺質係閉合之泡。或囊所成。其裏面爲上皮細胞。並含一濃厚之半液體質。其周有許多毛細管圍繞。腺體之動脈有四。故得血甚多。此腺有纖維維持其位置。附着於喉之兩旁。並氣管後面之筋膜。甲狀腺之功用。頗爲重要。若童年此腺發育不全。則其身心之發育均被阻。因體內欠缺甲狀腺內分泌所致。若成人時此腺若變性或萎縮。或將其完全割去。則皮之結繩組織過長。乾而且厚。但發育不全。手足與脣均大。新陳代謝受阻。靈心能力漸漸低落。然若留腺之一小部份。或移植此腺。則可免此結果。且服甲狀腺素。每可以增進其功用。反之。若此腺活動過甚。則顯新陳代謝過於活動之狀。而成突眼性甲狀腺腫之病。此種病多發於妙齡女子。其證狀爲甲狀腺漲大搏動。心之動作增速。震顫。眼珠突出。狀至可怖。顯見此腺之內分泌。與身體之滋養及組織之新陳

代謝。有密切之關係。此內分泌又可激心之活動。增加血壓。且免肥胖之患焉。

又此腺與憂鬱有關。凡多憂鬱而患氣喉者。此腺腫也。氣喉腫脹甚大。呼吸及嚥下均感困難。有亘數十年不愈者。然於生命無害。宜轉地治療。及通利大便。與達觀一切。則易全愈。若以西法手術割之。反足以促其天年也。（巢氏病源有瘳病。即甲狀腺腫。誦穆。）

若此腺之機能停止。則能生黏液水腫之病。此病多發於婦人。次為小兒。又次為男子。其證狀為皮膚呈一種特異之彈力性浮腫。肥厚乾燥而復厥冷。此種浮腫。最初始於顏面。次及頭部四肢。四肢異常粗大而短。眼瞼腫脹下垂。鼻亦肥滿而呈醜形。顏貌為無慾狀。此外汗及皮脂之分泌均減少。毛髮指甲及齒牙亦間有脫落者。至於精神障礙。則除無慾狀態外。說話亦緩慢而乏氣力。性亦遲鈍。記憶力亦減衰。且有時生幻覺。又本病之婦人患者。多有骨盤內臟器之疾病。往往無月經或月經過多。其在小兒患者。多起於五六歲或五六歲以後。其證狀為顏貌癡呆。身體矮小。皮膚乾燥。步行不便。言語不明。精神亦極遲鈍。即使成年。其生殖器為小兒型。而第二次性徵亦不發達。乳房及陰毛之發育尤為不良。又最近之發見。此腺下前葉。對於胰腺。甲狀旁腺及卵巢。有互相抑制之作用云。（第二次性徵云者。即指生殖器全部而言。凡與生殖機能有直接關係之兩性特徵。如女子骨盤之廣大。皮下脂肪之豐富。男子骨骼之雄偉。鬚髯之叢生。聲音之變化等皆是也。）（未完）

學問如植物。其根苦。其實甘。

英 謂



來簡一束

欲習醫久矣。苦於舊有醫書。不合邏輯。難以卒讀。屢作屢輒。後購傷寒論今釋。莊誦之下。頓覺以前種種困難。一掃無遺。興趣爲之大興。復聞絳帳宏開。更幸春風可坐。欣忭何似。茲特遵章繳費。請列門牆。藉資造就。而酬素志。龔景周君來書。今日中醫能完全科學化者。惟閣下爲最。能精通西醫者。亦惟閣下爲最。拜讀大著。欽佩莫名。謝則仁君來書。弟幼多疾病。稍長嘗涉獵內難傷寒金匱諸書。偶爲人治病。間或應手而瘳。職是攻之頗力。然終嫌歷代註家率尚玄談。不着邊際。僻處鄉曲。問難無從。比年來執行律務。塵事龐雜。偶獲暇晷。尋繹經義。往日所未明者。仍難澈底了解。嗣於報端暢讀先生諸妙論。以爲能道前人所未曾道。歎爲觀止。高無易君來書。

接讀中醫新生命第一號至第十二號。啓迪良多。旭從前即主張以科學原理。解釋舊時醫學。俾有統系。不致玄虛。使人如墮五里霧中。今得先生振臂一呼。萬方響應。從此中西醫術。定有融會貫通之一日。予曾習生理解剖理化博物等學。故閱讀新著。比舊說尤易了解而無困難。嘗謂習中醫者最低限度。須習過普通科學。頭腦清楚。是以國

醫館對於中醫學應用科學方法整理。若抱殘守缺。殊無設立之必要。舊時儘多佳著可讀。先生以爲何如。朱旭君來書。捧讀大著。雖不能寢食俱忘。（晚懶廢不嗜讀。非尊書不能使人寢食俱忘。）亦頗有不願釋卷之感。至理名言。皆得古人所未有。焦氏易林云。心得所好。口常欲笑。卽鑑近日之心情也。宗鑑君來書。

醫學新聞

本刊

●中醫條例。應否妥加修訂。交本屆中執委會考慮。——五全大會廿一日晨九時。開第五次大會。出席中委及代表共四百八十一人。列席候補中委及代表一百五十七人。主席蔣中正。秘書長葉楚傖。（中略）提案審查委員會審查報告（第四號。）奉交審查政治各提案。經於十九日下午三時。開第四次審查會。計到邵力子吳鐵城等三十八人。謹將審查結果報告於左。（一）政府對中西醫應平等待遇。俾宏學術。而利民生案。審查意見。『中醫條例。應否妥加修訂。擬交本屆中央執行委員會迅予考慮。』——十一月廿二日新聞報

◎中央國醫館頒布國醫教育機關立案暫行標準大綱——國醫館訓令第三三二三號云。『查各省市國醫學校學社傳習所等。所訂學則課程。向無標準。影響所及。專才固不易成就。學術亦無從發揚。本館有見於此。業將國醫教育機關分別釐定名稱。凡以教授國醫之知識技能爲宗旨者。定名爲國醫專科學社。其以研究國醫之高深學理爲宗

旨者。定名爲國醫研究所。並擬立案暫行標準大綱二十一條。亟應公布全國。以資遵守。」（下略。）此令發表後。國內中醫學校。以學校將改爲學社。一致反對。旋奉國醫館第三五五〇號訓令。將前令取消。

●本草品彙精要。商務行將刊印。——本草品彙精要。爲前明內府所編纂。圖繪極精。在中國藥學史上。居重要位置。商務已預定出版。

●大東書局編印中國醫學集成——大東書局延請紹興曹炳章先生。選擇中國古近醫書三百餘種。名中國醫學集成。分門十二。各科皆備。現在編印提要中。預定兩年內出齊。一律以北宋字排印。此書出版後。坊間石印之古醫書。將受打擊。

●本醫室遙從消息——本醫室開辦遙從。每十個月爲一學期。印發講義二十期。以科學之理。說中國醫學。教材極有系統。使學者得循序漸進之梯階。輔以內容精善之書籍。養成自行研究之能力。現第二學期講義。已陸續印發。同時學費減輕。第一第二學期。每月繳者僅二元一角。每學期一次繳足者。十九元五角。減費實行以後。新生尤見增加。遙從之詳細辦法。見本醫室遙從章程函索附郵五分。

座右銘

觀書須有感發奮勇之意。方有進境。觀書有悅擇之意。所入必深。——廣近思錄
（胡氏字叔心。明餘干人。卒謚文敬。）

胡居仁

朴。蒼朮。前證口乾熱多者。本方加花粉。黃連。

虛人久瘡。或瘡久虛弱者。可用必讀截瘡飲。黃耆。人參。白朮。茯苓。砂仁。草果。橘紅。五味子。烏梅。甘草。若前證多寒象者。宜補中益氣湯加薑附。又治瘡痢并發而多寒象者。黃耆。甘草。人參。白朮。當歸。柴胡。升麻。橘皮。附子。乾薑。

瘡疾若無他種特殊證候者。則三四發後可設法遏令不再發。謂之「截瘡」。截瘡必於三四發後者。因發過三四次後。病人之抗毒力已生出不少。得截瘡劑相助。可以遂止。截早則抗毒力未足。不得效耳。舊說相傳。以爲「截之太早。則邪氣閉遏不及發泄」者。非也。然初起時苟用藥得當。亦可自然不再發。不必截。截瘡劑甚多。而外臺療瘡丸最效。知母。常山。甘草。此方本是丸。作煎劑亦好。須於瘡發前四小時間各服一次。即不復發。若老人虛人。脾胃薄弱。不耐服藥。或小兒女子。畏苦味不肯服藥者。可用外治法。麻黃三錢。雄黃三錢。斑蝥三頭。去翅足三味共研細末。從頸根脊柱最高椎骨數起。向下數至第三椎。溫水洗去垢。抄藥末如黃豆大一小堆。放椎骨上。外用小膏藥貼之。按使熨貼。貼藥須於瘡發前兩小時行之。貼後瘡即不發。俟過應發瘡之時間。輕揭膏藥。軟棉拂去藥末。貼藥處必起小水泡。用銀針開水發過。將小泡之皮刺一小孔。留心勿揭去浮皮。否則疼痛。或且作爛也。用消毒棉或淨紙輕吸去泡中水。仍留浮皮。或蓋小膏藥以免衣服擦損。若貼藥後覺痛。則水泡已起。可即揭去刺開吸乾。不必俟一定時間也。此法甚效。惟斑蝥所以起泡性極毒。切不可入口。治一人所用藥極少。而麻黃雄黃用三錢者。因太少則不易研末故也。二味各三錢而斑蝥三頭。此比例量爲膏梁之體設。凡達官貴人。富商豪賈。同志青年。摩登小姐。重茵而坐。列鼎而食。不勞筋骨。其肌膚薄嫩。吹彈得破。六

錢藥中用斑蝥三頭爲比例。已足起泡矣。若藜藿之體。村夫老農。傭保苦力。武裝同志。村野老嫗。則雨淋日炙。肌膚堅如牛革。六錢藥中須斑蝥七頭。用時又須抄藥較多。膏藥較大方能起泡也。此外有許多禁咒之法。吾鄉謂之『捉瘡子』。大抵是道家之遺法。亦有確然見效者。據我看來。亦未見定是迷信。但究竟非醫藥範圍中事。非本篇所宜論矣。

柴胡爲治瘡要藥。但因王孟英戒人不可輕用柴胡葛根。王氏之法爲市醫所通行。故市醫用柴胡者極少。卽用之亦不過四五分。鄙人用柴胡於膏粱之體則一錢半。至少亦不減一錢。藜藿之體則至四五錢。藥肆與市醫相與譏爲『野郎中』。不知用少則不效也。仲景小柴胡湯。半夏黃芩人參生薑皆用三兩。而柴胡用半斤。雖曰古今權秤不同。然今人用半夏黃芩。適中量爲三錢。以比例計算。則柴胡之適中量當爲八錢。吾以四錢爲大量。比仲景尙輕一半。何嘗過重。俗醫又謂仲景法宜於北方人。不宜於南方人。然仲景生於南陽涅縣。官於長沙。人人知之。漢之涅縣。在今湖北鎮東縣境。在北嶺之南。屬江漢流域。長沙卽今湖南省城。在大江之南。洞庭之濱。何嘗是北方。彼俗醫者。古今地望之不知。而乃放言高論。大談學理。可謂厚顏。社會上乃偏信此等無稽之談。遂令瓦釜雷鳴耳。業師姚先生之世兄。嘗從鄙人受經問字。鄙人棄儒學醫。前年鄙人任寬德軒施醫。招姚世兄相助。姚述其師言。柴胡葛根升提勸肝陽。切戒不可用。見吾常用此二味。甚爲駭怪。吾乃告以宜用柴葛之證候。姚亦親見覆診者服柴葛而效。始敢試用。越兩月。姚欣然相告曰。『我今亦能用柴葛矣。』嗟乎。藥之性無有不偏。用藥治病。正取其偏性毒性耳。今之醫家病家。務求藥之平穩。不計能愈病與否。然則何不飲白開水。何必請醫服藥。費錢費事哉。况柴胡升提之說。亦大有可商乎。又籠

甲煎丸專治瘧母。大藥肆中有成丸出售。其方甚繁。不具錄。

南方人患瘧。大概不致危及生命。聞北方頗有以瘧病爲死症者。不知確否。此病必因蚊蟲傳染。瘧蟲又不從呼吸大小便汗液中出。故無須消毒。雖日與病人接觸。亦不傳染。飲食方面。相傳忌含鹹之麵。如饅頭油條等物。云食之輒浮腫。鄙人雖未確信。但爲慎疾計。亦囑病人忌之。惟豆類爲瘧疾之大忌。扁豆尤甚。食之雖已愈亦必再發。卽豆棚下亦不可走。其理固難通。然有事實證明。不容不信。故瘧止後。仍須忌豆類一箇月。病後若欲服藥調理。則健脾爲主。白朮黨參首烏之類皆可用。按本草不言何首烏治瘧。而張景岳治瘧方有「何人飲」用首烏人參鐵樵先生治瘧無實證者。用小柴胡湯加鮮首烏甚效。

猩紅熱（卽爛喉痧） 麻疹（卽痧子瘡子）

猩紅熱與麻疹。從學理上說。是截然兩種病。但其證候。治法宜忌。看護方法。以及鄙人所默會之不中不西的病理。二病都有相似處。故本篇併爲一起論之。麻疹之發見已久。古書上有「癰疹」「赤疹」「丹疹」「痧疹」諸名。現今上海一帶俗語稱「發痧子」。浙江甯紹一帶。又稱「瘡子」。瘡字之讀音如措。猩紅熱則中國本無此病。病之發源地在北美洲及歐洲西北一帶。海禁既開。歐亞交通頻繁。猩紅熱之病原體。始由歐美人與其經濟侵略勢力。一同帶入中國。古時交通不便。中國人又以「安土重遷」爲美德。有「鄰國相望。雞狗之聲相聞。民至老死而不相往來」者。故傳染病

有局限於一地方。不流傳於他處者。交通一便。往來一多。則本地方向來不見之病。亦復流行傳染。此例甚多。亦是一種有力的旁證。證明傳染病有病原體。而讀破萬卷古書之舊中醫。猶執定傳染病是氣候——六淫——造成。不承認有病原菌。其鋼蔽之深。真是無可感悟。猩紅熱傳入中國。乃近百年內事。上海租界第一次發見死於猩紅熱之病人。在西歷一八七三年。即前清同治之末年。其後至光緒二十九年。上海乃大流行此病。讀者諸君有年事較長者。當憶三十年前滿城風雨之『爛喉痧』。即是猩紅熱流行也。猩紅熱必兼發咽喉腫痛。甚則腐爛。醫生中有所謂喉科專家者。欲攬此病於喉科範圍。以施其妙手。故立其名曰爛喉痧。又曰爛喉丹痧。病家聞此名目。自然不求他醫。專誠請教喉科專家矣。其實。猩紅熱之咽喉腫痛是副證。皮膚發疹點乃爲主證。何以知之。若疹點不能順遂發出。不能順遂消退而落屑。無論如何治其咽喉。其紅腫腐爛決不能先愈。反之。專治疹點。不顧咽喉。疹點之發出消退。苟能步步順利。則咽喉之腫痛腐爛。儘有不用藥而自愈者。吾作此言。非欲奪喉科醫之買賣。事實學理如此。不容不說也。猩紅熱與麻疹。又多發於小兒。與天花（痘瘡）相似。於是世俗相沿。似乎痧痘爲小兒科之一分科。其實。從學理上言。麻疹痘瘡皆屬急性傳染病。非小兒特有之病。若從事實上言。成年人乃至老人。亦有患痧痘者。須知急性傳染病。無絕對專犯小兒者。雖如百日咳。（又名天哮喎。又名頓嗽。）亦有老人患此致命者。不過小兒比較的易患某數種急性傳染病。則有之耳。

猩紅熱麻疹之爲傳染病。已無疑。各有細菌爲病原體。亦無疑。惟究是何種菌。則至今尙未檢證明白。若是者西醫謂之『原因不明之傳染病』。或謂猩紅熱由於一種溶血性連鎖狀球菌。麻疹由於一種微小之雙聯球菌。然一般學

者未能肯定也。二病之流行時期。冬春最盛。夏秋甚少。流行地域。溫帶及近寒帶之地較多。熱帶極少。於此可知猩紅熱。麻疹之病原菌。喜寒冷而不耐較高之熱度也。傳染之人。不限種族。——某種傳染病。對於某種人種。無感染力。例如黃熱病不能傳染黃種人。黑種人。——而以二歲至十歲之小兒為最多。若嬰兒在半歲以內。傳染較少。然亦有生產時母患麻疹。兒產即已發疹。或產出後數日發疹者。成年人患此二病者甚少。一經病過。常終身不復病。此然亦不能如天花之絕對終身免疫也。

麻疹初起。常作傷風證狀。頭痛。怕冷。發熱。噴嚏。咳嗽。兩目因結膜發炎。紅潤而羞明。胸口甚悶。小兒若有以上證狀。而在麻疹流行之際。即有發疹之可能。此時如欲確定是否麻疹。可觀其口內之兩頰。當下臼齒根之處。若有白色或青白色。而有光輝之小水泡小斑點。四圍繞以赤暈者。可以斷定其必發麻疹。此種小點。西醫謂之『考浦立克氏斑點』。英文為 Koplik's spot。同時其上頸已有『內疹』。色殷紅。大如扁豆。此為麻疹初期診斷之唯一法門。然事實上有困難者。病人多屬小兒。不可理喻。用牙撓舌壓等物張其小口。必啼哭。強難以仔細觀察。且哺乳兒口內常有殘留凝結之乳屑。故見白點時。須以物撥之。撥之不去。方是真斑點。而非乳屑。亦有發疹前並不現此斑點者。惟真見此斑點時。則為麻疹無疑耳。

發熱之後四五日。疹點乃現。大概始於兩頰。遍於顏面。順次蔓延。由頸項軀幹而及於四肢。其始為小如蚤噏之紅點。漸增大。作暗赤色。或多點溶合而成片。此疹微微突起。目視不甚顯。手撫之。則覺糙如蟾蜍皮。疹之疏密。人各不同。不

能以遍身皆見。以爲已盡。亦不能以寥寥數點。以爲未發盡。惟未發盡者。胸悶不舒。欬亦不爽。若胸口不復悶。欬嗽爽利。則不問疹點之疏密。可知已經發盡。疹點盛者。顏面常腫脹。其皮緊張而紅亮。若初期見考浦立克氏斑點。確定爲麻疹。而發疹不自兩頰顏面始。乃從軀幹始者。其後經過必不順利。市上中醫謂之『白面痧』。須設法使面部速顯疹點。方免危險。

疹點發盡後。約有二三日稽留。此時熱度不減。一切傷風證狀皆如故。若病孩神識明白。脈搏強實者。即可保險無虞。二三日後。自然熱度降復常度。疹點亦退。目赤欬嗽。一時俱瘥。約熱退後二三日。疹點消盡。繼以皮膚落屑。狀如糖粃。此時病孩已不耐臥床。下地嬉戲矣。

猩紅熱初起時。亦頭痛惡寒發熱。甚則戰慄。但不欬嗽。常反復嘔吐。或發痙攣。——驚風證狀。——舌上有黃白苔。精神恍惚。疊語不眠。熱度昇高極速。發病第一日。每至攝氏四十度左右。咽頭灼熱紅腫。嚥物時作痛。在此第一日中。別無確實之證候。可以斷定爲猩紅熱者。至第二日而疹點發出。此時熱度愈高。常在四十一度以上。疹係小紅色點。始於頸部胸部。蔓延甚速。一晝夜間。可以遍佈全身。疹發至峯極時。其色非常鮮紅。爲一切疹點之最。此猩紅熱之所以得名也。面部多無疹。而口唇四周。則絕對無疹。常作青白色。此爲與麻疹不同之處。惲鐵樵先生保赤新書。謂痧子病兒面部。鼻傍口唇發青。爲逆症。淵雷謹按書中未言猩紅熱。或者先生併麻疹猩紅熱爲一。猩紅熱本比麻疹爲惡。而有唇周青色之證。故以爲痧子逆證歟。疹點亦閱二三日而消退。再閱一二日而退盡。此時舌苔剝離。顯絳色之舌底。其乳嘴腫脹。

本刊徵求定戶

中華民國廿四年十一月三十日出版
新 生 命 第十五號

本刊原為不定期刊物，茲應讀者之要求，並請郵局掛號。從第二號起，改為定期刊物。每月出一號。月底出版。

本刊第一號業經再版，仍贈閱。索閱者請開具姓名地址。附郵票五分，即寄贈一冊。空函及污損之郵票，恕不照贈。第二號以後照下開定價表發售。

遙從同學定閱者，照定價八折取費。

外埠定閱，最好用匯票。郵票以上海通用。（四川郵

票限本省用者不收）一角以內者為限。請用蠟紙標帖，仍作九五折計。

本刊定價表

四分之一面	半面	全面	一期	三月期
三元	五元	十元	一角半	六號
二角	四元	八元	七角半	十二號
一角	三元	六元	一元四角	十二期
五角	二元	五元	郵費國內不加	十二期

議顏版者半頁及裏封面底均用銅表紙特製，另加鋅加特版費。印者另用銅鋅加特版費。先惠用者另用銅鋅加特版費。

不許轉載
主編人 陸淵雷
編輯 謝誦穆
發行處 上海牯嶺路人民里
陸淵雷醫室

陸淵雷著全蜀今釋

印行報紙西裝本
現已出版
有贈品

此書初印千部。現已將次售完。頗有寒士愛讀。來函要求另印廉價本者。因改用報紙兩面印。西裝兩厚冊。書品較原印連史本爲小。一切以價廉爲目的。然內容與原本完全一樣。印刷裝訂雖不求美觀。但仍求清朗堅實。此書現已出版。實價四元二角。郵費二角。凡於廿四年國歷年內直接向本醫室購買者。每部贈九折廉價券一紙。持券買本醫室他種醫書雜志。或交遙從束脩者。皆照折實之價再折九折。

發行處 上海牯嶺路人安里十一號陸淵雷醫室 電話九三二八六