

醫方類聚卷之二百十五

婦人門

諸虛

聖惠方

治婦人冷勞諸方

夫婦人冷勞者山氣血不足表裏俱虛臟腑
久挾宿冷致飲食不消腹內積聚臍下冷痛
月候不調骨節痠痛手足無力肌膚羸瘦面
色萎黃故曰冷勞也



此方治婦人冷勞諸虛
聖惠方

治婦人冷勞氣攻脾胃腹脇妨悶四肢不用
喫食減少漸至虛羸訶梨勒散方

訶梨勒皮壹兩厚朴壹兩薑汁炙令香熟柴胡

壹兩木香兩當歸兩桂心兩芎藭分陳橘

皮叁分湯浸熟乾地黄分人參叁分去牛

膝壹兩白芍藥分白朮分甘草壹分炙

右件藥搗羅爲散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓不

計時候溫服

治婦人冷勞氣而色萎黃四肢羸瘦多卧少
起不欲飲食身體虛困厚朴散方

厚朴壹兩去麤皮塗生木香兩當歸叁分

微熟乾地黄兩半復上兩湯洗人參叁分

白茯苓叁分白芍藥兩乾薑兩炮桂心

半朱膝叁分去苗陳橘皮叁分湯浸白朮附

子叁分炮裂甘草兩炙微赤到

右件藥搗羅爲散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗三枚煎至七分去滓不

計時候温服

治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢

羸瘦不思飲食桃人散方

桃人半兩湯浸去皮尖鼈甲二兩塗醋炙

○婦人大全良琥珀青兩研肉桂皮壹兩去麩

方永類鈞方無琥珀細研肉桂皮壹兩去麩

鈞方赤芍藥方三分○鈞當歸炒三分○鈞方二

分白朮方三分○鈞木香兩訶梨勒兩皮乾

薑裂兩炮人參半兩去延胡索方三分○鈞

芥茯苓方二分○鈞陳橘皮一兩湯浸牛膝

三分去苗○
鈞方二分

右件藥時羅羅為散每服四錢以水壹中

蓋入生薑半分良方煎至六分良方去

滓每於食前温服

治婦人冷勞氣經脉不調腑臟氣滯四肢疼

痛飲食無味漸加羸瘦木香丸方

木香三鼈甲壹兩塗醋炙琥珀參柴胡壹

去白朮壹兩乾薑半兩炮陳橘皮壹兩湯浸

入參半兩去桂心兩吳茱萸參分湯浸七

厚朴壹兩去麁皮塗生薑汁炙令香熟當歸叁分剉碎微炒赤芍

藥叁分京三棱口分微煨剉延胡索叁分

附子叁分炮裂去皮臍芎藭叁分牡丹叁分熟乾地黄壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大空心及晚食前以溫酒下三十丸良方永類

治婦人冷勞血海氣虛經絡不利四肢疼痛不欲飲食漸加羸瘦牡丹丸方

牡丹三分牛膝壹兩去苗桂心三分桃人壹兩湯浸

人麩炒附子壹兩炮裂去皮臍熟乾地黄口兩乾漆微黃

參分搗碎木香叁分芎藭叁分菴藎子叁分延胡炒令煙出

索兩當歸叁分剉碎微炒蜜足水蛭叁分黃炒令

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大空心及晚食前以煖酒下三十丸

治婦人冷勞氣腹脇疼痛不思飲食四肢少

力漸加羸瘦相了人丸方

相子人分參乾漆冬分膏率冬分鼈甲壹兩半塗

去裙分參常歸碎微炒紫石英水飛過白朮

參肉苁蓉刮去酒浸青宿乾薑裂到桂

心分參牛膝去苗赤芍藥分參附子去皮炮裂

芎藭分參木香分參熟乾地黄分參桃仁浸去皮

尖雙人琥珀分參麝香細研

右件藥搗羅為末入麝香令勻鍊蜜和搗

三二百杵丸如梧桐子大空心及晚食前

以溫酒下三十丸

治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色萎黃四肢

無力月候不調少思飲食熟乾地黄丸方

熟乾地黄兩壹當歸半兩芎藭兩半鼈甲兩壹

塗醋炙今人參參分白芍藥參分白朮參分

桂心半兩五味子兩半黃耆兩壹牛膝參分附

子三分炮裂陳橘皮去白甄焙白茯苓三

甘草壹分炙微赤

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵

如梧桐子大空心及晚食前以温酒下三

十丸 婦人大全良方示

治婦人久冷血氣凝滯而色萎黃四肢羸瘦
不思飲食腹中多痛牛膝丸方

牛膝 壹兩去苗 川椒 壹兩去目及閉 芎藭 叁分附

子 壹兩炮裂 木香 兩半當歸 三分剉乾薑 三分

炮裂白朮 叁分 熟乾地黄 兩壹 桂心 兩壹 澤蘭 三分

逢莪茂 兩壹 肉荳蔻 壹兩去殼 硃砂 研入 青橘

皮 三分湯浸 去白麩焙

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大空心及晚食前以煖酒下三

十丸

治婦人冷勞氣心腹積聚攻腹脇疼痛四肢

羸瘦不欲飲食硃砂煎丸方

硃砂 二兩以醋壹 龍甲 壹兩塗醋炙 桃人

壹兩湯浸去皮尖 木香 兩壹 當歸 兩壹 碎微炒

靈脂 壹兩去沙石炒 婦人大全

右件藥搗羅為末用硃砂膏和搗百餘杵

九如梧桐子大空心及晚食前以煖酒下
二十九

治婦人冷勞氣脾胃虛乏大腸轉洩水穀不
化四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力
宜服此煮肝散方

縮砂三分 蒔蘿三分 華芨三分 柴胡三分 白朮
半兩 白芷半兩 胡椒半兩 乾薑半兩 炮薑半兩 燕蕒半兩 陳
橘皮半兩 湯浸焙 茵陳半兩 細辛半兩 人參半兩
木香半兩 桂心半兩 紫苑半兩 洗去苗土 白芍藥半兩

右件藥搗細羅爲散以猪肝壹具去脂膜

柳葉片切以新汲水洗過入葱白三莖婦人

大全良方 承寸 細切入藥末半兩於鐺鍋內

以新汲水二大盞入鹽醋少許以瓷碗合

煮令水盡空心以意食之喫粥飲下食後

良久飲煖酒壹盞爲妙晚食前再服亦佳

治婦人冷勞面色萎黃不多思食或時下痛

四肢少力漸羸瘦煮肝散方

白芍藥一兩 婦人大 芍藥三分 桔梗三分 去蘆

頭陳橘皮壹兩半湯浸去白瓢焙厚朴三分去麤皮塗生薑汁炙

令香桂心三分乾薑炮裂當歸剉碎柴胡去蘆

頭荆芥 蒔蘿 胡椒 蕪荑 藁本

紫苑去苗土已上各半兩

右件藥搗細羅為散每服以獾猪肝壹具半兩用塩醋并葱白各少許相和如尋常煮熟空腹以意服之後喫溫酒膏蓋方

錢二

治婦人熱勞諸方

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒積穢在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澀唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沉多臥少起飲食無味舉體痠疼或則心忪或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼口乾心躁不欲飲食者散方

弱者一兩到〇得效方地骨皮一兩赤茯苓

一兩麥門冬去心一兩人參三分去蘆頭赤芍藥一兩得
效方良生乾地黃壹兩○得效柴胡壹兩半去
苗○得效方黃芩三分當歸三分甘草壹分炙
○得效方良方壹兩
良方五錢

右件藥搗麤羅為散每服四錢用水壹中
盞人生薑半分婦人大全良方得效方煎
至六分去滓不計時候溫服

治婦人熱勞體瘦壯熱四肢煩疼咽喉不利
少思飲食知母散方

知母三分黃芩三分柴胡壹兩生乾地黃一兩赤
芍藥三分麥門冬三分射干三分川升麻三分甘
草半兩炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
盞入生薑半分淡竹葉二七片同煎至六
分去滓不計時候溫服

治婦人熱勞心胃煩熱不思飲食四肢多疼
經脈滯澀犀角散方

犀角屑半兩柴胡壹兩赤芍藥三分虎杖三分紅

藍花壹兩黃芩半兩龍甲一兩塗醋炙炙甘草半兩

赤微判分扶神三地骨皮三麥門冬三當歸兩

分三穀三枳三微黃去軀炒分

右件藥搗麤羅為散每服二錢以水壹中

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人熱勞體瘦經脈不通四肢疼痛口乾

煩渴不得眠卧飲食全少胡黃連散方

胡黃連三天靈蓋一龍甲一塗醋炙兩

柴胡一赤芍藥三生乾地黃一

當歸三地骨皮一黃耆一麝香一細

川大黃一兩微炒木香兩青蒿三黃芩三犀

角屑一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分桃柳心各七莖煎至六分

去滓不計時候溫服

治婦人熱勞發歇壯熱四肢煩疼漸漸黃瘦

心胃燥悶龍甲散方

龍甲一兩塗醋炙炙

黃芩一兩塗醋炙炙

生乾地黃一兩塗醋炙炙

柴胡一兩塗醋炙炙

本草綱目

卷之

鼈甲一兩半塗醋炙 知母三分 川大黃三分

微地骨皮三分 赤芍藥三分 甘草半兩炙 人參

三分去 麥門冬一兩 黃芩三分 黃耆三分 柴

胡一兩半 桑根白皮三分

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分葱白五寸豉五十粒煎至

六分去滓不計時候溫服

治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛

或時寒熱痰逆不欲飲食半夏散方

半夏半兩湯洗 知母半兩 桔梗半兩 黃耆

壹兩柴胡壹兩 鼈甲一兩塗醋炙 人參半兩

去蘆亦茯苓 秦艽半兩 麥門冬半兩 赤

芍藥半兩 甘草一分炙 烏梅肉兩 大腹皮三分

右件藥擣麤羅為散每服四錢以水一中

盞入生薑半分煎至六分婦人大全良方

片煎至七分去滓不計時候溫服

治婦人熱勞羸瘦四肢少力經脉不通紅藍

花散方

紅藍花壹兩 柴胡壹兩半 當歸兩 生乾地黄

赤芍藥兩 鬼箭羽兩 虎杖兩 大腹皮兩

麥門冬兩 土瓜根兩 地骨皮兩 枳殼

一兩 麩炒 甘草 半兩 炙 微黃去瓢 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹斗

盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人熱勞羸瘦黃連猪肚丸方

黃連三兩 人參壹兩 赤茯苓兩 黃耆兩

剉木香兩 鼈甲壹兩 醋炙柴胡 壹兩 去苗

地骨皮兩 桃人壹兩 湯浸去皮 微黃

右件藥搗細羅為散用好嫩猪肚壹枚淨

洗後將前藥末安猪肚內以線子縫合蒸

令爛熟砂盆內研令如膏為丸如梧桐子

大食前以粥飲下三十九永類鈔方同婦人

食前再服

治婦人熱勞煩悶四肢黃瘦疼痛時有欬嗽

不欲飲食胡黃連丸方

胡黃連半兩 柴胡壹兩 赤芍藥三分 鼈甲二兩
炙令黃 知母半兩 犀角屑三分 川升麻半兩 玄參半兩
去裙襴 人參半兩 地骨皮三分 當歸半兩 杏仁三分
兩 湯浸去皮尖 雙茯苓三分 枳殼三分 麩炒麥三分
人麩炒微黃 門冬一兩 紫苑三分 洗川大黃三分
去心焙 甘草半兩 秦艽三分 檳榔半兩 桔梗半兩
微赤剉 頭微赤剉

右件藥搗羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子火不計時候以粥飲下三十丸

治婦人熱勞煩悶四肢疼痛經脉滯澀腹脇妨悶不欲飲食益母草煎丸方

益母草汁升 青蒿汁升 無灰酒升 生薑汁升
 合童子小便升 蜜合

已上同於銀器中以慢火熬成膏

柴胡壹兩 人參三分 去去 麥門冬一兩 琥琥
去苗 珀三分 桃人一兩 湯浸去皮尖 地骨皮三分
細研 白朮三分 枳殼三分 麩炒微黃 鼈甲二兩 塗醋炙
分

桔梗三分去 常歸二分 赤芍藥兩 生乾地黃

一鬼箭羽兩 麝香壹分

右件藥搗羅為末用熬成膏和搗三二百

杵丸如梧桐子大食前以溫水下三十丸

治婦人熱勞欬嗽肌體消瘦心膈煩熱夜多

盜汗四肢痠痛食少無力青蒿丸方

青蒿壹兩 天門冬壹兩 柴胡壹兩 地骨

皮壹兩 旋復花壹兩 紫苑壹兩 貝母兩 人參

壹兩去 杏仁壹兩 秦艽壹兩

頭龍膽兩 天靈蓋壹兩 鱉甲壹兩

令黃去 炭兩 黃芩兩 川大黃兩

枳殼一兩 甘草三分 朱砂一兩

過麝香半兩

右件藥搗細羅為末入研了藥令勻鍊蜜

和搗三五百杵丸如梧桐子大每服不計

時候以麥門冬湯下二十九

治婦人與鬼交通諸方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若

陰陽調和則藏腑強盛風邪鬼魅不能傷之
若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼
干其正然婦人與鬼交通者由藏虛神不守
故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對悞
時獨言笑或時悲泣是也脉來遲伏或如鳥
啄皆邪物病也又脉來絲絲不知度數而顏
色不變此亦皆候也

治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜亂
茯神散方

茯神

壹兩

茯苓

壹兩

婦人

人參

壹兩

慮頭

菖蒲

一兩

赤小豆

半兩

右件藥搗篩為散

方良徐氏胎產方

吹咀

胎

每服三錢

胎產方

水壹中

盞煎至六分

去滓

食前溫

服

治婦人風虛與鬼交通悲思喜怒心神不定
別離散方

楊柳上寄生

一兩

白朮

一兩

桂心

半兩

茵芋

半兩

雄

半兩

炮裂

薊根

半兩

菖蒲

半兩

九刺辛

半兩

附子 半兩炮裂 去皮臍 乾薑 半兩炮裂到

右件藥搗細羅為散每服食前以温酒調下壹錢

治婦人風虛與鬼交通悲笑無恒言語錯亂心神恍惚睡卧不安朱砂散方

朱砂 一兩細研 水飛過 鐵粉 一兩 牛黃 一分 虎睛 壹對

黃雄黃 半兩 龍角 半兩 蛇蛻皮 壹尺 麝香 一分

右件藥同研令極細每服不計時候以桃符煎湯調下壹錢

治婦人與鬼氣交通桃人丸方

桃人 二分湯浸去皮尖 麝香 半兩 朱砂 三分

細水銀 一分用棗肉 檳榔 三分 阿魏 半兩麩

為度沉香 兩半 當歸 三分

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

丸如梧桐子大每日空心桃人湯下十九

婦人大全良方同

治婦人與鬼交通殺鬼雄黃丸方

雄黃 一兩 丹砂 一兩 雌黃 一兩 羚羊角屑

蕪荑 虎頭骨 菖蒲 鬼臼 鬼箭

白頭翁 石長生 蒼朮 馬懸蹄 猪

糞 已上各半兩

右件藥生用搗細羅為末以羊脂蜜臘和搗為丸如彈子大每服壹丸當患人戶前燒之

又方 婦人大全良方名辟瘟丹 虎頭骨一兩 朱

砂一兩 雄黃壹兩 雌黃一兩 鬼臼一兩 皂莢

一兩 鬼箭一兩 蕪荑兩 藜蘆兩

右件藥生用搗細羅為末鍊蜜和搗為丸

如彈子人以絳囊盛壹丸繫臂上男左女

右及取壹丸當患人戶前燒之 良方胎產方當病人

戶前燒之一切邪鬼不敢近

又方松脂二兩 雄黃二兩 細研○

右件藥先鎔松脂乃內雄黃末以虎瓜攪

令相得丸如雞頭實大夜卧燒壹丸○直

指方右二味先烱松脂乃內雄黃末以虎

瓜攪令相得藥成取如鷄子中黃夜臥以

著燻籠中燒令病人取自昇其上以被自
覆惟出頭勿令過熱及令氣得泄也
大全本草

支太醫方治婦人百病諸虛不足當歸四兩
地黃二兩爲末蜜和丸如梧子大食前米
飲下十五丸

海藥方婦人夜夢鬼交以臭黃合爲丸燒熏
丹穴永斷又主男子遺精暖腎辟惡氣
婦人夢與鬼交者鹿角末三脂一最和清酒

服卽出鬼精

圖經曰療婦人血氣并五勞七傷半天回雞
翁藤野蘭根崖椶等四味洗淨去麤皮焙
乾等分壽羅爲末温酒調服二錢匕婦人
服忌羊血雞魚濕麵丈夫服無所忌
是齊醫方

不換金元治婦人諸虛不足心腹疼痛

當歸 沒藥

懸胡索

川芎

藁本

人參 白茯苓

牡丹皮

甘草

白芍

藥 白朮 熟乾地黄 白芷 白薇 等

產寶方有桂心又無地黄

右為細末煉蜜為元如彈子大每服壹元

酒送下

正經湯

熟乾地黄 兩半 人參 桂心 半 夏 湯洗七次 白

芍藥 牡丹皮 阿膠 麥門冬 當歸

各二錢半 吳茱萸 湯洗七次二錢

右為麤末每服三錢水壹中盞生薑五片

煎至七分溫經湯有川芎甘草無熟乾地

黃

十柔元補治婦人血氣 蔣簽 判傳

熟乾地黄 兩四 當歸 兩二 桂 菴蓉 酒浸無以鹿背代之

紫苑 補骨脂 鹿角膠 炒 栢子仁 熟

艾 別碾酒 浸熬膏 白茯苓 各二兩

右為細末艾膏為元如梧桐子大每服七

八十元溫酒或米飲湯下

補氣固血治本藏因虛生寒月經行多或來

類聚

十九

不及期腹痛怯風臟腑不和茱萸鹿茸元

吳茱萸半兩湯洗三次鹿茸壹兩削去皮毛熟乾

地黃一兩五味子一兩菴蓉一兩酒浸壹宿杜仲一兩

剉碎酒酒半兩附子半兩炮裂乾姜半兩肉荳

炒絲斷半兩白茯苓半兩赤石脂一兩州土黑

龍骨半兩炭火三斤燒通赤經宿研水飛過

右為細末酒煮麪糊元如梧桐子大空心

食前熱米飲服五十元至七十元一兩月

後血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常

服母氏中年之後甚得此藥之力

朱氏集驗方

薤白湯治婦人血虛勞倦

鹿角膠當歸待效方黃耆得效方肉桂

乾地黄得效方石斛木香白朮白

茯苓龍甲醋炙秦艽川巴戟柑子皮

各書牡丹皮天仙藤甘草各半人參

二枳殼錢三

右咬咀每服三錢水一盞半生姜九片薤

白三寸煎七分去滓空心服

婦人大全良方

婦人血風勞氣方

鼈甲元治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經
脉不利飲食無味漸加虛困○永類鈴方治
血風勞氣身體疼痛頭目昏澁心忪煩倦寒
熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿月水不調臍腹
疝痛疝癰硬嘔逆阻食或因產失理淹延
著床

鼈甲

紫苑

桂心

川芎

防風

川

牛膝

當歸

秦艽

人參

桃人

琥

珀

麝香

黃耆

赤芍藥

蟲蟲

製

水蛭

鬼箭羽

白朮

羌活

熟乾

地黃

右為細末煉蜜負如梧桐子大食前温酒

吞下三十元

琥珀元治血風虛勞上熱下冷或發動即心

中煩燥困乏無力不美飲食醋心口瘡月水

中煩燥困乏無力不美飲食醋心口瘡月水

不調肌肉黃痺腹痛腸鳴或有氣塊攻衝或
時作寒熱頭旋痰逆手足麻痺大宜常服
博出

琥珀 當歸 木香 川芎 防風 檳

榔 各肆 三稜 炮 乾薑 炮 桂心 各五 吳白朮

洗柴胡 人參 各二 青皮 吳茱萸 洗泡

全蝎 炒 附子 炮 草薺 薺 赤芍藥 栝葉

白芷 各三 桃仁 去皮 敗龜 醋 鼈甲 各陸 天

麻 分三

右爲細末煉蜜元如梧桐子大每日空心
酒下二十元午前近晚更進一服如覺暖
近晚不須服如腹內塊積攻築於鼈甲桃
仁檳榔三稜各加壹倍爲妙忌生冷葱薑
菜毒魚等物

治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃痺多困

減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼香甲散

承類鈴方治證與上鼈甲散同又云風虛勞冷宜服

木香 乾薑 各三 鼈甲 醋炙 牡丹皮 赤

芍藥

橘紅

鈔方淨

桂心

人參

茯苓

熟地黃

秦艽

柴胡

白朮

炒當歸

炒

附子

炮去皮各一兩甘草兩半

右為粗末每服貳錢水一錢生薑三片棗二枚煎至七分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅壹兩同杵為末

地黃煎治婦人血風勞心忪發熱不退

出經方

生乾地黃

熟地黃

右貳味等分為細末用生薑自然汁入水

相和打糊為元如梧桐子大每服叁拾元用地黃湯下或只茶酒醋湯下亦可食後日叁服覺臟腑虛冷早間永類鈔方先服早間空心八味負壹服不可謂地黃性冷沮却壤脾大槩陰虛則發熱蓋地黃大能補陰精血也

荆芥散治血風諸般疾產後並宜服食久服諸疾除去

荆芥

雀腦

芎各三兩

當歸

人參

各三兩

桂

心 牡丹皮 羌活 防風 苦梗 大

腹于 甘草 蒲黃 白茯苓 枳殼

厚朴 半夏 杏仁 款冬花 各半兩 附子

炮乾地黄 龍甲 白芍藥 北柴胡

黃耆 各一兩 乾薑 木香 各半分 沉香 壹分

右為細末每服貳錢薑三片棗壹枚水壹

錢煎至七分溫服

荆芥煮散治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤
口乾背甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進

退血經不調多驚盜汗胃膈不快但是風勞
氣冷並皆治之

荆芥穗 肆 北柴胡 秦艽 白芷 黃耆

各貳兩 當歸 莪茂 川芎 麥門冬 白

茯苓 人參 白芍藥 沉香 海桐皮

枳殼 熟地黄 甘草 酸棗仁 木香

檳榔 各壹兩 鼈甲 製 白豆蔻 桂心 苦梗

各貳兩

右為細末每服貳錢薑錢三片烏梅壹箇

煎至七分無時溫服如極虛去檳榔每日
兩服臨臥服尤佳忌生冷動風甜物膈有
顆塊服之便消

如聖散治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易
胃疾傷月水不調久而心虛狀若心勞四肢
易倦筋骨少力盜汗易驚或時不寧五心煩
熱肌膚不長間作頭昏飲食無味胃膈不利
或產前產後受病並可服之

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黃 人

參 當歸 各乙 鼈甲 胡黃連 沉香

知母 各半 桑寄生 乾葛 各三

右爲細末每服二錢水青瑣烏梅壹个棗

二枚麥門冬數粒煎至八分無時候 承類

同

乞力伽散治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱

羸瘦不能飲食

白朮 白茯苓 白芍藥 各乙 甘草 半

右爲細末薑棗煎四錢服

油煎散治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食日三服

川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂

心 牡丹皮 陳橘皮 永類方淨 白芍藥

川芎 當歸 烏藥 白芷 莪茂 等分

右為末每服二錢水二盞入生麻油三四

點煎至七分溫服無時候 鈐方同

大効油煎散治血風勞氣攻痺四肢腰背疼痛嘔逆醋心不思飲食口漸羸瘦面色萎黃

手足麻痺血海冷敗服此神効

五加皮 川烏 炮 芍藥 海桐皮 牡丹

皮 各乙 桂心 乾薑 川芎 各半

右為細末每服二錢水盞蓋油浸二錢壹文

同煎至六分溫服常服以油浸二錢煎藥

時不可攪喫藥時不可吹 永類方同

局方亦有油煎散 方見通治 四白散子亦妙 方見脚氣

治血風勞方 牡丹皮 地骨皮 防風 甘草 黑豆

白芷 白芍藥 各乙 荆芥穗 二 川芎 乙

右為細末每服二錢水壹錢薑三片棗壹

箇葱白壹寸煎至八分溫服無時候

香甲散治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼

痛飲食無味肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈虛

煩此藥久服駐顏其妙不可具述

龍甲 三兩醋浸去裙炙黃 當歸 木香

人參 羌活 川芎 沉香 肉豆蔻

酸棗仁 附子 檳榔 大腹子 各半 北

柴胡 兩 厚朴 川牛膝 白茯苓 秦艽

各乙 桂心 兩

右以咀每服五錢水壹盞生薑叁片烏梅

壹个煎至八分去滓溫服日三服空心忌

生冷麪食雞肉鮮醬之類

馬鞭草散治血風攻透肢體疼痛或覺癢痒

或覺痺麻作寒作熱飲食減味並皆治之

出專治

馬鞭草 去粗 荆芥穗 北柴胡 烏梅肉

各三枳殼 白芷永類鈐方白朮 羌活 白芍藥
 兩各乙 秦艽 天台烏藥 麻黃各半兩 木香
 兩半當歸 川烏炮 甘草各乙兩
 右爲細末每服貳錢水壹盞生薑貳片棗
 壹枚葱白貳寸煎至七分日午臨卧溫服
 常服無忌有莫孕服

治婦人冷勞方

大香甲元散治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃
 瘦飲食進退經候不調心腹多脹漸變如勞

補血海調氣

鼈甲醋炙膏兩 沉香 柴胡 人參 川芎
 羌活 當歸 附子炮去皮 木香 安息香
 桔梗 茯苓 藿香葉 陳橘皮 牡丹
 皮 三稜 厚朴姜汁炙 桂心 桃仁去尖炒
 牛膝去苗各兩 檳榔 和皮大腹子各壹兩
 右爲細末每服二錢水壹盞生薑烏梅各
 少許煎至八分溫服餘壹半更加乾漆炒
 分阿魏牛分 赤芍藥壹兩 同爲末煉蜜元如梧

桐子人空心煎烏梅地黃湯下二三十元
與散子相問服博濟方

婦人熱勞方

秦芫散治血經有熱月脉凝滯五心煩倦出婦

人經驗方

麥門冬 秦芫各乙 生地黃 當歸各半

地骨皮 鬱金 蘇木各乙

右爲細末每服壹錢半水壹盞紅花少許
同煎至七分温服若經脉調不用紅花忌

酒與熟物此方可服壹年永類鈔方同

婦人寒熱方

生地黃散治婦人血風不調或時寒熱體痛

不不思飲食

生乾地黃 北柴胡各一兩 羌活 木香

桂心 防風各半兩 酸棗仁 羚羊角屑

白芍藥 白朮 黃耆 川牛膝 白茯苓

芩朮當歸 枳殼各三兩

右咬咀每服叁錢水壹盞薑三片煎至七

分去滓溫服空心

荆芥散療時氣風濕寒熱瘴瘧往來潮熱並

宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荆芥

穗 厚朴 各二兩 草果仁 三箇 川白芷 桂心

各半兩

右咬咀每服貳錢水壹大盞薑叁片棗兩

枚煎至七分去滓溫服無時候 永類鈔方同

寡婦寒熱如瘧方論

寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄

略而論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也

如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可

得是以慙慙成病也易曰天地絪縕萬物化

醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既

虛閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍

熱有類瘧疾久則為勞又有經閉白淫痰逆

頭風膈氣痞悶面黧瘦瘠等證皆寡婦之病

診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際寃其脉

原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室
女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣
生地黄元許學士云有一師尼患惡風體倦
乍寒乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大
行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進
數日病劇予診視之曰三部無寒邪脈但厥
陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製
此方治之愈

北柴胡

秦艽

黃芩

各半兩

生地黄

二兩
赤

芍藥

一兩

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大烏梅煎
湯下叁十元無時候日叁服永類考許學
士云嘗讀史記倉公傳載齊北王侍人韓
女病腰背痛乍寒乍熱衆醫皆以爲寒熱
病也倉公曰病得之欲男子而不可得也
何以知欲男子而不可得診其脈肝脈弦
出寸口是以知之又有婦人熱入血室寒
熱如瘧一證在傷寒論

婦人夢與鬼交方

辟瘟丹方見聖惠方 太乙神精丹蘇合香元皆可

川也

御藥院方

萬病丸治婦人久虛血氣衰少怠墮嗜臥飲食不進精神不足

熟乾地黄 當歸各四兩

右為細末蜜麩糊和丸如梧桐子大每服五十九丸温粥飲送下空心食前

得効方

血虛

加味補虛湯治頭痛發熱多汗六脉虛細尺脉或絕作血虛治之服後藥見效术附湯加川芎

先服方見大方科諸濕門十全大補湯加附子次服

大方科諸虛門又服萬安圓大方科諸虛門神术散大方科傷寒內補圓芎歸湯方見通治

靈砂丹有婦人頭痛惡風發熱六脉沉取無

根淨取却有乃是虛證右用人參壹二兩
銀銚煎湯空心下二十粒五更又下二十

粒天明而愈方見大方
科瘡冷門

桂香散治脾胃虛弱并脾血久冷

草豆蔻去殼
炒用 甘草 高良薑剉炒
香熟 白朮

縮砂仁各一
兩 青皮去穢
炒黃 訶子肉各半
兩 肉桂

青生薑切炒
乾 厚朴去麤皮
姜汁炒 棗肉切三味各
膏兩水壹

柿者令乾同
杵為團煇乾

右為末每服二錢入塩少許沸湯點空心

服及療腹痛又治冷瀉尤妙腹痛最難得
藥此方只是溫補藥耳特工止痛理不可

知

煩熱

清心蓮子飲方見大方
科瘡渴門

春雪膏涼心退煩悶熱極壅盛

寒水石 石膏 滑石 赭石 朴消各
五

甘草三
錢

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏治心臟驚熱至其不省人事

朱砂 鵬砂 燄消 各二錢半 金銀箔 各五片 寒

水石 五錢 腦子 一字 石膏 五分 粉草 三分

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎

湯調下

敗毒散治但惡寒發熱煩燥緣表中寒邪故

也服之立効 方見大方科傷寒門

澹寮方

雙和湯治男子婦人五勞六極七情心腎虛

精血少形骸枯頽九心煩熱虛汗盜汗遺切

虛勞不可服燥藥者多宜之婦人血勞經病

勞損等證尤有神效

白芍藥 七兩 黃芪 去蘆蜜炙 當歸 洗去熟地

黃酒蒸 土川 芩 去蘆各三兩 甘草 炙 肉桂 去粗皮不

見火二兩二分半

右件十味壹處搗羅為麤散每服二錢水

壹盞半生薑三片棗子壹枚同煎空心食

前服之忌生冷等物

茯苓補心湯治婦人虛勞發熱或五心熱煩
 下血過多致發虛熱用心過度發熱及往
 來寒熱易簡方云既雜以四物湯須穀氣
 素壯者乃可服之右以四物湯壹兩半王
 微義一參蘇飲醫方集成參兩微義和停
 錢半參蘇湯川生薑五片煎至八分溫服南北經
 驗方同

醫方集成

楊氏家藏方補宮圓治婦人諸虛不足久不
 妊娠骨熱形瘦崩中帶下並宜服之

鹿角霜 白朮 白茯苓 香白芷 白

薇 牡蠣煨 山藥 白芍藥 烏賊魚骨

各等分

右為末麴糊丸如梧桐子每服五十九米

飲空心送下南北經驗方

徐氏胎產方

衛生湯治婦人女子虛弱月事不來

白芍藥 當歸各二兩 黃耆三兩 甘草壹兩 人參

兩唐 蘇木神 細辛正 鱗水煎 熟地煎

右為粗末每服五錢水煎空心服

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

神效藥方 補腦汁 補腎汁 補心汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁 補脾汁 補肺汁 補肝汁 補膽汁 補胃汁

勞瘵

目錄

論

聖惠方

治婦人骨蒸勞瘵方

人參散 天靈蓋散 青蒿散 柴胡散

赤茯苓散 益母草煎丸 獺肝丸 黃

耆丸 煞鬼丸 鼈甲丸

婦人大全良方

神仙秘法 鷄蘇圓 防風湯 溫金散

四滿圓 桔梗子湯 瓜樓根 子苓散

含化丸 河車圓 補肺湯 四君子湯

養正膏 猪肚元

婦人骨蒸勞方

鼈甲煎 麥煎散 筒骨煎 大靈明月

丹 明月丹 地黃煎元 石膏散 青

蒿散 青蒿鱉甲煎元 逍遙散 枳殼

散

脩月魯般經後錄

金花散

宣明論

枳實飲子 當歸木香湯

擔軒方

勞熱

骨蒸熱

拔粹方

蒸病

犀角散 黃耆散 地骨皮散 柴胡散

荆芥散 清金湯 橘皮湯 四七湯
千緡湯

醫林方

八煎散

追癆方

射香散 桃仁散 天竺苗飲子

餘藥無名者散見本方

勞瘵

婦人大全良方

勞瘵敘論

夫骨蒸殭殍復連尸疰勞疰虫疰毒疰熱疰
冷疰食疰鬼疰等皆曰傳尸以疰者注也病
自上注下與前人相似故曰疰其變有二十
二種或三十六種或九十九種太略令人寒
熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聾或腹
中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或

聚或散沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死死後乃疰易傍人乃至滅門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸注等謂之五尸及大小附著等證不知其所苦無處不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攻之內非七情所忤外非四氣所襲雖若麗乎不內外因奈其證多端傳變遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得壹所謂獨骨癩

肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見効唯膏肓俞崔民穴名四花有六穴若聞早灸之可否幾半晚亦不濟也 病者憎寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐懼不能獨卧其傳在肝 病者增寒發熱而黑鼻燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心 病者憎寒發熱而青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢羸瘦吐涎沫其傳在脾 病者增寒發熱而赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘急時吐

白涎或有血線其傳在肺 病者增寒發熱
面黃耳輪焦枯脗骨痠痛小便白濁遺瀝曾
痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折
髮焦肌膚甲錯其蒸在皮 外人覺熱自反
惡寒身振矐劇其蒸在內 髮焦鼻衄或復
尿血其蒸在肉血 身熱煩躁痛如針刺其
蒸在脉爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在筋

版齒黑燥大杼酸疼其蒸在骨 背脊疼痛
脗骨酸癢其蒸在髓 頭眩熱悶口吐濁涎
眼多眵淚其蒸在腦 男子失精女子白淫
其蒸在玉房 乍寒乍熱中脘與臏中煩悶
其蒸在三焦 小便赤黃凝濁如膏其蒸在
膀胱傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在
小腸 大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸
口鼻乾燥腹脹睡臥不安白汗出其蒸在胃
口苦耳聾脇下痛其蒸在膽 裏急後重肛

門澁祕其蒸在回腸 小腹疝痛筋脉縱緩
陰器自強其蒸在宗筋 眼昏淚下時復眩
暈躁怒不常其蒸在肝 舌焦黑氣短煩悶
洒洒淅淅其蒸在心 唇乾口瘡胃腹脹悶
畏寒不食其蒸在脾 咳嗽喘滿咯痰吐血
聲嘶音遠其蒸在肺 耳輪焦枯脚氣酸疼起
居不得其蒸在腎 情想不寧無故泄精白
物絲絲而下其蒸在右腎 心主胞絡心膈
噎塞攻擊疼痛俛仰煩寃其蒸在鬲諸證雖

曰不同其根多有虫嚙其心肺治之不可不
絕其根也

聖惠方

治婦人骨蒸勞諸方

夫骨蒸者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦
曰傳屍亦謂殍殍亦稱復連亦名無辜丈夫
以痲癖爲根婦人以血氣爲本無問少長多
染此疾內既傷於臟腑外則損於肌膚日久
不痊遂致羸瘦因服冷藥過處則傷於脾胃

氣既衰而傳五藏脾初受病或脹或妨遂加
 洩痢肌肉瘦瘠轉增萎黃四肢無力食飲少
 味脚既受已次傳於腎腎既受病時時盜汗
 腰膝冷疼夢鬼交侵小便黃赤腎既受已次
 傳於心心既受病往往忪悸或喜或瞋兩頰
 常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受
 已次傳於肺肺既受病胃滿短氣欬嗽多唾
 皮膚甲錯狀如髮片肺既受已次傳於肝肝
 既受病兩目昏暗脇下妨痛不欲見人常懷

忿怒五藏既病漸加羸瘦卽難療也
 治婦人骨蒸勞身體壯熱手臂疼痛月水不
 通日漸瘦瘵兩脇氣刺四肢羸弱腹內塊生
 時有欬嗽不欲飲食人參散

人參參兩去 龍甲三兩塗醋炙 羚羊角屑
 二赤茯苓二兩 知母壹兩 柴胡三兩 地骨皮
 二枳殼二兩微炒去瓢 牛膝二兩 赤芍藥壹兩
 乾地黄壹兩 牡丹半 川大黃一兩剉碎
 部二知母三兩微黃 黃芩三兩 葶藶根一兩 當歸

三挑人一兩湯浸去皮尖草荳蔻一兩安

息香兩川朴消三分甘草三分炙紫苑一兩洗去

苗麥門冬一兩半天門冬一兩半天靈蓋

酥炙令黃

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中

盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食

前溫服

治婦人骨蒸氣勞四肢無力每至晚間即熱

兩頰紅色食飲不下心神煩躁天靈蓋散方

天靈蓋一兩塗酥鼈甲二兩塗醋炙令黃

全良方柴胡壹兩半安息香一兩當歸一兩地

骨皮壹兩半梔子一兩人參壹兩去赤

茯苓壹兩貝母一兩良方去心黃桃人湯浸

去皮尖雙人麥門冬壹兩半阿魏一錢麩

麩炒微黃黃連壹兩生乾地黃一兩檳榔一兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以童子小

便壹大盞入桃枝柳枝各七寸生薑半分

良方薑葱白五寸煎至五分良方去滓不

計時候温服

治婦人骨蒸勞熱四肢煩疼日漸羸瘦青蒿散方

青蒿二兩龍膽三分去蘆頭 梔子人分知母三分 黃

連去鬚 鼈甲二兩塗醋炙 黃耆一兩 桑根

白皮壹兩 地骨皮兩 白朮兩 甘草半兩炙

柴胡一兩半

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水壹中
盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候

温服

治婦人骨蒸勞熱欬嗽胃膈痰壅腹脇妨悶
不欲飲食柴胡散方

柴胡一兩半 半夏半兩湯洗 川大黃三分剉

枳殼三分 麩炒百合一兩 桑根白皮一兩 麥

門冬一兩 赤茯苓兩 秦艽三分 紫苑三分

苗黃芩三分 赤芍藥三分 甘草半兩炙 鼈甲兩

塗醋炙令 知母三分 木通三分

右件藥搗麤羅爲散每服三錢以水壹中

蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候
溫服

治婦人骨蒸及血勞等疾面色黃瘦四肢無力煩疼痰壅涕唾稠粘不思飲食赤茯苓散方

赤茯苓一兩 鼈甲二兩 塗醋炙 柴胡一兩 麥
門冬一兩 人參三兩 蘆頭 去 桃人三分 湯浸去
炒微 木香三分 白朮三分 桂心兩 川大黃兩 剉碎
微 蘧麥三分 赤芍藥三分 當歸三分 半夏三分 湯
炒 蘧麥七分 湯

去甘草半兩 炙
滑 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水壹中
蓋入生薑半分煎至六分去滓不計時候

溫服

治婦人骨蒸勞瘦月候不通心神煩熱四肢
疼痛不能飲食益母草煎丸方

益母草二斤 青蒿二斤 桃枝一握 長柳枝一握
尺

已上四味細剉用童子小便壹斗於銀

鍋中煎至三升絞去滓煎成膏

柴胡三兩去苗朱砂壹兩細研天靈蓋壹兩塗醋

微令黃鼈甲二兩塗醋炙木香一兩赤芍藥二兩

角屑二兩甘草壹兩炙麝香半兩挑人五兩

去皮尖雙人生研如膏

右件藥搗羅為末川益母草煎都和搗五

七百杵丸如梧桐子大每服不計時候用

烏梅甘草煎湯下三十九

治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食獼肝

丸方

獼肝壹具柴胡一兩半知母一兩也骨皮一兩

梔子一兩犀角屑一兩天靈蓋壹兩塗醋黃

耆三分鼈甲壹兩半塗醋炙川升麻一兩桃

人一兩湯浸去皮尖甘草半兩炙朱砂一兩

細研水麝香壹分

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫水下三

十九婦人大全

治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁
不得睡卧黃耆丸方

黃耆到一兩 麥門冬心焙一兩去人參三分去黃

芩三分枸杞子三分茯神一兩百合半兩枳殼半兩

微黃去秦艽半兩去苗○婦無酸棗仁三分柴

胡一兩赤芍藥半兩知母半兩龍甲二兩塗醋

襍杏人雙三分湯浸去皮尖甘草半兩炙微

兩方壹生乾地黄一兩郁李仁三分湯浸

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以清粥飲下
三十九

治婦人骨蒸傳屍勞瘦鬼氣伏連煞鬼丸方

麝香三分犀角屑一兩木香一兩白朮一兩虎頭

骨一兩半塗光明砂一兩半雄黃壹兩半

天靈蓋壹兩半塗醋炙微黃○鬼箭羽壹

○良方桃人尖一兩半湯浸去皮

右件藥擣羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

擣三五百杵丸如梧桐子大食前以溫水

下二十九此藥辟溫疫亦可帶之

治婦人骨蒸勞月水不通脇下痞癖往往腹

通鼈甲丸方

鼈甲二兩塗醋炙土瓜根一兩桂心一兩京三

稜一兩牡丹一兩牛膝一兩川大黃一兩碎微炒訶

梨勒皮一兩琥珀一兩桃人二兩湯浸去皮

黃一兩雙人一兩麩炒微

右件藥搗羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大不計時候以桃仁湯下三十

凡

婦人大全良方

神仙秘法取傳舜勞虫服此藥須先擇良日

焚香禱祝令病人設榻面向福德方服即有

神效不可使病人知其藥味及子細

青桑皮 楊柳枝 梅枝 桃枝已上要

者各葱白七青蒿一握如無真安息香一

石 阿魏一分

右八味除阿魏外用童子小便壹升半煮

取藥耗及壹半去滓將藥汁化阿魏再煮
十數沸去滓候溫作二次調下件藥末
朱砂兩半小檳榔兩半麝香半
右叁味研令極細分爲二服用前湯使調
下五更初壹服三點再壹服辰時開取下
虫遂絕根本若見虫色白者此病必差若
黑色則已傳入腎經不可救也服藥後只
以炎粥補之並不動元氣効驗無比切須
祕之世傳勞虫有靈輕易傳之則傷醫者

此說殆醫者祕惜其方不可以授人耳要
須密重之則無洩慢天機乃起死還生功
同造化鬼神護助自有靈效大凡傳屍勞
者必須先服此壹藥後拾五方隨證治不
可以槩用藥調治三五箇月再服此取虫
藥則永除根本如取下虫色已黑縱服後
藥亦無補也然則能使不傳它入
治心胃積氣作胃痺引兩脇痛昏悶不收音
聲不清虛熱上壅作鼻衄方

桑白皮分三枳殼 木通 子芩 生乾地

黃 白芍藥 甘草各半兩

右為粗末每服三文重水棧半煎至七分

去滓溫服食後方同永類鈔

治伏痰血在心肺時作衄心胃徹背痛方

白芍藥 牡丹皮各壹兩 生犀屑半兩 生地黃

三兩別搗碎入

右咬咀每服半兩水壹大棧煎至七分去

滓溫服方同永類鈔

調榮衛消痰血出聲音治痰嗽消痰血方

川當歸 牡丹皮 白芍藥 子芩 木

通 麥門冬 甘草 華陰細辛各半兩 生

乾地黃兩

右咬咀每服三錢水壹棧薑三片煎至七

分去滓溫服方同永類鈔

血 雞蘇圓治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄

血

雞蘇葉半斤 黃耆半兩 乙兩 甘草 川芎各一

分○拔粹方各半兩防風一兩苦梗半兩荆芥穗一兩甘菊一分真腦子半錢生乾地黄兩半

存為細末煉蜜圓如彈子大每服壹圓用

麥門冬去心煎湯嚼下又治肺損吐血日

漸乏力瘦弱行步不得喘嗽痰涎飲食不

美或發寒熱小便赤澁加車前子壹分拔粹

方三錢每服壹圓煎桑枝湯嚼下永類鈔方同

可六七服桑枝剉炒香每用水三錢煎至

壹錢去滓下藥

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血

榮衛損也宜防風湯方

黃耆兩白芍藥兩防風各三分甘草半兩當歸兩

生乾地黄各三分

右咬咀每服三錢水壹錢薑三片煎壹筒

煎至七分去滓溫服食前服永類鈔方同

溫金散治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防風各壹兩杏仁

二十七粒製人參去蘆茯苓各半兩麥門冬一分

以前五味用米泔浸壹宿曬乾次入人參
 茯苓麥門冬叁味同為細末每服二錢拔
 方三水壹瓊蠟壹豆大煎至八分食後温
 服永類鈐方同

四滿圓治勞嗽極妙方見

桔梗飲子治心氣不足解勞倦益血

苦梗 甘草 黃耆 人參去蘆 麥門冬 各

兩 青皮半兩

右為末每服二錢水壹瓊煎至七分温服

瓜樓湯治胃痺

枳殼四 厚朴 薤白各一兩 瓜樓介 桂枝兩一

有熱除此壹味

右改阻水七升煎取四升去滓温服永類鈐方

同

干苓散凉心肺解勞除熱使榮衛順血不絕

黃耆兩一 白芍藥 干苓 人參 白茯苓

麥門冬 苦梗 生乾地黄各半兩

右為粗末先用竹葉壹握小麥七十粒水

三瓊薑三片煎至水壹錢半入藥末三錢

重煎至七分去滓溫服拔粹方乘 類鈔方同

治積氣堅硬作氣噎胃脅引背痛方

白芍藥一兩 龍甲醃炙 枳殼大炒 北柴胡各

兩 甘草 赤茯苓各半

右咬咀每服三錢水壹大盞薑三片棗壹

个煎至七分去滓溫服永類鈔 方同

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胃作痺

痛引脇背痛腕膈滿悶方

鬼臼 天門冬去心各 巴豆 莽草 不

蛀皂角醋炙各 藁子雄黃一

右為細末煉蜜為丸如小豆大每服壹丸

漸加至三十丸空心湯水吞下臨卧壹服

常宜斟酌勿令泄瀉忌鯉魚山猪蘆笋

出聲音方

訶子炮去核 木通各一 甘草半

右咬咀用水三升煎至升半入生地黃汁

壹合再煎數沸放溫分六服食後日作半

料永類鈴

治咽喉痛方

百藥煎去皮 黑鵬砂 甘草 生白朮分

右四味為細末每服壹錢食後米飲調細

細呷嚥下永類鈴

治肺間邪氣胃中積血為痛失音含化丸方

蛤蚧壹隻去口足炙 訶子去核 阿膠炒 麥門冬去心

細辛 甘草 生乾地黃各半

右為細末煉蜜為丸如鷄頭子大食後含

化壹圓 己上諸方辰州李仲各仲 錄示

云傳之於五羊大帥方侍郎上務

河車圓治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸等疾治

勞瘵得効方

河車一枚初生男子者尤良於長流水中湯洗

摩成小片焙乾須在壹日內便碾成末纔

經宿即不乾碾不成未矣按本草云人肉

治瘵病胞衣飄生者尤佳主血氣羸瘦婦

人勞損面黧皮黑腹內諸疾漸漸瘦悴者

以五味和之加鮓餌法與服之勿令病者

藥服 雪白茯苓半兩 揀參兩 乾山藥一兩 類鈞方二

右為細末 麴糊為負 如梧桐子大 以少麴香末為衣 每服三五元米 飲溫酒 搥湯送下 空心服 嗽甚者 五味子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧一雙全者酒浸一宿酥炙 知母 貝母去心 人參去蘆

甘草 杏人去皮尖 枇杷葉去毛 鹿角膠

炒粉

右各壹兩 依方事 治淨 秤為末 每服三錢 水一瓊 入桑白皮煎至八分 溫服 日三夜 二承類鈞方同

補肺湯治勞嗽

桑白皮 熟地黃各二兩 承類 人參去蘆

紫苑 黃耆 川五味子各一兩

右為細末 每服三錢 水壹瓊 煎至七分 入蜜少許 食後溫服

四君子湯 又壹方 加秦艽 黃蠟 煎服 尤妙 辰

陽李倅云已上藥方乃趙世則傲之次子
公璵並服此乃安傳之仲弟屢救人甚驗
服藥止可食淡煮猪蹄肉仍須先煮熟肉
去元汁再以白湯熟煮仍忌房勞一切生
冷魚腥鹹毒醃臧等物無不痊愈修合藥
及煎藥時忌生人孝子婦人雞犬猫畜見
仍勿令病人知用藥味大有功效永類鈔方同

養正膏治傳尸出汗取虫辟邪

鼈甲一兩青蒿一兩淡鼓三七葱白兩安息

香壹分桃柳桑枝各七桃仁四十九分去

天靈蓋用七頭大壹片酥炙

右十味隔夜以水壹升浸至五更煎至半
升再以童便半升同煎取四合又用檳榔
壹箇為末麝香壹錢上將所煎藥去滓調
下至日高二丈時放溫頓服以衣覆出汗
審看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後
仍瀉下虫狀惡物盡甚者旬日再服永効
猪肚元治骨蒸勞辰頰赤氣粗口乾遍身壯

熟或多虛汗大腸澁祕小便赤黃飲食全少
出博濟方

青蒿 鼈甲醋炙 北柴胡 木香 生乾地

黃各壹兩 青皮兩半 宣黃連貳兩

右為末以猪肚壹箇洗淨入藥在內繫定
蒸令極軟研如泥為丸如菜豆大湯下十
五元空心日三服忌濕麪毒物永類鈴方同

婦人骨蒸勞方

鼈甲煎治勞見專治婦人方

雄鼈乙介重乙斤各 杏仁去皮尖 北柴胡 貝母

去心知母各四兩

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內
將活鼈在中以藥和停圍定上用板子石
厭定令鼈在藥內喫酒藥候來日却以慢
火煮候酒盡為度却取鼈令患人喫盡次
將鼈甲用醋炙黃入在前頂諸藥內焙乾
為細末用酒煮麪糊元如梧桐子大用米
飲吞下三十元無時候日五服

麥煎散治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃煩壅

赤茯苓 當歸 乾漆生○袖珍 力炒烟盡 鼈甲醋炙

常山 大黃煨 北柴胡 白朮 生乾地

黃 石膏各乙 甘草兩半

右為細末每服二錢拔粉力 水壹錢小麥三錢

五十粒煎至六分食後臨卧時溫服袖珍方右

吹咀每服一兩水二盞小麥煎至壹錢去渣溫服食前 有虛汗加麻

黃根壹兩蘇東坡云此黃州吳判官方療

骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極效麥煎散甚

多此方吳君寶之如希世之珍其效可知

永類鈔方同

筒骨煎治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心

煩喘嗽唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胃滿

氣促夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱壹切五

勞七傷骨蒸等候並皆療治許元林先生方

地骨皮 粉草 比柴胡 前胡 烏藥

麻蒿不去節 乾葛 青蒿 苦梗 知母

天仙藤 北黃芩各乙兩炒 人參 生乾地黃

秦艽 鱉甲 黃耆各半兩

右咬咀每服三錢水壹瓊酒壹分猪筒骨

壹莖炙焦分爲四服桃柳枝各七寸杏人

五粒去皮尖槌碎煎至七分去滓溫服加

烏梅半箇尤妙壹方加當歸白芍藥

大靈明月丹治傳尸出華佗方

雄黃 木香各半兩 天靈蓋炙壹兩 輕粉一分 鼈

甲醋炙 兔屎二兩

右爲末用法酒壹大升大黃半兩爲末熬

膏入前藥爲員如彈子大朱砂爲衣傳尸

勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香

令烟出吸之不嗽非傳尸也不可用此藥

若煙入口咳不能禁止乃傳尸也宜用之

藥五更初服勿令人知以童便共酒壹瓊

化壹元服如人行十里仍必吐出虫狀如

燈心細長及寸或如爛瓜李又如蝦蟆狀

各不同未効次日再服以應爲度

明月丹治諸勞

兔屎四十枚 硃砂如兔屎大

右細研黃蜜元如梧桐子大以甘草半兩

碎之水浸壹宿取汁五更初下七食勿令

病人知勞藥下後頻看若有虫急打殺以

桑火油煎使焦棄急水中三日不下更服

須在月望前日服忌見喪服色衣婦人猫

犬之類後服治勞補氣藥取差沉內翰云

規藏此方數能活人江陰萬融病勞四體
如焚垂困一夜夢人腹墜一月如大盤明

爛不可正視通人心骨皆寒已而悸寤俄
頃扣關乃感怒使人遺之藥服之遂差問
其名則明月丹也始悟向之所夢大體此
等藥最治熱勞又云傷寒煩燥骨熱皆能
治療一方有
明砂等分

地黃煎元解勞生肌進食活血養心出華
佗方

生地黃汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁

升薄荷汁 鵝梨汁 各一法酒升二沙蜜升四

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡去蘆 木香 人參 茯苓 山藥

栢子仁去皮 遠志去心 枳實去殼 白朮各壹

秦艽 苦梗 並去蘆麝香半兩熱地黃焙

酒蒸四兩

右為末以前膏子和員如梧桐子大食後

甘草湯下二十員 永類鈔方同

治骨蒸寒熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢微瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中眾醫不瘥因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服之體微

涼如故

石膏散 方見靈苑方

真石膏 不以多少研令極細

右新汲水和服方寸匕取身無熱為度外

臺祕要本草同 永類鈔方同

青蒿散治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱 靈苑

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿

用童子小便浸三日曝乾為末每服二錢

烏梅壹箇煎至七分服 永類鈔方同 ○王氏集

驗方婦人室女五心熱及骨蒸熱嫩青蒿
噉乾為細末每服二錢溫酒調下病甚者
不過十數服又以治寒熱虐亦好

青蒿鼈甲煎元治骨蒸勞退熱解肌進食出博

濟方

九肋鼈甲一个北柴胡二兩甘草二兩杏仁一握

梗當歸人參地骨皮赤芍藥各一

兩胡黃連宣連各一分官桂木香各半

麝香乙字酥蜜各三兩

右十四味同為細末用青蒿壹斤童子小

便五升好酒壹升熬青蒿汁約二升已來

攙去青蒿不用入酥蜜再熬成膏冷後入

藥末搜和為元如梧桐子大每服十五真

溫酒下米飲亦得日進叁服如秋後合時

更入桃柳枝七莖此藥甚妙承類鈔方云即局方人叁

鼈甲元

逍遙散方見調經

枳殼散治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃

瘁經候不調四肢煩倦心胃滿悶狀如勞氣

承類鈴方
胃滿如瘵

枳殼去穰麩炒二兩半夏麴鈴方赤芍藥各乙柴

胡黃芩各乙

右為細末每服二錢水一錢生薑一塊擘
破棗二枚煎至八分去滓溫服候五心煩
熱及身體壯熱潮熱退方續服

脩月魯般經後錄

金花散治室女骨蒸熱勞

藿香 零陵香 廷胡索 芍藥 白芷

川芎 當歸 桂心各一錢 蓮子心 晚蠶

蛾各二錢

右為細末溫酒調下壹日二服

宜明論

枳實飲子治婦人手足煩熱夜臥多汗肌肉
黃瘁經候不調四肢煩倦心胃滿悶狀似勞
氣

枳殼二兩吳半夏一兩湯洗七次以牛黃汁
浸三日麩炒黃色用半夏

紅芍藥 柴胡各一兩 黃芩一兩

右為末每服貳錢水壹盞入生薑三片棗貳枚同煎至八分去滓溫服直候五心煩熱及身體壯熱潮熱續服桃人煎丸治月候不調阻滯不通

桃仁二兩湯浸 川大黃 川朴硝各二兩 蟲蟲

一兩炒去翅頭足

不為末用醋五升入金銀鍋內以慢火熬成膏可丸如桐子大當日晚不食夜飮溫

酒下壹丸不嚼破午際取下赤小豆汁或

似雞肝小蝦蟆衣末再服候鮮紅即住服

當歸木香湯治婦人血氣虛勞令人頭目昏

眩夾語嗜沉重舌根強硬言語蹇澁口苦不

思飲食白日閑睡夜發虛汗神思恍惚夢寢

狂面色痿黃頻發喘咳遍身疼痛骨節氣走

注四肢沉重背肌拘急發寒熱五心煩燥唇

乾多渴胃膈不利喉咽噎塞疔羸瘦弱經日

脉大為勞宜服此藥

青皮 五如皮 海桐皮 桑白皮 地

穀皮 丁香皮 陳皮 牡丹皮 棕蘭

皮已上諸藥全燒為灰末用大錢秤紅芍藥半當歸兩木

香兩

右為細末每服壹錢水壹盞入小油貳點

錢壹文同煎至七分溫服如婦人血臟臍

下冷痛似刀攪遍身腫滿室女經脈不通

用班猫半大黃壹兩炒坐貳味為末用黃狗膽

汁以溫酒調下壹錢如臍下痛止心間痰

未止不服貳味

澹軒方

勞熱

婦人勞熱作無時試乾鰻魚羹食之熱若漸

除羹有效不妨日食愈為奇

骨蒸熱

骨蒸熱之熱作無常五寸雄猪骨良剉了同

煎平胃散食前常時自安康

拔粹方

蒸病

犀角散治婦人客熱四肢煩悶疼痛

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘

草 各半 柴胡 兩一 黃耆 半一兩 麥門冬 人參

枳殼 赤茯苓 生地黄 各七錢半

右咬咀每服四錢薑三片水煎

黃耆散治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼

生乾地黄 兩一 黃耆 兩一 犀角屑 甘草 瓜

蒺藜仁 黃芩 各半 人參 茯神 各七錢半

右爲末每服三錢淡竹葉五片水煎

地骨皮散治血風氣體虛發渴寒熱

柴胡 地骨皮 桑白皮 枳殼 前胡

黃耆 各七錢半 白茯苓 五加皮 人參 甘

草 桂心 白芍藥 各半兩

右咬咀每服三錢生薑三片水煎

柴胡散治寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩

柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮 各一兩 人參

地骨皮 枳殼 製 桔梗 桑白皮 赤芍

藥 生乾地黄各七錢半 麥門冬三兩 甘草兩

右咬咀每服四錢薑三片水煎

荆芥散療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮夫白 麻黃去節 香附子 甘草各一兩 荆芥

穗 厚朴各二兩 草果仁三介 白芷 桂心各半兩

右為籠末每服四錢薑三片棗二枚水煎

清金湯治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上

氣喘急喉中涎聲胃滿氣逆坐卧不安飲食

不下

鶯粟殼 人參 粉草各半兩 陳皮 茯苓

杏仁製 明阿膠炒 五味子 桑白皮 薏

苡仁 紫蘇各一兩 加百合 貝母去心 半夏

麴欵冬花各壹兩 發水煎

右咬咀每服五錢薑三片棗二枚烏梅半

枚水煎臨卧服

橘皮湯古今錄驗方療春冬傷寒秋夏冷濕

咳嗽喉中作聲上氣不得下頭痛

陳皮 紫苑 麻黃去根 杏仁 當歸 桂

心 甘草 黃芩各等分

右咬咀每服五錢水煎

四七湯治痰涎咽喉之中上氣喘逆甚効

紫蘇葉二兩 厚朴三兩 茯苓四兩 半夏五兩

右為木每服四錢姜七片棗壹枚水煎

千縉湯治痰喘

半夏七枚 炮裂四斤 皂角去皮炙 甘草炙 生

薑如指大

右同以水壹椀煮去半頓服

醫林方

八煎散治婦人大人小兒骨蒸熱勞若在肌骨諸藥不效此藥服之神驗

葫黃連 前胡 烏梅 柴胡等

右為細末每服三錢童子小便壹盞猪膽壹个猪髓壹條菹白同煎去滓溫服

追癆方

射香散治婦人室女一切蓄熱腹內悶著骨蒸室女經脉不行瘦勞肌熱

威靈仙四兩于漆壹兩碎炒雄黃一分射分

二末
另研

右件為末再研每服壹大錢水八分蓋煎至六分空心渣溫服當有惡穢毒物下並是病根此藥頗難服可以蒸餅糊為如梧桐子大每服十五丸至二十九茶湯任下次服桃仁散

桃仁散

挑仁一兩湯泡去皮赤茯苓一兩芍藥三分

人參三分賓郎四分陳皮三分犀角一分安息香一分

壹射二錢

右細末研勻每服二錢姜五片水壹盞煎至六分早晚食前服若取下其虫頭赤便服天竺黃飲子補護心藏未取下虫亦須先服之護心

天竺黃飲子方見大見科勞瘵門

黃湯 燒禪散 青竹茹湯 當歸白朮

湯 柴胡桂枝湯 乾薑柴胡湯 海蛤散

南陽活書

柴胡桂枝湯 乾薑柴胡湯 海蛤散

婦人大全良方

婦人傷寒傷風

四物湯

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

婦人無孕傷寒

桂枝加芍藥湯 麻黃加生地黄湯 小

柴胡加葛根湯 小柴胡加牡丹皮湯 小

甘草芍藥湯 桂枝加附子紅花湯 小

柴胡加芒硝大黃湯 小柴胡加地黃湯

得效方

感冒

麻黃湯 解肌湯 人參湯 三黃圓

衛生寶鑑

類聚卷五

熱入血室證治并方

小柴胡加地黃湯

醫林方

黃芩芍藥散

傷寒

巢氏病源

傷寒候

此謂人觸冒於寒氣而成病冬時嚴寒攝衛
周密者則寒不能傷人若卒苦勞役汗出觸
冒寒氣卽發成病謂之傷寒也其輕者微咳
嗽鼻塞嗇嗇小寒噏噏微熱數日而歇重者
頭痛體疼惡寒壯熱而膏腴之人肌膚脆弱
雖不大觸冒其居處小有失宜則易傷於寒

也自有四時節內忽有暴寒傷於人成病者亦名傷寒謂之時行傷寒非觸冒所致言此時通行此氣故為時行也

時氣候

此謂四時之間忽有非節之氣傷人而成病也如春時應暖而寒夏時應熱而冷秋時應涼而熱冬時應寒而溫言此四時通行此氣一氣之至無間少長病皆相似故名為時氣也但言其病名風寒所傷則輕狀猶如傷寒

小頭痛壯熱也若挾毒厲之氣則重壯熱煩毒或心腹脹滿多死也

傷寒百問歌

婦人傷寒

婦人傷寒與男異其實痰證初無二婦人治法貴調血男子治法要和氣古人分此大略言要得變通勿拘滯中暑白虎胃實承豈待血調施藥餌前集云假如中暈用白虎胃實用承氣豈必血調而後行湯液耶仲景不將男女分選藥用之隨證治大率

血室惡凝結水火相刑病之始氣口緊盛下
 為宜人迎緊盛汗乃是左手關脈若浮緊當
 救血室和榮衛只宜發汗不宜下汗則液通
 病去矣傷寒經水適然至晝靜夜譫如見鬼
 血室受熱切勿下只用小胡無不止傷寒經
 水適然住熱毒深入血結聚寒熱時作如瘧
 狀小柴胡湯宜速與遲熱入胃成結胃當針
 期門隨實取前集云婦人傷寒發熱經水適
 來晝日明了暮則譫語如見鬼
 狀此為熱人血室無犯胃氣及上二焦無犯
 胃氣者言不可下也小柴胡湯主之婦人傷

風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此
 為熱入血室其血必結故使如瘧狀宜小柴
 胡湯又云婦人傷風發熱惡寒經水適來得
 七八日熱除脈遲身涼和胃脇下滿如結胃
 狀譫語者此為熱入血室也當刺期門隨其
 實而取之又云若行湯速則熱入胃令津燥
 中焦上焦不榮成血結若或犯胃譫喜忘腹
 胃狀須當針期門也
 滿泉利抵當愈前集云傷寒胃實譫語抵當
 又云若犯胃氣則晝夜澹語喜忘
 小腹滿小便利屬抵當湯證也 妊婦傷寒
 藥貴涼小柴去夏黃龍湯桂枝半夏桃仁類
 一或投之胎必傷妊婦傷寒藥性貴涼切不
 可行桂枝半夏桃仁等藥
 小柴胡去半夏名黃龍湯婦人大病藥有序產前安胎產

後補然後用藥療傷寒病稍退時藥即去前集

云人抵產前先安胎產後先補血次服傷寒藥若病稍退止後藥不可盡劑婦人

六七日傷寒胃有燥屎大便艱澀語日赤毒

氣閉瀉心三黃人必安前集云婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便

便難煩躁譫語日赤毒氣閉塞不得通宜瀉心三黃湯見寒而惡身發

熱支急口燥兼舌乾經脈滯澀不通暢桂紅

汗解治無難桂枝紅花湯傷寒體戰作寒者陰陽

俱虛不可下或氣喘急而躁煩柴胡當歸可

安柴胡當歸湯傷寒懷妊已七月赤班變黑身

壯熱藥用升麻六物湯更審其人須溺血梔

子大青湯已宜此方在世非徒設妊孕傷寒

頭體痛兼熱前胡七物用梔子五物亦可

廣濟之方今古共前胡七物湯梔子五物湯孕婦熱病葱

豉湯葱白豉湯葱白壹物方更良葱白一物湯胎死腹

中亦宜服須臾胎出保平康頭痛心煩壯熱

時嘔不下食蘆根宜蘆根湯時疾欲令胎不墮

竈間黃土可塗臍產虛多汗被風傷身強口

噤背反張此證急須作瘧治酒調荆芥古奇

方一方用荆芥末三錢 妊婦傷寒有避忌不
 可尋常壹槩治產前腹痛經不勻其或前期
 或後至產後亡血或過多惡露不下有血塊
 悉宜加減四物湯日二三服仍大劑傷寒胎
 動阿膠阿膠散 更有壹藥白朮散渾身發熱
 及增寒葱白湯宜發其汗作寒振慄或悸噦
 蘇木湯煎八分殘懷孕傷寒不飲食寒熱往
 來常默默更苦頭疼脇下痛痰氣攻衝多嘔
 逆產後傷風熱入胞有如瘧疾寒熱逼經水

適來或適斷病後勞復熱未釋諸證皆可服

黃龍

黃龍湯

此藥載之古方冊有妊傷暑身熱

躁頭疼體急唇口燥無出柴胡石膏湯虛則

加參藥元妙

管見大全良方

婦人傷寒傷風證治

婦人傷寒與男子本無異議 若適然感風
 經脉凝滯頭疼惡風發熱自汗者可與桂枝
 紅化湯 若如人經脉正行或纔通適然感

冒憎寒發熱晝日明了暮則譫語如見鬼神
或三五日或七八日不安者此爲熱入血室
也輕者可與四物湯只用生乾地黃加北柴
胡等分同煎此藥大治婦人產後血虛發熱
極妙疾勢甚者與小柴胡湯加生乾地黃如
人參數同煎服

婦人大全良方

婦人惡寒方

夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒

者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於
陽者宜解表脉必浮數發於陰者宜溫裏脉
必沉細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上
疾證方治並載百問不復繁引僕嘗治一婦
人但惡寒別無他證六脉平靜遂用敗毒散
而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家
慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相薄脉
道沉伏愈令病人寒不可遏但去被徹火兼
以和表之藥自然不惡寒矣婦人惡寒尤不

可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣
 婦人傷寒傷風
 古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通淡然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫

語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也 小柴胡湯主之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮成而結胃狀須當針期門也五行相剋以生相扶以出平居之日水常養於木木木相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹滿小便利屬抵當湯證也 傷寒胃實譫語宜下之 婦人雖然婦人傷熱入血室譫語者不可下也

寒與男子治法不同男子先調氣婦人先調血此大略之詞耳要知脉緊無汗名傷寒脉緩有汗爲傷風熱病脉洪大中暑脉細弱其證一也假如中暍用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也 若妊婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等 藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋爲妊婦而去也大抵產前先安

胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則此藥不可盡劑此爲大法 黃帝問婦人重身毒之柰何歧伯曰有故無殞亦無積也大稍大聚其可犯襄其大半過其厄 男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和爲之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列爲壹卷雖不足以盡

婦人傷寒之詳並可以百問中參用也
事林廣記

婦人傷寒

三五日七八日月經常行或經水纔去作寒
熱譫語見鬼日可夜甚此乃熱入血室用四
物湯等分加柴胡煎服如不退用小柴胡湯
入生地黃搥碎煎服

大和本草

傷寒類要治傷寒婦人得病雖差未滿百日

不可與交合爲陰陽之病必拘急手足拳
欲死丈夫病名曰陰易婦人病名爲陽易
速爲汗之可痊滿四日不可療宜令服此
藥乾薑四兩爲末湯調連服以衣被出汗
方解手足伸而愈
無求子活人書

說藥證并藥方加減法

所謂藥證者藥方前有證也如某方治某病
是也傷寒有證異而病同壹經藥同而或治

兩證類而分之參而伍之審知某證者某經之病某湯者某證之藥然後用之萬全矣又况百問中壹證下有數種藥方主之者須是將病對藥將藥合病乃可服之假如下利而心下痞稱十棗湯大柴胡生薑瀉心湯甘草瀉心湯赤石脂禹餘糧湯桂枝人參湯之類雖均是治下利而心下痞其方有冷有熱子細詳藥證以對治之則無不中矣所謂藥方并加減法者仲景傷寒方壹百十三道病與

方相應乃用正方稍有差別卽隨證加減昔人云學方三年無病可醫療病三年無方可治往往世傳爲名論竟不知執方療病或中或否不知加減移咎於方古人用藥如斗運轉故攻病的而取效速壹服知二服愈假如理中圓證腎氣動者去白朮小柴胡湯證小便不利者加茯苓蓋脾惡濕腎惡燥白朮治濕茯苓利水故腎氣動者去白朮小便不利者加茯苓以此推之然後知不可執方療病

須是隨證加減今於逐方下說病證用藥加減庶幾修合之際便見治法兼古方凡稱改四者直云判如麻豆大云壹升者只用壹人白蓋以古准今易曉而通用也尋常疾勢輕者只抄麤末五錢匕小膏蓋半入薑棗煮七八分去滓服之未知再作病勢重者當依古劑法古之三兩卽今之壹兩也貳兩卽今之六錢半也古之三勝卽今之壹勝也料例大者只合三分之膏足矣

小柴胡湯

方見大方科傷寒門治婦人傷寒發熱經水

適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀者此

為熱入血室

永類鈔方此下云方見活人書如生地黃無犯胃

氣及上二焦又治婦人傷風七八日續得

寒熱發作有時經水適斷此為熱入血室

其血必結致使如瘧狀者

南陽活人書同○婦人

大全良方柴胡

八錢重黃芩人參生乾地黃

甘草

各參錢重半夏

二錢重右咬咀每服五錢水

棗半薑三片棗二枚煎至八分去滓溫服

瀉心三黃湯婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譏語目赤毒氣閉塞不得通

蜀大黃 鼠尾黃芩 雞爪黃連 各等分

右搗為麤末每服四錢水壹盞煎八分去

滓服取微利如日赤睛疼宜加白茯苓嫩

竹葉瀉肝餘之氣 南陽活人書婦人大全良方同

桂枝紅花湯婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急

口燥舌乾經脈凝滯不時 南陽活人書不得 往來

桂心 婦人大全良方得效方 芍藥 得效方 甘草 各

三兩〇南陽活人書各一兩 紅花 二兩

右判如麻豆大每服五錢匕水壹盞半生

薑四片棗子二箇煎至七分去滓良久再

服汗出而解

黃芩芍藥湯婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩 白芍藥 白朮 乾地黄 各一兩

右判如麻豆大每服五錢匕以水壹盞煎

至七分去滓溫服寒則加生薑同煎 南陽活人

書婦人大
全良方同

柴胡當歸湯婦人傷寒喘急煩躁或戰而作
寒陰陽虛不可下

柴胡三兩 白朮二兩 人參 甘草炙 當歸 赤

芍藥各一兩 方已上四味各二兩 五味子 木

通各半兩

右剉如麻豆大每服五錢匕水壹盞半生
薑四片棗子二枚煎至七分去滓溫服
乾薑地黃湯婦人傷寒差後猶有餘熱不去

謂之遺熱

大黃 黃連 黃芩 柴胡去蘆 甘草 白

芍藥各一兩 乾地黄一兩

右搗為麤末每服抄五錢匕婦人大全良方四錢以

水壹盞半煎至七分去滓溫服取溱利汗
出解

燒禪散婦人傷寒未平復因交合裏急腰膈
連腹內痛名陰陽易○婦人大全良方療男
子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其

證裏急腰膝及腹內痛身重

男子禪襠燒灰

右壹味以水和服方寸匕男子用婦人禪

襠燒灰小便利陰頭腫即愈南陽活人書同

青竹茹湯婦人病未平復因有所動致熱氣

上衝宵手足拘急搐搦如中風狀

括樓根無黃根者二兩青竹茹刮半片淡竹者○

升

右以水二升半煎取壹升壹合去滓分作

二三服

南陽活人書良方煮取壹升二合去滓分作三服

當歸白朮湯婦人未平復因有所動小腹急

痛腰膝疼四支不任舉動無力熱發者

白朮 當歸 桂枝去皮甘草炙芍藥 附

子生去皮破八片○南陽活人書壹分婦人大全良方乙箇人參 黃

耆各壹兩生薑半兩

右剉如麻豆大以水三升煎取壹升半去

滓通口服壹湯盞食頃再服溫覆微汗差

南陽活人書

婦人傷寒喘急煩燥咽戰而作寒陰陽俱虛不可下宜柴胡桂枝湯

柴胡三兩白朮一人兩甘草當歸赤

芍藥各一兩五味子木通各半兩

右判如麻豆大每服五錢水壹盞半生姜

二片棗子二个煎至七分去滓溫服

婦人傷寒經脉方來初斷寒熱如瘧狂言見

鬼宜服乾姜柴胡湯

柴胡四兩括樓根膏兩○婦人夫全良桂枝

豈兩半○牡礪膏兩乾姜各甘草壹兩

右判如麻豆大每服五錢水壹盞半煎至

七分去滓溫服初服微煩再服汗出而愈

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜海

蛤散 婦人血結胃法當針期門 仲景無

藥方此方疑非仲景然其言頗有理姑存焉

海蛤 滑石 甘草各一兩○婦人夫全良方得效方衛生寶

鑑各半消半兩○諸

右擣羅爲末每服二錢雞子清調下小腸

通利則胃膈血散臆中血聚則小腹痛小
腸既壅臆中血不流行宜此方小便利血
數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

婦人大全良方

婦人傷寒傷風

局方四物湯不用熟地黃只用生乾地黃加

北柴胡等分煎服亦療此證永類鑰方同
又云灸期門

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱
除脉遲身涼和胃脇下滿如結胃狀譫語者

此爲熱入血室也當刺期門穴隨其實而取
之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦
人病法當刺期門不用行子午法恐纏臟膜
引氣上但下針令病人吸五吸停針良久徐
徐出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補
可肥人二寸瘦人寸半深也
拔粹方

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒不離桂枝芍藥若往來寒熱

者不離柴胡前胡 若大渴者不離知母石
膏五味子麥門冬 若大便泄者不離桂附
白朮乾姜 若大便燥結者不離大黃黃芩
若經水適來適去斷者不離小柴胡 若安
胎者不離人參阿膠白朮黃芩 若發汗者
不離葱豉生姜麻黃旋覆 若頭痛者不離
前胡石膏梔子 若傷暑頭痛者不離柴期
石膏甘草 若滿悶者不離枳實陳皮 若
胎氣不安者不離黃芩麥門冬人參 若癩

發黑者不離黃芩梔子升麻

婦人無孕傷寒

夫婦人傷寒中風治法與男子無異惟熱入
血室妊娠傷寒則不同也宜以四物安養胎
血佐以汗下之藥而治之
婦人傷寒中風自汗頭痛項背強發熱惡寒
脉浮而緩惡熱入血室故倍加芍藥桂枝加
芍藥湯

桂枝一兩 赤芍藥三兩 生薑壹兩 大棗六枚

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒脉浮而緊頭痛身熱惡寒無汗發汗後恐熱入血室宜麻黃加生地黄湯

麻黃二兩桂枝二兩甘草半兩杏仁二十五個去皮尖

生地黄五兩

右剉細每服五錢水煎

婦人傷寒太陽經傳表證仍在而自利併陽明也宜小柴胡加葛根湯

柴胡一兩甘草六錢大棗三錢人參三錢黃芩三錢生

薑三分葛根三分

右剉細每服壹兩水三盞煎服

婦人傷寒身熱脉長而弦屬陽明小陽往來寒熱夜躁晝寧如見鬼狀經水適斷熱入血室大實滿者桃仁承氣湯主之不實滿者宜小柴胡加牡丹皮湯

柴胡二兩黃芩七錢人參二兩半夏六錢大棗三枚

甘草七錢生薑七錢牡丹皮二兩

右剉細每服壹兩水三盞同煎

婦人傷寒太陽標病汗解表除邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者甘草芍藥湯

甘草 芍藥 生地黄 川芎 四味各壹兩

右剉細每服壹兩水三盞煎至壹盞半去滓入棕櫚灰五錢調勻溫服不止者刺隱

白

婦人傷寒表虛自汗身涼四肢拘急脉沉而遲太陽標與少陰本病經水適斷桂枝加附子紅花湯

桂枝 二兩 芍藥 生薑 各一兩 甘草 一兩 附子 一枚

紅花 各五錢

右剉細每服壹兩水三盞煎服

婦人傷寒頭痛脉浮醫反下之邪氣乘虛而傳於裏經水閉而不行心下結硬口燥舌乾寒熱往來狂言如見鬼狀脉沉而數當下之宜小柴胡加芒硝大黃湯

柴胡 二兩 黃芩 半兩 半夏 五錢 甘草 半兩 大黃 七錢 芒硝 七錢 枳實 三枚 生薑 七錢

類聚

九

右剉細每服壹兩生薑同煎去滓下硝再沸溫服若脉不沉即不可下

小柴胡加地黃湯治婦人室女傷寒發熱經水適來或斷盡則明了夜則譫語如見鬼神亦治產後惡露方來忽時斷絕

柴胡一兩二錢半 人參 黃芩 炙甘草 半

夏湯洗七次 生地黃各七錢

右為麤末生姜三片棗二枚同煎

得効方

感冒

麻黃湯發散四時傷寒潮熱頭痛時疫

前胡 柴胡各五錢 石膏 蒼朮剉炒 藁本

赤芍藥 白芷 土芎 乾葛 升麻各五錢

麻黃三錢

右剉散每服四錢生薑三片連鬚葱二根

煎不拘時服 春加黃芩 夏用正方

秋加麻黃 冬加豆鼓

解肌湯治勞傷體熱鼻血兼退熱

柴胡 麻黃 木通 茯苓 犀角 蒲

黃 黃芩 赤芍藥 葛粉 生地黃

甘草 各等分

右剉散每服四錢水壹盞半生薑三片紅
棗二枚煎不以時溫服

人參湯治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日

晡最甚加生乾地黃每服三錢水壹盞半

生薑三片紅棗二枚煎溫服不拘時候見方

人方利傷寒門
卸小柴胡湯

三黃圓治陽毒傷寒 經驗良方治婦人棄衣

而走不避親疎妄言罵詈以朱砂為衣新

汲水下十圓即效未效再服 方見大方
科積熱門

衛生寶鑑

熱入血室證治并方

許學士治一婦人病傷寒寒熱遇夜則見鬼
狀所患六七日忽然昏塞涎響如引鉅牙關
緊急瞑目不知人病勢危困召子視之曰得
病之初曾值月經來否其家云經水方來而

病作而經遂止得膏二日發寒熱晝雖靜而
夜有鬼祟從昨日來不省人事予曰此乃熱
入血室證仲景云婦人中風發熱惡寒經水
不通來晝則明了暮則譫語如見鬼狀發作有
時此名熱入血室予製以小柴胡湯加生地
黃參服而熱除不汗而自解矣又壹婦人患
熱入血室證醫者不識用補血調氣血藥治
之數日遂成血結胃或勸用前藥予曰小柴
胡用已遲不可行也無已則有壹焉可刺期

門而矣予不能鍼請善鍼者治之如言而愈
或者問熱入血室何爲而成結胃也予曰邪
氣傳入經絡與正氣相搏上下流行遇經水
適來適斷邪氣乘虛入於血室血爲邪所迫
上入肝經肝受邪則譫語而見鬼復入膈中
則血結於胃中何以言之婦人平居水養木
血養肝方未受孕則下之以爲月水既妊則
中畜之以養胎及已產則上壅之以爲乳汁
皆血壹也今邪逐血併歸於肝經聚於膈中

結於乳下故手觸之則痛非藥可及故當刺期門也

小柴胡加地黃湯方亦治產後惡露方來忽然斷絕活人書海蛤散亦治錄手后

柴胡一分 人參 半夏 黃芩 甘草炙

生地黃各七錢

右陸味改咀每服伍錢水貳錢生薑五片

棗子壹箇煎至壹錢去粗溫服不拘時

海蛤散方見如人方

醫林方

黃芩芍藥散治婦人諸熱不可救之養陰去熱其病自退也

芍藥八錢 黃芩三錢 茯苓三錢

右為末每服四錢水壹中盞同煎去滓溫服

醫方類聚卷之二百十五

九

醫方類聚卷之二百十五

