

醫學雜纂

全

肺屬辛金。相傳之官。治

節出焉。肺重三斤三兩。

六葉兩耳。八葉主藏魄。

寢則夢妄。戈競擾虛則
夢。田野平原。審時氣血
淥於肺。

大腸屬庚金。傳道之官。
變化出焉。卯時氣血注
大腸。

手太陰肺。脈中焦。起下絡大腸。

肺與大腸相表裏。胃口行。

胃之上院即竇門

上膈屬肺從肺系。

即喉橫從腋下管

手太陰肺。中焦。起下絡大腸。

脈肉榮。膊下對腋。

關前動脈為寸口大指後肉處名膕

前於心與心包脉。

行少陰心主之前

下肘循臂骨上廉。

膕盡處為肘

時以下為臂遂入寸口上魚

際。

隆起處為魚口際其間穴名

大指內側爪甲根少商

穴止為肺主氣

支絡還從腕後出。

臂骨盡

接次指交陽

明經。大此經多氣而少血。

是動則喘滿。

肺主氣生水煩心上腫胸滿。

告脈布膕。

膨脹缺盆痛。

缺盆陽明胃經穴

兩手交

臂為辟。

肺所生病歟上氣。

喘渴。

金不煩心脉火燒心上腫胸滿。

絡於肺脾之內前廉痛為厥。

或為掌中熱。

脉行少陰心主之前

掌心勞宮穴屬心色

肩背痛是氣有餘。

脈絡交於小便數而久而短便頻。

氣虛亦痛。

肩臂弱變及子

少氣不足以報息。

肺主皮毛

手陽明經天腸脉。

次指內側起商陽。

本經循指上廉出合谷

穴名虎口穴

兩骨。

兩指歧

兩骨。

骨間

兩筋中

間行。

手背外側兩筋循行陷中陽絡穴

循臂入肘行膕外肩膕。

前廉杜骨傍。

上出膀胱經之大杜骨會於督脈之大椎

會此。

六陽經皆會於大椎故經文云上出於下入缺盆上入頸斜貫兩頰下齒當夾桂骨之會上

脾屬土。倉廩之官。五味出焉。實則夢歡歌快。虛則夢飲食相爭。已時氣血於注脚。

心屬火。君主之官。神明焉。實則夢憂驚恐。虛則夢煩火焰。已時氣血注於心。

小腸屬火。受盛之官。

胃中寒而腹脹壅。

太陰脾脉起足大指循指內側白肉際過棧骨後

孫拐骨張景岳曰非也即大指後圓骨

內踝前

踝旁日踝

上腨

音善足壯也一作蹠音短足根也然經二字通用

循胫膝股裏

相為表裡

股內前廉入腹中屬脾絡胃

上膈連

舌本舌散

去下

支者從胃

上

膈注心宮

連

此經血少而氣旺

是動即病

舌本強

食出區

出胃

脘痛

心中善噫

噫即

而腹脹得後與氣

大便

慢起

快然衰

病脾

身重

脾主

不能動

搖瘕泄

瘕積

泄瀉

水閉及黃疸

脾濕

煩心

痛即胃

食難消

食不消

立股膝內多腫

脾胃

四肢

不能卧因胃不和

手少陰心脉起心經下膈直絡

小腸承

相為表裡

支者挾咽繫目系直者

從心系上肺

下腋

循腋後廉出太陰

肺心主色

之後行

之後

下肘循臂

內後廉

抵掌後銳骨之端

掌後尖骨

小

指停少衝穴交

此經少

血而多氣

是動咽乾

少陰心

心痛應目黃

腸痛

繫目

渴欲飲臂

膕內痛

後廉

痛掌熱蒸

蒸

手太陽經

小腸脉

小指之端起少澤

本經穴

循手外上腕

出踝中

掌側腕下

上臂骨

廉出肘內

巧出焉。實則夢腰脊
解軟虛則夢涉水恐
懼。酉時氣血注於腎。

三焦者決瀆之官。水道。
心包絡即膻中。臣使之
官喜樂出焉。戌時氣血
注於心包絡。

尋上股內後廉直貫脊。會於督脈
長強穴屬腎下絡膀胱。深首者從腎貫肝膈入肺挾舌本循喉
嚙支者從肺絡心上注於胸腫。膻子此經多氣而少血。是動病飢不欲食。腹內飢而不嗜食
咳唾有血。脉入肺故咳腎主大腸或痢或便血及瘻。瘻則上厥此經心包絡也。坐起輒陰虛不寧。善恐惕。女人將
捕之恐。咽腫古乾兼口熱。少陰火兼上氣。腎水溢而為腫心痛或心煩。脉絡黃疸。腎水乘脾或為女勞疸腸澼。腎移熱於脾胃手厥陰經心主標心包下膈絡三焦。心包與三焦為表裡起自腋中。膻支者出腋下腋三寸循臑內迢太
陰。肺少陰心中間走入肘下臂兩筋間。掌後兩筋起橫紋陷中行掌心勞宮從中指出。中衝穴支從小指
次指交。指交三焦經是經少氣原多血。是動則病手心熱。肘脣攀急腋下腫甚則支滿在胸心中澹々。時大重面赤目黃笑不歇。時大重面赤目黃笑不歇是主脉所生病者。心主脉掌熱心煩心痛掣。皆經脉所過手少陽經三焦脉起手小指次指間。無名指循腕背。表手出臂外之兩骨穴。天井貫肘循臑外上。

出焉亥時氣血注於

三
集

膽屬乙木。中正之官。決

於瞻

肝屬甲木。將軍之官謀。憲出焉。實則夢山林。大樹虛則夢細草苔。蘚。丑時氣血注於肝。

痛領痛銳。背痛缺盆。腫痛亦腫脇。馬子少陰癰。頸夜生。少陽瘡瘍
表半裡。故瘧發。衝膀骨膝外墜絕。骨外踝皆痛。及諸節。堅而不潰汗出。少陽相火振寒。多瘧疾。少陽居半
皆經脉所過

足欣會永

所終大指之端毛際叢起大循足跗上廉內

踝穴 中封

出太陰後 肝脉
之後

中經陰器上抵小腹挾胃通屬肝絡膽相為表裡上貫腎

勝布於

本篇喉嚨之後上入頸頸咽頸

徐人之連目系出賓會督自真率與督賄會於
絡古本連目系出賓會督丁真率顛百會穴

目次

下行頰裏交環脣支者從

肝別貫脾上注於肺乃交宮

腰痛
第

仰難為工不可婦少腹腫男

脉搏小腹瀆瘍陰器。嗌乾喉脫色面塵蒙。胸滿嘔逆及飧。

良池木

冠狐疝遺尿肝虛或閉癃肝大

奇經八脉

臍下四寸名中極任脉起於其下二陰之交任脉會陰之穴任由會陰而行腹督由會陰而行背以上

毛際

行中循腹裏極穴上於關元臍下三寸穴名至

咽喉上頸循面入目是承江絡於
衝起氣街並少陰脈腎俠脣

上行

任脉當膻中而上衝脈夾脅旁而上衝為五

藏六府海 傳為血海五藏六府所稟氣上滲諸陽經灌諸

月上出人
不顧顧

從下衝上取茲義亦有晉下

行者注陰絡氣街出陰股內廉入膍中。曲處灌諸絡以溫肌

肉至跗

循足面下湧泉入足太指

督脈

起

小腹骨中央

入繫廷

女陰廷漏孔

各陰器

令暴二陰之

至後別繞臂與

巨陽絡

太陽中絡

少陰比

與膀胱腎二脉相合

上股內後

貴脊屬督行

上同太陽起自

內背

上額交竝絡腦間

下項循肩

內仍伏脊抵腰絡督

此督脈並兼陽而行者

循男莖下篡亦與女子類

又從少腹貫脅中

貴心入喉頭及

脣環

上繫目下中央際

此為並取任督脈並在

上行者

每錯綜

謂之督今人太率以行身背者為督行身前者謂任從中起者謂衝然考任督二經所行之道在身前一在身後而衝脈居中則無二道似當以此

說為正

督病少腹衝心痛不得前後便衝疝攻

此督脈為病同於衝任者

任病男疝

疝病女瘕帶婦人之疝

帶下瘕聚即

衝病裏急氣逆冲

血不足故急血氣著餘故逆

督者督領

漏及痔瘡

絡陰器合員間此督

脈為病同於衝任者

任病男疝

疝病女瘕帶婦人之疝

帶下瘕聚即

衝病裏急氣逆冲

血不足故急血氣著餘故逆

督者督領

諸經之脉衝者其氣上衝

陰也任者女子得之以任養也

蹠乃少陰腎之別脈

起於然骨

足內踝大骨之下照海穴

至禹踝直上陰股入陰間上循胸

經帶及三綯未說

破帶脉約束一身如帶陽維陰維周

此皆靈素說奇

出出入迎前

胃經頭旁動脉

入頸

目內眞

食於太陽

蹠陽脉始於膀胱經之中

蹠乃中脉穴足外踝下陷中

苦欲補濁論

心欲與急食鹹以與之

若以泄之。肺為華蓋之藏。相傳之官。藏魄而主氣者也。氣常肺欲收。急食苦以泄之。肺主上焦。其政歛肅。故喜收。宜白芍藥。以辛潤之。金受火制。急食辛以收之。○清肅平上焦。虛則補之。○義見上句。腎苦燥。急食以辛潤之。不斂則氣無營束。肺失其職矣。○酸補之。宜五味子補之。酸味遠其收歛。其性本潤。是做惡燥。宜知母之辛。以潤之。腎欲堅。急食苦以堅之。○腎非堅無以稱。強之官。藏精為水藏。主五液。遇濕熱即軟。遇寒冷則堅。○五味得酸。以苦補之。○堅即補也。宜地黃之微苦。即軟得苦。即堅。故宜黃檗。○藏精為火藏。遇濕熱即苦。若因能堅。然非益精無夫。五臟者。違其性則苦。遂其性則欲。本藏以為補。宜地黃山茱萸。○炎上作苦。木曰曲。曲作酸。金曰所惡。即名為渴。本藏所喜。即名為補。苦欲既明。而五味更當詳審。○從革。從革作辛。土爰稼穡。稼穡作甘。苦者直行而泄。辛者橫行而散。酸者束而收歛。鹹者止而軟堅。甘之一味。可上可下。土位居中。

而兼五行也。淡之一味。五臟無歸。專入太陽。而利小便也。善用藥者。不廢準繩。亦不囿於準繩。如熱應寒療。投寒而火熱反生。寒應熱治。進熱而沉寒轉甚。此喜攻增氣之害也。治寒有法。當益心陽。治熱有權。宜滋腎水。此求本化源之妙也。益心之陽。寒亦通行。強腎之陰。熱之猶可。此變化通神之法也。知此數者。其於若欲補鴻無膠固之失矣。

乙癸同源論

古稱乙癸同源。腎肝同治。其說維何。蓋火分君相。君火者居乎上。而主靜。相火者處乎下而主動。君火惟一心主是也。相火有二。乃腎與肝。腎應北方壬癸。於卦為坎。於象為龍。龍潛海底。龍起而火隨之。肝應東方甲乙。於卦為震。於象為雷。雷藏澤中。雷起而火隨。

之澤也。海也。莫非水也。莫非下也。故曰乙癸同源。東方之木無虛。
不可補。補腎即所以補肝。北方之水無實。不可濁。濁肝即所以濁
腎。至乎春。龍不現。則雷無聲。及其秋降。雷未收。則龍不藏。但使
龍歸海底。必無迅發之雷。但使雷藏澤中。必無飛騰之龍。故曰腎
肝同治。余於是而申其說焉。東方者。天地之春也。勾萌甲衍。氣滿
乾坤。在人為怒。怒則氣上。而居七情之升。在天為風。風則氣鼓。而
為百病之長。怒則補之。將逆而有壅絕之憂。風而補之。將滿而有
脹悶之患矣。北方者。天地之冬也。草黃木落。六字蕭條。在人為恐。
恐則氣下。而居七情之降。在天為寒。寒則氣燥。而為萬象之衰。恐
而濁之。將怯而有顛仆之虞。寒而濁之。將空而有涸竭之害矣。然
木既無虛。又言補肝者。肝氣不可犯。肝血自當養也。血不足者。濡

之水之屬也。壯水之源。木賴以榮。水既無竇。又言濁腎者。腎陰不可虧。而腎氣不可亢也。氣有餘者伐之。木之屬也。伐木之幹。水賴以安。夫一補一濁。氣血攸分。即濁即補。水木同府。總之相火易上。身中所苦。濁水所以降氣。補水所以制火。氣即火。火即氣。同物而異名也。故知氣有餘便是火者。愈知乙癸同源之說矣。

兩感

問曰。兩感從何道而入。答曰。經云兩感者死不治。一日太陽與少陰俱病。頭痛發熱惡寒。口乾煩滿而渴。太陽者府也。自背俞而入。人所共知之。少陰者藏也。自鼻息而入。人所不知也。鼻氣通於天。故寒邪無形之氣。從鼻而入。腎為水也。水流濕。故腎受之。經曰。傷於濕者下先受之。同氣相求耳。又云天之邪氣。感則害人五藏。以是知內外兩感。藏府俱病。欲表之則有裏。欲下之則有

表裏既不能一治。故死矣。故云兩感者不治。然所稟有虛實。所感有淺深。虛而感之深者必死。實而感之淺者猶或可治。之而不救者有矣。未有不治而獲生者也。予善用此間有生者十得二三。故立此方以待好生君子用之。

大羌活湯

防風 羌活 獨活 防已 黃芩 黃連
蒼朮 白朮 甘草 炙 細辛 三錢 知母 川芎

生地 兩

右㕮咀每服半兩。水二盞煎至一盞半。去楂得清藥一大盞。熱飲之。不解再服三四盞解之亦可。病愈則止。若有餘證。並依仲景隨經法治之。

醫門八法

論汗法

汗者散也。經云邪在皮毛者汗而發之。是也。又云體若燔炭汗出而散是也。然有當汗不汗。誤人者有不當汗而汗。誤人者有當汗不可汗而妄汗之。誤人者有當汗不可汗而又不可以不汗。汗之不得其道以誤人者有當汗而汗之不中其經。不辨其藥。知發而不知斂。以誤人者。不可以不審也。何則。風寒初客於人也。頭痛發熱而惡寒。鼻塞聲重而體痛。此皮毛受病。當汗之。若失時不汗或汗不如法。以致腠理閉塞。榮不通。病邪深入。流傳經絡者有之。此當汗不汗之過也。亦有頭痛發熱與傷寒同。而其人倦怠無力。鼻不塞。聲不重。脉來虛弱。此內傷元氣不足之症。又有勞心好色。真陰

虧損內熱。晡熱脉細數而力者。又有傷食病。胸膈滿悶。脊酸。喫腐日晡潮熱。氣口脉緊者。又有寒痰厥逆。濕淫脚氣。內癰外癰。瘀血凝結。以及風溫濕溫。中暑自汗諸症。皆有寒熱與外感風寒。同而實異。若誤汗之變症百出矣。所謂不當汗而汗者此也。若夫症在外感應汗之例。而其人臍之左右上下。或有動氣。則不可以汗。經云動氣右不可發汗。汗則衄而渴。心煩飲水即吐。動氣在左。不可發汗。汗則頭眩。汗不止。筋惕肉瞤。動氣在上。不可發汗。汗則氣上衝。正在心中。動氣在下。不可發汗。汗則無汗。心大煩。骨節疼目。運食入則吐。舌不得前。又脉沉咽燥。病已入裡。汗之則津液越出。大便難而譫語。又少陰症。但厥無汗而強發之。則動血。未知從何道出。或從耳目。或從口鼻出者。此為下厥上竭。為難治。又少陰中。

汗則亡陽。尺脈弱者不可發汗。

不可發汗。

寒不可發汗。汗則厥逆。蜷卧不能自溫也。又寸脉弱者不可發汗。汗則亡陰也。又諸亡血家不可汗。汗則直視。額上陷。淋家不可汗。汗則便血。瘡家不可汗。汗則癰。又傷寒病在少陽。不可汗。汗則譖妄。又壞病虛人及女人經水適來者皆不可汗。若妄汗之。變症百出矣。所謂當汗不可汗而妄汗誤人者此也。夫病不可汗而又不可以不汗。則將聽之乎。是有道焉。傷寒賦云。動氣理中去白朮。是即於理中湯去朮。而加汗藥。保元氣而除病氣也。又熱邪入裡。而表未解者。仲景有麻黃石膏之例。有葛根黃連黃芩之例。是清涼解表法也。又太陽症。脉沉細。少陰症。反發熱者。有麻黃附子細辛之例。是溫中解表法也。又少陽中風。用柴胡湯加桂枝。是和解中兼表法也。又陽虛者。東垣用補中湯加表藥。陰虛者。丹溪用芎歸。

理中湯甘草 人參 白朮 乾姜

紫胡湯半夏 人參 甘艸 黃芩
生薑 大棗

補中益氣湯黃芪 白朮 陳皮 升麻
紫胡 人參 甘艸 龜身

麻黃湯

桂枝 杏仁 甘草
麻黃

湯表藥其法精且密矣。總而言之。凡一切陽虛者皆宜補中發汗。一切陰虛者皆宜養陰發汗。挾熱者皆宜清涼發汗。挾寒者皆宜溫經發汗。傷食者則宜消導發汗。感重而體寢者汗之宜重。麻黃湯感輕而體虛者汗之宜輕。香蘇散又東西南之地不比西北隆冬開花少霜雪。人稟常弱。腠理空疎。凡用汗藥只須對症不必過重。予嘗治傷寒初起。專用香薷散加荆防川芎秦艽蔓荆等藥。一劑愈甚。則兩服無有不安。而麻黃峻劑數十年來不上兩餘。可見地土不同。用藥不同。其有陰虛陽虛。挾寒挾熱。兼食而為病者。即按前法治之。但師古人用藥之意。而未嘗盡泥其方。隨時隨症酌量處治。往往有驗。此皆已試之成法。而與斯世共白之所以拯災救患者。莫切乎此。此汗之之道也。且三陽之病淺深不同。治有次第。

葛元散 滑石甘艸辰砂

三物
青蒿厚朴扁豆
熟地加黃連

假如症在太陽而發散陽明已。陽一層病在太陽陽明而和解少。
陽財引賊入門矣。假如病在二經而專治一經。病在三經而偏治
一經即遺二經矣。假如病在一經而兼治二經或兼治三經則邪
過經矣。况太陽無汗。麻黃為最。太陽有汗。桂枝可先。葛根專主陽
明。柴胡專主少陽。皆的當不躬之藥。至於九味羌活乃即感熱症
三陽三陰并治之法。初非為太陽一經設也。又柴葛解肌湯乃治
春溫夏熱之症。自裡達表。其症不惡寒而口渴。若新感風寒惡寒
而口不渴者。非所宜也。又傷風自汗。用桂枝湯。傷暑自汗。則不可
用。若誤汗之。熱邪愈盛。而病必增劇。若於暑症而妄行發散。復傷
津液。名曰重暍。多致不救。古人設為白朮防風。治例風設益元
散。翻蕪飲。治暑俾不犯三陽。禁忌者良有以也。又人知發汗退。

熱之法而不知飲。汗退熱之法。汗不出則散之。汗出多則飲之。飲

也都非。五味酸棗之謂。其謂致病有因。出汗有由。治得其宜。汗自

飲耳。譬如風傷衛。自汗出者。以桂枝湯和榮衛祛風邪而汗自止。

若熱邪傳裡。令人汗出者。乃熱氣薰蒸。如釜中吹煮。水氣旁流。非

虛也。急用白虎湯清之。若邪已結聚。之不大便者。則用承氣湯下

之。熱氣退而汗自收矣。此與傷暑自汗略同。但暑傷氣為虛邪。只

有清補并行之法也。寒傷形為實邪。清熱之外。更有扶正之謂。復有發散太過。遂至汗多亡陽。身瞶動欲擗

地。都宜用真武湯。此救逆之良藥。與中寒冷汗自出者同類。并稱

又與熱症汗出者大相徑庭矣。其他少陽症。頭微汗。或盜汗者。小

柴胡湯。水氣症。頭汗出者。小半夏加茯苓湯。至於虛人自汗盜汗等症。則歸脾補中八珍十全按法而用。委曲尋繹。各盡其妙。而後

真武湯茯苓 白朮 白芍 附子 生姜

歸脾湯木香 入參 焦木 茯苓 龍眼肉 加姜東煎

當歸甘草 茯神遠志

即安所謂汗之必中其經。必得其藥。知發而知斂者此也。嗟嗟百病起於風寒。風寒必先客表。汗得其法。何病不除。汗法一差。天枉隨之矣。吁。汗豈易言哉。

論和法

傷寒在表者可汗。在裡者可下。其在半表半裡者。惟有和之一法焉。仲景用小柴胡湯加減。是已然有當和。不和誤人者。有不當和而和。入誤人都有當和而和。而不知寒熱之多寡。稟質之虛實。臟腑之燥濕。邪氣之兼併。以誤人都。是不可不辨也。夫病當耳聾。脇痛。寒熱往來之際。應用柴胡湯和解之。而或以麻黃桂枝發表。誤矣。或以大黃芒硝攻裡。則尤誤矣。又或因其胸滿脇痛而吐之。則亦誤矣。蓋病在少陽。有三禁焉。汗吐下是也。且非惟汗吐下有所當。

禁即舍此三法。而妄用他藥。均為無益。而反有害。古人有言。少陽膽為清淨之府。無出入之路。只有和解之法。柴胡一方。最為切當。何其所見明確。而立法精微。亦至此乎。此所謂當和而和者也。然亦有不當和而和者。如病邪在表。未入少陽。誤用柴胡。謂之引賊入門。輕則為瘧。重入傳入心胞。漸變神昏不語之候。亦有邪已入裡。燥渴譫語。諸症叢集。而醫者僅以柴胡湯治之。則病不解。至於內傷勞倦。內傷飲食。氣虛血虛。癰腫瘀血。諸症皆令寒熱往來。似瘡非瘡。均非柴胡湯所能去者。若不辨明症候。切實用藥。而借此平穩之法。巧為藏拙。悞人匪淺。所謂不當和而和者。此也。然亦當和而和。而不知寒熱之多寡者。何也。夫傷寒之邪。在表為寒。在裡為熱。在半表半裡。則為寒熱交界之所。然有偏於表者。則寒多偏。

於裡者則熱多而用藥須與之相稱庶陰陽和平而邪氣頓解否
則寒多而益其寒熱多而助其熱藥既不平病益增劇此非不和
也和之而不得寒熱多寡之宜者也然又有當和而和而不知稟
質之虛實者何也夫客邪在表譬如賊甫入門豈敢遽登吾堂而
入吾室必窺其堂奧空虛乃乘隙而進是以小柴胡用人參者所
用是門出也亦有表邪失汗腠理緻密賊無出路由此而傳入少
陽熱氣漸盛此不關本氣之虛故有不用人參而和解自愈者是
知病有虛實法在變通不可誤也然又有當和而和而不知臟腑
清潤之燥濕者何如也如病在少陽而口不渴大便如常是津液未傷
之藥不宜太過而半夏生姜皆可用也若口大渴大便漸結

是邪氣將入於陰津液漸少則辛燥之藥可除而花粉瓜萎有以
用矣所謂臟腑有燥濕之不同者此也然又有當和而和而不知
邪之兼併者何也假如邪在少陽而太陽陽明症未罷是少陽兼
表邪也小柴胡中須加表藥仲景有柴胡加桂枝之例矣又如邪
在少陽而兼裡熱則便閉譫語燥渴之症小柴胡中須兼裡藥仲
景有柴胡加芒硝之例矣又三陽合病閤目則汗面垢散語遺尿
者用白虎湯和解之蓋三陽全病必連胃腑故以辛涼之藥內清
本肺外徹肌膚令三經之邪一同解譫是又專以清劑為和矣所
謂邪有兼併者此也由是推之有清而和者有溫而和者有消而
和者有補而和者有燥而和者有潤而和者有兼表而和者有兼
攻而和者和之義則一而和之法變化無窮焉知斯意者則溫熱

之治瘟疫之方。時行疾癥皆從此推廣之。不難應手而愈矣。世人漫曰和解。而不能盡其和之法。將有增氣助邪而益其爭堅其病者。和云乎哉。

論下法

下者攻也。攻其邪也。病在表則汗之。在半表半裡則和之。病在裡則下之而已。然有當下而不誤人者。有不當下而不誤人者。有當下不可下而妄下之誤人者。有當下不可下而又不可不下者。下之不得其法。以誤人者。有當下而下之不知淺深。不分便溺與血蓄。血不論湯丸。以誤人者。又雜症中不別寒熱。積滯痰水蟲血癰膿。以誤人者。是不可不察也。何謂當下不下。仲景云。少陰病得之二三日。口燥咽乾者急下之。少陰病六七日。腹滿不大便者急下。

之。下利。脉滑數。不欲食。按之心。下硬者。有宿食也。急下之。陽明病。
譖語不能食。胃中有燥屎也。可下之。陽明病。發熱汗多者。急下之。
少陰病。下利清水。色純青。心下必痛。口乾燥者。急下之。傷寒六七
日。目中不了了。睛不和。無表症。大便難者。急下之。此皆在當下之。
例。若失時。不下。則津液枯竭。身如槁木。勢難挽回矣。然又有不當
下而下者。何也。如傷寒表症未罷。病在陽也。下之則成結胸病邪。
雖已入裡。而散漫於三陰經絡之間。尚未結實。若遽下之。亦成痞
氣。况有陰結之症。大便反硬。得溫則行。如開冰解凍之象。又雜症
中。有高年血燥不行者。有新產血枯不行者。有病後亡津液者。有
亡血者。有日久不更衣。腹無所苦。別無他症者。若誤下之。變症蜂
起矣。所謂不當下而下者。此也。然又有當下不可下者。何也。病有

熱邪傳裡已成可下之症。而其人臍之上下左右或有動氣則不可以下。經云動氣在右不可下。下之則津液內竭。咽喉燥。鼻乾頭眩心悸也。動氣在左不可下。下之則腹內拘急。食不下。動氣更劇。雖有身熱。臥則欲起。動氣在上不可下。下之則腹滿。頭眩。食則清穀。心下痞也。又咽中閉塞者不可下。下之則下輕上重。水漿不入。蹉卧_身臣_利疼。下理日數十行。又脉微弱者不可下。脉浮大按之無力者不可下。脉遲者不可下。喘而胸滿者不可下。欲吐欲嘔者不可下。病人陽氣素微者不可下。下之則呃。病人病平素胃弱不能食者不可下。病中能食。胃無燥屎也。不可下。小便清者不可下。病人腹滿時減復故者不可下。若誤下之變症百出矣。所謂當下不可下而妄下誤人者此也。然有當下不可下而又不得不下者何也。夫以

三黃鮮毒湯
黃連 黃芩 黃柏
黃連 黑山梔

蜜煎導法

蜂蜜 用銅器微火熬
頻攪勿令焦候凝如
鉛捻作挺子頭銳如
指捲皂角末少許乘

猪胆導法

熱納穀道中用少手
抱住亦欲大便時去
之加鹽少許亦可
猪胆一枚取汁入醋
步許用竹管長三
四寸以一半納穀
道中將胆汁灌入
肛中頃當大便

黃根木丸

黃連 黃芩 大黃橘紅
炒神曲 白朮 枳實治
傷肉食退麯

通幽湯

知 芒硝 桃仁紅花
生地熟地

羸弱之人虛細之脉。一旦而熱邪乘之。是為正虛邪盛。最難措手。
古人有清法焉。有潤法焉。有導法焉。有少火微和之法焉。有先補之
後攻。先攻後補之法也。焉有攻補並行之法焉。不可不講也。如三黃
解毒清之也。麻仁梨汁潤之也。蜜煎猪胆汁土瓜根導之也。涼
膈散大柴胡。少少和之也。更有脉虛體弱不能勝任者。則先補之。
而後攻之。或暫攻之而隨補之。或以人參湯送下三黃桔朴丸。又
或以人參瓜蔞枳實攻補並行而不相悖。蓋峻劑一投即知人參和之
歸芍維持調護於其中。俾邪氣潛消而正氣安固。不愧為王者之
師矣。又有雜症中大便不通其用藥之法可相參者。如老人久病
人新產婦人。每多大便閉結之症。丹溪用四物湯。東垣用通幽湯。
予嘗合而酌之。而加以旋覆枸杞柏子仁芝麻松子仁人乳梨汁。

蜂蠻之類隨手取效又嘗於四物加升麻及前滋潤藥治老人並
枯數至圓而不能便者往往有驗此皆委曲疏通之法若果人虛
雖傳經傷寒不妨借用甫得猛烈一往敗壞真元至成洞濶雖曰天
命豈非人事哉所謂之貴得其法者此也然又有當下而下而不
知淺深不分便溺與蓄血不論湯丸以誤人者何也如仲景大
承氣湯必痞滿燥實兼全者乃可用之若僅痞滿而未燥實者仲
景只用瀉心湯痞滿兼燥而未實者仲景只用小承氣湯除去芒
硝恐傷下焦陰血也燥實在下而痞滿輕者仲景只用調胃承氣
湯除去枳朴恐傷上焦陽氣也又有太陽傷風症悞下而傳太陰
人致腹痛者則用桂枝湯加芍藥大實痛者加大黃是解表之中
兼攻裡也又有邪從少陽來寒熱未除則用大柴胡湯是和解之

桂枝湯

中兼攻裡也。又結胸症項背強從胸至腹硬滿而痛手不可近者。

大陷胸湯 大黃芒硝甘遂
小陷胸湯 葵連半夏括薑

大陷胸丸 杏仁加甘遂末
大黃芒硝草薢各等分
半夏茯苓湯 半夏茯苓生薑
十東湯 芫花甘遂大戟大枣
枳實理中丸 甘草人参乾姜

仲景用大陷胸湯丸如不按不痛者只用小陷胸湯若寒食結胸停肠下痛不可忍者則用十東湯。凡結胸陰陽二症服藥固效活人俱用枳實理中丸應手而愈。又河間三書云。鬱熱蓄甚。神昏厥逆脉反滯濇有微細欲絕之象。世俗未明造化之理。投以溫藥則不可救。或者妄行攻下致殘陰暴絕勢大可危。不下亦危。宜用涼膈散。

涼膈散 連翹大黃芒硝甘草
梔子黃芩薄荷加竹葉生薑

皆用藥淺深之次第也。又如太陽症未罷口渴小便短濇大便如狂少腹硬滿而痛小便自利者此為蓄血下焦宜抵當湯丸。若

五苓散 茯苓猪苓焦木澤瀉官桂
抵當湯 水蛭黑附子蟲蟻水蛭桃仁去皮尖大黃酒浸足

代抵當丸大黃生地、牡丹皮、桃仁、桂心

蓄血輕微。但少腹急結未至硬滿者。則用桃核承氣湯。或用生地

四物湯加酒洗大黃各半下之。

尤為穩當。

蓋漏瀦症。

大便如常燥

糞症。

小便不利。

蓄血症。

小便自利。

大便色黑也。

此便溺蓄血之所

由兮也。

血結膀胱。

病勢最急。

則用抵當湯。

稍輕者。

抵當丸。

結胸惡

症悉具。

則用大陷胸湯。

稍輕者。

大陷胸丸。

其他蕩滌腸胃。

推陳致

新之法。

則皆用湯。

古人有言。

凡用下藥。

攻邪氣。

湯劑勝丸。

散誠以

熱淫於內。

用湯液滌除之。

為清淨耳。

此湯丸之別也。

然又有雜症

中不別寒熱。

積滯痰水。

蟲血癰膿。

以誤人者何也。

東垣治傷食症。

腹痛便閉。

拒按者。

因於冷食。

用見曉丸。

因於熱食。

用三黃枳术丸。

若冷熱互傷。

則以二丸酌其

所食之多寡而互用之。

應手取效。

又

實熱老瘧。

滾痰丸。

水腫實症。

神佑丸。

蟲積剪紅丸。

血積花蕊丹。

失

蓄血輕微。但少腹急結未至硬滿者。則用桃核承氣湯。或用生地四物湯加酒洗大黃各半下之。尤為穩當。蓋漏瀨症。大便如常燥糞症。小便不利。蓄血症。小便自利。大便色黑也。此便溺蓄血之所由兮也。血結膀胱。病勢最急。則用抵當湯。稍輕者。抵當丸。結胸惡症悉具。則用大陷胸湯。稍輕者。大陷胸丸。其他蕩滌腸胃。推陳致新之法。則皆用湯。古人有言。凡用下藥。攻邪氣。湯劑勝丸。散誠以熱淫於內。用湯液滌除之。為清淨耳。此湯丸之別也。然又有雜症中不別寒熱。積滯痰水。蟲血癰膿。以誤人者何也。東垣治傷食症。腹痛便閉。拒按者。因於冷食。用見曉丸。因於熱食。用三黃枳术丸。若冷熱互傷。則以二丸酌其。所食之多寡而互用之。應手取效。又實熱老瘧。滾痰丸。水腫實症。神佑丸。蟲積剪紅丸。血積花蕊丹。失

笑腸癟。牡丹皮散隨症立方各有攸宜此雜症攻下之良法也近世庸家不講於法每視下藥為畏途病者亦視下藥為砒鴉致令熱症垂危袖手旁觀委之天數大可悲耳昔張子和儒門事親新三法即以下法為補謂下去其邪而正氣自復谷肉果菜無往而非補養之物雖其說未合時宜而於治病攻邪之法正未可缺吾願學者仰而思之平心而察之得其要領以施救濟之方將以躋斯民於壽域不難矣

論消法

消者去其壅也臟腑筋絡肌肉之間本無此物而忽有之必為消散乃得其平經云堅者削之是已然有當消不消悞人都有不當消而消悞人者有當消而消之不得其法以悞人者有消之消而

不明部分。小悞人。都有消之而不辨。夫積聚之原。有氣血積食停
痰。蓄水。癰膿蟲蠱。勞瘵。與夫瘡癬癥瘕。七疝。胞癥。腸覃。石瘕。以及
前後二陰諸疾。小悞人者。是不可不審也。凡人起居有常。飲食有
節。和平恬淡。氣血周流。谷精神充暢。病安從來。惟夫一有不慎。則六
淫外侵。七情內動。飲食停滯。邪日留止。則諸症生焉。法當及時消
導。俾其速散。氣行則愈耳。倘遷延日久。積氣盤踞堅牢。日漸強大。
有欲拔不能之勢。雖有智者亦難為力。此當消不消之過也。然亦
有不當消而消者。何也。假如氣虛中滿。名之曰鼓。腹皮膨急中空。
無物取其形如鼓之狀。而因以名之。此為敗症。必須填實。庶乎可
消。與蠱症之為蠭為血。內實而有物者。大相徑庭。又如脾虛水腫。
土衰不能制水也。非補土不可。真陽太虧。火衰不能生土者。非溫

緩命門不可。又有脾虛食不消者。氣虛不能運化而生疾者。腎虛水泛為痰者。血枯而經水斷絕者。皆非消導所可行。而或妄用之。悞人多矣。所謂不當消而消者此也。然又有當消而消之。不得其法者。何也。夫積聚癥瘕之症。有初末之三法也。焉當其邪氣初客。所積未堅。則先消之。而後和之。及其所積日久。氣鬱漸深。濕熱相生。塊因漸大。法從中治。當祛濕熱之邪。削之更之。以底於平。但邪氣久客。正氣必虛。須以補濁。疊相為用。如薛立齋用歸脾湯送下蘆薈丸。予亦嘗用五味异功散佐以和中丸。皆攻補並行。中治之道也。若夫塊消及半。便從末治。不使攻擊。但補其氣。調其血。導達其經脉。俾榮衛流通。而塊自消矣。凡攻病之藥。皆損氣血。不可過也。此消之之法也。然又有消之而不明部分者。何也。心肝脾肺

筋分布五方。胃大腸小腸膀胱三焦膽與膻中皆附麗有常所而皮毛肌肉筋骨各有淺深。凡用湯丸膏散必須按其部分而君臣佐使駕馭。有方使不得移則病處當之不至。誅伐無過矣。此醫門第一義也。而於消法為尤要。不知明乎此而妄行劫削。則病未消而元氣已消其害可勝言哉。况乎積聚之原。有氣血食積停痰蓄水癰瘍蟲蠱勞瘵。與夫痃癖癥瘕。七疝胞癰。腸覃石瘕。以及前後二陰諸病。各各不同。若不明辨為害非輕。予因約畧而指數之。夫積者成於五臟。推之不移者也。聚者成於六腑。推之則移者也。其忽聚忽散者氣也。痛有定處而不散者血也。得食則痛。喫腐吞酸者食積也。腹有塊按之而硬者痰也。先足腫後及腹者水也。先腹滿後及四肢者。脹也。痛引兩脇。咳而吐涎者停飲也。咳而胸痛吐膿腥者。

臭者肺癰也。當胃而痛嘔而吐。膿者胃脘癰也。當脅而痛小便如淋轉側作水聲者腸癰也。增寒壯熱飲食如當常。身有痛偏着一處者外癰也。病人嗜食甘甜或異物飢時則痛。唇之上下有白斑點者蟲也。蟲有九濕熱所生。而為蛇為蟹則血之所成也。胡以知為蛇蟹。腹中如有物動而痛不可忍吃血故也。又嶺南之地以蠱害人。施於飲食他方之蠱多因近池飲食冷陰受蛇蠍之毒也。病咳嗽痰紅抑抑不樂畏見人。喉癢而咳嗽者勞瘵生蟲也。痘如弓弦筋病也。癖則隱癖附骨之病也。癥則有塊可徵積之類也。瘕者或有或無痞氣之類也。少腹如湯沃小便濇者胞痺也。痛引睾丸者疝也。女人經水自行而腹塊漸大如懷子者腸覃也。經水不行而腹塊漸大并非妊娠石瘕也有妊娠可於脉之滑濇辨之也。至

於濕熱下降則為陰菌。陰蝕陰挺下脫。陰莖腫爛之類而虛火內
燦。庚金則為痔漏。為懸瘻。為臓毒。種種見症不一而足。務在明辨。
症候。按法而消之也。醫者以一消字視為泛常。而不知其變化。曲
折較他法為尤難。則奈何不詳稽博考。以盡濟世之仁術也耶。

論吐法

吐者治上焦也。胸次之間咽喉之地。或有痰食癟膿。法當吐之。經
曰。其高者因而越之。是已然有當吐。不吐誤人者。有不當吐而吐。
誤人者。有當吐不可吐。而妄吐之。以誤人者亦有當吐不可吐。
而又不可以不吐。吐之不得其法。以誤人者。是不可不辨也。即如
纏喉鎖喉諸症。皆風痰鬱火壅塞其間。不急吐之。則脹閉難忍矣。
又或食停胸膈。消化弗及。無由轉輸。脹滿疼痛者。必須吐之。否則。

尊
待其瘳。

用

胸高滿悶。變症莫測矣。又有停痰蓄飲。阻塞清道。日久生變。或妨
碍飲食。或頭眩心悸。或吞酸噯腐。手足麻痺。種種不適。宜周吐法。
諸症如失。又有胃脘癌。嘔吐膿血者。經云嘔家有膿。不須治嘔膿。
盡自愈。凡此皆當吐而吐者也。然亦有不當吐而吐者何也。如少
陽中風。胸滿而煩。此邪氣而非有物。不可吐。吐則驚悸也。又少陰
病始得之。手足厥冷。飲食入口。則吐。此膈上有寒飲。不可吐也。病
在太陽。不可吐。吐之則不能反生。內煩。雖曰吐中有散。然邪氣不
除。已為小逆也。此不當吐而吐者也。然又有當吐不吐者何也。蓋
凡病用吐。必察其病之虛實。因人取吐。先察其人之性情。不可誤
也。夫病在上焦。可吐之症。而其人病熱勢危篤。或老弱氣衰者。或
體質素虛。脉息微弱者。婦人新產者。自吐不止者。諸亡血者。有動

氣都四肢厥冷。冷汗自出者皆不可吐。吐之則為逆候。此因其虛而禁吐也。若夫病久之人。宿積已深。一行吐法。心火自降。相火必強。設犯房勞。轉生虛症。反難救藥。更須戒怒凝神。調息靜養。越三旬而出戶。方為合法。若其人性氣剛暴。好怒喜淫。不守禁忌。將何恃以無恐。此又因性情而禁吐也。所謂當吐不可吐者。此必然有不可吐而又不得不吐者。何也。病人脉滑大。胸膈停痰。胃脘積食。非吐不除。食用山蒂散。與橘紅淡鹽湯。淡鹽湯二陳湯。用指探喉中而出之。體質極虛者。或以桔梗煎湯代之。斯為穩當。而予更有法焉。予嘗治寒痰閉塞。厥逆昏沉者。用半夏橘紅各八錢。濃煎半杯。和姜汁成羹一杯。頻頻灌之。痰隨藥出。則拭之。隨灌隨吐。隨吐隨灌。少頃痰開藥下。其人即甦。如此者甚衆。又嘗治風邪中臟。將

脫之症。其人張口痰鳴聲如曳鋸。溲便自遺者更難任吐而稀涎。
阜角等藥既不可用亦不暇用。因以大劑參附姜夏濃煎灌之。藥
隨痰出。則拭之隨灌。隨吐隨灌久之。藥力下咽。胸膈流通。參
附大進。立至數兩。其人漸甦。一月之間參藥數角。遂至平復。如此。

都又眾又嘗治風痰熱閉之症。

牛黃丸

前法頭疽內攻藥

不醒者

灌如前法。屢不醒者。

蓮鬚葱白煎酒灌

不醒者

灌如前法。喉閉喉風。以

灌如前法。俱獲全安。如此者又眾。更有牙

杜牛膝搗汁。雄黃丸等灌。如前法。俱獲全安。如此者又眾。更有牙

關緊急閉塞不通者。搗鼻散吹鼻取嚏。出開或痰或食隨

吐而其人遂甦。如此者尤眾。蓋因病用藥隨藥取吐。不吐之吐

其意更淨。此皆古人之成法。而予稍為變通者也。昔仲景治胸痛

不能食。按之反有涎。吐之利則止。是以吐痰止利也。丹溪治妊娠轉脬。小便不通。用補中益氣湯隨服而探吐之。往往有驗。是以吐法通小便也。華陀以醋蒜吐。蛇河潤以狗油雄黃同瓜蒂以吐蟲。而通膈。丹溪又以韭汁去瘀血。小治前症。由此觀之。症在危疑之際。却以恒通劑盡其神化。莫測之耶。況於顯然易見者乎。則甚矣。吐法之宜講也。近世醫者每將此法置之高閣。亦似汗下之外。并無吐法。以致病中常有自嘔。自吐而為順症者。見者驚。聞者駭。醫家亦不論虛實而亟亟止之。反成壞病害人多矣。吁可不畏哉。

論清法

清者。清其熱也。臟腑有熱。則清之。經云熱者寒之。是已然。有當清。

不清悞人者有不當清而清悞人者有當清而清之不分外傷外感以悞人者有當清而清之不量其人不量其症以悞人者是不可不察也夫六淫之邪除中寒寒濕外皆不免於病熱熱氣薰蒸或見於口舌唇齒之間或見於口渴便溺之際灼知其熱而不清則班班黃狂亂厥逆吐血諸症叢生不一而足此當清不清之悞也然又有不當清而清者何也有如勞力辛苦之人中氣大虛發熱倦急心煩溺赤名日虛火蓋春生之令不行無陽以護其榮衛與感熱症相隔宵壤又有陰虛勞瘵之症日晡潮熱與夫產後血虛發熱煩躁症象白虎悞服白虎者難救更有命門火衰浮陽上泛有似於火者又有陰盛隔陽假熱之症其人面赤狂躁砍坐卧泥水中或數日不大便或舌黑而潤或脉反洪大崢嶸然鼓擊於指下

按之豁然而空者或曰渴欲得冷飲而不能下或因下元虛冷頻飲熱湯以自救世俗不識悞投涼藥下咽即危矣此不當清而清之誤也然又有清之而不分內外傷者何也蓋風寒閉火則散而清之經云火鬱發之是也暑熱傷氣則補而清之東垣清暑益氣湯是也濕熱之火則或散或滲或下而清之開鬼門清淨府除陳莝是也燥熱之火則潤而清之通大便也傷食積熱則消而清之食去火自平也惟夫傷寒傳入胃肺熱勢如蒸自汗口渴飲冷而能消水者藉非白虎湯之類鮮克有濟也更有陽盛拒陰之症清藥不入到口隨吐則以姜汁些少為引或姜製黃連反佐以取之所謂寒因熱用是也此外感實火之清法也若夫七情氣緒喜怒憂思悲恐驚互相感觸火從內發丹溪治以越鞠丸開六

欝也。立齋主以逍遙散調肝氣也。意以一方治本欝而諸欝皆解。也然經云怒則氣上。喜則氣緩。悲則氣消。恐則氣下。驚則氣亂。思則氣結。逍遙一方以之治氣。上氣結者固為相宜。而於氣緩氣消氣亂氣下之症。恐猶未合。蓋氣虛者必補其氣。血虛者必滋其血。情之火悠焉。平至若真陰不足。而火上炎者。壯陽真陽不足。而火上炎者。引火歸原。導龍入海。此謂水火折衷。譬天火俟雲收。日出而龍雷各歸其宅耳。是人心也有形之火。後天之火也。得水則滅。故可知病因于火。而以熟藥治之。何也。先天之火也。得水則動。故曰。外感之火。虛火也。龍雷之火也。無形之火。先天地火也。得水則滅。故曰。外水。內水。感之火。虛火。主火。抑火。內火。邪火。之火。治火。光燄。燭天。化俟。雲收。日出。而龍雷各歸其宅耳。是

虛火可補而不可濫也。其有專用參芪而不用一味者，因其穴宅無寒也。其有專用六味而不用桂附者，因其穴宅無水也。補則同而引之者稱不同耳。蓋外感之火，以清為清；內傷之火，以補為清也。然又有清之而不量其人者何也？夫以壯實之人而患實熱之病，清之稍重，尚為無碍。若本體素虛，臟腑本寒，飲食素少，腸胃虛滑，或產後病後，房室之後，即有熱症，亦宜少少用之，甯可不足。不使有餘，或餘熱未清，即以輕藥代之，庶幾病去人安。倘清劑過多，則療熱未已而寒生矣。此清之貴，量其人也。然又有清之不量其症者何也？夫以大熱之症而清劑太微，則病不除；微熱之症而清劑太過，則寒症即生。但不及猶可再清，太過則將醫藥矣。且凡病清之而不去者，猶有濁焉壯水是也。王太僕云：太熱而甚寒。

之不寒。是無水也。當滋其腎。腎水者。天眞之水也。取我天眞之水。
制外邪。何邪。不服可熱。不除而反何火。沾於寒涼。以滋罪戾。
由是觀之外感之火尚當滋水。抑制之而內傷者更可知矣。大
抵清火之藥不可久恃。必歸本於滋陰。滋陰之法又不能開胃扶
脾以恢復元氣。則參苓芪木亦當酌量而用。非曰清後必補。但元
氣無虧者可以不補。元氣有虧可必須以補之。俟其飲食漸進。精神爽
慧。然後止藥可也。此清之貴。量其症也。總而言之。有外感之火。有
內傷之火。外感為實。內傷為虛。來路不同。治法迥別。甯曰。熱者寒
之。遂足以畢醫家之能事也。

論溫法

溫者溫其中也。臟受寒侵。必須溫劑。經云。寒者熱之。是已然。有當

溫不溫悞人。都有不當溫而溫以悞人。都有當溫而溫之。不得其法。以悞心者。有當溫而溫之。不量其人。不量其症。與其時以悞人者。是不可不審也。天地殺厲之氣。莫甚於傷寒。其自表而入者。初時即行溫散。則病自除。若不由表入。而直中陰經者。名曰中寒。其症惡寒厥逆。口鼻氣冷。或冷汗。自出嘔吐。瀉利。或腹中急痛。厥逆無脈。下利清穀。種種寒症。并見法當溫之。又或寒濕侵淫。四肢拘急。發為痛痺。亦宜溫散。此當溫而溫者然。又有不當溫而溫者何也。如傷寒邪熱。傳裡。口噪咽乾。便閉譫語。以及班斑黃狂亂。劬吐便血諸症。其不可溫固無論。以若乃病勢已深。厥逆漸進。舌則乾枯。反不知渴。又或挾熱下利。神昏氣弱。或脉來濇滯。反不應指。色似烟薰。刑如槁木。近之無聲。望之似脫。甚之血脈衰耗。筋脉拘攣。但

脈口齒舌乾燥而不可解者此為真熱假寒之候。世俗未明亢害承制之理誤投熱劑下咽即敗矣。更有鬱熱內蓄身反惡寒濕熱脹滿皮膚反冷中暑煩心脉虛自汗燥氣焚鉅痿軟無力者皆不可溫又有陰虛脈細數陽乘而吐血者亦不可溫溫之則為逆候此所謂不當用溫而溫者也然又有當溫而溫之不得其法者何也假如冬令傷寒則溫而散之冬令傷風則溫而解之寒痰壅閉則溫而開之冷食則傷則溫而消之至若中寒暴痛大便反硬溫藥不止者則以熱劑下之時當暑月而納涼飲冷暑暴受寒侵者亦當溫之體虛挾寒者溫而補之寒客中焦理中湯溫之寒客下焦四逆湯溫之又有陰盛格陽於外溫藥不效者則以白通湯加人尿猪胆汁反佐以取之經云熱因寒用是已復有真虛挾寒命門

火衰者必須補其真陽。太僕有言。大寒而盛熱之不熱。是無火也。
當補其心。此心字指命門而言。仙經所謂七節之旁。中有小心是
也。書曰。益心之陽。寒亦通行。滋腎之陰。熱之獨猶可是也。然而醫
家有溫熱之溫。有溫存之溫。參芪歸朮。和平之性。溫存之溫也。春
日煦煦。是也。附子姜桂。辛辣之性。溫熱之溫也。夏日烈烈。是也。和
煦之日。人人可近。燥烈之日。非積雪凝寒。開冰解凍。不可近也。更
有表裡皆寒之症。始用溫藥。裡寒頓除。表邪未散。復傳經絡。以致
始為寒中。而其後轉變為熱中。都容或有之。藉非斟酌時宜。對症
投劑。是先以溫藥救之者。繼以溫藥賊之矣。亦有三陰直中。初無
表邪。而溫劑太過。遂令寒退熱生。初終異轍。是不可以不謹。所
謂溫之貴得其法也。然又有溫之不量其人者何也。夫以氣虛無

火之人。陽氣素微。一旦客寒乘之。則溫劑宜重。且多服亦可無傷。
若其人平素火旺。不喜辛溫。或曾有陰虛失血之症。不能用溫者。
即中新寒。溫藥不宜太過。病退則止。不必盡劑。斯為克當其人矣。
若論其症。寒之重者。微熱不除。寒之輕者。過熱則亢。且溫之其補。
有相兼者。有不必相兼者。虛而且寒。則兼用之。若寒而不虛。即專
用溫藥。主之。丹溪云。客寒暑暴痛。兼有積食者。可用桂附。不可遽
用人參。蓋溫即是補。予遵其法。先用姜桂溫之。審其果虛。然後以
參木輔之。是以屢用屢驗。無有差忒。此溫之貴。量其症也。若論
其時。盛夏之月。溫劑宜輕。時值隆冬。溫劑宜重。然亦有當避暑時。
而得虛寒極重之症。曾用參附煎膏而治愈者。此捨時從症法也。
譬如霜降以後。禁用白虎。然亦有陽明症。蒸自汗。譫語煩躁。口渴。

飲冷用者雖當雨雪飄搖之際亦曾用白虎治之而痊安復不宜
太過耳此溫之貴量其時而清熱可類推已邇時醫者羣尚溫補
痛戒寒涼且曰陽為君子陰為小人又曰陽明君子苟有過人必
知之誠知之而即為補救猶可言也不思藥以療病及轉而療
藥則病必增劇而成危險之候又况桂枝下咽陽盛則殆承氣入胃
陰盛以敗安危之機禍如反掌每多救援弗及之處仁者鑒此顧
不痛歟吾願醫者精思審處晰理不差於毫厘用藥悉歸於中正
俾偏陰偏陽之藥無往不底於中和斯為善治噫可不勉哉

論補法

補者補其虛也經曰不能治其虛安問其餘又曰邪之所湊其氣
必虛又曰精氣奪則虛又曰虛者補之補之為義大矣哉然有當

補不補。悞人者有不當補而補。悞人者亦有當補而不分氣血。不辨寒熱。不識開闔。不知緩急。不分五臟。不明根本。不深求調攝之方。以悞人者是不可不講也。何謂當補不補。夫虛者損之漸損者虛之積也。初時不覺。久則病成。假如陽虛不補。則氣日消。陰虛不補。則血日耗。消且耗焉。則天真榮衛之氣漸絕。而虧損成矣。雖欲補之。將何及矣。又有大虛之症。內實不足。外似有餘。脉浮大而濇。面赤火炎。身浮頭眩。煩躁不甯。此為出汗暈脫之際機。更有精神浮散。徹夜不寐。其禍尤速。法當養榮歸脾。輩加飲藥以收攝元神。俾浮散之氣退藏於密。庶幾可救。復有陰虛火亢。氣逆上充。衝不得眠者。法當滋水以制之。切忌苦寒瀉火之藥。反傷真氣。若悞清之。去生遠矣。古人有言。至虛有盛候。反瀉含冤者。此也。此當補。

不補之悞也。然亦有不當補而補者何也。病有脉實症實不能任補者固無論矣。即其人本體素虛而客邪初至。病勢方張。若驟補之。未免閉門留寇。更有大實之症。積熱在中。脉反細濇。神昏體倦。甚至憎寒振慄。欲着覆衣。酷肖虛寒之象。而其人必有唇焦口燥。便閉溺赤諸症。與真虛者相隔天淵。倘不明辨精切。悞投補劑。陋矣。古人有言。大實有羸狀。悞補益疾者此也。此不當補而補之之悞也。然亦有當補而補之不分氣血。不辨寒熱者何也。經曰。氣主煦之。血主濡之。氣用四君子湯。凡一切補氣藥皆從此出也。血用四物湯。凡一切補血藥皆從此出也。然而少火者生氣之原。丹田都出氣之海。補氣而不補火者非也。不思少火生氣而壯火食氣。譬如傷暑之人。四肢無力。濕熱成瘡。不能舉動。都火傷氣也。人知

補火可以益氣而不知清火。如所曰。益氣補肺同而寒熱不同也。
又如血熱之症。宜補血行血。以清之。血寒之症。宜溫經養血以和
之。立齋治法。血熱而吐者。謂之陽乘陰。熱迫血而妄行也。治用四
生丸。立味湯。血寒而吐者。謂之陰乘陽。如天寒地凍水凝成冰也。
治用理中湯。加當歸。醫家常須識此。勿令悞也。更有去血過多。成
升斗者。無分寒熱。皆當補益。所謂血脫者。益其氣乃陽生。陰長。至理
蓋有形之血不能速生。無形之氣所當急固。無形生有形。先天知
造化本如是耳。此氣血寒熱之分也。然又有補之而不識。開閭不知
緩急者何也。天地之理。有閭。有開。用藥之機。有補。有濁。如
補中湯用參芪。必用陳皮以開之。六味湯用熟地。即用澤濁以導
之。古人用藥。補正必兼濁邪。邪却則補。自得加。又况虛中挟邪。正

當開其一面戢我人民攻彼賊寇或縱或擒有收有放庶幾財退
民安而國本堅固更須酌其邪正之強弱而用藥多寡得宜方為
立法是以古方中有補散并行者參蘿飲益氣湯是也有消補并
行者枳木丸理中丸是也有攻補并行者瀉心湯硝石丸是也有
溫補並行者治中湯參附湯是也有清補并行者參連飲人參白
虎湯是也更有當峻補者有當緩補者有當平補者如極虛之人
垂危之病非大劑湯液不能挽回予嘗用參麥煎膏日服數兩而
救陽微將脫之症又嘗用參附煎膏日服數兩而救津液將枯之症
亦有無力服參而以芪术代之者隨時處治往往有功至於病
漸進脉症相安漸為減藥穀肉果菜食養盡之治於平康其有
邪未盡元氣雖虛不任重補則從容和緩之補其機宜循序

體質素虛。別無大寒大熱之症。欲服丸散以葆真元者。則用和平之藥。調理氣血。不敢妄使偏僻之方。久而爭勝。反有傷也。此開闔緩急之意也。然又有補之而不分五臟者。何也。知五臟有正補之法。有相生而補之之法。難經曰。損其肺者益其氣。損其心者和其榮衛。損其脾者調其飲食。適其寒溫。損其肝者緩其中。損其腎者益其精。此正補也。又如肺虛者補脾。土生金也。脾虛者補命門火。生土也。心虛者補肺。木生火也。肝虛者補腎。水生木也。腎虛者補肺。金生水也。此相生而補之也。而子更有根本之謬焉。胚胎始兆形骸未成。先生兩腎。腎者先天之根本也。然而先天之中有水有火。水曰真陰。火曰真陽。名之曰真。則非氣非血。而為氣血之母。生身。生命全賴乎此。周子曰。無極之真。二五之精。妙合而凝。謎然不

動感而遂通隨吾神力為往來者此也古人深知此理用六味滋水八味補火十補斑龍水火兼濟法非不善矣然而如假補真火其真者未曾盡喪庶幾有效若先天祖氣薄無存雖有靈芝亦難續命而况庶草乎至於後天根本尤當培養不可忽視經曰安穀則昌絕穀則危又云粥漿入胃則虛者活古人診脉必曰胃氣制方則曰補中又曰歸脾者健脾者良有以也夫飲食入胃分佈五臟灌溉周身如兵家之糧餉民間之烟火一有不斷繼兵民離散矣然而因餓致病固多而因傷致病者亦復不少過嗜肥甘則痰生過嗜醇釀則飲積瓜菓乳酥濕從內受發為腫滿瀉利五味偏啖久而增氣皆令大殃可不慎哉是知脾胃兩臟皆為根本不可偏廢古人或謂補脾不如補腎者以命門之火即生脾土也或

謂補腎不如補脾者。飲食之精，自能下注於腎也。須知脾弱而腎不虛者，則補脾為亟。腎弱而脾不虛者，則補腎為先。若脾胃而虛，則并補之藥既補矣，更力攝養有方，斯為善道。諺有之曰：藥補不如食補，我則曰：食補不如精補。精補不如神補。節飲食，惜精神，用藥得宜，病有不痊焉者寡矣。

論病之原，以內傷外感四字括之。論病之情，則以寒熱言。實表裡陰陽，二字統之。而論治病之方，則又以汗和下、消吐清溫補、往來之蓋一法之中，八法備之。一法之中，百法備焉。病變雖多，而法歸於一。此予數十年，用心領神會，歷試而不謬者，盡見於八篇中矣。學者誠於此書熟讀而深思之，於以救濟蒼生，未必無小補云。

天都黃子程國彭鍾齡著

傷寒六經見症法

六經者。太陽。明少陰。陽太陰。少陰厥陰也。三陽有經有腑。三陰有傳有中。有太陽之經。即有太陽之腑。膀胱是也。有陽明之經。即有陽明之腑。胃是也。有少陽之經。即有少陽之腑。膽是也。然胆為清淨之腑。無出入之路。故治法如經也。三陰有傳經者。由三陽而傳入三陰。此熱邪也。有直中者。初起不屬陽經傳入。直中三陰。此寒邪也。茲數者。乃傷寒見症之綱領也。

太陽經症

太陽經病。頭痛發熱。頸脊強。身體癟。鼻鳴乾嘔。惡風。自汗。脈浮緩者。名曰中風。

宜解肌。桂枝湯主之。若前証悉具，惡寒無汗，脈浮緊，或喘嗽者，名曰傷寒，宜發。

秦麻黃湯主之

頭痛問曰

頭痛何以是太陽症？答曰：三經上至頭，皆有頭痛。惟太陽脉最長，其痛居多，故頭痛為表症。陽經

又問曰：三陽頭痛有別乎？答曰：

太陽之脈從巔入絡腦，還出別下項，循肩膊由

夾脊抵腰中，故太陽頭痛。

頭腦痛而連項脊也。

陽明之脈起於鼻，絡於目，交額中，凡陽陽頭痛。

頭額痛而連面目也。

少陽之脈起於目鏡，背下耳後，凡少陽頭痛。

耳前後痛而上連頭角也。

以此為別。

又問曰：三陰本無頭痛，今見直中症，亦有頭痛何也？答曰：七直中而兼外感也。

又問曰：傷寒傳經至厥

陰，亦又頭痛何也？答曰：厥陰症頭痛，脉浮是裡邪達表，欲得汗解也。

宜微表之。

又問曰：陽明腑病口

渴便閉，亦有頭痛何也？答曰：陽明之經絡在頭目，因其腑熱薰蒸，上攻於頭目之間，以致頭痛。

夫經

病可以傳腑，腑病亦可以連經，此相因之至理。

然必其實有腑症，方可用白虎清之。

若在寒發熱，

初起之時，則為外感風寒，不得與陽明腑病同類混稱也。

項脊強問曰

項脊強何以是太陽症？答曰：項脊者，太陽經所過之地。太陽病，則項脊強也。又問曰：仲景云結胷症，項脊強如柔症狀，何謂也？答曰：本太陽病為醫誤下而成結胸，胸中脹滿。

痛俯仰不舒。有似於項強。非真項強也。蓋太陽項強。在項後。經脉拘急而疼痛。胸無病也。結胸項強。在項前。胸中俯仰不舒。項無病也。且結胸症誤下而後成太陽病。起而即見自不同耳。

身痛問曰

身痛何以是太陽症。答曰。人身之中氣為衛。血為榮。風則傷衛。寒則傷榮。風寒客之。則榮

衛不通。故身痛。經云。寒甚則痛。熱甚則肉消咽破。凡內經舉痛諸症皆以寒名。未有以熱而曰痛者也。故見項癰痛。即宜用辛甘發散。令氣血流通而痛愈耳。又問曰。身痛既為表症。諸書言裡症亦有身痛。何也。答曰。裡症身痛屬直中而不屬傳經也。寒邪直侵臟腑。陽氣衰微。氣血凝滯致有身痛。宜急溫之。若傳經裏症。則屬熱。主血行則無身痛。總之外。有頭痛發也。而身痛如絶束者。太陽表症也。無頭痛發熱而身痛如受杖者。直中寒症也。一發散一溫中。誤投之。終難取效。不辨乎。

四肢拘急問曰

四肢拘急。何以是太陽症。答曰。寒主收引。熱主舒伸。天道之常。秋冬則萬物斂藏。春

四肢拘急問曰

夏則萬物發舒。此定理也。內經曰。寒則筋痙。骨痛。熱則筋弛。肉緩。故拘急為太陽感

寒症。又問曰。裡症亦有拘急何也。答曰。直中陰症。臟受寒侵。經脉因而斂束。若傳經裏。則為熱則體舒。又焉得拘急乎。總之發熱頭痛而拘急者。太陽症也。無發熱頭痛而拘急者。直中症也。仲景治法。太陽表症及風濕相搏。而見牽急者。皆處以甘草加附子湯。甘草附子湯之類。况三陰直中者。急屬寒。固無疑矣。常見內熱極甚。身如枯柴。四肢僵硬。不能屈伸者。何也。答曰。此熱甚而枯。肝臟將絕之候。名曰搐搦。非拘急也。仲景云。四肢熱。習脣吻反青。為肝絕此之謂也。

發熱問曰

發熱何以是表症。答曰。風寒鬱於腠理。則閉塞而為熱。翕然作摸之落手。此熱即發於皮膚之外。而臟腑無熱。名曰表病。裡和試以內經諸論證之。曰風寒客於人。使人毫毛畢直。皮膚閉而為熱。可汗而已。又曰。因於寒體。若燔炭。汗出而散。又曰。人之傷於寒也。則不免於病熱。

大汗熱自解也。由是觀之。熱之屬表明矣。故一見發熱。即屬表邪未解。雖一月半月之後。還當發散。

又問。發熱固為表邪。倘譖語發狂。裡症復急者。治從表乎。從裡乎。曰。經云。解表不開。切勿攻裏。攻之

為大逆。若裡症甚急。須用清中兼表之法。加芩連知母之類。以清裏而用荆防葛根之類。以發表大便閉結。裡熱極甚者。先用清散之法。然後用大柴胡湯下之。攻散並行。不相妨也。

又問。溫熱病亦發熱。不用麻黃桂枝。而用柴葛以解之。何也。曰。溫熱病者。寒邪伏於肌膚之間。溫醞釀成熱。一旦直裏

達表。其症但發熱。不惡寒。而口渴。故用柴葛解肌湯。辛涼以散之。不用麻黃桂枝之辛溫。以助熱邪。也。然既曰解肌。即為表症。設亦未嘗以發熱為裡症也。

又問。據予言。凡發熱皆在陽經。而不在陰經。何以仲景云。少陰症反發熱者。當用麻黃附子細辛湯。曰。少陰發熱者。表裡皆寒。是直中而兼外感。

非傳經少陰也。故用麻黃諸藥。溫中發散。令表裡兩解。天直中少陰。本無發熱。而曰反發熱者。蓋兼太陽表症也。總之傳經入裡。而發熱。清熱中心。兼發散直中入裡。而發熱。溫藥中必兼發散。可見發熱屬表症無疑。故曰。三陰無頭痛。無身熱。

惡寒問曰

惡寒何以是表症。答曰。人身外為陽。為表。寒邪屬陰。為表虛。為寒所乘。名曰陰盛陽虛。陽虛不能溫其膚衛。致表虛。雖在家室。亦引衣蓋覆。謂之惡寒。經云。陰盛陽虛。干之則

愈。故惡寒屬表症。又問諸書言裡症亦惡寒何也。答曰裏症惡寒。直中也。非傳經也。傳經入裏。則為熱邪。必然。惡熱。豈有惡寒之理。然太陽惡寒。與直中惡寒。何以別之。病入頭痛。發熱而惡寒者。表症也。無頭痛。發熱而惡寒者。直中裡症也。經曰。發熱惡寒。發於陽無熱。惡寒發於陰也。又問陽明腑病。口燥渴而背微惡寒者。豈非傳經裏症乎。曰。惡寒者。表未盡也。因其燥渴之甚。故用白虎加人參湯。此處論惡寒一項可謂精明之至矣。仲景云。發熱無汗。表未解者。不可與白虎湯。渴欲飲水。無表症者。白虎加入參湯主之。此症微惡寒。則表邪未解。口燥渴則熱已熾。故用此方。設口不燥渴。亦安得而用之乎。又問曰。誤下而成結胸。腹痛甚急。倘惡寒者。何以治之。答曰。結胸為醫誤下而成。今惡寒者。是表邪未盡。結於胸中。必先解表。方服陷胸湯丸。若誤攻之。表邪又結於胃。更危矣。故結胸症有一毫惡寒。必先散之。而後攻之。可見惡

寒屬太陽表症也。

喘問

曰。喘何以是太陽症。答曰。肺主皮毛。司氣之升降。寒邪侵於皮毛。肺氣不得升降。故喘。試以麻黃。

麻黃湯論

內有杏仁為定喘設也。又云。喘家作桂枝湯。加厚樸杏子佳。明言喘屬表邪也。又

問。喘既為肺為表。指掌賦云。喘滿而不惡寒者。當下而產。何也。曰。傳經裡症。內熱閉結。大便不通。熱氣上中。致肺金清肅之令。不得下行。因而喘急。此因胃熱攻肺。故可下之。使其熱氣流通。而喘定矣。然或有惡寒等症。不可遽攻。恐成逆候。又問。陰症喘促者。何以治之。曰。陰症喘者。乃少陰中寒。真陽衰微。腎不納氣。以致四肢厥冷。脈沈細氣促。而喘急。宜理中四逆以溫之。八味以佐之。若汗出髮閨。

喘不休者

為難治也

脈浮問曰

脉浮何以是太陽症。答曰。按之不足。舉之有餘。故曰浮。經曰。寸口脈浮。主病在外。浮而緊者。爲傷寒浮而緩者。爲傷風。皆主表邪也。設若邪氣入裏。則脈必沈。又焉得浮。故浮脉爲

太陽表症。又問脉浮固屬表症。倘裡症見而脉尚浮者。治當何如。曰。裡症脉浮。恐表邪未盡也。必先

解表。而後攻裡。書云。解表不開。切勿攻裡。仲景云。結胸症。脉浮者不可下。可見脉浮爲在表矣。然有

表症已罷。便閉諸舌。腹痛口渴。而脉尚浮者。又當從權。下之。仲景云。脉浮而大。有熱屬腑者。攻之

表症已罷。便閉諸舌。腹痛口渴。而脉尚浮者。又當從權。下之。仲景云。脉浮而大。有熱屬腑者。攻之

不令發汗。此之謂也。斯取症。不取脉也。

脉伏問曰

脉不出。何以是表症。答曰。脈者。血之餘府。熱則血行。豈有脉伏之理。惟表受陽寒。深故脈

脉伏。問曰。伏。一手無脉。曰单伏。而手無脉。曰双伏。外顯太陽症。而脉伏不出者。寒氣閉塞也。然此實

浮汗之機。欲愈之候。書云。天氣燠蒸。必有大雨。過而天氣清。猶汗出而精神爽也。又問裡症脉伏

者何也。曰。裡症脉伏。惟直中有之。亦寒氣閉塞也。宜用四逆湯加猪胆汁。葱白以溫之。若傳經裡症

之象。脈濇滯少。似伏而非伏也。然必有脣焦口燥。飲冷便閉諸症。与陰寒脉伏者。相隔霄壤。又

或有痛處。痛極則脈伏。痛止則脈出。

三才學書常脉大正表證印首中矣。

桂枝湯

桂枝分芍藥三錢

甘草分生薑

大棗四枚去核

四枚去核

麻黃湯

麻黃分桂枝八分

甘草分

杏仁三錢

剛

麻黃湯不宜於東南。多宜於西北。西北稟厚質。必須此藥開發。乃可疏通。
實為冬令正傷寒之的方。若東南不可輕用。體虛脈弱者用之。恐有汙多
陽之慮。桂枝麻黃二方用時。不卽禱如反掌。喻氏秘製芎蘇湯。不論四時
感冒。無不取效。今用此以代前二方。藥穩而取效甚速。洵良方也。

芎蘿湯

川芎

錢五分

蘇葉

錢五分

柴胡

錢五分

桔梗

錢五分

升麻

錢五分

半夏

錢五分

枳殼

錢五分

甘草

八分

羌活

錢五分

水煎服。引加姜三片、葱白二根，覆被取汗自愈。

加味香蘇散。用此以代麻桂二方。藥穩而效。不論冬月正傷寒。及春夏秋三時感冒。皆可此取效。

紫蘓葉錢五分、香附錢五分、甘艸八分、荆芥錢五分、秦艽二錢、防風錢五分、蔓荆子錢五分、陳皮一錢、川芎錢五分、生姜三片。

水煎溫服。微覆似汗。前症如頭痛甚者。加羌活錢五分、葱白二根。自汗惡風者。加桂枝八分、白芍三分。若在春夏之交。惟恐夾禦溫暑之邪。不便用桂。加白朮錢五分。○如兼停食。胸膈痞悶。加山楂、麥芽、葛子各三分。○如太陽本症未罷。更兼口

渴溺濇者。此為膀胱腑症。加茯苓三錢。木通二錢。喘嗽。加桔梗。前胡各五錢。杏仁三錢。

○鼻衄或吐血。本方去生姜。加生地赤芍。丹參。丹皮各三錢。咽喉腫痛。加桔梗。

薄荷半旁子。各五錢。便秘。加蕷子。枳壳。如兼四肢厥冷。口鼻氣冷。是兼中

寒也。加乾姜。八肉桂。八之類。雖有表症。其散藥只用一味。不必盡方。如挾

暑氣。加知母。黃芩。各三錢。之類。乾嘔發熱而咳。為表有水氣。加茯苓三錢。半夏五錢。

○時行疫癘。加蒼朮一錢。梅核氣症。喉中如有物。吞不入。吐不出者。加桔梗。

○蘿梗一錢。小便不通者。加通州五橘子三錢。婦人經水適來。加當歸。丹參。各一錢。

○產後受風寒。加黑姜。當歸。其散劑減去大半。若稟質極虛。不任發散。

養。更用補中兼散之法。

參蘿飲

蘿葉

錢五

文元黨

錢三

陳皮

錢一

枳壳

錢五

前胡

錢五

半夏

錢五

木香

八分

甘草

八分

桔梗

錢五

茯苓

錢三

此治稟質極虛者。

前方去文黨前胡加川芎柴胡

錢五分

名芎蘿飲不服參者宜之

六和湯 調和六氣

藿香

錢五

厚朴

錢五

杏仁

錢三

半夏

錢少

砂仁

八分

木瓜

錢二

赤茯苓

錢三

甘草

八分

人參

一錢

扁豆

四錢

白朮

錢三

引加生姜三片

紅棗五枚

前方如傷寒加蘿葉

錢五

傷暑加香薷

錢五

參

九味羌活湯 此方解表通用潔古製是湯以代桂枝麻黃青龍各半等方
其方內有生地黃芩寒滯宜斟酌用之

西羌活錢五分 防風錢五分 紅辛五分 蒼朮錢五分 白芷一錢 川芎錢五分 黃芩三錢 生地五錢

甘艸八分 引加生薑葱白 陰虛氣弱者禁用

大羌活湯 此方陰陽表裡同時俱病 欲汗則有裏症 欲不汗則有表症 經曰 其兩感傷寒者必死仲景無治法 潔古製此方間有生者 即九味羌活湯加 防已 知母 獨活 白朮 川連

三陰三陽俱病者宜之

柴葛解肌湯 治春溫夏熱之病。其症發熱頭痛與正傷寒同。但不惡寒而口渴與正傷寒異。耳本方主之。

柴胡錢五葛根錢五赤芍二錢甘草八分黃芩三錢知母一錢月母一錢

生地三錢丹皮三錢

水煎服。心煩加淡竹葉十片。譫語加石膏三錢。

陽明經症

陽明經病。目痛鼻乾。脣焦。漱水不欲嚥。脈長。此陽明本經症。其經去太陽不遠。亦有頭痛發熱。宜用葛根解肌。不可誤認為腑病。而用清涼攻下之法。

目痛鼻乾問曰

目痛鼻乾何以知邪在陽明經也答曰目鼻者足陽明胃所布之經絡也經云陽

之則目痛鼻乾至於他經各行其道何目痛鼻乾之有

唇焦漱水不欲嚥問曰

唇焦漱水不欲嚥問何以知邪在陽明經也答曰唇者陽明經所過之地

也全唇焦思漱水以潤之是知邪在陽明經絡中然不欲嚥者則知本腑無熱表病而裡和也又問表症既除裏症已見或亦有漱水而不嚥者治法從裏乎從表乎從裏乎曰既無表症裏必有熱則能消水漱當嚥下若不嚥都是內有瘀血也何以知之外無表症小腹硬滿自利是燥糞也大便自如小便不利此澀滯也今小便自利腹中硬痛其為瘀血明甚矣

脈長問曰

尺寸俱長何以知邪在陽明經也答曰長者泛溢也言脈過於本位也陽明為氣血俱多

不等者何也曰陽明用葛根者治陽明經病也陽明用承氣者治陽明腑病邪氣結實也不用葛根承氣而用白虎者治陽明經病初傳於肺邪未結實也陽明經病目痛鼻乾漱水不欲嚥而無便閉譖語燥渴之症是為表症裏和則欲用葛根湯散之假如邪已全入腑發熱轉為潮熱致有譖語燥渴便閉腹脹等症是為邪氣結聚則用承氣湯下之假如陽明經病初傳於肺蒸熱自汗燥渴譖語

而無便閉腹脹之熱邪。和結實則用白虎湯清中達表而和解之。此治陽明三法也。倘經腑不明。臨症差忒。悞人匪淺。因知仲景用攻者攻陽明之腑。不攻陽明之經。用表者表陽明之經。非表陽明之腑。辛涼口鮮者治肺病。散漫之邪大便未結腹無所苦也。此乃陽明經腑之說。所宜急講也。

葛根湯

葛根

錢二

升麻

錢五

秦艽

錢五

荆芥

錢五

赤芍

錢二

蘓葉

錢五

白芷

錢一

甘

艸八
生姜

片二

水煎服。如無汗而口渴者加知母。錢五自汗而渴者加入參石膏。凡陽明症口渴之甚即為入腑故加入清涼之藥如自汗而口不渴者乃陽明經中風去蘓葉加桂枝。若春夏之交惟恐夾雜溫暑之邪不便用桂加白朮。錢五

少陽經症

少陽經病。目眩口苦。耳聾。胸滿。肠痛。寒熱往來。嘔吐。頭汗。盜汗。舌滑脈弦。此少陽經受病。宜用小柴胡湯和解。仲景云。少陽症。但見一二症。即是不必悉具。此經有三禁。吐。汗。下。是也。然少陽有兼表兼裡者。務在隨時變通。不得以三禁之說而拘泥也。

耳聾問曰

耳聾何以是少陽症。答曰。足少陽膽經上絡於耳。邪在少陽。故耳聾也。又問。欲陰亦耳聾。則何也。曰。肝胆相為表裏。肝病連膽。故亦耳聾也。但少陽耳聾必往來寒熱。厥陰耳聾則

舌蹇囊縮

自有所別耳

胸滿問曰

胸滿何以是半表半裡症。答曰。胷半以上。乃清陽之分。正在半表半裏。邪至此。將入裏。而未深入於裏也。故胷滿而腹未滿者。乃邪氣而非有物也。若腹中脹滿。則為有物矣。又問。

痞氣亦胸前脹滿。之何以別之。曰。邪入三陰經而未結聚成實。醫遂下之。致成痞氣。必須問其曾經下否。若經下而後胷滿者。痞氣也。若未經下而胸前脹滿。即屬少陽也。陶氏治法。少陽症兼胸滿者。

小柴胡加枳桔如未效。本方對小陽胸湯。股如神為妙。是知用藥亦自有相通者。

脇痛問曰

脇痛何以是半表半裡症。曰足少陽膽經布於面部。則無此症。又問水氣亦有脇痛何也。曰水氣勝。必見乾嘔。咳引脇下痛。小半夏加茯苓湯主之。極重者。十棗湯攻水。

之若半表半裡。脇痛外必兼見少陽症。

目眩口苦問曰

目眩口苦。何以是半表半裡症。曰目者。肝之竅也。胆附於肝。今少陽胆病。故目眩口苦者。膽之汁也。熱泄膽汁。故口苦。凡有是二者。即是少陽半表半裡症。當和解之。

嘔吐問曰

嘔吐何以是半表半裡症。曰邪氣將入裡。氣上冲。邪正分爭。故嘔吐。仲景云。傷寒三阳邪氣入陰之機。然猶在將入未入之間。故和解可愈。然亦有胃熱而嘔者。有停飲而嘔者。有食積而嘔者。病人口燥渴。嘔吐黃水者。胃熱也。嘔吐清涎沫。口鼻氣冷。手足厥冷者。胃寒也。渴飲水而復嘔。咳引肋下痛者。停飲也。嘔吐飲食胸膈。脹痛吞酸。嗳腐者。食積也。以此為別。

往來寒熱問曰

寒熱往來。何以是半表半裡症。曰人身外陽內陰。足少陽膽經。正陰陽交界之所。邪傳至此。陰陽相爭。故寒熱往來。又問陽明亦有寒熱往來。何也。曰陽明經病邪。

在肌肉中。則身發熱焉。得有往來寒熱。由少陽傳入陽明之腑表症。未除裏熱已結。故兼見往來寒熱。當用大柴胡湯攻之。書曰。陽明內實。則為寒熱往來。此說非也。蓋由少陽邪氣未除。故見寒熱並非陽明正病也。

頭汗問曰

頭汗何以是半表半裡症。答曰。諸陽經上至於頭。則有頭汗。若諸陰經。皆至頸而還。則頭

牽率裏也。且若是表症。尚有寒邪閉塞焉。得有汗。今既有汗。是寒邪將化為熱也。但名曰裏症。則頭與身皆出汗。但名曰表症。則頭無汗。故曰半表半裏也。又問瘀血發黃。水氣皆有頭汗出。何也。曰瘀血頭汗出。小便自利。小腹滿痛。大便黑色。發黃。頭汗出。小便不利。目珠黃。水氣頭汗出。胸膈痞滿。咳引脇下痛。若少陽頭汗出。必見寒熱往來諸症。以此為別。

盜汗問曰

盜汗何以是半表半裡症。答曰。熱邪薰灼腠理。令人自汗。寒則腠理閉塞而無汗。今汗

曰。雜症盜汗。乃陰虛之症。傷寒盜汗。乃外感之邪。自不同類。

舌胎滑問曰

舌胎滑何以是半表半裏症。答曰。舌司腸胃。寒熱之變。在表則津液如常。在裏則胎

不在裏故曰

半表半裡症

脈弦問曰

脈弦何以是半表半裡症。答曰弦者肝之本脈也。肝胆相為表裡。且膽為乙木。木主風於時為春。故脈弦也。太陽脉浮。陽明脈長。少陽脈弦。此三陽診候之法也。

小柴胡湯

柴胡錢

赤芍錢

甘草八分

半夏

參

黃芩錢

人參錢

生薑三片

大棗

三枚去核

水煎溫服。如胸中煩而不嘔。是熱氣結聚。本半夏人參加括蔥仁五錢。以瀉
熱。渴者是津液少。去半夏。加栝萎根三錢。倍人參二錢。以生津液。如腹中痛
是邪氣壅。去黃芩。加白芍錢七分通壅。如脇下痞硬。去大棗。加牡蠣四錢。以
堅。口心下季。小便不利。是水氣去。黃芩。加茯苓三錢。通中。參以瀉泄。如不渴。

外有微熱。是表邪未解。今人參加桂枝八錢。以解肌。如渴者為肺寒氣逆。去人參大棗黃芩。加前胡錢橘紅分乾姜八分散寒降氣。

如兼胸滿者。加枳壳錢桔梗五分。如柴效。本方對小陷胸湯。一服如神。

半夏湯治少陽水氣脇痛。必見乾嘔。咳引脇下痛。此方主之。極重十
棗湯攻之。

半夏五錢 生姜三片 茯苓三分 白芍三錢 甘草八分 郁李仁二錢 廣皮八分

香附二錢

太陰經症

太陰經病。自古混同立言。故方藥多錯亂。今細按之。有三法焉。夫太陰有傳經之邪。有直中之邪。有誤下內陷之邪。不可不辨也。如經所謂腹滿嗌乾者。此傳經之邪也。法當用小柴胡去人參。加芍藥以和之。不已則下之。經又謂腹滿而吐食不下。自利益甚。時腹自痛者。此直中之寒邪也。法當理中湯以溫之。又謂太陽症。醫反下之。因爾腹滿時痛者。此誤下內陷之邪也。法當用桂枝加芍藥。大實痛者。桂枝加大黃湯。以是知傳經之邪。宜用大柴胡。輩直中之邪。宜理中。悞下內陷之邪。宜用柴桂枝湯加減法。今先舉傳入太陰者。言之其見症也。腹滿嗌嗌乾脈沈實。大柴胡湯主之。若自利去大黃。加黃連。

以清之

腹滿痛問曰

腹滿痛何以是太陰症答曰脾為坤土坤為腹陰中之至陰也邪氣傳之則腹滿而

也少陽之邪傳入太陰肝木乘脾致成腹痛故用柴胡芍藥以和之痛甚者加大黃以下之又如太陽症為醫誤下以致邪氣內陷而成腹痛用桂枝湯加芍藥大實痛者桂枝湯加大黃意正相等然腹痛難屬太陰又有傳經直中之分大抵傳經之邪由三陽傳入直中之邪猝然驟至也傳經之邪則脉沉實直中之邪則脉沈細也傳經之邪則口乾口燥直中之邪則口鼻氣冷也以此為別下利問曰合病以及陽明少陽合病但有下利何也曰三陽合病有下利者外合三陽之經內合陽明之腑也少陽之明合病自下利者亦合陽明之腑也陽明內主胃腑故有下利若不入腑以無下利今少陽之邪傳入太陰太陰為臟腑相連故有下利也但宜分傳經直中傳經則下利勝培直加中則下利清穀寒熱之藥由此而分不可不謹

脈沈實問曰

脉沈實何以是太陰熱症答曰沈者病脈也玉病在裏實者有力也主病為熱今脉沈實故知太陰經有實熱也

大柴胡湯

柴胡

錢

半夏

錢

黃芩

三白

芍藥

三白

枳實

錢

大黃

三

水煎服。若兼寒熱往來。加生薑

五分

大棗

三個

少陰經病症

舉

少陰經病有傳有中。今先傳經者言之。其見症也。口燥咽乾而渴。或咽痛。或下利清水。色純青。心下硬。或下利腸垢。目不明。大小承氣湯主之。

口燥咽乾而渴。問曰。

口燥咽乾而渴。何以屬傳經少陰也。答曰。少陰之脉循喉嚨。挾舌本。熱邪傳入少陰。消爍腎水。則真水不得上注於華池。故乾燥異常。而渴甚也。須急

下之。以救腎家浮濶之水。又問。腎氣虛寒。而亦口渴者。何也。曰。腎者。水臟也。虛故引水自救。小便必色白。自下焦虛有寒。不制水。故令色白也。若傳經熱。則小便短濇而赤。且傳經症。口燥咽乾。舌燥脣焦。而渴甚。睛氣虛寒。則無此等熱症。惟見頻飲熱湯。不自灌而已。又或思飲冷。而不能下咽。此內真寒。而外假熱之候。與口燥咽乾而渴相隔。膏肓。

口咽痛問曰 咽痛何以屬傳經少陰症。答曰 咽者少陰經脈所過之地也。熱邪乘之則咽痛。又問寒症亦有咽痛何也。曰 寒邪直中下焦逼其無根失守之火發揚於上亦令咽痛然必有下利清穀四肢厥冷等症不若傳經熱邪口燥咽乾而渴之甚也。

下利清水問曰

下利清水何以是傳經少陰症。答曰 邪傳少陰。熱氣薰灼結糞如鑄石在內所進穀俗名漏底傷寒設誤認此症為漏底而用熱藥是抱薪救火矣。仲景云少陰症下利清水色純青心下硬痛急下之宜大承氣湯正謂此症也。

目不明問曰

目不明何以是傳經少陰症。答曰 目能照物全在瞳子人瞳人屬水邪氣薰灼則腎症亦有目不明何也。曰 虛症目不明者氣弱也血枯也。丹溪用人參膏補氣也六味地黃湯補血也此皆內傷之治法。若傷寒目不明實為熱邪消爛腎水急宜清涼攻下以救援也如大便自利腹無所苦則用三黃解毒湯清之大便不利腹中硬痛則用承氣湯下之不可緩也。

小承氣湯 治邪傳少陰口燥咽乾而渴或目不明宜急下之

製軍三錢
酒洗 厚朴錢
參 枳實錢
參

水煎服。加芒硝三錢。即大承氣湯。

加味桔梗湯 治少陰咽痛。

桔梗錢
參 薄荷錢
參 甘草分
炙 大力子三錢

水煎服。如不瘥。對前小承氣湯服。

厥陰經症

厥陰經病亦有傳者。中今先舉傳經言之。者其見症也。少腹痛滿。舌蹇。囊縮。煩燥。厥逆。消渴。大承氣湯主之。

少腹滿問曰。少腹滿。何以是傳經厥陰症。答曰。胸膈以上。乃清陽之分。為少陰之分野。胸膈以下。少腹以上。乃清濁交界之所。為太陰之分野。當臍者。少陰之分野。少腹者。厥陰之分野。傷寒傳至厥陰。少腹脹滿。乃濁陰凝聚。聚實為有物。知宜急下之。又問瘀血與溺濇。亦少腹滿也。且瘀血者。太陽膀胱經蓄血也。溺濇者。太陽膀胱經蓄水也。膀胱系於臍下。故少腹滿也。但蓄血症。少腹

滿小便自利大便黑色澀滯症少腹滿小便不利大便如常若邪傳厥陰則大便閉結小便短亦是為燥糞症也且厥陰必有煩滿囊縮厥逆清渴諸症與太陽膀胱經症迥然不同也

舌趺囊縮

問曰 舌趺囊縮何以是傳經厥陰症答曰 肝主周身之筋熱邪內灼則津液枯不能榮

斂縮此冬令萬物閉藏之象令內熱消燐此夏令津液乾枯之象然直中症脈必沉遲或見下利清穀口鼻氣冷諸寒症邪傳厥陰必煩滿消渴之極或脣焦口燥身如枯柴形情大不相同且直中症舌雖短縮而潤澤邪傳厥陰則舌斂縮如荔枝必然焦燥毫無津液又問婦人之診如何

曰 婦人乳縮男金囊縮先驗其舌已自明白不待細問矣是以傷寒驗舌之法不可不講

厥逆

問曰 厥逆何以屬傳經厥陰症答曰 傷寒之邪自表入裏邪在三陽則手足熱傳至太陰則

厥自厥而至逆冷乃傳經之邪由淺入深是知厥逆屬傳經厥陰症又問寒症厥逆者何也曰 直中寒邪初時即厥不比傳經之邪厥自漸而至也又問仲景云發熱四日厥反三日復熱四日厥少逆多其病當愈厥四日熱反三日復厥四日厥多逆少其病當進何謂也曰此指熱厥而言也傷寒發熱尚淺傷寒發熱者其熱更深所謂熱深厥亦深熱微厥亦微者此也厥少熱多則熱漸退厥多熱

熱者其

起發熱而後至於厥；與逆復相間互發而進退無常也

消渴問

消渴何以屬厥陰熱症。答曰。消渴者。熱甚能消水也。邪傳太陰。則嗌乾。未甚渴也。至少陰。

曰。此熱極神竇不秘渴也。其始極渴其後則知渴。口燥脣焦。身如槁木。勢甚危矣。又問。真寒亦有渴者何也。

則口燥舌乾而渴至厥陰則消渴矣。消渴者。飲水多而小便少。不知消歸何有也。可見厥陰熱甚。則大渴而能消水也。又問。三陽經亦口渴何也。曰。太陽症本無渴。其小便不利而渴者。太陽腑病也。外頭太陽症而又兼口渴。故用五苓散以分利之。俾小便通而渴自止矣。陽明經亦無渴。不過唇焦漱水爾。其有渴者。則陽明腑病也。邪未結聚。熱勢散漫而口渴者。白虎湯。邪已結實。腹脹便閉而口渴者。承氣湯。此陽明腑病之治法也。至於少陽。乃表裡交界之所在。表為寒。在裡為熱。兼有口渴者。駢乎。欲入裏矣。故於小柴胡中去半夏。加栝蒌根以清其熱。倍人參以生津液。此少陽經之治法也。至於太陰。雖益乾而渴猶未甚也。少陰則燥渴。漸甚矣。厥陰則消渴。全而無復加者也。又問。陽明腑病。口大渴與厥陰消渴。何以別之。曰。陽明居中土也。萬物所歸也。三陽三陰之邪皆得傳之。今厥陰經消渴者。陽明胃中消之也。夫飲與食皆入胃者也。胃熱則消。胃寒則不能消也。厥陰熱邪極盛。攻入胃腑。則有消渴之症。生非厥陰。經另有一口而能飲能消也。因其有裏縮煩滿厥逆諸症。故名曰厥陰。因其由厥陰症而發消渴。故以消渴屬厥陰也。又問。熱甚亦有不渴者何也。自古乃同氣相求之理。但小便色白。而外見清穀厥逆諸寒症。以上諸症。與厥陰囊腫而消渴者。相隔千里。是不可以不辨。

太陽腑病

太陽腑者。足太陽膀胱是也。膀胱有經。有腑。邪在於經。則頭痛發熱。邪在於腑。則口渴。溺赤。外顯太陽經病。而兼口渴。溺赤者。此漏濇不通。乃太陽腑病。與他臟無涉也。五苓散主之。若表症未罷。可與散劑同用。

口渴溺赤。問曰。膀胱有水。何以反渴也。曰。水有清濁。水不去。則津液不生。故渴也。且水停有濕。腑者。加不可用。利藥。
反引邪氣入本腑也。

五苓散

茯苓
錢三

猪苓
三

澤瀉
錢三

桂枝
八分

白朮
參

錢

水煎服。以利為度。愚按前症。自汗脈浮者。當中風入本腑。可用此方。無汗脈緊。

者。由傷寒入本腑。即於香薷散中加茯苓澤瀉。應手而效。

陽明腑病

足陽明胃有經有腑。經者徑也。猶路徑然。腑者器也。所以盛水穀者也。邪在於經。不
過目痛鼻乾唇焦。漱水而已。邪既入腑。則潮熱。譖語狂亂。不得眠。煩渴自汗。便
閉諸症生焉。白虎湯。承氣湯。並主之。但陽明腑病。有由本經入腑者。有由太陽
少陽入本腑者。有由三陰經入本腑者。來路不全見症。則一治者詳之。

潮熱問曰。潮熱何以屬陽明腑症。答曰。潮熱者如潮之汎。不失其時。今日午後發熱。明日亦然。故名。

潮不可與承氣湯。可見潮熱。合用承氣湯也。又問潮熱固當下。設有表症。何以治之。

答曰。潮熱兼表。必先解表。然後攻裡。若裏症甚急。則用大柴胡法。表裡並治可也。

譖語問曰

譖語何以屬陽明腑症。答曰心者胃之母。肺者胃之子。心主藏神精明者也。肺主出聲。清

不避親疎。由其熱有輕重。故譖語亦有輕重也。又問經云。譖語有虛有實者何也。曰實則譖語虛則

鄭聲。譖語者亂言無次數。更端鄭重声者鄭重其辭語重疊頻言。不換他說也。蓋氣有餘則能機變而亂。語氣不足則無機變而只守一音也。又問婦人傷寒。晝則明。夜則譖語者何也。曰此熱入血室症也。婦人經水適來。血海空虛。邪氣乘之。致有此症。治法無犯胃氣。及上二焦必自愈。宜用小柴胡湯。太半夏加紅花桃。

仁生地丹皮之屬。

狂

狂問曰。狂亂何以屬陽明腑症。答曰重陰為顛。重陽為狂。諸經之狂皆陽盛也。傷寒陽熱極盛。至

於發狂勢亦危矣。狂之發也。少卧不飫。妄語妄行。或登高而歌。棄衣而走。甚則踰垣上屋。皆陽熱亢極使之非下不除。又太陽病不解。熱結膀胱。其人如狂。此乃下焦蓄血。少腹當鞭滿。小便自利。大便黑色。雖則如狂。初不若發狂之甚也。又有以火劫汚。遂至亡陽。發為驚狂。有慌亂恐懼之象。實非狂也。是知如狂者膀胱蓄血驚狂者。故汗妄亡陽發熱者。陽明胃腑實熱也。又問寒狂有發狂者何也。曰此陰盛陽之症。其人煩躁欲坐臥泥水中。是名陰燥。必沈遲。或見下利。清穀諸寒症。急宜溫補。不可悞用寒涼也。

不得眠

問曰不得眠何以是陽明腑病答曰不得眠陰陽皆有之其狂亂其不得眠者陽明胃熱故

也經云胃不和則卧不安胃受熱邪故不和不和故不眠也若初時目痛鼻乾不得眠者陽明經病也葛根湯主之若蒸熱自汗燥渴脈洪不得眠者陽明經腑同病散漫之熱也白虎加人參湯主之若便閉譫語潮熱自汗不得眠者陽明腑病結聚之熱也調胃承氣湯下之若傷寒邪氣已解或因食復遂至煩悶乾嘔口燥呻吟不得眠者以保和湯加芩連主之又問不眠固屬熱症有投寒藥轉甚者何也曰因汗下重亡津液心蘊虛煩致不得眠宜用酸棗仁湯矣或真武湯主之不眠似屬尋常若少陰脈沈利自利厥逆煩躁不得眠者為難治也

燥渴

問曰燥渴何以是陽明腑病答曰寒邪在表則不渴邪氣在傳裏化而為熱則渴太陽症有口渴者膀胱腑病也其初入陽明經病但漱水齶不為渴也入腑則大渴矣少陽症但口苦

亦無渴其有渴者將轉入陽明也仲景云服柴胡湯已而渴者屬陽明也三陰皆有渴因其連於胃腑故渴也是知燥渴的屬陽明症餘詳辨厥陰症消渴條下

自汗

問曰自汗何以是陽明腑病答曰傷寒在表則腠理緻密而無汗入腑則熱氣發越而汗自出矣今無汗忽變為有汗者乃熱邪入腑薰蒸如鼎沸然故令汗出也又問自汗有用桂枝及桂枝加附子湯者何也曰自汗用桂枝者太陽傷風症也用桂枝加附子湯者因發汗太多遂

通不止惡風寒而為表虛也若陽明腑病燥渴譫語孰敢用桂枝者仲景於桂枝加附子條下注曰

不渴不渴可見陽明燥渴。則無用桂枝之理矣。大抵頭痛發熱悉具者。傷風自汗也。因發汗遂漏不止也。陽虛自汗也。煩躁口渴能消水。不惡風寒而反惡熱者。陽明腑病自汗也。又問直中症亦自汗何也。曰。直中症令汗自出。脈沉遲。手足厥冷。乃真陽衰微之象。與陽明胃熱自汗。薰蒸騰沸之狀。天淵相隔矣。又問中暑自汗亦口渴。何以別之。曰。中暑自汗口雖渴。脈必弦細芤遲也。經云脉盛身熱得之。傷寒脈虛身熱得之。傷暑實者。

人參白虎湯。虛者十味香薷飲主之。

手足心腋下有汗

問曰。手足心腋下有汗。何以是陽明腑病。答曰。胃主四肢。為津液之主。今熱聚於胃致今出汗。乃津液之旁流也。經云。手足濶然汗出。大便難而譫語。

宜下之。又問。陽明中寒不能食。亦令手足汗出者何也。曰。此胃中虛冷所致。與傳經熱症。便難譫語者。自是不同。

便閉

問曰。便閉何以屬陽明腑症。答曰。陽明居中土。萬物所歸。無所復傳。傷寒三陽三陰之邪。皆得傳入。以作胃實。不大便之閉症法。當下之。然經有禁。詳列於前。不可不辨。

轉失氣

問曰。轉失氣。何以是陽明腑症。答曰。失氣者。氣下泄也。病人內有燥糞結而不通。則氣常

慎。未可再攻。是知轉

下失仲景云。欲行大承氣先與小承氣。腹中轉失氣者。方與大承氣湯。若不轉失氣。

失氣屬陽明腑也。

白虎湯 治陽明腑病。脈洪大蒸熱。潮熱譫語。燥渴自汗或胃熱發於但腹中未堅硬。大便未閉結。此陽明散漫之熱邪未結聚。故用本方和解辛涼之劑。

石膏

五錢

知母

三錢

甘草

八分

粳米

撮一

水煎服。若熱甚者倍之。又法自汗多者加入參名參白虎湯。挾濕者加蒼朮名蒼朮白虎湯。治濕溫症。按此方必燥渴潮熱自汗脈洪有此八字方可與之。若表症仍在而不燥渴者切不可用也。又太陽症發熱而渴小便不利者為膀胱病不可與白虎湯。若直中陰寒而赤煩熱。似渴非渴欲冷飲泥水。

中此真寒假熱之症。必須溫補。又有血虛發熱。症像白虎。宜用當歸補血湯。若誤投石膏知母。則傾危可立而待矣。

調胃承氣湯。治陽明腑病。潮熱譫語。便閉。繞脅硬痛。為有燥屎。此結聚之熱邪已堅實。宜下之。

大黃三錢 芒硝二錢 甘草八分

水煎服。本方去甘草。加枳實厚朴。名大承氣湯。竊按枳實消痞。厚朴去滿。芒硝潤燥。大黃瀉實。必痞滿燥實四症兼全者。方可用。若痞滿未燥。實宜小承氣湯。去芒硝恐傷下焦陰血也。燥實而未痞滿。即用本方去枳朴。

恐傷上焦陽氣也

論承氣湯有八禁

一者表不解

惡寒未除。便清長架。在裏仍在表也。法當汗解。

二者心下鞶滿半滿

半滿則邪氣尚淺。若設攻之。利遂不止。恐正氣下脫也。

三者合面赤色

面赤色為邪在表。浮大聚於上。而未結於下。故未可攻也。又面赤為戴陽。尤宜細辨之。

四者平素食少或病中反能食

平素食少。則胃氣虛。故不可攻。然病中有燥屎。即不能食。若反能食。則無燥屎。不過便鞶耳。亦未可攻也。

五者嘔多

嘔吐屬少陽邪在上焦。故未可攻也。

六者脈虛

遲為寒。攻之則呃。

七者津液內竭

病自汗出。小便自利。為津液內竭。不可攻也。宜導而通之。

八者小便少

病人平日少小便日三四行。今日再行。知其不久即入大脈腸。宜姑待之。不可妄攻也。

傷寒六經見症法終

沈氏諸脈主病詩

浮其象輕手乃得重手不見動在肌肉以上

沈金鳌撰

浮脈為陽表病。真遲風數熱緊寒因。是浮脉兼遲兼數兼緊也。各脉相兼做此。浮而有力是風熱無力而浮血弱人。此首選計。浮脉病。

寸頭疼眩目熱因風更有風痰病。

右寸肺感

關右脾虛左

中滿左不食

腹脹溲多赤澀

左足

足

膀胱糞難通。

右尺風邪客下風熱。焦故大便秘。

浮而有力為洪。

即大脉

其象極大而數按之滿指如犀波之湧起來盛衰來去長

脈洪陽盛血應虛相火炎熱病居脹滿胃翻須早治陰虛洩痢急當除。

此選計。誠濟

心經火盛內多煩。左頭病。又兼肺熱毛焦咽更乾。右也病。又肝火身疼。左頭病。又兼口枯舌乾腎虛陰火便俱難。左尺膀胱熱小便赤澗石。胃虛區。右關病。又兼口瘡頭疼。肺熱毛焦咽更乾。兼涎唾稠黏。左尺膀胱熱小便赤澗石。胃虛

浮而無力為芤。其象浮大而更按之中空，兩邊實，指下成窪，診在輕舉重按之間。

加病
左芤吐血兼心血。關上爲瘀。脇痛真氣痛。吐血目暗。左尺男人小便血。女月事

病相因。此單言血乎

芤脉之病

右芤積血在於胸。又兼血嘔血關內逢之腸胃癰。嘔血不食兼瘀血。尺多血痢與腸

紅糰彈舌如

芤脉病

浮而端直為弦。其象按之不移舉之應手端直如筩弦。

左弦頭痛還心悶。盜汗勞傷力懶。牽閏左脅疼兼痃癖。尺疼小腹脚拘攣。

此單左手

右寸膈痰多咳嗽。由肺受風寒右關胃冷腹心疼。脾胃傷冷宿食不化多飲下焦停水弦逢。尺陰症

症常從脣下侵。脾脈病

孚而脣大為虛。其象遲弱散大舉按無力豁然空不能自固。

脉虛脉亦虛。身熱為傷暑虛損疲憊。自多發熱陰虛。須早治養榮益氣。
莫蹉跎。此總言虛脉之病。

怔忡驚悸。寸常虛。血不榮心。奈若何。腹脹診閑化。食不
蒸俱。此統言左右兩手虛脉病

浮而遲細為濡

即與脉其象虛而無力。應手如散。如綿絮之在水中。輕按乃得。重按隨手而沒。

濡為亡血陰虛病。體手丹田暗已虧。汗雨夜來蒸入骨。血山崩倒濕侵脾。此總言濡脉病

也。脉病

左寸心虛。改驚悸還短氣。精神離散。左關濡。又兼榮衛不和體虛少加尺男精敗。女脫血。自汗

淋漓溲數俱。此單言左手濡脉病

憎寒關熱。濡右寸。氣乏身疲。怎得安。關上胃虛。飲食不進。脾更弱。濕不勝。則尺腸虛瀉。

下元寒。此單言右手濡脉病

浮而迢互爲長。其象不大不小。迨自若指下有餘。不過於本位。

氣血有餘。長脉見。

長脉吐有餘之病

陽明熱勢自然深。若非陽毒。

陽毒內蘊癲和癇

即是焦。

煩壯熱侵。

浮而虛大為散。

其象有表無裡。有陰無陽。按之滿指散而不聚。去來五不明。漫無根柢。渙散不收。

左寸怔忡右寸汗溢。飲左關溢應更散。右關更散。腫脈附散居兩尺。魂當斷。

沈其象輕手不得重手乃得。按至肌肉以下。著於筋骨之間。

沈

沈潛脉主陰經病。數熱。遲寒。滑有痰。無力而沈虛與氣沈而有力積兼寒。

此經言

左寸沈痰鬱飲停胸閨。主中寒痛不通。

此經言

左寸沈痰鬱飲停胸閨。主中寒痛不通。足部濁遺精血冷。

男精冷。在足病

女血冷腎虛腰及下

元瘤。

此統言左右手沈脈病

沈而不及為短。

其象兩頭無中間。有不及本位。應手而回。短脉只見寸尺。若在關部。將上不接下。不接尺矣。故前人云短而不診閨。

沈而不及為短。

其象兩頭無中間。有不及本位。應手而回。短脉只見寸尺。若在關部。將上不接下。不接尺矣。故前人云短而不診閨。

沈而不及為短。

其象兩頭無中間。有不及本位。應手而回。短脉只見寸尺。若在關部。將上不接下。不接尺矣。故前人云短而不診閨。

沈而不及為短。

其象兩頭無中間。有不及本位。應手而回。短脉只見寸尺。若在關部。將上不接下。不接尺矣。故前人云短而不診閨。

沈而微奧為細。其象小於微而常有細直而無指下尋之往來如鑿絲。

寸細應知嘔吐頻入關腹脹胃虛形。尺逢定是丹田冷。洩痢遺精號脫陰。此統言左右兩

脈細手

沈而弦長為實。其象舉手不絕。迢亘而長。不疾不徐。動而有力。血實而則脉實。

實脉為陽火鬱成發狂譫語吐頻。或為陽毒或傷食。古云脉實者水穀為病太便不通

或氣疼。此總言實脉病

寸心與面熱兼風。

左半實心中積熱口舌瘡咽喉痛

痰嗽中煩氣積胸。

右半實胸膈中熱痰嗽煩滿

肝火。

左關實腹痛滿

虛右關實脾虛少食

兼胃氣滯伏陽蒸內又

閏上見。

左足實小腹痛小便濁在尺實脣下痛便

難或時下鄉。

此統言左足手脉實病

脾。

沈極幾無為伏。

其象極重按之著骨指下隱然傷寒病一呼伏曰單伏兩手伏曰雙伏不可以陽症見陰為証乃火邪內鬱不得發越陽極似陰故脉伏也必得大

汗乃解。

又夾陰傷寒先有伏陰在內外又感寒陰盛陽衰四肢厥逆六脉沉伏須投姜桂脉乃復出表谿衝陽腎無脉則必死矣玄伏為真氣不行邪氣積伏又云痛甚者脉

必死。

伏為霍亂。食常停畜飲。頑痰積聚。真榮衛氣凝閉而厥逆。散寒溫裏莫

因循。

此絕言
伏脈病

憂鬱傷心神不守。

左胸中氣帶冷痰凝病

當關腹痛分寒。

左關伏脇下有寒氣
血冷腰脚痛右關伏

中脘積塊痛
脾胃停滯

尺部腹疼與疝疼。

左尺伏腎寒精虛症痛右尺伏臍下冷痛下

此統言左右伏脈病

沈而有力為牢。

其象似沈似伏實大而長少弦按之動而不移
寒遲疾不常往來寒熱

牢而疾必發熱。牢而遲必發

牢為喘促皮膚腫。

兩尺病失血脉宜沈細反浮大而牢是虛病

相宜。

見實脉必死此絕言左右兩手牢脉病

沈失常度曰革。

其象沈硬實大如按鼓皮一般革為陰陽不交之名

并崩漏男子營虛或夢遺。

此絕言
革脉病

革合芤弦寒與虛。

芤為虛弦為寒虛寒相搏故芤弦相合而成革脉革因為虛寒失血之便

中風感濕脹兼醫女人半產

並崩漏男子營虛或夢遺。

此絕言
革脉病

尤而天雨其象動而中止不能自還因而復動又復止尋之良久乃復還取起而加

代脉原因臟氣衰。腹疼便脹下元虧。或為吐瀉兼洩痢。女子懷胎三月兮。此總言代脈病

遲其象呼吸之間。脈僅三至來去極慢。

遲司臟病或多痰沈痼癥。假子細看有力而遲為冷痛。遲而無力是虛寒。

此總言遲脉病

寸遲心肺上焦寒。

左寸遲心上寒。精氣多慄。右寸遲肺受寒。冷痰氣短。關中寒痛不堪。左關筋寒急。手足冷。脇下痛。右關中焦寒。脾胃傷冷。食不化。

尺腎虛

故便濁

女不月。右為洩瀉疝牽丸。

右關臟寒。洩瀉小腹冷痛。腰脚重而無此總言。左右兩手遲脈病。

遲而細弱為微。

其象極細而弱。若有若無。多兼於遲。按之如欲絕之狀。

氣血微兮脉亦微。惡寒也。發熱也。陰微。

汗淋漓。男為勞極諸虛候。女作崩中帶。

下醫此總言

寸微氣促與心驚。

右寸中寒。痰少氣冷。不化。

左寸心憂陽榮血不足。

關脉微時脹滿。

左關微。四肢寒冷拘急。

右關微。胃寒氣脹食不化。

脾虛噫氣。心腹間冷疼。

尺部見之精血弱。

左尺微傷。

傷精尿血。

臟寒洩瀉痛呻吟。

左尺微臟寒洩

痛此總言左右

而手厥脈病

痛此總言左右

遲而無力為弱。其象極委而沈細快而不前。按之如欲絕舉手即無。弱猶愈於微。

脈弱陰虛陽氣衰。

氣虛則脈弱。十弱陽虛。關弱胃虛。尺弱陰虛。
弱為陽陷入陰。精氣不足之候。亦主筋也。

惡寒發熱骨筋萎多

驚多汗精多洩益氣周營。

周言弱脉必宜補。

及早醫

此總言弱脈病。

寸汗心虛。

左寸弱陽虛。心博自汗。

右身冷短氣閑中筋萎。

人兼陽中筋弱。肝主筋。左閑弱。故筋萎少。又兼女人主產後客風面腫。

胃脾虛。

右閑弱。

而食不欲知陽陷陰微病。骨痛耳聾。

左足弱。腎虛之故。

糞數遺痛。

此總言左足弱脈病。

遲而有力為緩。

其象比浮而稍大似遲而小疾。一息四至來往緩呼吸徐。緩脉有二。從容和緩者為正脈。前人所云諸病脉緩為胃氣弱。不治自愈者是。若氣無衰而緩遲則為緩。

緩脈緩營衛衰或痺。

緩而細。此總言緩脉病。

或濕。

沈緩而細。

或脾虛。

緩而滑。

上為項強下脚軟浮風傷風。

沈緩兼浮。

弱。

緩兼沈血細區分。此總言緩脉病。

弱氣衰弱。

緩脉病。

寸緩心虛。

左寸緩心氣不足。怔忡多。又兼項背拘急痛。

肺則浮。

左寸緩肺氣不足。

當關風眩。

左關緩風虛頭暉。

胃虛求弱氣虛。

右關緩胃。

尺為腎冷便頻數。

左尺緩腎虛。冷小便多。弱風氣閉滯。

下寒風秘步常憂。

右尺緩下寒脚。

屏而寺上為吉。其象來時緩甚。時一止復又來。令人云陰凝則結。又云結脉亦因思慮過度。脾

結脉皆因氣血凝老痰結滯苦沈吟內生積聚外癰腫癰癥亡陽汗自沐主病瘕
癥結七情鬱結老痰滯結一切氣血凝結又為亡陽為汗下內為
積外為癰腫兼浮寒結兼沉氣結此節總言結脈之病症

數其象一息六至數然來

數脉為陽熱可知只將君相火來醫實宜涼瀉虛宜補肺病秋深却忌之

總此

寸數咽喉口舌瘡吐紅咳嗽肺生病左右寸同又當關胃火右關數謂火脾熱

數肝火目赤尺用滋陰降火湯左右尺同主腎火微小便黃赤大便閉塞

并肝火關

數而弦急為緊其象來時勁急按之長左右彈指舉之若牽絛轉索之狀又名急脉

緊為諸痛主於寒癖積風癧吐冷痰浮緊汙之緊兼浮表寒身痛沈緊下緊兼沉裡寒腹痛人迎

因傷寒氣口食

此總言

左右兩手數脈病

左頭目項左頭緊頭熱

目痛項強

右鼻脣右鼻脣

目痛項強

關從心腹腸筋尋左關心腹滿痛腸痛筋急右關脾腹痛吐逆

急右關脾腹痛吐逆

尺為腰脚

脅下痛知是奔豚與疝疾。

左心腰脚脅下痛又兼小便難右尺下焦氣築痛此統言兩手繫脈病

數而時止為促

其象來時數時一止復又來徐徐無一定有迫促之狀凡脉促者亦病氣痛亦病拂鬱亦病氣血不疏通

脈促惟將火病醫。

三集有皆於血之熱此

其因有五細推之。

氣血熱痰飲

時咳嗽皆痰積或發狂

癥與毒疽。

首總言促脈病

數見關中為動

其象數見關中形圓如豆無頭無尾厥動搖尋之有舉之無不往不來不離其處動脈亦為神氣不安脫血虛勞

其象數見關中形圓如豆無頭無尾厥動搖尋之有舉之無不往不來不離其處動脈亦為神氣不安脫血虛勞

動脈專司氣與驚汗因陽動熱因陰或為洩利拘攣病男子亡陽女子崩。

此總言動脈病

滑其象往來流利如珠走盤不進不退。

滑脈為陽元氣衰痰生百病食生災。

浮滑風痰滑數痰火短滑宿食

上為吐逆下畜血女脉

左滑膈痰用生區土心驚古強緣熱故當閏宿食肝脾熱。左心腰脚脅下痛又兼小便難右尺口和時定有胎

女人督脈滑血熱經不通和滑為有名極言滑脈病

寸滑膈痰用生區土心驚古強緣熱故當閏宿食肝脾熱。

左心腰脚脅下痛又兼小便難右尺甲熱口臭肚氣宿食不化渴

病癥淋看尺部

左有同此脉病

濇其象虛細而遲來往極難一止復來三五不調

濇緣血少或傷精反胃亡陽汗雨淋寒濕入營腎為血女人非孕即無經人

左尺濇無孕生血少有孕
胎病或漏此總言濇脈病

寸心虛痛乖營衛

左寸心肺虛耗不安及冷氣心痛右
營衛不和焦冷疼氣短臂痠

脾弱

右關濇胃冷多嘔脾弱不食

肝虛

左關弱肝虛血散脹脹脇

滿身關內逢左尺傷精兼及症右寒小腹足脛痛

又兼大便溝津液不足

此總言和濇脈病

人迎

左手關前一分為人迎

表候人迎屬腑陽

人迎主外感六淫

風浮暑弱緊寒傷

如人迎脉浮吐濁應沈細火熱
傷風六淫做此

數

火洪數熟虛數

四末清寒表散良

人迎又主四肢病

氣口

右手關前一分為氣口

氣口為陰裏臟看

氣口候內傷七情及傷飲食屬裡臟也陰也

怒濡憂濇散因歡

如氣口脉濡即因傷怒餘做此

恐沈思

結驚多動悲緊還推何部下

診得氣口濡濇等脉并看與何部相關即知何臟受病如氣口脈濡即屬肝病而肝脉又適弦硬是也此單

言氣口內傷

七情之病

脾

飲食傷留臟腑因通腸快胃法相應人迎氣口俱沈緊夾食傷寒日病增此首言內氣口內傷飲食之

增病及人迎氣口俱傷之症

共錄脈訣四十八首外有奇經八脉因別處已有故不復錄云

瀨湖脈訣各有主病歌辭然只言其梗概余撰脈象統類各脉所主之病已詳但瑣碎無文義相貫難於記憶因倣瀨湖法作二十七脉主病詩閱者讀此復按核統類則某病主某脈病某病合某脈庶益洞然於中矣

沈景齋記

四言脉訣

浮大數動渭比之諸脈為有餘陽也沉濇弱弦微比之諸脈為不及陰也

脉為血脉

百骸貫通

大會之地

寸口朝宗

關前為陽

關後為陰

陽寸陰尺

先後推尋

男子之脈

右大為順

女人之脈

右大為順

男尺恒虛

女尺恒盛

關前一分

人命之主

左為逆

右為氣口

神門屬腎

兩在關後

人無二脈

必死不救

五藏不苟

各有本脈

左寸之心

浮大而散

右寸之肺

浮濶而短

肝在左關

沈而弦長

腎在左尺

沈而濡

右關屬脾

脈象和緩

右尺相火

與心同斷

若夫時令

亦有平脉

春弦夏洪

秋毛冬石

四季之脉

和緩不忒

飲食勞倦

診在右關

有力為實

無力虛看

太過實強

病生於外

不及虛微

病生於內

四時百病

胃氣為本

平和之則

五至無疴

閏以太息

三至為遲

遲則為冷

六至為數

數即熱症

轉遲轉冷

轉數轉熱

遲數既明

浮沈須別

浮沈遲數

辨内外因

外因於天

內因於人

天有陰陽

風雨晦明

人喜怒憂

思悲恐驚

浮表沈裡

遲寒數熱

浮數表熱

沈數裡熱

浮遲表寒

沈遲冷結

浮脈法天

輕手可得

浮無力濡

沉無力弱

泛在上

如水漂木

有力洪大

來盛去悠

沉極力牢

虛極則散

渙漫不收

有邊無中

其名曰芤

浮小為濡

綿浮水面

學亟力革

三部有力
其名曰實

三部無力

其名曰虛

三部無力

按之且小

似有似無

微脈可考

三部無力

按之且大

微脈可考

三部無力

惟中無力

散脈可察

漫不收

弦脉可求

伏脉可求

弦細端直

濡甚則微

不任尋按

更有革脈
其象內空

芤弦合看

有力為牢
其象內堅

大而弦長

柔小如綿

細直而軟

如蜘蛛絲然

遲細為牆

往來極滯

春柳相似

往來流利

滑脈可識

有力為緊

切繩極似

切繩極似

動脈無惑

短長與弦

別有三脉

不及本位

短脉可原

過於本位

長脉綿綿

長脉綿綿

沈脈沈地

如投水石

沉極為伏

推筋着骨

有力為牢

大而弦長

牢甚則實

幅幅而強

無力為弱

柔小如綿

細直而軟

如蜘蛛絲然

遲脈屬陰

一息三至

緩脈和匀

春柳相似

遲細為牆

往來極滯

結則來緩

止而復來

代亦來緩

止數不乖

滑脈可識

有力為緊

切繩極似

切繩極似

動脈無惑

短長與弦

別有三脉

不及本位

短脉可原

過於本位

長脉綿綿

長脉綿綿

且勁曰：弦
勁左右彈

長而端直

狀類弓弦

四肢一形

各有主病

脈有相兼還須細訂

浮脈主表

府病所居

有力為風

無力血虛

浮遲表冷

浮數風熱

浮緊風寒

浮緩風濕

浮虛傷暑

浮芤失血

浮洪虛火

浮微勞極

浮濡陰虛

浮散虛劇

浮弦痰飲

浮滑痰熱

沈脉主裡

為寒為積

有力痰食

無力氣鬱

沈遲虛寒

沈數熱伏

沈緊冷痛

沈緩水蓄

沈牢痼冷

沈實熱極

沈弱陽虧

沈細虛濕

沈弦飲痛

沈滑食滯

沈伏吐利

陰毒積聚

沈遲主藏

陽冷相干

有力為痛

無力虛寒

沉伏閉塞時謂之

甚不得吐瀉脉也

沈伏吐利

主吐主狂

有力實熱

無力虛瘡

數脉主府

一脈

主司痰飲

右

有關主食

尺為畜

在關

寸必吐逆

濇脉少血

亦主寒濕

反胃結腸

自汗可測

弦脉主飲

木侮脾經

陰弦頭痛

食陽弦腹疼

長則氣治

短則氣病

細則氣衰

大則病進

浮長風癘

沈短痞塞

洪則陽傷

食緊主寒痛

緩大風虛

緩細濕痺

緩濇血傷

緩滑濕痰

濇小陰虛

弱小陰竭

陽微惡寒

陰微發熱

陽動汗出

為痛為驚

陰痛動則熱

崩中失血

虛寒相搏

其名為革

男子失精

女人漏血

陽盛則促

肺癰熱毒

陰盛即結

疝瘕積鬱

代則氣衰

濃或泄膿血

傷寒霍亂

跌打悶絕

瘡疽痛甚

女胎三月

脉之主病

有宜不宜 陰陽順逆 吉凶可推

中風之脉 恰喜浮遲

脈之主病

堅大急疾

其凶可知 傷寒熱病

脉喜浮洪 沈微濶小

症反必凶

汗後脉靜

身涼則安 汗後脉躁

熱甚必難

陽症見陰

陰症見陽

雖困無害 勞倦內傷

脾脉虛弱 汗出脉躁

死症可察

瘡脉自弦

弦數者熱 弦遲者寒

代散則絕 潟瀉下痢

沈小滑弱

實大浮數

發熱則惡 嘴吐反胃

浮滑者昌 弦數緊濶

結腸者老

霍亂之候

脉代勿訝 煙逆遲微

是則可嗟 噎脉多浮

浮濡易治

嘔吐反胃

脾虛有痰也浮為虛

滑為痰是為順

脈故曰昌也

沈伏而緊

死期將至

喘息檻眉

浮滑是順

沈濶肢寒

均為逆症

火熱之症 洪數為宜 微弱無神

根本脫離

骨蒸發熱

脈數而虛

熱而濶小

必須其軀

勞極諸虛

浮軟微弱

土敗雙弦

火炎則數

失血諸症

脉必現芤

緩小可喜

數大堪憂

畜血在中

牢大却宜

沈濶而微

速愈者希

三消之脉

數大者生

細微而濶

短應手堪驚

小便淋閉

鼻色必黃

實大可療

濶小知亡

癲乃重陰

狂乃重陽

浮濶急象

沈急凶殃

癥宜虛緩

沈小急實

或但弦急

必死不失

心腹之痛

其類有九

細遲速愈

浮大延久

症屬肝病

脉必弦急

鼻頭色黃必
患小便難

癰本風痰脉

見浮緩為宜

牢急者生

弱急者死

黃疸濕熱

洪數偏宜

不妨浮大

微濶難醫

脈滿之脉

浮大洪實

細而沈微

岐黃無術

五藏為積六府為聚

實強可生

沈綯難愈

中惡腸脹

緊細乃生

浮大維何邪氣已深

鬼祟之脈

左右不齊

乍大乍小

乍數乍遲

瘡疽未潰脉宜洪大

及其已潰

洪大始戒

肺瘡已成

寸數而實

肺痿之形數而無力

肺瘡色白

脈宜短濶

浮大相逢

氣損血失

腸瘡實熱

沈綯無根

其死可測

婦人有子

陽搏陰別

少陽動甚其胎已結

兩尺陰脈搏指

有力兩陽脈

滑疾不散

胎必三月

但疾不散

五月可別

有力兩陽脈

滑疾不散

胎必三月

但疾不散

五月可別

左疾為男右疾為女

不搏指而別於

兩尺斯為有子女復加箕

男復如斧

欲產之脉

散而離經

新產之脉

小緩為應

房有核者則主有子也。有

實大弦牢

其凶可明

少陰動甚。少陰尺脈動甚也。

奇經八脉

不可不察

直上直下

尺寸俱牢

中央堅實

衝脈衝昭

胸中有寒

逆氣裡急

痞氣攻心

支滿漏失

直上直下

尺寸俱浮

中央浮起

督脈可求

腰背強痛

風癇為憂

寸口丸丸

緊細實強長

男

男疝女瘕

任脈可求

寸左右彈

陰蹻可決

尺左右彈

陽蹻可矣

關左右彈

帶脈之決

尺外斜上

至寸陽維

尺內斜上

至寸陰維

脈有反關

動在臂後

別有列缺

不干症候

經脈病脉

業已昭詳

將絕之形

更當度量

心絕之脈

如操帶鉤

轉豆躁疾 一日可憂

肝絕之脈

循刃責耳責

新張弓弦 死在八日

脾絕雀喙

又同屋漏

一似水流 還如糴覆

肺絕維何

如風吹毛

毛羽中膚 三日而號

腎絕伊何

發如攀索

辟彈石 四日而作

命脉將絕

魚翔蝦游

至如湧泉 罢可挽留

藥性賦

東垣著

寒性

諸藥識性此類最寒。犀角解乎心熱。羚羊清乎肺肝。澤瀉利水通淋而補陰不足。海藻散癰破氣而治癥何難。聞知菊花能明目而清頭風。射干療咽閉而消癰毒。薏苡理腳氣而除風濕。藕節消瘀血而止吐衄。瓜蔞子化痰潤肺喘。又且寬中車前子止瀉利小便。更兼行血是以黃藥瘡兒鈴嗽醫地骨皮有退熱除蒸之妙。荷葉宜消風清腫之施。寬中下氣枳殼緩而枳實急矣。療肌解表乾葛先而柴胡次之。百部治肺熱咳嗽可用梔子涼心腎。鼻衄最宜玄參治結熱毒癰。清利咽喉升麻消風熱腫毒。發散瘡痍嘗聞膩粉抑肺而斂肛門。金箔鎮心而安魂魄。茵陳主黃疸而利水瞿。

麥治熱淋之有血。朴硝通大腸。破血而止癰癧。石膏墜頭疼。解肌而消煩渴。前胡除內外之痰實。滑石利六腑之澀結。天門冬止嗽。補血冷而潤肝心。麥門冬清心解煩渴而除肺熱。又聞治虛煩除噦嘔。須用竹茹。通秘結。導瘀血必資大黃。宣黃連治冷熱之癆。又厚腸胃而止瀉。淫羊藿療風寒之痺。且補陰虛而助陽。茅根止血與吐衄。石韋通淋與於小腸。熟地黃補血。又療虛損生地黃宣血。更醫眼瘡。赤芍藥破血而療腹疼。煩熱亦解。白芍藥補虛而生新血。退熱尤良。若乃消腫滿逐水於牽牛。除毒熱殺蟲於貫眾。金鈴子治疝氣而補精血。萱草根治五淋而消乳腫。側柏葉治血止崩漏之疾。香附子理血氣婦人之用地膚子利膀胱。可洗皮膚之風。

明目治頭風而消痰嗽壅。又況荆芥穗清頭目便血疏風散瘡之
用。瓜蔞根療黃疸毒癰。消渴解痰之憂。地榆療崩漏止血止痢。昆
布破癰氣散氣散瘡。癰療傷寒解虛煩。淡竹葉之功倍除結氣破瘀
血。牡丹皮之用同知母止嗽而骨蒸退。牡蠣蠣澀精而虛汗收。則
母清痰止咳嗽而利心肺。桔梗下氣利胸膈而治咽喉。若夫黃芩
治諸熱兼主五淋。槐花治腸風亦醫痔瘻。常山理痰結而治溫瘧。
葶藶瀉肺喘而通水氣。此六十六種藥性之寒。又當考圖經以博
其所治。觀方書以參其所用焉。其庶幾矣。

熱性

藥有溫熱。又當審詳。欲溫中以草撥。用發散分以生薑。五味子止
嗽痰。且滋腎水。溫內脾。療勞瘵更壯元陽。原夫川芎祛風濕補血。

清白頭續斷治崩漏。益筋強脚。麻黃表汗以療咳逆。韭子助陽而
醫白濁。川烏破積有消瘀治風痺之功。天雄散寒為去濕助精陽
之藥。觀夫川椒達下乾薑煖中。葫蘆巴治虛冷之疝氣。生卷柏破
癥瘕而血通。白朮消痰壅溫胃。兼止吐瀉。菖蒲開心氣散冷更治
耳聾。丁香快脾胃而止吐逆。良薑止心氣痛之攻衝。肉蓯蓉填精
益腎。石硫黃煖胃驅虫。胡椒主去痰而除冷。秦椒主攻痛而治風。
吳茱萸療心腹之冷氣。靈砂定心臟之怔忡。蓋夫散腎冷助脾胃
須草澄茄。療心疫破積聚用蓬莪术。縮砂止吐瀉安胎化酒食之
劑。附子療虛寒翻胃。壯元陽之加白朧。治冷瀉療癰止痛於乳
香。紅朧蕤止吐酸。消血殺蟲於乾漆。豈不知鹿茸生精血。腰脊崩
漏之均補。虎骨壯筋骨。寒濕毒風之並祛。檀香定霍亂而心氣之

痛愈鹿角秘精髓而腰脊之疼除消腫益血於米醋下氣散寒於
紫蘇。扁豆助脾則酒有行藥破血之用。麝香開竅則葱為通中發
汗之需。嘗觀五靈脂治崩漏理血氣之刺疼。麒麟竭止血出。療金
瘡之傷折。麋茸壯陽以助腎。當歸補虛而養血。烏賊骨止帶下且
且除崩漏。目翳。鹿角膠住血崩能補虛羸勞絕。白花蛇治癱瘓除
風痒之癩疹。烏梢蛇療不仁去瘡癰之風熱。圖經云烏藥有治冷
氣之理。禹餘糧乃療崩漏之因。巴豆利痰水能消積熱獨活療諸
風。不論久新山茱萸治頭暉遺精之藥。白石英醫咳嗽吐膿之人。
厚朴溫胃而去嘔脹消痰亦驗。肉桂行血而療心痛止汗如神。是
則鯽魚有溫胃之功。代赭石鎮肝之劑。沈香下氣補腎定霍亂之
心疼。橘皮開胃去痰導壅滯之逆氣。此六十種藥性之熱。又當博

本草而取治焉

溫性

溫藥總括。醫家素諳。木香理乎氣滯。半夏主於風痰。蒼朮治目盲。燥脾去濕。宜用蘿蔔去膨脹。下氣製麵尤堪。況夫鍾乳粉補肺氣。兼療腎虛。青鹽治腹疼。且滋腎水。山藥而腰濕能醫。阿膠而痢嗽皆止。赤石脂治精濁而止瀉。兼補崩中。陽起石暖子宮以壯陽。更療陰痿。誠以紫苑治嗽。防風去_祛風。蒼耳子透腦涕止。威靈仙宣風氣通細辛去頭風。止嗽而療齒痛。艾葉止崩漏。安胎而醫痢。紅羨活明目。驅風除筋掣。腫痛白芷止崩治腫。療痔漏瘡癰。若乃紅藍花通經治產。後惡血之餘。劉寄奴散血。療湯火金瘡之苦。減風濕之痛。則茵芋葉療折傷之症。則骨碎補。藿香葉辟惡氣而定霍亂。

草菓仁溫脾胃而止嘔吐。巴戟天治陰疝白濁補腎尤滋玄胡索理氣痛血凝。調經有助。嘗聞欵冬花潤肺去痰嗽以定喘。肉荳蔻溫中止霍亂而助脾。撫芎走經絡之痛。何首烏治瘡疥之資。薑黃能下氣破惡血之積。防己宜消腫去風濕之施。藁本除風主婦人陰痛之用。仙茅益腎扶元氣虛弱之衰。乃曰破故紙溫腎補精髓與勞傷。宣木瓜入肝療脚氣并水腫。杏仁潤肺餘止嗽之劑。茴香治疝氣腎疼之用。訶子生津止渴兼療滑泄之苛。秦艽攻風逐水又除肢節之痛。檳榔豁痰而逐水。殺寸白蟲。杜仲益腎而添精去腰膝重。當知紫石英療驚悸崩中之疾。橘核仁治腰疼疝氣之瘕。諸血之鮮。益智安神治小便之頻數。麻仁潤肺利六府之燥堅抑。金櫻子兮澀遺精。紫蘇兮下氣涎淡。豆豉發傷寒之表。大小薊除

又聞補虛弱。排瘡膿。莫若黃芪。強腰脚。壯筋骨。無如狗脊。免絲子。
補腎以明目。馬蘭花治疝而有益。此五十四種藥性之溫。更宜參
圖經而默誌也。

平性

詳論藥性。平和性存。以硝砂而去積。用龍齒以安魂。青皮快膈去
除膨脹。且利脾胃。艾實益精。治白濁。兼補真元。原夫木賦草去目
翳。崩漏亦醫。花荳石治金瘡。血行則却。決明和肝氣。治眼之劑。天
麻主脾濕祛風之藥。甘草和諸藥而解百毒。蓋人性平。石斛平胃
氣而補腎。虛更醫。腳弱觀夫商陸治腫。覆盆益精。琥珀安神而散
血。硃砂鎮心而有靈。牛膝強足。補精兼療腰痛。龍骨止汗住濕。更
治血崩。甘松理風氣而痛止。蒺藜療風瘡而目明。人參潤肺寧心。

開脾助胃蒲黃治崩止血消瘀調經豈不以南星醒脾去驚風痰
吐之憂三稜破積除血塊氣滯之症。沒石主泄瀉而神效。阜角治
風痰而響應桑螵蛸療遺精之洩。鴨頭血醫水腫之盛。蛤蚧治勞
嗽牛蒡子疏風壅之痰。全蠍主風癱酸棗仁去怔忡之病。嘗聞桑
寄生益血安胎且止腰痛大腹子去膨下氣亦令胃和小草遠志
俱有寧心之妙木通猪苓尤為利水之多蓮肉有清心醒脾之用
沒藥在治瘡散血之科郁李仁潤腸宣水去浮腫之疾。茯苓神寧心
益智除驚悸之疴白茯苓補虛勞多在心脾之有準赤茯苓破結
血獨利水道以無毒因知麥蘖有助脾化食之功小麥有止汗養
心之功白附子去面風之游走大腹皮治水腫之泛濫椿根白皮
主瀉血桑根白皮主喘息桃仁破瘀血兼治腰疼神麴健脾胃而

進飲食。五加皮堅筋骨以立行。柏子仁養心神而有益。抑又聞安
息香辟惡。且止心腹之痛。冬瓜仁醒脾。實為飲食之資。燭蠶治諸
風之喉閉。百合斂肺勞之嗽。姜赤小豆解熱毒。瘡腫宜用。枇杷葉
下逆氣。嘔噦可醫。連翹排瘡濃與腫毒。石楠葉利宜筋骨與毛皮。穀
藥養脾。阿魏除邪氣而破積。紫河車補血。大棗和藥性以開脾。然
而鼈甲治勞瘧。兼補破癩瘕。龜甲堅筋骨。更療崩疾。烏梅主便血。
瘡痢之用。竹懸治中風聲音之失。此六十八種平和之藥。更宜參
本草。而求其詳悉也。

妊娠服藥禁歌

蚯斑水蛭及蚕蟲。烏頭附子配天雄。野葛水根并巴豆。牛膝薏苡與蜈蚣。三棱茺花
代顏麝。大戟蟬蛻黃雌雄。牙硝芒硝大黃桂。槐花牽牛阜角同。半夏南星與通草。
瞿麥乾薑桃仁通硝砂。乾漆蟹爪甲地膽茅根都失中。

仲景傷寒舌胎歌三十六集終

第一舌

龜純

白胎滑是邪初入。有熱丹田胸有餘寒。此為少陽半表里。小柴梔豉治之宜。

第二舌

純紅

若是純紅熱蓄中。透頂清純散可宗。猪牙皁角當歸末。細辛白芷又相同。

第三舌

黑純紅

外紅內黑症如何。熱邪入裡火炎多。大柴涼膈施堪治。須教一服便安和。

第四舌

純紅

舌見紅而黑點多。熱乘虛入發班瘡。治用元參升葛解。白虎參湯亦可和。

第五舌



大紅中有大紅星。少陽君火熱之徵。此際須防黃欲發。五苓散裡下茵陳。

第六舌



舌紅尖見黑和青。腎熱從來有此徵。堪取石羔竹葉治。醫家能用見斯真。

第七舌



淡紅兩斤黑圈沿。餘熱遺於胞絡間。又知邪火相鬱結。方中承氣急須煎。

第八舌

純紅人裂炎蒸熱涼膈從來人共稱。

第九舌

純紅點點如虫行。小承氣下自然清。

第十舌



一个純紅大舌頭。中間乾硬黑長求。更如有刺真難治。調胃承氣下不愁。

第十一舌



舌見紅而內黑紋。理中四逆合劑攻。

第十二舌



凡此百無一治。

若還純黑何須治。名為死現因求功。

第十三舌

黃胎白

舌黃尖白表邪留解散之餘攻始優便黃涼膈硝黃入尿癃五苓
益元木通求。

第十四舌

黑白

舌胎中黑白圈治病初發此亦危然好將調承湯下醫用是心
傳。

第五十舌

多紅白

中紅根黑白其尖好水不堪五苓先。

第十六舌

白胎

本色中間有白胎又有黑星攤因存表病宜涼膈表除調胃下苓
第十七舌 灰色

灰色中間兩黑條。熱乘腎與命門。朝急須解毒湯多服。遲則難醫。
自焦。

第十八舌

微黃色

初病微黃。語發譖。此由失汗表邪傳。必須汗下兼行是。雙解還同解毒湯。

第十九舌

膚微黃

白胎中結外微黃。作瀉還同解毒湯。若是惡寒。何以治五苓散服。是神方。

第二十舌

純黃

純黃表病未能除。小柴胡湯天水如劑驅可下大柴當。自下表裡。審症施。

第二十一舌

黃色本

外沿本色內黃胎初然必變黑將來急須調胃承湯下下遲轉黑治之難

第二十二舌

白本色

本色邊傍左白胎自許難施下藥來但將白虎湯煎服參入三錢豈狠猜

第二十三舌

白本色

白胎在左右滑如何往來寒熱小柴和

第二十四舌

白本色

若是白胎在左滑臟結窮丹不治多

第二十五舌

黃色白

四圍見白舌中黃渴煩嘔作燥須防。兼表五苓加六一待其黃退
下無妨。

第二十六舌



黃舌中間有黑星。六腑邪將入臟行急宜調胃承湯。○次施和解
治之宜。

第二十七舌



舌黃尖白為何因。裡多少治病非輕。○天水一劑涼膈二合而並進
熱須清。

第二十八舌



舌黃隔瓣為何因。熱邪入胃毒深沉。更加心中煩而渴。大承湏下
下之勤。

第二十九舌

墨迹
紅紙

舌中黑灰外微紅失下於前熱不清大承三下方能退五劑不退莫求生。

第三十舌

墨迹
紅紙

舌黃黑點亂稠生其人必渴必言譫脈滑可生脉瀉死尋摸衣床不可醫若下大承黑糞見雖求扁鵲也無如。

第三十一舌

墨迹
紅紙

舌黃中黑至尖頭熱氣深沉十九危惡寒若甚人多死不然下利承氣湯。

第三十二舌

墨迹
紅紙

淡黑中心外淡紅惡風表未罷何宗双解須加解毒散汗餘急下

胃承湯

第三十三舌



灰色尖黃不惡風。浮脉可下大柴宗。惡寒解毒和双解。下來黑糞。
必須傾。

第三十四舌




舌頭灰黑。黑紋多。更兼脉實大承和。若見脉浮並水渴。必須涼膈
救沉疴。

第三十五舌



舌根微黑與尖黃。脉滑從來下可康。惡風雙解微微汗。下利還須
解毒湯。

第三十六舌



009.365
4010

舌根微黑淡紅中尖黃隱見或星紋。脉實大承須急下涼膈浮而渴飲家。

雙解散

防風

川芎

當歸

芍藥

薄荷

麻黃

連翹

石羔

黃芩

桔梗

滑石

甘草

荆芥

白朮

梔子

生姜

每服三錢加大黃芒硝名防風通聖散