


T. 7970/4461g (15)

3

|||



本草綱目草部第十五卷

草之四

隰草類上五十二種

菊 本經

野菊 拾遺

菴藷 本經 對廬附

蒼 本經

艾 別錄 夏臺附

千年艾 綱目

茵陳蒿 本經

青蒿 本經

黃花蒿 綱目

白蒿 本經

角蒿 唐本

蘆蒿 拾遺

馬先蒿 本經

陰地厥 圖經

牡蒿 別錄

九牛草 圖經

菟蔚 本經 卽益母草

鑿草 拾遺

薇薺 本經 無心草附

夏枯草 本經

劉寄奴草 唐本

曲節草 圖經 麗春草 圖經

旋覆花 本經

青箱子 本經 紅天靈草 思莫子附

雞冠花 唐祐

紅藍花 開寶 番紅花 綱目

燕脂 綱目

大薊小薊 別錄 續斷 本經

苦芙 別錄

漏蘆 本經 飛廉 本經

苧麻 別錄

苧麻 唐本 大青 別錄

小青 圖經

胡盧巴 嘉祐 蠶實 本經

天名精 本經

惡實 別錄 莫耳 本經

天名精 本經

鶴 飛 豨薟 唐本

箬 綱目

蘆 別錄 苳蕉 別錄

蘘荷 別錄

麻黃 本經 木賊 嘉祐

石龍芻 本經

龍常草 別錄 燈心草 開寶

右附方舊一百四十四新二百八十六

本草綱目草部第十五卷

草之四

隰草類上五十三種

菊

本經上品

釋名節華本經女節別錄女華別錄女莖別錄日精別錄更生別錄

別傳延年

治藩

金蕊

陰成

周盈

別錄時珍曰按

陸佃埤雅云菊本作鞠從鞠鞠窮也月令九月菊有黃華華事至此而窮盡故謂之鞠節華之名亦取其應節候也崔實月令云女節女華菊華之名也治藩日精菊根之名也抱朴子云仙方所謂日精更生周盈皆一菊而根莖花實之名異也頌曰唐天寶單方圖載白菊云原生南陽山谷及田野中潁川人呼為回峰菊汝南名茶苦蒿上黨及建安郡順政郡並名羊歡草河內名地薇蒿

集解

別錄曰菊花生雍州川澤及田野正月采根
 三月采葉五月采莖九月采花十一月采實
 皆陰乾弘景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味其
 葉可作羹食者為真菊一種青莖而大作蒿艾氣
 味苦不堪食者名苦蕒非真菊也葉正相似惟以
 其苦別之南陽鄆縣最多今近道處處有之取種
 便得又有白菊莖葉都相似惟花白五月取之仙
 經以菊為妙用但難多得宜常服之藏器曰白菊
 生平澤五月花紫白色頌曰處處有之以南陽菊
 潭者為佳初春布地生細苗夏茂秋花冬實然種
 類頗多惟紫莖氣香葉厚至柔者嫩時可食花微
 大味甚其者為真其莖青而大葉細氣烈似蒿艾
 花小味苦者名苦蕒非真也南陽菊亦有兩種白
 菊葉大如艾葉莖青根細花白莖黃其黃菊葉似
 茼蒿花蓋都黃今服餌家多用白者又有一種開
 小小花瓣下如小珠子謂之珠子菊云入藥有佳
 宗奭曰菊花近世有二十餘種惟單葉花小而黃
 綠葉色深小而薄九月應候而開者是也鄧州白

菊單葉者亦入藥餘皆醫經不用瑞曰花大而香
 者為甘菊花小而黃者為黃菊花小而氣惡者為
 野菊時珍曰菊之品凡百種宿根自生莖葉花色
 品品不同宋人劉蒙泉范至能史正志皆有菊譜
 亦不能盡收也其莖有株蔓紫赤青綠之殊其葉
 有大小厚薄尖禿之異其花有千葉單葉有心無
 心有子無子黃白紅紫間色深淺大小之別其味
 有甘苦辛之辨又有夏菊秋菊冬菊之分大抵惟
 以單葉味甘者入藥菊譜所載其菊鄧州黃鄧州
 白者是矣其菊始生于山野今則人皆栽植之其
 花細碎品不甚高蓋如蜂窠中有細子亦可搽種
 嫩葉及花皆可燻食白菊花稍大味不甚其亦秋
 月采之菊之無子者謂之牡菊燒
 灰撒地中能死蠹鼠說出周禮

花

葉根莖

氣味苦平無毒

別錄曰其損之曰其者入藥苦者不入藥果曰

苦其寒可升可降陰中微陽也時珍曰本經言菊
 花味苦別錄言菊花味甘諸家以甘者為菊苦者

本草綱目卷之十五
為苦蕙惟取其者入藥謹按張華博物志言菊有
兩種苗花如一惟味小異苦者不中食范至能譜
序言惟其菊一種可食仍入藥餌其餘黃白二花
皆味苦雖不可餌皆可入藥其治頭風則白者尤
良據此二說則是菊類自有其苦二種食品瀕用
茸菊入藥則諸菊皆可但不得用野菊名苦蕙者
爾故景煥牧豎閑談云真菊延齡野菊泄人正知
黃精益壽鉤吻殺人之意之才曰木及枸杞根桑
根白皮
為之使

主治諸風頭眩腫痛目欲脫淚出皮膚死肌惡風

濕痺久服利血氣輕身耐老延年本經療腰痛去來

陶陶除胸中煩熱安腸胃利五脉調四肢別錄○

緩治頭目風熱風旋倒地腦骨疼痛身上一切游

風令消散利血脉並無所忌甄權作枕明目葉亦明

目生熟並可食大明養目血去翳膜元素主肝氣不足

好古

白菊氣味苦辛平無毒

主治風眩能令頭不白弘景染髭髮令黑和巨勝茯

苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

發明

震亨曰黃菊花屬土與金有水與火能補陰

血故養目時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備
受四氣飽經露霜葉枯不落
花稿不零味蕪其苦
性稟平和昔人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知
其得金水之精英尤多能益金水二臟也
補水所以制火益金所以平木木平則風息火降則熱除

用治諸風頭目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人其苗可蔬葉可啜花可餌根實可藥囊之可枕釀之可飲自本至末罔不有功宜乎前賢比之君子神農列之上品隱士采入酒等騷人餐其落英費長房言九日飲菊酒可以辟不祥神仙傳言康風子朱孺子皆以服菊花成仙荊州記言胡廣久病風羸飲菊潭水多壽菊之貴重如此是豈群芳可伍哉鍾會菊有五美贊云圓花高懸準天極也純黃不雜后土色也早植晚發君子德也冒霜吐穎象貞質也孟中體輕神仙食也西京雜記言采菊花莖葉雜秫米釀酒至次年九月始熟用之

附方 舊方六 服食其菊 玉函方云壬子喬變白增

采苗名曰玉英六月上寅日采葉名曰容成九月上寅日采花名曰金精十二月上寅日采根莖名

曰長生四朱並陰乾百日取等分以成日合搗千杵為末每酒服一錢匕或以蜜丸梧子大酒服七丸一日三服百日輕潤一年髮白變黑服之二年齒落再生五年八十歲老人變為兒童也孟詵云正月采葉五月五日服食白菊 太清靈寶方引丸采莖九月九日采花 斤茯苓一斤並搗羅為末每服二錢溫酒調下日三服或以煉過松脂和丸鷄子大每服一丸主頭眩久服令人好顏色不老藏器曰抱朴子言劉生丹法用白菊汁蓮花汁地血汁櫻汁和丹蒸服也

白菊花酒 天寶單方治丈夫婦人久患頭風眩悶

不覺欲倒者是其候也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其法春末夏初收白菊軟苗陰

乾搗末空腹取一方寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不飲酒者但和羹粥汁服亦得

秋八月合花收暴乾切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日服之日三次常令酒氣相續

菊

為佳 蘇 風熱頭痛 菊花石膏川芎各三錢為末
頌圖經 每服一錢半茶調下 簡便

方 膝風疼痛 菊花陳艾葉作護膝久則 痲痘入目
自除也 吳旻扶壽方

生腎障用白菊花穀精草綠豆皮等分為末每用
一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔盡食

柿日食三枚淺者五七日遠 病後生腎 白菊花蟬
者半月見效 仁齋直指方 蛻等分為

散每用二三錢入蜜少許水煎服 疔腫垂死 菊花
大人小兒皆宜屢驗 救急方

搗汁一升入口即活此神驗 女人陰腫 其菊苗搗
方也冬月采根 肘後方 爛煎湯先

熏後洗 危 酒醉不醒 九月九日真菊花為末飲
氏得效方 服方寸匕 外臺秘要

眼目昏花 雙美丸用其菊花一斤紅椒去目六兩
為末用新地黃汁和丸梧子大每服五

十九丸臨臥茶清
下 瑞竹堂方

花上水 主治 益色壯陽 治一切風 大

野菊 拾 遺

釋名 苦蕒 時珍曰蕒乃蓮子之心此
物味苦似之故與之同名

集解 藏器曰苦蕒生澤畔莖如馬蘭花如菊菊其
而蕒苦語曰苦如蕒是也時珍曰苦蕒處處

原野極多與菊無異但葉薄得而多尖
花小而蓋多如蜂窠狀氣味苦辛慘烈

根葉莖花 氣味 苦辛温有小毒 震亨曰野菊花
服之大傷胃氣

主治 調中止洩 破血 婦人腹內宿血 宜之 藏 治癰

腫疔毒 瘰癧 眼癭 時 珍

附方 新癰疽 丁腫 一切無名腫毒 孫氏集效方用
野菊花連莖搗爛酒煎熱服取

汁以渣傳之即愈。衛生易簡方用野菊花莖葉
蒼耳草各一握共搗入酒一椀絞汁服以渣傳之
取汗即愈或六月六日采蒼耳葉九月
九日采野菊花為末每酒服三錢亦可
野菊花根棗木煎湯
洗之 醫學集成
消不消亦自破也
瑞竹堂經驗方

菴藺

立淹間
本經上品

釋名

覆閭時珍曰菴草屋也閭里門也此草乃蒿屬老莖可以蓋覆菴閭故以名之貞元

廣利方謂之菴藺蒿云又史注云菴廬軍行宿室也則閭似當作廬

集解

別錄曰菴藺子生雍州川谷亦生上黨及道
邊十月采實陰乾弘景曰狀如蒿艾之類近道處處有之仙經亦時用之人家種此辟蛇也頌曰今江淮亦有之春生苗葉如艾蒿高二三尺七

月開花八月結實九月采實時珍曰菴藺葉不似艾似菊葉而薄多細丫面背皆青高者四五尺其莖白色如艾莖而粗八九月開細花淡黃色結細實如艾實中有細子極易繁衍藝花者以之接菊
子氣味苦微寒無毒別錄曰微溫普曰神農雷公桐君岐伯苦小溫無毒李當
之溫權曰辛苦時珍曰降也陰申微陽入足厥陰經血分之才曰荆實薏苡為之使

主治

五臟瘀血腹中水氣臃脹留熱風寒濕痺身

體諸痛久服輕身延年不老本經療心下堅隔中寒

熱周痺婦人月水不通消食明目驅驢食之神仙

別錄益氣主男子陰痿不起治心腹脹滿甄權腰脚重

痛膀胱痛及骨節煩痛不下食大明搗酒飲治閃挫

腰痛及婦人產後血氣痛時珍

發明 頌曰本經言久服輕身不老而古方少有服食者准入諸雜治藥中如胡治治驚邪狸骨丸之類大方中用之孫思邈千金翼帝宙獨行方主跪折瘀血並單用菴藺煎汁服亦可未服今人治打撲多用此法或飲或散其效最速時珍曰吳普本草及各醫別錄並言駝驢食菴藺神仙此亦謂其多壽爾駝驢乃獸名似驃而小前足長後足短不能自食每負麀鼠為之齧食

附方 舊一 **瘀血不散** 變成癰腫生菴藺蒿搗汁一升服之 **月水** 廣利方 **不通** 婦人宿有風冷留血積聚月水不通菴藺子一升桃仁二升酒浸去皮尖研勻入瓶內以酒二斗浸封五日後每飲三合日三服 **產後血痛** 菴藺子一兩小便二盃煎飲 **類湖集簡方**

附錄對廬 別錄有名未用曰味苦寒無毒主疥瘡久不瘳生死肌除大熱煮汁洗之似菴

蔞八 月采 著 音尸 本 經上品

釋名 時珍曰按班固白虎通載孔子云著之為言耆也老人歷年多更事久事能盡知也陸佃卑雅云草之多壽者故字從耆博物志言著千歲而三百莖其本已老故知吉凶

集解 別錄曰著實生少室山谷八月九月采實日以楮實為之楮實味甘此草所在有之其莖可為筮陶氏誤州上蔡縣白龜祠旁其生如蒿作叢高五六尺一本一二十莖至多者五十莖生便條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊花結實如艾實史記龜策傳云龜千歲乃遊於蓮葉之上著百莖共一根所生之處獸無虎狼蟲無毒螫

本草綱目卷之二十五

徐廣註云劉向言龜千歲而靈著百年而一本生百莖也褚先生云著滿百莖其下以有神龜守之其上常有青雲覆之傳云天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今取著者八十莖已上長八尺者即已難得但得滿六十莖以上長六尺者即可用矣今蔡州所上皆不言如此則此類亦神物故不常有也時珍曰著乃蒿屬神草也故易曰著之德圖而神天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺張華博物志言以末大於本者為主次蒿次荆皆以月望浴之然則無著標封亦可以荆蒿代之矣

實氣味苦酸平無毒

主治益氣充肌膚明目聰慧先知久服不饑不老

輕身本經

葉主治痞疾時珍

附方新**腹中痞塊**

著葉獨蒜穿山甲末食鹽同以好醋搗成餅量痞大小貼之兩炷香為度其痞化為膿血從大便出劉松石保壽堂方

艾別錄中品

釋名冰臺爾雅醫草別錄黃草碑雅艾蒿時珍曰王安石

疾久而彌善故字從艾陸佃埤雅云博物志言削冰令圓舉而向日以艾承其影則得火則艾名冰臺其以此乎醫家用灸百病故曰灸草一灼謂之一壯以壯人為法也

集解

別錄曰艾葉生田野三月三日采暴乾頌曰處處有之以復道及四明者為佳云此種灸百病尤勝初春布地生苗莖類蒿葉背白以苗短者為良三月三日五月五日采葉暴乾陳久方可

本草綱目卷之十五
用時珍曰艾葉本草不著土產但云生田野宋時以湯陰復道者為佳四明者圖形近代惟湯陰者謂之北艾四明者謂之海艾自成化以來則以蘄州者為勝用充方物天下重之謂之蘄艾相傳他處艾灸酒壘不能透蘄艾一灸則直透徹為異也此草多生山原二月宿根生苗成叢其莖直生白色高四五尺其葉四布狀如蒿分為五尖極上復有小尖面青背白有茸而柔厚七八月葉間出穗如車前穗細花結實累累盈枝中有細子霜後始枯皆以五月五日連莖刈取暴乾收葉先君月池子諱言聞嘗著蘄艾傳一卷有讚云產於山陽采以端午治病灸疾功非小補又宗懔荆楚歲時記云五月五日雞未鳴時采艾似人形者攬而取之收以灸病甚驗是日采艾為人懸於戶上可禳毒氣其莖乾之染麻油引火點灸炷滋潤灸瘡至愈不疼亦可代著策及作燭心

葉修治

宗奭曰艾葉乾擣去青滓取白入石硫黃末少許謂之硫黃艾灸家用之得米粉少

許可擣為末入服食藥用時珍曰凡用艾葉須用陳久者治令細軟謂之熟艾若生艾灸火則傷人臍脉故孟子云七年之病求三年之艾揀取淨葉揚去塵屑入石臼內木杵搗熟羅去渣滓取白者再搗至柔爛如綿為度用時焙燥則灸火得力入婦人丸散須以熟艾用醋煮乾搗成餅子烘乾再搗為末用或以糯糊和作餅及酒炒者皆不佳洪氏容齋隨筆云艾難著力若入白茯苓三五片同碾即時可作細末亦一異也

氣味苦微温無毒

恭曰生寒熟熱元素曰苦温陰中之陽時珍曰苦而辛生温熟

熱可升可降陽也入足太陰厥陰少陰之經苦酒香附為之使

主治灸百病可作煎止吐血下痢下部蠱瘡婦人漏血利陰氣生臍肉辟風寒使人有子作煎勿令

見風錄別搗汁服止傷血殺蛇蟲弘景主衄血下血膿

血痢水煮及丸散任用蘇恭止崩血腸痔血搨金瘡

止腹痛安胎苦酒作煎治癰甚良搗汁飲治心腹

一切冷氣鬼氣甄權治帶下止霍亂轉筋痢後寒熱

大治帶脉為病腹脹滿腰溶溶如坐水中好温中

逐冷除濕時珍

發明說曰春月采嫩艾作菜食或和麵作餛飩如

服止冷痢又以嫩艾作乾餅子用生薑煎服止瀉

蒸木瓜和丸或作湯空腹飲甚補虛羸然亦有毒

發則熱氣衝上狂躁不能禁止攻眼有瘡出血者

誠不可妄服也震亨曰婦人無子多由血少不能

攝精俗醫謂子宮虛冷投以辛熱或服艾葉不知

艾性至熱入火灸則氣下行入藥服則氣上行本

草止言其温不言其熱世人喜温率多服之久久

毒發何嘗歸咎於艾哉予考蘇頌圖經而因默有

感焉時珍曰艾葉生則微苦太辛熟則微辛太辛

生温熟熱純陽也可以取太陽真火可以回垂絕

元陽服之則走三陰而逐一切寒濕轉肅殺之氣

為融和灸之則透諸經而治百種病邪起沉痾之

人為康泰其功亦大矣蘇恭言其生寒蘇頌言其

有毒一則見其能止諸血一則見其熱氣上衝遂

謂其性寒有毒誤矣蓋不知血隨氣而行氣行則

血散熱因久服致火上衝之故爾夫藥以治病中

病則止若素有虛寒痼冷婦人濕鬱帶漏之人以

艾和歸附諸藥治其病夫何不可而乃妄意求嗣

服艾不輟助以辛熱藥性久偏致使火躁是誰之

咎歟於艾何尤艾附丸治心腹少腹諸病調女人

諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及妊娠產後下血

尤著可效老人丹田氣弱臍腹畏冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒食脚氣亦宜以此夾入襪內

附方 舊二十四 **傷寒時氣** 溫疫頭痛壯熱脉盛以新二十七 乾艾葉三升水一斗煮

一升頓服取 **妊娠傷寒** 壯熱赤斑變為黑瑛溺血汗 肘後方 **妊娠傷寒** 用艾葉如鷄子大酒三升

煮二升半分為二 **妊娠風寒** 卒中不省人事狀如服 傷寒類要 **妊娠風寒** 中風用熟艾三兩米

醋炒極熱以絹包熨腰下 **中風口喎** 以葦筒長五良久即甦 婦人良方 **中風口喎** 寸一頭刺入

耳內四面以麩密封不透風一頭以艾灸 **中風口** 之七壯患右灸左患左灸右 勝金方 **中風口**

噤 熟艾灸承漿一穴頰車 **中風掣痛** 不仁不隨並二穴各五壯 千金方 **中風掣痛** 以乾艾斛許

搽團納瓦甌中並下塞諸孔獨留一目以痛處著甌日而燒艾熏之一時即知矣 肘後方 **舌**

縮口噤 以生艾搗傳之乾艾 **咽喉腫痛** 醫方大成浸濕亦可 聖濟錄 **咽喉腫痛** 用嫩艾搗

汁細嚥之 ○經驗方用青艾和莖葉一握同醋搗爛傳於喉上冬月取乾艾亦得李臣所傳方也

癩癩諸風 熟艾於陰囊下穀道正門當 **鬼擊中惡** 卒然著人如刀刺狀胸脇腹內疔刺切痛不可按

或即吐血鼻中出血下血一名鬼排以熟艾如鷄子大三枚水五升煎 **小兒臍風** 撮口艾葉燒灰填

二升頓服 肘后方 **小兒臍風** 臍中以帛縛定效或隔蒜灸之 候口中有 **狐惑蟲蠱** 病人齒無色舌

艾氣立效 簡便方 **狐惑蟲蠱** 上白或喜睡不知痛痒處或下痢宜急治下部不曉此者但攻其

上而下部生蟲食其肛爛見五臟便死也燒艾於管中熏下部令烟入或少加雄黃 **頭風久痛** 斬艾

更妙罌中燒烟亦可 肘后方 **頭風久痛** 搽為丸時時嗅之以黃水 **頭風面瘡** 痒出黃水艾二兩

出為度 青囊雜纂 **頭風面瘡** 醋一升砂鍋煎取

汁每薄紙上貼之一日
二三上 御藥院方 心腹惡氣 艾葉搗汁飲脾

胃冷痛 白艾末沸湯服二 蛇蟲心痛 如刺口吐清

升水三升煮一升服吐蟲出或取生艾搗汁五口

更食香脯一片乃飲一升當下蟲出 肘後方

吐清水 乾蘄艾煎湯啜 霍亂吐下 不止以艾一把

頓服 外 老小白痢 艾蘄丸用陳北艾四兩乾蘄

臺秘要 梧子大每服七十丸空心米 諸痢久下 艾葉陳皮

飲下甚有奇效 永類方 服之亦可為末酒煮爛飯和丸每 暴泄不止 陳艾

鹽湯下二三十丸 聖濟總錄 生薑一塊水煎 糞後下血 艾葉生薑煎濃汁野鷄

熱服 生生編 痔病 先以槐柳湯洗過以艾灸上七壯取效即中

於腸頭其熱如火忽至僵仆無計有主郵者云須

灸即瘥乃用上法灸三五壯忽覺一道熱氣入腸

中因大轉瀉血穢併出瀉後遂 妊娠下血 張仲景

失胡瓜所在矣 經驗良方 有漏下者有半產後下血不絕者有妊娠下血者

並宜膠艾湯主之阿膠二兩艾葉三兩芍藥其草

各二兩當歸地黃各三兩芍藥四兩水五升清酒

五升煮取三升乃納膠令消盡每溫酒一升日三

服 匱要畧 妊娠胎動 或腰痛或搶心或下血不止或

酒四升煮二升分 胎動迫心 頭痛艾葉鷄子大以

溫服 子 婦人崩中 連日不止熟艾鷄子大阿膠

母秘錄 蓋先煮艾蘄至二盞半傾出入膠烱化 產後瀉血

分二服 一日服盡 初虞世古今錄 產後腹痛 欲

不止乾艾葉半兩灸熟老生薑半兩 產後腹痛 欲

濃煎湯一服立妙 孟詵食療本草 產後腹痛 欲

因或寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣楊誠

方 經驗 忽然吐血 水一二口或心衄或內崩熟艾三團

二錢 千金方 鼻血不止 艾灰推之亦可以艾 盜汗不止

熟艾二錢白伏神三錢烏梅三箇水一 火眼腫痛

鍾煎八分臨臥溫服 通妙真人方 以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以

溫水調化洗眼即瘥更入黃連尤佳 斗門方 面

上疔黯 艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍

許傳之自爛脫甚 婦人面瘡 各粉花瘡以定粉五

妙 外臺秘要 用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取

出調搽永無癥痕亦易生肉 談楚翁試驗方 身

面疔目 艾火灸三壯即 鷺掌風病 斬艾真者四五

除 聖惠方 五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手

心放瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方

疥瘡熏法 熟蘄艾一兩木鼈子三錢雄黃二錢硫

一條安陰陽瓦中置被裏烘 小兒疳瘡 艾葉一兩

熏後服通聖散 醫方摘要 小兒疳瘡 水一升煮

取四合服 備急方 小兒爛瘡 艾葉燒灰傳之 賺瘡口冷

熟艾燒烟熏 白癩風瘡 乾艾隨多少以浸麴釀酒 合

因或寒起者陳蘄艾二斤焙乾搗鋪臍上以絹覆住熨斗熨之待口中艾氣出則痛自止矣楊誠

方經驗 **忽然吐血** 水一二口或心衄或內崩熟艾三團

二錢 **鼻血不止** 艾灰推之亦可以艾 **盜汗不止**

千金方 熟艾二錢白伏神三錢烏梅三箇水一 **火眼腫痛**

鍾煎八分臨臥溫服 通妙真人方 以艾燒烟起用盥覆之候烟盡盥上刮煤下以 **面**

溫水調化洗眼即瘥更入黃連九佳 斗門方 **面**

上肝黯 艾灰桑灰各三升以水淋汁再淋至三遍

許傳之自爛脫甚 **婦人面瘡** 各粉花瘡以定粉五

妙 外臺秘要 用艾一二團燒烟熏之候烟盡覆地上一夜取 **身**

出調搽永無癥痕亦易生肉 談楚翁試驗方 **面**

面疔目 艾火灸三壯即 **鴛掌風病** 蘄艾真者四五

除 聖惠方 五六滾入大口瓶內盛之用麻布二層縛之將手

放瓶上熏之如冷再熱如神 陸氏積德堂方 **疥瘡熏法**

熟蘄艾一兩木鼈子三錢雄黃二錢硫

黃一錢為末揉入艾中分作四條每以

一條安陰陽瓦中置被裏烘 **小兒疳瘡** 艾葉一兩

熏後服通聖散 醫方摘要 **小兒疳瘡** 水一升煮

取四合服 **小兒爛瘡** 艾葉燒灰傳之 **賺瘡口冷** 不

瘡董法

之 熟艾燒烟熏 **白癩風瘡** 乾艾隨多少以浸麴釀酒

後方 **疔瘡腫毒** 艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁

瘡至痛乃點藥三遍其根自拔玉山韓光以此治

人神驗貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三

十餘人得效 **發背初起** 未成及諸熱腫以濕紙

孫真人千金方 灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃

止其毒即散不散亦免內攻神方也 李絳兵部

手癰疽不合瘡口冷滯以北艾煎湯洗咽喉骨哽

集用生艾蒿數升水酒共一斗煮四誤吞銅錢艾蒿

升細細飲之當下外臺秘要

水五升煎一升頓服便諸蟲蛇傷艾灸數壯甚風

蟲牙痛化蠟少許攤紙上鋪艾以筋卷成筒燒烟

消斬季謙病此月餘一試即愈普濟方

實氣味苦辛熱無毒主治明目療一切鬼氣甄壯

陽助水臟腰膝及暖子宮大明

發明詵曰艾子和乾薑等分為末蜜丸梧子大空

惡氣其鬼神速走出田野之人與此甚相宜也

附錄夏臺別錄有名未用曰味甘主百疾濟絕氣

也時珍曰艾名冰臺此名夏臺艾灸百病能回絕

氣此主百病濟絕氣恐是一物重出也故附於艾

千年艾綱目

集解時珍曰千年艾出武當太和山中小莖高尺

白秋開黃花如野菊而小結實如青珠丹顆之狀

三伏日采葉暴乾葉不似艾而作艾香搓之即碎

不似艾葉成茸也羽流以充方物

葉氣味辛微苦温無毒主治男子虛寒婦人血氣

諸痛水煎服之時珍

茵陳蒿

本經上品

釋名

藏器曰此雖蒿類經冬不死更因舊苗而生故名因陳後加蒿字耳時珍曰按張揖廣雅及吳普本草並因塵不知何義

集解

別錄曰茵陳生太山及丘陵坡岸上五月及立秋采陰乾弘景曰今處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又生韓保昇曰葉似青蒿而背白大明曰茵陳出和州及南山嶺上一名石茵陳頌曰近道皆有之不及太山者佳春初生苗高三五寸似蓬蒿而葉緊細無花實五月七月采莖葉陰乾今謂之山茵陳江寧府一種茵陳葉大根粗黃白色至夏有花實階州一種白蒿一似青蒿而背白本土皆以為茵陳入藥今南方醫人用山茵陳乃有數種或著其說云山茵陳汴京及北地用者如艾蒿葉細而背白其氣亦如艾味苦乾則色黑江南所用者莖葉都以家茵陳

而大高三四尺氣極芬香味甘辛俗又名龍腦薄荷吳中所用乃石香薷也葉至細色黃味辛甚香烈性溫若誤作解脾藥服大令人煩以本草論之但有茵陳蒿無山茵陳註云葉似蓬蒿而緊細今汴京北地所用山茵陳是也大體世方用山茵陳療體痛解傷寒發汗行肢節滯氣化痰利隔治勞倦最要詳本草正經惟療黃疸利小便與世方都不應今試取汴京所用山茵陳為解肌發汗藥灼然少效江南山茵陳療傷寒腦痛絕勝比見諸醫議論謂家茵陳亦能解肌下隔去胸中煩方家少用但可研作飲服之本草所無自出俗方茵陳蒿當別是一物主療自異不得為山茵陳也此說亦未可據但以功較之則江南者為勝以經言之則非本草所出醫方所用更當考論爾數曰凡使須用葉有八角者陰乾去根細剉勿令犯火時珍曰茵陳昔人多蒔為蔬故入藥用山茵陳所以別家茵陳也洪舜俞老圃賦云醃糟紫薑之掌沐醢青陳之絲是也今淮揚人二月二日猶采野茵陳苗

和粉麩作茵陳餅食之後人各據方土所傳遂致
淆亂今山茵陳二月生苗其莖如艾其葉如淡色
青蒿而背白葉岐緊細而扁整九月開細花黃色
結實大如艾子花實並與菴蒿花實相似亦有無
花實者

莖葉氣味苦平微寒無毒普曰神農岐伯雷公苦
無毒黃帝辛無毒權曰

苦辛有小毒大明曰石茵陳苦涼無毒伏礪
砂張元素曰苦其陰中微陽入足太陽經

主治風濕寒熱邪氣熱結黃疸久服輕身益氣耐

老面白悅長年白兔食之仙本治通身發黃小便

不利除頭熱去伏瘕別錄通關節去滯熱傷寒用之

藏器石茵陳治天行時疾熱狂頭痛頭旋風眼疼瘴

瘧女人癥瘕并閃損乏絕大明

發明弘景曰仙經云白蒿白兔食之仙而今茵陳
乃云此恐是誤耳宗奭曰張仲景治傷寒熱

甚發黃身面悉黃者用之極效一僧因傷寒後發
汗不徹有留熱面身皆黃多熱期年不愈醫作食

治不對而食不減予與此藥服五日病減三分之
一十日減三分之二二十日病悉去方用山茵陳

山梔子各三分秦艽升麻各四錢為散每用三錢
水四合煎二合去滓食後溫服以知為度此藥以

山茵陳為本故書之王好古曰張仲景茵陳梔子
大黃湯治濕熱也梔子藥皮湯治燥熱也如茵瀉

則濕黃苗旱則燥黃濕則瀉之燥則潤之可也此
二藥治陽黃也韓祗和李思訓治陰黃用茵陳附

子湯大抵以茵陳為君主而佐
以大黃附子各隨其寒熱也

附方舊二
新六茵陳羹除大熱黃疸傷寒頭痛風熱瘴
瘧利小便以茵陳細切煮羹食

之生食亦宜 **遍身風痒** 生瘡亦用茵陳煮濃汁洗之立瘥 千金方 **癩**

瘍風病 茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日一洗不然恐痛也

崔行功纂要 **風疾攣急** 茵陳蒿一斤秫米一石麩三斤和勻如常法釀

酒服之 **痢黃如金** 好眠吐涎茵陳蒿白鮮皮等分水二鍾煎服日二服 三

聖濟總錄 **遍身黃疸** 茵陳蒿一把同生薑一塊搗黃方 爛於胸前四肢日日擦之 **男子**

酒疸 用茵陳蒿四根卮子七箇大田螺一箇連殼搗爛以百沸白酒一大盞沖汁飲之秘方也

眼熱赤腫 山茵陳車前子等分煎湯調茶調散服數服 直指方

青蒿 本經 下品

釋名 **草蒿** 本經 **方潰** 本經 **菝** 音牽 去聲 **犴蒿** 蜀 **香蒿** 衍義保昇曰草

蒿江東人呼為犴蒿為其氣息似犴也北人呼為青蒿爾雅云蒿菝也孫炎注云荆楚之間謂蒿為

菝郭璞注云今人呼青蒿香中灸啖者為菝是也時珍曰晏子云蒿草之高者也按爾雅諸蒿獨菝

得單稱為蒿豈以諸蒿葉背皆白而此蒿獨青異於諸蒿故耶

集解 別錄曰草蒿生華陰川澤弘景曰處處有之即今青蒿人亦取雜香菜食之保昇曰嫩時

醋淹為菹自然香葉似茵陳蒿而背不白高四尺許四月五月采日乾入藥詩云呦呦鹿鳴食野之

蒿即此蒿也頌曰青蒿春生苗葉極細可食至夏高四五尺秋後開細淡黃花花下便結子如粟米

大八九月采子陰乾根莖子葉並入藥用乾炙作飲香尤佳宗奭曰青蒿得春最早人剔以為蔬根

赤葉香沈括夢溪筆談云青蒿一類自有二種一種黃色一種青色本草謂之青蒿亦有所別也陝

西銀綏之間蒿叢中時有一兩窠迥然青色者土人謂之香蒿莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此

蒿深青如松檜之色至深秋餘蒿並黃此蒿猶青其氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青時珍曰青蒿二月生苗莖粗如指而肥軟莖葉色並深清其葉微似茵陳而面背俱青其梗白硬七八月開細黃花頗香結實大如麻子中有細子

修治

敷曰凡使惟中為妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖四件若同使翻然成痼疾采得葉用七歲兒七箇溺浸七日七夜漉出晒乾

葉莖根子氣味苦寒無毒

時珍曰伏硫黃

主治疥癩痂痒惡瘡殺蟲治留熱在骨節間明目

本經鬼氣尸疰伏留婦人血氣腹內滿及冷熱久痢

秋冬用子春夏用苗並搗汁服亦暴乾為末小便

入酒和服

藏器

補中益氣輕身補勞駐顏色長毛髮

令黑不老兼去蒜髮殺風毒心痛熱黃生搗汁服

并貼之

大明

治瘧疾寒熱

時珍

生搗傳金瘡止血止疼

良

蘇恭

燒灰隔紙淋汁和石灰煎治惡瘡噎肉廔癥

孟詵

發明

頌曰青蒿治骨蒸熱勞為最古方單用之時珍曰青蒿得春木少陽之氣最早故所主之

證皆少陽厥陰血分之病也按月令通纂言伏內

庚日采青蒿懸於門庭內可辟邪氣陰乾為末冬

附方

舊新十三

四男婦勞瘦

青蒿細剉水三升童子小便五升同煎取一升去

淳入器中煎成膏丸如梧子大每空心
及卧時温酒吞下二十九丸 斗門方 虛勞寒熱

肢體倦疼不拘男婦八九月青蒿成實時采之去
枝梗以童子小便浸三日晒乾為末每服二錢烏

梅一箇煎湯 靈苑方 骨蒸鬼氣 童子小便五大斗澄清青
蒿五斗八九月揀帶子者

最好細剉相和納大釜中以猛火煎取三大斗去
滓漑釜令淨再以微火煎可二大斗入猪膽一枚

同煎一大斗半去火待冷以羗器盛之每欲服時
取其草二三兩炙熟為末以煎和擣千杵為丸空

腹粥飲下二十九丸漸增至三 骨蒸煩熱 青蒿一握
十九丸止 崔元亮海上方 猪膽汁一

枚杏仁四十箇去皮尖炒以童子小便 虛勞盜汗
一大盞煎五分空心温服 十便良方

煩熱口乾用青蒿一斤取汁熬膏入人參末麥門
冬末各一兩熬至可丸丸如梧子大每食後米飲

煎二十九丸名青蒿 瘧疾寒熱 肘後方用青蒿一握
煎 聖方總錄 水二升擣汁服之。

存仁方用五月五日天未明時采青蒿陰乾四兩
桂心一两為末未發前酒服二錢 經驗方用端

午日采青蒿葉陰乾桂心等分為末每服一錢先
寒用熱酒先熱用冷酒發日五更服之切忌發物

温瘧痰甚 但熱不寒用青蒿二兩童子小便浸焙
黃丹半兩為末每服二錢白湯調下

仁存 赤白痢下 五月五日采青蒿艾葉等分同豆
豉擣作餅日乾名蒿豉母每用一

餅以水一盞半煎 鼻中衄血 青蒿擣汁服之并塞
服 聖濟總錄 鼻中極驗 衛生易

簡 酒痔便血 青蒿用葉不用莖用莖不用葉為末
糞前冷水糞後水酒調服 永類鈔

方 金瘡撲損 肘後方用青蒿擣封之血止則愈
一方用青蒿麻葉石灰等分五月五

日擣和晒乾臨 牙齒腫痛 青蒿一握煎水 毒蜂螫
時為末搽之 漱之 濟急方

人 嚼青蒿封之 耳出濃汁 青蒿末綿裹納 鼻中息
即安肘後方 耳中 聖惠方

本草綱目卷之五 耳中 聖惠方 鼻中息

肉

青蒿灰石灰等分淋汁熬膏點之 聖濟總錄

子氣味甘冷無毒主治明目開胃炒用治勞瘦壯

健人小便浸用之治惡瘡疥癬風癢煎水洗之

治鬼氣為末酒服方寸匕 孟時 功同葉

附方 新 積熱眼澀 三月三日或五月五日采青蒿花或子陰乾為末每井華水空心服二錢久服明目可夜看

書名青金散 十便良方 節間蟲 見蟲部

黃花蒿

綱目

釋名臭蒿

集解 大明曰臭蒿一名草蒿時珍曰香蒿臭蒿通可名草蒿此蒿與青蒿相似但此蒿色綠帶

淡黃氣辛臭不可食人家采以罨醬黃酒麴者是也

葉氣味辛苦凉無毒主治小兒風寒驚熱 時珍

子氣味辛凉無毒主治治勞下氣開胃止盜汗及

邪氣鬼毒 大明

白蒿

本經上品

釋名 藜 爾雅 由胡 爾雅 萋蒿 食療 蒿 音商時珍曰白蒿有

之藜以其易繁衍也曰藜繡蒿即今陸生艾蒿也辛薰不美曰藜由胡即今水生萋蒿也辛香而美

曰藜之醜秋為蒿則通指水陸二種而言謂其春時各有種名至秋老則皆呼為蒿矣曰藜曰蒿曰

藜皆老蒿之通名象秋氣蕭賴之氣

本草綱目卷之十五

集解 別錄曰白蒿生中山川澤二月采弘景曰蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方藥家既不

用皆無復識之恭曰爾雅繡蒿即白蒿也所在有之葉頗似細艾上有白毛錯澀粗於青蒿從初生至秋白於衆蒿禹錫曰蓬蒿可以為茹故詩箋云以豆薦藜藿也陸機詩疏云凡艾白色為繡今白蒿先諸草發生香美可食生蒸皆宜頌曰此草古人以為藎今人但食藎蒿不復食此或疑白蒿即藎蒿而孟詵食療又別著藎蒿條所說不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳其苗葉亦相似然以入藥恐不可用也時珍曰白蒿處處有之有水陸二種本草所用蓋取水生者故曰生中山川澤不曰山谷平地也二種形狀相似但陸生辛薰不及水生者香美爾詩云呦呦鹿鳴食野之苹苹即陸生繡蒿俗呼艾蒿是矣鹿食九種解毒之草白蒿其一也詩云于以采藜于沼于沚左傳云蘋蘩藿藻之采可以薦於鬼神羞於王公並指水生白蒿而言則本草白蒿之為

藎蒿無疑矣鄭樵通志謂苹為藎蒿非矣鹿乃山獸藎乃水蒿陸機詩疏謂苹為牛尾蒿亦非矣牛尾蒿色青不白細葉直上狀如牛尾也藎蒿生陂澤中二月發苗葉似嫩艾而岐細面青背白其莖或赤或白其根白脆采其根莖生熟藎曝皆可食蓋嘉蔬也景差大招云吳酸藎藎不沾薄謂吳人善調酸淪藎蒿為齏不沾不薄而其美此正指水生者也

苗根氣味甘平無毒

思邈曰辛平時珍曰發瘡疥

主治五臟邪氣風寒濕痺補中益氣長毛髮令黑

療心懸少食常饑久服輕身耳目聰明不老本經

援醋淹為菹食甚益人搗汁服去熱黃及心痛曝

為末米飲空心服一匙治夏月暴水痢燒灰淋汁

煎治淋瀝疾

孟詵

利隔開胃殺河豚魚毒

時珍

發明

弘景曰服食家七禽散云白兔食白蒿仙與菴蒿同法耳時珍曰本經列白蒿於上品有

功無毒而古今方家不知用豈不得服之之訣與

附方

舊

惡瘡癩疾

但是惡瘡遍體面目有瘡者皆可服之用白艾蒿十束如升大

煮取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍稍之梅師方

子氣味

缺

主治鬼氣為末酒服之良

孟詵

角蒿

唐本草

集解

恭曰角蒿似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七月八月采保昇曰葉

似蛇牀青蒿子角似蔓菁青黑而細秋熟所在皆有之宗奭曰莖葉如青蒿開淡紅紫花大約徑三

四分花罷結角長二寸許微彎數日凡使勿用紅蒿并邪蒿二味真似角蒿只是此香而角短爾采

得於槐砧上細剉用之

氣味辛苦有小毒主治乾濕蠹諸惡瘡有蟲者

唐本

治口齒瘡絕勝

宗奭

附方

舊二新一

齒齦宣露

多是痔也角蒿燒灰夜塗上切忌油膩沙糖乾棗外臺

秘要口瘡不瘥

入胸中並生者不拘大人小兒以角蒿灰塗之有汁吐去一宿效千金

方月蝕耳瘡

用蒿灰摻之良集簡方

蘆蒿

拾遺

釋名莪蒿

爾雅

蘿蒿

同抱娘蒿

時珍曰陸農師云蘆蒿之為言高也莪亦窳

本草綱目卷之十五
也莪科高也可以覆蠶故謂
之蘿抱根叢生故曰抱娘

集解時珍曰蘆蒿生高崗似小蘆宿根先於百草
爾雅云莪蘿是也詩小雅云菁菁者莪陸機

注云卽莪蒿也生澤國漸洳處葉似斜蒿而細科
二月生莖葉可食又可蒸香美頗似萋蒿但味帶
麻不似萋
蒿其香

氣味辛温無毒**主治**破血下氣煮食之
藏

馬先蒿
本經中品

釋名馬新蒿唐本馬矢蒿本經練石草別錄爛石草上虎

麻時珍曰蒿氣如馬矢故名馬先乃馬矢字訛也
馬新又馬先之訛也弘景曰練石草一名爛石

草卽馬矢蒿分
方藥不復用之

集解別錄曰馬先蒿練石草並生南陽川澤恭曰
葉大如芫蔚花紅白色二月八月采莖葉陰

乾用八月九月實熟俗謂之虎麻是也一名馬新
蒿所在有之芫蔚苗短小其子夏中熟二物初生
極相似也禹錫曰按爾雅云蔚牡蒿註云卽蒿之
無子者詩云匪莪伊蔚陸機云牡蒿也二月始生
七月花花似胡麻花而紫亦八月生角似小豆角
銳而長一名馬新蒿是也頌曰郭璞以牡蒿爲無
子而陸機云有子二說小異今當用有子者爲正
時珍曰別錄牡蒿馬先蒿原是二條陸機所謂有
子者乃馬先蒿而復引無子之
牡蒿釋之誤矣牡蒿詳見本條

氣味苦平無毒別錄曰練
主治寒熱鬼疰中風濕

痺女子帶下病無子本經練石草治五癆破石淋膀胱

中結氣利水道小便別錄惡瘡弘景

附方

舊

大風癩疾

骨肉疽敗眉鬚墮落身體痒痛以馬先蒿一名馬矢蒿一名爛

石草炒搗末每服方寸七食前温酒下一日三服一年都瘥

肘後方

陰地厥

宋圖

集解

頌曰生鄧州順陽縣內鄉山谷葉似青蒿莖青紫色花作小穗微黃根似細辛七月采根

用時珍曰江浙亦有之外家采制丹砂硫黃

根苗氣味甘苦微寒無毒主治腫毒風熱

蘇頌

附方

新

男婦吐血

後胸隔虛熱陰地厥紫荷車貫衆甘草各半兩每服三錢水煎

服濟總錄

壯蒿

別錄下品

釋名齊頭蒿

時珍曰爾雅蔚壯葍蒿之無子者則壯之名以此也諸蒿葉皆尖此蒿葉

獨多而秃故有齊頭之名

集解

別錄曰壯蒿生田野五月八月采弘景曰方藥不復用恭曰齊頭蒿也所在有之葉似防

風細薄而無光澤時珍曰齊頭蒿三四月生苗其葉扁而本狹末多有秃岐嫩時可茹鹿食九草此

其一也秋開細黃花結實大如車前實而內子微細不可見故人以為無子也

苗氣味苦微甘温無毒主治克臙膚益氣令人暴

肥不可久服血脉滿盛

別錄

搗溲服治陰腫

時珍

附方

新

瘧疾寒熱

齊頭蒿根滴滴金根各一把搗生酒一鍾未發前服以渣傳寸

口男左女右二日便止海上各方

九牛草

宋圖

集解

頌曰王筠州山岡上二月生苗獨莖高一尺葉似艾葉圓而長背有白毛面青五月采苗

用時珍曰陳嘉謨本草蒙荃以此為蘄艾謬矣

苗氣味微苦有小毒主治解風勞治身體痛與耳

草同煎服不入衆藥用

蘇頌

芫蔚

本經上品

釋名益母

本經

益明

本經

貞蔚

別錄

蕪

爾雅音推

野天麻

會編

豬

麻

綱目

火欬

本經

鬱臭草

綱目

苦低草

綱目

夏枯草

外臺

土質

汗

綱目時珍曰此草及子皆充盛密蔚故名芫蔚其功宜於婦人及明目益精故有益母之稱其

莖方類麻故謂之野天麻俗呼為豬麻豬喜食之也夏至後即枯故亦有夏枯之名近效方謂之土質汗林億云質汗出西番乃熱血合諸藥煎成治金瘡折傷益母亦可作煎治折傷故名為土質汗也禹錫曰爾雅蕪蕪注云今芫蔚也又名益母劉歆云蕪臭穢也臭穢即芫蔚也陸機云蕪益母也故魯子見之感思

集解

別錄曰芫蔚生海濱地澤五月采弘景曰今

用亦稀頌曰今園圃及田野極多郭璞註爾雅云

葉似荏方莖白華華生節間節節生花實似鷄冠

子黑色莖作四方稜五月采又云九月采實醫方

去苦水煮作菜食凌冬不凋悴也時珍曰芫蔚近

水濕處甚繁春初生苗如嫩蒿人夏長三四尺莖方如黃麻莖其葉如艾葉而背青一根三葉葉有尖岐寸許一節節節生穗叢簇抱莖四五月間穗

肉開小花紅紫色亦有微白色者每萼內有細子
四粒粒大如同蒿子有三稜褐色藥肆往往以作
巨勝子貨之其草生時有臭氣夏至後即枯其根
白色蘇頌圖經謂其葉似荏其子黑色似鷄冠子
九月采實寇宗奭衍義謂其凌冬不凋者皆誤傳
也此草有白花紫花二種莖葉子穗皆一樣但白
者能入氣分紅者能入血分別而用之可也按閩
閩事宜云白花者為益母紫花者為野天麻返魂
丹註云紫花者為益母白花者不是陳藏器本草
云芫蔚生田野間人呼為臭草天麻生平澤似馬
鞭草節節生紫花花中有子如青葙子孫思邈千
金方云天麻草莖如火麻冬生苗夏著赤花如鼠
尾花此皆似以芫蔚天麻為二物蓋不知其是一
物二種凡物花皆有赤白如牡丹芍藥菊花之類
是矣又按郭璞爾雅註云薤音推即芫蔚又名益
母葉似荏白華華生節間又云薤音推方莖長
而銳有穗穗間有花紫縹色可以為飲江東呼為
牛薤據此則是薤薤各本相同但以花色分別之

其為一物無疑矣宋人重修本草以天麻草誤註
天麻尤為謬失陳藏器本草又有薤菜云生江南
陰地似益母方莖對節白花主產後血病此
即芫蔚之白花者故其功主血病亦相同

子修治

時珍曰凡用微炒香亦或蒸熟
烈日曝燥春簸去殼取仁用

氣味辛甘微温無毒

別錄曰其微寒時珍
曰其辛温灰制硫黃

主治明目益精除水氣久服輕身本經療血逆大熱

頭痛心煩

別錄

產後血脹

大明

春仁生食補中益氣通

血脉填精髓止渴潤肺

吳瑞

治風解熱順氣活血養

肝益心安魂定魄調女人經脉崩中帶下產後胎

前諸病久服令人有子

時珍

發明 震亨曰芫蔚子活血行氣有補陰之功故名益母凡胎前產後所恃者血氣也胎前無滯

產後無虛以其行中有補也時珍曰芫蔚子味耳微辛氣溫陰中之陽手足厥陰經藥也白花者入

氣分紫花者入血分治婦女經脈不調胎產一切血氣諸病妙品也而醫方鮮知用時珍常以之同

四物香附諸藥治人獲效甚多蓋包絡生血肝藏血此物能活血補陰故能明日益精調經治女人

諸病也東垣李氏言瞳子散大者禁用芫蔚子為其辛溫主散能助火也當歸雖辛溫而兼苦其能

和血故不禁之愚謂目得血而能視芫蔚行血甚捷瞳子散大血不足也故禁之非助火也血滯病

目則宜之故曰明目

莖 大明曰苗氣味藏器曰寒時珍曰莖葉味辛微苦花味微苦其根味甘無毒

鏡源曰制硫黃雌黃砒石**主治**癰瘡可作浴湯本經擣汁服主浮

腫下水消惡毒丁腫乳癰丹遊等毒并傳之又服

汁主子死腹中及產後血脹悶滴汁入耳中主聾

耳擣傅蛇虺毒蘇恭入面藥令人光澤治粉刺藏器活

血破血調經解毒治胎漏產難胎衣不下血運血

風血痛崩中漏下尿血瀉血痔痢痔疾打撲內損

瘀血大便小便不通時珍

發明 時珍曰益母草之根莖花葉實並皆入藥可同用若治手足厥陰血分風熱明目益精調

女人經脈則單用芫蔚子為良若治腫毒瘡瘍消水行血婦人胎產諸病則宜並用為良蓋其根莖

花葉專于行而子則行中有補故也

附方

舊十四
新七

濟陰返魂丹

晉殷產室曰此方乃吉
安文江高師禹備禮求

于名醫所得者其效神妙活人甚多能治婦人胎
前產後諸疾危證用野天麻又名益母又名火欬
又名負擔郎芫蔚子也葉似艾葉莖似火麻方梗
凹面四五月節節開花紅紫色如蓼花南北隨
處皆有白花者不是于端午小暑或六月六日花
正開時連根收采陰乾用葉及花子忌鐵器以石
器碾為細末煉蜜丸如彈子大隨證嚼服用湯使
其根燒存性為末酒服功與黑神散不相上下其
藥不限丸數以病愈為度或丸如梧子大每服五
七十丸又可搗汁濾淨熬膏服之○胎前臍腹痛
或作聲者米飲下○胎前產後臍腹痛胎動不
安下血不止當歸湯下○產後以童子小便化下
一丸能安魂定魄血氣自然調順諸病不生又能
破血痛養脉息調經絡並溫酒下○胎衣不下及
橫生不順死胎不下經日脹滿心悶心痛並用炒
鹽湯下○產後血運眼黑血熱口渴煩悶如見鬼

神狂言不省人事以童子小便和酒化下○產後
結成血塊臍腸奔痛時發寒熱有冷汗或回垢頰
赤五心煩熱並用童子小便酒下或薄荷自然汁
下○產後惡露不盡結滯刺痛上衝心胸滿悶童
子小便酒下○產後瀉血水以棗湯下○產後痢
疾米湯下○產後血崩漏下糯米湯下○產後赤
白帶下煎膠艾湯下○月水不調溫酒下○產後
中風牙關緊急半身不遂失音不語童便酒下○
產後氣喘欬嗽胸膈不利惡心吐酸水面目浮腫
兩脇疼痛舉動失力溫酒下○產後月內欬嗽自
汗發熱久則變為骨蒸童便酒下○產後鼻衄舌
黑口乾童便酒下○產後兩太陽穴痛呵欠心忪
氣短羸瘦不思飲食血風身熱手足頑麻百節疼
痛並米飲化下○產後大小便不通煩躁口苦者
薄荷湯下○婦人益母膏近效方治產婦諸疾及
久無子息溫酒下○折傷內損有瘀血每天
陰則痛神方也三月采益母草一名負擔一名夏
枯草連根葉莖花洗澤令淨於箔上攤暴水乾以

竹刀切長五寸勿用鐵刀置於大鍋中以水浸過

二三四寸煎煮候草爛水減三之二澆去草取汁約

五六斗入盆中澄半日以綿濾去濁滓以清汁入

釜中慢火煎取一斗如稀餈狀甕瓶封收每取梨

大暖酒和服日再服或和羹粥亦可如遠行即更

煉至可丸收之服至七日則疼漸平復也產婦惡

露不盡及血運一二服便瘥其藥無

忌又能治風益心力外臺秘方

草搗汁七大合煎減半頃服立止無新者以

乾者一大握水七合煎服常宙獨行方

腹中 益母草搗熟以暖水少許和絞

取汁頃服之常宙獨行方

欲絕益母草研汁服

一盞絕妙子母秘錄

溫服 聖惠方

帶下赤白 益母草花開時采搗為末每服

二錢食前溫湯下

集驗方

小便尿血 益母草搗汁服一升立瘥

者益母草日乾陳鹽梅燒存性等分為末每服三

錢白痢乾薑湯赤痢甘草湯下各二靈散

衛生

家寶 **小兒疳痢** 垂死者益母草嫩葉同米煮粥食

之取足以瘥為度甚佳飲汁亦可

廣 **痔疾下血** 益母草葉搗汁飲

一切癰瘡 婦人

利方 乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕金用

天麻草切五升以水一斗半煮一斗分數次洗之

以殺瘳 **急慢疔瘡** 聖惠方用益母草搗封之仍絞

千金 母草四月連花采之燒存性先以小尖刀十字劃

開疔根令血出次透根開破捻出血拭乾以稻草

心蘸藥糝入瘡口令到底良久當有紫血出捻令

血淨再搥藥入見紅血乃止一日夜搥藥三五度

重者二日根爛出輕者一日出有瘡根脹起即是

根出以針挑之出後仍傳藥生肌易愈忌風寒房

室酒肉一 **癰毒已破** 益母草搗敷甚

勒乳成癰 益

為末水調塗乳上一宿自喉閉腫痛益母草搗爛

產生搗亦得聖惠方新汲水一盃

絞濃汁頃飲隨吐愈冬

月用根衛生易簡方

粉刺黑斑花者晒乾燒灰以商陸根搗自然汁加

酸醋和搜灰作餅炭火煨過收之半年方用入面

藥甚能潤肌蘇頌曰唐天后鍊益母草澤面法五

月五日采根苗具者勿令着土暴乾搗羅以麩水

和成團如鷄子大再暴乾仍作一爐四旁開竅上

下置火安藥中央大火燒一炊久即去大火留小

火養之勿令火絕經一伏時出之甕器中研治篩

再研三日收用如澡豆法日用一錢

方每十兩加滑石一兩臙脂一錢

細和醋炒塗之

孫真人方

新生小兒益母草五兩煎水浴之

不生瘡疥簡要濟衆

鑿菜

音慙拾遺

集解藏器曰鑿菜生江南陰地似益母方莖對節

謂推是也其紫花者爾雅所謂藎是也

一音乃一物二種故此條亦主血病與益母功同

郭璞獨指白花者為益母咎殷謂白花者非益母

皆欠詳審嫩苗可食故謂之菜寇宗奭言芫蔚嫩

苗可煮食正合此也

苗氣味辛平無毒主治破血產後腹痛煮汁服藏

薇銜薇音眉本經上品

釋名糜銜本經鹿御本唐吳風草本唐無心普吳無顛普承

膏別承騰吳普恭曰南人謂之吳風草一名鹿銜

無風獨搖則吳風亦當作無風乃通藏器
曰一名無心草非草之無心者方藥少用

集解 別錄曰薇銜生漢中川澤及寃句耶鄂七月
采莖葉陰乾恭曰此草叢生似芫蔚及白頭

翁其葉有毛赤莖又有大小二種楚人謂大者為
大吳風草小者為小吳風草保昇曰葉似芫蔚叢
生有毛其花黃色其根赤黑色

莖葉氣味苦平無毒 別錄曰微寒之才曰得秦皮良
主治風濕痺

歷節痛驚癩吐舌悸氣賊風鼠瘻癰腫本經暴癥逐

水療痿躄久服輕身明目別錄婦人服之絕產無子

藏器煎水洗癩疽甲疽惡瘡時珍出外
科精義

發明 時珍曰麋銜乃素問所用治風病自汗藥而
後世不知用之誠缺畧也素問黃帝曰有病

身熱懈惰汗出如浴惡風少氣此為何病岐伯曰
病名酒風治之以澤瀉木各三五分麋銜五分合

以三指撮為後飯
後飯者先服藥也

附方 新二年深惡瘡無心草根鈞苓根狼毒白丁香
各五錢麝香一字為末搽之

又方無心草根乾薑各二錢鈞苓外科精義小兒破傷風病
拘急

口禁沒心草半兩白附子炮二錢半為
末每服一字薄荷酒灌下聖濟錄

附錄無心草 宋圖經頌曰生秦州及商州鳳翔各
縣皆出之三月開花五月結實六七

月采根苗陰乾用性溫無毒主積血逐氣塊益筋
節補虛損潤顏色療澀洩腹痛時珍曰麋銜一名

無心草此草功用與之相近其圖形亦相近恐即
一物也故附之俟訪攷焉鼠耳草亦名無心與此

不同

夏枯草

本經 下品

釋名 夕句

本經

乃東

本經

燕面

別錄

鐵色草

震亨曰此草夏至後即枯

蓋稟純陽之氣得陰氣則枯故有是名

集解

別錄曰夏枯草生蜀郡川谷四月采恭曰處

月開花作穗紫白色似丹參花結子亦作穗五月

便枯四月采之時珍曰原野間甚多苗高一二尺

許其莖微方葉對節生似旋復葉而長大有細齒

背白多故莖端作穗長一二寸穗中開淡紫小花

一穗有細子四粒丹溪云無子亦欠察矣嫩苗淪過浸去苦味油鹽拌之可食

正誤 宗奭曰今謂之臭鬱白秋便生經冬不悴春

蔚是也夏枯草無臭味明是兩物俱生於春夏枯先枯而無子鬱臭後枯而結子

莖葉氣味苦辛寒無毒

之才曰土瓜為

瘰癧鼠瘦頭瘡破癥散瘰結氣脚腫濕痺輕身

本經 虛者可使若實者以行散之藥佐之外以艾炙亦

發明 震亨曰本草言夏枯草大治瘰癧散結氣有

補養厥陰血脉之功而不言及觀其退寒熱

漸取效時珍曰黎居士易簡方夏枯草治目疼用

沙糖水浸一夜用取其能解內熱緩肝火也樓全

善云夏枯草治目珠疼至夜則甚皆神效或用苦

寒藥點之反甚者亦神效蓋目珠連日本郎係也

屬厥陰之經夜甚及點苦寒藥反甚者夜與寒亦

陰故也夏枯稟純陽之氣補厥陰血脉故治此如

神以陽治陰也一男子至夜目珠疼連眉稜骨及

頭半邊腫痛用黃連膏點之反甚諸藥不效灸厥

陰少陽痛隨止半日又作月餘以夏枯草二兩香

附二兩甘草四錢為末每服一錢半清茶

調服下咽則疼減半至四五服良愈也

附方

舊一

新六

明目補肝

肝虛目睛痛冷淚不止血脉痛羞明怕日夏枯草半兩香

附子一兩為末每服一錢臘茶湯調下

簡要濟衆赤白帶下

夏枯草花開時采陰乾為

未每服二錢米飲下

徐氏家傳方

血崩不止夏枯草為末每服方寸七米飲調下

聖方

產後血運

心氣欲絕者夏枯草搗絞汁服一錢大妙徐氏家傳方撲傷

金瘡

夏枯草口嚼爛罨上即愈衛生易簡

汗斑白點

夏枯草煎濃汁日日洗之乾

坤生

瘰癧馬刀

不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫

服虛甚者則煎汁熬膏服并塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治瘰癧

之聖藥也其草易得其功甚多薛已外科經驗方

劉寄奴草

唐本草

釋名金寄奴大烏藤菜

綱目時珍曰按李延壽南史云宋高祖劉裕小字寄

奴微時伐荻新州遇一大蛇射之明日往聞杵臼聲尋之見童子數人皆青衣於榛林中搗藥問其故答曰我主為劉寄奴所射今合藥傳之裕曰神何不殺之曰寄奴王者不可殺也裕叱之童子皆散乃收藥而反每遇金瘡傳之即愈人因稱此草為劉寄奴草鄭樵通志云江南人因漢時謂劉為卵金刀乃呼劉為金是以又有金寄奴之名江東人謂之烏藤菜云

集解

恭曰劉寄奴草生江南莖似艾蒿長三四尺葉似山蘭草而尖長一莖直上有穗葉互生

其子似稗而細保昇曰今出越州蒿之類也高四五尺葉似菊其花白色其實黃白色作穗夏月收

苗乾之頌曰今河中府孟州漢中滁州亦有之春生苗莖似艾蒿上有四稜高二三尺以來葉青似

柳四月開碎小黃白花形如瓦松七月結實似黍而細根淡紫色似蒿莖六月七月采苗及花子通

用時珍曰劉寄奴一莖直上葉似蒼朮尖長糙澀而深背淡九月莖端分開數枝一枝攢簇十朵小花白瓣黃蕊如小菊花狀花罷有白絮如苦買花之絮其子細長亦如苦買子所云實如黍稗者似與此不同其葉亦非蒿類

子苗修治敷曰凡采得去莖葉只用實以布拭去薄殼令淨拌酒蒸從巳至申暴乾用時

珍曰莖葉花子皆可用

氣味苦温無毒主治破血下脹多服令人下痢蘇恭

下血止痛治產後餘疾止金瘡血極效別錄心腹痛

下氣水脹血氣通婦人經脉癥結止霍亂水瀉大明

小兒尿血新者研末服時珍

附方舊一大小便血劉寄奴為末茶調空心服二錢即止折傷集簡方

瘀血在腹內者劉寄奴骨碎補延胡索各一两水二升煎七合入酒及童子小便各一合頓温服之

血氣脹滿劉寄奴穗實為末每服三錢酒煎服不可過多令人吐利此破

血之仙藥也霍亂成痢劉寄奴草煎汁飲湯火傷灼聖濟總錄

劉寄奴搗末先以糯米漿雞翎掃上後乃摻末並不痛亦無痕大驗之方凡湯火傷先以鹽末摻之護肉不壞後乃摻

藥為妙本事方風入瘡口腫痛劉寄奴為末摻之即止聖惠方

小兒夜啼劉寄奴半兩地龍炒一分甘草一寸水煎灌少許赤白下聖濟總錄

痢陰陽交帶不問赤白劉寄奴烏梅白薑等分水煎服赤加梅白加薑艾元英如宜方

曲節草宋圖

釋名六月凌

音令

六月霜

綱目

綠豆青

圖經

蛇藍

時珍曰此

草性寒故有凌霜綠豆之名

集解

頌曰曲節草生均州四月生苗莖方色青有節葉似劉寄奴而青軟七八月着花似薄荷

結子無用五月六月采莖葉陰乾

莖葉氣味甘平無毒主治發背瘡消癰腫拔毒同

甘草作末米汁調服

蘇頌

麗春草

宋圖經

釋名仙女蒿

圖經

定參草

頌曰麗春草生檀岵山川谷檀岵山在高密界河南

淮陽郡潁川及譙郡汝南郡等並呼為龍羊草河北近山鄴郡汲郡並名叢蘭艾上黨紫團山亦有

名定參草又名仙女蒿今所在有之甚療癰黃人莫能知時珍曰此草有殊功而不著其形狀今嬰粟亦名麗春草九仙子亦名仙女嬌與此同名恐非一物也常俟博訪

花及根氣味

缺

主治癰黃黃疸

蘇頌

發明

頌曰唐天寶中潁川郡楊正進方名醫皆用有效其方云麗春草療因時患傷熱變成癰

黃遍身壯熱小便黃赤眼如金色面又青黑心頭氣痛遶心如刺頭旋欲倒兼脇下有瘕氣及黃疸等經用有驗其藥春三月采花陰乾一升搗散每平明空腹取三方寸七和生麻油一盞頓服日一服隔五日再進以知為度其根療黃疸搗汁一盞空腹頓服須臾即利三兩行其疾立已一劑不能全愈隔七日更一劑永瘥忌酒麪豬魚蒜粉酪等

旋覆花

本經下品

釋名金沸草本經金錢花綱目滴滴金綱目盜庚爾雅夏菊

綱目戴樾別錄宗奭曰花緣繁茂圓而覆下故曰旋日戴樾覆時珍曰諸名皆因花狀而命也爾雅云

獲盜庚也蓋庚者金也謂其夏開黃花盜竊金氣也西陽雜俎云金錢花一名毘尸沙自梁武帝時

始進入中國

集解別錄曰旋覆生平澤川谷五月采花日乾二

別有旋菑根出河南北國亦有形似芎藭惟合旋

菑膏用之餘無所用非此旋覆花根也保昇曰葉

似水蘇黃花如菊六月至九月采花頌曰今所在

皆有二月以後生苗多近水旁大似紅藍而無刺

長一二尺以來葉如柳莖細六月開花如菊花小

銅錢大深黃色上黨田野人呼為金錢花花葉並同極

采花今近道人家園圃所蒔金錢花花葉並同極

易繁盛恐即旋覆也宗奭曰旋覆葉如大菊又如

艾蒿秋開花大如梧桐子花淡黃色其香過於菊

別有旋花乃鼓子花非此花也見本條時珍曰花

狀如金錢菊水澤邊生者花小瓣單人家栽者花

大蓋簇蓋壤瘠使然其根細白俗傳露水滴下即

生故易繁蓋亦不然

花修治數日采得花去蓋并殼皮及蒂子蒸之從巳至午曬乾用

氣味鹹温有小毒別錄曰其微温冷利權曰其無毒大明曰無毒宗奭曰苦其辛

主治結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中

下氣本經消胸上痰結唾如膠漆心胸痰水膀胱留

飲風氣濕痺皮間死肉目中眩瞶利大腸通血脉

益色澤別錄主水腫逐大腹開胃止嘔逆不下食甄權

行痰水去頭目風宗消堅軟痞治噫氣好古

發明 頌曰張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雜治婦人有三物

旋覆湯胡洽居士治痰飲在兩脇脹滿有旋覆花丸用之尤多成無已曰鞭則氣堅旋覆之鹹以軟

痞堅也震亨曰寇宗奭言其行痰水去頭目風亦走散之藥病人涉虛者不宜多服冷利大腸宜戒

之時珍曰旋覆乃手太陰肺手陽明大腸藥也所治諸病其功只在行水下氣通血脉爾李衛公言

嗅其花能損目唐慎微本草誤以旋花根方收附此下今改正之

附方 舊一 **中風壅滯** 旋覆花洗淨焙研煉蜜丸梧子大夜卧以茶湯下五丸至

七丸十九丸 **半產漏下** 虛寒相搏其脉弦芤旋覆花湯用旋覆花三兩葱十四莖

新絳少許水三升煮一月 **月蝕耳瘡** 旋覆花燒研羊脂和塗之集簡

升頓服 **金匱要畧**

脂小兒眉癬 小兒眉毛眼睫因癬退不生用野油方

分爲末洗淨以油調塗之 **總微論**

葉主治 **傳金瘡止血** 大治疔瘡腫毒 時珍

根主治 **風濕** 別錄

青菘 本經下品

釋名 **草蒿** 本經 **萋蒿** 本經 **崑崙草** 唐本 **野鷄冠** 綱目 **鷄冠** 莫

綱目 **子名草决明** 本經 時珍曰青菘名義未詳胡麻

地中與之同名豈以其相似而然耶青蒿亦各草蒿其功相似而名亦相同何哉其子明目與决明

子同功故有草决明之名其花葉似鷄冠嫩苗似莫故謂之鷄冠莫鄭樵通志言俗名牛尾蒿誤矣

集解 別錄曰青菘生平谷道旁三月采莖葉陰乾

五月六月采子弘景曰處處有之似麥柵花

其子甚細別有草蒿或作草蒙主療殊相類形名

又相似可疑而實兩種也恭曰此草苗高尺餘葉

細軟花紫白色實作角子黑而扁光似莧實而大

生下濕地四月五月荆襄人名為崑崙草頌曰今

江准州郡近道亦有之二月生青苗長三四尺葉

濶似柳而軟莖似蒿青紅色六月七月內生花上

紅下白子黑光而扁似荏苳根亦似蒿根而白直

下獨莖生根六月八月采子時珍曰青菘生田野

間嫩苗似莧可食長則高三四尺苗葉花實與鷄

冠花一樣無別但鷄冠花穗或有大而扁或團者

此則稍間出花穗尖長四五寸狀如兔尾水紅色

亦有黃白色者在穗中與鷄冠子及莧子一樣

難辨蘇恭言其結角誤矣蕭炳言黃花者名陶珠

術與陳藏器所說不同又有天靈草亦此類也並

附於

附錄桃朱術

炳曰青菘一種花黃者名陶朱術苗

花紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五鴈來紅

月五日乃收子帶之今婦人為夫所愛

時珍曰莖葉穗子並與鷄冠同其葉九月鮮紅望

之如花故名吳人呼為老少年一種六月葉紅者

名十天靈草時珍曰按土宿真君本草云狀如鷄

樣錦冠花葉亦如之折之有液如乳生江

湖荆南陂池間五月取思莢子敷曰思莢子鼠細

汁可制雄硫煮雌煉砂子只是味不同思莢

子味煎之有涎

莖葉修治

敷曰凡用先燒鐵

氣味苦微寒無毒主

治邪氣皮膚中熱風瘙身癢殺三蟲本經惡瘡疥蟲

痔蝕下部蠹瘡別錄擣汁服大療温癘蘇恭止金瘡血

大明

子氣味苦微寒無毒權曰主治唇口青本經治五臟

邪氣益腦髓鎮肝明目堅筋骨去風寒濕痺大

治肝臟熱毒衝眼赤障青盲翳腫惡瘡疥瘡甄

發明炳曰理眼有青菘子丸宗奭曰青菘子經中

令人多用治眼殊與經意不相當時珍曰青菘子

治眼與决明子莧實同功本經雖不言治眼而云

一名草决明主唇口青則其明目之功可知矣目

者肝之竅唇口青者足厥陰經之證古方除熱亦

多用之青菘子之為厥陰藥又可知矣况用之治

目往往有驗尤可徵據魏畧云初平中有青牛先

主常服青菘子九年百餘歲如五六十者

附方舊鼻衄不止眩胃欲死青菘子汁三合

鷄冠宋嘉祐

釋名時珍曰以花狀命名

集解時珍曰鷄冠處處有之三月生苗入夏高者

而窄觚有赤脉其莖赤色或圓或扁有筋起六七

月稍間開花有紅白黃三色其穗圓長而尖者儼

如青菘之穗扁卷而平者儼如雄雞之冠花大有

圍一二尺者層層卷出可愛子在穗中黑細光骨

與莧實一樣其穗如秕麥狀花最耐久霜後始薦

苗氣味甘涼無毒主治瘡痔及血病時珍子氣味甘涼無毒主治止腸風瀉血赤白痢藏器

中帶下入藥炒用明大

花氣味上同主治痔漏下血赤白下痢崩中赤白帶

下分赤白用時珍

附方新吐血不止白鷄冠花醋浸煮七次為末每服二錢熱酒下經驗方結

陰便血鷄冠花椿根白皮等分為末煉蜜丸梧子大每服三十丸黃芪湯下日二服聖總

錄糞後下血白鷄冠花并子炒煎服聖惠方五痔肛腫久不愈變成瘻瘡用

鷄冠花鳳眼草各一兩水二下血脫肛白鷄冠花盪煎湯頰洗衛生寶鑑

為末糊丸梧子大空心米飲每服七十丸一方白鷄冠花炒稷欄灰羌活一兩為末每服二錢米繁

赤類經水不止紅鷄冠花一味晒乾為末每服二錢空酒調下忌魚腥猪肉孫

氏集效方產後血痛白鷄冠花酒煎服婦人白帶白鷄冠花

晒乾為末每旦空心酒服三錢白帶沙淋白鷄冠花赤帶用紅者孫氏集效方

蘆等分燒存性空赤白下痢鷄冠花煎酒服赤用心火酒服之摘玄集簡方

紅藍花宋開寶

釋名紅花開寶黃藍頌曰其花紅色葉頗似藍故有藍名

集解志曰紅藍花即紅花也生梁漢及西域博物志云張蹇得種於西域今魏地亦種之頌曰

今處處有之人家場圃所種冬月布子於熟地至春生苗夏乃有花花下作椽彙多刺花出椽上圃

人乘露采之采已復出至盡而罷椽中結實白顆如小豆大其花暴乾以染真紅又作臙脂時珍曰

紅花二月八月十二月皆可以下種雨後布子如種麻法初生嫩葉苗亦可食其葉如小薊葉至五

月開花如大薊花而紅色侵晨采花搗熟以水淘布袋絞去黃汁又搗以酸粟米泔清又淘又絞袋去汁以青蒿覆一宿晒乾或捏或薄餅陰乾夜之入藥搗碎用其子五月收采淘淨搗碎煎汁入醋拌蔬食極肥美又可為車脂及燭

花氣味辛温無毒

元素曰入心養血謂其苦温陰中之陽故入心佐當歸生新血

好古曰辛而其苦温肝經血分藥也入酒良

主治產後血運口噤腹內

惡血不盡絞痛胎死腹中並酒煮服亦主蠱毒

多用破留血少用養血震亨活血潤燥止痛散腫通

經時

發明

時珍曰血生於心包藏於肝屬於衝任紅花汁與之同類故能行男子血脉通女子經水

多則行血少則養血按養病慢筆云新昌徐氏婦病產運已死但胸膈微熱有名醫陸氏曰血悶也得紅花數十斤乃可活遂亟購得以大鍋煮湯盛三桶於牕格之下昇婦寢其上熏之湯冷再加以頃指動半日乃蘇按此亦得唐許胤宗以黃芪湯熏柳太后風病之法也

附方

舊五

六十二種風

張仲景治六十二種風兼腹痛用紅花一

大兩分為四分以酒一大升煎鍾一切腫疾紅花

半頃服之不止再服圖經本草取汁服不過三服喉痺壅塞不通者紅藍花搗絞

便瘥外臺秘要瘥為度如冬月無生花似乾者熱病胎死浸濕絞汁煎服極驗廣利方煮汁飲

二三盞熊氏補遺胎衣不下方同上產後血運心悶氣

一兩為末分作二服酒二盞煎一盞連服如口禁幹開灌之或入小便尤妙子母錄時耳

本草綱目卷之十五

出水 紅藍花三錢半枯礬五錢為末以綿杖繳淨

噎膈拒食

端午采頭次紅花無灰酒拌焙乾血竭瓜子樣者等分為末無灰酒一盞隔湯

頃熱徐嚙初服二分次日四分三日五分

楊起簡便方

子主治天行瘡痘水吞數顆功與花同

開寶蘇頌

附方 舊二血氣刺痛

紅藍子一升搗碎以無灰酒一大升拌子暴乾重搗篩蜜

丸梧子大空心酒下瘡疽不出

紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半

水酒鍾半煎減半量大小女子中風

血熱煩渴以紅藍子五合

加減服 龐安常傷寒論 熬搗旦日取半大匙以水一升煎取

七合去渣細細嚙之 貞元廣利方

番紅花 綱目

釋名 洎夫藍 綱目 撒法郎

集解 時珍曰番紅花出西番回回地面及天方國

博物志言張騫得紅藍花種於西域則此即一種或方域地氣稍有異耳

氣味甘平無毒主治心憂鬱積氣悶不散活血久

服令人心喜又治驚悸 時珍

附方 新傷寒發狂 驚怖恍惚用撒法郎二分水一盞浸一夕服之天方國人所傳

王璽醫 林集要

燕脂 綱目

釋名 燕脂時珍曰按伏候中華古今注云燕脂起產於燕地故曰燕脂或作燕脂救匈奴人名妻為闕氏音同燕脂謂其顏色可愛如燕脂也俗作燕脂 並謬也

集解 時珍曰燕脂有四種一種以紅藍花汁染胡

粉而成乃蘇鸚演義所謂燕脂葉似薊花似蒲出西方中國謂之紅藍以染粉為婦人面色者也一種以山燕脂花汁染粉而成乃段公路北戶錄所謂端州山間有花叢生葉類藍正月開花似蓼土人采含苞者為燕脂粉亦可染帛如紅藍者也一種以山榴花汁作成者鄭虔胡本草中載之一種以紫鈔染綿而成者謂之胡燕脂李珣南海藥譜載之今南人多用紫鈔燕脂俗呼紫梗是也大抵皆可入血病藥用又落葵子亦可取汁和粉筋面亦謂之胡燕脂見菜部

氣味甘平無毒主治 小兒聾耳浸汁滴之開寶 活血

解痘毒 時珍

附方 新 五乳頭裂破燕脂蛤粉為末傳 嬰兒鵝口厚白

如紙用坯子燕脂以乳汁調塗之一 漏瘡腫痛豬膽

宿效男用女乳女用男乳 集簡方 七箇綿燕脂十箇洗水和

勻搽七次即可 救急方 防痘入目燕脂嚼汁點

痘瘡倒陷乾燕脂三錢胡桃燒存性一箇研末用 救急方

大薊小薊別錄 中品 釋名 虎薊弘景 馬薊范汪 貓薊弘景 刺薊日華 山牛蒡日華 鷄

項草圖經 千針草圖經 野紅花綱目 弘景曰大薊是虎薊小薊是貓薊葉並多

刺相似田野甚多方藥少用時珍曰薊猶髻也其花如髻也曰虎曰貓因其苗狀猙獰也曰馬者大也牛勞因其根似牛勞根也雞項因其莖似雞之項也千針紅花皆其花狀也鄭樵通志謂爾雅之繫曰狗毒者即此未知是否藏器曰薊門以多薊得名當以北方者為勝也

集解別錄曰大小薊五月采恭曰大小薊葉雖相

似功力有殊大薊生山谷根療癰腫小薊生平澤不能消腫而俱能破血頌曰小薊處處有之俗名青刺薊二月生苗二三寸時併根作采茹食甚美四月高尺餘多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草四月采苗九月采根並陰乾用大薊苗根與此相似但肥大爾宗奭曰大小薊皆相似花如髻但大薊高三四尺葉皺小薊高一尺許葉不皺以此為異作菜雖有微芒不害人

大薊根葉同**氣味**甘温無毒弘景曰有毒權曰苦平大明曰葉凉

主治女子赤白沃安胎止吐血鼻衄令人肥健別錄

擣根絞汁服半升主崩中血下立瘥甄權葉治腸癰

腹臍瘀血作運撲損生研酒并小便任服又惡瘡

疥癬同鹽研罾之大明

小薊根苗同**氣味**甘温無毒大明凉

主治養精保血別錄破宿血生新血暴下血血崩金

瘡出血嘔血等絞取汁温服作煎和糖合金瘡及

蜘蛛蛇蠍毒服之亦佳藏器治熱毒風并胸膈煩悶

開胃下食退熱補虛損○苗去煩熱生研汁服並大

明 作菜食除風熱夏月熱煩不止搗汁半升服立

瘡 孟

發明

大明曰小薊力微只可退熱不似大薊能健養下氣也恭曰大小薊皆能破血但大薊蕪療癰腫而小薊專主血不能消腫也

附方

舊五新九 心熱吐血 口乾用刺薊葉及搗根絞取汁每頓服二小盞 聖惠方

舌硬出血

不止刺薊搗汁和酒服乾者為末冷水服 普濟方 九竅出血 方

上簡要

卒瀉鮮血

小薊葉搗汁溫服一升 梅師方 崩中下血 大

薊根一升酒一斗漬五宿任飲亦可酒煎服或生搗汁溫服○又方小薊莖葉洗切研汁一盞入生地黃汁一盞白朮半兩煎減半溫服 千金方 墮胎下血 小薊根葉益母草五兩水三大

盞煮汁一盞再煎至一盞分二服一日服盡 聖濟總錄 金瘡出血 不止小薊苗搗爛塗

之 孟 小便熱淋

馬薊根搗汁服 聖惠方 鼻塞不通 小薊

食療本草 水二升煮取一升分

外臺秘要方 小兒浸淫 瘡痛不可忍發寒熱者刺薊葉新水

調傳瘡上乾即易

癬瘡作痒 刺薊葉搗汁服 千金方 婦人

陰痒

小薊煮湯日洗 廣濟方 諸瘦不合 虎薊根貓薊根酸棗根枳根杜衡各

一把瑛螬三分炒為末蜜丸棗大日 丁瘡惡腫 千

一服并以小丸納瘡中 肘後方

草四兩乳香一兩明礬五錢為末

酒服二錢出汗為度 普濟方

續斷 本經上品

釋名 屬折

本經 接骨 別錄 龍豆 別錄 南草 時珍曰續斷屬折接骨皆以功

命各也

集解

別錄曰續斷生常山山谷七月八月采陰乾

錄云續斷生蔓延葉細莖如荏大根本黃白有汁

七月八月采根今皆用莖葉節節斷皮黃皺狀如

鷄脚者又呼為桑上寄生時人又有接骨樹高丈

餘許葉似蒴藿皮主金瘡廣州又有續斷藤一名

諸藤斷其莖以器承取汁飲療虛損絕傷用沐頭

長髮折枝插地即生恐皆非真李當之云是虎薊

與此大乖但虎薊亦療血蒸曰所在山谷皆有今

俗用者葉似苧而莖方根如大薊黃白色陶說非

也頌曰今陝西河中興元舒越晉絳諸州亦有之

三月以後生苗幹四稜似苧麻葉兩兩相對而生

四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色謹

按范汪方云續斷即是馬薊與小薊葉相似但大

於小薊爾葉似旁翁菜而小厚兩邊有刺刺人其

花紫色與今越州所圖者相類而市之貨者亦有

數種少能辨其粗良醫人但以節節斷皮黃皺者

為真數曰凡使勿用草茅根緣真相似若誤服令

人筋軟時珍曰續斷之說不一桐君言是蔓生葉

根修治

數曰凡采得根橫切判之又去向裏硬筋以酒浸一伏時焙乾入藥用

氣味苦微温無毒

別錄曰辛普曰神農雷公黃帝李當之苦無毒扁鵲辛無毒之

才曰地黃為之使惡雷丸

主治傷寒補不足金瘡癰瘍折跌續

筋骨婦人乳難久服益氣力本婦人崩中漏血金

瘡血內漏止痛生肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩

急別錄去諸溫毒通宣血脉甄權助氣補五勞七傷破

癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰癧婦人產前

後一切病胎漏子宮冷面黃虛腫縮小便止泄精

尿血大明

發明時珍曰宋張叔潛秘書知劍州時其閣下病

半每服二錢水煎服即愈紹興壬子會稽時行痢

疾叔潛之子以方傳人往往有驗小兒痢服之效

附方舊二小便淋瀝生續斷搗絞汁服即馬薊

娠胎動兩三月墮預宜服此川續斷酒浸杜仲薑

梧子大每服三十丸米飲下產後諸疾血運心悶煩熱厭厭氣

續斷皮一握水三升煎二升分三服如人行一打

里再服無所息此藥救產後垂死子母秘錄打

撲傷損閃肺骨接用節骨草葉搗爛衛生易簡方

苦芙音襖。別錄下品

釋名鉤芙爾雅苦板時珍曰凡物穉曰芙此

集解弘景曰苦芙處處有之俗人取莖生食之保

若貓薊五月五日采苗暴乾恭曰今人以爲漏蘆

本草綱目卷之十五
一年不生瘡疥亦搗汁和米為食其色清人留不
敗造化指南云苦板大者名苦藉葉如地黃味苦
初生有白毛入夏抽莖有毛開白花甚繁結細實
其無花實者各地膽草汁苦如膽也處處濕地有
之入爐
火家用

苗氣味苦微寒無毒主治面目通身漆瘡燒灰傳

之亦可生食別錄燒灰療金瘡甚驗弘景治丹毒大明煎

湯洗痔甚驗汪穎下氣解熱時珍

漏盧本經
上品

釋名野蘭本經莢蒿蘇恭鬼油麻日華時珍曰屋之西
比黑處謂之漏凡物

黑色謂之盧此草秋後即黑異於象草故有漏盧
之稱唐韻作篇其莢如麻故俗呼為鬼油麻云

集解別錄曰漏盧生喬山山谷八月采根陰乾弘景曰喬山應是黃帝所莖處乃在上郡及出

近道市人取苗用之俗中取根名鹿驪根苦酒摩
以療瘡疥恭曰此藥俗名莢蒿莖葉似白蒿花黃

生莢長似細麻之莢大如筋許有四五瓣七八月
後皆黑異於象草蒿之類也常用其莖葉及子未

見用根其鹿驪山南謂之木黎蘆有毒非漏盧也
今人以馬薊似苦艾者為漏盧亦非也志曰別本

言漏盧莖大如筋高四五尺子房似油麻房而小
江東人取其苗用勝於根江寧及上黨者佳陶云

鹿驪蘇云木藜蘆皆非也漏盧自別藏器曰南人
用苗北土用根乃樹生如茱萸樹高二三尺有毒

殺蠱山人以洗瘡疥保昇曰葉似角蒿今曹交州
下濕處最多六月七月采莖日乾黑於象草大明

曰花苗並可用形并氣味似乾牛蒡頭上有白花
子頌曰今汴東州郡及奉海州皆有之舊說莖葉

似白蒿花黃白莢莖若筋大房類油麻而小今諸
郡所圖上惟單州者差相類沂州者花葉頗似牡

丹秦州者花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海
州者花紫碧如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸
裹之根如蔓青而細又類葱本黑色淮甸人呼為
老翁花三州所生花雖別而葉頗相類但秦海州
者葉更作鉅齒狀一物而殊類如此醫家何所適
從當依舊說似單州出者為勝又本草飛廉一名
漏盧云與苦芙相類其根生則肉白皮黑乾則黑
如玄參七八月采花陰乾用所說與秦州海州所
圖漏盧花葉及根頗相近然彼人但名漏盧不曰
飛廉也數曰一種真似漏盧只是味苦酸誤服令
人吐不止時珍曰按沈存中筆談云今方家所用
漏盧乃飛廉也飛廉一名漏盧苗似苦芙根如牛
蒡綿頭者是也采時用根今閩中所謂漏盧莖如
油麻高六七尺秋深枯黑如漆采時用苗乃真漏
盧也餘見
飛廉下

根苗修治數曰凡采得漏盧細剉以生甘草相
對拌蒸之從巳至申揀出晒乾用

氣味鹹寒無毒別錄曰大寒藏器曰有毒杲曰無
毒足陽明本經藥也之才曰連翹
為之
使

主治皮膚熱毒惡瘡疽痔濕痺下乳汁久服輕身

益氣耳目聰明不老延年本經止遺溺熱氣瘡痒如

麻豆可作浴湯別錄通小腸泄精尿血腸風風赤眼

小兒壯熱撲損續筋骨乳癰瘰癧金瘡止血排膿

補血長肉通經脉大

發明弘景曰此藥久服甚益人而服食方罕見用
之近道出者惟療瘦疥耳市人皆取苗用時

珍曰漏盧下乳汁消熱毒排膿止血生肌殺蟲故
東垣以為手足陽明藥而古方治癰疽發背以漏

盧湯為首稱也。龐安常傷寒論治癰疽及預解時行痘疹熱用漏盧葉云無則以山巵子代之亦取其寒能解熱蓋不知其能入陽明之故也。

附方 舊二 **腹中蛇蟲** 漏盧為末以餅臛和方寸匕服之 外臺秘要 **小兒**

無辜 疳病肚脹或時泄痢冷熱不調以漏盧一兩杵為末每服一錢以豬肝一兩入鹽少許同

煮熟空心頓食 **冷勞泄痢** 漏盧一兩艾葉炒四兩之 聖惠方 為末米醋三升入藥末

一半同熬成膏入後末和丸梧子 **產後帶下** 方同

大每溫水下三十丸 聖濟總錄 **乳汁不下** 乃氣脉壅塞也又治經絡凝滯乳內服

痛邪畜成癰服之自然內消漏盧二兩半蛇退十條炙瓜萸十箇燒存性為末每服二

錢溫酒調下良久以熱羹湯投之以通為度 和 **劑歷節風痛** 筋脉拘攣古聖散用漏盧麩炒半兩

方 地龍去土炒半兩為末生薑二兩取 汁入蜜三兩同煎三五沸入好酒五合盛

之每以三盃調末一錢溫服 聖濟總錄 **一切癰疽** 發背初發二日但有熱證便宜服漏盧湯退毒

下膿乃是宣熱拔毒之劑熱退即住服漏盧用 有白茸者連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半兩

大黃微炒一兩為細末每服二錢姜棗湯調下李 迅癰疽 五月收漏盧草燒灰豬

集驗方 **白禿頭瘡** 膏和塗之 聖濟總錄 **飛廉** 本經上品

釋名 **漏蘆** 別錄 **木禾** 別錄 **飛雉** 同 **飛輕** 同 **伏兔** 同 **伏豬**

同 **天齋** 同(時珍曰)飛廉神禽之名也其狀鹿身豹 皮如箭羽復療風邪故

有飛廉飛雉飛輕諸名 **集解** 別錄曰(飛廉生河內川澤正月采根七月八

月采花陰乾(弘景曰)處處有之極似苦苾惟

本 草 綱 目 草 部 卷 之 十 五 六 百 〇 八

葉多刻缺葉下附莖輕有皮起似箭羽其花紫色俗方殆無用而道家服其枝莖可得長生又入神枕方今既別有漏蘆則此漏蘆乃別名爾恭曰此有兩種一種生平澤中是陶氏所說者一種生山岡上者葉頗相似而無刻缺且多毛其莖赤無羽其根直下更無旁枝生則肉白皮黑中有黑脉日乾則黑如玄參用莖葉及根療痔蝕殺蟲與平澤者俱有驗今俗以馬薊似苦芙者為漏蘆並非是也保昇曰葉似苦芙莖似軟羽花紫色子毛白所在平澤皆有五月六月采日乾敦曰凡使勿用赤脂蔓與飛燕形狀相似只赤脂蔓見酒則色便如血以此可表識之頌曰今秦州所圖漏蘆花似單葉寒菊紫色五七枝同一幹海州所圖漏蘆花紫碧色如單葉蓮花花萼下及根旁有白茸裹之根黑色如蔓青而細又類葱本與陶蘇所說飛燕相近然彼但謂之漏蘆今醫家罕有用飛燕者不能的識時珍曰飛燕亦蒿類也蘇頌圖經疑海州所圖之漏蘆是飛燕沈存中筆談亦言飛燕根如牛

勞而綿頭古方漏蘆散下云用有白茸者則是有白茸者乃飛燕無疑矣今考二物氣味功用俱不相遠似可通用豈或一類有數種而古今名稱各處不同乎

根及花修治

敦曰凡用根先刮去粗皮杵細以苦酒伴一夜漉出日乾細杵用

氣味苦平無毒

權曰苦鹹有毒之才曰得烏頭良惠麻黃

主治骨節熱脛重酸疼久服令人身輕本經頭眩頂

重皮間邪風如蜂螫針刺魚子細起熱瘡癰疽痔

濕痺止風邪欬嗽下乳汁久服益氣明目不老可

煮可乾用別錄主留血療痔蝕殺蟲蘇恭小兒疳痢為

散水漿服大效蕭炳治頭風旋運時珍

發明 時珍曰葛洪抱朴子書言飛廉單服可輕身延壽又言服飛廉煎可遠涉疾行力數倍於常本經別錄所列亦是良藥而後人不知用何哉

附方 舊一 **疔蠱蝕口** 及下部用飛廉蒿燒灰搗篩以兩錢匕著痛處其痛則忍之若不痛非疔也下部蟲如馬尾大相纏出無數十日瘥二十日平復 千金翼方

苧麻 別錄下品

釋名 時珍曰苧麻作紵可以積紵故謂之紵凡麻絲之細者為紵粗者為紵陶弘景云苧即今績苧麻是也麻字從广從林音

派象屋下林麻之形广音掩

集解 頌曰苧麻舊不著所出州土今閩蜀江浙多葉而無火面青背白有短毛夏秋間着細穗青花其根黃白而輕虛二月八月又按陸機草木疏云

苧一科數十莖宿根在土中至春自生不須栽種荆楊間歲三刈諸園種之歲再刈便剥取其皮以竹刮其表厚處自脫得裏如筋者煮之用緝布今江浙閩中尚復如此宗奭曰苧如葶麻花如白楊而長成穗每一朵凡數十穗青白色時珍曰苧家苧也又有山苧野苧也有紫苧葉面紫白苧葉面青其背皆白可刮洗者煮食救荒味甘美其子茶褐色九月收之二月可種宿根亦自生

根氣味 其寒無毒 權曰其平 大明曰其滑冷無毒

主治 **安胎貼熱丹毒** 別錄 **治心膈熱漏胎下血產前**

後心煩天行熱疾大渴大狂服金石藥人心熱罽

毒箭蛇蟲咬 明大 **漚苧汁止消渴** 別錄

發明 震亨曰苧根大能補陰而行滯血方藥或惡其賤似未曾用也藏器曰苧性破血將苧麻

本草綱目卷之二十一 苧麻

本草綱目卷之十五
與產婦枕之止血運產後腹痛以苧安腹上即止
也又蠶咬人毒入肉取苧汁飲之今人以子近蠶
種則蠶不生是矣

附方 舊四 新七 **痰哮欬嗽** 苧根煨存性為末生豆腐蘸
三五錢食即效未全可以肥

豬肉一二片蘸食 **小便不通** 聖惠方用麻根蛤粉
甚妙 醫學正傳 半兩為末每服二錢

空心新汲水下。摘玄方用苧根洗 **小便血淋** 苧
研攤絹貼貼少腹連陰際須臾即通

煎湯頻服大妙亦 **五種淋疾** 苧麻根兩莖打碎以
治諸淋 聖惠方 水一盞半煎半盞頃

服即通大妙 **妊娠胎動** 忽下黃汁如膠或如小豆
斗門方 汁腹痛不可忍者苧根去

黑皮切二升銀一斤水九升煎四升每服以水一
升入酒半升煎一升分作二服一方不用銀 梅

師方 **肛門腫痛** 生苧根搗爛坐之 **脫肛不收** 苧根搗
良 瀕湖集簡方 爛煎湯

熏洗之 **癰疽發背** 初起未成者苧根熟搗傳上日
聖惠方 夜數易腫消則瘡 圖經本草

五色丹毒 苧根煮濃汁日三 **鷄魚骨哽** 談野翁試
浴之 外臺秘要 驗方用苧

麻根搗汁以匙挑灌之立效。醫方大成用野苧
麻根搗碎丸如龍眼大魚骨魚湯下鷄骨鷄湯下

葉氣味 同 **主治** 金瘡傷折血出瘀血 時珍
根 時珍

發明 時珍曰苧麻葉甚散血五月五日收取和石
灰搗作團晒乾收貯遇有金瘡折損者研末

傳之即時血止且易痂也按李仲南永類方云凡
諸傷瘀血不散者五六月收野苧葉蘇葉搗爛傳

金瘡上如瘀血在腹內順流水絞汁服即通血皆
化水以生豬血試之可驗也秋冬用乾葉亦可

附方 新 **驟然水瀉** 日夜不止欲死不拘男婦用五
三 月五日采麻葉陰乾為末每服

二錢冷水調下勿喫熱物令人悶倒只 **冷痢白凍**
喫冷物小兒半錢 楊子建護命方

只同
蛇虺咬傷
青麻嫩頭搗汁和酒等分服三盞
上
中卽不發看傷處有竅是雄蛇無竅是雌蛇以針挑破傷處成竅傳藥摘玄方

苧麻
苧音頌。唐本草

釋名白麻
時珍曰苧一作蒨又作縑種必連頌故謂之蒨也

集解
恭曰苧卽蒨麻也今人取皮作布及索者實似大麻子九月十月采陰乾頌曰處處有之

北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實殼如蜀葵其中子黑色時珍曰苧麻今之白麻也多生卑濕處人亦種之葉大似桐葉團而有尖六七月開黃花結實如半磨形有齒嫩青老黑中子扁黑狀如黃葵子其莖輕虛潔白北人取皮作麻以莖蘸硫黃作焯燈引火甚速其嫩子小兒亦食之

實氣味苦平無毒主治赤白冷熱痢炒研爲末每

蜜湯服一錢癰腫無頭者吞一枚
蘇生眼翳瘀肉

起倒睫拳毛
時珍

根主治亦治痢古方用之
蘇頌

附方
新一切眼疾苧麻子一升爲末以獭豬肝批片蘸末炙熟再蘸再炙末盡乃

爲末每服一字陳米飲
目生翳膜久不愈者用蘇實以柳木作磴

磨去殼馬尾篩取黃肉去焦殼每十兩可得四兩
非此法不能去殼也用豬肝薄切滾藥慢炙熟爲

末醋和丸梧子大每服三十九丸白湯下一方以蘇
實肉袋中蒸熟暴爲末蜜丸溫水下

大青
別錄中品

釋名

時珍曰其莖葉皆深青故名

集解

別錄曰大青三四月采莖陰乾弘景曰今出東境及邊道紫莖長尺許莖葉皆用頌曰今

江東州郡及荆南眉蜀濠諸州皆有之春生青紫莖似石竹苗葉花紅紫色似馬蓼亦似芫花根黃三月四月采莖葉陰乾用時珍曰處處有之高二三尺莖圓葉長三四寸面青背淡對節而生八月開小花紅色成簇結青實大如椒顆九月份赤

莖葉氣味苦大寒無毒

權曰甘時珍曰其微鹹不苦

主治時氣頭痛大熱口瘡

別錄除時行熱毒甚良弘景

治溫疫寒熱甄權治熱毒風心煩悶渴疾口乾小兒

身熱疾風癰及金石藥毒塗罽腫毒大明主熱毒痢

黃疸喉痺丹毒

時珍

發明

頌曰古方治傷寒黃汗黃疸等有大青湯又治傷寒頭身強腰脊痛葛根湯內亦用大青

大抵時疾多用之時珍曰大青氣寒味微苦鹹能鮮心胃熱毒不特治傷寒也朱肱活人書治傷寒發赤斑煩痛有犀角大青湯大青四物湯故李象先指掌賦云陽毒則狂斑煩亂以大青升麻可回

附方

新喉風喉痺大青葉搗汁灌之取效止衛生易簡方小兒口瘡

大青十八銖黃連十二銖水三升煮一升服一日二服以瘥為度千金方熱病下痢

困篤者大青湯用大青四兩甘草赤石脂三兩膠二兩豉八合水一斗煮三升分三服不過二劑瘥

肘熱病發斑赤色煩痛大青四物湯用大青一兩阿膠甘草各二錢半豉二合分

三服每用水一盞半煎一盞入膠烱化服○又犀角大青湯用大青七錢半犀角二錢半卮子十枚煎二分溫服南陽活人書吐皮青黑小兒卒然吐皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之候也大青為末納口中以酒送下保幼大全方

小青

宋圖經

集解 頌曰小青生福州三月生花彼土人當月采葉用之

葉氣味 缺 **主治**生搗傳癰腫瘡癤甚效蘇頌治血痢

腹痛研汁服解蛇毒時珍

附方 新蛇虺螫傷衛生易簡方用小青一握細研入香白芷半兩酒調服手按患處候黃水出為效○摘玄方用小青大青牛膝葉同搗汁和酒服以渣傳之

中暑發昏

小青葉并水浸去泥控乾入沙糖搗汁急灌方壽域方

胡盧巴

宋嘉祐

釋名苦豆

集解 禹錫曰胡盧巴出廣州并黔州春生苗夏結子子作細莢至秋采今人多用嶺南者或云

是番蘿蔔子未審的否頌曰今出廣州或云種出海南諸番蓋其國蘆菔子也舶客將種蒔於嶺外亦生然不及番中來者真好今醫家治元臟虛冷為要藥而唐已前方不見用本草不著蓋是近出

修治 時珍曰凡入藥淘淨以酒浸一宿晒乾蒸熟或炒過用

氣味苦大溫無毒杲曰 **主治**元臟虛冷氣得附子

硫黃治腎虛冷腹脇脹滿面色青黑得藜香子桃

仁治膀胱氣甚效嘉祐治冷氣疝瘕寒濕脚氣益右

腎暖丹田時珍

發明宗奭曰膀胱氣用此合桃仁麩炒等分爲末

九空心鹽酒下其散以熱米湯下與九子相間空

心服日各一二服時珍曰胡盧巴右腎命門藥也

元陽不足冷氣潛伏不能歸元者宜之宋惠民和

劑局方有胡盧巴丸治大人小兒小腸奔豚偏墜

及小腹有形如卵上下走痛不可忍者用胡盧巴

八錢茴香六錢巴戟去心川烏頭炮去皮各二錢

棟實去核四錢吳茱萸五錢並炒爲末酒糊丸梧

子大每服十五丸小兒五丸鹽酒下太醫薛巴云

一人病寒疝陰囊腫痛服五苓諸藥不效與此而

平也又張子和儒門事親云有人病目不覩思食

苦豆卽胡盧巴頻頻不缺不周歲而目中微痛如

蟲行人皆漸明而愈按此亦因其益命門之功所

謂益火之原以消陰翳是也

附方新小腸氣痛胡盧巴炒研末每服二錢腎臟虛

冷腹脇脹滿胡盧巴炒二兩熟附子硫黃各七錢

四十九聖濟總錄冷氣疝瘕胡盧巴酒浸晒乾蕎麥炒研

酒糊丸梧子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下

服至兩月大後出白膿則除根方廣心法附餘

陰癩腫痛偏墜或小腸疝氣下元虛冷久不愈者

盧巴酒浸炒小茴香炒各二兩爲末酒氣攻頭痛

糊丸梧子大各服五七十九丸鹽酒下

胡盧巴炒三稜酒浸焙各半兩乾薑炮二錢寒濕

半爲末薑湯或溫酒每服二錢濟生方

脚氣腿膝疼痛行步無力胡盧巴酒浸一宿焙破

故紙炒香各四兩爲末以木瓜切頂去瓢安

藥在內令蒲用頂合住簽定爛蒸搗丸梧子
大每服七十丸空心溫酒下 楊氏家藏方

蠶實 本經 中品

釋名 荔實 別錄 馬藺子 唐 馬棟子 圖 馬薤 禮記 馬帚

爾雅 鐵掃帚 救荒劇草 本經 旱蒲 禮記 豕首 本經 三堅 弘景曰

用俗無識者惟天名精亦名豕首恭曰此即馬藺

子也月令仲冬荔挺出鄭玄注云荔馬薤也通俗

文云一名馬藺本草謂之荔實頌曰馬藺子北人

訛為馬棟子廣雅云馬薤荔也高誘云荔挺出荔

草挺出也講禮者不識呼為荔挺又作馬莧並誤

矣馬莧亦名豚耳即馬齒也時珍曰爾雅云莽音

瓶馬帚也此即荔草謂其可為馬刷

故名今河南北人呼為鐵掃帚是矣

集解 別錄曰蠶實生河東川谷五月采實陰乾頌

曰今陝西諸郡及鼎澧州亦有之近汴尤多

葉似薤而長厚三月開紫碧花五月結實作角子

如麻大而赤色有稜根細長通黃色人取以為刷

三月開花五月采實並陰乾用許慎說文云荔似

蒲而小根可為刷高誘云河北平澤率生之江東

頗多種於階庭但呼為旱蒲不知即馬薤也時珍

曰蠶草生荒野中就地叢生一本二三十莖苗高

三四尺葉中抽莖開花結實

正誤 宗奭曰蠶實陶隱居言方藥不用俗無識者

本草諸家所注不相应若果是馬藺則日華

子本草不當更言可為蔬菜蓋馬藺葉出土已硬

又無味馬牛皆不食豈堪人食今不敢以蠶實為

馬藺更俟博識時珍曰別錄蠶實亦名荔實則蠶

乃荔字之訛也張揖廣雅云荔又名馬藺其說已

明又按周憲王救荒本草言其嫩苗味苦焯熟換

水浸去苦味油鹽調食則馬藺亦可作菜矣寇氏

但據陶說疑之欠考矣陶氏

不識之藥多矣今正其誤

實修治時珍曰凡入藥炒過用以治痢則以醋拌炒之

氣味甘平無毒保昇曰寒頌曰山人服之云太溫甚有奇效

主治皮膚寒熱胃中熱氣風寒濕痺堅筋骨令人

嗜食久服輕身本經止心煩滿利大小便長臙膚肥

大錄別療金瘡血內流癰腫有效蘇恭婦人血氣煩悶

產後血運并經脉不止崩中帶下消一切瘡癤止

鼻衄吐血通小腸消酒毒治黃病殺蕈毒傳蛇蟲

咬大明治小腹疝痛腹內冷積水痢諸病時珍

附方舊一諸冷極病醫所不治者馬藷子九升洗淨空腹服一合酒下日三服

金方千寒疝諸疾寒疝不能食及腹內一切諸疾消食肥肌馬藷子一升每日取一把

以麩拌煮吞之服盡愈喉痺腫痛衛生易簡方用蠶

水一升煎三合入少蜜攪勻細呷大驗○聖惠方

用馬藷子二升升麻一兩為末蜜凡水服一錢○

又方馬藷子八錢牛蒡子六錢張文仲備

錢為末空心溫水服方寸匕水痢百病急方用馬

藷子以六月六日麩熬各等分為末空心米飲服

方寸匕如無六月六日麩常麩亦可牛骨灰亦可

○又方馬藷子乾薑黃連各等分為散熟湯服二

方寸匕入腹即斷也冷熱皆治常用神效不得輕

之忌豬腸風下血有疣瘡瘡破者不治馬藷子一

肉冷水何首烏半斤雄黃雌黃各四兩為末以浸藥酒打

糊丸梧子大每服三十九溫酒下日三服見效

普濟方

花 在及根葉主治去白蟲本經療喉痺多服令人澹

洩別錄主癰疽惡瘡時珍

發明頌曰蠹草花實皆入藥列仙傳云寇先生宋

日記云北方田野人患胸腹飽脹者取馬揀花搗

凉水服即泄數行而愈據此則多服令人泄之說

有驗而蠹實之為馬藺更無疑矣

附方舊三睡死不寤蠹實根一握杵爛以水絞喉

痺口噤馬藺花二兩蔓荊子一喉痺腫痛喘息欲

臺秘要用馬藺根葉二兩水一升半煮一盞細飲

之立瘥。聖惠方用根搗汁三合蜜一合慢火熬

成徐徐點之日五七度一方單汁飲沙石熱淋馬藺

之口噤者灌下無生者以刷煎汁

花七枚燒故筆頭二十枚燒粟米一合炒小便不

為末每服二錢酒下日二服各通神散

通馬藺花炒茵香炒葶藶炒為一切癰疽發背惡

掃帚同松毛牛膝以取鐵掃帚地上自

水煎服乾坤生意面上癩廔落葉并子煎湯頻

消數次自消壽域神方面飽鼻鼓馬藺子花杵傳

附錄必似勒拾遺藏器曰辛溫無毒主冷氣胸閉

惡實別錄中品

釋名鼠粘別錄牛蒡別錄大力子綱目蒡翁菜綱目便牽牛

綱目時珍曰其實狀惡而多刺鉤故名其根

目實殼多刺鼠過之則綴惹不可脫故謂之鼠粘

子亦如羊
負來之北

集解

別錄曰惡實生魯山平澤恭曰魯山在鄧州東北此草葉大如芋子殼似栗狀實細長如

芡蔚子頌曰惡實即牛蒡子也處處有之葉大如芋葉而長實似葡萄核而褐色外殼似栗林而小如指頭多刺根有極大者作菜茹益人秋後采子入藥時珍曰牛蒡古入種子以肥壤栽之剪苗洵淘為蔬取根煮曝為脯云甚益人今人亦罕食之三月生苗起莖高者三四尺四月開花成叢淡紫色結實如楓林而小萼上細刺百十攢簇之一株有子數十顆其根大者如臂長者近尺其色灰黦七月采子十月采根

子修治

敷曰凡用棟淨以酒拌蒸待有白霜重出以布拭去焙乾搗粉用

氣味辛平無毒

藏器曰苦元素曰辛溫陽中之陰升也杲曰辛平陽也降也

主治明目補中除風傷

別錄風毒腫諸瘰

藏器研末浸

酒每日服三二盞除諸風去丹石毒利腰脚又食

煎熟按三枚吞之散諸結節筋骨煩熱毒甄權吞一

枚出癰疽頭

蘇恭

炒研煎飲通利小便

孟詵

潤肺散氣

利咽膈去皮膚風通十二經

元素

消斑疹毒

時珍

發明

杲曰鼠粘子其用有四治風濕癰疹咽喉風熱散諸腫瘡瘍之毒利凝滯腰膝之氣是也

附方

舊五

風水身腫

欲裂鼠粘子二兩炒研為末每溫水服二錢日三服

聖方

風熱浮腫

咽喉閉塞牛蒡子一合半生半熟為末熱酒服一寸七

經驗方

痰厥頭痛

牛蒡子炒旋覆花等分為末臘茶清服一錢日二服

聖惠方頭痛連

睛 鼠粘子石膏等分爲末 咽膈不利 既風壅涎唾

荆芥穗一兩炙甘草半兩爲末食後湯 懸癰喉痛

風熱上搏也惡實炒甘草生等分 喉痺腫痛 牛蒡

水煎含嚙名啓關散 普濟方 喉痺腫痛 子六

分馬藷子六分爲散每空心溫水服方寸七日再

服仍以牛蒡子三兩鹽二兩研勻炒熱包熨喉外

廣 咽喉痘疹 牛蒡子二錢桔梗一錢半粉茸 風

熱癰疹 牛蒡子炒浮萍等分以薄荷湯服 痘疹要訣

痛 鼠粘子炒煎水含 小兒痘瘡 時出不快壯熱狂

嗽吐之一延年方 燥咽膈壅塞大便

秘澁小兒咽喉腫不利若大便利者勿服牛蒡子

炒一錢二分荆芥穗二分甘草節四分水一盞同

煎至七分溫服已出亦可 婦人吹乳 鼠粘子二錢麝

服名必勝散 和劑局方 香少許溫酒

細吞下 便癰腫痛 鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙

袖珍方 朴硝一匙空心溫酒服 袖珍

方 蛇蝎蠱毒 大力子煮汁服 水蠱腹大 惡實微炒

麩糊丸 梧子大每米飲 歷節腫痛 風熱攻手指赤

下十丸 張文仲方 腫麻木甚則攻

肩背兩膝遇暑熱則大便秘牛蒡子三兩新豆豉

炒羌活各一兩爲末每服二錢白湯下 本事方

根莖 氣味 苦寒無毒 權曰其平(藏器曰)根須蒸

熟暴乾用不爾令人欲吐

主治 傷寒寒熱汗出中風面腫消渴熱中逐水久

服輕身耐老 別根主牙齒痛勞瘡諸風脚緩弱風

毒癰疽欬嗽傷肺肺壅疝瘕冷氣積血 蘇根浸酒

服去風及惡瘡和葉搗碎傅杖瘡金瘡永不畏風

藏主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟惡

氣可常作菜食令人身輕甄權切根拌豆麩作飯食

消脹壅莖葉煮汁作浴湯去皮間習習如蟲行又

入鹽花生搗搗一切腫毒孟詵

發明頌曰根作脯食甚良莖葉宜煮汁釀酒服冬月采根蒸暴入藥劉禹錫傳信方療暴中風

用繫細牛蒡根取時避風以竹刀或荆刀刮去土

生布拭了搗絞取汁一大升和好蜜四大合溫分

兩服得汗出便瘥此方得之岳鄂鄭中丞鄭因食

熱肉一頃便中暴風外甥盧氏為穎陽令有此方

服當時便瘥

附方舊五新時氣餘熱不退煩燥發渴四肢無力不能飲食用牛蒡根搗汁

服一小盞效

聖惠方 **天行時疾**生牛蒡根搗汁五合空腹分為二服服訖取桑葉一

把炙黃以水一升煮取五合頃服 **熱攻心煩**恍惚

取汗無葉用枝 孫真人食忌 **傷寒搐搦**汗後覆蓋不密致腰背手足搐

為二服 食醫心鏡 **傷寒搐搦**致腰背手足搐

搗者牛蒡根散主之牛蒡根十條麻黃牛膝天南

星各六錢判於盆內研細好酒一升同研以新布

絞取汁以炭火半秤燒一地坑令赤掃淨傾藥汁入坑內再燒令黑色取出於乳鉢內細研每服一錢溫酒下日三服 **一切風疾**十年二十年者牛蒡根一升生地黄枸杞

子牛膝各三升用袋盛藥浸無灰酒 **老人中風**口

三升內每任意飲之 外臺秘要方 **老人中風**口

白米四合淘淨和作餠飪鼓汁中煮加葱椒五味

空食之恒服極 **老人風濕**久痺筋攣骨痛服此壯腎潤皮毛益氣力

效 壽親養老書

牛蒡根一升切生地黄一升切大豆二升炒以絹袋盛浸一斗酒中五六日任性空心溫服二三盞

日二服 集驗方 頭面忽腫 熱毒風氣內攻或連手足赤腫 觸着痛者牛蒡子根一名蝙蝠

刺洗淨研爛酒煎成膏絹攤貼腫處仍 頭風掣痛 以熱酒服一二匙腫消痛減 斗門方

不可禁者磨膏主之取牛蒡莖葉搗取濃汁二升 無灰酒一升鹽花一匙頭糖火煎稠成膏以摩痛

處風毒自散摩時須極力令 頭風曰屑 牛蒡葉搗 熱乃效冬月用根 篋中方

之至明皂筴水 喉中熱腫 鼠粘根一升水五升煎 洗去 聖惠方 一升分三服 延年方

小兒咽腫 牛蒡根搗汁細 熱毒牙痛 熱毒風攻頭 不可忍牛蒡根一斤搗汁入鹽花一錢銀器中熬

成膏每用塗齒齦下重者不過三度瘥 聖惠方 項下癭疾 鼠粘子根一升水三升煮取一升半分

三服或為末蜜丸常服之 救急方

耳卒腫痛 牛蒡根切絞汁二升銀鍋 小便不通 臍 內熬膏塗之 聖濟總錄

急痛牛蒡葉汁生地黄黃汁二合和勻入蜜二合每 服一合入水半盞煎三五沸調滑石末一錢服

聖濟 癰子腫毒 鼠粘子葉貼 石瘦出膿 堅實寒熱 總錄 千金方

為末和鷄子白封 諸瘡腫毒 牛蒡根三莖洗煮爛 搗汁入米煮粥食一

椀甚良 積年惡瘡 及花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗 普濟方 和臘月豬脂日日封之 千金

方 月水不通 結成癥塊腹肋脹大欲死牛蒡根二 斤剉蒸三遍以生絹袋盛之以酒二

斗浸五日每食前溫 普濟方 服一盞

藁耳

釋名 胡藁 本常思 弘 蒼耳 爾 卷耳 詩 爵耳 詩 豬耳 經 本經 中品

綱目耳璫詩疏地葵本經施音羊負來弘景道人頭圖經進賢

菜珠記事噶起草綱目野茄綱目縑絲草頌曰詩人謂之

蒼耳廣雅謂之菜耳皆以實得名也陸機詩疏云其實正如婦人耳璫今或謂之耳璫草鄭康成謂

是白胡菜幽州人呼為爵耳博物志云洛中有人驅羊入蜀胡菜子多刺粘綴羊毛遂至中國故名

羊負來俗呼為道人頭弘景曰儉人皆食之謂之常思菜以葉覆麥作黃衣者方用甚稀時珍曰其

葉形如葇麻又如茄故有菜耳及野茄諸名其味滑如葵故名各地葵與地膚同名詩人思夫賦卷耳

之章故名常思菜張揖廣雅作常葇亦通

集解別錄曰菜耳生安陸川谷及大安田野實熟時采頌曰今處處有之陸氏詩疏云其葉青

白似胡荽白華細莖蔓生可煮為茹滑而少味四月中生子正如婦人耳璫郭璞云形如鼠耳叢生

如盤令之所有皆類此但不作蔓生時珍曰按周憲王收荒本草云蒼耳葉青白類粘糊菜葉秋

間結實比桑椹短小而多刺嫩苗焯熟水浸淘拌食可收飢其子炒去皮研為麪可作燒餅食亦可

熬油點燈

實修治大明曰入藥炒熟搗去刺用或酒拌蒸過用

氣味甘温有小毒別錄曰苦權曰其無毒恭曰忌豬肉馬肉米泔害人

主治風頭寒痛風濕周痺四肢拘攣痛惡肉死媵

膝痛久服益氣藏器治肝熱明目甄權治一切風氣填

髓暖腰脚治癩癰疥瘡及瘙癢大明炒香浸酒服去

風補益時珍

附方

舊三新四

久瘧不瘥

蒼耳子或根莖亦可焙研末酒糊丸梧子大每酒服三十

丸日二服生者搗汁服亦可

大腹水腫

小便不利蒼耳子灰葶藶末等

分每服二錢水下

風濕攣痺

一切風氣蒼耳子三兩炒為末以水一升

半煎取七合去滓

牙齒痛腫

蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷

即吐去吐後復含不過一劑瘥莖葉亦可或入鹽少許

鼻淵流涕

蒼耳子實

子即縑絲草子炒研為末每白湯點服一二錢

眼目昏暗

葉耳實一升為

未白米半升作粥

嗜酒不已

毡中蒼耳子七枚燒灰投酒中飲之即不

嗜 陳藏器本草

莖葉修治

數日凡采得去心取黃精以竹刀細切拌之蒸從已至亥時出去黃精陰乾用

氣味苦辛微寒有小毒

恭曰忌豬肉馬肉米泔伏磁砂

主治溪毒

別錄

中風傷寒頭痛

孟詵

大風癩癧頭風濕

痺毒在骨髓腰膝風毒夏月采曝為末水服一二

七冬月酒服或為丸每服二三十九日三服滿百

日病出如癩疥成汁出或斑駁甲錯皮起皮落

則臙如凝脂令人省睡除諸毒螫殺蟲痺濕蠹久

服益耳目聰明輕身強志

蘇恭

接葉安舌下出涎去

目黃好睡燒灰和臘豬脂封丁腫出根煮酒服主

狂犬咬毒

藏器

發明 時珍曰蒼耳藥久服去風熱有效最忌豬肉及風邪犯之則遍身發出赤丹也按蘇沈良

方云莫耳根苗葉實皆洗濯陰乾燒灰湯淋取濃汁泥連兩甗煉之灰汁耗即旋取傍釜中熱灰湯

益之一日夜不絕火乃旋得霜乾甗瓶收之每日早晚酒服二錢補煖去風駐顏尤治皮膚風令人

膚革清淨每澡沐入少許尤佳宜州學昌從諫服此十餘年至七八十紅潤輕健皆此藥力也斗門

方云婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地不知人事者用喝起草嫩心陰乾為末以酒服一大錢其

功甚效此物善通頂門連腦蓋即蒼耳也

附方 舊十二 **萬應膏** 治一切癰疽發背無頭惡瘡

瘡牙疼喉痺五月五日采蒼耳根葉數擔洗淨晒萎細到以大鍋五口入水煮爛以篩濾去粗滓布

絹再濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉痺敷

舌上或嚼化二三次即效每日 **一切風毒** 并殺三

用酒服一匙極有效 集簡方 能進食若病胃脹滿心悶發熱即宜服之五月五

日午時附地刈取葉耳葉洗暴搗下篩每服方寸匕酒或漿水下日一夜三若覺吐逆則以蜜丸服

準計方寸匕數也風輕者日二服若身體作粟或麻豆出此為風毒出也可以針刺潰去 **一切風氣**

黃汁乃止七月七月九月亦可採用 蒼耳嫩葉一石切和麥蘖五升作塊於蒿艾中罾

二十日成麴取米一斗炊作飯看冷暖入麴三升釀之封二七日成熟每空心暖服神驗封此酒可

兩重布不得令密密則益出忌馬肉豬肉 孟詵食療 **諸風頭運** 蒼耳葉曬乾為末每服一錢酒調

方草 每服二十九十日全 **血風腦運** 方見發 **毒攻手足**

好矣 楊氏經驗方 腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傳 **卒中水毒** 初

之立效春用心冬用子 千金翼 覺

頭目微痛惡寒骨節強急日醒暮劇手足逆冷三日則蟲蝕下部六七日膿潰食至五臟殺人也搗常思草絞汁服一二升并以毒蛇溪毒等所傷口

綿染導其下部肘後方
瘰眼黑手足強直毒攻腹內成塊逡巡不救蒼耳嫩苗一握取汁和酒溫灌之以滓厚傳傷處勝

金方疫病不染五月五日午時多采蒼耳嫩葉陰乾舉家皆服能辟邪惡千金方風瘙癢疹身痒不止用蒼耳莖葉豆淋酒調下面上黑斑調服一錢一月愈摘玄

方赤白汗斑蒼耳嫩葉尖和青鹽搗爛五六次效摘玄方
癘疾溫酒下日二服○乾坤生意用蒼耳葉為末以大楓子油和九梧子大每服三四十丸以茶湯下日二服○又方五月五日或六月六日五更帶

露采蒼耳草搗取汁熬作錠子取半斤鱧魚一尾剖開不去肚腸入藥一錠線縫以酒二盃慢火煮熟令喫不過三五箇魚卒得惡瘡蒼耳桃皮作反即愈也忌鹽一百日

花惡瘡有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上聖濟總錄一切丁腫洗日危困者用蒼耳根葉搗和小兒

○養生方用蒼耳根苗燒灰和醋淀塗之乾再上梅肉五箇連鬚葱三根酒齒風動痛蒼耳一握以二鍾煎一鍾熱服取汁

含漱外纏喉風病蒼耳根一把老薑一塊研赤臺秘要

目生瘡作痛道人頭末二兩乳香一錢每鼻衄不止蒼耳莖葉搗汁一五痔下血五月五日采蒼耳小盞服聖惠方

五痔下血五月五日采蒼耳小盞服聖惠方

寸七甚效 赤白下痢 蒼耳草不拘多少洗淨用水

膏每服一二匙 白產後諸痢 蒼耳葉搗絞汁溫服

湯下 醫方摘玄 中十餘度飲水愈 升浸水 花蜘蛛

聖惠 誤吞銅錢 蒼耳頭一把以水一升浸水 肘後方

蛛毒 咬人與毒蛇無異用野縑絲即道人頭 搗汁一盞服仍以渣傳之

花主治白癩頑癢 時珍 校正 時珍曰據蘇沈二說併入唐

天名精 本經 上品 鶴虱開寶地菘別錄有名

未用 崇松 釋名 天蔓菁 別錄 天門精 別錄 地菘 本唐 崇松 別錄 崇松 玉

門精 別錄 麥句薑 本經 蟾蜍蘭 別錄 醫葶藍 本經 蚶蚞草 綱目

豕首 本經 彘顛 別錄 活鹿草 異苑 劉愷草 愷音胡 皺面草

綱目 母豬芥 綱目 實名鶴虱根名杜牛膝 恭曰天名精 即活鹿草也

別錄 一名天蔓菁南人名為地菘葉與蔓菁菘菜 相類故有此名其味甘辛故有薑稱狀如藍而蟹

蟄好居其下故名蟹蟄藍香氣似蘭故又名蟾蜍 蘭時珍曰天名精乃天蔓菁之訛也其氣如豕彘

故有豕首彘顛之名昔人謂之活鹿草俗人因其 氣臊訛為狐狸臊者是也爾雅云菘醜豕首也郭

璞注云江東呼為豨首可以燭蠶蛹食藏器曰郭 璞注爾雅蓬麥云即麥句薑者非也陶公注鈞樟

條云有一草似狼牙氣辛臭名為地菘人呼為劉 檣草主金瘡按異苑云宋元嘉中青州劉愷射一

麀剖五臟以此草塞之蹶然而起愷怪而拔草便 倒如此三度愷因密錄此草種之主折傷愈多人

因以名之既有活鹿之名雅與麀事 相合陶蘇俱說是地菘定非二物

正誤 弘景曰天名精卽今之豨薹亦名豨首夏月

恭曰豨首苦而臭名精辛而香全不相類也禹錫

曰蘇恭云天名精南人名地菘陳藏器本草解紛

亦言天名精爲地菘開寶本草不當重出地菘條

例宜刊削時珍曰按沈括筆談云世人既不識天

名精又妄認地菘爲火棟本草又出鶴虱一條都

成紛亂不知地菘卽天名精其葉似菘又似蔓菁

故有二名鶴虱卽其實也又別錄有名未用壘

菘卽此地菘亦係誤出今並正之合而爲一

集解 別錄曰天名精生平原川澤五月采保昇曰

山南菘菜夏秋抽條頗似薄荷荷花紫色白色味辛而

香志曰地菘所在皆有生人家及路旁陰處高二

三寸葉似菘葉而小又曰鶴虱出波斯者爲勝今

上黨亦有刀勢薄於波斯者恭曰鶴虱生西戎子

似蓬蒿子而細合莖葉用之頌曰天名精江湖間

皆有之狀如薺保昇所說又曰鶴虱江淮衛湘皆

有之春生苗葉嫩似紫蘇大而尖長不光莖高二

尺許七月生黃白花似菊八月結實子極失細乾

卽黃黑色南人呼其葉爲火棟按火棟卽豨薹雖

花實相類而別是一物不可雜用時珍曰天名精

嫩苗綠色似皺葉菘芥微有狐氣淘浸煉之亦可

食長則起莖開小黃花如小野菊花結實如同蒿

子亦相似最粘人衣狐氣尤甚炒熟則香故諸家

皆云辛而香亦巴人食負蠶南人食山禁之意爾

其根白色如短牛膝此物最賤而唐本草言鶴虱

出西戎宋本草言出波斯者何哉蓋當時人不知

用之惟西戎波斯始知入藥且土產所宜故爾亦

首宿云出西域而不知中國飼馬者卽是也詳見

豨薹

葉 根同氣味甘寒無毒別錄曰壘松辛無毒時珍曰

才曰垣衣地微辛其有小毒生汁吐人之

黃爲之使

主治 瘀血血瘕欲死下血止血利小

便久服輕身耐老本經除小蟲去痺除胸中結熱止

煩渴逐水大吐下別錄破血生肌止鼻衄殺三蟲除

諸毒腫丁瘡癩痔金瘡內射身癢癰瘡不止者楷

之立已唐本地菘主金瘡止血解惡蟲蛇螫毒每按以

倚之開寶吐痰止咳治牙痛口緊喉痺時珍地菘松主眩

痺別錄有

發明時珍曰天名精併根苗而言也地菘松皆

吐痰止血殺蟲解毒故搗汁服之能止痰癰激之

效方云凡男婦乳蛾喉腫痛及小兒急慢驚風

牙關緊急不省人事者以鶴虱草一名皺面草一

各母豬芥一名杜牛膝取根洗淨搗爛入好酒絞

汁灌之良久即甦仍以渣傳項下或醋調搽亦好

朱端章集驗方云余被檄任淮西幕府時牙疼大

作一刀鐮人以草藥一捻湯泡少時以手蘸湯挹

痛處即定因求其方用之治人多效乃皺面地菘

草也俗人訛為地菘沈存中筆談專辯地菘其子

名鶴虱正此物也錢季誠方用鶴虱一枚擢置齒

中高監方以鶴虱煎米醋漱口或用防風鶴虱煎

水噙漱仍研草塞痛處皆有效也

附方

新舊二九男女吐血皺面草即地菘晒乾為末每

日二次衛生簡易咽喉腫塞傷寒蘊要治痰涎壅滯喉腫

草連根葉搗汁鴛翎掃入去痰最妙○聖濟總錄

用杜牛膝鼓錘草同搗汁灌之不得下者灌鼻得

吐為妙○又方土牛膝春夏用莖秋冬用根一纏

喉風腫

大每噉一二九即愈乾者為末蜜丸亦可

名救生丸

諸骨哽咽

地菘馬鞭草各一握去根

經效濟世丸

普濟方

風毒瘰癧

赤腫地菘搗傳

作彈丸綿裹含嚙其骨

自軟而下也

孫氏集效方

發背初起

惠方

疔瘡腫毒

鶴虱草葉浮酒糟同搗傳

之立效

地菘杆汁一升日再服

傷寒類要

惡瘡腫毒

地菘搗汁日服三四次外臺

秘要

惡蛇咬傷

地菘搗傳之

易簡方

鶴虱

唐本氣味苦辛有小毒

為散以肥肉臙汁服方寸匕亦入丸散用

痛以淡醋和半七服立瘥

開寶

殺五臟蟲止瘡傳惡

瘡大

發明

頌曰鶴虱殺蟲方中為最要藥初虞世古今

梧子大以蜜湯空腹吞四五十九忌酒肉常雲患

心痛十年不瘥於雜方內合服之便愈李絳兵部

手集方治小兒蛇蟲嚙心腹痛亦單用鶴虱研末

附方一新大腸蟲出

不斷斷之復生行坐不得鶴虱末水調半兩服自愈怪疾奇方

釋名希仙

綱目火杵草

唐本豬膏母

唐本虎膏

唐本狗膏

唐本

粘糊菜

救荒時珍曰韻書楚人呼豬為豨呼草之

故謂之豨豨豨豬膏虎膏狗膏皆因其氣似及治虎

狗傷也火杵當作虎豨俗音訛爾近人復訛豨豨

為希仙矣救荒本草言其嫩苗煉熟浸去苦味油鹽調食故俗謂之粘糊菜

集解恭曰：豨薟田野皆食之一名火杓葉似醋漿

曰：豬膏母生平澤下濕地所在皆有一名虎膏一

名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛頌曰：豨薟處處有之

春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺秋初

有花如菊結實頗似鶴虱夏采葉暴乾用藏器曰

豬膏草葉似荏有毛保昇曰：豬膏葉似蒼耳兩枝

相對莖葉俱有毛黃白五月六月采苗日乾時

珍曰按蘇恭唐本草謂豨薟似酸漿豬膏母似蒼

耳列為二種而成納進豬膏丸表言此藥與本草

所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨

薟丸表言此草金棱銀線素莖紫荻對節而生蜀

號火杓莖葉頗同蒼耳又按沈括筆談云世人妄

認地菘為火杓有單服火杓法者乃是地菘不當

用火杓火杓乃本草名豬膏母者後人不識重復

出條也按此數說各異而今人風痺多用豬膏丸

將何適從耶時珍常聚諸草訂視則豬膏草素葉

有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍

薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十

八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外萼

有細刺粘人地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉

皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說

相合今河南陳州采豨薟充方物其狀亦是豬膏

草則沈氏謂豨薟即豬膏母者其說無疑矣蘇恭

去苦味油鹽調食故俗謂之粘糊菜

一名火杓葉似醋漿

一名虎膏一

名狗膏葉似蒼耳莖圓有毛

春生苗葉似芥葉而狹長文粗莖高二三尺秋初

有花如菊結實頗似鶴虱夏采葉暴乾用

豬膏草葉似荏有毛

相對莖葉俱有毛

五月六月采苗日乾

按蘇恭唐本草謂豨薟似酸漿豬膏母似蒼

耳列為二種而成納進豬膏丸表言此藥與本草

所述相異多生沃壤高三尺許節葉相對張詠豨

薟丸表言此草金棱銀線素莖紫荻對節而生蜀

號火杓莖葉頗同蒼耳又按沈括筆談云世人妄

認地菘為火杓有單服火杓法者乃是地菘不當

用火杓火杓乃本草名豬膏母者後人不識重復

出條也按此數說各異而今人風痺多用豬膏丸

將何適從耶時珍常聚諸草訂視則豬膏草素葉

有直稜兼有斑點葉似蒼耳而微長似地菘而稍

薄對節而生莖葉皆有細毛肥壤一株分枝數十

八九月開小花深黃色中有長子如同蒿子外萼

有細刺粘人地菘則青莖圓而無稜無斑無毛葉

皺似菘芥亦不對節觀此則似與成張二氏所說

相合今河南陳州采豨薟充方物其狀亦是豬膏

草則沈氏謂豨薟即豬膏母者其說無疑矣蘇恭

所謂似酸漿者乃龍葵非豨薟蓋誤認爾但沈氏

言世間單服火杓乃是地菘不當用豬膏母似與

成張之說相反今按豨薟豬膏母條並無治風之

說惟本經地菘條有去痺除熱久服輕身耐老之

語則治風似當用地菘然成張進御之方必無虛

謬之理或者二草皆有治風之功乎而今服豬膏

母之豨薟者復往往有效其地菘不見有

服之者則豨薟之為豬膏尤不必疑矣

豨薟氣味苦寒有小毒又曰豬膏母辛苦平無毒

藏器曰有小毒蘇恭

曰猪膏無毒誤矣

主治豨薟治熱蠱煩滿不能食生搗汁三合服多

則令人吐又曰猪膏母主金瘡止痛斷血生肉除

諸惡瘡消浮腫搗封之湯漬散傳並良蘇恭主久瘡

痰癰搗汁服取吐搗傅虎傷狗咬蜘蛛咬蠹咬蠮

蝮溺瘡藏器治肝腎風氣四肢麻痺骨痛膝弱風濕

諸瘡時珍

發明頌曰蜀人單服豨薟法五月五日六月六日

中層層洒酒與蜜蒸之又暴如此九過則氣味極

香美熬搗篩末蜜丸服之云甚益元氣治肝腎風

氣四肢麻痺骨間冷腰膝無力者亦能行大腸氣

諸州所說皆云性寒有小毒與唐本同惟文州及

高郵州云性熱無毒服之補益安五臟生毛髮兼

主風濕瘡肌肉頑痺婦人久冷尤宜用須去粗莖

留枝葉花實蒸暴兩說不同豈單用葉則寒而有

毒并枝花實則熱而無毒乎抑土地所產不同而

然歟時珍曰生搗汁服則令人吐故云有小毒九

蒸九暴則補人去痺故云無毒生則性寒熱則性

溫云熱者非也慎微曰按江陵府節度使成訥進

豨薟丸方表畧云臣有弟訥年二十一中風伏枕

五年百醫不瘥有道人鍾針因覩此患曰可餌豨

薟丸必愈其草多生沃壤高三尺許節葉相對當

夏五月以來收之每去地五寸剪刈以溫水洗去

泥土摘葉及枝頭凡九蒸九暴不必太燥但以取

足為度仍熬搗為末煉蜜丸如梧子大空心溫酒

或米飲下二三十丸服至二千丸所患愈加不得

憂慮是藥攻之力服至四千丸必得復至五千丸

當復丁壯臣依法修合令訥服之果如其言服後

本草綱目卷之五十五

須喫飯二五匙歷之五月五日采者佳奉勅宣付醫院詳錄又知益州張詠進豨薹丸表畧云功以餐石飲水可作充腸之饌餌松含栢亦成救病之功是以療飢者不在於羞珍愈病者何煩於異術倘獲濟時之藥輒陳鄙物之形不耻管窺輒于天聽臣因換龍興觀握得一碑內說修養氣術并藥方二件依方差人訪問采覓其草頗有異金稜銀線素莖紫萸對節而生蜀號火杵莖葉頗同蒼耳不費登高歷險每常求少獲多急采非難廣收甚易倘勤久服旋見神功誰知至賤之中乃有殊常之效臣自喫至百服眼目清明即至千服鬚鬚烏黑筋力輕健效驗多端臣本州有都押衙羅守一曾因中風墜馬失音不語臣與十服其病立瘥又和尚知嚴年七十忽患偏風口眼喎斜時時吐涎臣與十服亦便得痊今合一百劑差職貢史元奏進

附方 新風寒泄瀉

火杵丸治風氣行於腸胃泄瀉火杵草為末醋糊丸梧子大每

最三十九白湯下 聖濟總錄

癰疽腫毒

一切惡瘡豨薹草端午采者一兩乳香一兩白

礬燒半兩為末每服二錢熱酒調下毒重者連進三服得汗妙 乾坤秘韞

發背下瘡

豨薹草

五葉草即五瓜龍野紅花即小薊大蒜等分搗爛入熱酒一盞絞汁服得汗立效 乾坤生

丁瘡腫毒

端午采豨薹草日乾為末每服半兩熱酒調下汗出即愈極有效驗 集

反胃吐食

火杵草焙為末蜜丸梧子大每沸湯下五十九 百一選方

附錄類鼻

別錄有名未用曰味酸溫無毒主痲痺生田中高地葉如天名精莢根五月采

時珍曰此似豬膏草也古今名謂或不同故附於此

羊屎柴

時珍曰按乾坤生意云一名牛

箬目綱

屎柴生山野中葉類鶴虱四月開白花其葉主癰疽發背搗傳之冬月用根可以毒魚

釋名 筩 與筭同 蔡葉 時珍曰 筭若竹而弱故名 其生疎遠故又謂之遼

集解 時珍曰 筭生南方平澤其根與莖皆似小竹 其節籜與葉皆似蘆荻而葉之面青背淡柔

而韌新舊相代四時常青南人取葉作 笠及裹茶盃包米糲女人以襯鞵底

葉氣味 其寒無毒 **主治** 男女吐血衄血嘔血咯血

下血並燒存性温湯服一錢七又通小便利肺氣

喉痺消癰腫 時珍

附方 新一切眼疾 籠籜燒灰淋汁洗之 經驗方 咽喉閉

痛 菘葉燈心草燒灰等分 吹之甚妙 集簡方 耳忽作痛 或紅腫肉脹 將經霜青筭

露在外將朽者燒存性為末傳入 耳中其疼即止 楊起簡便方 **肺壅鼻衄** 筭葉 燒灰

白麩三錢 研勻并花水 **經水不止** 筭葉灰 蠶紙灰 服二錢 聖濟總錄

二錢米飲下 **腸風便血** 茶篋內筭葉燒存性每服 三匙空心糯米湯下或入

麝香少許 **男婦血淋** 亦治五淋多年者煮酒瓶 珍百一選方 王 頭筭葉三五年至十年

者尤佳每用七箇燒存性入麝香少許陳米飲下 日三服有人患此二服愈 福建煮過夏月酒多有

之一百 **尿白如注** 小腹氣痛茶籠內筭葉燒存性 小 入麝香少許米飲下 經驗方

便澀滯 不通乾筭葉一兩燒灰滑石半兩 為末每米飲服三錢 普濟方 **男婦轉**

疔 上方同 **吹奶乳癰** 五月五日糲筭燒灰酒服二 錢即散 累效 濟急仙方 **痘**

瘡倒靨 若葉灰一錢麝香少許酒 服 張德恭痘疹便覽方

蘆 別錄 下品 **校正** 併入拾遺江 中采出蘆

釋名葦

音偉葎

音加花名蓬

葎

唐本筍名薩

音拳時珍曰按毛萇詩疏

云葦之初生曰葎未秀曰蘆長成曰葦葦者偉大也蘆者色蘆黑也葎者嘉美也

集解

恭曰蘆根生下濕地莖葉似竹花若荻花名蓬葎二月八月采根日乾用頌曰今在處有

之生下濕陂澤中其狀都似竹而葉抱莖生無枝花白作穗若茅花根亦若竹根而節疎其根取水底味其辛者其露出及浮水中者並不堪用按郭璞注爾雅云葎即蘆也葦即蘆之成者荻蘆似葦而小中實江東呼為烏蘆音丘或謂之藹即荻也至秋堅成即謂之萇音桓兼似萇而細長高數尺江東謂之兼其花皆名芳音調其萌皆名薩堪食如竹筍若然則蘆葦通為一物也所謂兼乃今作簾者是也所謂荻者今以當薪者是也而人罕能別兼荻與蘆葦也又北人以葦與蘆為二物水旁下濕所生者皆名葦其細不及指大人家池圃所植者皆名蘆其幹差大深碧色者亦難得然則蘆

葦皆可通用矣時珍曰蘆有數種其長丈許中空皮薄色白者葎也蘆也葦也短小於葦而中空皮厚色青蒼者荻也蘆也荻也萇也其最短小而中實者兼也蘆也皆以初生已成得名其身皆如竹其葉皆長如箬葉其根入藥性味皆同其未鮮葉者古謂之紫籜數曰蘆根須要逆水生并黃泡肥厚者去鬚節并赤黃皮用

根氣味甘寒無毒主治消渴客熱止小便利別錄療

反胃嘔逆不下食胃中熱傷寒內熱彌良蘇恭鮮大

熱開胃治噎噦不止甄權寒熱時疾煩悶溼痢人渴

孕婦心熱大明

筍氣味小苦冷無毒齊宗曰主治膈間客熱止渴

利小便鮮河豚及諸魚蟹毒原鮮諸肉毒

時珍

發明

時珍曰按雷公炮炙論序云益食加觴須煎蘆朴注云用逆水蘆根并厚朴二味等分煎

湯服蓋蘆根其能益胃寒能降火故也

附方

舊六新六骨蒸肺痿不能食者蘇遊蘆根飲主之蘆根麥門冬地骨皮生薑各

十兩橘皮茯苓各五兩水二斗煮八升外臺秘要勞復食復

去滓分五服取汗乃瘥嘔噦不止厥逆者蘆根三斤切水煮濃汁頻飲二升

欲死並以蘆根煮五噎吐逆心膈氣滯煩悶不下食蘆

必效若以童子小便煮服反胃上氣蘆根茅根各二

不過三升愈霍亂煩悶蘆根三錢麥門冬一兩水四升煮二升

霍亂脹痛蘆根一升生薑一升橘皮五兩水八升煎三分服食狗

肉毒心下堅或腹脹口乾忽發熱中馬肉毒方同上

聖惠鯨鯪魚毒方同上食蟹中毒方同上中藥箭毒方同上

方同上千金

莖葉氣味甘寒無毒主治霍亂嘔逆肺癰煩熱癰

疽燒灰淋汁煎膏蝕惡肉去黑子時珍瘰疬治金瘡生

肉臧癥徐之○江中采出蘆令夫婦和同用之有

法藏

發明時珍曰古方煎藥多用勞水及陳蘆火取其

水不強火不盛也蘆中空虛故能入心肺治

上焦 虛熱

附方 新 霍亂煩渴

腹脹蘆葉一握水煎服。又方 盧葉五錢糯米二錢半竹茹一

錢水煎入薑汁蜜各半合煎 兩沸時時呷之 聖惠方

吐血不止 蘆荻外皮 燒灰勿令

白為末入蚌粉少許研勻麥門冬湯 服一二錢三服可救一人 聖惠方

肺癰欬嗽 煩

微熱心胸甲錯葦莖湯用葦莖切二升水二斗煮 汁五升入桃仁五十枚薏苡仁瓜瓣各半斤煮取

二升服當吐出膿血而愈 張仲景金匱玉函方

發背潰爛

陳蘆葉為末 以葱椒湯洗

淨傳之神效 乾坤秘蘊

癰疽惡肉

白炭灰白荻灰等分煎膏 塗之蝕盡惡肉以生肉膏

貼之赤去黑子此藥只可留十 日久則不效 葛洪肘後方

小兒禿瘡

以鹽湯 洗淨蒲

葦灰傳之 聖濟總錄

蓬蘽氣味其寒無毒主治霍亂水煮膿汁服大驗

蘇 煮汁服解中魚蟹毒

蘇 燒灰吹鼻止衄血亦入

崩中藥 時珍

附方 新 乾霍亂病

心腹脹痛蘆蓬茸一把水煎 濃汁頓服二升 小品方 諸

般血病

水蘆花紅花槐花白鷄冠花茅花等分 水二鍾煎一鍾服 萬表積善堂方

其蕉 別錄 下品

釋名 芭蕉

義 天苴

史記 注

芭苴

時珍曰按陸佃埤雅 云蕉不落葉一葉舒

則一葉焦故謂之蕉俗謂乾物為巴巴亦蕉意也 稻聖賦云竹布實而根苦蕉舒花而株稿芭苴乃 蕉之音轉也蜀人謂之天苴曹叔雅異物志云芭 蕉結實其皮赤如火其肉甜如蜜四五枚可飽人

而滋味常在牙齒間故名其蕉

集解

弘景曰其蕉本出廣州今江東並有根葉無味其北間者但有花無實頌曰今二廣閩中川蜀者亦少近時中州種之甚盛皆芭蕉也其類亦多有子者名其蕉卷心中抽幹作花初生大萼似倒垂齒蕾有十數層層皆作瓣漸大則花出瓣中極繁盛紅者如火炬謂之紅蕉白者如蠟色謂之水蕉其花大類象牙故謂之牙蕉其實亦有青黃之別品類亦多最其美曝乾可寄遠北土得之以為珍果其莖解散如絲閩人以及湯練治紡績為布謂之蕉葛宗奭曰芭蕉三年已上即有花自心中抽出一莖止一花全如蓮花瓣亦相似但色微黃綠中心無蕊悉是花葉也花頭常下垂每一朵自中夏開直至中秋後方盡凡三葉開則三葉脫落也時珍曰按萬震南州異物志云其蕉即芭蕉乃

草類也其莖之如樹株大者一圍餘葉長丈許廣尺餘至二尺其莖虛軟如芋皆重皮相裹根如芋魁青色大者如車轂花着莖末大如酒盃形色如蓮花子各為房實隨花長每花一闔各有六子先後相次子不俱生花不俱落也蕉子凡三種未熟時皆苦澀熟時皆甜而脆味如葡萄可以療饑一種子大如拇指長六七寸銳以羊角兩兩相抱者名羊角蕉剥其皮黃白色味最其美一種子大如鷄卵有類牛乳者名牛乳蕉味微咸一種子大如蓮子長四五寸形正方者味最弱也並可蜜藏為果又顧玠海槎錄云海南芭蕉常年開花結實有二種板蕉大而味淡佛手蕉小而味甜通呼為蕉子不似江南者花而不實又范成大虞衡志云南中芭蕉有數種極大者凌冬不凋中抽一條長數尺節節有花花褪葉根有實去皮取肉軟爛如綠柿味極其冷四季恒實土人以飼小兒云去客熱謂之蕉子又名牛蕉子以梅汁漬曝壓扁味其酸有微霜名芭蕉乾一種鷄蕉子小於牛蕉亦四季實

一種牙蕉子小於鷄蕉九香嫩其美惟秋初結子
一種紅蕉葉瘦類蘆箬花色正紅如榴花日拆一
兩葉其端有一點鮮綠可愛春開至秋盡猶芳俗
各美人蕉一種膽瓶蕉根出土時肥飽狀如膽瓶
也又費信星槎勝覽云南番阿魯諸國
無米穀惟種芭蕉椰子取實代糧也

氣味 其大寒無毒 恭曰性冷不益人多食動冷氣 **主治** 生食止渴

潤肺蒸熟晒裂春取仁食通血脉填骨髓 孟詵 生食

破血合金瘡解酒毒乾者解穢熱煩渴 吳瑞 除小兒

客熱壓丹石毒 時珍

根氣味 其大寒無毒 恭曰寒頌曰其蕉芭蕉性相同也 **主治** 癰腫

結熱 別錄 擣爛傳腫去熱毒擣汁服治產後血脹悶

蘇恭 **主黃疸** 孟詵 治天行熱狂煩悶消渴患癰毒并金

石發動躁熱口乾并絞汁服之又治頭風遊風 大明

附方 舊四新六 發背欲死 芭蕉根擣爛塗一切腫毒 方同

上赤遊風癩 方同 風熱頭痛 方同 風蟲牙痛 芭蕉自然

汁一椀煎熱含 天行熱狂 芭蕉根擣汁飲之 消渴

飲水 骨節煩熱用生芭蕉根擣 血淋澀痛 芭蕉根

各等分水煎服 聖惠方 產後血脹 擣芭蕉根絞汁 瘡口不

合 芭蕉根取汁抹

蕉油 以竹筒插入皮 **氣味** 其冷無毒 **主治** 頭風熱

止煩渴及湯火傷梳頭止女人髮落令長而黑大明

風癰病涎作暈悶欲倒者飲之取吐極有奇效蘇頌

附方新小兒截驚以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭頂留顙門塗四肢留手足心勿塗

甚效 鄧筆峯雜興

葉主治腫毒初發研末和生薑汁塗之時珍○聖惠方

附方新岐毒初起芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破

皆無痕也 仁齋直指方

花主治心痺痛燒存性研鹽湯點服二錢日華

蕺荷別錄 中品

校正自菜部移入此併入 有名未用蕺草為一

釋名覆菹別錄蕺草別錄溱苴音蒿苴說文嘉草弘景曰

蕺荷而今人呼赤者為蕺荷白者為覆苴蓋食以赤者為勝入藥以白者為良葉同一種耳時珍曰

覆苴許氏說文作蒿苴司馬相如上林賦作溱苴與芭蕉音相近離騷大招云醢豚若狗膾苴蓴王

逸注云苴蓴音博蕺荷也見本草而今之本草無之則脫漏亦多矣

集解別錄曰蕺草生淮南山谷頌曰蕺荷荆襄江似薑牙而肥其葉冬枯根堪為菹其性好陰在木

下生者尤美潘岳閑居賦云蕺荷依陰時藿向陽是也宗慄荆楚歲時記云仲冬以鹽藏蕺荷用備

冬儲又以防蟲史游急就篇云蕺荷冬日藏其來遠矣然有赤白二種白者入藥赤者堪噉及作梅

果多用之宗奭曰蕺荷八九月間淹貯以備冬月作蔬果治病止用白者時珍曰蘇頌圖經言荆襄

江湖多種今訪之無復識者惟楊慎用鉛錄云急

就章註藁荷即今其露考之本草形性相同其露即芭蕉也崔豹古今註云藁荷似芭蕉而白色其子花生根中花未敗時可食久則消爛矣根似薑宜陰翳地依陰而生又按王旻山居錄云藁荷宜樹陰下二月種之一種永生不須鋤耘但加糞耳八月初踏其苗令死則根滋茂九月初取其傍生根為菹亦可醬藏十月中以糠覆其根下則過冬不凍死也

修治 教曰凡使勿用革牛草真相似其革牛草腥入砂盆中研如膏取自然汁鍊作煎新器攤冷如乾膠狀刮取用之

根氣味 辛温有小毒 思邈曰辛微 **主治** 中蠱及瘡

擣汁服 別錄 溪毒沙蟲蛇毒 弘景 諸惡瘡根心主稻麥

芒入目中不出以汁注目即出 蘇恭 赤眼澀痛擣汁

點之時 珍

藁草 氣味苦其寒無毒 大明曰平 **主治** 温瘡寒熱酸嘶

邪氣辟不祥 別錄

發明 弘景曰中蠱者服藁荷汁并臥其葉即呼蠱主姓名多食損藥力又不利脚人家種之亦

云辟蛇 頌曰 按于寶搜神記云外姊夫蔣士先得疾下血言中蠱其家密以藁荷置於席下忽大笑曰蠱我者張小小也乃收小小小小走自此解蠱藥多用之往往驗也周禮庶氏以嘉草除蠱毒

宗慄謂嘉草即藁荷是也陳藏器云藁荷茜根為主蠱之最謂此 時珍曰 別錄菜部藁荷謂根也草部藁草謂葉也其主治亦頗相近今併為一云

附方 舊八 卒中蠱毒 下血如鷄肝晝夜不絕臟腑敗壞待死者以藁荷葉密置

病人席下勿令知之必自喉中似物吞吐不出腹脹羸瘦取白

呼蠱主姓名也梅師方喉舌瘡爛酒漬蘘荷根半日含漱其汁瘡乃止外

蘘荷根搗汁服蠱梅師方臺秘吐血痔血向東蘘荷根一把搗汁婦人腰痛

方同月信澀滯蘘荷根細切水煎取二升風冷失

聲咽喉不利蘘荷根二兩搗絞汁入酒傷寒時氣

溫病初得頭痛壯熱脉盛者用生蘘荷根葉合搗絞汁服三四升時後雜物入目白

荷根取心搗絞取汁滴入目中立出普濟方

麻黃

本經中品

釋名龍沙本經卑相別錄卑鹽別錄時珍曰諸名殊不可解或云其味麻其色

黃未審然否張揖廣雅云龍沙麻黃也狗骨麻黃根也不知何以分別如此

集解別錄曰麻黃生晉地及河東立秋采莖陰乾今出青州彭城滎陽中牟者為勝色青而多沫蜀中亦有不好恭曰鄭州鹿臺及

關中沙苑河旁沙洲上最多同州沙苑亦多其青徐者亦不復用禹錫曰按段成酉陽雜俎云麻黃

莖頭開花花小而黃叢生子如覆盆子可食頌曰今近汴京多有之以滎陽中牟者為勝春生苗至

夏五月則長及一尺以來稍上有黃花結實如百合瓣而小又似皂筴子味甜微有麻黃氣外皮紅

裏仁子黑根紫赤色俗說有雌雄二種雌者於三

月四月內開花六月結子雄者無花不結子至立秋後收莖陰乾時珍曰其根皮色黃赤長者近尺

附錄雲花子時珍曰按葛洪肘後方治馬疥有雲花草云狀如麻黃而中堅實也

莖修治弘景曰用之折去節根水煮十餘沸以竹片掠去上沫沫令人煩根節能止汗故也

氣味苦温無毒

別錄曰微温普曰神農雷公苦無毒扁鵲酸李當之平權曰其平元

素曰性温味苦而其辛氣味俱薄輕清而浮陽也升也手太陰之藥入足太陽經兼走手少陰陽明

時珍曰麻黃微苦而辛性熱而輕揚僧繼洪云中半有麻黃之地冬不積雪為泄內陽也故過用則

洩真氣觀此則性熱可知矣服麻黃自汗不止者以冷水浸頭髮仍用撲法即止凡服麻黃藥須避

風一日不爾病復作也凡用須佐以黃芩則無赤眼之患之才曰厚朴白薇為之使惡辛夷石韋

主治中風傷寒頭痛温瘧發表出汗去邪熱氣止

欬逆上氣除寒熱破癥堅積聚本經五臟邪氣緩急

風脅痛字乳餘疾止好唾通腠理解解腠洩邪惡氣

消赤黑斑毒不可多服令人虛別錄治身上毒風癩

痺皮肉不仁主壯熱温疫山嵐瘴氣甄權通九竅調

血脉開毛孔皮膚大明去營中寒邪泄衛中風熱元素

散赤目腫痛水腫風產後血滯

時珍

發明弘景曰麻黃療傷寒解饑第一藥頌曰張仲

景治傷寒有麻黃湯及葛根湯大小青龍湯皆用麻黃治肺痿上氣有射干麻黃湯厚朴麻黃

湯皆大方也果曰輕可去實麻黃葛根之屬是也六淫有餘之邪客於陽分皮毛之間腠理閉拒營

衛氣血不行故謂之實二藥輕清成象故可去之麻黃微苦其形中空陰中之陽入足太陽寒水之

經其經循背下行本寒而又受外寒故宜發汗去皮毛氣分寒邪以泄表實若過發則汗多亡陽或

飲食勞倦及雜病自汗表虛之證用之則脫人元氣不可不禁好古曰麻黃治衛實之藥桂枝治衛虛之藥二物雖為太陽證藥其實營衛藥也心主

營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑傷寒傷風而欬嗽用麻黃桂枝卽湯液之源也時珍曰麻黃乃肺經專藥故治肺病多用之張仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝歷代明醫解繹皆隨文傳會未有窀其精微者時珍常繹思之似有一得與昔人所解不同云津液爲汗汗卽血也在營則爲血在衛則爲汗夫寒傷營營血內濇不能外通於衛衛氣閉固津液不行故無汗發熱而憎寒夫風傷衛衛氣外泄不能內護於營營氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒之邪皆由皮毛而入皮毛者肺之合也肺主衛氣包羅一身天之象也是證雖屬乎大陽而肺實受邪氣其證時兼面赤怫鬱欬嗽有痰喘而胸滿諸證者非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻而肺氣臃鬱故用麻黃甘草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁泄肺而利氣汗後無大熱而喘者加以石膏朱肱活人書夏至後加石膏知母皆是泄肺火之藥是則麻黃湯雖太陽陽發

汗重劑實爲發散肺經火鬱之藥也腠理不密則津液外泄而肺氣自虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以救表內伐肝木以防脾佐以芍藥泄木而固脾泄東所以補西也使以薑棗行脾之津液而和營衛也下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也汗後脉沉遲者加人參以益肺氣也朱肱加黃芩爲陽旦湯以瀉肺熱也皆是脾肺之藥是則桂枝雖太陽解肌輕劑實爲理脾救肺之藥也此千古未發之秘旨愚因表而出之又少陰病發熱脉沉有麻黃附子細辛湯麻黃附子甘草湯少陰與太陽爲表裏乃趙嗣真所謂熟附配麻黃補中有發也一錦衣夏月飲酒達旦病水泄數日不止水穀直出服分利消導升提諸藥則反劇時珍診之脉浮而緩大腸下弩復發痔血此因肉食生冷茶水過雜抑遏陽氣在下木盛土衰素問所謂久風成飧泄也法當升之揚之遂以小續命湯投之一服而愈昔仲景治傷寒六七日大下後脉沉遲手足厥逆咽喉不利唾膿血泄利不止者用

麻黃湯平其肝肺兼升發之即
斯理也神而明之此類是矣

附方 舊五 **天行熱病** 初起一二日者麻黃一大兩
新七 去節以水四升煮去沫取二

升去滓着米一匙及豉為稀粥先以湯浴
後乃食粥厚覆取汗即愈 孟詵必用方 **傷寒雪**

煎 麻黃十斤去節杏仁四升去皮熬大黃一斤十
二兩先以雪水五碩四斗漬麻黃於東向竈釜

中三宿後納大黃攪勻桑薪煮至二碩去滓納杏
仁同煮至六七斗絞去滓置銅器中更以雪水三

斗合煎令得三斗四升藥成丸如彈子大有病者
以沸白湯五合研一丸服之立汗出不愈再服一

丸封藥勿令洩 **傷寒黃疸** 表熱者麻黃醇酒湯主
氣 千金方 之麻黃一把去節綿裹

美酒五升煮取半升頓服取 **裏水黃腫** 張仲景云
小汗春月用水煎 千金方 一身面目

黃腫其脉沉小便不利甘草麻黃湯主之麻黃四
兩水五升煮去沫入甘草二兩煮取三升每服一

升重覆汗出不汗再服慎風寒○千金云有患氣
急久不瘥變成水病從腰以上腫者宜此發其汗

水腫脉沉 屬少陰其脉浮者為氣虛脹者為氣皆
非水也麻黃附子湯汗之麻黃三兩水

七升煮去沫入甘草二兩附子炮一枚煮取二升
半每服八分日三服取汗 張仲景金匱要畧

風痺冷痛 麻黃去根五兩桂心二兩為末酒二升
慢火熬如飴每服一匙熱酒調下至汗

出為度避風 **小兒慢脾** 風因吐泄後而成麻黃長
聖惠方 五寸十箇去節白朮指面

大二塊全蠍二箇生薄荷葉包煨為末二歲以
下一字三歲以上半錢薄荷湯下 聖惠方 尸

咽痛痺 語聲不出麻黃以青布裹 **產後腹痛** 及血
燒烟筒中熏之○聖惠方 下不

盡麻黃去節為末酒服方寸匕一口 **心下悸病** 半
二三服血下盡即止 子母秘錄

麻黃丸用半夏麻黃等分末之煉蜜丸小 **痘瘡倒**
豆大每飲服三九日三服 金匱要畧

本 卷之二十五

六 百 三 十 九

厲寇宗奭曰鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙

去滓乘熱服之避風其瘡復出也一法用無灰酒

煎其效更速仙源縣筆工李用之子病斑瘡風寒

倒厲已困用此中風諸病麻黃一秤去根以王相

一服便出如神石三斗以淨錫盛五七斗先煮五沸掠去沫逐旋

添水盡至三五斗漉去麻黃澄定漉去滓取清再

熬至一斗再澄再漉取汁再熬至升半為度密封

收之一二年不妨每服一二匙熱湯化下取汗熬

時要勤攪勿令着底恐焦了仍忌鷄犬

陰人見之此劉守真秘方也宜明方

根節氣味耳平無毒主治止汗夏月雜粉撲之

發明又壯蠟粉粟粉并麻黃根等分為末生絹袋

盛貯盜汗出即撲手摩之時珍曰麻黃發汗之氣

測度如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛
陰虛胃熱痰飲中暑亡陽柔痙諸證皆可隨證加
而用之當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤捷蓋其
性能行周身臟表故能引諸藥外至衛分而固膜
理也本草但知撲之之法而不知服餌之功尤良也

附方新盜汗陰汗麻黃根壯蠟粉為末撲之盜汗不止麻黃根

分為末每服一錢無灰酒下外以麻小兒盜汗黃

黃根故蒲扇為末撲之奇效良方根三分故蒲扇灰一分為末以乳服三分日三服

仍以乾薑三分同為末三分撲之古今錄驗

諸虛自汗夜卧即甚久則枯瘦黃芪麻黃根各一

水二盞小麥百粒虛汗無度麻黃根黃芪等分為
煎服和劑局方產後虛汗黃芪當歸各
大每用浮麥湯下百丸以
止為度談楚翁試驗方

二兩每服一
兩煎湯下
陰囊濕瘡
腎有勞熱麻黃根石硫黃
各一兩米粉一合為末傅
之干
內外障翳
麻黃根一兩當歸身一錢同炒黑
色入麝香少許為末啗鼻頻用此
金方
南京相國寺東黑
孩兒方也
普濟

木賊
宋嘉祐

釋名
時珍曰此草有節面糙澀治木骨者
用之磋擦則光淨猶云木之賊也

集解
禹錫曰木賊出秦隴華成諸郡近水地苗長
尺許叢生每根一幹無花葉寸寸有節色青

凌冬不凋四月采之頌曰所在近水地有之采無
時今用甚多時珍曰叢叢直上長者二三尺狀似
鳧茈苗及粽心草而中空有節
又似麻黃莖而稍粗無枝葉

莖氣味甘微苦無毒
時珍曰溫
主治目疾退翳膜消積

塊益肝膽療腸風止痢及婦人月水不斷崩中赤

白解
嘉祐
解肌止淚止血去風濕疝痛大腸脫肛
時珍

發明
禹錫曰木賊得牛角腮麝香治休息久痢得
禹餘糧當歸芍藥治崩中赤白得槐蛾桑耳

治腸風下血得槐子枳實治痔疾出血震亨曰木
賊去節烘過發汗至易本草不曾言及時珍曰木
賊氣溫味微甘苦中空而輕陽中之陰升也浮也
與麻黃同形同性故亦能發汗解肌升散火鬱風

濕治眼目
諸血疾也

附方
舊三
新九
目昏多淚
木賊去節蒼朮泔浸各一兩
為末每服二錢茶調下或蜜

丸亦
急喉痺塞
木賊以牛糞火燒存性每冷水
服一錢血出即安也
聖惠方
舌

硬出血
木賊煎水漱之
血痢不止
木賊五錢水煎
即止
聖惠方
溫服一日一服

聖方 瀉血不止 方同上 日二 腸痔下血 用木賊枳

殼各二兩 乾薑一兩 大黃二錢 半並於 鈿肉炒黑 蘇頌圖經

存性為末 每粟米飲服 二錢甚效也 按入 婦人血

崩 血氣痛不可忍 遠年近日 不瘥者 雷氏木賊散

服三錢 色黑者 酒一盞 煎紅赤者 水一盞 煎和滓

煎 忌生冷 硬物 豬魚油 月水不斷 木賊炒三錢 水

服日一服 胎動不安 木賊去節 川芎等分 為末 每

煎服 〇聖 小腸疝氣 木賊細剉 微炒為末 沸湯點

酒下 〇寇氏 誤吞銅錢 木賊為末 鷄子白調 聖惠方

附錄 問荆 藏器曰 味苦平 無毒 主結氣 瘤痛 上氣

賊節節相接 一名接續草

石龍芻 本經上品

釋名 龍鬚 龍修 龍華 龍珠 懸莞 草

續斷 緝雲草 方賓 西王母簪 時珍曰 刈草

草生水石之處 可以刈束 養馬 故謂之 龍芻 述異

記周穆王東海島中 養八駿 處有草名 龍芻 是矣

故古語云 一束龍芻 化為龍駒 亦孟子芻豢之義

產此草 因以名之 崔豹古今注云 世言 黃帝乘龍

上天 群臣攀龍鬚 墜地生草 名曰 龍鬚 者 謬也 江

本草綱目卷之十五

集解 別錄曰石龍芻生梁州山谷濕地五月七月

連實赤今出近道水石處似東陽龍鬚以作席者但多節爾藏器曰今出汾州沁州石州亦處處有之保昇曰叢生莖如經所在有之俗名龍鬚草可為席八月九月采根暴乾時珍曰龍鬚叢生狀如粽心草及鳧苳苗直上夏月莖端開小穗花結細實並無枝葉今吳人多栽蒔織席他處自生者不多也本經明言龍芻一名龍鬚而陶弘景言龍芻似龍鬚但多節似以為二物者非矣

莖氣味

苦微寒無毒

別錄曰微温

主治 心腹邪氣小便

不利淋閉風濕鬼疰惡毒久服補虛羸輕身耳目

聰明延年

本經

補内虛不足痞滿身無潤澤出汗除

莖中熱痛療蛇蟲腫不消食

別錄

敗席主治 淋及小便卒不通彌敗有垢者方尺煮

汁服之

藏器

龍常草

別錄有名未用

釋名 粽心草

時珍曰俚俗五月采繫角黍之心呼為粽心草是也

集解

別錄曰生河水旁狀如龍芻冬夏生時珍曰按爾雅云葍鼠莞也鄭樵解為龍芻郭璞云

纖細似龍鬚可為席蜀中出者好恐即此龍常也蓋是龍鬚之小者爾故其功用亦相近云

莖氣味

鹹温無毒

主治 輕身益陰氣療痺寒濕

別錄

燈心草

宋開寶

釋名 虎鬚草

綱目

碧玉草

綱目

本草綱目卷之十五
集解志曰燈心草生江南澤地叢生莖圓細而長

折取中心白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者但

生乾刺取為生草入藥宜用生草時珍曰此即龍

鬚之類但龍鬚緊小而瓢實此草稍粗而瓢虛白

吳人栽蒔之取瓢為燈炷以草織席及蓑他處野

生者不多外丹家以之伏硫砂雷公炮炙論序云

函遇赤鬚永留金鼎注云赤鬚亦呼虎鬚草煮函

能住火不知即此虎鬚否也

莖及根修治時珍曰燈心難研以粳米粉漿染過

晒乾用

氣味其寒無毒元素曰辛甘陽主治五淋生煮服

之敗席煮服更良開寶瀉肺治陰竅澇不利行水除

水腫癰閉元素治急喉痺燒灰吹之甚捷燒灰塗乳

上飼小兒止夜啼震亨降心火止血通氣散腫止渴

燒灰入輕粉麝香治陰疳時珍

附方舊一破傷出血燈心草嚼爛傳之衄血不止

新九燈心一兩為末入丹砂一錢喉風痺塞瑞竹堂方

米飲每服二錢聖濟總錄喉風痺塞用燈心一

握陰陽瓦燒存性又炒鹽一匙每吹一捻數次立
愈○一方用燈心灰二錢蓬砂末一錢吹之○一
方燈心箬葉燒灰等分吹之○惠濟方
用燈心草紅花燒灰酒服一錢即消
小便不利者燈心一把鼈甲二兩水一
升半煎六合分二服龐安常傷寒論夜不合眼
難睡燈心煎湯代茶通利水道白飛霞自制天一
飲即得睡集簡

粉漿染晒乾研末入水澄去粉取浮者晒乾二兩
五錢赤白茯苓去皮共五兩滑石水飛五兩豬苓
二兩澤瀉三兩人參一斤切片熬膏和藥丸如龍
眼大硃砂為衣每用一丸任病換引大段小兒生
理向上本天一生水之妙諸病以
水道通利為捷徑也。韓氏醫通
兩酒水各半入瓶內煮半
日露一夜溫服 集玄方

燈花燼

見火部

本草綱目草部第十五卷終

