

元戎

庫文閣内		
三〇函	一三四	漢
二册		
内閣文庫		
番號	漢	12421
冊數		12 (1)
函號		300 216

300-216



Kodak Gray Scale

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19



© Kodak, 2007 TM: Kodak






致醫壘元戎序

秋小子曰美哉
王氏進之名方書曰
良醫司命諸疾譬大
將司命三軍呼吸之際有生死焉均

之萬全乃濟將與醫豈二道乎由進
之書證之傷寒雜病二門耳其言曰
雜病之外不離乎表傷寒之內不離

評



後恐后誤

平裏表則汗裏則下中則和不易之法也。劑之溫涼在其中矣。又曰雜科各自專門知證不知脈知藥不知性。是豈直知而全識也哉。信斯言也。論根理要而用察標本固仲景叔和思邈潔古東垣之用心也。其原本岐伯猶兵家之祖述風後。隨機應變見可

訣

知難勿藥止戈壽命均長矣。豈非續命丹訣。當籌田素書者乎。是篇行則切脈望色聽聲寫形者有據而為知微對證之良醫。得八荒元二得蚤從事於此。則疾可已身可活。而古所謂六不治者。安從有哉。是用兼撫臺石涇公命刻之。省垣以為函家

整兵經武和衆安民保大定功之助
云

嘉靖二十二年癸卯孟夏之吉

賜進士出身通議大夫奉

勅巡撫遼東地方兼贊理軍務都察

院右副都御史前湖廣布政使司左

布政秋山居士餘姚顧遂書

醫堊元戎序

趙州教授兼提舉管內醫學王好古進之檄

草車千乘帶甲十萬籌策沈機神鬼猜泣奇正萬全
歷古如是况良醫之用藥独不若臨陣之用兵乎奈
何世人以平昔鹵莽之浮學應倉卒無窮之疾爰具
不眩駭顛仆者寡矣况患固多藏於細微而發於人
之所忽由輕蹈危瘵之求當苟無妙算深謀成法以
統之則倒戈歎績之不暇尚何勝之可圖哉則前日
問類只日之定畫計不及之也予自河南與諸友將
一一作兵日從事於患難之場隨病察脈逐脉定方用之

劫之薄之登之以盡其宜吐之補之汗之下之以挂極
其當攻守不常出沒無定大綱小紀經緯悉陳本數
末度條理具設前乎此言人之所隱秘深藏或不盡
意者不啻胸中自有十萬精銳如大阿之在運中其
輝末常耀於外一旦撒而揮之有以恐人之耳目特
八陣之奇鋒七擒之利及其款可却其勝可決而其
安可圖如此而後已故曰醫星元式云丁酉九月二
十有九日

醫星元式目錄

卷第一

傷寒之源

內傷論

不可汗不可吐不可下三忌

太陽證

仲景桂枝湯

小建中湯

金匱小建中湯

金匱黃耆建中湯

金匱黃芪桂枝五物湯

天雄散

易簡建中湯

黃芪建中湯

當歸建中湯

樂

局方藥令黃耆湯

火建中湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加附子湯

桂枝去桂加白朮茯苓湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝白朮甘草湯

茯苓桂枝生薑甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加蜀葵牡蠣龍骨救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝甘草湯

柴胡桂枝湯

桂枝人參湯

桂枝附子去桂加白朮湯

桂枝芍藥湯

桂枝加大黃湯

王朝奉桂枝白朮問答

桂枝例

活人陽旦湯

活人陰旦湯

活人解肌湯

仲景麻黃湯

仲景桂枝各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

大青龍湯

小青龍湯

仲景雜方

又方

仲景麻黃升麻湯

肺痿之源

易簡杏子湯

仲景麻黃湯例

仲景麻黃杏仁薏苡仁湯

仲景薏苡仁附子湯

活人麻黃葛根葱豉湯

活人知母麻黃湯

易老解利法

麻黃醇酒湯

越婢湯

通頂散

活人獨活散

活人敗毒散

易老大羌活湯

芎辛例

芎辛湯

易簡芎辛湯

白朮丸

捲雲散

海藏法白朮湯

神朮湯

黃耆湯

黃耆甘草湯

活人防風牡蠣白朮湯

風論

仲景小續命湯

獨活續命湯

白花續命湯

大續命湯

小續命湯

卷第二

太陽證

仲景葛根湯

葛根黃芩黃連湯

活人葱白例

連鬚葱白湯

七味葱白湯

葱白一物湯

普救散

不卧散

和鮮散

葛根加半夏湯

葛根升麻湯

葛根葱白湯

葱薑湯

葛根一物飲子

百解散

蕩邪散

易簡王氏生料五積散

海裁五積論

痊濕喝三證

桂心白木湯

八物白木散

桂枝加葛根枳朮湯

活人拳敗散

白木湯

易簡白木湯

化水丹

三寶丹

仲景五苓散

附子散

防己防風湯

金匱枳朮桂枝湯

金匱葛根湯

神木湯

海藏黃芩湯

消暑丹

半硫丸

活人全^班諸藥

陽毒升麻湯

陽毒梔子仁湯

痲^痲瘡疏豆瘡

犀角大青湯

錢氏消毒散

阿膠大青^湯

陽毒升麻湯

陽旦湯

甘草湯

葛根橘皮湯

陽毒玄參升麻湯

四物解肌湯

五物木香湯

消暑犀角^飲子

王朝奉^痲瘡論

陰陽毒升麻鱉甲湯

陰毒甘草湯

陰旦湯

沉香連翹湯

內化丹

治癰背瘡方

內托散

人參黃芪甘草三物湯

黃芪甘草二物湯

芍藥甘草例

仲景芍藥甘草湯

四逆湯

芍藥甘草黃芩湯

又甘草一物湯

奪命丹

大補十全散

易簡冒風湯

甘草乾姜湯

芍藥甘草附子湯

甘草一物湯

仲景炙甘草湯

灸

東垣先生芍藥甘草例

桂苓例

桂苓丸

千里漿

紫蘇湯

桂苓白朮丸

又方

梅葛散

蜜酒

菩薩散

荔枝煎

烏梅散

大順散

又千里漿

荔枝湯

桂漿

神木湯

仲景烏梅丸

錢氏芍藥皮丸

四信散

檠皮湯

活人三黃熟艾湯

單黃連加減例

牛房根散

紫霜丸

天麻硃砂丸

安先生傳易老鮮利二藥

鮮利傷寒嗜藥

守真檠皮丸

古方駐車丸

活人黃連阿膠湯

仲景紫參湯治痢

玄明丸

無名丸

楊氏內鮮丸

醫畢元戎卷第一

趙州教授兼提舉管內醫學王好古進之答次

傷寒之源

帝曰人傷于寒而變為熱何也岐伯曰夫寒盛則生
熱也寒氣外凝內鬱之理腠理堅緻玄府閉緻則氣
不宣通濕氣內結中外相薄寒盛熱生故人傷于寒
轉而為熱汗之而愈則外凝內鬱之理可知斯乃新
病歎日者也今風寒客于人使人毫毛畢異直皮膚閉
而為熱當是之時可汗而發也海藏云傷寒冬傷
于寒也邪氣內藏至春夏而變為熱病元受邪氣伏

異惡畢記
閉

藏過春夏風寒所傷外邪喚出內邪也。有汗者有
無汗者。所以有傷風傷寒之異也。亦有先傷寒而後
傷風者。亦有先傷風而後傷寒者。亦有先傷寒而重
感寒者。亦有先傷風而重感風者。此四者。汗有多寡
亦有止作。亦有常汗而不止者。有全無汗者。先證重
後傷輕。則頭重者。先證輕。則後傷重。則亦頭重者。當
必脉謹察。察有重字不可忽也。利害天壤。死生係焉。有傷于陽
者。風雨寒暑是也。有傷于陰者。飲食居處陰陽喜怒
是也。其變又有不可深數者。元感風寒。與新傷各合
而變有之。形無形。內外之異。所以治之。當從其變而

葉不一也。輕重寒暑在其中矣。

岐伯曰。平旦人氣生。日中而陽氣隆。日西而陽氣已

虛。氣門乃閉。是故暮而收。拒無擾筋骨。無見霧露。反

此三時。形乃因薄。扁鵲脉一呼一吸。皆四至而滿者。

邪中霧露之氣也。仲景曰。清邪中於上焦。又曰。霜降

已後。春分已前。中霧露者。皆為傷寒也。又曰。清邪中

於上焦。濁邪中於下焦。飲食同傷也。此一條此字一作中字議

論。在陰證論。神述湯後霧露條下。

且傷風者。惡風傷兩者。惡濕傷寒者。其熱惡寒傷暑
者。心熱畏日。此皆傷於陽者也。飲食不節者。或餓或

過

飽或冷或硬居處不時者或塞或通或勞或逸陰陽
太過者隱相易之形狀或一或二喜怒不常者須心
腹之逆滿或隔或痞此皆傷於陰者也旧有冬伏之
寒邪在經春夏之復傷而作傷于陽者則邪氣外併
傷于陰者則邪氣內併新傷引出旧陽也一作傷或四季之
中有一日兩傷有一時并傷則內外相合其變至多
矣或陽證或陰證或陰毒或雜證俱在其中先外傷
後內傷外就內而合病若頭痛身疼輕而內傷重者
當先治內之重者後治外之輕者先內傷後外傷內
就外而合病若心腹痞同輕而外傷重者當先治外

因恐內字

藥

之重者後治內之輕者然亦有內外俱輕亦有內外
俱重當各從其所可先者而先治從其所并治者并
治次第不失為舉為全矣治內兼外者不可寒下若
下則陷經邪于內治外兼內者不可熱發則益中熱
于外二者皆逆豈不危乎兼之寒熱可輕用哉

內傷論

足 脇

內傷先傷胃或上熱下冷傷食病也手足四支微冷
者或四順兩腋熱甚此少陽也中州先傷少陽及病
者何也答曰內傷者先傷胃之陽明也經云脾胃相
通五穀消是脾胃陽成陰已共為腐熟今既胃傷

連下有及字脾也且兩脾雖為少陽之地章門二穴所處即脾之募也眠安得不熱况從內而至外者先少陽內傷中州而少陽亦病也假令內傷有巴豆及諸溫熱之屬又有備急丸寒熱各半之例又有枳實大黃牽牛之屬亦有神曲麥蘗縮砂仁及三稜廣茂之例其藥不一又有玄明凡煮黃凡種不一內傷之疾豈一藥所能畢哉今人無論證之寒熱人也虛實便之與結只一系而主之寒熱安得不差所以人病者虛勞殘疾與所不有也然內傷脾胃與少陽俱病此陽病也若內傷陰病當以理中而復脉虛而細少陽病也

具

脉虛而弦厥陰病也脉弱而虛太陰本病也此至陰證論也藥與見陰證論潔言老詳說可下之藥於前今又詳說可用之藥於後并見陰證論有與病能食而傷者有有病不能食而傷者不可不知內傷心腹脹痛而大小便不通服食藥心腹中微快大小便通餘邪傳入于標頭痛發熱後治其標之藥合隨三陽經用輕治即愈此由內而外先治其內後調其外此其法也以其飲食過多傷之太甚一作過故邪熱之氣傳入于標內既以定外又得安為之全愈若冬伏寒之氣在經內傷與出冬伏之邪先內傷次標病亦如前法先治

積

內後治外此內重外輕故如是也 若外重而內輕者先治其外後治其內可也以上止是內傷太過非續寒傷冷也若積寒傷冷脈已從陰雖有標病不須治標獨治內也內三陰之經所用皆溫劑內既得溫標病不發而自愈何以然發表之藥不遠熱也三陰溫藥非發表之藥亦不遠熱內既以溫藥標病從內而變亦從此而解矣若錯汗之三焦之氣也而成大陰也此溫中之劑刺正有雜字獨治內亦兼治外也不可不知矣陰證治本不治標之本俱得治標不治本標本俱失 已有冬伏寒邪若內傷喚出旧邪便見太陽證

三立恐有脫字

重下者所字

也若無冬伏寒邪者正是內傷發出不知邪氣多頭少陽證也兩眼熱甚頭額痛手足冷如厥逆狀熱甚然後手足溫或熱雖手指末亦有微冷者王朝奉集仲景活人例

不可汗不可下不可吐

大法春宜吐夏宜發汗秋宜下凡用發汗及吐下湯藥皆中病便止不必盡劑也 少陰病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯 陽已虛尺中脈弱瀉復不可下之宜小柴胡湯 動氣有左在右在上在下并不可發汗宜此胡桂枝湯 少陰病脈細沈數病在

一本以下注書

穀

裡不可發汗宜當歸四逆湯 少陽不可發汗宜小
此胡湯 咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家
不可發汗已上六證并小此胡湯 下利清穀不可
發汗宜理中湯四逆之類若四逆厥及虛家皆不可
吐厥宜當歸四逆湯虛宜附子湯 有熱人可黃耆
人參定中湯 少陰病膈上寒乾嘔不可吐宜小半
夏加橘皮湯溫中丸 咽中有動氣不可下咽中閉
塞不可下宜烏扇湯 諸外實者不可下諸四逆厥
者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆湯虛宜附子湯
有熱人黃耆人參建中湯本虛攻其熱必噦小此

不

胡湯 脈浮而緊法當身痛宜以汗解假令尺中脈
遲一有者字不可發汗榮氣不足血少故也宜小此胡湯
濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱
而惡寒榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴
胡湯 脈濡而弱不可發汗宜小柴胡湯 脈浮而
大浮為氣實大為血虛小便當赤而難胞中當虛今
及小便利而大汗出法應衛家微可與小建中湯
今及更實津液四射射榮竭血盡乾煩而不得眠此不
可不宜與小柴胡湯 脈浮大應發汗宜柴胡桂枝
湯而及下之為大逆 脈浮而緊者不可下宜桂枝

止

麻黃各半湯、散不可下、宜柴胡桂枝湯。下之必煩、利不正、宜葛根黃芩黃連湯。脈濡弱、浮數不可下、宜小柴胡湯。脈濡弱、微瀉、微則陽氣不足、中風汗出而反躁煩、瀉則血厥而且寒、不可下、宜桂枝甘草龍骨牡蛎湯。結胸、脈浮大、不可下、下之即死、宜小陷胸湯。太陽病多熱者、下之則鞅、宜小柴胡湯。太陽發汗不徹、轉屬陽明、微汗出、不惡寒、若太陽證不罷、不可下之、為逆、宜桂枝麻黃湯。太陽病有外證未解、不可下、下之為逆、宜桂枝麻黃湯。病發於陽而反下之、熱入、因作結胸、病發於陰而反下之、

鞅

因作痞。病脈浮而緊、而復下之、緊反入裏、則作痞。

太陽與陽明合病、喘而寸滿、不可下、宜麻黃杏仁

鞅

甘草石羔湯。太陽與少陽合病、心下鞅、頸項強而

眩者、不可下、宜小柴胡湯。四厥逆、及虛家皆不可

鞅

下、厥宜當歸四逆湯。虛家宜附子湯。病欲吐者、不

可下、宜小半夏加橘皮湯。太陰腹痛、吐食、自利、腹

痛、下之必胃下結鞅。厥陰病得氣、上衝心、心中熱

餓、不飲食、食則吐、蛇下之利不止。少陰病、飲食入

口、則吐、心中溫、欲吐、復不能吐、始得之、手足寒、脈

弦遲者、胃中寒、實不可下之、宜溫中湯。生薑汁半夏

鞅

強鞭殺湯

無陽證雖大便鞭者下之必清穀腹滿宜用蜜

煎導等法 傷寒五六日不結胃脈滯而虛復厥者

不可下此亡血也宜當歸四逆湯一作下之即死宜四逆

加人參湯 臟結無陽證不往來寒熱其人反靜舌

上胎滑者不可攻也攻謂下也宜用小芪胡湯鍼刺

元穴 傷寒嘔多雖有陽明證不可及之宜小柴胡

湯 陽明病身面色赤攻之必發熱宜梔冒氣湯

色黃者小便不利也宜五苓散 陽明病心下鞭

滿者不可攻之宜生薑瀉心湯 半夏瀉心湯攻之

利不止者死宜四逆湯 不可汗吐一條三法利害

調 攻

及

非輕前人多列經後大抵醫之失只在先藥藥之錯

則變生若汗下不差則永無亡陽生黃畜血結胸痞

氣及下利洞泄悞熱利症急虛勞等證生矣以其如

此故錄大禁忌於前使医者當疾之初不犯也

又三忌

時忌 春夏不宜桂枝秋冬不宜麻黃

藥忌 已汗者不得再發已利者不得再泄

病忌 虛人不宜用涼實人不宜用熱其所

犯之劑當從緩而輕

海藏云前人說不可汗下吐三法多在經後讀者往

往遺之此用藥之大禁必不可犯今列之篇首使人
易見爾

太陽證 先足經從湯液 後手經從雜例

仲景桂枝湯

治太陽證傷風自汗脉浮而緩

桂枝 芍藥 生姜 甘草 紅棗核

以十字一本注書夏加黃芩知母石膏升麻

右為龕末水一盞煎至八分温服自汗小便
不數者宜用無汗小便數手足冷不惡寒或
膏梁好飲者不宜用

小建中湯

治陽咏瀉陰脉弦

桂 三字 芍藥 甘草 半 姜 三片

紅棗 摩去核 後做此

右為龕末每服五錢匕生姜三大片元束一枚
水一盞半煎至八分去滓下膠飴兩匙再煎
温化服日三服二尺脉尚遲再加黃耆末一
錢後人用治雜病改桂枝為桂取其厚則
不言枝

金匱小建中湯

急恐脱裏字

治虚劳急悸、衄、腹中痛、梦失精、四肢酸疼、手足烦热、咽乾、口燥、宜此方主之。

桂枝

三兩 去皮

芍药

六兩

甘草

三兩 炙

生姜

三兩 切

大枣

十二枚 擘

膠飴

一升

右六味以水七升先煮五味取三升去滓内膠飴另消温服日三服咽家不可用此湯以其有甘草故也每服一升

千金療男女因積劳虚損或大病後小腹作疼

四躄沈滯骨内疼酸吸之少气行動喘怒或

小腹拘急腰背强痛心中虚悸咽乾唇燥面

漸

目少色或飲食無味陰陽痿弱悲憂慘感多臥少起久者積年輕者百日新至瘦削五臟气竭則難可復根又治肺與大腸俱不足虚寒之氣小腹拘急一作瘠腰痛羸瘦百病肘後黃香建中湯有人參三卷二兩

金匱黃耆建中湯

虚劳衰急諸不足宜此方主之

黃耆

桂枝

去皮

生姜

各三兩 切

芍药

六兩

甘草

二兩 炙

大枣

十二枚 擘

膠飴

一升

右七味以水七升先煮六味取三升去滓

内膠飴令消温服一升日進三服 集驗云
吧者加生姜腹滿去東加茯苓四兩一方療
肺虛損不足痞氣加半夏五兩

金匱黃耆桂枝五物湯

血痺病從何得之師曰夫尊卑人骨弱肌膚
盛重困疲勞血出引不得時動搖加被微風
遂得之但以脉自滿在寸口關上下緊巨鉞
陽氣令脉和緊去則愈 血痺陰陽俱微寸
口關上微尺中小緊外證身體不在如爪狀
宜此方主之

瀉

黃耆 桂枝 去皮 芍藥 各三兩 生薑 六兩切

大棗

右五味以水六升煮取二升去滓温服
七合日三服一方有人參

金匱桂枝加朮附子湯 天雄散亦主之

夫男子平人脉大為勞極虛亦為勞 男子
面色薄者濁及亡血卒喘悸浮者裡虛也
男子脉虛沈弦而無寒熱短氣裡急小便不
利面色白時目瞑兼血少腹滿此為勞使之
然勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬

渴依金匱改之

差陰寒精自出酸劑不能行男子脉微弱而
澆為無子精清冷旦夫失精家小腹弦急痛
陰頭寒目眩一作眼脹髮落脉極虛元遲為
清穀亡血失精脉得之諸元動微緊男子失精
女子夢交並以此方主之

桂枝 去皮芍藥 生薑 切甘草 各二兩

大棗 枚 十二枚 牡蛎 煨 牡蛎 各三兩 熬

右七味以水七升煮取三升去滓分温
三服小呂云虛羸浮熱汗出者除桂加白薇
附子各一作三分故云加龍骨湯

天雄散

天雄 三兩 去皮 白朮 八兩 桂枝 六兩 龍骨 三兩 煨

右四味搗為末酒服方寸匕日三服不如稍
增之

易簡建中湯

治腹中切痛增損治療各不同並見於後
此茶飲酒人不喜甘者不亘服此茶夕桂枝
湯用茶一同但減芍藥如官桂之數專治傷
凡發熱自汗用此茶之一作表無汗者不亘服此
官桂分三白芍藥半甘草半兩

後

腹

濕 冒下易簡 有涉字

右以吧、每服四錢水一盞半、生姜五片、棗一
枚、煎至六分、去滓服
大治婦人血痛、男子心腹^{一作疼非}疼痛、并四肢拘急、
疼痛、心腹疼痛甚者、加遠志半兩、或吐或瀉、
狀如霍亂、及冒濕寒、賊凡入腹、拘急、切痛、加
附子三分、^匙疝氣、發作、當於附子建中湯煎
時加蜜一^匙、頭許、一方治男子婦人諸虛
不足、小腹急痛、眼助膨脹、膝下虛滿、胸中煩
悸、面色痿黃、唇口乾燥、少力身重、胸滿短氣、
腰背強痛、骨內酸疼、行動喘乏、不能飲食、或

下當作丁

黃耆建中湯

因勞傷過度、或因病後不復、加黃耆一兩半、
名黃耆建中湯、一方治婦人一切氣血虛
損、及產後勞傷、虛羸不足、腹中^{疼非}疼痛、呼吸少
氣、小腹拘急、痛引腰背、時自汗出、不思飲食、
加當歸一兩、名當歸建中湯、若產後半月、每
日三服、令人下壯

桂 芍藥 甘草 加黃耆

當歸建中湯

桂 芍藥 甘草 加當歸

局方樂令黃耆湯

范汪當歸湯皆出桂枝建中例

大建中湯 主治並見局方

桂心 三錢 芍藥 二錢 甘草 八錢 棗 二枚 擘

生薑 八錢 加黃耆二錢 當歸 一錢 人參 一錢

附子 半錢 半夏 三錢

右以呷水五盞煎至三盞去滓分作三服

桂枝加葛根湯 桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝加附子湯

桂枝去桂加白朮茯苓湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯 四味 瀾水

桂枝白朮甘草湯 四味

茯苓桂枝生薑甘草湯 四味

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥加蜀葵牡蛎龍骨救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蛎湯

柴胡桂枝甘草湯 柴胡桂枝湯

桂枝人參湯

桂枝附子去桂加白朮湯

桂枝為茶湯

若誤下傳裏侍表也

桂枝加大黃湯

桂枝加大黃、白大柴胡、法有表、復有裏同例、已上諸湯、並見法

人舊小本中

王朝奉桂枝白虎問答

云、春初、秋末、冬月方用桂枝麻黃、五六月壯熱不用白虎、若誤用桂枝麻黃湯、則內熱發黃、生斑必死、二月三月四月、泄病宜陽旦湯、七月八月猶熱病壯熱而宣、白虎自然汗解、或問孫曰、杜張皆言變、若果見桂枝麻黃證、

但當是溫字

亦豈得不用、只用白虎也、孫曰、此說甚妙、但臨時看證用之、老弱之人、不宜白虎、白虎治傷寒、亦治渴證、

桂枝例

活人陽旦湯

治中風傷寒、脈浮發熱、往來汗出、惡風、項強、鼻鳴、乾嘔、

桂枝三

芍藥三

甘草二

黃芩一

右到如麻豆大、每服五錢、水一盞、半、棗一箇、生姜三片、煎至一盞、取八分清汁、溫服、

到

惡

煩

自汗者加附子、渴者去桂加栝樓、利者去芍藥、桂加乾姜、心下悸者去芍藥加茯苓、
三虛勞裏急者正陽旦湯主之、煎時入膠飴、
桂、若脈浮緊、無汗、發熱者不可服也。

活人陰旦湯

治傷寒、收節痛疼、內寒外熱、虛爛、

桂心 三 芍藥 二 甘草 二 大棗 十五

乾姜 二 黃芩 二 此一味酌量加減

右剉如麻豆大、每服五錢、水一盞半、煎至八合、去滓、溫服、日三夜二。

王朝奉陰旦陽旦湯、活人同、

活人解肌湯、治溫病、頭疼、壯熱、

桂枝 一分 芍藥 半兩 甘草 一分 麻黃 三分

葛根 一兩 黃芩 半兩

右剉如麻豆大、每服五錢、水一盞半、煎至八分、日三服、三日後不解者、再服、脈浮者、宜再服、脈沈實者、宜下之、

仲景麻黃湯、治傷寒、無汗、脈浮而緊者、

麻黃 一錢 官桂 一錢 去浮皮 甘草 炙半

杏仁 三箇半

右為麻末每服五錢匕水一盞半煎至八分
去滓溫服夏加知母黃芩石膏恐有斑黃之
變惟冬与春病人素虛者不宜加此

仲景桂枝各半湯

桂枝 一錢 芍藥 生薑

麻黃 各一錢 杏仁 二枚 棗 半枚

右為粗末每服五錢水一盞半煎至八分去

滓溫服

^{坐有朱字}奉議先生云治傷風得傷寒脉傷寒得傷風脉
證脉不同故宜服各半湯

桂枝二麻黃一湯 桂枝二越婢一湯

大青龍湯 麻黃杏仁 甘草石膏湯

麻黃 三錢 杏仁 二枚 生薑 三錢 棗 一枚

桂 甘草 各一錢 石膏 半

右為麻末每服五錢匕水一盞半煎至八分
去滓溫服汗出止後服

小青龍湯

麻黃 細辛 乾薑 甘草

桂 芍藥 各三錢 五味子 半 半夏 一錢

生薑 三片 棗 一枚

右為蘇末水一盞半煎至八分去滓溫服日
三夜二後人增損為花蓋散大青龍去桂石
膏倍杏仁治嗽華

仲景雜方治客忤

麻黃 四兩 杏仁 二十枚 甘草 三兩

右以水八升煮三升服之

又方

桂 一兩 生姜 三兩 梔子 十四枚 藪 五合

右以酒三升攪煮之去滓頓服一作以其取差一法用
桂枝一法用麻黃一作以其度之有汗無汗一無此字而用也

仲景麻黃升麻湯

治壞證傷寒六七日大下後寸脈沈而遲手
足厥下部脈不至咽喉不利唾膿血利不止
者以符而為難治

升麻 一兩 麻黃 去節 三兩 知母 黃芩

葳蕤 各十錢 石羔 白朮 乾姜

芍藥 天門冬 去心 桂枝 茯苓 各六

當歸 一兩 甘草 六錢

右十四味以水一斗先煮麻黃二兩沸去上
沫內諸藥煮取三升去滓溫分三服相去如

炊三斗米頃令盡汗出愈若寸脉沈遲下部
脉又不至泄利久不止不可輕用此茶

海藏云仲景麻黃升麻湯條下為下之而寸脉

沈遲或厥或咽喉不利咳嗽下膿血或下利

不止斷作難治此茶有桂枝有麻黃湯有干

善芍藥甘草湯有白虎湯內更有少陽茶黃

芩此是也以元有是字三陽合而標病不應下而下之壞

而成肺病也若脉不遲者去干善官桂不下

利者亦去之寸口脉小者去黃芩此隨證而

加減之也前人全用茶以其前證悉備故用

痿 故

三陽標茶以治之經曰治病必求其本是也

肺痿之源

衍義云有一濕病已十二日診之其脉六七至

而濇寸稍大尺稍小發寒熱頰赤口乾目不

了了而耳聾問之病後數日經水乃行此屬

少陽熱入血室也若治不對病則必死乃指

其證與小柴胡湯有之字又與小柴胡湯加

桂乾姜也一日寒熱遂止又云我臍下急痛

又与抵當丸微利臍下痛瘥身漸凉脉漸勻

瘥当作輕

頰

此

尚不^{及非}乃復与少柴胡湯次日云我但胸
中热燥口鼻乾又少与調胃承气湯不得利
次日又云心中痛又与陷胸丸半服利三行
次日虚煩不寧時言有所見時復^後狂言雖知
其中有燥屎以其極虛不敢攻之遂以竹葉
湯去其煩热其夜大便自通至曉兩次有燥
屎^{有也字}散收而狂言虚煩盡解但咳嗽唾膿^吐肺
虛若不^{有也字}治恐乘虛而為肺痿遂与小柴胡去
人参大枣生姜加乾姜五味子湯一日咳嗽
減二日而病悉愈已上皆用張仲景方

王朝奉陽毒條下有金匱千金唾膿血二條內
有吐血肺痿失治又不愈^{一作變}肺癰為難治孫
真人詳說并某證俱^{一作具}見^{一作枯}甘湯例少陰條下
並出仲景金匱祖方

仲景麻黄杏仁甘草石膏湯

麻黄附子細辛湯 麻黄連翹赤小豆湯

麻黄附子甘草湯 主治俗製
並見活人

易簡杏子湯

感 治一切咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛
勞咯血痰飲停積悉皆治療

人参 半夏 茯苓 甘草

官桂 芍药 五味子 细辛 各等分 易简

右以胆、每^{一有服字}四、水一盃半、杏仁去皮尖、剉五枚、姜五片、煎至六分、去渣、食前服。

若感冒得之、加麻黄等分、^{一有若字}脾胃素实者、用罌

粟殼、去筋膜、碎剉、以醋淹炒、等分、加之、每服

漆烏梅一枚、煎服、其效尤驗、若^逆惡心者

不可用此法、又云去杏仁、人参倍加、麻黄添

芍药、^如麻黄之数、干姜五味子各增一半、名

小青龍湯、大治久年咳嗽、气虚喘急、皆得其

薏

宜、二方中有麻黄、有汗人、则不宜服此剂

仲景麻黄汤例

仲景麻黄杏仁黄苧仁汤 治凡湿身烦 疼日晡剧者

麻黄 三两 杏仁 三枚 甘草 薏苧仁 各一

右四味、以水四升、煮取二升、温分服

仲景薏苧仁附子汤 治胸痺偏 缓急者

薏苧仁 一两 附子 十枚

右二物、杵末、每服方寸匕、日三服

活人麻黄葛根葱豉汤

治伤寒三二日、头项腰脊痛、恶寒、脉浮而紧

四味随定奪套分兩

右剉如麻豆大，水煮麻黃去沫，次下葛根，散十沸，次下豉，次下葱白，煎成去滓，溫服少時，以葱醋粥射投之，覆衣取汗，後有活人葱白例，并王刺奉葱白等方。

活人知母麻黃湯。

易老解利法

乾山茱 一兩 蒸 藜蘆 一錢

右為細末，紙煨蘆少許，梘內啗之。

麻黃醇酒湯 治黃疸病

蘆

按甘草缺不兩

凡用麻黃，去節去沫，曝乾，再用麻黃一把，去節，綿裹美酒五升，煮取半升，去滓頓服。

一法治凡此箇凡字，非傷凡自汗，即中凡痺而無汗，故用麻黃後，越婢中有凡痺字。

麻黃 一兩 穿山甲 人參 各二 甘草

水酒各一碗，同煎服。

越婢湯 治凡濕脚

麻黃 去節去沫 石膏 白朮 一兩

附子 炮一兩 甘草 炙半

右剉如麻豆大，每服四錢，水一盞半，生薑三片。

枣一枚煎至八分去滓温服

通頂散 解利 傷寒

藜蘆 半兩 躑躅花 一錢 藿香葉 二錢

右為細末紙燃蘸少許鼻內噓之

活人独活散 治傷寒 濕温

羌活 独活 防风 細辛

黄芩 川芎 甘草 人参

茯苓 枳殼 甘菊花 石羔

麻黄 蔓荆子 薄荷 生姜

右十四味為齋末生姜薄荷水煎去滓温服

年高者以川芎代黄芩自汗者減麻黄凡濕證多自汗故減麻黄

活人敗毒散

治傷風温疫凡濕凡眩凡疹湿痺

羌活 独活 前胡 柴胡

枳殼 人参 茯苓 桔梗

甘草 川芎

右為細末生姜水煎或沸湯點亦可大人小兒皆宜服瘴烟之地湿温疫疔行或人多凡疹或处早湿脚气此藥不可闕

特

海藏云傷寒得傷凡脉傷凡得傷寒脉故仲景
有大青龍之劑及汗出過多戒不可服有筋
惕内^肉之證許公^州學士諄以此則知麻黃
桂枝不可輕用及洪洲^州韓氏又有桂枝之戒
以其乱治貴賤之不同^宜芳草^罪蘼^罪藿之不等故
耳^至於揚氏^楊明理特有互見脉^非非精於持
診者則未易能也後之學者安所^過從哉
先師潔台^夫老人博採衆方別立一法作十味大
羌活湯無問有汗無汗中凡中寒悉皆治之
使喜温者去五積之变热好凉者除雙解之

天当作夫

变^寒实^夫雖市天農子用而無失自非聖賢之前
身豈能筆下有此怕次耶
易老大羌活湯

并

治傷寒脉浮而紧傷凡脉浮而緩并解兩感
惡候

羌活

防风

白芷

川芎

細辛

甘草

蒼朮^製

生地黄

黄芩

右藥末每服五錢匕生姜五七片水一盞半
煎至七分去滓^無時稍热服
大羌活湯全

在

錢

和

右生地黄、木杵臼中別為麤末、各等分稱之、
名曰羌活地黄各半湯、解利而感傷寒有神、
詳說見難知、易老火羌活湯、劑料大小服餌、
溫熱加減、並從緩急法、一法加大黃治凡、
熱淫於內、同芎青丸主治、並見吳氏、一法
治破傷風、用豆淋酒煎、素有寒者加草烏頭、
白朮一作黃一字服之、

芎辛例

一有內字
治頭風鼻塞身

芎辛湯

重肩背拘急

川芎

十兩
一作半兩

細辛根

二錢

甘草

一錢半

右為麤末、量多少水煎、去滓、分二服、臨卧
一法加吳白芷辛夷車葉花治鼻出黃水濁
涕不絕、一作腦胸痛目昏、

易簡芎辛湯

治一切頭痛、發熱者、不當服、其餘餘疼厥飲、
腎厥等證、偏正頭痛、不可忍者、只以此茶并
聖餅子、不拘病退、但多服、此自能作効、仍服
養正丹、黑錫丹、并用此調鐘乳粉、間服諸證、
頭痛、緊捷之法、無以踰此也、但頭疼、多用石
羔、蓋取能墜疼、飲然、但恐性寒、故以鐘乳代、
痰

之腎厥頭疼尤得其宜或以石膏煨過為末用亦得

生附子 川烏頭生 南星炮 乾姜

細辛 川芎以上各一兩

茶

右以咀每服四匙水二盞善五片荃芽少許

煎六分去滓食後服 若氣壅塞盛只用川

芎一兩細辛半兩甘草三匙煎如前服之

又一方治頭疼以細辛二匙川芎白芷減半

為細末搐入鼻中 一方治氣虛人頭疼以

附子一隻生去皮切作四片用生薑自然汁

附子上易簡有若葉虛人以五字

白龍丸

一大盞浸一宿慢火炙乾再炙再蒸再炙須以溲盡薑汁為度高良薑等分為細末曬茶調服之 又治着濕頭重眩暈用川芎白朮生附子等分官桂甘草減半每服四匙薑十片煎服

鮮當作癰

問

治男子婦人一切風遍身瘡鮮手足頑麻偏正頭疼鼻塞腦悶大解傷寒乳凡又治霧露之氣或發熱者宜服之

川芎

細辛

甘草

藁本

白芷 各等分

右為細末、茶四兩、入石羔半斤、細末係煨了者、水投丸、每兩分八九、薄荷茶清嚼下一丸、食後服、凡蛀牙疼、用一丸、分三次、乾擦、後用湯漱之、使用葱茶嚼下一二丸、或作湯服之、亦可。

搥雲散 治眼

菟活

防風

甘草

柴胡

右等分、水煎服之

海藏法白木湯

白木 三 防風 二 甘草 一

同仲景桂枝湯

黃耆湯

止汗者、以生薑煎服

神木湯

蒼木 三兩 防風 二兩 甘草 一

同仲景麻黃湯

發汗者、以葱白生薑煎服、若

以此二藥、治傷寒得傷風脈、傷風得傷寒脈、

亦同、各半例、加減治法、並見陰證論六氣加

減

黃芪湯

主治並見陰證論

人參

黃耆

白朮

白茯苓

芍藥 甘草 一法加 藿香葉
陳皮 生姜

黃耆甘草湯

治凡寒入腠理令人膚痛行走無定膚痛摩之即痛按之至肉則不痛也

黃耆 甘草 生姜煎服

活人防風牡蛎白朮湯

治發汗多臥眩汗出筋惕肉瞤此壞證也

防風 牡蛎粉 白朮 各等分

治為細末每服二錢酒調下米飲湯亦得日

二三服汗止便服小建中湯

凡論

上古聖人之教下也謂虛邪賊風避之有時註云乘虛而入非也俗云賊風者牕牖之風亦非也虛邪者從前來者為虛邪不勝已者亦為虛邪也經云從八風入腠理注云辟被虛邪亦天之虛邪也移精變氣之賊風數至虛邪朝夕內至五藏骨髓外傷空竅肌肉無間邪之虛實皆乘虛而入非乘虛而入便為虛邪也乃從前來與不勝已皆為虛邪也春甲

云

乙則金風秋庚辛則炎凡便是賊凡也故勝
己者為實邪從後來者是為實邪賊凡也故
凡為百病之始善行數變衝盪吹擊而無窮
有太過不及勝復之各異故抗萬物者莫疾
乎凡也四時八節之所傷初焉外舍久見內
藏始自皮毛次入經絡一作次入大絡一作次入大經
深入骨髓而不可治

仲景小續命湯

治脉緊緩或浮緩全治證並見局方

麻黃 桂心 芍藥 甘草

生姜 各五兩 人參 川芎 黃芩

杏仁 防風 各半兩 防己 附子 各一兩

崔氏外臺不用防己

右十二味以坦水一斗二升先煮麻黃三沸
去沫內諸藥煎取二升分為三服不差再三
兩劑隨經種重發之 脚氣服之亦差 天
陰節變服之以防瘡癰 恍惚者加茯神遠
志 骨節煩疼有熱者去茯苓加白芍藥 千
金翼深師台今錄驗有白朮不用杏仁 救
急方無芍杏仁二味 延壽方無防風

輕

古

易老法 六經加減例 四時增損同

麻黃續命湯 桂枝續命湯 白虎續命湯

葛根續命湯 附子續命湯

羌活連翹續命湯

獨活續命湯

治卒中凡不省人事漸覺半身不遂

麻黃 人參 黃芩 芍藥

芍藥 甘草 杏仁 桂 各一

防己 附子 各半 防風 一兩 獨活

白花蛇肉 乾蝎 各三錢炒

右為麤末每服三錢水一盞半生薑五片煎

取一盞去滓食前熱服

白花續命湯

治卒中急凡牙關緊急精神昏憤

白花蛇 全蝎 炒 獨活 天麻

附子 人參 白殭蚕 防風

肉桂 白朮 蒿本 赤箭

川芎 細辛 白附子 甘草

半夏 姜製麻黃 白茯苓 以上各一兩

右為麤末每服五錢水一盞生薑五片煎至

厲

七分、去滓稍熱服

大續命湯

脉紧澹者主之治肝屬二凡卒然瘖瘖若依

古法用大小二湯通治五藏偏枯賊風

麻黃各二兩石羔四兩桂心二兩川芎二兩

乾姜各二兩當歸各二兩黃芩各一兩杏仁二十枚

竹瀝一升甘草千金翼有

右九味以水一斗先煮麻黃一沸去沫下

諸藥煮四升去滓又下竹瀝煮數沸分作四

服能言未差後服小續命湯日五竹瀝今增

如神大八風散復有竹瀝葛薑三汁法

小續命湯

脉微弱者主之治大凡經藏奄忽不能言四

肢不曳皮肉痛痒不自覺也

獨活各三兩麻黃各三兩川芎二兩防風二兩

當歸各三兩葛根各三兩生薑各三兩桂心各二兩

茯苓各三兩附子各三兩細辛各三兩甘草各一兩

右十二味以水一斗煮取四升分五服老

小各半之初得病有自汗去麻黃無汗則用

之上氣者加吳茱萸二兩厚朴一兩乾

吧者加附子一兩
喘者加陳皮一兩
中吸々少氣者加大紅棗十二枚
悸加茯苓二兩
熱者去生姜加葛根
得凡不須加減且作三劑四五日後視虛實
論之行湯鍼灸法

醫星元戒卷第一終

寬政壬子夏六月十日從

秘府古抄本校訛元簡記



