


萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

藥物要義

姚昶緒著



商務印書館發行


真寶文庫

第一卷一第

三  
雲  
三

商務印書館發行

04076E



藥物要義

謝敬堂

上海小書局

# 藥物要義目次

總論

各論

第一章 解熱劑	一三
第二章 興奮劑	二六
第三章 通便劑	四二
第四章 利尿劑	五五
第五章 催吐劑	六一
第六章 發汗劑	六八
第七章 驅痰劑	六八
第八章 麻醉劑	七六

第九章	鎮靜劑	九一
第十章	健胃消化劑	九七
第十一章	鐵劑	一〇四
第十二章	收斂劑	一一一
第十三章	變質劑	一二二
第十四章	驅蟲劑	一二八
第十五章	消毒劑	一二九
第十六章	刺戟劑	一三三
第十七章	腐蝕劑	一三五
第十八章	緩和劑	一三七
第十九章	清涼劑	一三七
第二十章	血清劑	一三八

# 藥物要義

## 總論

藥物之定義 凡物質入人體內，因其化學作用，能治愈疾病者，曰藥物。但藥物之治愈疾病，須用一定之量，其量不足，則不能奏治病之效。若過其量，又往往中其毒而反受害。例如阿片藥物也，用之過量，可以致死。即常用之，亦能成癮，而失治病之效。故醫家之用藥，猶兵家之用兵。其能戰勝疾病，而治愈之與否，悉視用藥之得當與否以爲斷，其關係實甚重大也。

藥物之質料 我國舊有之藥物，概取材於動植礦三界之天產品，而以草根樹皮等爲最多。其中雖不乏功效顯著者，然素無化學試驗，有效成分（能治病之物質）之多少，往往不同，故效力不能確實。西藥則不然，因化學甚發達，純粹之有效藥物，（用化學方法，從天產品提出之有效成分，或

用人工特製之藥物，逐年有所發明，天然品已漸漸廢棄矣。茲將西藥之種類略舉如下！

- (一) 化學製品。即純粹之有效成分，現今藥物中，此類占大多數。
- (二) 酏劑。用酒精浸出植物質中之有效成分。
- (三) 膏劑。用水、酒精或醇精浸出植物質中之有效成分，再煮成膏者也。
- (四) 粉末類。將植物質製成粉末而用之也。

此外植物之根、皮、葉，間亦用之。又豬油、黃蠟、礦脂等，常爲外用油膏之賦形藥。

藥局方與藥劑師 東西先進諸國，對於國內常用之藥物，皆有藥局方以規定之。即某藥須具若何之性質，某藥須含某種有效成分若干量，一一詳細記明，於各地設立衛生試驗所以化驗之，不合藥局方者，不得販賣。故市上絕少偽品劣貨。我國則西藥之輸入，雖逐年增多，既無藥局方之規定，又無衛生試驗所以取締之，偽品劣質，在所難免，危險莫甚，吾人當思有以改革之。

凡製造藥品及配合醫生處方者，名藥劑師。在先進諸國，法律上皆有資格之規定，非有高等專門學校文憑者，須經政府考試及格方可營藥劑師之業。我國則既少藥科之學校，又無資格之考試。

試觀各地之藥劑師，大半無化學智識之店伙，濫竽充數其間，其危險亦莫大矣，吾人亦當思有以改革之。

藥物作用之分類 藥物對於人身之作用，雖千差萬別，大約可分爲二十類如下！

- (一) 解熱劑。能減退病人之發熱。
- (二) 興奮劑。能興奮病人之精神，增強心臟之搏動力，使血行活潑。
- (三) 通便劑。能通利病人之大便。
- (四) 利尿劑。能通利病人之小便。
- (五) 發汗劑。能增多病人之發汗。
- (六) 催吐劑。能使病人嘔吐。
- (七) 驅痰劑。能使病人之痰，容易吐出。
- (八) 消毒劑。能殺滅一切病原微生物。
- (九) 驅蟲劑。能驅除腸中之寄生蟲（例如蛔蟲等。）



(十) 變質劑。能變換病人之體質。例如病人胃中多酸者，能使之減少。

(十一) 麻醉劑。使病人之神經麻醉，減弱或消失其知覺。

(十二) 清涼劑。能解除病人之煩渴等。

(十三) 收斂劑。能收縮病人之血管及肌肉，用以止血或減少分泌。

(十四) 腐蝕劑。能將贅疣等物，腐蝕而除去之。

(十五) 健胃消化劑。能補助消化，振起食慾。

(十六) 鎮靜劑。能鎮靜病人之精神，如催眠劑即屬此類。

(十七) 刺戟劑。刺戟病人身體之一部分，或使之發泡，或使之紅腫，以誘導體內深部之疾

病，使之外出。

(十八) 緩和劑。此類藥物，自己無特別之治病作用，不過用以混於他藥物，以緩和其作用。

(十九) 鐵劑。有補血之效。

(二十) 血清劑。以血清治病，係晚近之發明。

處方中各藥之用途 醫生立一方，其方中各藥，必有君臣之相佐。茲舉一例說明如下！

處方 溴化鉀

纈草酊

糖漿

蒸溜水

上列四藥，可配成催眠之藥水，溴化鉀主藥也。此方有催眠作用，全賴乎此藥。纈草酊則爲佐藥，恐溴化鉀一藥，尙不能奏催眠之效，更加是藥，以助強其作用也。糖漿係調味藥，因溴化鉀與纈草酊味均惡，恐病人不喜服，故加是藥以調其味。蒸溜水爲賦形藥，蓋此方係藥水，將前三種藥物，溶於蒸溜水中，始能成藥水之形，四種藥物之次序，須照前例，主藥居首，佐藥次之，調味藥再次之，成形藥居末。然四種中亦有缺其一種或二種者，例如主藥之作用既足，無需用佐藥者。或主藥佐藥之味均佳，無需用調味藥者。又有單用一藥者，於散劑常見之。是因一藥之作用已足，量已多，味亦不惡，無需再加他藥也。反之，亦有用二種以下之主藥或佐藥者。

藥物製劑之種類 我國舊時之藥劑，內服藥以煎劑居多，丸散次之。外用藥則多用散劑或油膏。西藥之製劑，種類甚多，略舉如下！

(一) 水劑。即用水為賦形藥者也。通常多為透明之液體，間有主藥或佐藥不能溶盡，而下有沈澱者。此種有沈澱之水劑，又名振盪劑。服用時，須先振盪其瓶，使之勻和。

(二) 煎劑。加適量之冷水於植物之根、皮、葉等，沸煮之三十分鐘，乘溫熱時濾過之，所得之濾液也，往往加入佐藥與調味藥。

(三) 浸劑。加適量之熱水於植物之根、皮、葉等，沸煮五分鐘，冷後濾得之濾液也。

(四) 散劑。為全體勻和之細末，其味難服者，可以膠質製成之薄紙包而吞服，服後，膠紙既溶，藥即呈其作用。

(五) 丸劑與錠劑。凡難服或常服之藥物，可製成丸劑或錠劑而服之。

(六) 膠囊劑。膠囊為膠質所製之小管，形似鵝毛管，有底有蓋。凡惡味之粉藥或油質藥，裝入膠囊底中，以蓋合之即易服下。外狀雖似玻璃，實則服下後即溶化。

(七)坐藥。專用以插入肛門、尿道、陰道中，治肛門、尿道、陰道內之疾病。其形狀隨用途而異，用於肛門者，名肛門坐藥，狀似新式鎗彈。插入時，須將較大之一端先入，則插入後，不致爲肛門周圍肌肉之壓力所排出，用於尿道者，名尿道坐藥，狀如線香，插入時，須塗以油，方不擦傷尿道。用於陰道者，形圓如球，名陰道坐藥。此種坐藥，用油蠟等賦形藥，混合於主藥而成。插入體部後，即漸漸溶化，呈其作用。

(八)軟膏與硬膏。均爲外用之藥，由主藥與油蠟等賦形藥混和製成。在平常室內之溫度中，柔軟能隨意改變其形狀者，名軟膏。平時甚硬，遇體溫後，始漸漸軟化者，名硬膏。

藥物之用法 我國之藥物，大概祇用以內服與外用。西藥則用法甚多，茲列舉如下！

(一)內用 製成藥水、藥粉、藥丸等而服之，但服用回數及時間均有一定。

(二)外用 方法甚多，大約如下！

(甲)撒布 以藥粉撒於患病處也。

(乙)塗布 以油膏或藥水塗敷於患處也。

(丙)塗擦 以油膏或藥水摩擦患處也。

(丁)罨包 以棉花浸溼藥水，裹貼於患部也。

(戊)洗滌 以藥水洗患部也。不但身體之外部可以洗滌，即耳、鼻、子宮、尿道、陰道之內，亦

可用藥水洗滌。

(三)灌腸 灌入藥水於腹內也。隨所用藥品之性質，有排便、消毒、收斂、及增加身體中滋

養水分等效。

(四)噴吸 吸藥水之蒸氣於氣管內也，專用以治喉頭氣管之病。

(五)皮下及肌肉注入 注入藥水於皮下或肌肉中也，其奏效較內服爲速。

(六)靜脈注入 注入藥水於靜脈（迴血管，即皮下所現之青筋）中也。其奏效較皮下

注入更速，但手術稍難，須請熟練之醫生行之。

普通藥、劇藥及毒藥 藥物作用之強弱，各不相同，可分普通藥、劇藥、毒藥三種，性質緩和者，雖用量較多，人身不致受大害者，爲普通藥。性質較劇，用量稍多，人身即蒙大害，然尚不易致死者，爲劇

藥。性質最烈，用量稍多，即可致死者，爲毒藥。藥之爲劇爲毒，各註於標題之下，無註者即普通藥。

藥物之極量 劇藥與毒藥之用量，各國藥局方皆有規定之最大限度。醫生除特別情形外，不得超過之。此最大限度名極量。

藥物之配合禁忌 二種藥物配合後，往往互失其作用。例如酸類與鹼類配合，則成鹽類，而各失其作用。更有二種藥物配合後，生成一種毒物者，危險益甚矣，此之謂配合禁忌。

藥物之習慣性 藥物中往往有易成習慣性者，既成習慣後，藥物即減少或消失其治病之效。例如阿片，雖有止瀉、鎮咳、止痛等效，然常服則成癮。成癮後，即失其治病之效矣。即不成癮之藥物，常服之，效力亦往往減弱。

藥物之蓄積作用 吾人服下之藥物，經相當時間後隨大小便及汗等，仍排泄於體外。然其排泄有遲速之不同。排泄遲者，逐日服下之藥，漸逐蓄積於體內，貯積既多，作用亦強，往往突然發生大影響，或竟中毒而致死。例如亞砒酸、變質劑中之要藥也，我人患溼疹、疥瘡等慢性皮膚病時，必須用之。此藥雖係毒藥，但用量在極量之內，決不致中毒。惟其排泄甚緩，若常用之，往往發蓄積作用而中

毒。故此藥連服三星期後，須停服一星期，俟貯積於體內之藥物，完全排出後，方可再服。劇毒藥之蓄積作用，固甚危險，即非劇毒藥，吾人亦往往蒙巨大之影響。是以無完全之醫學智識者，決不可輕試藥物，自蹈危險。

特異質 吾人之體質，雖各不同，通常尚無大差。故金雞納霜之能退熱，甲用之然，乙用之亦然。然有一種特別體質之人，對於某種藥物之感受性較常人過敏。例如黃碘粉，外科中常用之制腐藥也，然有人用之而發劇烈之皮膚炎者。又如可卡因，重要之局部麻醉藥也，有人用其少量而發生嘔吐、盜汗、昏厥等症狀者。此等特異質，女子較男子為多。

藥物之副作用 一種藥物，常有多種作用，惟其作用中之一種或二種，有治病之效。此外不能治病諸作用，謂之副作用。副作用弱者，我人雖不覺，強者則所蒙之影響甚大。例如銨碘、清血解毒之要藥也，然有喉燥、口渴、食慾不振等副作用。金雞納霜，有頭重、耳鳴之副作用。此等副作用，大概停止服藥後，亦即自愈，無需介意。

藥物之治病作用 藥物之治病也，以能殺滅病原微生物（據西醫之研究，疾病一部分，係由

微生物侵入體內而發生，此種微生物，名病原微生物。或除去體內之毒質者爲上乘，是名原因療法。以其能除去疾病之原因，而使之全愈也。藥物之有此作用者現尙發明未多。金雞納霜之治瘧疾，與六零六之治梅毒，其最著者也。其次爲病變療法，雖不能除去疾病之原因，而能除去人體中因疾病而發生之變化，現今最流行之石灰質注入療法（治肺癆、白帶等症）卽屬此類。若不能達到以上二種目的，則不得不用對症療法，卽緩解表面上發現之症狀，以減輕病人之苦痛，間接以治愈疾病。然對症療法，須審慎以行之，因種種症候中，有有益於疾病，不可除去者。例如咳嗽有驅痰之作用，若強制止之，則氣管中之痰，愈積愈多，反爲有害。泄瀉有排除腸內有害物質之作用，決不可妄止之。傷寒病人之發熱，爲醫生診斷上之絕好資料，且爲抵抗微生物發育之天然良能，（微生物遇高熱，不易發育。）決不可投以解熱劑而減輕之。故用藥之道，須審慎周詳，非有完全醫學智識者，決不可輕試也。

藥物用量之單位 西醫用藥，大概以法國之克蘭姆量爲單位，卽民國四年公布所謂萬國權度通制者是也。一克蘭姆（英美別有單位）卽一克約我國庫秤二分六釐八毫，用小數法記之，如



書「一·五」爲一克半，「〇·〇三」爲一克之百分之三，「二〇·〇」爲二十克。不論固體液體之藥，皆宜用秤秤其重量。一立方厘米容積之水，其重量即爲一克，故水之重量，可以容積知之，如「一〇〇·〇」原爲百克重量之水。然水之一克，其容量爲一立厘米，故祇須量得百立厘米容量，即是百克重量之水矣。與水比重相近之液體藥品，亦可以容量代秤，雖稍有出入，無妨也。

# 各論

## 第一章 解熱劑

凡能減退病人體溫（人體之溫度，名體溫）之藥物，名解熱劑。而解熱劑之減退體溫，惟金雞納霜之治瘧疾，與柳酸、阿斯疋林等之治風痹，爲能除去其原因，有剷除根本之作用。此外之用解熱劑以治熱病不過一時性，經過一定時間，藥力盡後，體溫仍昇也。解熱劑概兼有發汗作用，用量過多，有發疹、嘔吐、眩暈等副作用，或有虛脫之危，不可不慎。

### 鹽酸規寧（鹽酸金雞納霜）

本品爲白色針狀之結晶，味甚苦，水中難溶。藥房發賣之鹽酸金雞納霜丸，普通每粒中含本品○·一。其應用如下！

內用（一）本品爲瘧疾之特效藥，不但能退熱，且能殺滅其病原微生物，奏根本治愈之效。現

今之藥物中，奏效確實，無出金雞納霜治瘧疾之右者。其用法，於發作前六小時或八小時，服〇・五至一・〇散劑（用膠紙包）或丸劑均可。在發作間歇時，每日三次，每次服〇・三五〇・五。全愈後，尚須連服數日，以防復發。在瘧疾流行時，又可用以預防，用法每日三次，每次服〇・一至〇・三。

（二）對於神經痛、頭痛、齒痛等，用以作止痛藥。每日數次，每次服〇・二至〇・四。

（三）對於丹毒、敗血症、流行性感、百日咳等均可用為解熱藥。百日咳之小兒，隨其年齡而加減之。流行性感、一日用〇・五至一・〇。此外各症，每日用一・〇至二・〇，分數次服。

（四）對於紫斑、瘰癧、出血病、出血體質（即極易出血之體質）等，一日三次，每次服〇・〇五至〇・一，大概可與麥角（止血藥）混而用之。

（五）衰弱者及重病回復期，可用以作強壯藥，每日三次，每次服〇・〇五至〇・一。

配合禁忌 利索耳青及鞣酸含有物。

外用 蛔蟲症用〇・三至二〇・以灌腸。百日咳與肺炎，吸入二百倍溶液之蒸氣。

皮下注射及靜脈注射 肺炎、產褥熱、流行性感、風痹等症，往往用之，奏效較內服迅速。

處方例

(一) 鹽酸規寧

〇・六

龍膽膏

適宜

右混和，爲丸五粒，一次頓服。(瘧疾)

(二) 鹽酸規寧

安替疋林

各一・〇至三・〇

吐根糖漿

二〇・〇

蒸餾水

八〇・〇

右混和，每日三次，每次服一茶匙，(百日咳。鹽酸規寧之量視小兒之年齡而定，參考卷首

小兒藥用量表。)

小兒之用量如下

瘧疾

解熱藥

一歲以下（一回量） ○・一以下 ○・〇八以下

一至二歲 ○・一至〇・二五 ○・〇五至〇・一

三至四歲 ○・三至〇・三五 ○・一至〇・一五

五至十歲 ○・三五至〇・四 ○・二至〇・二五

硫酸規寧（硫酸金雞納霜）

本品之性狀及應用，與鹽酸金雞納霜同，惟作用較鹽酸金雞納霜稍弱，故用量宜稍多，藥房中發賣之硫酸金雞納霜丸，普通每粒中含本品〇・一。

歐規寧

本品爲白色柔軟之針狀結晶，水中難溶，苦味極微，且殆無副作用。故用於小兒，最爲適宜。

內服（一）爲鹽酸金雞納霜或硫酸金雞納霜之代用品，每日數次，一次用〇・五至二・〇，作散劑內服。預防瘧疾，一日用一・〇，雖常服之，亦無副作用。

（二）百日咳之小兒，隨其年齡，每次用〇・〇五至〇・五，可混於糖湯或牛乳中服之，本品

因作用弱，用量須倍鹽酸金雞納霜，方可得同等之效力。

### 柳酸（水楊酸）

本品爲白色之針狀結晶或輕鬆粉末。無臭，味酸而帶辣。難溶於水，而易溶於酒精及醇精。

內服 本品爲風痺之特效藥。他種發熱病，間亦用之作解熱藥。用量每次〇・三至〇・五。但副作用大，現今殆已廢棄。祇供外用耳。又不可與石灰水、碘化鉀或過錳酸鉀配合。

外用 製水溶液（〇・二％）、酒精溶液（一％）、軟膏（一〇％）及散劑（多與滑石或澱粉相混）等，治寄生性皮膚病（有微生蟲寄生於皮膚者）、贅疣、雞眼、胼胝、有惡臭之潰瘍等症。本品又有制腐作用，如漿糊中加入少許，可防腐敗。

註 %係百分中含量之記號，謂之百分率。例如〇・二％水楊酸水溶液，乃水百分中含柳酸〇・二分也。

### 處方例

#### （一）柳酸

一・〇

氧化鋅

澱粉

礦脂

右混和為軟膏外用(溼疹)

各二四〇

五〇〇

(二) 柳酸

乳酸

棉膠

右混和塗擦用(雞眼、贅疣、疥癬)

各一〇

八〇

(三) 柳酸

松節油

羊毛脂

豬油

各三〇

三〇〇

右混和爲軟膏，外用（骨節風痺）

### 柳酸鈉

本品爲白色鱗屑狀之結晶或粉末。無臭，味甘鹹而帶辣，水中易溶。

內服（一）本品爲風痺之特效藥，然用於急性風痺、偏頭痛、脊髓癆病人之疼痛等症，亦有止痛之效。

（二）爲消炎劑，用於肋膜炎、腹膜炎、腦膜炎等症。

（三）爲解熱藥，用於肺炎、麻疹等發熱病。

（四）用於遺精及月經不調。

（五）用於糖尿病、瘙癢症等，亦有效。

（六）用於黃疸、膽石疝痛等，能促進膽汁之分泌。用量，每次 $0.5$ 至 $1.0$ ，但一日不可過八。 $\circ$ 散劑易潮，概爲水劑用之。

注意 有心臟病者，不宜用本品，因恐心臟更衰弱而致虛脫也。配合禁忌與柳酸同。



灌腸 不能內服之病人，可用與內服相同之量，溶於蒸餾水中以灌腸。  
處方例

(一) 柳酸鈉

萇岩膏

三〇〇

橙皮糖漿

〇〇六

蒸餾水

一八〇〇

右混和爲水劑，一日服三次，二日服完，飯後服下。

藥房中有本品之錠劑發賣，一錠中普通含本品〇・五。

沙羅耳

本品爲白色結晶性之粉末，有香氣，水中殆不溶解，爲六十六分之柳酸與夫四十四分之石炭酸結合而成。在胃中不分解，入腸後始分解爲柳酸與石炭酸。

內服 (一) 對於風痺，有解熱、止痛之效，用量，每日數次，每次〇・五至一・〇，概爲散劑用之。

(二) 對於腸發酵、泄瀉、膀胱炎、白濁等，有殺菌制腐之效，用量與上同。其治膀胱炎與白濁，因服此藥後，尿中即含有柳酸故也。但不可久服，久服則發石炭酸中毒症。

外用 爲軟膏（一至一〇%）或澱粉撒布劑（一〇%）以治潰瘍、溼疹、痒疹等。

處方例

(一) 沙羅耳

乳糖

各〇・五至一・〇

右混和，爲一包，給十包，每隔二小時服一包。（風痹）

(二) 沙羅耳

一・〇

橄欖油

四・〇

羊毛脂

四五・〇

右混和爲軟膏，外用。（瘙癢症、褥瘡）

沙利尼林一名柳酸安替尼林（劇）

本品爲白色之粉末，難溶於水。

內服 對於風痹、流行性感冒、偏頭痛、及神經痛等，有解熱止痛之效。用量，每日數次，每次〇·五至一·〇，宜包於膠紙中服下，但空腹時不宜服。

阿斯正林

本品爲白色結晶性之粉末，稍有酸氣，味酸辣，難溶於水。

內服 對於風痹、神經痛及各種發熱病，有解熱止痛之效。用量，一日數次，每次〇·五至一·〇，但空腹時不宜服，又不可與鹼性藥物或鑛泉混用。

處方例

(一) 阿斯正林

五·〇

右爲散劑十包，每隔二小時服一包。(風痹)

安替正林(安知必林)(劇)

本品爲無色稜柱狀之結晶，或白色結晶性之粉末。殆無臭氣，味稍苦，水中易溶。

內服 (一) 爲解熱劑或鎮痛劑，每日數次，每次用 〇・五至一・〇。

(二) 對於舞蹈病、癲癇等，常與溴質劑並用。

(三) 對於遺精、遺尿等症，每夕一次，用 〇・五至一・〇。

(四) 對於尿崩症，每日服三次，第一日每次用 〇・五，第二日以後，漸次增量，至每次用二・〇。

(五) 產婦欲削減乳汁之分泌，每隔一二小時，服 〇・三。

注意 本品不可與甘汞、抱水克羅拉耳、水楊酸鈉、亞硝酸鹽等配合。

外用 瀉血用其 5% 水溶液以止血，痔疾用 10% 軟膏。不能服藥之病人，可常用其水溶液灌腸，用量與內服同。

皮下注射 劇烈之神經痛、風痹、疝痛等，常注入其水溶液於劇痛部附近之皮下，奏效較速。

處方例

(一) 安替定林

11.0

溴化鈉

六・〇

橙皮糖漿

二〇・〇

蒸餾水

一八〇・〇

右混和爲水劑，一日三次，二日服完，飯後服下。（舞蹈病、癲癇）

（二）安替疋林

二・〇

乳糖

一・〇

右混和，爲散劑三包，一日服完，飯後服下。（解熱及鎮痛用）

藥房中有本品之錠劑發賣，一錠中普通含本品〇・二五。

疋拉密洞（劇）

本品爲白色結晶性之粉末，味微苦，能溶解於十倍量之水中，須貯於暗處。其作用與安替疋林同，但較安替疋林功效顯著，下熱緩慢，而退熱之時間較長，且殆無副作用，衰弱之病人及小兒，用此爲宜，用量，一日數次，每次〇・三至〇・五。極量，一回〇・五，一日一・五。惟供內服，不作他用。

飛那西汀（劇）

本品爲無色小葉狀有光輝之結晶，無苦味，水中難溶，須貯於暗處。亦爲無副作用之解熱鎮痛劑，對於頭痛，效力更大。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。極量，一回一・〇，一日三・〇。

處方例

（一）飛那西汀

〇・五

溴化鈉

一・〇

右混和，爲散劑一包，與三包，一日服完，飯後服下。（頭痛偏頭痛）

米格來寧

本品爲白色之粉末，係安替苾林八十五分咖啡酸九分枸橼酸六分之混合物，偏頭痛之特效藥也，普通之頭痛及流行性感胃亦用之。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇，概爲散劑。

安替飛苾林（劇）

本品爲無色無臭有光輝之葉狀結晶，味稍辛辣，難溶於水，須貯於暗處，爲最廉價之解熱鎮痛

劑。因其副作用大，現已漸漸廢棄。用量，一日三次，每次 $\cdot 0$ 三至 $0 \cdot 5$ 。極量，一回 $0 \cdot 5$ 。一日 $\cdot 5$ 。

### 愛耳蓬

本品爲白色針狀之結晶，無臭無味，難溶於水。市上販賣之錠劑，每錠中含本品 $1 \cdot 0$ 。

內服 本品爲最新發明之解熱劑，毫無副作用，對於輕度之發熱，絕不發汗，而退熱之時間甚長。故肺癆病人之發熱，及傷寒、肺炎等之下熱期，用是最適。但對於高熱病人，則奏效不確實。用量，一日二至四次，每次服一錠（即 $1 \cdot 0$ ）。

## 第二章 興奮劑

此類之藥物中，能興奮腦神經，以回復其既失之機能者，名回蘇藥。興奮心臟之機能，使血行增盛者名強心藥。病人將虛脫或疲勞時，均用之。但用其小量能奏興奮之效，若用大量反致麻痺。

### 酒精

本品爲無色透明之液體，有揮發性，則漸漸揮散而減少，須貯於密閉之瓶中。有濃淡二種，濃者百分中含純酒精八五·六至八七·二分，稀者百分中含純酒精六十至六十一分，遇火皆能燃燒。內服（一）對於虛脫、失神、急性心臟衰弱（例如大出血後）等，常用其稀釋品少量，作興奮劑。若用其大量，則有鎮靜催眠之效。

（二）有興奮胃腸機能，而增進消化吸收之效。

（三）用以溶解他藥，或混於他種藥水中，使其作用發現較速。例如酞劑乃溶解植物中之有效成分於酒精中者也。

注意 凡有腦脊髓炎或腦脊髓膜炎、動脈硬化、急性熱病、腎臟炎、及腸潰瘍等症者，均忌用之。

外用 常爲塗布劑之溶解藥，神經痛、知覺運動麻痺、痛風、瘰癧、丹毒、癩、橫痃、及梅毒等傳染性炎症，常用酒精罨包。又多汗症，用以作塗布劑。

#### 葡萄酒



醫藥所用之赤葡萄酒，百分中約含純酒精十分，作用與酒精同。以其味佳，常用以代酒精，供內服。用藥，一日數次，每次五・〇至三〇・〇，但不供外用。

### 白蘭地酒

本品用葡萄酒蒸溜而製出，百分中約含純酒精四十分。作用同酒精。以其味佳，作用強，而無副作用，凡用酒精稍多者，常以此代之。用量，一日數次，每次三・〇至一五・〇。

### 精製樟腦

本品爲無色透明或白色半透明結晶性柔軟之塊，或白色結晶性之粉末。有特別之臭氣，不溶於水，易溶於酒精、醇精，及克羅羅封等。有揮發性，須貯於密閉之器中。

內服（一）爲強力之興奮劑，用於急性病（例如傷寒、肺炎）及酒精、阿片等中毒，以防虛脫。

（二）爲興奮性驅痰劑，應用於老年人之肺炎、喘息等，常與安息香酸混用。

用量 一日數次，每次〇・〇五至〇・三。

外用 凍瘡、皮膚癢、神經痛、挫傷、打傷等常用其一〇%酒精溶液或一〇%軟膏作塗擦劑。

皮下注射 急性虛脫，用一〇%之醇精溶液或一〇%至二〇%之橄欖油溶液行皮下注射，奏效較內服迅速。

處方例

(一) 精製樟腦

〇・三

安息香酸

一・二

乳糖

一・五

右研和，爲散劑六包，一日三次，二日服完，飯後服下，包於膠紙中吞服。(喘息)

(二) 精製樟腦

〇・一

阿拉伯樹膠

〇・四

右研和，爲散劑一包，與十包，每隔二小時服一包，包於膠紙中服下。(虛脫)

(三) 精製樟腦

四・〇

松節油

三〇・〇

右混和，爲塗擦劑。（未潰之凍傷）

薄荷精

本品爲無色針狀之結晶，有特殊之香氣，味初如灼，後清涼，難溶於水，易溶於酒精、醇精、及克羅羅封，有揮發性，須貯於密閉之器中。

內服（一）本品有興奮呼吸及心臟搏動之作用，故各種虛脫症及麻醉藥中毒（例如阿片中毒，）往往用之。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・五，但一日不得過六・〇。

（二）喘息、胃痛、嘔吐、吃逆、膽石疝痛及肺癆之盜汗等，常用其少量。

外用 神經痛、偏頭痛、皮膚癢、凍瘡、風痺、打撲傷等，用其酒精溶液（一〇%）或軟膏（一〇%）作塗布劑或塗擦劑，有止痛止痒之效，齒痛往往用純品塞入齒腔。

皮下注射 虛脫或中毒症狀劇烈時，往往注入薄荷橄欖油溶液（一〇%）於皮下，奏效較內服迅速。

處方例

(一) 薄荷精

重碳酸鈉

右混和，爲散劑十包，每隔一小時服一包。(惡心嘔吐)

(二) 薄荷精

橄欖油

羊毛脂

右混和，爲塗擦劑。(偏頭痛)

藥房中有一種錠劑名蘇打明者，即用薄荷精與重碳酸鈉製成，專用以治惡心、嘔吐、消化不良等症，用量，一日數次，每次服二粒至五粒。

麝香

本品麝貓之麝囊分泌物乾燥製成者，爲黑褐色或赤褐色之塊，有特別之香氣。

內服 各種虛脫症，用之作回蘇劑，小兒痙攣用之作鎮靜劑。用量，每隔二小時，服〇・一至〇

〇・五

五・〇

二・〇

〇・五

八・五

•五。小兒用〇・〇一至〇・一。我國古方之小兒急驚風藥中亦有本品。

毛地黃葉（狄吉他利斯葉）（劇）

本品之效力，以新鮮者爲佳，陳舊者漸失其效力，一年以後，已不堪用。須藏於乾燥之暗處。

內服（一）各種心臟瓣膜病代償機能已失，脈象細小不整，同時更發鬱血性支氣管炎、呼吸困難、浮腫等者。

（二）患慢性心肌病或肺氣腫之病人，因心臟之作用不完全而發前項之症狀者亦應用之。

（三）應用於急性心內膜炎及心囊炎。

（四）應用於尿毒症及因腎臟炎而起之心機失調。

（五）應用於因萎黃病而起之心臟擴張症。

（六）應用於急性發熱病（例如傷寒、肺炎等）有旺盛心臟機能，增加血壓，及利尿等效。

用量，一日數次，每次〇・〇四至〇・二。極量，一回〇・二，一日一・〇。大概爲浸劑而服，間有研

爲粉末製成散劑或丸藥者。

處方例

(一) 毛地黃葉浸 (1·0)

一七〇·〇

醋酸鉀液

純糖漿

各一五·〇

右混和，爲水劑，一日六次，二日服，每隔三小時服一次。(心臟病之有浮腫者)

注意 有動脈硬化症者，忌用本品。連服一二星期後，須停止一星期，以其有蓄積作用，恐中毒故也。又不可與酸類、酒劑、碘化物、醋酸鉛及含鞣酸之物配合。

毛地黃酊 (狄吉他利斯酊) (劇)

本品爲帶褐綠色之液，其味苦，較葉及粉末能久藏，但太陳者亦不堪用。應用與毛地黃葉同，惟作用較弱。可以久服。用量，一日數次，每次·〇三至一·〇。極量，一次一·五，一日五·〇。

狄加冷 (劇)

純粹之品，爲白色之粉末，從毛地黃葉提出之主要有效成分也。易溶於水。市上販賣者皆液體，

乃其○·三%水溶液。作用與毛地黃葉同。但奏效確實迅速而無副作用（毛地黃葉有刺戟胃之副作用），且可用以供皮下注入，奏效更速，甚宜於急性症。用量，每日一至三次，每次○·五至一○。極量，一次二·○，一日四·○。皮下注射之用量與內服同。

狄吉佛林（地葵佛林）

瑞士「汽巴」藥廠之製品也，大要與狄加冷同。市上之販賣品，有注射用液、錠劑，及粉末（已加入乳糖）三種。注射用液一·○，錠劑一個，或粉末○·一之效力，均與毛地黃葉○·一相等。

咖啡鹼（劇）

本品爲白色絹絲狀之結晶，味稍苦，難溶於水，須貯於避光之處，從咖啡及茶葉中提出者也。

內服（一）急性心臟衰弱及麻醉藥中毒時用以作興奮劑。（本品對於心臟之興奮作用，發現速，消失亦速，絕無蓄積作用。）

（二）對於水腫症，用作利尿劑。

（三）對於神經痛、偏頭痛、喘息等症，用作止痛，或鎮痙劑。

用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・三。極量，一次〇五，一日一・五。但不可與碘化物、鹼類鹽及含鞣酸之物配合。

處方例

(一) 咖啡鹼

一・五

安替苾林

二・〇

乳糖

一・五

右混和，作散劑十包，每隔三小時服一包。(偏頭痛神經痛)

安息香酸鈉咖啡鹼(劇)

本品爲白色之粉末或顆粒，無臭無味，易溶於水，應用與咖啡鹼同。用量，一日數次，每次〇・一至〇・五。極量，一次一・〇，一日六・〇。如用其一〇%水溶液行皮下注入，則奏效更速。

柳酸鈉咖啡鹼(劇)

本品爲白色之粉末，無臭味稍苦，易溶於水。應用，用量，及極量，均與安息香酸鈉咖啡鹼同。



處方例

(一) 柳酸鈉咖啡鹼

○・二

安替正林

○・八

右混和，爲散劑一包，給十包，每日二次，朝夕各服一包。(喘息)

斯忒羅反忒斯酏(劇)

本品爲澄明黃褐色之液，味苦，其作用與毛地黃相似，但發現速而消失亦速，故無蓄積作用，常應用於各種心臟病及發熱病之心臟衰弱。與毛地黃混用，尤屬相宜，蓋可互補其作用之不足也。用量，一日數次，每次○・一至○・三。極量，一次○・五，一日一・五。

處方例

(一) 斯忒羅反忒斯酏

毛地黃酏

杏仁水

各一〇・〇

右混和，一日三次，每次服八滴。（心悸亢進）

番木鱉膏（劇）

本品爲褐色之硬塊，味甚苦，能溶於水。其主要成分爲番木鱉鹼。常應用於消化不良，慢性泄瀉，神經麻痺，及霍亂等症。用量，一日數次，每次〇・〇一至〇・〇五。極量，一次〇・〇五，一日〇・一。但不可與鹼類鹽、重金屬鹽、碘化物及含鞣酸之物配合。

處方例

（一）番木鱉膏

〇・〇三

糖化酵素

一・五

重碳酸鈉

三・〇

右混和，爲散劑三包，一日服完，飯後服下。（消化不良）

番木鱉酊（劇）

本品爲黃色之液，味甚苦，應用與番木鱉膏同。用量，一日數次，每次五至二十滴。極量，一次一。

○，一日二・○。

硝酸香木鱈鹼（毒）

本品爲無色之針狀結晶，味甚苦，能溶解於九十倍量之水中，有興奮神經之效，其應用如下：

內服（一）目力衰弱症。

（二）消化不良及泄瀉等。

（三）四肢麻木、聲門麻痺、遺尿症、尿崩症、癲癇、脊髓癆、陰萎、頭痛、神經痛等。

（四）麻醉藥之中毒。

用量，一日數次，每次○・○○一至○・○○三極量，一次○・○○五，一日○・○一五。慢性病先每日用○・○○一，後每日加增○・○○二，達每日用○・○一之量，則不可再加。連服是量至六七日後，須停服十日，以避蓄積作用。若服用本藥中，有五官過敏，牙關及頭項緊張等情狀，即係本藥中毒之兆，須即停服。

皮下注射 如欲奏效迅速，可用其○・一％水溶液行皮下注射，用量與內服同。

### 麥角（劇）

本品爲陰溼地麥上之奇生菌體，色灰黑，狀如角，故有是名。愈新鮮者效力愈佳，貯藏一年以上者，已失其效力，不堪應用。須藏於密閉之器中。潮溼後亦失其效力。

內服（一）能收縮子宮，產科用以增進陣痛，使速產出。又胎盤（俗名胞）娩出困難及產後子宮出血時，亦應用之。

（二）對於吐血、咯血、瀉血，及紫斑病，用作止血藥。

（三）膀胱麻痺、遺精、糖尿病、偏頭痛、頭痛、眩暈、盜汗等，間亦應用之。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇。極量，一次一・〇。一日五・〇。大概爲浸劑，間有研爲末而作散劑者。但不可與碳酸鹼類、碘化物、醋酸鉛、酒劑，及含鞣酸之物配合。

### 麥角膏（劇）

本品爲赤褐色之稠膏，易溶於水。應用與麥角同。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・五。極量，一次〇・二，一日〇・六。可作水劑、散劑、丸劑等服之。除內服外，更可用其水溶液行皮下注射，應用

於下列各症。注射之用量，一次〇・一至〇・三。

(一) 動脈瘤、靜脈瘤、靜脈腫等，隔日注射一次。

(二) 子宮肌腫、膀胱麻痺、前列腺肥大等，每日注射一次。

處方例

(一) 麥角膏

一・〇

桂皮糖漿

二〇・〇

蒸溜水

八〇・〇

右混和，爲水劑，每隔二小時服一茶匙。(吐血、咯血、出血性紫斑病。)

愛耳戈汀

本品係從麥角提出之有效成分，爲褐色之液體。應用與麥角同，而少副作用，效力確實，且耐久。除內服外，亦可用作皮下注射。用量，一日數次，每次〇・一至〇・五。若欲促進陣痛，須每隔十分時服二・〇。皮下注入量，一次用〇・二至〇・五。

### 希朶拉斯替流膏

本品係希朶拉斯替根之製劑，爲暗色之液體，有不快之味。爲止血劑，應用於子宮出血，月經過多，咯血，衄血等症。但本品之作用，發現甚緩，對於月經過多症，須於月經未至前即服藥。用量，一日數次，每次一・〇至二・〇。

#### 處方例

(一) 希朶拉斯替流膏

二・〇

橙皮糖漿

一〇・〇

蒸溜水

九〇・〇

右混和，爲水劑，一日三次服完，飯後服下。(月經過多)

#### 鹽酸育亨賓

本品爲白色之結晶，易溶於水，專應用於陰萎，月經不調，女子生殖器發育不全等症。用量，一日三四次，每次〇・〇〇五至〇・〇一。內服與皮下注射均可。皮下注射之奏效較內服爲速。但無論

內服或皮下注射，連用十數次後，須停用數日。藥房中有銓劑發賣，每銓中含本品〇・〇〇五。

### 第三章 通便劑

藥物之能促進腸蠕動，而排去腸內容物者，悉名通便劑，分緩瀉藥與劇瀉藥二種，緩瀉藥祇能亢進腸蠕動，使起瀉下；劇瀉藥則又能刺戟腸壁而發炎症。然緩瀉藥用多量，等於劇瀉藥，劇瀉藥用小量，等於緩瀉藥。

#### 蓖麻子油

本品爲澄明淡黃色或無色之濃厚液，稍有臭氣，味初淡，後稍帶辣。緩瀉藥中最普通者也。腸壁雖稍有炎症，亦可應用，但久服則妨害消化。用量，一次一五・〇至三〇・〇。大概服一次後，即可達瀉下之目的。可混於咖啡，牛乳，肉汁，或葡萄酒中服之。嫌味惡而不能內服者，可混於清水以灌腸。

#### 巴豆油（毒）

本品爲褐黃色之濃厚液，有特殊之臭氣，劇瀉藥中最劇烈者也。內服，惟應用於頑固之便秘。用

量，一次半滴至一滴。極量，一次〇・〇五，一日〇・一五。爲散劑或混於蓖麻子油中而服。不能內服者，可製成乳劑而灌腸。外用，混於五倍至十倍量之脂肪油或甘油中，作誘導性皮膚刺戟劑。

#### 雅拉怕根末

本品爲黃褐色之粉末，味稍苦辣。緩瀉藥之用量，一次〇・二至〇・五。劇瀉藥之用量，一次〇・五至二・〇。作散劑或丸劑而服。大概與甘汞、蘆薈等他種瀉藥混用。

#### 處方例

##### (一) 雅拉怕根末

甘汞

〇・二

白糖

〇・一

〇・三

右混和，爲散劑一包，同量給六包，一日三次，二日分服。(便閉)

##### 雅拉怕脂(劇)

本品從雅拉怕根製出，爲褐色之塊，易碎。用量，一次〇・一至〇・五。極量，一次一・〇，一日三



- 爲散劑或丸劑而服。

雅拉怕肥皂

本品爲帶黃灰色之粉末，由雅拉怕根末與藥用肥皂末等量混合製成。用量當倍於雅拉怕根末。藥房中販賣之雅拉怕丸，以雅拉怕根一分與雅拉怕肥皂三分製成。用量一次服二至十粒。

大黃

供藥用者，爲大黃之根，有特殊之香氣，味苦，緩瀉藥也。適用於老人，小兒，虛弱者，及病後恢復期之便閉。又爲健胃劑，應用於消化不良症。用其小量，更有止瀉之效。用量，作緩瀉劑，一日二三次，每次用○·五至二·○。通便約在服藥後六小時至十小時之間。作健胃或止瀉劑，一日數緩，每次用○·一至○·三。大概用真粉末製成散劑或丸劑而服，間有用浸劑者。

處方例

(一) 大黃末

○·三

重碳酸鈉

二·○

右混和，分三包，一日服完，飯後服一包。（健胃）

（二）大黃末

一・五

雅拉怕根末

〇・六

白糖

一・〇

右混和，分三包，一日服完，飯前服一包。（通便）

大黃膏

本品爲褐色之硬塊，能溶於水，應用與大黃同。用量，作健胃劑，一日數次，每次〇・一至〇・三。作瀉劑，一日二三次，每次〇・五至一・五。作丸劑或水劑服之。

複方大黃丸

本品從大黃膏六分，蘆薈膏二分，雅拉怕脂一分，及藥用肥皂四分製成，良好之緩瀉藥也。一次服五粒至十粒。

複方大黃散

本品從大黃末二分，鑲養粉六分，生薑末一分混和製成。通便外，更能除去胃中過多之酸。用量，一日數次，每次一・〇至三・〇。

大黃酊

本品爲澄明黃褐色之液，從大黃一〇・〇，桂皮一・〇，小豆蔻一・〇，酒精與蒸溜水各五〇・〇製成。通便之效力不確實，專作健胃劑，混於健胃藥水中。用量，一日數次，每次一・〇至三・〇。

處方例

(一) 大黃酊

複方規那酊

生薑酊

各一〇・〇

右混和，一日二次，每次服三十滴。(健胃)

大黃糖漿

本品爲澄明黃褐色之油狀液，專作緩瀉性，調味劑，附加於瀉下性水劑中。又因其味易服，常用

作小兒之瀉劑，一次服一茶匙。

小兒散（苦土大黃散）

本品由碳酸鎂一〇・〇，大黃末三・〇，茴香油糖七・〇混合製成。新製者呈淡黃色後則漸變帶赤白色。爲小兒科專用之瀉劑，故有是名。其作用於通便外，更能除去胃中多餘之酸。用量，小兒每次〇・五至一・〇。大人每次三・〇至五・〇。概作散劑而服。

生那葉（洋瀉葉）

本品爲效力確實之緩瀉藥，概作浸劑服之。用量，每次一・〇至四・〇。

處方例

（一）生那葉浸（一五・〇）

一五〇・〇

硫酸鎂

五〇・〇

右混和，每隔二小時服一調羹，至通便止。

蘆薈

本品爲暗褐色之塊，有特殊之臭氣，其味苦。作用於通便外，更能通經。故孕婦，女子在經期中，及有腎臟炎者，均忌用之。用量因目的而異，作緩瀉劑，每次用〇・〇三至〇・三。作劇瀉劑，每次用〇・三至一・〇。作通經劑，每次用〇・三至〇・五。本品之瀉下作用，雖常服，亦不減弱，有便閉之習慣者，用之最宜。

蘆薈膏

本品爲黃褐色乾燥之塊，能溶於水。作用與蘆薈同。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・二。

蘆薈丸

本品由蘆薈與藥用肥皂各等量製成。專治常習便閉之用。一日二三次，每次服一粒至五粒。

蘆薈阿魏丸

本品由蘆薈，阿魏，藥用肥皂，蜂蜜各等量製成。每丸之重量，約當〇・一。專應用於有臟躁症者之便閉。用量，一日數次，每次服二粒至五粒。

蘆薈雅拉怕丸

本品由蘆薈，雅拉怕，肥皂，甘草各等量製成。一九之重量，約當〇・一五。作緩瀉藥之用量，一日數次，每次服二粒至五粒。

#### 蘆薈酊

本品爲綠褐色之液，味甚苦，無瀉下之效，祇作健胃劑，混用於他種健胃藥之水劑中。用量，每次五滴至二十滴。

#### 洋鼠李（卡斯卡拉）

本品有流膏與乾膏二種，流膏爲暗赤褐色澄明之液，乾膏爲黑褐色之硬塊，均良好之緩瀉藥也。雖常服，不減其效。用量，流膏一日數次，每次一〇至四〇。乾膏一日二三次，每次〇・〇五至〇・三。通便約在服藥後十小時。藥房中發賣之卡斯卡拉錠，係乾膏所製，每錠中含乾膏〇・〇五，每次服一粒至五粒。

#### 處方例

#### （一）洋鼠李流膏

三・〇

橙皮糖漿

一〇・〇

蒸溜水

九〇・〇

右混和，爲水劑，一日三次服完，飯前服下。

硫酸鈉（芒硝）

本品爲無色之結晶，味鹹而帶苦，易溶於水，在乾燥之空氣中，漸漸失其結晶水而風化。

內服（一）作瀉劑，一次用一五・〇至三〇・〇，爲水劑而服。大概服一次，已達瀉下之目的。其作用發現甚速，殊無副作用。

（二）石炭酸及鉛之急性中毒時，常用解作毒劑。用量，一日數次，每次一・〇至五・〇。

處方例

（一）硫酸鈉

三〇・〇

大黃糖漿

三〇・〇

蒸溜水

一七〇・〇

右混和，爲水劑，每隔一小時服一調羹，至瀉下而止。

### 人工卡耳斯泉鹽

本品爲白色之結晶性粉末，由乾燥硫酸鈉（即既風化而失去結晶水者）四十七分，硫酸鉀二分，食鹽十五分，重碳酸鈉三十六分混合而成，易溶於水。爲肝臟病，黃疸，腎臟炎，慢性胃炎，胃潰瘍等病人適用之緩瀉劑。用量，一日二三次，每次五〇至一五〇，作水劑服用。

### 處方例

（一）人工卡耳斯泉鹽

三〇〇

大黃糖漿

三〇〇

蒸溜水

一七〇〇

右混和，爲水劑，一日分三次服完，飯前服下。（黃疸）

硫酸鎂（一名瀉鹽，又名硫酸，鎂磺養）

本品爲無色稜柱狀之結晶，在空氣中殆不風化，易溶於水，味甚苦，瀉劑中最通用者也。最適用



於常習便閉，蓄便，水腫等症。又常為腦病之誘導劑。用量，一日二三次，每次五〇至二〇〇。概作水劑服用。服藥後歷二三小時，即起腹鳴，腹癢而水瀉。

處方例

(一) 硫酸鎂

二五〇〇

酒石酸

〇〇二

薄荷水

五〇〇

蒸溜水

八〇〇〇

右混和，為水劑，每隔一小時服一調羹，至泄瀉而止。

煅製鎂

本品為白色經鬆之粉末，水中殆不溶解。

內服 (一) 作緩瀉劑，一日數次，每次用一〇至五〇。

(二) 作制酸劑或砒中毒之解毒劑，一日數次，每次用〇二至一〇，為散劑，或振盪水劑。

服用。

外用 純品或與石松子、滑石等相混，作糜爛之撒布劑。

處方例

(一) 煅製鎂

薄荷水

蒸溜水

右混和，爲水劑，每隔半小時服一調羹，服前須將瓶振盪。(砒中毒)

碳酸鎂

本品爲白色之塊片，或輕鬆之粉末，不溶於水，而易溶於碳酸水。應用及用量，均與煅製鎂同。但不能爲砒中毒之解毒劑。其粉末又用作牙粉之原料。

重酒石酸鉀(精製酒石)

本品爲白色堅硬之結晶或結晶性粉末，有酸性反應，難溶於冷水，易溶於熱水，作散劑或水劑

一〇〇〇  
一〇〇〇  
一八〇〇

服之。

內服(一)作緩瀉劑,一次三・〇至五・〇。

(二)作清涼,止渴,或利尿劑,一日數次,每次用〇・五至二・〇。

處方例

(一)精製酒石

三〇・〇

枸橼油糖

一〇・〇

右混和,一日三次,每次服一茶匙。(便閉)

酒石酸鉀鈉

(一名養臬脫鹽)

本品爲無色透明之柱狀結晶或白色之粉末,味鹹,易溶於水,概作水劑服用。

內服(一)作緩瀉劑,一次用八・〇至一五・〇。

(二)作利尿劑,一日數次,每次用〇・五至二・〇。

## 第四章 利尿劑

### 醋酸鉀

本品爲白色之粉末，易潮，概作水劑服之。適用於慢性腎臟炎，患心臟病者之水腫及痛風等症。其作用，於利尿外，稍有瀉下之效。用量，一日數次，每次 $0.5$ 至 $3.0$ （一日量不可過 $15.0$ ），但不可與金雞納霜，抱水克羅拉耳，無機酸及酒劑配合。

### 醋酸鉀液

本品即醋酸鉀之水溶液，百分中含醋酸鉀三十四分。因醋酸鉀易潮，故醫家多用本品。作用與醋酸鉀同。用量，一日數次，每次 $2.0$ 至 $10.0$ 。

### 處方例

(一) 毛地黃葉浸 (1.0) 一八〇.〇

### 醋酸鉀液

單糖漿

各二五・〇

右混和，每隔二小時服一調羹。（心臟病之水腫）

醋酸鈉

本品爲無色無臭透明之結晶，在乾燥之空氣中，漸漸風化，易溶於水。作用與醋酸鉀同。用量，一日數次，每次二・〇至五・〇。

尿素

本品爲無色之結晶，能溶於水。對於漿液性肋膜炎、腎臟結石、心臟病之水腫、及因肝臟變硬而起之水鼓等，爲適當之利尿劑。用量，一日數次，每次一・〇至二・〇，作散劑或水劑服用。

狄午雷汀（劇）

本品爲白色之粉末，無臭，味鹹而帶甘，易溶於水。絕無副作用，爲利尿劑中最佳者。適用於心臟病之水腫、漿液性肋膜炎、水鼓、心臟性喘息、急性腎臟炎等症，用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。極量，一次一・〇，一日六・〇。散劑容易變性，概作水劑服之。

處方例

(一) 毛地黄葉浸 (一・〇)

一八〇・〇

狄午雷汀

八・〇

薄荷水

二〇・〇

右混和，一日三次，二日分服，(心臟性水腫)

杜松子

本品有特殊之香氣，味甘。因腎萎縮，肺氣腫等而來之水腫用之。但腎臟有急性炎症者忌用之。多與他種利尿劑混用。用量，一日數次，每次一・〇至二・〇。多作浸劑或丸劑服用。慢性風痹又常用其浸劑洗浴。

杜松子油

本品從杜松子製出，爲澄明無色或淡黃色稀薄之液，有特殊之香味，能與酒精混和。內服於利尿外，又常用作驅風或驅蟲劑。用量一日數次，每次二滴至五滴，混於乳糖中爲散

劑，或混於酒精中爲滴劑服之。

外用 對於風癩，痛風，神經痛等症，用其純品，或製成軟膏（二〇・〇％）作皮膚之刺戟誘導劑。

商陸膏（劇）

本品爲褐色之稠膏，味苦而帶辣，能溶於水。適用於腎臟炎，肋膜炎，心囊水腫，腹水等之利尿。用量，一日三次，每次〇・二至〇・五。極量，一次〇・五，一日一・五，作丸藥或水劑服用。

萘澄茄

本品爲淋病，膀胱炎等適用之利尿劑，於利尿外，更有消毒膀胱之效。味甚苦，有特殊之香氣。用量，一日數次，每次一・〇至五・〇，概作散劑（包於膠紙）或丸劑服用。又常與科派巴樹膠混用。

萘澄茄膏

本品爲褐色之稀薄膏，不溶於水，應用與萘澄茄同。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇，作丸藥或裝入膠管中服之。

處方例

(一) 樟腦

〇・四

萼澄茄

萼澄茄膏

各適量

右混和，爲丸六十粒，每隔三小時服一粒或二粒。(刻刻小便之淋病)

辛乏午耳西葉

本品之作用及應用，均與萼澄茄同，惟副作用較萼澄茄稍弱。用量，一日數次，每次二・〇至五・〇，概作浸劑服用。但不可與酸類，石灰水，金屬鹽類，蛋白質劑及植物性鹼類(例如嗎啡，可卡因等)配合。

處方例

(一) 午乏午耳西葉浸(二〇・〇)

一八〇・〇

橙皮糖漿

二〇・〇



右混和，一日三次，二日分服。（淋病）

牛羅忒羅品

本品爲白色之結晶，味鹹奇，稍有臭氣，易溶於水，有利尿與膀胱消毒二作用。適用於淋病與膀胱炎。常與午壬午耳西葉浸或沙羅耳混用。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇。

處方例

(一) 沙羅耳

三・〇

牛羅忒羅品

三・〇

右混和，分六包，一日三次，二日分服，飯後服下。（慢性淋病）

可派巴樹脂

本品爲澄明黃褐色之液，有特異之香氣，味辛而苦，與水不能混和。適用於慢性淋病與慢性膀胱炎，而水鼓、支氣管漏膿、咯血等，間亦應用之。但有刺戟胃及腎臟之副作用，不宜久服。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇，概作丸劑，乳劑，或裝入膠管中服用。

處方例

(一) 可派巴樹脂

○·六

右裝入膠管一個中，同量給十八個，一日三次，每次二個，飯後服下。(慢性淋病)

白檀油

本品爲淡黃色濃厚之液，味辛辣，有特異之香氣，與水不能混和。應用及服法，均與可派巴樹脂同。效力確實而副作用少，故較可派巴樹脂爲優。用量，一日數次，每次○·三至五·五。

戈諾山 (Gonosan)

本品爲白檀油之製劑，裝入膠管中而販賣，每管中含白檀油○·二四。應用與白檀油同。而比白檀油，效力更確實，副作用更少，故爲治淋藥中最佳者。用量，一日三四次，每次服一個或二個。

## 第五章 催吐劑

吐酒石 (劇)

本品爲透明細小之結晶，或白色之結晶性粉末，在空氣中漸漸風化，能溶於水。

內服（一）作催吐劑，效力雖著，而惡心，泄瀉等副作用甚強，易致虛脫。故惟強壯之大人可用之。小兒，老人，及虛弱者，均不適用。有胃腸病者，亦忌用之。

（二）又常用作驅痰劑或發汗劑。

作催吐劑之用量，每次〇・〇二至〇・二，每隔十分時或十五分時服一次至達催吐之目的而止。作驅痰劑，或發汗劑之用量，一日數次，每次〇・〇〇五至〇・〇一。極量，一次〇・二，一日〇・六。

處方例

（一）吐酒石

〇・一

吐根末

一・五

右混和，分三包，每隔十五分時服一包，至吐出而止。

（二）吐酒石

〇・〇五

礶砂

五・〇

甘草膏

二・〇

蒸溜水

二〇〇・〇

右混和，每隔二小時服一調羹。（驅痰）

吐根（劇）

本品以其根作浸劑，或以其粉末作散劑服之。但不可與礶精茴香精，驗類鹽，及含鞣酸之物配合。其應用如下。

（一）作催吐劑，效力甚確實，副作用較吐酒石輕。小兒，老人等亦可服之。用量，一次〇・二至一・〇，每隔十分時或十五分時服一次，至嘔吐而止。若嘔吐過強，服鞣酸可以解除其作用。

（二）作驅痰劑，適用於支氣管炎，肺結核等之痰少而黏厚者。用量，一日數次，每次〇・〇一至〇・〇五。

（三）作止瀉劑，應用於痢疾，泄瀉等症。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。多與阿片混用。

處方例

(一) 吐根末

〇・六

吐酒石

〇・〇三

澱粉

二・〇

右混和，分四包，每隔十分時服一包，至嘔吐而止。

(二) 吐根浸(〇・五)

一八〇・〇

杏仁水

六・〇

遠志糖漿

二〇・〇

右混和，一日六次，二日分服。(驅痰)

藥房有吐根錠發賣，每錠中含吐根〇・〇一。

吐根酊(劇)

本品爲澄明黃褐色之液，味苦，可用作催吐劑與驅痰劑。作催吐劑之用量，一次一〇・〇至一

五・〇每隔十分時服一次，至嘔吐而止。作驅痰劑之用量，一日數次，每次〇・五至一・五，多與他種驅痰劑混用。

#### 吐根糖漿

本品爲澄明黃褐色之厚液，以吐根酒一分，單糖漿九分混和製成，多添加於他種驅痰劑。一日用五・〇至一・五。或用作小兒之催吐劑，每次服一茶匙。

#### 吐根精（伊米汀）（劇）

本品係從吐根中提出之有效成分，爲白色之粉末，能溶於水，作散劑或水劑服用。

內服（一）作催吐劑，一次用〇・〇〇五至〇・〇一，每隔十分時服一次，至嘔吐而止。

（二）作驅痰劑，一日數次，每次用〇・〇〇一至〇・〇〇二。

（三）其鹽酸鹽即鹽酸吐根精，爲變形蟲性痢疾之特效藥，有收斂止瀉之效。用法，以其〇・一％水溶液，行皮下注射，每次注入一兩立方厘米。

#### 鹽酸阿坡嗎啡（毒）

本品爲白色或灰白色之結晶，在溼潤之空氣中觸日光變爲綠色，然其效不甚減弱，能溶於四十倍量之水中。

內服（一）作催吐劑，一次用 $0.005$ 至 $0.005$ ，每隔十五分鐘服一次，至嘔吐而止。

（二）作驅痰劑，一日數次，每次用 $0.002$ 至 $0.003$ 。

皮下注射 作催吐劑之效力，皮下注射較內服確實，副作用亦比他種催吐劑少。注入量，每次

$0.005$ 至 $0.01$ 。卽用 $1\%$ 之水溶液，每次注入 $0.5$ 至 $1.0$ 。

極量，一次 $0.02$ ，一日 $0.06$ 。

硫酸銅又名膽礬（劇）

本品爲藍色透明之結晶，在乾燥之空氣中，徐徐風化，易溶於水。

內服 作催吐劑，應用於白喉、麻醉藥中毒及磷中毒等症。其對於磷中毒，不但使吐出胃中之

物，爲磷所還元之銅，附着於磷之表面，能阻止磷之作用，而奏解毒之效。用量，一次 $0.1$ 至 $0.5$ 。

極量，一次 $1.0$ ，作散劑或水劑服用。

外用（一）用其結晶或粉末作腐蝕劑，應用於各種黏膜之潰瘍，瘻管，砂眼等症。  
（二）作收斂劑，對於結膜炎，結膜瀰膿，淋病，白帶，慢性膀胱炎等症，用其○·五至一％水溶液，供點眼或洗滌之用。

處方例

（一）硫酸銅

白糖

一·〇  
二·五

右混和，分五包，每隔十分時服一包，至嘔吐而止。

硫酸鋅又名皓礬（劇）

本品爲無色之結晶，在乾燥之空氣中，徐徐風化，易溶於水，其水溶液有弱酸性反應。

內服 作催吐劑，一次用○·二至一·〇。極量，一次一·〇，爲散劑或水劑服用。

外用 作收斂劑，應用於淋病與結膜炎。淋病用其○·一至○·一％水溶液，行尿道注入。結膜炎用其○·一至○·五％水溶液作點眼藥水，或用其○·五至一％軟膏作點眼軟膏。



處方例

(一) 硫酸鋅 醋酸鉛

各一〇

蒸溜水

二〇〇〇

右混和，尿道注入用。(慢性淋病)

(二) 硫酸鋅

〇〇〇五

白礦脂

一〇〇〇

右混和，爲軟膏，點眼用。(結膜炎)

第六章 發汗劑

凡解熱劑與幾種催吐劑，兼有發汗之效，可參照之，不再述。

第七章 驅痰劑

茴香

藥用之茴香，係小茴香。大茴香有毒，不可用。

內服 本品有驅痰、驅風、健胃、及促進乳汁分泌等效。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，作浸劑、茶劑、散劑等服用。

茴香油


本品為無色或淡黃色之液，有特異之香氣，味初甘後則稍苦。應用與茴香同，又可作矯味藥。用量，一日數次，每次一滴至五滴，概作散劑服用。

抱水退耳品

本品為無色稜柱狀之結晶，無臭，味稍苦，難溶於水。作丸劑，或散劑服用。

作利尿劑，應用於慢性腎臟炎與心臟收縮不全症之水腫。用量，一日數次，每次〇

〇・一左右，能溶解氣管支中



之黏液，使容易吐出。其大量（每次一・〇）能減痰之分泌。

遠志根

本品作驅痰劑，應用於慢性支氣管炎，支氣管漏膿，肺炎等症。其作用能催進咳嗽，使滯留於氣管及支氣管中之痰排出。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，作浸劑或煎劑服用。有消化障害，咯血，高熱等時，忌用之。

處方例

(一) 遠志根煎 (六・〇)

一八〇・〇

硃精苗香精

五・〇

糖漿

二〇・〇

右混和，一日三次，二日分服。(支氣管炎)

遠志糖漿

本品為澄明淡黃色之液。應用與遠志根同，概添加於他種驅痰藥之水劑中。用量，一日五・〇

至二五・〇。

### 碳酸銹

本品爲無色透明結晶性之塊，有銹之臭氣，在空氣中徐徐風化，而變不透明之白色。易溶於水，須貯於密閉之器中。

內服 作驅痰劑，用量，一日數次，每次〇・二至・〇五，爲水劑服之。

外用 作興奮性嗅入劑。

### 氯化銹（硃砂）

本品爲白色結晶性之粉末，或纖維狀之結晶性塊，無臭，在空氣中不變化，易溶於水。

內服 作驅痰劑，能溶解滯留於支氣管中之稠痰。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇，爲水劑或錠劑服之。

### 硃精苗香精（阿母尼亞苗香精）

本品爲澄明淡黃色之液，以苗香油三分，酒精八十分，硃精水十七分混和製成，有苗香與硃精

之氣味，百分中含純鹵精約一·七分。

內服 作驅痰劑，應用於咯痰困難之支氣管炎。用量，一日三四次，每次〇·二至一·〇，爲水劑服之。但不可與甘汞、酸類、酸性鹼類、碘化物、植物鹼等配合。

安息香酸銹

本品爲白色薄板狀之結晶或結晶性粉末，無臭，稍有安息香酸之香氣，易溶於水。

內服 作興奮性驅痰劑，適用於老人之支氣管炎（卽喘息），肺炎等。於驅痰外，更有發汗，利尿之效。用量，一日數次，每次〇·五至一·〇，爲水劑服用。

處方例

(一) 安息香酸銹

六·〇

遠志糖漿

二〇·〇

蒸溜水

一八〇·〇

右混和，一日六次，二日分服。（喘息）

金硫黃（劇）

本品爲澄赤之粉末，幾無臭，不溶於水。

內服 作驅痰劑，應用於呼吸器之炎症，喀痰稠厚不易吐出者，最適用。用量，一日三四次，每次  
○·○一至○·一。極量，一次○·二，一日○·六，爲散劑或丸劑服用。常與阿片，樟腦，吐根等混用。

安息香酸

本品爲白色或淡黃色之小葉狀晶，難溶於水。除驅痰外，更有興奮作用。用於老年人之咳嗽無力者，最爲適宜。用量一日數次，每次○·○五至○·三，作散劑或丸劑服用。但不可與碳酸銹及鹼類鹽配合。

安息香酸鈉

本品爲無色之粉末，易溶於水。

內服 爲驅痰劑或消毒劑，應用於鵝口瘡，白喉，及胃腸之異常發酵等症。用量，一日數次，每次  
○·一至一·○。

外用 肺癆常用其5%水溶液，作吸入劑。又鵝口瘡用其1%水溶液，作含嗽劑。

杏仁水（劇）

本品從苦杏仁製出，爲無色或淡黃色之液體，有特異之杏仁香。其主要之有效成分爲精酸，每千分中約含精酸一分，須貯於避光之處。除驅痰鎮咳外，更稍有麻痺作用。

內服（一）爲鎮咳劑，應用於呼吸器之炎症，乾性咳嗽，肺癆，疫咳等。

（二）爲鎮靜劑，應用於胃痛，神經性嘔吐等。

用量，一日數次，每次0.5至1.5，作水劑服用。概與他種驅痰劑混用。極量，一回2.0，一日6.0。但不可與鹼類鹽，金屬鹽類，氯水，硝酸等配合。

處方例

（一）吐根浸（0.2）

1.80.0

杏仁水

6.0

遠志糖漿

20.0

右混和，爲水劑。一日三次，二日分服，飯前服下。（呼吸器炎症之鎮咳驅痰）

### 苦扁桃水（劇）

本品從苦扁桃製出，其性狀，作用，應用，用量，極量，配合禁忌等，與杏仁水同。

### 鹽酸披羅卡品（毒）

本品爲白色之結晶，味稍苦，在空氣中易潮，易溶於水。其用途甚多，略舉如下：

（一）用於輕症之全身水腫，有消腫之效。重症則恐誘發肺水腫，不宜用。

（二）爲驅痰劑，應用於支氣管炎，喘息，疫咳，白喉等症。

（三）用於漿液性肋膜炎，及內耳水腫等，有促進吸收之效。

（四）眼科中虹膜炎，脈絡膜炎，網膜剝離及綠內障等症，常用其1%水溶液作點眼藥。

（五）應用於鉛，水銀等之慢性中毒，能使之從汗或唾液迅速排泄。

（六）應用於鱗屑癬，痒疹，濕疹等之皮膚病。

用量，每次0.01至0.02。極量，一回0.02，一日0.06。用以行皮下注射者居多。



內服者甚少。

## 第八章 麻醉劑

麻醉劑用其少量，有止痛、止咳、鎮痙等效。但本類中劇毒藥居多，用時須注意。

### 阿片末（劇）

本品爲灰黑色之粉末，有阿片之特臭，味苦，不溶於水，百分中約含嗎啡十至十一分。其應用如下！

內服（一）以其有靜止腸蠕動之作用，常用作止瀉劑。（但腸中有食物渣滓者，須先用瀉劑除去。）或盲腸炎，腸膜炎，腸出血及腹腔手術後之鎮靜劑。

（二）用作慢性興奮性神經病之鎮靜劑。

（三）用作止吐劑。

（四）用作胃痛神經痛等之止痛劑。

(五) 對於咳嗽劇烈者，常用作鎮咳劑，但痰多者不宜用。

用量，一日數次，每次〇・〇一至〇・一。極量，一回〇・一五，一日〇・五，作散劑或丸劑服用，但不可與碘化物，碳酸鹼類，木鼈子製劑，重金屬鹽類，及含鞣酸之物配合。又不宜常用，常服則成癮而失治病之效。

外用 裏急後重等，常用其〇・〇五至〇・一，作坐藥；不能內服者，可混於溫水中灌腸。

#### 阿片膏（劇）

本品爲赤褐色之乾膏，水中能溶解，不過其水溶液甚溷濁，其中嗎啡之含量，約一六・六六至一八・三三％。應用與阿片末同。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・一。極量，一回〇・一五，一日〇・五。配合禁忌，亦與阿片末同。除內服，灌腸，作坐藥外，更可用其水溶液行皮下注射。

#### 阿片醇（劇）

本品爲赤褐色之液，約含阿片一〇％（即含嗎啡一％）。應用與阿片末同。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。極量，一回一・五，一日五・〇。

處方例

(一) 吐根浸(〇・六)

一八〇・〇

阿片酊

三・〇

糖漿

二〇・〇

右混和、一日三次、二日分服。飯後隔一小時服下。(支氣管炎下痢)

阿片吐根散(多肥耳氏散)(劇)

本品由阿片末一分，吐根末一分，硫酸鉀八分混和而成。爲灰白色之粉末，有止痛，止瀉，鎮痙，鎮咳，驅痰，發汗等作用。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇。極量，一回一・五，一日五・〇。概作散劑而服，常單獨用之。藥房中有現成之阿片吐根錠發賣，每錠中含阿片，吐根各〇・〇二五。用量，每次服一錠至四錠。

嗎啡(毒)

本品爲阿片之主要成分，卽從阿片中提出者，有鹽酸嗎啡硫酸嗎啡二種，應用與用量悉同。均

爲白色針狀之結晶或粉末，易溶於水。

內服（一）爲止痛劑，應用於疝痛，胃痛，癌腫及第三期肺癆等症。又胸內苦悶及狹心症發作時，間亦用之。

（二）對於因疼痛而起之不眠症，常用作催眠劑。

（三）用作鎮咳劑，能減輕呼吸困難。但對於因痰不能吐出而起之呼吸困難，則不適用。對於心臟病，乾性支氣管炎，肋膜炎等之呼吸困難，最爲適用。

（四）精神病病人暴躁時，用作鎮靜劑。

（五）用作腹膜炎之止吐劑。

用量，一日數次，每次 $0.01$ 至 $0.02$ 。極量，一回 $0.03$ ，一日 $0.1$ 。作散劑、水劑、丸劑、錠劑等服之。但不可與碘化物，重金屬鹽類及含鞣酸之物配合。妊婦、衰弱者，有高熱、腦充血、或心臟病者均忌用之。小兒、老年人及女子亦宜少用。又不可常用，常服則成癮而失治病之效。

皮下注射 用其水溶液行皮下注射，奏效較內服更速，用量與內服同。

外用 常用以灌腸或作坐藥擦劑等。

狄俄寧（劇）

本品爲白色之結晶性粉末，易溶於水，味微苦。其應用與嗎啡同，而其毒性較嗎啡弱，故副作用亦少。戒煙時，用以代阿片，最爲合宜。卽常服，亦不易成癮。其麻醉作用較嗎啡弱，而鎮咳作用則甚確實。用作肺癆病人之鎮咳劑，兼有減輕盜汗之效。用量，一日數次，每次〇・〇一五至〇・〇四。極量，一回〇・〇三，一日〇・一，作散劑、水劑、丸劑等服用。亦可用其水溶液行皮下注射。眼科醫生更用其水溶液作點眼藥。此時止痛用〇・五至二％水溶液，消腫用二至五％水溶液。又痛經、骨盆痛等用其〇・〇四作坐藥。

鹽酸黑羅因（劇）

本品爲白色結晶性之粉末，無臭，味苦，易溶於水，須貯於避光之處。

內服（一）本品之鎮咳及鎮靜呼吸促迫之作用，較嗎啡更佳。

（二）有鎮靜心悸亢進之效。

(三) 可用作催眠劑或止痛劑，但其效力較嗎啡弱。

(四) 能鎮靜生殖器之刺激（舉陽遺精等）。

用量，一日數次，每次 0.003 至 0.005 極量，一回 0.001，一日 0.003。對於夜間舉陽或遺精，每夕服 0.001，作散劑、水劑、丸劑等服用。但不可與鹼類、重碳酸鈉、礬精、茴香精、阿坡嗎啡等配合。

皮下注射 欲奏效迅速者，可用其水溶液行皮下注射，用量與內服同。

#### 磷酸可丁（劇）

本品爲白色之針狀結晶，味苦，易溶於水，須貯於避光之處。其作用與嗎啡相類而較弱，副作用亦少，且無成癮之患。又不致妨礙食慾，或誘起便秘。

內服（一）代嗎啡作鎮靜劑或催眠劑。

（二）作止痛劑，應用於神經痛、胃痛、疝痛等症。

（三）作鎮咳劑，應用於肺癆、慢性支氣管炎、痙咳等症，因不致成癮，可以常服。

(四) 又常應用於神經衰弱，及糖尿病。

用量，一日數次，每次○·○·○五至○·○五。極量，一回○·一，一日○·三。作水劑，散劑九劑等而服。對於神經衰弱症，初時一日三次，每次用○·○·○二，漸次增量，達一日五次，每次用○·一後，再漸次減量。

皮下注射 欲奏效迅速，可用其水溶液行皮下注射。

#### 印度大麻草膏（劇）

本品係印度北部所產大麻草所製，爲黑綠色之稠膏，易溶於酒精，不溶於水。可代嗎啡，作催眠劑，止痛劑，或鎮靜劑。用量，一日數次，每次○·○·○三至○·一。極量，一回○·一，一日○·三。對於偏頭痛，初時一日三次，每次用○·○·○二，飯前服下，約二星期後，每次增至○·○·○三，可連服三個月。外用，可與脂肪或羊毛脂混和，作止痛軟膏或擦劑。

#### 印度大麻草酊

本品由印度大麻草膏一分與酒精十九分混而成，爲暗綠色之液，與水相混，則因析出樹脂而

溷濁。應用與印度大麻膏同。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇。

萇蓉根（劇）

本品有止痛、鎮咳、鎮痙等作用，對於因腸寬弛而起之便閉及遺尿症亦常用之。用量，一日數次，每次〇・〇二至〇・〇五。極量，一回〇・一，一日〇・三，作浸劑、散劑、或丸劑服用。

萇蓉膏（劇）

本品爲褐色之稠膏，能溶於水，惟水溶液溷濁。應用與萇蓉根同。用量，一日數次，每次〇・〇二至〇・〇五。極量，一回〇・〇五，一日〇・一五，作散劑或丸劑服之。常應用於百日咳、喘息、疝痛、遺尿等症。外用，製成坐藥、軟膏或擦劑，供止痛或鎮痙之用。

萇蓉酊（劇）

本品爲黃褐色之液。應用與萇蓉根同。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。極量，一回一・〇，一日・三〇，作水劑服之。

但本藥現不甚用以內服，惟用以外塗耳。



處方例

(一) 荳蔻膏

一〇〇

豚脂

九〇〇

右混和、爲軟膏。(塗於疼痛部)

希沃斯葉(劇)

本品有鎮咳、止痛、鎮痙等效。用量，一日數次，每次〇・〇三至〇・三。極量，一回〇・三，一日一〇，作散劑或丸劑服之。外用，可用其浸劑(一至二%)灌腸或罌包。

希沃斯膏(劇)

本品爲帶綠褐色之稠膏，水中能溶，惟其水溶液溷濁。應用與希沃斯葉同。用量，一日數次，每次〇・〇一至〇・一。極量，一回〇・一，一日〇・三，作散劑、水劑、丸劑等服之。外用，可作坐藥或軟膏(五至十%)。

硫酸阿忒羅品

本品爲白色結晶性之粉末，易溶於水，須貯於避光之處。其應用如下。

(一) 眼科中以其能擴大瞳孔，用作散瞳劑。

(二) 以其有制止分泌之作用，常用以治流涎，盜汗，遺精，經水過多，咯血及減少乳汁等。

(三) 作鎮痙或止痛劑，應用於胃痛，頭痛，神經痛，疝痛，喘息，吐糞症，百日咳，舞蹈病，癲癇等症。

(四) 爲毛地黃、嗎啡、及葷中毒等之解毒劑。

內服量，一日數次，每次 $0.0002$ 至 $0.0005$ 極量，一回 $0.001$ ，一日 $0.005$ ，  
三，作水劑、散劑、丸劑等服用。用其 $0.1\%$ 水溶液行皮下注射，奏效較內服尤速。點眼用其 $0.5\%$ 水溶液，須用新製者。

### 溴氫酸斯科坡拉民（毒）

本品爲無色稜柱狀之結晶，無臭，味苦而帶辣，易溶於水，須貯於避光之處。其應用如下！

(一) 作散瞳劑，效力較硫酸阿忒羅品強五倍，但效力之消失亦速。

(二) 作鎮靜劑或催眠劑，應用於舞蹈病，顏面搐搦，振顫麻痺，癲癇，神經痛，肌痛，興奮性精神

病等症。

(三) 作鎮痙或制止分泌劑，應用於喘息、百日咳、疝痛、盜汗、流涎等症。

內服量，一日數次，每次 $0.0002$ 至 $0.001$ 。極量，一回 $0.001$ ，一日 $0.003$ 。作水劑或丸劑服之。但連服時，如覺咽部乾燥，宜即減量。用其水溶液行皮下注射，奏效較內服更速。注射用量，一次 $0.0005$ 至 $0.001$ 。連續注射時，須注意其急性中毒。(有咽部乾燥，眩昏，步履蹣跚等症狀) 點眼用其 $0.1$ 至 $0.2\%$ 水溶液。

柳酸伊塞林(毒)

本品為無色或帶黃色之結晶，稍能溶於水，須貯於避光之處。其應用如下！

(一) 眼科中作縮瞳劑，應用於角膜潰瘍，綠內障、葡萄腫，虹彩脫離等症及白內障手術之後。

(二) 作鎮靜劑或制止分泌劑，應用於癩癩、舞蹈病、破傷風、神經痛及肺癆之盜汗等。

(三) 莨菪、番木鱉、硫酸阿忒羅品等中毒之時用為解毒劑。

內服量，一次至三次，每次用 $0.0005$ 至 $0.001$ 。極量，一回 $0.001$ ，一日 $0.003$ 。

○三，作散劑、水劑、丸劑等服用。欲奏效迅速，可用其水溶液行皮下注射。注射量，與內服量同。點眼用其○·二至○·五％水溶液。

#### 硫酸伊塞林（毒）

本品爲白色或帶黃色結晶性之粉末，易溶於水，在溼氣中易潮，須貯於避光及密閉之器中。應用，用量，極量等，均與柳酸伊塞林同。

#### 鹽酸可卡因（劇）

本品爲無色小葉狀或稜柱狀之結晶，無臭，味苦，易溶於水。其應用如下：

內服 應用於胃痛，嘔吐，船暈，百日咳，喘息，狹心症，脊髓癆之疼痛發作等症。用量，一日數次，每次○·○一至○·○五。極量，一回○·○五，一日○·一五，作水劑、散劑、丸劑等服用。但不可與鹽類、碘化物及含鞣酸之物配合。

外用（一）施小手術時用其一至二％水溶液，注射於手術部近傍之皮下，能使該部之知覺麻醉，減輕苦痛，是名局部麻醉。注射用量與內服同。

(二) 檢查口腔、咽、鼻腔、尿道、陰道、直腸（腸之近肛門部）等時，用其五至十%水溶液塗布於該部之黏膜，使知覺麻鈍。

(三) 結膜與角膜之疼痛性疾患，常用其一至三%水溶液點眼。

(四) 製成五%軟膏，塗於乳房，以制止乳汁之分泌。

(五) 齶齒、齒齦炎、扁桃腺炎、咽炎、喉炎、聲門痙攣、嚥下困難等症，常用其四至六%水溶液或軟膏作塗布劑。

(六) 裏急後重、陰道痙攣等症常用作麻醉性坐藥。

藥房中有現成之鹽酸可卡因錠發賣，每錠中含鹽酸可卡因〇・〇〇五。

克羅羅封（劇）

本品為無色透明揮發性油狀之液，有特殊之香氣，與水不易混和，易與酒精或油類混和，須貯於密閉之瓶中。

內服 作鎮痙劑或止痛劑，應用於破傷風、番木鱉中毒、喘息、癩癩、風痺、神經痛、胃痛、吃逆、疝痛，

船暈等症。用量，一日數次，每次〇・一至〇・五。極量，一回〇・五，一日一・五。混於甘油或糖漿中服之。

外用（一）施稍大之手術時，用作全身麻醉劑。蓋吾人吸入其蒸氣後，漸漸失其知覺而完全麻醉，即行大手術，亦不覺痛苦矣。但乳兒、老人、有心臟病者、過肥者、少血者、有動脈瘤者、及有重症之呼吸器病者，均不宜用。

（二）爲塗擦劑，以止局部之疼痛。

#### 處方例

克羅羅封

醋酸

各五・〇

右混和，爲塗擦劑。（各種疼痛）

醇精

本品爲無色透明揮發性之液，有特殊之香氣，易與酒精或油類混和，須貯於密閉之器中。

內服（一）作止痛劑或鎮痙劑，應用於神經痛、臟躁症、喘息、嘔吐、胃痛、疝痛、鼓腸等症。

（二）作興奮劑，應用於失神、虛脫等。

用量，每隔一二小時，服五至二十滴，混於糖漿、白糖、茶等或裝入膠管中服之。

外用（一）代克羅羅封，作全身麻醉劑，或與克羅羅封合用。

（二）施小手術時，噴於皮膏，作局部麻醉劑。

（三）關節痛、齒痛、皮膚知覺過敏、頭痛、臟躁症等，用作塗布劑以止痛。

（四）失神時，用作興奮性嗅入劑。又假死、疝痛等時，用以灌腸。

皮下注射 虛脫時，注入其純品一。○至二。○，可速奏興奮之效，惟注射部疼痛頗劇。間有轉成壞疽者，故近來不常用。

處方例

（一）醇精

二〇・〇

松節油

五・〇

右混和，一日三次，每次服十五至二十滴。（疝痛）

## 第九章 鎮靜劑

本品為藥，大概有催眠之作用。

抱水克羅拉耳（劇）

本品為無色透明之乾燥結晶，有特殊之臭氣，味稍苦而有腐蝕性，易溶於水，須貯於密閉之器中。

內服（一）作催眠劑，應用於各種不眠症。但對於因疼痛，咳嗽，呼吸困難等而起之不眠症則無效。

（二）作鎮靜劑，應用於酒客譫妄，產褥熱之狂躁，舞蹈病等。

（三）作鎮痙劑，應用於破傷風，急癇，百日咳，喉頭痙攣，吃逆，暈船，痙攣性陣痛及番木鱈中毒等。



(四) 作止痛劑，應用於神經痛、齒痛等，但其效遠不及嗎啡。

用量，一日數次，每次〇・五至二・〇。極量，一回二・〇，一日六・〇，作水劑或丸劑服之。常與溴化鈉或嗎啡混用，但不可與碳酸鹽類、銣鹽、有機酸之鹼類鹽或安替疋林配合。有心臟病、肺病、持久之高熱、少血或胃腸之潰瘍者不宜用。

外用(一) 不能內服者，可混於牛乳中灌腸。

(二) 外科上作防腐劑、弱腐蝕劑，製成五〇%水溶液或十%軟膏，應用於創傷、弛緩性潰瘍、丹毒、有惡臭之鼻炎等症。

### 薩耳佛那耳(劇)

本品爲白色稜柱狀之結晶或粉末，無味無臭，水中難溶。其催眠作用極強，但常服則有全身倦怠、嘔吐、麻痺等副作用，祇可偶一用之。用量，每次一・〇至二・〇。極量，一回二・〇，一日四・〇，作散劑，於睡前二小時服下。最好用多量之水送服。又服其〇・二至〇・五，可止肺癆病人之盜汗。

### 忒利俄那耳(劇)

本品爲無色葉狀之結晶，難溶於水。其作用與薩耳佛那耳同，惟作用發現速而消失亦速，故副作用較少。但常服亦漸漸現嘔吐，麻痺等中毒症狀，亦須注意。小兒科方面可應用於夜驚症，痙攣，舞蹈病，百日咳等。用量，每次〇·五至二·〇。極量，一回二·〇，一日四·〇。作散劑，於臨睡前服下。

### 弗羅那耳

本品爲無色之結晶，無臭，味稍苦，稍能溶於水。不但催眠作用甚確實，且毫無副作用，可以常服。故神經性不眠症，盜汗，小兒之急癩，百日咳等皆適用之。用量，每次〇·二五至一·〇。作散劑，於睡前半小時至一小時服下。有疼痛者，可混以嗎啡或狄俄寧。不能內服者，可溶於溫水中灌腸。

### 溴化鉀

本品爲白色有光澤骰子形之結晶，易溶於水。

內服（一）作鎮痙劑，應用於癩癩，小兒急癩，聲門痙攣，嘔吐，百日咳等症。

（二）作鎮靜催眠劑，應用於神經衰弱，精神興奮，神經性心悸亢進，不眠症，頭痛，遺精，淫慾過盛，臟躁症，舞蹈病等。又用作定期性狂躁之頓挫療法。

用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，作散劑或水劑服之。須飯後服下。忌食酒類、油膩、及有酸味之食物。又不可與銀劑、水銀劑、無機酸類等配合。

對於癲癩與舞蹈病，初用少量，後每隔一星期，於一日量中加一・〇，至一日量達一〇・〇後，漸次減量。若發作尚不停止，可再逐漸加量。

用作定期性狂躁之頓挫療法，每日須用一〇・〇至一五・〇。俟稍現功效後，始漸減少。

外用（一）不能內服者，可用其三・〇至五・〇溶於黏漿中灌腸。

（二）百日咳、喘息等，常用其〇・五至二％水溶液作吸入劑。

### 溴化鈉

本品爲白色結晶性之粉末，稍有吸濕性，易溶於水，須貯於密閉之器中。應用，用量，配合，禁忌等，均與溴化鉀同。惟作用稍弱，副作用亦少，可以常服，小兒亦適用之。

### 溴化銣

本品爲無色之結晶或白色之結晶性粉末，久觸空氣，則變淡黃色，易溶於水，遇熱則揮散，須貯

於冷處。應用與溴化鉀同，惟作用強，而副作用亦強。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇，作散劑或水劑而服。常與溴化鉀、溴化鈉等混用。

處方例

(一) 溴化鉀

溴化鈉

溴化銣

纈草酊

糖漿

蒸溜水

右混和，一日三次，二日分服，飯後服下。(癲癇、臟躁症、舞蹈病等)

溴化樟腦(劇)

本品爲無色針狀或板狀之結晶，有類似樟腦之香氣，不溶於水。常作鎮靜劑，應用於各種神經

病，神經性心悸亢進，淫慾過盛及遺精等症。用量，一日數次，每次〇・一至〇・二。極量，一回〇・三。

一日一・〇，作散劑、丸劑，或裝入膠囊服之。

處方例

(一) 溴化鉀

溴化樟腦

二・〇  
〇・六  
二・〇

乳糖

右混和，分六包，一日三次，飯後服下。(遺精、淫慾過盛)

額草根

本品作鎮靜劑，應用於臟躁症、癩癩、神經衰弱、舞蹈病等。但其作用不甚確實。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，作浸劑、散劑、丸劑等服之。不喜內服者，可用其浸劑灌腸。

額草酊

本品為黃褐色之液。應用與額草根同，但其作用較額草根更不確實，故常混於他種鎮靜水劑

中以補助其作用，無獨用者。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇。

#### 醇精性纈草酊

本品爲黃色之液，有特異之氣味。應用，用量，均與纈草酊同。惟作用比纈草酊稍強，且兼有興奮作用。

## 第十章 健胃消化劑

### 龍膽根

本品爲褐色之粉末，味苦，有特異之香氣。作健胃劑，用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，作浸劑或散劑服用。其製劑有龍膽膏與龍膽酊，應用均同。用量，膏劑每次〇・五至二・〇，酊劑每次一・〇至三・〇。概與他種健胃劑混用，獨用者甚少。

### 苦味酊

本品用龍膽、橙皮各五分，莖薤二分，稀酒精百分製成，爲黃褐色之液。作健胃劑，用量，一日數次，

每次一・〇至二・〇。

黃連

本品作健胃劑，應用於兼消化不良之慢性泄瀉，慢性胃炎，肺癆病人之慢性泄瀉，慢性痢疾等症。用量，一日數次，每次〇・二至〇・五，作煎劑或丸劑服之。其製劑有黃連膏，爲褐色之乾膏，能溶於水。應用與黃連同。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇，作水劑或丸劑服之。

蒲公英

本品除健胃外，稍有泄瀉作用，故適用於兼便閉之消化不良，肝臟病，門脈鬱血，痔疾等症。用量，一日數次，每次五・〇至一〇・〇，作煎劑或茶劑服之。若欲泄瀉作用稍強，可加精製酒石。其製劑有蒲公英膏，爲褐色之稠膏，易溶於水。作健胃劑，用量，一日數次，每次〇・五至一・五，爲水劑或丸劑服之。

橙皮

本品除健胃外，更用作矯味劑或矯臭劑。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，爲浸劑、散劑、丸

劑等服之。其製劑有橙皮酊、橙皮糖漿、橙皮油等，應用均同。用量醇劑一日數次，每次一〇至四〇，糖漿每水劑一五〇〇用二〇〇。橙皮油亦可與乳糖混合（每乳糖一・二加入一二滴），製成油糖用之。

### 桂皮

本品之應用如下

（一）作健胃劑，應用於消化不良與慢性泄瀉。

（二）對於陣痛微弱及子宮出血雖亦用之，然其效遠不及麥角。

（三）作茶劑、散劑等之矯味藥，又作丸劑之丸衣。

用量，一日數次，每次〇・三至一・五，作浸劑、散劑、丸劑、茶劑等服用。其製劑有桂皮水、桂皮酊、桂皮糖漿、桂皮精、桂皮油等，均作健胃劑或矯味劑之用。用量，桂皮水與桂皮糖漿每次三・〇至五〇，桂皮酊與桂皮精每次一〇至三〇，桂皮油每次一二滴。

### 芳香酊



本品由桂皮十分，丁香，小豆蔻各二分，生薑、枸橼精各五分，稀酒精百分製成，爲赤褐色之液。作健胃劑、驅風劑或水劑之矯味藥。用量，一日數次，每次一・〇至三・〇。

### 芳香散

本品由桂皮、小豆蔻、生薑各等分製成，爲淡褐色之粉末，有桂皮之香氣。作健胃劑或驅風劑，或散劑之矯味藥。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，作散劑服之。

### 生薑

本品作驅風劑，或健胃劑，應用於弛緩性消化不良、鼓腸等症。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，爲散劑，或丸劑服之。其製劑有生薑酊與生薑糖漿。應用均同。用量，酊劑每次一・〇至一・五，糖漿每次四・〇至一〇・〇。

### 番椒

本品作健胃劑或驅風劑。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・五，爲散劑丸劑，或浸劑服之。外用引赤劑。其製劑有番椒酊，應用均同，內服量每次五乃至二十滴。

## 薄荷葉

本品作驅風劑、鎮痙劑、或興奮劑，應用於胃痛、嘔吐、疝痛、泄瀉、臟躁等症。又常用作矯味劑或矯臭劑。用量，每次一・〇至五・〇，爲浸劑或茶劑服之。

## 薄荷油

本品爲澄明無色或淡黃色之液，有特異之香氣，味初如灼，後清涼。應用與薄荷葉同。用量，一日數次，每次一至三滴，爲油糖或酒精溶液服之。外用作偏頭痛、神經痛、齒痛等之止痛塗布劑，又可加入含嗽藥中。

薄荷葉之製劑，尙有薄荷水、薄荷糖漿等，均不過作水劑之矯味藥或矯臭藥。

## 胃液素

本品係從牛或豚之胃黏膜製出之醱酵素，爲白色之粉末，易潮，有特殊之臭氣，味稍甘，可溶於水，須貯於密閉器中。作消化劑，應用於因胃液缺少而起之消化不良症，例如慢性胃炎、貧血或肺癆病人之消化不良等。用量，一日數次，每次〇・二至〇・五，爲水劑、散劑或丸劑服之。大概與稀鹽酸

混用，須在飯後即速服下。

處方例

(一) 胃液素

稀鹽酸

各二〇〇

橙皮糖漿

二〇〇〇

蒸溜水

一八〇〇

右混和，一日三次，二日分服，飯後即服。

含糖胃液素

本品乃胃液素與乳糖之混合物，性狀應用用法，均與胃液素同。用量，一日數次，每次〇・五至一・〇。

胃液素酒

本品由含糖胃液素二十分，甘油，蒸溜水各十分，鹽酸一分，白葡萄酒三百六十分製成，為澄明

淡黃色或淡赤色之液。應用與胃液素同。用量，一日數次，每次一調羹。

### 胰素

本品從新鮮之豚胰腺製出，爲淡黃色或灰白色之粉末，稍有臭氣，水中能徐徐溶解。有消化蛋白質及澱粉之作用，常應用於各種消化不良及糖尿病。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，作散劑或丸劑服之。

### 糖化酵素

本品爲淡黃色之粉末，水中難溶，消化澱粉之作用極強。本品一分約能消化澱粉五十分，適用於因澱粉質消化不良而起之各種胃腸病。用量，一日數次，每次〇・一至〇・三，大概與重碳酸鈉混用，作散劑或錠劑，於飯後即速服下。

本藥尙有高峯氏糖化酵素，柏木糖化酵素等種種特製品，此等特製品消化澱粉之作用，較普通品更強數倍，應用用量等，均與普通品同。

### 處方例

(一) 高峯氏糖化酵素

胰素

一·〇

重碳酸鈉

一·五

右混和，分六包，一日三次，二日分服，飯後即服。(消化不良)

## 第十一章 鐵劑

鐵劑有補血之效，但服鐵劑後，忌飲茶及食含坦寧酸之物。適用鐵劑之症如下：

(一) 萎黃病，惡性貧血症，白血病，假性白血病。

(二) 各種續發性貧血，例如大出血後之貧血，經久熱病後之貧血或衰弱，及貧血性水腫等。

(三) 腺病及佝僂病病人之貧血者。

(四) 因貧血而起之月經困難及神經病。

但腦或內臟充血者，易咯血之肺癆病人，消化不良者，及月經過多者，均忌用之。茲將重要各鐵

劑之性狀，用量等略記如下：

### 鐵粉

本品爲深灰色之粉末，百分中至少含純鐵九十八分。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・二，作散劑或丸劑服之，須在飯後服下。

### 林檎鐵膏

本品從有酸味之成熟林檎與鐵粉製成，爲帶綠黑色之稠膏，易溶於水，味稍甘，百分中約含純鐵五分，爲鐵劑中性質緩和者。用量，一日數次，每次〇・二至〇・五，作水劑或丸劑服之。

### 林檎鐵酞

本品從林檎鐵膏一分，酒精二分，桂皮水七分製成爲暗褐黑色之液，爲鐵劑中易消化者。用量，一日數次，每次一・〇至二・〇，作水劑服之。

### 處方例

#### (一) 林檎鐵酞

苦味酊

各一五・〇

右混和，一日三次，每次服半茶匙，飯後服下。（各種貧血症）

還元鐵

本品爲灰黑色之粉末，百分中約含純鐵九十分。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・三，作散劑或丸劑服之。

處方例

（一）還元鐵

五・〇

硫酸規寧

一・五

龍膽末

〇・五

龍膽膏

二・五

右混和，爲丸五十粒，一日三次，每次服二粒，飯後服下。（瘧疾後之貧血，月經困難等）

含糖炭酸鐵

本品爲帶綠灰色之粉末，味甘，百分中約含純鐵十分，爲鐵劑中性質緩和者。用量，一日數次，每次○·一至○·五，作散劑或丸劑服之。

### 硫酸鐵

本品爲帶綠白色之結晶性粉末，在乾燥之空氣中，徐徐風化，易溶於水。用量，一日數次，每次○·五至○·五，作水劑、散劑、或丸劑服之。

### 蘆薈鐵丸

本品從硫酸鐵、蘆薈末各等分加以酒精製成，每丸之重量約一·○，應用於月經不調及兼便秘之貧血症；但有妨礙消化之副作用，不宜常服。用量，一日三次，每次服一粒或二粒。

### 過氯化鐵液

本品爲澄明深黃褐色之液，由過氯化鐵與蒸溜水等分製成，百分中含純鐵十分。作止血劑。內服應用於胃腸出血、咯血、腎臟出血等症。用量，一日數次，每次二至十滴，混於黏漿中，飯後服下。外用以二三倍量之水稀釋之，作止血、創傷出血、子宮出血等之止血藥。此外吸入、灌腸等，間亦用之（均



用二%水溶液。

醇精性鐵酊

本品從過氯化鐵液一分，醇精二分，酒精七分製成，爲鮮黃色之液，百分中約含純鐵一分，適用於有神經症狀之貧血病人。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇。

含糖碘化鐵

本品爲帶黃白色或淡灰色之粉末，易潮，百分中約含碘化鐵二十分，適用於腺病、肝臟腫大及梅毒病人之貧血等。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，作散劑或丸劑而服。

碘化鐵液

本品爲綠色之液，百分中約含碘化鐵五十分，應用與含糖碘化鐵同。用量，一日數次，每次五至十滴，作水劑服之。

碘化鐵糖漿

本品爲無色或淡黃色澄明之稠液，百分中約含碘化鐵五分。須以鐵線浸入其中，貯於無色瓶

內而密閉之，應用與含糖碘化鐵同，小兒更爲適用。用量，一日數次，每次一・〇至五・〇，作水劑服之，但不可爲碳酸鹽類、重碳酸鹽及含鞣酸之物配合。又本品之水劑，須用新製者，如歷日稍久，則漸分解，析出黃色之沉澱。

### 枸橼酸鐵

本品爲透明赤褐色之小葉片，可徐徐溶解於水中，百分中含純鐵十至二十分，爲鐵劑中容易吸收者。用量，一日數次，每次〇・一至〇・五，作水劑、散劑、或丸劑服之。

### 處方例

(一) 枸橼酸鐵

五・〇

龍膽末

一・〇

龍膽膏

三・〇

右混和，爲丸五十粒，一日三次，每次服二粒。(各種貧血症)

枸橼酸鐵液

本品爲澄明暗褐色之液，百分中約含枸橼酸鐵四十四分，爲鐵劑中性質緩和者。用量，一日數次，每次○·三至二·○，作水劑服之。

枸橼酸鐵銹

本品爲透明赤褐色之小葉片，易潮，易溶於水，亦爲鐵劑中性質緩和者。用量，一日數次，每次○·一至一·○，作水劑服之。

鐵酒

本品從枸橼酸鐵銹二分，白葡萄酒九十八分製成。爲澄明黃褐色之液，應用與枸橼酸鐵銹同。用量，一日數次，每次服一茶匙至一湯匙。

枸橼酸鐵規寧

本品爲暗赤褐色有光澤之小葉片，味苦，水中可徐徐溶解，百分中含規寧九至十分，用作貧血病人之強壯劑。用量，一日數次，每次○·一至○·五，作散劑或丸劑服之。

乳酸鐵

本品爲帶綠白色之塊片或結晶性粉末，百分中約含純鐵二十分，爲鐵劑中性質緩和且易於吸收者。用量，一日數次，每次〇・一至〇・四，作散劑或丸劑服之。

處方例

(一) 乳酸鐵

〇・一

磷酸鈣

〇・一

白糖

〇・五

右混和，爲散劑一包，同量給六包，一日三次，每飯後服一包。(腺病)

蛋白鐵液

本品爲赤褐色之液，味佳，爲鐵劑中性質緩和且最易吸收者。用量，一日三次，每次三・〇至五・〇，混於牛乳或水中，飯後服下。

## 第十二章 收斂劑

收斂劑有減少分泌，止瀉，止痛等作用。

明礬

本品爲無色透明之正八面結晶塊，易溶於水。

內服（一）作止血劑，應用於吐血，咯血，瀉血等。

（二）作止瀉劑，應用於慢性泄瀉。

用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・五，混於黏漿中服用。

外用（一）作制止分泌劑，應用於口內炎，慢性咽炎，喉炎，白帶，淋病，膀胱炎，足汗過多等症。

（二）作止血劑，應用於衄血，子宮出血，壞血病性潰瘍等症。

出血與足汗過多，用其純品之粉末作撒布藥。對於咽喉炎與喉炎，則以本劑與倍量之白糖相和，作撒布藥。吸入與含嗽，可用其〇・五至二％水溶液。尿道，膀胱，子宮等之洗滌，用其一％水溶液。

石灰水

本品爲澄明無色之液，加水於燒石灰製成。千分中約含氫氧化鈣一分，觸空氣或沸煮之，則漸

漸溷濁。內服應用於胃酸過多，慢性瀉瀉，膀胱炎，腎盂炎，白喉，佝僂病，骨軟化，皮膚瘙癢等症。用量，一日二三次，每次二五〇・至一五〇・〇，混於溫牛乳肉汁等中服下。但對於白喉，須每隔半小時至一小時服少許。皮膚瘙癢症，祇須每朝空腹時服半調羹，連服一二星期即奏效。本品不可與銻鹽，金屬鹽，昇汞，植物性鹼類，及含鞣酸之物配合。外用常用其二〇％水溶液作白喉，肺癆，咽頭炎，支氣管炎等症之吸入劑，塗布劑，或含嗽劑。大腸炎用其五〇％水溶液作腸洗滌劑。

#### 沈降碳酸鈣

本品爲白色之細末，不溶於水。內服作制酸劑或收斂劑，應用於胃酸過多，慢性瀉瀉，糖尿病等症。外用作火傷，潰瘍，濕疹等之撒布藥，又爲牙粉之主要原料。

#### 氯化鈣

本品爲白色之結晶，易潮，易溶於水，係收斂劑或消炎劑，應用於肺癆，喘息，白帶，辜丸炎等症。用量，一日數次，每次〇・三至一・〇，混於黏漿中，作水劑服用。其純品之一至三％水溶液，可用以行靜脈注射，效力較內服更佳。

### 次亞磷酸鈣

本品爲白色之結晶性粉末，稍能溶於水，作強壯劑或消炎性收斂劑，應用於佝僂病、骨軟化、肺癆、喘息等症。用量，一日數次，每次〇・二至一・〇，作散劑服用。

### 乳酸鈣

本品乃乳酸與鈣之合劑，爲無色無臭之粉末，可溶於九・五分之水中，與氯化鈣有同一效用。普通用其二乃至三％溶液，一日數回，每回一食匙，以供內服。通常用量，可較氯化鈣稍多，每日至多可用至一〇・〇，對於腺病、佝僂病亦可用之，多用於各種出血、喘息、肺癆、骨軟化症。

### 醋酸鉛（鉛糖）（劇）

本品爲無色透明之結晶，微有醋酸之臭氣，味微甘而帶收斂性，易溶於水，內服作收斂劑或止血劑，應用於泄瀉、咯血、腸出血、膀胱出血、痢疾等症。但易中毒，不宜常服。用量，一日數次，每次〇・〇二至〇・〇五。極量，一回〇・一，一日〇・三，作水劑、散劑或丸劑服之。不可與石灰水、阿片劑、碘化物、無機酸、碳酸鹽及含鞣酸或樹膠質之物配合。外用可製成水溶液，供灌腸（〇・二至〇・六％）。

尿道注入(0.1至0.5%)，點眼(0.05至0.3%)，罌包(1至5%)等用。

### 氧化鋅(亞鉛華)

本品爲白色之粉末，不溶於水。

外用(一)作乾燥性收斂劑，用純品或與石松子、澱粉、滑石等相混爲撒布藥，或製成軟膏(十至三十%)，應用於濕疹、痒疹、糜爛等皮膚病。

(二)與五倍量之白糖相和，或製成0.2至2%軟膏應用於結膜炎。

(三)用純品或與等量之明礬或鞣酸相和，作喉頭內噴粉藥。

內服 舞蹈病、癩癩等服溴質劑無效時，間或應用之。用量，一日數次，每次0.05至0.3，作散劑或丸劑服之。

### 處方例

(一) 氧化鋅

### 澱粉

各一二·五



礦脂

二五〇

右混和，爲軟膏，外用。（濕疹、糜爛）

藥房發賣之氧化鋅軟膏，係由氧化鋅一分豚脂九分製成。

硝酸銀（劇）

本品爲無色板狀之結晶，易溶於水，見光則分解，須貯於深褐色之瓶中。內服應用於慢性脊髓病，胃潰瘍，慢性泄瀉，癩癩等。用量，一日數次，每次〇・〇〇五至〇・〇二。極量，一回〇・〇三，一日〇・一。作水劑或丸劑服之，但不可與碘化物、溴化物、植物性鹼類、植物質粉末、酸類、鹽類等配合。外科及眼科上，常用其水溶液作消炎性收斂劑，供塗布、點眼、灌腸、尿道注入等，應用於各種黏膜之炎症。其濃度從用途而異：口腔、咽、喉等之塗布，用二至一〇％。眼科用塗布，用〇・五至二％。尿道注入，用〇・二至〇・五％。洗滌胃或膀胱，用〇・一％。灌腸，用〇・一至〇・五％。十％以上之濃溶液及純品，有腎蝕作用，可用作腐蝕劑。

用硝酸銀應注意之點如下！

(一) 不可連用，以免發生銀病。

(二) 不可與有機物伍用。

(三) 溶液須貯於暗色瓶內。

(四) 用於局部而僅望其瞬時之作用時，用藥後，即須以食鹽水洗之，如點眼等是。

(五) 沾染本藥，即生黑斑，可以鹼精洗去之。

### 蛋白化銀

本品爲鮮黃色之粉末，易溶於水，專供淋病之尿道注入與結膜炎之點眼。因無刺戟性，較硝酸銀爲佳。尿道注入，用 $0.25$ 至 $2\%$ 水溶液。點眼，用 $1$ 至 $5\%$ 水溶液。創傷療法中，更用其 $5$ 至 $10\%$ 軟膏，以促進上皮與肉芽之生長，且兼有消毒，乾燥之效。

### 次硝酸鉍（次硝酸蒼鉛）

本品爲白色結晶性之粉末，無臭無味，不溶於水。

內服 作緩和收斂劑，應用於胃潰瘍，慢性胃炎，胃痛，慢性泄瀉，痢疾等症。用量，一日數次，每次

○五至一·五，但對於胃潰瘍用量須稍多，作散劑或錠劑服之，不可與硫黃、硫化物、銻化物、及含鞣酸之物配合。

外用 用純品或與澱粉相和，作收斂性或消毒性撒布藥，應用於濕疹、糜爛、火傷等症。

處方例

(一) 次硝酸錳

阿片末

乳糖

右混和，分九包，一日三次，三日分服。(下痢)

次沒食子酸錳(迨耳馬妥耳)

本品爲黃色之粉末，無臭無味，不溶於水。

內服 作消毒性收斂劑，應用於胃潰瘍、泄瀉、腸癆、傷寒等症。用量，一日數次，每次○·三至一

○，作散劑，包於膠紙中服之。

三·○

○·一

三·○

外用 爲黃礬粉之代用品，有消毒、收斂、乾燥、及促生肉芽等作用。用其純品或與澱粉等相和作撒布劑，或製成軟膏（五至一〇%）應用於潰瘍、濕疹、足汗過多、糜爛、火傷、創傷等症。

用法方例

（一）次沒食子酸鈣

滑石

澱粉

右混和，作撒布藥。（多汗症）

草酸銻（劇）

本品爲白色顆粒狀之粉末，無味無臭，不溶於水，作止吐劑，應用於胃痛、嘔吐、暈船等症。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・三。極量，一回〇・三，一日一・〇，作散劑或丸劑服之。

鞣酸（單寧酸）

本品從五倍子，或沒食子製出，爲淡黃色之粉末，味澀，易溶於水，須貯於褐色密閉之瓶中。

內服(一)作收斂劑或止血劑，應用於慢性泄瀉，慢性痢疾吐血，瀉血，血尿，多汗症等。但有胃炎，常習便閉及多血體質者忌用之。用量，一日數次，每次〇・〇五至〇・三，作散劑，水劑，丸劑等服之。本品有妨礙消化之副作用，且作用不確實，故現今多改用其製劑(見下)。

外用(一)用其純品，作潰瘍面之撒布藥。

(二)鼻、咽、喉等之慢性炎症，用本品與澱粉混和作噴粉藥，或用其〇・五至一%水溶液作吸入或含嗽藥。

(三)慢性膀胱炎、陰道炎、白帶、淋病等，用其〇・五至一%水溶液，作洗滌或注入藥。

(四)霍亂、痢疾等，用其〇・五至五%水溶液灌腸。

(五)濕疹、痒疹、凍瘡、多汗症等，用其五至一〇%水溶液作罨包藥，或用其一〇%軟膏作塗布劑。

### 處方例

(一) 鞣酸

1.0

甘油

四・〇

豚脂

一五・〇

右混和，爲軟膏，塗布用。（既潰爛之凍瘡）

鞣酸蛋白

本品爲褐色之粉末，無臭無味，不溶於水。作用與鞣酸同，因無副作用，且效力確實，現今凡應內服鞣酸者，悉代以本品。用量，一日數次，每次〇・五至二・〇，作散劑服之，但不供外用。

沒食子酸

本品爲白色或帶褐白色之針狀結晶，無臭，味澀而帶酸，稍能溶於水，須貯於褐色密閉之瓶中。內服 作收斂劑或止血劑，應用於泄瀉、痔出血、子宮出血、膀胱炎、盜汗等症。用量，一日數次，每次〇・一至〇・五，作散劑、水劑、丸劑等服之。

外用 其〇・五至二％水溶液，作淋病、子宮出血等之洗滌藥，或口內炎之含嗽藥。其五至一〇％甘油溶液，作各種黏膜炎之塗布藥。

## 第十三章 變質劑

### 碘酊（劇）

本品由碘一分、酒精十二分製成，爲暗赤褐色之液，有碘之特臭，須貯於密閉之瓶中。內服有止吐及驅除梅毒之作用，應用於神經性嘔吐、妊婦嘔吐、梅毒等症。用量，一日數次，每次二三滴，作水劑服用。外用作消毒劑或消炎劑，供各種炎症、腺病性、梅毒性及寄生性皮膚病、風癩、凍瘡及手術前皮膚面之塗布用。又爲瘻管、陰囊水腫、關節水腫及各種腺腫等之注入藥。

### 碘化鉀（劇）

本品爲白色骰子形之結晶，易溶於水。內服：（一）作第二第三期梅毒之驅梅毒劑。（二）應用於腺病、慢性骨節風癩、肋膜炎、心囊炎、動脈硬化症、動脈瘤等症。（三）應用於甲狀腺腫、淋巴腺腫、舉丸炎、慢性子宮炎等症，有催進吸收之作用。（四）應用於喘息、頭痛、神經痛等。（五）作慢性鉛中毒或慢性水銀中毒之解毒劑。

用量，一日數次，每次〇・一至一・〇，作水劑，飯後服之。對於重症梅毒，須漸次增量，達每日用五・〇至八・〇而止，不可與水銀劑，鉛劑，植物性鹼類，硝酸銀，無機酸及酸性鹽等配合。本品副作用頗多，服時宜用少量，後漸增加。

外用 其一至三％水溶液，用作喉炎，支氣管炎等之吸入藥。梅毒性潰瘍，用其五至十％軟膏作塗布藥。

#### 碘化鈉

本品爲白色結晶性之粉末，易潮，易溶於水，須密閉瓶中。應用與用量同上，副作用少，宜於常服。

#### 亞砷酸（毒）

本品爲白色之粉末或塊片，難溶於水。內服：應用於各種皮膚病，貧血，萎黃病，白血病，脾臟腫大，舞蹈病，癩癩，神經衰弱，神經痛，偏頭痛，肺癆，佝僂病，骨軟化病，瘡疾等症。用量，一日數次，每次〇・〇〇五至〇・〇〇二。極量，一回〇・〇〇五，一日〇・〇一五，概作丸劑，飯後服下。消化障害全身衰弱者，忌服。內服本品，如有胃部壓重，消化障害，結膜炎，心機亢進等中毒之初期症狀發現，宜即停



止。即無此等症狀發現，每連服三星期後，亦須停止一二星期，以避蓄積作用。外用製成四%軟膏，作皮膚或齒齦之腐蝕藥。

亞砒酸鉀液（福氏液）（毒）

本品爲澄明無色之液，應用及注意同上。用量，每次二至六滴。極量，一回 $0.5$ ，一日 $1.5$ ，作水劑服。

卡科狄耳酸鈉

本品爲白色之結晶或粉末，易溶於水，應用同上，副作用極微。用量，一日二次，每次 $0.02$ 至 $0.1$ ，一日之極量 $0.3$ ，作水劑服。其 $5\%$ 水溶液，專供慢性皮膚病之皮下注射用。

六零六與九一四（毒）

兩者均係砒質之製劑，爲淡黃色之粉末，梅毒之最新特效藥也。凡適用砒質劑之皮膚病，血液病，神經痛，瘡疾，瘴氣熱等，皆可用之。但有重症循環器病，腐敗性支氣管炎，眼病，視神經萎縮，惡性腫瘤等者，忌用之。又祇可供靜脈內注入，不能內服，肌肉內或皮下注入不適用。靜脈內注射之用量，用

六〇六，則男子每次〇・三至〇・五，女子每次〇・二至〇・四。用九一四，則男子每次〇・四五至〇・九，女子每次〇・四至〇・七五。每隔一星期至十日，注射一次。梅毒療法，至少須注射三次。他種疾病，則或注射一二次已奏效。

### 磷（毒）

本品爲白色或淡黃色透映之塊，有蠟狀光澤，不溶於水，易溶於脂肪油，須貯於水中。內服應用於佝僂病，骨軟化病，骨質形成遲緩等症。用量，一日二次，每次〇・〇〇〇五至〇・〇〇一。極量，一回〇・〇〇一，一日〇・〇〇三，作丸劑，錠劑或脂肪油溶液服之。外用製成〇・五%軟膏，供風癬、麻癬等擦用。

### 磷酸

本品爲澄明無色無臭之液。內服：（一）作清涼劑，（二）作強壯劑，應用於佝僂病，骨質病，盜汗等症。（三）用於膀胱結石，有漸漸溶解之效。

用量，一日數次，每次〇・三至一・〇，作水劑服之。

水銀軟膏（灰白軟膏）

本品與帶藍灰色之油膏，由水銀三十分，豚脂十八分，牛脂四十二分研和製成。專供外用，如下：

（一）作第二期梅毒之塗擦劑。

（二）作癩瘡，癰，瘰疽，皰九炎，乳房炎，腹膜炎，盲腸炎，肋膜炎，腦膜炎，腮腺炎等之消炎劑。

（三）作皮膚殺蟲藥，應用於頭虱，陰虱等症。

昇汞（毒）

本品爲白色之結晶，內服可除梅毒。極量，一回〇・二，一日〇・〇六。易中毒，現今用者甚少。不可與碳酸鹽，石灰水，植物鹽基，及含鞣酸之物配合。其〇・〇五至〇・一％水溶液爲強力之消毒藥，應用甚廣，但易與金屬結合，故本品不可用金屬器具盛貯，而金屬器具亦不宜用此消毒。

甘汞（劇）

本品爲白色粉末，不溶於水，見光則分解，須貯於暗處。內服有通便，及消毒腸內之效。霍亂，疾病，傷寒，腦膜炎，肺炎，肋膜炎等初期常用之。用量，每次〇・二至〇・五。其少量可利尿，梅毒療法間亦

用之。用量，每次〇・〇二至〇・〇五。但不可與酸類，碳酸鹼，石灰水，碘化物，安替疋林，膏劑，白糖，阿片劑等配合。外用概用蒸氣製甘汞，較普通品更細，供梅毒性潰瘍及各種眼病之撒布劑。

#### 柳酸汞（毒）

本品爲白色粉末，對於梅毒，於十倍量之橄欖油中，行肌肉內注入，又可內服。用量，每次〇・〇一至〇・〇二極量，一回〇・〇二，一日〇・〇六。

#### 重碳酸鈉

本品爲白色結晶性粉末，能溶於水，應用於胃酸過多，嘔吐，胃腸炎，黃疸，痛風，慢性膀胱炎等症。用量，每次〇・五至二・〇。但不可與鹽類，酸性鹽，杏仁水，苦扁桃水，植物鹼，及含鞣酸之物配合。外用常供作胃炎之洗滌劑與喉炎之吸入劑。

#### 食鹽

內服常應用於咯血，硝酸銀中毒，便秘等症。外用則供作灌腸，洗滌，吸入等，又可供靜脈內注入。用食鹽水之靜脈內注入，對於霍亂，大失血等更有特效。以其能補足血液之不足，使循環無滯也。

稀鹽酸

本品爲澄明無色之液，應用於因胃中缺酸或胃分泌減少而起之消化不良，腸中酸酵異常，小兒之夏季泄瀉，紫斑病，壞血病，傷寒等症。又爲發熱病人之解渴劑。用量，每次〇・五至一・〇。

第十四章 驅蟲劑

綿馬根末

本品專供殺除縲蟲，十二指腸蟲，蟯蟲等（均係腸中之寄生蟲）之用。用法取十二至二十克，分三包或四包，於空腹時每隔三十分服一包，服完後經一小時，再服甘汞或硫酸鎂一次，使死蟲瀉出。但瀉劑不可用蓖麻子油，因易引起中毒故也。其製劑有綿馬膏，作用同。用量，總量五至十克。

山托寧（劇）

本品爲無色之小葉狀結晶，難溶於水，見光則變黃色，須貯於暗處，供驅除蛔蟲，十二指腸蟲，蟯蟲等之用。近時對於脊髓癆之疼痛及癩癩亦應用之。用量，每次〇・〇五至〇・一，一日服一次，乃

至三次，須空腹時服下。概與甘汞、大黃末等瀉劑混用。連服三四日後，再服蓖麻子油。極量，一回〇・一，二日〇・三。

### 替摩耳

本品爲無色透明之大結晶，不溶於水，有驅除十二指腸蟲及絛蟲之效。用量，二至四克，服一二次後即給以瀉劑。多服則有頭痛、耳鳴等副作用。胃腸中發酵異，常間亦用之。用法，每日三次，每次〇・〇五至〇・一。其味難服，須包於膠紙中服之。

## 第十五章 消毒劑

### 氯化鉀（一名鹽剝）（劇）

本品爲無色之結晶，一切口腔及咽頭疾患，均用其二至二%水溶液作嗽劑。有消毒防腐之效，但不供內服。

### 過錳酸鉀

本品爲紫色之稜柱狀結晶，有消毒、防腐、防臭，及止發酵之效，但消毒力不甚大。常用其○·五％水溶液供嗽口，洗滌及尿道注入之用。內用對於月經困難，白喉等間亦用之。用量，每次○·○五至○一，但不可與有機物、鹼精及其鹽類配合。又毒蛇咬傷可以其○·五％水溶液少許，注射於咬傷部近傍之皮下。本品溶液之污斑，可用醋酸除去之。

黃磺粉（劇）

本品爲黃色細小之結晶，有特殊之臭氣，難溶於水。有消毒、防腐，減少分泌及促生肉芽等效。爲外科上極重要之撒布劑。更製成軟膏、藥紗布等用之，但不供內服。有特別體質之人，用本品撒布後，周圍皮面發生痒疹。多用更易中毒。

硼酸

本品爲白色之結晶或粉末，其消毒力雖弱，而毫無刺激性，其二至三％水溶液，常供洗滌，洗眼，嗽口等用。其粉末作撒布劑。其製劑有硼酸軟膏。

福爾馬林（劇）

本品爲澄明無色之液，有特殊之透竄性臭氣，須貯暗處，其消毒力極強，價甚廉，用以消毒房屋器具等最宜。其法加熱使之蒸發，凡物觸其蒸氣，即奏消毒之效。其水溶液供洗滌創面及器械之用。

### 石炭酸（劇）

本品爲無色尖銳之針狀結晶，或結晶性之塊，有特殊之臭氣，至攝氏四十度而熔融，可溶於水。其二至五%水溶液常用以消毒器械，施術者之手，病室，及傳染病人之排泄物等。濕疹，癩風，痒疹，膿疱，鵝口瘡等亦可用此洗滌。其純品或濃溶液有腐蝕作用，可用以腐蝕贅疣，痔核，軟性下疳，惡性膿疱等。白喉，肺疽，腐敗性支氣管炎等，有以其水溶液，供吸入之用者。神經痛，風痺，丹毒，扁桃腺炎等，更用其二至三%水溶液行皮下注入。內服，現已不用。極量，一回〇・一，一日〇・三。

### 克利阿瑣忒（劇）

本品爲澄明淡黃色油狀之液，有防腐消毒之效。內服應用於胃腸酸酵異常，嘔吐，泄瀉，小兒霍亂，肺癆等症。用量，每次〇・〇三至〇・二極量，一回〇・五，一日一・五，爲丸劑或膠囊劑服之。外用爲凍瘡軟膏或腐敗性支氣管炎之吸入劑。齒科上用作腐蝕兼局所止痛劑。



炭酸瓜耶可耳

本品爲白色結晶性之粉末，不溶於水，爲克利阿瓊忒之內服代用品，以其絕無副作用且便於服用，近多用之。用量，每次〇・二至〇・五。

利索耳青

本品爲帶紅色之結晶，有防腐及止酵作用。內服應用於胃腸發酵異常，胃腸炎，頑固嘔吐及小兒吐瀉症等。用量，每次〇・二至〇・五，但對於頑固之嘔吐，每次須用一・〇至三・〇。又製成軟膏，用於癩瘡，濕疹，糠秕疹，魚鱗癬等皮膚病。其一至三％水溶液，用以洗滌尿道，膀胱或子宮。

以希替奧爾

本品爲黑褐色之稠液，發特殊之臭氣，有防腐，消炎，止痛等效。常製成軟膏或酒精溶液。爲風癬，神經痛，皮膚瘙癢，丹毒，濕疹，癩瘡，魚鱗癬，火傷，凍瘡等之塗擦劑。又常用其〇・五至三％水溶液行尿道注入或灌腸，以治淋病或癩疾。內服作胃腸消毒或強壯劑，對於癆瘵，喘息，子宮病及慢性濕疹，間亦用之。用量，每次〇・一至〇・二。

### 藥用肥皂

本品爲白色之塊或粉末，常用其水溶液灌腸以通便。又酸類中毒時，用作解毒劑而內服。

### 硫黃

藥用之硫黃，有昇華硫黃，精製硫黃及沈降硫黃三種。精製硫黃與沈降硫黃可爲通便劑而內服。用量，每次一至五克。鉛或水銀中毒時，可用作解毒劑。外用製成軟膏，應用於各種皮膚病。

### 里索爾

本品爲褐色澄明之液。其一至二%水溶液常用作消毒洗滌劑，但往往亦有因此中毒者，不可不慎。

## 第十六章 刺戟劑

### 芥子末

本品爲黃色粉末。內服有促進消化之效。用量，每次〇·五至一·〇。外用則用途甚廣。

(一) 爲內臟充血或發炎之引赤誘導劑。

(二) 爲止痛，或鎮痙劑，應用於神經痛，風痺，胃痛，疝痛，嘔吐，喘息，咳嗽等症。

用法，用等量之微溫水調芥子末，攪成泥狀，攤於布上，將布貼於患部，至灼痛難耐時除去之。此時被貼之皮膚當全部發赤，可用潔布揩淨包以軟布。但貼用時間不宜過久，蓋往往有因而發泡者。更有芥子浴者，乃加五十至百克之芥子末於浴水中，以供浴用也。

### 松節油

本品爲淡黃色之液，有特殊之香氣。內服有驅痰及促進膽汁分泌之效。常應用於支氣管炎，肺癆，支氣管漏及膽石疝痛，腎石疝痛等症。又爲磷中毒之解毒劑，供此用者愈陳舊愈佳，以陳舊者其中含有多量之臭養氣，磷質遇之，卽變爲無毒之亞磷酸也。但其味惡，宜作爲膠囊劑吞服。用量，每次○·二至一·○。外用可作爲神經痛，風痺，痛風，鼓脹，凍瘡等之誘導劑，以供塗擦之用。又爲腐敗性支氣管炎，肺壞疽，肺癆等之吸入劑。

### 硼精水（阿母尼亞水）

本品爲無色澄明之液，有特殊之刺戟性臭氣，易揮散，須貯於密閉之器中。其應用如下！

(一) 爲神經痛，風痹等之塗擦劑。

(二) 其五%水溶液爲毒蟲咬傷之洗滌或罨包劑。又毒蛇咬傷後，用其二十%水溶液，行皮下或靜脈內注入。

(三) 失神，假死，癲癩等嗅入其氣，可以蘇生。

#### 發泡膏

本品有強弱二種，均由芫菁末、橄欖油、黃蠟等製成。爲皮膚之發泡誘導劑，應用於內臟發炎時。

## 第十七章 腐蝕劑

### 硝酸

本品爲腐蝕劑，應用於贅疣，雞眼，水痘，水瘡，血管腫，狼瘡等。發煙硝酸，效力更強。

### 冰醋酸

本品爲澄明無色之液，有揮發性，須貯於密閉之瓶中。除供腐蝕用外，更可漬於布片，作發泡誘導劑。又眩暈，卒倒等時，供作興奮性嗅入劑。

苛性鉀（劇）

本品爲白色之棒或塊片，極易受潮，腐蝕性強。其腐蝕之部分甚深，適用於狂犬、毒蛇等之咬傷，及軟性下疳、狼瘡等。又爲刺戟劑，對於禿髮症慢性皮膚病等可供洗滌之用。腐蝕用十％之濃溶液。洗滌用二至四％之稀溶液。

氯化鋅（劇）

本品爲白色之小粒或粉末，易潮。其應用（一）爲腐蝕劑，用於癌腫、狼瘡、梅毒性潰瘍、肉腫、鼻茸等症。（二）爲消毒或收斂劑，用於腐敗性創傷、潰瘍、瘻管、軟性下疳、子宮內膜炎、淋毒性陰道炎、喉頭炎等。腐蝕用氯化鋅糊，該糊乃由氯化鋅澱粉及水製成，視腐蝕之深淺，而加減其濃度。消毒及收斂，用〇・一至一％之水溶液洗滌。

## 第十八章 緩和劑

屬於本類之藥物，有澱粉，樹膠末，乳糖，糖漿，礦脂，豬油等。均為矯味劑或成形藥，有緩和主藥之作用。自己並無效力，故不一一細述。

## 第十九章 清涼劑

### 沸騰散

本劑係將重碳酸鈉二·〇與酒石酸一·五分別包開。臨服時，先溶解前者於半杯之冷開水中，次加入後者，乘沸騰時服下。有清涼解渴之效，發熱病人往往用之。

### 鹽酸清涼液

本劑由稀鹽酸〇·五，糖漿十克及水九十克合成。專供發熱病人解渴之用，其中亦可加入強心藥。

第二十章

血清劑

詳見本叢書之微生物編

王雲五主編  
萬有文庫

第一集一千種

藥 物 要 義

版權有所翻印必究

中華民國二十八年十月初版  
中華民國二十三年七月再版

著 者 姚 昶 緒

發 行 者 兼 印 刷 者 商 務 印 書 館  
上海河南路

發 行 所 商 務 印 書 館  
上海及各埠

三六七三上

板



04076E



2121:6

