

三因極一病證方論卷之十七

婦人論

夫天地造端於夫婦乾坤配合於陰陽雖清濁動靜之不同而成象効法之有類原茲婦人之病與男子不同者亦有數焉古方以婦人病比男子十倍難治亦言之深乎但三十六病產蓐一門男子無之其如外傷風暑寒濕內積善惡憂思飲食勞傷虛實寒熱悉與丈夫一同也依源治療可得而知之

求子論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先察夫妻有無勞傷耗腎屬依方調治使內外和平則婦人樂有子矣

治婦人立身已來全不產及斷緒久不產三十在者

朴消

牡丹皮

當歸

大黃

去心

桃仁湯去皮

細辛去苗

厚朴

去心

赤芍藥

桔梗

人參

茯苓

桂去皮

甘草炙

牛膝酒浸

橘皮各炙

附子湯去心

水蛭切焙

青字

右為劉散母服肆大錢水酒合壹窠畢煎取陸分去滓空腹服日參夜壹溫覆得少汗必下積血及冷赤膿如小豆汁斟酌下盡若力弱大困不堪者只壹心服止然恐惡物不盡不得藥力能盡服儘好不尔着坐窠藥

皂角去皮子

吳茱萸

當歸各壹兩 細辛去苗

五味子

乾薑各壹兩

大黃蒸

礬石燒

戎鹽

胡椒各半兩

右為細末以絹袋盛大如指長參子餘盛藥令滿縛定納婦人陰中坐臥任意勿行走小使時去之更安壹日壹度易新者必清黃冷汁汁盡止若未見病出可十日安之本為子宮有冷惡物故令無子值天陰冷則發疼痛須依病出盡方已不可中輟每日早晚用苦菜煎湯重洗

秦桂圓治婦人無子音金城范守進此方見經駢

秦艽去蘆

桂心不見火

杜仲去心 防風各壹分

厚朴去心

附子去心

茯苓各兩半 白薇

乾薑炮

牛膝酒浸

沙參

半夏湯洗

人參壹兩

細辛兩壹分

右為細末煉蜜為丸如赤豆大每服五十圓食前溫酒醋湯任下如未効更加圓數各有則止神効並如彼說

不復繫引

探胞湯 崩經三月不知是胎驗之方

川芎不拘多少

右為未濃煎艾湯調貳錢空腹服微動則有胎

脈例

經云陰搏陽別謂之有子搏者近也陰脈逼近於下陽脈別出於上陰中見陽乃知陽施陰化法當有子又少陰脈動甚者妊子也手少陰屬心足少陰屬腎心主血腎主精精血交會識投于其間則有娠又三部脈浮沉正等無病者有妊也餘並如脈經論

惡阻

婦人中脘宿有風冷痰飲經脈不行飲与血搏多意病阻其狀顏色如故脉理順時不知病之所在但文竟四肢沉重頭目

眩暈惡聞食臭喜嘔鹹酸至三四月則大動逆逆不自勝持

多卧少起此由經氣所閉入者須於麻氣不得宣通頭清悶

經脉必澁故使四肢沉重然則頭目眩暈苗然則汗元時

治妊娠擇食嘔吐頭疼顛倒失逆四肢不和煩悶

人參

橘皮

白朮

麥門冬去心

甘草炙一分白茯苓

厚朴姜製

右為劉散每服四大錢水一盞半姜五片入竹茹一塊

如前大同前至七分去滓空心服

半夏

治妊娠惡阻心中潰悶頭目眩暈四肢怠惰百

節煩疼逆嘔吐嫌聞食氣好暗鹹酸多卧少起不進飲食

半夏洗三兩茯苓

熟地黄各二兩橘皮

細辛

人參

芍藥

川芎

紫蘇葉

桔梗

甘草各二分

右爲散每服四大錢水一盞姜七片煎七分去滓空
腹服有客挾煩渴口生瘡者去橘皮細辛加前胡知母
膈冷下利者去地黃入桂心炒胃中虛熱大便閉小便
澀加大黃一兩八分去地黃加黃芩六分

伏苓 治妊阻病心中煩悶頭暈重憎聞飲食氣便嘔而
吐悶顛倒四肢重弱不自勝持服之即効要先服半夏
湯兩劑後可服此方

茯苓 人參 杜公炒 乾姜炮 半夏

橘皮略 白木 葛根 甘草炙 枳實

右爲末蜜丸如梧子大每服三五十丸米飲下日三服

小地黃丸 治妊娠酸心吐酸水腹痛不能食

人參 乾姜炮各等分

右爲末用生地黃汁丸如梧子大每服五十九丸以

食前服

養胎大論

夫養胎須分能所母爲能養子爲所養自哉况殊致養亦別
故謂之重身父母交會之初子假父母精血投誠於其間茲
後成姓元氣質始之謂也一月血聚謂之始血二月精凝
謂之始膏三月成形謂之始胎此亦无次第中次第也道生
一一生二生三三生万物况以三而成故不得不數月而
分也成形之後陰陽施化男女始分故隨見外象而有感於
內四月始受少陰君火氣必養精五月受太陰濕土氣必養
肉六月受少陽相火氣必養氣七月受陽明金氣必養骨八
月受太陽水氣必養血九月受厥陰木氣必養筋十月胎脯
俱備神明已全俟時而生此皆所養胎息之所成始成然也
若能養者惟在乃母依經所載而時養之无妄服食針灸勞

逸等不特傷胎亦乃自傷不可不備孝也為保傳母尤宜熟識之謹備列母之能養避忌諸法以繼諸後

避忌法

一月足厥陰脉養內屬於肝肝臟血不可縱怒及疲極筋力
胃觸邪風亦不可妄針灸其經二月足少陽脉養內屬於膽
膽合於肝共榮於血不可驚動及針灸其經三月手心主脉
養內屬右腎二主精不可縱慾及悲哀觸冒寒冷亦不得針
灸其經四月手少陽脉養內屬三焦二二精府合腎以養精
不可勞逸及針灸其經五月足太陰脉養內屬於脾二養肉
不可妄思及飢飽觸冒卑濕亦不可針灸其經六月足陽明
脉養內屬於胃二為臟腑海合於脾以養肉不得雜食及針
灸其經七月手太陰脉養內屬於肺二以養皮毛不可憂鬱
及叫呼觸冒煩躁亦不得針灸其經八月手陽明脉養內屬

於大腸合肺以養皮毛燥物致氣滯及針灸其經九月足
少陰脉養內屬於腎以養骨不可懷怒及勞勞觸冒生冷亦
不得針灸其經十月足太陽脉養內屬於膀胱以合腎太陽
為諸陽生氣故使兒脉續緩皆成六府通暢與母分氣神氣
各全俟辰而生唯不說手少陰心養者蓋心為五臟大主如
帝王不可有為也若將理得宜无傷胎臟更能知轉男胎教
之法斯為妥善叙列于后

轉女為男法

論曰陽施陰化所以有娠過三陰所會多生女子但懷娠三
月名曰始胎血脉不流象形而變是時男女未定故今於未
滿三月間服藥方術轉令生男也其法以斧置雌婦床下繫
刃向下勿令人知恐不信者令待雞抱卵時依此置窠下一
窠及出雄雞此蛋未試亦不可不知凡受胎三月逐物變化

故古人立胎教能令生子良善長壽忠孝仁義聰明无疾蓋
須十月之內常見好境界无近邪僻真良教也如有觸忤傷
胎治各有法據徐之才逐月養胎傷胎等方備則備矣事煩
少用故不暇錄識者當自閱今出安胎方如后

安胎散 治妊娠胎氣腹痛或胎熱多驚至重腰痛腹滿胞急
卒有所下或頻仆悶胸飲食毒物或感時疾宗熱往來致
傷胎臟

川芎

枳殼切 蘇合丸 熟地黃 三兩 糯米 二合
右為散每服四大錢水一盞薑半片棗一枚金銀
少許同煎至七分食前服

白朮散 治妊娠宿有風冷胎痿不長或失於將理動傷胎氣
多致損胎常服保護胎臟

白朮

川芎 各四兩 川椒去合口 白芨半斤 牡礪粉 粉一兩

右為末每服二錢溫酒米湯任調下腹痛加白芍藥心
下毒痛加川芎心煩嘔吐加細辛一兩半夏二十粒濕
洗入若渴者以大麥汁調服病重愈久服勿直味惡之
阻人宜作丸服亦治至女帶下諸疾

單胎散 治妊娠傷宗大熱悶亂燥渴恐傷胎臟

卷荷葉嫩者

乾一兩

蚌粉花半兩

右為末每服二錢入蜜少許新汲水調下食前服

漏且例

懷妊全假經血以養胎忽因事驚恐或從高墜下頓仆失據
或冒涉風寒觸忤邪祟致真平血胎乾不動奔上捨心腹中
急逼或血從口出皆傷胎證也

膠艾湯

治妊娠不問月數涿法因頓仆胎動不安腰腹痛或
有所下或胎奔上刺心短氣安胎

熟地黃二兩艾葉炒

當歸

甘草炙

芍藥

川芎

阿膠炙略

黃氏一兩

右為剉散每服四錢水一盞半前七分去滓食前溫服

子根 治胎无故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆如小豆汁者

野苧根

二兩剉炒

金銀各一兩

右為一劑水酒各一盞煎至一盞去滓分二服不以

胎前

治婦人宿有癥瘕妊娠經斷未及三月即動此

癥也經斷三月而得漏下不止胎動在脐上者為癥瘕害當去其癥又論妊娠六月動者前二月經水利時胎下血

者後斷三月下也所以下血不止者其癥不去故也當下其癥

桂心不燥

茯苓

牡丹皮

桃仁

各等分

右為末煉蜜丸如彈子大母服一丸嚼細溫酒米湯任下合服則服

胎前

養胎血安胎子藏胎源將理失其或因勞

役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露則下子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長而年不產日月盈滿

轉動无力或致損墜及瘕產即通車且驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連

日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出入冷冰新產惡血上衝運悶不省喘促汗出及淤血未久脐腹疔痛氣挾

往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心怔盜汗飲食不進漸成羸勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產二

後常服滋養血氣和調陰陽逐膝理脾治風虛除痼冷

甘草炙

貝母

秦椒

出相炒

乾姜

炮

挂心炒

黃芩

石斛去根

石膏

糯米炒

大豆卷

炒各一分當歸酒浸一宿麻子仁兩半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九並用溫酒或棗湯任下細嚼空心服

子煩證治

治妊娠

苦煩悶者以四月受少陰君火氣以養精六月受少陰相火氣以養榮其母必驚膽忒多好煩悶名子煩

防風去叉

黃芩

麥門冬去心

白茯苓

右為散每服四大錢水一盞半竹葉十數片煎七分去滓溫服

腹痛下利治法

治妊娠

腹中絞痛心下急滿及產後血暈內虛氣乏崩中久痢常服通暢血脈不生癰瘍消痰養胃

白芍藥

澤瀉

川芎

白朮

右為末每服二錢溫酒調下食前服元和紀用經云本

六氣經緯丸能祛風補勞養真陽退邪祛縵中安和神

志潤澤容色散邪氣溫瘴時疫安期先生賜李少君父

餌之藥後仲景增城為婦人懷妊腹痛本方用芍藥

治懷身

下痢赤白絞刺夜痛

雞子一個

黃丹

右為末每服二錢米飲調下一服愈者是男兩服愈者是女

凡冷熱利斷下門中還無毒者皆可

小便病證治

凡妊娠胎滿逼胞多致小便不利者或心腎氣不足不能使胞冷清濁相干為諸淋病或胞系了矣小便不通名曰轉胞又胎滿尿出不知時名遺溺治之各有方

當歸 治妊娠小便難飲食如故

當歸

具母炒

苦參各二兩滑石半兩

右為細末蜜丸小豆大米飲下二十九不拘時服

葵子 治妊娠小便不利身重惡寒起則眩暈及水腫者

葵子五兩

茯苓二兩

右為末每服二錢匕米飲調下小水利則愈又方入榆

白皮一兩

八天圓 治婦人病食飲如故煩熱不得卧而反倚息以胞系了矣不得溺故致此病名轉胞但利小便則愈以八味丸中有茯苓故也方見少陰脚氣門

白薇 治妊娠遺尿不知出時

白薇

芍藥各等分

右為末酒服方寸匕日二三服

胎水證治

凡婦人宿有風氣冷濕妊娠喜脚腫俗呼為皺脚亦有通身腫滿心腹急脹名曰胎水

鯉魚 治妊娠腹大胎間有水氣

白木

芍藥

當歸略三

茯苓四兩

右判散以鯉魚一頭修事如食法煮取汁去魚不用每服藥四錢入魚肝一支半姜七片陳皮少許單七分去

商陸 治妊娠手脚腫滿赤意

赤小豆

商陸乾各等分

右為對散每一兩水一椀煎至七分毒汗清服

腎養湯

治妊娘腰脚腫痛

茯苓 白木朮各四兩 乾姜炮 甘草各二兩 杏仁去皮 炒三

右為對散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

滑胎劑

凡懷妊已滿十月形体成就神識咸備分氣趣產宜服滑胎

湯藥

瘦胎易產胡湯

治主服効

枳殼剉 芩芩去 甘草二兩

右為末每服二錢空心沸湯點服至七月方可服焙月

忌登高厠

榆白皮

治臨產預服滑胎

槲枝 饗麥 木通 大麻仁各

右為對散每服五大錢水二盞煎七分去滓日二服

產雜證治

婦人懷憂无踰妊產頃刻之間便至天害故以陣面健兒為
比不亦危矣凡欲生產切不得喧鬧送一年高性善老娘并
純謹家人扶持不可揮霍致令產婦憂恐如腹中痛甚且令
扶行或痛多陣眼中出火方是兒轉至行不得方好上產產
自有時痛不甚者名曰弄痛須且熟忍時至自產莫妄費力
定是難產切忌悲孝穢汗家人來產訖亦不可見恐傷子須
依產畜方位无致觸犯禁忌為佳產畜見太醫局方

催生湯

治產婦陣踈難產經三兩日不生或胎死腹中或產

母氣之委頓產道乾澀繞齊陣痛破水便可投之

蒼朮二兩 枳殼一兩 陳皮六分 白芷

桂心 甘草各 當歸 川烏頭各

乾姜炮

厚朴製

蒼朮

半夏

茯苓

附子炮去

南星炮各

川芎

枳殼炒

南木香

杏仁炒去

阿膠

右為末每一大錢溫酒下竟執應用新汲水調白養服

黑金水銀

水銀二分

黑金一分

右用熟絹巾紐出水銀細研以汗衫角紐做九子葉豆
大煖坐草時香水吞一二丸立效仍須敬仰

產科論序

世傳產書甚多千金外臺會王產玉馬氏王氏崔氏皆有產
書巢安世有衛生室集子母秘錄羊胎則備矣但倉卒之間
未易屢試惟李師聖序郭稽中產科終驗愛集二十一篇備
凡十八方用之頗効但其間敘論未為至當始於料理簡辦

大題共
十六

於諸方之下以備識者非敢好辨也

產科二十一論評

第一論曰：此病胎死腹中者何？答曰：因母患熱病至六七日
以後臟腑極熱熏蒸其胎是以致死緣兒身死冷不能自出
但服里神散暖其胎須臾胎氣暖即自出何以知其胎之已
死但看產婦舌色青者是其候也

鬼神

桂心

當歸

芍藥

甘草炙

生乾地黄

乾姜炮

黑豆炒去皮

附子炮

右為末每服二錢空心溫酒調下法无附子有蒲黃

評曰：夫妊娠謂之重身一命係焉將理失宜肯能損胎不特
病薰者所致或因頓仆驚恐出入觸冒及素有癥瘕積聚壞
胎尿多候其舌青即知子死養胎論云：面青舌赤母死子生

唇青吐涎子母俱斃又有雙懷二胎或一死一活其候尤難
知自非臨歧觀變未易預述不可不備幸也然以黑神散溫
胎未若補助產母使其氣正免致虛乏困頓胎自下矣催生
湯殊勝黑神散

神效 治胎死腹中或產母氣乏委頓產道乾澀方見產前

第一論曰難產者何答曰胎側有成形塊爲兒枕子欲生時
枕破與敗血果其子故難產但服勝金散逐其敗血即自生
若逆生橫生並皆治之

神效

麝香一分 鹽豉一兩薄青布裹了燒

右爲末取秤槌燒紅以酒淬之調下一錢

評曰產難不只胎側有兒枕破與敗血果凝隨其胎息因緣
自有難易其如橫逆多因坐草太早努力過多兒轉未速或

已破水其血必乾致胎難轉若先露則謂之逆先露手謂之
橫法當以微針刺之使自縮入即服神應黑散以固其血必
自轉生養生方云君皇之間兩命所係不可不廣傳蓋養黑
散之功也或以益壅兒脚底抓搔之

神應黑散 治橫生逆生難產

百草霜 香白芷 各等分

右爲細末每服二錢童子小便好醋各一茶脚許調勻
更以神湯浸四五分服止一服見功甚者再服已分免
矣一名烏金散

第二論曰胎衣不下者何答曰母生子訖血流入衣中衣爲
血所脹是故不得下治之稍緩脹滿腹中以吹上衝心曾疼
痛喘急者但服奪命丹以逐去衣中之血血散脹消胎衣自
下而无所患更有牛膝湯用之其效錄以附行

養血丹

附子半兩炮 牡丹皮二兩 乾漆一分炒碎

右為末 醋醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥梧子大
温酒下五七丸不以時服

半膠湯 治產兒已出胞衣不下 脐腹堅脹急痛甚及子死腹
中不得出

牛膝酒浸 芫麥各四 滑石八兩 當歸酒浸
木通略 葵子五兩

右為散每服三錢水兩盞煎七分去滓不以時服

第四論曰產後血暈者何谷曰產後氣血暴盛未得安靜血
隨氣上逆亂心故眼前生花極甚者令人悶絕不知入口
禁神昏氣冷醫者不識呼為暗風若作此治之病必難愈但
服清魄散自差

清魄散

澤蘭葉一分 人參一分 薤白二兩 川芎半兩

右為末温酒熱湯各半盞調一錢急灌之下咽即開眼

氣短省人事

評曰產後眩暈頭刻等入須量虛實為治若胸中物有痰飲
阻病不除者後多致眩暈又血盛氣弱氣不使血逆而上攻
此等皆非清魄可療痰暈仍用半夏茯苓湯血暈酒用牡丹
散但缺藥尤難用當識輕重所謂按乎可接二亦无擾若
氣血平人因去血多致暈者宜倉湯尤佳

治產後血暈

狼損若口噤則拗開灌之必效

牡丹皮 大黃各 芒硝略 冬瓜子合桃仁

右為散每服五錢水三盞煎至麥平去滓入芒硝又

煎之二服欲產先煎下以備緩急金匱以此治腸鳴但
分兩少異

方見眩暈明

第五論曰產後口乾渴悶者何答曰產後茶衛大虛血氣未
定食類大昂胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胃中是以
口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胃膈壅滯以藥下之乃
不得一但服見現圓

見現圓

姜黃

京三稜

薑澄加

陳皮

人參

高良姜

蓬朮炮各

右爲末用薤白慢火煮爛研細將汁煮麪糊丸如梧子
大用薤白湯下二十九

評曰產後口乾渴悶未必止因食麪或產母內積憂煩外傷

燥熱飲食甘辛作口乾渴悶當隨其所因調之可也煩心宜
四物湯去地黃以人參烏梅煎若外傷燥熱看傷何經當隨
經爲治難以備奪飲食所傷見現圓却能作效

四物湯

方見下第六論

第六論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能
令乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則
乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宣越
故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作瘧疾
治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜奪命丹
又問二者何以別之答曰時有刺痛者敗血不散宜奪命丹
者陰陽不和增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯

當歸

人參

芍藥

川芎

乾姜

炮各一兩

甘草 炙四分

右到散每服四錢水一盞姜三片煎六分去滓熱服不
以時候

評曰乍宗乍挾榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止入
脾肺二臟耶大抵一陰閉一陽即作宗挾陰勝故宗陽勝故
挾只可云敗血循經流入閉諸陰則宗閉諸陽則挾血氣與
衛氣解則休遇又會而復作大調經散五積散入醋煎

治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛不調
陰陽相乘憎火發挾或自汗或腫滿皆氣血未平之所為也

大巨

炒去核

茯神 一兩

真琥珀 一分

右為末濃煎烏豆紫蘇湯調下

方見傷寒太陰經入醋煎妙

第七論曰產後四肢浮腫者何者為產後敗血與虛停積於

五臟循經流入四肢留淫日深却還不得留壞如水故令四
肢面目浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用導水
藥極虛人夫產後沈虛又以藥虛之是謂重虛狂二因致天
枉但服調經散血行腫消即愈

調經散

沒藥 別研

琥珀 別研

桂心

當歸 別研

細辛

麝香 各半別研

右為末每服半錢匕生姜汁溫酒各少許調勻服

評曰產後浮腫多端有白癩姪腫至產後不退者亦有產後
失於調理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血氣搏留滯經
絡氣分血分子不可不辨要當隨所因脈證治之宜得其情調
經散治血分固効但力怯難惠不若吳茱萸湯枳朮湯奪和
散大調經散此是聖藥也

加減更湯治婦人臟氣本虛宿挾風冷曾高滿痛

刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄利不止
少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾轉甚

吳茱萸湯散七枚 桔梗 乾姜炮 甘草炙

麥門冬去心 半夏湯洗七次 防風 細辛

當歸酒浸炒 茯苓 牡丹皮 桂心各半兩

右為麤末每服四錢水 盞半煎七分去滓食前執服

六湯治心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實剉炒 白朮三兩

右劉散每服四錢水盞半煎七分去滓溫服腹中軟即

當散也

寶壽散治婦人產後虛腫喘促利小便則愈

生薑三兩 白麩三兩 半夏七個湯洗

右以生薑汁搜麵裹半夏為七餅子炙佳熟為末熟水
調一錢小便利為效

天難經曰最治產後腫滿喘急煩渴小便不利方見第六論

第八論曰產後不見鬼神者何答曰心主身之血脈因虛傷

耗血脈心氣則虛敗血停積上干於心心不受觸遂致心中

煩躁則起不安不見鬼神言語顛倒醫工不識呼為血邪如

此治之必不得愈但服調經散每服加龍腦一捻得睡即安

調經散下見第七論每服加龍腦一捻

第九論曰產後不語並何答曰人心有七孔三毛產後虛弱

多致停積敗血閉於心竅神志不能明了又心氣通於舌心

氣閉塞則舌亦強矣故令不語如此但服七珠散

七珠散

人參 石菖蒲 川芎 生乾也

細辛一分 防風

朱砂各半兩

右為末每服一錢薄荷湯調下不以時服

第十論曰產後腰痛又瀉痢者何答曰產後腸胃虛怯法亦邪易侵若未滿月飲冷當風乘虛襲留於青膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水谷不化洞泄腸鳴或下赤白眩臂腹脹或走痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之則禍不旋踵謹之謹之

調中湯

高良姜

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎各一兩

甘草炙半兩

右為散每服三錢匕水三盞煎至一盞去滓挑服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之况云飲冷當風何所不至矣挾風濕本屬外因喜怒憂思還從自性况勞逆

飢飽皆能致病若其洞泄可服調中赤白帶下非此能

隨門類別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從諸

門選用之

沉香散治產後利下赤白裏急後重疔刺疼痛等證

桃膠炮

沉香

蒲黃細切炒

右為末每服二錢陳米飲調下食前服

白頭翁湯治產後下利虛極

白頭翁

甘草炙

阿膠略

黃連

藥皮炙

秦皮去蘆皮

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓空心服

第十一論曰產後遍身疼痛者何答曰產後百節開張血脉

流走遇氣弱則絡分肉之間血多留滯累月不散則骨節不利筋脉急引故腰背不得轉側手脚不能動搖身

也若醫以為傷寒治之則汗出而筋脉動搖手足厥冷
它病但服越痛散以黜除之

越痛散

牛膝酒浸甘草炙 薤白絡一當歸 挂心

白朮 黃芪各半兩 獨活半兩 生姜半兩

右剉散每服半兩水五盞煎至二盞去滓食前分二次

批服

評曰越痛散不特治產後氣弱血滯兼能治太陽經感風頭
夜腰痛自汗發熱若其感寒傷食憂恐驚怒皆致身發
批頭痛况有蓐勞諸證尤甚越痛散皆不能療不若五積散
入醋煎用却不妨

五積散 方見傷寒大陰經

第十一論曰產後大便祕澁者何答曰產則水血俱下腸胃

津液不足是以大便祕澁不通也若過五六日腹中悶

脹者有燥糞在臍膈以其乾澁未能出耳宜服麻仁丸以

津潤之若誤以為有熱而投以寒藥則陽消陰長變動百出

性命危矣

麻仁丸

麻仁研 枳殼麸炒 人參 大黃各等分

右為末蜜丸如梧子大空心溫酒下二十九丸未通又加

九數

評曰產後不得利二者百无一生去血過多藏燥大便祕澁
澁則固當滑之大黃似難輕用唯葱涎調臘茶為丸復以葱
茶下之必通

阿膠散 治產後虛羸大便祕澁

阿膠 枳殼麸炒 法

右為末蜜丸如梧子大別研滑石為衣溫水下二
半日來未通又服

第十三論曰產後血崩者何答曰產卧傷耗經脉未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因鹹酸不節傷蠱滯衛氣衰血弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服

固經圓

以上之

艾葉

赤石脂煨

補骨脂炒

木賊各半兩

附子去皮膽

右為末陳米飲和丸梧子大食前溫酒米湯下一十九
評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不
節而能致之多因憂驚怒氣不平或產後服斷無樂早
致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸似難責効不若大
料煖苦窮膏婦加芍藥湯候定續次隨證合品諸藥治之為得

第十四論曰產後腹脹悶嘔吐不定者何答曰收血散於脾
胃脾受之不能運化精微而成腹脹口豆之則不得受納水
谷而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥療之病與藥
不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯

抵聖湯

赤芍藥

半夏湯洗

澤蘭葉

人參

陳皮炒

甘草炙

右為散每作一劑用水二椀生姜半兩前至三盞去
滓分三次熱服

第十五論曰產後血暈黑赤定及鼻衄者何答曰陽明者經
脉之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產
後氣消血散葉衛不理散亂入於諸經却還不得故令

黑起及變鼻動此緣產後虛抗亦生此證其疾不可治
絕肺敗此證不可治不出方

第十六論曰產後喉中氣急喘者何答曰榮者血也衛者氣
也榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多
榮血暴竭衛氣无主独聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰為
難治若惡露不挾敗血停凝上薰於肺亦令喘急但服奪命
丹血去喘息自定

奪命丹

方見第一論

評曰產後喘急固可畏若是敗血上薰於肺猶可貴効奪命
丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等傷命丹未可均濟况孤
陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮以窮湯亦自可救傷風寒宜
旋覆花湯性理櫛發且小調經散用桑白皮杏仁煎湯調下
傷食宜見現丸五積散

旋覆花湯

方見眩暈門

治產後傷風感寒鼻逆欬喘滿痰涎壅塞坐臥
不寧

旋覆花

赤芍藥

半夏麩

前胡

荆芥穗

五味子

甘草炙

茯苓

麻黃去節

杏仁略炒

右為劑散每服四大錢水一盞薑姜五片棗一枚煎七
分去滓食前服

大調經散

方見第十七論

五積散

方見傷寒太陰經八續論

見現丸

方見第二論

第十七論曰產後中風者何答曰產後五七日內強乃下床
或一月之內傷於房室或讓髮髮怒傷脾和或因着

艾傷動臟腑得病之初眼澁口紫軌由體搖漸至腰脊
強直者不可治此乃人作非偶亦中風所得也

評曰問產後中風是外邪血虛則或有中之者自合以人
作不可治問答不相領解如何關示後人立論之難有如此
者若是中風當以麻痺看有何兼依經調之強力下床月內
房室憂怒着及非中風類虛勞性意火邪治各有法非產後
病不服藥引李者識之

第十八論曰產後心痛者何答曰心者血之主人有伏宿疾
因產大虛天轉於血血凝不得消散其氣遂上衝擊於心之
絡脉故心痛但以大石蜜湯治之疾去則血脉温而絡通
心痛自止若誤以爲所傷治之則虛極矣益甚矣心絡宗甚
傳心之正經則變爲真心痛朝發夕死夕發朝死藥不可輕
用如此

大藥譜

乾熟地黃

當歸

獨活

吳茱萸

乾姜

芍藥

桂心

甘草

小草

細辛

右剉散每服半兩用水三大匙至一盞去滓微熱服
評曰產後心痛非產後常病痛或有之九痛未必便是血
痛設是岩蜜湯豈可用熟地黃熟地黃宜血安能去痛此方
本出千金用生乾地黃耳藥更一升合唯五兩乾姜三兩細
辛治陳案在下佳方本一两却減作半兩制奇制耦量病淺
深自有四數不可妄意加減茲以岩蜜湯治血痛不若失笑
散用之有效

失笑散治心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

五靈脂

蒲黃

右未先用醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分

熱服

第十九論曰產後熱悶氣上轉為脚氣者何答曰產卧血虛生熱後因春夏取涼過多地之蒸濕因足履之所以著而為脚氣其狀熱悶壅塞驚悸心煩嘔吐氣上皆其候也可服小續命湯內三劑必愈若醫者誤以逐敗血藥攻之則血去而疾益增劇

小續命湯方見中風門

評曰脚氣固是常病未聞產後能轉為者往三讀千金見有產婦多此疾之語便出是證文辭善意可察見矣設是熱悶氣上如何令服續命湯此藥本主少陽經中風非均治諸經脚氣要須依脚氣方論陰陽經絡調之此涉專門未易輕論况非產後要病更不敏引

第二十論曰產後汗出多而變瘧者何答曰產後血虛肉理不密故多汗因遇風邪持之則變瘧也瘧者口禁不開背強而直如發攣狀搖頭馬鳴身反折項上終氣息如絕而速斡口灌小續命湯稍緩則汗出如兩手拭不及者不可治

小續命湯方見中風門

評曰產後汗出多變瘧亦令服續命湯此又難信况汗多如何更服麻黃桂枝方已真矣葦葦不若大且紫湯為佳大醫局方大聖散亦良藥也

大聖散方見救急單

第二十一論曰產後所下過多虛極生風者何答曰婦人以榮血為主因產血下太多氣无所主唇青面冷汗出目頭昏命在頃刻此但虛極生風也如此則急服活人上丹若以風藥治之則誤矣

乳香 大陰玄精 五靈脂 硫黃

陳皮 桑上寄生 阿膠炙 卷柏生各

右將上四味同研勻石苔內微火炒勿令焦了又研極細復入餘藥為末用生地黃汁和九梧子大溫酒或當婦酒下二十丸食前服

評曰所下過多傷損虛竭少氣厚青面冷汗出神昏此皆虛脫證何以謂之生風是外淫必因感冒中傷絡絕然後發動臟腑豈能自生風也虛之說蓋因脉經云浮為風為虛此乃兩病合說在人迎則為風在氣口則為虛後季无識便謂風虛是一病謬溢之甚者當當知

保慶集二十一論人用况多因評其說仍將得効方附行外有產科諸證併叙于后

三因極一病證方論第十七

三因極一病證方論卷之十八

羸勞證治

婦人因產理不順疲極筋力羸勞心慮致虛羸喘乏寒熱如瘡頭痛自汗肢射倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰羸勞

石子湯 治羸勞

猪腎一對去脂膜四破 香豉 葱白
粳米一斗以羊腎代之 當歸 芍藥各二

右為剉散分兩劑每一劑用水三升煮取一斗概去滓分三服任意服

陰脫證治

婦人趣產勞力努啻太過致陰下脫者脫肛狀及陰下挺出通迫腫痛幸重及勞昏能發作清水續小便淋露
疏黃散 治產後勞陰脫

硫黃 烏賊骨 各等一 五味子 一分

右為末 養應丸

當歸散 治陰下脫

當歸

黃芩 各二

芍藥 一分

蠟 一分

麝香 一分

牡蠣 兩半

右為末 每服一錢 溫酒米湯任意調下 忌登高 牽重

灸法

單炒蛇床子 乘熟布裹 熨患處 亦治產後陰痛

桃仁膏

治產後陰腫妨悶

桃仁 末

枯礬

五倍子 各五分

右以下味為末 研桃仁膏 拌勻 傅之

硫黃湯 治產勞玉門開而不閉

硫黃 四兩

吳茱萸

兔絲子 各半

蛇床子

右為散 每服四錢 水一椀 煎取半椀 淨洗玉門 且再洗

下乳治法

產婦有三種 乳脈不行 有氣血盛而壅閉不行者 有血少氣

弱溢而不行者 虛當補之 盛當散之 然者當用通草 漏若土

茨根 雀巢者 當用成煉 鍾乳粉 猪蹄鮑魚之屬 皆可見矣

漏若土 治乳婦氣脈壅塞 乳汁不行 及經絡凝滯 乳內脹痛

留毒邪毒 或作癰腫 此藥服之 自然內消 乳汁通行

漏若土 二兩

蛇蛻 十條

茨葦 一十枝 煮

右為末 每服二錢 溫酒調下 不以時 仍喫熱羹湯 助之

成鍊鍾乳粉 成鍊鍾乳粉 治乳婦氣少 血衰 脈溢 不行 乳汁絕少

成鍊鍾乳粉

右研細 每抄一錢 溫酒調下

母猪蹄湯 治如前

母猪蹄

通草 四兩

右以水一斗浸煮熟得四五升取汁飲不下更作

青桑葉

治乳硬作痛

嫩桑葉 右搗研細

右米飲調搗紙花貼病處千金云凡患乳癰四十已不

可治五十已上不可治之則死不治自得終其天年

惡露證治

產後見枕不散乃血凝堅聚按之攪手日脯增劇疼痛淋漓

不快上攻心胃困頓狼狽宜服黑龍丹當歸湯奪命丹治之

黑龍丹

治產後一切血疾垂死者但催藥尤有不効者神驗

不可言

當歸

五靈脂

川芎

高良姜

乾地黄

生薑各

並細剉入一椀頭沙合內亦石脂泥縫紙筋益泥固烙

封合炭火十斤煖通紅六火候冷開取合子者成黑糟

乃取出細研入後藥

百豆霜

別研

硫黃

乳香

各錢

花乳石

琥珀

各錢

右為細末米醋煮糊九如彈子大每服一圓炭火燒通

紅生薑自然汁与无灰酒各一合小便半盞研開頓服

立效

當歸湯

治產後敗血不散兒枕硬痛或發或止及新產乘虛

風寒內搏惡露不化胎腹堅脹

當歸 微炒

羌活 取升用

紅藍花 各一兩

石為坐散每服三錢酒一大盞煎七分去滓食前溫服

奪命丹

方見前集三論

虛煩證治

產者最難調理所以已問男女及不許見穢惡者皆古人預防其妄心也每見婦人以得男則喜得女則憂二喜太早致心虛煩悶多自此始蓋去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱內熱則煩其證心曾煩滿吸二短氣頭痛悶亂骨節疼痛時轉甚乃大病後虛煩相類

人參當歸湯

治產後虛煩不安

人參

當歸

麥門冬

乾地黄

桂心略乙芍藥二兩

右為散每服四大錢水二盞先將粳米一合淡竹葉十片煎至一盞去葉入藥并棗三枚煎七分去滓食前服地黄宜用生乾者虛甚則用熟

蒲黃散

治產後虛煩心効

蒲黃

上炒

右一味每服一錢匕東流水調下不以時候

虛渴證治

產後去血過多津液不回腎氣虛弱多使人煩渴引飲无度雖非三消其證頗同治之當養血通氣回津補腎方効

熟地黄湯

治產後虛渴不止少氣脚腫眼昏頭眩飲食无味

熟乾地黄一兩

人參三兩

麥門冬二兩

括樓根四兩

甘草半兩

右為散每服四錢水二盞糯米一握生薑三片棗三枚煎七分去滓食前服

按煎七分去滓食前服

六氣經

治前乃見前症腰腹痛門

淋閉證治

諸治產則後淋閉甚法不同產前當安胎產後當去血如其公熱膏石氣淋等為治則一但量其虛實而用之瞿麥蒲黃

最為產後要藥唯當歸主之，所因則不失機要矣。

牙根湯

治產後諸淋无問冷熱皆石結痲毒主之。

白茅根八兩

瞿麥穗

白茯苓略四 蒲黃

桃膠

滑石

甘草略 子貝十

葵子

人參略一 石首魚略 骨十

右為判散每服四大錢水一盞半薑三片灯心二十莖煎七分去滓温服不可為末煎不通湯調下一錢如氣壅閉不通橘皮煎湯調下

產後難病治法

當歸散

治產後惡血不散發渴疼痛及惡露不快臍腹

堅脹兼室女經候不勻赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸

赤芍藥 牡丹皮 延胡索略二 桂心一兩

右為末蜜丸如梧子大温酒米飲下三五丸食前温服

痛甚則嚼啞下

四神散

治產後留血不消積聚作鬼急切疼痛循如道尸及

心腹絞痛下利

當歸

芍藥

川芎

乾姜略 附子略

右為末每服方寸匕温酒調下

丁香散

治產後嘔逆

石蓮肉十

丁香十

右為末水半盞煎數沸照

當歸黃芩湯

治產後腰脚疼痛不可轉側壯熱自汗身弊強

氣短

黃芩二兩

當歸三兩

芍藥二兩

右劉散每服四大錢水一盞半姜五片煎七分去滓食

前温服

竹葉湯 治產後傷風發熱面正赤喘而頭痛

乾葛三分

防風

桔梗

桂心

人參

甘草炙各一分

附子炮去皮兩

右為劑散每服四錢水一盞半姜五片棗三個竹葉十

片煎七分去滓空腹服嘔者加半良

神效散

治婦人產後一切疾病不問大小以至危篤不能者

牡丹皮

白芍藥

桂心

陳皮

青皮略半

當歸

百合水

川芎

甘草炙

乾姜略

人參

神麴

麥蘖各三分 紅花一分

右為末每服二錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空腹

服孕婦不得服

調補法

產後氣血既衰五臟俱損雀得將術不可轉利難惡血未

亦不可便服補藥頃候七日外脐下塊散方可投之若痛甚

切者或崩傷血利虛羸喘乏別生它疾帶起宿患宜尋閱諸

方悉詳調理不必拘以日數也如黑神散却不妨

黑神散 治產後諸疾

當歸

白芍藥

甘草炙

白薑炮

桂心

里宜妙去

蒲黃

熟地黃各半分

右為末温酒或小便任意調下空心服忌如常一法去

蒲黃加附子

四順理中固

治新產血氣俱傷五臟暴虛肢躄羸弱之少氣多

汗逆產直至百晷每日常服壯氣補虛調養臟氣蠲除餘

疾消穀嗜食兼治產後臟虛嘔吐不止

甘草炙

人參

白朮

乾姜炮

右末煉蜜丸如梧子大每服二十丸温米飲下空心食

前服

富歸建中湯

治產後勞傷虛羸不足腹中疝痛吸少氣小

腹拘急痛連腰背時自汗出不思飲食產訖直至滿月每

日三服令人丁壯強健

當歸四兩

桂心三兩

白芍藥六兩甘草炙二分

右剉散每服四大錢水一盞半姜三片棗二枚煎七分

去滓入飴糖一匙再煎消服崩傷內動加阿膠地黃煎

丹

治產後百疾百日内常服除宿血養新血方見後

人參

治產後出月羸瘦不復常方見後

羊肉湯

治產後腹中疼痛虛勞不足裏急脇痛并治寒疝

當歸三兩

生薑一分

精羊肉四兩橘皮半兩

右剉散水三椀酒少許煎至一椀去滓分二服或少加

葱鹽亦佳

婦人女子眾論證治法

婦人三十六病未論所述名品不同或云七癥八瘕九痛十

二帶下共三十六雖有各數不見證狀又論云十二癥者是

所下之物不同一如清血二黑血三紫汁四赤肉五膿茄六

豆汁七蒸羹八痰血九清益十米泔十一如月浣十二經不

應期九痛者熱湯痛冷溢痛淋瀝痛小便時痛經來時痛脇

脹痛汁出如虫蠶痛脇下分痛腰膝折痛七害者驚孔不利

陰中寒熱小腹急堅臍內不仁子門揭膈洞泄惡吐五傷者

兩脇支心引脇痛氣結不通邪思便利前後痼寒三痛者

羸瘦不生肌斷縮不乳產經水閉塞亦各三十六病名品雖

殊無非血病多因經脈失於將理產後不善調護內作七情

外感六淫陰陽勞逸飲食生冷遂致榮衛不輸新陳不忤隨

經敗濁淋露凝滯為穢為痕流溢穢惡痛害傷相犯時微若

秋是作病重如山岳古人所謂婦人之病十倍男子之言之
太過亦明戒約之功也

白帶

治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒
咳逆煩滿拘急短氣心脇腰背腹肚与子藏相引痛溺下
五色心常恐懼遇恚憂勞即發皆是內傷所致

白帶服

白石脂服

烏賊魚骨

牡蠣服

龍骨服

烏賊魚骨

芍藥

黃連

白茯苓

當歸

桂心

人參

石草去毛

瞿麥穗

白芷

附子炮去

白鱗

甘草一兩 川椒炒去汗

右為末蜜九梧子大空心酒下三十九至五十九

有胎

治婦人久冷无子及數經墮胎皆因衝任之脉虛損
胞内宿挾疾病經水不時暴下不止月内再行或前或後

或崩中漏下三十六疾積聚癥瘕冷痛小便白濁以
上疾證皆令孕育不成以至絕嗣此藥治產後百病百
内常服除宿血生新血令人有孕及生子无疾亦治男子
亡血諸疾

木香炮

茯苓

京墨燒

桃仁炒去

秦光

甘草炙

人參

桔梗炒

石斛酒浸

蚕布燒

藁本各二

當歸

桂心

乾姜炮

細辛

牡丹皮

川芎各一

川椒炒

山藥各三

澤蘭

熟地黃

香附各四

蒼朮八兩

大豆卷炒 糯米炒

右為末蜜丸每兩作六丸每一丸嚼細食前溫酒醋湯
任下

烏雞前 治婦人百病

豆菜黃醋

良薑

白姜炮

當歸

赤芍藥

延胡索

破故紙

川椒

生乾地黄

刘寄奴

蓬莪朮

橘皮

青皮

川芎

荷葉皮

白熟艾

右為末醋糊丸如梧子大每服三五十圓具湯使如右

月經不通紅花蘇木酒下

白帶牡礪粉調酒下

子宮久冷白茯苓煎湯下

赤帶建茶清下

血崩豆淋酒調綿灰下

胎不安蚤和酒下

腸風陳米飲調百草霜下

心夜高瀆煎酒下

漏阻下血烏梅溫酒下

耳聾蟬黑黍湯下

胎死不動斑猫二十个煎酒下

腰脚痛當煇酒下

胞衣不下益薑研水下

頭風薄荷煎茶下

血風眼黑且甘草湯下

生瘡地黄湯下

身熱疼痛黃芪末調酒下

四肢浮腫麝香湯下

咳嗽喘痛杏仁桑白皮湯下

腹痛芍藥調酒下

產前後利白者白姜湯下

赤者甘草湯下雜者宜

湯下常服溫酒醋湯任下並空心食前服

延齡丸治婦人眾病无所不治

熟地黄

川芎

防風

檳榔

蕪荑

蟬蛻

桐子仁

馬牙消

黃芪

白薇

川椒

鯉魚鱗

木香

附子

石膏

澤蘭

厚朴

甘草

白姜

紅花

右為末煉蜜搜和杵數千下丸如彈子大每服一九具

湯使如右

血瘦塊痛綿灰酒下

催生溫酒細嚼下

血勞血虛桂梗酒下

血崩撥攔灰酒下

血氣痛炒白姜酒下

血風荆芥酒下

血暈悶絕坐死腹中胞衣不下並用生地黃汁童子小便酒各一盞煎二沸調下常服醋湯溫酒化下並空心

食前服

交感丸

治婦人產前產後眼見黑花或即發狂如見

鬼狀胞衣不下失音不語心腹脹滿水穀不化口乾煩渴寒熱往來口内生瘡咽中腫痛心虛忪悸夜不得眠產後

中風角弓反張面赤牙關緊急崩中下血如豚肝狀臍腹疼痛血多血少結為穢痕恍惚昏迷四肢腫滿產前胎不

安產後血刺痛

生地黃二斤研以布當歸一兩延胡索糯米炒

生薑二斤此研如上法以生薑汁炒地黃汁

蒲黃四兩如香 南薑琥珀別研伏牛子代

右為末蜜為丸彈子大當歸湯化下一丸食前服

救血圓 調補衝任溫暖血海治胞絡傷損血乾血不散受

胎不牢多致損墮常服去風冷益血

當歸 牛膝酒浸 延胡索炒 芍藥

茴香 蒲黃紙包 香附去毛 蓬木根

菊花 熟地黃 桂心各二兩 烏豆煮為末

右用醋煮烏豆乾取豆為末再入二椀煮至一椀留在

作糊為丸如梧子大酒飲任下五十九

人參丸 治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調血

脈宣壅破積退邪祛除呆痴緩中下堅張安神潤顏色通

氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食期傷眩暈及

產出月贏瘦不復常者

人參 赤芍藥 川芎 苧蒲各一

當歸二兩 熟地黄五兩 烏梅肉三兩

右為末 蜜搜杵數千下 丸如梧子大 每服五十九至百丸 溫酒米湯任下 食前服

四物湯

調經養血 治衝任虛損 月水不調 崩漏 腹痛 崩中 漏下 血痕 塊硬 發歇 疼痛 妊娠 宿冷 將理 失宜 胎動 不安 血下 不止 及產後 乘虛 風寒 內搏 惡露 不下 結生 痕聚 小腹 堅痛 時作 寒熱 又治 血氣 虛冷 崩中去血

熟地黄

當歸

川芎

白芍藥

右為散 每服四錢水一盞 半煎七分 去滓 空心服 忌葱 薤 蒜

溫經湯

治衝任虛損 月候不勻 或來多 不斷 或過期 不來 或崩中 去血 過多 不止 及治 曾經 損道 損胎 瘀血 停留 小腹 中痛 發熱 下利 手心 煩熱 唇白 乾燥 治小腹 有寒 又不可

受胎

半夏

去滑

當歸

川芎

人參

白芍藥

牡丹皮

桂心

阿膠

甘草

吳茱萸

麥門冬

右為散 每服三錢水一盞 半煎生薑五片 煎八分 去滓 執服 空心 食前

杜丹散

治血虛勞倦 五心煩熱 肢身疼痛 頭目昏重 心忪煩 赤口燥咽 乾發熱 盜汗 減食 賢目 及血熱 相搏 月水不利 崩腹 脹痛 赤熱 如瘡 又治 室女 血弱 陰虛 榮衛 不和 痰嗽 潮熱 肌身 羸瘦 漸成 骨蒸

牡丹皮

芍藥

甘草

沒藥

延胡索

紅花

當歸

烏藥

陳皮

蘇木

鬼箭

蓬朮

右為末每服二錢白水煎七分忌生冷

伏龍肝散

治氣血勞傷衝任脉虛經血非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼脘腹冷痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸使人无子

伏龍肝

赤石脂

煨醋

牡蠣

煨取粉

烏賊骨

烏餘糧

煨醋

桂心

各半分

右為細末空腹酒飲任調下二錢白多者加牡蠣烏賊骨亦多者加赤石脂烏餘糧黃多者加伏龍肝桂心隨病加之一法有龍骨

艾煎丸

治崩傷淋瀝小腹腹痛常服補榮衛固經脉

食茱萸

煨醋

當歸

各半

熟地黃

白芍藥

各半

熟艾

四兩用酒

石菖蒲

川芎

人參

各一

熟艾

四兩用酒

滋血湯

右為末煮酒養粉為九梧子大每服五十九酒飲任下治婦人血風血熱血虛經候滯帶經脉不通四肢麻木肌躄渾身疼痛倦怠將成瘰癧

馬鞭草

荆芥穗

各四

桂心

當歸

枳殼

煨醋

赤芍藥

川芎

牡丹皮

一兩

右為末每服四大錢水一盞半烏梅一枚煎七分去滓空心服

抵當湯

治婦人經水不利

水蛭

剉

蟅虫

炒

桃仁

三十

大黃

三

方

右為末每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服血未利更服亦治男子有瘀血膀胱痛

万病丸

治室女月經不通脐下堅結大如杯升發往來下痢羸瘦此為血瘕若生肉癥不可為也

乾漆并細切入鹽出牛膝酒浸 兩六分 生地黄四分 兩八

右以地黃汁入下二味為末煨火熟俟可丸即丸如梧

子大空心米飲或溫酒下二九日再勿妄加病去止藥

婦人氣血虛經不行若服破血行經藥是殺之也謹之

養石 養石二分 杏仁一分去皮

右研杏仁細入養灰加少養丸如棗大綿裹內陰中未

知再作

三稜 治婦人血癥血瘦食積痰滯

三稜 蓬木各四分 青皮 半夏湯洗 麥藥各三

右用好醋六升煮乾焙為末蒲糊丸梧子大醋湯下三

四十九丸積痰湯下

烏金散 治婦人血氣血癥血風勞心煩躁筋骨疼痛四肢

好黑豆拾兩 沒藥 當歸各半兩 麝香

右先將黑豆不犯水淨拭用沙瓶一隻入豆在內以瓦

片蓋盡泥固濟留甯通氣炭火一斤煨煙尽存性以塩

泥塞瓶甯退火次日取出豆如鷓鴣翼研細方入後末研勻

不拘時候溫酒調下二錢重者不過三五服忌鯉魚毒

由水母之類

烏金散 治腸覃病因寒氣客於腸外与胃氣相薄正氣不榮

擊寒殺內着寒氣乃起其生也始如雞知久久乃成狀如懷

胎按之堅推即移月事時下故曰腸覃亦治乳餘痰大小

便不利并食有伏虫膈脹癰疽毒腫又寒邪氣

烏喙施去 狻半夏煨 石膏煨 菝藟炒 牡蛎

茯苓酒洗 猥子桂心 乾薑各一字 巴豆七個

古末蜜丸如棗豆大每服三五丸食後酒飲任下治男

子痲痛

木香散 治婦人脾氣血氣血虫氣虫水虫石虫

木香 沉香 乳香 甘草 炙猪川芎

胡椒 陳皮 人參 晉礬 蛤半 桂心

乾薑 炮 縮砂 酪 茴香 炒 一天茄 各兩 赤石

右洗焙為末空心日午溫陳米飲調下一錢忌羊肉

石虫散 治婦人血結胞門或為癥瘕在腹脇間心腹脹滿腫急如石水狀俗謂之血虫

石莖 一两 當歸尾 馬鞭草 酪 紅花 炒 羊角

烏梅 肉 酪 蓬茂 炮 三稜 炮 蘇木 節

沒藥 琥珀 別研 各甘草 酪

右為末濃煎蘇木酒調下二錢不飲酒薑棗煎湯調服

大腹皮散 治婦人血壅單二腹腫

大腹皮 防己 木通 厚朴 薑製

枯樓 黃芪 枳殼 麩炒 桑白皮 炙

大黃 蒸 陳皮 青皮 五味子 酪 炒

右剉散每服秤一兩水一椀煎至六分蓋去滓入酒一分溫服不以時候

大腹皮散 治婦人小腹痛如敷二狀小便微難而不渴產後者為水与血并結在血室也

大黃 剉 內 甘遂 炮 阿膠 炒 酪

右剉散每服三錢水一盞煎七分去滓溫服其血當下

小麥湯 治婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適

將此為熱入血室其血必結故使如瘡狀發作有時

方見少陽經傷風傷寒門云傷風必須有汗宜加桂心

小麥湯 治婦人戴躁喜悲 欲哭狀若神靈所作數呻欠

冷血氣

小麥一升 甘草 再加黑豆

右為對散每服半兩水一盞裏四枚煎至六分去滓空

心温服亦補脾氣

牡丹丸 治婦人月病血刺疼痛方見疝氣門

黃芪五物湯 治婦人血痺方見痺門

竹茹湯 治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹 熟地黃 杏仁 白芍藥 桔梗

川芎 當歸 甘草 炙桂心 各一兩

右為對散每服四錢水一大盞煎七分去滓不以時候

膏天丸 治婦人穀氣寔胃氣泄陰吹而正噎

頭髮灰 猪肪

右調勻綿裹如荔枝大納陰中

蠶瘡證治

凡婦人少陰脉數而滑者陰中必生瘡名曰蠶瘡或痛或痒如虫行狀淋漓膿汁陰蝕殘皮皆由心神煩鬱胃氣虛弱致氣血留滯故經云諸痛痒瘡皆屬心又云陽明王肌肉痛痒皆屬心治之當補心養胃外以薰洗坐導藥治之乃可

補心湯 方見心臟虛實門

狼牙湯 治婦人陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢

狼牙一味剉濃煎汁以綿纏筋頭大如蚕豆浸濃汁澀陰

雅黃丸 方見狐惑門凡蝕於肛者單燒雅黃末熏之蝕於

下部則因乾苦參湯洗

養腎湯 方見五痿門

小兒論

凡小兒病与大人不殊唯向 水脐風夜啼重舌變暴客忤積

男

熱驚癇解顛癇病疳病不行數證大人死之其如傷風傷寒
 斑瘡下痢用藥則一但多少異耳諸方前已類編可披而得
 故不重引然養小之書隋唐間猶未甚該博宋則有錢
 氏要方張氏妙選胡王備錄勿勿新書及單行小集方論證
 狀動計千百不勝備矣今畧取保生要方具前數證以防緩
 急之需博推君子不妨廣覽

小兒初生回氣法

小兒初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿
 絮包裹抱懷中未可斷臍帶且將胞衣置炭火爐中燒之仍
 燃大紙燻醮油點灯於臍帶上往來偏帶燎之蓋臍帶連兒
 臍得火氣由臍入腹更以熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭
 如常方可浴洗了即斷臍帶

小兒初生所服藥法

小兒初生急以綿裹拭拭口中心惡血若不急拭啼声一出
 即入腹成百病矣亦未須与乳且先与拍破黃連浸湯取濃
 汁調朱砂細末抹兒口中打取腹中積滯方可与乳兒若多
 睡聽之勿強与乳則自然長而少病

小兒初生通大小便法

小兒初生大小便不通腹脹欲絕者急与葱熨以溫水先嗽
 口了吸咂兒前後心并臍下手足心共七每一処凡三五
 次嗽口吸咂取紅赤為度須臾曾通不尔无生意有此證
 此方可謂再生

小兒臍風撮口證

小兒初生一七日內忽患臍風撮口百无一活坐視其勢者
 皆良可憫有一法極驗世罕有知者凡患此風撮上有
 小泡子如粟米狀以溫水盪熱帛裹手指輕擦破即愈

便安不用服藥神效

千金變蒸論

凡小兒生三十一日一變而為二蒸十變而五小蒸又
三大蒸積五百七十六日大小蒸都畢乃成人小兒所以變
蒸者是榮其血脉改其五臟變者上氣蒸者體熱其輕者
熱而微驚耳冷尻冷上唇頭白泡起如魚目碎子微行其
重者休壯熱而脉乱或汗或不汗不欲食食難下現目白睛
微赤黑睛微白變蒸畢自明矣此其證也單變小徵者蒸小
劇凡蒸平者五日而衰遠者十日而衰先期五日後之五日
為十日之中熱乃除耳或違日數不除切不可妄治及灸刺
但少与紫丸微下之熱歇便止若身熱耳熱尻亦其此乃他
病可作別治

茶七治小兒變蒸發熱不解并絞傷寒温壯汗後熱不歇及

腹中有痰癖哺乳不進乳則吐呢食糲先寒後熱者

代赭石 赤石脂略 豆三十粒 柏去 杏仁 手裏拳炙

右以上二味為末別研豆杏仁為膏相和更搗一二
千杵當自相得若硬入少蜜同杵之蜜器中收三十日
兒服如麻子大一粒与少乳汁令食後与少乳勿
令多至日中當小下熱除若未全除明日更与一粒自
日兒服如小豆一粒以此準定增減夏月多致毒家
疹二三十日輒一服桂紫負元所不治雖不下虛人

夜啼四證

小兒夜啼有四證一日寒二日熱三日重舌口瘡四日客寒
寒則腹痛而啼面青白口有冷氣腹亦冷曲腰而啼此寒證
也熱則心躁而啼面赤小便赤口中熱腹脹啼時或有汗仰
身而啼此熱證也若重舌口瘡則要乳不得至乳上即啼身

身額皆微熱急取燈照口若元瘡舌必腫也口內者具生之氣
氣杆化而啼也

蒜丸 治冷證腹痛夜啼

大蒜一兩 研爛火煨香熟 出出 乳香半錢 別研

右研勻丸如芥子大每服七粒乳空時乳頭以乳汁送下

燈花散 治熱證心躁夜啼

燈花三兩

右研細用灯心煎湯調塗口中以乳汁送下日參服

蒲黃散 治小兒重舌

真蒲黃出 燒出 細地

右研細每匙些小揅舌下時時揅之愈愈更以溫水蘸

熟帛裹指輕按掠之按罷揅藥

牡蠣散 治小兒口瘡

牡蠣煨通 取出 候冷 研細 以紙 裹了 甘草炙 末壹

右和勻時時揅少許揅口中或噉或吐皆无害

小兒疳積散

用本家廂下火柴頭一个火煨穿以朱書云吾是二天上

五雷公將來作神將能收夜啼鬼一縛永不放急急如

律令柴頭以火燒焦頭為上書了勿令見知立在床下

倚床前脚裏男左女右

黃土散 治小兒疳積

竈中黃土 蚯蚓屎各等分

右研勻和水塗兒頭上及五心良

積熱證治

小兒積熱者表裏俱熱遍身皆熱頰赤口乾小便赤大便燥
黃先以四順清涼飲子利動臟腑熱則去黃散去復熱者內

執已解而表熱未解也當用惺惺散紅線散加麻黃湯發汗表熱迺去表熱去後又發熱者何也世醫到此尺不能發汗再用涼藥或再解表或以謂以謂不可治謂致天傷者甚裏真虛氣不歸元而陽浮於外所以再發熱非表證也只用六神散入粳米煎和其胃氣則收陽氣歸內身體便安此二者用銀白散

四順散

治小兒頭昏頰赤口內赤小便秘赤大便少此裏證也

大黃溫熱畏

當歸先

赤芍藥

甘草

各等分

右為末三歲以上小兒每服一大錢水一盞煎七分作二服食後服（法用芍藥欲利小便則用赤者虛者者如甘草下利者減大黃冒風邪加麻黃去即中風自體強戴眼者加獨活並於一兩中加減也）

惺惺散

桔梗

細辛

人參

甘草炙

白茯苓

芫荽根

白朮

右等分為末每服一錢匕水一小盞薄可三葉同煎四分溫服不拘時候

紅綿散

白檀香一兩直

天麻一兩

天南星一兩

蘇木一兩

白朮一兩

右為末每服一錢水一小盞入紅綿少許煎六八分溫服凡小兒風熱頭目不清並宜服之若傷寒有表証發熱者每服入去節麻黃末半分以下有裏熱者入滑石末半錢以下同煎服之

六神散

人參

白茯苓

山藥

白朮

白扁豆

甘草炙

右爲末每服一大錢水一小盞薑棗一個姜三片煎
至五分通口服此藥用處甚多治胃冷加附子治風証
加天麻治利加瞿粟殼

銀白散

乾山藥 白朮

白茯苓

各半兩

人參

白扁豆 知母 甘草

升麻各等分

右細末每服一錢水一小盞棗一個煎七分溫服不拘
時候

急慢驚風證治

小兒發癘俗云驚風有陰陽二證身熱面赤而發搐搦上視
牙關緊硬者陽證也因吐瀉或只吐不瀉日漸困面色白脾
虛或冷而發驚不其搐搦微々同上視手足微動者陰証也
陽證用涼藥陰證用溫藥不可一既作驚風治也又有一証

欲發瘡疹先身熱驚跳或發搐搦此非驚風當服

陽和

朱砂一分

膩粉

麝香半

麝香

白附子

甘草絡

胡黃連

白僵蚕十個

金箔七片

赤脚蜈蚣一條炙

右爲末二歲以上服半錢匕以金銀薄湯調下三歲
以上一錢匕如口不開灌入鼻中

陰簡

黑附子姓賦

生天南星

半兩

白附子二兩

右以細井花水浸七日每日換水浸乾控乾入朱砂二

錢麝一錢拌勻每服一字薄湯調下量與愈方

用附子生去皮脂爲末每服二分以水盞半姜厚

片同煎至半盞分三四服果見加瀉吐者入丁香五箇

同煎乳空時服或用水浸炒食為良如粟米大每服二十粒亦可○餘方見癩癩門

解顛治法

三辛散

治小兒頭骨應合而不合頭骨開解名曰解顛

細辛

桂心略半

乾姜七次半

右為末以乳汁和傳顛上乾復傳之見面赤即愈

又方

蛇蛻炒焦為末

右用猪頰車中髓調傳頂上日三四度曾有人依頭巾裹遮護之久而自合亦良法也

癩病證治音拔

千金論小兒有癩病者是娠婦被惡神導其腹中令見病也癩亦小兒也其證微下利寒壯去來毫毛鬚髮落寧不脫

者是也宜服龍膽湯凡婦人先有小兒未能行而母更有癩使兒飲此乳亦作癩也令兒黃瘦骨立發落髮落

龍膽湯治嬰兒出腹血脉盛實寒熱温壯四肢驚掣吐乳者

若已能進哺中食實不消壯熱及寒熱不解中客之鬼氣并諸驚痛

龍膽

柴胡

黃芩

桔梗

鈔藤皮

芍藥

甘草炙

茯苓二枚

大黃二兩

右為散散以水一升煮取五合為一劑十歲以下小兒皆

皆可服若兒生一日至七日分合為三服八日至十五

五日分一合半為二服至十六日至二十日分一合為

三服二十日至三十日四日五分以五合為三服皆以

得下即止此劑為出腹嬰兒所依若日月長大者依

依此為列心

自前元... 半一百日... 加半兩餘... 症病證治

小兒疳病者多因關乳喫食太早所致或因久患疳疔胃
虫動日漸羸瘦腹大不能行髮髮發也元精神肥現食主之
肥兒丸

黃連 神曲 醋 大麥 桑葉 半炒 木香 二錢

檳榔 見外 史君子 肉苳蔻 各半兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服三十丸量現大小
數加減熟水吞下

六神丸治如前證

丁香 木香 肉苳蔻 各半兩 二錢 開水吞下
訶子 半兩 史君子 蘆薈 各半兩

右為末麩糊負如羅薑子大每服三十負量現大小加煎
熟水吞下

六神負治如前證

丁香 木香 肉苳蔻 各半兩 二錢 開水吞下
訶子 半兩 史君子 苦艾 各半兩 無研入

右為末以棗肉和負如麻子大每服伍七負溫米
飲下乳食前服

龍膽負治疳病發壯

龍膽草 黃連 史君子 肉 青橘皮 各半兩

右為末猪膽汁和為負如蘿蔔子大每服三
十粒以意加減臨時熟水下

不行證治

五加皮散治小兒三歲不能行者由受氣不足體力虛

怯腰脊脚膝筋骨軟故不能行

貞五加皮

右為末粥飲調酒少許每服一粟殼許日三服
三因極一病證方論卷之十八終

