

君子湯以補脾土丁香木香以培陽氣○若脾土虛寒腎水  
反來侮土而致中寒腹痛吐瀉少食等證者用益黃散以補  
脾土而瀉水庶幾不致慢驚矣○但治小兒當審察虛實凡  
證屬有餘者病氣也不足者元氣也故有餘當認爲不足思  
患預防斯少夫矣

慢驚風十五

慢驚之候多由吐瀉因致氣微神緩昏睡露睛痰鳴氣促驚跳  
搐搦或乍發乍靜或身涼身熱或肢體逆冷或眉唇青赤面  
色淡白但其脈遲緩或見細數此脾虛生風無陽證也○小

兒慢驚之病多因病後或以吐瀉或因誤用藥餌損傷脾胃所致然亦有小兒脾胃素弱或受風寒則不必病後及誤藥者亦有之總屬脾腎虛寒之證○治慢驚之法但當速培元氣卽有風痰之類皆非實邪不得妄行消散再傷陽氣則必致不救○凡脾土微虛微瀉而內不寒者可平補之宜六神散四君子湯或五味異功散○脾腎俱虛而臟平無寒者宜五福飲且陰血生於脾土又宜四君子加當歸棗仁○脾氣陽虛微寒者宜溫胃飲理中湯五君子煎○脾氣虛寒多痰者宜六君子湯或金水六君煎○脾腎陰陽俱虛而寒者惟

理陰煎爲最妙○脾腎虛寒之甚或吐瀉不止者宜附子理

陰煎再甚者宜六味回陽飲或四味回陽飲量兒大小與之

○脾腎虛寒泄瀉不止者宜胃關煎

薛氏曰保嬰集云急驚屢發屢用攻瀉則脾損陰消而變爲慢

驚著多矣當補脾養血佐以安心清肺制木之藥最爲切當

竊謂前證多因脾胃虧損肝木所勝外虛熱而內真寒也但

用五味異功散加當歸佐以釣藤飲以補脾土平肝木亦多

得效如不應用六君加炮薑木香溫補脾土更不應急加附

子以回陽若用逐風驅痰之藥反促其危也○愚按附子溫

中回陽爲慢驚之聖藥也如元氣未脫用之無有不效氣脫甚者急宜炮用之

保嬰撮要曰凡元氣虧損而至昏憤者急灸百會穴若待下瘀不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療因脾虛不能攝涎故津液妄泛而似痰者但當以溫補脾胃爲主若不審其因泛用祛風化痰之劑則脾氣益傷陰血益損病邪益甚而危矣

婁全善曰木虛則摘而無力火虛則身寒口中氣冷土虛則吐

瀉睡而露睛治宜溫補脾胃用六君子湯五味異功散之類

大驚卒恐 十六

小兒忽被大驚最傷心膽之氣口問篇曰大驚卒恐則氣血分離陰陽破散經絡厥絕脈道不通陰陽相逆經脈空虛血氣不次乃失其常此內經槩言受驚之病有如此矧小兒血氣尤非大人之比若受大驚則其神氣失散潰亂不堪尙何實邪之有斯時也收復正氣猶恐不暇顧可復爲清散耶卽如硃砂琥珀之類不過取其鎮重之意亦非救本之法今幼科諸書皆以大驚之證例作急驚論治誤亦甚矣不知急驚慢

驚一以風熱一以脾腎之虛皆不必由驚而得而此以驚恐致困者本心膽受傷神氣陡離之病所因不同所病亦異胡可以同日語也

治大驚氣散之病當以收復神氣爲主宜秘旨安神丸七福飲茯神湯團參散獨參湯之類加金銀等物煎服之

驚啼十七

小兒驚啼證本與驚風不同亦與大驚卒恐者有異蓋小兒肝氣未充膽氣最怯凡耳聞驟聲目視驟色雖非大驚卒恐亦能怖其神魂醒時受怖寐則驚惕或振動不寧或忽爾啼叫

皆神怯不安之證總宜安神養氣爲主如獨參湯園參散七  
福飲秘旨安神丸之類皆其所宜○若微煩熱者宜生脉散  
熟甚者宜硃砂安神丸或導赤散○驚哭多淚忽啼忽止者  
是驚惕啼叫無淚聲長不揚者是腹痛

發搐十八

搐抽搐也是卽驚風之屬但暴而甚者謂之驚風微而緩者謂  
之發搐發搐不治則漸成驚風矣雖錢氏等書皆以時候之  
氣分五臟之證爲論治然病變不測有難以時氣拘者是不  
若察見在之形證因臟腑之虛實隨宜施治者之爲得也總

之小兒之實證無他惟東方之實及中央之滯耳蓋東方木  
實則生火生風而爲熱爲驚中央土實則生濕生滯而爲痰  
爲積知斯二者則知所以治實矣○若小兒之虛證則五臟  
皆有之如心虛則驚惕不安肺虛則氣促多汗脾虛則爲嘔  
吐爲暴泄爲不食爲痞滿倦臥爲牙緊流涎爲手足牽動肝  
虛則爲筋急血燥爲抽搐勁強爲斜視目瞪腎虛則爲二便  
不禁爲津液枯槁爲聲不出爲戴眼爲肢體厥逆爲火不歸  
源知此五者則知所以治虛矣○然此虛實之證固亦多有  
疑似者但以形色聲音脈息參而察之則無有不燎然者諸

治實之法當從急驚治虛之法當從慢驚及如後夜啼謹治  
法已盡其蘊當并察之總之諸言實者乃邪氣之實非元氣  
之實也故治此者切不可傷及元氣若病已久尤當專顧脾  
腎則根本完固諸無不愈矣

錢仲陽曰驚癇發搐男左視無聲右視有聲女右視無聲左視  
有聲此相勝也蓋左爲肝部右爲肺部金木相勝故耳○若  
握拳拇指在內女爲順拇指在外男爲順順則易治逆則難  
治

薛氏曰寅卯辰時搐而發熱作渴飲冷便結屬肝膽經虛熱用

柴芍參芩散作渴引飲自汗盜汗屬肝胆經血虛用地黃丸  
口吻流涎屬肝木尅脾土用六君子湯○巳午未時發搐若  
兼作渴飲水屬風火相搏以地黃丸補肝導赤散涼驚驚丸治  
心若作渴飲湯體倦不乳土虛而木旺也用地黃丸以補腎  
六君子湯以補脾○申酉戌時微搐而喘目微斜身似熱睡  
而露睛大便淡黃屬肺虛熱用異功散若手足逆冷或喘  
瀉不食屬肺虛寒用六君炮薑木香久病而元氣虛者用  
六君子六味丸二藥主之○亥子丑時微搐身熱目睛緊斜  
吐瀉不乳厥冷多睡屬寒水侮土用益黃散未應用六君薑

桂○傷風發搐口中氣熱呵欠手足動者名假搐用大青膏  
發散風邪○傷風發搐口氣不熱肢體倦怠用異功散補脾  
土鈞藤飲清肝木○若因風邪內鬱發熱而變諸證者當理  
肺金清風邪○若外邪既解而內證未除當理肺補脾○若  
停食發搐嘔吐乳食者宜用消食丸○若傷食後發搐身熱  
困睡嘔吐不思乳食者當先定搐後用白餅子下之○若食  
既散而前證仍作或變他證者脾土傷而肝木乘之也用六  
君子加鈞藤鈎以健脾平肝○若肺經虧損而致驚搐等證  
者當補脾肺以平肝心則驚搐自止矣○如手足冷汗搐者

搐肚日夜不止名真搐當用人參湯川烏全蝎等藥平其胃氣○百日內發搐真者內生風二三次必死假者外生風雖頻發不死○百日內搐亦有因乳母七情厚味所致者當兼治其母而以固胃爲先不可逕治其兒也○若涎入心脾則不能言用涼心鎮驚下痰之藥逆搐者不治○若吐瀉後變證者亦不治○大凡發搐因風者則面青目赤因驚則呌呼搐搦因食則喫吐氣悶肺虛則生粘痰喉間作鋸聲此乃心火不能生脾土脾土不能生肺金以致肺不能主氣脾不能攝涎故涎氣泛上而喉中作聲耳若用祛風治痰之劑則

氣散陰消而促其危矣

夜啼十九

小兒夜啼不安按保嬰等書云夜啼有二日脾寒曰心熱也夜屬陰陰勝則脾臟之寒愈盛脾爲至陰喜溫而惡寒寒則腹中作痛故曲腰而啼其候面青手腹俱冷不思乳食是也亦曰胎寒宜釣藤飲寒甚者理中丸○若曲腰啼叫哭而無淚者多係腹痛宜木香散或用溫胃飲加木香○若脾腎寒甚而兼帶作痛者宜陳氏十二味異功散○若過用乳食停滯作痛邪實無虛而啼者宜保和丸和胃飲加減主之甚者宜

消食丸○若陰盛陽衰心氣不足至夜則神有不安而啼叫者宜四君子湯五味異功散或七福飲秘旨安神丸○若面白青手冷陽氣虛寒心神驚怯而啼者宜五君子煎或六味異功煎甚者宜七福飲加炮乾薑肉桂○若兼泄瀉不乳脾腎虛弱也宜六神散甚者養中煎胃關煎○若兼吐瀉少食脾胃虛寒也宜五君子煎溫胃飲或六味異功煎加炮木香○若大便不化食少腹脹脣氣虛弱也宜五味異功散或五君子煎加木香○若面色白黑睛少至夜分陰中陽虛而啼者此肝腎之不足也宜六味丸八味丸理陰煎○若見燈兒火

愈啼者心熱也心屬火見火則煩熱內生兩陽相搏故仰身而啼其證面赤手腹俱煖口中氣熱是也火之微者宜生脉散導赤散火之甚者宜殊砂安神丸人參黃連散○若肝胆熱甚木火相搏者宜柴胡清肝散○大都此證或因吐瀉內火津液或稟賦腎陰不足不能滋養肝木或乳母恚怒肝火侮金當用六君子湯補脾土以生肺金地黃丸壯腎水以滋肝木若乳母鬱悶而致者用加味歸脾湯乳母暴怒者加味小柴胡湯乳母心肝熱搏者柴胡清肝散○若因驚夜啼者宜從前驚啼論治

全言卷四十一  
發熱二十

小兒發熱證其最要者有四一則外感發熱二則瘡毒發熱三則痘疹發熱四則疳積發熱凡此四者之外如飲食驚風陰虛變蒸之類雖亦有之然各有其說均當詳辨

一發熱當辨虛實如實則面赤氣粗口燥唇瘡作渴喜冷飲水大小便難或掀衣露體煩啼暴呴聲洪脉強伸體而臥睡不露睛手足指熱皆爲實證實以邪氣有餘或可散邪或宜清火○虛則面色青白氣怯神倦恍惚軟弱口鼻微冷不喜寒涼飲湯安靜泄瀉多尿嘔惡驚惕上盛下泄抱胞喜按乍涼

乍溫夜則虛汗臥則露睛屈體而臥手足指冷脈息緩弱皆爲虛證虛以正氣不足最宜調補或兼解邪雖有發熱外證必不可妄用寒涼及任意消散尅伐等劑

外感發熱治法二十一

凡小兒無故發熱多由外感風寒若寒邪在表未解者必有發熱頭痛或身痛無汗或鼻塞流涕畏寒拘急脉見繫數者是也○凡暑感者極易解散一汗可愈但察其氣血平和別無實熱等證或但倦怠昏睡者則但以四柴胡飲或五柴胡飲爲主酌兒大小而增減其劑此法先固其中次解其表庶元

氣無傷而邪且易散最爲穩當極妙之法有云小兒何虛乃  
堪此補及又有補住邪氣之說皆寸光昧理之談不可信也

○若胃氣微見虛寒者宜五君子煎加柴胡或以理陰煎加  
減用之最妙○元氣頗強而能食者宜正柴胡飲○兼內熱  
火盛而外邪未解者宜一柴胡飲或錢氏黃龍湯○壯熱火

盛往來寒熱者宜柴芩煎○寒氣盛者宜二柴胡飲○寒邪

盛而中氣微虛者宜五積散○傷寒見風身熱兼嗽而中氣

不虛者宜柴陳煎若中氣不足而兼熱兼嗽者宜金水六君

煎○冬受寒邪至春夏而發熱者是爲小兒正傷寒但取效

稍遲然治法不能外此

新按 余之仲兒生於乙卯五月於本年初秋忽爾感寒發熱  
脉微繁然素知其臟氣屬陰不敢清解遂與芎蘇羌芷細辛  
生薑之屬冀散其寒一劑下咽不惟熱不退而反大瀉作連  
二日瀉不止而喘繼之愈瀉則愈喘斯時也將謂其寒氣盛  
耶何以用溫藥而反瀉將謂其火刑金耶豈以清瀉連日而  
尙堪寒涼將謂其表邪之未除耶則何以不利於蘇散束手  
無策疑懼已甚且見其表裏俱劇大喘垂危又豈淺易之劑  
所能挽回因沉思良久漸有所得乃用入參一錢生薑五片

煎汁半盞然未敢驟進恐再加喘必致不救因用茶匙挑與  
二三匙卽懷之而旋走室中徐察其呼吸之進退然喘雖未  
減而亦不見其增甚乃又與三四匙少頃則覺其鼻息似乎  
少舒遂放胆與以半小鍾更覺有應自午及酉完此一劑適  
一醫至急呼曰誤矣誤矣有大喘如此而尙可用參者速  
宜以抱龍丸解之余諾之而不聽乃復以人參一錢五分如  
前煎湯自酉至子盡其劑完而氣息遂平齁齁大睡瀉亦  
止而熱亦退矣此所以知其然者觀其因瀉反喘豈非中虛  
設有實邪自當喘隨瀉減是可辨也向使誤聽彼醫易以清

利中氣一脫卽當置之死地必仍咎余之誤用參也孰是孰非何從辨哉余因紀此以見溫中散寒之功其妙有如此者

外感發熱弗藥可愈

二十二

凡小兒偶然發熱者率由寒熱不調衣被單薄柔弱肌腠最易相感感則熱矣余之治此不必用藥但於其熱睡之頃夏以單被冬以綿被蒙頭鬆蓋勿壅其鼻但以稍緩爲度使其鼻息出入皆此緩氣少項則微汗津津務令上上稍透則表裏通達而熱自退矣若冬月衣被寒涼汗不易出則輕摟着身赤體相貼而上覆其面則無有不汗出者此余近年養兒至

妙之法百發百中者也若寒邪甚者兩三微汗之無有不愈然此法惟行於寅卯之際則汗易出而效尤速

諸熱辨證二十三

一小兒發熱若熱隨汗退者卽外感證也○其有取汗至再而熱不退者必癰毒痘疹之候俟其形見當於本門求法治之○若是瘡毒但當辨其陰證陽證陽證宜清火解毒陰證宜托裏助陽方治詳具外科○若汗出熱不退別無癰腫而耳後紅筋燦然及眼如包淚或手指尖冷脈繫數者必是痘疹

一小兒飲食內傷本無發熱之證蓋飲食傷臟則爲脹爲痛爲吐爲瀉本非肌表之病焉得發熱故調經論曰邪之生於陽者得之風雨寒暑生於陰者得之飲食居處陰陽喜怒此自不易之理也今人但見小兒發熱則多言傷食而妄行消導謬亦甚矣○其或飲食內傷風寒外感表裏兼病而發熱者亦常有之然此當察其食之有停無停酌而治之亦非可混行消耗蓋恐內本無滯而妄加尅伐則虧損中氣以致外邪難解則病必滋甚

一小兒疳積發熱此誠飲食內傷所致然必成痞成疳陽明鬱鬱

積既久所以內外俱熱是非暴傷飲食者之比亦非肌表發  
熱者之比方治詳具疳積條

一小兒有陰虛發熱之證及變蒸發熱之說凡陰虛發熱者此  
卽小兒勞損證也亦名爲童子勞此當於虛損門求法治之  
○至若變蒸之說則辨在本條并當詳察

錢仲陽曰潮熱者時間發熱過時卽退來日依時而發此欲發  
驚也○壯熱者常熱不已甚則發驚癇也○風熱者身熱而  
口中氣熱乃風邪外感也○溫熱者肢體微熱熱不已則發  
驚搐○壯熱惡風寒爲元氣不充表之虛熱也○壯熱不惡

風寒爲外邪所客 衣之實熱也○壯熱飲湯爲津液短少裏  
之虛熱也○壯熱飲水爲內火銷爍裏之實熱也○脉尺寸  
俱滿爲重實○尺寸俱弱爲重虛○脉洪大或緩而滑或數  
而鼓此熱盛拒陰雖形證似寒實非寒也○熱而脉數按之  
不鼓此寒盛格陽雖形證似熱實非熱也○發熱惡熱大渴  
不止煩躁肌熱不欲近衣其脉洪大按之無力或兼目痛鼻  
乾者此血虛發熱也當補其血○如不能食而熱自汗出者  
氣虛也當補其氣

內熱證 二十四

內熱與外熱不同內熱以五內之火熱由內生病在陰分故內  
熱者宜清涼不宜升散升散則內火愈熾火空則發也外熱  
以膚腠之邪風寒外襲病在陽分故外熱者宜解散不宜清  
降清降則表熱愈畱外內合邪也此外熱內熱之治其不同  
者有如此欲分內外之辨則外熱者其至必驟內熱者其來  
必緩但察其絕無表證而熱在臟腑七竅三焦二陰筋骨肌  
肉之間者皆是內熱之證但內熱之證亦有虛實實者宜從  
正治虛者當從反治反正之間有冰炭之異非可混也

凡實熱之在內者古法治分五臟宜從正治○心熱者宜瀉心

煥赤散安神丸○肝熱者瀉青丸柴胡飲子龍胆湯○脾

熱者瀉黃散○肺熱者輕則瀉白散地骨皮散重則涼膈散

○腎熱者滋腎丸滋陰八味丸實熱則宜疎下虛熱則宜調

補○肢體熱輕則惺惺散重則人參羌活散○大便秘者二

黃犀角散四順清涼飲○餘熱不退者地骨皮散○大小便

血者保陰煎○血熱妄行者清化飲○三焦火盛上下熱甚

者抽薪飲○小水熱痛者大分清飲○陽明內熱煩渴頭痛

二便秘結者玉泉散○陽明火盛兼少陰水虧者玉女煎

凡元氣虛而爲熱者必真陰不足皆假熱證也宜從反治○

心脾肺氣虛假熱者五君子煎入參理中湯○五臟氣血俱虛假熱者五福飲○肝腎真陰不足假熱者輕則六味地黃湯甚則理陰煎○肝腎血虛假熱者大營煎五物煎○肝腎陰虛上熱下寒則陽無所附而格陽爲熱者六味回陽飲或八味地黃湯○肝經血虛生風而熱者四物加天麻鈞藤鈎○汗後血虛而熱甚者六神散加粳米○汗後氣虛而惡寒發熱者補中益氣湯○汗後陰虛陽無所附而熱者四物湯加參芪○汗後陽虛陰無所附而熱者四君子加芎歸○久從溫補而潮熱不退脉見滑大者五福飲加地骨皮或加知

母○凡嬰兒諸熱有因別證而作者當從所重者而治之○

若乳下嬰兒當兼治其母以調之

小兒上論列方二十五

四君子湯

補一

五君子煎

新熱六

五味異功散

補四

六君子湯

補五

圍參散

小十

六味異功煎

新熱七

四物湯

補八

五物煎

新因三

金水六君煎

新和一

五福飲

新補六

理中湯

熱一

人參理中湯

熱一

七福飲 新補七

溫胃飲 新熟五

四味回陽飲 新熟一

胃關煎 新熟九

理陰煎 新熟三

六味回陽飲 新熟一

獨參湯 补三六

生脈散 补五七

六味地黃丸 补一二一

養中煎 新熟四

茯神湯 小六十

八味地黃丸 补一二二

大營煎 新補十四

滋腎丸 寒一六三

滋陰八味丸 新寒十七

保陰煎 新寒一

清化飲 新因十三

補中益氣湯 补二二

益黃散 和十九

六神散 小五一

加味歸脾湯 補三四

小柴胡湯 散十九

柴胡飲子 小三十

柴胡清肝散 寒五九

一柴胡飲 新散一

二柴胡飲 新散二

人參黃連散 小十七

四柴胡飲 新散四

五柴胡飲 新散五

二黃犀角散 小二九

正柴胡飲 新散六

柴芩煎 新散十

錢氏黃龍湯 小二五

柴陳煎 新散九

五積散 散三九

四順清涼飲 攻二五

全責人

參蘇飲 散三四

硃砂安神丸 寒一四二

惺惺散 小二三

釣藤飲 小六六

黃連安神丸 寒一四二

瀉白散 寒四二

瀉黃散 寒五七

秘旨安神丸 小七一

瀉心湯 寒二七

抑肝散 小六七

安神鎮驚丸 小七六

瀉青丸 寒一五一

抑青丸 小九八

東垣涼膈散 痘八三

抽薪飲 新寒三

龍膽湯 小八二

大分清飲 新寒五

玉泉散 新寒十五

玉女煎 新寒十二

地骨皮散 小三二

導赤散 寒一二二

大青膏 小六八

消食丸 小二七

清膈煎 新寒九

和胃飲 新和五

利驚丸 小九七

涼驚丸 小九六

抱龍丸 小八五

琥珀散 小八一

牛黃散 小二七

梅花飲 小八三

白餅子 小三九

肥兒丸 小百十二

保和丸 小三五

木香散 瘡二二

陳氏十二味異功散 痘二二一 人參羌活散 小二二六

備用方

具列小兒方中所當詳閱