

秘傳花鏡卷之三月次

花木類攷

松

栢

梓

牡丹

梅

蠟梅

山茶

瑞香

結香

迎春花

櫻桃

玉蘭

杏花

丁香

987



秘傳花鏡卷之三月次

花木類攷

松

栢

梓

牡丹

附譜

梅

附譜

蠟梅

山茶

附譜

瑞香

結香

迎春花

櫻桃

玉蘭

杏花

丁香

花鏡

卷三 目次



辛夷

杜鵑

桃花

附譜

金絲桃

夾竹桃

李花

梨花

木瓜

棠梨

郁李

貼梗海棠

西府海棠

垂絲海棠

林擒

奈

文官果

山楂

山躑躅

粉團

八仙花

紫荆

金雀花

山礬

桑

佛桑花

南天竹

合歡

漆

柿

柳

楊

檉柳

橘

附枳

橙

金柑

香櫞

佛手柑

檳榔

虎刺

蜜蒙花

平地木

梔子

石榴

火石榴

棟

棗

椿 附樛

楓

楮

梧桐

楊梅

橄欖

荔枝 附譜

龍眼

黃楊木

柳

椒

茱萸

銀杏

胡桃

六月雪

茶

枳椇

槐

紫薇

白菱

木槿

桂

皂莢

櫻櫚

紅豆樹

無花果

枇杷

栗

榛

榧

木蘭

茶梅花

天仙果

古度子

攀枝花

柏

石楠

鐵樹

冬青

榆

秘傳花鏡卷之三

西湖花隱陳漢子訂輯

花木類攷

是編乃綠墅名園所必需主人好花而不善
 植者所當細閱也然詳圃而畧農非棄本以
 趨末五穀簡而草木繁若不細審其性情分
 辨其宜忌則萬卉千葩安望其色之妍香之
 濃葉之肥實之美耶今以不傳之秘公之同
 人則世無不生之花矣

松

松為百木之長。諸山中皆有之。兩鬣三鬣而細者常
 松也。五鬣六鬣為一朶。葉者別牙。栝子松也。潤瓣厚
 葉者羅漢松也。其質礫砢。修聳多節。永年皮粗如龍
 鱗。葉細如馬鬣。遇霜雪而不凋。歷千年而不殞。其花
 色黃而多香。但有粉而無瓣。實似猪心。壘成鱗砌。秋
 老則子長。鱗裂。味最甘香。可口。滇南子色黑。遼東子色黃。千歲松
 產於天目。武功。黃山。高不滿二三尺。性喜燥。背陰生
 深巖石塌上。永不見肥。故歲久不大。可作天然盆玩。

又有赤松。白松。鹿尾松。之異。惟剔牙。松皮青而嫩。稍
 傷其皮。則脂易溜。須以火鐵燙止。用糞泥密封。方不
 洩氣。凡欲松偃蓋。必截去松之大根。惟留四旁根鬚。
 則無不偃蓋矣。種法於春分前。浸子十日。治畦下糞
 漫撒畦內。如種菜法。其苗自生。一切花木皆貴少壯。
 獨松柏梅等。世人多貴蒼老。古勁。歲久。松能化石。脂
 能成珀。如上有兔絲。則根下有伏苓。為仙家服食之
 藥。其花亦可作粉食。

栢

柏一名蒼官。一名掬。與松齊壽。有扁柏。檜柏。黃柏。瓔珞柏之異。惟扁柏為貴。故園林多植之。因其葉側向而生。又名側柏。其味微澁而甘香。道人多採作服食。用煎茶湯。諸木向陽。柏獨西指。其性堅緻。有脂而香。故古人破為暢白。用以搗鬱。三月開細瑣花。不甚可觀。結實成球狀。如小鈴。霜後四裂。中含數子。大如麥粒。亦自芬香。仁亦道家所服食者。檜柏體堅難長。亦難萎黃。木聳直而皮薄。肌細。葉至冬更青翠。瓔珞柏枝葉俱垂。下宜栽庭際。皆無花。有子。峨嵋山有竹葉

柏身者。名竹柏。稟堅凝之質。不與群卉同凋。其小者止一二尺。可作盆玩。又乾陵有柏。木之文理大者多為菩薩。雲氣人物鳥獸狀態分明。徑尺一株。可值萬錢。柏性喜晒。每年中用晒過糞水澆三四次。則色鮮潤。秋時剪小枝二三尺者。插肥地。亦活。或收子。至二三月間。用水淘取。沉者着濕地。隔兩日再淘。候芽出。將剝熟地成畦。以子勻撒其中。覆以細土。二三日一澆。苗出土後。須圍以短籬。防蝦蟇所食。

梓

キサゲ

梓一名木王。林中有梓樹。諸木皆內拱葉似梧桐。差小而無歧。春開紫白花。如帽極其爛熳。生莢細如箸。長尺許。冬底葉落。莢猶在樹。種法。秋末冬初。取莢曝乾。播種。一年薹之。二年方可移植。或交春斷其根。莖於土。亦能發條。其葉飼豕最肥。

牡丹

フカミクサ ハツカクサ

牡丹為花中之王。北地最多。花有五色。千葉重樓之異。以黃紫者為最。自歐陽修作記後。人皆供傳其名。遂有牡丹譜。今取其一百三十一種。詳釋於後。其性

宜涼畏熱。喜燥惡濕。根窠樂得新土。則茂懼烈風。酷暑日須栽高。厥向陽之所。則花大而色妍。移植在八月。社前或秋分後。皆可根下宿土。少留。切勿掘斷細根。每種過先將白歛末一斤。拌勻新土內。因其根甜多引十蠶蟻蟻再以小麥數十粒撒下。然後坐花於上。以土覆滿。復將牡丹提與地平。使其根直。則易活。不可踏實。隨以天落水。或河水灌之。子類母丁香。而黑六月。收置向風處。晾一日。以瓦盆拌濕土。盛之。至八月中。取其下水。即沉者。而畦種之。待其春芽長大五六

月以葦箔遮。日夜則露之。至次年便可移種矣。然結子畦種不若根上生苗分植之便。其接換亦在秋社前後。將種活五年以上小牡丹去地留一二寸。將利刀斜削去一半。再以佳種旺條截一段斜削去一半。上留二三眼。貼於小樹上。合如一木。以麻縛定。用濕泥抹其縛處。兩瓦合之內填細土。待來春驚蟄後出瓦與土。隨以草薦圍之。未有不活者。其花愈接愈好。昔張茂卿接牡丹於椿樹之上。每開則登樓宴賞。至今稱之。夏月灌溉必清晨或初更。必候地涼方可澆。

八九月五七日一澆。十月十一月三四日一澆。十二月地凍止。可用猪糞壅之。春分後便不可澆肥。直至花放後。畧用輕肥。六月尤忌澆澆。則損根。來年無花。花未放時。去其瘦莖。謂之打刺。花將放必用高幕遮。日則花耐久。開殘即剪。勿令結子。留子則來年不盛。冬至日以鍾乳粉和硫黃少許置根下有益。如枝梗蟲蛀當尋其蛀眼。用硫黃或塞或熏。或用杉木作針。釘之。自斃。性畏麝香。桐油。生漆氣。旁宜植逼瀉草。如無即種大蒜葱韭。亦可不使亂草侵土。并熱手撫摩。

轍當
作轍

若折枝挿瓶先燒斷處銹蠟封之可貯數日不萎或用蜜養更妙花樹後蜜仍可如將萎者剪去下截用竹架起投水缸中浸一宿復鮮一法以白朮末放根下諸般花色悉帶腰金若北方地厚雖無肥糞即油糞肥壅之亦盛不可一例論也但忌犬糞八月十五是牡丹生日洛下名園有植牡丹數千本者每歲盛開主人轍置酒延賞若遇風日晴和花忽盤旋翔舞香馥異常此乃花神至也主人必起具酒脯羅拜花前移時始定歲以為常

附牡丹釋名 共一百三十一種

正黃色 計十一品

御衣黃

千葉似黃葵

姚黃

千葉樓子姚崇家

淡鶯黃

平頭初黃後漸白

蔡院黃

千葉起樓子

甘草黃

單葉深黃色

愛雲黃

大瓣平頭宜重肥

黃氣毬

瓣圓轉淡黃

金帶腰

腰間色深黃

女真黃

千葉而香濃喜陰

太平樓閣

千葉高樓

蜜嬌

本如檮葉大長花五瓣蜜蠟色中有蕊根檀心

大紅色 計十八品

錦袍紅

即潛溪緋千葉

狀元紅

千葉樓子喜陰

朱砂紅

日照如猩血喜陰

舞青猊

中吐五青瓣

石榴紅

千葉樓子喜陽

九蕊珍珠

紅葉上有白點如珠

醉胭脂 千葉莖長頭垂 西瓜瓠 內深紅邊漸淡 錦繡球 葉微小千瓣圓轉

羊血紅 千葉平頭易開 碎剪絨 葉尖多缺如剪 金絲紅 平頭瓣上

七寶冠 千葉樓子難開 映日紅 千葉細瓣喜陽 石家紅 平頭千葉不甚緊

鶴頂紅 千葉中心更紅 王家紅 千葉樓子微曲 小葉大紅 頭小葉多難開

桃紅色 計二十七品

蓮蕊紅 有青映三重 西番頭 千葉難開宜陰 壽安紅 平頭細葉黃心宜陽

添色紅 初白漸紅後深 鳳頭紅 花高大中特起 大葉桃紅 潤瓣樓子宜陰

梅紅 千葉平頭深紅色 西子紅 千葉圓花宜陰 舞青霓 千葉心吐

西瓜紅 胎紅而長宜陽 美人紅 千葉軟條樓子 嬌紅樓臺 千葉重樓宜陰

海天霞 平頭花大如盤 輕羅紅 千葉而薄 皺葉紅 葉圓有皺紋宜陰

陳州紅 千葉以地得名 殿春芳 晚開有樓子 花紅綉毬 細瓣而圓花

四面鏡 有旋瓣四面花 醉仙桃 外白內紅宜陰 出莖桃紅 莖長有尺許

翠紅粧 起樓難開宜陰 嬌紅 似魏紅而 韞紅 單葉紅花稍白即青州紅

罌粟紅 單葉皆倒暈 魏家紅 千葉肉紅畧有粉稍開最大以姓得名

粉紅色 計二十四品

觀音面 千葉花緊宜陽 粉西施 淡中微有紅暈 玉兔天香 中二瓣如兔耳

玉樓春 千葉多雨盛開 素鸞嬌 千葉樓子宜陰 醉楊妃 千葉平頭最畏烈日

粉霞紅 千葉大平頭 倒暈檀心 外紅心白 水紅毬 千葉外白內紅如毬

三學士

係三頭

合歡嬌

一帶雙頭者

醉春容

似醉西施開久露頂

紅玉盤

平頭邊白心紅

玉芙蓉

成樹則開空陰

鶴翎紅

千葉細長本紅末白

西天香

開早初嬌後淡

回回粉

細瓣外紅內白

瑪瑙盤

千葉淡紅白稍檀心

雲葉紅

瓣層次如雲

滿園春

清明時即開

瑞露蟬

花中抽碧心如合蟬

墨羅

中心瑣碎如羅紋

一捻紅

昔日貴妃勻面脂在手偶印花上來年花生皆有指

甲紅痕至今稱以為異

紫色

計二十六品

朝天紫

金紫如夫人服

腰金紫

腰間圍有黃鬚

金花狀元

微紫葉有黃鬚

紫重樓

千葉樓最難開

葛巾紫

圓正富麗如巾

紫雲芳

千葉花中包有黃蕊

紫羅袍

千葉瓣薄宜陽

丁香紫

千葉小樓子

茄花紫

千葉樓深紫即藕絲

瑞香紫

淺紫大瓣而香

舞青猊

千葉有五青瓣

駝褐紫

大瓣色似褐衣宜陰

紫姑仙

大瓣樓子淡紫

烟籠紫

千葉淡交映

潛溪緋

叢中特出緋者一二

紫金盤

千葉深紫宜陽

紫繡毬

即魏紫也千葉樓子葉肥大而圓轉可愛

檀心紫

中有深檀心

葉底紫

似墨紫花叢中旁必生一枝引葉覆上即軍容紫

潑墨紫

深紫色類墨葵

鹿胎紫

千葉紫瓣上有白點儼若鹿皮紋宜陽

魏家紫

千葉大花產魏相家

平頭紫

即左紫也千葉花大徑尺而齊如截宜陽

乾道紫

色稍淡而暈紅

紫玉

千葉白瓣中有深紫色絲紋宜陰

錦團緣

其幹亂生成千瓣粉紫色合紐如撮瓣細紋

白色 計二十二品

玉天仙 多葉白 慶天香 千葉粉 玉重樓 千葉高樓

綠邊白 瓣邊有綠暈 蜜嬌姿 初開微白 萬卷書 即玉玲瓏

銀粧點 千葉樓 水晶毬 瓣圓俱垂下 玉剪裁 平頭葉邊

白青猊 中有五青瓣 蓮香白 平頭花 伏家白 以姓得名

鳳尾白 中有長瓣特出 玉盤盃 多葉大 玉版白 單葉細長

鶴翎白 多葉而長 金絲白 瓣上有淡黃絲 羊脂玉 千葉樓子

青心白 千葉青 玉碗白 單葉大 平頭白 花大尺許

一百五 瓣長多葉黃蓋檀心花最大

青色 計三品

佛頭青 一名歐碧 群花謝後此種始開 綠蝴蝶 一名萼綠華 千瓣色微帶綠

鴨蛋青 花色如蛋殼宜陰

牡丹花之五色燦爛其形其色其態度變幻原莫可名狀後之命名亦隨人之喜好約數百種然而雷同者亦不少茲存一百三十種尚有疑似處望博雅裁之

梅 ウメ

梅一名枏一名蓀葉實花俱似杏差小而花獨優於

香昔范石湖有梅譜約九十餘種大底一花二三名者多今特取其山林常有而人所常植者二十種詳釋於後梅本出於羅浮庾嶺喜暖故也而古梅多著於吳下吳興西湖會稽四明等處每多百年老幹其枝樛曲萬狀蒼蘚鱗斂封滿花身且有苔鬚垂於枝間長寸許風至綠絲飄動其樹枝四蔭週遭可羅坐數十人好事者多載酒賞之蓋梅為天下尤物無論智愚賢不肖莫不慕其香韻而稱其清高故名園古剎取橫斜疎瘦與老幹枯株以為點綴早梅冬至前

即開晚梅春分時始放如多植則相繼而開最久性潔喜晒澆以塘水則茂肥多生蠹但結實微酸而酸之功用甚廣人多取焉食若畏酸同韶粉嚼則味不酸而牙不軟或以胡桃肉解齏楚音

附梅花釋名 共二十一種

諸色梅

綠萼梅

凡梅附蒂皆綠紫此獨純綠

重葉梅

花頭甚豐千葉開如小白蓮

玉蝶梅

花頭大而微紅色甚妍可愛

冠城梅

單葉者實大五月熟千葉者實少

消梅

即江梅花與冠城相似實微甘而脆

照水梅

花開朵朵向下而香濃亦梅中奇品

鴛鴦梅 重葉數層紅艷 黃香梅 一名細梅花小而

品字梅 一花結三實但 紅梅 有福州紅潭州紅名

杏梅 花色淡紅實扁 墨梅 此係練樹所接江梅

麗枝梅 花繁而蒂紫但 冰梅 實生葉鱗而不花色

鶴頂梅 花如常梅惟 冬梅 結實甚小十月

九英梅 此花為白樂天 朱梅 較之千葉紅梅

江梅 白花種心紫蒂王 臺閣梅 花開後心中復有

榔梅 出均州大和山相傳真武折梅枝捕榔樹上

誓曰吾道若成花開果結後榔果開梅結實至今尚在五龍宮北

蠟梅 ナニキンウメ

蠟梅 俗作 一名黃梅 本非梅類因其與梅同放其香

又相近色似蜜蠟且臘月開故有是名樹不甚大而

枝叢葉如桃潤而厚有磬口荷花狗英三種惟圓瓣

深黃形似白梅雖盛開如半含者名磬口最為世珍

若瓶供一枝香可盈室狗英亦香而形色不及近日

圓瓣者皆如荷花而微有尖僅免狗英者皆由用狗

英接換故也若以子出不經接過者花小而香淡其

品最下實如垂鈴夏熟採取試水沉者種之多生產

荆襄者為上今南浙亦盛其本宜過枝不宜接換

山茶 ツバキ

山茶一名曼陀羅樹高者一二丈低者二三尺枝幹交加葉似木樨潤厚而尖長面深綠光滑背淺綠經冬不凋以葉類茶故得茶名花之名色甚多姑列於後其開最久自十月開至二月方歇性喜陰燥不宜大肥春間臘月皆可移栽四季花寄枝宜用本體黃花香寄枝宜用茶體若用山茶體花仍紅色白花寄枝同上磬口花鬯口花宜子種以單葉接千葉則花

盛而樹久以冬青接十不活一二

附山茶釋名 共十九種

諸色茶花

瑪瑙茶 產溫州紅黃白 鶴頂紅 大紅蓮瓣中心塞

寶珠茶 千葉攢簇殷紅 焦萼白寶珠 似寶珠甚白

楊妃茶 單葉花開最 正官粉 賽官粉 花皆粉

石榴茶 中有 梅榴茶 青蒂而 真珠茶 淡紅

菜榴茶 有類山 躑躅茶 色深紅 串珠茶 亦粉

磬口茶 花瓣皆 茉莉茶 色純白一名白菱

一捻紅 白瓣有紅點 照殿紅 葉大而紅 晚山茶 二月方開

南山茶 出廣州葉薄有毛實大如拳

瑞香 ジンチヤウゲ

瑞香一名蓬萊花。有紫白紅三色。本不甚高。而枝幹極婆娑。隔年發莖。蓓蘖於葉頂。立春後即開。花紫如丁香者。其香更濃。葉邊有黃暈者。名金邊瑞香。又有似楊梅葉者。或球子者。攀枝者。其性喜陰耐寒。然又惡濕。婦女多喜扞帶。不宜糞澆。惟用浣衣垢水。或燻猪湯澆。或壅人頭垢。則茂芒。種時剪取嫩條。破開放。

大麥一粒。用亂髮纏之。插入土中。根旁壅好。勿令見日。以垢水澆之。一云左手折花。隨即扞插。勿換手。種無有不活。其根甚甜。多藏蚯蚓。必須以法去之。又名麝囊。能損花。宜另植。

結香

結香俗名黃瑞香。幹葉皆似瑞香。而枝甚柔韌。可結。結花色鶯黃。比瑞香差長。亦與瑞香同時放。但花落後始生葉。而香大不如。

迎春花 ワウハイ

迎春花一名腰金帶。叢生高數尺。方莖厚葉。開最早。交春即放淡黃花。形如瑞香。不結實。對節生小枝。一枝三葉。候花放時。移栽肥土。或巖石上。或盆中。而柔條散垂。花綴枝頭。實繁且韻。分栽宜於二月中旬。須用燐性水澆。方茂。

櫻桃 ヌスノウメ

櫻桃一名楔。又有荆桃。含桃。謂鳥喜含崖蜜。蠟櫻。色皆黃朱英。赤色麥英。數名。此木得正陽之氣。故實先諸果而熟。禮薦宗廟。亦取其先出也。本不甚高。而多蔭。春初開。

白花繁英如雪。其香如蜜。葉圓有尖。邊如細齒。結子一枝數十夥。有朱紫蠟三色。又有千葉者。其實少。但果紅熟時。必須守護。否則為鳥雀白頭公所食。無遺也。枝節間有根鬚垂下者。二月間取栽於肥土中。常以糞澆之。即活。若陽地種者。還種陽地。陰地種者。還種陰地。則樹易盛。而實多。又性宜堅實。陰地不可用。糞實熟時。當張葦箔以護風雨。一經雨打。則蟲自內生。人莫之見。須用水浸良久。候蟲出。方可食。

玉蘭 モクレンゲ

玉蘭古名木蘭出於馬跡山紫府觀者佳今南浙亦
廣有樹高大而堅花開九瓣碧白色如蓮心紫綠而
香絕無柔條隆冬結蕾一幹一花皆着木未必俟花
落後葉從蒂中抽出在未放時多澆糞水則花大而
香濃但忌水浸與木筆並植秋後接換甚便其瓣擇
洗精潔拖麵麻油煎食極佳或蜜浸亦可其製法與
牡丹瓣同

杏花 カラモノハナ
アズノハナ

杏花有二種單瓣與千瓣劔州山有千葉杏花先紅

後白但嬌麗而不香樹高大而根生最淺須以大石
壓根則花易盛而結實始繁其核可種而仁不堪食
其可食者係關西巴且杏八丹云實小而肉薄核內仁
獨甘美點茶上品梅杏黃而帶酢沙杏甘而有沙木
杏扁而青黃奈杏青而微黃又一種金杏圓大如梨
深黃若金橘每種將核帶肉埋於糞土中任其長大
來年須移栽若不移過則實小味苦又不可栽密密
則難長少實昔李冠卿家有杏花多不實一媒姥見
而笑曰來春與嫁此杏冬至忽攜一樽酒過云婚家

撞門酒也。索處子紅裙繫樹，祝曰：青陽司令庶彙，惟新木德屬仁，更旺於春。森森柯幹，簇簇繁陰。我今嫁汝，萬億子孫，明年結子果多，相傳為韻事。

丁香

丁香一名百結。葉似茉莉，花有紫白二種。初春開花，細小似丁香蓓蕾而生於枝杪。其瓣柔色紫，清香襲人，接分俱可，但畏濕而不宜大肥。

辛夷

辛夷一名木筆，一名望春。較玉蘭樹差小，葉類柿而

長隔年發，蓋有毛，儼若筆尖。花開似蓮，外紫內白花，落葉出而無實。別名侯桃，俗呼猪心花。又有紅似杜鵑者，俗呼為石薔。其本可接玉蘭，亦宜斫條扦插，可同玉蘭並植。至秋後過枝，即生，皆可變為玉蘭。多澆糞水，則花大而香濃。人多取葢合香。

杜鵑

杜鵑一名紅躑躅。樹不高大，重瓣紅花，極其爛縵。每於杜鵑啼時盛開，故有是名。先花後葉，出自蜀中者，佳花有十數層，紅艷比他處者更甚。性最喜陰而惡

肥每早以河水澆置之樹陰之下則葉青翠可觀亦有黃白二色者春鵲亦有長丈餘者須種以山黃泥澆以羊糞水方茂若用映山紅接者花不甚佳切忌糞水宜豆汁澆

桃

桃爲五木之精能制百鬼乃仙品也隨處有之枝幹扶疎葉狹而長二月開花有紅白粉紅深紅之殊他如單瓣大紅千瓣粉紅千瓣白之變爛縵芳菲其色甚媚花最易植木少則花盛實甘子繁性早實三年

便結子六七年卽老結子便細十年後多枯其皮最緊若四年後用刀自樹本豎剝其皮至生枝處使膠盡出則皮不服不死多有數年之活傳云千歲桃豈尋常之物惟仙家稱之寃竟桃無久壽而種類甚多詳載於後種法取佳種熟桃連肉埋糞地中尖頭向上覆熟肥土尺餘至春發生帶土移栽別地則旺若仍在糞地則實小而苦凡種桃淺則出深則不生故其根淺不耐久近得所傳云於初結實次年斫去其樹復生又斫又生但覺生風卽斫令復長則其根入

地深而盤結自固百年猶結實如初又桃實太繁則多墜於社日春根下土石壓其枝則不落桃子若生蟲以煮猪首淡汁冷澆之自無如生蚜蟲以多年竹燈挂懸樹梢間則蟲自落

附桃花釋名 共二十四品

諸色桃

日月桃 其種一枝有二 崑崙桃 一名王母桃出洛花或紅或白
巨核桃 霜下始花大暑 瑞仙桃 花最稠密其方熟出常山
人面桃 花粉紅千葉少 毛桃 爾雅名禿桃小而多實又名美人桃 毛核粘味劣不堪

緋桃 即蕪桃花如剪絨 金桃 出太原形長色黃以比諸種開遲色艷

鴛鴦桃 千葉深紅開最 銀桃 單葉實圓色青白肉後結實必雙

李桃 單葉深紅花實圓 雪桃 即十月桃花紅形圓色青肉不粘核

水蜜桃 出上海顧氏家 油桃 有赤斑點光如塗油其味甜如蜜

新羅桃 單葉紅花其子 扁桃 出波斯國形扁而肉可食性獨熱

雷震紅 雷雨過輒見一 鷹嘴桃 花紅實在六月熟紅暈更為難得

餅子桃 單葉紅花實狀 墨桃 花色紫黑似墨葵如香餅味甘

白碧桃 單葉千葉二種 胭脂桃 單葉紅花結實至惟單葉結實繁

壽星桃 樹矮而花千葉附 羊桃 出自福州其實實大可作盆玩錄

金絲桃

ビヤウヤナギ

金絲桃一名桃金娘。出桂林郡。花似桃而大。其色更
頰中莖純紫。心吐黃鬚。鋪散花外。儼若金絲。八九月
實熟。青紺若牛乳狀。其味甘。可入藥用。如分種。當從
根下劈開。仍以土覆之。至來年移植便活。

夾竹桃

夾竹桃本名枸那。自嶺南來。夏間開淡紅花。五瓣長
筒。微尖。一朵約數十萼。至秋深猶有之。因其花似桃
葉似竹。故得是名。非真桃也。性惡濕而畏寒。十月中

即宜置向陽處。以避霜雪。最喜者肥。不可缺。冬逢
和暖日。微以水潤之。但水多則恐冰凍而死。分法在
季春。以大竹管。韜於枝節間。用肥土填貯。朝夕不失
水。久之根生。截下另植。遂可得種矣。今人於五六月
間。以此花配茉莉。婦女簪髻。嬌裊可挹。

李花

スモノハナ

李樹大者有一二丈。性較桃則耐久。可活三十餘年。
老枝雖枯。子亦不細。花白小而繁。多開如雪。其實名
不一。有木李。青宵。御黃。均亭。夫人。皮青肉紅皆李之上品。

也。紫粉。小青。白李。杏李。馬肝。牛心。扁縫。鼠精。朱李。餒李。似餒乃李之下品也。又麥李。紅而甜。麥秀即食至結實有離核。合核無核之異。俗傳種桃宜密。種李宜稀。其分根種接之法。皆與桃同。故不贅。但培壅宜猪糞。不可用糞。如少實。於元旦五更。將火把四面照看。謂之稼李。當年便生。若以桃接。則生子紅而甘。

梨花 十ノ八十

梨一名果宗。一名玉乳。處處有之。其木堅實。高有三丈。枝葉扶疎。似杏而微厚大。二月開花。六出。似李

花稍大。有紅白二色。香不香之別。上巳日無風。則結實必佳。其果名不一。有紫花梨。細葉梨。芳梨。實小青梨。實大胸山梨。大谷梨。張公梨。夏熟禦兒梨。韓梨。蜜梨。甘棠梨。鵝梨。皮薄漿多而香秋白梨。紅消梨。出蕭縣太師梨。乳梨。出宜城皮厚而肉實稻稍梨。罨羅梨。棒槌梨。因其形似香水梨。出北地為上品壓沙梨。楹梓梨。鳳棲梨。綿梨。水梨。最赤梨。鹿梨。葉如茶而實小出山紫梨。花以秋日開紅色以上諸品。或形色。或香味。種種不同。每顆生十餘子。種之。惟一。二生。梨餘皆生。杜植法。用最熟大梨。全埋。經年。至來春生芽。次年分

栽之多著肥水及冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭
 二年即開花接法在春秋二分時用桑本或棠梨或
 杜接過其實必大史記云淮北滎陽河濟之間家植
 千樹梨其人與千戶侯等又夷陵山中多紅梨花且
 有千葉者時司馬溫公會作詩贊之昔梁緒於花開
 時折花簪多壓損帽簷至頭不能舉人為美談

木瓜 ボケ

木瓜一名楸一名鐵脚梨獨蘭亭宣城者為最樹高
 丈餘葉厚而光狀如海棠及奈春深未發葉先有花

其色深紅微帶白實大如瓜小者如拳皮黃似薯粉
 香最幽甜而津潤有鼻者木瓜無鼻而齋者水李比
 木瓜小而酢澁者木桃惟木瓜香而可食宣州人種
 滿山谷每實將成好事者鏤紙花粘瓜上夜露日照
 漸變紅花色矣其文如生本州用充土貢名為花木
 瓜樹可以子種亦可接壓在秋社前後移栽者較春
 栽更盛耳畏日喜肥更宜犬糞其直枝可作杖謂老
 人策之利筋脈實可浸酒或蜜漬為果亦佳蜜漬法
 先切去皮煮令極熟多換水浸使拔去酸澁之味然

後用生蜜熬成煎將木瓜晾乾投於蜜瓶中藏之經久不壞而香馥猶存昔天台山石罅有木瓜一株花時一巨蛇盤其上至寶落供大士後乃去號為護聖瓜

棠梨

棠一名棠棣即棠梨也樹如梨而小葉似蒼木亦有圓者三叉者邊有鉅齒色黧白二月開小白花實如小棟子生青熟紅亦有黃白者土人呼為山查果味酸而澁採之入藥兼可製為糖食取花日乾淪之亦

可克蔬若以此接換梨或林檎與西府海棠氣質極其相宜其共之誤

郁李 ニハウメ

郁李一名棠棣又名未移喜梅俗呼為壽李樹高不過五六尺枝葉似李而小實若櫻桃而赤味酸甜可食其花反而後合有赤白粉紅三色單葉者子多千葉者花如紙剪簇成色最嬌艷而上承下覆繁縟可觀似有親愛之義故以喻兄弟周公昔賦棠棣即此性潔喜暎春間宜栽高燥處澆以清水不用大肥仁

可入藥。

貼梗海棠

海棠有數種。貼梗其一也。叢生單葉。綴枝作花。磬口深紅。無香。不結子。新正即開。但取其花早而艷。不及西府之嬌媚動人。二月間于根傍開一小溝。攀花着地。以肥土壅之。自能生根。來冬截斷。春半便可移栽。其樹最難大。故人多植作盆玩。近法皆不用壓直於根上。分栽而分。必須正月中澆。性不喜肥。頗畏寒。宜避霜雪。亦有四季花者。

西府海棠

西府海棠一名海紅樹。高一二丈。其木堅而多節。枝密而條暢。葉有類杜。二月開花。五出。初如胭脂。點點然。及開則漸成纈。暈明霞。落則有若宿粧。淡粉。蒂長寸餘。淡紫色。或三萼五萼成叢。心中有紫鬚。其香甚清烈。至秋實大如櫻桃。而微酸。宜種壚壤膏沃之地。如花謝後結子。即當剪去。則來年花盛。而葉遲可愛。若以棠梨接之。即活。又一種黃海棠。葉微圓而色青。初放鶯黃色。盛開便淺紅矣。

垂絲海棠

海棠之有垂絲非異類也。蓋由櫻桃樹接之而成者。故花梗細長似櫻桃。其瓣叢密而色嬌媚。重英向下。有若小蓮。微遜西府一籌耳。世謂海棠無香。而蜀之潼川昌州海棠獨香。不可一例論也。接法詳十一八法內

林檎

林檎一名來禽。因其能來眾鳥於林一名冷金丹。即奈之類也。二月開粉紅花。似西府。但花六出。實則圓而味耳。非若奈之實。長而味稍苦。果之香甜可口。五月中熟者。

蜜林檎為第一。金林檎。以花為重。唐高宗時李謹得

五色林檎。以貢。有金紅水蜜黑五色之異帝悅。賜謹為文林郎。因

名為文林郎果。但此木非接不結。多以柰樹搏接之。

其法與接梨同。臘月可將嫩條移栽。若樹生毛蟲。埋

蠶蛾於樹下。或澆魚腥水可除。好事者以枝頭向陽

好實。於未熟時剪紙為花貼於其上。待紅熟時猶若

花木瓜樣。入盤飮可愛。又四月收林檎一百。內取二

十枚槌碎。入水同煎。候冷納瓮中浸之。密封其口。久

留愈佳。

奈

奈一名頻婆。係梵音猶言端好也江南雖有而北地最多。與林檎同類。有白赤青三色。白為素奈。涼州有大如兔頭者。赤為丹奈。青為綠奈。皆夏熟。涼州又有一種冬奈。十月方熟。子帶碧色。又上林苑有紫奈。大如升。核紫花青。其汁如漆。著衣便不可洗。名脂衣奈。此皆異種也。西土奈多。家家收切。曝乾為脯。數十百斛。以為蓄積。謂之頻婆糧。

文官果

文官果產於北地。樹高丈餘。皮粗多礫。石木理甚細。葉似榆而尖長。周圍鉅齒。紋深。春開小白花。成穗。每瓣中微凹。有細紅筋貫之。蒂下有小青托。花落結實。大者如拳。一實中數隔。間以白膜。仁與馬櫛榔無二。裹以白軟皮。大如指。頂去皮而食。其仁甚清美。如每日常澆。或雨水多。則實成者多。若遇旱年。則實小。而無成矣。

山楂

山楂一名茅櫨。樹高數尺。葉似香薷。二月開白花。結

實有赤黃白三色肥者如小林檜小者如指頂九月
乃熟味似榧子而微酢多生於山原茅林中候鼠喜
食小兒以此為戲果

山躑躅 キリシマ

山躑躅俗名映山紅類杜鵑花而稍大單瓣色淡若
生滿山頭其年必豐稔人競採之亦有紅紫二色紅
者取汁可染物以羊糞為肥若欲移植家園須以本
山土壅始活

粉團花 テリハナ

粉團一名繡球樹皮體皴葉青而微黑有大小二種
麻葉小花一蒂而眾花攢聚圓白如流蘇初青後白
儼然一毬其花邊有紫暈者為最俗以大者為粉團
小者為繡毬間中有一種紅繡球但與粉團之名不
相牟耳蘇毬海桐俱可接繡毬

八仙花

八仙花即繡球之類也因其一蒂八蕊成一朵故
名八仙其花白瓣薄而不香蜀中紫繡球即八仙花
如欲過貼將八仙移就粉團樹畔經年性定離根七

八寸許。如法貼縛。水澆至十月。俟皮生。截斷。次年開花。必盛。昔日瓊花至元時已朽。後人遂將八仙花補之。亦八仙之幸也。

紫荆花

ハナスワウ

紫荆花一名滿條紅。花叢生。深紫色。一簇數朶。細碎而無瓣。發無常處。或生本身。或附根枝。二月盡即開。柔絲相繫。故枝動朶朶嬌顫。若不勝。花謝後葉出。光緊微圓。根旁生枝。可以分種。性喜肥。畏濕。若與棗棠並植。金紫相映而開。更覺可人。冬取其莢種。肥地交

春即生。昔臨潼田真兄弟分居。復合。荆枯再榮。勿謂草木無情也。

金雀花

金雀花枝柯似迎春。葉如槐。而有小刺。仲春開黃花。其形尖而旁開兩瓣。勢如飛雀。可愛。乘花放時。取根上有鬚者。栽陰處。即活用鹽湯焯乾。可作茶供。

山礬花

山礬花一名芸香。一名鄭花。多生江浙諸山。葉如冬青。生不對節。凌冬不凋。三月着白花。細小而繁。不甚

可觀而香馥最遠故俗名七里香北人呼爲錫花其子熟則可食土人採其葉以染黃不借礬力而自成色故名山礬二月中可以壓條分栽採寘髮中久而益香放床席下去蚤虱置書帙間辟蠹魚

桑クハ

桑之功用甚大原非玩好之木此獨不遺者以存圃中之本務也其種類稍異白桑葉大如掌而厚雞桑葉細而薄子桑先樾後葉山桑葉尖而長女桑樹小而條長壓桑材中弓弩絲中琴瑟棧桑似赤棘以子

種者不若壓條之易大若以構接則葉大根下埋龜甲則茂盛不蛀又桑生黃衣謂之金桑其木必稿葉專飼蠶一歲三採更盛一云蝗之所至無葉不食獨不食桑亦造物之靈也壓桑條宜燥土則根易生

佛桑花

佛桑一名扶桑枝葉類桑與槿花色殷紅似芍藥差小而輕柔過之開當春末秋初五色婀娜可愛有深紅粉紅黃白青色數種并單葉重葉之異今北地亦有之皆自南方移植者但易凍死逢冬須密藏之

南天竹 ナニテン

南天竹 一作 一名大椿。吳楚山中甚多。樹高三五尺。歲久亦有長至丈者。但不易得耳。糯者矮而多子。瘦者高不結實。葉似苦楝而小。經冬不凋。實幹數枝。三四月間開細白花。結子成簇。至冬漸紅如丹砂。雪中甚是可愛。亦可製食。其性喜陰而惡濕。用山黃泥種背陰處。自茂不宜澆糞。但用肥土。或鞋底泥壅之。若澆只宜冷茶。或臭酒糟水。退雞鷲毛水最妙。人多植庭除間。不特供玩好。尤能辟火災。若秋後髡其幹留

取孤根。俟春生後。遂長條肄而結子。則本低矮而實紅。可作盆中冬景。

合歡花 子ムノハナ カウカノハナ

合歡。一名蠲忿。生益州。及近京雍洛間。樹似梧桐。枝甚柔弱。葉類槐。葉細而繁。每夜枝必互相交結。來朝一遇風吹。即自解散。了不牽綴。故稱夜合。又名合昏。五月開紅白花。瓣上多有絲茸。實至秋作莢。子極薄。細。人家第宅園池間。皆宜植之。能令人消忿。冬月可以分栽。取葉搗爛。絞汁。浣衣最能去垢。

漆ウルシ

栳一作漆生蜀漢江浙等處木高二三丈皮白葉似椿

花似槐子若牛李木心黃可作杖夏至後以剛斧斫

其皮將竹管承取其汁用漆器具甚妙液若不取多自凝

柿カキ

柿朱果也葉似山茶而厚大四月開黃白小花結實

青綠九月微黃即摘少藏數日即便紅熟甜美可啖

但未熟時最澁將木瓜三兩枚雜於生柿籃中數日

或以槓櫃置其中亦能去澁產青州者更佳古云柿

有七絕一樹多壽二葉多陰三無鳥巢四少蟲蠹五

霜葉可玩六嘉實可餐但不可與聯同食七落葉肥厚可以

臨書如冬間核種待長移栽不若春後用柶柿接或

取好枝於輓棗根上接更妙大凡柿接三次過則核

全無矣蓋柿之種類不一有紅柿烏柿黃柿牛奶蒸

餅八稜方蒂圓蓋塔柿等名色木有文而根最固俗

謂之柿盤別有一種柶柿葉上有毛實皆青黑最不

堪食止可收作柿漆八月間用柶柿擣碎每柿一升

用水半升釀四五時搾取漆令乾添水再取傘扇全

賴此漆糊成也。

柳 ヤナギ

柳一名官柳。一名垂柳。本性柔脆。北土最多。枝條長軟。葉青而狹長。初春生柔荑。粗如筋。長寸許。開黃花。鱗次黃上。甚細碎。以漸生葉。至暮春葉長成。花中結細子。如粟米。大扁小而黑。上帶白絮如絨。俗名柳絮。隨風飛舞。凡着毛衣。即生蛀蟲。入池沼。即化浮萍。此乃官柳也。若葉成陰。長條數尺。或至丈餘。娘孃下垂者。此為垂柳。雖無香艷。而微風搖蕩。每為黃鸝嬌。

語之鄉。吟蟬托息之所。人皆取以悅耳娛目。乃園林中必需之木也。種法在臘月。斫大幹。燔其下焦。而扞之。如劈開其皮。夾甘草一片入土。則不生蟲。壅土宜實。種後若不動搖。雖縱橫顛倒。插之盡活。乃最易生之物也。昔人因其花似絮。故有飛綿飛絮寒無用。如雪如霜。暖不消之咏。

楊

楊有二種。白楊葉芽時。便有白毛。及盡展。似梨葉長而厚。面淡青。而背白。蒂長兩兩相對。遇風則簌簌有聲。

聲人多植之墳墓間高可十餘丈又青楊樹比白楊較小葉似杏葉而稍長大色青綠本亦聳直大槩柳枝長脆葉狹長楊枝短硬葉圓潤柳性耐水楊性宜旱一木迥不相侔何可因其並稱而遂認爲一木耶特表而出之赤者近水生根須可樹以護壩堤。

檉柳 ギヨリウ

檉柳一名觀音柳一名西河柳幹不甚大赤莖弱枝葉細如絲縷婀娜可愛一年作三次花花穗長二三寸其色粉紅形如蓼花故又名三春柳其花遇雨卽

開宜植之水邊池畔若天將雨檉先起以應之又名雨師葉經秋盡紅負霜不落春時扦插易活。

橘 枳附
タケナニ
ニカン

橘一名木奴小曰橘大曰柚多生南方暖地本高一二丈刺出莖間葉冬不凋初夏開小白花其香甚觸六七月成實交冬黃熟福橘大而紅爲諸橘之最溫衢者亦佳其類甚多韓彥直有橘譜可考今錄其要有朱橘蜜橘乳橘芳塌橘包橘綿橘沙橘早黃穿心波斯荔枝脫花甜凍橘盧橘等至如油橘則最下之

品也。春初取核撒地。待長三尺許。移栽宜於斥鹵之所。忌用猪糞。夏時澆以糞水。則葉茂而實繁。性畏霜雪。至冬以河泥犬糞壅其根。以爲來年之益。稻草裹其幹。則不凍死。若在閩粵則不然也。其木有二病。蘚與蠹是也。幹生苔蘚。須速刮去之。見蛙屑飄出。必有蟲穴。以鈎索之。再用杉木釘塞其孔。經云。橘踰淮而爲枳。則枳卽橘之變種也。故其木與花葉皆類。橘惟所結子不同。橘有瓢可食。枳則皮粗厚。內實而不堪食。只可入藥用。其樹多刺。最宜編籬。凡遇旱。以米泔

水澆。則實不損落。根下埋死鼠。則結實加倍。藏橘於綠豆內。至春盡不壞。橙柑亦然。若見糯米卽爛。

橙
ユ
ユ
ス

橙一名蜜橙。一名金毬。樹似橘而有刺。葉長有兩刻。缺如兩段者。實似橘而微大。經霜早黃。皮皺厚而甜。香氣馥郁。但瓢稍酸。人多以糖製。或蜜浸。其用甚廣。誠佳果也。一種香橙。似蜜橙。小而皮薄。味酸。花皆類橘。葉亦有尖。一種懈橙。卽臭橙。比蜜橙皮鬆。味辣。無所取用。蜀有給客橙。似橘而實非。若柚而獨香。冬夏

花實相繼。通歲得以食之。亦名盧橘。

金柑 キンカン

金柑一名金橘。一名瑞金奴。生江浙川廣間。其樹不甚大而葉細。婆娑如黃楊。夏開小白花。秋冬實熟則金黃色。大如指頭。或如彈丸。更有小如豆者。皆皮薄而堅。肌理瑩細。其味酸甜而芳香。可口。一種牛奶柑。形長如牛乳。但香味稍劣。又一種名金豆者。樹只尺許。結實如櫻桃。大皮光而味甜。植於盆內。冬月可觀。多產於江南太倉。與浙之寧波。又一種蜜羅柑。其大

似香櫞。而皮皺。味更香美。生於浙之金衢。皆以四月前發。

香櫞

香櫞。俗作圓一名枸櫞。本似橘。而葉畧尖長。枝間有刺。花之色與香亦類。橘其實正黃色。有大小二種。皮光細而小者為香櫞。皮粗而大者為朱欒。香味不佳。惟香櫞清芬襲人。能為案頭數月。清供。瓢可作湯。皮可作糖片。糖丁。葉可治病。其樹必待小鳥作窠。後方得開。花結實亦物類之感召也。下子亦易出。

佛手柑

佛手柑一名飛穰產閩廣間樹似柑而葉尖長枝間有刺植之近水乃生結實形如人手指長有五六寸者其皮生綠熟黃色若橙而光澤內肉白而無子雖味短而香馥最久置之室內笥中其香不散南人以此雕鏤花鳥作蜜煎果食甚佳

擯榔

擯榔一名馬金南生南海今嶺外皆有木大如栲榔高五七丈初生若竹竿積硬引莖直上有節而無旁枝柯條從心生端頂有葉似芭蕉條脉開破風至則

如羽扇三月葉中腫起一房因自拆裂出穗凡數百實其大如李皆有皮殼又生刺重累於下以護其實五月成熟剝去其皮煮肉曝乾交廣人邂逅設此代茶食必以扶留藤牡蠣灰同咀嚼之吐去紅水一口則柔滑甘美不澀又大腹子即豬擯榔形扁而味澀必須萇葉與蛤粉卷和而食

虎刺 アリトウシ

虎刺一名壽庭木生於蘇杭蕭山葉深綠而先上有一小刺夏開小白花花開時子猶未落花落後復結

子紅如珊瑚其子性堅雖嚴冬厚雪不能敗性畏日喜陰本不易大百年者止高二三尺春初分栽亦多不活用山泥忌糞水并人口中熟氣相冲宜澆梅水及冷茶吳中每栽盆內紅子纍纍以補冬景之不足

蜜蒙花

蜜蒙花生益州及蜀之州郡木高丈餘葉似冬青而厚背白色有細毛花微紫色二三月採花暴乾則味其甜如蜜其花一朵有數十房蒙蒙然細碎故有是名

平地木 ヤブカウヂ

平地木高不盈尺葉似桂深綠色夏初開粉紅細花結實似南天竹子至冬大紅子下綴可觀其托根多在甌蘭之傍虎茨之下及巖壑幽深處二三月分栽乃點綴盆景必需之物也

梔子花 クキナシノハナ

梔子花一名越桃一名林蘭釋號簷蔔小木也有三種單葉小花者結子多千葉大花者不結子色白而香烈又有四季花者亦不生山梔徽州產一種矮樹

梔子高不盈尺盆玩清香動人夏花潔白而六出秋實丹黃有稜可染黃色亦可入藥昔孟景十月宴芳林園賞紅梔子花清香如梅近日罕見此種冬初取子晒乾來春畦種覆以灰土如種茄法次年三月移栽至四年即開花結實矣又梅兩時隨花剪扞肥地亦活若千葉者宜土壓旁生小枝久則根生分栽自活性不喜糞惟以輕肥沃之自茂若太肥又恐生白蠹一法芒種時穴一腐板泥塗剪枝種其上浮置水面候其根生後移而種之

石榴 サクロ

石榴一名丹若一名金罌又一種味最甜者名天漿其種自安石國張騫帶歸今隨在有之樹高一二丈梗紅葉綠而狹長其花單葉者結實千葉者不結實性宜沙石枝柯附幹自地便生作叢孫枝甚多種極易息惟山種者實大而甘干房同膜千子如一花有數色千葉大紅千葉白或黃或粉紅又有並蒂花者南中一種四季花者春開夏實之後深秋忽又大放花與子並生枝頭碩果罅裂而其傍紅英燦爛併花

折插瓶中豈非清供乎又一種中心花瓣如起樓臺
謂之重臺榴花頭最大而色更紅艷海榴花跗萼皆
大紅心內鬚黃如粟密又有紅花白緣白花紅緣者
亦異品也其實可禦饑渴釀酒漿解醒療病栽以三
月初取嫩枝如拇指大者斫令長一尺半八九枝共
為一窠燒下頭二寸許不燒恐漏汁難活掘圓坑深
一尺七寸口徑尺豎於坑畔環布枝令勻正置枯骨
殭石於枝間骨石乃樹性所宜也下肥土築之一重土間一重
骨石至平坎乃止其土令沒枝頭過一寸許水澆常

令潤澤若已生芽又將骨石布其根下則柯圓枝茂
可愛其孤根獨立者雖生亦不佳十月終以蒲葦裹
其本而纏之不致凍壞至二月初解放若以大石壓
其根上則實繁而不落性喜暖雖酷暑烈日中亦可
澆以水糞

火石榴

テウセンガクロ

火石榴以其花赤如火而得名究不外乎榴也樹高
不過一二尺自能開花結實以供盆玩亦有粉紅純
白者皆可人目若嫌其葉多花少嘗摘去嫩頭偏於

烈日中以肥水澆之則花更茂亦物性使然也大抵
盆種土少力薄更不耐寒逢冬必須收藏房簷之下
庶不凍壞養盆榴法無間寒暑以肥爲上盛夏置之
架上或屋上使不近地氣則枝不大長若蟻蚓作穴
用米泔水沉沒花盆浸約半時取出日晒如土乾又
復浸之則無矣倘發莖太密須搯去其半則花開始
有精神結實不至半大便落又有一種細葉柔條者
更佳多產揚州

棟オホキ センダン

棟樹有二種青皮棟堅紉可爲器具其皮肉俱青色
火棟性質輕脆其皮肉皆紅樹高一二丈葉密如槐
而尖夏開花紅紫色一蓓數朶芬香滿庭實如小鈴
生青熟黃又名金鈴子鳥雀專喜食之故有鳳凰非
棟實不食之語江南自春至夏有二十四番花信風
梅花爲首棟花爲終實熟鳥不食者俗名苦棟子也
木有雌雄雄者根赤無子

棗ナツメ

棗一名木蜜樹堅直而高大身多刺而少橫枝葉細

而有尖。四五月開小淡黃花。香味甚濃。北地最廣。而青晉絳州者更佳。今實之鮮者。通謂之白蒲棗。乾者幸自河南山東北直諸處產。而青州樂氏棗為最。浙之金衢紹出南棗。獨浦江者甘膩似密雲棗。而形長大。密雲雖小而核細。肉甜。羊棗實圓而紫黑色。江寧窰坊棗與膠棗無皮核。而人多重之。又東海有棗。五年一實。棗類甚多。不能詳載。其實未熟。雖擊不落。已熟不擊自落。凡種擇鮮棗之味美者。交春種下。候葉一生。即便移栽。三步植一株。行欲相當地。不必耕也。

每蠶入簇時。以杖擊其枝間。使振去狂花。則結實繁而且大。又於白露日。根下遍堆草。焚之以辟露氣。使不至於乾落。至正月初一早。以斧背斑駁槌之名曰嫁棗。本年必花盛。而實繁。俗云移棗樹三年不發。不發亦死。亦有久而復生者。又東海之中有水赤棗。華而不實。

椿 附標
チヤンチン

椿俗名香椿。樹高聳。而枝葉疎。無花而不結莢者。是也。其根上孫枝。春秋二分日。移植即活。其嫩葉初放。

時土人摘以佐庖點茶香美絕倫一種似椿而葉臭有花而結莢者俗呼為瓠椿是樗非椿也江東人呼為虎目葉脫處有痕相似也

楓

楓一名彙香木也其樹最高大似白楊而堅可作棟梁之材葉小有三尖角枝弱善搖二月開白花旋即着實圓如龍眼上有芒刺不但不可食且不中看惟焚作香其脂名白膠香一經霜後葉盡皆赤故名丹楓秋色之最佳者漢時殿前皆植楓故人號帝居為

楓宸一云楓脂入地千年即成琥珀又有一種小楓樹高止尺許老幹可作盆玩

楮 カキ カウソ

楮一名穀樹有二種一雄皮斑而葉無榘又三月開花即成長穗似柳花而無實一雌皮白中有白汁如乳葉有榘又似蒲萄開碎花結實紅似楊梅但無核而不堪食皮可作紙汁可克膠十二月內將子淘晒過種即生亦可佐服食

梧桐 アヲギリ

梧桐一名青桐。一名櫟木。無節而直。生理細而性緊。皮青如翠。葉缺如花。妍雅華淨。新發時賞。心悅目人。家軒齋多植之。四月開花。嫩黃小如棗花。墜下如醜。五六月結子。莢長三寸許。五稜合成。老則開裂如箕。名曰橐鄂子。綴其上。多者五六。少者二三大。如黃豆。雲南者更大。皮乾則皺而黃。其仁肥嫩而香。可生。斝亦可炒食。點茶。此木能知歲時。清明後。桐始華。桐不華。歲必大寒。立秋是何時。至期一葉先墜。故有梧桐一葉落。天下盡知秋之句。每枝生十二葉。一邊六葉。從下

數一葉為一月。有閏則十三葉。視葉小處。即知閏何月也。二三月畦種。如種葵法。稍長。移種背陰處。方盛地喜實。不喜鬆。凡生岩石上。或寺旁。時聞鐘磬聲者。採東南大枝為琴瑟音。極清麗。別有白桐、油桐、海桐、刺桐、頰桐、紫桐之異。惟梧桐世人皆尚之。又一種最小者。因取其婆娑暢茂。堪克盆玩。

楊梅 ヤ、モ

楊梅一名杙。音求。為吳越佳果。樹若荔枝而小。葉細陰厚。至冬不凋。隔年開花。結實如穀。樹子而有核與仁。

生青熟紅如鶴鳴狀亦有紫白色者肉在核上無皮
殼而有仁可食以柿漆拌核暴之則自裂仁出大畧生太湖杭紹諸
山者實大肉鬆核小而味甘美餘雖有實小而酢止
堪鹽淹蜜漬火薰而已種法六月間將子於糞坑內
浸過收盒待來年二月以青石屑拌黃土鋤地種之
待長尺許於次年三月移栽澆以羊糞水自盛四年
後取別樹生子好枝接之復栽山黃泥地移時根下
須多留宿土臘月開溝於根旁高處離四五尺以灰
糞壅之不可着根每遇雨肥水滲下則結實必大而
甜若以桑樹接楊梅則不酸如樹生癩以甘草削釘
釘之即愈春分前海桐可接

橄欖

橄欖一名南威一名味諫俗呼青果生嶺南及閩廣
諸州郡有五種丁香欖故欖蠻欖絲欖新婦欖樹似
木樨聳直而枝高其大有數圍者春開花似樗其香
甚甜美實長寸許其形如梭而兩頭銳核內無仁而
有三竅深秋方熟入口雖酢後漸清芬勝於雞舌香
凡實先生者向下後生者漸高有樹大不可梯者將

熟時以木釘釘之或於根旁刻一方寸坎納鹽其中。一夕後實皆自落木亦無損其尖而香者名丁香橄欖最爲珍品圓而大者俗名柴橄欖初食之甚澁殆咀嚼久之隨飲以水回味自甘煮食可解酒毒置湯中可以代茶鹽淹蜜漬皆宜又廣西出方欖有三角邕州者色類相似但核作兩瓣之異耳。

荔枝

荔枝一名丹荔一名離枝爲南方珍果嶺南蜀中俱產惟閩中爲第一樹有高至五六丈者其形團圓如

帷蓋葉似冬青花如橘枳又若冠之綦綬朶如蒲萄結實多雙核類枇杷而尖長殼如紅縐膜如紫綃肉如白肪甘如醴酪花於春末實於夏中其木堅久其根多浮須常加糞壤以培之但性不耐寒最難培植纏經繁霜枝葉立萎必待三春再發初種五六年交冬便須覆蓋直至四五十年始開花結實有四百餘年老幹猶能結實亦異品也每逢夏至將中其實翕然俱赤採食味甘多汁而香大樹下子可百斛妙在人未採時百蟲不敢食一經染指烏雀蝙蝠之類俱

來傷殘熟時必趁日中併手採摘此果若離本枝一日色變二日香減三日味變四日外色香味皆盡矣非惟北地不可得即江浙亦未之見也然其名色荔枝譜載之甚詳茲畧舉蔡君謨之大槩而錄之總由愛其實而摹擬其色香味與地土形狀姓氏而巧為名之耳多食病熱以蜜解之

附荔枝釋名 共七十五種

諸色荔枝

狀元紅 實圓而小核細如丁香上品也 大將軍 五代時有此因種自將軍府得名

一品紅 於荔枝為極品 玳瑁紅 色紅有黑點類

陳紫 乃為果中第一 方紅 徑可二寸色味俱美

藍家紅 泉州第一品出 法石白 出法石院色白

江綠 味次出泉州江姓 周家紅 初為第一今重陳

大丁香 殼厚色紫味微 龍牙 長可三四寸彎曲如

朱公荔枝 比陳紫而小 十八娘 色深紅而細長闊

珍珠荔枝 圓白如珠無核荔枝之最 火山荔枝 出南越四月熟

蒲萄荔枝 每穗多至 粉紅荔枝 荔枝本深紅此

蜜荔枝 因其過於甘香 圓丁香 他種殼下大上銳

水荔枝漿雖多而味不及出興化軍大小陳紫一種大過陳紫一種小過陳紫

綠葉香皮色綠而雜以紅點斑駁可愛虎皮荔枝色紅上有青斑類虎皮

牛心此以狀名長一寸餘皮厚肉澁釵頭顆顆最小而紅豔可施之頭鬢

柑殼是以狀得名秋元紅實時最晚因以命名游家紫出泉州游氏

何家紅漳州何氏綠核荔枝核皆紫力此核獨綠蕙團每朵數十並蒂雙垂

朱柿色似朱形如柿硫黃以其色類硫黃出福州學士緋實色最紅可愛

水晶國肉似水晶楓亭驛出興化肉厚味甘焦核因其核最細為荔枝中妙品

六月蜜取六月熟七夕紅因其七月實熟也中秋綠因其熟太遲也

皺玉肉微有皺紋星毬紅實圓有似乎毬綠羅袍雖成熟色猶帶綠

天茄子色如茄花麝香匣其香微有似於麝松柏壘其形有類於松實

金鐘金櫻紫璫蒺藜延壽紅以上諸名皆取其色

駝蹄饅頭蛇皮雙髻僧耆頭以上取形相似

脆玉栗玉玉英郎官紅水母以上取肉色

沉香壽香透背中半熟此種取其時百步蘭以上取其香

進鳳子爭龍瓶犀角子不憶子

大蠟小蠟雜每引子拌狗亦取其色得名

龍眼

龍眼一名益智一名比目一名海珠藜樹似荔枝而

葉幹差小。凌冬不凋。其枝蔓延緣木而生。春未開細
白花。結實圓如彈。而殼青黃。核如木椀子。而不堅。肉
白有漿。其甘如蜜。一朶四五十顆。作穗若蒲萄。然其
性畏寒。白露後方可摘。荔枝有後方熟。故俗呼爲荔
奴。又因其色香味皆不及荔枝。故稱爲奴。在食品則
荔枝肉厚漿多。而香因可人口。特珍異之。若論益人
則龍眼功用良多。荔枝性熱。而龍眼性最和平。宜與
荔枝比肩。烏得而奴隸之耶。

黃楊木

黃楊木。樹小而肌極堅。細枝叢而葉繁。四季長青。每
歲止長一寸。不溢分毫。至閏年反縮一寸。昔東坡有
詩云。園中草木春無數。惟有黃楊。屢閏年。因其難大
人多以之作盆玩。

柳ヤシホ

柳。出海南。今嶺南亦有之。葉如棕櫚。樹高六七餘丈。
亦無枝條。葉在木末。如束蒲。實生葉間。一穗數枝。大
如寒瓜。皮中子殼。可爲飲器。鋸開子中。白瓢厚有半
寸。味似胡桃。極肥美。有漿飲之。輒醉。初極清芬。久之

則渾濁不堪飲矣。人皆取其殼作瓢。能解水與酒毒。如酒有毒。則酒滾沸而起。今人反漆其裏。是失本旨矣。

椒 サンシヤウ

椒一名蘆菘。一名漢椒。有秦蜀二種。今處處有之。惟蜀產者香烈。木高四五尺。似茱萸而小。本有針刺。葉堅而滑。味亦辛香。蜀人取嫩芽作茶。其葉對生。尖而有刺。四五月結子。枝葉間如小豆而圓。生青熟紅。皮皺肉厚。內有小黑子突出。如人之瞳子。故有椒目之

稱。喜陰惡糞。宜壅河泥。又一種胡椒。生於西戎。北人食物中多尚之。廣東一種小椒。係蔓生。其辣味與樹椒同。

茱萸

茱萸隨處皆生。木高丈餘。皮青綠色。葉似椿而潤厚。色青紫莖間有刺。三月開紅紫細花。其實結於枝梢。繁繁成簇。而無核。嫩時微黃。至熟則深紫。味辛辣。如椒。井側河邊宜植。此樹葉落。其中人飲。是永無瘟疫。懸子於屋。能辟鬼魅。九月九日。折茱萸戴首。可辟

惡氣除鬼魅

銀杏 イテウ

銀杏一名鴨脚子以其葉似鴨脚也多生南浙木最耐久高

十餘丈大可數圍其肌理甚細可為器具梁棟之用

又名公孫樹言公種而孫始得食也緣其子白俗呼

為白果其花夜開即落人罕見之實大如枇杷每枝

約有百十顆初青後黃八九月熟後打下堆積空處

待其皮白腐爛方取其核洗淨曝乾核形兩頭尖扁

而中圓或炒或煮而食俱可春初種肥地週年後方

可移栽其核有雌推雌者兩稜雄者三稜須雌雄同

種方肯結實或將雌樹臨水種之照影亦結或將雌

樹鑿一孔以雄木填入泥封之亦結大約接過易生

實熟時以竹篾纏樹本但擊篾則果自落雖為佳果

可以療病究竟不可多食食多動風惟舉子延試煮

食能截小水如食多誤中其毒一時腹內痛脹連飲

冷白酒幾盃一吐即愈

胡桃 クルミ

胡桃一名羌桃一名萬歲子樹高數丈葉翠似梧桐

兩兩相對而長且厚而多陰三月開花如栗花穗蒼
黃色實似青桃有二種殼薄多肉易碎者名胡桃產
荆襄殼堅厚須重槌乃破者名山核桃產燕齊採用
先剖去青皮乃得核桃核內有白肉形如猪腦外有
黃膜微澁須湯泡去之可食然其性熱只宜少食下
種必擇其佳者殼光紋淺體重之核平埋土中即能
發芽若以尖縫向上則水浸其仁壞多不能活春斫
皮中出汁婦女承取沐頭則髮黑又將核入火中燒
半紅埋灰中作火種經三四日不動亦不燼

六月雪

六月雪一名悉茗亦名素馨六月開細白花樹最小
而枝葉扶疎大有逸致可作盆玩喜清陰畏太陽深
山叢木之下多有之春間分種或黃梅雨時扦插宜
澆殘茶

茶 子ヤ

茶一名薺音喘早採爲茶晚採爲茗其葉以穀雨前採
者爲貴花色月白而心黃清香隱然瓶之高齋誠爲
雅供且藎在枝間者逐一皆開性畏水與日不澆肥

者茶更香美其所產之地殊多但不宜於北今就最
著名者而衡之松羅伏龍天池陽羨等類色翠而香
遠界片產吳興是茶而實非茶種皆為江浙第一如
虎丘龍井又為吳下第一惜不多產至於荆溪武夷
稍下六安可入藥而香味不及天目徑山次之此外
所產只可供本土之用爾藏茶須用錫瓶則茶之色
香雖經年如故近日閃茶以松羅雜真珠蘭焙過而
香更烈者終不若天然香味之足貴也但茶性甚淫
梅花茉莉玫瑰木樨隨拌隨染其香矣

枳椇

ケニホノナレ

枳椇一名木蜜一名雞距子樹高三四丈葉圓大如
桑柘枝柯不甚直子着枝端夏月開花實長寸許紐
曲開作二三岐形若雞之足距嫩時青色經霜乃黃
味甘如蜜嫩葉生啜亦甜老枝細破煎汁成蜜倍甜
能止渴解煩但敗酒味若以此木為柱則屋中之酒
必薄每實開岐盡處結一二小子內有扁核色赤如
酸棗仁飛鳥喜巢其上

槐

エニジュ

槐一名懷一名盤槐一名守宮槐樹高大而質鬆脆葉細如豆瓣季春之初五日如兔耳十日如鼠耳更旬始規二旬葉成扶疎可觀花淡黃而形彎轉在秋初時開故有槐花黃舉子忙之諺人多庭前植之一取其蔭一取三槐吉兆期許子孫三公之意花可染色結實至明年春暮方落落即自生小槐懷槐葉大而色黑本如棠盤槐膚理葉色俱與槐同獨枝從頂生皆下垂盤結蒙密如涼傘性亦難長歷百年者高不盈丈或植廳署前或種高阜處甚有古致守宮槐

幹弱花紫晝聶夜炕又俗名猪屎槐者材不堪用種法收子晒乾夏至前以水浸生菜和蒜子撒肥地當年即與蒜齊刈蒜留槐別樹竹竿以繩攔定來年復種蒜護之三年後方可移栽老槐經秋可取火

紫薇 サルスベリ

紫薇一名百日紅其花紅紫之外有白者曰銀薇又有紫帶藍色者曰翠薇俗呼為怕癢樹其木光滑無皮人若搔之則枝幹無風而自動亦其性使然也葉對生一枝數穎一穎數花六月始花其莖開謝相接

續可至九月。約有百日之紅。其性喜陰。宜栽於叢林之間。不蔽雨露處。自茂。根旁小木。分種易活。

白菱

白菱。葉似梔子。花如千瓣菱花。一枝一花。葉托花朵。七八月間發花。其花垂條。色白如玉。綽約可人。亦接種也。

木槿 モクゲ

木槿。一名薜英。一名王蒸。又名日給。愛老。重臺。花上花。諸名目。惟千葉白。與紫。大紅。粉紅者佳。葉繁密。如

桑而小。花形差小於蜀葵。朝榮夕隕。遠望可觀。若單葉柔條。五瓣成一花者。乃籬槿也。止堪編籬。花之最下者。南海有朱槿。但不可得耳。在春初扦插。以河泥壅之。即活。若欲扦插。須一連插去。不可住手。如斷續。插生後。雖盛亦必斷而不接也。其嫩葉可代茶飲。

桂 モクセイ

桂。一名榿。一名木樨。一名巖桂。葉對生。豐厚而硬。凌寒不凋。枝條繁密。木無直體。花甚香甜。小而四出。或有重臺。亦不易得。其種不一。白名銀桂。黃名金桂。能

著子紅名丹桂不甚香。又有四季桂。月桂。閩中最多。葉如鋸齒而紋粗。花繁而香濃者。俗呼毬子木。揮花時凡三放。為桂中第一。澆以猪穢則茂。壅以二蠶沙則肥。但不宜糞。而喜河泥。若移栽須擇高阜。半日半陰處。以臘雪高擁其根。則來年不灌自茂。冬月以猪猪湯澆一次尤妙。如木生蛀。取芝蔴梗懸之。樹間能殺諸蟲。一云木樨接於石榴樹上。其花即成丹桂花。樹後摘去其蒂。亦如鳳仙可發。二次屈其條壓土中。良久自能生根。一年後截斷。八月含蕊時移種。若以

冬青樹接亦可。花以鹽滷浸之。經年色香自在。以糖椿作餅點茶香美。

皂莢 サイカン

皂莢一名皂角。所在有之。樹最高大。葉如槐而尖。細枝多刺。夏開小黃花。結實有三種。小而尖者名猪牙。長而肥厚多脂者可用。長而瘦薄不粘者劣。初生時嫩芽可茹。莢老可入藥。二三月宜種。如樹大不結莢。當於南北二面去地鑽孔。用木釘釘入。泥封其孔。來年即結。

樓欄 シユロ

樓欄一名鬚葵。木高數丈。直無旁枝。葉如車輪。叢生。木抄有棕皮包於木上。二旬一剝。轉復上生。三月間。木端發數黃苞。苞中細子成列。卽花穗亦黃白色。結實大如豆而堅。生黃熟黑。每一墮地。卽生小樹。宜植。庄園之內。性喜鬆土。或鳥雀食子遺糞於地。亦能生。苗秋分移栽。先掘地作坑。用狗糞鋪坑底。再以肥土蓋之。初種月餘。以河水間日一澆。後此隨便可也。至其棕之爲用。織衣帽褥椅之類。甚廣。再製爲繩索。縛。

花枝紫屏架。雖經雨雪。耐久不爛。園圃中極當多植。數本者。

紅豆樹 トウアツキ

紅豆樹出嶺南。枝葉似槐。而材可作琵琶槽。秋間發花。一穗十莖。纍纍下垂。其色妍如桃杏。結實似細皂角。來春三月。則莢枯子老。內生小豆。鮮紅堅實。永久不壞。市人取嵌骰子。或貯銀囊。俗皆用以爲吉利之物。又有一種半截紅半截黑者。名相想子。土人多採以爲婦人首飾。

無花果 イチジク

無花果一名優曇鉢一名映日果一名蜜果樹似胡
桃三月發葉似楮子生葉間五月內不花而實狀如
木饅頭生青熟紫味如柿而無核植之其利有七一
味甘可口老人小兒食之有益無損二曝乾與柿餅
無異可供邊實三立秋至霜降取次成熟可為三月
之需四種樹取効最速桃李亦須三四年後結實此
果截取大枝扦插本年即可結實次年便能成樹五
葉為醫痔勝藥六霜降後如有未成熟者可收作糖

蜜煎果七得土即活隨地廣植多貯其實以備歉歲
種法在春分前取三尺長條插土中澆以糞水若生
葉後惟澆清水結果後更不可缺水常置甌其側出
以細甯日夜不絕實大如甌

枇杷 ヒハ

枇杷一名盧橘樹高一二丈葉似琵琶又如驢耳背
有淡黃毛枝葉婆娑凌冬不凋秋發細莖成毬冬開
白花來春結子簇結作株微有毛如鶯黃小李至夏
成熟滿樹皆金其味甘美收核種之即出待長移栽

春月用本色肥枝接過則實大而核小若再接再一次則無核矣性不喜糞但以淋過淡灰壅之自能榮茂果木中獨備四時之氣者惟枇杷核能去微垢

栗クリ

栗產濮陽范陽兗州而宣州杭州者更佳樹似櫟而花色青黃與他花特異枝間綴花長二三寸許有似胡桃人俟其落時收之點火風雨不滅結實如毬外有芒刺內有栗房一包三五枚熟則罅拆子出如欲乾收或曝或懸迎風處若欲生收藏之潤沙中至春

三四月尚如新摘者冬末春初將子埋濕土中種向陽地待生長六尺餘方可移栽春分時取櫟樹或本樹生子肥大者接之亦可栗生數年不可掌近凡屬新栽樹皆然而栗尤甚十月天寒以草包之二月方解或云與橄欖同食能作梅花香味而橄欖無渣

榛ハシバニ

榛生關中鄜坊山東等處樹似梓而高丈餘葉色如牛李冬發花春結實外殼堅內肉香狀如小栗其核中悉如李生則胡桃味乾則甜美可食產遼東新羅

者更肥美。栽種法與栗同。

榧 カヤ

榧一名披子。一名玉榧。俗呼赤果。產自永昌。杭州者不及信州玉山之佳。葉似杉而異形。其材文彩而堅。本大連抱。高有數仞。古稱文木。堪爲器用。樹有牝牡。牡者開花而牝者結實。理有相感。不可致詰也。冬日開黃圓花。其實有皮殼如棗而尖短。去皮殼可以生食。若火焙過。便能久藏。食更香美。大槩以細長而心實者爲佳。一樹可得數十斛。二月下子種。

木蘭

木蘭一名木蓮。一名杜蘭。生零陵山谷及泰山上。狀如楠樹。高數丈。枝葉扶蘇。皮似桂而香。葉似長生有三道縱紋。花似辛夷。內白外紫。亦有紅黃白數種。交冬則榮。亦有四季開者。實如小柿。甘美可食。

茶梅花 サバンクワ

茶梅非梅花也。因其開於冬月。正衆芳凋謝之候。若無此花。點綴一二。則子月幾虛度矣。其葉似山茶。而小花如鷺眼錢。而色粉紅。心深黃。亦有白花者。開最

耐久望之雅素可入

天仙果

天仙果出自四川。樹高八九尺。葉似荔枝而小。不開
花而自實。纍纍枝間。子如櫻桃。六七月中熟。其味最
甜美。

古度子

古度子出自交廣諸州。本與葉似栗。不開花而實。枝
間生子。大如安石榴。及檀子。而色赤。味酸。煮以為糲
食之。若遲數日不煮。則化作飛蟻。穿皮飛去矣。此益

無情化有情之一驗也。

攀枝花

ハンヤノハナ

攀枝花一名木綿。產於南越。樹類梧桐。高四五丈。葉
類桃而稍大。花似山茶。開時殷紅如錦。結實大如酒
杯。絮吐於口。即攀枝花。土人取其實中絮。鋪褥甚軟
美。但不可作綿線。若樹上有取不盡者。猶如柳絮。即
飛揚四散矣。

柏

ナニキンハセ
リウキウハセ

柏一名烏柏。一名柅柳。出浙東江西。樹最高大。葉如

杏而薄小。淡綠色。可以染皂。花黃白。子黑色。可以取
 臘。為燭。其子中細核可榨。取油。止可燃燈。油傘不可
 食。食則令人吐瀉。木必接過方結子。不接者雖結不
 多。秋晚葉紅。可觀。亦秋色之不可少者。

石楠

石楠。昔楊妃名為端正木。南北皆有之。樹大而婆娑
 其質甚堅。葉如枇杷。有小刺而背無毛。名曰鬼目。春
 盡開白花。成簇。秋結細紅實。冬有二葉。為花苞。苞既
 開。中有十五餘花。大小如椿花。其細碎。每一包約彈

子大而成毬。一花六葉。一朵有七八毬。淡白綠色。葉
 木微淡赤色。花既開。盡滿花。但見葉不見花。花纔罷
 隔年。綠葉始落。漸生新葉。綠葉密多。蔭人皆移植庭
 院間。清明時紅葉墮地。小兒拾為冠帶。嬉戲蜀中一
 種最大者。可數十圍。中梁柱之用。小者為梳。最精。

鐵樹

鐵樹。葉類石楠。質理細厚。幹葉皆紫黑色。花紫白。如
 瑞香。四瓣較少。團一開。累月不凋。嗅之。乃有草氣。因
 憶古人嘗見事。或難成。便云。除須鐵樹開。花疑無是。

樹及至馴象衛殷指揮園中見有此樹高可三四尺
詢其名則曰鐵樹每遇丁卯年便放花其年果花移
置堂上治酒歡飲作詩稱賀若非到此目睹則安知
真有是木耶及聞海南人言此樹黎州極多有一二
尺長者葉密而花紅樹儼類鐵其枝桠穿結甚有畫
意益玩最佳但人所罕見故稱奇耳五臺山有鐵樹
每年六月開花

冬青

子ス三モ子


冬青一名萬年枝樹似枸骨枝幹疎勁葉綠而亮隆
冬不枯可以染緋庄園徑路多排直而種號曰冬墻
夏開小白花而氣味不佳花含蕊必雨花落後必晴
結子圓而青名曰女貞實可以釀酒子墜地即生苗
移植易活欲其茂盛須用猪糞壅再以猪溺澆雖至
彫瘁復榮一種細葉冬青枝條細軟乘小時種傍籬
邊用以密編可蔽籬眼堅久如壁又一種水冬青葉
細而嫩利於養蠟子取白蠟宋徽宗試畫院諸生以
萬年枝上太平雀為題無一知者及扣之冬青也洪
武時杭城各街市比屋植冬青亦取吉祥之意

榆

榆類種多。葉皆相似。但皮及木理有異。刺榆如栢有刺。其葉如榆。嫩時瀹為蔬。羹滑於白榆。初春先生莢。名曰榆錢。最可觀。亦可作羹。至冬實老。可釀酒。亦可作醬。荒歲其皮磨為粉。可食。亦可和香末作糊。榆麵如膠。用粘瓦石。極有力。

秘傳花鏡卷之三終

花鏡圖





櫻桃



結香




杏



玉蘭



香瑞



梅



茶山



梅臘

花李



桃絲金



梨



桃竹夾



丁香



辛夷



鵝杜



桃



花官文



棠海府西



楂山



檣林




李郁



瓜木



棠海梗貼



梨棠



桑



花雀金



桑佛



礬山



荆紫



躑躅



八仙花



團粉





豆紅海



椰檳



花蒙蜜



刺虎



橙



手佛



棟



椽





椿



楊黃



楓



棗



榴石



平地木



榆



梔子花



椰



荔枝



椒



眼龍



梅楊





楮



攬橄



梧桐



無花果



角皂



蘭木



樞



菱白



槿木



梭櫚



栗



柏



古度子



石楠



攀枝花



茶梅



榛



天仙果



枇杷



古藥



鐵樹

青冬

