

董芳如字毅朴  
古

丁氏醫學叢書

普通藥物書教科書

上海英界泥城橋西靜安寺路三十九號醫學書局發行

正改丁氏醫學叢書總序

余自髫齡後，即喜涉獵典文，或局戶浹旬，或飢驅千里，人事倥偬，未嘗輟也。曩者因詩書二經，本朝諸儒疏通證明，殆靡遺義。後生璞璞，補苴不足以名家，遂求聲音訓詁於說文，許氏求陰陽消息於易虞，氏求典章制作於禮鄭，氏求義理心性之學於濂洛關閩，諸書求歷代宏綱鉅典之因革於九通及正史之表志，求九章元代幾何三角微積等學於中外之嗜人家，求詞章之學於漢魏六朝唐宋，以及本朝之迦陵稚威西河北江諸家，如是者十餘年，資性樞不能有所得，而心勤形療，吾之肺病適成，遂求醫學於本經素問靈樞難經，以及漢之張長沙，晉之葛稚川，唐之孫思邈，金元之四大家，如是者又數年，而肺病日益加劇，莊子刻意篇有曰：「吐故納新」，熊經鳥伸（淮南子精神訓亦有此語），三國志華佗傳亦有曰：「熊經鷄臚」，雖皆修養家導引之事，而與近世孫唐氏之體力養成法，適相符合，求其法而習之，而體力少強，遂求解剖學生理衛生學，以及醫學藥物學於東西洋之典籍，而專注其意於肺癆，約年餘而病果瘳。

高密鄭氏龍門成都兩司馬氏昌黎韓氏尚矣未學荒陋欲以考據詞章之末附於舊人之後亦不自諒而以數十年病餘牘得之寒暑起而作入而息頃然與禽獸草木等處前之人負其名以去則又何如漢賈生之言曰至人不居朝廷必隱於醫而宋范氏之言與之相似因潛其心於醫受業於新開趙先生元益以求中西醫學之會通考醫學之分科古略而今詳中疏而西密於此可以知學術之升降焉周有四科曰疾醫考醫食醫獸醫見周禮唐有七科曰體療少小耳目口齒角法按摩咒禁見大典宋設三科曰方脉科鍼灸科瘡科見選舉志又太醫局有奉有教授有九科見職官志而九科無考金十科亦無考元十三科曰大方脉雜醫科小方脉科風科產科兼婦人雜病科眼科口齒科喉科正骨科金鑑科瘡腫科鍼灸科祝由科兒科疎錄明十三科曰大方脉科傷寒科小方脉科婦人科口齒科咽喉科外科正骨科痘疹科眼科鍼灸科見明會典本朝十一科曰大方脉小方脉傷寒科婦人科瘡瘍科鍼灸科眼科口齒科咽喉科正骨科痘疹科今痘疹歸小方脉咽喉口齒共爲一科并成九科見大清會典此吾國歷代醫學分科之大略也而東西洋各國醫學之分科其行於古者雖不可考

其行於今者可得而詳焉。

研究骨肉皮膚內臟之部位形狀構造者曰解剖學。用顯微鏡研究十一種之細胞者曰組織學。研究骨骼之支持筋肉之運動皮膚之感覺以及內臟中肺主呼吸心主運動腦主知覺運動腸胃主消化腎臟主排泄等之生活現象者曰生理學。研究增進人類之健全以永保其生活現象者曰衛生學。研究傳染病之各種微生物者曰細菌學。研究病因及變化之原理者曰病理學。研究鑄物植物各種之生理作用者曰藥物學。研究自覺他覺症狀而斷定其為某病者曰診斷學。研究內部之生理有異常之處欲以藥物輔助其生理而使之復元者曰內科學。本屬於內科因學者之專門研究而別為一科者曰精神病學。曰傳染病學。曰消化器病學。曰肺病學。曰法醫學。小兒之生理病理與成人不同故內科學不足以概之於是設兒科學生殖器之解剖生理解婦人與男子不同關於生殖器之疾病又極繁夥於是設婦人科學婦科中又別為生產科。中擇淺顯易知老嫗都解之學問以應民間普通生產之用者曰產婆學。研究手術外又須兼通內科。迺來漸侵入內科範圍。

者曰外科學而耳科學鼻科學齒科學三科於外科學可以概之。惟視覺器本光學之生理其手術甚精微而關係尤鉅於是設眼科學淋疾下疳梅毒內外科不足以概之故別爲一科曰生殖器病學癆疥之疾似可屬於外科而學者別爲專門曰皮膚病學此東西各國醫學分科之大略也余擬著中外各科書籍不分門戶之見不存騎牆之說冀精覃思冀有以得其會通焉。

歲乙未復養疴於江陰南菁書院是歲也爲余專治醫學之日迄於今蓋十有餘年矣其間因奔走於米鹽細故任吾邑兼算學堂算學教習者三載在京師譯學館算學兼生物學教習者二載有奇而授課之暇輒從事於醫籍如蛾逐焰如蟻附羣必神昏目倦嗒然假寐而後已而不自知其深嗜之至於斯爲樂之至於斯也。

近世東西各國醫學之發達如萬馬之騰驤如百川之匯萃磅礴浩瀚駿駿乎隨大洋之潮流渡黃海岸注入亞東大陸俾不才肆其雄心窮其力運其廣長之舌大陳設而吸飲焉非愉快事哉然吾人雖如千手觀音向醫學中各科目悉伸張其神臂無一刻那頃之已時而各學科光怪陸離之新理新法一若對萬花鏡之圓轉循環使

人應接不暇。雖日寫五千言，積以數年之久，猶不足盡譯其所長，以供醫林之參考。蓋新之浩博也，不得不延人繙譯以代草創之勞矣。余則題述朝夕筆之角之一，再以書往往至模糊不可辨，不自知手腕之幾脫也。於以知呂覽淮南子各成於賓客之手之所以不足特。唐章懷太子註後漢書，魏王泰著括地志，成於衆手尤不足恃也。假手於人豈不難哉？經營拮据，歷有年歲，因成醫書若干種，名曰丁氏醫學叢書。雖不如呂覽淮南子之耳剽訛決，其對於李書，籲以一手註文，選未免有愧色矣。

追溯昔年之知遇，每自痛惜。授我以算學者，華若汀先生也；授我以醫學者，趙靜涵先生也。十年前讀余衛生學問答，而薦我入都者，李部郎亦園也。屈節禮賢，屢蒙其優渥者，張文達公也。經論學術，在師友之間，而屢却其聘者，張學使小圃、黃學士仲弢兩先生也。或在天之涯，或在地之角，別未十稔，而徐陳應劉，一時俱逝，其衆散存沒之感，何能無慨於中耶？卓然蓋落，難招正則之魂，柯竹沈霖，永絕中郎之賞。既乏師資，亦鮮勝侶，間有造作，莫析疑義。余雖於學日從事焉，茫乎不自知其可憂而可喜，也。故益念逝者不能忘。

隱。知。已。之。難。久。矣。世。路。羊。腸。跔。天。蹐。地。不。敢。踰。咫。尺。吾。其。悉。此。情。哉。向。者。余。以。意。氣。慕。盛。每。爲。鄉。里。小。兒。所。詬。侮。而。大。江。南。北。往。往。有。奢。慾。嚮。慕。者。豈。近。者。難。以。爲。工。而。遠。者。多。不。知。其。不。肖。耶。抑。昌。黎。所。謂。小。人。好。詭。詐。不。樂。成。人。之。美。耶。昔。揚。子。雲。著。太。玄。而。劉。歆。欲。以。覆。醫。話。左。太。冲。賦。三。都。而。隨。風。賦。以。臺。酒。搜。瑕。索。纖。自。古。而。然。苦。爲。天。下。著。書。人。寒。心。矣。撫。今。追。昔。平。生。確。督。督。然。陳。念。終。胥。俎。語。輒。命。筆。不。能。自。已。故。曼。衍。爾。若。謂。擬。司。馬。子。長。劉。孝。標。之。自。序。則。吾。不。敢。作。是。言。其。即。庾。蘭。成。所。謂。窮。者。欲。達。其。云。勞。者。須。歌。其。事。歎。人。生。憂。患。卒。卒。年。歲。一。去。不。可。復。得。九。數。之。未。未。勵。其。與。十。年。之。馬。醫。賤。伎。之。流。人。曰。夫。夫。也。其。爲。馬。醫。賤。伎。之。流。也。歎。此。吾。之。所。以。自。誠。者。也。醫。學。云。乎。哉。無。錫。丁。福。保。仲。祐。自。序。

## 普通藥物學教科書序

人身一細胞之集合耳。人之生也一細胞生活之集合耳。細胞之生活異常於是起形態變化化學變化機能變化夫形態化學機能上之起變化也必有因病的遺傳胚種變常先天之素因也營養不良運動不足後天之素因也二者屬於內曰內因外傷壓迫閉塞等器械的原因也光線冷熱氣壓電氣等理學的原因也外生中毒已體中毒化學的原因也動物性有機體植物性有機體傳染病的原因也飲食住居衣服氣候職業貧富等生活要素的原因也五者屬於外曰外因以健康強固完全無缺之集合細胞而或殘於內或傷於外因則生理的性狀惡得不一變為病理的顯象哉獨是生理有自然之作用能抵抗而復其常至抵抗力竭盡無餘不能制病而制於病乃不

無不乞產於藥物。藥物者何以之達治愈疾病之目的之要素也。彼之外科手術日光療法空氣療法氣候療法精神療法電氣療法水治法按摩法等皆為理學的藥物。彼之興奮藥、麻醉藥、解熱藥、下劑、吐劑、發汗藥、利尿藥、祛痰藥、收斂藥、刺戟藥、腐蝕藥、殺菌藥、驅蟲藥、健胃藥以及血清療法、食餌療法等皆為化學的藥物。今姑舍理學的而論化學的化學的藥物作用之及於細胞也。有三曰化學作用、二曰交換作用、三曰特殊作用。效能具備。疾病自除。藥之為用顧不太哉。嘗攷東西各國之藥物多吾國三四倍而普通應用者不及三百種。於家庭必要之範圍上總分內服外用二大綱。內服藥之目十有二。油性之藥臭味甚惡入膠囊而後吞嚥者是謂膠囊劑或以臭味不快之葉製為圓形或橢圓形之板狀者是謂錠劑。草根木皮煎服藥汁者是謂煎劑。藥粉。

一。分配合舍利別蜂蠻等二三分成粥狀者是謂舐劑油藥和水使成乳狀者是謂  
乳劑調製藥物使具有粘稠之性者是謂越幾斯劑藥性猛烈僅可用其點滴者是謂  
滴劑植物藥類沸水浸而攪拌者是謂浸劑和入餡水普通稱爲水藥者是謂合劑製  
藥爲丸使可永久服用者是謂丸劑尋常藥粉溫水送服者是謂散劑混和之植物藥  
沸水泡之如茶而飲其多量者是謂茶劑外用藥之目有八以藥液自肛門注入直腸  
內而治其疾者是謂浣腸病在身體之一局部卽煮藥劑於其上而治療之者是謂罨  
法注液體於植物之粗末使成粥狀紗布包之罨於皮膚之局部者是謂巴布藥爲半  
液體或固體普通稱爲膏藥者是謂軟膏腐蝕性藥與軟膏油類液體等調和爲濃稠  
之物塗擦身體之局部者是謂擦劑煉製藥劑成捏粉狀者是謂恙劑煉製藥劑爲圓

錐形納入肛門、膀胱內等處溫即融解者是謂坐藥。撒布藥粉被覆創面以吸收皮膚之分泌物或抑止出血或消母局部者是謂撒布劑。綱舉目張無禁絲焉取精用宏無土苴焉。以較我國本草諸書。譬猶獨闢闢闢揭日月於中天矣。同學丁仲祜先生吾邑之通儒也。以多疾故習長桑之術。博覽古今。郵通中外。窺造化之機。抉生命之奧。自乙未以迄戊申所著醫籍。不下二十餘種。其關於藥學者。往歲已刊有藥物學綱要。先生以為未足。復譯述普通藥物學教科書。以為後學之徑塗。原本為系左近君所著書。凡二編。正編分十章。曰總論。如藥之配合。藥與年齡之關係。天秤與分量。調合法與器物等。言之兼詳。曰健胃劑。如含糖百物。聖、重、曹、苦丁、稀鹽酸。沸騰散等屬之。曰皮膚病藥。如石蠟。百露拔爾瀝謨。依比知阿兒等屬之。曰強壯劑。如鐵劑。葡萄酒。肝油等屬之。曰解

熱劑如撒曹、歇貌林、比林等屬之。曰防腐劑。如石炭酸、沃度仿謨、硼酸、昇禾等屬之。曰收斂劑。如次硝蒼、單寧酸、醋酸鉛、皓礬等屬之。曰下劑。如瀉利鹽、蓖麻油、蘆薈、甘草等屬之。曰雜部。如莫比、臭刺、叶根、醋刺、沃丁、沃刺、珊瑚、攝涅瓦、依的兒等最重要之藥。皆列其中。曰非藥的之藥。如白糖、單含乳糖、甘草、華攝林、酒精等。皆列其中。續編分八章。曰利尿劑。如實芰答利斯、焰酸加里、海葱、咖啡涅等屬之。曰冤睡鎮痙劑。如纈草根、忽布利、莖苔草、杏仁水、樟脑等屬之。曰結核劑。如「ベンツソール」、「チオコール」等屬之。曰生殖器劑。如蘆薈鐵丸、麥角越幾斯、泊芙蘭、流動「ヒドラス」、越幾斯等屬之。曰寄生物驅除劑。如石榴根皮、檳榔子、列曹兒珍等屬之。曰變質劑。如亞硫酸法列兒、水燒食鹽等屬之。曰雜劑。如蜜陀僧、煅鐵苦土、枸櫞油、芥子等屬之。曰附錄。

如名生藥、白髮染藥、化粧藥等屬之。譯既竣以時盛且以盛業醫有年屬為之序。盛不能為先生剛發精義然不敢辭。盛聞古語曰：在門牆則揮之在夷狄則進之。言在門牆者不必是在夷狄者不必非也。吾國醫事失傳由來已久。藥品多而樣雜。有用者僅什一耳。而况不知分析不諳成分方書。如山奚、透塵飯、塗羹可戴而不可食者。大河南北疾疫流行或父死子隨或兄終弟及。轎車相望行道愴懷旬月以還無有一人焉出奇方而拯救之。草木無靈可為殷鑾先生之意蓋欲以西方鴻寶起吾東國之病夫。故譯是書以貢諸當世造福吾民曷其有極上醫醫國惟先生其當之矣。嗚呼王震之外臺秘要不專美於當年。歷仙之齊域神方且重見於今日。進醫界於文明之域。固邦人所頌福將之者也。敢進鄙詞以誌景仰。宣統元年孟春無錫顧鳴盛序。

普通藥物學教科書字引

五量<sup>漢氏四度之水</sup>一立方分米的通常之重  
合我國二分六釐六毫六六

一、○之百倍，在於量為半合。

氏六、即〇、〇、〇、刃直之二、刃之、三倍、即三〇〇、磅、等之十六倍、即四百八十瓦合十二兩餘、%、百

分之比例，如二%有炭酸水、兩石〇一乃至二字之等第或，如二〇藥局方於藥物之規則，謂之某局。

藥局方、如日本有日本藥局方、德國有德國藥局方是也。●普通藥 性質平和之藥。●劇藥 性質峻烈之藥曰劇藥。當與普通藥分別取捨。●毒藥 賦性

較服藥尤烈者，曰毒藥，故肝須嚴密健閉，凡  
非醫師及藥劑師，皆不得隨意理之。丁幾  
細以藥物依法，越幾斯而成之吾舍利。

**別**藥物中混和白糖、再入熱水而為。●**浸劑**入沸水煎煮分時而成。●**煎劑**入沸水煎煮五分時而成。●**錠劑**乾燥之藥粉中、混和白糖、復加以適量黏劑、有時亦加水。

**禁未合而爲之，**●**坐藥** 以藥物爲種種之形，以挿入身體●**罨法** 以藥品或他物，包於身之某部位而罨之●**灌腸** 以藥液灌入腸內

品或他物，入於器皿而灌注於腸中，收斂水分之液體，謂之收斂藥。利尿使小便通利之藥。汎發作用身者，謂之汎發藥。

**晶或牠物、入於器皿而灌注於腸中、●收斂** 分之液體、謂之收斂、●利尿  
限制或阻止在身某部使小便通、●汎發作用身者、謂之汎發、●作用影響於全  
**發作** 身者、謂之局所作用、●頓服 一次、●稀釋 以水等解釋藥物、●風化  
**僅身體之一部分、有其作用**、●局所作用者、謂之局所作用、●局所作用

氣而化合、謂之真化、如還元硫與空氣中之鐵素化合、而為磁性硫是也。●朝鮮植物園空氣中之水蒸氣而溶解、曾之朝鮮、●生理的作用無病之身、

中之而無外合 而外無外合者也

●要急後重不出門　●一チアノーゼ

色  
酒  
鹽  
霽  
鼻準紅  
汞  
卽水  
割化學上之加留謨也、如稱  
曹  
塗  
化學上之那  
疣  
贅

● 鹽裂赤褐色、● 魚裂如龜甲然、● 電裂赤燭也、● 達和異常、● 黑褐色、● 豆波

則婦女因患病且衰弱致產後發病亦曰「カフセル」以膠製成之小袋

未嘗吐。○盈汗。○睡腹中出汗之謂。○羸脹甚也。○脹壅也。煩熱之氣。盛入脹中。一節輕丁。

●消炎止其熱也、●特效藥如患甲病、除乙藥外、別無可  
用、●宿便之糞便也、●遺精宣泄而漏泄精液者、  
●濕留數日、因夢中交媾或無

之  
四、  
一、田本蘆局方之規定，凡用之藥，均不得稍逾所定之某分量，此某分量即為常量。

謂之極量極量，稱者必須在某分量，則當於其處方之某某名上，作一△號，以備檢查。經過疾

痛經歷之、●加答兒

# 普通藥物學教科書目錄

## 第一章 總論

- 規那皮 一五二作金澤那樹皮(神經衰弱症、病後之恢復期)..... 一  
●規那丁幾 蘭澤山金澤那樹皮酒..... 二

### 規那越幾斯

米起幾斯苦澤作香

### 規尼涅

舊書全寫那古(咽喉喉之特效藥、健胃強壯藥、百日咳、肺結核).....三

### 藥之配合

連服之禁忌.....四

### 藥品與年齡

天秤與分量.....五

### 調合法與器物

存貯藥料法以下等.....六

### 處方與調劑之事

十一

## 第二章 健胃劑

- 含糖百弗聖 *Pepsinum Saccharatum*. 百布聖即「ペプシム」一作胃液素，舊譯作卑白新，又作伯布西尼（消化蛋白質之酶）.....十五
- 「マルチ」*Mart*（消化植物性食物之藥）.....十七
- 胰液素 *Pancreatin* 又名「パンクリアチン」舊譯作甜肉汁，又作勞克黑阿低尼.....十七
- 重炭酸曹達 *Natrium bicarbonatum*. 一名重炭酸那篤爾謨，省曰重曹，舊譯作重炭酸鈉（殺蟲胃加太兒之藥，胃之洗滌藥，制酸劑之妙藥，鎮吐劑，咽喉加太兒，氣管支加太兒，尿石，排糞藥，腎土與藥）.....十八
- 苦味丁幾 *Tinctura Anmna*.....二十
- 稀鹽酸 *Dilute hydrochloric acid*. 舊譯作淡鹽強酸，（清涼劑止渴胃酸過少之各種）.....二十一
- 酒石酸 *Tartaric acid*. 舊譯作葡萄，又作葡萄酸（清涼劑）.....二十一
- 沸騰散 *Pulvis aerophorus*.（制酸鎮吐）.....二十一
- 百弗聖酒 *Urinum pepsini*（消化不良食血）.....二十一

●龍膽 *Gentiana scabra*. 一名地質生根(地骨皮) ..... 114

●格矢亞丁幾 *Tianchura chinasiæ*. 一名括矢亞丁波、舊譯作瓜沙、又作苦白木(健胃  
藥) ..... 115

●蒲公英 *Dandelion*. 俗名蒲公草(消炎不具益清涼堅之效) ..... 115

●古倫僕根 *Calotropis*. 一作古倫僕根、一作古倫母根(舊譯作高倫布、又作如林草(消花不  
良兼下痢症)) ..... 116

●人參 *Chinese Ginseng* ..... 116

●西洋參附 ..... 118

●阿膠附 ..... 119

### 第三章 皮膚病藥

●石鹼 *Soap*. 俗譯杜婆子、苗名番鹼、又名洋肥皂(酸類之肥皂等同於肥皂、無此種慢性之疾  
患(若消除寄生物疥癬白瘻毛頭病)) ..... 119

●百露拔爾撒謨 *Balsam on Fern*. 韶(ハラダシナ)舊譯作程苔脂、一作秘苔脂(疥癬

- 之炒藥).....三十一  
 ●薔薇油 Cleum Rosae. 譯作玫瑰油(調香料白色之藥).....三十一  
 ●依比知阿兒 Ichthyol 「即イヒチオール」舊譯作伊克度、一作黑石脂、(面皰、赤鼻、毛髮  
脫落症、糠粃疹、濕疹、疳癬、凍傷火傷、瘡病、健麻質斯、齒痛).....三十二  
 ●撒里矢爾酸 Salicylic acid. 一名水楊酸、省曰撒酸、舊譯作沙利先酸、一作柳皮酸(防  
腐劑、酒飲症、腋臭、鷄眼、子宮病、含漱藥、撒里矢爾酸綿紗之製法).....三十四  
 ●細答利斯丁幾 Jincure of Cautharides. 一名芒青丁幾、一作カンタリス丁幾、舊譯  
作班養酒、(毛髮剝落藥).....三十六
- 第四章 強壯劑**.....三十六
- 還元鐵 Reduced iron. 一名水素還元鐵、舊譯作消鐵粉、一作消鐵末、(萎黃症、貧血諸症  
寒發之要藥、通經、驅病).....三十六  
 ●乳酸鐵 Lactate of Iron. 舊譯作爛龍鐵(效能同上).....三十九  
 ●林檎鐵丁幾 Tinctoria ferri Pomati. (效能同上).....三十九

●沃度鐵舍利別 Syrup of Iodide of Iron. 藝譯作鐵碘水糖。(海毒、腺病、瘧麻實斯、助膜炎).....三十九

●過格魯兒鐵液 Solution of Perchloride of Iron. 一名一半格魯兒化鐵液。藝譯作氯酸鹽水。(鈣血、創傷出血、子宮出血、壞疽病之藥物).....四十一

●葡萄酒 (出血、黃疸、胃病恢復期、失氣、為麻結核之藥物等、為薄弱者滋養物).....四十一

●肝油 Cod-liver oil. 藝譯作魚肝油。又名鱉肝油。(腺病之藥物、懷孕病之妙藥).....四十二

## 第五章 解熱劑.....四十一

●撒里矢爾酸曹達 Salicylic acid of lithium. 一名撒里矢爾酸那篤價諾。一名水楊酸曹達。一名水楊酸那篤價諾。古曰撒曹。舊譯作沙利先鋒。(寒冒、助膜炎、神經痛、懷孕質斯之炒藥).....四十三

●「アスピリット」 Aspirin 一名「アセチル」撒里矢爾酸(與安知歌貌林同).....四十四

●安知歌貌林 Acetanilidum. Antifebrinum. 一名亞尼里度。舊譯作亞西尼利。又名退熱冰。(寒冒、肺炎、寒疾等之解釋藥。安知歌貌林之擬態藥、胃痛之炒藥).....四十四

●安知必林 *Anisopryrinum.*

舊譯作麻提牌蕊，又名安替批林，又名解大冰，（百日咳）妙藥。

.....四十六

●歇那設珍 *Phenacetin* (正名「ヘナセチン」)(諸炎及流行性感冒之妙藥偏頭痛之藥)

.....四十七

●聖尼涅 *Cinchonine.*

舊譯作先高尼精，又名先高寧，（開心熱之藥）

.....四十八

●規尼涅 *Quinine* (即キニン) 舊譯作金雞那精，一作桂尼精，又作桂寧，又名雞那精，

(開心熱之藥)及功藥(神藥精).....四十八

## 第六章 防腐劑

.....五十三

●石炭酸 *Carbolic acid*

舊譯作加布力克酸，又作架波留酸，一作加播勃酸，(防腐消毒

之妙藥).....五十三

●沃度仿謨 *iodoform* (即ヨウドホルム) 舊譯作海漠仿，又名黃碘，又名埃多方，(創傷治癒

之妙藥，梅毒淋病化膿性病之藥).....五十五

●*dermatol* (沃度仿謨之代用藥)

.....五十六

●硼酸 *Boracic acid* (舊譯作硼酸) 又名種發酸，一作硼砂酸(擦滿，貼之)光潔藥).....五十六

●安息香酸 Benzoic acid 雜譯“苯生鹽酸”又名偏蘇以克酸(老人小兒之祛痰劑)五十七

●安息香酸那篤僵誤 Nutrium. Benzatum. 一名安息香酸曹達。省曰安曹。亦譯作偏蘇以克殺弟。(解熱防腐兼祛痰劑)五十七

●結列阿曹篤 Krouvatum 錄々ノカムト(舊譯作苦里亞蘇說一作幾河蘇、又作蒸木油、(肺結核之藥、耳鼻喉嚨之藥、驅蟲之妙藥)五十八

●[<sup>\*</sup>グワヤコーク] Guaicum (結核之藥)五十九

●昇末 Orotroscine Sennaliate 一名過橋子兒茶、又名猛汞、舊譯作雙綠葉、一作秉榮、又作白降丹、又名冰蘇薄荷、解毒橫痃之藥、丹毒之藥、初生兒眼疾結膜炎之藥、雀斑母斑之妙藥、愚藥薄荷)六十

## 第七章 收飲劑.....六十三

●次鉛酸蒼鉛 Stibnite of Bismuth 一作鹽基性鉛蒼鉛。省曰硝蒼(舊譯作下硝鐵粉、又作蛇糞淡糞五(船蛆土兒亦稱之潔潔燒之藥)六十三

●單寧酸 Acidum tanictum 一名鞣酸(舊譯作英匿酸)(下痢、內藏出血、白帶下、鼻出血等)

- 加太兒沐浴、金屬性中毒之藥、腋臭之藥.....六十四  
●阿仙藥 Catechu. 舊譯作兒茶、一作孩兒茶、(下痢務施加太兒之藥).....六十六  
●阿仙藥丁幾 Tincture of Catechu. 舊譯作兒茶酒、(下痢之藥).....六十六  
●醋酸鉛 Acetate of Lead. 一名鉛糖、舊譯作鉛霜又作鉛醋鹽、(防治血、點出血、下  
痢、氣管支加太兒、咯痰之過多、盜汗、咳嗽之藥、清潔、粘液漏、鼻汁過多症之藥、扁桃腺、口腔炎之  
含嗽劑、漱液多之點眼藥、外傷之藥法、擦裂、表皮剝脫之膏藥).....六十六  
●硫酸亞鉛 Sulphate of Zinc. 一作皓粉、舊譯作硫強銀、又名鍍銀又名鍍銀膏、又名  
硫強鋅(催吐劑、多用于眼病、為點眼藥、耳漏及其他之粘液過多之藥、淋病子宮病之藥).....六十八  
●酸化亞鉛 Oxide of Bismuth. 一名亞鉛華、舊譯作錫汞(擦傷、皮疹、擦裂、乳嘴痛、  
慢性潰瘍、結膜炎、角膜斑點、鼻咽頭尿道生殖器之癰瘍、汗疹、漆咬沃度瘡瘍之藥、某醫士之  
失敗談).....七十  
●亞鉛華軟膏 Ointment of Oxide of Zinc. 舊譯作錫汞油膏(分泌物過多、糜爛及  
潰瘍).....七十一  
●硫酸銅 Sulphate of Copper. 一名藍藥、舊譯作藍藥、又作硫酸銅、又作銅青藥(最良  
清毒)

之出相トヨ一ハ之藥).....七十一

●硝酸銀 Nitrate of Silver. 舊譯作銀丹、又名硝強銀、又名銀養淡三又名銀養淡五  
(實狀的里ムタ皮<sup>クナリ</sup>肉<sup>ミトロ</sup>骨<sup>ホーム</sup>、黑膏<sup>凍瘡</sup>、瘻疽、橫痃梅毒、痔疾、淋病、白帶下赤痢等  
之炒藥、白髮染之藥).....七十三

●磷酸攝價謨 Oxalatd. et Cerium 即磷酸セリウム<sup>マグニシウム</sup>舊譯作惡西鐵、又作草酸鈷(鍍吐  
劑<sup>豆波利之炒藥</sup>).....七十四

●明礬 Potassa Alumnen. 舊譯作白礬、又作礦強銀鉛、(子宮枯液漏、淋疾、白帶下、腋臭清  
潔面、耳咽頭之分泌過多、足指之汗多等藥、衛生上之應用、利用於奇妙)七十四

●骨消波拔爾撒謨 Copainva-jalsan 舊譯作哥拜把、(淋病之藥).....七十六

●薑澄茄 Chudebs. 原譯作印度薑澄茄、(同上).....七十七

●冰醋酸 Glacial Acetic Acid 一名強醋酸、省曰冰醋、舊譯作冰醋強酸<sup>雞眼、疣、毒  
蛇咬傷、卒倒者之藥等藥</sup>).....七十七

●氯化兒酸加價謨 Kalium chloricum 一名鹽酸加里、又名鹽素酸加價謨、省曰鹽制、  
舊譯作綠張鐵<sup>又作綠鞣劑</sup>、(口中一切之炒藥).....七十八

## 第八章 下劑 ······七十九

- 漢利鹽 Sulphate of Magnesia. 一名硫酸鹽鉀鈣鐵或，即硫酸マグチンジム、一名舍利鹽、一名硫酸吉士。省曰硫苦，性味微強咸，又作硫酸亞巴、俗名洋朴硝、慢性便祕、水腫、慢性胃炎加太兒、及脾氣之藥) ······七十九
- 硫酸那葛爾誤 Glauber Salt. 一名芒硝，又名硫酸鈉、舊譯作弱強鹽、又名土朴硝、又名鈉二硫酸四鉀元明粉(同上) ······八十
- 蓬麻子油 Castor Oil. 一名リチニ油(用一二兩為良下劑) ······八十一
- 人工加兒爾斯泉鹽 Sal Arachinum fractium. 省曰人加兒(便秘、腹充血慢性胃加太兒、更進、胃清湯、胃擴張等之良藥) ······八十一
- 蘆薈 Aloë. (下劑月經閉止、健胃之藥) ······八十二
- 蘆薈藥刺巴丸 Pilulae Aloëtum Jalapae. (下劑、月經閉止之藥) ······八十三
- 大黃 Rhubarb. (通便藥) ······八十三
- 小兒散 Iohisinfantium. 一名苦土大黃散(小兒之下劑加太兒之藥) ······八十四

●甘汞 *Cadmium*. 一名亞格魯兒汞、又名カドメル、舊譯作單綠汞、又作迦路米、又名水銀粉、(海青、驅逐劑、消炎藥、止痛、燒傷藥除、利尿劑、烏毒吳、鼻之拔布藥、傳染諸病及小兒下劑).....八十五

## 第九章 細部 ..... 八十六

●水銀軟膏 *Jointment of Mercury*. 一名灰白水銀軟膏、一名灰白軟膏、舊譯作汞油膏、

又作汞鹽油膏(海青、淋巴腺炎、睾丸炎、急性乳房炎、並下腹炎、頭風、腰風).....八十六

●撒涅瓦根 *Sennep*. 一作撒志根、舊譯作辛衣格、又名辛衣加、又名辛衣格姑參、(桂皮  
劑).....八十八

●貌羅誤加價謨 *Brom-Kalium*. 即ブロームカリウム、一名吳素加里、省曰吳素、舊譯作

皆溴(藥物、洗劑、強直痙攣及的里暮路病、神經過敏症精神病、角膜病、神經病、不眠症、夜晝月經  
困難、淫蕩勃發等之藥).....八十九

●斯爾仿那兒 *Sulfonal*. 即スルフォナール(舊譯作索弗奴)催眠達汗之藥).....九十

●抱水格魯拉姆 *Chloral-hydrat*. 即クロラルヒドラ(舊譯作森若林、

西名告魯利(不眠症、精神病、強直症、喘息膏漬塗之藥).....九十一

●莫兒比哩 Morphine 魔モルヒニ、舊譯作莫非穢、又作莫非亞、又作麻非、即鴉片精(不眠症、精神病、種種之疼痛、痙攣、強直、呼吸困難、喘息咳嗽下痢病、虎列刺等之藥).....九十三

●阿片 Opium 阿ウムラ、舊譯作鴉片、又作阿芙蓉、又名麻黃(下痢、內臟出血之藥).....九十五

●醋酸加價謨 Acetate of Potassium. 即醋酸カリエム、省曰醋剝、舊譯作醋酸鋰、又作氯醋鹽、又作鉀素醋酸(利尿劑).....九十五

●珊瑚蜜 Santonine 那サンノンナ、舊譯作山道年、又作山道年可精(珊瑚蟲之特効藥).....九十六

●綿馬越幾斯 Extractum filicis. (舊譯作非利瑪流膏(燒過十二指腸蟲之藥)).....九十六

●吐根 Peacock. 舊譯作衣必格、又作衣畢格(祛痰及催吐劑).....九十七

●沃度丁幾 Tincture of Iodine. 一名沃陳丁幾、省曰沃丁、舊譯作海溴酒、又作碘雜酒、(陰囊水腫、關節炎、淋巴腺炎、肋膜炎皮膚病之塗布藥).....九十七

●沃度加價謨 Kalium Jodatum. 那ヨウムカリエム、一名沃度加里、省曰沃剝、舊譯作

- 銀礦，又作銀礦，（梅毒、膝病、鐵麻質斯、肋膜炎、神經痛、喘息等之藥）……………九十八
- 沃度那黛僵誤 Natrium jodatum。一名沃度曹達（同上）……………九十九
- 亞拉里亞護謨 Arabic Gum。舊譯作白樹膠，又作亞拉伯膠，（表皮剝落、火傷之藥）……………九十九
- 亞拉里亞護謨膠 Mucilage qummi arabici 省田誰誤華（同上）……………九十九
- 依的兒 Ether 酪イーテル，舊譯作伊打，又作以脫（失氣虛脫之妙藥）……………一百
- 紓創膏 Embolistrum adhaesivum aunglicum。俗名膠皮膏（硬若蠟）……………一百
- 佩里設林 Glycerin 酪グリセリン，又作リスリン舊譯作甘油，（表皮剝脫陳裂、火傷、耳內乾燥）……………一〇一
- 鹽酸古加乙凍 Muriste of Cocaine。省曰古加乙凍，即コカイン，舊譯作鹽酸古告  
精，又名麻藥冰，又名古改拿（眼科外科齒科之應用藥）……………一〇一
- 薄荷腦 Mentholin。一作薄荷蘭，又作薄荷冰（鎮痛藥）……………一〇一

## 第十章 非藥的之藥……………一〇一

- 白糖 Reind Sugar. (製藥劑) ..... 101
- 薑舍利別 Simple Syrup. 省曰單舍、舊譯作糖漿(同上) ..... 101
- 乳糖 Saccharum lactis. 在譯作奶糖、又作瘤糖(使散藥不引濕之藥) ..... 101
- 甘草 Liquorice. (四味藥丸裡之配合藥) ..... 101
- 薑軟膏 Simple Ointment. 在譯作黃油膏(又作白油膏、香藥膏) ..... 101
- 酒精 Spirit. 即アルコール(製藥料) ..... 101
- 血之道 ツク井一ノ一(鎮瘡經通之藥) ..... 104
- 消化素 (慢性胃加太兒消化不良症) ..... 104

# 普通藥物學教科書

丁氏醫學叢書

無錫丁福保仲祐譯述

## 第一章 緒論

藥物者何謂能改變或感動人身內外之材料也。藥物學者何謂由直接或間接之法使吾人達和之身體復於常態之學問也。某文學博士曰：醫與藥人世棄材也。害生命，弱種族，盡舉而付諸一炬，猶得貽區區健康之人民，生健康之子孫，立健康之社會，惡是何言歟？淺假而政府果行其說，不惟舉世之醫士藥物，一一自炭酸瓦斯中還元為無機成分，即吾藐然血肉之軀，亦已揚為灰燼，點點游離於太空矣。嗚呼！為是說者，蓋亦知離火雖烈，能焚其枝葉，而不能絕其根本乎？此醫甫死，而他醫復生，舊藥幾除，而新藥又至，宇宙間之事事物物，容有斷絕之時，獨此一醫一藥，則與天地共永長。與日月同悠久。曠觀大地人民，林林總總，或胎傳而罹先天之疾，或縱欲而殘後天之軀，至必不得已，迺皇皇然乞靈於草木金石，以求其效，若是者，比比也。今試就至近至小者

而言火傷發炎則倉猝納諸水水藥物也膚裂出血則抵以手以手不足則以他物代之代之之物亦藥物也藥無求於人而人自有求於藥藥物頗可盡火之哉古今來東西藥物之書不知凡幾而欲使普通人民盡可誦讀盡可了解者殆未之見是書之作實緣於此稱曰勿體容有當乎日俗凡遇罕有之事奇異之物不推其原動曰勿體其於藥物亦然或曰此神人夢示聖藥也或曰此儒子所授仙方也要皆無稽之譚而余之所謂勿體者則大不然姑舉規尼涅（即金雞那）一事以概其餘當十七世紀之頃（即明末時）有印度人某患熱病渴甚不得水見樹下水溜中有水強飲之無何體暢神怡霍然愈迺詫曰神水神水患熱病者聞之無遠近皆踵至就飲飲盡病亦愈衆拜曰神水神水西人獨不謂然曰此水能治熱病必與樹有關係迺採其皮沸煎而分析之竟得發明規那皮規那丁幾規那越幾斯規尼涅四種藥劑其效與溜水無異此勿體之所由昉也茲復列述如左

### ● 規那皮

舊譯作金雞那樹皮

以此樹皮研爲粉末服之亦有用爲煎劑者以之作強壯劑用於神經衰弱症及病後之恢復期等以治因熱性病而起之胃腸病慢性下痢亦有效用量本藥四、〇和溫

湯一〇〇、〇。煎十五分時。煎時宜常加水。普通一日三次分服。

煎之之前。入稀鹽酸一、〇。則有效分較多。但其味極苦。宜加單舍。(即白糖六十五分水三十五分所成之糖漿)或砂糖而後服之。

●規那丁幾

舊譯作金雞那樹皮酒

本劑以規那皮末一分。酒精五分。浸十日。取出。壓搾之而成。效能、用量與規那皮同。規那丁幾四、〇。稀鹽酸一、〇。單舍八、〇。水一〇〇、〇。

右一日分三次服。

●規那越幾斯

案越幾斯舊譯作膏

本劑以規那皮末製爲丸藥。製法從略。效能與規那皮同。用量一次約〇、五。爲丸藥。或溶於水而用之。

●規尼亞

舊譯作金雞那霜

以規那皮之成分製成。爲間歇熱(如瘧疾等)之特效藥。於間歇熱發作之六時前。服〇、五至一、〇。能不復發。但此後。每日尚須服〇、二。連服一二三日。以防其病之復至。此外用以治種種之熱性病。亦有效。

本藥又爲健胃強壯藥。日服三天，每次用量〇、〇三至〇、一少則無效。用於百日咳、神經痛其用量如右亦得良好之成績。

本藥具特別之苦味。取少許嘗之，閱數時口內尚苦。故當裹爲丸藥或包於「オブラー」（即以膠製成之極薄之膜，用以包藥，吞入胃中即化）而服之。服本藥至〇、五以上之大量，則患耳鳴、聽覺障礙然停止服用約二三日至四五日即治。

外用爲灌腸料，則以規尼涅〇、五至二〇水五〇〇爲防腐藥，則爲百五十倍之溶液。

本藥有鹽酸規尼涅、硫酸規尼涅二種，其效能皆同。

### ●藥之配合

藥之性質各有不同，有不可混用者，有不可同時並服者。欲明此理，當先研究化學，庸醫習慣，雜劑妄投，偶一不慎，動致失敗。今舉二事如下：醫生某甲，治患微毒兼赤痢者，某甲以爲微毒之良藥，莫若沃剝（即鍊礦）赤痢之妙劑，莫若甘汞（即單綠汞，一名迦路米），乃以此二藥一爲水劑，一爲散劑，授令服之，未幾不惟無效，且起化合。

之中毒病垂危。又有某乙治姪婦之惡阻及患病者。診視畢。沈思良久。以爲惡阻用鹽剝（即鉗療。又作綠強鉗）。最效。痔則用硫黃爲佳。遂慨然曰。羣恙無妨服我藥。如截鐵斬釘。病可立治也。乃入藥室。取二藥同入乳鉢中。以乳棒盡力研和之。詎意轟然爆發。乙大驚仆地。後頭部破裂。顏面焦灼殆遍。宛轉呼號。聞者爲之慘怛。家人急授以藥與水。始漸蘇。自是病者相約不至門。可羅雀矣。由是觀之。配藥之方。顧可忽乎哉。諸君乎。慎弗於余之配合法外。率以己意加入某藥。而武斷之也。

### ●連服之禁忌

自化學大發明後。而藥物之品目。日益繁廣。棄醫者固不能以同一效能之藥。一一而進諸病夫。亦不可專恃惟一方。且旦而授令服用。惟在萬不得已之時。可再三應用耳。然病情之診斷不確。而連服一藥。則將有中毒之危。昔有某國大學醫學士某。治患十二指腸蟲者。以綿馬越幾斯（舊譯作西必安膏。一作非利瑪膏。又名公蘇膏）爲殺蟲藥。命連日服之。無何。腸病治而兩目忽盲。病者怒訟諸法廷。請賠償所損害。司法官以此醫雖不知連服綿馬。有喪明之害。然對症下藥。重病果除。而當時又無不得連服之規則。醫之失敗。非故意。遂判其爲無罪。病者訟不得直。憤然而歸。雖然。殺人者死。

傷人抵罪。不有陽律。豈無陰譴。世之庸醫。知乎否乎。

●藥品與年齡

藥品之用量。當隨年齡之大小而異。茲以二十歲至六十歲所用之藥量。定為單位。幼年之藥量。其比例當如左表。

一歲以下	十五分之一	四歲至七歲	三分之一
二歲以下	八分之一	七歲至十四歲	二分之一
三歲以下	六分之一	十四歲至二十歲	三分之二
四歲以下	四分之一		

至六十歲以上。年齡遞加。則用量反宜遞減。如四分之三。減為三分之二。三分之二。減為二分之一。是也。溫氏（ヨンゲ）於十二歲以下小兒之分量。別有一法。簡括而易記。臨法以現在之年齡。加十二年。而與現在之年齡相比。如三歲小兒之分量。為

$\frac{3+12}{3} = \frac{15}{3} = 5$  是也。畧記如左。

一歲	1	1
二歲	2	7
三歲	3	15
四歲	4	14
五歲	5	5
六歲	6	1
七歲	7	3
八歲	8	7
九歲	9	2
十歲	10	5
十一歲	11	11
十二歲	12	23
十三歲	12	1
十四歲	12	2

右所示概略。計算殊便。惟各人身體又有大小強弱之別。尤貴臨時增損。所謂匙加減是也。

### ● 天秤與分量

欲知藥粉之輕重。必用權。欲知藥液之多寡。必用量。凡藥用之權量。當購置二瓦之天秤。及十五瓦之適當杯各二。如散藥等之固形物。則以天秤稱之。丁幾等之液體。則以適當杯量之。

如一〇即一瓦。當我國二分六釐六毫六六〇。即一〇之十分之一。當我國二釐六毫六絲六六〇。即〇.一之十分之一。即一〇之百分之一。當我國二毫六絲六忽六微六六。於兩量以乘之。則可變為中國量。其核算頗精密。如一五〇以乘之。則為 $\frac{1}{15} \times \frac{1}{10}$ 。即吾國之四錢也。

### ●調合法與器物

天秤與適當杯為藥用所必要。既如前述，然調合藥品之器物亦不可少。如二百瓦之溫湯斗、乳鉢、乳棒、水牛製之匙、合匙、土瓶、小水濾、玻璃漏斗等是也。器物既備，則可依左之處方而說明之矣。

〔例一〕 重曹二、〇 硝蒼一、五 白糖 適宜  
右分三包。一日三次。每服一包。(胃腸病)

依法先用天秤稱重曹二瓦入乳鉢，又稱硝蒼一、五亦入乳鉢，並酌加白糖，乃取乳棒混和使勻，即過目力分為三包。

〔例二〕 含糖百弗聖三、〇 稀鹽酸一、〇 單舍八、〇 水一〇〇、〇

右一日分三次服。(消化不良)

依法先用天秤稱含糖百弗聖三瓦入溫湯斗，再用適當杯量稀鹽酸及單舍，亦入溫湯斗，加水百瓦，徐徐溶解之，取玻璃箸攪和，自漏斗注入瓶中，一日分三次服。

〔例三〕 摩涅瓦浸二、〇 一〇〇、〇 稀鹽酸一、〇 單舍八、〇

右一日分三次服。(咳嗽)

依法先以搘涅瓦稱準括弧內之分量，入溫湯一百瓦煎之。五分時為止，加入稀鹽酸及單舍，煎時宜頻頻加水，使常滿百瓦。一日分三次服。

〔例四〕 還元鐵〇、三 規尼涅〇、一 甘草末適宜

右製丸六粒。一日三次，每食後服一粒。（強壯藥）  
依法先以還元鐵規尼涅，次第稱準，入乳鉢，隨加甘草末，取乳棒研和之，再入護設末少許，水二三滴至五六滴，復研相使勻，置掌上搘捏之，而分為六丸。

〔例五〕 重費三〇 硝若一、五 黃若越幾斯〇〇六

右分三包。一日三次，每服一包（胃痛等）

依法先稱重費與硝若，入乳鉢，次第稱準，越幾斯，黃若越幾斯，煉藥也。不能徑置天秤之盤內稱之，宜先將筍皮剪成小張，稱其為若干瓦，乃除去筍皮之分量，以該製劑載於筍皮上稱之。然後用乳棒之尖端，燃取淨盡，與前二藥一併研和，此法固有黃若越幾斯，故稱難。

按合匙可為天秤之代用物，無論何藥，初次入天秤稱準後，移於此合匙中，視其多少，明日又用前藥，則徑用合匙約之，必不爽，此亦簡捷之法也。水牛製之合匙無與。

他藥化合之弊故較優於金屬製

●存貯藥料法 以下補

英國醫學博士哈來曰。凡存貯藥料之所應向北得光不可向南因直對之日光化分數種藥料之力量大又如藥料含異質或不淨則直來之日光更易令其化分即如硝酸銀（銀養淡登<sup>五</sup>）或硝酸銀水如為全淨者則久遇日光不致變色設少含生物質則易致化分又如甘汞（單綠汞）或大黃等質亦不可遇直射之日光又如各質應用其新鮮者不可用陳久者以上係藥肆中預備日用之藥料至如存大包或大箱之藥品其房屋應暗冷而乾熱度不應常有改變凡見光最易化分之質如赤降汞（紅色汞養）黃色沃度水銀（青汞碘）珊瑚鹽（山道年）過格魯兒液鐵（淡鐵綠水）青酸（輕衰酸）等宜裝於深茄花色玻璃瓶而藏於櫃內因此各質不可令遇日光變化其物質中之一分也。

藥料遇空氣之害甚於遇日光之害如能令藥料不遇空氣則酸素炭酸素（養氣炭養氣）與其水亦不可遇之此空氣為令藥料變化最多之原即如青酸（輕衰）依的兒（以脫）兩質遇空氣則化分極速凡亞加里性之藥皆不可曝露於空氣中雖空氣

頗乾，亦能收其所含之水少許。又有數種藥質，所在之器，必封固極密，毫不通空氣，可免其自散者化散，又可免受空氣變化之害。最易化散之流質，如以脫呀囉昉等，其瓶必用最準之玻璃塞鑿之，且其塞外應用玻璃套，而其內面應磨準而不通氣，則不能免化散之弊。又能免空氣加熱，令瓶內壓力加大，塞子挺出之弊。

凡植物質遇溼空氣必壞，故作乾之後，應置於馬口鐵器內，密蓋之。如菲沃斯草（羊躑躅）、實菱答利斯（毛地黃）、玫瑰花等易壞之物，取而乾之，存貯之，均須謹慎，應存於乾燥之處，且每年必易新者。

#### ●處方與調劑之事

處方與調劑之職，彼此大有相關，又各有所應記之事。茲略言之。處方之規矩，其事有七。

(一)處方者寫字之時，不可與病人及旁人相談，寫畢之後，必先自己細看一遍，然後交與病人。

(二)處方上必記其名與住處與日期。如藥肆家有疑而不明之處，或方內有差誤之處，則易與醫士商量，有日期，則便於以後查驗。

(三)西醫處方必用臘丁文而不可用簡寫之法。因臘丁文為西國所通行者。至于指明如何服法。必用本國之文字記之。因病人能自知其服藥之法為有益之事。而更為穩妥。又如本國人能知德國法國等國之藥品書亦必為有益之事。

(四)如所定之服量分外大者。則醫士應指明用大量之故。令配藥者放心。即如方內有醋酸莫兒比涅(嘔啡哩醋酸)十釐。則應用大小兩種寫法並寫。即如醋酸莫兒比涅拾釐十厘。則可免配藥之錯誤。或可記之如拾釐(1)。

(五)處方者必慎用各法。免誤事之危險。即如藥品書內定最猛之毒藥。並配其畧淡之水。如斯篤利幾尼涅(馬錢霜)亞篤魯必涅(阿脫路比亞)莫兒比涅(嘔啡哩)亞硫酸(鉀養)昇汞(汞綠)等。常用其水為頗淡者。除數種極要事之外。應用其淡水。又偶然必用其濃者。則處方者應在方內指明所用之藥。分外危險。令其分外謹慎。

(六)處方以簡便為要。因所開之方為繁者。則顯明開方之人不知醫理。如有一藥常與他藥合用。則難知其藥之本性。久之。則觀其無效驗。不敢用於方內。即如一方內開兩種或多種同性之藥。如鴉片與矢爐毒(黑脊拉克)等。混亂開方。則病人不得益。醫士不能知其病如何。恐其藥性彼此相消。而其內無有一藥能顯其本性。

(七)凡方內用可憎之藥料，則必謹慎另配他藥。令其適口，或不能適口，亦可免其厭惡。如芙蓉中預備多法多料，能成此事。但處方於此等事，亦難免誤。如薑荳（啞羅）之苦味，大為可惡。如加以甘草膏，則其苦味不覺。瀉性仍存，又如數種油質合於鹽與胡椒，服之適口。又如將油質合於糖，或合於他質成膏，則不惟其質可觀，其味亦能更佳。即如蓖麻油，能在酒精內消化，如将其油合於白蘭地等火酒少許，則不覺其味之可惡。又如鹽類質，如硫苦（洋朴硝）元明粉等，用其濃水，則難服。愈淡，則愈易服之。有數質其味甚濃，能加以有趣味之物，則不覺難服。間有處方之人，因欲令藥味適口，而所配之味，為病人所厭惡者，此事必宜謹慎。因有人喜桂皮而不喜薄荷，或喜此兩質而不喜哥羅仿等，故必預問病人所喜何味，可擇其有益者用之。

調劑家所宜謹慎者，其事有五。

(一)凡醫士應通曉調劑之理法，否則將不能開方。

(二)凡毒藥應存於綠色瓶，其瓶面應有槽，或有凸點，則不惟目能見之，手亦能知之。

(三)凡最猛之毒藥，如青酸（輕汞）昇汞（汞綠）與含砒素之各藥，應另藏一櫃，鎖密之。至開櫃之時，必另使人在旁看守。又如毒性之鹹類，含砒素或含昇汞之各水，當配

水之時。應使明事之人觀之爲證。

(四)如用最毒之藥。如馬錢霜等作丸藥。如能溶化者。必先令其溶化。然後與他料作丸。令得均勻。

(五)如臨調劑時。疑其服數過大。而醫士未嘗指明。或有差誤。則應立即通知醫士。先辨明其事。而後發藥。處方者與調劑者。彼此相關。

處方之人。如能自行調劑。則爲最佳。因醫士與病人相關之事。內必有深信而不疑者。常有醫士難於託他人調劑。又常有患病者。不願託藥肆中調其劑。而其不願之故。間有因觀其方。畧能知其人所生何病。間有人患病。不欲令外人知之。

醫士亦因別故。不願將方託藥肆配之。因所處之方。如能親自調劑。則覺自己有把握。如令他人配藥。則不放心。恐其有誤。如適用同法之方。而藥不靈。則難知爲方之有差。抑藥品之不精。如醫士自配藥。而送與病人。則不能無疑。且能另得其方功效。內之新據。設如醫士開一方。而交與病人而去。待數日復至其處。則其人或因過信其藥。服之過限。令病因此增重。或病人竟問配藥之肆。此方可再服否。而從藥肆家之言多服之。又常有病人。用所處之藥方。自己服之。以爲有益。則遇朋友內有相類之病。將其方

傳之而不請醫士診視。因此誤事。不但能害醫士之聲名。且其方大略不合宜。其人之病必更加重。

常有病者問調劑者曰。此方內之藥丁文不識。請問其爲何種藥料。又請問其藥性如何。有毒與否。內有鴉片與否。成人服之得益。小兒亦可服之否。如是云云。則如配藥者答言不知。則開罪於病者。如答之。則開罪於醫士。所以配藥者應另有回覆之語。可答曰。醫士與配藥家之規矩。應各事秘密。不告於人。如違命回覆。則大爲失信。如欲知之。必向處此方之醫士處問之。若爲應知之事。則醫士自必告知。

如醫士與配藥料之人。能如是彼此相信。則所開之方。大半可託藥肆家配之。惟間有數事。醫士應能自己配藥。因不惟病人能得益。即醫士所用之法。能自有把握。

## 第二章 健胃劑

### ● 含糖百弗聖

*Tepsinum Saccharatum.*

百布聖即ペブシン 一作胃波

素、舊譯作專白新、又作伯布西尼、

此藥自牛豚等之胃粘膜間。採取百弗聖。混以乳糖而製成之。百弗聖(Pepsin)者。爲胃

液腺所分泌之胃液素。人類亦有之。爲消化蛋白質。蛋白質爲肉類之主成分。自然之藥。人之罹胃病者。即因此胃液素即百弗聖缺少之故。胃液素缺少。則不惟動物性食物所含之蛋白質不能消化。於植物性食物亦然。假令胃液素雖少。而消化機能卒不稍減。則食慾必非常增進。食慾非常增進。則身體必次第衰弱。是以東西醫士用牛豚之百弗聖。補助而促其消化。是爲健胃劑之一。凡小兒、少年、老者。服之俱效。誤用之。亦不致中毒。其用量。通常每次一瓦。一日三次。食後爲宜。溶於水中服之。或卽服其散劑。皆可。此藥除消化蛋白質外。又能間接治肺癆、貧血等症。

〔提要〕 一二三日間。食不知味。服百弗聖一瓦。有效。

營坐業者。苟不知食慾衰弱之因原。連用此藥二三日。或五六日。尙無妨。更久則不惟無效。且成不消化之習慣。胃脣因而薄弱。是當知之。諺有之曰。藥可服而不可服。三復斯語。味醰醰焉。

或者曰。含糖百弗聖主治之功能。第一爲消化蛋白質。故凡多食動物性食物。而胃液素少者。用之適宜。然多食植物性食物。而亦罹同病。則如之何。實無治療之藥劑乎。將仍授以牛豚之胃液素乎。抑別有特效之物以代之乎。應之曰。有消化植物性食物之

藥以「マルナン」為最。

●「マルナン」 Martin

「マルナン」者為醫科大學草野氏自麥芽中之發見。悉心研究知此物有消化植物性食物之效。試之果然如或疑其無效可取小麥粉約十錢注適宜之水煮為糊加入「マルナン」一錢。熱至攝氏四十度取下約半時則澱粉次第消化變美麗澄明之液體據此可見有消化植物性食物之效矣。凡常食植物而食慾不進者服「マルナン」其功用與肉食者之服百弗聖同。用量每服一錢。

〔提要〕○一之「マルナン」每日服三次能消化米芋野菜等物。  
或者又曰蛋白質及澱粉質既可用百弗聖「マルナン」二藥適宜消化之矣而分  
解脂肪分令得易於吸收之藥亦有之乎曰有胰液素。

●胰液素 Pancreatin 又名「パンクリアナン」舊譯作胰肉汁、又作擎克靈阿  
低尼。

胰液素自牛豚等之胰臟採取製成為消化脂肪分之藥。胰臟分泌之胰液缺乏則當用此補給之。

西保案。脾臍古名臍，又名臍。舊譯作臍肉。

脾液素有固形及流動二種。固形者以哺乳動物之脾浸諸水後復取出而乾燥之也。流動者加依的兒及佩利設林（即甘油）於脾臍而製成之液體也。不惟有變化脂肪之力，兼有消化蛋白、澱粉兩質之能。是故百弗聖為胃之消化藥。脾液素為腸之消化藥。用量〇、一至〇五，與百克聖或牛乳、肉羹汁混和並服皆可。

由是觀之。彼重炭酸曹達、苦味丁幾、稀鹽酸、酒石酸等藥，以善於消化著名者。與百弗聖、マルチン二脾液素較之。則猶西子與嫫母矣。迨細按之。實不盡然。何則。醫者之用藥。猶君子之用人也。取其所長棄其所短。故某病用百弗聖等藥而無效者。則曹達為無上之良藥矣。某病不能用百弗聖等藥者。則稀鹽酸為唯一之妙劑矣。

〔提要〕肉食皆含脂肪。消化脂肪之物莫如脾液素。

●重炭酸曹達

Natrium bicarbonicum. 一名重炭酸那篤。俄譯省曰重寶。

舊譯作重炭酸鈉

此藥為白色之粉末。其效能加左。

(一)為慢性胃加答兒（舊譯作胃久炎古名癰瘍，又名癰飲）之藥。治慢性胃加答

兒有奇效。

(二)爲胃之洗滌藥。因誤用飲食而發之胃臟汚物症。以此洗滌之佳。

(三)爲制酸劑。治釀酸過多之消化不良。靈效無匹。釀酸過多者。發酸水嘈雜。口中覺有酸味之症也。

(四)爲鍼吐劑。嘔吐劇甚者。服此立止。屬試不爽。

(五)爲明頭、氣管枝等粘膜加害兒之吸入藥。吸其蒸氣頗見功效。有謂內服亦宜。則未敢必。

(六)治尿石。膀胱中有患結石病者。服之能愈。

(七)治癩。皮膚粗糙。剝落似糠之白色細屑者。以外治之。

據秦西醫家言。重曹又有利尿及治癩風之效。殆未可盡信也。

用量一次〇、五至一、五一日數次。散劑、水劑皆可作吸入及塗布劑。當用一%至三%之溶液。

案%者。爲百分之記號。如云三%重曹水者。乃水一百瓦中。含有重曹三五也。餘類推。

世俗以重曹價甚廉。遂以爲無大效力。誤矣。名醫用之。尤能起死回生。試舉一事以證之。昔有某富家翁。年五十五。患輕症之慢性胃炎。答兒某日。又誤食腐敗之魚類。嘔吐。刺其。迺延名醫數輩治之。卒無效。困苦甚。而且衰弱。培魯索（ベルソ）博士。醫中之聖也。最後至診翁。語但服適宜之重曹水即可。從之。果不數日而愈。今已六十有四歲矣。健被猶如曩昔也。夫重曹一日量之價。日僅一二盞耳。而得延壽十餘年。斯可知。醫生之價值。不在醫藥。而在用藥之有學問。

重曹有去酸之功。服一瓦。可治輕症之胃炎。答兒。然設以過信之故。但約計多寡。而不鑄鉄校量。或今日服一瓦。明日仍服一瓦。則反有增加釀酸。或起消化不良之弊。所謂過病不及也。讀者其知之。

〔提要〕日服重曹一瓦。治輕症胃炎。答兒。

● 苦味丁幾  
*Tinctura Amara.*

此藥以細剉之橙皮。龍膽各五分。小豆蔻粗末二分。酒精百分。入一器中。浸置五日。取出。壓搾。濾之者也。能刺載消化器。間接防食物腐敗。而促消化吸收。是爲苦味健胃劑。通常單用者少。多與他藥混和並用。用量二、三〇。約爲一日分。

此藥價亦最廉。與重曹同。任服多少。不致中毒。惟徒恃藥劑之力。而不加以自然之攝生。則反爲弱身之基本。

〔提要〕苦味丁幾與敷藥並用。則爲補消化器之藥。

●稀鹽酸

Dilute hydrochloric acid.

氯化鈉淡鹽酸。

此藥以鹽酸一分。蒸餾水二分。混合而成。吾人胃液中本含有鹽酸。與百弗聖。協同消化蛋白質。軟骨。膠狀質。實爲主要成分之一。若胃中鹽酸缺乏。則不僅罹胃病。且食慾不進。軀體羸瘦。是時宜服此藥。以助其消化。此外又爲清涼劑。止渴劑。用於熱性病。用量。一次五六滴者。當加水二千瓦。用二〇者。當加水二百瓦。更和白糖。或單含。是謂鹽酸リモナード。適宜用之。能止渴。有涼爽之感。然若長時連用。或服其過量。則減弱消化力殊甚。且傷胃之無義。而致虛脫。宜特注意。

凡調合藥劑。務當審慎。若漫不加察。誤入或過多。則貽害匪淺。有某醫院藥局。生以稀鹽酸與蒸餾水混和。至病者腹。俄傷胃勢極重篤。年餘。僅得不死。經多方研訊。知當日醫者。以調劑事委諸藥局生。藥局生復委諸學徒。以有此危險。欲謀斯災。宜聘藥劑師。然藥劑師不易得。而醫師以一身兼診病。調劑兩者。尤屬萬難。大夫君子。其亦有補救

之方乎。

〔提要〕稀鹽酸爲治因鹽酸缺乏而起胃加答兒之藥。

●酒石酸

Tartaric acid.

舊譯作葡萄、又作葡萄酸。

此藥亦爲清劑。以〇、五至一、〇加水百瓦並相單舍，則爲酒石酸「リモナード」。但製爲沸騰散而用之者多。單用酒石酸者頗少。

●沸騰散

Pulvis eriphius.

此散以重曹十分、酒石酸九分、白糖十九分混合而成。加水則沸騰，故名。其效爲制酸、鎮吐等。用量沸騰散五、〇溶解於一五〇、〇水中，乘沸騰時速服之。或乾置舌上，而後飲水送下亦可。

胃痛「ムカムカ」而作嘔時，服此，頓覺怡適。

〔提要〕沸騰散爲治「ムカムカ」之藥。

●百弗聖酒

Liquor pepsini

此酒先以含白糖弗聖百分，瓶里設冰五十分，水五十分混和，後入鹽酸五分，白葡萄酒千八百分，靜置七日，時時振盪，而製之者也。消化不良及貧血之人，可以此爲健

胃強壯劑。每食後飲十瓦至十五瓦。一杯。神志暢怡。頗有效。藥肆所出售者。不惟為陳宿之物。即白葡萄酒。亦係質品。飲之有便秘或下痢之害。日商惟利是圖。而不顧公德。於此可見。願世人勿購之。

〔提要〕每食後飲百弗聖酒一杯。能卻病。

右所述著名之健胃劑。皆屬於通常藥之範圍內。非劇藥也。茲歷舉處方如左。

▲含糖百弗聖三、〇「マルチン」〇、三 乳糖適宜

右分三包。一日三次。每食後服一包。

▲脾液素一、〇 含糖百弗聖三、〇 乳糖適宜

右分三包。一日二次。每食後服一包。

▲重曹三、〇 苦味丁幾二、〇 單舍八、〇 水一〇〇、〇  
右一日分三次服。

▲重曹三、〇 含糖百弗聖三、〇 白糖適宜

右分三包。一日三次。每食後服一包。

▲稀鹽酸二、〇 單舍一〇、〇 水一〇〇、〇

右一日分數次適宜服用。

▲苦味丁幾二、〇 含糖百弗聖三、〇 稀鹽酸一、〇 薑含八、〇 水一〇〇、〇  
右一日分三次食前服。

但僅可擇一方服之。不可在一日內互用數方。

右不過略舉健胃劑之最普通者言之。其他俱散見於各條檢閱之可也。

●龍膽 *Radix gentianae scabra*. 一名健貢亞那根

龍膽為一種草類之根。日本古稱漢藥。謂其效能甚多。歐洲則稱此草之乾燥根為 Gentiana. 其成分殆東西相同。至論醫症的功用。當先總述一般之苦味劑。而後可順序及之。苦味藥之入口中也。雖能由反射的刺戟而增進唾液之分泌。然一入胃中。則反減少胃液之分泌。必除去胃中之苦味藥。胃液乃從而漸增。故服苦味藥者。最少宜在食前三十分至一時間。用之適宜。能間接催進食慾。恢復衰弱之消化機。抑制胃中之異常酵。反之而服其大量。則不僅減損食慾。妨害消化。甚有致恶心。嘔吐。或下痢者。要之苦味藥者。恒用為健胃劑。因精神過勞。酒色過度等而起衰弱的消化不良者。服此更佳。

右所述乃通論一般之苦味藥也。而屬於苦味藥之龍膽亦然。每次以龍膽〇、三至一〇爲浸劑或散劑內服。一日數次。常用於衰弱的消化不良。

又龍膽三瓦入溫湯百瓦煎五分時再加橙皮舍十五瓦。一日分三次服。

自龍膽製成之龍膽丁幾。龍膽越幾斯其效皆同。丁幾一次量大率一瓦半。越幾斯一次量大率〇、一至〇、五。

### ● 楊格矢亞丁幾

*Thaumatura Quassiae.*

一名括矢亞丁幾舊譯作瓜芝。又

作若白木。

此藥自南美或印度諸島所產。*Quassia* 之木質採製而成。多以之製丁幾。效用與一般苦味藥同。用量一既日數次。每服一〇。

### ● 蒲公英

*To Raddeion.*

俗名獅子草。

此藥為一種草類。產於日本及歐亞各地。春日開花。採之者連根鋤取。乾而後製之。山野間自產者亦可入藥用。用法以蒲公英五〇至一五〇入溫湯百瓦至二瓦煎之。惟尋常多喜用蒲公英。越幾斯日服越幾斯數次。每服約一瓦。不惟有一般苦味藥之健胃作用。且有催促通便之效。於消化不良而兼常習便秘之症者。服該越幾斯頗佳。

▲蒲公英越幾斯三〇 芒草末適宜

右製丸十五粒。一日二次。每食前服五粒。

●古倫僕根 Calumba. 一作葛倫僕根、一作古倫母根、古譯作高倫布、又作

牛林草、

此藥為一種灌木之根名 Colombo 產於東亞非利加之海岸地方及東印度用為單純之苦味健胃劑者甚少。多用以止瀉治消化不良而兼慢性下痢症用量古倫僕根二瓦約入溫湯百瓦煎之一日分三次服或為散劑丸藥等日服〇、五

▲古倫僕末二〇 次硝酸蒼鉛一、五 乳糖適宜

右分三包。一日三次。每服一包。

▲古倫僕浸(二二〇)一〇〇〇 蟬皮舍利別一〇〇

右一日分三次服。

●人參 Chinese Ginseng 补

前明時心州、高麗、鄧鄆、百濟、澤州、箕州、并州、幽州、媯州、易洲、平州並產人參。而上黨山谷出者為最。上黨即今潞州也。太行紫團山所出者為紫團參。紫色稍扁。百濟參白堅

且圓名曰條參俗名羊角參高麗參近紫體虛新羅參亞黃味薄肖人形者神類雞腿者力大高麗百濟新羅三國屬朝鮮其參有子十月下種如種菜法春生苗多於深山背陰處初生小者三四寸一梗五葉四五年後生兩梗未有化莖十年後生三梗年深者四梗葉各五中心生一花俗名百尺杵三四月有花細如粟蕊如絲紫白色秋後結子如大豆七八枚生青熟紅自落秋冬采者堅實春夏采者虛軟本朝獨重遼參以爲神草古人之舊說如此由近日醫學家將人參用化學法實驗其性質知略有開胃功用別無特長其補益之性不及雞汁牛汁之十一也附誌於此以告學者謂余不信請引名醫徐靈胎英醫稻惟德之說於左

國朝徐氏靈胎曰天下之害人者莫其身未必破其家破其家未必殺其身先破人之家而後殺其身者人參也又曰吾願天下之人斷不可以人參爲起死回生之藥而必服之英國醫學博士稻惟德曰人參各國皆有惟高麗頗多農人種以爲業等次不一紅參最佳其價甚貴因種之不易農人取荒山樹林之肥土培養苗生甚難並非當年收成必待數年之後方能長大愈久愈佳上等者獻奉朝廷農人不應有此物各處查考甚嚴或朝廷賜於臣子或與鄰國交往作禮物亦有自生者卽如黑龍江奉天諸處

多有人挖取爲業者。其名目稍有不同。究其功用。則大同小異。而本草諸書。誇其用處。非常。曾經化學家查覈其性。余爲此細心考究功用。主治何症。僅可列於開胃之劑耳。凡調理病服之者不少。皆實驗未著。親身服佳者斤餘。亦未見過服之患入平胃藥類。比蘇打鋐養木鱉金雞拿等藥之力似遜其半。夫藥能有損人之力者。亦必有療病之能。用之得當。病患息除。用之失宜。反以貽害。而醫者首視病人之壯弱。診某病須用某藥。或外搽內服。鮮有不愈者也。世之庸醫。皆以人參爲上品之靈藥。而不查其真實果有何力。竟信古傳以難得之物。當作治病良藥。可慨也。

### ● 西洋參

附

西洋參。大都產於北美洲。爲野生之物。產美利堅各省者爲上等。產英屬坎拿大者尤佳。其身結質而重大。土人掘山得之。售諸外國商店。每磅僅值美銀一圓許。華商購諸外國商店。運回中國。可獲利數倍。參之類人形者甚多。選而裝潢之。每枝可售銀數百元。華商在美國。運回中國之貨。惟此一宗。每年值銀十八萬磅。美人見華人之重視參也。曾令化學家多人。分析試驗之。皆謂無養生質料。惟其味稍苦。略有開胃之功。據外國商人言。洋參一項。如無華人購買。直棄如草芥耳。

### ●阿膠

禹貢導水。濟水三伏而四見。既伏而見。東出於濟源縣。東阿亦濟水所經。故取井水以煮驥皮。謂之阿膠。古人以爲服之可以下胎。疏痰。止吐。取濟水性趨下清。故以治淤濁上逆之疾。今之醫者則用以治崩。帶胎動。胸風。血淋等症。而不知驥皮所煮之膏與豬皮牛皮等所煮之膏相類。除潤內皮增油質之外。別無功用可知。古人之說固不確。而今人用以爲治婦科要藥。則尤謬。

## 第三章 皮膚病藥

### ●石鹼

又名皂子。南名垂蠅。又名洋肥皂。

石鹼近日盛行。種類甚多。惟列入藥品者。僅有藥用石鹼。 *Sapo medicatus*。加里石鹼。 *Sapo kalimus*。二種。欲明其性質。製法等。必須先自化學上說明之。故從闕略。而但述其効能。及用法。

內服石鹼。入胃。則與胃中消化液之鹽酸。鹽酸爲消化液之一成分化合。而害消化。故供內用者殆無之。然於鹽酸。硫酸等之鹽類中毒。倉卒無解毒劑時。則溶服石鹼。往往有效。余友妻

某罹比斯的里病。日憂懲煩惱無悅容。某日服硫酸一口。擬自裁。余友驟見。驚惶無措。旋忽憶及石鹼可為酸類之解毒劑。乃亟製為溶液。題飲之。更遣疾足奔赴醫家。乞救治。竟得不死。夫石鹼常物耳。而能生死肉骨。則其寶貴當何如。藥學智識。顧可忽耶。

藥用石鹼供外用者。效亦頗多。以微溫湯浴之。為灌腸劑。則刺戟直腸。興奮蠕動機能。使堅硬難下之宿糞。軟化而易通解。

此藥又有清潔齒牙之效。處方如左。

▲藥用石鹼三〇、〇 沈降炭酸加酒曳謨、一〇、〇 丁香油一〇

右同入鍋中。文火徐徐調和。先塗齒面而後擦之。則齒麗美觀。

患癩。皮膚剥落如紙。慢性溼疹。自皮膚面漏泄粘液。風等皮膚病。以外用。恒有效。又可代普通石鹼。為洗除皮膚毛髮垢膩之浴料。且較普通石鹼為佳。能豫防皮膚病之發生。

加里石鹼之刺戟性較藥用石鹼為強。故能除皮膚之寄生物。於疥癬。白疕。瘻疹。發生中含紫黃屬發奇藥。搔之則出血而結痂皮。及因黴毒而起之禿頭病等。均以之外用。或與他藥並用。又因有殺菌消毒之效。可用以洗滌傳染病者之襯衣。

總之石鹼有祛除垢污之效。故人恒用之。惟多用。則能溶解表皮之脂。致皮膚發生炎症。是當慎之。

〔提要〕石鹼可為浴料。治皮膚病。達腸。解酸類之中毒。

●百露拔爾撒謨 *Balsam of Peru.* 即ベラニバルサム、舊作秘魯

脂、一作秘魯。

此樹惟中美洲聖撒魯消舞爾(サンサルヴァードル)國之百露撒謨(バルサム)溪某地方有之。喬木類也。剝皮而取其汁。或經布片於樹幹而吸取之。更加製煉而成。論其功效。有謂患慢性氣管枝氣管炎。及肺結核者。服此。能制痰液之分泌。兼具防腐之力。有謂諸種之潰瘍。火傷。凍瘡等。外用。頗奏奇效。然晚近醫學智識日新月盛。良藥廢續發現。故前人之舊說已無信之者矣。惟以之殺疥癬蟲。則諸藥無出其右。各種寄生蟲。無論如何頑固。一觸此藥。經二十分或四十分時。必不能保存生命。且以其有清快之芳香。塗於皮膚。亦少刺戟。故自醫者以迄社會咸信用之。

用此藥者。當先入浴。以加里石鹼。洗除垢脂。乃取四〇至六〇塗擦患部。或以此分量。落於五十瓦之酒精中。而後塗擦。終以毛布纏絡。凡一晝夜。約二三次。塗擦之後。宜

常就寢。若已治愈。則悉除舊衣。更易新服。過數日。如仍覺癢。當更反復用之。

〔提要〕殺疥癬蟲之藥。以白露拔爾撒謨為最。

●薔薇油 (Henn Rose. 舊譯作玫瑰油、

採取新鮮之薔薇花和水蒸餾之。則得一種揮發油。是為薔薇油。芳香襲人。可為調香料。某醫謂依後之處方塗於皮膚。則皮膚細而白。何必內服亞硫酸等之毒藥云云。余嘗試之。絕無效驗。且其價貴於理學上又不能確實說明之。故不能勸人試用也。姑錄處方以供一覽。

▲薔薇油五〇 稀酒精或者一〇〇〇

右一日五六次。用毛筆塗布。連用七八月之久。

若果如某醫所言。具以上之效能。則先以藥用石鹼清潔皮膚。以刷牙粉令齒潔白。以毛髮刺載藥(詳後)塗擦毛孔。使髮純黑。終以此藥塗皮膚。令色白而理細。則雖姣如子都。亦當退避三舍矣。惜哉。余不能無問然。

〔提要〕薔薇油。能令皮膚色白而理細。

●依比知阿兒 Ichthyol 「即イヒナオール」 舊譯作伊克度。一作墨石脂。

依比知阿兒者。自燃土質化石製造而成。此化石爲大洪水以前魚類及海獸之遺物。沈淪地中千萬年後以供人類之需求。造物之厚我可知矣。然今人之智巧苟非遠莫乎古人之上。則亦莫得而相用之也。

此藥效用之多更僕難終。面脂用之最效。酒麴鼻次之。毛髮脫落症次之。溼疹、瘡疹、粉粧疹次之。凍瘡、火傷次之。癰病次之。便麻質斯齒痛等又次之。或單純使用。或和水爲溶液。或與他藥交互塗擦。俱有殊效。面脂當先以指甲擠出皮脂。然後用依比知阿兒軟膏依比知阿兒及<sub>舊</sub>膏膚和膏或<sub>舊</sub>塗擦。如是者數日再以醋洗淨。酒麴鼻塗間先貼水蛭。徐徐吸吮其血。至夜乃以依比知阿兒軟膏塗布該部。毛髮脫落症先用石鹼洗淨。約一時許。用依比知阿兒一寸水十分。溶和塗之有效。溼疹、瘡疹、燒乾疹用依比知阿兒十五刺納林五十五混和塗擦。凍瘡用依比知阿兒與的列並底油各等分。交互塗擦。火傷用依比知阿兒二瓦華攝林軟膏百瓦徐徐混和塗布之。治愈頗速。且能鎮痛。但依余試驗。每易遺留疤痕。是其弊也。癰病用依比知阿兒一分刺納林五分。混和塗擦。雖無大效。然與他種內服藥同時並用。實爲不可少之物。此溫那(ウンナ)氏及其他醫者所公認也。健麻質斯用依比知阿兒一分巴拉賓軟膏三分。交互塗

擦亦可爲內服藥之助。齒痛於依比知阿兒中混和時羅仿謨少許。以綿蘸取塡塞齒隙有效。某醫於癩病、健麻質斯及其他各病。每日用此藥一瓦至二瓦。落入水中。令患者內服。謂其效如神。然此爲個人之臆見。通常多供外用。作塗擦劑。

此藥爲各種之皮膚病藥及鎮痛劑。其費貴可知。

〔提要〕凡患皮膚病及疼痛塗擦依比知阿兒立治。

●撒里矢爾酸 *Salicylic acid*。一名水楊酸。省曰撒酸。舊譯作沙利先酸。  
一作柳皮酸

紀元千八百七十四年。西洋人名古爾培 *Gülpe* 者。嘗報告社會。謂此藥有防腐之功。故今世頗信用之。以之解熱。及治健麻質斯。推爲聖藥。今先就防腐言之。此藥防腐之力。雖不如石炭酸之甚。然於必不可用石炭酸時。則恒用此代之。以其無苦臭氣。且毒分亦較弱也。第一爲各種食物之防腐料。日本人常以之入酒中。防其釀酵。惟用大量。則酒變性。反害胃之消化。又可防胃之釀酵物。每服〇。一連續至五六次。卽愈。此余所實驗者也。俗稱之潰飲症。卽此外用與他藥交互塗布。或撒布治腋臭。雞

眼、誠裂等症。於腋臭尤效。患子宮病、淋疾等，則以此藥之水溶液注射之。於口腔各病，則為含漱藥。歷舉處方如左。

▲撒里矢爾酸二〇○ 刺納林五〇〇 酸化亞鉛二〇〇 濃粉二五〇

右調和如糊狀，塗於腋下治腋臭。但塗擦前後，須以冷水頻頻洗拭腋下。且宜頻換裏衣。又塗擦此藥，須有恒心，連續半年，自有奇驗。若行四五日，即厭倦中止，則仍不效。

▲撒里矢爾酸一〇○ 古魯內謨八〇

右調勻，用以塗擦雞眼、誠裂等，則能柔軟而治愈。

▲撒里矢爾酸一〇〇 濃溫湯五〇〇

右一日數次，患子宮病及淋疾者，以「スボイト」注射之。口腔病所用之含漱料同。

〔提要〕撒酸為種種之防腐藥，又可以治腋臭、雞眼、誠裂等。

附記 撒里矢爾酸綿紗之製法：以脫脂綿紗一基羅（二十六兩五錢許）浸入撒里矢爾酸五〇〇克、麻子油二〇〇克、酒精一四三立得耳（一立得耳即五合五勺）之浴

解物中取出展開乾之謂之五%綿紗如撒酸蓖麻子油俱用二倍之量則謂之十%綿紗。

■ 猴答利斯丁幾

Jinture of Cantharides.

一名光普丁幾、一作カ

ンタリハ丁幾、舊譯作瓦薩酒、

此藥以猴答利斯末與阿列布油更蠟的列並底油調和而成有強弱二種入藥少則弱多則強以之作吸出膏藥供引赤誘導之用以吸取膿汁或毒物塗此藥七八時即能奏效人遭狂犬噬傷速取此藥塗於受創部則病毒可不致蔓延  
〔提要〕受最危險之狂犬毒塗布芫青軟膏即能吸出其毒。

第四章 強壯劑

■ 還元鐵

Reduced iron. 一名水至還元鐵、舊譯作吉殘粉、一作清鐵末、

余既述還元鐵不得不先論鐵劑之大略夫鐵爲人身主要之成分無處無之常與血液中之赤色素互相結合而存在昔格耳浦(コルブベサ子ツ)嘗研究之謂中等體重之男子體中約有鐵三瓦餘即八分二釐也如有疾病赤色素既少鐵亦因此而

減損僅在一瓦半以下。於是顏面蒼白，姿容衰弱，難者曰：信如是言，彼深目虬鬚者流殆以鐵為副食物耶？應之曰：否否！吾人平日所飲之水，所食之豆類、肉類及咖啡、茶、酒等物中，無不含有鐵之成分。計每日所食，約在六生的格郎姆（即一盤六毫）以上。此蓋造物之調劑得宜，非人力所能為也。鐵與血液相和，循肺臟之中，以其酸化作用為媒介，吸取酸素，而運輸於全體之諸組織。其效用有如此者。凡吸收之鐵，一部分自胃腸入血液之中，一部分則與糞便同排泄於外。故服鐵劑無論多寡，苟每日運用，所下糞便必呈黑色。

患萎黃病者，血液貧弱，內服適宜之鐵，則唇、頰、齒齦等部色赤而鮮，食慾漸盛，消化增進，精神愉快，筋力及心臟作用，此覺活潑。健康者用此，則反之，不惟不入血液之中，兼妨害消化作用，致食慾大減，衰弱甚或呈頭痛、鬱憂等病的狀態。今世俗之人，不論有無病患，或雖病而不根究其原因之為何，或雖有藥而不考求其藥性之為何，而漫然曰：鐵強壯劑也。日沾鐵礦泉飲之，誠不足以博通人之一喙矣。夫鐵礦泉，非若市中之萬應如意丹也。惟婦人有生殖器病者，以此煮沸之，入浴其間，稍有効力。貧血諸病，內服適宜，亦屬相宜耳。況販夫所鬻者，類皆陳宿之物，所用之水，是否腐敗，更不可知。實

最危者也。歷述鐵劑之效用如次。

(一) 姜黃病 (二) 貧血諸症 (三) 急性病發

之衰弱 (四) 大出血後之衰弱

(五) 過溼

(六) 慢性下痢後之衰弱

(七) 患

間歇熱與規尼涅並用有效

(八) 腎病

患肺病、心臟病、胃病等均忌用。

內服以少量為宜。若服大量，徒害消化。其吸收於血液中者，仍極纖微，則何如服少量之為愈也？又服用時間，宜擇胃液分泌最盛之時，或食時，或食後，皆可。此因胃液多，則鐵之溶解吸收均較易也。有謂浴於鐵泉，獲效殊鉅者，實亦浴湯，及其他含有物之力，非鐵為皮膚所吸收，此亦不可不辨。

右為一般鐵劑之概論，以下乃就各種之製鐵劑，一一說明之。

還元鐵為灰色之粉末，易溶解於胃液，鐵劑之中，此為最良。收貯瓶中，不嚴密栓塞，則與空氣中之酸素化合，漸次失其効力。功用一如前述，用量一日數次，每次〇、〇五至〇、一。

▲還元鐵〇、二 規那皮末一、五 柚櫞油糖一、〇

右分三包，一日三次，每食後服一包。

▲還元鐵〇、二 規尼涅〇、一 牡草末適宜

右製丸六粒。一日三次。每食後服兩粒。

●乳酸鐵

Lactate of Iron.

舊譯作鈣酸鐵、

此藥為帶白綠色之粉末。雖易消化。而亞於還元鐵。瓶儲亦須嚴密栓塞。功用同前。用量。每次〇・〇五至〇・三。

▲乳酸鐵〇・三一 甘草末適量

右製丸六粒。一日三次。每食後服兩粒。

●林檢鐵丁幾

Syrupura ferri Pomati.

此藥以林檎與鐵合製而成。色褐而帶黑之液體也。功用同前。用量。一日數次。一〇爲度。

●沃度鐵舍利別

Syrup of Iodide of Iron.

舊譯作鐵與水糖、

此藥為沃度與鐵之合劑。二者之功能。兼而有之。然此非謂單用沃度。或單用鐵劑。皆無效也。嘗有但服沃度而即愈者。代以本劑。取效反遲。有但服鐵劑而立治者。易以本劑奏功偏緩。余爲是言。亦曰。此可爲兩藥之折衷劑云爾。此藥長時服用。毫無妨害。患慢性病者用之。亦避中毒之危。其功用。主治貧血諸症。萎黃病。微毒。腺病。僂腫質斯助。

膜炎之末期及喘息等用量一日數次每服一、〇至五、〇依余所經驗者凡小兒老者用此以代沃度加里及其他鐵劑往往有效無害人以余習用此藥遂漫呼余爲沃度鐵醫余亦一笑置之

▲沃度鐵舍利別六、〇 舍利別八、〇 水一〇〇、〇

右一日三次食後服用

注意 沃度鐵之含量各國之藥局方迥不相侔美國則爲十%法國則爲〇、五%凡至日本藥肆購求此藥當注意日本藥局方之文字不可粗忽

●過格魯兒鐵液 Solution of Perchloride of Iron 一名一半格魯

兒化鐵液  
舊譯作淡氯鋅水

內服此藥功用同前然害消化起便秘服其大量且呈腹痛嘔吐下痢呼吸困難等險重之症候故供內用者甚少惟實扶的里丹毒等症每次以二三滴和水多量服之頗有效然此亦舊說也外用爲止血藥治創血創傷出血等於子宮出血則加水五六倍混和而塗布之此近日醫生慣用者也惟常人治療頗爲危險若於不潔之創面及壞疽的潰瘍加水三倍混和塗布則表面腐蝕愈後必遺瘢痕故安全之策不如徑受醫

生之療治。

此外鐵劑尚多。因非醫生社會必需之品。故刪而不錄。

〔提要〕鐵劑能治貧血、過溼、急性病後之衰弱、腺病等。

### ●葡萄酒

此酒自葡萄之實製造而成。其含亞爾個保兒（即酒精）之多少。因葡萄產地之不同。及雨澤之密疏。日光之強弱而異。少者含三%。多者二十%。酒精飲料中。惟此為最良之品。既入藥用。又能滋養。然因價值昂貴之故。廣品極多。飲之。妨害消化。易患下痢。或反是。而致便秘。西洋、中國工於鑄造。化學家縱盡分析之術。小莫能辨別之。必老練之檢查官。嘗之以舌。乃得判斷也。日本所製者。雖不能如斯巧妙。而偽物之多。實堪驚駭。博覽會中陳列之純葡萄酒。其直頸瓶。且營秘密之運動。獨一等二等之賞。於是明目張膽。益無顧忌。以偽亂真。流毒社會。可勝浩嘆。常人不可妄飲葡萄酒。卽此故也。茲歷叙純葡萄酒之効能如次。

〔第二〕用於出血過度、貧血、萎黃病、及重病之恢復期等。

〔第二〕為興奮劑。用於虎列拉、失氣、大出血、小兒之吐瀉後等。有發起心力之效。

(第三)用於慢性、熱性病、肺結核等有增進營養之效。

(第四)毫無病患但體質薄弱每食後用少量有滋養之效。

此酒有赤白二種其功效大約相同用量不一視各人經濟之豐嗇及葡萄酒之種類而定貧困者用四至十五瓦富者用三十五至五十瓦故普通用量大約二十五瓦一日須服三四次。

〔提要〕葡萄酒能興奮能滋養一次量為二十五瓦。

● 肝油

Cod-liver oil.

舊譯作魚肝油又名鰐肝油

此藥自大口魚屬之肝臟所得為透明黃色之脂肪微有一種臭氣而帶魚味用為強壯藥治種種之衰弱症於肺病多用之然無直接却病之功但能改良營養間接而阻止病之進行耳次用於腺病與沃度劑並服頗有效次用於腺病性之骨病皮膚病等亦佳次用於佝僂病為唯一之妙藥身體發熱時及患胃弱肥胖病下痢等者則大忌又夏日服肝油不甚相宜一歲以上之小兒亦必不可用蓋脂肪類本易害消化弱者貿然服之必有害而無益余友某患肺結核聞諸道路謂肝油為強壯劑大喜連服之年餘不思飲食頻頻下痢肌肉消失瘦骨嶙峋急停止勿服乃日漸恢復然則體弱及

抱病者妄投此藥。胃之消化亦必因而衰弱。從可知也。惟佝僂病用之。取效如神。用量一次五、〇至二、〇。日服二次。服後忌進油味。宜飲咖啡湯。如用爲滋養物。須於肝油中調入卵黃食之。兩者相濟。奏效較速。

〔提要〕患佝僂病。腺病而胃力强者。每服肝油五瓦。連續服之有效。

## 第五章 解熱劑

### ●撒里矢爾酸曹達

Salicylate of Lithium

一名撒里矢爾酸那烏鐵

譏。一名水楊酸曹達。一名水楊酸那烏鐵。省曰撒曹。舊譯作沙利光錠。

此藥爲白色之粉末。味甘而辛。無臭。爲散藥或水劑。皆可。惟用散劑者多服其中量。則起恶心。或患嘔吐。連服中量。或頓服大量。易有衰弱之虞。爲解熱藥及鎮痛劑。用於感冒。肋膜炎。神經痛。急性腰臍質斯等。以治急性腰臍質斯尤效。用量一次一、〇至一、五。日服四、〇至八、〇。同時宜兼服薄荷少許。以防嘔吐。有用於腦脊髓膜炎。糖尿病者。又或謂有利尿之效者。余皆不之信。略舉處方如左。譯者案。確有利尿之效。余已經驗數十次矣。

▲ 撇曹一〇 白糖二〇 薄荷油一滴 水三〇〇

右臨臥頓服。

案頓服為一次服完之義。二〇〇者約合小杯一杯。服後即和衣擁被而臥。以促其發汗。輕症之感冒。一服即治。

▲ 撇曹四〇 薄荷水一〇 罂粟壳以白糖代亦可 八〇 水一〇〇〇

右一日分三次服用於僂麻質斯與筋膜炎之初期有效。

【提要】撇曹之功效能治感冒、筋膜炎、神經痛、僂麻質斯等症。

●〔アスピリン〕 Aspirin 一名アセチノン  
板里夫爾音譯

此藥為白色之粉末。難溶於水。亦有強烈心致衰弱之副作用。效能與撇曹相似。用於筋膜炎及諸種之熱性病。以治關節炎質斯更著奇效。此外又可為鎮痛劑。近自醫科大學以下皆用之。用量一次一〇日約三次。

【提要】每服アスピリン一五解熱鎮痛。用於僂麻質斯尤妙。

○安知歇貌林

Acetanilidum. Antifebrinum.

一名亞丁為亞尼里

度、舊譯作亞西米尼利、又名退熱冰。

此藥爲有光輝之粉末。無色無臭。味帶辛。難溶解於水。普通作散藥。或丸藥。爲解熱劑。治感冒。肺炎。寒扶斯。肺結核。急性發疹病等種種之熱性病。爲鎮痛劑。治神經痛。脊髓  
癆之疼痛。偏頭痛。僕麻質斯等症。就中如神經痛及僕麻質斯。則以服散劑爲宜。用量。  
一次〇.二至〇.四。日服數次。用以發汗者。當於夜間臨臥時服之。極量。極量者。在法  
上斷無過此量。一次〇.四。一日二至三。過此則呈中毒症狀。全身倦怠。頭部疼痛。眩晕。耳鳴。恶心。  
嘔吐。甚或起。アノノ。皮膚現青藍色。繼則流粘稠之汗。惡寒。齦牙。皮膚蒼白。  
脈搏不正。呼吸困難。剝舌。四肢發譫。語人事不省。蓋有名之刷藥也。此時當  
先擦其身體。進溫咖啡湯。或葡萄酒。並遺疾足。教請醫者。醫者用湯布羅。及依的兒  
注射皮下。爲善。又雖不至發暈。而連續服用。皮膚亦必發一種之疹。而微發熱。  
余嘗用此藥於患肺結核者。以之解熱。最初服〇.三。早晚各一次。如熱不減退。則增  
至〇.四。日服三次。雖發皮疹。亦必速服。則不能解熱。即咳嗽。咯痰。亦能驟止。食慾  
增進。精神怡適。解藥中。此爲最效。又患胃痛胃痛者。頓服〇.四。更飲日本酒約二  
十瓦約一小杯。較之用莫比(即嗎啡)。注射皮下。安穩爲多。其無副作用。則最著者也。

處方例 安知歌貌林、二一〇.四 白糖〇

右為一包。一日二三次至三次，每服一包。

案一之符號可作乃至二字解，如一、〇—一〇即自一瓦乃至二瓦也。以下類推。

●安知必林

Antipyrinum.

葛氏店標牌記，又名安替批鱗，又名解大冰。

此藥味苦難服，雖為劇藥，較獸貌林稍平和，其性穩，易溶於水，可製為水劑，故小兒之解熱藥，大抵用之。效能與獸貌林同。此外又可為鎮咳劑，治百日咳，有奇效。用量普通一次〇、五，日服二三次，極量一次一〇。一日〇、三，余用此量，除小兒外，多用極量，五六週必治。然設過極量，則亦致中毒，如獸貌林。

處方例 安知必林二、〇 稀鹽酸一、〇 單含八、〇 水一〇〇、〇

右一日分三次服，解熱用。

安知必林〇、六 貢若越幾斯〇、〇一 單含五、〇 稀鹽酸三滴  
水三〇、〇

右一日分三次服，以治四五歲小兒之百日咳等。

[提要] 以安知必林鎮痛、解熱、鎮咳，穩而速。

●歇那設珍

Phenacetin

日名「フェナセチン」

此亦藥物之一種。其化學的成分，及生理的作用。健康者服之而影響於身體的作用。皆似歇貌林。千八百一十七年，卡斯託，Cast 芬司伯羅，Finsberg 二氏，俱謂此藥功效多而毒性弱，勝於歇貌林。以是用之者頗多。然自余經驗所得，以爲用少量則無効。用大量則逞其毒性，甚於歇貌林。故余以之爲解熱劑者，雖用大量，日服一次至三四次，然終不令連服也。感冒、結核，及各種熱性病等，普通慣用歇貌林。而肺炎、及流行性感冒，用歇那設珍大量，爲頓挫藥服之。往往有特殊之效。患偏頭痛，連服中量較歇貌林爲佳。有謂此藥善治健麻質者，余則以爲不及撒曹遠甚。用量普通○、三至○、五。余則每用○、七至一○。一日數次，但不連日服用。若用少量，甯投他劑，極量一次一○。一日五○。

〔提要〕歇那設珍，用於種種之熱性病，治流行性感冒尤效。

●聖古尼涅

*Cinchonine*

舊譯作先高尼楨，又名先高等。

此藥與規尼涅同，結晶爲線狀物，味殊苦。以製水劑、散膏皆可。而爲丸藥者，多效能似規尼涅而較遜。古昔醫者常以之代規尼涅。醫治貧民，今則無用之者矣。然其直廉，尚不及規尼涅三分之一。故往往有指購規尼涅，而竟以聖古尼涅影射驟混貧困之

醫者亦有用聖尼涅，製爲丸藥，謗稱爲規尼涅。肥己瘠人，爲害誠匪淺。赴求藥者，其審慎加詳焉。用量，一次一、〇至一、〇少則無效。

〔提要〕苟規尼涅之價倍減，則今世之聖尼涅，將不禁而自絕。

規尼涅

(Sennin)

即キニ子，舊譯作金尼涅，一作桂尼精，又作桂寧，又名

桂子，以桂皮為主藥。

譯者曰：規尼涅雖見於第一章總論，然不甚詳備，故節錄英國哈來氏之說以補之。英國哈來曰：規尼涅（雞那以亞）之功用，易顯而甚奇，而其所以然之理，尙未查明。故先言其感動身體之性，而後推論其顯此藥性之故。如身弱而易受感動者，服硫酸規尼涅（雞那以亞硫養）之大量，苟達十五釐（即一瓦合一分六釐）至二十釐，則所顯之證，爲頭痛，頭內滿悶，略有噁心，耳鳴，或稍聾，或極聾，眼見闪光，視物不明，頭眩，夜不能睡，少有發狂。此各病證，總名規尼涅病。待二三小時，則漸退，惟其頭痛與噁心，有數小時不退者，如多服至二十五釐或三十釐，則頭痛更重，而其發狂顯出更明，耳全聾，眼或稍失明，瞳人放大。曾有人服過四百釐，而後仍無恙，然服此種大量，令人大發狂，肉筋全收縮，略顯癱證，呼吸無力，耳目全聾，盲幾瀕於死，後漸退而仍能治愈。

如食硫規（雞那以亞硫養）之極量，則脈與呼吸及身之熱度，不多改變。設如屢次服之，則脈力漸減，呼吸漸少，身之熱度亦漸低降。間有服其大量，規尼涅病尙未顯出，而已全吐出，其吐出之故半爲苦味，口不能耐，非盡因惹胃之故。凡服規尼涅而吐者，服其丸，則不致吐。如身弱而易受感動者，食其中等之量，已可令其頭痛與嘔吐，規尼涅最奇之藥性，能治依時而作之病，無論何種瘧疾，服之皆能有效。或令瘧疾減其力，或令緩其勢。如服量已足，可令其病全退。不惟能治其病，證之顯明者，如振動與發熱等，尙能絕其原。又能治療疾引出之別病，如瘻疾變爲神經（腦氣筋）痛，則其痛亦退。與瘻疾同，又脾因瘻而膨大，服規尼涅亦能令其服原。

以上爲規尼涅在無病者與有病者所顯之藥性。如查其專一之功用，則在有脊骨之高等動物，幾不覺有何功用，而下等之微蟲與黴菌遇之，則顯明其毒性。如將規尼涅一分，消化于水八百分內，則立能毒死水內各種之蟲，又有數種黴菌之易於茂盛者，與發酵內所生之生物，亦可令其即死。因是之故，以規尼涅一分，在水三百分內消化之，則能阻止發酒醉。又能令肉、乳油、直辣的尼、阿勒布門、牛乳與湯，多時不腐爛而變壞。大約規尼涅必先化分，而後其相合之質亦腐壞。化學家蘇斯特與輪勒子嘗試，以

規尼涅合於放出之血。令其不能發酸。而其不發酸之故。大約因血變酸性。特此微細生物質。而規尼涅能阻止微細生物生長故也。又化家賓斯曾試驗規尼涅能直感動血輪。使其紅血輪收養氣之性減小。又能阻止其白血輪自變之動。而白血輪伸長之性。大約恃此動法。如微絲血管放鬆幾至血不流通之界限。則白血輪易於衝過微絲血管。轉鬆之質。余想規尼涅能阻止白血輪行過微絲血管之故。非徑能改變血輪之形性。而因能補其微絲血管之內面也。又想瘧與脾脹大病。能爲規尼涅所治之故。必因微絲血管受此補性。遂能減其聚血之事。並非因阻止白血輪之動。遂能治其病也。德國木城之賓斯亦設一理。指明規尼涅能治瘧疾之故。雖不能全合於理。而既有此說。當爲根基。望以後有人能推論更詳。其說曰。規尼涅遇下等之動物。如水內微蟲等。所顯之藥性。與感動白血輪所顯之藥性。大同小異。能令白血輪似有癱瘓。不能自動。所以治惡地氣害身之病。無論病之根源。爲生物質。或爲他物質。俱能徑感動其病之根源。其治病之法。不藉神經而知之。又人得規尼涅病。所有頭眩耳鳴。常欲睡。而不能睡等證。或因腸管內血有不足之故。又地氣害人。所顯惹身體之物。遇規尼涅。則因其有減腐爛之性。能令惡質似有癱瘓。故如有瘧疾。則能在脾內血管間。阻止其血輪發

生。如此減脾之力。令其所發之血更少。因此令脾漸縮而復原云云。

又有一事必推論之。卽多服規尼涅而得規尼涅病所顯之證。如頭痛。發狂。耳聾。眼盲。四事從何而來。爲何緣故。前曾言此各證顯出時。血行之速與血管之大小。俱無改變處。又如查驗曰血輪。遇規尼涅所受之感動。各人之意見不同。但言能令其血輪似有癰瘍病。則前所言顯出之證。可藉此故而知之。或又謂此不足成此各證。而以爲規尼涅能改變或混亂紅血輪收受養氣之職司。故令人頭痛。或頭暉。或發狂。而減小各處自有之知覺。與規尼涅病所顯之證。彼此適相對。然有一事。亦是不同。如減小血收養氣之職司。則溺中所有尿酸。必遠加增。而以規尼涅論之。則溺中減其尿酸之數。化學家蘭克。可那。拉布化。俱。溺中由里酸大爲減少。可那云。一次服雞那霜三十八粒。則溺中之由里酸。減少至原數之五分之一。而其由里阿煥<sup>五</sup>減去四分之一。又服過規尼涅。因此減身之熱度。此事尙未有人查明。故他醫士所言雞那能減小血收養氣之職司。因其試驗之法未精。故其理不能以爲必真。若以爲規尼涅病。因藥性感動神經之質。然服規尼涅。收入血中而消化。存於血內。在各津液內顯出。而由內腎漸次逐出。或不改變。或少改變。但其質變爲不成顆粒形之狀。可見神經之質。遇規尼涅徑顯

之力亦無相對之據。或以爲規尼涅病因能感動神經之微細水泡形質。遂疑規尼涅之中量有收斂性。令神經所顯者行動更緩而力量更大。用其大量則阻礙神經之當職。間或隔絕之。以令人眼盲耳聾爲其效。依此理而言之。則能明規尼涅治病之法。如諸神經放鬆。而神經之微細水泡形質亦軟而鬆。通過神經之力。或有痛。或不平。匀果如此。則規尼涅之補性。與金雀那樹皮錢在放鬆內皮質所顯藥性爲同類者。

規尼涅爲藥之用。不惟在瘧疾內有特治之功。尙可作爲植物補藥之模。即如身軟無論爲一處之軟。或全身之軟。如胃吐清水。或消化無力。或流白濁。或膀胱生炎等。俱能爲有益之補藥。所以不必查規尼涅能有益於何種一處。或全身之軟病。又必查其病人能當此藥與否。因身體極弱者。服規尼涅常有嘔與頭痛。或胃易惹動。或便秘。則規尼涅常有病人不能當之故。必用其最小之量。或必待消化之力已加大能當而後用之。在血有毒之發熱。則規尼涅爲最可貴之藥。如食一大量。即十釐至二十釐。則常能減數種發熱病之力。如腸發熱產婦發熱赤白痢。血有膿發熱是也。在風溼發熱。可合於鹹類藥服之。又如瘧疾與各種依時而作之發熱。無論何種。則規尼涅爲特治之藥。惟量數必須足用。即八釐至二十釐。而應在瘧疾來時之前。約十二小時服之。則其

功力為最大。如屢用其小量，則尋常不能治此病。又如依時而作之發熱，每二十四小時用三十釐至五十釐為一服，亦能治其重者。又如作為預防瘧疾之藥，則其功力最大，而無可疑之據。一日之內，以三釐至五釐為一服，或間日服之。依其地氣中惡氣之輕重而定。又如神經痛，尼涅為最有功力之藥，可用其大量，如同時有瘡疾，或面神經痛，其功力亦最大。各國之醫，幾全用規尼涅一質，而不理會金雞那樹皮內所含之他質，故此各種有益之質，隱而不彰也。

## 第六章 防腐劑

●石炭酸 Carbolic acid 舊譯作加布力克酸、又作架波臣酸、一作加播  
利酸

此藥之原語曰 Carbolic，在防腐藥中占最重要之位置。其功用亦甚廣，具特殊之臭氣，其味如燒，為細長無色之結晶塊，經時則帶微紅色。於十五分至二十分之水中，與不論多寡之酒精，依酌兒、瀝里、設林等俱能溶解。以二十倍以上希濃者之石炭酸溶液，注於皮膚，隨竈燬灼燬均著如燒之謂，特甚而發白斑。未幾即變紅色，二三日後表皮剝脫。若溶

液較濃則蝕至深部而患知覺失脫。內服少量之濃厚石炭酸，腦髓及神識上俱起麻痺作用，甚或瀕於危篤，故為劇藥。常人無醫學知識，其溶液非二十倍以上者，必不可售與之。其效並罕供內用，惟祛尿病等間服極少之量。若外用者，則不可殫述矣。紀元一千八百六十七年，有里新帖耳（Lister）者，倡論防腐的療法，惟應用此藥最優。於是乃盛行於世。近日行外科手術者，殆舍此莫屬也。於種種之外傷及手術創，則以之洗滌。於粘膜起膿性、腐蝕性分泌物，如寶扶的里、氣管枝炎、白帶下、淋病等症，則以之含漱。注射或塗布，蓋其目的在腐蝕、刺殺及限制分泌也。於各種皮膚病，如白癬、癰風、火傷、凍瘡等症，則以之塗布，或製為軟膏塗擦。於急性關節腫脹質斯丹毒、骨炎、腺腫等症，則以之注射。於齶齒，則用純品。他若醫者之手，及器械，以之洗滌接觸傳染病毒，或不能無疑之家宅、病室、屍室、廁廁、溝渠、排泄物等者，謂之排泄物等，以之消毒。但用於廁廁、溝渠、排泄物者，可用粗製石炭酸，（俗名滅臭藥水）其價較廉，用量內服〇·〇一至〇·〇五，宜製為丸劑。外用須二十倍（石炭酸五〇〇至百倍石炭酸一〇〇）之溶液。污物消毒，最少亦須五%，不然無效。

〔提要〕石炭酸為外科手術及傳染病毒之防腐消毒藥。

## ● 沃度仿謨 Jodufurm

即ヨウドホルム、舊譯作海模仿、又名黃碘、又名溴

多方

千八百六十二年攝羅噏司 Serr-Lé 始發見此藥。千八百七十九年里斯帖耳認為最可恃之防腐藥。自茲以降。迭著奇效。此藥為黃色之粉末。稍帶結晶形。具一種強烈之臭。水難溶解。惟酒精及依的士易溶解之。效能與石炭酸同。內服〇.〇五至〇.一之少量。亦覺頭痛。食慾缺乏。心臟之動悸。加高顏面生面皰狀物。服稍大量。則身體倦怠。心部疼痛。兼患下病。故供內用者極少。昔人用〇.〇二至〇.〇五。一日數次。治腺病。結核。糖尿病等。今已無人用之外。用消毒不如石炭酸之迅速。靜以俟之。則有效。故外科醫於用石炭酸洗凊之後。皆撒布此藥。而施綑帶。更歷述其效能如下。  
(一)保護一切之瘡傷。令必不陷於腐敗。且促其治愈。以此恒用於骨折骨疽之切斷面。火傷。化膿之下疳。及橫痃。  
(二)用以消散瘰疬。瘻癰。微毒性腺腫。關節睾丸之腫脹等。  
(三)用於化脓性之耳病。眼病等。  
(四)用於肛門之裂傷。痔疾。淋病等。  
(五)用於鼻加答兒。臭鼻。咽喉喉頸之潰瘍等。  
(六)用於婦人科之病。如子宮口糜爛。乳嘴潰瘍。陰門炎。陰門溼疹等。  
(七)用於結核性關節炎。及手術難施之部。以此藥一〇依

的兒阿列布油各七〇。溫和注射之。其自（一）至（六）則或爲粉末撒布或溶解於酒精及偏里設杯而用之。或和二十倍之單軟膏供塗擦之用。

〔提要〕凡用石炭酸洗滌後之處置所用之藥無逾於沃度仿謨。

●「デルマトール」 Dermatol.

此藥爲黃色之粉末似沃度仿謨而無臭氣用之亦不發皮疹。功力雖遜於仿謨有代用者或撒布於創面潰瘍或爲軟膏<sup>單軟膏五〇〇「デルマトール」</sup>而塗擦於溼疹等之皮膚病。

〔提要〕患外科病者欲用無臭之藥則莫若「デルマトール」。

●硼酸

Boracic acid

舊譯作佈製<sup>又名硼養酸、一作硼砂酸、</sup>

此藥爲結晶之粉末似鱗屑有光澤冷水難溶沸水即溶殺菌防腐之力雖遠不如石炭酸及沃度仿謨而對於人體則爲最無害之物今世多用之舊說謂有鎮痙之效又胃中之腐敗物或如實扶的里之傳染病以〇·一至一〇爲粉劑或丸劑內服一日數次皆宜云今人則多供外用以其少毒性及刺戟性故或用於耳鼻之病及咽喉炎、膿炎等或爲口中之含漱劑或以之注射治淋疾白帶下或溶於酒精偏里設杯而以之塗布皮膚病或爲硼酸軟膏<sup>通常硼酸一〇〇而以之塗擦火傷擦傷破裂等眼科用</sup>

以洗取。尤爲唯一之藥品。設改用石炭酸水。則刺較較強。反不能達其目的。硼酸之效力大矣。用量爲二%至四%之溶液。

〔提要〕硼酸二十倍之溶液。可用以洗滌耳、目、鼻、口。

●安息香酸

Benzoin acid

舊譯作苯佐因酸。又名偏蘇以克酸。

此藥爲針狀之粉末。白色而有光澤。不易溶解於水。雖不無防腐殺菌之力。今則主爲祛痰劑。以是用安息香酸那篤爾謨。如高年、小兒、虛弱者。患氣管枝加答兒、及肺炎等。以〇、〇五至〇、五爲散劑。或丸劑。日服數次。外用爲防腐性繩帶料。或供注入尿道。及腫病之用。

●安息香酸那篤爾謨

Natrium Benzoatus

一名安息香酸曹達省

曰安膏。舊譯作偏蘇以克酸。

此藥爲無晶形之粉末。色白。易溶於水。貯入罐中。宜緊塞之。其效能。有用爲解熱。及制止酵劑者。殆未可信。蓋此等功用之良藥。不知凡幾。何必用安曹耶。然與攝惶瓦並用。爲小兒等之祛痰劑。則頗有解熱、防腐之效。用量。爲解熱及制止酵劑。則用五〇至一〇〇日服數次。爲祛痰劑。則用〇、五至一〇。亦日服數次。

【提要】安曹與攝涅瓦並服。能去老者及小兒等之癰。

● 結列阿曹篤

Kreosotum.

即クレオトート、舊譯作苦里亞蘇脫一作糞

阿蘇、又作蒸木油、

此藥因肉、Kreas 及保畜 Sol 而得斯名。爲半透明油狀之液體。具一種之臭氣。其味似燒。作用一如石炭酸。而防腐之力反優。毒性則較弱。故不供外用。而常內用。千八百三十五年後法蘭西醫者曾言此藥可供內用。惜不久此說即廢。至晚近德醫舜氏 vonmerbrot 又謂宜用於肺結核之慢性呼吸器病。諸家或減或否。迄今用之者尚多。或問此藥於肺結核究有效否。曰不知。但優於此者殆未之見也。其他又可用于嘔吐、下痢。如小兒之夏季下痢是也。外用治有寄生物之皮膚病。製爲軟膏。耳漏、臭鼻、腐敗性潰瘍等俱以之塗布。龋齒用純品或和唾嚙。以綿浸透。填入齒窩。亦每奏效。用量於肺結核每服〇、〇五。一日三次。漸增至一日一、〇至二、〇。即停止勿服。惟自始至終。最少須在半年以上。不然無效。然依余所經驗。則以久服此藥。初時頗增食慾。至後遂害消化。其對於結核無甚效力。徒爲胃病之原因而已。又對於嘔吐、下痢者。每服約〇、〇一。用法或爲丸劑。或爲酒精溶液。或盛入膠囊吞服。略述二三處方如下。

▲結列阿曹篤一、一 黃壙 甘草末各適宜

右爲丸六十三粒。一日三次。每食後三粒。此爲肺結核最初一週間之用量

▲結列阿曹篤〇、一五 酒精五、〇 檸皮舍利別一〇、〇〇〇 水一〇〇、〇  
右一日三次。每食後服。(同上)

▲結列阿曹篤〇、〇三 葱舍八、〇 桂皮水一〇〇、〇  
右混和。一日分三次服。治吐瀉病。

▲結列阿曹篤〇、五 水一〇〇、〇

右爲創面之洗滌料。

▲結列阿曹篤〇、五 薄荷丁幾一五、〇

右用綿花浸透貼置疼痛之齒。

近今醫者因炭酸結列阿曹篤臭味較少。又無刺戟作用。恒代用之。用量於肺結核。自一日一、〇始漸增至五、〇爲度。其他則一日量〇、二至一、〇。

[提要] 謂結列阿曹篤有效於肺病者。臆說也。以塗齶齒或有效耳。

●「グフヤコール」 Guajacolum

此藥為結列阿曹篤之主成分。有芳香之液體。無色，或微帶黃色。副作用少而效用多。故常以之代結列阿曹篤。為內服藥。治結核。用量自一日〇、〇五始。漸增至二、〇為度。用法或為丸劑。或溶於酒精為水劑。或盛入膠囊吞服。

▲「グワヤコール」〇、〇五 龍膽丁幾二、〇 酒精五、〇 單舍八、〇  
水一〇〇、〇

右一日分三次服。

近今醫者因炭酸「グワヤコール」無臭味且刺戟性少。恒代用之。用量自二次〇、二始漸增至一日四、〇為度。

[提要]「グワヤコール」之效能。雖未必確實可恃。然為治肺病之藥。則無足疑。

● 升汞

Corrosive Sublimate 一名過格魯兒汞。又名猛汞。舊譯作蠶蠶汞。

一作汞媒。二、又作白降丹。又名汞媒毒藥。

此藥為無色無臭之重粉末。以水十六分。沸水。酒精各三分。依的兒四分。始能溶解之。為腐蝕性最強烈之毒物。其消毒防腐之功最大。內服雖極少量亦必患口內炎及流涎症。食慾缺乏。起胃腸炎。服〇、〇一。起劇甚之嘔吐。下痢。服〇、一。則必死。故惟微毒。

有用○、○○五者。此外供內用者少。然其殺細小有機物之力則殊強。即二萬倍之溶液尚不失其功效。但普通多用二千倍。巴氏(Buchholz)曰。昇汞殺菌之力強於結列阿曹篤二十倍。強於石炭酸百倍。以是外用者頗多。歷述如下。(一)為微毒。橫痃之藥。患微毒性之口腔潰瘍。咽喉潰瘍。或橫痃塗布二百倍之濃厚液。(二)用以剝除實扶的里之義膜。塗布千倍之溶液頗有效。(三)為丹毒之藥。以昇汞○、○五。刺納林四五〇。華攝林五〇。為混合液。(四)用於皮膚之寄生物。混和百倍之華攝林。塗布其上。(五)用於齧口瘡。塗布千倍之溶液。(六)為結膜炎。初生兒眼炎。角膜潰瘍等之洗滌藥。用二千倍至三千倍或四五千倍之溶液。(七)用於微毒性皮疹。面皰。雀斑。夏日斑。黃斑等之皮膚病。其多少當臨時酌定。(八)用於淋疾。注射千倍之溶液。然舊說也。今廢。(九)用於微毒。以五〇溶解稀釋之。為全身浴湯。(十)用於陰囊。以二千倍之溶液頻頻塗布。二三日後必治。(十一)用以洗滌醫者之手。或消毒病室。及傳染病毒等。但不免危險。終不如用石炭酸水之為安全。昇汞為雀斑。母斑之妙藥。用之輒得奇效。記余經驗談一則。如次曰。在昔明治二十五年間。學校之講義錄。及他書中。每謂雀斑。母斑塗布二%昇汞水。可除去。惟愈後必

贊痕收縮。其醜尤甚於斑點云。今世青年男女聞此耳食之談。輒不禁怦怦欲動。期一試以爲快。而醫者及各藥肆。又往往大書廣告。遍載報章曰。有能除雀斑母斑。而復無瘢痕者。受上賞人無應之者。余至此。欲益實行余之理想矣。三十七年七月。岐阜縣人某見余所著書中。有可疑處。遽遠道來。踵門而告曰。縱遺留瘢痕。當亦無甚關係。三見三請。余乃恍然悟。遂姑試其驗否。初時塗布極危險之一%昇汞水。如故。明日復塗之。又如故。至三日。乃以綿紗浸入二%昇汞水。取出。貼置母斑上。外加繃帶。閱二時。該部疼痛。如燒如刺。解帶視之。皮色已變赤矣。又閱數時。更發水痘。如遭極重之火傷。余乃用針刺破水痘。泄出其水。塗布亞鉛華軟膏。仍施繃帶。每日更換。余此時恐還有瘢痕。中心猶惴惴也。閱二週間。母斑變薄。在在有除退之處。且無瘢痕。余喜極欲狂。又閱二週間。用其尤薄者。更塗布如前。先後凡四次。昔日之醜婦。今日居然佳人矣。余於是竭力鼓吹。並著衛生小說一冊。命其名曰半面美人。後又有乞余治療者。約四五人。皆得良好之成績。茲更述簡捷之法。以告患者。法用單綿紗浸入二%昇汞水中。微絞。取出。置於雀斑母斑上。外覆油紙。並施繃帶。約四時去繃帶。刺破水痘。塗布亞鉛華軟膏。外覆亞麻仁油紙。並施繃帶。每日更換。輕者卽治不治。則閱二週間後。更反復爲之。惟

點置藥液綿紗之四時間內，無論如何痛苦，須堅忍之。

〔提要〕昇汞善治母癰、雀斑及其他皮膚病。

〔注意〕塗布昇汞之部分廣大，則必中毒，不可不知。

## 第十七章 收斂劑

凡能收縮組織部分之間隙，而驅逐其液體，限制或抑止剩餘之分泌物，祛除局部之種種障礙，使身體之組織強固者，皆謂之收斂劑。

### ■ 大硝酸蒼鉛

Subnitrate of Bismuth 一作鹽基性硝酸蒼鉛，省曰硝

蒼、鷺等作下硝酸鉛，又作錫銠淡青五

此藥為細而重之粉末，色白，無臭味。小兒服之極宜。惟難溶於水，尋常多製為振盪合劑。入藥於水混和而用然後服之。其效能為保護腸胃，令其收斂。胃病如消化不良，醣酵物，炎症，嘔吐等皆用之。於胃潰瘍尤效。腸病如潰瘍的下痢，腐敗性下痢，小兒吐瀉病等皆用之。其第一作用則為直接減少腸之刺戟，防護腸粘膜糜爛之部。較之施於胃病者，其效益多。脫罕氏 Tschubé 曰：有腸胃病者，服此藥，則如黝黑然，無覺隙，無滲漏。

或謂硝蒼無確效。其有效者。因與莫比阿片。茛菪等特効品並用之故。非硝蒼之力也。設用其純品。則雖有效而甚微。答之曰。單用硝蒼而無效。必其分量太少所致。若一日服三〇至五〇毫克。屢著奇驗。余治重症腸加答兒及赤痢等。輒單用此藥。初時每服一瓦。一日五次。繼則每服二瓦。亦一日五次。病者用如此大量。往往立治。服時雖食慾稍減。其他則絕無障礙。實對症之特效藥也。惜藥價奇昂。一瓶三〇〇克。即一需銀五六角。名爲「一瓦貴」。則不滿二六〇。若日服一〇〇。即需一角。常人惜費。服之者甚少。醫者雖肯用多量。而藥肆每特造類似者售之。以貪法外之利。首有大阪之病院長某。治一患赤痢者。令一日服硝蒼一〇〇。逾日病轉劇。院長詫訝。反覆推求。不得其故。卒取硝蒼試驗。則其作用適與硝蒼反對也。於是大悟。亟令改服最佳之硝蒼。無何遂愈。奸商蔑棄公德。於此可見。

此外有以收斂之目的。爲振盪合劑。以一%至三%之溶液。供注射淋病之用者。余則以爲不如酸化亞鐵。又有製爲軟膏。軟膏五〇單用於皮膚病者。亦無大效。

〔提要〕患下痢者。服硝蒼一瓦。一日五次。其效如神。

●單寧酸 Acidum tanicin 一名鞣酸。舊譯作炭匯酸。

此藥亦爲粉末，色白而微黃，味甚清，効能爲收斂，止血。如下痢、內臟出血、胃腸出血、子宮出血等；白帶下、膀胱加答兒及金屬性之中毒等，均利用之。爲散劑、丸劑、水劑，皆可用。量一次〇、〇五至〇、五日服數次，然服〇、〇五則力弱而效微，服〇、五則害胃之消化，而大減食慾，不可不知。但寒大出血等病者如服此藥，仍當如上之分量。外用治鼻出血、鼻加答兒、白帶下、淋病等，用五十倍至二百倍之溶液，又製爲單鹽酸軟膏，單鹽酸四五〇、單鹽酸四五〇、單鹽酸四五〇，治腋臭，頻塗擦數月可愈。

▲單鹽酸〇、三 含糖百弗半〇、〇 白糖適宜

右分三包，一日三次，每服一包，治下痢。

▲單鹽酸一〇 三百倍石炭酸水二〇〇〇〇

右注射用，治白帶下、淋病。

常人內服此藥，莫如用單鹽酸錠，較爲便利。單鹽酸錠者，單鹽酸五分，白糖九十五分。

徐徐研勻，製爲錠劑，每一錠中含有單鹽酸〇、〇五，如服〇、一，則用二錠。

〔提要〕單鹽酸，用於下痢、出血、白帶下、腋臭、淋病、鼻加答兒等。

案：錠劑似丸藥，大而扁，以其他結合藥與白糖混相製成，重量約一〇。

●阿仙藥

Cat's Claw.

舊譯作兒茶、一作孩兒茶。

此藥自一種植物之枝葉製造而成。該植物產於印度、蘇門答臘、新嘉坡各地，亦為收斂劑。效力甚遲，遠不及硝芥、單寧酸等。但其價較廉，且無中毒之虞，故於慢性下病、膀胱加答兒等病者，至今猶用之。用量每服〇·五至一·五，一日三次，為丸劑，然不如丁幾之為便。

●阿仙藥丁幾

Tincture of Cat's Claw.

舊譯作兒茶酒。

此丁幾，以阿仙藥末一分，酒精五分，同入一器，冷浸五日，濾過而成為暗褐色之液體。用量一次約一·〇至二·〇。

▲阿仙藥丁幾五·〇 亞拉里亞謨藥五〇·〇 單舍八·〇 水五〇·〇  
右一日分三次服。

〔提要〕患慢性下痢、膀胱加答兒等病者，可試服阿仙藥。

●醋酸鉛

Acetate of Lead.

一名鉛堿，舊譯作鉛堿，又作醋酸鉛。

此藥為白色結晶性之塊，其臭似醋，易溶於水，內服少量，味甘而口覺乾燥，若連服之，則阻止胃腸粘膜之分泌，害消化而致便秘，服至十五以上之大量，則發急性中毒，頭

痛、眩晕、沈沈昏睡時或衰弱、知覺失脫、甚至麻痺。如是者約數日即死、不死亦必懨慢性中毒症。輕體羸瘦、容顏頹頓、肌膚枯燥、消化不良、每起便秘、齒齦鬆懈、呼氣帶臭、又或發生疝痛。疝痛者為病也知覺鈍麻、無恢復時、危害如此。故為劇藥、然能適當用之、則効能亦大。昔有用其大量、治肺炎、肺結炎、僂麻質斯等症者、今人則用於肺出血、腸出血等。以此藥少量與阿片混和為散劑、丸劑、水劑等而服之、又有用於下痢、氣管枝加答兒、肺結核之咯痰過多、盜汗、或兼咳嗽等症、亦服少量。外用範圍尤廣、於分泌過多之潰瘍、及鼻汁過多等、則為溶液塗布之於耳腔內、子宮等、則用以撒入於扁桃腺、口腔炎、則為含漱劑。於淚液過多症、則為點眼藥。於外傷、則為冷罨法、或洗滌劑。於皮膚燒裂、表皮剝脫等、則製為軟膏。類似擦用量、依日本藥局方日本藥局方造之委員所制定關於藥物之規則、內用則一次〇、一、二日〇、五普通則一次〇、〇二至〇、〇五、一日〇、〇五至〇、二、外用宜為 $1\%$ 之溶液、含漱劑宜〇、五%之溶液、點眼藥宜〇、〇五%之稀薄液、撒入及注射用宜〇、一至〇、五%之溶液、各視其部分與病之輕重、而隨時增減。

**[提要]** 鉛糖治下痢、出血、咳嗽、盜汗等症。又供點眼、罨法之用。

●硫酸亞鉛 Sulphate of Zinc. 一作皓粉、俗譯作礦強錫、又名錫粉、又

名錫礦粉、又名錫鋅。

此亦劇藥也。爲無色結晶形之物。水能溶解。酒精不能溶解。以其溶液塗布於健全之皮膚。雖無異狀。然在潰瘍面、創面及健全粘膜。則呈腐蝕作用。稀薄之液。有限制分泌物、強固組織、阻止腐敗、除去惡臭之效。內服○.○一至○.○三之少量。無他症狀。連用。則全然減少。兼致便秘。服稍多量。則患腸加答兒。精神陷於遲鈍。若服○.一至○.四之大量。即起嘔吐。腹痛。下痢。更多則口腔粘膜變赤。爲白收縮而生皺襞。患極重之吐瀉。服七○至八○之最大量。則呈劇烈之症狀。全身衰弱。呼吸困難。數時即死。不可救藥。常人如用此藥。宜特注意。但醫者即因其有此等作用。利用之以奏種種之效。詳記如左。

皓粉。自昔以之爲鎮靜藥。治癲癇、比斯的里、眩晕、神經痛等。今乃知其有害無益。廢而不用。昔又用於消化器呼吸器分泌過多之加答兒症。今則因新藥廣續發現。用之者少。惟於誤食毒物者。可用爲催吐劑。然猶害胃。不如硫酸銅之優。是內服無效可知。外用則反此。能奏種種之奇效。而於眼科尤著。可爲諸藥之王。彼患眼瞼結膜之急性慢

性加答兒、初生兒眼炎、角膜潤漏、顆粒性結膜炎（即篤拉保謨トラホーム）淚液分泌過多等眼病。而又僻居山陬，無眼科醫為之診治者，通例可先以一%之碘酸水洗滌，後用○.二-%皓礬水為點眼藥。其他如鼻粘膜之分泌過多、及耳漏等，則用五十倍至二百倍之溶液塗布或注射之。出血性潰瘍、粘膜糜爛等塗布二十倍之濃厚液。淋病，注射五百倍至千倍之溶液。膀胱出血、腫及子宮之粘液漏等，注射百倍至千倍之溶液。口、鼻、咽喉之粘膜病為百倍至二百倍之含漱水。用量，依日本藥局方之極量，一次○.○六一日○.三。外用者，如前所述，更舉一二三處方，以資觀覽。

▲硫酸亞鉛○.○二 水○.○○

右一日數次，每次以三滴點眼。習之既久，則漸加至○.○三或○.○五。

▲硫酸亞鉛○.一至○.五 水○.○○

右注射用治淋病。

▲硫酸亞鉛一〇 水一〇〇〇〇

右塗布用治分泌物過多。

〔提要〕患迎風流淚等症，以皓礬水點之，立效。

●酸化亞鉛

Oxide of Bismuth.

一名亞鉛華、舊譯作銀華。

此藥為白色之粉末。無味。無臭。不溶解於水。撒布於健全之皮膚。無他變化。在粘膜上。則呈乾燥收斂之作用。內服藥用量二三次。雖無障礙。反覆用之。則害消化而起便秘。服至〇、四以上之大量。則恶心。嘔吐。停止勿服。則症狀全消。故不為劇藥。往古用為鎮癆藥。治癩癩。偏頭痛等症。今知其為無效。或以此為溫和之收斂劑。可治胃腸加答兒。然不如用硝青為佳。外用。則為最寶貴之藥。塗於剝脫之皮部。能防腐而促治愈。又無刺戟。及中毒之虞。故為最良。用於擦傷。皮疹。蟬裂。乳嘴疵。慢性潰瘍。鼻咽頭尿道生殖器等糜爛。及分泌過多。非各症亦皆有效。又為眼科需用之品。治結膜炎。角膜斑點等。患汗疹者。撒布此藥。可即治愈。以治漆卞布薑(カブレ)。皮膚受刺戟而生如粟粒之瘡。沃度仿誤卞布薑等尤妙。用量。內服一次〇、〇五至〇、三。然無價値。前既言之矣。外用。可任意撒布。惟撒布藥動易紛落。故又不如用亞鉛華軟膏。

●亞鉛華軟膏

Ointment of Oxide of Zinc.

舊譯作銀華油膏

酸化亞鉛一分。豚脂九分。調和裹之。即為軟膏。效能一如酸化亞鉛。而可任用多少。凡分泌物多量之糜爛部。或潰瘍部。無不可用之。日本甫經開業之醫生。閱歷未深。因處

觀亞鉛華軟膏而損其名譽者，恒有之。試舉軼事二則以告諸君。昔有某醫學士治一患者，病為無名之潰瘍，在額之一隅，糜爛面多分泌物。學士先以五十倍之石炭酸水洗拭，乃撤布沃度防護，覆紗紙，載亞麻仁油紙，而終施繃帶。詎意數日後，糜爛益廣，於是改用硼酸，或又以「デルタトール」代之。技窮卒不治。一日，患者偶告諸某藥肆主人，主人語之曰：塗亞鉛華軟膏，病可立治也。患者猶豫未決，姑試之。才四五日，患部乾燥矣。出告人曰：今而知醫者之妄也。又有醫學得某士某，診察一小兒，先是見患麻疹，病後皮膚落屑，似糠粃狀，無何結紅色之痂，久而不愈，遂乞學士治之。學士遍試諸方，瘡仍如故。卒乃撤布亞鉛華粉，而其家人恐仍為所誤，更受治於他醫。他醫亦授以亞鉛華軟膏，令如法塗拭之。嗚呼！使學士早用此藥，亦何至見疑於病家而讓美於他人耶。

〔提要〕皮膚潰爛而有分泌物者，須塗亞鉛華軟膏。

● 硫酸銅

Sulphate of Copper. 一名膽礬、舊譯作藍礬，又作硫酸銅，又

作銅礬粉。

此亦劇藥之一，為藍色之結晶物，能溶於水，而不溶於酒精，其效能亦多。往時用於神

經諸病爲鎮癱藥。又用於慢性下痢。爲收斂藥。今皆廢而不用。惟爲吐劑。則頗有奇效。患燐中毒者。以之製爲散劑。或水劑內服○二至○、五。不惟取效神速。且無吐根。吐酒石等。頻起恶心之患者。實催吐藥之最佳者也。以是盛行於世。外用一如皓礬。而無其穩妥。惟用於顆粒性結膜炎。(即トライホム) 則功用過之。鼻、咽、頭、尿道等頑固之粘膜病。亦可以此濃厚之溶液塗布。注射。或爲坐藥。以腐蝕之用量。依日本藥局方之標準。內用。一次○、一二日○。四催吐。一次一○。塗布○、二%。點眼○、一至○、五%。注射○、二至○、五%。其處方如左。

▲硫酸銅○、三 舉舍五、○ 水三○、○

右於中毒時頓服。頓服無效宜於五分或十次

▲硫酸銅○、二 水一○○、○

右塗布用。

▲硫酸銅○、○二 蒸餽水一○、○

右點眼用。治顆粒性結膜炎。(トライホム) 結膜炎等。

【提要】硫酸銅雖水不及皓礬。而可爲吐劑。收斂劑。點眼藥等。

## 硝酸銀 Nitrate of Silver.

舊譯作銀丹、又名硝彈銀、又名銀養淡三文

名銀養淡卷五

此亦劇藥。與硫酸銅等相似。日本藥局方中恒採用結晶硝酸銀為無色之結晶物。易溶於水。有為光線起作用之性。故宜貯入黑色瓶中。塗於健全之皮膚。亦變為白色。知覺稍稍鈍遲。其變白色之部。因光線之感應未幾。又成黑色。收縮而微生皺襞。內服○。一至○。三之少量。頭微覺苦辣。連服則胃部溫熱。食慾缺乏。恶心嘔吐。內服○。一至○。二之大量。則腐蝕胃粘膜。發劇甚之胃炎而死。論其効能。昔常用於下痢。胃潰瘍。脊髓病等症。內服○。五至○。二。一日二三次。近人用之者漸少。外用。則範圍殊廣。如質軟的里。肉芽贊殖。壞疽。分泌物過多。顆粒性結膜炎。(トロホーム)鼻茸。凍瘡。疖。橫痃。黴毒性潰瘍。痔核等。塗布 $\frac{2}{10}\%$ 瓦水 $\frac{1}{10}$ 瓦銀 $\frac{1}{2}$ 之濃厚溶液。飄著。奇效。如初生兒眼炎。化膿性外耳炎。咽喉及喉頭加答兒。生殖器加答兒。尿道疾患膀胱加答兒。白帶下。慢性腫炎等。當先以二千倍至三千倍之溶液塗布。或注射之。後再注射十倍之食鹽水。如慢性下痢。赤痢等。以五百倍溶液五○。○灌腸。往往治愈。此外又為染白髮之藥。能與天然之黑髮無異。惟續生者仍白。必須再塗布之。法先用石鹼。

水洗滌清潔，續換微溫湯洗之。俟乾，以毛刷蘸取藥液，浸食子殼一、〇〇，自髮之根部至於末端，以次遍塗。俟乾，乃用硝酸銀等藥液塗布其處，方如左。

▲ 硝酸銀二、〇 蒸餾水一五〇、〇 安母紐謨液適宜

右塗布用如用北漆過多致皮膚亦染成黑色，以沃度加里一、〇〇水三〇、〇混爲溶液洗之，其色即褪。

〔提要〕患類紅性結膜炎，橫痃，微毒，鼻茸，白髮者，盍一試硝酸銀之功效。

● 蔊酸攝留謨

Oxaloid of Oerium

即葛酸セリウム、舊譯作惡西鐵、

又作草酸鉛、

亦列入劇藥之中，爲白色之粉末。水與酒精，皆不能溶解之。其生理的作用及効能，大抵似硝青所異者，欠溫和耳。然有鎮吐之作用，故用之於胃腸加答兒，每有非常之功。聖氏 Simpson 諺謂此藥爲妊娠嘔吐之妙劑，是其能鎮靜頑固之嘔吐，可勿疑也。三伏之中，宜人備一嚢，以防不測。用量，依日本藥局方之檢量，一次〇、二二日一、〇，通常則一次〇、〇五至〇、一。

〔提要〕嘔吐之際，速服葛酸攝留謨〇、〇五，立止。

● 明礬

Potassa Alumina.

舊譯作白堊，又作礬涅蘇羅、

此藥爲白色之粉末。味微甘而甚澀。酒精不溶。入水則徐徐溶解。內服治下痢。爲小兒之嘔吐劑。效能遠不及他藥。外用則爲古今漢醫洋醫所篤信。如子宮粘液漏、分娩後之收縮不全、淋病、白帶下、腋臭、潰瘍、面、耳腔、鼻腔、喉頭等之分泌物過多或潰爛、創血、足背汗多等症。撒布粉末或爲溶液以塗布、注射、含漱。頗得良美之成績。用量：內服一次〇、一至〇、五外用自十倍百倍至五百倍不等。視病症之如何而權宜之。其他尙有功用。茲畧述如左。

(一) 明礬有能沈降水中不潔物之性質。凡飲料水混濁者。投明礬少許攪之。則澄清透澈。衛生上當應用之。

(二) 有以明礬溶液用於交接之後者。茲先述某博士之言曰：男女之交接也。有由於交接慾者。有由於生殖慾者。由於生殖慾者。其目的全在嗣續。可置弗論。其由於交接慾者。因家道儉盜。有數子。於願已足。苟子女繁多。不遑盡力教育。他日反爲門庭之玷。則不如不生。但不能斬斷情根。永絕肉慾。爲可憐耳。蓋既爲道德上法律上所公認之夫婦。則斷非寄寢可比。人且莫得而禁之。而況於己乎。彼之異榻而寢。或獨居一室。以示後弗爾爾者。特聊自解嘲耳。苟非大有力者。恐能堅持不懈耶。無已。則惟有用如意。

袋以避妊娠一法。某醫士既然其言而更爲進一說曰。如意袋者。嵌於陰莖。妨害莖蒂後腺(日名「コーベル」氏腺)所分泌之液體。既殺男子之快美。兼傷女子之粘膜。余意不如用五十倍之明礬水。房事後即注射腔中。且淨拭之。如此則精蟲盡死。且可防廯。及豫防子宮加答兒等云云。余則以爲一旦吸收之精液。未必果死於礬水。縱或能致於死。亦不足以爲訓。何則。男女當生育之年。而又爲健康之體。則萬無不育之理。未妊之前。拒之惟恐不力。及其既生。則又愛之惟恐不深。保之惟恐不盡。人情大抵然也。况家庭多一子女。卽邦國多一臣民。異日爲家族爭光。爲社會創業。爲國家效用。胥於是乎賴之。又奚必以區區礬水。故殺之於胚種。未成前耶。諸君乎。慎母爲亂言所惑。而爲此無意識之事也。不納余言。必有大咎。

〔提要〕 分泌過多之症。宜塗布明礬水。澄清濁水。亦惟此爲最效。

●骨辨波拔爾撒謨  
*Copraivabalsam* 舊譯作哥拜把。

此藥爲一種木本植物樹生南美洲之樹脂。斫其幹。則流出爲淡黃色之溶液。酒精、依的兒。能全溶解。遇水不溶。效能爲殺蟲。及限制分泌。然已屬舊說。今人但供淋病之用。惟內服無迅速之效。連用則妨害消化。兼患頭痛、鬱血等症。若製爲坐藥。骨辨波拔爾撒謨  
黃蠟柯柯阿脂各

等分成和製或注射尿道內，則甚宜。注射用者以本品五〇和入炭酸那篤撒謨二〇水一〇〇〇內用量，每次〇·五至一〇為丸劑，或盛入膠囊服之。一日三次。骨溝波膠囊藥肆中有出售者，每一膠囊約入骨溝波〇·五，可徑購之。如用丸劑，則當從左之處方。

▲骨溝波拔爾撒謨一、五 藥澄加三〇 黃蠅適宜

右為丸三十粒，每服十粒，一日三次。

〔提要〕骨溝波拔爾撒謨，惟用於淋病最妙。

●華澄茄 Cudobs. 葡譯作印度草澄茄

此藥為一種植物未熟之果實，色黑褐，有芳香，其効能有謂宜於實扶的，然不足特。惟與骨溝波拔爾撒謨相合，製為丸劑，以治淋病頗有利益。用量一次一〇至二〇，一日三次。為散劑、丸劑、錠劑皆可。

〔提要〕華澄茄末與拔爾撒謨皆為淋病之妙藥，二者効力相侔，故不取乎彼必取乎此。

●水醋酸 Glacial Acetic Acid 一名強醋酸，省曰冰醋，舊譯作冰醋強酸。

此藥為澄明無色之液體。有劇烈之酸臭。水、酒精、依的兒皆易混和之。其效能有二。一為腐蝕藥。患生雞眼、疣、瘻及毒蛇咬傷者。宜塗布純品。二為興奮劑。於卒倒、及人事不省之際。令鼻吸之。以俟醫至。亦應急之要品也。此藥專供外用。無內服者。

氷醋本不應列入收斂劑中。以其有腐蝕之功。故錄之。

〔提要〕氷醋能腐蝕雞眼、疣、瘻、毒蛇咬傷部卒倒者。嗅之立蘇。

● 格魯兒酸加偏誤

Helin's Chloroform

一名鹽酸加里。又名鹽素精。

加偏誤者曰古列。又作氯綠素。

此亦劇藥之一種。為細小之結晶物。無色而有光澤。易溶於溫湯。其效能有謂可用於實扶的里。膀胱加答兒、痛風、神經痛等症。然無大效。惟姪婦嘔吐。服此立止。是其長也。余曾實驗之外用。則為防腐。能收斂。其效頗鉅。鼻腔潰瘍、子宮潰瘍、白帶下、淋病等。以二%至四%之溶液。注射或洗滌之。皆得良好之結果。癌腫、鵝口瘡、齒齦炎等。口腔疾患。以三%溶液含漱。屢獲奇驗。因水銀中毒而起之口腔炎。治愈之藥。亦惟鹽剉為最。故凡施水銀療法者。服後即宜授此溶液含漱。以豫防之。用量一次〇、一至〇、五一至〇、四〇外用。為二%至四%之溶液。如前所述。

鹽剝又用爲燥發藥。故販此者有嚴密之管理規則。常人用以治療各病。不如徑購格魯兒酸加僧謨錠。較爲穩妥。錠劑者。本品十分白糖九十分。混和製之。每一錠中含有格魯兒酸加僧謨○。一。

〔提提〕爲含漱劑治口腔諸病。他藥雖多。究無遠於鹽剝者。

## 第八章 下劑

### ●瀉利鹽

Sulphate of Magnesium.

一名硫酸鎂。即硫酸镁。

グアシユム、一名含利鹽、一名硫酸苦土。省曰硫酸、舊譯作礦強鎂、又作鎂錠。蓋外俗名洋朴硝、

此爲普通之藥。人皆知之。爲無色細小之結晶物。味苛烈而苦。沸水能溶解。酒精殆不能溶。效能宜用於慢性便秘。慢性胃炎。及原因於心臟腎臟肺臟之水腫與夫腦充血。急性漿液膜炎等症。而欲其下泄者。然近時醫家多用之於濕性腳氣之初期。此藥長時服用。必連續下泄。食慾漸減。身體之脂肪亦少。體重因而減輕。若連服如故。則全身衰弱。兼誘發慢性腸加答兒。體力難於恢復。余意脚氣水腫等症。如用此藥。祇可

連服五日。又五日停止勿服。又五日再服之。如此二三次乃止。斷不可連服至一週間以上。曩余曾見一人患濕性脚氣。有告以瀉利鹽之效者。遽信之。連服三月。彼固雄偉肥滿之人。至後則瘦骨峻嶒。顧影而自憐矣。年餘始全恢復。倘脆弱者服之。其不死亡者幾希。可不慎歟。用量一日一五〇至三〇〇。其味惡故必和稀鹽酸。單含而後可服之。處方如左。

▲瀉利鹽一五〇 稀鹽酸一〇〇 單含一五〇 溫水一〇〇〇

右一日分三次服。

[提要] 患慢性便秘。胃加答兒、水腫等症。取瀉利鹽連服二日。或三四日有效。

●硫酸那篤僧謨 Glauber Salt 一名芒硝、又名硫酸曹達、舊譯作礦強  
鹽、又名土朴硝、又名鈉三磷酸四鉀元明粉。

此藥之形狀、色味、効能、用量一如瀉利鹽。從前漢醫家每與大黃並用。為重要之下劑。然功力不及瀉利鹽。而害且過之。故無採用者矣。

●蓖麻子油 Castor Oil 一名摩子油

此藥自蓖麻之種子壓搾而得。為一種之脂肪。色微黃。具特殊之臭。水、酒精俱易溶解。

效龍為最優之緩下劑。服一二次，則大便暢利，且無腹痛之害。故患赤痢，或腸加答兒者，先服本品一二次，盡下宿糞，再進收斂劑以治療之。今醫家多守此法。下劑之種類雖多，然或因臭惡而催嘔吐，或連服而害胃之消化，其服至一二次，而能無害如此藥者，殆不數數見也。用量，頓服一五〇至二二〇，在五時內必能達其目的，但須領注於極濃之茶，或赤葡萄酒中，而攪和之。一氣服下，則服後尙覺有茶酒餘味，渾忘藥之惡臭矣。又有人用以灌腸者，然不如用佩里設林。

〔提提〕頓服蓖麻子油一二次，能通利大便。

帶人人工兒爾斯泉

*Sel Carolinum factitium.*

名曰人加兒

此藥為白色之粉末，易溶於水，亦為善良之緩下劑。患便秘，臟充血，慢性胃加答兒，黃疸，胃潰瘍，胃擴張等症，連服二週間，有殊效。於胃潰瘍尤為必要之妙藥。余嘗屢試屢驗，百不一爽。惟藥味鹹辛，頗難服。此其缺點耳。故用於胃潰瘍者，服後必嘔吐。若不嘔，必棄而未服也。曩余曾治一人，令服此藥，病者曰：此藥難服，吾誠畏之。且服而嘔，何益於吾病？請易他藥。余曰：子之病，舍此別無他藥。夫死實可懼，吐則何懼？子姑忍之。三週間後，必有效也。至期宿疾果瘳，乃謝余曰：良藥苦口，利於病。信然。其用於胃擴張者，則

於服他藥後。以此洗淋胃臟。亦著奇驗。惟患胃腸炎。及衰弱者。均忌用。此外更有與抱水格魯拉兒並用者。詳見第九章。用量。一次五〇至一〇〇。溶於五〇〇至一〇〇。

○之水中。空心時服之。一日量者。處方如左。

▲人工加兒爾斯泉鹽一五〇。水二〇〇。〇

右一日分三次。每食前服。

▲人工加兒爾斯泉鹽五〇至一〇〇。水六〇。〇

右早晨空心時頓服。

若因臭味苦烈。實難咽下。可以和入單含。其多寡一視木品。另器置生卵一枚。服藥後。速取生卵吞嚥。再用冷水徐徐含漱。則絕無惡臭矣。余之實驗如此。

〔提要〕人加兒。治胃潰瘍。便祕。黃疸。胃擴張。膳充血等症。

●蘆薈

Also:

此藥係取一種植物之津液。煎製而成。爲暗褐色之塊。碎之即爲粉末。味殊苦。尋常多製爲丸劑。其效能可爲下劑。兼通月經。服少量。則爲健胃劑。故欲久服下劑。惟此不害消化。不致下痢。用量。爲下劑。及治月經閉止。用〇、二致一〇。爲健胃劑。用〇、〇一。

至〇〇五可免腹痛。

●蘆薈藥刺巴丸 Pilule Aloeset Jalapae.

此藥以蘆薈末、藥刺巴石驗、甘草末各等分，徐徐研和，製爲丸藥。每丸約重〇一錢，效能與蘆薈同。惟不宜爲用，量一次服二粒至四粒，每早晚各一次。

日本行用此藥由來已久，通經之効無人不知。然竟有因是誤認爲墮胎藥者。謂妊娠連服此藥必能墮落，不知非徒無效，且有大害。今之售通經藥者，其廣告中有曰：此藥能使滯留數月之月經，一旦通順，故妊娠者必不可服云云。此必不可服四字實有深意存乎其間。萬一欲墮胎者，常服此藥久之無效而來詰責，則可徐徐答之曰：廣告中固明明有妊娠者必不可服之語，君自不慎，若將安歸來者必語塞而去，不然危矣。

〔提要〕月經閉止，非蘆薈莫治。又可爲下劑、健胃劑。

●大黃 Rhubarb.

此藥以大黃之根莖製成，或爲浸劑，或爲散劑，効能爲下劑及健胃劑。但用以健胃，則僵於此者頗多。用爲下劑，若不與他藥並服，則亦無甚價值。昔漢醫家所用之大黃，服之，輒致裏急後重，腹痛亦頗甚，蓋製法處惡故也。今人購求此藥者，必明告之曰：局方

之大黃。乃可用量，一次〇、五至五、〇，一日數次。用以健胃者，一次〇、一至〇、五。略舉處方如左。

▲ 大黃末二、〇 甘草〇、二 白糖適宜

右分二包，一日二次，早晚一包。

▲ 大黃浸二〇、一五〇、一 重曹三、〇 單舍一〇、〇

右一日分三次服。

又有大黃丁幾，健胃一次二、〇至四、〇，下大黃越幾斯，健胃一次〇、一至二、〇，大黃越幾斯，健胃一次〇、一至二、〇，大黃舍一、〇，一五、〇至二、〇，三種功用皆同。

〔提要〕大黃少量，則爲健胃劑，服大量，則爲下劑。

● 小兒散

*Peltis infantum.*

一名苦土大黃散

此藥以炭酸麻僵涅曳誤（舊譯作炭養錢，一作鎂炭養）三分，大黃末二分，茴香油四分研和而成。瓶貯必須嚴密栓塞，其效能爲小兒之緩下劑及制酸劑。凡小兒患胃加答兒，遇多便祕，下痢等，皆宜服之。用量當依小兒之年齡而增減。但尋常所用，一次約〇、二三或二、〇，上此全由經驗而得者。

惟此藥須混和白糖。若用多量。輒覺不便。故如作下劑者。究以甘汞為佳。

〔提要〕小兒有患便秘。下痢。及胃加答兒者。宜令服小兒散○、一二至○、四或○、五。

### ●甘汞

〔名〕Gomme。一名亞格骨兒汞。又名カロメル。舊譯作氯綠汞。又作迦路

汞。又名水銀粉。

此劇藥也。為白色之粉末。而微帶黃。水、酒精、依的兒。皆不溶解。遇光線則起作用。宜收貯於有色瓶中。以阻其光。以此藥撒布於健全之皮膚。無甚作用。在剝脫之皮膚。及粘膜上。常留之。則呈收斂作用。除深吸入。而於全身起中毒症。與稀薄之昇汞無異。連服本品之極少量。則發口內炎。流涎等之中毒。服非常之大量。則恒起劇甚之胃腸炎而死。效能為溫和之微毒藥。及下劑。近人又用為利尿劑。蓋水銀劑之最重要者也。茲更詳晰言之。（一）為微毒之驟微劑。頗有效。如發口內炎。宜兼用三%鹽剝水。時時含漱。前人患微毒者。率服輕粉。往往發口內炎。此即未經含漱故也。（二）用於眼炎。及其他之炎症。（三）用於種種之傳染病。如赤痢。腸塞扶斯等之初期。以此為下劑。可利用之。以廓清腸管。兼能消毒。（四）用於單純之便秘。（五）用以驅除蛔蟲。每與殺蟲劑並用。（六）為利尿劑。用於因心臟病而發之水腫。但尿既通利。切勿再服。經

二週間再進。乃無妨害。(七)用於鼻茸、吳鼻等。以之撒布。(八)為小兒下劑。用於小兒之腦膜炎、霍亂等。以本品絕無臭味故也。連服數次極妙。但在無齒之小兒當特別注意。恐其吞生口內炎致不能哺乳也。用量驅微藥一次○.○二至○.○五。傳染病之下劑。初時一次○.五至一○.○二漸減至○.一或○.○五為度。便祕○.一至○.五驅除蛔蟲○.○三至○.一水腫大率○.二。

古者吾國伊勢所製之輕粉與甘汞實為同一性質之物。惟粗劣而劇毒遠不如甘汞之優長。服此者須明辨之。

〔提要〕甘汞之功用有三：一為微毒劑；二為下劑；三為利尿及其他炎症。

## 第九章 雜部

利尿劑、鎮咳劑、鎮痙劑等藥品。本宜詳言之於各章中。第失之太繁。學者不易卒讀。誠憾事也。爰擇最切要者摭擷之。列入雜部。其有觸損者。異日當續成之。

●水銀軟膏 Ointment of Mercury. 一名灰白水銀軟膏。一名灰白軟

膏。舊譯作汞油膏。又作汞藍油膏。

以水銀三十分、豚脂十八分、牛脂四十二分、混合而成。色灰而微青。塗擦皮膚數次。該部即呈紅色。漸發生小水泡。或痛或癢。此水泡曰水銀濕疹。塗擦大量。則呈汎發作用。全身蒙其影響。如口內炎。其一也。効能為消炎。凡微毒。淋巴腺炎。急性乳房炎。耳下腺炎等之未化膿者。塗之可愈。又善治頭風。陰風等。用於微毒者。以水銀軟膏二、〇。塗擦於左大腿。或右大腿。二日塗擦於左上膊。或右上膊。如前量。三日塗擦於胸側。四日入浴。塗擦石鹼而淨洗之。五日。又塗擦於左大腿。或右大腿。如第一次塗於右大腿則第二次塗於左大腿上膊亦如此反覆為之。一日量為二、〇。必須徐徐擦入毛孔。乃善。又治療之間。宜頻頻以鹽水含漱。免呈汎發作用。母忘母忽。曩余適道經某村野。有抱兒求治者。問。兄年幾何矣。曰。生後八九月也。問何病。曰。不能哺乳。姑視之。見兒發極甚之口內炎。復診察他部。見腿之一側。塗有水銀軟膏。余駭甚。淨拭而諦視之。該部係患生無名腫毒之赤色炎症。余乃由是追考。其塗擦水銀軟膏者。當欲使無名腫毒消炎之故。第不知有汎發作用。遂致發口內炎耳。余於是一面為治療口內炎。一面將所塗之水銀軟膏隨卽洗淨。該無名腫毒已化膿液。乃用五十倍石炭酸水洗滌消毒。撒布沃度防護而施綑帶。約二週間。病皆愈。由此觀之。外用之藥物。可不再三審慎耶。

〔提要〕微毒及種種之炎症與夫頭虱陰虱等非塗擦水銀軟膏莫治。

●攝涅瓦根 Senna 一作遠志根、舊譯作辛衣格、又名辛衣加、又名辛衣格蛇參、

此藥以一種植物於北美洲之根乾而製之。有謂攝涅瓦即中藥之遠志，不無謬誤。而於植物學上為同屬之植物，則可確信而無疑。先是北美土人為毒蛇咬傷，輒外用此藥，謂為有效。有甲醫者英人也，富研究思想，經驗久之，斷其可為利尿劑及通經藥。爾後醫家多應用之，絕無影響。於是又有乙醫悉心查察，而報告醫界曰：利尿、通經，不過偶然之結果，惟用以祛痰，則確有效力。經諸家迭次實驗，果然。自是遂專作祛痰劑。至今猶用之中有名潑結膏 (Poker) 者，言嘗親見有人服此藥而能增加其尿，然未能確實證明。其效能宜用於急性和慢性氣管炎，如答兒、肺炎之末期等。若氣管枝中蓄滯粘液，狀如分泌物，聽診上聞有水泡音 (液體中透入氣體而發之音，謂之水泡音)，服之最易促其排出。且作用安穩，用於小兒老人，最為適當。惟體發高熱及消化甚不良者，皆忌服。此前人及余所實驗者也。用量，一次〇·五至一·五一日三次，為散劑、浸劑、煎劑，俱可。余則以為散劑效少，不如浸劑及煎劑。其處方如左。

▲攝涅瓦煎(二)〇一〇〇〇 安母尼亞茴香精一〇〇 薑舍八〇

右一日分三次服。

▲攝涅瓦浸(一)〇三〇〇 稀三鹽酸三滴 薑舍五〇

右一日分六次服。此爲五歲小兒所用之分量。

〔提要〕咳嗽時略出濃稠之痰。可煎服攝涅瓦根三瓦。

●貌羅謨加倍謨

Brom-Kalium 即ブロームカリウム、一名溴素加里、

省曰臭利、舊作溴溴、

此藥爲骰子形之結晶。色白有光澤。易溶於水。觸空氣中之水蒸氣即潮解。瓶貯必須嚴密栓塞。効能爲麻醉、鎮痙。其性和平。故醫生或信用之。歷述如下。  
(一)治頻癇。分量較普通畧多。後尚漸次增加。約一年餘至翌年。仍須常服。以防再發。此某醫之言也。然以余之經驗推之。雖曰此藥與其他健胃劑並用。而頻年連服。難免不妨害胃之消化。  
(二)治急癇。以稍大劑。每逾數時服之。其效如神。  
(三)治強直症。因破傷風創四肢硬直之謂。亦以大量與抱水格魯拉兒更迭投之。亦妙。服用之時間與急癇同。  
(四)用於比斯的里、舞蹈病。亦服稍大量。  
(五)治神經過敏症。如劇甚之精神感動、心身過

勞等服普通量，或稍大量，頗能鎮靜。**(六)**治精神病。**(七)**治偏頭痛、神經性頭痛等，速服普通量。**(八)**治不眠症及夜啼等，頓服稍大量。**(九)**治睾丸神經痛、子宮神經痛、腔隙神經痛、月經困難等，亦速服普通量。如上所述，有能立効者，有能輕減者，用量普通一次一〇—一二〇，極量一次五〇—一日二五〇。但此等極量必醫生而後可用，常人慎勿妄試。其處方如左。

▲臭剉三〇 苦丁二〇 罂舍一〇〇 水一〇〇〇

右一日分三次服，治比斯的里等。

▲臭剉四〇 安知歌貌林一〇 乳糖適宜

右分三包，一日三次，每服一包，治神經衰弱、神經痛、偏頭痛等。

▲臭剉一、五至二〇 白糖適宜

右臨臥頓服，治不眠症、淫情勃發等。

[提要] 臭剉之功效甚多，概言之，則麻醉、鎮痙是也。

●斯爾仿那兒

Sulfonal 即スルファンラール，舊譯杜索弗拿。

此乃劇藥，為色白易碎之結晶，水、酒精依的兒皆不溶解。于一八八六年，寶滿 Bou

man 氏始發見之。同時，格斯鐸 East 認爲最良之催眠藥。至今猶盛行焉。內服一、〇至二、〇。未幾即覺疲倦，在四時至八時內能安眠而不覺。覺後亦無不愉快之症狀。然永久連服，則必患消化不良。時或皮膚發疹。若頓服五、〇以上之極大量，則言語障礙。步行蹣跚。或癱瘓而死。故爲劇藥。其效能用於因神經刺戟而起之不眠症。熱性病者之夜間不安。精神病者之不眠。精神病者之不安不眠等，俱有良效。臭剝遠不及之。惟治癲癇，則功用遙於臭剠。且不可如臭剠之連續服用。用量一次〇、五一日二、〇至三、〇。於盜汗，則一次〇、三至〇、五。極量一次二、〇。一日四、〇。余之治不眠也。最初一次用〇、五。翌日即以其他之驚睡劑代之。三日後再服本品〇、六。如此更迭變換，以防中毒。且不使成爲習慣。

〔摘要〕心煩不眠。服斯爾彷那兒〇、五。可愈。

### 抱水格魯拉爾

Chloral-hydrate

即クロラルヒドロ。一作抱水コロラード。

〔別譯〕氯醛冰、西名告魯利。

此亦劇藥也。爲無色之結晶物。味殊苦。而覺如腐蝕。誤服溶液，實能腐蝕。故必以多量之水稀釋之。或混和護謨漿、單含、橙皮含等。而後可服。內用普通量。自四五分時至三十分時後。

自能沈沈熟睡。二時至六時內，斷不醒覺，更服大劑，益得酣眠。且有知覺減少，筋肉麻痺等症。若服至五、〇以上之極大量，昏睡愈甚，更有呼吸、心臟俱起麻痺而死者。其效哉！用於因腦之興奮而起之不眠症，與畜性之精神病，強直症，喘息等，俱有良効。昔有一人，年約三十，患強直症，全身筋肉強直，四肢之伸縮，不能自由。脈搏微細，呼吸將絕。妻若擊泣，然閉目，繞牀而泣，請遺藥，酒余竟至，棄以本品服之，少頃，即已安眠。家人環守其旁，約五時，尚未醒覺。乃皆驚疑曰：「宿久臥如此耶？」抑已逝而永不返耶？語未畢，病者已驚地躍起，談笑一如平日矣。此可見本品之效力也。又胃潰瘍亦宜用之。已畧述於前章，人工加兒爾斯泉鹽之條。胃潰瘍，每晨空心時，及午餐前，各服人加兒一次，每晚則賴服本品，連服二週間，頗有良効。諸家皆已言之。

用量，一次自〇、五至一、〇，極量，一次二、〇。一日六、〇。然無有用至二、〇者，以必致中毒故也。

▲抱水格魯拉爾〇、七 吳氯一、〇 亞拉里亞護謨漿三〇、〇 單含五、〇  
右賴服爲催眠劑。

〔提要〕患喘息、不眠、強直、胃潰瘍等，當試服抱水格魯拉爾。

## 莫兒比涅 Morphine

即セルヒチ、恐譯作莫非橘、又作莫非亞、又作麻  
非、即鴉片糖。

毒藥之中此爲最著。古今來殺於此者不知幾何人。生於此者亦不知幾何人矣。野史中當錄有滑稽談一則曰：有大盜持白刃刲蔽井先生先生手持一匙以敵之。此雖俚言實寓至理。蓋一匙之加減實命脈之所關也。此藥爲鍼狀之結晶物。色白味苦。水酒精皆能溶解。塗於健全之皮膚毫不呈其作用。在創面即略發刺痛。然隨時消散。內服少量始覺倦怠。繼患遲鈍之頭痛。漸僅睡眠。此時果強其運動。則誘起恶心。嘔吐。殊形苦悶。間有呈一種快樂之酩酊狀者。則屬萬一耳。服至〇、〇六以上之大量。則陷於昏睡。顏面呈「ヂアノーベ」二便閉止。呼吸困難。體溫條降。症候危險。或死或否。一視人之體質而各有不同。嘗有一婦人服〇、二之一之大量。竊自盡。余爲治之。約三週間而愈。今尚健存。而劉蔭「ヨシ」氏則曰：莫兒比涅之致死量不定。平均非服至〇、四不得死。總之內服及注射皮下。即不死亦必呈汎發作用。若廢賴內服漸成習慣。則雖服至一、〇或二、〇之最大量。亦僅罹慢性中毒。而生命依然無恙。嘗有一人。詣余乞莫兒比涅。曰：我役場之書記也。以夙患喘息病發。輒以莫兒比涅注射皮下。忽忽不覺。

竟成痼疾。每一服務，則全身倦怠，萬難支持，終至廢絕飲食。旦夕惟吞服此藥，欲出貨自購，而其價昂貴，故不揣冒昧，叩乞先生賜我〇、一以上之莫比，無則給以六十文，亦受惠多多矣。言訖，淚涔涔下，慣用莫比者，既罹慢性中毒，即至瘠迫若此。苟非受名醫之治療，終難霍愈也。吁，可危哉！然其效能則殊鉅，應用於種種之疾病，靈效輒著，故不因其有毒而退厭之也。茲歷述如下。

- (一) 爲催眠藥，治因精神興奮之不眠，及其他種種之不眠症，但不及抱水格魯拉爾。
- (二) 為鎮靜藥，治躁狂的精神病時，或較抱水格魯拉爾為優。
- (三) 為鎮痛藥，治各種之疼痛，或內服，或注射皮下，無論為根治的，與姑息的，凡用他藥而無效者，用此則獲奇效。抱水格魯拉爾遠不及之。
- (四) 治痙攣、張口時或有效，但不如抱水格魯拉爾，及其他鎮靜藥。
- (五) 治因心臟障礙而起之呼吸困難及喘息之呼吸困難。
- (六) 治咳嗽，而兼咯血之症，亦殊效。
- (七) 治因胃癌、胃潰瘍，及其他疾患而起之嘔吐，能鎮靜。
- (八) 治種種之下痢症，然用阿片尤為適當。
- (九) 用於赤痢、虎列刺，能免裏急後重，及疼痛之困苦，且抑止下痢，縮短經過之期。
- (十) 用於腸出血、腸穿孔、糖尿病等，但優於莫比者，不知凡幾，故不必定需之。要之，本品為驟醉、鎮痛之藥，其能適用於種種之疾病，而紓其困苦者。

則全在匙之加減耳。惟此加減適宜之法，苟非老練者，不能領悟。用量，二次〇、〇〇五至〇、〇三極量，一次〇、〇三一日〇、一為散劑、丸劑、水劑或注射皮下。余用此藥獨與衆異。尋常每次不過〇、〇〇三之少量。若用至〇、〇一以上，則堅囑患者安心靜臥，在十二時以內，嚴禁室內運動。雖便溺亦當令他人傳遞，不可離床。

此藥有鹽酸莫兒比涅（省曰鹽黃）硫酸莫兒比涅兩種。然其效能、用量，無少差異。

〔提要〕莫兒比涅之功用有種種，而其主效則為麻醉、鎮痛。

### ●阿片

Opium 部オピム 藥譜作鴉片，又作阿芙蓉，又名麻實。

阿片為劇藥之一。乃取罂粟（罂粟產於日本中國東印及中亞細亞波斯等國）殼中之乳汁，乾之而成褐色之粉末也。其味苦烈，有異常之臭。生理的作用及効能，皆與莫兒比涅無異。惟功力遠不及之。其優勝於莫比者，僅抑止下痢，及內臟出血而已。用量，一次〇、〇〇五至〇、一極量，一次〇、一五一日〇、五為散劑、丸劑，皆可。

〔提要〕阿片有制止下痢，及制止出血之效。

### ●醋酸加侖膜

Acetate of Potassium. 部醋酸カリエート。省曰醋剷。

舊譜佐膽威氣，又作鐵醋劑，又作鉛養醋液。

此藥為白色之粉末。水、酒精皆易溶解。觸空氣中之水蒸氣，隨即潮解。瓶貯必須嚴密栓塞。効能為優長之利尿劑。惟因腎臟實質炎，而發之水腫，不可用。或謂慢性胃加答兒、痛風、僕麻質斯等用之，亦恒有效。但余之實驗上，不能確信。用量，一次一〇至二三〇。一日數次。普通則一日四〇。

〔提要〕醋剝，能治各種之水腫。惟水腫因腎臟炎而發者，不可用。

● 瑞篤靈

*Suzukine* 即サントニオ子，舊譯作山道年，又作山道年可精。

亦劇藥也。為無色之結晶粉末。有光澤，觸光線，則變為黃色，而失其效力。宜收貯於有色瓶中，以阻其光。効能為驅除蛔蟲、蛲蟲之特效藥。用量，一次〇、〇五至〇、一極量，一次〇、一二〇〇三。余所用者如左。

▲ 瑞篤靈〇、一 甘末〇、一 大黃末一〇 白糖適宜  
右分三包。一日三回，每回一包。

〔提要〕蛔蟲蠕動之時，以瑞篤靈〇、一分三次服，可驅除之。

● 細馬越幾斯

*Extractum filicis*

舊譯作非利瑪流膏。

綿馬根一分，注入依的兒三分，鍊製而成。効能為驅除蛔蟲、十二指腸蟲等之藥。惟不

可連服。第二章總論中已詳言之。用量一次二二〇至一〇〇為丸劑或入膠囊俱可。服後約經二時則須頓服蓖麻子油二十五。

〔摘要〕吸取腸中滋養之蟲蟲惟綿馬越幾斯能殺之。

### ● 吐根

Tuber.

舊譯作衣必格、又作衣畢格。

吐根亦屬劇藥。為一經細小植物該植物產於西國溫帶之森林中。南美巴拿馬。之根乾而製之者也。効能因分量之大小而不同。用小量則為祛痰劑。用大量則為催吐劑。又有用為收斂劑。治赤痢。腸加答兒等。用量吐劑一次六、七以上。祛痰劑等一次〇、〇一至〇、〇五為散劑。或浸劑服用。但余所經驗者。如用為祛痰劑。則以浸劑為最穩妥而且有效。若用散劑。少則無效。大量則易致嘔氣。用左之處方配合令服。既無嘔氣之患。兼有祛痰之功。且咳嗽亦賴覺鎮靜。

▲ 吐根浸(〇、二)〇〇〇 安母尼亞茴香精一〇 罩舍八〇  
右一日分六次服。

### ● 沃度丁幾 Tincture of Iodine.

一名沃陳丁幾。省曰沃碘。舊譯作海

碘酒。又作碘藥酒。

此亦劇藥之一。以沃度一分溶解於酒精十二分中而成。為暗褐色之液體。別具一種之臭。塗布於皮膚表皮隨卽剝脫。効能或謂善於鎮吐及催促腸空扶托下痢之收斂。故有供內用者。然無甚效驗。外用塗布於陰囊水腫、甲狀腺腫、關節炎、淋巴腺炎、肋膜炎、寄生物皮膚病、微毒性皮膚病等。俱效。用量一次〇、二至〇、二極量一次〇、二一日一〇。外用或塗布結晶。或以酒精二三倍稀釋而塗布之。皆可。且可任用多少。

〔提要〕皮膚癌、肋膜炎、關節炎等。塗布沃度丁幾有效。

●

沃度加爾謨

Kalium Jodaturn.

即ヨードカリニム、一名沃度加里、

省曰沃剝。舊譯作鐵磚。又作鈣磚。

沃剝亦屬劇藥。為骰子形之結晶物。色白。水、酒精、皆能溶解。觸空氣中之水蒸氣則易潮解。瓶貯亦須嚴密栓塞。効能為驅微藥及吸收劑。用於微毒、腺病、慢性僥麻質斯、肋膜炎之末期、神經痛、喘息等症。頗有奇效。但須頻服。乃得奏功。非日夕可期也。用量一次〇、一至〇、五一日數次。為水劑服。惟本品宜漸次增量。最初一日約服〇、二滿一週間再加〇、一。俟一日服至三〇暫時停止。若服用之際忽起中毒症狀。呈頭痛、不眠、耳鳴諸分泌增多等症狀。亦宜中輒弗服。近日醫家以沃度那篤留謨。不似沃度

加價謨之有害消化，故可持久服用之。

〔提要〕微毒、筋膜炎、僕麻質斯、神經痛等症。宜服沃度加價謨。

● 沃度那篤留謨

*Natrium iodatum.*

一名沃度曹達

此藥為結晶形之粉末，色白，味苦而鹹。水、酒精皆能溶解。效能用量一如沃剝。處方如左。

▲ 沃度曹達〇二三 苦丁二六〇 單舍一〇〇 水一〇〇〇

右一日分三次服。

● 亞拉昆亞護謨

*Arabic Gum.*

舊作白樹膠，又作亞拉伯膠。

此藥為帶黃色之粉末，有淡滷之味。和水少許，則呈極粘之性質。可作漿糊之用。醫藥上專供製合丸劑之料。外用撒布於表皮剃脫及火傷等部，若須和水以供內用，則以亞拉昆亞護謨漿為宜。

● 亞拉昆亞護謨漿

*Mucilage gummi arabici*

省曰：「此藥漿。」

亞拉昆亞護謨一分子入冷卻之餾水中，急速洗之，取出，隨注加溫蒸餾水二分，時時振盪，得熱，即全溶解。效能為緩和劑。對於胃腸加答兒等症，常與他藥混和內用。用量一次

五〇至一〇〇。

〔提要〕亞拉尾亞謹謨。爲製合丸劑之良材。內服治胃腸加答兒者。則必用謹謨藥。

●依的兒

Aether

即ニーテル、舊譯作伊打、又作以脫、

此藥爲透明無色之液體。有特異之芳香。易發揮。宜密塞而藏瓶於冷暗之處。效能爲興奮及局所麻醉。興奮者。於失氣虛脫。或甚九死一生之際。以半筒至二筒注射皮下。或內服。或灌腸。局所麻醉者。用以吸入。或爲散霧法。使局所之知覺麻醉。以便施小手術。他如頭痛。神經痛等。則以之爲鎮痛藥。塗布患部。惟效力倏即消失。用量。內服以五滴至二十滴。加糖水用之。除內服之外。則用純品。

〔提要〕危殆之際。取依的兒注射之。能挽回生命。

●紓創膏

*Eublastrium adhesivum anglicum.*

俗名橡皮膏。

有英法紓創膏。德意志紓創膏之別。係塗魚膠於白絹片而乾之。忌置於濕潤之處。効能。可代綿帶。創部之小者。取此膏貼置之。帶石炭酸水少許。濕其外面。則生粘着力。而保護堅固。

〔提要〕凡擦傷等。可貼置紓創膏。以代綿帶。

● 偏里設林 Glycerin 部グラスリン 又作リスリン舊譯作甘油、  
爲澄明無色之液體。無臭。水、酒精皆能溶解。若表皮剝脫、耳內乾燥、皮膚破裂、火  
傷及其他種種之皮膚病，均宜以此塗布。又可爲灌腸料。內用者殆無之。用量灌腸一  
次二、〇至五、〇塗布不拘多寡。

〔提要〕偏里設林可塗於種種之皮膚病。又爲灌腸料。

● 鹽酸古加乙涅 Muriate of Cocaine 省曰古加乙涅、部ロカイン、  
舊譯作鹽酸古加乙涅、又名麻素冰、又名古巴拿、

此劇藥也。爲結晶形之粉末。白色。無臭。水、酒精皆能溶解。其效能以麻醉鎮靜之目的。  
有內用以治胃痛、嘔吐者。然不確實。外用爲局所麻醉藥。於眼科、外科、齒科等恒用此  
以減疼痛。用法內服一次〇、〇一至〇、〇三點眼。用一%至二%或三%之溶液。注  
射皮下。用一%至十%之溶液。齒痛用極濃厚之溶液。或用純品。

〔提要〕自眼科、外科、以至齒科各病。塗布古加乙涅。自能鎮痛。

● 薄荷腦 Mentholum 一作薄荷油、又作薄荷冰、

此藥爲無色之針狀結晶物。有強烈之芳香。其味先則如灼。後乃清涼。水難溶解。酒精、

依的兒，則易溶解。效能為鎮痛藥。齒痛用其純品。偏頭痛，製為酒精溶液塗布之。此外如為調味藥，則以極少量與他藥配和，故用量不一定。

〔提要〕薄荷脣能治齒痛。偏頭痛又為調味料。

## 第十章 非藥的之藥

凡藥非直接治愈疾病，必與種種之主藥並用，而後能達其目的者，謂之非藥的之藥。

### ●白糖 Refined Sugar.

即白砂糖。世人無不知之。醫藥用者，必須十分精製。宜向藥肆購求之。效能為調味料。用量不定。

### ●單舍利別 Simple Syrup. 省曰單舍。舊譯作糖漿。

白糖六十五分，投於熱蒸馏水二十五分中，溶解而成。效能為調味藥。用量不定，惟尋常用至八〇或一〇〇者，大率和水一〇〇。

### ●乳糖 Saccharum lactis. 舊譯作奶糖、又作綿糖。

為白色之粉末。味微甘。入水徐徐溶解。空氣中之濕潤，能不吸引。用為調味料及散劑。

之配合藥，最佳，用量，不定。

●甘草 *Liquorice.*

為甘草根之皮。昔漢醫常用為煎劑。今則研搗粉末而用之。效能為調味料及丸劑之配合藥。用量不定。

〔提要〕白糖、單舍利別乳糖、甘草末皆為調味料。

●單軟膏 *Simple Ointment.* 即<sup>舊譯</sup>作黃油膏、又作白油膏、

黃蠟一分。胡麻油二分。煎沸之後。冷力攪拌。即為單軟膏。效能為軟硬膏之配合料。用量不定。

●華攝林 *Vaseline.* 即<sup>舊譯</sup>作花士林、

為白色之膏藥的物質。無刺戟性。久貯之亦不變。為最優之膏藥料。用量不定。

●酒精 *Spirit.* 即<sup>アルコール</sup>、

為澄明白色之液體。有揮發性。其味如灼。入水易混和。遇火即燃。而放淡藍色之火焰。效能為丁幾劑及溶解他藥。其主理則供製藥用。用量不定。

〔提要〕華攝林、單軟膏、皆為膏藥料。酒精、則主用於種種之製藥。

●血之道「クヰーン」

明治三十七年余始創製此藥。係取鎮痙藥、通經藥及其他藥品混合而成。效能為鎮痙、通經。如比斯的里俗云之道、神經衰弱、月經不順等症皆宜用之。用量一次二膠囊，至三膠囊，早晚各服一次。

〔提要〕「クヰーン」善治神經衰弱比斯的里、月經不順等症。

●消化素

此藥亦余於是年創製。係取消化蛋白質之藥及溶解植物性食物之藥，與有防腐作用之藥品少量混合而成。能為制止醣酵，用於急性及慢性之胃加答兒。消化不良症亦有効。用量普通一次一〇、一日三次。

〔提要〕患消化不良及胃加答兒者可試服消化素，自二日至四日。

