

加批詳評景岳全書

古方八陣目錄圖集

古方總目

以下總列共
一十三卷

附古方條序

愚按古方之散列於諸家者既多且雜。或互見於各門。或彼此之重複。欲通其用。涉獵固難。盡收之徒資紊亂。今余探其要者。類為八陣。曰補和攻散寒熱固因。八陣之外。復列有婦人小兒痘疹外科之四方。且於諸方之中。仍以類聚。庶乎奇正羅列。緩急並陳。或舍短可以就長。或因此可以效彼。慧眼所及。朗如日星。引而伸之。觸類而長之。因古人之繩墨。得資我之變通。醫中之能事。斯亦先幾一著也。凡我同志。其加省焉。

一曰補陣

存亡之幾。幾在根本。元氣既虧。不補將何以復。故方有補陣。

二曰和陣

病有在虛實氣血之間。補之不可。攻之又不可者。欲得其平。須從緩治。故方有和陣。

三曰攻陣

邪固疾深。勢如強寇。速宜伐之。不可緩也。故方有攻陣。

四曰散陣

邪在肌表。當透於外。拒之不早。病必日深。故方有散陣。

五曰寒陣

陽亢傷陰。陰竭則死。或去其大。或壯其水。故方有寒陣。

六曰熱陣

陰極亡陽。陽盡則斃。或祛其寒。或助其火。故方有熱陣。

會稽 張介賓 會卿著

七曰固陣 元氣既傷虛而且滯漏泄日甚不盡不已故方有固陣。

八曰因陣 病有相同治有相類因症用方亦有不必要易者故方有因陣。

附列四方 古方有八陣之外其有未盡者如婦人有經脈治產之異小兒有養育驚疳之異

痘疹有出沒變化之異外科有經藏表裏之異隨機應變治有不同故并列方目於左。

卷五十三 補陣

四君子湯 一

加味四君湯 二

生附四君湯 三

五味異功散 四

六君子湯 五

加味六君湯 六

香砂六君湯 七

四物湯 八

蘇加味四物湯 九

正加味四物湯 十

東加減四物湯 十一

保柴胡四物湯 十二

萬柴胡四物湯 十三

奇效四物湯 十四

增損四物湯 十五

元四物湯 十六

良方加減四物湯 十七

四物二物湯 十八

八珍湯 十九

十全大補湯 二十

人參養榮湯 二十一

小建中湯 二十二

全大建中湯 二十三

局方十四味建中湯 二十四

八味大建中湯 二十五

人參建中湯 二十六

黃耆建中湯 二十七

當歸建中湯 二十八

三味建中湯 二十九

補中益氣湯 三十

調理益氣湯 三十一

歸脾湯 三十二

加味歸脾湯 三十三

人參湯 三十四

獨參湯 三十五

奪命散 三十六

參附湯 三十七

參歸湯 三十八

參朮膏 三十九

參朮湯 四十

仲朮附湯 四十一

濟朮附湯 四十二

香附湯 四十三

當歸補血湯 四十五

黃耆湯 四六

黃耆六一湯 五十一

參苓散 五四

五味子湯 五八

補肺湯 六二

甯肺散 六四

黃耆益損湯 七十

板麥門冬飲子 七四

麥門冬散 七八

正心湯 八二

秘酸棗仁湯 八六

遠志飲子 九十

加味逍遙散 九四

當歸黃耆湯 九八

心虛白濁散 百二

人參丸 百六

良黃耆湯 四七

玉屏風散 五一

參苓白朮散 五五

陳氏五味子湯 五九

甯肺湯 六三

醍醐膏 六七

元地黃散 七一

家抄麥門冬飲 七五

旋神飲 七九

開心湯 八三

仲景酸棗仁湯 八七

聖愈湯 九一

生薑汁煎 九五

大防風湯 九九

刮麥散 百三

人參固本丸 百七

大補黃耆湯 四八

潤神散 五二

七味白朮散 五六

人參胡桃湯 六〇

風髓湯 六五

黃耆散 六八

柔脾湯 七二

麥門冬湯 七六

醫統養心湯 八十

茯苓補心湯 八四

錢氏酸棗仁湯 八八

益榮湯 九二

局方胃風湯 九六

河地黃飲子 一百

益氣補腎丸 百四

團參丸 百八

神效黃耆湯 四九

當歸六黃湯 五三

生脈散 五七

瓊玉膏 六一

蜜酥煎 六六

五味黃耆散 六九

東垣麥門冬飲子 七三

萬氏麥門冬湯 七七

錢氏養心湯 八一

酸棗仁湯 八五

遠志湯 八九

逍遙散 九三

十寶湯 九七

金櫻膏 百一

當歸酒 百五

天王補心丹 百九

補心祥效丸 百十

平補鎮心丹 百十

栢子養心丸 百十

心腎丸 百十

遠志丸 百十

甯志丸 百十

甯志膏 百十

定志丸 百十

八物定志丸 百十

十四友丸 百十

琥珀多寐丸 百十

六味地黃丸 百十

八味地黃丸 百十

氏加減八味丸 百十

方益陰腎氣丸 百十

加減金腎氣丸 百十

滋陰大補丸 百十

大造丸 百十

全鹿丸 百十

班龍丸 百十

鹿茸丸 百十

鹿角膠丸 百十

鹿茸丸 百十

無比山藥丸 百十

還元丹 百十

養藥丸 百十

還少丸 百十

七珍至寶丹 百十

補髓丸 百十

枸杞子丸 百十

三才丸 百十

加味青綠丸 百十

十補丸 百十

煨腎丸 百十

青綠丸 百十

安腎丸 百十

小安腎丸 百十

石刻安腎丸 百十

煨腎散 百十

打老兒丸 百十

肉蓯蓉丸 百十

四味肉蓯蓉丸 百十

紅鉛丸 百十

二丹丸 百十

益血丹 百十

要四神丸 百十

黃耆丸 百十

加味四斤丸 百十

益血丹 百十

金剛丸 百十

虎骨四斤丸 百十

人參膏 百十

益血丹 百十

要四神丸 百十

虎骨四斤丸 百十

人參膏 百十

益血丹 百十

要四神丸 百十

虎骨四斤丸 百十

人參膏 百十

益血丹 百十

要四神丸 百十

虎骨四斤丸 百十

人參膏 百十

卷五十四 和陣

二陳湯 一

加減二陳湯 二

加味二陳湯 三

二朮二陳湯 四

宣黃芩二陳湯 五

鮮柴葛二陳湯 六

小半夏加茯苓湯 九

金匱大半夏湯 十

橘皮半夏湯 十三

秫米半夏湯 十四

平胃散 十七

調氣平胃散 十八

不換金正氣散 二

陳不換金正氣散 二

升陽益胃湯 二五

蘇白朮湯 二六

良方四味白朮湯 二九

白朮散 三十

調胃白朮湯 三三

白朮芍藥散 三四

神朮散 三七

局神朮散 三八

蘇子降氣湯 四一

小降氣湯 四二

流氣飲子 四五

二十四味流氣飲 四六

加味七氣湯 四九

局七氣湯 五十

疏鑿飲 五三

方厚朴湯 五四

人參木香散 五七

消導寬中湯 五八

導滯經通湯 六一

導水茯苓湯 六二

當歸散 六五

當歸活血散 六六

桂附二陳湯 七

小半夏湯 八

蘇大半夏湯 十一

茯苓半夏湯 十二

半夏白朮天麻湯 十五

蒼朮半夏生薑湯 十六

益黃散 十九

藿香正氣散 二十

徐正氣散 二三

大正氣散 二四

濟生白朮湯 二七

良方白朮湯 二八

宣明白朮散 三一

良方白朮湯 三二

苓朮芍藥湯 三五

苓桂朮甘草湯 三六

海神朮散 三九

沉香降氣散 四十

木香順氣散 四三

木香調氣飲 四四

七氣湯 四七

三七氣湯 四八

指迷七氣湯 五一

四磨飲 五二

木香寬中湯 五五

木香分氣飲 五六

化滯調經湯 五九

三和湯 六十

健脾散 六三

參朮健胃湯 六四

局方五皮散 六七

滄五皮散 六八

沉香琥珀丸 六九

法製陳皮 七十

祛痛散 七一

調痛散 七二

丁香止痛散 七三

良方烏藥散 七四

手拈散 七五

游山散 七六

舒筋湯 七七

玄桂丸 七八

枳朮丸 七九

香砂枳朮丸 八十

麴蘗枳朮丸 八一

木香人參生薑枳朮丸 八二

加味枳朮丸 八三

枳朮丸 八四

大健脾丸 八五

啟脾丸 八六

和中丸 八七

東和中丸 八八

養胃進食丸 八九

消食丸 九十

導痰丸 九一

五飲湯 九二

茯苓飲 九三

茯苓飲子 九四

千緡湯 九五

五液湯 九六

四七湯 九七

加味四七湯 九八

澤瀉湯 九九

硃砂消痰飲 九九

消飲丸 百一

星香丸 百二

祛痰丸 百三

天花丸 百四

易玉壺丸 百五

玉液丸 百六

玉粉丸 百七

杏仁丸 百八

許學士神朮丸 百九

麴朮丸 百一十

三仙丸 百一

青州白丸子 百一

琥珀壽星丸 百一

茯苓丸 百一十四

白螺丸 百一五

丹潤下丸 百一

蘇潤下湯 百一

黃瓜羹丸 百一

杏仁蘿蔔子丸 百一

陳皮湯 百一

竹茹湯 百一

橘皮竹茹湯 百一

二汁飲 百一

葛花解醱湯 百一

豬苓散 百一

人參散 百一

六和湯 百一

丁香散 百一

丁香半夏丸 百一

半夏丁香丸 百一

大七香丸 百一

許則仁半夏湯 百一

定喘湯百三

三神祕湯百三

蘇子煎百四

百花膏百四

六鬱湯百四

十味溫胆湯百五

五高寬中散百五

人參豆蔻湯百六

利昂散百六

香需飲百六

縮脾飲百七

除溼湯百七

白朮酒百八

茵陳五苓散百八

茯苓湯百八

加減柴苓湯百九

人參定喘湯百三

直神祕湯百三

杏仁煎百四

枳殼散百四

三和散百五

越鞠丸百五

千高散百五

紫蘇子飲百六

人參利昂散百六

五物香需飲百七

七味滲溼湯百七

羌活勝溼湯百七

五苓散百八

柴胡五苓散百八

茵陳五苓散百八

胃苓湯百九

真人養臟湯百九

百合湯百三

蘿蔔子湯百三

杏仁膏百四

保和湯百四

生韭飲百五

流氣丸百五

五噎散百五

枇杷葉散百六

草豆蔻丸百六

十味香需飲百七

清熱滲溼湯百七

升陽除溼湯百七

加減五苓散百八

四苓散百八

橘半胃苓湯百九

草果散百九

五虎湯百三

葶藶大棗瀉肺湯百四

前胡散百四

十味保和湯百四

溫胆湯百五

五高散百五

嘉禾散百六

補氣運脾湯百六

清濕益氣湯百六

黃連香需飲百七

防己黃耆湯百七

升陽除溼防風湯百八

加味五苓散百八

豬苓湯百八

柴苓湯百九

大橘皮湯百九

消食導氣飲百九

外黃芩湯百九

秘傳斗門方百九

治病簡易八方二百

麴虎二百

戊己丸二百

雙荷散二百

側柏散二百

地黃煎二百

枇杷葉散二百

阿膠散二百

良方阿膠散二百

錢氏阿膠散二百

綠雲散二百

簡易黑神散二百

良方黑神散二百

天門冬丸二百

髮灰散二百

棕灰散二百

平胃地榆湯二百

海愈風湯二百

小烏沉湯二百

除溼和血湯二百

驅癘飲二百

祛癘飲二百

截癘飲二百

萬安散二百

驚甲飲子二百

清脾飲二百

草果飲二百

七寶飲二百

四獸飲二百

局常山飲二百

丹截癘丹二百

集截癘常山飲二百

寶文加飲子二百

柴平湯二百

人參養胃湯二百

和解散二百

檳榔煎二百

屠蘇酒二百

降椒酒二百

省風湯二百

八風散二百

防風當歸湯二百

順風勻氣散二百

星香湯二百

八味順氣散二百

大秦芫湯二百

養血當歸地黃湯二百

蒼苡仁湯二百

滌痰湯二百

清心散二百

簡易虎骨散二百

虎骨散二百

交加散二百

良方交加散二百

四白丹二百

續斷丹二百

稀莖丸二百

蠲痺湯二百

三痺湯二百

加味五痺湯二百

人參散二百

六味茯苓湯 二六

桂心湯 二六

活絡飲 二六

愈風丹 二七

活絡丹 二七

史國公浸酒方 二八

雞鳴飲 二八

紫蘇散 二八

檳榔散 二九

人參桂心散 二九

大腹子散 三〇

續斷丸 三〇

萊萸丸 三〇

神應養真丹 三一

椒艾囊 三一

樞子煎 三一

枳殼散 二六

濕鬱湯 二六

獨活寄生湯 二七

薰洗痛風法 二七

開結導引丸 二七

煨腎散 二八

萊萸木瓜湯 二八

紫蘇湯 二九

桑白皮散 二九

橘皮湯 二九

地黃湯 三〇

本續斷丸 三〇

健步丸 三〇

透骨丹 三一

敷脚氣方 三一

聖效方 三二

紫蘇子湯 二六

越痛散 二六

透經解擊湯 二七

易天麻丸 二七

換骨丹 二七

調榮活絡飲 二八

立效散 二八

生檳榔湯 二九

木香散 二九

半夏散 二九

木瓜湯 三〇

保命牛膝丸 三〇

調元健步丸 三一

虎骨酒 三一

蕪荑散 三一

景仲烏梅丸 三二

除溼蠲痛湯 二六

秦艽地黃湯 二六

薰蒸痺痛法 二七

愈風燥溼化痰丸 二七

換腿丸 二七

胡桃湯 二八

防已飲 二八

加減檳榔湯 二九

木通散 二九

大腹皮散 三〇

沉香湯 三〇

酒浸牛膝丸 三〇

因勝駿丸 三一

薏仁湯 三一

直蕪荑散 三二

生烏梅丸 三二

良桃仁承氣湯 五

大陷胸湯 九

大黃甘草湯 十三

雙解散 十七

陶黃龍湯 二一

四順清涼飲子 二五

三化湯 二九

枳實大黃湯 三三

三稜丸 三七

禹功散 四一

流金膏 四五

木香檳榔丸 四九

神保丸 五三

枳實導滯丸 五七

局溫白丸 六一附萬
方病紫苑丸

守病丸 六五

當歸承氣湯 六

小陷胸湯 十

大黃硝石湯 十四

牛黃雙解散 十八

良黃龍湯 二二

元四物湯 二六

透膈湯 三十

羌活導滯湯 三四

三聖膏 三八

瀉川散 四二

和通經散 四六

寶木香檳榔丸 五十

感應丸 五四

秘化滯丸 五八附野
方山房感應丸

陳氏溫白丸 六二

勝紅丸 六六

大柴胡湯 七

河間大黃湯 十一

梔子大黃湯 十五

局涼膈散 十九

元黃龍湯 二三

抵當湯 二七

茵陳蒿湯 三一

牛黃清心湯 三五

桃仁膏 三九

稀涎散 四三

苦楝湯 四七

遇仙丹 五一

大金花丸 五五

化鐵丹 五九

丹溪阿魏丸 六三

助氣丸 六七

六一承氣湯 八

外科大黃湯 十二

防風通聖散 十六

東涼膈散 二十

玉燭散 二四

十棗湯 二八

芍藥湯 三二

三稜散 三六

穿山甲湯 四十

大異香散 四四

三花神佑丸 四八

備急丸 五二

大硝石丸 五六

陳米三稜丸 六十

醫林阿魏丸 六四

三黃丸 六八

雄黃聖餅子 六九

小胃丹 七三

滾痰丸 七七

辰砂化痰丸 八一

人參利膈 八五

開結導飲丸 八九

脾約丸 九三

追蟲丸 九七

五瘟丹 百一

瓜蒂散 百五

良獨聖散 百九

外臺走馬湯 百二

卷五十六 散陣

麻黃湯 一

麻黃附子甘草湯 五

桂枝湯 九

舟車丸 七十四

清氣化痰丸 七四

硃砂滾涎丸 七八

控痰丹 八二

青木香丸 八六

扁犀角丸 九十

七宣丸 九四

化蟲散 九八

大青丸 百二

獨聖散 百六

錢氏獨聖散 百十

導水丸 七一

丹清氣化痰丸 七五

青礞石丸 七九

烏巴丸 八三

消痞核桃 八七

河間犀角丸 九一

七聖丸 九五

萬應丸 九九

硃砂丸 百三

茶調散 百七

木通散 百一

神芎丸 七二

法製清氣化痰丸 七六

化痰丸 八十

吐痰方 八四

熨痞方 八八

麻仁方 九二

三因紅丸子 九六

妙應丸 一百

八毒赤丸 百四

陳氏獨聖散 百八

大黃附子湯 百二

麻黃加木湯 二

麻黃甘草湯 六

桂枝加黃耆湯 十

麻黃附子細辛湯 三

大青龍湯 七

桂枝加大黃湯 十一

麻黃杏仁意苈甘草湯 四

小青龍湯 八

栝萸桂子湯 十二

桂枝人參湯 十三

桂枝麻黃各半湯 十四

桂枝附子湯 十五

桂枝甘草湯 十六

桂枝葛根湯 十七

柴胡桂枝湯 十八

小柴胡湯 十九

薛加減小柴胡湯 二十

良方小柴胡湯 二十一

加減小柴胡湯 二十七

柴胡石膏湯 二十三

大柴胡湯 二十四

柴平湯 二五

柴苓湯 二六

柴葛湯 二十七

四逆散 二八

葛根湯 二九

升麻葛根湯 三十

柴葛解肌湯 三一

葛根蔥白湯 三二

連翹蔥白湯 三三

參蘇飲 三四

加減參蘇飲 三五

敗毒散 三六

加味敗毒散 三七

荆防敗毒散 三八

五積散 三九

十神湯 四十

升陽散大湯 四一

升陽益胃湯 四二

聖散子 四三

九味羌活湯 四四

六神通解散 四五

清風百解散 四六

良消風散 四七

和消風散 四八

二味消風散 四九

黃芩半夏湯 五十

全匱續命湯 五一

小續命湯 五二

大續命湯 五三

續命煮散 五四

秦艽升麻湯 五五

愈風湯 五六

胃風湯 五七

地黃湯 五八

東羌活附子湯 五九

寶羌活附子湯 六十

羌活勝風 六一

聖惠川芎散 六二

玉機川芎散 六三

川芎茶調散 六四

局神朮散 六五

天香散 六六

芎芷散 六七

芎辛道中痰湯 六八

上清散 六九

透頂散 七十

菊花散 七一

如聖湯 七二

點頭散 七三

清空膏 七四

愈風餅子 七五

八般頭風 七六

都梁丸 七七

金沸草散 八一

蘇陳九寶湯 八五

越婢湯 八九

烏藥順氣散 九三

半夏左經湯 九七

茅兼補厚朴湯 一百

排風湯 一百

枳殼煮散 九

升麻湯 三十

卷五十七 寒陣

黃連解毒湯 一

神竹葉石膏湯 五

和桂苓甘露湯 九

普濟消毒飲 十三

雞子清飲 十七

三柳湯 上八

三旋復花湯 八二

方羌活散 八六

越婢加半夏湯 九十

通關散 九四

大黃左經湯 九八

第四風引獨活湯 一百

陽毒升麻湯 一百

柴胡疎肝湯 一百

柴胡桂枝乾薑湯 四十

華蓋散 七九

良旋復花湯 八三

羌活散 八七

當歸湯 九一

神效左經丸 九五

第一麻黃湯 九九

獨活湯 一百

括蕞根湯 一百

桂枝散 一百

冲和散 八十

桑皮散 八四

芎芷香蘇散 八八

羌活勝溼湯 九二

麻黃左經湯 九六

第二獨活湯 一百

追毒湯 一百

再造散 一百

河間葛根湯 二十

白虎湯 二

六竹葉石膏湯 六

千金甘露飲 十

芩連消毒飲 十四

黃連阿膠湯 十八

白虎加人參湯 三

竹葉黃耆湯 七

三黃石膏湯 十一

六神通解散 十五

梔子仁湯 十九

白虎加桂枝湯 四

暄桂枝甘露湯 八

羌活升麻湯 十二

小陷胸湯 十六

梔子豆豉湯 二十

梔子厚朴湯 二一

梔子乾薑湯 二二

梔子藥皮湯 二三

解瘟疫熱毒 二四

漏蘆升麻湯 二五

黃連香需飲 二六

瀉心湯 二七

甘草瀉心湯 二八
夏瀉心湯

生薑瀉心湯 二九

大黃黃連瀉心湯 三〇

附子瀉心湯 三一

清心蓮子飲 三二

加味通心飲 三三

清心湯 三四

外科清心湯 三五

人參清肺湯 三六

人參平肺散 三七

黃芩清肺飲 三八

清肺湯 三九

東清肺飲子 四十

萬氏清肺飲 四一

瀉白散 四二

五味瀉白散 四三

正麥門冬湯 四四

獨麥門冬湯 四五

萬氏麥門冬湯 四六

家麥門冬飲 四七

明麥門冬飲子 四八

二母散 四九

陳氏二母散 五十

黃芩知母湯 五一

桑白皮湯 五二

紫苑散 五三

東清胃散 五四

加味清胃散 五五

秘清胃散 五六

瀉黃散 五七

和中湯 五八

柴胡清肝散 五九

梔子清肝散 六十

芍藥清肝散 六一

良龍胆瀉肝湯 六二

北龍胆瀉肝湯 六三

加味龍胆湯 六四

當歸六黃湯 六五

正氣湯 六六

芍藥甘草湯 六七

生地黃煎 六八

石膏散 六九

荊芥散 七十

雙玉散 七一

祕方茶調散 七二

天花散 七三

地骨皮散 七四

玉泉丸 七五

清膈導痰湯 七六

生鐵落飲 七七

大連翹飲 七八

生地黃散 七九

方犀角地黃湯 八十

犀犀角地黃湯 八一

科犀角地黃湯 八二

方犀角地黃湯 八三

生地黃飲子 八四

茵根散 八五

蟹甲地黃湯 八九

退熱湯 九三

本槐花散 九七

枳殼散 百一

仲黃芩湯 百五

黃芩芍藥湯 百九

香連丸 百十

五淋散 百十

真珠粉丸 百二

牛膝湯 百二

茯苓溲瀝湯 百二

蒼朮湯 百三

蒼朮湯 百三

硃砂涼膈丸 百四

十味安神丸 百四

人參五味子湯 八六

黃耆蟹甲煎 九十

圓魚丸 九四

外槐花散 九八

小薊子飲 百二

外黃芩湯 百六

木香化滯湯 百十

六神丸 百十

蒿芩湯 百十

導赤散 百二

三味牛膝湯 百二

當歸拈痛湯 百三

二妙散 百三

河苦參丸 百三

硃砂安神丸 百四

七味安神丸 百四

二神湯 八七

地黃膏 九一

地榆散 九五

東加減四物湯 九九

仲黃連湯 百三

直黃芩湯 百七

清熱溲瀝湯 百十

八正散 百十

大平丸 百十

赤茯苓散 百二

海金沙散 百二

活犀角散 百三

加味二妙丸 百三

陳苦參丸 百三

氏安神丸 百四

龍腦安神丸 百四

四生丸 八八

秦艽扶羸湯 九二

四味地榆散 九六

枳殼湯 百一

黃連湯 百四

黃耆散 百八

益元散 百十

七正散 百十

火府丹 百二

葵子湯 百二

茵陳湯 百二

清燥湯 百三

蒼朮黃柏丸 百三

錢苦參丸 百四

氏安神丸 百四

萬龍腦安神丸 百四

抑青丸百四

芩連丸百五

大補陰丸百五

節補陰丸百六

加味坎離丸百六

大蘆薈湯百六

軟石膏丸百七

聚金丸百七

豬臟丸百八

卷五十八 熱陣

理中湯一

加味理中湯五

理中化痰丸九

煨溫胃湯十三

茯苓四逆湯十七

四逆湯二一

鐵抑青丸百五

芩金丸百五

大補元丸百五

三補丸百六

三才封髓丹百六

加減蘆薈丸百七

地榆丸百七

臟連丸百七

保和丸百八

附子理中湯二

胡椒理中湯六

治中湯十

四逆散十四

芩黃四逆湯十八

仲附子湯二二

瀉青丸百五

大補丸百五

大補地黃丸百五

滋腎丸百六

當歸龍薈丸百六

三聖丸百七

槐角丸百七

酒蒸黃連丸百七

四順清涼飲百八

附子理中丸三

八味理中丸七

丁香理中湯十一

四逆加人參湯十五

茵陳四逆湯十九

三附子湯二三

瀉金丸百五

大造丸百五

丹補陰丸百六

加味虎骨丸百六

良蘆薈丸百六

尤連丸百七

阿膠丸百七

黃連丸百八

白頭翁湯百八

理中加丁香湯四

枳實理中湯八

良溫胃湯十二

四逆加脂胆汗湯十六

當歸四逆湯二十

生附湯二四

參附湯 二五

桂枝附子湯 二九

生薑附子湯 三三

附子八味湯 三七

八味大建中湯 四一

回陽返本湯 四五

十味劉散 四九

半夏乾薑散 五三

萬氏橘皮湯 五七

橘皮竹茹湯 六一

續丁香柿蒂散 六五

養胃湯 六九

甘露湯 七三

大順散 七七

冷香湯 八一

千金霍亂方 八五

神朮附湯 二六

白朮附子湯 三〇

乾薑附子湯 三四

六物附子湯 三八

三建湯 四二

華陀救陽脫方 四六

芎朮湯 五十

甘草乾薑湯 五四

丁附散 五八

小半夏湯 六二

丁香茯苓散 六六

胃愛散 七十

茯苓甘瀉湯 七四

四順附子湯 七八

楸木瓜湯 八二

乾霍亂二方 八六

耆附湯 二七

甘草附子湯 三一

羌活附子湯 三五

小建中湯 三九

炙甘草湯 四三

覆旋代赭石湯 四七

正元散 五一

橘皮乾薑湯 五五

丁香茯苓散 五九

柿蒂湯 六三

續丁香柿蒂 六六

補脾湯 七一

茯苓甘草湯 七五

附子粳米湯 七九

訶子散 八三

苓桂朮甘湯 八七

濟水附湯 二八

薑附湯 三二

芍藥甘草附子湯 三六

局大建中湯 四十

桂枝甘草湯 四四

厚朴人參半夏湯 四八

生薑半夏湯 五二

金匱橘皮湯 五六

三丁香散 六十

藿香安胃散 六四

安脾散 六八

七味人參丸 七二

草薢寇湯 七六

冷香飲子 八十

薑亂三方 八四

薑朮湯 八八

韓氏溫中湯 八九

強中丸 九三

溫中化痰丸 九七

丁香五套丸 百一

嚴實脾散 百五

鐵刷散 百九

大沉香丸 百十

二味沉附湯 百十

芎附散 百二

溫中去麴丸 百二

腎著湯 百二

五高散 百三

仲吳茱萸湯 百三

八味湯 百四

白通湯 百四

五味子散 百四

厚朴溫中湯 九十

三生飲 九四

溫胃化痰丸 九八

復元丹 百二

簡腹脹方 百六

蟾蜍散 百十

桂附二陳湯 百十

七棗湯 百十

參附滲濕湯 百二

龍虎丹 百二

茵陳附子湯 百三

十高散 百三

良吳茱萸湯 百三

仲真武湯 百四

桃花湯 百四

二神丸 百五

大正氣散 九一

三生丸 九五

倍尤丸 九九

薛加減金匱腎氣丸 百三

丁香止痛散 百七

沉香桂附丸 百十

扶陽助胃湯 百十

冷湯 百十

七味滲濕湯 百二

活絡丹 百二

小茵陳湯 百三

五噎散 百三

吳茱萸散 百三

九寶丹 百四

漿水散 百四

薛四神丸 百五

強中湯 九二

五生丸 九六

丁香半香丸 百一

濟生實脾散 百四

勝金散 百八

椒附丸 百十

五味沉附湯 百十

生薑煎 百十

熨背散 百二

二至丸 百二

茵陳橘皮湯 百三

白朮聖散子 百三

吳茱萸丸 百四

四桂散 百四

附子茴香散 百四

薛四神丸 百五

此...

十

上海廣益書局印行

普林四神丸 百五
方肉豆蔻丸 百五

縮脾丸 百六

益志湯 百六

小己寒丸 百七

十補丸 百七

腎氣丸 百七

三層茴香丸 百八

外奪命丹 百八

黑錫丹 百九

卷五十九 固陣

壯礪散 一

黃耆湯 五

三妙湯 九

嬰粟丸 十三

金鎖丹 十七

集要四神丸 百五
陳肉豆蔻丸 百五

桂香丸 百六

局安腎丸 百六

局大己寒丸 百七

百選十補丸 百七

胡蘆巴丸 百七

奪命丹 百八

二氣丹 百八

紅丸子 百九

壯礪白朮散 二

寧肺散 六

九仙散 十

潤肺丸 十四

金鎖正元丹 十八

五味子丸 百五

訶梨勒丸 百五

陳麴丸 百六

小安腎丸 百六

元大己寒丸 百七

神應散 百七

丁香棟實丸 百八

良奪命丹 百八

半硫丸 百八

暄白朮散 三

安眠散 七

劫嗽丸 十一

辰砂妙香散 十五

金鎖思仙丹 十九

華撥丸 百五

厚朴丸 百六

萹蒨分清飲 百六

石刻安腎丸 百六

海己寒丸 百七

當歸生薑羊肉湯 百七

苦棟丸 百八

萬奪命丹 百八

養正丹 百八

神效參桂湯 四

百藥煎 八

五味子丸 十二

玉荆公妙香散 十六

金鎖匙丹 二十

玉鎖丹 二一

御玉鎖丹 二一

水陸二仙丹 二二

經驗金櫻丸 二三

經驗秘真丹 二四

鎖精丸 二六

固真丸 二七

固真丸 二八

濟生固真丸 二九

直固精丸 三十

固元丹 三一

秘元丹 三二

韭子丸 三二

家韭子丸 三三

小免絲子丸 三五

大免絲子丸 三六

濟生免絲子丸 三七

菝菟丸 三八

豬肚丸 三九

經驗豬肚丸 四十

三仙丸 四一

九龍丸 四二

小溫金散 四三

蓮子六一散 四四

威喜丸 四五

五子丸 四六

遠志丸 四七

豬苓丸 四八

泄瀉經驗方 四九

固腸丸 五十

白朮聖散子 五一

陳肉豆蔻丸 五二

固腸丸 五三

大斷下丸 五四

椿皮散 五五

桃花丸 五六

生地黄湯 五七

香梅丸 五八

勝金丸 五九

濟生烏梅丸 六十

縮泉丸 六一

四味肉蓯蓉丸 六二

固脬丸 六三

牡蠣丸 六四

茴香益智丸 六五

溺血方 六六

卷六十 因障

以下眼目方

當歸補血湯 一

益氣聰明湯 二

蔓荊子湯 三

益陰腎氣丸 四

濟陰地黄丸 五

神效黃耆湯 六

明目地黄湯 七

加減駐景丸 八

滋陰地黃丸 九

還睛散 十

八味還睛散 十一

還睛丸 十二

祖傳固本還睛丸 三十一
定志丸 十四

地芝丸 十五

助陽和血湯 十六

芎辛散 十七

明目細辛湯 十八

決明夜光散 十九

石斛夜光散 二十

瀉熱黃連湯 二一

黃芩黃連湯 二二

當歸龍胆湯 二三

芍藥清肝散 二四

蟬花散 二五

五味瀉白散 二六

明目羊肝丸 二七

黃連羊肝丸 二八

黃連天花粉丸 二九

密蒙花散 三十

春雪膏 三一

玄明春雪膏 三二

龍胆黃連膏 三三

立消膏 三四

黃連甘石膏 三五

黃連人參膏 三六

丹砂散 三七

清涼膏 三八

正傳光明丹 三九

青火金針 四十

赤火金鍼 四一

吹鼻六神散 四二

點鹽法 四三

洗爛弦風赤眼方 四四
全膏

傳爛弦歌 四五

搜風散 四六

拜堂散 四七

湯泡散 四八

收淚散 四九

去星 五十

眼目打傷青腫 五一

明目第一方 五二

以下耳病方

桂星散 五三

復元通氣散 五四

補腎丸 五五

聰耳益氣湯 五六

肉苁蓉丸 五七

聾耳明聾散 五八

聾耳流膿方 五九

白龍散 六十

百蟲入耳 六一

蜈蚣入耳 六二

暴聾灸法 六三

塞耳聾 六四

龍腦膏 六五

杏仁膏 六六

通氣散 六七

通耳法 六八

以下面鼻方

川芎散 六九

蒼耳散 七三

明防風湯 七七

細辛散 八一

千金瘰癧肉方 八五

酒瘰鼻粉瘰 八九

止衄方 九三

硝石散 九七

以下口舌方

玄參散 百一

甘露飲 百五

上清丸 百九

飛礬散 百十

丁香散 百十

綠雲散 百二

辛荑散 七十四

神愈散 七四

荊芥散 七八

葛蒲散 八二

簡易瘰癧肉方 八六

點痣去斑 九十

止衄散 九四

良通關散 九八

玄參升麻湯 百二

龍胆瀉肝湯 百六

礬砂丸 百十

寸金散 百十

應手散 百十

細辛黃柏散 百二

溫肺飲 七一

醍醐散 七五

腦漏秘方 七九

輕黃散 八三

白礬散 八七

面鼻雀斑 九一

鼻衄蒸法 九五

陳氏通關散 九九

清涼飲子 百三

五福化毒丹 百七

聖金散 百十

黃柏散 百十

陰陽散 百十

白礬黃柏散 百二

細辛膏 七二

良防風湯 七六

黃白散 八十

雄黃散 八四

二神散 八八

面唇二方 九二

鼻塞不通蔥熨法 九六

擦牙通關散 一百

清熱化痰湯 百四

冰柏丸 百八

金花煎 百十

升麻黃連丸 百十

外陰陽散 百十

礬砂散 百二

黃連朴硝散百二

絳雪九百二

聖口齒方百三

以下齒牙方

神功丸百三

立效散百三

芫花散百四

蟲牙痛百四

藜蘆散百五

麝香散百五

齒縫出血百五

石膏升麻散百六

槐頭散百六

御前白牙散百七

以下咽喉方

獨甘桔湯百七

柳華散百二

孫真人口瘡方百三

東清胃散百三

細辛煎百三

如神散百四

非子湯百四

北棗丹百五

神授丹百五

固齒雄鼠骨散百五

薑黃散百六

椒鹽散百六

東白牙散百七

拔甘桔湯百七

參甘桔湯百七

柳華散百二

孫真人口瘡方百三

摻口瘡百二

皂角散百三

秘驗清胃飲百三

驅毒飲百四

赴筵散百四

瑞竹堂方百四

青金散百五

黃連散百五

秘方雄鼠骨散百六

香鹽散百六

宣風牢牙散百六

道藏經方百七

加味甘桔湯百七

碧雪八百二

千金口鼻方百三

三安腎丸百三

丁香散百四

蟾酥膏百四

巴豆丸百四

三仙散百五

雄黃麝香散百五

荆槐散百六

牙宣散百六

青白散百六

取牙不煩手百七

訶子甘桔湯百七

清因秘隔散 百七

杏仁煎 百八

人參平補湯 百八

鐵苗丸 百九

奪命丹 百九

七寶散 百九

以下諸毒方

紫金錠 二百

八毒赤丸 二百

解一切食毒 九

鯉魚禽獸自死毒 三

金雞子毒 六

解毒草毒 二十

附子等毒 二

蔡蘆毒 八

中藥箭毒 二

消梨飲 百七

蜜附子 百八

百合丸 百八

雄黃解毒丸 百九

馬牙硝散 百九

破關丹 百九

三因解毒丸 二百

飲食中毒 二百

食魚中毒 十

食斑鳩毒 二

巴豆毒 二

烏頭草烏毒 二

雄黃毒 九

解鹽酒 三

透大一塊冰 百八

牛黃益金散 百八

竹衣麥門冬湯 百八

玉鑰匙 百九

燒鹽散 百九

通氣散 百九

藍根散 二百

中酒毒 七

河豚毒 二

中蟹毒 二

解花椒毒 二

解毗毒 二

半夏毒 六

杏仁毒 三

解漆毒 四

靛花丸 百八

秘方三黃丸 百八

射干丸 百八

二聖散 百九

開關散 百九

白扁豆散 二百

解麩毒 八

河豚狗肉毒 二

魚膽狗肉毒 二

食牛馬中毒 五

解諸菜毒 九

鈎吻毒 三

班蝥芫青毒 二

解服丹毒 一

解服丹毒 三

以下毒方

解虎傷毒_{二五}

避犬法_{九二}

解毒散_{二四}

蝎黃毒_{二四}

蚯蚓毒_{二五}

解射工溪毒_{二五}

丹砂丸_{九二}

麥麩散_{三二}

以下雜方

嗽烟筒_{二六}

擦牙烏鬚方_{二六}

四製川棟子_{二七}

溼散陰丸作痛_{二七}

涼血清腸散_{二八}

蟠龍散_{二八}

蛇毒_{二二}

糯米散_{四二}

馬咬傷毒_{二四}

蜂螫湯_{二四}

蚕咬毒_{二五}

雄黃丸散_{二五}

七寶丹_{二六}

桃生蟲毒簡易方_{二六}

靈寶烟筒_{二六}

便易擦牙方_{二六}

木香導氣丸_{二七}

薰尉脫肛方_{二八}

縮砂散_{二八}

伏龍肝散_{二八}

雄黃辟蛇毒_{二二}

定風散_{二四}

蜈蚣毒_{二四}

鼠咬毒_{二四}

蜘蛛咬毒_{二五}

大孔蟲瘡方_{二五}

蜜髓煎_{二六}

風犬毒_{二二}

諸犬咬蟲傷犬法_{二四}

誤吞蜈蚣_{二四}

誤吞水蛭_{二五}

神授散_{二五}

雄麝散_{二五}

歸魂散_{二六}

七寶美鬚丹_{二六}

疝氣神方_{二七}

去鈴丸_{二七}

薰洗脫肛法_{二七}

訶子人參湯_{二八}

獨蒜通便方_{二八}

北京烏鬚方_{二六}

神仙六子丸_{二七}

事後中寒腹痛_{二七}

參朮芎歸湯_{二八}

溼傷散_{二八}

小便不通方_{二八}

卷六十一 婦人

小便慈尉通便方 二八

燥囊牡蠣散 二九

龍腦上清丸 二九

香髮木秤油 三〇

雞內金散 二九

蒸洗陰囊散 二九

上清丸 二九

玉容散 三〇

狐腋氣五方 二九

梅蘇丸 二九

辟邪丹 二九

硫黃膏 三〇

脚汗牡蠣散 二九

冰梅丸 二九

福建香茶餅 三〇

安胎飲 一

良方當歸湯 五

良方黃耆湯 九

四味白朮散 十三

益母地黃湯 十七

四聖散 二一

枳殼散 二五

安榮散 二九

竹茹湯 三三

一母丸 三七

佛手散 四一

安胎散 二

良方阿膠散 六

良方鉤藤湯 十

全生白朮散 十四

良方獨聖散 十八

續斷湯 二二

鯉魚湯 二六

天仙藤散 三十

半夏茯苓湯 三四

東胎丸 三八

生花湯 四二

泰山磐石散 三

良方膠艾湯 七

良方白朮散 十一

探胎飲 十五

安胎寄生湯 十九

枳殼湯 二三

竹葉湯 二七

羚羊角散 三一

烏附湯 三五

茯苓丸 三九

當歸川芎湯 四三

地黃當歸湯 四

七味阿膠散 八

三味白朮散 十二

當歸芍藥湯 十六

二黃散 二十

滑胎枳殼散 二四

紫蘇飲 二八

人參橘皮湯 三二

千金保孕丸 三六

達生散 四十

加味芎歸湯 四四

當歸黃耆湯 四九

良牛膝散 四九

難產方 五三

廣濟下胎方 五七

硫黃散 六一

迴生丹 六五

丹溪斷子法 六九

母雞湯 七三

良方人參湯 七七

補脾飲 八一

良方黃龍湯 八五

玉露散 八九

金匱膠艾湯 九三

丹參散 九七

澤蘭湯 百一

澤蘭湯 百五

增損四物湯 百六

芎歸補中湯 四六

局黑神散 五十

桂心散 五四

扶羸小品方 五八

硫黃湯 六二

斷產法 六六

仲羊肉湯 七十

豬腰湯 七四

白茯苓散 七八

止汗散 八二

陳氏二母散 八六

良方漏蘆湯 九十

加味八珍湯 九四

玄胡當歸散 九八

薑黃散 百二

當歸沒藥丸 百七

保生無憂散 四七

局黑神散 五一

桂香散 五五

下死胎 五九

益母丸 六三

千金斷產方 六七

良羊肉湯 七一

四神湯 七五

七珍散 七九

麻黃根湯 八三

豬蹄湯 八七

括蕞散 九一

調養衛榮湯 九五

牛膝散 九九

溫經湯 百三

柏子仁湯 百八

人參黃耆湯 四八

經驗滑石散 五二

下胎小品方 五六

千金去胎方 六十

夏奪命丹 六四

斷產小品方 六八

黃雌雞湯 七二

大巖蜜湯 七六

良方起痛散 八十

二味參蘇飲 八四

湧泉散 八八

補肝散 九二

良方交加散 九六

良方交加散 一百

失笑散 百四

烏賊魚骨丸 百九

增損四物湯百十

人參當歸湯百十

槐榆散百十

子苓散百二

白芷散百二

芍藥散百三

琥珀丸百三

八珍益母丸百三

秘方烏雞煎丸百四

以下通用方

四君子湯百四

四物湯百四

人參理中湯百五

六味地黃丸百五

參蘇飲百六

梔子清肝散百六

奇效四物湯百十

一味防風湯百十

七灰散百十

防風黃芩散百二

海白芍藥散百二

通氣散百三

延年益嗣丹百三

烏雞丸百三

萬病丸百四

六君子湯百甲

八珍湯百四

逍遙散百五

八味地黃丸百五

人參敗毒散百六

八正散百六

良加減四物湯百十

龍骨散百十

糝灰散百二

越勞散百二

克應丸百二

四製香附丸百三

續嗣降生丹百三

又烏雞丸百四

四物二連湯百十

如聖散百十

柏葉散百二

歸神湯百二

滑石散百二

女金丹百三

河車種玉丸百三

唐氏烏雞丸百四

補中益氣湯百四

歸脾湯百五

七味白朮散百五

五積散百五

柴胡清肝散百六

犀角地黃湯百六

導赤散 百六

舒筋湯 百七

柴胡石膏湯 百七

二神散 百八

青娥丸 百八

卷六十二 小兒

秘補脾湯 一

觀音散 五

太和餅 九

平和飲子 十三

人參黃連散 十七

柴胡散 二一

錢氏黃龍湯 二五

二黃犀角散 二九

補肺散 三三

消食丸 三七

桃仁承氣湯 百六

交加散 百七

都梁丸 百七

小薊飲子 百八

獨參湯 百八

調中湯 二

助脾膏 六

團參散 十

調氣散 十四

燈花散 十八

柴苓散 二二

人參羌活散 二六

柴胡飲子 三十

錢氏阿膠散 三四

消乳丸 三八

玉燭散 百七

加味小柴胡湯 百七

瓜子仁湯 百七

海愈風湯 百八

奪命散 百八

調中丸 三

七味白朮散 七

調元散 十一

錢氏當歸散 十五

天麻散 十九

惺惺散 二三

牛黃散 二七

地骨皮散 三一

保和丸 三五

白餅子 三九

腎着湯 百七

良蜜酥煎 百七

子和通經散 百七

鎖精丸 百八

人參理中丸 四

白朮散 八

止汗散 十二

錢氏當歸散 十六

湯氏異攻散 二十

星蘇散 二四

錢氏生犀散 二八

天麻定喘湯 三二

大安丸 三六

宣風散 四十

人參養胃湯 四一

銀白散 四五

沉香散 四九

錢氏黃芩湯 五三

甯神湯 五七

清神湯 六一

鈎藤散 六五

地黃清肺飲 六九

十味安神丸 七三

萬龍腦安神丸 七七

琥珀散 八一

抱龍丸 八五

膽星天竺丸 八九

穠者牛黃丸 九三

刺鴛丸 九七

虎睛丸 一百

人參安胃散 四二

朱君散 四六

玉露散 五十

瀉腸散 五四

當歸養心湯 五八

錢氏酸棗仁湯 六二

錢氏鈎藤飲 六六

甘草湯 七十

硃砂安神丸 七四

鎮心丸 七八

針龍膽湯 八二

至聖保命丹 八六

溫白丸 九十

萬牛黃清心丸 九四

錢氏抑青丸 九八

五癩丸 百二

生附四君湯 四三

二順散 四七

六神散 五一

破故紙散 五五

錢氏養心湯 五九

黑附子湯 六三

柳肝散 六七

秘旨安神丸 七一

錢氏安神丸 七五

金箔鎮心丸 七九

梅花飲 八三

定命丹 八七

粉紅丸 九一

三味牛黃丸 九五

化痰丸 九九

斷癩丸 百三

釀乳法 四四

香朴散 四八

香橘餅 五二

陳肉豆蔻丸 五六

茯神湯 六十

鈎藤散 六四

大青膏 六八

七味安神丸 七二

安神鎮驚丸 七六

辰砂膏 八十

擦牙通關散 八四

九還金液丹 八八

錢氏牛黃丸 九二

涼驚丸 九六

比金丸 一百

消風丸 百四

妙聖丹 百五

生熟地黃丸 百九

七味肥兒丸 百十

當歸龍薈丸 百十

黃連丸 百二

靈脂丸 百二

壘氣丸 百二

史君子丸 百三

以下通用方

四君子湯 百三

八珍湯 百三

參朮湯 百四

參苓白朮散 百四

五君子煎 百五

參薑飲 百五

八味丸 百五

補銀丸 百六

蘭香散 百十

蘆薈肥兒丸 百十

良蘆薈丸 百十

胡黃連丸 百二

如聖丸 百二

紫霜丸 百三

白玉散 百三

六君子湯 百三

十全大補湯 百四

參朮膏 百四

理中湯 百四

理陰煎 百五

六味回陳飲 百五

胃關煎 百六

紫河車丸 百七

四味肥兒丸 百十

大蘆薈丸 百十

龍膽丸 百十

蟾蜍丸 百二

楊子丸 百二

化羸丸 百三

五味異攻散 百三

獨參湯 百四

參苓散 百四

生脈散 百四

溫胃飲 百五

六味異攻煎 百五

佐關煎 百六

大蕪荑湯 百八

六味肥兒丸 百十

加減蘆薈丸 百十

木香丸 百二

天麻丸 百二

消積丸 百二

下蟲丸 百三

四物湯 百三

歸脾湯 百四

參附散 百四

五福飲 百五

養中煎 百五

六味丸 百五

五德丸 百六

二陳煎百六

小和中飲百六

掃蟲煎百七

卷六十三 痘疹

保元湯一

陳氏托裏消毒散五

陳氏四聖散九

人參透肌散十三

當歸活血散十七

陳氏木香散二十一

升均湯二五

柴胡橘皮湯二十九

參蘇飲三三

桂枝葛根湯三七

雙解散四一

荆芥甘草湯四五

芍藥枳朮丸百六

四順清涼飲百六

調元湯二

解毒內托散六

加味四聖散十

十宣散十四

養血化斑湯十八

陳氏十二味異攻散二十二

升麻葛根湯二六

人參敗毒散三十

加減參蘇飲三四

十味羌活散三八

柴胡飲子四二

消毒散四六

枳朮丸百六

青州白朮子百六

內補湯三

參香內托散七

如聖湯十一

芎歸散十五

胃愛散十九

人參麥門冬散二三

蘇葛湯二七

荆防敗毒散三一

麻黃甘草湯三五

十三味羌活散三九

桂枝大黃湯四三

蟬退膏四七

大和中飲百六

瀉青丸百七

托裏散四

參耆四聖散八

人參固肌湯十二

活血散十六

三仙散二十

柴胡麥門冬二四

連翹升麻湯二八

柴葛敗毒散三二

柴胡桂枝湯三六

羌活湯四十

防風芍藥甘草湯四四

四味消毒飲四八

六味消毒飲 四九

消毒化斑湯 五十四

解毒湯 五一

真人解毒湯 五二

葛根解毒湯 五三

寶表解毒湯 五四

遼源解毒湯 五五

解毒防風湯 五六

化毒湯 五七

消風化毒湯 五八

涼血化毒湯 五九

犀角化毒丸 六十

五福化毒丹 六一

外五福化毒丹 六二

犀角散 六三

紫草化毒散 六四

紫草木香湯 六五

紫草飲 六六

紫草飲子 六七

紫草快斑湯 六八

紫草木通湯 六九

紫草散 七十

紫草膏 七一

紅棉散 七二

快斑湯 七三

快斑越婢湯 七四

快透散 七五

鼠黏子湯 七六

射于鼠黏子湯 七七

錢氏獨聖湯 七八

無價散 七九

三酥餅 八十

神應奪命丹 八一

萬氏奪命丹 八二

東垣涼膈散 八三

退火丹 八四

陳通關散 八五

元參地黃湯 八六

萬清肺飲 八七

導赤通氣散 八八

甘桔清金散 八九

加味甘桔湯 九十

大如聖飲子 九一

萬橘皮湯 九二

勻氣散 九三

前胡枳殼湯 九四

當歸丸 九五

百祥丸 九六

秦變百祥丸 九七

排毒散 九八

錢氏苦參丸 九九

稀痘丸 一百

稀痘酒 百一

三豆湯 百二

絲瓜湯 百三

辰砂散 百四

保嬰丹 百五

洗肝明目散 百六

洗肝散 百七

羊肝散 百八

蕪藜散 百九

蟬菊散 百十

秦皮散 百十

通神散 百十

卷之二

黃柏膏 百十

神隔蒜灸法 百十

茶葉方 百二

胭脂汁 百二

滅癩散 百二

雄黃散 百三

生肌散 百三

以下麻疹方

升麻湯 百三

萬氏胡四物湯 百四

門冬清肺湯 百四

透斑和中湯 百五

羌菊散 百五

以下通用方

人參理中湯 百五

柴歸飲 百六

痘疔散 百十

胡荽酒 百十

豬膽膏 百二

敗草散 百二

辟邪丹 百三

棉繭散 百三

馬鳴散 百三

升麻透斑湯 百四

生地黄湯 百四

清肺化斑湯 百四

解毒化滯湯 百五

四聖丹 百十

茵陳煎法 百十

百花膏 百二

白龍散 百二

砒法 百三

擦牙散 百三

葛根麥門冬湯 百四

清肺湯 百四

清金降火湯 百四

大青湯 百五

萬氏四聖散 百十

水楊湯 百十

蕎麥散 百二

救苦滅癩散 百二

蟬針法 百三

吹口丹 百三

萬氏麥門冬湯 百四

清肺消毒湯 百四

二母散 百五

羚羊角散 百五

六物煎 百五

疎邪飲 百六

九味異攻煎 百五

五積散 百六

四味清涼飲 百六
仲景黃芩湯 百六
益元散 百七

涼血養榮煎 百六
透邪煎 百六
黃芩散 百七

搜毒煎 百六
化斑湯 百七
導赤散 百七

犀角地黃煎 百六
小柴胡湯 百七

卷六十四 外科

仙方活命飲 一

托裏消毒散 二

秘方托裏散 三

神功托裏散 四

參耆托裏散 五

參耆內托散 六

托裏養榮湯 七

托裏黃耆湯 八

內補黃耆湯 九

托裏當歸湯 十

托裏建中湯 十一

托裏溫中湯 十二

托裏益中湯 十三

托裏溫經湯 十四

托裏益黃湯 十五

托裏清中湯 十六

托裏柳骨湯 十七

托裏榮衛湯 十八

內塞散 十九

定痛托裏散 二十

肉托復煎散 二一

肉托羌活湯 二二

托裏起鞠湯 二三

沖和湯 二四

神效酒煎散 二五

人參黃耆湯 二六

黃耆人參湯 二七

黃耆建中湯 二八

參朮補脾湯 二九

參耆補肺湯 三十

益氣養榮湯 三一

補陰八珍湯 三二

參朮薑附湯 三三

附子理中湯 三四

六物附子湯 三五

附子八物湯 三六

回陽湯 三七

薛加減八味丸 三八

加味地黃丸 三九

當歸川芎散 四十

加味敗毒散 四一

九味羌活湯 四二

加味羌活湯 四三

白芷胃風湯 四四

葛根牛蒡湯 四五

犀角地黃湯 四六

犀角升麻湯 四七

元參升麻湯 四八

升麻黃連湯 四九

當歸散 五三

乳香定痛丸 五七

連翹消毒散 六一

散腫潰堅湯 六五

梅花飲子 六九

內固金粉散 七三

奪命丹 七七

梔子仁湯 八一

濟陰湯 八五

五利大黃湯 八九

內疏黃連湯 九三

漏蘆升麻湯 九七

破棺丹 百一

蒲公英酒 百五

桑枝煎 百九

連翹湯 五十

方脈流氣飲 五四

消毒散 五八

加味解毒湯 六二

瓜蒌托裏湯 六六

牛膠飲 七十

蠟礬丸 七四

飛龍奪命丹 七八

味梔子仁湯 八二

地骨皮散 八六

清涼飲 九十

桃仁湯 九四

潤腸丸 九八

忍冬酒 百二

遠志酒 百六

神仙截法 百十

瘡科流氣飲 五一

五香連翹湯 五五

清熱消毒散 五九

解毒防風散 六三

萬金散 六七

明膠飲子 七一

千金化毒丸 七五

回生丹 七九

清肝益榮湯 八三

一味苦參丸 八七

宣毒散 九一

漏蘆湯 九五

沒藥丸 九九

金銀花酒 百三

牛膝酒 百七

砒法 百十

復元通氣散 五二

陳氏獨聖散 五六

黃連消毒散 六十

陳氏解毒防風湯 六四

製甘草湯 六八

護心散 七二

五福化毒丹 七六

通氣散 八十

清心湯 八四

陳氏苦參丸 八八

拔毒散 九二

千金漏蘆湯 九六

當歸丸 一百

槐花酒 百四

消癭酒 百八

刺少商法 百十

洪丞相蜈蚣法百十

豆豉餅百十

蔥熨法百二

大黃獨毒散百二

豬蹄湯百二

陰陽散百三

迴龍玉龍膏百三

乳香定痛散百四

代鍼膏百四

生肌散百四

參五味子湯百五

升麻湯百五

知母茯苓湯百六

牡丹皮散百六

槐花散百六

射干連翹湯百七

騎竹馬灸法百十

木香餅百十

神仙薰照法百二

集香散百二

草烏揭毒散百三

神功散百三

沖和膏百三

烏金膏百四

替鍼丸百四

收口摻藥百五

四順散百五

如金解毒散百五

四味排膿散百六

梅子湯百六

除溼和血湯百七

如神散百七

隔蒜灸法百十

香附餅百十

洗藥神效散百二

敷藥方百二

抑陰散百三

清涼救苦散百三

麥飯石膏百三

透骨丹百四

三合散百四

桔梗湯百五

合歡飲百五

如聖拓黃湯百五

八味排膿散百六

大黃湯百六

夏枯草湯百七

遇仙無比丸百七

附子餅百十

秦枝灸百二

雄黃解毒散百二

圍藥鐵井欄百十

抑陽散百三

二黃膏百三

黑末子百四

鐵頭散百四

藜蘆膏百四

濟桔梗湯百五

紫苑茸湯百五

葶蘆散百六

蒼以仁湯百六

射干湯百六

必效散百七

肘後治癩方百七

神效閉結散 百七

神效瓜蔓散 百八

羌活白芷散 百八

升麻和氣散 百八

烏金散 百九

滑石散 百九

換肌消毒散 百九

茯苓膏 百九

牡蠣丹 百九

加味托裏湯 百九

壩腫湯 百九

臭椿皮散 百九

三品錠子 百九

蝟牛膏 百九

秘傳正骨丹 百九

花蕊石散 百九

生地黃丸 百七

海藻散 百八

胡麻散 百八

當歸飲 百九

蛇床子散 百九

仙遺糧湯 百九

五寶丹 百九

牛黃雙解散 百九

十全大補湯 百九

白芷升麻湯 百九

秦羌防風湯 百九

羊腰膏 百九

芫花線 百九

本事接骨方 百九

黑丸子 百九

昆布丸 百七

連翹飲子 百八

四生散 百八

羌活當歸散 百九

金黃散 百九

土草解毒湯 百九

蠲痺解毒散 百九

楊柳癰漏方 百九

內托羌活湯 百九

五味當歸散 百九

痔漏腸紅方 百九

豬臟丸 百九

水銀棗子膏 百九

枯痔水澄膏 百九

沒藥降聖丹 百九

封口藥 百九

清肝解鬱湯 百八

積蘇散 百八

一掃散 百九

白粉散 百九

五茄皮湯 百九

七貼方 百九

會腹散 百九

加味瀉肝湯 百九

婦人陰瘡 百九

地榆散 百九

痔瘡方 百九

熊膽膏 百九

如金千金方 百九

十味沒藥丸 百九

當歸導滯散 百九

上海英大書局印行

復元活血湯 二百四十

龍骨散 二十四

卷跌閃腫痛 八十四

治授傷 二五

蘇養酒 二五

羌活防風湯 二百六十

蜈蚣散 二六

樺皮散 二六

寶換肌散 二七

防風天麻丸 二七

黑虎丹 八十二

烏頭湯 八十二

臘梨疔 八十二

白虎丹 二九

手足甲疽 六二九

二味隔紙膏 三百

金瘡方 二四

桃花散 二四

洗損傷方 九二四

杖瘡四方 二五

防風湯 七二五

大芎黃湯 二六

破傷風法 二六

升麻湯 九二六

通天再造散 二七

行藥方 二七

苦參酒 二八

數鷓鴣方 二八

瘡瘡二方 九二八

紫白痕風 三二九

坐板瘡 七二九

爛腿瘡久不愈 三百

金瘡降真散 二四

刀瘡鐵打經驗方 六二四

箭鏃竹木刺方 五二五

諸骨諸物鯁 四二五

白朮防風湯 八二五

玉真散 二六

海藏愈風丹 六二六

醉仙散 七二六

白花蛇丸 四二七

皂角散 八二七

硫黃酒 二二八

洗瘍方 六二八

頭面黃水肥瘡 九二八

汗斑四方 四二九

膿瘡神效膏 八二九

凍瘡方 三三〇

金瘡灰蛋散 二四

損傷敷灸法 七二四

卷跌打火棍湯 二五

破傷風敷藥 五二五

羌活湯 九二五

養血當歸地 二六

二聖散 七二六

子浮萍散 二七

和浮萍散 二七

白花蛇膏 二七

雷丸散 九二七

七珍湯 三二八

梅花白癩 七二八

諸癬疥頑瘡 二九

添瘡 五二九

隔紙膏 九二九

湯火六方 三三〇

湯火至聖膏_{三百}

加味太乙膏_{三百}

阿魏膏_{三百}

消痞膏_{三百}

大龍膏_{三百}

碧油膏_{三百}

四君子湯_{三百}

八珍湯_{三百}

獨參湯_{三百}

當歸補血湯_{三百}

錢七味白朮湯_{三百}

六味丸_{三百}

大防風湯_{三百}

二陳湯_{三百}

不換金正氣散_{三百}

湯火止痛散_{三百}

會通膏_{三百}

硃砂散_{三百}

琥珀膏_{三百}

趙府膏_{三百}

長肉膏_{三百}

六君子湯_{三百}

十全大補湯_{三百}

人參養榮湯_{三百}

黃耆六一湯_{三百}

陳氏五味子湯_{三百}

八味丸_{三百}

十宣散_{三百}

小柴胡湯_{三百}

加味道暹散_{三百}

小兒丹毒_{三百}

神效膏_{三百}

神效當歸膏_{三百}

貼痞琥珀膏_{三百}

蜜陀膏_{三百}

保養元氣膏_{三百}

加四君子湯_{三百}

補中益氣湯_{三百}

五味真功散_{三百}

參朮膏_{三百}

參附湯_{三百}

陳加減八味丸_{三百}

薛氏四聖丸_{三百}

小青龍湯_{三百}

防風通聖散_{三百}

小兒鵝口_{三百}

清涼膏_{三百}

攻堅敗毒膏_{三百}

水紅花膏_{三百}

八仙紅玉膏_{三百}

煮香松法_{三百}

四物湯_{三百}

歸脾湯_{三百}

生脈散_{三百}

聖愈湯_{三百}

人參理中湯_{三百}

還少丹_{三百}

五積散_{三百}

人參敗毒散_{三百}

消風散_{三百}

詳評景岳全書卷五十二終

犀角散四三六

柴胡清肝散八三六

東垣清胃散二二七

瀉青丸六三七

八正散三三八

玉燭散四三八

失笑散八三八

黃連解毒湯五三六

加龍膽肝湯九三六

竹葉石膏湯三三七

大蘆薈丸三三七

清肺飲一三八

人參平肺散三三八

槐角丸九三八

普濟消毒湯六三六

清心蓮子飲七三六

竹葉黃耆湯四三七

五苓散八三七

盜元散二三八

尊經瀉肺湯三三八

紫金錠九三六

梔子清心散七三六

黃芩清肺飲一三七

滋腎丸五三七

五淋散九三七

四順清涼飲三三八

枳殼散七三八

良方通關散一三九

景岳全書卷五十二終

加批
詳評
景岳全書

卷五十三

圖集

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

古方八陣

補陣

四君子湯一 治脾胃虛弱。飲食少思。或大便不實。體瘦面黃。或胸膈虛痞。吞酸痰嗽。或脾胃虛弱。善患瘧痢等症。

人參 白朮

茯苓

炙甘草 一錢

加薑棗。水煎服。或加粳米百粒。

加味四君湯二

治痔漏下血。面色痿黃。怔忡耳鳴。脚軟氣弱。及一切脾胃氣虛。口淡食不知

味。又治氣虛不能攝血。以致下血不禁。

人參 白朮

茯苓

炙甘草

黃耆 白扁豆

此開胃

右水煎服。或為末。每服

三錢。滾湯調服。

生附四君湯三

方在小兒四三。

治脾胃虛寒吐瀉。

五味異功散四

治脾胃虛寒。飲食少思。嘔吐。或久患咳嗽。面浮氣逆。腹滿等症。

人參 白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

此即四君子湯加陳皮也。○右加薑棗。水煎溫服。

六君子湯五 治脾胃虛弱。飲食少思。或久患瘧痢。或食飲難化。或嘔吐吞酸。或咳嗽喘促。若虛大等症。須加炮薑。其功尤速。

即前四君子湯。加陳皮。半夏。各一錢五分。

加味六君子湯 六

補用古方治病。運用之妙。存乎其人。何勞加減。且既云古方。不必加減。

治一切脾胃虛弱。泄瀉。及傷寒病後。

米穀不化。腸中虛滑。發渴微痛。久不瘥者。及治小兒脾疳瀉痢。

人參 白朮 黃耆 山藥 甘草 白茯苓 砂仁 厚朴 肉豆蔻 各一錢 右每

服一兩。用水煎服。或為細末。用米湯調服二錢。不拘時。

香砂六君子湯 七 治過服涼藥。以致食少作嘔。或中氣虛滯。惡心脹滿等症。

人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮 砂仁 藿香 炙甘草 各一錢 右薑水溫服

局四物湯 八 治血虛營弱。一切血病。當以此為主。

熟地黃 當歸 川芎 芍藥 水二鍾煎服。

薛加味四物湯 九 即前方加山梔。柴胡。丹皮。

氏加味四物湯 十 治血熱陰虛諸痿。四肢軟弱。不能舉動。

當歸 一錢 五味子 九粒 熟地 三錢 麥冬 黃柏 蒼朮 白芍藥 川芎 各七人參 黃

連 各五分 杜仲 七分 牛膝 足不與知母 各三分 水二鍾煎一鍾。空心溫服。酒糊丸服亦可。

垣加減四物湯 十一 方在寒陣九。治腸風下血。

解柴胡四物湯十二 治日久虛勞微有寒熱脈滑而數者

當歸 熟地 芍藥 川芎 各錢半 柴胡八分 人參 黃芩 半夏 甘草各三錢 加生薑三

片水煎服

萬葉胡四物湯十三 方在瘰癧一四三 治瘰癧後餘熱

奇效四物湯十四 方在婦人百十一 治肝經虛熱血崩

增損四物湯十五 方在婦人百十 治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯十六 方在攻陣二六 治血虛臟結

良加減四物湯十七 方在婦人百十二 治婦人血積

四物二連湯十八 方在婦人百十三 治婦人陰虛內熱

局八珍湯十九 治氣血兩虛調和陰陽 即前四君子四物湯相合也 本方加黃柏知母

即名補陰八珍湯方見外科三二

十全大補湯二十 治血氣俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困倦眩暈驚悸嘔吐作渴遺精白

濁二便見血小便短少便泄閉結喘欬下墜等症 即前八珍湯加黃耆肉桂各一錢

局人參養榮湯二一 治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦倦食少作瀉口乾心悸自汗等症

人參 黃耆 當歸 白朮 炙甘草 桂心 陳皮 各一錢 熟地 五味 茯苓 各七

錢半 遠志五分 加黃耆水煎服

小建中湯 二二

治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等症。

炙甘草 桂枝

生薑各三兩 大棗十二枚 芍藥六兩 膠飴一升

右六味以水七升煮取三升

去渣內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也○按此即桂枝湯加膠飴也今方俱改兩為錢而以阿膠代膠飴殊失本方之妙矣

金匱大建中湯 二二

治胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝上下疼痛不可觸近

人參 二兩 蜀椒 二兩

去汁 乾薑 四兩 膠飴 右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微

火煎取一升半分二次溫服如一炊頃可食溫粥覆之

補十四味大建中湯 二四

治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛及榮衛失調積勞虛損形體羸

瘠短氣嗜卧漸成勞瘵者

人參 白朮 茯苓 甘草

肉桂 當歸 白芍 熟地 黃耆 肉桂 附子 炮 麥

冬 半夏 肉蓯蓉

酒浸各等分 右咀每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分空心溫服

八味大建中湯 二五

治中氣不足手足厥冷小腹掣急或腹滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇

乾精出寒熱煩冤四體痠痛及無根失守之火出於肌表而為疹為斑厥逆嘔吐等症

人參 甘草

炙各一錢 黃耆 炙當歸 芍藥 酒炒 桂心 各二錢 半夏 附子 製各二錢 右咀每服五

錢水二鍾薑三片棗二枚煎七分食前服

人參建中湯 二六

治虛勞自汗 即前小建中湯加人參二兩煎法同

黃耆建中湯 二七

治諸虛羸瘠百病。即前小建中湯加黃耆一兩五錢。煎法同。

當歸建中湯 二八

治婦人血虛自汗。即前小建中湯加當歸二兩。煎法同。

三味建中湯 二九

治表虛自汗。

芍藥 二錢 甘草 一錢 官桂 五分

薑三片。棗一枚。水煎服。

東補中益氣湯 三一

治勞倦傷脾。中氣不足。清陽不升。外感不解。體倦食少。寒熱瘧痢。氣虛不能攝血等症。

人參 黃耆 炒白朮 炒甘草 錢半 各當歸 一錢 陳皮 五分 升麻 柴胡 各三分 右加薑棗水空

心午前服。

東調中益氣湯 三二

治溼熱所傷。體重煩悶。口太澀味。或痰嗽稠粘。寒熱不調。體倦少食等症。

黃耆 一錢 人參 炙甘草 蒼朮 各五分 橘紅 木香 柴胡 升麻 各二分 水煎空心服

○一方有白芍三分。五味十五粒。

歸脾湯 三三

治思慮傷脾。不能攝血。致血妄行。或健忘怔忡。驚悸盜汗。嗜卧少食。或大便不

調。心脾疼痛。瘡癩鬱結。或因病用藥失宜。剋伐傷脾。以致變證者。最宜用之。

人參 黃耆 白朮 茯苓 棗仁 各二錢 遠志 當歸 各一錢 木香 炙甘草 各五分 水二鍾

加圓眼肉七枚。煎七分。食遠服。○愚意此湯之用木香。特因鬱結疼痛者。設如無痛鬱等證。

必須除去木香。以避香燥。豈不發氣。虛動者為尤善乎。又遠志味辛。氣升而散。凡多汗而

必須除去木香。以避香燥。豈不發氣。虛動者為尤善乎。又遠志味辛。氣升而散。凡多汗而

燥熱者亦宜酌用。補本香 燥熱者亦宜酌用。燥古人立方有洲石開用遠志交通心腎何慮其熱肉有參芪可以因汗

桂附且用之

加味歸脾湯 三四

治脾經血虛發熱等症。即方加柴胡山梔各一錢。

人參湯 三五

治吐血咯血後宜服。并治血虛。

人參 一兩為

五更時用雞黍清調和。凡二錢。茶是抄服。服訖卻卧。參盡則效。

愚意此方固佳。其或有惡腥者。但以真牛乳釋其熱。或溫飲之。瘦於雞子清。凡無火及

微火者。豈不更妙。一方治吐血。血不止。用人參為末。以雞子清投新汲水攪勻。調服一

二錢。

獨參湯 三六

治諸氣虛氣脫。及反胃嘔吐喘促。粥湯入胃即吐。凡諸虛證垂危者。用人參

二兩。水一升。煮取四合。乘熱頓服。日再進之。兼以人參煮粥食之。尤妙。補藥與穀食各不

然穀氣更

奪命散 三七

治傷寒瘧疾。陰陽不明。或誤用藥。致病愈困。煩躁發渴。及婦人胎前產後受熱

瘴疾。

上黨人參 七錢

水二鍾。煎一符。去渣。連罐浸新汲水中。取冷一服。而盡。若鼻上有汗。滴尤

妙。

蘇氏參附湯 三八

治真陽不足。上氣喘急。呃逆自利。臍腹疼痛。手足厥冷。噤惡不食。自汗盜汗。

氣短頭暈等症。

人參 製附子 用須參倍於附。或等分。不拘五錢或一兩。酌宜用。薑水煎服。良方有丁

香十五粒。名加減參附湯。

參歸湯 三九 此即團參散。見小兒門十。亦名人參湯。見婦人門七七。○治心虛盜汗。

人參 當歸 等分 右先用豬心一枚。破作數片。煎湯澄取清汁。煎藥服。

參朮膏 四十 治中氣虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。耗傷元氣。虛發蜂起。但用此藥補其中

氣。諸症自愈。

人參 白朮 等分 用水煎膏化服之。○一方用白朮一片。人參四兩。切片。以流水十五碗

浸之一宿。桑柴文武火煎。取濃汁。再用重湯熬膏。入真白蜜收之。每以白湯點服。

參朮湯 四一 治氣虛顛掉。泄瀉嘔吐等症。

人參 白朮 黃耆 各二錢 白茯苓 陳皮 炙甘草 各一錢 甚者加附子一錢。水二鍾。煎八

分。食遠服。

仲朮附湯 四二 一名白朮附子湯。治中寒中氣不足。四肢逆冷。口禁牙關緊急。痰厥脈弱。

風虛頭眩頭重。苦極不知食味。

白朮 二兩 炙甘草 二兩 附子 一兩半 炮去皮

溫服。或用此化蘇合丸。連進三服。效。 每用五六錢。薑五片。棗一枚。水一鍾半。煎七分。食遠

服。或用此化蘇合丸。連進三服。效。

生黃耆附湯 四三 治寒溼腰痛重冷小便自利。

白朮炒製附子各一兩杜仲炒半兩右咀每服四錢入薑煎服。

麻者附湯 四四 治氣虛陽弱虛汗倦怠。

黃耆蜜炙製附子等分每服四錢水一鍾薑五片煎六分食遠服。

當歸補血湯 四五 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴目赤面紅脈大而虛重按全無。

及病因飢飽勞役者。

黃耆兩一當歸三錢水一鍾半煎八分食遠服。

生黃耆湯 四六 治喜怒驚悸房勞致陰陽偏虛者或自汗盜汗不止。

黃耆蜜炙熟地 白茯苓 天門冬 麻黃根 肉桂 龍骨各一錢小麥炒五味子 防風

各八分 當歸 炙甘草各七分水二鍾薑三片煎服。○如冷汗加熟附子二片發熱自汗加石

斛一錢。

良黃耆湯 四七 方在婦人丸。安胎治腹痛。

魏大補黃耆湯 四八 治虛弱自汗。

人參 白茯苓 肉蓯蓉 熟地各一錢黃耆 白朮 當歸 山茱萸 防風各八分炙甘草

肉桂各四分五味子十一粒水一鍾半加薑三片棗一枚煎七分不拘時服。

東神效黃耆湯 四九 治渾身或頭面手足麻木不仁目緊縮小及羞明畏物視物不明。

黃耆 二錢 人參 八分 炙甘草 一分 蔓荊子 各一錢 芍藥 各一錢 陳皮 五分 水煎臨卧熱服如麻木不

仁雖有熱證不用黃柏但加黃耆。

黃耆六一湯 五十 治陰陽俱虛盜汗。

黃耆 六錢 炙甘草 一錢 水一鍾半煎八分食遠服。

玉屏風散 五 治表虛自汗。

黃耆 蜜炙 防風 各一錢 白朮 炒二錢 水一鍾薑三片煎服。

浪潤神散 五 治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗疲倦煩躁。

人參 麥門冬 黃耆 桔梗 淡竹葉 炙甘草 等分 右每服一兩水煎服○如自汗

加小麥同煎。

當歸六黃湯 五 方在寒陣六五。治陰虛血熱盜汗神效。

參苓散 五 治睡中汗出。

人參 酸棗仁 白茯苓 各等分 右為細末每服三錢食遠米飲調下大人小兒皆可服。

參苓白朮散 五 治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉或久瀉或大病後調助脾胃。

人參 山藥 炒 白扁豆 去皮薑汁炒 蓮肉 去心各一斤 白朮 二斤米泔浸炒 桔梗 炒 黃砂仁 薏仁 炒 白茯苓

去皮 炙甘草 各一 右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸桐子大每

服七八十九空米飲白湯任下。

七味白朮散 五六

方在小兒七。○治脾虛熱渴。

醫錄生脈散 五七

治熱傷元氣。肢體倦怠。氣短口渴。汗出不止。或金為大制。水夫所生。而致效。

嗽喘促。肢體痿弱。脚軟眼黑等症。

人參 五錢 麥冬 五味子 各二錢

水煎服。○此方以生脈為名。故俗醫之治脈脫者。每多用。

此是豈知脈脫由陽氣。豈麥冬。五味子之所宜乎。

補肺為氣之主。熱傷氣。故用麥冬。清大器。脈脫者。益氣。兼真。見亦淺矣。

人立方之意深矣。

五味子湯 五八

治喘促脈伏而數。或虛煩作渴。

五味子 一錢 人參 麥冬 杏仁 橘紅 各一錢

水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。無時服。

陳氏五味子湯 五九

治腎水涸枯。口燥舌乾。

五味子 麥門冬 各一兩 黃耆 炒三兩 人參 二兩 甘草 錢五

右每服五錢。水煎。日夜服數劑。

人參胡桃湯 六十

治喘急不能卧。

人參 一錢 胡桃肉 五枚 炮 水一鍾。半薑三片。棗一枚。煎八分。食後溫服。

丹瓊玉膏 六一

治虛勞乾嗽。或好酒者久嗽。尤效。

人參 十二兩 白茯苓 十五兩 白蜜 五斤 琥珀 沉香 各五兩 大生地 十斤 以銀石器 右先以地

黃汁同蜜。熱沸攪勻。用蜜絹濾過。將人參等為極細末。和蜜汁入磁瓶內。用綿紙十餘層。加箬封瓶口。入砂鍋或銅鍋。以桑柴大長流水。沒瓶煮三晝夜。取出。換油蠟紙。封口。懸浸。

升中半日。以出大氣。提起仍煮半日。以去水氣。然後收藏。每日清晨及午後。取三茶匙。用溫一兩許調服。或白湯亦可。製須淨室。忌雜夫婦人。○本方原無琥珀沉香二味。乃臞仙加入者。云奇效異常。今并錄其方。

補肺湯六二 治夢嗽

人參 黃耆 北五味 紫菀各七 熟地黄 桑白皮各錢 水二鍾。煎八分。入蜜少許。食

遠溫服。

湯甯肺湯六三 治榮衛俱虛。發熱自汗。欬嗽痰涎。肺氣喘急。唾膿。

人參 茯苓 當歸 白芍藥 白朮 甘草 川芎 熟地黄 麥門冬 五味 桑白

皮各七 阿膠炒一錢 水二鍾。薑三片。紫蘇五葉。煎八分。食遠服。

聖寧肺散六四 方在固陣六。治久嗽收瀆之劑。

鳳髓湯六五 治欬嗽大能潤肺。

牛髓一斤 白蜜半斤 乾山藥四兩 杏仁四兩 去皮 胡桃仁兩 另研 右將牛髓白蜜。用砂

鍋煎沸。以絹濾去渣。盛磁瓶內。將杏仁等三味同入瓶內。以紙密封瓶口。重湯煮一日。夜取

出冷定。每空心以白湯化服一二匙。

良蜜酥煎六六 治欬嗽胸痛。上氣喘壅。此為邪搏於肺。氣不宣通。故欬而喘。氣上逆。面目浮

腫。此方非獨治嗽。兼補虛損。去風燥。悅肌膚。婦人服之尤佳。

白沙蜜一升。牛酥一升。杏仁三升去皮。右將杏仁於磁盆內。用水研取汁五升。以淨銅鍋先傾汁三升。熱減其半。又傾汁二升。再以微火熬減至一升許。即入蜜酥二味。煎熟其藥乃成。貯於淨瓶磁器中。每日三次。以溫酒或米飲白湯調服一匙。服至七日。唾色變白。二七唾稀。三七嗽止。

醍醐膏六七

治一切瘀血肺疾。用好牛酥五斤。鎔三遍。凝取膏出。醍醐含服一合即瘥。

方黃者散六八

治嗽久勞嗽唾血。

黃耆

蜜炙糯米炒

阿膠炒等

右為細末。每服二錢。未飲調下。

韋五味黃耆散六九

治咳嗽咯血成勞。眼睛疼痛。四肢困倦。脚膝無力。

五味子

人參

芍藥

甘草各五錢

桔梗各錢

熟地

麥冬各一錢

水二鍾煎八分。

食後溫服。

黃耆益損湯七十

治男婦諸虛百損。五勞七傷。骨蒸潮熱。百節疼痛。盜汗驚惕。咽燥唇焦。憔悴無力。咳嗽多痰。咯吐衄血。寒熱往來。頰赤昏倦。少食。服熱藥則熱煩躁滿。服寒藥則膈滿。

腹痛及大病後榮衛不調。或婦人產後血氣未足。俱宜服此。

人參

黃耆

當歸

熟地黃

白朮

川芎

芍藥

麥冬

味子

木香

石斛

肉桂

丹皮等分

右咀

每服一兩水

一鍾。平薑五片。棗二枚。小麥

五十粒。烏梅一個。煎七分。食前服。

元地黃散 七一 治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮 枸杞子 右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下不拘時

脾柔脾湯 七二 治虛熱吐血衄汗出

甘草 炒 芍藥 炒 黃耆 各半兩 熟地黃 兩半 右每服五七錢水煎服世治吐血並用竹茹

地黃藕汁童便此亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理宜涼解以大黃犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰須當溫散仲景治吐衄一熱自有兩方宜乾薑肉桂

或理中湯之類

煉麥門冬飲子 七三 治吐血久不愈者

麥門冬 黃耆 各錢 一人參 歸身 生地 各錢 五味子 十粒 右以水煎服

拔麥門冬飲子 七四 治脾胃虛氣促氣弱精神短少衄血吐血氣虛不能攝血者

麥冬 當歸 芍藥 紫菀 各錢 一人參 黃耆 各錢 甘草 五分 五味子 九粒 水二鍾煎一

鍾食後服

家麥門冬飲 七五 方在寒陣四七 治虛火效嗽陰虛勞損

麥門冬湯 七六 方在寒陣四四 治肺熱效嗽見血

凡麥門冬湯 七七 方在痘疹一四二 治表邪內熱效嗽

麥門冬散 七八 治鼻衄

麥門冬

生地各一錢

白芍藥

蒲黃各二錢

水二盞

薑三片

煎八分

食後溫服

旋神飲七九

治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗煩躁咳嗽吐血瘦劇困倦

人參

白朮

黃耆

當歸

熟地黃

麥門冬

白芍藥

茯神

白茯苓

蓮肉

五味子

炙甘草

桔梗

半夏各五分

水一鍾

半紅棗一枚

烏梅一箇

煎七分

食遠服

如嗽加阿膠

胸滿加木香

以淫紙包炮用

或加沉香亦可

如不思飲食

加扁豆炒用

續養心湯

八十

治體質素弱

或病後思慮過多

心虛驚悸不寐

歸身

生地

熟地

茯神各一錢

人參

半錢

麥冬

幾半

棗仁

柏子仁各八分

炙甘草

四分

五味子十五粒

加燈心蓮子

水煎八分服

養心湯

八一

方在小兒五九

治心虛驚癇

正心湯

八二

治七情五志久逆

心風妄言妄笑

不知所苦

人參

當歸

酒洗

生地黃

茯神各一錢

羚羊角木

棗仁炒研

甘草

遠志製各八分

水一鍾

半蓮子七枚

煎七分

入羚羊角末

麝香半分

和勻食後臨卧服

開心散

八三

治好忘

後定志丸稍勝於此

百十七

人參

遠志各二錢

石菖蒲

一兩

白茯苓

二兩

右為細末

每服一錢

食後米飲調下

局茯苓補心湯

八四

治心慮過多

心神煩亂

煩躁不寐

白茯苓

白茯神

麥門冬

生地黃

當歸

半夏

陳皮

各一錢

甘草五分

右加竹

葉煨心同煎服。

酸棗仁湯八五 治病後氣血俱虛。內亡津液。煩熱諸虛不眠者。

棗仁微炒人參各一錢麥冬三錢竹茹二錢加龍眼肉五枚煎服無時。

酸棗仁湯八六 治心腎水火不交。精血虛耗。痰飲肉蓄。怔忡恍惚。夜卧不安。

棗仁 遠志 黃耆 白茯苓 蓮肉去心 當歸 人參 茯神各一錢 陳皮 炙甘草各五分

水一鍾半。加生薑三片。棗一枚。煎七分。日一服。臨卧一服。

酸棗仁湯八七 治虛勞虛損不得眠。

酸棗仁二升 甘草一兩 知母 茯苓 川芎各二兩 深師方仍有生薑二兩 石五味 以水

八升。煮酸棗仁得六升。肉諸藥。再煮取三升。分温三服。

酸棗仁湯八八 方在小兒六二。治心肺虛熱煩躁。

遠志湯八九 治心虛煩熱。夜卧不甯。及病後虛煩。

遠志黑豆甘草 黃耆 當歸 麥冬 棗仁炒 石斛各錢 人參 茯神各七 甘草五分 水二

鍾煎八分。食遠服。煩甚者。加竹葉。知母。

遠志飲子九十 治心勞虛寒。夢寐驚悸。

遠志肉 茯神 人參 當歸 酒浸 棗仁 黃耆 肉桂各一兩 甘草五錢 右咬咀。每服

一兩水一鍾半。薑五片。煎服無時。

聖愈湯九一 治血虛心煩。睡卧不甯。或五心煩熱。

人參 川芎 當歸 熟地黃酒拌 生地黃酒拌 黃耆各一錢 右水煎服。

養榮湯九二 治思慮過度。心血耗傷。怔忡恍惚不寐。

人參一錢 芍藥 棗仁 柏子仁各五分 當歸 黃耆 茯神各一錢 紫石英五分 遠志 甘草

木香各三分 水一鍾半。薑三片。棗一枚。煎八分服。

元道遙散九三 治肝脾血虛。及鬱怒傷肝。少血目暗。發熱脇痛等症。

當歸 芍藥 白朮 茯神 甘草 柴胡各等分 右薑水煎服。

薛加味道遙散九四 治脾肝血虛發熱。小水不利。即前道遙散。加丹皮。梔子各七分。

生薑汁煎九五 治噎食不下。咽喉閉塞。胸膈煩悶。

生薑汁 白蜜 牛酥各五兩 人參 百合各二兩 右入銅銚中。以慢火熬膏。每用一二匙。用

人參百合湯調下。或噎下。

局胃風湯九六 治風冷乘虛入客腸胃。水穀不化。泄瀉注下。及腸胃濕毒如豆汁。或下瘀血。

日夜無度。

人參 白朮 茯苓 當歸 川芎 白芍藥 肉桂等分 右為粗散。每服二錢。入粟米

數粒同煎。食前服。此方名為治風。而實非治風。乃補血和血益胃氣之藥。下血痢而挾虛者。

實可倚仗。出太陽桂苓湯例藥也。

退十寶湯 九七 治冷痢虛甚下物如魚腦三服愈

黃耆錢四 熟地黃 人參 白朮 白芍藥 當歸 茯苓 半夏 五味子 肉桂錢一

甘草錢五 水一鍾薑三片為梅一箇煎七分食遠服

良當歸黃耆湯 九八 治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸炒黃耆各一兩 糯米一合 水二鍾煎一鍾溫服

局大防風湯 九九 治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內侵患鶴膝附骨等症不問已潰未潰宜

先用此及治痢後脚膝腰痛不能動履名曰痢後風此藥祛風順氣活血壯筋骨行履如故

人參 白朮 防風 羌活錢各二 黃耆錢一 熟地 杜仲錢各二 官桂 甘草錢各五 芍藥

膝 附子錢各一 川芎錢半 水煎後服○一方有當歸無官桂加生薑七片

河地黃飲子 百 治舌瘡不能言足廢不能行此謂少陰氣厥不至急當溫之名曰痲證凡陰

虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地 巴戟去心 山茱萸 肉苁蓉 酒浸 附子 石斛 五味 石菖蒲 茯苓 遠志

官桂 麥門冬 右等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎服

金櫻膏 百一 治虛勞遺精白濁最效

金櫻子揀經霜後熟者揀去刺切開去核揔碎煮之濾滓淨汁用熬成膏 人參 桑螵蛸新瓦焙 山藥各二 杜仲薑汁炒 益智仁

兩 薏仁 山茱萸 艾實 枸杞各四 青鹽三錢 右用水同煎二次去渣熬成膏將

全櫻膏對半和勻空心白滾湯下三四匙

心虛白濁歌百二 白濁皆因心氣虛 不應只作腎虛醫 四君子湯加遠志 一服之間

見效奇

劫勞散百三 方在婦人一二四 治虛勞咳嗽盜汗發熱

益氣補腎湯百四 治氣虛眩暈

人參 黃耆各一錢 白朮二錢 白茯苓一錢 山藥 山茱萸各錢 甘草五分 水二鍾棗二

枚煎八分食前服

元當歸酒百五 治血虛頭痛欲裂

當歸一兩好酒一升 煮取六合服之

人參丸百六 甯心益智安神固精

人參 茯苓 茯神 棗仁 遠志 益智 牡蠣各五錢 硃砂二錢 為末棗肉丸服

千人參固本丸百七 治脾虛煩熱金水不足及肺氣燥熱作渴作嗽或小便短小赤色澀滯

如淋大便燥結此陰虛有火之聖藥也

人參二兩天冬炒麥冬炒生地黃 熟地黃各四兩 蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒

或淡鹽湯下中寒之人不可服如欲作膏俟煎成外加白蜜四兩

團參丸百八 治吐血效嗽服涼藥不得者團參散方在小兒十

人參 黃耆 飛羅麩各一兩 右為細末。滴水和丸。桐子大。每服五七十九丸。茅根湯下。

天王補心丹

百九

甯心保神。固精益血。壯力強志。令人不忘。消煩熱。除驚悸。清三焦。解乾渴。

育養心氣。○此方之傳。未致所自。道藏傷云。昔志公和尚。日夜講經。鄧天王憫其勞者也。錫之此方。因以為名焉。

生地黄

四兩

玄參 炒 丹參 炒 遠志 炒 桔梗 各五錢 白茯苓 五錢 五味 炒 當歸 酒洗 麥冬

炒 天冬 炒 柏子仁 炒 酸棗仁 炒 各

右為細末。煉蜜為丸。每兩分作十丸。金箔為衣。每服一

丸。燈心棗湯化下。食遠臨卧服。或作小丸亦可。

類方

如前方內加黃連二兩。酒炒。

醫統方 此較前多百部 菖蒲 杜仲 三味。

生地黄 二兩 同砂仁 五錢 茯苓 人參 玄參

丹參 遠志 柏子仁 炒 棗仁 炒 白茯苓

杜仲 製 百部 各一兩 歸身 一兩 天冬 麥冬 各一

錢 桔梗 八錢 五味 石菖蒲 各五錢

得效方用熟地不用生地。餘如醫統。又外加茯苓。炙甘草。共一十八味。分兩俱各等分。○按

右方惟前三味香。乃道藏經本方。此外各有不同。亦惟隨宜擇用可也。

補心神效丸

百十

黃耆

蜜炙

茯神 人參 各四兩 遠志 製 二兩 熟地黄 三兩 棗仁 炒 柏子仁 另研 五味子 各二兩 砂

一兩 另研

右為末。煉蜜丸。桐子大。每服五十九丸。米飲溫酒任下。○盜汗不止。麥麩湯下。○夢遺

加批 景岳全書 卷五十三 上海廣益書局印行

失精。人參龍骨湯下。○卒暴心痛。乳香湯下。○虛煩發熱。麥門冬湯下。○吐血。人參湯下。○大便下血。地榆湯下。○小便出血。茯苓車前子湯下。○中風不語。薄荷生薑湯下。○風癩瘰癧。氣防風湯下。

局平補鎮心丹百十 治心血不足。時或怔忡。夜多亂夢。如墮岸谷。常服安心腎。益榮衛。

人參 龍齒各二兩 茯苓 茯神 麥冬 五味各一兩 車前子 遠志製 天冬 山藥

薑汁炒 熟地酒蒸 砂兩半 棗仁炒 煉蜜丸 桐子大 每服八九十九丸 早晚米飲或溫酒下。

○一方有肉桂一兩二錢五分。○一方有當歸 柏子仁 菖蒲。

集 柏子養心丸百十 治心勞太過。神不守舍。合眼則夢。遺洩不常。

柏子仁解白不油者以紙包搥去油 白茯苓 酸棗仁 生地黃 當歸身各二兩 五味子 辰砂細研

犀角鎊 甘草各半兩 右為末。煉蜜丸。如芡實大。金泊為衣。午後臨卧。各津嚼一丸。

古 心腎丸百十 治水火不濟。心下怔忡。夜多盜汗。便赤夢遺。

牛膝酒浸 茯苓酒浸 熟地黃各二兩 絲子酒浸 人參 黃耆蜜炙 當歸酒浸 山藥炒 鹿茸酥

附子地土去 茯苓皮 神 五味子 龍骨煨 遠志甘草湯浸 刺藜各一兩 右為細末。酒煮麩糊丸。桐子

大。每服百丸。空心棗湯或清湯送下。

濟 遠志丸百十 治心神恍惚不甯。夢泄遺精。

人參 茯神 白茯苓 龍齒 遠志薑湯浸 石菖蒲各二兩 蜜丸 桐子大 硃砂為衣。每服七

八十九空 心鹽湯下。

寧志丸

百十 治怔忡驚悸癩癩。○得寧志丸方在和陣三百六十。與此稍同。

人參

棗仁 酒浸 茯苓 柏子仁 當歸 遠志 酒浸 茯神 石菖蒲 琥珀各五 乳香

硃砂

各三 右為末。煉蜜丸。桐子大。每服三五丸。食後棗湯下。

寧志膏

百十 治因驚失志。

人參

棗仁 炮去皮 滴乳香 另研 右為末。煉蜜丸。彈子大。每服十九。薄荷湯下。

定志丸

百十 治心氣不足。驚悸恐怯。或語鬼神喜笑。及目不能近視。反能遠視。乃陽氣不足也。宜此方主之。○此方與前開心散小異。八三。

人參

茯苓 各二 菖蒲 遠志 各一 煉蜜丸。桐子大。硃砂為衣。每服五七十九。米飲下。

八物定志丸

百十 補心神。安魂魄。去熱除痰。

人參

半 石菖蒲 茯神 遠志 製各一 麥門冬 白朮 各五 硃砂 一錢 牛黃 二錢 另研 右為細

末。煉蜜丸。桐子大。硃砂為衣。每服五十九。米飲下。○一方有茯苓一兩。

十四友丸

百十 治驚悸怔忡。

人參

黃耆 當歸 生地黃 遠志 茯神 茯苓 棗仁 炮去皮 阿膠 炒 龍腦 紫石

英 薄荷

硃砂 各一 右為末。煉蜜丸。桐子大。每服五七十九。食後臨臥棗湯下。

秘驗琥珀多寐丸

百十 治健忘恍惚。神虛不寐。

秘驗琥珀多寐丸

百十 治健忘恍惚。神虛不寐。

真琥珀 真羚羊角細碎 人參 白茯苓 遠志製 甘草等分 右為細末。猪心血和煉蜜丸。

艾實大。金箔為衣。每服一丸。燈心湯嚥下。

金匱六味地黃丸一二 即金匱腎氣丸。亦名地黃丸。治腎水虧損。小便淋閉。頭目眩暈。腰腿痠

軟。陰虛發熱。自汗盜汗。憔悴瘦弱。精神疲困。失血失音。水泛為疾。病為腫脹。壯水制火之劑也。

熟地黃八兩 山茱萸 山藥炒各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓各三兩 右為細末。和地黃膏。加煉

蜜為丸。桐子大。每服七八十丸。空心食前。滾白湯。或淡鹽湯任下。○此方用水煎湯。即名六

味地黃湯。下八味丸亦同。

崔八味地黃丸一二 治命門火衰。不能生土。以致脾胃虛寒。飲食少思。大便不實。或下元冷

憊。臍腹疼痛等症。○王太僕曰。益火之源。以消陰翳。即此謂也。○即前六味地黃丸。加肉桂。製

附子各一兩。

陳加減八味丸一二 治腎水不足。虛火上炎。發熱作渴。口舌生瘡。或牙根潰蝕。咽喉痰痛。寐

汗憔悴等症。此臨川陳自明方。李氏云。凡發背之熱。未有不自腎虛而得之者。必須五更服

加減八味丸。○即前六味丸。加肉桂一兩。五味子四兩。炒用。內澤瀉切片。蒸五次。焙用。○一

方。五味止用一兩。

辰益陰腎氣丸一二 治陰虛潮熱。盜汗。煩熱作渴。筋骨疼痛。月經不調等症。○即前六味丸

加當歸。生地各四兩。五味子二兩。

蘇加減金匱腎氣丸

六二 治脾胃陽虛不能行水小便不利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成臌證其效如神此證多因脾胃虛弱或治失其宜元氣復傷而變此證

若非速救腎之火則陽氣不充於下何以生土土虛又何以制水此必用之劑也苟不知此必不能救若病在燃眉當變丸為湯治之

熟地四兩酒拌蒸 山藥 山茱萸 川牛膝 丹皮 澤瀉 車前子 肉桂各一兩 白茯苓三兩

附子錢五 右為末煉蜜同地黃膏搗丸桐子大每服七八十丸空心米飲下

丹滋陰大補丸七二 治諸虛不足腰腿痠痛行步無力壯元陽益腎水

熟地二兩 山藥炒 牛膝各兩 山茱萸 杜仲 巴戟肉 白茯苓 五味子 小茴香炒 肉

菴蓉酒洗去甲遠志甘草湯煮兩 石菖蒲 枸杞各五錢 右為細末紅棗肉和或煉蜜為丸

桐子大每服七八十丸空心淡鹽湯或溫酒任下

大造丸八二 方在寒陣一五六 治陰虛血熱諸症

秘全鹿丸九二 此藥能補諸虛百損五勞七傷功效不能盡述人製一料服之可以延年一

紀補人 人所賴以生者穀肉菓菜以養之至於有病則用藥以治之無故而服藥猶無故而

共用兵 則人氏獲氣反有所傷故無病服藥猶有病服藥之毒然愚昧者以為服之則精血強

反多疾病至于五方之人無有不贊其妙者若不察而輕信之及至發作藥毒而死猶不覺悟

恨也子命可哀也其法須四人共製一鹿分而服之逾年又共製之四人共製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣

加批... 上海廣益書局印行

中鹿一隻

辨殺之。運去毛。將壯雜洗淨。同鹿肉加酒煮熟。將肉橫切。焙乾。為末。去皮。同壯

人參

白木

炒茯苓

炙甘草

當歸

川芎

生地黄

熟地黄

黃耆

蜜炙

天門冬

麥門冬

枸杞

杜仲

鹽水

牛膝

酒拌

山藥

炒

芫實

兔絲子

製

五味子

蓉

破故紙

酒炒

巴戟肉

胡蘆巴

酒拌

川續斷

覆盆子

酒拌

楮實子

酒拌

秋石

一斤

各川椒

炒去目

小茴香

炒

沉香

青鹽

各半

右先須精製諸藥為末

和勻

一處

候鹿膠

成就

和搗為丸

桐子大

焙乾

用生黃絹作小袋

五十條

每袋約盛一斤

懸置透風處

用盡一

袋

又取一袋

陰溼天須用火烘一二次為妙

冬月溫酒亦可

冬月溫酒亦可

青

囊仙傳班龍丸

百三

壯精神

除百病

養氣血

補百損

老人虛人常服

延年益壽

昔蜀中有道

士

酣歌酒肆

曰

尾閭不禁

滄海竭

九轉金丹

都慢說

惟有班龍頂上珠

能補玉堂關下血

真人

仲源

方傳世

鹿角膠

鹿角霜

柏子仁

兔絲子

製

熟地黄

各八兩

白茯苓

補骨脂

各四兩

右將膠先

溶化

量入無灰酒

打糊丸

桐子大

每服六七十丸

空心淡鹽湯下

或酒任下

此藥固本保元

生精養血

培復天真

大補虛損

益五內

除骨蒸

壯

元陽

多子嗣

充血脈

強健筋骸

美顏色

增延壽算

聰明耳目

潤澤鬢髮

真王道奇品之方

功

秘

班龍二至百補丸

一三

此藥固本保元

生精養血

培復天真

大補虛損

益五內

除骨蒸

壯

元陽

多子嗣

充血脈

強健筋骸

美顏色

增延壽算

聰明耳目

潤澤鬢髮

真王道奇品之方

功

難盡述也

難盡述也

鹿角五十對兩為別取新角連腦骨者佳錫長二黃精八兩枸杞 懷熟地 兔絲子淨

此金櫻子去毛子天門冬去心麥門冬去心川牛膝 龍眼肉 楮實子各二 已上十味

同角入金華好罈層層故實以新汲淡水入罈平肩用密梭布四層包口以新磚壓之置大

鍋中并字架上以木甌蓋好重湯煮三日夜毋得間斷大候傍用小錫燒滾水不時添注罈

內并錫水勿使乾涸日足取起濾去渣將汁用羅底絹絞出入淨砂鍋內文火熬成膏約一

斤半外煉蜜二斤酒水成珠攪入調和後藥楮合為丸 鹿角霜十兩人參五兩黃耆實

芡實炒白茯苓 山藥炒山茱萸 生地黃酒洗飯上蒸透知母鹽水炒北五味子一兩夏月加

補以上十味為細末用前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽湯送下百餘丸隨用煮熟連

肉或乾棗數枚壓之俾納丹田也。

正鹿角膠丸一三 治血氣虧損兩足痿弱不能行動久卧床褥者神效。

鹿角膠一斤 鹿角霜熟地各半當歸四兩人參 牛膝 兔絲子製白茯苓各三 白朮

杜仲各二虎脰骨酥炙龜板酥炙右為末先將鹿角膠用無灰酒二鍾溶化加煉蜜搗

丸桐子大每服百丸空心鹽薑湯下。

鹿茸三 治腳氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱欬嗽等症。

鹿茸酥炙另五味子 當歸 熟地黃各等 酒糊和丸如桐子大每服四五十丸溫酒或

鹽湯任下。

驗鹿茸丸一三

治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸酥炙

熟地黃

當歸

枸杞

棗仁炒

附子製

遠志薑汁

山藥

沉香

肉蓯蓉

酒浸

各一

兩

麝香五分

煉蜜丸

桐子

每服五十九丸

鹽湯下

三鹿茸丸一三

治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸酥炙

麥門冬

熟地黃

黃耆炙

五味子

肉蓯蓉

雞內金

酒炒

山茱萸

破故紙

炒各

錢

茯苓

人參

牛膝

酒浸

玄參

地骨皮

各半

右為末

煉蜜丸

桐子

每服七八十

丸

米飲下

本藥茸丸一三

治腎虛腰痛不能轉側

麋茸鹿茸

兔絲子製各

船茴香

五錢

右為末

以羊腎二對

用酒煮爛

去膜研如泥

和丸

子

大陰乾

如太乾

以酒糊佐之

每服三五十九丸

溫酒或鹽湯下

楊還少丹一三

治脾胃虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁真氣虧損肌體瘦弱等症

熟地黃二兩

山藥

山茱萸

杜仲薑湯

枸杞

二兩

牛膝

酒浸

遠志薑汁

肉蓯蓉

酒浸

北五

味

川續斷

楮實子

船茴香

兔絲子

製

巴戟肉

餘各

右為末

煉蜜丸

桐子

每

服五十九丸

空

心

鹽

酒

下

局無比山藥丸一三

治諸虛損傷肌肉消瘦耳聾目暗常服壯筋骨益腎水令人不老

山藥二兩

兔絲子

三兩

酒

五味子

六兩

肉蓯蓉

酒浸

杜仲

三兩

牛膝

一兩

酒

煎

地

澤

山藥

二兩

兔絲子

三兩

酒

五味子

六兩

肉蓯蓉

酒浸

杜仲

三兩

牛膝

一兩

酒

煎

地

澤

山藥

二兩

兔絲子

三兩

酒

五味子

六兩

肉蓯蓉

酒浸

杜仲

三兩

牛膝

一兩

瀉 山茱萸 茯苓 巴戟肉 赤石脂各一兩 右為細末煉蜜丸桐子大每服三五十九
食前溫酒或米飲下。

還元丹九三 一名延年益壽不老丹。此藥大補元氣服一月自覺異常功效不可盡述。

按此方為陰虛血熱者宜之。諸陽虛者不可用。

何首烏一斤 用米泔水浸軟竹刀刮去皮分四裂忌鐵器以砂鍋瓦器或酒拌芝麻蒸

熟地一斤 酒浸焙各三兩 天冬 麥冬各一兩 人參五錢 地骨皮童便浸 白茯苓酒浸晒乾取 右

取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前未為膏磁器取貯勿令洩氣不拘時服一二匙沸

湯嗽之。

養榮丸百四 治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足形體羸瘦。

人參 白朮土炒 當歸 熟地黃 黃耆 芍藥 山藥各一兩 遠志 製生地黃 山茱萸各

兩 白茯苓二兩 陳皮八錢 右為細末用鴨一隻取血入煉蜜和丸桐子大每服八九十九

食前淡鹽湯送下或酒亦可。

三才丸一四

天門冬 熟地黃 人參等分 右為末煉蜜丸服。

七珍至寶丹二四 補血生精瀉火益水強筋骨黑髮補益之功甚大。

何首烏赤白各半斤酒浸軟竹刀刮去皮同牛膝蒸 川牛膝半斤淨用黑豆三升同何首烏層層拌鋪 白茯苓

一斤用人乳五升煮乾為末。赤茯苓一斤用牛乳五升煮乾為末。當歸四兩酒浸焙乾。枸杞四兩破故紙炒香。芫絲子製各煉蜜為丸。雞頭子大每服一丸。日進三服。空心溫酒。午後薑湯。臨卧鹽湯送下。

百補髓丹三四 治老人虛弱。腎傷腰痛。不可屈伸。

杜仲十兩 補骨脂用芝蔴五兩同炒以芝蔴黑 鹿茸四兩煉去毛酒浸炙 右為末。用胡桃肉三十箇。

浸去皮。搗為膏。入麪少許。煮糊為丸。桐子大。每服百丸。溫酒鹽湯任下。

枸杞子丸四 治腎虛精滑。補精氣。

甘州枸杞 黃精九蒸 右為末。等分相和。搗作餅子。焙乾為末。煉蜜丸。桐子大。每服百餘。

丸。空心溫酒送下。

扁香娥丸一四 治腎虛腰痛。益精助陽。烏鬚壯脚力。婦人隨證用引吞送。神效。

破故紙四兩炒香 杜仲淨八兩 胡桃肉十兩 右為末。用蒜四兩。和丸搗膏。桐子大。每服三五十。

丸。空心溫酒送下。○一法不用蒜。以酒糊為丸。或煉蜜為丸。服者更佳。○按此方可加巴戟。

大茴香各四兩為丸。炒。或再加肉蓯蓉亦可。

復加味青娥丸一四 補諸虛不足。滋陰益陽。美容顏。健腰膝。止腰痛。尤效。

破故紙錢五分 小茴香鹽水炒 胡蘆巴炒各四兩 杜仲三兩薑汁炒 胡桃肉二十箇 蓮心一兩 青鹽煨五分 穿山甲

錢五分 右為末。將胡桃肉搗爛。加酒煮芡糊為丸。桐子大。每服三十九。空心溫酒下。

十補丸一四 方在熟陳一七四。治腎藏虛冷等症。

煨腎丸一四

治腎肝虛損。骨痿不能起床。筋弱不能收持。及脾損穀不化。善益精緩中消穀。

杜仲善湯

牛膝 萹蒨 白蒺藜 防風 兔絲子 製胡蘆巴 肉蓯蓉 酒浸 破故紙 酒炒

分官桂 減半

右將猪腰子製如食法。搗爛加煉蜜。和杵千餘。為丸桐子大。每服五七十九。

空心用溫酒送下。治腰痛不起甚效。

局煨腎散一四

治腎虛腰痛。

杜仲薑汁

花椒炒出 食鹽少許 右為末。以猪腰子一枚。薄批作五七片。以椒鹽醃去腥水。

摻杜仲末三錢在內。以薄荷包外。加溼紙二三層。煨熟食之。酒下。

安腎丸十五

方在熱陣一六七。治腎經積冷。下元虛弱。

小安腎丸一五

方在熱陣一六八。治腎氣虛寒多溺。腰膝沉重。

石刻安腎丸二五

方在熱陣一六九。治真氣虛德夢遺數。腳膝軟弱。

紅鉛丸三五

一名一炁丹。一名人精妙合丸。

紫河車用鹽

壯成男胎者一具。以銀紙包裹。去人乳。以磁罐盛。曬乾者四兩。或以茯苓石。

以重女小便

重男紅鉛亦名先天梅子。五錢。此室女初次精血和算女子年歲。凡五千四十。

或以絲綿

取用烏梅煎。右為細末。煉蜜為丸。每丸重七釐。此藥俗傳云。以人補人。得先。

天之人氣妙不可盡述。每丸價一兩。

打老兒丸一五

四

熟地 山藥 炒各五兩 牛膝 酒洗 巴戟 枸杞 湯 楮實子 去浮 枸杞 石菖蒲 遠志肉 湯製 白茯苓 去筋 杜仲 鹽水 北五味 鹽水 拌蒸 一二 山茱萸 四兩 小茴香 續斷 各三 肉蓯蓉 炒五兩

右為細末。煉蜜丸。桐子大。每服五六十丸。空心午前臨睡。或酒或鹽湯下百餘丸。

肉蓯蓉丸 五 治腎虛耳聾。

肉蓯蓉 酒浸 兔絲子 酒浸 山茱萸 白茯苓 熟地黃 人參 官桂 防風 芍藥 黃耆 各五 附子 炮 羌活 澤瀉 各二 羊腎 一對 薄切去 錢半 筋膜夫乾 煉蜜丸 桐子大 每服三五十丸 空心 溫酒下。

四味肉蓯蓉丸 一五 方在固陣六二 治小便不禁。

黃耆丸 一五 治虛風羸瘦 心神虛煩 筋脈拘攣 疼痛少睡。

黃耆 天參 熟地黃 白茯苓 蒼朮 山茱萸 兩各一 棗仁 羌活 去蘆 當歸 麝香 角屑 枸杞子 桂心 各七 防風 遠志 各半 右為細末 煉蜜和丸 桐子大 每服七八十丸 溫酒下 不拘時。

二丹丸 一五 治風邪健忘 和血養神定志 內安心神 外華腠理。

丹參 天門冬 熟地黃 各一 麥門冬 白茯苓 甘草 各一 人參 丹皮 遠志 各半 右為細末 煉蜜和丸 桐子大 以硃砂半兩為衣 每服五七十丸 加至百丸 空心煎愈 風湯下。

益血丹 一五 治大便燥久虛亡血。

海 益血丹 一五 治大便燥久虛亡血。

右為細末 煉蜜和丸 桐子大 以硃砂半兩為衣 每服五七十丸 加至百丸 空心煎愈 風湯下。

海 益血丹 一五 治大便燥久虛亡血。

右為細末 煉蜜和丸 桐子大 以硃砂半兩為衣 每服五七十丸 加至百丸 空心煎愈 風湯下。

右為細末 煉蜜和丸 桐子大 以硃砂半兩為衣 每服五七十丸 加至百丸 空心煎愈 風湯下。

海 益血丹 一五 治大便燥久虛亡血。

當歸酒浸炒熟地黃等分右為末。煉蜜丸。彈子大。細嚼。酒下一丸。

集要四神丸百六治稟賦虛弱。小便頻數不禁。

五味子 兔絲餅各四兩 熟地黃六兩 肉蓯蓉一斤 右為末。酒煮山藥糊丸。桐子大。每服五

十九。空心鹽湯下。

局方虎骨四斤丸一六

宣州木瓜去穢 天麻去蘆 肉蓯蓉洗淨 牛膝焙乾各一斤 附子地皮二兩 虎骨酥炙一兩 右先將前四

味。用無灰酒五升浸。春秋五日。夏三日。冬十日。取出焙乾。入附子虎骨共為末。用前浸藥酒

打麪糊丸。梧桐子大。每服五十九。食前鹽湯送下。

加味四斤丸一六 治肝腎二經氣血不足。足膝痠痛。步履不隨。如受風寒溼毒。以致脚氣者。

最宜服之。

虎脛骨一兩 乳香另研 沒藥另研各五錢 川烏地皮一兩 肉蓯蓉 牛膝各一兩 天麻一兩 木瓜一斤

蒸酥炙 右各為末。先將木瓜蓯蓉搗膏。加酒糊和杵丸。桐子大。每服七八十九。空心溫酒或鹽

湯任下。

三因加味四斤丸一六 治腎虛肺熱。熱淫於內。致筋痿弱。不能收持。

肉蓯蓉酒洗 牛膝酒洗 天麻 木瓜 鹿茸酥炙 熟地黃 五味子酒浸 兔絲子酒煮 右

末。煉蜜丸。桐子大。每服五十九。食前溫酒或米飲送下。○劉宗厚曰。按此方云。熱淫於內。而

上海廣益書局印行

用溫補何也。然陰血衰弱。血不養筋。筋緩不能自收。令陽躁熱。淫於內。故用此以養陽益陰。陰實則水升火降矣。

金剛丸

一六

治腎損骨疼。不能起床。宜此益精。

萹解

杜仲薑汁炒

肉苁蓉

酒洗

兔絲子製

右用酒煮豬腰子。搗丸桐子大。每服五七十九。

空心溫酒送下。

人參膏

五

用人參十兩細切。以活水二十盞浸透。入銀石器內。桑柴火緩煎。取十盞。應

汁。再以水十盞煎渣。取汁五盞。并入前汁。合煎成膏。磁瓶收貯。當隨證作湯調服。○丹溪曰。

多慾之人。腎氣衰憊。欬嗽不止。用生薑橘皮煎湯化膏服之。○浦江鄭兄。五月患痢。又犯房

室。忽發昏暈。不知人事。手撒目暗。自汗如雨。喉中痰鳴聲如拽鋸。小便遺失。脈大無倫。此陰

虧陽絕之證也。予令急煎大料人參膏。仍與炙氣海十八壯。右手能動。再二壯。唇口微動。遂

與膏服一盞。半夜後服三盞。眼能動。盡三斤。方能言。而索粥。盡五斤而痢止。至十斤而全安。

若作風治則誤矣。○一人背疽。服內托十宣藥已多。膿出作嘔發熱。六脈沉數有力。此潰瘍

所忌也。遂用大料人參膏。入竹瀝飲之。參盡十六斤。竹伐百餘竿。而安。後經旬餘。值大風拔

木。瘡復起。有膿中有紅線一道。過肩胛。抵右肋。予曰。急作參膏。以芎歸橘皮作湯。入竹瀝。盡

汁飲之。盡三斤。而瘡潰。調理乃安。若癰疽潰後。氣血俱虛。嘔逆不食。變證不一者。以參耆歸

朮等分煎膏服之。最妙。

加批 詳評 景岳全書

卷五十四

書集

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

古方八陣

和陣

局二陳湯一 治痰飲嘔惡。風寒欬嗽。或頭眩心悸。或中脘不快。或因生冷。或飲酒過多。脾胃不和等症。

陳皮 半夏製各茯苓 二錢 炙甘草 一錢 水二鍾。薑三五片。棗一枚。煎八分食。

加減二陳湯二 治嘔吐吞酸。胃脘痛呃逆。即前方加丁香九粒。氣滯甚者。可加一二錢。

丹加味二陳湯三 治食鬱痰滯。胸膈不快。

蒼朮米泔浸 白朮 炒橘紅 半夏 泡茯苓 川芎 香附各八分 枳殼 黃連薑炒 甘草各五分

水盞半。煎八分。食前稍熱服。

二朮二陳湯四 治一切嘔吐。清水如注。

蒼朮土炒 白朮炒 陳皮 半夏製 茯苓各一錢 炙甘草 五分 水一鍾半。薑三片。棗三枚。煎八分。稍熱服。

○虛寒者。加人參。煨乾薑。○痰飲如南星。倍半夏。○宿食。加神麩。砂仁。

宣黃芩二陳湯五 治熱痰

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 甘草減半 水一鍾半 薑三片 煎七分 食遠服

辨柴葛二陳湯六 治一切瘧暑濕勞食等症

柴胡 乾葛 陳皮 半夏 茯苓 甘草 白朮 蒼朮 柴胡 黃芩各等分若陰瘧除此味

水二鍾 薑三片 煎服 內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之 陽分汗

多加人參黃耆去乾葛 陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地 久瘧微邪潮熱加四君子湯

去祛邪之藥 若欲截瘧加常山檳榔青皮貝母各一錢

桂附二陳湯七 方在熱陣百十五 治寒瘧厥冷

全小半夏湯八 治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏一升 生薑半斤 右二味以水七升 煮取一升半 分溫再服 局方用半夏五錢 生薑

二錢 半水一鍾半 煎服

全小半夏加茯苓湯九 治卒嘔吐心下痞 膈間有水 眩暈者 即前方加茯苓三兩 煎法同前

全大半夏湯十 治胃反不受食 食入即吐 外臺云 治嘔而心下痞 乾者

半夏二升洗 人參三兩 白蜜一斤 右三味以水一斗二升 和蜜揚之二百四十遍 煮藥取

二升半 溫服一升 餘分再服

藥 大半夏湯十一 一名橘皮湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 陳皮 白茯苓 二 水二鍾。薑五片。煎八分。溫服。

茯苓半夏湯十二 治嘔吐噦。心下堅痞。脇間有水。痰眩驚悸。及小兒等病。

白茯苓 二兩 半夏 五錢 右每服三五七錢。薑水煎服。

鹽橘皮半夏湯十三 治痰涎壅嗽。久不已者。常服潤燥解肌熱。止咳。

陳皮 五錢 半夏 二錢 水一鍾半。加生薑三五片。煎七分。溫服。

靈樞米半夏湯十四 久病不寐者。神效。世醫鮮用之。

秫米 一升 半夏 五合 右用千里長流水八升。揚之萬遍。取清者五升。煮秫米半夏。炊以葦

薪。令煮至一升半。去渣飲汁。一小杯。日三服。其新病者。覆杯即卧。汗之即已。久病者。三日而已也。

東垣半夏白朮天麻湯十五 治眩暈。及足太陰痰厥頭疼。

半夏 錢半 白朮 神麴 各錢 麥芽 陳皮 各錢 茯苓 蒼朮 天麻 澤瀉

各五錢 黃柏 二分 乾薑 二分 右吹咀。每服半兩。水二鍾。煎八分。食遠熱服。

全黃黃芩半夏生薑湯十六 治乾嘔而利者。

黃芩 生薑 各三兩 炙甘草 芍藥 各二兩 半夏 半斤 大棗 十二 右六味。以水一斗。煮取三升。

去滓溫服一升。日再。夜一服。

東垣平胃散十七 治脾胃不和。不思飲食。心腹脇肋脹滿刺痛。嘔噦惡心。吞酸噫氣。體重節痛。

自痢霍亂。噎膈反胃等症。

厚朴製

陳皮去白各五兩

蒼朮去皮米泔洗炒八兩

炙甘草二兩

本方加人參

茯苓各二兩

即名參苓

平胃散

○右為末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服○或去薑棗入鹽一

小捻單以沸湯點服亦可○小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麩麥芽枳實○如

胃中氣痛加木香枳實或枳殼○如脾胃因倦加人參黃耆○如有痰加半夏○如便後腹

脹加大黃芒硝○如脈大內熱加黃連黃芩

調氣平胃散十八

治胃氣不和服滿腹痛

厚朴製陳皮 木香 烏藥 白豆蔻 砂仁 白檀香各一錢 甘草五分 蒼朮錢半 藿香錢

分 水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

益黃散十九

治脾土虛寒寒水反來侮土而嘔吐不食或肚腹作痛或大便不實手足逆冷等症

陳皮一兩 青皮

訶子肉此去皮 炙甘草各半兩 丁香二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等症

藿香 紫蘇 桔梗 白芷 大腹皮各一錢 陳皮 半夏 茯苓 甘草 白朮 厚朴各

分 水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗

不換金正氣散二十一

治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發寒熱或受山嵐瘴氣等毒

厚朴量半 藿香 半夏 蒼朮未泔 陳皮錢各一 甘草錢五 薑棗水煎服

不換堂正氣散 二二 治感冒風寒或傷生冷或瘴癘或疫癘

蒼朮未泔 厚朴量半 橘紅 三兩 炙甘草 半夏 藿香 二人參 木香酒洗 白茯苓

右每服一兩 薑棗水煎服

正氣散 二三 正胃氣進飲食 退寒瘧食瘧瘴氣 脾胃滯者 用之為宜

藿香 草果 二兩 半夏 陳皮 厚朴 砂仁 炙甘草 各一 右為末 每服三錢 加生薑

七片 薑棗 同煎 俟藥未發前和渣服

大正氣散 治脾胃不和為寒溼氣所傷 心腹脹悶 有妨飲食

陳皮 錢各二 半夏 藿香 葉 厚朴 薑炒 桂枝 枳殼 檳榔 乾薑 錢各三 甘草 錢五

水一鍾 半薑三片 棗一枚 煎七分 不時溫服

升陽益胃湯 二五 治秋燥令行 濕熱少退 脾胃虛弱 怠惰嗜卧 體重節痛 四肢不收 口苦

舌乾 飲食不消 大便不調 小便頻數 兼見肺病 洒淅惡寒 慘慘不樂 面色惡而不和 乃陽氣

不伸故也 當升陽益胃 ○良方無黃耆 甘草 半夏 芍藥 四味

人參 炙甘草 半夏 用各一錢 黃耆 一錢 白朮 三分 白芍 防風 羌活 獨活 各五

桑胡 茯苓 者勿用 澤瀉 用各三分 陳皮 四分 黃連 二分 右吹咀 每服三錢 漸加至五錢

生薑五片 棗二枚 水三鍾 煎一鍾 早飯 午飯 之間溫服 忌語 話一二時 及酒濕助火之物 ○

服藥後如小便畢而病反增。是不宜利小便也。當去茯苓澤瀉。若得善食增食。初二日間不可太飽。恐藥力尚淺。胃氣再傷。不得轉運也。或用美食以助藥力。而滋胃氣。慎不可淡食。以損藥力。而助邪氣之沉降也。亦可小役形體。使胃氣升降。切勿大勞。致令復傷。但以胃氣安靜為尤善。

海白木湯 二六 治風溼惡寒脈緩。

白木 防風 甘草 右以咀。加生薑煎服。

生白木湯 二七 治五臟受溼。欬嗽痰多。氣喘身重。脈濡細。

白木 橘紅 半夏 茯苓 各二錢 炙甘草 一錢 水一鍾半。薑五片。煎七分。食遠服。

良方二味白木湯 二八 方在婦人十二。治妊服內熱心痛。

良方四味白木湯 二九 方在婦人十三。治妊服胃虛惡阻。

白木散 三十 治自汗盜汗極效。

白木 半斤 石將白木切成小塊。用浮麥一升。水一斗。同煮乾。如白木尚硬。再加水煮透爛。

取起切片。焙乾為末。每服二三錢。仍用浮麥煎湯。食遠調服。○如治小兒。以炒黃耆煎湯。量

大小與服。○忌蘿蔔辛辣炙燥之物。乳母尤忌。

明白木散 三一 方在固陣三。治虛風多汗痿弱。

良方白木散 三二 方在婦人十一。治妊服傷寒內熱等症。

調胃白木散 三三

治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白木 茯苓各二錢

陳皮 白芍藥 炒澤瀉

檳榔 各一錢 木香 五分

水二鍾薑三片煎八分

食遠服。○如腫不退倍加白木并枳實各炒一錢

白木芍藥湯 三四

治脾經受濕水泄體重微滿困弱無力不欲飲食或暴泄無數水穀不化

宜此和之

白木 芍藥各一兩甘草炒半兩

右每服一兩水煎服

白木芍藥湯 三五

治痛瀉要方

白木 芍藥各一兩甘草炒半兩 防風 一兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

錢

金桂木甘草湯 三六

病疾飲者當以溫藥和之凡心下有痰飲胸膈支滿目眩此方主之

茯苓 四兩 桂枝 白木 各三兩 甘草 二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便即利

神木散 三七 治傷寒頭痛身熱等症

蒼木 二錢 川芎 藜蘆 甘草 各一錢 水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局神木散 三八

方在散陣六五 治四時溫疫頭疼發熱

藏神木散 三九

治風溼惡脈緊 蒼木 防風 甘草 右吹咀加葱白煎服○治剛瘧無汗者加羌活或獨活麻黃

約沉香降氣散 四十 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或留飲吞酸腸下妨悶

沉香二錢砂仁七錢香附子去毛鹽水炒六兩二錢五分炙甘草五錢右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調○時服或淡鹽湯亦可

蘇子降氣湯 四一 治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蘇子炒半夏炒前胡 當歸 陳皮 厚朴製各八分肉桂 甘草各三分水二鍾薑三片煎七分不拘時服

林醫小降氣湯 四二 治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘇 台烏藥 白芍 陳皮各二錢炙甘草五分水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

統木香順氣散 四三 治氣滯腹痛脇痛

木香 香附 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 砂仁 厚朴製蒼朮各一錢炙甘草五分水二鍾薑三片煎八分食遠服

局木香調氣散 四四

木香 白檀香 白豆蔻 丁香各二錢炙甘草 藿香各八錢砂仁四錢右為末每服二錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子 四五 治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛嘔吐氣喘痰盛浮腫等症○即

外科方脈流氣飲

木香唐汁 檳榔 青皮 陳皮 枳殼 烏藥 大腹皮 枳實 茯苓 紫蘇 桔梗

防風 黃耆 當歸 川芎 芍藥 甘草 半夏製各 水一鍾半 薑三片 棗一枚 煎服

和二十四味流氣飲四六 調榮衛利三焦行痞滯消腫脹

紫蘇 陳皮 青皮 厚朴 製尖甘草 香附炒各木通二兩 大腹皮 丁香皮 檳榔

肉桂 木香 草果 義木 炮薑香各一兩半 人參 白朮 赤茯苓 木瓜 白芷

半夏 枳殼炒 石菖蒲各一兩 右每服三錢 薑四片 棗二枚 水煎服

七氣湯四七 治七情之氣鬱結於中 心腹絞痛不可忍 及不能飲食

半夏製五兩 人參 肉桂 甘草各一兩 右每服三五錢 水一鍾半 薑三片 煎八分服

三七氣湯四八 治如同前 ○按此方即局方四七湯也在後九七

半夏製五兩 茯苓四兩 厚朴三兩 紫蘇二兩 右每服三五錢 薑七片 棗二枚 水煎服

加味七氣湯四九 即前七氣湯加厚朴 茯苓 各等分

局方七氣湯五十 治七情鬱結 臟氣互相刑剋 陰陽不和 揮霍撩亂 吐瀉交作

半夏 厚朴 芍藥 茯苓各二錢 人參 肉桂 橘紅 紫蘇各一錢 水二鍾 加薑棗煎服

指七氣湯五一 治七情相干 陰陽不得升降 氣道壅滯 攻痛作疼 積聚癥瘕 脹滿等症

半夏 甘草各七分 香附錢半 青皮 陳皮 桔梗 官桂 薑香 益智 義木煨各一錢 右

每服三五錢。薑三片。棗一枚。水煎服。統旨七氣湯有三稜。玄胡索。薑黃。單豆蔻。無半夏。桔梗。○濟生大七氣湯有三稜。無半夏。

四磨飲 五二 治諸逆氣。

沉香 烏藥 枳實 檳榔 右四味用白湯共磨服。或下養正丹尤佳。一方用白酒磨。

濟生用人參。無枳實。○本方加木香。即名五磨飲。

生疏鑿飲 五三 治水氣通身浮腫。喘呼氣急。煩渴。大小便不利。

澤瀉 茯苓皮 木通 商陸 大腹皮 檳榔 羌活 去蘆 秦朮 去蘆 椒目 赤小豆 炒

右吹咀每服六七錢。水一鍾半。薑五片。煎服。

方厚朴湯 五四 治心腹脹滿。此病氣壅實者之法。治也。

厚朴 四五錢 薑汁炒 加生薑五七片。水煎溫服。○或間用沉香降氣散。

木香寬中散 五五 治七情傷於脾胃。以致胸膈痞滿。停痰氣逆。或成五膈之病。

青皮 陳皮 丁香 各四兩 厚朴 製一斤 甘草 炙五兩 白豆蔻 二兩 香附 炒 砂仁 木香 各三兩 右

為末。每服二錢。薑鹽湯調服。○若脾胃虛損之證。不可過服。或與六君子兼用之。

狼木香分氣飲 五六 治氣滯留注四肢。腹急中滿。胸膈脇肋膨脹。虛氣上衝。小便臭濁。

木香 猪苓 澤瀉 赤茯苓 半夏 枳殼 檳榔 燈草 蘇子 等分 右吹咀每服

一兩水一鍾半。煎八分。入麝香末少許。食遠服。

良方
人參木香散五七 治水氣病

人參 木香 茯苓 滑石 琥珀 海金沙 枳殼 檳榔 猪苓 甘草碎 石叻咀

每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進三服不拘時

消導寬中湯五八 治氣滯食滯水腫脹滿

白木一錢 枳實數分 厚朴薑製 陳皮 半夏 茯苓 山查 神麩炒 麥芽炒 蘿蔔子炒 各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯五九 治食滯脹滿

白朮錢半 人參 白茯苓 陳皮 厚朴薑汁 山查 半夏 神麩炒 麥芽炒 各五分 砂仁 七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加葡萄子炒用一錢麩食傷者尤宜用

索炬三和湯六十 治脾溼腫滿

陳皮 厚朴薑汁 白朮 檳榔各一錢 紫蘇七分 海金沙 木通各五分 水一鍾半薑三片煎

一枚煎七分食遠服

寶靈導滯通經湯六一 治脾濕氣不宣通面目手足浮腫

木香 白朮 桑白皮 陳皮各五錢 茯苓一兩 右叻咀每服七八錢水一鍾半煎八分食

前溫服

良方
導水茯苓湯六二 治水腫頭面手足徧身腫如爛瓜之狀按而壅陷胸腹喘滿不能轉側

安睡飲食不下。小便秘澀。溺出如割。或如黑豆汁而絕少。服喘嗽氣逆諸藥不效。用此即漸利而愈。

赤茯苓 麥門冬去心 澤瀉 白朮各三兩 秦白皮 紫蘇 檳榔 木瓜各一兩 大腹皮 陳

皮 砂仁 木香各半錢 右吹咀。每服一二兩。水二鍾。燈草三十根。煎八分。食前服。○如病

重者。可用藥五兩。再倍加麥冬及燈草半兩。以水一斗。於砂鍋內熬至一大碗。再下小鉚內

煎至一鍾。五更空心服。浮再煎連進此三服。自然小水通利。一日添加一日。

健脾散六三 和中健胃消食快氣

人參 白朮炒 丁香 藿香 砂仁炒 肉果炒 神麴炒 天甘草等分 右為細末。每服二錢。

不拘時服。橘皮湯下。

參朮健脾湯六四 治脾虛兼滯脹滿

人參 白茯苓 陳皮 半夏 砂仁 厚朴薑製各一錢 白朮二錢 甘草三分 水一鍾半。薑

三片。煎七分。食遠服。○加神麴麥芽山查。消脹尤佳。

三當歸散六五 水腫之疾。多由火不養土。土不制水。故水氣盈溢。脈道閉塞。滲透經絡。發為

浮腫。心腹脹滿之證。

當歸 桂心 木香 赤茯苓 木通 檳榔 赤芍藥 牡丹皮 陳皮 白朮各一錢半

木瓜一斤 水二鍾。加紫蘇五葉。煎八分。不拘時服。

當歸活血散 六六 治瘀血脹滿

赤芍藥 歸尾 酒洗 生地黄 各錢半 桃仁 去皮紅花 酒洗 香附 童便浸 各一錢 川芎 牡丹皮 玄胡

索 蓬木 各八分 三稜 各七分 青皮 各七分 水一鍾半 煎七分 食前服

方局 五加散 六七 治風濕客於脾經 以致面目浮虛 四肢腫滿 心腹膨脹 上氣急促 兼治皮水

胎水

五加皮 地骨皮 大腹皮 茯苓皮 生薑皮 等分 右咀 每服三錢 水一大鍾 煎七分

熱服無時

五皮散 六八 治病後身面四肢浮腫 小便不利 脈虛而大 此由諸氣不能運行 散漫於皮

膚肌腠之間 故令腫滿 此藥最宜

大腹皮 陳皮 生薑皮 桑白皮 赤茯苓皮 各等分 右咀 每服五六錢 水一大鍾 煎

八分 不拘時溫服 日三次 忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸 六九 治水腫 一切小便不通 難治之證

沉香 郁李仁 去皮 薑蔥 各一兩 琥珀 杏仁 去皮 紫蘇 赤茯苓 澤瀉 各半 橘紅 防

已錢半 右為細末 煉蜜丸 桐子大 以麝香為衣 每服二十五丸 空心人參湯送下 量虛實

增減

法製陳皮 七十 消食化氣 寬利胸膈 美進飲食

茴香 甘草 二兩 各 青鹽 炒一兩 乾薑 烏梅肉 各半兩 白檀香 二錢 右六味共為末外以廣陳

皮半斤湯浸去白淨取四兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子慢火一處

煮候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

秘家祛痛散 七一 治諸般心氣痛或氣滯不行攻刺心腹痛連胸膈小腸疝及婦人血氣刺

痛此方屢用無不神效

青皮 五靈脂 去石 川棟子 川山甲 大茴香 各二錢 良薑 香油 玄胡索 沒藥 檳榔 各

半沉香一錢 木香 錢二分 砂仁 少許 右咀用木鼈子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木鼈

不用共為細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛飲 七二 治脾痛氣脹

木香 丁香 檀香 大香附 白烏藥 義木 肉桂 片薑黃 白生薑 白豆蔻

砂仁 炙甘草 等分 右咀每服二錢半加紫蘇四葉煎湯服

丁香止痛散 七三 方在熱陣百八 治心痛

良烏藥 七四 治血氣壅滯心腹作痛

烏藥 義木 醋浸 桂心 桃仁 當歸 青皮 木香 等分 右共為末每服二錢熱酒下

奇效手拈散 七五 治心脾氣痛

延胡索 五靈脂 草果 沒藥 等分 右為細末每服二三錢不拘時熱酒調下

方遊山方_{七六} 治心脾痛。此藥極奇。葉石林遊山見一小寺。頗整潔。問僧所以仰給者。則曰

素無田產。亦不可求。只賃數藥以贍其脾。疾藥最為流布。有詩云。

草果玄胡索。靈脂并沒藥。酒調一二錢。一似手拈卻。

右等分為末。每服三錢。不拘時。溫酒調下。

舒筋湯_{七七} 一名如神湯。○治閃胸血滯。腰腹疼痛。及產後血滯作痛者。更妙。

當歸 玄胡索 桂心 等分 右為細末。每服二錢。不拘時。溫酒調服。○一方加杜仲牛膝

桃仁續斷亦可。

丹玄桂丸_{七八} 治死血留胃。腕當心作痛。

玄胡索_{一兩} 官桂 紅花 紅麴 滑石_{各五錢} 桃仁_{三十枚} 右為細末。湯浸蒸餅為丸。菜豆

大。每服四十九。薑湯下。

潔枳木丸_{七九} 治痞積。消食強胃。

枳實_{去穰} 白朮_{數炒} 右為末。荷葉裏燒飯為丸。桐子大。每服五十九。白朮湯下。但久服

之。令人胃氣強實。不復傷也。○東垣橘皮枳木丸。即前方加陳皮一兩。半夏一兩。即名橘半

枳木丸。

香砂枳木丸_{八十} 破滯氣。消宿食。開胃進食。

木香 砂仁_{各五錢} 枳實_{數炒} 白朮_{米泔浸} 右製服如木丸法。

麴藥枳木丸 八一 治強食多食。心胸滿悶不快。

神麴炒 麥蘖炒 枳實炒 白木二兩 右製服如枳木丸法。

東木香人參生薑枳木丸 八二 開胃進飲食。

木香三錢 人參五錢 乾生薑二錢 陳皮四錢 枳實一兩 白木一兩 右為細末。荷葉燒飯為

丸。桐子大。每服三五丸。食前溫水下。

直加味枳木丸 八三 治脾胃虛弱。食積氣滯。胸腹脹滿。常服進食寬中。和暢脾胃。

白木二兩 枳實一兩 神麴炒 麥芽炒 陳皮 山查 香附炒 砂仁炒 如前法丸服。

漢枳實丸 八四 專治食積痞塊。

枳實 白木 山查 麥芽 神麴 半夏各一兩 蒼朮 陳皮各五錢 木香錢半 薑黃三錢

荷葉蒸飯為丸。桐子大。每服百丸。食後薑湯下。

統醫大健脾丸 八五 又名百穀丸。徐東皋曰。此方健脾養胃。滋穀氣。除濕熱。寬胸膈。去痞滿。

久服強中益氣。百病不生。

人參 白茯苓蒸 廣陳皮各二兩 枳實蒸 青皮洗 半夏炒 山查肉飯上蒸 白木土炒

穀芽炒一兩 白豆蔻炒 廣木香各五錢 川黃連一兩 同吳茱萸五錢 右為末。用長流水煮

荷葉老米粥。搗丸。綠豆大。每服百丸。食前白湯下。愚按此方雖佳。但脾多畏寒。若非有大

當去黃連。或仍加炮薑一二兩為妙。

楊啟脾丸 八六 治脾胃不和。氣不升降。中滿痞塞。心腹膨脹。腸鳴泄瀉。不思飲食。

人參 白木 陳皮 青皮去毒 神麩炒 麥芽炒 砂仁 厚朴 乾薑各一兩 甘草兩半 煉

蜜為丸。彈子大。每服一丸。食前細嚼。米飲下。

和中丸 八七 治久病厭厭不能食。而臟腑或秘或瀉。此皆胃虛所致。常服之。和中理氣。消痰

積。去濕滯。厚腸胃。進飲食。

白木熟炒二兩 厚朴薑製二兩 陳皮一兩 半夏湯泡一兩 檳榔五錢 炙甘草四錢 枳實五錢 木香二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅。為丸。桐子大。每服三四十九。食前溫水送下。

東垣和中丸 八八 開胃進食。

人參 白木各三錢 乾薑炮 甘草炙 陳皮各一錢 木瓜一枚 右為末。蒸餅丸。桐子大。食前白湯

下三五十丸。

養胃進食丸 八九 治脾胃虛弱。心腹脹滿。面色痿黃。肌肉消瘦。怠惰嗜卧。或不食。常服滋養

脾胃。進食。消痰涎。辟風寒濕冷邪氣。

人參 白茯苓 白木甘浸厚朴薑炒各二兩 神麩二兩 大麥蘖炒 橘紅各一兩 甘草炙一兩 蒼朮堅

而甘者米泔浸去皮五兩炒 右九味為末。水麵糊丸。桐子大。每服三五十九。食前米湯或薑湯送下。

消食丸 九十 治一切食積停滯。

山查 神麩炒 麥芽炒 蘿蔔子 青皮 陳皮 香附各二兩 阿魏醋沒一兩另研 湯泡蒸餅為丸

桐子大每服五十九食遠薑湯下

生導痰丸九一 治一切痰涎壅盛或胸膈留飲痞塞不通

陳皮 半夏 茯苓 甘草 南星 枳殼 右等分每服六錢水二鍾薑五片或十片

煎七分食後服

海五飲湯九二 一留飲在心下二潏飲在腸下三痰飲在胃中四溢飲在膈上五留飲在腸

間凡此五飲以酒後飲冷過多所致

旋覆花 人參 橘紅 枳實 厚朴 半夏 茯苓 澤瀉 白木 猪苓 前胡

桂心 芍藥 炙甘草 水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁

外茯苓飲九三 治胸有停痰宿水自吐出水後心胸膈滿不滿不能食消痰氣令能食

茯苓 人參 白木 枳實 陳皮 生薑 右六味水六升煮取一升八合

分溫三服如人行八九里服之

茯苓飲子九四 治痰迷心竅怔忡不止

陳皮 半夏 茯苓 茯神 麥冬 沉香 甘草 右水一鍾半薑五片煎七分

服 千緡湯九五 治痰喘不得卧人扶而坐一服而安

半夏 炙甘草 皂角 生薑 水一鍾半煎七分不拘時服

半夏 炙甘草 皂角 生薑 水一鍾半煎七分不拘時服

玉液湯九六 治七情所傷。氣鬱生涎。隨氣上逆。頭目眩暈。心膈忪悸。肩稜骨痛。

半夏大者六錢湯池七次切片 右作一服。水鍾半。薑十片。煎七分。入沉香末少許。不拘時溫服。

局四七湯九七 治七情之氣結成痰涎。狀如破絮。或如梅核。在咽喉之間。咯不出。嚥不下。此

七情所為也。或中脫痞滿。氣不舒快。痰飲嘔惡。皆治之。

半夏湯池錢半 茯苓二錢 蘇葉六分 厚朴薑製九分 水一鍾半。生薑七片。紅棗二枚。煎八分。不時服。

研加味四七湯九八 治心氣鬱滯。露痰散驚。

半夏錢半 厚朴製錢 茯苓各一錢 遠志 石菖蒲 甘草各五分 水二鍾。加薑棗煎服。

玉澤瀉丸九九 治心下有支飲。苦眩冒。

澤瀉五錢 白朮二錢 水二鍾。煎七分。食遠溫服。

硃砂消痰飲一百 治痰迷心竅。驚悸怔忡。

膽星五錢 硃砂二錢半另研 麝香二分另研 右為末。臨卧薑湯調下一錢。

深消飲九百一 治停飲胸滿。嘔逆腹中水聲。不思飲食。

白朮炒二兩 茯苓五錢 枳實炒七錢 乾薑炮七錢 右為細末。蜜丸。桐子大。溫水下三十九。

秘方星香丸百二 治諸般氣嗽生痰。

南星蠶水泡一宿 半夏蠶同上 香附皂角水浸一兩 陳皮去白四兩 右不見火為末。薑汁糊丸。每服五

十九。臨卧薑湯送下。

祛痰丸 百三 治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星生半夏生赤茯苓 橘紅 乾薑炮等 右為細末 麩糊丸 桐子大 每服五七十九 不

拘時米飲送下

天花丸 百四 亦名玉壺丸 治消渴引飲無度

人參 天花粉各等 右為細末 煉蜜丸 桐子大 每服三五十九 麥門冬湯下

局玉壺丸 百五 治風痰頭痛亦治諸疾

南星生半夏生各兩天麻 五錢 白麩 三兩 右為末 水和為丸 桐子大 每服三五十九 用水一

大盞煎沸入藥 煮令藥浮即熟 澆出 投溫別用生薑湯下 〇一方用南星半夏各二兩 俱製

天麻白礬各五錢 共為末 以薑汁和丸 如胡椒大 每服三十九 白湯下

玉液丸 百六 治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止欬除煩熱

半夏湯泡焙 枯礬研細各 寒水石服亦為末 右研勻 麩糊丸 桐子大 每服三十九 食後

淡薑湯下

潔玉粉丸 百七 治氣痰咳嗽

南星 半夏各一兩 俱湯浸 橘紅 二兩 右為末 湯浸蒸餅為丸 桐子大 每服五七十九 食後人參

湯薑湯任下

熟杏仁丸 百八 治久嗽及老人咳嗽喘急不得已睡卧不得服此立效

杏仁去皮

胡桃肉去皮

右等分。研為膏。加煉蜜。丸如彈子大。每服一丸。食後細嚼薑湯下。

許學士神木丸百九

治痰飲。此足陽明太陽治溼發散之劑也。

茅山蒼木一斤米泔浸一宿去

生油麻五錢水二盞

大棗十五個煮取肉研

右三味和丸

桐子大。日乾。每服五七丸。空心溫酒下。

三鞠木丸百十

治中脘宿食留飲。酸蟄心痛。嘈雜。口吐清水。

神麴炒三

陳皮一兩

蒼木米泔浸三宿。右為末。生薑汁別煮神麴糊為丸。薑湯送下。

百三仙丸百十

治一切溼痰痰飲。胸膈頻滿。痰涎不利。頭目不清。

南星半夏

香附各等分

右南星。半夏。以滾湯炮過。為末。用生薑自然汁和。不可太軟。用

楮葉或荷葉包佳。外以蒲包。再包會之。令發黃色。曬乾收用。須五六月內。造如會麴之法。每

製丸藥。用藥二兩。香附一兩。同為細末。麴糊為丸。綠豆大。每服四五丸。食後薑湯下。

青州白丸百十

治男婦風痰壅盛。手足癱瘓。嘔吐涎沫。牙關緊急。痰喘麻木。及小兒驚風

嘔吐。

半夏七兩

南星三兩

白附子二兩

川烏半兩

右俱研羅為細末。用生絹袋盛。以磁盆盛

井花水。攪洗粉出。未出者。以手捺攏。再搗再攏。以盡為度。然後日曬夜露。每日一換新水。攪

而復沉。春五夏三。秋七冬十日。去水曬乾。白如玉片。以糯米糊作稀糊。丸如綠豆大。每服二

十九。生薑湯下。無時。如癱瘓。用酒下。小兒驚風。薄荷湯下。五七丸。

方局琥珀壽星丸百十

天南星一斤 硃砂二兩 琥珀一兩

右先掘地坑深二尺。用炭火五斤。於坑內燒熟紅。取出

炭掃淨。以好酒一升澆之。將南星乘熱下坑內。用盆急蓋。以泥壅護。經一宿取出。焙乾為末。

同二味和勻。用生薑汁打麩糊丸如桐子大。每服五十九。煎人參湯空心送下。日三服。○一

方用琥珀四兩。硃砂一兩。仍用猪心血三個。和藥末內糊為丸。如前服。

指茯苓丸百十

治人有臂痛。手足不能舉。或時左右轉移。此伏痰在內。中腕停滯。脾氣不能

流行。上與氣搏。脾屬四肢。而氣不下。故上行攻臂。其脈沉細者是也。但治其痰。則臂痛自止。

及婦人產後發喘。四肢浮腫者。用此則愈。此治痰第一方也。

半夏二兩

茯苓一兩 枳殼炒半兩 風化硝半兩

右為末。薑汁煮糊丸。桐子大。每服三五十丸。

薑湯下。昔有人為痰所苦。夜間兩臂常覺抽掣。兩手戰掉。至於茶鍾亦不能舉。隨服隨效。

又簡易方。治痰飲流注疼痛。止用大半夏二兩。風化硝一兩。為末。以薑汁煮糊丸。桐子大。

薑湯下十五丸。痰在上。臨卧服。在下。食前服。

白螺丸百十

治痰飲積。胃脘痛。

白螺殼

始上年

滑石炒 蒼朮

山梔 香附 南星各一 枳殼 青皮 木香 半夏

砂仁各五錢

右為末。生薑汁浸蒸餅為丸。綠豆大。每服三四十九。薑湯下。○春加川芎。夏加

黃連。冬加吳茱萸。各五錢。

丹潤下丸百十 降熱痰甚妙

半夏二兩 依依南星依炙甘草 黃芩 黃連各一 橘紅半斤 以水化鹽五錢拌勻 煎乾 右為末 蒸餅

丸綠豆大 每服五七十丸 白湯下

集潤下丸百十 治胸膈停痰 降痰甚妙

橘紅一斤 鹽五錢 甘草一兩 右為末 湯浸蒸餅為丸 綠豆大 每服五十九丸 白湯下

丹黃瓜羹丸百十 治食積作痰 壅滯喘急

瓜蒌仁 半夏 山查 神麩炒等 右為末 瓜蒌汁薑湯下 五十九丸

丹杏仁蘿蔔子丸百十 治氣壅痰厥咳嗽

杏仁 蘿蔔子炒各一兩 右為末 粥糊丸 桐子大 每服五十九丸 白湯下

全陳皮湯百十 治嘔吐呃逆

陳皮四兩 生薑半斤 水七升 煮取三升 溫服一升 下咽即愈

本竹茹湯百十 治胃熱嘔吐

半夏薑汁 乾葛各三錢 甘草二錢 右為末 每服二錢 水一鍾 薑三片 竹茹一彈許 棗一枚 同煎七分 去渣 溫服

橘皮竹茹湯百十

治吐利後 胃虛膈熱 呃逆者

人參 竹茹 橘紅各二錢 甘草一錢 水一鍾 半生薑五片 棗一枚 煎八分 溫服

二汁飲_{百二} 治反胃。

甘蔗汁二分 薑汁一分 二味和勻。每溫服一碗。日三服則吐止。

煉葛花解酸湯_{百二} 治飲酒太過。疾逆嘔吐。心神煩亂。胸膈痞塞。手足顫搖。飲食減少。小便

不利。

人參 白朮 茯苓 砂仁 白豆蔻 葛花_錢 青皮 陳皮 豬苓 澤瀉_{各七} 神曲

木香_{各五} 水二鍾。生薑五片。煎七分。食遠稍熱服。取微汗。酒病去矣。或為末。薑醋湯調

服二三錢亦可。

全豬苓散_{百二} 治嘔吐。病在膈上。思水者。

豬苓 茯苓 白朮_{等分} 右三味。杵為散。飲散服方寸匕。日三服。

大人參散_{百二} 治脾胃虛寒。霍亂吐瀉。心煩腹痛。飲食不入。

人參 當歸 厚朴 橘紅_{各二} 乾薑 炮炙甘草_{各五} 加棗一枚。水煎服。

瀉六和湯_{百二} 治夏秋暑溼傷脾。或飲冷乘風。多食瓜果。以致客寒犯胃。食留不化。遂成痞

膈。霍亂嘔吐。及廣南夏月瘴疾寒熱等症。

半夏 人參 炙甘草 砂仁 杏仁_{各一} 赤茯苓 扁豆_炒 藿香 木瓜_{各五} 右咀

每服五錢。水二鍾。生薑三片。棗一枚。煎溫服。○一方。有白朮。香薷。厚朴。各一錢。名六和半夏湯。

良丁香散_{百二} 治霍亂嘔吐不止。

丁香 五分 薑香 枇杷葉 各一錢 右吹咀水一鍾半。薑一片。煎六分熱服。

方丁香半夏丸 百二 治胃寒嘔吐吞酸。

丁香 一兩 紅豆 炒 半夏 製 白木 炒 陳皮 三兩 右為末。薑汁打糊丸。胡椒大。每服二三十丸。薑湯下。

丸薑湯下。

方半夏丁香丸 百三 治脾胃宿食。胸膈停痰。嘔吐惡心。吞酸噎腐。心腹痞滿。不思飲食。

肉豆蔻 丁香 木香 薑香 人參 陳皮 去白各半 半夏 製 右為細末。薑汁煮糊丸。

桐子大。每服三十丸。薑湯下。

和方大七香丸 百三 治脾胃虛冷。心膈噎塞。漸成膈氣。及脾泄瀉痢。反胃嘔吐。

香附 二兩 麥芽 炒 砂仁 藿香 官桂 甘草 陳皮 各一兩 丁香皮 三兩 甘松 烏藥 各

錢 右為末。蜜丸。彈子大。每服一丸。嚼碎。鹽酒鹽湯任下。忌生冷肥膩。

良方許則仁半夏丸 一三 治胃冷嘔逆不食。

半夏 洗去滑 小麥麩 一斤 右水和丸。彈子大。水煮熟。初服四五丸。二服加至十四五丸。旋

煮間服之。

萬定喘湯 百三 治諸喘久不愈。按此方必風痰在肺者乃可用。他則忌之。

白果 三枚 枳殼 炒 款冬花 桑白皮 蜜炙麻黃 製半夏 各三錢 蘇子 二錢 黃芩 炒 杏仁 各錢

水三鍾煎。二鍾作二次服。不拘時。徐徐飲之。

歌 諸病原來有藥方。惟愁喘喘最難當。麻黃桑杏尋蘇子。白果冬花用夏良。

甘草黃芩半夏合。水煎百沸不須薑。病人過北仙丹藥。服後方知定喘湯。

方局 人參定喘湯百三。治肺上喘喉中有聲。坐卧不安。胸膈緊痛。及治肺感寒邪。咳嗽聲重。

入參 麻黃 阿膠 半夏麴 五味子 桑殼 甘草各八分 桑白皮 錢半 水二鍾薑三

片煎八分。食後服。

良方 百合湯百三。治肺氣壅滯。欬嗽喘悶。多渴。腰膝浮腫。小便淋瀝。

百合 赤茯苓 陳皮 桑白皮 紫蘇 大腹皮 枳殼 馬兜鈴 人參 猪苓 炙

甘草 麥冬各一錢。右分二服。每服水一鍾。半薑一片。棗一枚。煎七分。不拘時溫服。

局方 五虎湯百三。治風寒所感。熱痰喘急。

麻黃七分 細茶八分 杏仁去皮尖 石膏一錢 甘草四分 水一鍾。半薑三片。棗一枚。煎服。

三神祕湯百三。治上氣喘急不得卧。

人參一錢 陳皮 桔梗 紫蘇各錢半 五味子十五粒 水一鍾。半煎七分。食遠服。

植神祕湯百三。治水氣作喘。

人參 陳皮 桔梗 紫蘇 半夏 桑白皮 檳榔各一錢 甘草五分 五味子十五粒

水二鍾。薑三片。煎八分。食遠溫服。

蘇子湯百三。治積年上氣喘促。唾膿血不止。而氣實者宜之。

蘇子湯百三。治積年上氣喘促。唾膿血不止。而氣實者宜之。

前胡 桑白皮 麥門冬 貝母各錢 甘草分五 杏仁去皮共 水一鍾半 薑三片 煎七分

濕服

濟百石膏百四 治咳嗽不已。或痰中有血。

百合蒸焙 款冬花 等分 右為細末 煉蜜丸龍眼大 臨卧細嚼 一九薑湯下。

枳殼散百四 治心下痞悶作痛 噎氣如敗卵。

枳殼 白朮各五 香附一兩 檳榔二錢 右為細末 每服二錢 米飲調下 日二三服 不拘時。

保和湯百四 治中染瘴氣 發熱嘔吐 脹滿不食。

厚朴薑製 半夏製 大腹皮黑豆洗 橘紅各八分 枳殼 甘草各五分 生薑三錢 水煎溫服。

十味保和湯百四 治氣虛氣滯作噎。

人參 白朮 茯苓 半夏製 陳皮各一錢 藿香 香附 砂仁各六分 炙甘草 木香各三錢

水一鍾半 薑三片 棗二枚 煎七分 食前溫服。

丹六鬱湯百四 能解諸鬱。

香附二錢 橘紅 蒼朮 撫芎 半夏泡 赤茯苓 梔子炒 各七 炙甘草 砂仁各五分 水

二鍾 薑三片 煎八分 溫服。○氣鬱加烏藥 木香 檳榔 紫蘇 乾薑 倍砂仁 香附。○溫鬱加白朮。

○熱鬱加黃芩 滑梔子。○痰鬱加南星 枳殼 小皂莢。○血鬱加桃仁 紅花 丹皮。○食鬱加山

查神麩麥芽。

局三和散百五 治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘澀

羌活 蘇葉 木瓜 大腹皮 沉香各一錢 木香 檳榔 陳皮 白木 川芎 炙甘草

各七 右咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

生韭飲百五 治食積久則胃腕有瘰血作痛大能開提氣血

生韭搗取自然汁一盞加溫酒一二杯同服○右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以酒汁送

下

三溫膽湯百五 治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽怯變生諸症

半夏湯泡二兩 枳實數炒一兩 陳皮一兩 白茯苓七錢 竹茹一兩 炙甘草四錢 每服四五錢生薑七

片棗一枚水一鍾煎七分食遠溫服○一方有遠志一兩

十味溫膽湯百五 治證同前兼四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安夢遺精滑等症

半夏湯泡三兩 枳實數炒一兩 陳皮各一兩 白茯苓錢半 人參 熟地 棗仁炒 遠志製 五味各二錢 炙甘

草五分 水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸一五 治六鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡疥等症

香附 山查 神麴炒 麥芽炒 撫芎 蒼朮 梔子炒各 右為末調神麴糊丸桐子大每

服五七十九滾湯下○丹溪越鞠丸無山查麥芽

流氣丸百五 治五積六聚癥瘕痞塊留飲之疾是皆鬱氣客於腸胃之間皮膚之下久而停

留變而為痞。此藥能通滯氣和陰陽消舊飲。雖年高氣弱亦可緩緩服之。

木香 小茴香 橘紅 菖蒲 青皮 廣茂 泡檳榔 蘿蔔子 神麴 麥芽 枳殼 炒

補骨脂 炒 砂仁 華澄茄 各一 右為末 麪糊丸 桐子大 每服五十九 細嚼白豆蔻仁一枚 炒

食後白湯送下

嚴五膈散 百五 治五膈五噎

人參 白朮 甘草 白豆蔻 半夏 桔梗 乾薑 華澄茄 木香 杵頭糠 沉香

各三 枳殼葉 五分 水二鍾 薑三片 煎七分 溫服

方局 五膈寬中散 百五 治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不和遂成膈噎 用香燥熱藥故丹燥

發揮其弊宜于茶末 一切氣逆並治

青皮 陳皮 各五 香附 重便 厚朴 炒 白豆蔻 砂仁 丁香 木香 各一 右為細末 每

服二錢 薑鹽湯點服

要道 十膈散 百五 治十般膈氣 風冷氣熱 痰食水憂思喜

人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 枳殼 炒 神麴 炒 麥芽 乾薑 炒 官桂 訶子 煨

三稜 炒 莪朮 炒 厚朴 炒 檳榔 木香 各半 右為細末 每服二錢 入鹽少許 白湯調服

如脾胃不和 腹滿脹悶 用水一鍾 薑五片 棗一枚 鹽少許 煎七分 服

方局 五噎散 百五 治胸膈痞悶 諸氣結聚 脇肋脹滿 痰逆惡心 不進飲食

白木 南星 製半夏麴 枳殼 麩炒青皮 草果 麥芽 大腹皮 乾薑 丁香各一

甘草 五分 水一鍾半 薑五片 不拘時服 煎七分

嘉禾湯 百六 一名穀神散 ○治脾胃不和 胸膈痞悶 氣逆生痰 不進飲食 五膈五噎

白茯苓 砂仁 薏仁 炒 枇杷葉 去毛 桑白皮 炒 沉香 磨汁 五味子 白豆蔻 炙甘草

丁香 人參 白木 各五分 木香 磨汁 青皮 陳皮 杜仲 薑汁 穀芽 炒 藿香 大腹皮 洗

石斛 酒炒 半夏麴 炒 神麴 炒 隨風子 各三分 檳榔 三分 右水二鍾 薑三片 棗二枚 煎八分 食

遠服 ○五噎入柿乾一個 膈氣吐逆入薤白三寸 棗五枚 同煎

扁人參豆蔻湯 百六 治膈噎 寬中順氣

人參 炙甘草 白豆蔻 石葛蒲 各五分 白木 陳皮 半夏麴 蘿蔔子 炒 當歸 厚

朴 各八分 藿香 丁香 各三分 水一鍾半 薑三片 粟米一撮 煎七分服

煎紫蘇子飲 百六 治膈噎上氣 欬逆 因怒未定 便更氣飲食 或食飲畢 便怒 以致食與氣相

逆 遂成膈噎之候

直蘇子 訶子 煨蘿蔔子 微炒 杏仁 去皮 共 人參 各一 木香 五分 青皮 炙甘草 各二

右咀 水一鍾半 薑三片 煎七分服

枇杷葉煎 百六 治五噎立效

枇杷葉 拭去毛 橘紅 各三 生薑 半兩 水一鍾半 煎七分 作二次溫服

統補氣運脾湯百六 治中氣不運噎塞

人參二錢 白朮三錢 黃耆一錢 橘紅半錢 茯苓各錢 砂仁八分 甘草五分 水一鍾半 薑一片

棗一枚煎八分食遠服

利膈散百六 治胸脾膈塞不通

人參 白朮 陳皮 赤茯苓 前胡各一錢 乾薑 桂心 訶子 甘草各五分 水一鍾半

薑五片煎七分頻服之效

明人參利膈丸百六 治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯治膈噎聖藥○按此方必膈噎而

大便秘結者乃可用

人參 當歸 藿香各一兩 木香 檳榔各七錢 枳實炒 甘草各八分 厚朴黃炒 大黃酒浸各二兩

右為末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸百六 治酒積胃痛咽膈不通

草豆蔻煨 白朮各一兩 麥芽一兩 神麴炒 黃芩半兩 半夏各五錢 枳實炒 橘紅 青皮各三錢 乾薑二錢

炒鹽五分 湯浸蒸餅為丸如綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去黃芩庶乎不滯

疎清暑益氣湯百六 治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢節疼痛身熱而煩小便黃數大便

溏濁自汗口渴不思飲食

人參 黃耆 升麻 蒼朮各一錢 白朮炒 神麴炒各五分 陳皮 炙甘草 黃柏 麥冬 當歸

各五乾葛 五味 澤瀉 青皮各三 水煎溫服

扁香薷飲百六 治一切暑熱腹痛。或霍亂吐利煩心等症。○按此方惟治陽暑。陰暑不宜用。

香薷一斤 厚朴半斤 白扁豆半斤 各半斤 每服五錢。水一鍾。半煎。八分。不拘時溫服。

五物香薷飲百七 治一切暑毒腹痛。霍亂吐瀉。或頭痛昏憤等症。

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴 炙甘草各一 右吹咀。水一鍾。半煎。○本方加黃連。即

名黃連香薷飲。

一百十味香薷飲百七 治伏暑身體倦怠。神昏頭重吐瀉等症。

香薷二錢 人參 黃耆 白朮 茯苓 厚朴各半 陳皮 白扁豆一錢 木瓜 炙甘草各五

分 水二鍾。煎七分。食遠溫服。

黃連香薷飲百七 治陽暑中熱。

黃連四兩 香薷一斤 厚朴半斤 每服四錢。如前煎服。

局縮脾飲百七 解伏暑。除煩渴。消暑毒。止吐瀉霍亂。

白扁豆炒 乾葛各一兩 炙甘草 烏梅肉 砂仁 草果各四 右吹咀。每服四錢。水煎

冷服。

局七味滲瀉湯百七 治寒濕所傷。身體重著。如坐水中。小便或赤澀。大便澀泄。因坐卧濕地。

或為陰雨之所襲也。

炙甘草 蒼朮 白朮各一 茯苓 乾薑各二 丁香 橘紅各二 水一鍾半 薑三片 棗一枚煎七分 食前服

清熱滲溼湯百七 方在寒陣百十一 治溼熱浮腫 小便不利

防己黃耆湯百七 治風濕脈浮 身重汗出惡風者

防己 黃耆去蘘各一兩 甘草天半 白朮七錢 右吹咀 每用五錢 生薑四片 棗一枚 水盞半 煎

八分 溫服 不久再服 喘者加麻黃半兩 胃中不和加芍藥 氣上衝者加桂枝 下有

陳寒者加細辛 服後當如蟲行皮中 從腰下如冰 坐厚被上 又以一被繞腰下 溫令微差

一除溼湯百七 治中溼身體重者 腰腿痠疼 大便溼 小便或澀或利

半夏 蜀椒 蒼朮 厚朴 茯苓各錢 陳皮七分 藿香 炙甘草各五分 水二鍾 薑七片 棗二枚 煎七分 食遠服

羌活溼濕湯百七 治外傷濕氣 一身盡痛者 此方通治濕證

羌活 獨活各二錢 藜蘆 防風各錢 蔓荊子 川芎 炙甘草各五分 水二鍾 煎八分 食後

溫服 如身重腰痛 沉沉然 輕有寒也 加酒防己五分 附子五分

疎升陽除溼湯百七 治脾胃虛弱 不思飲食 腸鳴腹痛 泄瀉無度 小便黃 四肢困弱

升麻 柴胡 羌活 防風 半夏 益智仁 神麴 澤瀉各五分 麥蘖麩 陳皮 豬苓

甘草各三錢 蒼朮一錢 右吹咀 作一服 水三大盞 生薑三片 棗二枚 煎至一盞 去渣空心

服。

板升陽除濕防風湯百八 治下痢下血大便祕滯裏急後重數至圜而不能便或下白膿慎

勿利之舉其陽則陰自降矣。

防風二錢 白朮 白茯苓 白芍藥各一錢 蒼朮酒浸去皮炒四錢 右先將蒼朮用水一鍾半煎至

一鍾入諸藥同煎至八分食前服。

三因白朮酒百八 治中溼骨節疼痛。

白朮一兩 用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之。

仲五苓散百八 治暑熱煩躁霍亂泄瀉小便不利而渴淋瀝作痛下部濕熱。

白朮 猪苓 茯苓各七錢 肉桂五錢 澤瀉一兩二錢 古法為細末每服二錢白湯調下日三

服。○今法以水煎服。

加減五苓散百八 治溼熱黃疸小水不利。○即前方五苓散去肉桂加茵陳各等分。

加味五苓散百八 治溼勝身痛小便不利體痛發熱此太陽經解表滲利之劑治風溼寒溼

藥也。○即前五苓散加羌活。

全茵陳五苓散百八 治黃疸。

茵陳蒿末十分 五苓散五分 右和勻先食飲方寸匕日三服。

柴胡茵陳五苓散百八 治傷寒溫濕熱痛發黃小便赤黑煩渴發熱此以汗下太早溼熱未

除。以致通身發黃。嘗用此治之。甚效。

五苓散。一兩茵陳。半兩車前子。一錢木通。柴胡各一錢。右分服二服。用水一鍾半。燈草五

十莖煎服。連進數服。小便清利而愈。○因酒後者。加乾葛二錢。

四苓散。百八。即前五苓散去肉桂。

神豬苓湯。百八。治傷寒下後。脈浮發熱。渴欲飲水。小便不利。及少陰病下利。咳而喘渴。心煩

不得眠者。

豬苓。去皮。茯苓。阿膠。滑石。澤瀉。各一兩。右五味。以水四升。先煮四味。取二升。去滓。內

阿膠。烱盡。服七合。日三服。

茯苓湯。百八。治濕熱泄瀉。或飲食泄瀉。

茯苓。白朮。炒各五錢。右用水煎。食前服。○一方有芍藥等分。名白朮散。

胃苓湯。百九。治脾溼太過。泄瀉不止。

陳皮。厚朴。甘草。蒼朮。白朮。茯苓。澤瀉。豬苓。肉桂。各等。每服五六錢。薑

五片。棗一枚。水煎服。

橘半胃苓湯。百九。治嘔吐泄瀉。脹滿不下。食不知味。

橘紅。半夏。製各一錢。蒼朮。浸炒。白朮。炒。厚朴。炙。甘草。人參。茯苓。澤瀉。茅根。各二錢。

薑汁數匙。水二鍾。煎一鍾。入薑汁再煎一二沸。陸續飲之。

柴苓湯百九 治身熱煩渴泄瀉

白木 茯苓 澤瀉 柴胡 豬苓 黃芩 右水煎服

加減柴苓湯百九 治諸症此和肝腎順氣消痞治瀉之劑

柴胡 甘草 半夏 茯苓 白木 澤瀉 豬苓 山梔炒 山查 荔枝核各分 右吹咀

水二鍾薑三片煎八分食前服

局真人養臟湯百九 治大人小兒冷熱不調下利赤白或如膿血魚腦裏急後重臍腹疔痛

或脫肛墜下酒毒便血並治之

人參 當歸 訶子 肉豆蔻麩煨 炙甘草 木香各一錢 芍藥 白木各三錢 肉桂五分 粟殼

水二鍾煎八分食遠服臟寒者加附子一錢

良方草果散百九 治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴薑汁炒 肉豆蔻麩煨 草豆蔻各十個 右每服三錢薑水煎服

經大橘皮湯百九 治溼熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮 檳榔各一錢 滑石 茯苓 豬苓 澤瀉 白木各二錢 官桂 甘草各五錢 水一鍾半

生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲百九 治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食所致其有脾土本虛不勝肝氣者

此方主之

人參 白朮 茯苓 炙甘草 川芎 半夏 青皮 陳皮 枳實 香附 神麩 砂

仁 木香以上酌虛 實增減用 水一鍾半 薑三片 煎七分 食遠溫服

外 黃芩湯百九 治乾嘔下利

黃芩 人參 乾薑各二兩 桂枝一兩 半夏半斤 大棗十二枚 右六味 以水七升 煮取三升 分

溫三服

秘傳斗門方百九 治毒痢臟腑攪痛 膿血赤白 或下血片 日夜不息 及噤口惡痢 裏急後重

全不進食 久渴不止 他藥不能治者 立見神效

乾薑炒四錢 粟殼蜜炙八錢 地榆 甘草炙各六錢 白芍藥炒三錢 黑豆炒去皮一兩半 右咬咀 可分三四貼 用

水一鍾半 煎七分 食遠熱服

治痢簡易八方二百

外臺秘要方 治痢下白膿不止 用白麩一味 炒熟搗篩 煮米粥肉方寸匕 食之 此療瀉痢

日至百行 藥所不及者也 ○千金方 治痢 用薤白一握 細切 煮粥食之 ○聖惠方 治赤

白痢疾 以葱一握 切和米煮粥 空腹食之 ○千金翼方 用雞子以醋煮極熟 空腹食之 治

久痢赤白 ○又方 用乾薑於火內燒焦黑 不可成炭 放磁瓶中 閉冷 為末 每服一錢 米飲

調下 ○天難散 治脾胃氣虛 腸滑下痢 用黃雌雞一隻 製如食法 以炭火炙之 搥扁 用鹽

醋熨過 又炙令極熟而燥 空腹食之 ○一方 治熱毒下血 痢久不已 用當歸黃連各三錢

烏梅五個。水煎八分。空心服。

類麩丸一二百 治暑溼暴瀉。壯脾溫胃。及治飲食所傷。胸膈痞閉。

神麩炒 蒼朮未切炒等分 右為細末。麩糊丸。桐子大。每服七八十九。未飲下。不拘時。

局方戊己丸二百 治脾經受濕。瀉痢不止。米穀不化。臍腹刺痛。

黃連炒 吳茱萸炮炒 白芍藥各五兩 一方黃連四兩。吳茱萸二兩。芍藥三兩。右為細末。麩

糊丸。桐子大。每服七十九。空心食前米飲下。

聖雙荷散二百 治卒暴吐血。

藕節七節 荷葉頂七個 右入蜜一匙。搗細。水二鍾。煎八分。溫服。或為末。蜜湯調下。二錢亦妙。

直側柏散二百 治內損失血。飲酒太過。勞傷於內。氣血妄行。血如湧泉。口鼻皆出。須臾不救。

服此即安。又治男婦九竅出血。

人參 荆芥穗燒灰各一錢 側柏葉蒸乾一兩半 右為末。每服三錢。入飛羅麩三錢。拌勻。汲水調粘

啜服。

地黃煎二百 治吐血。憂患內傷。胸膈疼痛。及虛勞唾血百病。久服佳。用生地黃一斤。搗取

汁。於銀鍋或砂鍋。微火煎一二沸。入白蜜一斤。再煎至三升。每服半升。日三服。一方。用生

地黃汁一升。生薑汁一合。和勻。溫服。日三四次。一方。治虛勞吐血。用生地黃五斤。搗。以好

酒五升。煮去渣服。

方 枇杷葉散 二百 治者毒攻心嘔吐鮮血

香薷 二錢 厚朴 甘草 麥門冬 木瓜 茅根 各一錢 陳皮 枇杷葉 丁香 各五分 右為

末每服二錢薑水煎服

阿膠散 二百 治肺燥咳嗽不已及唾血

阿膠 炒 白芨 各二錢 天門冬 北五味子 人參 生地黃 茯苓 各一錢 右以白芨為細末

餘藥用水一鍾半入蜜二匙秫米百粒生薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

良方阿膠散 二百 方在婦人六 安胎補血氣

氏阿膠散 二百 方在小兒三四 治小兒咳嗽喘急

綠雲散 二百 治吐血

柏葉 人參 阿膠 炒 珠 百合 右等分為末每服二錢不拘時糯米飲調下

簡黑神散 二百 治一切吐血及傷酒食醉飽低頭拘攣吐血致多并血熱妄行口鼻俱出但

聲未失無不效

百草霜 不拘多少 右研細每服二錢糯米煎湯下喜涼水者以新汲水調服 衄血者用

少許吹鼻皮破出血或灸瘡出血搽之即止

局黑神散 二百 方在婦人五十 治產後惡露不行盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬丸 二百 治吐血咯血大能潤肺止咳

天門冬一兩 貝母 杏仁各七錢炒 白茯苓 阿膠 甘草各五錢 右為細末 煉蜜丸 芡實大每

噙化一九津嚥下。

髮灰散二一 治起居所傷 小便尿血 或忍尿轉 臍下急痛 小便不通 又治肺疽 心衄 內崩

吐血 舌上出血。

亂髮燒灰即血餘也 右每服二錢 以米醋湯調服。

棕灰散五二 治大腸下血不止 或婦人崩漏下血。

敗棕不拘多少燒灰存性為細末 每服二錢 空心好酒或清米飲調服。

鐵平胃地榆湯六二 治邪陷陰分 則陰結便血。

陳皮 厚朴 蒼朮 甘草 地榆 人參 白朮 當歸 芍藥 升麻 乾葛 茯苓

神麩 乾薑炒香附各等分 右吹咀 每服五錢 加薑棗煎 空心服。

海愈風湯七一 一名舉卿古拜散 治一切失血 筋脈緊急 產後或汗後搖擲。

荆芥穗為細末 右先炒大豆黃卷 以酒沃之 去黃卷取淨汁 調前末三四錢服之 輕者一

服重者二三服即止 氣虛者忌服 童便調亦可。

扁小烏沉湯八一 治氣逆便血不止。

烏藥一兩 天甘草 香附醋炒四兩 右為末 每服二錢 食前鹽湯下。

除溼和血湯九二 治陽明經溼熱虛陷 便血腹痛。

當歸身酒拌 牡丹皮 生地黃 熟地黃 黃耆炙 甘草各一 白芍藥錢半 生甘草升

麻 陳皮 秦艽 蒼朮 肉桂各五 水二鍾煎八分空心候宿食消盡熱服

驅瘧飲二百 治諸瘧久瘧不愈者

草果 青皮 陳皮 人參 茯苓 半夏 厚朴 蒼朮炒 檳榔 白木 甘草各一

良薑五分 水二鍾棗二枚烏梅一箇煎八分食遠服

祛瘧飲二二 三發後火盛氣強者可因其衰而減之立效

貝母去心 紫蘇各一 橘紅 山查肉 枳實各錢 檳榔八分 柴胡七分 甘草炙三 知母淨去毛

酒炒過 五錢 右用水二鍾煎一鍾又將渣再煎至八分并一處露過宿臨發日早溫服一半未

發前一時許再溫服後半

截瘧飲二二 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃耆炙一錢 人參 白朮 白茯苓 橘紅 砂仁 草果 五味子各一 甘草七分 烏梅

三枚 水二鍾薑三片棗二枚煎一鍾溫服

生萬安散三二 治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以逐邪取效若氣虛胃弱及妊婦皆

不宜用

蒼朮 厚朴薑炒 陳皮 檳榔 常山酒浸 甘草炙各一 右咀水一鍾半煎八分露一宿

臨發早溫服忌熱物

癰腫甲飲子_{二二}

治瘧疾久不愈。脇下痞滿腹中結塊。名曰瘧母。

鱉甲_{醋炙} 川芎

黃耆 草果仁 檳榔 白朮 橘紅 白芍藥 甘草 厚朴_{製等}

右吹咀每服五七錢。水一鍾。薑七片。棗一枚。烏梅少許。煎七分。溫服。無時。

清脾飲_{二二}

治瘧瘧脈來弦數。但熱不寒。或熱多寒少。口苦咽乾。小便赤滯。

厚朴_製 青皮

白朮 草果仁 柴胡 茯苓 黃芩 半夏 甘草_{各等} 每服四五錢。

水一鍾半。薑三片。棗一枚。未發前服。忌生冷油膩。寒多者可加肉桂。熱多者可加黃連。

方草果飲_{二二}

治諸瘧通用。

草果 川芎

白芷 蘇葉 青皮 陳皮 良薑 炙甘草 右等分。吹咀。每服五錢。水

一鍾半。煎七分。溫服。留渣兩服。并煎。當發日進三服。不以時。加薑煎。亦治寒瘧。

彌七寶飲_{二二}

治一切瘧疾。不拘寒熱。鬼瘧。食瘧。

常山 草果

檳榔 厚朴_{薑製} 青皮 陳皮 甘草_{各一錢} 右用酒水各一鍾。共煎一鍾。

將渣亦如前再煎一鍾。各另放。俱露一宿。至次日當發。清晨面東。先溫服頭服。少頃再飲二

服。大有神效。

簡四獸散_{二二}

治諸瘧。和胃消痰。

人參 白朮

茯苓 甘草_{炙減} 陳皮 半夏 草果 烏梅_{各等} 大棗_{三枚} 生薑_{三片}

右咀以鹽水許。醃食頃。濕紙厚裹。慢火煨香熟。每服四五錢。水一鍾半。煎七分。溫服。

扁常山飲九二二

治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母 常山

草果 烏梅肉各一斤 良薑二十斤 炙甘草一斤

右咀每服五錢薑五片棗一

枚水煎服

丹截瘧丹二百三十

雄黃一兩 人參五錢

右為末於端午日用粽子共九桐子大每服一九發日早面東并花

水吞之忌諸熱味

成截瘧常山飲二三

常山 草果 穿山甲炙 檳榔 甘草炙 知母 烏梅 右等分用水酒各一鍾煎至一鍾

露一宿發前二時溫服如吐則順之

寶交加飲子二三 治痰食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻 草豆蔻各二箇 厚朴二錢半 大甘草二寸半 生薑一兩半 右水一鍾半煎八

分發日空心服未愈再服

柴平湯二三 治脈濡濕處一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡 人參 半夏 黃芩 甘草 陳皮 厚朴 蒼朮 加薑棗煎服

局人參養胃湯二三 治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身體拘急山嵐瘴氣癘癘瘧疾等症

半夏 厚朴薑製 橘紅各八分 藿香 草果 茯苓 人參各五分 蒼朮一錢 炙甘草三分 薑七

片烏梅一個水煎服

和解散^{二三} 治瘴病初作胸脹滿悶頭眩發熱

厚朴^五 陳皮^{各二兩} 甘草^{四兩} 藜蘆^本 桔梗^{各三兩} 蒼朮^{一斤米泔浸}

錢水鍾半薑三片棗二枚煎七分熱服日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證

候任服之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎^{六二三} 治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔 蒼朮 厚朴^製 陳皮 草果^錢 甘草^{一寸} 煨生薑^{一塊} 水一鍾半棗三枚煎

八分食遠熱服

屠酥酒^{七三} 辟山嵐瘴氣瘟疫等症

麻黃 川椒^{去合} 細辛 防風 蒼朮^製 乾薑 肉桂^{去粗} 桔梗^{等分} 右為粗末囊貯浸

酒中密封瓶口三日後可服每日空心服一二杯胃露遠行辟諸邪氣但不能多飲使醉

降椒酒^{八三} 辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香^{二兩} 川椒^{合口者} 右用絹囊醋浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不能

犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風疾有效

方省風湯^{九三} 治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜掣急疼痛風感痰實

防風 南星^{生用各二錢} 半夏^{生用各二錢} 黃芩 甘草^{各一錢} 水二鍾生薑五片煎八分不拘時服○

此藥同導痰湯合服尤妙。

局八風散^{二百} 治風氣上攻頭昏目眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞

聲重。

藿香^{去土}前胡^{去蘆}白芷^{各一}黃耆^炙甘草^炙人參^{各二}羌活^{防風}^{各三}右為細末每

服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分食後溫服或用獵茶清調服一錢亦可。○小兒虛風用

獵茶清調下半錢更量兒大小加減服。

防風當歸湯^二 治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張太陽兼陽明證也宜去風養血。

防風^{當歸}川芎^{熟地黃}^{等分}每服一兩水二鍾煎一鍾溫服。

順風勻氣散^二 治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此。

白木^{人參}天麻^{各五}沉香^{白芷}青皮^{甘草}^{各四}紫蘇^{木瓜}^{各三}烏藥^{一錢}

水一鍾半薑三片煎七分食遠服。

簡星香湯^二 治中風痰厥服熱藥不得者凡痰氣厥身熱面赤者宜服之。

簡星^{八錢}木香^{一錢}右作二貼水二鍾生薑十片煎七分不拘時服。

生研八味順氣散^二 治氣厥身冷似中風凡患中風者先服此藥順氣次進治風藥。

人參^{白木}茯苓^{青皮}陳皮^{白芷}台藥^{各一}甘草^{半兩}右咀每服三錢水一

盞煎七分溫服。

大秦元湯二四 治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自愈。

當歸 芍藥 白朮 生地 熟地 川芎 甘草 茯苓 防風 白芷 獨活 羌活

黃芩各七 秦艽 石膏各一 細辛五分 春夏加知母一錢水二鍾煎一鍾溫服如遇天

陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此方自河間東垣而下俱用為中風之要藥夫既無六經之外證而胡為用羌辛防芷等藥既內無便溺之阻隔而何用秦芩石膏黃芩之類其為風寒痛痺而血虛有大者乃宜此方耳。

拔養血當歸地黃湯二四 治中風少血偏枯筋脈拘攣疼痛。

當歸 川芎 熟地黃 芍藥 藜蘆 防風 白芷各一 細辛五分 水一鍾半煎八分

食遠溫服。

薏苡仁湯二四 治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸屈。

薏苡仁 當歸 芍藥 麻黃 官桂 蒼朮米泔浸 甘草 水一鍾半生薑七片煎八分

食前服○自汗去麻黃有熱減官桂。

滌痰湯二四 治中風痰迷心竅舌強不能言。

南星製 半夏泡七次各 枳實數枚 茯苓各一 橘紅一錢 石菖蒲 人參各一 竹茹七分 甘草五分

水一鍾半生薑五片煎八分食後服。

清心散九四 治風痰不開。

青黛 硼砂 薄荷各二錢 牛黃 冰片各三 右為細末。先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌。將

藥末蜜水調稀。擦舌上。

簡虎骨散二百五十 治半身不遂。肌肉乾瘦為偏枯。忌用麻黃發汗。恐枯津液。惟此方潤筋去風。

當歸 烏蛇肉各二兩 赤芍藥 白木 續斷 薑本 虎骨各一兩 右為細末。每服二錢。食

後溫酒調下。○若骨中煩疼。加生地一兩。○若臟寒自利。加天雄半兩。

虎骨散二五 治風毒走注。疼痛不定。少得睡卧。

虎脰骨醋炙 龜板醋炙 各 血竭另研 沒藥另研 自然銅醋片 赤芍藥 當歸 蒼耳子炒

骨碎補去毛 防風各七錢半 牛膝酒浸 天麻 檳榔 五加皮 羌活各一兩 白附子泡 桂心 白

芷各半兩 右為細末。每服二錢。溫酒調下。不拘時。

交加散二五 治瘧疾。或戰振。或產後不省人事。口吐痰涎。

當歸 荆芥穗等分 右為細末。每服二錢。水一鍾。酒少許。煎七分。灌服神效。

良方交加散三五 方在婦人百。治經脈結聚不調。腹中撮痛。

古潔四白丹二五 清肺氣。養魂魄。以中風多昏。胃氣不清利也。兼能下強骨髓。

白朮 白茯苓 人參 川芎 甘草 砂仁 香附 防風各半兩 白芷一兩 白檀香 薑

香各錢 知母 細辛各二錢 羌活 薄荷 獨活各二錢 犀角各五分 甜竹葉

各錢 知母 細辛 羌活 薄荷 獨活 犀角 牛黃 片腦 甜竹葉

右為木煉蜜為丸每兩作十九丸臨卧嚼一丸煎愈風湯送下。上清肺氣下強骨髓。

續斷丹_{二五} 治中風寒濕筋攣骨痛。

續斷 草解酒浸牛膝酒浸 乾木瓜 杜仲_{炒各二兩} 右為木煉蜜和丸每兩作四丸每服一

丸細嚼溫酒下不拘時。

濟稀養丸_{二五} 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澀手足緩弱。稀養草 生於沃壤間。

帶猪氣者是。五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九曬每蒸用酒蜜酒之蒸

一飯頃九蒸畢日乾為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心酒溫米飲任下。一方每稀養草

一斤加四物料各半兩川為羌活防風各二錢丸服。

獨活湯_{三五} 治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼背項拘急。

當歸 赤芍藥 煨黃耆 薑黃 羌活_{各錢五分} 甘草_{五分} 水二鍾薑三片棗二枚不拘時服。

三痺湯_{八二五} 治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效。

本參 黃耆 當歸 川芎 熟地黃 白芍藥 杜仲_{薑汁炒} 續斷 桂心 牛膝 細辛

白茯苓 防風 秦艸 獨活 甘草 等分水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時。

加味五痺湯_{九二五} 治五臟痺證。

人參 白芍藥 茯苓 川芎_{或倍} 當歸_{錢各一} 五味子_{十五} 細辛_{七分} 甘草_{五分} 白木_{一錢}

用倍 水二鍾薑一片煎八分食遠服。肝痺加秦仁柴胡。心痺加遠志茯苓參芩犀角。

上海廣益書局印行

脾痺加厚朴枳實砂仁神麴○肺痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝
黃耆草薢

人參散^{二百}

治肝脾氣逆胸膈引痛眠卧多驚筋脈掣急此藥鎮肝去邪

人參^{二兩}

杜仲^炒

黃耆^炙秦仁^炒茯苓^{各一}

五味子^{細辛}

去苗熟地黃

秦苑

羌活

去蘆芎藭

丹砂^{細研各}

右為細末入丹砂再研勻

每服一錢不拘時溫酒調下日三服

六味茯苓湯^{二六}

治肢體手足麻痺多痰唾眩胃者

半夏^製赤茯苓

橘紅^{各二}

枳殼^炒

桔梗^{去蘆}

甘草^{炙各}

水二鍾薑五片煎八分不拘

時服

枳實散^{二六}

治心痺胸中氣緊急心微痛氣短促咳唾亦痛不能飲食

枳實^炒桂心

細辛

桔梗^{各七}青皮^{一兩}

右吹咀每服三錢水一鍾生薑一錢半煎

六分不拘時服

紫蘇子湯^{二六}

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子^炒

半夏^{湯泡}橘紅

桂心^{各三}

人參

白木

甘草^{炙各}

右吹咀每服四五錢

水一鍾生薑五片棗二枚煎七分不拘時溫服

除溼獨痛湯^{二六}

治風溼痛痺

羌活

茯苓

澤瀉

白木^{各一錢}

陳皮^{一錢}

甘草^{四分}

蒼朮^末

水二鍾煎八分入薑

末^{泔浸}

汁竹瀝各二三匙服。○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗。○痛在下者加防己木通黃蘗牛膝。

桂心散二六 治風邪走注疼痛。

桂心 漏蘆 芎藭 威靈仙 白芷 當歸 木香 白殭蠶炒 地龍去土炒乾 右為

細末每服二錢溫酒調下不拘時。

溼鬱湯二六 治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧溼地或汗出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠

嗜卧遇陰寒則發脈沉而緩者是也。

蒼朮三錢 白朮 香附 橘紅 厚朴薑汁炒 半夏製 白茯苓 撫芎 羌活 獨活各一錢 甘

草五分 生薑五片 水煎服。

起痛散二六

乳香 沒藥 桃仁 紅花 當歸 羌活 地龍酒炒 牛膝酒洗 甘草 香附薑洗 五靈

脂酒炒 右為末每服二錢酒調服。○或加酒炒芍藥。

秦朮地黃湯二六 治風熱血燥筋骨作痛。

秦朮 生地黄 當歸 川芎 白芍藥 甘草 防風 荆芥 升麻 白芷 蔓荊子

大力子蒸羌活各一錢 右水煎服。

活絡飲二六 治風溼痺痛諸藥不效。

當歸 白朮 川芎 羌活 獨活各一錢 甘草五分 木一鍾半薑五分煎七分溫服。

獨活寄生湯二百七十 治腎虛卧冷寒濕當風腰脚疼痛

獨活一錢 杜仲炒 細辛 桑寄生 人參 當歸 川芎 芍藥 茯苓 牛膝 甘草

桂心 熟地黄 防風 秦艽 本一鍾半 薑三片 煎七分 空心服

透經解鬱湯二十七 治風熱筋攣骨痛

穿山甲三錢 荆芥 紅花 蘇木 羌活 蟬蛻去土 防風 天麻 甘草各七 白芷

連翹 川芎各五 右酒水各半煎服

黃蒸方二十七 治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腰膝經絡致成脚痺疼痛宜用

此藥和榮衛通經絡亦是治痺之法

花椒一撮 葱三大 鹽一把 小麥麩四升 酒一盞 醋不拘多少 以井右放銅器內炒令極熱

攤卧褥下將患脚薰蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汗出為度勿見風○或加薑桂亦妙

黃泥痛風法二十七 治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內用前湯泡之桶邊放一瓦甕桶

內安一矮甕令病人坐桶邊放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞眼其

功甚捷

愈風丹二十七 治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不遂等症

羌活兩 當歸 熟地 生地各一斤 杜仲七兩 天麻 草薢另研 牛膝酒浸 玄參各六 獨活

羌活兩 當歸 熟地 生地各一斤 杜仲七兩 天麻 草薢另研 牛膝酒浸 玄參各六 獨活

五兩肉桂 三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十九或百丸空心食前溫酒或白湯下。

易老天麻丸 二七

治諸風肢節麻木手足不遂等症。

天麻 酒浸三

日焙乾

牛膝 製同

薺活 各六兩

附子 製一

羌活 十兩

生地 一斤

丸服如前

法○一方有玄參六兩杜仲七兩獨活五兩

按此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯

經絡宜改用熟地為妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否此最少亦宜

四兩或六兩方可也

不隨故以血藥為君佐以天麻羌活薺活去濕祛痰之藥少加附

子引經通達

非為寒邪也

愈風燥溼化痰丸 二七

治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無休者。

白木 炒 蒼木 浸 杜仲 薑汁炒 牛膝 酒浸 川芎 薺仁 巴戟 破故紙 炒 各當歸 牙皂

瓦炒 防風 羌活 生地 獨活 防己 天麻 南星 半夏 陳皮 木香 沉香

川烏 礞石 全蝎 各五錢

右為末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次食

乾物壓之

活絡丹 二七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

草烏 泡去 川烏 泡去 膽星 各六兩 地龍 炮乾 乳香 去油 沒藥 各二兩

蜜丸桐子大每服二三

十九溫酒茶清任下

煨開結導飲丸 二七

治飲食不消心下痞悶脚腿腫痛

上海廣益書局印行

上海廣益書局印行

上海廣益書局印行

上海廣益書局印行

上海廣益書局印行

上海廣益書局印行

白朮炒 陳皮炒 澤瀉 茯苓 神麩炒 麥芽炒 半夏製 枳實炒 青皮 乾薑各五 ○如有

積塊者。加巴霜錢半為末。湯浸蒸餅為丸。梧子大。每服四五丸。或十丸。溫水下。此內傷飲食。

脾胃之氣不能運行上升。則注為腳氣。故用此以導引行水化脾氣也。

換骨丹二七 通治諸風痺痛。兼治鶴膝風。○此與後史國公浸酒方大同。

虎骨酥炙 防風 牛膝 當歸 羌活 獨活 敗龜板 秦艽 草薢 晚蠶沙 松節

各一兩 枸杞半 茄根洗淨 酒糊丸。或酒浸。或為末服亦可。

右換腿丸二百 治足三陰經為風寒熱濕所侵。發為攣痺。縱緩疼痛。上攻胸脇。下至腳膝。足

心發熱。行步艱難。

薤仁 南星 防己 石斛 檳榔 草薢 石南葉 羌活 防風 木瓜各四 牛膝酒

當歸 天麻 續斷各一 黃耆半 右為末。酒糊丸。梧子大。每服五十九丸。空心鹽酒下。

史國公浸酒方二八 一名萬病無憂酒。○治諸風五痺。左癱右瘓。四肢頑麻。口眼歪斜。骨節

疼痛。諸般寒濕風氣。效難盡述。

當歸 龍甲炙 羌活 草薢 秦艽 防風去蘆 牛膝 晚蠶沙 松節各二 枸杞五 乾

若根八兩 虎腰骨酒浸一日 用無灰酒一斗。絹袋盛藥入酒內封十日。可取飲。服時不

可面向棹口。恐藥氣衝人頭面。飲酒不可間斷。飲盡時藥渣曬乾為末。米糊丸。桐子大。空心

酒下五十九丸。忌發風動氣等物。

方煨腎散二八 治腰痛

人參 當歸 杜仲 肉蓯蓉 破故紙 巴戟 鹿角霜 秋石等分 為末用猪腰子

一個洗淨血水。淡鹽氾過。劈開兩半勿令斷。中間細細花開。用前藥摻入。另用細絹包裹。線縛定。外用小砂罐入酒少許。用紙封固。毋令泄藥氣。煮腰子候熟。取食之。仍飲醇酒三杯。立愈。

調榮活絡飲二八 治失力閃腰。或跌撲瘀血。及大便不通腰痛。

當歸 牛膝 杏仁研如泥 大黃各二錢 生地 芍藥 紅花 羌活各一錢 桂枝二分 川芎一錢

水一鍾半煎八分。食前溫服。

胡桃湯二八 治腎虛腰痛

胡桃肉 補骨脂 杜仲各四兩一錢 右咬咀。分二貼。用水二鍾煎七分。空心服。

狼鷄鳴散二八 治腳氣第一品藥。不問男女皆可服。如感風溼流注。腳痛不可忍。筋脈浮腫。

者皆宜服之。其效如神。

檳榔七枚 橘紅 木瓜各一兩 吳茱萸 蘇葉各三錢 桔梗去蘆 生薑連皮各半兩 右咬咀。用水三

大碗慢火煎至一碗半。取渣。再入水二碗。煎取一小碗。兩汁相和。安置床頭。次日五更分作

三五次冷服之。冬月略溫亦可。服了用乾物壓下。如服不盡。留次日漸漸服之。亦可。服藥至

天明。當下黑腎水。即是腎家所感寒濕之毒氣也。至早飯時。必痛住腫消。只宜遲喫飯。使藥

力作效。此藥並無所忌。

萊菔木瓜湯二八

治腳氣衝心。悶亂不識人。手足脈欲絕。

吳茱萸半兩

乾木瓜一兩 檳榔二兩

右咬咀。每服八錢。水一鍾半。生薑五片。煎八分。不拘

時溫服。

立效散二八

治腳氣攻心。此方消腫甚效。及治暴腫。

檳榔七枚 生薑二兩 陳皮

吳茱萸 紫蘇 木瓜各一兩

右水三升。煎一升。分作二服。

丹防已飲二八

治腳氣

白朮 木通

防已 檳榔 川芎 甘草稍 犀角 蒼朮鹽水炒 生地黄 黃柏酒炒

右水煎服。○大便實加桃仁。○小便澀加牛膝。○有熱加黃芩黃連。○大熱及時令熱加石膏。

膏。○有痰加竹瀝薑汁。

紫蘇散二八

治腳氣上氣。心胸壅悶。不得卧眠。

蘇葉 桑白皮 赤茯苓 檳榔 木瓜各一兩 炙甘草 紫苑 前胡去蘆 杏仁去皮 百合

各七錢。右咬咀。每服八錢。水一鍾半。生薑五片。煎八分。不拘時溫服。

三紫蘇湯九

治腳氣陰陽交錯。上重下虛。中滿喘急。嘔吐自汗。

蘇子炒半夏 梨各一錢 前胡 厚朴薑汁炒 甘草炒 歸身各七錢 陳皮 肉桂各四分 水一鍾半。薑三

片。煎七分。不拘時服。

生檳榔湯二九 治一切腳氣散氣疎壅。

檳榔 香附 陳皮 蘇葉 木瓜 五加皮 甘草各七錢 右吹咀水一鍾半。生薑三片。

煎服。

加減檳榔湯二九 治一切腳氣脚弱。名曰壅疾。貴在疎通。春夏尤宜服之。

檳榔 橘紅 蘇葉各一兩 甘草半兩 右每服五七錢。水一鍾半。生薑五片。煎八分。不拘時

溫服。如脚痛不已者。加木香五加皮。○婦人脚痛。加當歸。○室女脚痛。多是肝血滯實。宜

加赤芍藥。○中滿不食。加枳實。○痰厥或吐。加半夏。○腹痛。大便不通。用此湯下。青木香丸

或加大黃。○小便不利。加木通。○轉筋者。加吳茱萸。○脚腫而痛者。加大腹皮。木瓜。○脚痛

而熱。加地骨皮。

檳榔散二九 治脚氣衝心。煩悶不識人。

檳榔 茴香 木香各半兩 右吹咀。每服五錢。以童便一鍾。煎七分。不拘時溫服。

活桑白皮散二九 治脚氣感發。上氣喘促。兩脚浮腫。小便赤澀。腹脹滿。氣急。坐卧不得。

桑白皮 郁李仁各一兩 赤茯苓二兩 木香 防己 大腹皮各一兩 蘇子 木通 檳榔

青皮各七錢 右每服三五錢。薑三片。水煎服。

木香散二九 治脚氣衝心。煩悶。膈下氣滯。

木香半兩 檳榔 木通各一兩 右吹咀。每服八錢。水一鍾半。生薑五片。葱白七寸。煎八分。不

拘時溫服。

木通散二九

治脚氣遍身腫滿喘促煩悶。

木通去皮

蘇葉

猪苓各一兩

桑白皮

赤茯苓

檳榔各二兩

右吹咀每服五七錢水一鍾

半生薑五片葱白七寸煎一鍾不拘時溫服。

人參桂心散二九

治脚氣嘔逆心煩不能飲食。

人參去蘆

赤茯苓

檳榔

麥門冬

橘紅各一兩

桂心七錢

右吹咀每用八錢水一鍾半。

加生薑七片煎服。

橘皮湯二九

治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食。

橘紅

人參去蘆

蘇葉各一兩

右吹咀每服八錢水一鍾半。

半夏散二九

治脚氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食。

半夏洗七次

桂心各七錢

赤茯苓

人參去蘆

橘紅

前胡去蘆

檳榔各一兩

蘇葉一兩

右吹咀。

每服五七錢水一鍾半生薑七片淡竹茹二錢煎七分溫服無時。

大腹皮散三百

治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利。

大腹皮三兩

木瓜

蘇子

檳榔

荆芥穗

烏藥

橘紅

蘇葉各一兩

蘿蔔子半兩

沉香

枳殼數炒

桑白皮各兩

右吹咀

每服八錢

水一鍾半

薑五片

煎八分

溫服

御醫藥方

加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味即名沉香大腹皮散。

活人 大腹子散^{三百} 治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘇 木通 桑白皮 羌活 木瓜 荆芥 赤芍藥 青皮 獨活^{各一兩}

枳殼^{二兩} 右每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎空心溫服

地黃湯^{三百} 治穿心脚氣 熟地黃^{四兩} 當歸^{二兩} 芍藥 川芎 牛膝 酒浸 三柰^{各一兩} 杜仲^{半兩} 汁炒 右吹咀每服一

兩水一鍾半煎八分不拘時溫服

木瓜湯^{三百} 治脚氣

木瓜 大腹皮 紫蘇 木香 羌活 炙甘草^{各一錢} 茯苓 陳皮^{各八分} 水一鍾半煎八

分食前服

沉香湯^{三百} 治脚氣攻心煩悶氣促脚痠痛

沉香 木通 檳榔^{各五分} 吳茱萸^{三分} 赤芍藥^{一錢} 紫蘇^{一錢} 水一鍾半生薑三片煎八

分不拘時溫服

續斷丸^{三百} 治風溼流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷 當歸 萆薢 附子 防風 天麻^{各一兩} 乳香 沒藥^{各半兩} 川芎^{七錢} 右為細

末煉蜜丸桐子大每服四十九丸空心溫酒送下或米飲下

本續斷丸^{三百} 治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚瘡疼痛風毒流注下部行止艱難小便餘

此藥補五臟內傷。調中益氣。涼血強筋骨。

杜仲五兩 五加皮 防風 薏仁 羌活 續斷 牛膝酒浸各三兩 萸薢四兩 生地黃五兩

右為末。用好酒三升。化青鹽三兩。用木瓜半斤去皮子。以前鹽酒煮成膏。和藥為丸。桐子大。每服五七十丸。空心食前濕服。酒鹽湯任下。

保命牛膝丸三百 治肝腎虛損。骨痿不能起於床。筋弱不能收持。宜益精緩中。

牛膝酒浸 萸薢 杜仲炒 白茯苓 防風 兔絲子酒煮 肉苁蓉酒浸 官桂減半 右為末。

酒煮猪腰子。搗和丸。桐子大。每服五七十丸。空心溫酒下。

本酒漫牛膝丸三百 治腰脚筋骨癱軟無力。

牛膝三兩 川椒去合 虎骨真者醋炙 附子一枚 泡 右吹咀。用生絹作袋。盛藥。以煮酒一斗。

春秋浸十日。夏七日。冬十四日。每日空心飲一大盞。酒盡出藥為末。醋糊丸。每服二三十丸。

空心溫酒鹽湯任下。忌動風等物。

萊萸丸三百 治脚氣入腹。喘急欲死。

吳茱萸泡 木瓜等分 右為末。酒糊丸。梧子大。每服五七十丸。至百丸。空心酒飲任下。○或以

木瓜蒸爛。研膏丸。尤妙。○此方內加大黃。名二將軍丸。

東健步丸三百 治脚膝無力。屈伸不得。腰背腿脚沉重。行步艱難。

防己酒洗 羌活 柴胡 滑石炒 炙甘草 天花粉酒洗 各 防風 澤瀉各三錢 苦參酒洗

川烏錢各一 肉桂五分 右為細末酒糊丸桐子大每服七十丸煎愈風湯空心送下。

調元健步丸三一 治陰虛血少濕熱兼行足履無力。

當歸酒洗 川黃柏鹽酒炒 枸杞各二 牛膝酒洗 白芍藥微炒 白茯苓 白朮炒 蒼朮 陳皮

各一 炙甘草三錢 木瓜 五加皮各八錢 川續斷七錢 澤瀉 防己各五錢 蜜丸桐子大空心

鹽湯送下七八十丸或百丸。

三勝駿丸三一 治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足攣拳或脚面連指走痛無定筋脈不伸

行步不遂常服益真氣壯筋骨。

附子泡製 當歸 天麻 牛膝 木香 棗仁炒 熟地酒蒸 防風各二 木瓜四兩 羌活 乳

香各半 全蝎炒 甘草一錢 沒藥各一 麝香二錢 右為末用生地黃三斤以無灰酒四升煮乾

曬二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸

服亦可。

神應養真丹三一 治厥陰經為四氣所襲脚膝無力或右癱左癱半身不遂手足頑麻語言

蹇澀氣血凝滯遍身疼痛。

當歸酒浸片 熟地黃酒蒸 川芎 芍藥 羌活 天麻 羌絲子酒製 木瓜等分 右為末

入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心酒下鹽湯亦可。

透骨丹三一 專治腳氣。

川烏港羌活 沉香 乳香研細 川芎 檳榔 木瓜各一兩 木香半兩 白茯苓二兩

右為末。麩糊丸桐子大。食前薑湯下六七十丸。

本虎骨酒三一 去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎腰骨真者 草薢 五靈脂 薏苡仁 牛膝 熟地黄各二兩 右對細絹袋盛。浸酒二斗。

飲了一盞入一盞。可得百日。婦人去牛膝。

活人薏仁酒三一 治脚痺。

薏苡仁 牛膝各二兩 海桐皮 五加皮 獨活 防風 杜仲各一兩 熟地黄半兩 白木半兩

右為粗末。以生絹袋盛。用好酒五升。浸春秋冬二七日。夏月分作數貼。逐貼浸酒用之。每日

空心溫服一盞。或半盞。日三四服。常令酒氣不絕。久服覺皮膚下如有蟲行。即風濕氣散。

椒艾囊三一 治脚氣極效。及避一切脚氣風氣毒氣。

艾葉炒半斤 川椒一斤 草烏二兩 右三味和勻。用布袂鋪如錦褥。裹足底及足脛。即用火

踏下。加微火烘踏於上。使椒艾之氣得行於足。自然寒濕風毒諸氣皆得消散。立能止痛。痛

止後。仍要三二日一為之。或夜卧包之。連旦去之。用此方法。無不效者。

丹 湯 敷脚氣方三一 治脚氣腫痛。

芥菜子 白芷等分 右為末。薑汁和敷痛處。

蕪荑散三一 治大人小兒。虻咬心痛不可忍。或吐青黃綠水涎沫。或吐蟲出。發有休止。此虻

心痛也宜此主之

蕪荑 雷丸 各半兩 乾漆 搗碎炒火

右為細末每服三錢用溫水七分調服不拘時甚者不

過三服小兒每服五分

直蕪荑散 三百 取諸蕪

雞心檳榔 蕪荑 各三錢 木香 一錢 右為末作一服先以酸石榴根煎湯候五更時乃嚼

肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟因而下

櫃子煎 三二 治寸白蟲化為水

細櫃子 四十九 以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦空心服七枚七日服

盡蟲化為水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神

效方也

聖效方 三二 治寸白蟲神效

檳榔 半兩 南木香 二錢 右為細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只嚙汁

下咽吐其肉隨即服藥已間當蟲下盡去病根此方簡易屢驗

仲烏梅丸 三二 治胃寒吐蛇虺厥等症

烏梅肉 三十 人參 黃柏 各 細辛 附子 炮桂子 各六錢 黃連 炒一兩 乾薑 一兩 當歸 酒浸

川椒 去目及閉口者各四錢 右研末先將烏梅用酒蒸爛搗膏加煉蜜丸桐子大每服一二

十九日三服。退生冷滑物。或用理中湯下。○成無己曰。肺欲收。急食酸以收之。為梅之酸。以收肺氣。脾欲緩。急食甘以緩之。人參之甘。以緩脾氣。寒溼於內。以辛潤之。當歸。桂枝。細辛之辛。以潤內寒。寒溼所勝。平以辛熱。薑附之辛熱。以勝寒。虵得甘則動。得苦則安。黃連。黃柏之苦。以安虵。

生烏梅丸三二

方在固陣六十。

治大便下血。

神投散三二

方在固陣二五。

治傳尸癘毒。

鑽川棟散三二

治諸疝小腸氣。

木香

小茴香鹽炒各一兩

川棟子一兩用已豆十五粒打破用炒黃色

巴豆不用

右為末。空心酒下二錢。

荔枝散三二

治疝氣陰核腫大痛不可忍。

大茴香炒

沉香

木香

青鹽

食鹽各四兩

川棟肉

小茴香各二錢

荔枝核十四枚用新煮燒其殼

右為細末。每三錢。食前熱酒調服。

經蒼木散三二

治下元虛損偏墜。腎莖痛楚。

真茆山蒼木六斤粉六

一斤用老米泔水浸二日夜。

一斤酒浸二日。切片曬乾。

斗子青鹽半斤同炒黃色

不用鹽。

一斤小茴香四兩同炒黃色

去茴香不用。

茴香四兩同炒如前

一斤桑椹二斤取汁。拌製曬乾。

右為細末。每服三錢。空心酒下。

實天台烏藥散三二

治小腸疝氣。卒引臍腹痛。

烏藥 木香 茴香 炒良薑 炒青皮各半 檳榔 二個 川棟子 十個 巴豆七粒 右將巴豆微

打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用其餘共為細末每服一錢溫酒下甚者薑湯下

百桃仁膏三百 治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可忍

桃仁炒去 大茴香炒 右等分為末每服二錢葱白二寸煨氣蒸藥細嚼空心熱酒下

扁守效丸一三三 治癩疔不痛者之要藥

蒼朮 南星 白芷 川芎 山查 半夏 枳實一云 右等分為末薑汁糊丸桐子大

每七八十丸鹽湯下○有寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹二 治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹痛疝氣小兒驚風

硝石一兩同 破黃為末入磁瓶內用微火炒以柳枝攪胎上硫黃一兩 五靈脂澄去 橘紅

青皮各二兩 太陰玄精石各一 右為末醋糊丸豌豆大每服三十九空心米飲下○伏

暑間亂紫蘇湯下○大人疝氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕研碎米湯下

生潤腸湯三三 治大便燥結不通

生地黄 生甘草 熟地黄 當歸尾 大黃各五錢 桃仁 麻子仁各一錢 紅花 石水二盞

煎一盞空心服

通急湯三三 治大便燥急兼黑腹痛

蘇地 生地 當歸梢 紅花 桃仁泥 大黃各一升 麻二分 水一鍾半 煎服○古方

加麻仁甘草。即名潤燥湯。

東華滯通幽湯三三

治幽門不通。氣不升降。大便閉塞。凡脾胃初受熱中。多有此證。治在幽

門。以辛潤之。

升麻 桃仁泥 歸身各一錢 炙甘草 紅花各三 熟地 大生地各五 水二鍾。煎一鍾。調

攪。每服五分。稍熱服。

阿膠補湯三三

治大便氣秘不通。不能飲食。小便清利者。謂之虛秘。此湯主之。蓋實秘者物

也。虛秘者氣也。

厚朴一錢 白朮二錢 半夏 枳殼 陳皮 甘草各一 水一鍾半。薑三片。棗三枚。煎八分。

食前服。如不通。加大黃一錢。

繪皂角散三三

治大小便關格不通。經三五日者。

大皂角燒存

右為末。米湯調下。○又以豬脂一兩煮熟。以汁及脂俱食之。○又宜以八正

散加槓榔。枳殼。朴硝。桃仁。燈心。茶葉。煎服。

良方三仁丸三三

治大腸有熱。津液竭燥。大便澀。

柏子仁 松子仁 大麻仁各一 右研勻。用黃蠟半兩溶化。和丸。桐子大。每服二十丸。食

前米飲下。米快加數服之。

脾約丸三三

方在攻陣丸三。通大便秘結。

棟潤腸丸四十 治胃中伏火。大便秘澀不通。不思飲食。或風結血秘。皆須潤燥。和血疎風。則自通矣。

當歸精

大黃煨 羌活各五錢 麻仁 桃仁去皮共 右以二仁另研為泥。外為細末。煉蜜為

丸。桐子大。每服三五丸。空心白湯送下。一方有皂角仁。秦艽各五錢。

濟菴潤腸丸三四 治發汗利小便。致亡津液。六腑秘結。老人虛人宜服。

肉蓯蓉酒浸焙 沉香另研 右為末。取麻子仁搗爛。和水取汁。打糊。丸。桐子大。每服七八十

丸。空心米飲或酒送下。

益血潤腸丸三四 治老人大便燥結。

熟地黃六兩 杏仁炒去 麻仁各三兩 以上各二 枳殼炙炒 肉蓯蓉酒洗 阿膠炒 蘇子

荆芥各一兩 當歸三兩 右以後七味為末。同前三味膏。和杵千餘下。仍加蜜煉。丸。桐子大。

每服五六十丸。空心白湯或酒下。

搜風順氣丸三四 治痔漏風熱閉結。老人燥秘等症。

車前子半兩 大麻子微炒 大黃五錢 牛膝酒浸 郁李仁 羌絲子酒浸 枳殼 山藥各

錢 右為末。煉蜜丸。桐子大。每服三十丸。溫酒下。

聖搜風順氣丸三四 治風氣脚氣。凡老人小兒血熱風熱。而大便秘結者宜服。

車前子兩半 大麻仁微炒 郁李仁皮 羌絲子酒浸 牛膝酒浸 乾山藥各一兩 白橫榔一兩

枳殼

數抄防風

獨活

各八錢五分

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地龍湯

三四 治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通莖中痛甚欲死○一名牛膝膏又名

苦杖散

牛膝不拘多少或用一兩槌碎以水二鍾煎濃汁一鍾去渣日三服○又法入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏

三四 治死血作淋

桃仁

去皮歸尾酒洗各一兩 生地黃酒洗赤芍藥各兩川芎五錢牛膝去蘆四兩右吹咀用好

水十鍾炭火慢煎至二鍾入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

經琥珀散

三四 治老人虛人小便不通淋瀝

琥珀

為末人參煎湯 空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散

三四 方在寒陣一二二利小腸熱瀉

萬全木通湯

三四 治小便難而黃

木通

赤茯苓車前葉滑石各二瞿麥一錢水一鍾半煎七分食前服

蔥白湯

三百 治小便卒暴不通小腹脹氣急上衝心悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂

氣無所伸衝逆胞系鬱悶不流

陳皮

三兩 葵子一兩蔥白三莖右吹咀用水五升煮取二升分三服○一云每服五錢蔥

白三莖水煎服

東清肺飲子三五 治渴而小便不利。邪熱在上焦氣分也。

茯苓 猪苓 澤瀉錢半 車前子 琥珀 木通 瞿麥 篇蓄錢各一 通草 燈心各五

水二鍾煎一鍾食遠服

半夏丸三五 治溼痰流注。白濁神效。

半夏製猪苓等分 右為末神麩糊丸服。○按此方與本事猪苓丸同意。詳固陣四十八。

煎醜醐膏三五 治消渴。

白砂蜜 五斤 砂仁為木 烏梅一斤 槐碎用水四 右入砂鍋慢火熬赤色成膏。取下放冷。加

白檀細末三錢。麝香一字攪勻。以磁器收貯。蜜封。冬月沸湯調服。夏月涼水亦可。

澤養勞湯三五 治五疸虛弱。脚軟心悸。口淡耳鳴。微發寒熱。氣急小便白濁。當作虛勞治之。

人參 黃耆 白朮 當歸 甘草炙 桂心 陳皮各一兩 白芍藥三兩 生地黄 茯苓各五

五味子 遠志錢各三 右吹咀。每服一兩。水一鍾半。薑三片。棗三枚。煎七分。食前服。

細綠礬散三五 治黃胖。

綠礬六兩 以末醋於鐵勺內炒七 南星炒黃 神麩一兩 炒 大皂角一斤 鐵鍋水煎爛。搗出聲

成膏。乾為度。放地上出火氣。右前三味為細末。以皂角來膠搗丸。桐子大。每服五丸。清晨

下床時。用薑湯下。夜卧上床時。再服五丸。忌油膩煎炒。如身上發紅斑。急煎薑湯解之。自愈。

蒲濟眾方^{三五} 治心氣不甯。怔忡驚悸。清上膈風熱痰飲。

白石英 硃砂^{等分} 右為細末。每服五分。用金銀湯調下。

抱膽丸^{三五} 治男婦一切癩癩風狂。或因驚恐畏怖所致。及婦人產後驚氣入心。并室女經

脈通時。驚邪蘊結。氣實上感者。累效。

水銀^{二兩} 黑鉛^{一兩} 硃砂^{細研} 乳香^{細研} 各^{一兩} 右將黑鉛入銚子內溶化。下水銀結成砂子。

次下硃砂乳香。乘熱用柳木棰研勻。丸雞豆子大。每服一丸。空心井花水吞下。病者得睡。切

莫驚動。覺來即安。再一丸可除根。

靈苑辰砂散^{三五} 治風痰諸癩。狂言妄語。精神恍惚。思慮迷亂。乍歌乍哭。飲食失常。痰發仆

地。吐沫戴眼。魂魄不守。

辰砂^{光明佳} 棗仁^{微炒} 乳香^{明者各} 右為細末。先令病人隨量契飲。沉醉。但勿令吐。居靜

室中。將前藥都作一服。用溫酒一鍾調勻。令頓飲之。如量淺者。但隨量取醉。服藥訖。便令安

卧。病淺者。半日至一日。病深者。卧三兩日。只令家人潛伺之。察其鼻息勻調。切勿喚覺。亦不

可驚觸。使覺。必待其自醒。則神魂定矣。萬一驚寤。則不可復治。吳正肅公少時心病。服此一

劑。寤五日遂瘥。

歸神丹^{三五} 治五癩諸風。痰壅驚悸。神不守舍。

人參 當歸 棗仁 白茯苓^{各二兩} 硃砂^{大塊} 琥珀 遠志^{薑湯} 龍齒^{各一兩} 金箔 銀箔^各

片右為末。酒糊丸。桐子大。每服三五十九。麥門冬湯下。

得效。甯志丸。三百六十。治心風癩癩。服此一料。其病頓減。

硃砂一兩。人參。白茯苓。當歸。石菖蒲。乳香另研。棗仁沒去皮取仁炒。右將硃砂

用熟絹一小片。包裹線紮。以獾猪心一枚。竹刀切開。紙拭去血。入硃砂包定。再外線縛外。以

竹箬重裹。麻皮紮緊。用無灰酒二升。同入砂罐煮湯。酒盡取出。硃砂另研。將猪心用竹刀細

切。砂盆內研爛。拌入藥末。再加煮熟淨棗肉四兩。搗丸。桐子大。留少硃砂為衣。每服五七十

凡人參湯下。

人參琥珀丸一三六。治癩癩。

人參。琥珀另研。白茯苓。石菖蒲小者。遠志酒浸各半兩。乳香另研。硃砂水飛。棗仁溫酒浸半

二錢半。茯苓半錢。右為末。煉蜜丸。桐子大。每服三五十九。食後溫酒送下。日再服。如不

能飲者。棗湯下。此可常服。

秘方半夏丸一三六。治心風癩狂。張德明傳。其內人失心狂數年。服此藥而愈。後再作。服

人參琥珀丸而安。

半夏一兩。用生薑汁煎三五升。取麝香一錢。水銀半兩。生薄荷一大握。用水

荷泥更研千百下。丸如芥子。每服十五丸。金銀湯臨卧服。三日再服。

神應丹三六。治諸癩。

辰砂佳者不右研細。豬心血和勻以蒸餅裏劑蒸熟。就熟取出。九桐子大。每服一丸。人參湯下。食後臨卧服。

氏場五癩神應丸三四六 治癩癩潮發不問新久。

白附子泡半 半夏二兩 南星 烏蛇酒浸 白礬生各 全蝎炒二 蜈蚣半條 白殭蠶炒一 麝香三字 皂角二兩 碎用水半升洗淨 去藥二 右為細末。生薑汁煮。麪糊丸。桐子大。每服三十丸。生薑湯食後送下。

局方牛黃清心丸三五六 治心志不定。神氣不甯。驚恐癩狂。語言謔妄。虛煩少睡。甚至暴衣登高。踰垣上屋。或小兒風痰上壅。抽搐發熱。或急驚痰厥。發搐目反口噤。煩躁等症。

白木 麥門冬 枯黃芩各兩 人參 神麩 蒲黃炒各二 山藥七兩 炙甘草五兩 杏仁去皮

去炒黃 梧梗各二兩 大豆黃卷微炒 當歸 肉桂各一兩 阿膠 白薇各七 白茯苓二兩

川芎 防風 麝香 冰片各五 羚羊角一兩 犀角一兩 雄黃八錢 乾薑泡七 大棗百枚 炙

研金箔一千四百張 右另研為末。煉蜜與棗杵勻。每兩作十九丸。用金箔為衣。每服一丸。溫水化下。

醫牛黃丸三六 治癩狂風癩心風。神不守舍。時發無常。仆地吐涎。不自如覺。

牛黃 珍珠 麝香各五 硃砂 龍齒各另 犀角 琥珀各二 天門冬去心 麥門冬去心 各

全蝎 甘草各五 蜂房三錢 人參 茯苓各四 水銀五分 黃芩 知母 龍膽草 石菖蒲

白芍藥各五分 金箔各七 銀箔各七 右為細末。共和勻。煉蜜和搗干杵。丸如梧子大。每服十

五丸。食後臨卧。新竹葉湯下。

萬牛黃清心丸三六 方在小兒九四。治心熱神昏。

氏牛黃丸三六 方在小兒九二。小兒痰涎風癩。

著牛黃丸三六 方在小兒九三。治小兒驚癇。痰涎壅盛。

三味牛黃丸三六 方在小兒九五。治小兒驚熱疳積。

蘇合香丸三七 治中氣。或卒暴氣逆心痛。鬼魅惡氣等症。

麝香 沉香 丁香 白檀香 香附 藜蘆 白木 訶子煨去 硃砂 水飛 青木香 烏

犀角各二兩 黃陸香 龍腦各一兩 安息香二兩另為末用無 蘇合油二兩入安 右為細末。用

安息香膏并煉蜜。每兩作十丸。焙黃蠟包裏為善。每用溫水化服。一丸如桐子大。每服四五丸。

龍腦雞蘇丸三七 治上焦之火。除煩解勞。安吐血衄血。清五臟虛煩。神志不定。上而酒毒膈

熱消渴。下而血滯五淋血崩等症。

麥冬四兩 甘草半兩 龍腦 薄荷葉 一斤 阿膠 炒 人參 各二兩 黃耆二兩 生地六兩 另木通 銀

柴胡各二兩 此二味用沸 右用好白蜜二斤。先煎一兩沸。卻入地黃末。不住手攪。徐加木

通柴胡汁。慢火煎成膏。然後加諸藥末。和丸如豌豆大。每服二十九丸。隨證用引送下。○如室

女虛勞。寒熱潮作。用人參柴胡湯下。○一方。如前加黃連一兩。

九還金液丹^{三七}

方在小兒八八

治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

旅香橘湯^{三七}

治七情內傷胸膈不快腹脹痛

香附^炒半夏^製

橘紅^{各三錢}

甘草^{錢一}

水一鍾半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良分氣紫蘇飲^{三七}

治腹脇疼痛氣促喘急

蘇葉

桔梗^{去蘆}

桑白皮

草果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

炙甘草^{各一錢半}

水一鍾

半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

本枳實散^{三七}

治男子兩脇疼痛

枳實一兩

白芍藥^炒

雀腦芎

人參^{各半兩}

右為細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

服

濟推氣散^{三七}

治右脇疼痛服滿不食

片薑黃

枳殼^{麩炒}

桂心^{各五錢}

甘草^{錢二}

右為細末每服二錢薑棗湯食遠溫服

白朮^{九三七}

治息積病脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不可鍼灸宜導引服此藥

白朮^炒

枳實^{數炒}

官桂^{各一錢半}

人參^{二兩}

陳皮

桔梗^{醋炒}

炙甘草^{各一兩}

右為細末煉蜜丸

如桐子大每服五七十九不拘時溫酒送下日三服

卷五十四終

加批詳評景岳全書

卷五十五

宇集古方八陣

會稽張介賓 會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

攻陣

景仲大承氣湯一 治陽明太陰傷寒譫語五六日不大便腹滿煩渴並少陰舌乾口燥潮熱脈

實者○劉河間加甘草名三一承氣湯

大黃四兩厚朴半斤枳實五枚芒硝三合

黃煮取二升去滓內芒硝更上火微一兩沸分溫再服得下餘勿服

景仲小承氣湯二 治病在太陰無表證汗後潮熱狂言腹脹脈實六七日不大便喘滿者○即

前大承氣湯減去芒硝

景仲調胃承氣湯三 治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日晡潮熱者○凡陽明病有一證

在經者當解肌入府者當攻下

大黃 芒硝 甘草各五錢此從近法 每服三五錢水一大鍾煎七分溫服

景仲桃仁承氣湯四 治傷寒畜血小腹急大便黑而不通

桃仁十二枚去皮尖 官桂 甘草各一錢 芒硝三錢 大黃半兩或一兩此從近法

右吹咀作一服或二服水一

大鍾煎七分。溫服。

方桃仁承氣湯五 治瘀血小腹作痛。大便秘利。或譫語口乾。漱水不嚥。遍身黃色。小便不利。

或血結胸中。原缺可近。或寒熱昏迷。其人如狂。

桃仁半兩去皮六 大黃兩 甘草二錢 肉桂一錢 右薑水煎。發日五更服。

當歸承氣湯六 治燥熱裏熱。火鬱為病。或皮膚枯燥。或咽乾鼻乾。或便溺結閉。通宜此方。

當歸大黃各四錢 甘草芒硝各二錢 右以咀入薑煎服。

景仲大柴胡湯七 表證未除。裏證又急。汗下兼行。用此。

柴胡半斤 半夏半斤 黃芩芍藥各三兩 生薑五兩切 枳實四枚 大黃二兩 大棗十二枚擘 右七味。

以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

陶氏六順氣湯八 以代大小承氣。大柴胡。大陷胸等湯之神藥也。○此湯治傷寒熱邪傳裏。

大便結實。口燥咽乾。怕熱謔語。揭衣狂走。斑黃陽厥。潮熱自汗。胸脇滿硬。臍腹疼痛等症。效。

不盡述。

大黃 枳實 黃芩 厚朴 柴胡 甘草 芍藥 芒硝 水煎服。欲峻者。大黃後入。○

凡傷寒過經。及老弱。或血氣兩虛之人。或婦人產後。有下證。或有下後不解。或表證尚未除。

而裏證又急。不得不下者。用此湯。去芒硝下之。則吉。蓋恐硝性峻急。故有此戒。經云。轉藥熟。

緊。有芒硝者緊也。今之庸醫。不分當急下。可少與。宜微和胃氣之論。一概用大黃芒硝亂投。

湯劑下之。因茲枉死者多矣。○仲景云。湯滌傷寒熱積。皆用湯液。切禁丸藥。不可不知也。

仲景大陷胸湯九 治大結胸手不可按。

大黃 四錢 芒硝 三錢 甘遂末二分此從近數 用水一鍾半。先煎大黃至一鍾。內芒硝煎一二沸。去

滓。內甘遂末和勻。服得利則止。○此藥極峻。必不得已而用之。○原方用大黃六兩。芒硝一

升。甘遂末一錢。水六升。如前法煮二升。分二服。得快利後止服。

小陷胸湯十 方在寒陣十六。治小結胸正在心下。按之則痛。脈浮滑者。

河大黃湯十一 治瀉利溼熱邪盛。膿血稠黏。裏急後重。日夜無度者。

大黃 一兩 右細剉。好酒二大盞。浸半日。煎至一盞半。去大黃。分二服。頓服之。痢止一服如

未止再服。以利為度。服芍藥湯以和之。痢止再服黃芩湯和之。以撤其毒。

外科大黃湯十二 方在外科一六七。治腸癰小腹堅腫。

全大黃甘草湯十三 治食已即吐。○按此湯必下焦脹實。大便秘結不通。而格拒吐食者。方

可用之。若因胃虛而食已即吐者。此則大非所宜。用者不可誤認。

大黃 四兩 甘草 一兩 右二味。以水三升。煮取三升。分溫再服。

全大黃硝石湯十四 治黃疸腹滿。小便不利而赤。自汗出。表和裏實者宜之。

大黃 黃柏 硝石 各四兩 梔子 十五枚 右四味。以水六升。煮取二升。去滓。內硝更煮。取一升

頓服。

金 梔子大黃湯 十五 治酒疸。心中懊惱。或熱痛。

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升 右用水六升。煮取二升。分溫三服。

河 防風通聖散 十六 治諸風潮搐。手足瘰癧。小兒急驚。便急。邪熱暴甚。肌肉蠕動。一切風熱。

疥癩等疾。

防風 川芎 當歸 芍藥 麻黃 連翹 薄荷葉 大黃 芒硝各五錢 石膏 黃芩

桔梗各一兩 滑石三兩 甘草三兩 荆芥 白朮 梔子各二錢半 右為末。每服二錢。水一大鍾。生

薑三片。煎六七分。溫服。○醫統方各五分。用水二鍾煎服。○痰嗽。加半夏。○閉結。加大黃二

錢。○傷風。加羌活。全蠍。各五分。○此方有四。賈同。知方無芒硝。有縮砂。瘍瘍機。要有白芷。疾

恭。鼠粘子。甘草。

雙解散 十七 方在痘疹四一。治痘疹表裏俱實。

牛黃雙解散 十八 方在外科二百九。治便毒熱毒。大小便秘。

局 涼膈散 十九 瀉三焦六經諸火。

大黃 朴硝 甘草各一錢 連翹半錢 梔子 黃芩 薄荷各五分 水一鍾半。加竹葉七片。煎

八分。入蜜一匙。和勻服。

東 涼膈散 二十 方在痘疹八三。解痘疹肉熱良方。

治熱邪傳裏。胃有燥糞結實。心下硬痛。而下利。統清水。身熱譫語發渴。此非

內寒而利。乃因湯藥而利也。名曰積熱利證。宜急下之。身無熱者。宜用此湯。身有熱者。宜六一順氣湯。醫家有不識此證者。便呼為漏底傷寒。即用熱毒藥止之者。是猶抱薪救火也。誤人多矣。

大黃 芒硝去此枳實 厚朴 甘草 人參 當歸 水一鍾半。生薑三片。棗二枚煎服。

良黃龍湯 二二 方在婦人八五 治妊婦感冒風寒。熱入胞宮。寒熱如瘧。

錢黃龍湯 二二 方在小兒二五 治小兒感冒發熱。或寒熱往來。

和子玉燭散 二四 治血虛有滯。或婦人經候不通。腹脹作痛。○此四物湯對調胃承氣湯也。

當歸 川芎 芍藥 地黃 大黃 芒硝 甘草各等分 右吹咀水煎服。○甚者倍用大黃。

四順清涼飲子 二五 治大人小兒血脈壅實。藏府生熱。面赤煩渴。睡卧不甯。大便秘結。

大黃 當歸 芍藥 甘草各等分 右吹咀水煎服。

元四物湯 二六 治藏結秘澀。

當歸 白芍藥 熟地黃 川芎 大黃 煨桃仁各等分 右用水煎。或丸服亦可。

仲景抵當湯 二七 治傷寒熱在下焦。少腹鞭滿。其人發狂。小便自利者。下血乃愈。以太陽病瘵

熱在裏也。

水蛭 三十五粒 蠱蟲 三十個 熱桃仁 二十個 大黃 三兩 酒浸 右四味為末。以水五升。煮取三升。○又

抵當丸亦即此四味。

景十棗湯二八 治懸飲內痛

芫花醋拌經宿炒 大戟長流水煮 甘遂麩裹煨 右為細末先以水一鍾半煮大棗十枚至

八分去棗內藥末強人一錢弱人五分平旦服之不下更加五分決下徐以糜粥補之

古澤三化湯二九 治中風外有六經之形證先以續命湯主之內有便溺之阻隔此方主之

厚朴薑製 大黃 枳實 羌活各等分 右吹咀每服一兩水煎服微利則止

選透膈湯三十 治脾胃不和中脫氣滯胸膈滿悶噎塞不通脇肋脹痛痰涎嘔吐飲食不下

木香 白豆蔻 砂仁 檳榔 枳殼麩炒 厚朴薑汁 半夏 青皮 橘紅 甘草 大黃

朴硝各一錢 水一鍾半薑三片紅棗一枚煎八分食遠服

金茵陳蒿湯三一 治傷寒發黃及穀疸發熱不食大小便秘或食即頭瘧是為穀疸

茵陳 九錢 大黃四錢 山梔一錢 右作二服每服水二鍾煎八分食遠溫服

河芍藥湯三二 下血調氣經白澁而使膿血氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥一兩 當歸 黃連各五錢 木香 甘草 檳榔各二錢 大黃三錢 官桂一錢 黃芩五錢

右咀每服半兩水二盞煎一盞食後溫服如血痢則漸加大黃如汗後藏毒加黃柏半兩依

前服○愚按此方乃河間之心方然惟真有實熱者可用若假熱假實者誤服則死

枳實大黃湯三三 治溼滯腳氣

羌活錢半 當歸 一錢 枳實五分 大黃酒製 水一鍾半煎八分食前空心溫服以利為度

三錢

羌活導滯湯三四 治風溼腎滯脚氣

羌活獨活各半 防己當歸各三錢 枳實炙炒二錢 大黃酒煨一兩

右每服五七錢水一鍾半煎至

七分溫服量虛實加減微利則已

牛黃瀉心湯三五 治心經實熱狂言妄語神志不安

牛黃另研一兩 冰片另研一分 硃砂另研二錢 大黃生一兩 右為細末和勻每服一二錢冷薑湯或蜜水調下

三稜散三六 治積聚癥瘕痞癖不散堅滿痞悶食不下

三稜白朮各二兩 蓬朮當歸各五錢 木香檳榔各三錢 右為末每服三錢沸湯調下

三稜丸三七 治血癥血痕食積痰滯

莪朮醋浸炒 三稜各三兩 青皮麥芽炒半夏各一兩 右共用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸桐

子大每服四十九丸淡醋湯下痰積薑湯下

三聖膏三八 貼積聚癥塊

石灰十兩 官桂半兩 大黃一兩 錘紋者為本 右將石灰細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃官

桂末攪勻以磁器收貯用泊紙或柿漆紙攤貼患處火烘熨之

根桃仁煎三九 治血癥

桃仁大黃各一兩 燕蟲半兩 朴硝一兩 右為末以醇醋一鍾磁器中煮三分下前三味不

住手攪煎至可丸乃下朴硝丸如桐子大不吃晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未

見再服。仍以調氣血藥補之。立齋曰：向在毗陵，一婦人小便不通，臍腹脹甚。予診之曰：此血瘀也。用前藥一服，臍痛下瘀血，血水即愈。此藥猛烈，大峻，氣血虛者，斟酌與之。

川山甲散

四十

治癥痞瘀血，心腹作痛。

川山甲

炒焦

鱉甲

醋炙

赤芍藥

大黃

炒

乾漆

炒盡烟

桂心

各一兩

川芎

芫花

醋炒

歸尾

各半兩

麝香一錢

右為末，每服一錢，酒調下。

和子

功散

四一

瀉水之劑。

黑丑

頭末

茴香

一兩

炒或加

右為細末，以生薑自然調一二錢，臨卧服。

和子

濟川散

四二

治一切痰飲，十種水氣。

甘遂

麩裏

芒硝

各二錢

郁李仁

一錢

大黃

牽牛末

各三錢

右為末，滴水丸如桐子大，每服五

十九，溫水下。

稀涎散

四三

吐頑痰。

牙皂

痰去皮

藜蘆

五分

右為細末，每服五分，或一二錢，漿水調下。牙關不開者，灌之。

大異香散

四四

治積聚脹滿。

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

枳殼

炒

藿香

香附

半夏

麩

桔梗

益智

各一錢半

炙甘草

五分

右分二貼，水二鍾，薑三片，棗一枚，煎七分，食遠服。

經

流金膏

四五

治一切大痰，欬逆等症。

白石膏

微煨 研細

大黃

日蒸晒九次各二兩

黃芩

酒洗 橘紅各兩

連翹

川芎

桔梗

貝母各

海膽星

蘇州薄荷

香附

右為極細末

煉蜜丸彈子大

午後臨卧

細嚼一丸忌酒

麩諸溼熱物

○按此方當去川芎 桔梗效必更速

子通經散

四六

治婦人氣逆血閉

陳皮

去白 當歸各一兩

甘遂

以麩包勿令透 水煎百餘滾取 出用冷水浸過去麩焙乾一兩

右為細末每服三錢溫湯調下

臨卧服

苦棟湯

四七

治疔毒

苦棟根東引不出土者。刮去皮土。取內白皮二兩。水三盞。煎一盞半。去滓。以晚米三合煮糜。空心先以炙肉一片嚼之。引蟲向上。次吃藥粥一二口。少頃又吃。漸漸加至一盞。其蟲下盡而愈。

三化神佑丸

四八

治一切沉積痰飲。變生諸病。或氣血壅滯。溼熱鬱結。走注疼痛。風痰脹

滿等症。○子和神祐丸。用黑丑一兩。無輕粉。

黑丑

取頭落 木二兩

大黃

一兩

芫花

醋浸 炒 大戟 醋浸 甘遂 醋浸 輕粉 一錢

右為細末。滴水為丸。小

豆大

初服五丸

毒服如五丸

溫水下

日三服

以快利為度

欲速者宜八九丸

或百餘丸

凡痞滿甚者。以疾涎壅盛。頓攻不關。則轉加痛悶。須漸進之。初服止三丸。每加二丸。至快利

即止

木香檳榔丸 四九

殺下諸蟲

檳榔 一兩

木香

鶴虱

貫眾

錫灰

乾漆燒烟

史君子各五錢

輕粉 一錢

雷丸

巴豆仁

各二錢 麩糊丸

麻子

大每服二十九

五更粥飲下

或煎薑蒲石榴湯下

各五錢

輕粉 一錢

雷丸

巴豆仁

鐵木香檳榔丸 五十

治一切氣滯

心腹痞滿

腸肋脹悶

大小便澀秘不通

木香 檳榔

青皮

去毒

陳皮

去白

枳殼

數炒

蓬朮

黃連

黃柏

各三兩 檳榔

青皮

去毒

陳皮

去白

枳殼

數炒

蓬朮

黃連

黃柏

遇仙丹 五

追蟲

逐積滯

消痰痢

萬病可除

黑丑 頭末

檳榔

各一

大黃

半斤

三稜

莪朮

各

木香

二兩

碎煎濃湯

去滓

煮麩糊為丸

桐子大

每服四五十丸

以強弱為加減

五更茶清下

如未通再

飲溫茶助之

下蟲積惡物盡了

白粥輔之

備急丸 五二

治胃中停滯寒冷之物

心腹作痛如錐

及脹滿下氣

並卒暴百病中惡客忤口

噤卒死皆治之

易老名獨行丸

脾胃論名備急大黃丸

巴霜 大黃

乾薑

俱為

右等分

和勻

煉蜜丸

石臼內杵千餘下

如泥丸

如小豆大

夜卧

時溫水下

一丸

氣實者加一二丸

如卒病不計時候

服如卒死口噤

即斡口折齒灌之

○司

空裴秀亦作散用

用其急也

孕婦忌服

神保丸 五三

治心膈痛

腹痛

血痛

腎氣膈下痛

大便不通

氣噎宿食不消

和神保丸 五三

治心膈痛

腹痛

血痛

腎氣膈下痛

大便不通

氣噎宿食不消

木香

胡椒各二錢

錢半乾蝎十

右為末湯浸蒸餅丸麻子大研砂三錢為衣每

服五丸用柿蒂湯或薑醋

回香木香等湯隨送下

寶感應丸 五四

治宿食積滯胸膈痞悶疼痛吐瀉

南木香

肉豆蔻

丁香

半薑

巴霜

百草霜

杏仁

去皮共研

右先

將前四味為末後入三味同升用好黃蠟六兩溶化以絹濾淨更用好酒一升於銀石

器內煮蠟數沸傾出其蠟自溶用凡春夏修合先用香油一兩銚肉熱令香熟次下酒

蠟四兩同化成汁就銚內乘熱和前藥成劑分作小銚油紙裹虎旋丸服之若秋冬須

用香油一兩五錢每服三十九丸薑湯下

大金花丸 五五

治中外諸熱淋血嗽血衄血頭痛骨蒸咳嗽肺痿

黃連

黃芩

黃柏

梔子

木香

右為細末滴水丸小豆大每服三十九丸涼水清

茶任下

本方去大黃倍加梔子梔子金花湯丸

針大硝石丸 五六

治痞積

硝石 六兩

大黃 八兩

另研人參

甘草 各三

右為細末用好陳醋三升以磁器燉大熬丸每入

醋一升先入大黃不住手攪使微沸盡一刻已入一升再熬微乾又下一升並下餘藥再熬

使可丸如雞子黃大每服一丸白湯化下或丸如桐子大每服三五丸服後當下如雞肝

或如米泔赤黑色等物乃效下後忌風冷宜軟粥料也

棘枳木導滯丸 五七 治傷滯熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黃芩 茯苓 白朮 黃連 各三錢 枳實 熱炒 神麩 各五錢 澤瀉 二錢 大黃 煨一 右為末湯浸

蒸餅為丸 食遠白湯下五十九

秘化滯丸 五八 理諸氣化諸積奪造化有通塞之功調陰陽有補瀉之效久堅沉痾者磨之

自消暴滯積留者導之自去○此與鄧山房感應丸略同但彼方猶有沉香檀香砂仁香附四味

南木香 丁香 青皮 橘紅 黃連 各二錢 枳實 各五錢 半夏 三錢 烏梅肉 三錢 白豆 各

浸湯洗去心膜用好醋浸少頃慢火熬至醋乾用六錢細入烏梅肉 始乾為末用五錢以

前藥又研勻再入後藥鴨梅膏已豆若乾止用梅四錢五分 米調調器清慢火熬

入前藥和 右和勻用白麩八錢調厚糊丸蘿蔔子大每服五七丸壯人十九丸五更空心用陳

皮湯下○不欲通者以津下○知所積物取本汁冷下○停食飽閉枳殼湯下○因食吐不

止以津嚥下即止○婦人血氣痛當歸湯下○赤痢冷甘草湯下○白痢冷乾薑湯下○心

痛石菖蒲湯下○諸氣痛生薑陳皮湯下○腸氣茴香酒下○若欲推蕩積滯熱薑湯下○仍加

數丸未利再服利多不止飲冷水一二口即止此藥得熱即行得冷即止小兒疳積量大小

飲湯下妊娠勿服

化鐵丹歌 五九

八梅十六豆 一豆管三椒 青陳各半兩 丁木不相饒 將來研作末 醋打麩糊調

丸如黍米大 日曬要堅牢 五分或三分 強弱或兒曹 任意作引下 是鐵也能消

陳耒三殺丸 六十 消積聚去未麩五穀等積

陳倉米

一兩

用新巴豆五枚去殼同炒巴豆焦色去豆不用

陳皮

三錢

煨砂仁

麥芽

各二錢

南木香

一錢

右

為末醋和丸綠豆大每服十五丸至二十九丸食遠薑湯下

方溫白丸

六一

治心腹積聚癥瘕痞塊大如杯碗胸膈脹滿嘔吐心下堅結儻攻兩脇如有

所得及一切諸風身體頑麻三十六種通尸注忤十種水病痞塞心痛腹中一切諸疾但服此藥無不徐愈

川烏

製二兩

皂角

夫去

吳茱萸

湯泡

一石

葛蒲

柴胡

桔梗

去蘆厚朴

薑棗

紫苑

人參

黃連

去霜

茯苓

乾薑

肉桂

川椒

去日

巴霜

各五錢

右為末

入巴豆

研勻

蜜丸

桐子

大每服三丸薑湯下○按此方與海藏蕩病紫苑丸大同但彼多羌活獨活防風三味止用

巴霜二錢而羣藥更倍隨證用引送下與此為稍異也○潔古治法肝積肥氣溫白丸加

柴胡川芎○心積伏梁溫白丸加菖蒲黃連桃仁○脾積痞氣溫白丸加吳茱萸乾薑○肺

積息奔溫白丸加人參紫苑○腎積奔豚溫白丸加丁香茯苓遠志

陳溫白丸 六二 方在小兒九十 驅風豁痰定驚

丹阿魏丸 六三 治內積

阿魏 煨 糖 棗 各一 黃連 六錢 連翹 五錢 右為末 阿魏糊丸 桐子大 每服二三十丸 白

湯送下

上海廣益書局印行

林醫阿魏丸 六四

治諸般積聚癥瘕痞塊

山查肉

南星水浸 半夏

麥芽炒 神麴炒

黃連各一兩 連翹

阿魏醋沒 瓜萸仁

貝母各

錢

風化硝 石膩 蘿蔔子炒 胡黃連各二錢半

丸

食遠薑湯下

守病丸 六五

此藥名為守病

硃砂加上雄黃

硃砂輕粉要相當

去皮巴霜半兩

取下多年積服

易勝紅丸 六六

治脾積氣滯胸膈滿悶氣促不安嘔吐清水丈夫酒積婦人脾血積小兒食積並治

三稜

蓬朮各醋煎 青皮

陳皮

乾薑

良薑各一兩 香附二兩

右為末醋糊丸桐子大每服三四十丸薑湯下

院御助氣丸 六七

治三焦痞塞胸膈飽悶氣不流通蘊結成積瘕癖氣塊並皆治之

三稜地栽尤 青皮二兩 橘紅

白朮各五錢 木香 檳榔 枳殼各三錢 右為末糊丸桐子大每服五十九米湯下

方局三黃丸 六八

治三焦積熱咽喉腫閉心膈煩躁小便赤澀大便閉結

黃芩 黃連 大黃各等分

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

黃芩

黃連

大黃

煉蜜丸桐子大每服四五十丸白湯送下或淡鹽湯亦可○此

方為瀉即名瀉心湯。

味雄黃聖飲子 六九

治一切酒食傷脾積聚滿悶等

巴豆

百枚去膜油 雄黃 半兩

白麩 十兩炒

右二味為細末同麩和勻用新汲水攪和作餅如手

大以水煮之候浮於湯上看軟硬搜作小餅子每服五七餅加至十餅十五餅食一餅利一

行二餅利二行食前茶酒任下。

河舟車丸 七十

治一切水滯蠱腹痰飲癰積氣血壅滯不得宣通風熱鬱癘走注疼痛及婦

人血逆氣滯等症。

黑丑 頭末

甘遂 各一兩

芫花 各一兩

大戟 俱細炒

大黃 二兩

青皮

陳皮

木香

檳榔 各五錢

輕粉

各一兩

加燕美 半兩

右為末水糊丸如小豆大空心溫水下初服五丸日三服以快利為度服法

如前三化神祐丸

子導水丸 七一

大黃

黃芩 各二兩

滑石 四兩

黑丑 頭末

加法

甘遂 一兩

去濕熱腰痛泄水溼腫滿久病

宜加

白芥子 一兩

去遍身走注疼痛宜加

朴硝 一兩

退熱散腫毒止痛久病宜加

李仁 一兩 散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈宜加

右為細末滴水丸桐子大每服五十丸或百丸卧時溫水下

和子神芎丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癩咽痛胸膈不利大小便秘一切風熱

和子神芎丸 七二

治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫瘡癩咽痛胸膈不利大小便秘一切風熱

等症。

大黃生黃芩各二兩黑丑頭末滑石各四兩黃連川芎薄荷葉各半兩滴水丸桐子大每服

五十九丸食後溫水下。局方無黃連。

三小胃丹七三

上可去胸膈之痰下可利腸胃之痰。

芫花大戟甘遂各一兩大黃酒拌黃柏炒右為細末粥丸如麻子大每服

十九丸溫水下。

清氣化痰丸七四

南星半夏取湯浸星夏二日卸煮至無白點為度晒乾聽用橘紅檳榔各二兩木香

沉香各一兩蒼朮米泔浸右為末薑汁糊丸淡鹽湯白湯任下。

丹清氣化痰丸七五

治上焦痰火壅盛咳嗽煩熱口渴胸中痞滿。

南星製三兩半夏製黃連各五兩瓜蒌仁杏仁茯苓各四兩枳殼炒陳皮各六兩甘草

右為細末薑汁煮糊丸桐子大每服五十九丸薑湯下。

法製清氣化痰丸七六順氣快脾化痰消食。

南星去皮半夏各四兩用皂角白礬乾薑各四兩入水五盞煎至三盞去渣舒陳皮青皮

蘇子炒神麩炒麥芽炒蘿蔔子炒杏仁炒葛根山查香附各二兩右為末湯泡

蒸餅丸桐子大每服五七十九丸臨臥食後茶湯下。

居滾痰丸 七七

治一切溼熱食積等痰。窠囊者疾。○一方礞石止用五錢。外加百藥煎五錢。乃能收斂周身痰涎。聚於一處。然後痢下。所以甚效。

礞石

硝煨全色一兩

大黃

酒蒸

黃芩

去朽者各半斤

沉香

五錢

右為細末

滴水為丸

桐子大

每服三五

十

丸

量人強弱加減。○凡服滾痰丸之法。必須臨卧就床。用熱水一口許。只送過咽。即便仰卧。令藥徐徐而下。服後須要半日勿飲食起坐。必使藥氣除逐上焦痰滯惡物。過膈入腹。然後動作。方能中病。或病甚者。須連進二三次。或壯人病實者。須多至百丸。多服無妨。

子

和

礞石

滾痰丸 七七

治五癩。

白礞石

赤石脂

等分

右為細末

研蒜膏為丸

綠豆大

每服三五

十

丸

食後

荆芥湯下。

丹

青礞石丸 七九

解食積去漫痰。重在風化硝。

南星

二兩切片用白礞末五錢水半夏一兩湯泡切片以皂

黃芩

薑汁

茯苓

枳實

炒各

礞石

二兩搗碎始硝二兩又同入小砂罐內瓦片蓋之法製硝同藥水煮化去毒綿濾令時

用風化

右為末

神麴丸 桐子大 每服三五丸 白湯下 又方 半夏二兩 白朮

石

各一兩

黃芩

五錢

茯苓

陳皮

各七錢

風化硝

二錢

右為末

丸同煎

節化痰丸 八十

潤燥開鬱降火消痰治老痰鬱痰結成痞塊凝滯喉間肺氣不清或吐咯難

出皆因大邪失上凝滯於心肺之分俱宜開鬱降火消痰緩而治之庶可效耳。

加批

景岳全書

卷五十五

九

上海廣益書局印行

天門冬去心 黃芩酒炒 海粉另研 瓜萸仁另研 橘紅各一 連翹 香附淡鹽水 桔槩各五錢

青黛另研 芒硝另研各三錢 右為細末。煉蜜入薑汁少許。搗丸。龍眼大。噙化。一丸。清湯送下。或

丸如綠豆大。淡薑湯送下。五六十丸。○此等老痰。大約飲酒人多有之。酒氣上蒸。肺與胃脘皆受大邪。故結而成痰。此方天冬。黃芩。瀉火。海石。芒硝。鹹以軟堅。瓜萸。潤肺消痰。香附。連翹。開鬱降火。青黛。去鬱火。故不用辛燥等藥。

林醫 辰砂化痰丸 八一 治風化痰。安神定志。止嗽除堅。

辰砂另研 明礬另研各五錢 南星製一兩 夏麩三兩 右為細末。薑汁糊丸。菜豆大。硃砂為衣。每

服三十丸。食後薑湯下。

三 控涎丹 八一 凡人忽患胸背手足腰膝疼痛。牽引鈞動。時時走易不定。不可忍者。或手足

冷痺。氣脉不通。是皆痰涎在心膈上下。故為此證。

真白芥子 紫大戟去皮 甘遂麩裏眼 右為末。糊丸。桐子大。臨卧淡薑湯或溫水下。五七

丸至十九丸。痰甚者。量加之。

林醫 烏巴丸 八三 治胸膈久為頑痰所害。面色青白。浮腫。不思飲食。遍身疼痛。夜間氣壅。不得

睡。往來寒熱。手足冷痛。不得轉側。屢用痰藥墜之不下。取之不出。此是頑痰堅滯。宜此藥利下之。則愈。未利再服。

烏梅肉二兩 巴霜五粒 去油 右用水二碗。砂鍋內將烏梅肉煮爛。候水稍乾。入巴豆。將竹片攪

如桐櫛取出搗為丸。桐子大。每服七丸。九丸。十一丸。或十五丸。薑湯下。不拘時。

吐痰方 八四 治胸中有痰癆瘵者

用白礬二兩。水二升。煮一升。入蜜八合。再煮。少時溫服。須臾即吐。未吐。再飲熱水一盞。吐痰為效。

人參利膈丸 八五 方在和陣一六六 治痰逆膈噎聖藥

和青木香丸 八六 治胸膈噎塞。氣滯不行。腸中水聲。嘔噦痰逆。不思飲食。寬中和膈。

黑丑 炒香取頭末十二兩 破故紙 炒 華撥 各四兩 木香 二兩 檳榔 用酸漿米飯裹蒸乾 右為末。滴水

為丸。菜豆大。每服三四十九丸。茶湯熱水任下。

消痞核桃 八七

我木 酒洗 當歸 酒洗 白芥子 急性子 各四兩 皮硝 海粉 各八分 大核桃 百枚 右先以羣

藥入藥鍋內。寬水煮一二沸。後入大核桃。重五錢者。百枚同煮。一日夜。以重一兩為度。取起

曬乾。先用好膏藥一個。搽阿魏一錢。麝香五釐。量痞大小貼住。以熱手摩擦。空心服前桃一

個。三日後二個。以至三個。服完後。須四物湯之類。數劑即愈。

熨痞方 八八 一層用麝香二三分。搽肉上。二層阿魏一二錢。三層芒硝一二兩。鋪蓋於

上。右先用蕎麥麪和成條。量痞大小圍住。鋪藥於內。以青布蓋之。隨燒熱。磚四五塊。輪流

布上熨之。覺腹中氣行寬快。即是痞消之兆。以手烘熱摩之。亦妙。內須服調養氣血之藥。

開結導飲丸 八九 方在和陣二七八。治飲食不消。心下痞悶。腿脚腫痛。

方犀角丸 九十 除三焦熱邪。及痰涎壅滯。腸胃燥澀。大小便難。

黃連去鬚犀角銛各十兩人參二十兩大黃八十兩黑丑炒搗取頭末六十兩 右為細末。煉蜜丸。梧子大。每服

十五丸。至二十九丸。臨卧湯下。更量虛實加減。

河犀角丸 九一 治癩癩發作有時。揚手擲足。口吐痰涎。不省人事。暗倒屈伸。

犀角末半兩赤石脂三兩朴硝二兩白僵蠶薄荷各一兩 右為末。麩糊丸。梧子大。每服二

三十丸。溫水下。日三服。不拘時。如覺痰多。即減其數。忌油膩炙燥。

麻仁丸 九二 治大便秘結。胃實能食。小便熱赤者。

芝麻四兩研取汁杏仁四兩去皮大黃五兩山梔十兩 右為末。煉蜜入麻汁。和丸。桐子大。每服

五十九丸。食前白湯下。

局脾約丸 九三 此即仲景麻仁丸。仲景曰。跌陽脈浮而濇。浮則胃氣浮。濇則小便數。浮濇相

搏。大便則難。其脾為約。麻仁丸主之。亦名潤腸丸。治臧府不和。津液偏滲於膀胱。以致

小便利。大便秘結者。

大黃蒸杏仁去皮厚朴麻仁各四兩枳實二兩 煉蜜丸。桐子大。每服二十九丸。白滾湯下。日

三服。漸加以知為度。

局七宣丸 九四 治風氣積聚。宿食不消。心腹脹滿。胸膈否塞。風毒腫氣。連及頭面。大便秘澀。

小便時數脾胃氣壅不能飲食。○東垣云治在脈則瀉在時則秋。

柴胡 枳實 訶子肉 木香各五分 炙甘草四兩 桃仁炒去皮 大黃兩十五 右為末煉蜜丸

小豆大每服十五丸至二十九食遠米飲下漸加至四五十丸以利為度覺病退止服

局七聖丸九五 治風氣壅盛痰熱結搏心煩面赤咽乾口燥肩背拘急胸膈脹滿腹脇痞悶

腰脇沉重大便閉結小便赤澀○東垣云治在脈則弦在時則春

木香 檳榔 川芎 肉桂 羌活各五分 郁李仁泡去 大黃半生半熟 右為末煉蜜丸小

豆大每服十五丸至二十九食後臨卧白湯下

三紅丸子九六 消食瘕

胡椒一兩 阿魏一錢 青皮炒三 三稜醋煮一 莪朮二兩 右為末另用陳倉米末同阿魏

醋煮糊丸桐子大炒上硃為衣每服七十丸薑湯下

追蟲丸九七 取一切蟲積

黑丑頭末 檳榔各八錢 雷丸醋炙 南木香各二 右為末用茵陳二兩大皂角苦楝皮各一兩

煎濃汁丸菜豆大壯大人每服四錢小兒弱人每一錢五分量人虛實於五更時用沙糖水

吞下待進去惡毒蟲積二三次方以粥補之

醫化蟲散九八

雷丸二粒 檳榔二枚 鶴虱一錢 史君子七枚 輕粉少許 右為末分二服候晚刻以豬猪肉

一兩切成片。用皂角漿泡一宿。至五更慢火炙熟。乃以香油拭肉上候溫。取前藥一服。擦肉上略烘過食之。至巳時蟲下了。乃進飲食。

萬應丸 九九 下諸蟲。

檳榔 五兩 大黃 半斤 黑丑 頭末 皂角 十條 苦楝根皮 一升 右先將苦楝根皮皂角二味用

水二大碗熬成膏子。搜和前三味為丸。桐子大。以沉香雷丸木香各一兩為衣。先用沉香衣

後用雷丸木香衣。每服三錢。四更時用沙糖水送下。

妙應丸 一百 一名翦紅丸。殺諸蟲。

大黃 牽牛 頭末 檳榔 各三兩 雷丸 錫灰 各五錢 大戟 三錢 鶴虱 史君子 茴香 貫衆 各

錢 輕粉 少許 苦楝根 一兩 右為細末。用皂角煎膏丸服。每服五六十九。隨弱強加減。五更

初茶清下。如不通再吃溫茶助之。下蟲積盡了。白粥補之。

五瘟丹 百一 治瘟疫火證。

黃芩 黃柏 黃連 山梔 香附 紫蘇 甘草梢 大黃 右以七味生為末。用大黃

三倍煎濃湯去滓。和藥丸如雞子大。硃砂雄黃為衣。貼以金箔。每用一丸。取泉水七碗。浸化

可服七人。前藥甲乙年以甘草梢為君。乙庚年黃芩為君。丙辛年黃柏為君。丁壬年山梔為

君。戊癸年黃連為君。為君者多一倍也。餘四味同香附紫蘇為臣者減半也。

木香丸 百二 治時行瘟病發熱。上膈結執。

薄荷 梔子 黃芩 黃連 甘草各二錢 連翹六錢 大黃 玄明粉各八 右為細末以青蒿自然汁為丸菜厚大雄黃為衣每服五六十九白滾湯下。若治雜病發熱者以硃砂或青黛為衣。

硃砂丸

百三

治卒時中惡毒垂死

硃砂 研

附子泥去 雄黃明者各 麝香一分 巴豆二十粒

去油

右研勻煉蜜和搗為丸麻子大每

服三丸不拘時粥飲下如不利更加三丸至七丸以利為度

毒赤丸

百四

治一切邪祟鬼症服之即愈

雄黃 硃砂 礬石 附子 地蘇蘆 牡丹皮 巴豆

各一

蜈蚣一條

右為末煉蜜丸如

小豆大每服五七丸涼水送下無時。衛生寶鑑云副使許可道宿驛中夜夢一婦人於脇

下打一拳遂痛不止而往來寒熱不能食乃鬼擊也名醫錄云李三露八毒赤丸名為殺鬼

杖子遂與藥三粒卧時服明旦下清水二斗而愈。又陳慶王子因醉卧水仙廟夢得一餅

食之而心腹痞滿病及一年諸治不效余診之問其始末因思此疾既非外感又非內傷惟

八毒赤丸頗為相當遂與五七丸下清黃涎斗餘漸得氣調後以別藥理之數月而愈

仲瓜蒂散

百五

治傷寒頭不痛寸脈微浮胸中痞鞅氣上衝咽喉不息者此為胸有寒也當吐之

瓜蒂 熬黃 赤小豆

等分

右二味各別搗篩為散然後合之取一錢匕以香豉一合用熱湯

七合煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服之不吐者少少再加得快吐乃止諸亡血虛家不可

與瓜蒂散

與瓜蒂散

柯獨聖散 百六 吐積蓄痰涎

甜瓜蒂 不拘多 少微炒 為細末。每服一二錢。薑汁調服。膝痛加全蠍。頭痛加鬱結者。服吐之。

茶調散 百七 吐除痰積

瓜蒂 二錢 好茶 一錢 右為末。每服二錢。薑汁調服。

疎獨聖散 百八 方在外科五六 治瘡瘍氣血凝滯

良獨聖散 百九 方在婦人十八 治妊娘傷觸動致腹痛下血

微獨聖散 百十 方在痘疹七八 治痘瘡倒靨陷伏

木通散 百一 治男子婦人腸脇苦痛

木通 去節 青皮 蘿蔔子 炒 茴香 川棟子 取肉用巴豆半兩同滑石另研 莪木 木香 各

兩 右為細末。每服三錢。不拘時用葱白湯調服。甚者不過三服。

全 大黃附子湯 百一 治寒氣內積。腸下偏痛

大黃 三兩 附子 二枚 細辛 二兩 右三味。用水五升。煮取二升。分溫三服。若強人。煮取二升

半。分溫三服。服後如人行四五里。更進一服。

全 匱外臺走馬湯 百一 治中惡心痛。腹脹大便不通

巴豆 二枚 去皮心熱 杏仁 二枚 右二味。以綿纏令碎。熱湯二合。檢取白汁。飲之。當下。通治飛尸鬼

擊病。老少量用。

加批 詳評 景岳全書

卷五十六

宇集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉 桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

散陣

仲麻黃湯一

治太陽經傷寒發熱無汗惡寒及身痛此峻逐陰邪之方也

麻黃 桂枝

各三兩 甘草一兩 杏仁七十

右四味以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥

煮取三升半去滓溫服八合覆取微汗

麻黃加朮湯二

治風溼 即前方加白朮四兩

仲麻黃附子細辛湯三

治少陰傷寒始得之脈沉而反熱者此陰分之表證也宜此主之

並治寒氣厥逆頭痛脈沉細者

麻黃 去節 細辛

各二兩 附子一枚 炮去

皮切八片 右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮

取三升去滓溫服一升日三服

全麻黃杏仁薏苡甘草湯四

治風溼一身盡痛發熱日晡劇者因汗出當風或久傷取冷所致

麻黃 去節 薏苡仁

各半

甘草

各一兩 杏仁十箇 去

右每服四錢水一盞半煮八分溫服取微汗

避風

仲麻黃附子甘草湯五 治少陰傷寒二三日無別證用此微發其汗。並治風溼通身浮腫。

麻黃去節甘草炙各二兩附子一枚泡 右三味以水七升。先煮麻黃一兩。去上沫。內諸藥。煮

取三升。去滓。溫服一升。日三服。

金麻黃甘草湯六 治腰已上水腫者。宜此汗之。

麻黃半兩甘草二錢 右咀。用水二鍾。先煮麻黃三四沸。去沫。入甘草。再煎至八分。食後服。

服取汗。有人患氣喘積久不瘥。遂成水腫。服此效。

仲大青龍湯七 治傷寒頭痛發熱無汗而煩躁。

麻黃三錢桂枝生薑各一杏仁五枚甘草五分大棗一枚石膏半斤水一鍾。煮

分二服。

仲小青龍湯八 治傷寒表不解。心下有水氣。嘔噦而咳。發熱或渴。或利。或小水不利。小腹痛

而喘。並治肺經受寒。咳嗽喘急。宜服此以發散表邪。

麻黃去節桂枝芍藥甘草細辛乾薑各三兩半夏五兩五味各半斤 右八味。以水一斗。

先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三升。溫服一升。○按右方乃仲景古法。今當隨證輕

重。酌宜用之。

仲桂枝湯九 治太陽經傷風發熱。有汗惡風。

桂枝芍藥生薑各三兩甘草二兩大棗十二枚 右以水七升。微火煮取三升。去滓。適寒溫。

服一升。服已須更食熱稀粥一升餘以助藥力溫覆一時許令遍身微似有汗者佳不可令如水流滿病必不除。

桂枝加黃耆湯十 治黃疸脈浮者當以汗解之 即前桂枝湯加黃耆二兩

桂枝加大黃湯十一 即前桂枝湯內加大黃一兩

栝蒌桂枝湯十二 治瘧 即前桂枝湯加栝蒌根二兩

仲桂枝人參湯十三 治太陽傷寒表裏不解腸熱下利者

桂枝去芍藥甘草湯十四 白朮 人參 乾薑各三 右五味以水九升先煮四味取五升後

內桂枝更煮取三升溫服一升日再夜一服

仲桂枝麻黃各半湯十四 治太陽傷寒如瘧狀發熱惡寒不能得汗熱多寒少而身癢者

桂枝去皮麻黃去節芍藥甘草炙生薑各四兩大棗四枚杏仁二十四個湯 右七味以水

五升先煮麻黃一二沸去沫內諸藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝附子湯十五 方在熱陣三十 治傷寒風溼身痛

桂枝甘草湯十六 方在熱陣四十 治過汗心悸

桂枝葛根湯十七 方在痘疹三七 解散寒邪

仲柴胡桂枝湯十八 治傷寒發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者

柴胡四兩桂枝去皮人參黃芩芍藥生薑各一兩甘草一兩半夏一合大棗六枚 右

九味以水七升。煮取三升。去滓溫服。
新小柴胡湯十九 治邪在肝膽半表半裏之間寒熱往來喜嘔或日晡發熱脇痛耳聾驚悸
痲瘧等症。

柴胡 半斤 半夏 半斤 人參 黃芩 生薑 甘草 大棗 右七味以水一斗二升

煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服。一升。日三服。若胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加枳實。黃芩。一枚。若渴者。去半夏。加人參。合前成四兩。半括蕞根四兩。若脇下痞。去大棗。加牡蠣。四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂三兩。溫覆取微汗愈。若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑二兩。按右乃漢時古數也。今方改用。

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 半夏 二錢 黃芩 二錢 人參 二錢 甘草 五分 右加薑棗水煎服

柴胡 二錢 石膏 三錢 甘草 一錢 右用薑水煎服。○氣虛者加入參。

大柴胡湯 二四 方在攻陣七。治表證未除裏證又急。汗下兼行宜此。

柴胡湯 二五 方在和陣二二三。治淫瘧一身盡痛。

柴苓湯 二六 方在和陣一九二。治身熱煩渴泄瀉。

加減柴苓湯 二七 方在和陣一九三。治諸症和肝腎順氣除滯。

仲四逆散 二八 治陽氣亢極血脈不通四肢厥逆在臂脛之下者。若是陰證則上過於肘下

過於膝。以此為辨。乃不當用此也。

柴胡 芍藥 甘草 枳殼 各等 為細末。每服二錢。米飲調下。日三服。○噉加五味子乾

薑各五分。○悸者加桂五分。○腹痛加附子一枚。此今○泄利下重者。濃煎韭白湯調服。

仲葛根湯 二九 治太陽傷寒項強几几無汗惡風及太陽陽明合病下利者。○此即桂枝湯

加麻黃葛根也。

葛根 四兩 麻黃 去節 生薑 各三兩 肉桂 去皮 芍藥 甘草 二兩 大棗 十二枚 右七味咬咀。以水

一斗。先煮麻黃葛根減二升。去沫。肉桂諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。覆取微似汗。不須啜粥。

餘如桂枝法將息及禁忌。

升麻葛根湯 三十 治傷寒陽明經證。目痛鼻乾。不眠無汗。惡寒發熱。及小兒瘡疹痘癘等症。

升麻 葛根 芍藥 甘草 各等 水二鍾。煎一鍾。寒多熱服。熱多溫服。

蘇葛解肌湯 三一

此槌法加減方。○治足陽明證目痛鼻乾不眠頭疼眼眶痛脈微洪者。

蘇胡 乾葛 甘草 黃芩 芍藥 羌活 白芷 桔梗 水二鍾薑三片。棗二枚槌法加石膏末一錢煎之熱服。○本經無汗惡寒者去黃芩。冬月加麻黃。他時加蘇葉。

葛根蔥白湯 三二 治傷寒已汗未汗頭痛。

葛根 芍藥

川芎

知母

生薑

蔥白

水二鍾煎一鍾服

連翹蔥白湯 三三

治傷寒已汗未汗頭痛如破。

連翹 蔥白

生薑

水三鍾煎一鍾半分二服

局參蘇飲 三四

治四時感冒傷寒頭痛發熱惡寒無汗及傷風咳嗽聲重涕唾稠粘潮熱往來。此藥解肌寬中孕婦傷寒痘疹並治。

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 半夏 茯苓 各八分 本香 桔梗 甘草 各五分

水二鍾薑五片棗一枚煎八分熱服

加減參蘇飲 三五

方在痘疹三四 治痘疹初熱見點解利之藥

敗毒散 三六

亦名人參敗毒散。○治四時傷寒瘟疫憎寒壯熱風溼風眩項強身體疼痛不問老少皆可服。或嶺南烟瘴之地疫癘時行。或處卑濕腳氣痿弱等症。此藥不可缺。日三服以效為度。

人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 各等 水一鍾

以效為度

人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 各等 水一鍾

以效為度

人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 各等 水一鍾

半薑三片煎服或為細末沸湯點服。

加味敗毒散 三七

方在外科四一

解利足三陽熱毒寒熱如瘧。

荆防敗毒散 三八

方在痘疹三一

發散痘疹俱可用。

五積散 三九

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐肚腹疼痛及寒濕客於經絡腰

脚骨髓痠痛及痘瘡寒勝等症。

當歸 麻黃 蒼朮

陳皮 各一錢

厚朴 製乾薑 芍藥

枳殼 各八分

半夏 地

白芷 各七分

桔梗

甘草 炙 茯苓 肉桂 人參 各五分

川芎 四分

水二鍾薑三片葱白三莖煎八分不拘時

服 又歌曰

痢後偏生脚痛風

局方五積自能攻

就中或却麻黃去

酒煮多多服見功

十神湯 四十

治時氣溫疫感冒風寒發熱憎寒頭痛咳嗽無汗此藥不拘陰陽兩感一切發

散宜此

紫蘇 乾葛 升麻 芍藥 各一錢

麻黃 川芎 甘草 各八分

白芷 陳皮 香附 各六分

水

二鍾薑三片煎服

槲升陽散火湯 四一

治胃虛血虛因寒邪鬱遏陽氣以致肌表俱熱如火捫之烙手此火鬱

發之之劑也

升麻 葛根 羌活 獨活 芍藥 人參 各五分

防風 炙甘草 各三分

生甘草 二分

柴胡 八分

水一鍾半加生薑三片煎服忌生冷

升陽益胃湯 四二

方在和陣二

治秋燥行令陽氣漸衰惡寒體倦

聖散子 四三

治一切山嵐瘴氣時行瘟疫傷寒風濕等疾有非常之功如李待詔所謂肉寒

外熱上實下虛者此藥尤效通神宋嘉祐中黃州民病疫瘴大行得此藥痊活者不可勝細

蘇東坡撰文勒石以廣其傳聖散子之功益著徽州鄭尚書在金陵用此方治傷寒活人甚

衆故知其大能發散寒濕驅除瘴瘧實有超凡之效也

蒼朮 製防風

厚朴 薑炒

豬苓

澤瀉

白芷

川芎

赤芍藥

藿香

柴胡

各半兩

麻黃 升麻

羌活

獨活

枳殼

吳茱萸

泥細辛

藜蘆

茯苓

石菖蒲

草豆

蔻 良薑

各八錢

甘草

半兩

大附子

一枚

右為粗末

每服三錢

水二鍾

煎八分

稍熱服

易九味羌活湯 四四

一名羌活沖和湯

治四時不正之氣感冒風寒憎寒壯熱頭疼身痛

口渴人人相似者此方主之

羌活 防風

蒼朮

白芷

川芎

生地

黃芩

甘草

各錢

細辛

七分

水二鍾

煎三片棗一枚煎八分熱服取汗

有汗者去蒼朮加白朮渴者加葛根石膏

六神通解散 四五

方在寒陣十五

治發熱頭痛脈洪身熱無汗

芩瀉風百解散 四六

治四時傷寒頭痛發熱及風寒咳嗽鼻塞聲重或喘急

荆芥穗 麻黃

白芷

蒼朮

陳皮

甘草

五分

水一鍾半加薑蔥煎八分熱服

甚者加烏梅一個。

局消風散 四七

一名人參消風散。○治風熱上攻。頭目昏眩。鼻塞聲重。及皮膚頑麻。癢疹瘙

癢等症。

荆芥穗 天甘草 人參 川芎 防風 羌活 薄荷 蟬蛻 炒 僵蠶 炒 茯苓 各二錢 陳皮

厚朴 各一錢

右為末。每服二三錢。茶清調服。瘡癬溫酒下。

子消風散 四八

照前方。但無荆芥。防風薄荷甘草四味。

二味消風散 四九

治皮膚瘙癢不能忍。

蘇薄荷葉 蟬蛻 去頭足土

右為末。食遠溫酒調下二錢。

大黃芩半夏湯 五十

專治寒包熱。兼治表裏。

黃芩 酒炒 半夏 麻黃 紫蘇 桔梗 枳殼 杏仁 甘草 等分 水二鍾。薑三片。棗二

枚。煎八分。食遠服。○天寒加桂枝。

全續命湯 五一

治中風肢體不收。口不能言。胃昧不知痛處。拘急不能轉側。並治但伏不能

卧。欬逆上氣。面目浮腫。

麻黃 去節 人參 當歸 石膏 桂枝 川芎 乾薑 甘草 各三兩 杏仁 四十枚 右九味

以水一斗。煮取四升。溫服一升。當小汗。薄覆脊。須臾。汗出則愈。不汗更服。無所禁忌。勿當

風。

針小續命湯 五二 通治八風五痺痿廢等症。又於六經分別加減用之。

麻黃去節 人參去蘆 黃芩去腐 芍藥 甘草炙 川芎 防己 杏仁去皮 官桂各一兩 防風一兩

石膏知母 黃芩秋冬加 官桂 附子可隨證加減 諸藥用。○附雲岐子法加減。如精神恍惚。

加茯苓遠志。○心煩多驚加犀角。○骨節間煩疼有熱者。去附子。倍芍藥。骨間冷痛倍用。

桂枝附子。○躁悶小便澀去附子。倍芍藥。入竹瀝一合煎。○藏寒下利去防己。黃芩倍附子。

白朮一兩。○熱痢減去附子。○腳弱加牛膝。石斛各一兩。○身痛加秦芫一兩。○腰痛加桃。

仁杜仲各半兩。○失音加杏仁一兩。○自汗者去麻黃。杏仁加白朮。○春加麻黃一兩。○夏

加黃芩七錢。○秋加當歸四兩。○冬加附子半兩。

千金續命湯 五三 即前方全價續命湯去人參。加黃芩荆瀝。○元戎方用竹瀝。

續命煮散 五四 補虛消風通經絡。行氣血。除痰癥疼痛。

人參 熟地黃 當歸 川芎 芍藥 防風 荆芥 獨活 細辛 葛根 甘草

遠志 半夏各五錢 桂心七錢 右每服一兩。水二鍾。生薑三片。煎八分。溫服。○汗多者加牡。

蠣粉一錢半。

續秦芫升麻湯 五五 治中風手足陽明經。口眼喎斜。四肢拘急。惡風寒。

升麻 葛根 甘草炙 芍藥 人參各半兩 秦芫 白芷 防風 桂枝各三 每服一兩。水

升麻 葛根 甘草炙 芍藥 人參各半兩 秦芫 白芷 防風 桂枝各三 每服一兩。水

二鍾連煎葱白頭三葉煎至一鍾食後稍遠服避風寒卧得微汗即止

愈風湯五六

治中風諸證當服此藥以行導諸經則大風悉去縱有微振只從此藥加減治

之若初覺風動服此不致倒仆此乃治本病之要藥也

羌活 甘草 防風 當歸 蔓荊子 川芎 細辛 黃耆 枳殼 人參 麻黃

白芷 甘菊 薄荷 枸杞子 知母 地骨皮 獨活 秦艽 黃芩 芍藥 蒼朮

生地黄各四兩 肉桂一兩 右咬咀每服一兩水二鍾生薑三片煎七分空心臨卧服○空心

一服吞下二丹丸謂之重劑臨卧一服吞下四白丹謂之輕劑○假令一氣之微汗用愈風

湯三兩加麻黃一兩作四服加薑五七片空心服以術投之得微汗則佳○如一旬之通利

用愈風湯三兩加大黃一兩亦作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利為度○又潔古

羌活愈風湯 即同前方加柴胡杜仲半夏厚朴防己白茯苓前胡熟地黄石膏等九味共

三十三味云治肝腎虛筋骨弱言語艱難精神昏憤風溼內弱風熱體重或瘦而一肢偏枯

或肥而半生不遂心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能安心養神調陰陽無偏勝○景岳

曰中風一證病在血分多屬肝經肝主風木故名中風奈何自唐宋名家以來竟以風字看

重多用表散之藥不知凡病此者悉由內傷本無外感既無外感而治以發達是速其死耳

因閉經云邪之所湊其氣必虛因內氣之虛外風觸之而發故名中風而用散風兼補之藥

若不因外風所觸竟率刺顛仆則名癲中風病由內起當尋疾暴大暴氣而治不宜發表若

中風之名自古有之非風之名實為杜撰近來醫家一遇此症俱用參附熱補而斃者多矣

以因其氣血留滯而少佐辛溼以通行經絡則可。若認為風邪而必用取汗以發散則不可。倘其中亦或兼表邪而病者則諸方亦不可廢。用鼓表者何必多議故擇其要者詳錄之亦以存古人之法耳。

胃風湯五七 治虛風能食牙關緊急手足搐攣胃風面腫

白芷二分 升麻二分 葛根 蒼朮 蔓荊子 當歸各一錢 炙甘草 柴胡 薑本 羌活

黃柏 草豆蔻 麻黃各五分 水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

地黃散五八 治中風四肢拘攣

乾地黄 炙甘草 麻黃去節各一兩 右咬咀用酒三升水七升煎至四升去滓分作八服日

進二服不拘時

東羌活附子湯五九 治冬月犯寒腦痛齒亦痛名曰腦風

羌活 蒼朮各五分 製附子炮 麻黃 防風 白芷 麝香 黃柏各七分 升麻 甘草各二分

黃耆三分 佛耳草無嗽不用 水一鍾半煎八分溫服○一方有細辛

無寶羌活附子湯六十 方在熱痺三五治呢逆

羌活勝風湯六一 治兩眼眇多眵燥緊澀羞明赤脈貫睛頭痛鼻塞腫脹涕淚腦顛沉重眉

骨痠痛外翳如雲霧絲纒秤星螺蓋

羌活 防風 荆芥穗 白芷 獨活 柴胡 薄荷葉 白朮 桔梗 前胡 枳殼

甘草 川芎 黃芩各五分 水二鍾煎一錢。熱服。

聖川芎散六二 治偏正頭風疼痛。

川芎 羌活 細辛 香附 槐花 炙甘草 石膏各半兩 荊芥穗 薄荷 菊花 茵陳

防風各一兩 右為末。每服二錢。食後茶清調服。○忌動風物。

玉川芎散六三 治風熱頭痛不清及目痛。

川芎三分 羌活 防風 藜蘆 升麻 甘草各一錢 柴胡七分 黃芩炒 黃連各四分 生地二錢

右為末。每服一二錢。茶清調下。

局川芎茶調散六四 治傷風上攻。偏正頭痛。鼻塞聲重。

薄荷葉二兩 川芎 荊芥穗各一兩 羌活 白芷 甘草各五錢 細辛 防風各二錢 右為細末。

每服二錢。食後茶清調下。

局神木散六五 治四時瘟疫傷寒發熱惡寒頭疼項強身痛。及傷風頭痛鼻塞身重咳嗽。

蒼朮 藜蘆 白芷 細辛 羌活 川芎 甘草各一錢 水一鍾半。薑三片。葱白三寸。煎

服。

長天香散六六 治年久頭風不得愈者。

南星製 半夏製 川烏去皮 白芷各二錢 右作一服。水二鍾。加生薑自然汁。小半盞煎一盞。食

遠服。

芎芷散^{六七} 治風壅頭痛

川芎 白芷 荆芥穗 較石膏 右為末。每服一錢。食後沸湯調下。

芎辛導痰湯^{六八} 治痰厥頭痛

川芎 細辛 南星 橘紅 茯苓^{各錢半} 半夏^{二錢} 枳實 甘草^{各一錢} 水一鍾半。薑七片

煎八分。食後服。

青^奇上清散^{六九} 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎 鬱金 芍藥 荆芥穗 芒硝^{各半兩} 薄荷葉^{一錢} 片腦^{半錢} 右為細末。每用一字

鼻內搐之。○一方有乳香沒藥各一錢

本透頂散^{七十} 治偏正頭風夾腦風並一切頭風。不問年深日近

細辛^{表白者瓜蒂七個丁香三粒糯米七粒腦子麝香^{各一豆許}} 右將腦麝另研極細。卻將

前四味亦另研極細末。然後並研令勻。用磁罐盛之。謹閉罐口。用時隨左右搐之。一大豆許。

良久出涎則安。

菊花散^{七一} 治風熱上攻頭痛不止

甘菊花 旋覆花 防風 枳殼 羌活 蔓荊子 石膏 甘草^{各一錢} 水一鍾半。薑五

片。煎七分。不拘時服。

寶如聖散^{七二} 治眼目偏痛頭風

麻黃

燒灰
半兩

益硝

二錢
麝香

腦子

各少

右為細末。搗之。

點頭散

七三

治偏正頭痛。

川芎

一兩

香附

四兩
炒
去毛

右為細末。每服二錢。食後茶清調服。

陳清空膏

七四

治偏正頭痛。年深不愈者。善療風溼熱上壅頭目。及腦痛不止。若除血虛頭

痛者。非此所宜。

川芎

五錢

柴胡

七錢

黃連

酒炒

防風

羌活

各一

甘草

半一兩

細梔子

黃芩
炒一兩
酒洗

右為細末。每服二錢。熱茶調如膏。抹在口內。少用白湯送下。臨卧。○如若頭痛。每服加細

辛二分。○如太陰脈緩有痰。名曰痰厥。頭痛。瀉羌活。防風。川芎。甘草。加半夏一兩五錢。

愈風餅子

七五

治頭風疼痛。

川烏

炒半

川芎

甘菊

白芷

防風

細辛

天麻

羌活

荆芥

薄荷

右為細末。

水浸蒸餅為劑。捏作餅子。每服三五餅。細嚼。茶酒任下。不拘時。

本治八般頭風

七六

草烏

共

細辛

等分

黃丹

少許

右為細末。用葦管插入鼻中。

百都梁丸

七七

治風吹項背。頭目昏眩。腦痛。及婦人胎前產後。傷風頭痛。

白芷

大塊

白者

右為末。煉蜜丸。彈子大。每用一丸。細嚼。荆芥點茶下。

和三拗湯

七八

治感冒寒風。鼻塞聲重。語音不出。咳嗽喘急。胸滿多痰。

麻黃連節 杏仁連皮 生甘草 右明每服五錢薑三五片水煎食遠服○若憎寒惡風欲取

汗解加桔梗荆芥名五物湯治咽痛

局華蓋散七九 治肺受風寒頭痛發熱咳嗽痰飲

麻黃去節 蘇子 桑白皮 杏仁去皮 赤茯苓 橘紅各一錢 甘草五分 水二鍾薑五片棗

一枚煎八分食遠服

冲和散八十 治感冒風溼頭目不清鼻塞聲重倦怠久伸出淚

蒼朮四兩未 荆芥 甘草錢八 右為末薑湯調服二錢

金沸草散八一 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已憎寒發熱無汗惡風或熱壅膈間唾濁痰

盛

旋覆花 麻黃 荆芥各一錢 前胡 半夏 芍藥各八分 炙甘草五分 水二鍾薑三片棗一

枚煎八分食遠服

三 旋覆花湯八二 治風寒暑溼傷肺咳嗽大甚坐卧不甯

旋覆花 前胡 甘草 茯苓 半夏 麴 杏仁 麻黃 荆芥 穗 五味子 赤芍藥

右每服五錢加薑棗水煎○有汗者勿服

良 旋覆花湯八三 治風痰嘔逆飲食不下頭目昏悶等症

旋覆花 枇杷葉 川芎 細辛 赤茯苓各一錢 前胡半錢 右加薑棗水煎服

將桑皮散八四 治上焦熱壅。咳嗽連聲。血腥並氣不得透。

桑皮 柴胡 前胡 紫蘇 薄荷 枳殼 桔梗 赤茯苓 黃芩 炙甘草 等分

右咀。每服七八錢。水一鍾半。煎七分。食遠溫服。

簡蘇陳九寶湯八五 治老人小兒素有喘急。遇寒暄不常。發則連綿不已。咳嗽哮喘。夜不得

卧。

麻黃 紫蘇 薄荷 桂枝 桑白皮 大腹皮 陳皮 杏仁 甘草 各六 水一鍾半。

薑三片。烏梅七個。煎七分服。

局羌活散八六 治風邪壅塞聲重。頭目昏眩。遍身拘急。肢節頓疼。天陰愈覺不安者。

羌活 麻黃 防風 細辛 川芎 菊花 枳殼 蔓荊子 前胡 白茯苓 甘草

石膏 黃芩 等分 水一鍾半。薑三片。煎服。

羌活散八七 治風痺手足不仁。

羌活 防己 防風 桑仁 當歸 川芎 各一 附子 記去麻黃去根 天麻 各一 黃松節

薏仁 各二 荆芥 一 右為細末。每服二錢。不拘時。溫酒調下。

得 芎藭立香蘇散八八 散風消痰。理腳氣。

川芎 甘草 二錢 蘇葉 乾葛 白茯苓 柴胡 各半 半夏 六錢 枳殼 炒三 桔梗 生二 陳皮

三錢 每服三錢。水一鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘時溫服。

全越婢湯 八九 治風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出無大熱

麻黃 一兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十五枚 右五味以水六升先煮麻黃去上沫

內諸藥煮取三升分溫三服○惡風者加附子一枚○風水加白朮四兩○古今錄驗方即名越婢加朮湯

全越婢加半夏湯 九十 治肺脹咳嗽上氣目如脫狀脈浮大者

麻黃 六兩 石膏 半斤 生薑 三兩 甘草 二兩 大棗 十五枚 半夏 半斤 右六味以水六升先煮麻

黃去上沫內諸藥煮取三升分溫三服

當歸湯 九一 治肺痺上氣閉塞胸中脇下支滿乍作乍止不得飲食唇舌燥手足冷痛

當歸 無防風 去義黃耆 各二人參 細辛 黃芩 去腐各一兩 桂心 三兩 柴胡 八兩 半夏 湯洗五

杏仁 去皮尖炒 麻黃 去根節木青二三日 右吹咀每服五七錢水一鍾薑七片棗二枚煎

七分不拘時溫服日三次二服

羌活勝濕湯 九二 方在和陣一七八 治外傷濕氣一身盡痛

羌活 獨活 桑寄生 各二兩 杜仲 炒 川椒 炒 各一兩 獨活 桑寄生 各二兩 杜仲 炒 川椒 炒 各一兩

烏藥順氣散 九三 治風氣攻注四肢骨節疼痛遍體頑麻癱瘓腳氣語言蹇澀痿弱等症

先宜服此以疎氣道然後隨證用藥

烏藥 麻黃 白芷 川芎 桔梗 橘紅 枳殼 炒 炙甘草 薑 炒 各一兩 乾薑 炮 五

石每服五錢薑水煎服

通關散 九四 方在因陣九八 搗鼻取嚏 開通牙關

神效左經丸 九五 治諸風寒溼痺 麻木不仁 肢體手足疼痛 極效

蒼木浸 草烏去皮 葱白 乾薑各四兩 右四味搗爛 裝入瓶內 按實 密封瓶口 安於煖處

三日 取出曬乾 入後藥 ○按此方當加當歸六兩更佳 全毛狗脊 薑本 白芷 破故

紙酒浸 撫芎 小茴香 炒山甲 炮牛膝酒浸 各川烏 炮木瓜 白附子 虎腰骨酥炙

乳香炙 沒藥炙 各一兩 右為末 酒糊丸 小豆大 每服三四十九 空心酒下

三麻黃左經湯 九六 治風寒暑溼四氣流注 足太陽經 腰足攣痺 關節重痛 憎寒發熱 無汗

惡寒 或自汗 惡風 頭痛 麻黃去節 乾葛 細辛 防風 桂心 羌活 蒼朮 防己 酒拌 茯苓 炙甘草各一兩二分

水二鍾 薑三片 棗一枚 煎八分 食前服

三半夏左經湯 九七 治足少陽經為四氣所乘 以致發熱 腰脇疼痛 頭痛不食 熱悶煩心 腿

痺 縱緩 半夏 乾葛 細辛 柴胡 防風 桂心 乾薑 炮白朮 麥冬 黃芩 茯苓 炙甘

草各一錢 水二鍾 薑三片 棗一枚 煎八分 食前服

三 大黃左經湯 九八 治四氣流注 足陽明經 致腰腳腫痛 不可行 大小便秘 或惡飲食 喘滿

自汗 嘔吐 腹痛

大黃煨細辛 羌活 前胡 杏仁去皮 厚朴 枳殼 黃芩 茯苓 炙甘草各一

水二鍾 薑三片 棗二枚 煎八分 食前服

第十第一麻黃湯九

治惡風毒氣 腳弱無力 頑痺四肢不仁 失音不能言 毒氣衝心 有人病

此者 但一病相當 即服此第一方 次服第二 第三 第四方

麻黃一兩 大棗十二枚 茯苓三兩 杏仁三十枚 防風 當歸 白木 川芎 升麻 芍藥

黃芩 桂心 麥冬 甘草各二兩 右咬咀 用水九升 清酒二升 合煎取二升半 分四服 日

三夜 覆令小汗 粉之 莫令見風

第十第二獨活湯一百

獨活四兩 熟地黃三兩 生薑五兩 葛根 桂心 甘草 芍藥 麻黃各二兩 右咬咀 以水

八升 清酒二升 合煎取二升半 分四服 日三夜 腳弱者 特忌食飧子 葷菜 犯之 則一世不

愈

第十第三兼補厚朴湯百一 並治諸氣欬 逆氣嘔吐

厚朴 川芎 桂心 熟地黃 芍藥 當歸 人參 略 二 黃耆 甘草各三兩 吳茱萸二升

半夏七兩 生薑一斤 右咬咀 以水二斗 煮猪蹄一具 取汁一斗二升 去上肥膩 入清酒三

升 合煮取三升 分四服 相去如人行二十里 久更進服

第十第四風引獨活湯百二 兼補方

獨活四兩 茯苓

甘草各三兩

升麻一兩

人參

桂心

防風

芍藥

當歸

黃耆 乾薑

附子各二兩

大豆二升

右咬咀以水九升清酒三升合煮三升半分四服相去如人行二

十里久更進服

獨活湯百三

治腳氣陽虛寒勝經氣不行頑腫不用如神

獨活

麻黃

去節 川芎

熟附子

牛膝

黃耆

炙人參

當歸

白芍藥

白茯苓

白朮

杜仲

炒乾薑

肉桂

木香

甘草

炙等分

右咬咀

每服五七錢

水一鍾半薑三片

棗三枚煎八分食前溫服

追毒湯百四

治肝脾腎三經為風寒熱濕毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便秘

瀉心熱煩悶遍身浮腫脚弱不能行步

半夏湯洗七次

黃耆

去蘆 甘草

當歸

去蘆 人參

去蘆厚朴

薑製獨活

去蘆 橘紅

各一兩 氣地黃

枳實數炒

芍藥

麻黃

去節 桂心

三兩

右咬咀

每服八錢

水一鍾半

生薑七片棗三枚

煎八分食前溫服日三夜一

局排風散百五

治風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神錯亂及五藏風邪等症

防風

白朮

當歸

酒洗 芍藥

肉桂

杏仁

川芎

白鮮皮

甘草

炙各二錢 麻黃

茯苓

獨活

各三錢

右分二服

水二鍾薑三片

煎七分

食遠服

陽毒升麻湯百六

治陽毒赤斑狂言吐膿血

升麻一錢 犀角磨 射干 黃芩 人參 甘草各八分 水一盞半煎八分內犀角汁和勻服

栝萎根湯百七 治風濕大湯 栝萎根 乾薑 防風 人參 甘草各一錢 石膏三錢 水一盞半煎八分服

再造散百八 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗用表藥而汗不出脈無力者此以陽虛不能作汗

名曰無陽若醫不識此復用麻黃等藥及覆逼取汗誤殺者多矣

人參 黃耆 川芎 甘草 熟附子 桂枝 細辛 羌活 防風 煨生薑 夏月熱

甚或加石膏 水一鍾半棗二枚煎八分溫服

本枳殼煎散百九 治悲哀煩惱傷肝兩脇骨痛筋脈緊腰腳重滯筋急不能舉動此藥大治

脇痛

枳殼數寸 細辛 川芎 桔梗 防風各二兩 葛根一兩 甘草一兩 右咀每服七八錢水一

鍾薑棗同煎食前溫服

柴胡疎肝散百十 治脇肋疼痛寒熱往來

陳皮焙炒 柴胡各二錢 川芎 枳殼炒 芍藥各一錢 甘草五分 香附一錢 水一鍾半煎八分

食前服

本桂枝散百十 治因驚傷肝脇骨疼痛不已

枳殼一兩 桂枝半兩 右為細末每服二錢薑棗湯調下

河葛根湯_{百十} 治寒邪在經。脇下疼痛不可忍。

葛根 桂枝 川芎 細辛 防風_{各一錢} 麻黃 枳殼 芍藥 人參 炙甘草_{各八分}

右咀水一鍾半。薑三片。煎八分。食遠溫服。

升麻湯_{百十} 治無汗而喘。小便不利。煩渴發斑。

升麻 蒼朮 麥門冬 麻黃_{各一錢} 黃芩 大青_{各七錢} 石膏_{一錢} 淡竹葉_{十片} 水二鍾。煎

八分。溫服。

神柴胡桂枝乾薑湯_{百十} 治傷寒五六日。汗下後。但頭汗出。往來寒熱。心煩者。邪未解也。

柴胡_{半斤} 桂枝_{三兩} 乾薑_{二兩} 枳實_{四兩} 黃芩_{三兩} 牡蠣_{煨二兩} 甘草_{炙二兩} 右七味以水

一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。初服微煩。再服汗出便愈。

加批
詳評
景岳全書

卷五十七

字集古文八陣

會稽 張介賓 會卿著

長洲葉 桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

寒陣

黃連解毒湯一 亦名解毒湯。治火熱狂躁煩心。口乾舌燥。熱之甚者。及吐下後熱不解。脈

洪喘急等證。

黃連 黃芩 黃柏 梔子各等分 右每服五錢。水二鍾煎服。

仲白虎湯二 治傷寒脈浮滑。此表有熱。裏有邪。宜用此以解內外之熱。及一切中著煩熱。熱

結斑黃。狂躁大渴等證。

石膏一斤 知母六兩 甘草二兩 糯米六合 右四味。以水一斗。煮米熟。去滓。溫服一升。日三

服。○本方加蒼朮。即名蒼朮白虎湯。

仲白虎加人參湯三 此即人參白虎湯。○亦名化斑湯。○仲景法即於前白虎湯內加人參

三兩。用治服桂枝湯大汗出後。大煩渴不解。脈洪大者。○今近代止用人參二錢。石膏五錢。

知母二錢。甘草一錢。糯米一撮。以治赤斑。口燥煩躁。暑熱脈虛等證。○又河間名為人參石

膏湯。用治膈消煩熱。但分兩加倍於今方。

活白虎加桂枝湯四 治瘧但熱不寒及有汗者。

知母 桂枝 甘草炙 粳米各一錢 石膏一錢 右咀水一鍾半煎八分溫服。

仲竹葉石膏湯五 治陽明汗多而渴鼻衄喜水水入即吐及暑熱煩躁等證。

石膏一兩 竹葉二十片 半夏 甘草各二錢 麥冬 人參各三錢 粳米一撮 此係今方分兩非仲景舊法 水二鍾。

薑三片煎服。一方云石膏二錢人參一錢其他以遞減之用者當酌宜也。

六味竹葉石膏湯六 治胃火盛而作渴。

石膏煨倍用之 淡竹葉 桔梗 薄荷葉 木通 甘草各一錢 水煎服。

竹葉黃耆湯七 治胃虛火盛作渴。

淡竹葉二錢 人參 黃耆 生地黃 當歸 川芎 麥冬 芍藥 甘草 石膏煨 黃芩

炒各一錢 水煎服。按此方之用當去川芎為善。外科仍有半夏。

明桂苓甘露飲八 治陽暑發熱煩躁水道不利等證。

滑石兩四 石膏 寒水石 白木各二兩 茯苓 澤瀉各一兩 肉桂 豬苓各五錢 右為末每服

三錢溫湯調下。

和桂苓甘露飲九 治證同前服虛而渴者當用此。

滑石一兩 人參 白木 茯苓 甘草 石膏 寒水石 乾葛 澤瀉各一兩 官桂 木香

藿香各一錢 右為末每服三錢白湯調下。

千金甘露飲十

治男婦小兒胃中客熱。口舌生瘡。咽喉腫痛。牙齦腫爛。時出膿血。及脾胃受溼。

痰熱在內。或醉飽多勞。溼熱相搏。致生膿病。身面皆黃。或身熱而腫。大小便不調。

枇杷葉七錢去毛 生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 黃芩 石解 茵陳 枳殼 各二錢

炙甘草五分 右作一服。水二鍾。煎七分。食後服。○本事方無麥冬。茵陳。有山豆根。犀角。治口黃證。大有神效。

三黃石膏湯十一 治疫癘大熱而躁。

石膏生三錢 黃芩 黃柏 黃連各二錢 豆豉半合 麻黃八分 梔子五枚 水二鍾。煎一盞。連連三四盞則愈。

羌活升麻湯十二

治暑月時行瘟熱。病宜清熱解毒。兼治內外者。

羌活 升麻 葛根 人參 白芍藥 黃芩各一錢 黃連 石膏 甘草 生地黃 知母

各七 水二鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。溫服。

東普濟消毒飲十三 治疫癘憎寒壯熱。頭面腫。目不能開。上喘。咽喉不利。口乾舌燥。俗云

大頭瘟病。諸藥不效。元泰和二年。東垣制以濟人。所活甚衆。時人皆曰天衣。

黃芩酒炒 黃連酒炒 各五錢 人參 三錢 橘紅 玄參 生甘草 桔梗 柴胡各二錢 薄荷葉

連翹 鼠粘子 板藍根 馬屁勃各一錢 白殭蠶炒 升麻各七 右為細末。半用湯調。時時

服之。半用蜜丸。噙化。服盡良愈。○或加防風 川芎 當歸 薄荷 細辛 水二鍾。煎一

鍾食遠積熱服。如大便乾，加酒蒸大黃一二錢以利之。或熱甚者，以鍼砭刺出其血。
苓連消毒飲 十四 治天行時疫大頭癩發熱惡寒頸項腫脈洪痰庫等證。

柴胡 桔梗 羌活 防風 黃芩 黃連 連翹 枳殼 荆芥 白芷 川芎 射干

甘草 水一鍾半薑三片煎服。有痰者加竹瀝薑汁調服。如秘結熱甚者先加大黃煎服利二三行後依本方加人參當歸調理。

阿六神通解散 十五 治發熱頭痛脈洪身熱無汗。捷法有川芎羌活細辛三味。

麻黃 甘草 各一錢 蒼朮 石膏 滑石 各錢 豆豉 十粒 水二鍾加蔥薑同煎一

鍾溫服

仲 陷胸湯 十六 治小結胸症在心上。按之則痛脈浮滑者。

半夏 三錢 黃連 錢半 栝蒌仁 二錢 此 右先以水二鍾煎栝蒌至一鍾半乃入二藥同煎至

八分溫服。原方用黃連一兩半夏半斤栝蒌實一枚水六升如法煮二升分三服。

雞子清飲 十七 治熱病五六日壯熱之甚大便秘結狂言欲走者。

雞子 二枚 取清 芒硝 細研 寒水石 細研 各 右先用新汲水一盞調藥末次下雞子清攪勻分二

服。按此法似不若以雪梨漿調二藥服之更妙。

仲 黃連阿膠湯 十八 治少陰傷寒二三日以上心中煩不得卧。

黃連 四兩 黃芩 一兩 芍藥 二兩 阿膠 三兩 雞子黃 二枚 右以水五升先煮前三味取二升。

去滓。內膠烊盡。稍冷。內雞子黃。攪令相得。溫服七合。日三服。

梔子仁湯 十九 治發熱狂躁。面赤咽痛。

梔子 赤芍 大青 知母 各一升 麻 柴胡 黃芩 石膏 杏仁 甘草 錢各二 豆豉 百

水煎溫服。○一方無豆豉。○又六味梔子仁湯。在外科八二。

景仲 梔子豆豉湯 二十 治傷寒煩熱懊懣。可為吐劑。

梔子 十四 香豉 四合 右用水四升。先煮梔子得二升半。內豉再煎取一升半。去滓。分二服。

溫進一服。得吐者。止後服。

景仲 梔子厚朴湯 二一 治傷寒下後。餘邪未清。心煩腹滿。起臥不安者。

梔子 十四 厚朴 四兩 枳實 四兩 已上三味。用水三升半。煮取一升半。去渣。分二服。溫進一服。得吐。止後服。

景仲 梔子乾薑湯 二二 治傷寒以圓藥大下之。身熱不去。微煩者。若病人舊有微溏者。不可用。

梔子 十四 乾薑 三兩 右二味。以水三升半。煮取一升半。去滓。分二服。溫進一服。得吐者。止後服。

景仲 梔子柏皮湯 二三 治傷寒身黃發熱者。

梔子 十五 甘草 一兩 黃柏 二兩 右三味。以水四升。煮取一升半。去滓。分溫再服。

解瘧疫熱毒 二四 瘧疫八九日後。已經汗下。不進口渴咽乾。欲飲水者。以蚯蚓糞名六一泥。

不拘多少。搗新汲水飲之。或用晚蠶沙亦可。○其熱甚者。用新青布以冷水浸過。略略搗乾。

置患人胸上。以手按之。良久布熱即易之。須臾當汗出如水。或作戰汗而解。夏月極熱用此法。他時不可用。

漏蘆丹麻湯 二五 方在外科九七。治時毒頭面紅腫。

黃連香需飲 二六 方在和陣一七二。治傷暑中熱。

局瀉心湯 二七 治心火。

用川黃連去鬚。為極細末。每服一字。或五分。或一錢。或湯或散。臨卧服。

景仲甘草瀉心湯 二八 亦名半夏瀉心湯。嘔而腸鳴。心下痞者。此方主之。○此方辛入脾而

散氣。半夏乾薑之辛以散結氣。苦入心而泄熱。黃連黃芩之苦以泄痞熱。脾欲緩。急食甘以緩之。人參甘草大棗之甘以緩之也。

半夏 一斤 黃連 一兩 乾薑 黃芩 甘草 天 人參 各二 大棗 十二 右七味。以水一斗。煮取

六升。去滓。再煮取三升。溫服一升。日三服。

景仲生薑瀉心湯 二九 治傷寒汗解之後。胃中不和。心下痞鞭。乾噎食臭。腸下有水氣。腹中雷

鳴。下利者。

生薑 四兩 甘草 炙 人參 黃芩 各三 乾薑 一兩 黃連 一兩 半夏 半斤 大棗 十二 右八味。以

水一斗。煮取六升。去滓。再煎取三升。溫服一升。日三服。○此方無生薑。即名半夏瀉心湯。

景仲大黃黃連瀉心湯 三十 治太陽傷寒汗下後。色微黃。心下痞。按之濡。其脈關上浮者。

大黃二兩黃連一兩 右二味以微沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服

仲景附子瀉心湯 三一 治傷寒下後心下痞而復惡寒汗出者

大黃一兩黃連黃芩各二兩附子一枚炮去皮破 右前三味以麻沸湯二升漬之須臾絞

去滓內附子汁分溫再服

清心蓮子飲 三二 治熱在氣分口乾作渴小便淋瀝或口舌生瘡咽疼煩躁

黃芩麥冬地骨皮車前子少甘草各錢人參黃耆石蓮子柴胡茯苓各一

右每服五錢水煎服

良加味通心飲 三三 治諸疝內熱脹痛及小便不利

木通梔子仁黃芩瞿麥連翹枳殼川棟子甘草等分 右咀每服五錢水

一鍾半燈心二十根車前草五莖煎七分溫服

清心湯 三四 治心受熱邪狂言叫罵動履失常

黃連黃芩梔子連翹薄荷甘草芒硝等分 水一鍾半竹葉二十片

煎八分溫服

外科清心湯 三五 方在外科八四 治瘡瘍腫痛發熱

局人參清肺湯 三六 治肺胃虛熱咳嗽喘急坐卧不安年久勞嗽唾痰

人參杏仁去皮阿膠各一錢棗殼蜜炒炙甘草桑白皮知母地骨皮烏梅肉各

分 水二鍾棗一枚煎八分。食遠服。

人參平肺散 三七

治心火剋肺金。傳為欬嗽喘嘔。痰涎壅盛。胸膈痞滿。咽喉不利。

人參 天冬 黃芩

地骨皮 陳皮 青皮 茯苓 各八分 知母 一錢 五味子 粒二十 甘草 五分

分 桑白皮 錢半

水二鍾薑三片煎八分。食遠服。

黃芩清肺飲 三八

治肺熱小便不利。宜用此清之。

梔子 二錢 黃芩 一錢

水煎服。如不利。加鹽豉二十粒。

清肺湯 三九

方在痘疹一四五。治麻疹欬甚者。

清肺飲子 四十

方在和陣三五。治邪熱在氣分。渴而小便不利。

清肺散 四一

方在痘疹八七。治痘疹肺熱喘嗽。

瀉白散 四二

治肺火大腸火喘急等證。

甘草 一錢 桑白皮 地骨皮 各二錢

右為末。水調服。

五味瀉白散 四三

方在因陣二六。治眼目風熱翳膜外障。

紅麥門冬湯 四四

治病後火熱乘肺。欬嗽有血。胸膈脹滿。上氣喘急。五心煩熱而渴。

天冬 麥冬 桑白皮 各七分

紫苑 葶苈 貝母 各六分 桔梗 甘草 各五分 淡竹葉 生地 各一錢

五味子 九粒

水一鍾半。棗一枚煎服。

類 麥門冬湯 四五

治肺熱氣衰血焦。髮落好怒。唇口赤甚。

麥門冬

遠志 甘草 煮心

人參

黃芩

生地黃

茯神

石膏

各一兩 甘草 兩

右咬咀每

服一兩水煎服

萬麥門冬湯四六

方在痘疹一四二

治表邪麻疼火熱嗽甚

麥門冬飲四七

治虛勞咳嗽午後嗽多者是也

川芎

當歸

生地黃

白芍藥

麥門冬

黃柏

知母各一錢

桑白皮

八分

五味子

五

水二鍾薑一片棗一枚煎八分食遠服

麥門冬飲子四八

治膈消胸滿心煩氣多血少津液不足為消渴

麥門冬

生地黃

人參

五味子

炙甘草

茯神

天花粉

知母

乾葛

等分

右咀每服一兩竹葉十四片水煎服

二母散四九

治肺熱咳嗽及疹後嗽甚者

貝母去心重

知母等分

乾生薑一片

右水煎服

或為末每服五分

或一錢沸湯下

二母散五十

方在婦人八六

治產後熱血上攻咳嗽喘促

家黃芩知母湯五一

治夏月大嗽有痰面赤煩熱

黃芩

知母

桑白皮

杏仁

山梔

天花粉

貝母

桔梗

甘草

等分

水二鍾煎

八分食遠服

醫桑白皮湯五二

治肺氣有餘大痰痰厥作喘

桑白皮 半夏 蘇子 杏仁 貝母 山梔 黃芩 黃連各八分 水二鍾 薑三片 煎八分 溫服

海紫苑散 五三 治嗽中有血虛勞久嗽肺痿

紫苑 阿膠 知母 貝母各錢半 人參 甘草 茯苓 桔梗各一錢 五味子十二 水二鍾

煎八分 食後服

末清胃散 五四 治醇酒厚味或補胃熱藥太過以致牙痛不可忍牽引頭腦滿面發熱或齒

齧潰爛喜冷惡熱此陽明之火也宜用此方 生地錢半 升麻 當歸 丹皮各一錢 黃連錢半 夏 水煎服

味清胃散 五五 即前方加犀角 連翹 甘草

秘清胃散 五六 治一切風熱濕痰牙痛齧腫血出搖動

石膏 梔子 黃連 黃芩 當歸 生地 白芍 蒼朮各一錢 青皮八分 細辛 藿香

荆芥穗各六分 升麻五分 丹皮 甘草各四 水二鍾 煎八分 食後緩緩合飲之

錢瀉黃散 五七 治脾火

山梔 一兩 石膏 五錢 藿香 七錢 防風 四錢 甘草 三錢 右以唾蜜酒拌略炒香為細末每服

二錢水一鍾 煎清汁飲

和中湯 五八 治虛火嘈雜

和中湯 五八 治虛火嘈雜

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏錢各一 甘草五分 黃連錢半 大棗二枚 水一鍾半。加糯

柴胡清肝散五九

治肝膽三焦風熱瘡癩。或怒火憎寒發熱。或瘡毒結於兩耳兩脇前後

或胸乳小腹下及服足等證。

柴胡

黃芩錢半

山梔錢半

川芎

人參錢各一

甘草五分

連翹

桔梗各八分 水一鍾半煎服

梔子清肝散六十

治肝膽三焦風熱耳內作癢。或生瘡出水。或脇肋胸乳作痛。寒熱往來。

梔子

柴胡

丹皮錢各一

當歸

川芎

芍藥

牛蒡子錢各一

茯苓錢各一 白朮錢各一 甘草錢各一

右水煎服。一方無白朮。

原方藥清肝散六一

治眇多眵。睛緊滯羞明。赤脈貫睛。藏府秘結。

白朮

川芎

防風

羌活

桔梗

滑石

石膏

芒硝各三分 黃芩 薄荷 荆芥

前胡

炙甘草

芍藥各二分

柴胡

山梔

知母各二分

大黃四分

水煎。食遠熱服。

良方龍膽瀉肝湯六二

亦名龍膽瀉。治肝經濕熱。小便赤澀。或脇脹口苦寒熱。凡肝經有餘

之證。宜服之。

龍膽草

酒洗

人參

天冬

麥冬

生甘草

黃連

山梔 知母各五分 黃芩七分 柴胡一分

五味子三分

水一鍾半煎服

七味龍膽瀉肝湯六三

治肝火內炎。如前諸證。

加批 醫藥 卷之六

柴胡梢 澤瀉 車前子 木通 龍膽草 當歸梢 生地各等 右以水二鍾煎一

薛氏加味龍膽瀉肝湯六四 治肝經溼熱或囊癰下疳便毒小便澀滯或陰囊作痛小便短

龍膽草酒炒 車前子炒 當歸尾 木通 澤瀉大人倍用 甘草 黃芩 生地 山梔大人倍用

右水煎○若治小兒子母同服

當歸六黃湯六五 治盜汗之聖藥

當歸 黃耆實天各二錢 生地黃 熟地黃 黃連 黃芩 黃柏各一錢 水二鍾煎服

正氣湯六六 治陰分有火盜汗

黃柏炒 知母炒各二錢 炙甘草六分 水一鍾半煎八分食遠熱服

仲芍藥甘草湯六七 治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚掣急足溫者

白芍藥 甘草炙各四兩 右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

生地黃煎六八 治陰火盜汗

生地 當歸 黃耆炙 甘草炙 麻黃根 浮小麥 黃連 黃芩 黃柏 水一鍾半煎八

分食遠服

寶石膏散六九 治陽明風熱頭痛

石膏 川芎 白芷 等分 右為細末。每服四錢。熱茶清調下。

本荆芥散 七十 治頭風。

荆芥 石膏 煨等 右為細末。每服二錢。薑三片。連翹葱白三朮。水一鍾。煎七分。食遠服。

雙玉散 七一 治熱痰欬喘。急煩渴頭痛。

石膏 寒水石 等分 右為極細末。每服三錢。人參湯或隨證用引調下。

秘方茶調散 七二 治風熱上攻。頭目昏痛。及頭風熱痛不可忍。

小川芎 一兩 細芽茶 薄荷 各三錢 白芷 五錢 荆芥穗 四錢 片苓 二兩 酒拌炒 三 頭暈及腦痛。

加細辛 藜蘆 蔓荊子 各三錢 右為細末。每服二三錢。用茶清調下。

天花散 七三 治消渴。

天花粉 生地黃 麥門冬 乾葛 各二錢 五味子 甘草 各一錢 右作二服。水一鍾半。梗米

百粒。煎八分。食遠服。

錢地骨皮散 七四 治壯熱作渴。

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡 人參 知母 半夏 等分 右吹咀。每服一兩。水煎服。

玉泉丸 七五 治煩熱口渴。

人參 麥門冬 黃耆 茯苓 烏梅肉 甘草 各一兩 天花粉 乾葛 各兩 右為末。蜜丸。彈子大。每服一丸。溫湯嚥下。

局犀角地黄湯八十 即前方加黃連黃芩各一錢

犀角地黄湯八一 治一切血熱失血三焦熱血便秘等證

犀角唐汁生地二錢黃連黃芩各一錢大黃三錢 水二鍾煎一鍾入犀角汁和勻溫服

外犀角地黄湯八二 方在外科四六 治胃大血熱妄行

良生地黃散八三 治血熱小便出血

生地黃二錢黃芩炒五阿膠炒柏葉炒各一錢 右水煎服

生地黃飲子八四 治諸見血吐血衄血下血溺血皆屬熱證

生地 熟地 枸杞 黃耆 芍藥 天冬 甘草 地骨皮 黃芩各等分 右咀每服七

錢水二鍾煎八分食遠服如脈微身涼惡寒者加桂五分吐血者多加此

葛根散八五 治衄血不止心神煩悶

葛根 黃芩 阿膠炒珠 側柏葉 生地黃各二錢甘草炙一 水一盞半薑三片煎七分食

遠服

人參五味子湯八六 方在外科一五二 治虛損肺痿等證

二神散八七 治男婦吐血或血崩下血

陳槐花二兩百草霜五錢 右為細末每服三錢茅根煎湯調下○治下血宜空心服之○

舌上忽然腫破出血宜此搽之

良方四生丸 八八 治吐血衄血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生側柏葉 生地黃 等分 右搗爛如雞子大丸每服一丸水二盞煎

一盞濾去滓服○陳日華云先公嘗遊靈石寺見一僧嘔血明年到寺問嘔血者何如主僧

云得服四生丸遂愈自得此方屢用有效愚意前證乃內熱暴患者宜用之若人病本元不

足須補脾以資化源否則虛火上炎全反受尅獲生鮮矣

濟生醫甲地黃飲 八九 治虛勞煩熱怔忡羸瘦

醫甲 醋炙 熟地 人參 白朮 當歸 麥門冬 茯苓 石斛 柴胡 秦艽 各一 肉桂

甘草 各六分 水二鍾薑五片烏梅一個煎七分不拘時服

方黃耆醫甲煎 九十 治虛勞客熱肌肉消瘦煩熱心悸盜汗少食多渴咳嗽有血

黃耆 蜜炙 醫甲 醋浸炙 去粗 人參 知母 桑白皮 紫苑 桔梗 甘草 各五分 地骨皮 秦艽

柴胡 生地 芍藥 各七分 天門冬 白茯苓 各八分 肉桂 四分 水一鍾半煎八分食後溫服

地黃膏 九一 滋陰降火養血清肝退熱

鮮地黃 以十斤為則搗汁 當歸身 一斤 芍藥 半斤 枸杞 半斤 天門冬 麥門冬 各六 川芎

丹皮 各二兩 蓮肉 四兩 知母 地骨皮 各三兩 人參 甘草 各一兩 右將眾藥用水二斗煎一斗

去滓淨和生地黃汁同熬成膏服之

方秦艽扶羸湯 九二 治肺痿骨蒸勞嗽或寒熱往來聲啞自汗體虛怠惰

人參 秦艽 當歸 鱘甲醋炙 紫苑茸 地骨皮 柴胡 甘草各五分 水一鍾半。薑五片。大棗烏梅各一枚煎七分。食遠服。
退熱湯九三 治急勞煩熱。口乾憎寒。飲食不得。

柴胡 龍膽草 青蒿 知母炒 麥冬 甘草各一 右用童便一鍾半。葱白三寸。蘆白三

莖。桃柳枝各五寸。同浸一宿。平旦煎一鍾。空心燉服。至夜再服。

良方 團魚丸九四 治骨蒸勞嗽累效。

貝母 前胡 知母 杏仁各一兩 柴胡半兩 團魚二個 右藥與魚同煮熟。取肉連汁食之。

將藥焙乾為末。再以團魚骨甲煮汁一盞。和丸桐子大。每服二三十丸。煎黃耆六一湯。空心

送下。病既安。仍服黃耆六一湯調理。

良方 地榆散九五 治腸風熱證下血。

地榆 黃芩 黃連 梔子 茜根 茯苓等分 右吹咀。每服五錢。入韭白五寸同煎。食

遠溫服。

良方 四味地榆散九六 一名撥火散。○治中暑昏迷。不省人事。並治血痢。

地榆 赤芍藥 黃連去鬚 青皮等分 右為末。每服三錢。漿水調服。或新汲水亦可。○若

治血痢。以水煎服。

本方 槐花散九七 治腸風藏毒下血。

槐花散九七 治腸風藏毒下血。

槐花 炒側柏葉 并荆芥穗 枳殼數分 右為末。每服二錢。空心米飲調下。或用煎湯亦名槐花湯。

柳槐花散 九八 方在外科一六九。治腸風藏毒下血。煎加減四物湯 九九 治腸風下血。

當歸 川芎 生地 側柏葉各八分 枳殼數分 荆芥穗 槐花 炒甘草各四分 地榆 條芩

防風各六分 烏梅三枚 水二鍾。薑二片。煎八分。空心溫服。

枳殼湯 一百 治大便秘風下血。

枳殼二兩 炒黃連一兩 同槐花四兩 水二鍾。濃煎。空心溫服。

枳殼散 一百 治便血或婦人經候不調。手足煩熱。胸膈不利。

枳殼數分 半夏錢 赤芍藥 柴胡各一錢 黃芩一錢 水二鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

生小薊飲子 百二 治下焦結熱。澀血崩淋等證。

生地 四兩 小薊根 滑石 蒲黃 炒藕節 淡竹葉 山梔 炙甘草各五錢 右咬咀。每服

五六錢。水一鍾。煎八分。空心溫服。

仲景黃連湯 百三 治傷寒胸膈有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。

黃連 炙甘草 乾薑 桂枝各二兩 半夏半斤 大棗十二枚 右七味。以水一斗。

煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。夜二服。

黃連湯 百四

治便後下血。腹不痛。名溫毒下血。

黃連

當歸 各一錢

甘草 五分 水二鍾。煎八分。食後服。

仲黃芩湯 百五 治太陽與少陽合病。自下利。

黃芩 三兩

炙甘草

芍藥 各二兩

大棗 十二枚

右四味。以水一斗。煮取三升。溫服一升。日一

服。夜一服。若嘔者。加半夏半升。生薑三兩。

外黃芩湯 百六

方在和陣一九八。治乾嘔下利。

直黃芩湯 百七

治心肺蘊熱。口瘡咽痛。膈悶。小便淋瀝不利。

黃芩

黃連

梔子

生地

麥冬

木通

澤瀉

甘草 各等分

右每服一兩。水一鍾半。

煎八分。食前服。

黃耆散 百八

治熱痢下赤膿。心腹煩熱疼。

黃耆

當歸

龍骨 各七錢

生地黃

黃連 五錢

黃柏 去粗皮

黃芩

犀角屑

地榆 各半兩

右為細末。每服二錢。不拘時。粥飲調下。

河黃芩為藥湯 百九 治瀉痢腹痛。或身熱熾後重。脈洪數。膿血稠黏。及陰虛內熱。衄血吐血。

者。○此方即前之仲景黃芩湯。但分兩不同。

黃芩

白芍 各二錢

甘草 一錢

水一鍾半。煎八分。溫服。

○腹痛甚者。加桂二分。膿血甚者。加

當歸黃連各一錢。○一方。芍藥用六錢。

局木香化滯湯百十。治痢下赤白。腹中疔痛。裏急後重。多熱多滯者宜之。

木香 甘草各七 人參 陳皮 黃連 澤瀉 檳榔各一 白木 枳殼 炒厚朴 白芍

藥 茯苓各錢 水二鍾煎八分。食前服。

清熱滲濕湯百十。治溼熱浮腫。肢節疼痛。小水不利。

黃柏二錢 鹽水炒 黃連 茯苓 澤瀉各一 蒼朮 白朮各錢 甘草五分 水二鍾煎八分服。

如單用滲濕去黃連黃柏加橘皮乾薑。

河間益九散百十。一名六一散。○一名天水散。○治中暑身熱煩渴。小水不利。河間云。治痢之

聖藥。分利陰陽。去溼熱。其功大矣。

粉甘草 桂府滑石兩 右為極細末。每服二三錢。新汲水調下。○一方加辰砂三錢。名

砒砂益元散。○一方加牛黃。治煩而不得眠。

局香連丸百十。治熱瀉痢疾。赤白膿血。濕熱侵脾。裏急後重。

黃連淨十兩。切如豆粒。用淨吳茱萸五兩。二味用熱水拌和。入磁罐。木香每製淨黃連一兩。內置熱湯中。煨一日。同炒。至黃連紫黃色。為度。去茱萸不用。

右為末。醋糊丸。桐子大。每服七十丸。食前空心米飲下。

良六神丸百十。治食積兼熱。赤白痢疾。或腹痛不食。或久而不止。

神麩為糊 麥芽炒 茯苓 枳殼炒 木香煨 黃連炒 焦黑 右為末。以神麩糊為丸。桐子大。

每服五七十九。白湯送下。

八正散

百十

治心經熱。藏府秘結。小便赤澀。淋閉不通。及血淋等證。

車前子

木通

滑石

飛山梔

大黃

煨瞿麥

萹蓄

甘草

各等分

右吹咀。每服五錢。水

二鍾。燈心二十莖。煎七分。食前溫服。

七正散

百十

車前子

赤茯苓

山梔仁

木通

龍膽草

萹蓄

生甘草梢

加燈心竹葉水煎服

五淋散

百十

治膀胱有熱。水道不通。淋瀝不止。臍腹急痛。或尿如豆汁。或如砂石。膏淋尿血。並皆治之。

茵陳

淡竹葉各一木通

滑石

甘草

各錢半

梔子

炒赤芍藥

赤茯苓

各二錢

水二鍾煎

一鍾。食前服。

局黨苓湯

百十

治夏月暑瀉欲成痢者。

香薷

黃連

薑汁炒厚朴

薑炒扁豆

豬苓

澤瀉

白朮

茯苓

等分

右咀。每服五六錢

水鍾半。薑三片。煎七分服。

局太平丸

百十

治泄瀉。

黃連

同吳茱萸炒芍藥

炒減

右為末。老米糊丸服。

同乾薑炒。加阿膠一半為丸。名駐車

丸。

去寒莫不用芍藥半。

右為末。老米糊丸服。

同乾薑炒。加阿膠一半為丸。名駐車

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

丸。

本
大府丹^{百二} 治心經積熱小便淋瀝黃疸煩渴

生地黃^{二兩} 木通^{二兩} 黃芩^{炒各一兩} 右以二味為末加蜜丸桐子大每服五七丸木通湯下○

許學士云一卒病渴日飲水斗許不食者三月心中煩悶時在十月余謂心經有伏熱與人府丹數服越二日來謝云當日三服渴止又三服飲食如故此本治淋用以治渴可謂變通也

真珠粉丸^{百二} 治精滑白濁

黃柏^{真蛤粉各一兩} 真珠^{三兩一方代以青黛亦效} 右為末水糊丸桐子大每服百丸空心溫酒下或

加樗皮滑石青黛俱好

方導赤散^{百二} 治心火及小腸熱證小便赤澀而渴

生地^{木通} 生甘草^{各等分} 入竹葉二十片水煎服○一方加人參麥冬

赤茯苓湯^{百二} 治膀胱實熱小便不通口乾咽腫不利

赤茯苓^{豬苓} 木通^{車前子} 瞿麥^{葵子} 黃芩^{滑石} 枳實^{甘草}^{各等分}

水一鍾半薑三片煎八分食前服

濟
葵子湯^{百二} 治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾燥

葵子^{微炒} 豬苓^{赤茯苓} 枳實^{瞿麥} 木通^{黃芩} 車前子^{滑石}^{各一} 甘草^{五分}

右用水一鍾半薑煎空心服

牛膝湯_{百二} 治砂石淋澀。

牛膝_{一合} 麝香_{少許} 右用水煎牛膝去滓入麝香服之。○鄞縣耿夢得之內患淋下砂石

剝刺有聲甚為苦楚一服而愈。

三味牛膝湯_{百二} 治小便不通莖中痛及婦人血熱內結腹堅痛。

牛膝_{根葉一} 當歸_{一兩} 黃芩_{去黑心} 右咀每服一兩許水一鍾半煎七分食遠服日三。

海金沙散_{百二} 治膏淋。

海金沙_{滑石各一兩} 甘草_{二錢} 右為細末每服二錢燈草湯空心調下。

茵陳湯_{百二} 治黃疸發熱大小便澀。

茵陳_{八錢} 梔子仁_{各二錢} 赤茯苓_{各錢} 葶藶_{各錢} 枳實_{各五} 甘草_{各五} 水一鍾半薑三片煎八分食

前服。

活茯苓滲濕湯_{百二} 治黃疸溼熱嘔吐而渴面目俱黃小便不利食少而熱。

白茯苓_{澤瀉} 茵陳_{青皮} 陳皮_{防己} 梔子_{黃芩} 黃連_{枳實} 各七分

蒼朮_{白朮} 各一錢 右水煎服。

陳當歸枯痛湯_{百三} 治溼熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利手足遍身流注疼痛熱腫

等證。

羌活_{黃芩} 炙甘草_{茵陳} 各五錢 人參_{苦參} 升麻_{乾葛} 蒼朮_{防風} 歸身

白朮 知母 豬苓 澤瀉各一錢半 右吹咀。每服一兩。水煎空心服。睡時再服。

人犀角散百三 治腳氣衝心。煩喘閉亂。頭痛口乾。坐卧不得。

犀角屑 枳殼各七錢半 沉香各七錢半 檳榔 紫蘇葉 麥門冬 赤茯苓各一兩 木香 防風各半兩

石膏二兩 右吹咀。每服八錢。以水一鍾半。煎八分。去滓。入淡竹瀝一合。更煎一二沸。不

拘時濕服。

陳清燥湯百三 治六七月間溼熱成癘。肺金受邪。腰以下痿軟癱瘓。不能行動。走不正。兩足

欬側。

柴胡 酒黃柏 黃連 麥冬各三分 生地 人參各一錢 炙甘草 豬苓 白茯苓 橘紅

神麴 澤瀉各五分 白朮 蒼朮各八錢 黃耆錢半 升麻三分 五味子九粒 右吹咀。每服半兩。

水二盞。煎一盞。稍熱空心服。

蒼朮湯百三 治溼熱腰腿疼痛。

蒼朮三錢 柴胡二錢 黃柏 防風各一錢 右用水煎。空心服。

丹二妙散百三 治溼熱在經。筋骨疼痛。如有氣加氣藥。如血虛加補血藥。如痛甚加薑汁。熱

棘服之。

黃柏炒 蒼朮去皮炒 右為末。搗生薑煎湯調服。○此二物皆有雄壯之氣。如氣實加少

酒佐之。○此即集要二神湯各三錢半。用水煎。空心服。○一方以二妙為君。加甘草 羌活

各二陳皮 芍藥各一 威靈仙酒炒五分 為末服之佳

加味二妙丸百三 治兩足溼痺疼痛如火燎從兩足跗熱起漸至腰膝或麻痺痿軟皆是溼

熱為病此方主之

歸尾 川牛膝 川萆薢 防己 龜板酥炙各一兩 蒼朮未泔浸炒四兩 黃柏二兩酒浸晒乾 酒煮麵粉為

丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯送下

丹蒼朮黃柏丸百三 治溼熱食積痰飲流注腳氣

蒼朮鹽水炒 黃柏鹽水炒 防己 南星 川芎 白芷 犀角 檳榔等分

○血虛加牛膝龜板○肥人加痰藥 右為末酒糊丸服

正虎脛骨丸百三 治兩足痿弱軟痛或如大烙從足踝下上衝腿膝等證因熱所成者經驗

牛膝 歸尾各二 龜板酥炙 虎脛骨酥炙 防己各一 蒼朮未泔浸 黃柏酒浸日晒 右為細

末麩糊為丸桐子大每服百餘丸空心薑鹽湯送下○一方加炮附子五錢

河間苦參丸百三 治血虛風熱著脾

苦參二兩 丹皮炙 沙參 人參 防風去叉 五茄皮 蒺藜炒去 烏蛇酒浸 蔓荊子 龜板

酥取粉 虎骨酥炙 玄參各一 右為細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升按取汁於無油鐵器

熬成膏加煉蜜四兩和丸桐子大每服十五丸至二十九丸食後良久夜卧共三服荊芥薄荷

酒下

陳苦參丸百三 方在外科八八 治遍身瘙癢癬疥瘡瘍

鐵苦參丸百四 方在痘疹九九 治痘後潰爛瘡毒疥癩

硃砂涼膈丸百四 治上焦虛熱肺腕咽膈有氣如烟搶上

黃連 山梔各一人參 茯苓各半 硃砂五分 冰片五分 另研

為衣熱水送下五七丸日進三服食後

煉硃砂安神丸百四 名黃連安神丸○治心神煩亂發熱怔忡不寐或寐中驚悸頭暈等證

生地 硃砂各一分 當歸各一分 甘草五分 黃連一分 湯浸餅蒸為丸黍米大每服十五丸或二

十丸津液嚥之或食後用溫水涼水送下亦可

錢安神丸百四 治熱渴心悶脈實頰赤口燥

麥冬 馬牙硝 白茯苓 寒水石 山藥 甘草各五 硃砂一兩 龍腦一字 右為末煉

蜜丸芡實大每服一丸沙糖水化下

秘安神丸百四 方在小兒七一 治心虛驚悸

十味安神丸百四 方在小兒七三 治虛驚

七味安神丸百四 方在小兒七二 治心熱多驚

龍腦 麝香 研 牛黃 研 各 犀角 人參 茯苓 麥冬 硃砂 各 桑白皮 地骨皮

治男婦小兒五積癩癩不論遠近發作無時但服此藥無不痊愈

甘草

各一兩

馬牙硝

二錢

金箔

三十片

為細末

煉蜜丸

彈子大

金箔為衣

寒用熱水

熱用涼水

不

拘時

化下一丸

小兒半丸

如病二三年者

日進二三服

若男婦虛勞喘嗽發熱者

用新汲水

化下

其喘滿痰嗽立止

傷龍腦安神丸

八

方在小兒七七

治驚痰及痘中昏悶諸妄

抑青丸

九百四

治肝火

右單用一味為末

粥丸

溫水下

黃連

煎汁

右單用一味為末

粥丸

溫水下

錢抑青丸

百五

方在小兒九八

治肝熱急驚搐搦

瀉青丸

百五

治肝膽火並小兒急驚發搐

眼赤睛疼

龍膽草

當歸

川芎

防風

羌活

山梔

大黃

等分

煉蜜丸

桐子大

每服五十丸

瀉金丸

二五

治肺火

用黃芩為末

滴水丸

白湯下

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

黃連

煎汁

治瀉熱吐酸

大補丸百五 治陰大

黃柏鹽酒炒 米粥丸。血虛。四物湯送下。氣虛。四君子湯送下。

大造丸百五 此方治陰虛血熱。能使耳目聰明。鬚髮烏黑。有奪造化之功。故名大造。亦治心

風失志。虛勞水虧等證。

紫河車頭生壯盛者一具以米泔洗淨少加酒蒸極爛搗膏 敗龜板白瓦者研 黃柏鹽酒炒

杜仲酥炙 牛膝酒洗 天門冬各一兩 熟地塊 同稀糊色入好酒煮七次去茯苓

用 夏加五味子七錢。右除熟地黃另杵。共為末。用酒煮未糊。同熟地膏搗丸。桐子大

或蜜丸亦可。每服八九十九丸。空心臨卧鹽湯薑湯任下。冬月酒下。婦人加當歸二兩。去龜

板。男子遺精白濁。婦人帶下。加牡蠣一兩半。

丹 大補陰丸百五 降陰火補腎水。

黃柏鹽水炒 知母鹽酒炒 熟地酒洗 龜板酥炙黃 右為細末。用豬脊髓蒸熟。加煉蜜和丸

搗爛桐子大。每服五六十九丸。空心薑鹽酒送下。

秘 大補元丸百五 治男婦虛損勞傷。形體羸乏。腰背疼痛。遺精帶濁。

紫河車初胎者一具。米泔洗淨。入小砂罐內。加水一盞。煮沸。候冷 黃柏蜜炒 知母乳炒 龜板

酥炙各懷熟地 牛膝酒洗 肉蓯蓉酒洗 麥門冬山藥 虎脛骨酥炙 黃耆蜜炙 茯苓

各兩 杜仲 何首烏 人參 白芍藥 冬月 枸杞 各二 生地 酒洗 砂鍋 天門冬 當歸 酒洗

詳評... 卷五... 宇... 集

北五味各一兩冬加乾薑炒黑右為細末用豬脊髓三條蒸熟同煉蜜和搗為丸桐子大每服八十九丸空心淡鹽湯送下冬月酒下

大補地黃丸百五治精血枯涸燥熱

黃柏鹽酒炒熟地酒蒸各四兩當歸酒洗山藥炒枸杞各三兩知母鹽酒炒山茱萸各二兩白芍藥各二兩生地各二兩

三兩肉蓯蓉酒浸玄參各兩右為末煉蜜丸桐子大每服八十九丸空心淡鹽湯送下

丹補陰丸百六一名虎潛丸降陰大滋腎水

黃柏製知母製熟地酒洗各三兩龜板酥炙四兩白芍藥酒炒當歸各二兩虎脛骨酥炙瑣陽酥炙

陳皮各兩右為細末酒煮羯羊肉為丸桐子大冬加乾薑半兩每服五六十丸薑鹽湯或酒下

齊節補陰丸百六

黃柏知母煨酒龜板各三熟地五兩瑣陽枸杞天冬白芍各二兩五味子一兩乾薑

五錢煉蜜入豬脊髓三條搗丸桐子大每服八十九丸空心淡鹽湯送下冬月用酒

三補丸百六治三焦火熱

黃芩黃連黃柏滴水丸桐子大白湯送下或淡鹽湯亦可

煉滋腎丸百六降腎火桂與大邪同體此寒因熱用法也凡不渴者病在下焦宜用之○良

方云或腎虛足熱小便不利肚腹腫脹皮膚脹裂眼睛突出此神劑也

上海英大藥房印

黃柏二兩酒拌陰乾知母同上肉桂二錢為細末熟水為丸百沸湯空心送下二百丸

加味虎潛丸百六治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯元氣滋腎水

熟地黃八兩人參黃耆炙當歸杜仲酥炙牛膝酒蒸瑣陽酒洗龜板酥炙兔絲子製

茯苓破故紙炒黃柏蜜水知母酒炒虎骨酥炙各山藥炒枸杞子各二右煉蜜加豬春

髓酒蒸熟同搗丸桐子大每服百餘丸空心淡鹽湯或酒任下

加味坎離丸百六生精養血生水降火

川黃柏八兩分四分用清酒鹽水入乳熟地八兩用茯苓四兩打碎砂仁二兩三味同入

知母酒浸炒白芍酒浸一當歸川芎各四右共為末鋪篋中日曬夜露三日為度煉蜜

九桐子大每服八九十九空心鹽湯冬月溫酒任下

三才封髓丹百六降心火益腎水

天門冬熟地黃人參各一黃柏炒褐色砂仁炒半甘草炙右為末麩糊丸桐子

大每服五七十丸以肉蓯蓉五錢切片酒浸一宿次日煎三四沸空心送下

當歸龍薈丸百六治肝經實火大便秘結小便澀滯或胸脇作痛陰囊腫脹凡肝經實火皆

宜用之及一切躁擾狂越驚悸不甯等證

當歸龍膽草梔子仁黃連黃柏黃芩各一蘆薈各一大黃各一青黛各五木香二錢

麝香五分右為末神麩糊丸桐子大每服三二十九薑湯白湯任下

麝香五分右為末神麩糊丸桐子大每服三二十九薑湯白湯任下

良蘆薈丸百六

治疔癬肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝火食積口鼻生瘡牙

銀蝕爛等證。

蘆薈 胡餘連 黃連炒焦 木香 白蕪荑去白皮 當歸 茯苓 諫皮各兩 甘草炒七

右為末。米糊丸。桐子大。每服七八十丸。米湯下。

大蘆薈丸百六 方在小兒百十。治小兒肝脾疳積發熱。

加減蘆薈丸百七 方在小兒百十六。治疳積。

三聖丸百七 治嘈雜神效。

白木炒 橘紅炒 黃連炒 右為細末。神麩糊丸。綠豆大。每服五六十丸。薑湯下。

木連丸百七 治嘈雜。

白木四兩 黃連一兩 右為末。神麩糊丸。黍米大。每服百餘丸。薑湯下。

軟石膏丸百七 治嘈雜暖氣。

軟石膏煨 半夏製 南星製 香附子炒 梔子仁等分 右為細末。米粥丸。桐子大。每服五七十

丸。薑湯下。

地榆丸百七 治血痢下血極效。

地榆微炒 當歸微炒 阿膠糯米炒 黃連去鬚 訶子取肉 木香晒乾 烏梅肉各半 右為細末。煉

丸。桐子大。每服三五十九丸。空心或食前陳米飲吞下。

槐角丸百七

治五種腸風下血並痔漏瘻肛

槐角炒黃芩

地榆 當歸 防風 枳殼

右等分為細末米酒麩糊丸桐子大每

服五六十丸空心清米飲送下極效一亦有白梅肉

御阿膠丸百七

治腸風下血

黃連 阿膠

炒珠 赤茯苓 等分

右將連煎熟為膠用酒煮化和末取手為丸食前米湯

送三五十丸或共為末糊丸亦可

聚奎丸百七

治酒毒大腸蓄熱下血

黃芩 防風

各二兩 黃連 四兩 半生

右為末醋糊丸梧子大每服七八十丸空心米飲下

臟連丸百七

治遠年近日腸風藏毒下血

大鷹爪黃連

半斤 槐米 二兩 枳殼 二兩

防風 粉草 槐角 香附 牙皂 木香各五錢

右用陳倉米三合同香附一處為末外藥共為細末用豬大腸約長二尺洗淨裝入米附縛

定量用水二大盞沙鍋炭火煮乾即添水浸火煮爛如泥取起和藥搗丸桐子大空心米

飲下七八十丸忌麪蒜生冷煎炙之物一料病痊

扁酒蒸黃連丸百七

治一切熱瀉便血並伏暑發熱解酒毒

黃連

半斤用淨酒二升浸以丸為

為末滴水丸每服五十丸食前溫水下

黃連丸百八

治腸紅便血痔瘡腫痛

黃連 吳茱萸 右二味等分。用滾湯同澆。過罈一二日同炒揀開。各另為末。糊丸。桐子
大每服二三錢。糞前紅服。茱萸丸。糞後紅服。黃連丸。俱酒下。○此與左金丸稍同。

豬臟丸

一百八

方在外科二二二

治大便痔漏下血

保和丸

一百八

方在小兒三五

治飲食酒積停滯

四順清涼飲

三百八

方在攻陣二五

治臟腑血熱煩渴秘結

仲白頭翁湯

四百八

治熱痢下重者

白頭翁

二兩

黃連


黃柏

秦皮

各三兩

右四味以水七升煮取三升去滓溫服一升不愈

再服一升



加批 詳評 景岳全書

卷五十八

宙集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

熱陣

仲理中丸一 即名人參理中湯。○治太陰病自利不渴。陰寒腹痛。短氣欬嗽。霍亂嘔吐。飲食

難化。胸膈噎塞。或瘧疾瘴氣。瘟疫。中氣虛損。久不能愈。或中虛生痰等證。

人參 白朮 乾薑 炙甘草 各三兩 右四味。搗篩為末。蜜丸。雞子黃大。以沸湯數合。和一

丸。研碎。溫服之。日三四。夜二服。腹中未熟。益至三四丸。然不及湯。湯法以四物依數切。用水

八升。煮取三升。去滓。溫一升。日三服。○原論加減法。詳在霍亂門。述古條中。宥按右方兩數

乃漢時權度。今後世所用。惟每味數錢。而甘草半之。酌宜可也。

附子理中湯二 治證如前。而中氣虛寒。腹痛甚者。又或入房腹痛。手足厥冷。或食冷犯寒等

證。即前方加製附子一二三錢。隨宜用之。其有寒甚勢急者。不妨生用。或炮用亦可。○外

科附子理中湯。有芍藥。茯苓。無甘草。乾薑。

附子理中丸三 治陰寒腎氣動者。○即前附子理中湯去白朮。煉蜜丸服。

理中加丁香湯四 治中脫停寒。喜辛物。入口即吐。即噤。○即前理中湯加丁香十粒。甚或兼

加批

痛者可加至一二錢。○若以理中加木香即名木香理中湯。

加味理中湯五 脾肺俱虛。欬嗽不已。

人參 白朮 茯苓 炙甘草 陳皮 半夏 乾薑 細辛 北五味 各等分 右咀。每

服三錢。薑三片。棗一枚。煎七分。食遠服。

楊胡椒理中湯六 治脾胃虛寒。氣不宣通。欬喘逆氣。虛痞噎悶。腸腹滿痛。短氣不能飲食。嘔

吐痰水不止。

白朮五兩 乾薑 炙甘草 胡椒 良薑 藜蘆 陳皮 細辛 款冬花去梗 右咀。

每服五七錢。水一鍾半。煎七分。食遠溫服。○或煉蜜丸。桐子大。每服三五十九。白湯溫酒米

飲任下。無時。每日二服。

選八味理中丸七 治脾胃虛寒。飲食不化。胸膈痞悶。或嘔吐泄瀉。

人參 乾薑炒各一兩 白朮炒四兩 茯苓 炙甘草 神麴炒 砂仁炒各一兩 右為細末。

煉蜜為丸。每丸重一錢。空心服一丸。薑湯嚥下。

枳實理中丸八 治傷寒寒實結胸。

人參 白朮 茯苓 甘草 乾薑各二兩 枳實片 十六 右為細末。煉蜜丸。雞子黃大。每服一

丸。熱湯化下。連進二三服。

理中化痰丸九 治脾胃虛寒。痰涎內停。嘔吐。或大便不實。飲食難化。欬吐痰涎。此中氣虛弱。

不能統歸原也。

人參 白朮 乾薑 茯苓 各二兩 炙甘草 一兩 製半夏 三兩 薑湯煮麩糊丸 桐子大 每服

四十九或五十九丸 白湯送下。

治中湯 十 治脾胃不和 嘔逆霍亂 中滿虛痞 或泄瀉 ○此即理中湯加青皮陳皮也。

人參 白朮 乾薑 炙甘草 青皮 陳皮 等分 右每服五錢 水煎服 如嘔加半夏。

丁香溫中湯 十一 治同前 即前治中湯加丁香 去半夏。

方溫胃湯 十二 治憂思結聚 脾肺氣凝 元陽受損 大腸與胃氣不平 脹滿上衝 飲食不下 脈

虛而緊滿。

附子 厚朴 當歸 白芍藥 人參 炙甘草 陳皮 各一錢 乾薑 炮 一川椒 去合口炒

水一鍾半 薑三片 煎一鍾 食遠服。

東溫胃湯 十三 治服寒藥多致脾胃虛弱 胃脘痛。

白豆蔻 人參 澤瀉 各三錢 益智仁 厚朴 砂仁 甘草 乾薑 薑黃 各四兩 黃耆

陳皮 各七錢 右為細末 每服三錢 水一盞 煎至半盞 食錢溫服。

仲景四逆湯 十四 又名通脈四逆湯 ○治傷寒陰症 自利 裏寒外熱 脈沉身痛 而厥。

炙甘草 二兩 乾薑 炮 三兩 附子 一枚 破八片 生用 右以水三升 煮取一升二合 分二次溫服 其

脈即出者愈 ○面色赤者 加葱九莖 ○腹中痛者 去蔥 加芍藥二兩 ○嘔者 加生薑二兩 ○

咽痛者。加桔梗一兩。○利止脈不出者。加人參一兩。

仲景四逆加人參湯 十五 治傷寒惡寒脈微而復利。即於前方加人參一兩。

仲景四逆加豬膽汁湯 十六 治傷寒吐下後汗出而厥四肢拘急脈微欲絕者。即於四逆湯

內加入豬膽汁半合。

仲景茯苓四逆湯 十七 治傷寒汗下後病仍不解煩躁者。

茯苓 六兩 人參 一兩 甘草 二兩 乾薑 兩半 附子 一枚 生用 去皮切八片 右五味以水五升煮取三升

去滓溫服七合。日三服。

茱萸四逆湯 十八 治厥陰中寒小腹痛甚。

吳茱萸 湯泡 附子 泡 乾薑 各二錢 炙甘草 錢半 水一鍾半煎七分熱服

薛氏茵陳四逆湯 十九 治發黃脈沉細遲肢體逆冷腰以上自汗。

茵陳 二兩 炙甘草 一兩 乾薑 地兩 附子 一個 炮 右分四貼水煎服

仲景當歸四逆湯 二十 治傷寒手足厥寒脈細欲絕者。或下利脈大腸鳴者。虛也。及其人內有

久虛者。宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之。

當歸 桂枝 芍藥 細辛 各三兩 甘草 通草 各二兩 大棗 二十五枚 右七味以水八升煮取

三升去滓溫服一升。日三服。

四逆散 二十一 方在散陣二八 治陽邪亢熱血脈不通四肢厥逆。

附子湯 二二 治少陰病得之一二日。口中和。其背惡寒者。當灸之。附子湯主之。并治少陰

病身體痛。手足寒。骨節痛。脈沉者。

附子 二枚去皮 人參 二兩 白朮 四兩 芍藥 茯苓 各三兩 右五味以水八升。煮取三升。去滓。

溫服一升。日三服。

三附子湯 二三 治風寒濕痺。骨節疼痛。皮膚不仁。肌肉重著。四肢縱緩。

附子 生 白芍藥 桂心 甘草 白茯苓 人參 乾薑 各三兩 白朮 一兩 右以咀。每服四

錢。水煎服。

生附湯 二四 治寒溼腰痛。

附子 生用 白朮 茯苓 牛膝 厚朴 乾薑 炙甘草 各一錢 蒼朮 杜仲 黃妙 各 水二

錢。生薑三片。紅棗二枚。煎八分。食前服。

參附湯 二五 方在補陣三八。治元陽不足。喘急呃逆。嘔惡厥冷等證。

仲朮附湯 二六 方在補陣四二。治中寒中氣不足。逆冷痰厥。口噤等證。

香附湯 二七 方在補陣四四。治氣虛陽弱。虛汗倦怠。

濟水附湯 二八 方在補陣四三。治寒濕腰冷重痛。小便不利。

生桂枝附子湯 二九 治傷寒八九日。風濕相搏。身體煩疼。不能轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澀者。

桂枝 四兩 生薑 三兩 附子 三枚炮去皮 甘草 二兩 大棗 十二枚擘 右五味以水六升。煮取二升。

桂枝 去皮 生薑 切 附子 各破八片 甘草 二兩 大棗 擘 右五味以水六升。煮取二升。

去澤。分溫三服。

金匱白木附子湯 三十

治傷寒八九日風溼相搏。身體煩疼。不能轉側。不嘔不渴。脈虛浮而濡。

若大便堅。小便自利者。去桂枝。此方主之。

白朮 二兩 附子 一枚

泡甘草 兩 生薑 一兩 大棗 六枚

右五味。以水三升。煮取一升。去澤。

分溫三服。一服覺身痺。半日許再服。三服都盡。其人如冒狀。勿怪。即是附木並走皮中。逐水

氣。未得除故耳。

金匱甘草附子湯 三一

治風溼相搏。骨節煩疼。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不

利。大便反快。惡風不欲去衣。或身微腫者。此主之。

炙甘草 白朮 各二兩

附子 一枚 泡桂枝 四兩

右四味。以水六升。煮取三升。去澤。溫服一升。

日三服。初服得微汗則解。能食汗後復煩者。服五合。恐一升多者。服六七合為妙。

良薑附子湯 三二

治霍亂轉筋。手足厥冷。或吐逆身冷。脈微。急用此藥救之。○此即仲景乾薑

附子湯。

乾薑 一兩

附子 一枚 生用

右每服半兩。水煎。○外科薑附湯有人參、白朮。

生薑附子湯 三三

治嶺南瘴癘。內虛發熱。或寒熱往來。嘔痰吐逆。頭疼身痛。或汗多煩躁引

飲。或自利。小便亦兼。玉卒中風。

附子 一枚

如法 製分四服

右每服水一鍾。生薑十片。煎六分。微溫服。

乾薑附子湯 三四 治瘧毒陰證發熱或煩躁手足冷鼻共冷身體重痛舌上胎生引飲煩渴

或自利嘔吐汗出惡風

大附子一枚製 右每服加炮乾薑二錢同煎溫服熱甚者冷服

實錢羌活附子湯 三五 治呃逆

羌活 附子 乾薑 炮 茴香 各一木香 五分 水鍾半棗二枚煎服○三因方木香作丁香

仲 芍藥甘草附子湯 三六 治發汗病不解反惡寒者虛故也

芍藥 甘草 天各 附子 一枚炮去 上三味以水五升煮取一升五合去滓分溫服

治 附子八味湯 三七 治氣虛中寒腳氣等證

附子炮去 人參 乾薑 炮 芍藥 茯苓 甘草 天 桂心 各二 白朮 四兩 右每服五七錢水

一鍾半煎七分食前溫服○又方去桂心加乾熟地黃三兩

六物附子湯 三八 方在外科三五 治四氣流注太陰四肢骨節煩疼浮腫小便不利

小建中湯 三九 方在補陣二二 治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼咽乾口躁等證

局 大建中湯 四十 方在補陣二四 治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛

八味大建中湯 四一 方在補陣二五 治中氣不足厥逆嘔吐攣急陰縮腹痛虛火等證

三建湯 四二 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脈微沉大小便數滑凡中風痰涎不省人

事傷寒陰證皆可用之

大附子 大川烏

天雄各製用

右用水二鍾。薑十片。煎一鍾。不拘時。或溫服。或冷服。

自汗加桂。浮小麥。氣逆加沉香。○胃冷加丁香。胡椒。

景仲天甘草湯 四三

一名復脈湯。治傷寒脈結代。心動悸。

天甘草 四兩

生薑

桂枝去皮各

人參 阿膠各二

生地黃 一斤 麥冬去心 半斤 麻子仁 半斤

大棗十二枚

右九味。以清酒七升。水八升。先煮八味。取三升。去滓。內膠煑盡。溫服一升。日三服。

服。

景仲桂枝甘草湯 四四

治發汗過多。其人叉手自冒心。心下悸。欲得按者。

桂枝四兩 甘草 二兩

右二味。以水三升。煮取一升。去滓頓服。

陶回陽返本湯 四五

治陰盛格陽。陰極發躁。渴而面赤。欲坐泥水中。脈則無力。或脈全微。欲

絕者。服後脈微出者。生。頃出者。死。

人參

製附子 炮薑

炙甘草

五味子

麥冬

陳皮

臘茶

面戴陽者。下虛也。加

蔥七莖。黃連少許。用澄清泥漿水一鍾煎之。臨服入蜜五匙。頓冷服之。取汗為效。

華陀救脫陽方 四

治寒中三陰。口噤失音。四肢強直。掣急疼痛。似手中風。及厥逆唇青。囊縮

無脈。或卒倒屍厥。脫陽等證。先急用葱白一握。微搗碎炒熱。用布包熨臍下。以二包更替

熨之。甚者仍灸氣海關元。二三十壯。脈漸出。手足漸溫。乃可生也。次用附子一個。重一兩

者。切八片。白朮。乾薑。各五錢。本香二錢。同用水二鍾。煎一鍾。候冷灌服。須臾又進一服。或煎

服回陽等湯

仲旋覆代赭石湯 四七

治傷寒若汗或吐下解後心下痞軟噫氣不除者

旋覆花

甘草 各三兩

人參 二兩

生薑 五兩

代赭石 一兩

大棗 十二枚

半夏 半斤

右七味以水

一斗煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

仲厚朴生薑甘草半夏人參湯 四八 治發汗後腹脹滿

厚朴 去皮

生薑 切各半斤

半夏 半斤

人參 一兩

甘草 二兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

服一升日三服

簡易十味劉散 四九

治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子 三兩

當歸 黃耆 天

白芍藥 各二兩

川芎 防風

白朮 各兩

肉桂 一兩

熟地 茯苓 各

半錢

右吹咀每服五七錢水鍾半薑八片棗三枚煎八分食後臨卧服

奇效芎朮湯 五十 治寒濕頭痛眩暈痛極

川芎

附子 生去

白朮 各三錢

桂心 去皮

甘草 各一錢

水一鍾半生薑七片棗二枚煎八分食

連服

正元散 五二 治眩暈陽虛

紅豆 炒

乾薑 各三錢

人參 白朮

炙甘草 茯苓 各二兩

附子 炮去

皮 川芎

山藥 薑汁

烏藥

乾葛 各一兩

川烏 炮去

皮 肉桂 各五錢

黃耆 各二兩

陳皮 二錢

右吹咀每服三錢水一鍾薑三片棗

一枚入鹽少許。煎服。

全生薑半夏湯 五三

治胸中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心中憤懣然，無奈者。

半夏半斤生薑汁一升

右二味，以水三升，煮半夏取二升，內生薑汁，煮取一升半，少冷，分

四服，日三服，夜一服，病止停後服。

全半夏乾薑散 五四

治乾嘔，或吐逆痰涎。

半夏製乾薑等分

右二味，杵為散，取方寸匕，用漿水一升半，煎取七合，去滓，頓服之。

仲景甘草乾薑湯 五五

治少陰傷寒，小便色白，吐逆而渴，動氣因下，反虜，身雖有熱，反倦及肺

痿，吐涎沫而不效，口不渴，小便數，遺尿，肺中冷，上虛不能制下，眩暈多涎唾等證。○楊仁齋

曰：治男女諸虛出血，胃寒不能引氣歸元，無以收約其血者。○良方名薑草湯，治陰感于陽

寒而嘔血。

甘草炙乾薑炮二

右咀，以水三升，煮取一升五合，分溫再服。○仁齋曰：等分，每服三錢。

食前煎服。

橘皮乾薑湯 五六

治惡心嘔噦。

人參 乾薑 肉桂

各一錢

陳皮 通草

各錢

甘草五分

水一鍾半，煎八分服。

全橘皮湯 五七

亦名生薑橘皮湯。○治乾嘔噦，若手足厥者。

橘皮 四兩 生薑 半斤

右二味，以水七升，煮取三升，溫服一升，下咽即愈。

萬橘皮湯 五八 方在瘧疹九二 行滯消痰 止嘔吐

金橘皮竹茹湯 五九 治噦逆

橘皮二斤 竹茹二升 生薑半斤 甘草五兩 人參一兩 大棗三十枚

右六味 以水一斗 煮取三

升 溫服一升 日三服

小半夏湯 六十 方在和陣八 治嘔吐及心下有飲者

三丁香散 六一 治呃逆

丁香 柿蒂 各一 炙甘草 良薑 各五分 石為末 熱湯點服 二錢不拘時

丁香煮散 六二 治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉 各十枚 北棗 七枚 生薑 七片 黃林米 半合 水一椀半 同煮稀粥 去藥啜粥

簡易丁香散 六三 治反胃嘔逆 粥食不下

大附子 一枚 坐于磚石上 四面着大新紙 通熱 煨入生薑汁中 浸少時 如法再煨 約盡薑汁 半椀許 為度 去皮焙乾 為末 丁香 二錢 二味勻和 每

服二錢 水一鐘 粟米同煎七分服

楊丁香茯苓湯 六四 治脾胃虛寒 宿食留滯 否塞 痰痛 氣不升降 以致嘔吐 涎沫 或嘔酸水

不思飲食

半夏 製 橘紅 茯苓 各一兩 丁香 製 附子 肉桂 砂仁 各五錢 乾薑 炮 木香 各一兩 每服四

錢 水一鐘半 薑七片 棗一枚 煎七分服

良方丁香柿蒂散_{六五} 治吐利或病後胃中虛寒呃逆凡呃逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 炙甘草 良薑_{各五分} 人參 半夏 陳皮 茯苓_{各一錢} 薑二錢 水二鍾煎服

寶丁香柿蒂散_{六六} 治呃逆嘔吐

丁香 柿蒂 青皮 陳皮_{各等分} 水一鍾半薑五片煎服

嚴柿蒂湯_{六七} 治胸滿呃逆不止

柿蒂 丁香_{各二錢} 加生薑五片水煎服○家珍方有人參一味

百安脾散_{六八} 治胃氣先逆飲食過傷憂思蓄怒宿食癖積冷飲寒痰動擾脾胃不能消磨

致成斯疾女人由血氣虛損男子皆由下元虛憊有食罷即吐有朝食暮吐有暮食朝吐所

吐酸黃臭水皆是脾敗惟當速治遲則發煩渴大便秘水飲不得入口而危矣

南木香_{唐汁} 橘紅 人參 白木 草果_{麩煨} 茯苓 炙甘草 丁香 胡椒_{各兩} 高良薑

_{一兩用陳壁土三合以水二碗同煮乾切片} 右咀每服五錢水一鍾半入鹽少許煎七分食遠溫服或為細末

每服五錢用鹽米湯調下

三補脾湯_{六九} 治脾胃虛寒泄瀉腹滿氣逆嘔吐飲食不消

人參 白木 茯苓 厚朴_炒 陳皮_{各一錢} 乾薑_炒 炙甘草 草果 麥芽_炒 各八分 水一鍾半

煎七分空心溫服

三
胃養胃湯七十

治脾胃虛寒嘔逆惡心腹脹脹疼腸鳴泄瀉

蒼香

厚朴炒半夏

茯苓冬錢半

草果

陳皮

人參

白木炒

附子各錢一分

甘草冬錢一分

甘草冬錢一分

甘草冬錢一分

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食遠服

胃愛散七

治脾胃久虛中焦氣滯或冷涎上壅嘔吐惡心或胸膈疼痛不思飲食或泄瀉

不止

人參一兩

白木

茯苓

黃耆冬錢各三錢

丁香

甘草冬錢各二錢

肉果冬錢各三個

乾薑冬錢各二錢

右用白木炒

熟四兩同研為末每服二三錢用薑湯或人參湯調服或為吹咀每藥五七錢加炒末一

兩煎服亦可

煉養香胃散七二 治脾胃虛弱不能進食嘔吐吞酸腹痛不能腐熟

養香

人參

陳皮冬錢各一丁香五分

生薑冬錢各十片

水一鍾半煎七分食遠服

方七味人參丸七三

治胃冷兼虛嘔逆不食服許則仁半夏丸不效可服此藥方見和陳

一三二

人參

白木炒各五兩

厚朴炒各五兩

北細辛各四兩

生薑

橘皮各三兩

桂心二兩

右為末煉蜜丸桐

子大每服米飲下十九丸漸加至二十九丸

甘露湯七四

治反胃嘔吐不止飲食減少常服之快利胸膈調養脾胃進飲食○徐東舉曰

常州一富人病反胃往京口甘露寺設水陸泊舟岸下夢一僧持湯一碗與之飲罷猶記其

加批景岳金書

卷五十八

上海廣益書局印行

香味。使覺胸膈少快。早入寺。知客供湯。乃是夢中所飲者。胸膈尤快。遂求其方。合數十服。後疾遂瘳。名曰觀音應夢散。予得之。常以侍賓。易名曰甘露湯。又在臨汀療一人。愈。其勿忽之。乾餹糟頭作者生薑用四分。右和白搗爛作餅焙或曬乾。每十兩。入炙甘草二兩。同研為末。每服二錢。用沸湯入鹽少許調。不拘時服。

茯苓澤瀉湯七五

治反胃吐而渴欲飲水者。外臺治消渴脈絕反胃者。

茯苓

半斤

澤瀉

生薑各四分

甘草

桂枝各二兩

白朮三兩

右五味以水一斗煮取三升。內

澤瀉再煮取二升半。溫服八合。日三服。

茯苓甘草湯七六

治水飲停蓄心下。甚者作悸作利。

茯苓

桂枝

各二兩

甘草炙

生薑三兩

右四味以水四升。煮取二升。去滓。分溫三服。

草豆蔻湯七七

和中調氣。治嘔吐。

草豆蔻

藿香各五分

陳皮

枳殼各七分

白朮

山藥各一錢

桂心

丁香各二

水一鍾半。薑

五片。棗二枚。粟米少許。煎七分。食前溫服。

大順散七八

治胃暑伏熱。引飲過多。以致寒濕傷脾。陰陽氣逆。霍亂吐瀉。藏府不調等證。

乾薑

肉桂

杏仁各四兩

甘草三兩

右先將甘草微炒黃。次入乾薑同炒。令薑裂。又入杏

仁同炒。令杏仁不作聲為度。卻同肉桂研羅一處。每用二三錢。以水一鍾。煎數滾。溫服。如

煩躁者。以井花水調服。亦不拘時。此方加附子。即名附子大順散。

四順附子湯七九

治霍亂轉筋吐瀉手足逆冷六脈沉絕氣少不語身冷汗出

附子生白乾薑炮

人參甘草各一兩

右咬咀每服四五錢水鍾半煎七分食遠服

林附子粳米湯八十

治霍亂四逆多嘔少吐者

中附子一枚半夏兩半

乾薑炒甘草一兩大棗十枚粳米五合

右咬咀每服八錢水鍾半

煎米熟去滓服

冷香飲子八一

治傷暑喝霍亂腹痛煩躁脈沉微或伏

附子炮陳皮各一錢

草果甘草各一錢

水一鍾半薑十片煎八分并水頓冷服

集冷香湯八一

治夏秋水濕恣食生冷陰陽相干遂成霍亂腹臍刺痛脇肋脹滿煩躁引飲

無度或感痺虛熱胸膈不利或嘔或泄並宜

良薑白檀香草豆蔻炮

製附子炙甘草各一錢丁香七粒

水一鍾半煎七分用并

水浸冷於嘔吐時服之效或為細末水調生麴糊丸如芡實大每服一丸新汲水磨下亦可

指木瓜湯八三

治吐瀉不已轉筋擾亂

木瓜一兩

茴香微炒二錢

吳茱萸湯炮炙甘草二錢

右咬咀分二服加薑五片紫蘇十葉空

腹急煎服之○良方有生薑二錢五分無茴香甘草名木瓜煎

三訶子散八四

治老幼霍亂一服即效

訶子炮去核

炙甘草厚朴薑製

乾薑炮神麴炒良薑炒茯苓麥芽炒陳皮草豆蔻等分

右為細末。每服二錢。當病發不可忍時。用水煎入鹽少許服之。

霍亂三方八五

治霍亂瀉利不止。轉筋入腹欲死者。用生薑三兩搗爛。入酒一升。煮三四

沸頓服。○一方。凡霍亂吐瀉不能服藥。急用胡椒四十粒以飲吞之。

千金霍亂方八六

治霍亂乾嘔不止。以薤葉煎一升。服三次立愈。

乾霍亂二方八七

凡欲吐不吐。欲下不下。嘔惡不止者。謂之乾霍亂。○一方。用鹽一兩。生薑

半兩。搗同炒令色變。以水一椀煎熱服。○一方。用丁香十四粒為末。以熱湯一盞調服。

金匱芩桂木甘湯八八

治心下有痰飲。胸脇反滿。目眩。

茯苓四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草二兩

右用水六升。煮取三升。分三服。小便即利。

薑木湯八九

治心下停飲怔忡。

白薑 白朮

半夏各一錢 官桂三分 甘草五分 水一鍾半。棗三枚煎服。

韓氏溫中湯九十

凡病人兩手脈沉遲或緊。是皆胃中寒也。若寸脈短小。及力小於關尺者。

此陰盛陽虛也。或胸膈滿悶。腹中脹滿。身體拘急。手足厥冷。急宜溫之。

丁香 丁香各五分 厚朴 乾薑 陳皮 白朮各一錢 水鍾半。加葱白。荊芥穗同煎。

厚朴溫中湯九一

治脾胃寒滯。心腹脹滿。或見疼痛。

厚朴薑炒 橘紅 乾薑各一錢 茯苓 草豆蔻 木香 甘草各五分 木煎溫服。

大正氣散九二

方在和陣二四。治風寒濕氣傷脾。心腹脹悶。有妨飲食。

強中湯九三

治生冷寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參

橘紅

青皮

丁香

白木

附子

草豆蔻

乾薑

厚朴

甘草

錢

錢

各五

水鍾半

薑三片

紅棗二枚

煎七分

不拘時服

嘔加半夏

若傷麩食加萊菔子

錢

三強中丸九日

治胃脘虛寒痰飲留滯痞塞不通氣不升降。局方溫中化痰。凡即此亦不用半夏。

用半夏

高良薑

乾薑

陳皮

青皮

各一兩

半夏

二兩

右為細末

生薑汁煮糊

丸桐子大

每服二

三十丸薑湯下

三生飲九五

此治中風乃行經治痰之劑。斬關奪門之將。必用人參驅駕其根。而補助真氣乃可用之。否則恐反為害。

生南星

一兩

生川烏

半兩

生附子

半兩

木香

二錢

每用一兩

加人參

一兩

同煎服

嚴氏三生丸九六

治痰厥頭痛

南星

半夏

白附子

等分

右為末

薑汁浸蒸餅丸

小豆大

每服四十丸

食後薑湯下

五生丸九七

治風癱

川烏頭

附子

各生用

南星

半夏

乾薑

生各

右為細末

醋煮大豆汁作糊

和丸

每服五丸

冷酒送下不拘時

子大每服五丸

冷酒送下不拘時

芎溫中化痰丸九九 治停痰留飲。

陳皮 青皮 良薑 乾薑等分 右為細丸。醋煮糊丸。桐子大。每服三十丸。空心米飲送下。

芎溫胃化痰丸九九 治膈內有寒。脾胃傷飲。胸膈不快。痰涎不已。

半夏製三兩 白朮 陳皮 乾薑各兩 右為末。薑汁糊丸。桐子大。薑湯下。二十九。

芎倍朮丸一百 治五飲吞酸等證。○一曰留飲。停水在皮下。○二曰澀飲。水在兩脇。○三曰痰飲。水在胃中。○四曰溫飲。水溢在膈。○五曰流飲。水在脇間。漉漉有聲。皆由飲水過多。或飲水所致。

白朮炒二兩 桂心 乾薑炒各兩 右為末。蜜丸。每服二十九。溫米飲下。加至三五十丸。食前服。

發明丁香半夏丸百一 治心下停飲冷痰。

丁香 半夏製各兩 人參 乾薑炒 細辛各五錢 檳榔三錢 右為細末。薑汁糊丸。桐子大。每服三十丸。薑湯下。

方局丁香五套丸百一 治胃氣虛弱。三焦痞塞。不能宣行水穀。故痰飲積聚。嘔吐惡心。脹滿不食。

丁香 木香 青皮 橘紅各半兩 白朮 茯苓 良薑 乾薑各一兩 南星製各二兩 半夏製各二兩

右為末。湯浸蒸餅丸。桐子大。每服七十九。溫湯下。

三復元丹百三 治脾腎虛寒。發為水腫。四肢虛浮。心腹堅脹。小便不通。兩目下腫。

附子炮二兩 南木香炒 茴香炒 川椒炒 厚朴製 獨活 白朮炒 橘紅 吳茱萸炒 桂心各一兩

澤瀉一兩 肉豆蔻煨 檳榔各半 右為末。糊丸。桐子大。每服五十九丸。紫蘇湯不拘時送下。

蘇加減金匱腎氣丸百四 方在補陣一二六。治脾腎陽虛。不能制水。為腫。為脹。

生實脾散百五 治陰水發腫。宜先實脾土。

附子製 乾薑炮 厚朴 木香 大腹皮 草果仁 木瓜各錢 甘草分五 水二鍾。薑五片。

棗一枚。煎七分。不拘時服。

嚴實脾散百六 即前方加白朮茯苓。

簡腹脹方百七 凡肚腹脹滿。不能用藥者。以獨蒜煨熟。去皮綿裹。納下部中。冷即易之。○又

治關格脹滿。大小便不通。亦用上法。氣立通。○又方。用生薑如指大一塊。煨熟。以綿裹。乘熱

納下部中。冷即易之。

丁香止痛散百八 治心痛不可忍。

丁香半兩 良薑二兩 茴香炒 甘草各兩 右為細末。每服二錢。不拘時。溫湯點服。

勝金散百九 治卒心痛。

桂枝 玄胡索炒 五靈脂 當歸各半 右為末。煉蜜丸。桐子大。每服二十丸。食前陳皮湯下。

良鐵刷散百十 治心脾積痛。婦人血氣刺痛。酒病惡心。腸滑泄瀉。

良薑炒 二 茴香炒 七 蒼朮製 甘草各二 右為末。每服二錢。空心薑鹽湯調下。

局端葱散百十 治男婦脾胃虛冷。滯氣不行。攻刺心腹。痛連胸膈。膀胱小腸寒疝。氣疝。及婦

加批 上海廣益書局印行

人血氣滯痛。

蒼木

未切甘草各八錢

三稜

煨蓬木煨茯苓

青皮

各六錢

丁皮

砂仁

去殼

檳榔

各四錢

延胡

索三錢

乾薑炒肉桂各二錢

右每服五錢

水一盞入連根葱白一莖煎七分

空心熱服

或為

末

用葱湯調服二三錢

實沉香桂附丸

二百十

治中氣虛寒飲食不美陰盛陽虛藏府積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中

雷鳴利便無度面色不澤手足厥冷及下焦陽虛疝氣疼痛不可忍腰屈不能伸喜熱耐稍

緩等證

附子

炮去川烏製同

沉香

肉桂

乾薑炮

良薑炮

茴香炒

吳茱萸

炮各

右為末

醋煮麩

糊丸

桐子大每服五七十丸食前未飲下日二服忌生冷

椒附丸

三百十

治小腸虛冷小腹脹小便頻而清白

椒紅

炒附子炮龍骨秦蠅蛭炙山茱萸鹿茸

酒蒸焙各等分

右為末酒糊丸桐子大每服六

十九空心鹽湯下

大沉香丸

四百十

治寒氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴心痛

沉香

乾薑炮

薑黃

桂心

檀香

各二兩

甘松

洗焙

白芷

天台烏藥

甘草

各半斤

香附

一斤

白豆蔻

三兩

右為末煉蜜和丸彈子大每服一丸細嚼生薑湯下不拘時

擬桂附二陳湯

百十

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

桂附

二陳湯

百十

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

擬桂附

二陳湯

百十

治寒瘧寒多熱少腰足厥冷

附子 炮肉桂 半夏 白茯苓 陳皮 炙甘草 石叻咀 每服五六錢 水一鍾半 薑三片

棗一枚煎服

扶陽助胃湯 百十

羅謙甫治崔運使長男雲卿年二十五體肥養厚常食涼物寒藥以致秋

間癰發復用水吞砒石等藥復增吐瀉中氣愈虛延至次年四月復因勞怒前證大作診其脈得細而微手足稍冷面色青黃食少痞悶嘔酸氣促汗出予思內經云中氣不足溲便為之變腸為之苦鳴下氣不足則為痿厥心忪又曰陽氣客於腸胃之間則卒然而痛非大熱之劑不能愈遂制此方

附子 炮去皮乾薑炮錢

草豆蔻 益智仁 揀參 炙甘草 官桂 白芍藥 錢各一 吳茱萸

陳皮 白木 各五

右叻咀 水二盞 棗二枚 薑三片 煎八分 食前溫服 三服後大勢去痛

減半 至秋灸中脘以助胃氣 次灸氣海百餘壯 生發元氣 明年復灸三里二七壯 亦助胃氣 引氣下行 仍慎加調攝 一年而平復

五味沉附湯 百十 治虛寒無陽 胃弱乾嘔

熟附子 乾薑 炮各一錢 白朮 炙甘草 各錢半 沉香 五分

二味沉附湯 百十

治瘴疾上熱下寒 腿足寒厥

水盞半 薑五片 煎七分 食前服

沉香 磨汁 附子 製各三錢

水一鍾半 生薑三片 煎八分 去渣 入沉香汁 放冷服 此藥主上熱下

寒 ○全集云 沉水真正鐵角沉香 其味甘辛者為美 辛辣者性熱 附子降氣飲陽 治陰毒冷

瘡。只一服而回生起死。真可以奪造化。

濟生七棗湯百十

治瘡癰。或因感冒風寒。或是五藏氣虛。陰陽相搏。寒多熱少。或但寒不熱。皆

可服。

大附子一枚製

○又方。用川烏代附子。以水調陳壁土為糊。浸泡七次。○水二鍾。薑七片。棗

七枚。煎一鍾。當發日早晨。空心溫服。仍吃棗子三五枚。忌如常。

冷湯百二

治瘧毒內寒外熱。咽嗑間煩躁不解。

人參半兩

大附子一錢 甘草炙三寸 淡竹葉十四片

大棗五枚 水煎溫服。或冷服。○甚者宜倍

用人參附子。不可拘此常數。

生薑煎百二

治瘧如瘧。憎寒壯熱。

老生薑一大塊

打破。右用水一鍾。煎半鍾。熱服。取微汗。

芎附散百二

治五種痛痺。自腿臂間發作不定者。

小川芎

附子皮去 黃耆 防風 白朮 當歸酒洗 熟地 桂心 甘草 柴胡等分

水一鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。空心服。

芎參附滲濕湯百二

治坐卧溼地。雨露所襲。身重脚弱。關節疼痛。發熱惡寒。小便不利。大便

溇泄。

人參 白朮 茯苓 甘草 附子製 乾薑炮 桂枝 芍藥等分 水二鍾。薑三片。棗一枚。

煎八分。不拘時服。

七味溲溼湯百二 方在和陣一七四 治寒濕所傷。身體重。小便赤澀。大便溼泄。

腎背散百二 治胸脾心背疼痛氣悶。

烏頭細辛 附子 羌活 川椒 桂心各一兩 川芎二錢 右為末。以少醋拌勻。或炒熟。

或用帛裹。微火炙令煖。以熨背上。取瘻乃止。忌生冷如常服。○按此方當用氣。惟諸辛香者。

佳。附子似不必用。

溫中法麴丸百二 治脾痺發欬嘔汁。

法麴炒 枳實炒 白茯苓 吳茱萸湯浸 桂心 厚朴薑製 當歸 甘草炙 人參 麥冬

乾薑 細辛 附子炮 桔梗炒 麥芽微炒 右為細末。煉蜜丸。桐子大。每服七十九。食

前熱水下。日三服。

游龍虎丹百二 治走注疼痛。或麻木不仁。或半身疼痛。

單烏 蒼朮 白芷各一兩 右為末。水拌發熱過。再入乳香二錢。當歸牛膝各半兩。酒糊丸。

彈子大。酒化下。

活絡丹百二 方在和陣二七七。治中風手足不仁。久不愈。經絡中有濕痰。死血者。

濟生二至丸百二 治老人虛弱。腎氣虛損。腰痛不可屈伸。

附子炮 桂心 杜仲 製補骨脂炒 鹿角霜 鹿角 鈔鹿茸 酒炙 青鹽另研各半兩 右為末。

酒煮糊丸桐子大每服七十丸空心用胡桃肉細嚼鹽湯或鹽酒送下。如畏熱藥者去附子加肉蓯蓉。

三腎著湯

百三

治腎虛身重腰冷。如在水中不渴。小便自利。食飲如故。腰下重痛。如帶五千錢。

茯苓

白朮

各四兩

炙甘草 乾薑

各二兩

右改咀。每服四錢。水煎。空心冷服。○一方用薑四兩。白朮二兩。

良方

每服有杏仁五分。治妊娠腳腫。

茵陳附子湯

百三

治發黃。服四逆湯身冷汗不止者。

附子

二個

乾薑

各二兩

右用水煎。分作三服。

小茵陳湯

百三

治發黃脈沉細。四肢及遍身冷。

附子

一個

炙甘草

各一兩

茵陳二兩。右用水二升。分作三服。

茵陳橘皮湯

百三

治身黃脈沉細數。熱而手足寒。喘嘔煩躁不渴者。

茵陳

橘皮

生薑

各一兩

白朮二錢

半夏

茯苓

各五錢

右用水四升。煮取二升。放溫分四服。

五高散

百三

方在和陣一五六。

治五高五噎。

十高散

百三

方在和陣一五八。

治十般高氣。

五高散

百三

方在和陣一五九。

治諸氣結聚。胸膈痞悶。痰逆惡心。飲食不進。

良方

白朮

聖散子

百三

治一切瀉痢久不瘥。并婦人產後痢疾。

白朮

砂仁

當歸

肉豆蔻

乾薑

陳皮

炙甘草

石榴皮

訶子

芍藥

炒等

分

分

分

分

分

分

右以咀。每服五錢水一鍾半。入乳香一豆。大煎八分。食前服。

仲吳茱萸湯百三 嘔而胸滿。乾嘔吐涎沫。頭痛。及食穀欲嘔者。此方主之。

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩 大棗十枚 右四味以水五升。煮取三升。溫服七合。日三服。

良方吳茱萸湯百三 治冒暑伏熱。腹痛瀉痢。或飲食過度。霍亂吐瀉。或食冷冒寒。或忍飢大怒。

或因車舟傷動。胃氣令人吐瀉。並作轉筋逆冷等證。遲則不效。

吳茱萸 木瓜 食鹽各半 右同炒令焦。先用磁瓶盛水三升。煮百沸。入藥煎至二升。已

下傾一盞。或冷或熱。隨病人之便服之。○若卒無前藥。用鹽一撮。酸醋一盞。同煎八分。溫服。

或鹽梅。鹹酸等物皆可用。

吳茱萸散百四 治腸痺寒濕內聚。腹痛滿。氣急。大便飧泄。

炮乾薑 炙甘草 吳茱萸 肉豆蔻剉裏 砂仁 神麴炒各一錢 白朮 厚朴薑製 陳皮各二

一方有良薑。○右為末。每服二錢。空心米飲調下。

海藏吳茱萸丸百四 治下痢藏府不調。脹滿腹痛。水穀不化。怠惰嗜卧。時時下痢。乃陰濕證也。

吳茱萸兩半 湯神麴炒五兩 白朮炒四兩 肉桂 乾薑炮各二兩半 川椒去目炒 右為末。糊丸。桐子

大米飲下三五十九丸。食前服。

楊八味湯百四 治脾胃虛寒。氣滯不行。心腹刺痛。藏府虛滑。

人參 當歸 炮薑 吳茱萸湯洗 肉桂 丁香 木香 陳皮各一錢 右咬咀。水一鍾半煎七分。溫服無時。○按此方味太剛烈。當加炙甘草方效。

仲景真武湯 治少陰傷寒腹痛。小便不利。四肢沉重疼痛。自下利者。此為有水氣。其人或欬。或下利。或下利。或嘔者。

茯苓 芍藥 生薑各三兩 白朮二兩 附子一枚。炮去皮。七八斤 右五味。以水八升。煮取三升。去滓。溫服七合。日三服。○若欬者。加五味子半升。細辛乾薑各一兩。○小便利者。去茯苓。○下利者。

去芍藥。加乾薑二兩。○嘔者。去附子。加生薑。足前成半斤。
良方九寶丹百四 調理脾胃。止泄瀉。

人參 白朮炒 茯苓 炙甘草 乾薑炮 木香 藿香去土 訶子去核 肉豆蔻炮炒各一錢
水一鍾半。加薑煎。食遠服。

濟生四桂散百四 治本元氣虛。真陽耗散。膈腹冷痛。泄瀉不止。
人參 附子炮 白茯苓 木香各一兩 右咬咀。每服五錢。水一鍾半。煨薑五片。鹽少許。食遠煎服。○滑泄不止。加肉豆蔻訶子。名六桂散。○活人有白朮。無訶子。

仲景白通湯百四 治少陰下利。
葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚。生用。去皮。破。八片 右三味。以水三升。煮取一升。去滓。分溫再服。○白

通加豬胆汁湯。即於前方。和人尿五合。豬胆汁一合。治少陰下利。無脈。乾嘔。而煩者。服湯後。

脾暴出者死。微續者生。

神桃花湯百四 治少陰傷寒下利。便膿血。

赤石脂一斤 乾薑一斤 粳米一升 右三味。以水七升。煮米令熟。去滓。溫服七合。內所

篩赤石脂細末方寸匕。攪勻服之。日三服。若一服愈。餘勿服。

諱漿水飲百四 治暴瀉如木。周身汗出。一身盡冷。脈微而弱。氣少不能語者。甚者嘔吐。即為

急證。

半夏一斤 附子一枚 炮薑 肉桂 甘草各五錢 良薑二錢 右為末。每服三錢。漿水一鍾。煎

至半鍾。熱服。

附子湯百四 治氣虛積冷。心腹絞痛。泄瀉食不化。

人參 白朮 茯苓 炙甘草各七錢 附子一枚 炮薑各五錢 茴香 肉豆蔻各四分 木香三分 丁香

五粒 水一鍾。煎七分。食遠服。

五苓散百五 治腎泄在清晨。及五更作瀉。飲食不進。不時去後。

茯苓一斤 白朮一斤 芍藥一斤 桂枝一斤 澤瀉一斤 右為末。每服二錢。白湯調下。為丸尤妙。

木二種九百五 治脾胃虛寒。不思飲食。泄瀉不止。

肉豆蔻二兩 破故紙炒四兩 右為末。用大肥棗四十九枚。入生薑四片。兩同煮。以棗爛為度。

去棗。取棗肉。藥搗為丸。桐子大。每服五六十丸。白湯下。

加批... 上海...

四神丸 百五 治脾胃虛寒大便不實飲食不思及泄利腹痛等證

破故紙 炒四兩 肉豆蔻 麩炒五兩 各二兩 吳茱萸 湯浸炒 右為末用太棗百枚同薑八兩煮

爛取肉搗為丸桐子大每服七八十九空心食前白湯下○按此丸不宜用麩但以薑汁煮

麩糊為丸更佳開胃用大棗以益脾胃則飲食進而泄瀉止補腎而

四神丸 百五 治津腎泄清展瀉瀉

破故紙 炒四兩 肉豆蔻 二兩 木香 半兩 小茴香 炒一兩 右為末薑棗棗肉為丸桐子大白湯送下

林四神丸 百五 治寒疝脹痛不已

華澄茄 本香 各半 吳茱萸 半兩 湯浸香附 各一兩 右為末糊丸桐子大每服七八十九空心

鹽湯或乳香葱湯任下

集要四神丸 百五 方在補陣百六書 治小便頻數不禁

五味子 丸百五 治下元虛寒火不生土以致命門不暖關門不閉名曰腎泄亦名脾腎泄

人參 白朮 炒北五味子 炒破故紙 炒各三兩 山藥 炒白茯苓 各兩 吳茱萸 湯泡川巴戟 去心炒

肉果 麩炒各一兩 龍骨 右為末酒糊丸桐子大每服百餘丸食前白湯或米湯任下

得藥撥丸 百五 治腎泄中寒者宜之

華椒 川薑 此丁香 不見附子 此去皮 良薑 胡椒 吳茱萸 湯浸炒 山茱萸 草豆蔻 去皮

兩 煮棗肉丸桐子大每服五六十九食前陳米飲下日三服

扁肉豆蔻丸百五 治脾胃虛弱脹滿水穀不消臍膈滑泄

肉豆蔻新製 蒼朮製 乾薑炮 厚朴製 陳皮各四兩 炙甘草 茴香炒 肉桂 川烏炮去 訶子肉

各二 右用湯浸蒸餅為丸梧子大每服七八十丸食前白滾湯下

陳肉豆蔻丸百五 方在小兒五六 治腸滑瀉痢

訶黎勒丸百六 治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶黎勒炮 附子炮 肉豆蔻炮 木香 吳茱萸湯泡 龍骨生用 白茯苓去皮 藜蘆各等分

右為細末生薑汁煮麩糊為丸梧子大每服七十丸空心薑湯下

良精神丸百六 治寒中洞泄實滯脹滿等證

厚朴炒 乾薑炒 右水拌炒為末水糊丸桐子大每服五十丸米飲下

縮脾丸百六 治滑泄不禁

白朮炒 厚朴薑炒 赤石脂 肉豆蔻新製 乾薑炒 附子製 藜蘆 神麩炒 右為細末

醋糊丸桐子大每服五七十丸空心米飲下

三桂香丸百六 治藏府虛寒為風寒所搏冷滑注下不禁危篤者累效

附子 肉豆蔻炮 白茯苓各一兩 桂心 乾薑炒 木香各半兩 丁香二錢

子大空心米飲下五七十丸 右為末麩糊丸桐

陳麩丸百六 磨積止瀉舟治腹中冷痛

上海廣益書局印行

陳麴一兩 人參 白朮炒 當歸炒 乾薑 肉桂 炙甘草 厚朴製各半兩 右為末 煉蜜丸 桐

子大 每服三五丸 溫酒或淡醋湯任下 日二服

楊草解分清飲百六 治真元不足 下焦虛寒 或服寒涼劑 藥過多 小便白濁 頻數 無度 澄如

膏糊等證

益智仁 川草解 石菖蒲 烏藥各等分 右以咀 每服五六錢 水一鍾 入鹽一捻 煎七分

食前溫服 一方加茯苓 甘草

益智湯百六 治腎經虧損 遺精白濁 四肢煩倦 持發蒸熱等證

鹿茸酥炙 巴戟肉 枸杞子 熟地黃 菝蓉酒浸 牛膝酒浸 附子地皮去桂心不見火 山茱萸

白芍藥 炙甘草 防風各等分 右每服三錢 水一盞 薑五分 鹽少許 同煎 空心服

局安腎丸百六 治腎經積冷 下元衰憊 目暗耳鳴 四肢無力 夜夢遺精 小便頻數 臍腹撮痛

食少體瘦 神困健忘 常服壯元陽 益腎水

肉桂去粗皮 川烏北去皮臍 白朮 山藥 茯苓 肉菝蓉酒浸 巴戟去心 破故紙炒 萆薢

桃仁剉炒 石斛炙 白茯苓炒去刺 右為末 煉蜜丸 桐子大 每服三五丸 溫酒或鹽湯

下 空心食前服 〇 疝氣 茴香湯下 〇 三因安腎丸 無茯苓 肉桂 二味

小安腎丸百六 治腎氣虛乏 下元冷憊 夜多漩瀉 體瘦神倦 腰脇沉重 泄瀉腸鳴 眼目昏暗

牙齒蛀痛

川棟子一斤用香附子川烏各一斤加鹽四兩水四小苗十一熟地八兩川椒四兩去爛

出右為末酒糊丸桐子大每服二三十丸空心臨臥鹽湯或酒任下。

蜀石刻安腎丸百六 此方不宜妄用 治真氣虛憊脚膝軟弱夜夢遺精小便滑數

附子製肉桂川烏製川椒去目微出汗 免絲製巴戟製破故紙酒炒 赤石脂煨遠志製 茯神

茯苓酒浸 蒼朮浸炒 山茱萸 杜仲製 石斛製 胡蘆巴炒 柏子仁 菴子微炒 小苗酒炒 肉苁蓉

每服七十八丸空心鹽湯或白湯下。

戒小己寒丸百七 一名強中丸 治脾胃積冷中寒洞泄倦怠不思飲食進食止自汗厚腸胃

○見肘後甚驗

艾葉四兩 蒼朮一兩 吳茱萸炒 陳皮炒 各二兩 右用米醋二升浸一宿濾出曝乾再于原醋內

拌勻炒令紫色焙乾為末稀糊丸桐子大每服三五十丸空心食前溫酒鹽湯米湯白湯任下

局大己寒丸百七 治藏府虛寒心腹疝痛腸鳴泄瀉自利自汗米穀不化手足厥冷陰盛陽

衰等證

菓撥 肉桂各四兩 乾薑炮 良薑各六兩 水煮麩糊為丸桐子大每服二三十丸食前米飲下

戒大己寒丸百七 治諸沉寒冷秘等證

吳茱萸 官桂 乾薑 良薑 烏頭 附子 右為末醋糊丸桐子大每服三五十丸米

飲下

飲下

飲下

飲下

飲下。空心食前。日二服。無所忌。

辨已寒丸百七 此丸不僭上而陽生於下。○治陰證。服四逆輩。胸中發躁而渴者。或數日大

便秘。小便赤澀。服此丸。上不躁。大小便自利。

肉桂 附子炮 烏頭炮 良薑 乾薑 芍藥 茴香各等 右為末。未糊丸。桐子大。空心溫水

下五七十丸。或八九十九丸。食前亦可。酒醋糊丸亦可。○海藏云。已寒上五味雖熱。以芍藥面

香潤劑。引而下之。陰得陽而化。故大小便自通。開州如此燥熱。一味芍藥。豈能潤之。如得春和之陽。冰自消矣。

十補丸百七 治腎藏虛冷。面黑足寒。耳聾膝軟。小便不利等證。

附子炮 五味各二 山藥 山茱萸 丹皮 桂心 鹿茸製 茯苓 澤瀉各一 煉蜜丸。桐

子大。每服六七十丸。鹽湯下。

選百十補丸百七 治小腸寒疝。

附子一枚 大胡蘆巴 木香 巴戟天 川棟肉 玄胡索 官桂 萹澄茄 大茴香

破故紙炒 各一兩 右為末。酒煮糯米粉糊為丸。桐子大。硃砂為衣。空心酒下五十丸。

成神應散百七 治寒疝諸症。心腹痛不可忍。散氣開鬱。

玄胡索 胡椒 小茴香等分 右為末。每服二錢。酒調下。

全當歸生薑羊肉湯百七 治寒疝腹中痛。及脇痛裏急者。

當歸三兩 生薑五兩 羊肉一斤 右二味。以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。

加生薑成一斤。痛多而嘔者加橘皮二兩。白朮一兩。如加生薑亦須加水五升。煮取三升二合服之。

丹腎氣丸百七 治諸疝痛

小茴香炒 破故紙炒 吳茱萸鹽炒各五錢 胡蘆巴七錢 木香三錢 右為末。蘿蔔汁丸。桐子大。鹽湯下五七十九。

百選胡蘆巴丸百七

治小腸氣。蟠腸氣。奔豚疝氣。偏墜陰腫。小腹有形如卵。上下來去。痛不可忍。或絞結。透臍攻刺。嘔吐者。

胡蘆巴斤炒一 大巴戟炒 川烏炮去皮 川棟子炒 茴香二十 吳茱萸湯浸七次 右為末。酒糊丸。桐子大。每服十五丸。至二十九丸。空心溫酒下。

東垣丁香棟實丸百八 治寒疝氣血留滯

當歸酒洗 附子炮 川棟肉 茴香各一兩以上 以吸咀用好酒三升同沒藥 丁香 木香各分全蝎 玄胡索五錢 右俱為末。拌勻。酒糊丸。桐子大。每服三五十九。加至百丸。空心溫酒送下。

苦棟丸百八 治奔豚小腹痛神效

川苦棟子 茴香各二 附子一兩 右三味。用酒二升。同煮盡為度。焙乾為末。每藥末一兩。玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

兩入 玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

兩入 玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

兩入 玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

兩入 玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

兩入 玄胡索三錢 全蝎一錢 全蝎十八 丁香十八 俱為末和勻。酒糊丸。桐子大。溫酒下五十九。

空心下。○如痛甚。煎當歸酒下。

根三層茴香丸百八

治腎與膀胱俱虛。邪氣搏結不散。遂成寒疝。臍腹疼痛。陰丸偏大。層囊

墜腫。有妨行步。或癢痒不止。時出黃水。浸成瘡瘍。或長怪肉。或外腎腫脹。冷硬如石。日以漸

大。須溫導陽氣。漸退寒邪。補虛消疝。緩養腎經。凡一應小腸氣寒疝之疾。久新不過三料。

第一料

舶上茴香

用鹽半兩。同炒焦黃。和鹽

川棟子此去核

沙參洗木香各一兩

右為細末。米糊丸。桐子

大。每服二三十丸。

空心溫酒。或鹽湯。日三服。小病一料可安。病深者一料纔盡。便可用第二料。

第二料

如前方加萹撥一兩。檳榔五錢。右六味共重五兩半。依前糊丸。服如前。若未愈。再

服第三料。

第三料

如前方加白茯苓

使者四兩。附子此去皮。臍或五錢。或一兩

右八味共重十兩。丸服如前。漸加至四

五十九丸。

凡小腸氣頻發。及三十年者。或大如栲栳者。皆可消散。神效。

奪命丹百八

治遠年近日小腸氣。偏墜。搐痛。臍下脹痛。以致悶亂。及外腎脹硬。日漸滋長。

陰間瀝瘡等證。

吳茱萸

揀淨一斤。分四分。用酒醋。澤瀉淨片二兩。鹽湯童便各浸一宿。焙乾。酒浸一宿。

右為末。用酒糊丸。桐子大。每服五十九丸。

食前鹽湯。或鹽酒下。

良奪命丹百八

方在婦人六五。

治瘀血入胞。脹滿難下。

萬奪命丹百八 方在痘疹八二。治痘瘡倒陷。解毒發痘。

外科奪命丹百八 方在外科七七。治疔瘡發背惡毒惡證。有奪命之功。

二氣丹百八 治虛寒積冷。小便不禁。老人虛人尺脈微弱患此者。

硫黃製研 肉桂各二錢 乾薑地 硃砂研為末 附子製半 右以麩糊丸桐子大。每服二十九。空心鹽湯下。

局半硫丸百八 治高年冷秘虛秘。及痲痺冷氣。○簡易曰。此癖潤劑也。

半夏湯泡七次 硫黃明淨者研極細用 右等分。以生薑汁打糊丸桐子大。每服五七十丸。用無灰酒。或生薑湯下。

養正丹百八 治上感下虛眩暈。此藥升降陰陽。及救逆翻胃。霍亂吐瀉。中風涎潮。不省人事。

傷寒陰感唇青自汗。 硫黃為末 黑錫錄淨 水銀 硃砂研各 右將錫鎔化入硫。米漸入漸攪。為末。再入水銀同攪。如硬再於火上微煨。又攪勻放冷。研極細。米糊丸綠豆大。每服三十九。空心鹽湯下。

局黑錫丹百九 治痰氣壅塞。上感下虛。腎水虧竭。心火炎感。或一應下虛陰寒。真頭痛等證。及婦人血海久冷無子。赤白帶下。

黑錫去洋二 硫黃二兩 肉桂五錢 附子炮 木香 沉香 舶茴香 破故紙 陽起石水飛

胡蘆巴酒洗 肉豆蔻麩裹 金鈴子蒸去皮核 右用新鐵銚將錫化開。下硫黃末。提起以木

加批

上海廣益書局印行

梓橘極細。放地上。退火毒。同餘藥研一日。至黑光色為度。酒糊丸。桐子大。陰乾。入布袋內。捺
令光瑩。每服四十九。空心薑鹽湯下。女人艾葉棗湯下。

橘紅丸百九

和脾胃。消宿食。去膨脹。治大人小兒脾胃之證。極有神效。

京三稜浸軟

蓬朮根青皮 橘紅各五斤 乾薑此胡椒各三斤

右為末。用醋糊丸。桐子大。饘紅

為衣。每服三十九。食後薑湯送下。○小兒臨時加減。與服丸。治飲食所傷。中脘痞滿。服之應

手而愈。○妊婦惡阻嘔吐。全不納食。百藥不治者。惟此最妙。按州妊婦用之。未必見效。不可因其說而誤用。可佐二

陳湯服之。但人疑其墜胎。必不信服。每易名用之。時有神效。但恐妊婦偶觸損動。未免歸咎

此藥是當酌而防之。

椒囊法百九

辟一切瘴疾時氣。風寒時氣。

紅川椒去閉口者

以絳紗囊貯椒兩許。懸佩身傍。近裏衣處。則一切邪氣不能侵犯。

椒紅丸百九

治元臟傷。目暗耳聾。服此百日。覺身輕少睡。足有力。是其效也。服及三年。心

智更悟。目明倍常。面色紅悅。鬚髮光黑。

川椒去目并合口者炒

生地黄取自然汁熱

右將生地汁熱。至稀稠得所。椒末搗丸。梧子

大。每空心溫酒下三四十丸。合藥時。勿令婦人雞犬見。○有詩曰。其椒應五行。其仁通六義。

欲知先有功。夜間無夢寐。四時去煩勞。五臟調元氣。明目腰不疼。身輕心健記。別更有異能。

三年精自秘。回老返嬰童。康強不思睡。九毒頓消亡。三尸自逃避。若能久餌之。神仙應可冀。

加批詳評景岳全書

卷五十九

由集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家積忍庵訂

固陣

局牡蠣散一 治諸虛不足及大病後體虛津液不固常常自汗。

黃耆蜜炙 麻黃根 牡蠣煅 淨 醋 中 水一鍾半。加小麥百粒煎八分。食遠溫服。

牡蠣白朮散二 治漏風證。以飲酒中風汗多。食則汗出如洗。久而不治。必成消渴。

牡蠣煅 白朮炒 防風各二錢 水二鍾煎八分。食遠溫服。

明白朮散三 治虛風多汗。食則汗出如洗。少氣痿弱。不治。必為消渴證。

白朮二兩 防風五兩 牡蠣煅 右為末。每服一錢。溫水調下。不拘時。○如惡風倍白朮。○

如多汗而腰倍牡蠣。○按此方雖與前同。而用法不同。故并存之。

神效麥麩湯四 治心虛盜汗。

麥麩炒黃色 防風 白朮炒 牡蠣煅 醋 中 黃耆蜜炙 水一鍾半。棗二枚煎八分。調服辰砂。

妙香散極效方在後十五。

黃耆湯五 方在補陣四六。治自汗盜汗。

懸甯肺散六 治新久咳嗽肺氣不通咯唾膿血自汗咳嗽常年不愈者服之立止并坐卧不安。語言不出等證。

烏梅肉七分

罌粟殼二錢去筋蜜炙

右為細末不拘時烏梅湯調下。

避安眠散七

治上效嗽久而不止。

款冬花

麥門冬

烏梅肉

佛耳草各四分

橘紅五分

炙甘草三分

罌粟殼蜜炙一錢

右為末。

水

一鍾煎八分。

入黃蠟如棗核許煎化臨睡溫服。

痰丹百藥煎八

劫嗽立止。

百藥煎

訶子

荆芥穗等分

右為極細末蜜丸噲化。

咸三妙湯九

治久嗽。

烏梅肉

三個

北棗

三枚

罌粟殼蜜炙四個

水一鍾半煎七分食後服。

九仙丹十

治一切效嗽不已。

人參

款冬花

桔梗

桑白皮

五味子

阿膠

貝母

烏梅各五

罌粟殼蜜炙二錢

水

一鍾半薑一片。

棗一枚煎七分食遠服。

劫嗽丸十一

治久嗽失氣失聲者宜此飲之新效者不宜用也。

訶子肉

百藥煎

荆芥穗等分

右為細末蜜丸噲化。

五味子丸十二

劫效嗽如神。

五味子五錢 甘草二錢 文蛤 風化硝銻一 右為末煉蜜丸芡實大噲化

嬰粟九十三 治一切久嗽勞嗽一服即愈

嬰粟殼新者一半去蒂切焙乾陳者一半泡去筋膜炒各一兩 右共為末蜜丸彈子大臨睡嚼服一丸○一方用嬰

粟子半片淘淨焙乾炒黃為末沙糖丸彈子大每服一丸臨卧含化

統潤肺丸十四 治欬嗽

訶子 五味子 五倍子 甘草等分 右為末蜜丸噲化○久嗽者加嬰粟殼

良辰砂妙香散十五 治心氣不足驚癩或精神恍惚虛煩少氣少睡夜多盜汗心虛遺精白

濁服之安神鎮心

黃耆 山藥薑汁炒 茯苓 茯神 遠志甘草湯製各一兩 人參 炙甘草 桔梗各五錢 木香二錢

麝香一錢另研 硃砂三錢另研 右為末每服二錢不拘時溫酒調下或用麥麩湯調下

方局王荆公妙香散十六 安神祕精定心氣

人參 龍骨五色者 益智各一兩 白茯苓 白茯苓 遠志製 甘草各五錢 硃砂錢半 右為末每

服二錢空心臨卧溫酒調下

本金鎖丹十七 治夢泄遺精關鎖不固

船苗 蒟蘆巴 破故紙炒 白龍骨各一兩 木香兩半 胡桃肉三十個研 羊腎三對切開用鹽半兩 兩條炙熟搗碎

右為末和二膏加酒浸蒸餅為丸桐子大每服三五丸空心鹽湯下

補金鎖正元丹 十八

治真氣不足。遺精盜汗。目暗耳鳴。呼吸短氣。四肢疲倦。一服損等證。

補骨脂

三兩酒浸炒

肉蓯蓉

酒洗

紫巴戟

去心

葫蘆巴

炒各一斤

文蛤

八兩

茯苓

去皮

三兩

右為細末

酒糊丸

桐子大

每服二十九丸

空心溫酒鹽湯任下

另研

萬金鎖思仙丹 十九

治男子嗜慾太過。精血不固。此藥以去脫之劑。

蓮蕊

芡實

石蓮子

各十斤

金櫻膏

三斤

右以金櫻煎膏如餵

入前三味藥末

和丸

桐子

大

每服四十九丸

大空心鹽酒下

三十九丸

服久精神完固

大能延年

平時服食

忌葷菜

車前子

林器

金鎖匙丹 二十

治男婦精滑遺泄不禁

夢與鬼交

茯苓

茯神

各二錢

遠志

龍骨

各三錢

左股牡蠣

煅

空心鹽湯或酒下

玉鎖丹 二一

治玉門不閉

遺精日久

如水之漏

不能關束者

文蛤

八兩

白茯苓

二兩

白龍骨

一兩

右為細末

米湯下

下臨睡更進一服極效

藥

玉鎖丹 二二

治精氣虛滑

遺泄不禁

龍骨

蓮花蕊

雞頭子

烏梅肉

等分

右為末

用熟山藥去皮為膏

和丸

米湯下

經驗水陸二仙丹 二三

治精脫腎虛

夢遺白濁等證

與補陰藥同用

甚有奇效

經

驗

水

陸

二

仙

丹

二

三

治

精

脫

腎

虛

夢

遺

白

濁

等

證

與

補

陰

藥

同

用

甚

有

奇

效

經

驗

水

陸

二

仙

丹

二

三

治

精

脫

腎

虛

夢

遺

白

濁

等

證

與

補

陰

藥

同

用

甚

有

奇

效

金櫻膏一斤 用金櫻子不拘多少入粗麻布袋內擦去毛刺搗爛入缸以水浸頭浸一二宿去滓取汁以棉濾二三次即入銅鍋用桑柴文火熬成膏取起以冰磁瓶收貯
用 右二味和勻丸桐子大每服二三九空心淡鹽湯下

經驗金櫻丸二四 治夢遺精滑小便後遺瀉

金櫻子 芡實 各一龍骨 白蓮蕊各五錢 右為末糊丸桐子大每服八十丸空心鹽酒下

正經驗秘真丹二五 治腎虛遺精夢泄白濁等證

兔絲子 製 韭子 破故紙 炒 杜仲 薑湯炒 乾薑 炒 龍骨 牡蠣 煨 山茱萸 赤石脂 各五錢

志 覆盆子 巴戟肉 枸杞 山藥 各七錢半 鹿角膠 一兩 柏子仁 一兩 金櫻子 取黃者去刺

兩黃柏 鹽酒炒七分 右為細末煉蜜丸桐子大每服百丸空心薑鹽湯下

局鎖精丸二六 治白濁白帶小便頻數

破故紙 青鹽 白茯苓 五味子 炒等分 右為末酒糊丸桐子大每服三十九空心

心溫酒下

煉固真丸二七 治精滑久不愈

牡蠣 不拘多少用砂鍋內 右以醋糊為丸桐子大每服五七丸空心鹽湯下

良固真散二八 治纔睡着即泄精此二味大能澀精固真氣暖下元

濟固精丸二九 治下元虛損白濁如脂或脫氣虛寒腰重少力小便無度並效

牡蠣煎 兔絲子酒浸 韭子炒 龍骨煎 北五味炒 白茯苓 桑螵蛸酒炙 白石脂等分 右為

細末。酒糊丸。桐子大。每服七十九。空心鹽湯下。

直指固精丸 三十 治腎虛有火精滑。心神不安。

黃柏酒炒 知母酒炒 各一兩 牡蠣煎 龍骨煎 蓮蕊 艾實 山茱萸 遠志甘草製 茯苓各三錢

右為末。山藥糊丸。桐子大。每服五十九。空心溫酒下。

一百固元丹 三一 治元臟久虛。遺精白濁五淋。及小腸膀胱疝氣。婦人赤白帶下。血崩便血等

疾。以小便頻利為效。好蒼朮。剉淨。米泔湯。咀片一斤。擇堅而小者佳。惟茅山者尤妙。分作

四分製之。○一方。用小茴香。食鹽。各一兩。同炒。○一方。用川椒。補骨脂。各一兩。同炒。○一方

用川烏。頭川。椽子肉。各一兩。同炒。○一方。用醇醋。老酒。各半斤。同煮乾焙燥。右連炒諸藥

同為末。用酒煮糊丸。桐子大。每服三五十九。男以溫酒。女以醋湯。空心下。○此高司法方也。

御藥秘元丹 三二 治內虛裏寒。自汗時出。小便不禁。

白龍骨三兩 訶子肉 砂仁各一兩 雲砂二兩 右為末。煮糯米粥。丸。桐子大。每服五十九。空心鹽湯下。

韭子丸 三三 治虛勞寒脫漏精。

韭子炒 車前子 天雄製 兔絲子煮酒 龍骨各一兩 鹿茸 酥炙 乾薑此 桑螵蛸炒 各三錢 右為末。

煉蜜丸。桐子大。每服二三十丸。空心黃耆湯下。

三家韭子丸 三四 治少長遺溺。及男子虛弱。陽氣衰敗。小便白濁。夜夢遺精。此藥補養元氣。

進美飲食。○按此方當除去石斛。倍用兔絲子尤佳。

家韭子炒六兩 鹿茸酥炙四兩 肉蓯蓉酒浸 牛膝酒浸 熟地當歸各二兩 兔絲子酒煮 巴戟肉各一兩

杜仲炒 石斛 桂心 乾薑地各一兩 酒糊丸 桐子大 每服五十九。加至百餘丸。食前溫酒鹽

湯任下。○凡小兒遺尿者。多因胞寒。亦稟受陽氣不足也。○作小丸服之。

小免絲子丸 三五 治腎氣虛損。目眩耳鳴。四肢倦怠。夜夢遺精。

免絲子製五兩 石蓮肉二兩 白茯苓二兩 山藥炒二兩 分 用山藥糊丸 桐子大 每服五十九。

空心溫酒鹽湯任下。○一衣有五味子一兩。治小便多而不禁。

獨大免絲子丸 五六 治腎氣虛損。五勞七傷。脚膝痠痛。面色蒼黑。目眩耳鳴。心中氣短。時有

盜汗。小便滑數。

免絲子酒製 鹿茸 酥炙 肉桂 石龍肉去土 附子泡澤瀉各一兩 熟地 牛膝酒浸 山茱萸

杜仲炒 茯苓 肉蓯蓉酒浸 續斷 石斛 防風 補骨脂酒炒 華撥 巴戟肉 茴香炒

沉香各三兩 五味 桑螵蛸 覆盆子各五錢 右為末。酒煮。麪糊丸。桐子大。每服三五

丸。空心鹽湯溫酒任下。

濟 兔絲子丸 三七 治小便多致失禁。

兔絲子製 肉蓯蓉酒浸 各 牡蠣煅 附子炮 五味子 鹿茸酥炙 各 雞腔脰炙 乾桑螵蛸酒炙

右為末。酒糊丸。桐子大。每服七十九。空心鹽湯溫酒任下。

芎藭扶元丸 三八 治思慮太過心腎虛損真陽不固尿有餘瀝或小便白濁夢寐遺精等證

芎藭絲子 製五 白茯苓 三兩 石蓮肉 二兩 酒糊丸桐子大每服三五十丸空心鹽湯或米湯

下。○一衣有此五味子四兩兼治三消

豬肚丸 三九 治小便頻數

蓮子 一斤以豬肚一個同煎一周 船荷香 破故紙 川棟子 母丁香各一兩 右為末煉

蜜丸桐子大每服五十九丸空心溫酒送下

經驗豬肚丸 四十 止夢遺泄精進飲食健肢體此藥神應瘦者服之自肥莫測其理

白木 五兩麩炒 苦參 三兩牡蠣左扇者煨 右為末用豬肚一具洗淨以磁罐煮極爛木石白搗

如泥和藥再加肚汁搗半日丸如小豆大每服四五十九日進三服米飲送下久服自覺身

肥而夢遺永止

娘三仙丸 四一 治夢遺精滑

益智仁 二兩用鹽二兩同炒去鹽 烏藥 半兩炒 山藥 一兩 右為末山藥煮糊丸如桐子大每服七十九空

心茯苓湯送下

丹九龍丸 四二 治腎虛精滑

金櫻子 枸杞 山茱萸 蓮蕊 蓮肉 當歸 熟地 芡實 白茯苓各等分 右為末

酒糊丸桐子大每服五六十丸或酒或鹽湯下

小温金散 四三 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證。

人參 蓮肉去心 巴戟肉 益智 黃耆蜜炙 麥冬去心 赤茯苓 葶藶酒浸 炙甘草各一

燈心十莖 棗一枚 水煎服。

仁蓮子六一散 四四 治心經虛熱赤濁。

石蓮子六兩 炙甘草一兩 為末每服三錢燈心湯調下。

和威喜丸 四五 治元陽虛憊精滑白濁遺尿及婦人血海久冷淫帶夢泄等證。

白茯苓去皮四兩切塊同猪苓一錢五分同於磁器內煮二十餘沸取出曬乾不用猪苓 黃蠟四兩 右以茯苓為末熔黃蠟搜和丸如彈

子大每空細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清利為效忌米醋惟糠醋可用尤忌氣怒動性

五子丸 四六 治小便頻數時有白濁。

兔絲子酒蒸 家韭子炒 益智 茴香炒 蛇床子去皮 右各等分為末酒糊丸桐子大每服

七十九 米飲鹽湯任下。

遠志丸 四七 方在補陣百十四 治神魂恍惚夢泄遺精

豬苓丸 四八 此方以行為止治濕鬱熱滯小便頻數夢遺精滑。

半夏一兩 將半夏破如豆粒用豬苓為末二兩先將一兩炒半夏色黃勿令焦出大毒取

半夏為末糊丸桐子大候乾用前豬苓末一半又同炒微裂入磁瓶內養之空心温酒鹽湯

下三四十丸又常服於未申間以温酒下。

泄瀉經驗方 四九 治泄瀉飲食少進 用糯米一升 水浸一宿 滌乾 慢火炒令極熟 磨細 羅

如飛 麩加懷山藥一兩 炒研末 和米粉內 每日清晨用羊蓋入白糖二匙 川椒末少許 將極

滾湯調食 其味甚佳 且不厭人 大有資補 久服之 其有精寒不能成孕者 亦孕矣

固腸散 五十 治脾胃虛弱 內寒注泄 水穀不分 下痢膿血 赤少白多 腸滑腹痛 心腹脹滿 食

減力之

陳米 炒二兩 木香 一錢 肉豆蔻 生粟殼 蜜炙各二錢 乾薑 炮 炙甘草 各二錢 右為末 每服二錢 水一

鍾 薑三片 煎一枚 煎七分 不拘時 溫服 忌酒 豬肉 魚 腥 生 冷

白木聖散子 五一 方在熱陣一三七 治一切瀉痢久不瘥

陳肉豆蔻丸 五二 方在小兒五六 治瀉痢腸滑不止

林氏固腸丸 五三 治瀉痢日夜無度

人參 附子 棗 阿膠 炒 龍骨 研 肉豆蔻 炮 炙 赤石脂 煨 醋 乾薑 炒 木香 各一兩 白木 炒 訶子 肉

各二兩 沉香 五錢 右為末 粳米糊丸 桐子大 每服七八十九 米飲下

局大斷下丸 五四 治藏府停寒 下痢不已

乾薑 炮 高良薑 細辛 各半 附子 製 牡蠣 煨 龍骨 研 赤石脂 煨 肉豆蔻 炮 炙 訶子 肉 桔 菴

酸石榴皮 醋浸一宿 夫 右為細末 醋煮麩糊為丸 桐子大 每服五七十丸 米飲送下

棟椿皮散 五五 治血痢及腸風下血神效

椿根白皮

枯白礬各二兩

槐角子四兩

炙甘草一兩

右為細末每服三錢米飲調下

桃花丸五六

治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢腸滑不禁日夜無度○此即仲景桃花湯之法方見熱陣一四七。

赤石脂煑醋乾薑地等

若痢久虛滑去積不已用蒼朮二兩防風五錢水一盞煎至半盞下此丸小便利則安。

右為末湯浸蒸餅丸梧子大每服百餘丸食前米飲下日三服○

生地黄湯五七

治熱痢便血崩淋不止

生地黄五錢地榆半七錢炙甘草半二錢

右吹咀用水二鍾分空心日晚二服

香梅丸五八

治腸風下血服之即止

烏梅肉白芷百藥煎燒存性

右為末米糊丸桐子大每服五六十九空心米湯下

勝金丸五九

一名百藥散○治腸風下血溺血不止及臟毒便血

百藥煎三兩生用一兩炒焦一兩燒存性一兩右為末軟飯和丸或蜜丸桐子大每服五七十九空心米飲下或人參湯下。

濟烏梅丸六十

治大便下血如神

鹽蠶炒一兩烏梅肉一兩

右為末醋糊桐子大每服四五十九空心醋湯下

縮泉丸六一

治脾氣不足小便頻多

烏藥益智為末酒煮山藥糊為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

烏藥益智為末酒煮山藥糊為丸桐子大每服五七十九空心鹽湯下

上海廣益書局印行

四味肉蓯蓉丸六二

治稟賦虛弱小便遺數不禁。此即集要益神丸在補陣百六十。

熟地六兩 五味子四兩

肉蓯蓉酒洗去甲 八兩 菟絲子製二兩

酒煮山藥糊丸桐子大每服七八十

丸空心鹽酒下。

固脬丸六三

治遺尿不覺小便不禁。

菟絲子製三兩

茴香一兩 桑螵蛸炙 附子各五錢

戎鹽一錢

右為末酒煮麩糊丸桐子大每

服三十九丸空心米飲下。

牡蠣丸六四

治小便不禁。

牡蠣

三兩用磁器盛以益末一兩鋪底蓋面用炭火約五斤燒半日取出研

赤石脂搗碎醋拌勻濕於鐵鍋內慢火炒乾研粉

右用酒糊丸桐子

大每服五十九丸空心鹽湯下。

心統 茴香益智丸六五

治老人陽虛失禁及房勞傷腎道溺。

小茴香鹽炒

益智仁炒

破故紙酒炒

川烏炮

烏藥各一兩

右為末山藥糊丸桐子大每服八

十丸鹽湯下。

瀉血方

文蛤炒為末

右以烏梅肉浸爛搗膏丸桐子大空心酒下五六十丸

卷五十九終

加批
詳評景岳全書

卷六十

宙集古方八陣

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

因陣

以下眼目方

原機當歸補血湯一

治男婦亡血過多以致睛珠疼痛不能視物羞明酸澀眼光無力眉骨太陽酸痛難忍者

當歸 熟地黃

各二錢

白芍藥 牛膝

白朮

生地黄

天門冬

各一錢

川芎

防風 炙甘

草

各五分

水二鍾煎八分稍熱服○如惡心不進食者加生薑煎

益氣聰明湯二

治目中內障初起視覺昏花神水淡綠色或淡白色久則不靚漸變純白或

視物成二等症并治耳聾耳鳴

人參 黃耆

各五錢

升麻 葛根

炙甘草

各三錢

芍藥

黃柏

各二錢

蔓荊子

錢半

右每服四

五錢水二鍾煎一鍾臨睡熱服五更再服

東垣蔓荊子湯三

治勞倦飲食不節內障眼病此方如神

蔓荊子

二錢半

人參 黃柏

各一錢

炙甘草

八錢

黃耆

酒拌炒

白芍藥

各三錢

右吹咀每服四五

錢水二盞煎一盞去渣臨卧溫服

益陰腎氣丸^四 治足三陰虧損。虛火上炎。致目睛散大。視物不的。或昏花緊澀。作痛羞明。或卒見非常等證。其功與六味還少丹同類。

熟地^{二兩} 生地 歸尾^{酒洗} 丹皮 五味 山藥 山茱萸 柴胡 茯苓 澤瀉^{各二錢}

煉蜜丸。桐子大。水飛硃砂為衣。每服五七十丸。空心淡鹽湯下。

濟陰地黃丸^五 治證同上。

熟地^{倍用} 山藥 山茱萸 當歸 枸杞 巴戟肉 麥冬 肉蓯蓉 五味子 甘菊花

各等 煉蜜丸。桐子大。每服七八十丸。空心白湯下。

神效黃耆湯^六 方在補陣四九。治目緊縮小。及羞明畏日。視物不明。

方明目地黃丸^七 治男婦肝腎俱虛。風邪所乘。熱氣上攻。翳障目澀多淚。

熟地黃 生地黃^{各一斤} 牛膝^{三兩} 石斛 枳殼 杏仁^{去皮} 防風^{各四兩} 煉蜜丸。桐子大。每

服七八十丸。食前鹽湯下。

蒲加減駐景丸^八 治肝腎氣虛。兩目昏暗。視物不明。

熟地 當歸^{各五兩} 菟絲子^{酒煮} 枸杞 車前子^炒 五味子^{各二錢} 楮實子 川椒^炒 各

末。煉蜜丸。桐子大。每服七八十丸。食前溫酒下。

燥滋陰地黃丸^九 治足三陰虧損。虛火上炎。致目睛散大。視物不的。或昏花緊澀。作痛羞明。兼多燥熱赤爛者。一名乾熟地黃丸。

熟地一兩 歸身酒製 黃芩各半 天冬焙 甘草炙 枳殼 柴胡 五味子各三錢 人參 地骨各

鐵黃連三錢 生地酒洗一兩半 煉蜜丸桐子大 每服百丸 食前茶湯下 日三服

補還睛散十 治翳膜遮睛 昏澀淚出 淤血 齧肉 攀睛

川芎 龍膽草 草決明 石決明 荆芥穗 甘菊花 羌蔚子 楮實子 白茯苓各

兩 白蒺藜炒 木賊 甘草各七錢 川椒炒出汗 右為細末 每服二錢 食後茶清調下 日三服

忌一切難魚厚味及蕎麥麩熱物

八味還睛散十一 治肝肺停留風熱 翳膜遮睛 痛澀眵淚

白蒺藜炒去刺 防風 甘草 木賊 山梔仁各七錢 草決明一兩 青箱子二錢 蟬脫二錢

右為細末 每服二錢 食後麥門冬湯調服

還睛丸十二 治男婦風毒上攻 眼目腫痛 怕日羞明 多眵 隱澀 難開 臉皆紅爛 癢肉攀睛 或

暴赤痛甚 又治偏正頭風 頭痛 皆有奇效

白朮 昆絲子 製青箱子 防風 羌活 白蒺藜炒去刺 蜜蒙花 木賊 炙甘草等分

煉蜜丸彈子大 每服一丸 細嚼 白湯送下 空心食前日二服

正祖傳固本還睛丸十三 治遠年一切目疾 內外翳膜遮睛 風弦爛眼 及老弱人目眵多 翳

迎風冷淚 視物昏花等症 悉皆治之

天門冬酒浸一宿 麥門冬 生地黃酒浸 熟地黃酒洗各三兩 人參 白茯苓 乾山藥 枸杞

各兩 川牛膝 酒洗 石斛 酒洗 草決明 微炒 杏仁 去皮 枳殼 麩炒 兔絲子 酒浸 甘菊花 用小金

兩 羊角 細到 取 烏犀角 剉用 青箱子 微炒 防風 去蘆 各五味子 焙乾 炙甘草 黃連 去鬚

白蒺藜 取仁 川芎 各七 右為末 蜜丸 梧子 大每服五七十丸 鹽湯下

定志丸 十四 方在補陣百十七 治陽氣不足 眼目不能近視

地芝丸 十五 治目不能遠視 但可近視 或并不能 乃陰氣不足也 宜用此方

生地黃 四兩 天冬 枳殼 麩炒 甘菊花 各二 煉蜜丸 桐子 大每服百丸 茶清或溫酒下

煑助陽和血湯 十六 治眼發之後 猶有上熱 白睛赤色 隱澀難開 而多眵淚 等證

黃耆 當歸 酒洗 柴胡 炙甘草 防風 各五分 升麻 七分 白芷 三分 蔓荊子 二分 水煎熱服

蔓荊子 散 十七 治兩眼風熱 晝夜隱澀難開 羞明 惡日 視物昏暗 赤腫而痛

細辛 二芎 芩 蔓荊子 各五分 甘草 白芷 各一分 防風 半錢 右吹咀 水二盞 煎一盞 臨卧溫服

煑明目細辛湯 十八 治兩目發赤 微痛 羞明 畏日 怯風 惡燈火 多眵 隱澀 鼻塞 流涕 津唾稠

粘 大便微硬 細辛 麻黃 羌活 蔓荊子 防風 藜蘆 川芎 荊芥 穗 白茯苓 各四分 生地黃

歸尾 各八分 花椒 七粒 水二盞 煎八分 食後臨卧稍熱服

決明夜光散 十九 治眼目夜昏 雖有燈月 亦不能視

石決明 夜明砂 各二錢 猪肝 一兩 右以藥為末 仍將竹刀切肝為二片 鋪藥於內 合定用

麻線縛之。以米泔水一碗用沙鍋煮至半盞。臨臥連肝連汁俱服之。

石斛夜光丸 二十

治神水散。大昏如霧。露眼。前黑花。視物成二。久而先不收斂。及內障瞳人

淡白綠色。

石斛酒洗 人參 生地 熟地酒洗 麥門冬 天門冬 白茯苓 防風 草決明 黃連

酒炒各 羚羊角銼 犀角銼 川芎 炙甘草 枳殼麩炒 青柏子微炒 五味子炒 肉蓯蓉酒洗

炙各 牛膝酒洗 白蒺藜炒去刺 兔絲子 覆盆子 山藥 杏仁 枸杞各七錢 右為末。煉蜜

丸。梧子大。每服三五十九。溫酒鹽湯任下。

疎瀉熱黃連湯 二一 亦為黃連飲子。治眼暴發赤痛。

黃連酒炒 黃芩酒炒 龍膽草生地 柴胡各一升 麻五分 水煎於午前或飯後熱服。

疎黃芩黃連湯 二二 治兩眼血熱赤痛。

黃芩 黃連 龍膽草俱各酒洗 生地酒洗 右等分。吹咀。每用五錢。水二盞。煎一盞。去渣。熱服。

東甯歸龍膽湯 二三 治眼中白翳。

歸身 龍膽草酒洗 黃芩酒炒 黃柏酒炒 芍藥各八分 黃耆 黃連 甘草各五分 防風 羌活

升麻 柴胡 五味子 石膏各五分 水二盞。煎一盞。去渣。入酒少許。臨臥熱服。忌言語。

芍藥清肝散 二四 方在寒陣六一。治赤脈貫睛。眵多。眵睛。緊澀。羞明。臟腑秘結。

蟬花散 二五 治肝經風熱。毒氣上攻。眼目赤痛。及一切內外翳障。

蟬蛻 甘菊花 穀精草 羌活 甘草^步 白蒺藜^炒 草決明 梔子^炒 防風 蜜蒙花

荊芥穗 木賊 川芎 蔓荊子 黃芩^{各等分} 右為末。每服二錢。食後茶清調下。

五味瀉白散^{二六} 治風熱翳膜血筋。一切肺熱外障。

當歸 生地 芍藥 梔子 黃芩^{各等} 每服三五錢。為散。為湯。任服。

明目羊肝丸^{二七} 治肝虛風熱。冷淚赤澀。內外障翳。

黃連^{三兩} 家菊花 龍膽草 石決明^{服人參} 當歸 熟地 枸杞 麥冬 牛膝

青鹽 黃柏 柴胡 防風 羌活^{各八錢} 肉桂^{四錢} 羯羊肝^{一具。焙乾為末} 右為末。煉蜜丸。桐子

大。每服三四十九。溫湯下。

黃連羊肝丸^{二八} 治同前證。單用黃連一味。同羊肝俱為末。煉蜜丸。服。濟生方用生羊

肝去筋膜。同黃連搗丸。桐子大。每服五六十丸。溫湯下。

黃連天花粉丸^{二九} 治兩眼赤痛。眵多眵燥。緊澀羞明。赤脈貫睛。臟腑秘結。

黃連^{酒炒} 天花粉 家菊花 川芎 薄荷葉 連翹^{各一兩} 黃芩 梔子^{各二兩} 黃柏^{酒炒}

右為細末。滴水丸。梧子大。或用蜜丸。每服五七十丸。至百丸。食後臨卧茶湯下。

局 蜜蒙花散^{三十} 治風氣攻注。兩眼昏暗。眵淚羞明。并暴赤腫翳障。

蜜蒙花 羌活 白蒺藜^炒 木賊 石決明^{各一兩} 甘菊^{三兩} 右為末。每服二錢。食後茶清

調下。

春膏三一 點赤眼 朴硝置豆腐上蒸之待流下者瓦器盛點之

玄明春膏三二 治時氣熱眼

玄明粉半兩 甘石三錢 冰片三分

右乳無聲磁罐蜜收用時點二大眇內

龍脂黃連膏三三 點赤熱眼

龍腦一錢 黃連去毛淨酒炒八兩

先剉黃連今碎以水四盃貯砂鍋內入連煮至一大盃搥去渣入薄磁盤內重湯煮成膏半盞許以龍腦為引或用時旋入尤妙

立消膏三四 治浮翳宿障霧膜遮睛

雪白鹽淨器中生研如塵

右以大燈草煎鹽少許輕手指定浮翳點上凡三次即沒亦不疼痛

黃連甘石散三五 治眼眶破爛畏日羞明

蘆甘石一斤 黃連四兩 龍腦量加 先以黃連研極細同甘石再研俱用細綿紗篩過收貯用

時取一二兩加入龍腦用井花水調如稠糊臨睡抹敷破爛處不破爛者點眼內皆勿使入

眼珠內為妙

黃連人參膏三六 治目赤癢痛

官黃連人參各五

右切碎用水一小鍾同浸飯鍋蒸少頃取出冷定額點眼角自愈或

於臨用時研入冰片少許更妙○一方但用人乳浸黃連頻點皆中抱朴子云治目中百病

○一方用黃連少加生白礬以人乳浸蒸點抹眼角大效

丹砂散 三七 點治諸眼昏效。此李時珍方也。

硼砂 海螵蛸去殼 蘆甘石上好者 煅淨重便 七次飛各一兩 硃砂 五錢用此 則不粘

用少加冰片研點極妙。

清涼膏 三八 治眼目赤腫不能開痛悶熱淚如雨。

生南星 腦荷葉各半 兩 荊芥 百藥煎如無即 用文始 右各三錢為末井水調成膏貼眼角上自

然清涼。

正光明丹 三九 治一切風熱上壅兩目赤腫濕痛爛弦風眼及內外翳障。

製甘石 一兩 硃砂 一錢 硼砂 二錢 輕粉 五分 冰片 三分 麝香 一分 以上用乳鉢研極細收

貯為君。○如眼赤腫痛加乳香沒藥各五分。○內外皆障加珍珠五分。○膽蓉二分。○爛弦風

眼加銅綠五分。黃丹五分。○或以諸藥合一以治諸般眼疾。右各研為細末并一處再研二

日。用磁器密收。勿令泄氣。點眼絕效。

青大金鍼 四十 治頭風牙痛赤眼。

火硝 一兩 青黛 一錢 腦荷 川芎各五 右為細末。口噙冷水勿嚥。用此藥吹鼻。

赤火金鍼 四一 治赤眼頭風冷淚鼻塞耳鳴牙疼。

火硝 一兩 川芎 雄黃 乳香 沒藥 石膏各一 右為細末每用一二分。如前吹鼻三

次愈。

吹鼻六神散 四二

治眼目暴發赤腫。熱淚昏濕。及頭腦疼痛。

錢硝

雄黃

乳香

梨沒藥

梨腦荷葉

各一錢

右為細末。磁罐收貯。

左吹左。右吹右。先令病人口含水吹之。其氣上行。須臾覺效。頭痛吹法亦然。或兩鼻皆吹之。若久患眼疾者。不可吹。

者。不可吹。

東點鹽法 四三

明目去昏翳。大利老眼。得補法之良。

用海鹽二斤。揀淨。以百沸湯泡。濾取清汁。於銀石器內。熬取雪花白鹽。磁器收貯。每早用一錢擦牙。以水漱口。用左右手指。互以口內鹽津。細洗兩眼。大小皆內。閉目良久。却用水洗面。能洞視千里。明目堅齒。極妙之法。蘇東坡手錄。目亦不明。昏花老眼。惟宜此法。大效。

洗爛弦風亦眼方 四四 一名萬金膏。此藥之效如神。人家所不可少。無目病。則以施入價廉功倍。濟人甚大。

廉功倍。濟人甚大。

文蛤

黃連

防風

荆芥穗

各五錢

苦參

四錢

銅綠

分

右為極細末。外以薄荷煎湯。凡彈子大。臨用時。以熱水化開。乘熱洗眼目三次。立愈。神效。○一方。有當歸川芎。各四兩。

傳爛弦歌 四五

爛弦百藥煎為奇。

研細湯澄渣去之。

熬作稀膏。入輕粉。

鹽湯洗了。傳之宜。

搜風散 四六

搜風熱眼及腫痛。

黃連

大黃

朴硝

黃丹

等分

右為末。以苦參煎湯。少加煉過白蜜同調。數眼四弦甚。

炒。

拜堂散

四七

傳風亦熱眼。倒睫爛弦。

五梧子不拘多少為末。蜜水調敷患處。

湯泡散

四八

治肝虛風熱攻眼。赤腫羞明。漸生翳膜。

杏仁

防風

黃連

去鬚赤芍藥

歸尾

各半

銅青

二錢

薄荷葉

三錢

右剉散。每用三四

錢。沸湯泡。乘熱先薰。後洗。冷則再煖。又洗。每日三兩次。○一方。加白鹽少許。閉目沃洗。尤能

散血。

收淚散

四九

治風淚不止。

海螵蛸

五分

冰片

少許

綠蘆甘石

一錢

右乳極細末

點大眦角

淚即收上

二藥以燥濕片

腦以辛散。

去星

五十

凡胡椒。韭菜根。橘葉。菊葉之類。皆可杵爛為丸。用綿裹塞鼻中。觸之。過夜則星白

下。

眼目有傷青腫

五一

以生半夏為末。水調塗之。即愈。

明目第一方

五二

此方始於上陽子。以授魯東明。左邱明。杜子夏。左太冲。凡此諸賢。皆有目

疾。得此皆愈。

夜省看書一

減思慮二

專內視三

簡外視四

晨興遲五

夜眠早六

凡此六事。教以神火下。以氣飲。蘊於胸中。納諸方寸。修之一時。長服不已。非但明目。亦可延

年。

以下耳病方

挂星散 五三 治風閉耳聾。

官桂 川芎 當歸 石菖蒲 細辛 木通 木香 白茯苓炒去 麻黃去節 甘草炙各

白芷梢 天南星煨裂各 水二鍾 葱白二根 紫蘇五葉 薑五片 煎八分 食後服。○一衣加

全蠍去毒一錢 治諸氣閉濕耳聾及腹癱使癱瘡疽無頭者能止痛消腫。

類復元通氣散 五四 治諸氣閉濕耳聾及腹癱使癱瘡疽無頭者能止痛消腫。

青皮 橘紅各四兩 甘草炙三寸 連翹一兩 右為末熱酒調服一二錢。

補腎丸 五五 治腎虛耳聾。

巴戟去心 乾薑炮 白芍藥 山茱萸 人參 黃耆 當歸 熟地黄 遠志製 肉桂菴酒

芩絲子 製蛇床子 牡丹皮 附子炮 石斛 細辛 澤瀉 桂心 甘草各二兩 石菖蒲一兩

茯苓半兩 防風一兩 羊腎二枚 右為末將羊腎用酒煮研爛仍加酒煮麩糊丸桐子大每

服五七十九空心鹽酒送下。

聰明益氣湯 五六 治腎虛耳聾。

黃耆一錢 人參 炙甘草 當歸酒洗 白朮各五 橘紅 菖蒲 防風 荆芥各三分 升麻

柴胡各二 右水煎服。

肉菴蓉丸 五七 方在補陣一五五 治腎虛耳聾

聾耳明鑿散 五八 治膿耳。

枯礬

龍骨 研各黃丹

飛半乾胭脂

七分麝香

少許 右為細末。先須以綿杖纏拭去膿別

用綿杖蘸藥引入耳中。如無乾胭脂。即以濟寧油胭脂同枯礬拌擦如粉用之。○又紅玉散

止枯礬乾胭脂麝香三味等分用。○一方單用枯礬吹入。即愈。

時日流膿方 五九

用菖蒲根水洗滌。搗取汁。先以棉杖將耳中膿水攪淨。然後將蒲汁灌入。

盪洗數次。全愈。最妙者。

白龍散 六十 治小兒腎熱上衝於耳。生膿作痛。或因沐浴水入耳中。亦令作膿。謂之聾耳。久

而不愈。則成聾。

枯礬

黃丹

龍骨 各五麝香

一分 右為極細末。先以綿杖子展盡耳內膿水。用藥一字。

分搽兩耳。日二次。勿令風入。

百蟲入耳 六一 用香油滴入耳中。即出。○本事方用白膠香燒烟薰耳中。煖即出。○一方用

葱涕灌入。活者即出。○一法用生薑擦貓鼻。其尿自出。取尿滴入。蟲即出。或以麻油滴入。則

蟲死。或以炒芝麻枕頭。則蟲亦出。但不若貓尿之捷也。

蜈蚣入耳 六二 用薑汁滴入。或韭菜汁雞冠血入俱好。

暴聾灸法 六三 用小蒼朮一塊。長七分。一頭削尖。一頭截平。將六頭插入耳內。平頭上用筋

頭大艾灸之輕者七壯重者十四壯覺耳內有熱氣則效○又方用雞心檳榔一箇將臍內剝一窩如錢眼大實以麝香放於患耳內上以艾炷灸之不過二三次即效

塞耳聾六四

用大蒜一瓣一頭剝一坑子以好巴豆一粒去皮慢大炮令極熟入在蒜內以新棉裹定塞耳中

龍腦膏六五

龍腦一分椒目五分杏仁去皮右拌搗研勻棉裹塞核大塞耳中日二易之

杏仁膏六六

治耳中汁出或痛或膿右用杏仁炒令赤黑研成膏棉裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙○一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和為丸以棉

裹塞耳又治耳聾兼有膿

通聖散六七

穿山甲天蜈蚣各五分麝香一分右為細末以葱涎和劑塞耳或用少棉裹塞之或用葱管

感藥末塞耳中

通耳散六八

磁石用酒煮如豆一匙穿山甲燒存性為末一字

如風雨聲即愈

以下面鼻方

右兩味用新棉裹塞患耳內口中銜生鐵少許覺耳內

林 川芎散 六九 治風寒鼻塞

川芎 藜本 細辛 白芷 羌活 吳甘草 各一 蒼朮 未泔浸 五兩 右咀 每服三錢 水一盞

薑三片 葱白三寸 煎服

生 辛夷散 七十 治肺虛為四氣所干 鼻肉壅塞 涕出不已 或氣不通 不聞香臭

辛夷 川芎 細辛 白芷 升麻 防風 羌活 藜本 吳甘草 木通 各等 一衣

有蒼耳子 減半 右為末 每服二錢 食後茶清調下

濕肺散 七一 治閉塞陽明鼻塞

升麻 黃耆 丁香 各一 羌活 葛根 炙甘草 防風 各五 麻黃 不去節 水二鍾 葱白

二莖 煎八分 食遠熱服

金 細辛膏 七二 治鼻塞腦冷 清涕常流

細辛 川芎 川椒 黑附子 皮去 乾薑 吳茱萸 各二 桂心 三錢 皂角屑 錢半 右將諸

藥用米醋浸過宿 次用豬脂二兩 熬油 入前藥 煎附子色黃為度 以棉蘸藥塞鼻中

三 蒼耳散 七三 治鼻流濁涕不止 名曰鼻淵

蒼耳子 炒二 辛夷仁 薄荷葉 各五 白芷 一兩 右為細末 每服二錢 葱湯或茶清 食後服

神愈散 七四 治風熱在肺 鼻流濁涕 室塞不通

細辛 白芷 與防風 羌活 當歸 半夏 芎 桔梗 陳皮 茯苓 葶 十般 等分 剉和同 三錢 薄

荷葉煎服 氣息調勻鼻貫通

醍醐飲 七五 治傷風鼻塞聲重

細辛 半兩 川芎 一兩 薄荷 一兩 川烏 皮去 白芷 甘草 各二兩 右為細末每服一錢 蔥茶湯

或薄荷湯下

良方防風湯 七六 治鼻塞不聞香臭

防風 麻黃 官桂 各半兩 升麻 木通 各一兩 梔子 七枚 石膏 三兩 右以咀每服水一盞煎

七分空心溫服

宣防風湯 七七 治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衄血之證

防風 半兩 人參 麥冬 炙甘草 川芎 黃芩 各一兩 右為細末每服二錢 沸湯調服食

後日二服

荊芥散 七八 治肺風酒釀鼻赤疤

荊芥穗 四兩 防風 杏仁 去皮 白蒺藜 炒去刺 礬石 炒 炙甘草 各一兩 右為末每服二錢 食後

茶清調下

正腦漏秘方 七九 祖傳經驗治鼻中時時流臭黃水甚者腦亦時痛俗名控腦砂有蟲食腦

中用絲瓜藤近根三五尺許燒存性為細末酒調服之即愈

簡黃白散 八十 治鼻鼈瘰肉鼻痔等證

白礬 雄黃 細辛 瓜蒂炒各等分 右為細末以雄犬膽汁為劑如棗核塞鼻中。

細辛散 八一 治鼻癢有惡肉不聞香臭。

北細辛 瓜蒂等分 右為末棉裹如豆大塞鼻中。

御菖蒲散 八二 治鼻內室塞不通不得喘息。

菖蒲 皂角等分 右為細末每用一錢棉裹塞鼻中。仰卧片時。

輕黃散 八三 治鼻中惡肉。

輕粉 杏仁去皮共 雄黃 五錢 麝香少許 右四味用乳鉢先研杏仁如泥。後入雄麝輕粉。

同研極細。磁盒收。蓋每有患者不拘遠近於卧時用篩頭蘸米粒許點惡肉上。隔一日卧點。

一次半月見效。

雄黃散 八四 治鼻癢。

雄黃 五分 瓜蒂 二個 綠礬 一錢 麝香少許 右為末吹入鼻中。

千金惡肉方 八五 一名瓜丁散。

瓜蒂 華陰細辛等分 為末綿包少許塞鼻中。

簡易惡肉方 八六 用枯白礬為末以綿胭脂裹塞鼻中。數日肉隨落。

白礬散 八七 治肺風酒鼓鼻等疾。

白礬 硫黃 乳香各等分 為末綿裹擦之。或用茄汁調敷患處更妙。

二神散 八八 治赤鼻久不瘥

大黃 朴硝 等分 為末 津調塗鼻上

酒瘻鼻粉痣 八九 亦名硫黃散

硫黃 輕粉 各一 杏仁 五分 右為末 用蜜酒調 於卧時塗上 早洗去效 或用津唾調搽

更妙 又方 只以銅綠為末 晚時切生薑蘸擦之

點痣去斑 九十 用石灰水調一盞如稠糊 揀好糯米粒全者 半置灰中 半露於外 經一宿 灰

中米色變和水晶 若或面或手有黑痣黑靨及紋刺者 先須鍼頭微微撥破 置少許水晶者 於其上 經半日許 屬痣之汗自出 乃可去藥 且勿著水 二三日即愈

面鼻雀斑 九一 此連子術備方

白芷 甘菊花 各三錢 白果 二十個 紅棗 十五個 珠兒粉 五錢 豬胰 一個 右將珠粉研細 餘俱

搗爛 拌勻 外以蜜拌酒釀燉化 入前藥 蒸過 每晚搽面 早洗去

面瘡 二方 九二 面上暴生瘡 用生杏仁搗爛 以雞子清調如煎餅 至夜洗面敷之 旦洗去

數十次愈 指甲抓破面者 用生薑自然汁 調輕粉 敷破處 無痕

止鼻衄血 九三 龍骨為細末 吹入鼻中 少許即止 凡九竅出血者 用此皆能治之

止鼻衄歌 九四 石榴花瓣可以塞 蘿蔔藕汁可以滴 火煨龍骨可以吹 水煎茅花可

以吹 又堵頭苔蒜可以塞 車前草汁可以滴 火燒蓮房可以吹 水調錫煤可以吹

鼻吻蒸法九五 治衄如湧泉不止者 用草紙摺十餘層并花水濕透分髮貼頂心中以熱
熨斗熨之微熱不妨久之即止

鼻塞不通熨法九六 但用葱頭以繩束成一把去根頭實處切成寸長作餅先以熨斗烙

葱一面令熱置頂心顛會穴處乃以熨斗或火從上熨之俟鼻內作葱氣方法未通再作餅
熨之○其有嬰兒傷氣鼻塞不能吮乳者但用大南星為末以生薑自然汁和作薄餅用兩
掌合煖置顛上片時即通

硝石散九七 治風邪犯腦患頭痛不可忍不問年歲

硝石 人中白 等分 冰片 少許 右為末用一字吹入鼻中

良通關散九八 治卒然牙關緊急腰背反張藥不能嚥或時毒癰腫鼻塞氣閉等證

細辛如無真者不用亦可 薄荷葉 牙皂角 等分 右為細末以紙燃少許入鼻內候噴嚏口開隨進

湯藥○聖惠搖鼻法止用二味無薄荷

疎通關散九九 方在痘疹八五 通心經降心火利小便良方

擦牙通關散一百 方在小兒八四 治風搖關竅不通痰塞中脫留滯百節

以下口舌方

良玄參散百一 治滿口并舌生瘡連齒斷爛痛

玄參 黃芩 黃柏 梔子仁 大黃 前胡 獨活 犀角屑 麥冬 升麻 炙甘草

各等 右為咀。每服五錢。水一鍾半。煎七分。不拘時溫服。

玄參升麻湯 百二 方在外科四八 治口舌生瘡。重舌木舌。腮頰咽喉腫痛。斑疹瘡瘍。

清涼飲子 百三 治上焦積熱。口舌咽喉乾燥。

黃芩 黃連 各二錢 薄荷 玄參 當歸 芍藥 各錢半 甘草 一錢 水二鍾。煎分。不拘時服。

○大便秘結。加大黃二錢。

清熱化痰湯 百四 治上焦有熱。痰感作渴。口舌腫痛。

貝母 天花 枳實 桔梗 各一錢 黃芩 黃連 各錢二分 玄參 升麻 各七分 甘草 五分 水煎服。

甘露飲 百五 方在寒陣十。治口舌生瘡。咽喉腫痛。牙齦潰爛。

龍膽瀉肝湯 百六 方在寒陣六三。治肝火內炎。上為喉口熱瘡。下為小便澀痛等症。

五福化毒丹 百七 方在外科七六。治咽喉牙口瘡毒癰腫。

良冰柏丸 百八 治舌瘡口瘡。

薄荷葉 蘇州黃柏 等分 硼砂 半之 冰片 一分 右為末。生蜜丸。彈子大。每服一丸。噙化。

上清丸 百九 治口舌生瘡。咽喉腫痛。止嗽清音。寬膈化痰。極效。

砂仁 桔梗 各一錢 月石 二錢 冰片 一分 甘草 玄明粉 訶子 各一錢 百藥煎 八錢 蘇州薄荷

葉 一兩 為極細末。煉蜜丸。芡實大。臨睡含化一丸。或為小丸。茶清送下。

硼砂丸 百十 治口瘡舌瘡。

寒水石 一兩 牙硝 四錢 礪砂 二錢 冰片 麝香 各一 甘草膏和丸 麻子丸不時含化 一丸

津嗽

方聖金散 百一 治舌上出血不止

黃藥子 一兩 青黛 一錢 右為細末 每服一錢 食後新汲水調下 日二服

金花煎 百一 治舌上出血如簪孔

黃柏 三兩 黃連 五錢 梔子 二十 右咀以水二升 浸一宿 煮三沸 去滓 燉服 一方用酒浸煮

飛礬散 百一 治木舌漸腫大滿口 若不急治 即殺人

白礬 飛百草霜 等分 右為細末 檢糟茹自然汁調服 若口喞灌之效

寸金散 百一 治心經煩熱 動血妄行 舌上出血不止

新蒲黃 三錢 新白麴 三錢 牛黃 五分 腦荷 五分 右研勻 每服一錢 生藕汁調服 食後亦可

搽舌上

黃柏散 百一 治血出血不止 名曰舌血

黃柏 不拘多少 煉蜜 右每服二錢 溫米飲調下

升麻黃連丸 百一 治多食肥甘 口臭穢惡

升麻 半兩 黃連 黃芩 酒炒 生薑 檀香 甘草 各二錢 青皮 半兩 右為細末 湯泡蒸餅丸

彈子大 每服一丸 不拘時 細嚼 白湯下

丁香九百一 治口臭穢

丁香二錢 川芎二錢 白芷五分 炙甘草一錢 右為末。煉蜜丸。彈子大。綿裹。一炷。噙化。

應手散百一 治傷寒舌出寸餘。連日不收。

梅花冰片 為末。搭舌上。應手而收。重者須用一錢方收。

陰陽散百一 亦名赴筵散。治口瘡效。

黃連一兩 乾薑炒黑三錢 為細末。乾摻口瘡上。涎出即愈。

外陰陽散百二 方在外科一三三。治瘡屬半陰半陽者。

綠雲散百二 治口瘡爛臭久不愈。

黃柏蜜天 青黛等分 右為細末。臨卧用少許。摻舌。噉津妙。

細辛黃柏散百二 治口舌瘡。

黃柏 細辛等分 右為末。敷之。或摻舌上。吐涎水。再敷。須旋含之。

白蠶黃柏散百二 治口瘡。

黃柏蜜天 白蠶蜜天 直者新瓦上焙乾斷絲 右為細末。用少許。敷瘡上。吐涎。

硼砂散百二 治口瘡。

硼砂 青黛 龍腦 薄荷 石膏等各 右為極細末。每用少許。臨卧敷口中。

黃連朴硝散百二 治口瘡絕妙。

黃連 朴硝 白礬各五薄荷葉一兩 右為粗末用臘月黃牛膽將藥入膽內風前掛兩

月取下如遇口瘡旋將藥研細敷之去其熱涎即愈

柳華散百二 治熱毒口瘡

黃柏炒 蒲黃 青黛真者 人中白 煨 右等分為末敷之

摻口瘡百二

天竺黃 月石等分 冰片少許 為末摻之

碧雪百二 治一切熱瘡口舌生瘡舌強腮腫咽喉腫痛等證

蒲黃 青黛 硼砂 銹硝 甘草等分 右為細末每用少許摻舌上細細嚥下或飲涼

水送下頻用之效或用砂糖丸芡實天每服一丸嚥化下咽妙

絳雪百二 治口瘡舌瘡咽喉腫痛

硼砂一錢 硃砂三錢 馬牙硝 寒水石飛各二錢 冰片半字 右為細末每用一字摻舌上嚥亦

不效喉痛者吹入咽中

孫真人口瘡方百三 單用朴硝含之甚良

皂角散百三 治重舌喉痺

皂角不對者四五挺 荆芥穗二錢 右為細末以米醋調塗腫處

千金口鼻方百三 亦治舌上出血如簪孔

用香薷一把。以水二斗。煮取三升。徐徐含漱之。

聖口齒方百三。治口臭穢及齒齲腫痛。

用北細辛一兩。煮取濃汁。熱漱。冷即吐之。立效。

以下齒牙方

東神功丸百三。治多食肉人口臭不可近。牙齒疳蝕。牙斷肉脫血出。并治血崩血痢。腸風下

血。及逆氣上行等證。

黃連酒洗砂仁各五錢生地 甘草各三錢當歸 木香 藿香葉 升麻 蘭葉各一錢 右

為末。以湯浸蒸餅和丸。綠豆大。每服百丸。或二百丸。白湯食遠服。

東清胃散百三。治寒陣五。治齒齲潰爛。喜冷惡熱。

初清胃飲百三。方在寒陣五六。治一切風熱。牙床腫痛。出血動搖。

三安腎丸百三。治腎虛牙齒腫痛。此與局方安腎丸同。但少肉桂。茯苓二味。方在寒陣一

六七。

植立効散百三。治牙痛不可忍。痛連頭腦項背。微惡寒飲。大惡熱飲。

防風一錢。升麻七分。炙甘草 細辛各三分。龍膽草酒洗。右用水一鍾。煎五分。去渣。以匙

抄在口中。燉痛處。少時立止。如多惡熱飲。更加龍膽草一錢。此法不定。隨宜寒熱多少。臨時

加減。○若惡風作痛。須去龍膽草。加草豆蔻。黃連各五分。累用得効。

細辛煎百三

治牙齒腫痛不可忍。及口氣臭。

用北細辛一味煎濃汁。乘熱噲漱。良久吐之。極妙。

驅毒散百四

治熱毒上攻。宣露出血。牙齦腫痛不可忍。

屋遊 此即瓦上青苔。不拘多少洗淨。右用水煎湯澄清。入鹽一撮。頻頻漱之。

院御藥丁香散百四

治牙齒痛。

丁香 華撥 蠟梢 大椒 右等分為末。每用少許。擦於患處。

選羌花散百四

治風蟲諸牙痛。

羌花 細辛 川椒 蘄艾 小麥 細茶 等分 右咀水一鍾。煎七分。溫漱之。日三四次。

吐涎出即愈。

如神散百四

治風牙蟲牙攻蛀疼痛。牙齒動搖。連頰浮腫。

川椒坊出 蜂房炙 右等分為細末。每用二錢。水煎數沸。熱漱即止。

赴筵散百四

治風蟲牙痛。

良薑 草烏 細辛 荊芥穗 右等分為末。擦牙。有涎吐之。

蟾酥膏百四

治風蛙諸牙疼痛。

蟾酥少許 巴豆去油研 杏仁燒焦

塞牙縫中。吐涎盡愈。 右共研如泥。以棉裹如粟米大。若蛀牙塞入蛀處。風牙

蟲牙痛百四

蒼耳 艾 小麥 花椒 芫花 黑豆 煎熟屢漱之即愈。

韭子湯百四

治蟲牙。用韭菜子一撮以碗足盛之。用火燒煙。外用小竹梗將下截劈為四開。以紙糊如喇叭樣。引煙薰其蛀齒。○如下牙蛀者。以韭子煎濃湯漱之。蟲自出。

瑞竹堂方百四

治蟲牙疼痛不已。用天仙子不拘多少。燒烟。以竹筒抵牙。引烟薰之。其蟲即死。

巴豆九百四

治蟲牙疼痛。蝕孔空虛。

巴豆一秋

花椒五十粒。右為極細末。飯丸黍米大。綿包塞蛀孔。

藜蘆散百五

治蟲牙疼痛。用藜蘆為末。塞牙孔中。勿令涎汁有涎吐之。大有神效。

北棗丹百五

治走馬牙疳。用北棗去核。每個內入人言一塵。燒存性。研細。每以些小敷患處。

青金散百五

治走馬牙疳。蝕損唇舌。腐臭牙落。其效如神。

銅綠 砒霜 等分

右為細末。每用些少敷患處。

三仙散百五

治走馬牙疳。一時腐爛即死。

銅綠 三分

麝香 一分 婦人溺桶中垢白者大 一錢

右為極細末。敷齒上。不可太多。

麝香散百五

治走馬牙疳危惡證候。

麝香少許 膽礬一錢 銅綠半兩 白礬生用五分 右為細末。敷牙患處。

神授丹百五 治牙疳。

枯礬七分 白礬三分 麝香一分 為末。以竹管吹瘡上。

黃連散百五 治齒斷間出血。喫食不脛。

黃連六 白龍骨馬牙硝各一 枯礬五分 冰片半分 右為細末。每用少許。敷牙根下。

雄黃麝香散百五 治牙斷腫爛出血。

雄黃一錢 銅綠半 輕粉 黃連 黃丹炒各一錢 血竭 枯礬各五分 麝香一分 右為細末。研勻。每

用些少敷患處。

齒縫出血百五 右用紙維子蘸乾蟾酥少許。于血出處按之立止。

固齒雄鼠骨散百五 治腎水不足。牙齒浮動脫落。或縫中痛而出血。或但動不痛者。

雄鼠骨 當歸 沒石子 熟地 榆皮 青鹽 細辛等分 右為細末。綿紙裹條。扱牙

床上縫中。則永固不落矣。

雄鼠骨散百六 治牙落可以重生。

雄鼠骨一具 生打活雄鼠一個。剝去皮。雜用鹽水浸一時。炭香附 白芷 川芎 桑葉臨

地骨皮 川椒 蒲公英 青鹽 川樵皮 旱蓮草 右為末。擦牙。百日復出。固齒無不

效。

狼荆槐散百六 治牙宣出血疼痛不止

荆芥穗 槐花 右等分為末擦牙患處

石膏升麻散百六 治陽明風熱流注齒牙腫痛出血化為膿汁等證

石膏 羊腰骨灰 地骨皮 升麻 右等分為末每用少許擦牙齒根上或加麝香少許更妙

許更妙

薑黃散百六 治牙疼不可忍

薑黃 白芷 細辛 等分 右為細末擦患處須臾吐涎以鹽湯漱口面赤腫者去薑黃加

川芎具腫立消

生香鹽散百六 牢牙去風

丁香附炒焦黑 青鹽一兩 右為末如常擦牙乃鐵瓮先生良方

和子牙宣散百五

良薑 胡椒 藜蘆 細辛 乳香 麝香 雄黃 青鹽各另研 右等分為細末先以

溫水漱淨牙後以藥末擦患處進出涎沫吐之漱十餘次痛立止忌油鹽二日

槐鹽散百六 治食甘甜過多牙痛

食鹽 青鹽 槐枝一斤切斷用木五

鉛盒盛擦牙固齒最妙 右將二鹽先炒乾乃入槐枝湯煮乾取起為末用

椒鹽散百六

治牙痛用清涼藥不效或反甚者宜從此以治

川椒 青鹽 華椒 薄荷 荆芥穗 細辛 朝腦 右為末擦痛牙處或煎湯漱之亦

可。

宣風半牙散百六

駐顏補腎半牙固齒

細辛 青鹽各七錢 當歸酒洗 川芎各一兩

下或先以溫水漱口淨然後擦而嚥之亦可 右為末每用少許清晨擦牙滿口漱良久連藥嚥

萬青白散百七 治一切牙疼固齒

青鹽二兩 食鹽 川椒煎汁各四兩

右以椒汁拌鹽炒乾為末擦牙永無齒疾以漱水洗面目亦

無疾此藥極妙

御前白牙散百七

石膏四兩 大香附一兩 白芷七錢 甘松 三奈 藿香 沉香 川芎 零陵香各三錢 細辛

防風各半兩 右為細末先以溫水漱口次擦之妙

東白牙散百七

升麻一錢 羊脰骨灰二錢 軟石膏三錢 白芷七分 麝香少許

擦之妙 右為細末先以溫水漱口次

道藏經方百七

治牙齒動搖血出不止

用白麩麩不拘多少搗為細末每日擦牙及患處最妙

取牙不犯手百七

草烏 藜蘆 各錢半 川椒 細辛 各三 右為細末每用少許點在患牙內外一時其牙自落

以下咽喉方。

扁甘桔湯百七 治一切風熱上壅咽喉腫痛。錢氏方用甘草二錢苦梗一錢

甘草二錢 桔梗四錢 水二鍾煎八分食後服。此方加荊芥穗二三錢三因方即名荊芥

湯尤效。

拔甘桔湯百七 治熱腫喉痺。

甘草 桔梗 薄荷 連翹 黃芩各等分 水二鍾加竹葉煎服。一方有山梔子。

加味甘桔湯百七 方在痘疹九十。治咽喉腫痛

林訶子甘桔湯百七 治火風失音。

訶子四個半 桔梗一兩五錢 甘草二寸半 右咀分二服水一鍾重便一鍾煎八分食後溫

服 生半熟 生半炒 生半炙

清咽利膈飲百七 治咽喉腫痛痰涎壅盛

防風 金銀花 荊芥 薄荷 桔梗 黃芩 黃連各一錢 山梔 連翹 玄參 大黃

朴硝 牛蒡子炒研 甘草各七 水二鍾煎一鍾食遠服

消痰飲百八 治喉痺。

單用消黎汁頻頻飲之。或將梨削浸涼水中。頻頻飲之尤妙。此物大解熱毒。○或南方少梨之處。但擇好蘿蔔汁。加元明粉徐飲。大效。

透天一塊冰百八 治一切風熱喉痺。口舌生瘡。頭目不清。痰涎壅盛。

黃連二錢 腦荷 月石 檳榔 蒲黃 甘草各一錢 荆芥穗 黃柏各五分 冰片半分 或白沙

糖半兩 右為細末。煉蜜為丸。芡實大。每服一丸。噙化。

靛花丸百八 治纏喉風聲不出。

靛花 薄荷葉蘇州者 右等分為細末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。臨睡噙化。

杏杏仁煎百八 治效嗽暴重。聲音不出。

杏仁記去皮去 各蜜 薑汁 砂糖各一 木通 桑白皮去味 貝母 紫苑草 北五味各

兩石菖蒲 款冬花各半 右將後七味為咀。用水五升。煎半去渣。入在蜜。薑糖。四味。合和。

微火煎取一升半。每服三合。兩日夜服之。

三因蜜附子百八 治隔陽咽閉。吞吐不通。及臟寒閉塞等證。

用大附子一枚。去皮臍。切作大片。用蜜塗炙令黃。含口中。噉津。甘味盡。再塗蜜炙用。或易之。

○或用炮附子。以唾津調塗腳心。○一方。用肉桂。含之。

牛黃益金散百八 治虛火炎上。傷肺。咽喉生瘡。破爛。

黃柏為木用蜜丸天數次以白礪砂淨各白殭蠶淨各牛黃三分右用蜜調如稀糊塗敷患

處或丸如龍眼大含化嚥之○按此方必加冰片半分方妙

秘方三黃丸百八治喉痺極佳

大黃 黃連 黃芩各一兩 黃藥子各七錢 山豆根 苦參各三錢 月石 京墨

各錢麝香少許 冰片五分 右為末猪膽調籠內蒸三次臨後入片麝礪砂為丸豆大噙化

一丸津嚥日夜常噙勿脫藥味方妙

人參乎補湯百八治腎虛聲嘶不出

人參 川芎 當歸 熟地黃 白芍藥 白茯苓 芩絲子 杜仲 製北五味子 白朮

巴戟去心 半夏 麩 橘紅各半兩 牛膝酒洗 破故紙炒 益智仁 葫蘆巴炒 炙甘草各二錢

石菖蒲半錢 右咀每服五錢薑五片棗二枚煎七分吞山藥丸百餘粒○凡五鼓後腎氣

開時不得咳唾言語再進上藥則功效勝常

百合丸百八治肺燥失聲不語

百合 百藥煎 杏仁去皮 訶子 薏苡仁等分 右為末雞子清和丸彈子大臨卧噙化

或用蜜丸亦妙

秘竹衣麥門冬湯百八治一切勞瘵痰嗽聲啞不出難治者服之神效

竹衣取金竹內衣 竹茹彈子大一團即金 竹瀝即取金 麥冬二錢 甘草 橘紅各五 白茯苓

膠解者一錢竹青皮也括取之竹瀝竹者

桔梗各一錢

杏仁七錢去皮共研

右明水一鍾半加竹葉十四片煎七分入竹瀝一盞和勻服。

射干百九

治惡癰腫咽喉不利。

射干

炙甘草各半

川升麻

川大黃

木鱉仁各二錢半杏仁去皮共雙仁麩

右為細末煉

蜜丸小彈子大常含一丸津嚥。

林鐵笛百九

治謳歌動大失音不語者神效。

薄荷葉四兩

連翹

桔梗

甘草各二兩

訶子

煨大黃

酒蒸砂仁

各一兩

川芎

半兩

百藥煎

二兩

右為細末雞子清和丸彈子大臨卧嚥化一丸或煉蜜丸亦可。

雄黃飛解毒丸百九

治急喉風雙蛾腫痛湯藥不下。

雄黃飛鬱金各一兩

巴霜十四枚

右為末醋糊丸綠豆大熱茶清下七丸吐出頑涎即愈未吐

再服大效如口喙以物幹開灌之下咽無有不活者○如小兒驚熱痰涎壅塞或二九三九

量大小與之○一法以此丸三粒用醋磨化灌之其痰立出尤妙。

玉鑰匙百九

治風熱喉痺及纏喉風。

月石

五錢

牙硝半兩

白殭蠶一錢

冰片一字

右為細末每用五分以竹管吹入喉中立愈。

此方加雄黃二錢即名金鑰匙。

濟二聖散百九

治纏喉風急喉痺。

生

膽礬三錢

白殭蠶炒半兩

為細末用少許吹入喉中。

生

膽礬三錢

白殭蠶炒半兩

為細末用少許吹入喉中。

秘奪命丹百九 治急喉風

白礬枯礬 月石 皂角炭烟盡 為細末每用少許吹喉中痰出即愈

馬牙硝散百九 治喉癰及傷寒熱後咽痛閉塞不通毒氣上衝

馬牙硝細研每服一錢綿裹含嚥津以通為度

燒鹽散百九 治喉中懸癰垂長咽中妨礙

燒鹽枯礬 各等 右和勻研細以筋頭蘸點即消

開關散百九 治喉風氣息不通

白殭蠶炒去 枯白礬等分 右為細末每服二三錢生薑蜜水調下細細飲之

七寶散百九 治喉閉及纏喉風

殭蠶直者 硼砂 雄黃 全蠍十個全 明礬 牙皂一槌去皮 膽礬五分

一字吹入喉中即愈 右為細末每用

開關丹二百 治乳蛾喉閉纏喉風等證

硼砂末五錢 霜梅肉搗爛 右二味和勻丸芡實大每服一丸嚥化嚥下內服荊防敗毒散

通氣散二百 方在外科十八 治時毒腫甚咽喉不利取嚏以泄其毒

以下諸毒方

紫金錠二百 一名神仙太乙丹 一名玉樞丹 一名萬病解毒丹 解除一切中毒積毒

毒毒最毒。單砒石死牛死馬河勝等毒。及時行瘟疫山嵐瘴氣喉閉喉風癩邪鬼氣狂亂

迷死牙關緊急小兒急驚等證。凡行兵與役之處尤不可無。

右用糯

文蛤洗焙山茨菰去皮淨千金子去油取紅芽大戟去蘆焙乾為麝香另研

末一兩五錢

米煮濃飯為丸。分作四十錠。每服半錠。用井花水或薄荷湯磨服。利一二次。用粥止之。若治

癰疽惡毒。湯火蛇蟲犬獸所傷。以東流水磨服。并傳患處。○如治癩疔鬼氣鬼胎。等急疼痛

須煖酒磨服。○凡修合時日。須用端午七夕重陽。或天德月德日。於淨室焚香修製。凡奇怪

之病。屢用如神。效驗不可盡述。醫家大家皆不可一日無之。

三解毒丸二百 治誤食毒草。或中蠱毒。并百物毒。救人於必死。

板藍根洗淨曬貫眾去毛青黛研生甘草各一 右為末。煉蜜丸。桐子大。另以青黛為末。如

稍覺精神恍惚。即是誤中諸毒。急取十五丸嚼爛。用新汲水送下。即解。或用水浸蒸餅丸。尤

佳。

藍根散二百 解毒藥。熱藥諸毒。 右先將二根。以水一碗。煎至七分。去渣。次入後

藍根洗蘆根洗綠豆研 澱粉一合

藥和勻。分三服。或一二服。利下惡物。不效。再服。

白扁豆飲二百 解毒毒入腹及砒毒。 用白扁豆不拘多少為細末。入青黛等分細研。再入甘草末少許。巴豆一枚去殼不去油。別

研為細末。取一半入藥內。外以砂糖一大塊。用水化開。和藥共成一大盞。飲之。毒隨利去後。卻服五苓散之類。

八毒赤丸_{二百}

方在攻陣百四。治一切邪祟鬼疰等證。

飲食中毒_{二百}

凡中飲食毒。而覺煩熱脹滿者。急用苦參三兩。苦酒一升半。煮半沸。陸續飲

之。吐食出即瘥。○或以水煮亦得。○或用犀角湯亦可解。

中酒毒_{二百}

飲酒中毒者。經日不醒是也。謂之中酒。

黑豆一升。煮汁溫服一盞。不過三盞。即愈。

解麵毒_{二百}

只以蘿蔔生啖之。或搗汁服之。麥麵大熱。蘿蔔能解其性。或用大蒜嚼食之。亦

善解麵毒。

解一切食毒_{二百}

解一切飲食之毒。及飲酒不知中何毒。卒急無藥可解者。

薺芫生甘草_{各二兩}

右剉細。以水五盞。同煎取二盞。停冷去滓。分三服。○一方加蜜少許。

同煎服之。解一切毒。

食魚中毒_{二百}

凡食魚後中毒物煩亂者。用陳皮濃煎汁服之。即解。

河豚毒_{二百}

五倍子 白礬 等分 右為細末。水調服之。○一方。凡中河豚魚毒。一時困殆。倉卒無藥。急以清油多灌之。使毒盡吐出即愈。

解河豚魚膾及食狗肉不消脹滿毒

二一

蘆柴根鮮者搗汁飲之乾者煎汁溫飲之

解食鱈魚鮑蠃蝦蟆自死禽獸等毒

二一

豆豉一合新汲水煎濃燉溫服之可解

中蠶毒

二一

凡食蠶中毒用紫蘇葉濃煮汁飲之或用紫蘇子搗汁飲之亦良或搗藕汁或搗蒜汁飲之俱可解或用冬瓜汁或食冬瓜亦可

食牛馬中毒

二一

粉草搗無灰酒服當吐瀉若渴者不可飲水飲水必死○一石淡豆豉搗入乳服之即解

食雞子毒

二一

好醋飲之即愈未愈再服

食斑鳩毒

二一

葛粉二合水調服可解薑湯調服亦解

解花椒毒

二一

有服川椒氣閉欲絕者冷水飲之解地漿水更效

解諸菜毒

二一

食後多腹脹者是毒也以醋解之

二一

忍冬葉生啖之愈或煎濃汁飲之○崇寧間蘇州天平山白雲寺僧五人行山間得草一叢

甚大。摘而食之。發吐。二人急採鴛鴦草生啖之。即愈。二人不甚吐至死。此即忍冬藤。亦名金銀花。亦名鴛鴦藤也。

解巴豆毒

二二

其證口乾兩臉赤。五心熱。下利不止。

乾薑

地黃連 微炒各等分

石為細末。每服二錢。水調下。如人行五里許。再服。○又方。煮綠豆湯。

冷服之。即愈。

○一方。黃連甘草煎汁涼飲之。○一方。芭蕉根葉搗汁飲之。利止而安。

解砒毒

二二

凡中砒毒者。其人煩躁如狂。心腹絞痛。頭眩嘔吐。面色青黑。四肢逆冷。六脈洪

數。飲食中得者為易愈。若空心酒醋服者難挽。以地漿水燉服。若吐出。又服。所謂洗淨腹

中毒。全憑地上漿是也。○其法掘地成坑。以水灌注。攪成泥水飲之。謂之地漿。○又方。解

砒毒最良。此為第一。用生綠豆半斤。搗粉。入新汲水攪和。去渣取汁飲之。○又方。用新鮮

羊血鴨血飲之。皆可解。○一方。用甘草汁同薑汁飲之。即愈。

鈎吻毒

三二

鈎吻生池傍。與芹菜相似無他異。惟莖有毛。以此別之。誤食殺人。解之之法。用

薺花八兩。水六升。煮取二升。分溫二服。此即甜桔梗也一方。用桂湯效。

解附子等藥毒

二二

凡服附子酒多。而覺頭腫唇裂血流。或見內熱諸證。急用綠豆黑豆嚼服。

或搗汁飲之。或濃煎二豆湯常飲食之。○凡服散風藥過多。以致悶亂不省。以醋灌之。或濃

煎甘草。同生薑自然汁燉飲之。○一方。大豆汁。錫糖麥湯。並能解附子毒。○一方。用田螺搗

碎。調水飲之。

解烏頭草烏毒_{二二}

甘草煎濃湯服之。○或米醋調沙糖俱可。

解半夏毒_{二二}

生薑搗汁取之。有中此毒。口不能言。倒地將死者。速用薑汁灌之。須臾自甦。

解斑蝥芫青毒_{二二}

豬脂油和大豆汁飲之。

解黎蘆毒_{二二}

雄黃為末。溫酒調服一錢。○一方。煮蔥汁服。

解雄黃毒_{二二}

漢防己煎湯飲之。○有用雄黃搽瘡。或薰陰囊。瘡受毒者。防己煎湯洗數次愈。

解杏仁毒_{二二}

藍子研水服則解。

解服丹毒_{二二}

地漿服之為上。○一方。用蚌肉食之良。

解中藥箭毒_{二二}

交廣黎人。以焦銅作箭。中人破皮即死。糞清飲之立解。患處以糞塗洗之。

解鹽鹵毒_{二二}

凡婦女有服鹽鹵垂危者。急取活鴨或雞。斬去頭。將頭塞口中。以熱血灌之。

可解若酒多者必數隻方足盡收其鹹毒。

解毒毒

一州牧以生漆塗囚眼囚即言道一村叟見而憐之語之曰汝急尋蟹搗碎取

汁滴眼內漆當隨汁流散瘡亦愈矣如其言竟得一小蟹用之目睛果愈略無損○或成紅斑爛瘡取生蟹黃塗之不數次即愈○一方用杉木煎汁洗之

以下毒方

解虎傷毒

麻油一掬飲之即無妨仍用葛根湯洗傷處綿拭乾香油塗之再以青布作

條燃火入竹筒中放烟薰傷處口渴者沙糖調水飲之

蛇毒

凡被蛇傷即用鍼刺傷處出血用雄黃等藥敷之仍須中留一孔使毒氣得泄乃

內服解毒藥○凡傷處兩頭俱用繩扎縛庶不致毒氣內攻流布經絡○一方治毒蛇咬

傷急取三七搗爛卷之毒即消散神妙無比○一方治蛇蟲傷毒用五靈脂雄黃等分為末

每服二錢酒調服仍敷瘡留口如乾燥須以油潤之○凡居山野陰濕之處每用雄黃如桐

子大一丸燒烟以薰衣袍被褥之類則毒不敢侵百邪皆遠避矣○一凡蛇入七竅急以艾

灸蛇尾又法以刀破蛇尾少許入川椒數粒以紙封之蛇自出即用雄黃硃砂末煎人參湯

調灌之或食蒜飲酒內毒即解○一山居人被蛇傷急用溺洗咬處拭乾以艾灸之立效○

又方用獨頭大蒜切片置患處以艾於蒜上灸之每三壯換蒜多灸為妙凡被毒蛇所傷

皆效○肘後方用小蒜搗汁服渣敷傷處

雄黃辟蛇毒_{七三}

南海地多蛇。而廣府尤甚。某侍郎為帥。聞雄黃能禁制此毒。乃買數百兩。

分貯絹囊。掛於寢室四隅。經月餘。一日卧榻外。常有黑汁從上滴下。其甚。使人穿承塵窺之。則巨蟒橫其上。死腐矣。於是盡令撤去障蔽。蛇死者長丈許。大如柱。傍又得十餘條。皆蟠蛇成窠。并他屋內所驅放者。合數百。自是官舍清寧。

風犬傷人_二

_三

急於無風處。咬出瘡口惡血。如或無血。則以針刺出血。用小便洗淨外。用香

油調雄黃少加麝香敷之。○一凡遇惡犬咬傷。如倉卒無藥。即以百草霜麻油調敷。或用葱搗爛貼之。牛糞敷之。或蚯蚓糞敷之。或口嚼杏仁爛敷之。皆能救急。如少延緩。恐毒氣入經為害。○一方。拔去頂上紅髮。急令人吮去惡血。以艾灸傷處五七壯。甚者灸百壯。神效。○一

方。用米泔水洗淨。沙糖敷之。○一方。用杏仁炒黑。搗成膏貼之。

避犬法_九

_{二三}

瑣碎錄云。凡行道遇惡犬。即以左手大姆指搗寅上。吹氣一口。輪至戌上。搗之。犬即退伏。

糯米散_四

_{二百}

治風犬傷毒。

大班蠶_五

_{二十一}

右用糯米一撮。先將班蠶七個。入米內慢火炒。勿令焦。去殼。又入七個

炒令焦色變。又去之。再入七個炒。未出赤烟為度。去殼不用。只將米研為末。分三分。冷水入

香油少許。空心調下一服。須臾又進一服。以二便利下惡物為度。若腹痛急。以青靛調涼水

解之。或先用黃連甘草煎湯。待冷服之。不可食熱物。或用涼水調益元散解之。甚妙。甚者飲

解之。或先用黃連甘草煎湯。待冷服之。不可食熱物。或用涼水調益元散解之。甚妙。甚者飲

身禁食犬肉。每見食犬肉而復作者。不救。又見單服班蝥而死者。亦有之。蓋班蝥毒之尤者。雖曰以毒攻毒。惟少用之。茲用糯米以奪其氣。尤宜豫備青靛黃連以解其毒。而況單服班蝥者。豈有不死。

寶定風散^{二四} 治諸犬傷毒。

南星^{生用} 防風^{等分} 右為末。凡被犬咬。先以口含漿水吮洗傷處。或小便鹽湯俱可洗淨。

用綿拭乾。方上藥末。即不發。○或用製過南星一二錢為末。以童便調下。亦可治破傷風。

諸犬咬蟲傷灸法^{二四} 凡狼犬蛇蠍蜈蚣諸傷。痛極危急。或因傷受風。而牙關緊閉。腰背反

張。不省人事者。速切蒜片。或搗爛罌傷處。隔蒜灸之。或二三十壯。或四五十壯。無不應手而

愈。取效多矣。故本草謂蒜療瘡毒。有回生之功。夫精在腸胃。尚為難療。況四肢受患。則經絡

遠絕。藥不易及。故古人有淋洗灸刺等法。正為通經逐邪。導引氣血而設也。

解毒散^{二四} 一名國老飲。治蟲毒及一切蛇蟲惡獸所傷。重者毒氣入腹。則眼黑口噤。手

足強直。此藥平易。不傷元氣。大有神效。不可以易而忽之也。

明礬 甘草^{各一兩} 右為末。每服二錢。不拘時。冷水調下。亦可敷患處。

治馬咬傷^{二四} 毒氣入心則危。

馬齒莧搗爛煎湯服。外以栗子嚼敷患處。

蜈蚣毒^{二四} 以鹽擦咬處。或鹽湯洗傷處。痛即止。○用後蝎螫方最妙。已試。○一衣用吳茱

黃嚼爛擦之。或取井底泥傅之。

解誤吞蜈蚣方

二四

昔有婢用火筒吹火。不知內有蜈蚣。向火一吹。蜈蚣驚竄入口。不覺下

喉。求救人無措手。適有人云。取小雞一隻。斷喉取血。燉飲之。復灌以香油。取吐。蜈蚣隨出。

蝎螫毒

二四

用生半夏白礬等分為末。以醋和敷傷處。亦治蜈蚣傷。無白礬亦可。○又蝎怕膽礬。蛇怕雄

黃。徐春甫云。親見蝎螫腫痛。用膽礬擦之。立消。可見南方人家不可無雄黃。北方人家不可

無膽礬。此製蠟第一藥也。

解蜂螫毒

二四

以小便洗擦拭乾。以香油塗之。○或以雄黃末擦之。○或以蝎螫方治之。

治鼠咬毒

二四

貓毛燒存性。入麝香少許。香油調敷傷處。則不害。

治誤吞水蛭

二四

昔一人夜間飲水。誤吞水蛭入腹。經停日久。復生水蛭。食入肝血。腹痛不

可忍。面目黃瘦。全不進食。不治必死。方用田中泥一塊。小死魚三枚。同猪膏溶搗勻。再用巴

豆十粒。去油。同魚膏四味搗勻。丸如綠豆大。用田中冷水吞下。大人五七丸。小兒三丸。須臾

瀉下水蛭盡。卻用八珍湯調理。

中蛇蝎毒

二五

石灰泡熱水涼洗患處。久浸之則愈。○小兒多受蛇蝎毒。則陰莖及囊俱腫如水泡。用鴨血

塗之或以鴨口含少時則消。○一方用鹽湯溫洗之即效。

治蠶咬毒_{二五}

蠶咬人毒入肉中令人發寒熱。

芫葉搗敷之汁塗之。今治蠶家以芫近蠶則蠶不生發也。

解蜘蛛咬毒_{二五}

薑汁調胡粉敷瘡口。或用清油搽之內飲羊乳。本草云蜘蛛咬人令人一身生絲惟羊乳

飲之可解。貞元十年崔員外從質云。目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕。其家棄之乞食於道。一

僧遇之教飲羊乳未幾日而平。

青囊神授散_{二五}

治傳屍勞瘵血氣未甚虛損者不必多方。只以此藥早服則蟲自不能為患。

無有不愈者。此方得之河南郡王府。濟世之功不可盡述。

川椒_{三升去合口}

右為細末空心未飲調服二錢。或酒煮米粉糊為丸桐子大每服三十

丸以漸增至五六十丸。或用酒送。

解射工溪毒_{二五}

葱白散。○治溪澗中射工蟲。專射行人形影。人中其毒則病如瘡狀。或若

傷寒。俗云沙發中之深者死。急用後方治之。

葱白_{一握}

豉_{半升} 葛根_{二兩} 升麻_{七錢}

右剉如豆大。每服四錢。水二盞煎一盞去滓。不

拘時溫服。移時再服。

千金雄黃散_{二五}

治時氣病壘下部生蟲。

雄黃 半兩 桃仁 一兩 青箱子 黃連 苦參 各三 右五味為末。綿裹如棗核大。內下部。亦

可用棗汁服。方寸匕。日三服。

針治大孔蟲瘻方_{二五}

用大棗蒸爛為膏。以水銀和捻長二三寸許。綿裹內大孔中過宿。明旦蟲皆出。但水銀損腸。宜慎之。○愚按此方。水銀不必生用。但如治頭風法。燒烟以棗肉拌之。用必更妙。○頭髮生虱方。在新因五三。

雄麝散_{二五} 治五種蟲毒

明雄黃 麝香 各一_字 用生羊肺一指大。以刀切開。安藥在內。吞下。

醫丹砂丸_{二五九} 治蟲毒

雄黃 砂_{各另研} 藜蘆 略炒 鬼臼 巴豆霜 各二 右為末。煉蜜丸。桐子大。每服二丸。空心薑

湯下。當利惡物並蟲毒。如煩悶。以鴨血為羹食之。

良方七寶丸_{二百六十} 治蟲毒

敗鼓皮 蠶退紙 刺蝟皮 各燒存性 五倍子 少續隨子 硃砂 另研 雄黃 另研 右為細末。糯

米粥丸。小豆大。每服七丸。空心白湯下。

蜜髓煎_{二六} 治中蠱令人腹內堅痛。面目青黃。病變無常。

真蜜 一盤 豬骨髓_{五兩} 右同煎熟。分作十服。日三服。即瘥。

歸魂散_{二六}

凡初中蠱毒在膈上者當用此藥吐之

白礬

建茶_{各一兩}

右二味為細末每服五錢新汲水調下。嗽服之一時久當吐毒出。若此

藥入口其味甘甜並不覺苦酸者即其證也。

麥麩散_{二六}

治中蠱毒吐血

用小麥麩二合分為三服以冷水調下。半日服盡當下蠱即瘥。

桃生蠱毒簡易方_{二六}

一方明礬芽茶等分為末涼水調三錢。一方青藍汁頻頻服半合則解。一方石榴皮煎

汁飲之當吐出活蟲而愈。

以下雜方

嗽烟筒_{二六}

治一切犯寒咳嗽遇寒便作

款冬蕊

鵝管石

雄黃

艾葉_{各等分}

右為末鋪瓦上用紙捲筒燒烟吸入口內吞下即

嗽茶水一口壓之自效。一方有佛耳草無艾葉用紙捲成條每切一節約長三五分許焚

爐中吸烟嚥之

靈膏烟筒_{二六}

治一切寒喘咳嗽

黃蠟

雄黃_{各三錢}

佛耳草

款冬蕊_{各一錢}

艾葉_{三分}

先將蠟溶化塗紙上。次以艾鋪之將

三味細研勻。摻糝成筒用大點一頭吸烟吞之清茶送下。

七寶美髯丹

補腎元鳥鬚髮延年益壽

何首烏赤白各一斤川牛膝半斤附何首烏先用米泔水浸一日以竹刀刮去粗皮切作大片用

取起曬乾次日如前換豆再蒸如此七次去豆殼為度破故紙半斤洗淨用黑芝蔴同白茯苓半斤

曬乾蒸熟赤茯苓半斤用黑牛乳當歸身酒洗枸杞子半斤去右共為末煉蜜九龍眼

大每日空心嚼二三丸溫酒米湯鹽湯俱可送下○製藥勿犯鐵器○按此即七珍至寶丹

少兒絲子一味

北京烏鬚方

兩京各處烏鬚者惟此方頗好用之雖未至簡效然不壞鬚傷肉製用得

法者可黑一月

五梧子擇川中之大者打碎粒分粗細為二先將粗者於鍋內用文火炒成糊次入細者

火炒則青黃白烟間出即可取出先以真青布一大片浸濕將梧子攪在布上用紅銅花用細

色皮一團用脚踏成餅工用濕泥一抔會一夜如鳥利為妙磁器收貯聽用右每次

以化盡為度去醋取銅花曬乾皂礬明礬各三分沒石子食鹽各二分研砂淨一分

藥時旋配旋用以製梧子二錢用則加銅花四分餘皆一二分和勻作一服研細以濃茶汁

或燒酒用磁鍾調如稀糊坐湯中煮之看鍾內綠氣生面為佳先用皂角湯洗鬚淨拭乾以

抵柄塗上用皮紙搭濕色之或以青布囊裏之過夜次早溫水洗之如不潤用胡桃油擦指

潤之一連染二夜其黑如漆亦效

擦牙烏鬚方九先期而擦者永久不白

青鹽一斤 嫩槐枝葉五斤 黑鉛四兩 沒石子七錢 右將黑鉛青鹽入鍋內槐枝槐葉俱成
灰炭取起將沒石子研細末和入用磁罐盛之每日早晚以藥擦牙漱水吐掌上擦鬚鬢久
久自然潤黑。

便易擦牙方二百七十

用五倍子大者一百個裝食鹽一斤鋪在鍋內大火燒過存性為末每日擦之久則鬚鬢皆

黑。

丹 疝氣神方二十七 其病甚至氣上衝如有物築室心臟欲死手足冷者二三服除根

陳皮 荔枝核為末炒 硫黃火中溶化即投水中 右為末飯丸桐子大每服十四五丸酒

下其疾立止若疼甚不能支持略加五六丸再不可多也。

神仙六子丸二十七 男子三十歲後服此藥一歲二次製服不息永不白鬚髮四十以上或見

微白及少年髮黃不潤者服此百日自然漆黑其效如神

兔絲子製 金鈴子 覆盆子 五味子 蛇床子炒各一兩 何首烏酒浸蒸牛膝酒浸熟地酒蒸

地骨皮各三兩 舶上茴香鹽炒 川木瓜各二兩 右十二味為細末用浸兔絲酒作糊為丸桐子

大每服五七十丸食前溫酒或白湯送下。一方加人參白朮白茯苓各一兩尤有神效服

此大忌三白。

四製川棟子丸二十七 治疝氣一切下部之病悉皆治之凡腫痛縮小雖多年亦可除根

川棟子淨肉一斤分四分內一分用鹽一兩茴香一合同炒黃色去鹽香不用外三分一分用巴豆四十九個一分用斑髮四十九個一分用已戟一兩仍各加參麩一合同炒黃色俱去木香一兩破故紙一兩右為末酒糊丸梧子大每服五七十九鹽湯送下甚者每藥不用

日進二三服或空心或食前

木香導氣丸四

治男子小腸氣肚疼一切氣積下元虛冷脾胃不和並宜服之有效

木香 丁香

乳香 香附 川棟子肉 大茴香 破故紙 葫蘆巴炒甘草炙三稜各

兩杜仲炒半

右為細末酒糊丸梧子大每服三五十九加至七八十九用溫酒或鹽湯食

前送下日進二三服

去鈴丸五

治疝消鈴

用大茴香一升以老生薑二斤取自然汁浸茴香一宿以薑汁滲盡為度入好青鹽二兩同炒亦取出焙乾為末用無灰酒浸蒸餅為丸桐子大空心食前酒下二三十丸或米飲亦可

○此方實脾疎肝所以治疝多效非如常法之尅伐故為妙也

事後中寒腹痛方六 凡房事後中寒厥冷嘔惡腹痛者用蔥薑搗爛衝熱酒服之睡少頃

出汗即愈○如腹痛甚者以蔥白頭搗爛攤臍上以艾灸之或熨之亦可得鼻共有汗其痛

即止

溼症陰丸作痛七

蕪艾 紫蘇葉烘乾 川椒炒熱各

右三味拌勻乘熱用絹袋盛夾囊下勿令走氣冷即易

之

薰髮脫肛方^{二七} 治氣瘡脫肛。

枳殼^{剉炒} 防風^{去又各} 桔槿^{二錢}

之通手即淋洗。

右噉用水三碗煎至二碗乘熱薰之仍以軟帛熱湯熨

薰手脫肛方^{二七}

用赤皮葱薑菜二味各帶根者煎湯入大楓子防風末各數錢乘熱薰洗

立收上○一方用五倍子煎湯洗以赤石脂末摻上托入或脫長者以兩林相並中空尺許

以磁瓶盛湯令病人仰卧浸瓶中遂日易之收盡為度○又濕腸散方在小兒五四

參朮芎歸湯^{二百} 治瀉痢產育氣虛脫肛脈濡而弦者

人參 白朮 川芎 當歸 黃耆^{酒炒} 山藥^炒 白芍藥 白茯苓 升麻 炙甘草 右

生薑水煎服○按此方若治泄痢虛滑脫肛仍須加製附子肉豆蔻方效

涼血清腸散^{二八} 治大腸血熱脫肛

生地黃 當歸 芍藥^{各錢} 黃芩 黃連 防風 荆芥 升麻^{各一錢} 香附 川芎 甘草

縮砂散^{二八} 治大腸伏熱脫肛紅腫

縮砂仁 黃連 木賊^{等分} 右為細末每服二錢空心米飲調下

高子人參湯^{二八} 治證同前

此方... 上海廣益書局印行

訶子根去核 人參 白茯苓 白朮 炙甘草 蓮肉 升麻 柴胡等分 水一鐘半。加生薑煎服。

瀉腸散二八 治久痢大腸滑脫。

訶子 赤石脂 龍骨等分 右為末。以臘茶少許。和藥搽腸頭上。用絹帛搽入。○又方用

蟹頭煨存性。入枯礬少許。如上搽入。

蟾腸散二八 治陽發脫肛腫痛。

地龍曬乾風化硝二兩 右為末。每用一二錢。肛門溼則乾搽。燥則清油調搽。先以見履清

荆芥生葱煮水候溫洗。輕輕拭乾。然後敷藥。

伏龍肝散二八 治陰症脫肛。

伏龍肝一兩 蟹頭骨五錢 百藥煎二錢 右為末。每用一二錢。濃煎紫蘇湯。候溫洗過。以清

麻油調藥。敷如前法。

獨蒜通便方二八 治小便不通。

獨蒜一枚 梔子三枚 鹽花少許 右搗爛攤紙上。貼臍良久即通。未通塗陰囊上立通。

小便不通經驗方二八

以朴硝為末。每服二錢。空心煎茴香湯下。○又方。用蚯蚓杵。以涼水濾過。覆服半碗。立通。大

解熱疾。不知人事欲死。服之甚效。

小水不通葱熨法九二八

用葱三斤慢火炒香熟以絹帕裹更替熨臍下即通或用鹽炒熟熨之冷則再易須臾即通

雞內金散九二九 治氣虛瀉尿

用雄雞股脰并腸燒為末溫酒調服

狐腋氣五方二九 治陰汗臭兩腋下臭不可與人同行

枯白礬 蜜陀僧 黃丹各二錢 麝香五分 右於乳鉢內研細以醋於手心內調藥搽腋下

經兩時許即以香白芷煎湯洗之一日用一次

又治腋氣神效方 蜜陀僧四兩 枯白礬二兩 輕粉三錢 右為細末頻搽兩腋搽至半月見效半年全愈

又腋氣方 用熟蒸餅一枚擘作兩片搽蜜陀僧細末一錢許急挾在腋下略睡少時候冷

棄之如一腋有病只用一半葉元方平生苦此疾來紹興偶得此方用一次遂絕根本

又腋氣方 單用枯礬為極細末以絹袋盛之常以撲於腋下不過十度即愈一方以唾調塗之

又腋氣方 先剃去腋毛令淨用白定粉水調搽數患處至六七日後清晨看腋下有一黑

點如針孔大者以筆點定即用小艾炷灸七壯灸過或有濁氣攻心作痛者當用後藥下之

丁香 青木香 檳榔 檀香 麝香 大黃 右煎服以下為度

腳汗牡蠣散_{二九} 治腳汗除穢氣

牡蠣_煨 枯白礬 蜜陀僧 黃丹 等分 右為細末每用少許乾摻腳指縫中即收

燥囊牡蠣散_{二九} 治陰囊濕癢搽之則汁水流珠用此極效

牡蠣_{酒煨} 雄黃 一錢 枯礬 硫黃 苦參 蛇牀子_{各二錢} 右為細末先用蒼木椒鹽煎湯

洗溼處後用此藥摻之

蒸洗陰囊法_{二九} 治一切陰囊溼癢

陳茶_{一撮} 蒼木_{二錢} 花椒 蛇床子 白礬_{各一錢} 蒼耳草_{量入} 炒鹽_{半兩} 朴硝_{三錢} 右用

水四碗先將前五味煎湯去滓乃入後三味泡化先薰後洗三四次絕癢

梅蘇丸_{二九}

龍腦薄荷 粉草 冰糖_{各四兩} 烏梅肉_{二兩} 白檀香 紫蘇葉_{各二兩} 右為極細末以熟棗

肉搗丸芡實大勿用鐵器

冰梅丸_{二九}

龍腦薄荷_{二兩} 白糖 柿霜_{各四兩} 烏梅肉 桔梗_{各五錢} 兒茶_{三錢} 甘草_{一錢} 冰片_{一分} 右

為極細末煉蜜丸龍眼核大

龍腦上清丸_{二九}

烏梅肉 腦荷_{各四兩} 白檀香 蘇葉 兒茶 礪砂 沙糖_{各二兩} 冰糖 柿霜_{各八兩} 乾葛

粉草各一兩 冰片三分 右為極細末。蜜丸。櫻桃大。

上清丸二九 佳方。

腦荷二兩 雨茶 白礪砂七錢 烏梅肉 貝母 訶子各三錢 冰片三分 煉蜜丸。

辟邪丹二九 方在痘疹百三十。辟一切穢寒邪氣。

福建香茶餅三百 能辟一切瘴氣。時疫傷寒穢氣。不時噙口中。邪氣不入。

沉香 白檀各一兩 兒茶二兩 粉草五錢 麝香五分 冰片三分 右為極細末。糯米調飯湯為

丸。黍米大。噙化。

香髮木穉油三百

採桂花半開者。去萼蒂令淨。每花二升。用真麻油一斤。輕手拌勻。納磁瓶中。用油紙緊封器口。坐釜中湯煮一餉。持起頓燥處。十日後取出。用麻布濾絞清油。封閉緊密收之。愈久愈香。

○或用菜子油亦可。

玉容散三百 治面生黑點雀斑。

甘松 三奈 茅香各半兩 白芷 白芨 白歛 白礬 白附子 天花粉 綠豆粉各

兩 防風 零陵香 藜本各二錢 肥皁三錢 去 右為細末。每早晚蘸末洗面。

硫黃膏三百 治面部生瘡。或鼻赤風刺粉刺。

硫黃 白芷 天花粉 水粉各五分 全蝎一枚 蟬蛻五個 芫青七個 去 右為細末。用麻油

黃蠟約多寡。如合面油熬勻。離火方入前未藥和勻。每於臨卧時洗面淨。以少許塗面。勿近眼。數日間腫處自平。亦鼻亦消。如退風利。一夕見效。

加批
詳評景岳全書

卷六十一

長集

會稽張介賓會鄉著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

婦人規古方

婦人

安胎飲一 治妊娠五七個月。用數服。可保全產。

人參

白朮

當歸

熟地

川芎

白芍藥

陳皮

甘草

紫蘇

炙黃芩

各一

右用薑水煎服。一方有砂仁。

安胎散二 治妊娠卒然腰痛下血。

熟地

艾葉

白芍

川芎

黃耆

阿膠

當歸

甘草

地榆

各一

右加薑棗水煎服

泰山盤石散三

治婦人血氣兩虛。或肥而不實。或瘦而血熱。或脾肝素虛。倦怠少食。屢有墜胎之患。此方平和。兼養脾胃氣血。覺有熱者。倍黃芩。少用砂仁。覺胃弱者。多用砂仁。少加黃芩。更宜戒怒。事惱怒。遠酒醋辛熱之物。可永保無墜。徐東臯曰。婦人凡懷胎二三月。月慣

要墜落。名曰小產。此由體弱氣血兩虛。藏府大多。血分受熱。以致然也。醫家又謂安胎多用

艾附砂仁。熟補。尤增禍患。而速其墜矣。殊不知血氣清和。無火煎燥。則胎自安。而固氣虛則

要墜落。名曰小產。此由體弱氣血兩虛。藏府大多。血分受熱。以致然也。醫家又謂安胎多用

提不住。血熱則溢妄行。欲其不墜得乎。香附雖云快氣開鬱。多用則損正氣。砂仁快脾氣。多用亦耗真氣。沉香燥之性。氣血兩傷。求以安胎。適又損胎而反墜也。今惟泰山磐石散于金保孕丸二方。能奪化工之妙。百發百效。萬無一失。故表而出之。以為好生君子共知也。

人參 黃耆 當歸

川續斷

黃芩

一川芎

白芍藥

熟地

各八分

白朮

二錢

炙甘草

砂仁

各五分

糯米

一握

水一鍾半

煎七分

食遠服

但覺有孕

三五日

常用一服

四月之後

方無慮也。

方無慮也。

地黃當歸湯

一名內補丸

○治妊娠衝任脈虛補血安胎。

熟地

二兩

當歸

一兩

右每服五錢

水煎服

○為丸法

以當歸炒為末

熟地蒸搗膏和丸

桐

子大每服百餘丸

溫酒或滾湯下

○許學士曰

大率妊娠惟在抑陽助陰

然胎前藥最忌陰

陽雜亂致生他病

惟枳殼湯所以抑陽

四物湯所以助陰耳

然枳殼湯其味多寒

若單枳殼

致胎寒腹痛

更以內補丸佐之

則陽不致強

陰陽調和有益胎嗣

此前人未嘗論及也

良當歸湯

五

治胎動煩躁

或生理不順

唇口青黑

手足厥冷

當歸

人參

各二錢

阿膠

炒

甘草

各一錢

連根葱白

一握

右水四碗

煎四味至半

去滓

下葱

再

煎

一碗

分二服

良阿膠散

六

或跌仆

或因毒藥

胎動不安

或腸痛腹痛

上搶短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃耆

炙甘草

等分

右每服四錢

薑棗水煎

良阿膠散

六

或跌仆

或因毒藥

胎動不安

或腸痛腹痛

上搶短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃耆

炙甘草

等分

右每服四錢

薑棗水煎

良阿膠散

六

或跌仆

或因毒藥

胎動不安

或腸痛腹痛

上搶短氣

阿膠

艾葉

當歸

熟地

川芎

白芍

黃耆

炙甘草

等分

右每服四錢

薑棗水煎

方膠艾湯 七 治枉根跌仆胎動不安腰腹疼痛或胎上擔或去血腹痛○又金匱膠艾湯在

後九十三

阿膠兩艾葉數莖 右二味以水五升煮取二升分三服

七味阿膠散 八 治胎動腹痛

阿膠炒白茯苓 白木炒川芎 當歸 陳皮各一錢 甘草炒三 右薑棗水煎服

根黃耆湯 九 治氣虛胎動腹痛下水

糯米一合黃耆炒川芎各一兩 右水煎分三服

根鉤藤湯 十 治枉根胎動腹痛面青冷汗氣欲絕

鉤藤鈎 當歸 茯神 桑寄生 人參各一錢 苦梗一錢 右水煎服○如有煩熱加石膏

根白木散 十一 治枉根傷寒內熱等證

白木 黃芩炒各二錢 右用薑棗水煎服○若陰證者不可用

根三味白木湯 十二 治枉根內熱心痛

白木四錢赤芍鈎三錢黃芩炒二錢 右水煎服○忌桃李雀肉

根四味白木湯 十三 治枉根胃虛惡阻吐水甚至十餘日漿粥不入

白木鈎人參五分甘草炒丁香各二分 右薑水煎服

全生白木散 十四 治枉根面目虛浮四肢腫如水氣名曰胎腫

白木一兩 生薑皮 大腹皮 陳皮 白茯苓各半 右為末每服二錢末飲下。○如未應佐以人參甘草。

探胎飲十五 婦人經水不來三月疑似用此驗之。

川芎不拘多少為木不見火 空心煎艾湯調下方寸七。覺腹中動則有胎也。臍之下動者乃血瘀也。

不動者血凝也病也。

當歸芍藥湯十六 治妊娠心腹急痛或去血過多而眩暈。

當歸 白芍藥少 白朮少 茯苓 澤瀉各一錢 川芎二錢 右水煎服。

益母地黃湯十七 治妊娠跌墜腹痛下血。

生地 益母草各二錢 當歸 黃耆各一錢 右薑水煎服。

良獨聖散十八 治妊娠有所傷觸激動胎元腹痛下血極效。

砂仁不拘多少帶皮同炒勿令焦黑取仁為末 右用熱酒調服四五分或一錢。○此物有安胎導滯易產之功。

實妊婦之要藥也。

狼安胎寄生湯十九 治妊娠下血或胎不安或腰腹作痛。

桑寄生 白朮 茯苓各五錢 甘草一錢 右水煎服。

二黃散二十 治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈或煩躁作渴或脇肋脹痛等證。

生地 熟地各等分 右為末每服三錢煎白朮枳殼湯下。

四聖散 二一 治漏胎下血

條芩 白朮 砂仁 阿膠各等分 右為細末。每服二錢。艾湯調下。○一衣有芍藥。無阿膠。

○按此方若改為湯。砂仁用當減半。

良續斷湯 二二 治妊娠下血尿血

當歸 生地黄各一續斷 赤芍藥各半 右為末。每服二錢。空心用葱白煎湯調下。

枳殼湯 二三 治胎漏下血。或因事下血。亦進食和中。并治惡阻。

枳殼炒 黃芩炙各半 白朮炒一兩 右為末。每服一錢。白湯調下。○前四證。若因脾胃虛弱。宜用

補中益氣湯加五味。○若因脾胃虛弱。宜用前湯倍加升麻柴胡。○若因肺熱內熱。宜用逍

遙散。

滑胎枳殼散 二四 此方能令胎瘦產易。○湖陽公主每產累日不下。南山道人進此方。

粉草炒一兩 商州枳殼炒二兩 右為末。每服二錢。空心沸湯調。日三服。凡孕六七月宜服之。○

溫隱居方。加當歸廣木香等分。○或加香附一兩亦可。

枳殼散 二五 方在寒陣百一。治婦人血熱氣滯。經候不調。

針鯉魚湯 二六 治妊娠腹脹。胎中有水氣。遍身浮腫。小便不利。或胎死腹中。皆效。

當歸 芍藥各一錢 白朮一錢 茯苓一錢 橘紅五分 鯉魚一尾 右作一服。將鯉魚去鱗臟。

白水煮熟。去魚用汁。鍾半入藥。加生薑五片。煎一鍾。空心服。當見胎水下。如水未盡。胎死腹

中。脹滿未除。再制一服。水盡。脹消。自已。

竹葉湯 二七

治妊娠心驚。臍怯。煩悶不安。名曰子煩。○一方有當歸。防風。梔子仁。

白茯苓

麥門冬

黃芩 各三

右每服四錢。竹葉五片。水煎服。○若因血虛。煩熱。宜兼用

四物。○若因中氣虛弱。宜兼用四君。

紫蘇飲 二八

治妊娠失調。胎氣不安。上疔作痛。名曰子懸。或臨產氣結不下等證。

大腹皮

川芎

白芍藥

陳皮

蘇葉

當歸 各一

人參

甘草 各半

右每服一兩。薑

蔥水煎服。○一方有香附。無人參。○若肝脾氣血虛。而有火不安。宜兼逍遙散。○若脾氣虛

弱而不安。宜用四君芎歸。

安榮散 二九

治妊娠小便澀少。遂成淋瀝。名曰子淋。甚妙。

麥門冬

通草

滑石

當歸

燈心

甘草

人參

細辛 等分

右水煎服。○一方。人

參細辛。加倍為末。每服二錢。麥冬湯調服。○若因肺經鬱熱。宜用黃芩清肺飲。○若因膏粱

厚味。宜用清胃散。○若因肝經濕熱。宜用加味道遠散。

天仙藤散 三十

治妊娠三月後。足指發腫。漸至腿膝。飲食不甘。狀似水氣。或腳指間出黃水。

名曰子氣。

天仙藤

洗略

香附 炒

陳皮

甘草

烏藥 等分

右每服三五錢。加生薑木瓜各三片。紫蘇

三葉。水煎食。前日進三服。○若因脾胃虛弱。宜兼六君子。○中氣下陷。須用補中益氣湯。

羚羊角散二

治妊娠虛風頭項強直筋脈掣急語言寒澀痰涎不利不省人事名曰子癇

羚羊角

獨活

秦仁

五加皮

薏苡仁

防風

當歸

川芎

茯神

杏仁

去皮

五分甘草

木香

右加薑五片水煎服

○若因肝經風熱或怒火所致須用加味道

逆散

人參橘皮湯三二

治妊娠脾胃虛弱氣滯惡阻嘔吐痰水飲食少進益胃和中○一名參橘

散

人參

陳皮

麥門冬

白木

厚朴

白茯苓

炙甘草

右加淡竹茹一握

薑水煎溫服

○若因中脘停痰宜用二陳枳殼

○若因飲食停滯宜用六君加枳殼

○若因脾胃虛空用異功散

竹茹湯三三

治孕婦嘔吐不止惡心少食服此止嘔清痰

竹茹

陳皮

半夏

茯苓

生薑

水一鍾半

粳米一撮

煎七分溫服忌羊

肉雞魚麵食

頭半夏茯苓湯三四

治妊娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏

陳皮

砂仁

白茯苓

甘草

右用薑棗烏梅水煎服一二劑後用

茯苓丸在三九

烏附湯三五

治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏附湯

治孕婦惡心阻食養胃調和元氣

烏藥 香附 藜白木 土炒 陳皮 各一人參 炙甘草 各八 水鍾半 薑三片 煎七分服 ○吐甚者 加丁香 砂仁 各七粒

千金保孕丸 三六 治妊娠腰背痛 善於小產 服此可免墮胎之患 ○此即良方杜仲丸 但彼

等分用

杜仲 四兩 同糖 川續斷 酒洗 二兩 右為末 山藥糊丸 桐子大 每服八九十丸 空心米飲下 忌酒

醋惱怒

一母丸 三七

一名知母丸 ○妊娠血熱 跌仆 胎動不安 或欲墮產

知母 炒為末

右搗棗肉為丸 彈子大 每服一丸 人參湯嚕送 或丸桐子大 每服三四丸 白

湯下 或嚕嚕之

束胎丸 三八 懷胎七八個月 恐胎氣展大 難產 用此扶母氣 束兒胎 易產 然必胎氣強盛者

乃可服

條黃芩 酒炒 勿太熟 冬月 一兩 夏月 半兩

白木 三兩 陳皮 二兩 白茯苓 七錢

為末 粥糊丸 桐子大 每服五

十丸 白湯下

茯苓丸 三九

治妊娠煩悶 頭暈 聞食吐逆 或胸腹痞悶

赤茯苓 人參 桂心 乾薑 炮 半夏 炮洗 橘紅 各一

白木 炒 甘草 炒 枳殼 炒 各

右為

末 蜜丸 桐子大 每服五十丸 米飲下 日三服 ○右原方仍有葛根 二兩 似非所宜也 用者當

酌之

達生散四十

妊娠臨月服十餘劑則易產。或加砂仁、枳殼如兼別證，以意增減。○詩云：誕彌

厥月。先生如達。註曰：先生首生也。達，小羊也。羊子易生，故以此名之。

人參 白朮 當歸 白芍 陳皮 紫蘇 各一錢 甘草 二錢 大腹皮 酒洗 水一鍾半

煎服。○一方：無當歸、白芍、白朮。

佛手散四一

一名芎歸湯，亦名當歸湯。○治產後去血過多，煩暈不省，并治一切胎氣不安。

亦下死胎。

川芎 二錢 當歸 三五錢 右咀，每用半鍾水煎服。○若腹疼，加桂。○若腹痛自汗，頭眩，少氣，加

羊肉。若不應用八珍湯。○若用下胎，當為末，以酒調服。

錢氏化湯四二

此錢氏世傳治婦人者。

當歸 五錢 川芎 二錢 甘草 三五錢 桃仁 十粒 去皮 煎地 三錢 右咀，水二鍾，煮二

枚，煎八分，溫服。一方無煎地。○附加減法。○凡胎衣不下，或血冷氣閉，血枯氣弱等證，連服

生化二三劑即下。或用此送益母丸一丸即下。蓋益母草行血養血，性善走而不傷人者也。

○一、凡婦人無論胎前產後，皆宜此藥。○一、凡血暈虛暈，加荊芥穗六七分。○一、凡產婦氣

虛氣脫，倦怠無力，加人參、黃耆。○一、凡陽虛厥逆，加附子、肉桂。○一、脈虛煩渴，加麥冬、五味

○一、氣壅有痰，加陳皮、竹瀝。○一、血虛血燥便結，加麻仁、杏仁、茯苓。○一、多汗不眠，加茯神。

東仁黃耆。上體多汗。加麻黃根。下體多汗。加漢防己。○一、煩熱。加丹皮。地骨皮。○二、口渴。如風。反張。惡寒者。加荊芥。防風。各三四分。○一、惡露未盡。身發寒熱。頭痛。腸脹。其小腹必然脹痛。加紅花。丹皮。肉桂。各三四分。玄胡一錢。○一、內傷飲食。加山楂。陳皮。砂仁。或神效參芽。○一、外傷寒濕。或加蒼朮。白朮。○一、血積食積。胃有燥糞。臍腹脹痛。加大黃二錢。○一、產後下血不止。或如屋漏水。沉黑不紅。或斷或來。或如水。或有塊。淋瀝不休。此氣血大虛之候。不可誤用寒涼。其脈浮肌者。可加附子。輩諸陽分藥。否則無救矣。○佛手散。單用當歸三錢。川芎二錢。此即其變方也。○會稽錢氏世傳曰。嘗論產證本屬血虛。陰亡陽孤。氣亦俱病。如大補則氣血陡生。倘失調則諸邪易襲。西物避芍藥之寒。四物得薑桃之炒。氣母耗散。法兼補虛。食必扶脾。勿專消導。熱不可用芩。連。恐致宿穢凝滯。寒不宜用桂附。反招新血流崩。三陽見表證之多。似可汗也。用麻黃則重竭其陽。三陰見裏證之劇。似可下也。用承氣則大瀉其血耳。聾脇病乃腎虛惡露之停。休用柴胡。謔語汗多。乃元弱似邪之證。毋同胃實。厥由陽氣之衰。難分寒熱。非大補不能回陽。症因陰血之虧。豈論剛柔。非滋營胡以潤絡。潮熱似瘧。治則遷延。神亂如邪。以邪論則立困。總屬大虛。須從峻補。去血多而大便燥。莖蒼如於生花。非潤腸和氣之能通。患汗出而小便難。六君倍用參耆。必生津助液之可利。加參生化。頻服救產後之危。活命長生。調攝須產前加意。

當歸川芎散 四三 治小產後瘀血心腹疼痛。或發熱惡寒。

當歸 熟地黃 白芍藥炒 玄胡索炒 川芎 桃仁 紅花 香附 青皮炒 澤蘭 牡丹

皮 右水煎入童便酒各小半。○若以手按腹愈痛。此是瘀血為患。宜用此藥。或失笑散消

之。○若按之反不痛。此是血虛。宜用四物參苓白朮。○若痛而作嘔。此是胃虛。宜用六君子。

○若或作瀉。此是脾虛。宜用六君子送二神丸。

加味芎歸湯四四 治分挽交骨不開。或五七日不下垂死者。

生男女婦人髮一盤燒 存性 自死龜殼一個或占遲 川芎 當歸各一兩 右咀。每用一兩。水煎服。

良。久不問生死胎自下。

當歸黃耆湯四五 方在補陳九。治妊娠下痢腹痛。

芎歸補中湯四六 治氣血虛半產。

川芎 當歸 黃耆炙 白朮炒 人參 芍藥炒 杜仲炒 艾葉 阿膠炒 五味子杵炒各一錢 甘草

分 天五 右每服五錢。水煎服。○若脾氣虛弱。須用補中益氣湯。○若氣虛有火。宜用安胎飲。

保生無憂散四七 臨產服之。補其血。順其氣。或胞胎肥厚。根蒂堅牢。皆可使之易產。又治小

產瘀血腹痛。

當歸 川芎 白芍 乳香 枳殼 南木香 血餘 右等分。每服二三錢。水煎。日二服。

○若胞衣既破。其血已涸。或元氣困憊。急用八珍湯斤許。水數碗。煎熟時飲。救之。飲盡再製。

亦有得生。

人參黃耆湯四八 治小產氣虛血下不止。

人參 黃耆炒 當歸 白朮炒 白芍炒 艾葉各一錢 阿膠炒二錢 右作一劑水煎服。

狼牛膝散四九 治胎衣不下。腹中脹痛。急服此藥腐化而下。緩則不效。

牛膝 川芎 朴硝 蒲黃各三兩 當歸半兩 桂心半兩 右每服五錢。薑三片。加生地黃一

錢水煎服。

芎黑神散五十 一名烏金散。靈苑方名肉桂散。治產後惡露不盡。胎衣不下。血氣攻心。

腹痛不止。及治脾腎陰虛。血不守舍。吐血等證。

黑豆二兩 當歸酒洗 熟地 蒲黃 白芍 甘草炙 乾薑化 肉桂各一兩 右為末。每服二錢。

童便酒各半調服。良方黑神散有炮附子半兩。無蒲黃。

簡黑神散五一 方在和陣二一一。治一切失血。

經驗滑石散五二 治產難。凡水下胎乾。胎滯不生。用此最效。

滑石飛過一兩 白蜜 香油各半 右將油蜜慢火熬熟三四沸。掠去末。調滑石末頓服。外以油

調於產婦臍腹上下摩之。立效。

難產方五三 令產婦以自己髮梢含於口中。惡心即下。亦治胎衣不下。

方桂心散五四 治妊娠因病胎不能安者。可下之。

桂心 瓜蒌 牛膝 薺麥各五分 當歸一錢 右水煎。

桂香散 五五 治胎死腹中不下。

桂心 三錢 麝香 五分 右為末。作一服。酒調下。

下胎小品方 五六

用參朮一升。搗碎。水二升。煮一升。服之即下。神效。○按參朮能損氣破血如此。故凡脾胃虛弱。及飲食不化者。不宜用明矣。○又方。用牛膝一兩。酒一鍾。煎七分。作二服。即下。

濟下胎方 五七 并下死胎俱效。

天花粉 四兩 肉桂 牛膝 豆豉 各三兩 右咀。用水七碗。煎二碗半。分三服。每服後一時許。

又進一服。

扶羸小品方 五八 虛弱人欲下胎。宜用此。

人參 粉草 川芎 肉桂 乾薑 桃仁 黃芩 蟹爪 右等分。每服一兩。水二鍾。煎

八分。空心服。未動再服。

下死胎 五九 凡胎死腹中。其舌多見青黑。口中甚穢而嘔。腹中不動。祇覺陰冷。重墜者是。

用平胃散一兩。以黃酒河水各一鍾。煎至一鍾。入朴硝三五錢。再煎三五沸。溫服。其死胎即化水而出。萬不失一。○又方。單用朴硝末三錢。以熱酒和。熱童便調服。立出。或用佛手散。以

酒調服亦妙。

針去胎方 六十

大麩麩 五升 漬酒一斗。煮二三沸。去滓。分五服。隔宿勿食。旦再服。其胎如糜。母無所苦。干

金不傳。

方 硫黃散 六一 治產後陽氣虛寒。玉門不閉。

硫黃 烏賊骨 五味子 右為末。搽患處。日三易。

硫黃湯 六一 治產後玉門不斂。陰戶突出。

硫黃 三錢 兔絲子 吳茱萸 各二錢 蛇床子 一錢 右研勻。用水二鍾。煎湯。類洗。自收。

方 益母丸 六四 一名返魂丹。○治婦人赤白帶。惡露時下不止。及治婦人胎前產後。經中諸

般奇痛。無所不療。本草云。此草胎前無滯。產後無虛。故名益母。

益母草 一味 一名充蔚子。一名野天麻。方梗對節。生葉。葉類大麻。四五月間開紫花。是白

花者非。右於五月採取。晒乾。連根莖葉。勿犯鐵器。磨為細末。煉蜜為丸。如彈子大。每服一

丸。用熱酒和童便化下。或隨證用湯引送下。○一方。以此為末。每服二錢。或酒或童便。或隨

證用引服之。○一方。凡產時倉卒未合。只用生益母草搗汁。入蜜少許服之。其效甚大。○一

益母草膏方。係前採取搗爛。以布濾取濃汁。用砂鍋文武火熬成膏。如黑砂糖色。為度。入磁

罐收貯。每服二三匙。酒便調下。或於治血湯藥中。加一匙服之。尤妙。

方 奪命丹 六五 治瘀血入胞。脹滿難下。急服此藥。血即消。衣自下。○按此方頗有迴生丹之

功。用下死胎必效。須用當歸方。

附子

地半兩 乾漆碎之炒 牡丹皮各一兩

右為細末。另用大黃末一兩。以好醋一升。同熬成膏。

和前藥丸

桐子大溫酒吞五七丸

○一方。有當歸一兩。

迴生丹

六六

治婦人產後諸疾。污穢未淨。及一切實邪疼痛。死胎瘀血衝逆等證。

大黃膏

用蘇木三兩。河水五碗。煎至三碗。去滓聽用。

紅花三兩。炒黃色。用好酒一大壺。

煮十餘燉。去滓聽用。

黑豆三升。煮熟存汁三碗。去豆去皮。曬乾為末。俱聽用。大黃一斤。

為末。用好醋八碗。熬成膏。次下紅花酒。蘇木湯。黑豆汁。攪勻。又熬成膏。盆內收貯。候用。將鍋

焦焙乾為末。同豆皮末俱入。

人參

白朮

青皮

木瓜

各三錢

當歸

川芎

元胡

蒼朮

香附重便炒

苓

桃仁泥

熟地各一兩

牛膝

三稜

山茱萸

五靈脂

地榆

甘草

羌活

白芍

各五錢

良薑

四錢

烏藥

二兩

木香

乳香

沒藥

各一錢

右為末。用大黃膏為丸。彈子

斷產灸法

六七

一傳方欲絕產者。灸臍下二寸三分。陰動脈中三壯。○此當自臍中至骨際。

折作五寸約之。

針斷產方

又六

四物湯一劑。苦薑子一撮即紅花

水鍾半。煎八分。經後空心服。則不受胎。

斷產小品方

六八

斷產墜胎有驗。

故蘇退紙方一 右燒為末空心酒調服終身不受孕。

丹斷子法六九

用白麵麩一升無灰酒五升作糊煮至三升半濾去滓分作三服候經至前

一日晚五更及天明各吃一服經即不不字行終身無子矣。

景仲 羊肉湯七十

治產婦腹中疝痛寒痛血氣不足虛弱甚者及寒月生產寒氣入於子門手

不可犯臍下脹滿此產後之寒證也并治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

精羯羊肉一斤當歸三兩生薑五兩 右用水八升煮取三升加葱椒鹽溫服七合日三服

○若寒多者加生薑一片○痛多而嘔者加橘皮二兩白木一兩

良方 羊肉湯七一 治產婦脾虛寒邪內乘以致腹痛或頭眩臍脇急痛

精羊肉四兩當歸川芎各半生薑一兩 右以水十盞煎至四盞分四次空心服

良方 黃雌雞湯七二 治產後虛羸腹痛

當歸白木炒熟地黃黃耆炒桂心各半小黃雌雞一隻去頭足 右先用水七碗煮雞

至三碗每用汁一碗藥四錢煎日三服

母雞湯七三 治產後褥勞虛汗不止

人參黃耆白朮白茯苓麻黃根牡蠣各三錢 右用母雞一隻去毛雜淨水六七碗同藥煮至三碗

豬腰湯七四 治產後褥勞寒熱如瘧自汗無力咳嗽頭痛腹痛俱效

豬腰一對當歸白芍藥酒炒各一兩 右以藥二味用水三碗煎至二碗去滓將豬腰切如散

子塊。同晚米一合。香豉一錢。加蔥椒鹽煮稀粥。空心日服一次。神效。或加入參更妙。

四神散

七五

治產後血虛。或瘀血腹痛。

當歸

二錢

川芎

芍藥

炒各一錢

炮薑

五分

右水煎服。

大巖蜜湯

七六

治產後陽氣虛寒。心腹作痛。不食嘔吐。四肢厥逆。

生地

當歸

芍藥

炒乾薑

吳茱萸

桂心

獨活

甘草

炒小

草

各一兩

細辛

右每服半兩。水煎服。

人參湯

七七

治產後諸虛不足。發熱盜汗。內熱暈熱等證。此即參歸湯。亦名團參散。

人參

當歸

等分

右為末。先以豬腰子一枚切片。糯米半合。蔥白二莖。入水二鍾。煎汁八

分。再入藥三錢煎服。

白茯苓散

七八

治產後稱勞。頭目肢體疼痛。寒熱如瘧。

白茯苓

一兩

人參

當歸

黃耆

川芎

白芍藥

炒熟地

桂心

各半兩

豬腰

一對

右以水三盞。入豬腰并薑棗各三事。煎二盞。去滓。入前藥半兩。煎一盞服。

方七珍散

七九

治產後不語。

人參

石菖蒲

生地

川芎

各一兩

細辛

七錢

防風

硃砂

另研

右為末

每服一錢

薄荷湯調服。

方七珍散

八十

治產後骨節疼痛。發熱頭重。四肢不舉。

牛膝

酒炒

甘草

炒薤白

各一兩

當歸

白朮

炒黃耆

炒桂心

獨活

加薑各

右每服半兩。水煎。

補脾飲 八一 治產後傷動脾破不能小便而淋瀝

生黃絲絹一斤 白牡丹皮根

白芨各一錢 俱為末

用水一碗同煮至絹爛如飴空心燉服服時

不得作聲作聲則不效

方止汗散 八二

牡蠣半兩 小麥麩八兩 炒黃

為末

右每服三五錢用豬肉汁調服

方麻黃根方 八三

治產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

麻黃根 人參

黃耆炒 當歸

牡蠣煨粉 甘草

右每服四五錢水煎服

二味參蘇飲 八四

治產後瘀血入肺欬嗽喘急

人參 一兩 蘇木 二兩

右作一劑水煎服○若既愈當用六君子以補脾胃○若口鼻黑氣

起急用此藥加附子五錢

關附欬嗽喘急肺病也豈用附子者乎 亦有得生者

方黃龍湯 八五

治妊娠寒熱頭疼嘔嘔不食腸痛嘔痰及產後經後外感風寒熱入胞宮寒

熱如瘧等證○按此方小柴胡湯之去半夏也

柴胡 二錢 黃芩 炒 人參

甘草各一錢

右用水煎服

氏陳二母散 八六

治產後血熱上攻留於肺經咳嗽喘促

知母 貝母

人參 桃仁

杏仁俱去皮 白茯苓

右等分每服五錢薑水煎服

豬蹄湯 八七

治氣血不足乳汁不下

用八物湯加黃耆漏蘆陳皮木通先以豬蹄煮汁二碗煎藥服之○或加天花粉 又方用

豬蹄一副通草二兩。川芎一兩。甘草一錢。川山甲十四片。燒將豬蹄洗切。入水六碗。同藥煎。約至三盤。加葱薑鹽料。取汁飲之。忌冷物。要喫羹湯助其氣血。乳汁自下。夏月不可失蓋。時用葱湯洗乳為佳。

良湧泉散 八八 下乳。忌食薑椒辛辣飲食。

王不留行 瞿麥 麥門冬 龍骨各二錢 右用豬蹄汁一盞。酒一杯。煎服。以木梳於乳上梳下。

梳下。

玉露散 八九 治產後乳脈不行。身體壯熱。頭目昏痛。大便澀滯。

人參 白茯苓 當歸 炙甘草各五分 桔梗 川芎 白芷各一錢 芍藥七分 右水煎。食後

服。如熱甚。大便秘結。加大黃三五分。炒用。

良瀉蘆湯 治婦人肥盛。脈氣壅結。乳少。

瀉蘆 二兩 蛇退 一升 土瓜根 右共為末。酒調下二錢。

栝蒌散 九十 治吹乳腫痛。

栝蒌 一個 乳香 二錢 右用酒煎服。○外用南星為末。以溫湯調塗。

滑補肝散 九二 治肝腎二經氣血虧損。脇脹作痛。或脇脹頭暈。寒熱發熱。或遍身作痛。經候

不調。

熟地 白朮各一兩 桑仁各一兩 獨活各四兩 當歸 川芎 黃耆 山藥 五味子各一兩 山茱萸肉

木瓜各半 右吹咀。每服五錢。棗水煎服。

金膠艾湯九三 治勞傷血氣衝任虛損。月水過多淋瀝不止。

阿膠炒 川芎 炙甘草各一兩 艾葉 當歸各兩 白芍 熟地各二兩 右吹咀。每服五錢。水煎

服。一方加地榆黃耆。即名安胎散。

集加味八珍湯九四 治婦人思慮過傷。飲食日減。氣血兩虛。月經不調。夜夢交感。或出盜汗

寢成勞損。

人參 白朮 茯苓 當歸 生地各一錢 炙甘草 川芎 芍藥 乾柴胡 黃耆各五分

香附製丹皮 各八分 水鍾半。大棗一枚。煎七分。食前服。

集調衛養榮湯九五 治婦人室女一切月經不調。或先或後。或純閉不通。憎寒壯熱。口苦無

味。欬嗽躁煩。頭眩。漸成勞證者。

當歸 生地 麥冬 沙參 陳皮 白朮各一錢 牡丹皮 地骨皮各八分 柴胡 桔梗各五分

分。藜蘆一錢 甘草四分 右加蓮子薑棗水煎服。○痰中見血。加側柏葉。○煩躁口乾。加炒

山梔。倍參門冬。○腸下脹疼。加青皮。川芎。○胸膈滿悶。加黃連薑炒 枳實。去麥冬。地骨皮。○

夜出盜汗。加黃連黃耆。去柴胡。桔梗。○大便秘結。加桃仁。倍當歸。○欬嗽不已。加瓜蒌仁。阿

膠。○小水不利。加木通。茯苓。

良當歸散九六 治經水妄行不止。及產後氣血虛弱。惡露內停。憎寒發熱。宜服此去之。

當歸 川芎 白芍 炒 白朮 炒 黃芩 炒 各半兩 山茱萸 肉 半兩 右為末 每服二錢 酒調日三服

○一方無山茱萸。○氣虛者去芩。加桂心一兩。

丹參散 九七 良方云丹參一味。其治頗類四物湯。能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。止崩

中帶下。調經。下產後惡血。兼治冷熱勞。腰骨痛。骨節煩疼。

丹參 酒洗去土 右為細末。每服二錢。溫酒調下。○經脈不調。食前服。冷熱勞。不拘時服。

玄胡當歸散 九八 亦名延胡索散。○治血積小腹疼痛。或因氣逆。月經不通。肚腹作痛。

當歸 赤芍藥 劉寄奴 沒藥 枳殼 炒 玄胡索 炒 右為末。每服一錢。熱酒調下。

牛膝散 九九 治月水不利。臍腹作痛。或小腹引腰。氣攻胸膈。

當歸 酒浸 赤芍藥 牛膝 酒炒 桂心 桃仁 去皮 元胡索 炒 牡丹皮 各一木香 三錢 右為

末。每服一錢。溫酒調下。或每服五七錢。水煎服。

狼交加散 一百 治經脈不調。腹中撮痛。或結聚癥瘕。產後中風。又交加散。方在和陣二五

生地 一斤 生薑 十二兩 右以地黃汁炒薑。澤薑汁炒地黃。澤乾為末。每服三錢。溫酒調服。

○加芍藥。元胡。當歸。蒲黃。桂心。各一兩。沒藥。紅花。各五錢。尤效。

薑黃散 百一 治瘀血凝滯。肚腹刺痛。或腹脹發熱等證。

薑黃 當歸 酒拌 各蓬木 醋炒 紅花 桂心 川芎 元胡索 炒 丹皮 各五 右水酒各半

上海廣益書局印行

煎服

琥珀散 百二 治心膈迷悶。肚腹撮痛。月信不通等疾。

烏藥 二兩 當歸 酒洗 蓬朮 醋製各一兩 右為末。每服二錢。溫酒調服。

溫經湯 百三 治寒氣客於血室。以致血氣凝滯。臍腹作痛。其脈沉緊。

人參 牛膝 酒炒 甘草 炒 當歸 川芎 芍藥 牡丹皮 蓬朮 醋炒 桂心 各五分 右水

煎服

失笑散 百四 治婦人心痛氣刺不可忍。及產後兒枕蓄血。惡血上攻痛疼。并治小腸氣痛。

五靈脂 淨洗 蒲黃 俱炒 右為末。每服二三錢。用酒煎熱服。一方用好醋一杓。熬成膏。再

入水一鍾。煎至七分。熱服。一方用醋糊和丸。龍眼大。每服一丸。以童便和水各半鍾。煎七

分。溫服。按此方若用以止痛。蒲黃宜減半。若用止血。則宜等分。或靈脂減半亦可。

澤蘭湯 百五 治勞怯經閉。

澤蘭葉 二錢 當歸 芍藥 炒 甘草 炙 五分 用水煎服。

當歸沒藥丸 百六 治血瘀作痛。及血風筋掣骨疼。手足麻木疼痛。

當歸 五靈脂 炒 沒藥 炒 右為末。醋糊丸。桐子大。每服三十丸。薑湯下。

醋附丸 百七 治元臟虛冷。月候不調。腹中急痛。赤白帶下。渾身寒熱。胎氣壅滯不固。

香附米 一斤 醋煮 右以醋糊為丸。桐子大。每服三四十丸。米飲下。

柏子仁丸百八 治血虛有火。月經耗損。漸至不通。日漸羸瘦。而生潮熱。慎勿以毒藥過之。宜

柏子仁丸或前澤蘭湯主之。

柏子仁炒研 牛膝酒拌 卷柏各半 澤蘭葉續斷各二 熟地黄蒸兩酒拌 右為末。入地黄

膏。加煉蜜丸。桐子大。每服百餘丸。空心米飲下。

烏賊魚骨丸百九 此即內經治血枯方。

烏賊魚骨去甲 蘆茹一兩即 右為末。以雀卵搗丸。小豆大。每服五丸。或十丸。鮑魚煎湯下。

以飯壓之。○鮑魚。即今之淡乾魚也。

增損四物湯百十 治脾虛不攝。血去不止。

人參 當歸 芍藥 川芎 乾薑炒各 甘草炙四 右每服四錢。水煎服。

奇效四物湯百十 治肝經虛熱。血沸騰而崩。久不止。

當歸酒拌 熟地 白芍 川芎 阿膠炒 艾葉炒 黃芩 右每服四錢。水煎服。

加減四物湯百十 治婦人血積。

當歸 川芎 芍藥 熟地 蓬朮 三稜 肉桂 乾漆炒烟盡 右吹咀。每服五七錢。

水鍾半。煎七分。食遠服。

四物二連湯百十 治婦人血虛發熱。或口舌生瘡。或晝安夜熱。

當歸 川芎 芍藥 熟地 胡黃連 宣黃連各一 右作一劑。水煎服。

人參當歸湯百十 治去血過多。內熱短氣。頭痛悶亂。骨節作痛。或虛煩咽燥。

人參 當歸 生地 桂枝 麥冬 白芍藥各等 右用粳米一合。竹葉十片。水二鍾。煎

一鍾。去米。入藥五錢。棗二枚。煎服。或總煎之亦可。虛甚者。用熟地黃

根一味。防風散百十 治肝經有風。以致血得風而流不歸經者。

用防風去蘆為末。每服一錢。白湯調服。一名獨聖散。每服二錢。空心食前。用酒煮白麴清

飲調下。極效。

龍骨散百十 治血崩不止。

龍骨煨 當歸 香附炒各 棕毛灰五錢 右為細末。每服四錢。空心米湯調下。忌油膩雞魚

炙博物。

如聖散百十 治血崩。三服全愈。

棕櫚子 烏梅肉 乾薑俱燒存性為末各等分 右每服二錢。空心烏梅湯調服。一方。單用棕皮

半燒。半生為末。每空心服二錢。亦炒。

槐榆散百十 治血崩及腸風下血。

槐花 地榆等分炒焦 右二味。用酒煎飲之。

七灰散百十 治血崩神效。

蓮蓬殼 罌粟殼 醃蟹殼 益母草 旱蓮草 棕毛葉 藕節各等分俱燒存性為末 空心醋

點湯調下三錢。○一祕方用棉花子以銅鍋炒黑為末黃酒調下二三錢三兩次即止并治

崩漏。小產血不止。

棕灰散百二 方在和陣二一五。治大腸下血及崩漏失血。

柏葉散百二 治元氣虛弱。崩中漏血。年久不愈。亦治白帶。

柏葉炒當歸 生地 續斷 川芎 龜甲炙 禹餘糧各一兩 阿膠炒五錢 鱉甲炙兩 赤石脂煨

牡蠣煨 地榆 艾葉炒 鹿茸炙各五分 右為末。每服二錢粥飲調下。

子芥散百二 一名黃芩散。○治壯熱崩中下血。是陽乘陰分。故經血泛溢。宜清其北方。

條黃芩不拘多少 右燒秤鍊焯酒。食前調下三四錢。○一方有乾薑白芷。○一方以木耳。

黃芩等分為丸。俱效。

良方防風黃芩丸百二 治肝經風熱。以致血崩便血尿血等證。

條芩炒黑 防風等分 右為末。酒糊丸桐子大。每服三五十丸。食遠或食前米飲。或溫酒下。

切勞湯百二 治勞嗽發熱。盜汗體瘦。唾中有血。或成肺癆。○此校本也。非切勞也。能用此者。

庶可望生。此外恐非佳劑矣。

白芍藥炒 人參 黃耆炒 當歸 熟地 甘草炒 白茯苓 五味子杵炒 阿膠炒 半夏製

五分似錢 已上乃其原方 右薑棗水煎。日三服。○鄉人楊元鼎女及笄病此甚危。百藥無

效。偶遇名醫。得此方服三十餘劑。遂愈不發。

集歸神湯百二 治婦人夢交盜汗。心神恍惚。四肢乏力。飲食少進。

人參 白朮 白茯苓 歸身各一棗仁 陳皮各八圓 眼肉七枚 甘草 羚羊角 琥珀

未各五分 右羚羊角琥珀二味不煎。餘藥煎熟去滓。入二末和勻。食前服。

白芷散百二 治下元虛弱。赤白帶下。或經行不止等證。

白芷一兩 海螵蛸二枚 胎髮一團 右為末。每服二錢。溫酒調下。

海白芍藥散百二 治婦人赤白帶下。臍腹疼痛如神。

白芍二兩 乾薑半兩 右為細末。每服三錢。空心溫米湯調下。晚又進一服。十日見效。

克應丸百二 治婦人赤白帶下。

熟地 赤芍各二兩 當歸二兩 赤石脂煨醋 龍骨 牡蠣煨酒 茯苓 丹皮 艾葉 川芎各

兩 右為末。醋糊丸。桐子大。每服五十九丸。空心白湯送下。

良滑石散百二 治熱淋。

滑石五分 通草 車前子 葵子各四分 右為末。以漿水調服。

芍藥散百三 治婦人血滯腰痛。

芍藥 元胡炒 肉桂各一兩 香附米二兩 醋一升 鹽 右為細末。每服二錢。不拘時。白湯下。

良通氣散百三 治腎虛腰痛。神效。

破故紙酒炒 右每服二錢。先嚼胡桃肉半個。空心以溫酒送下。

四製香附丸_{百三} 調經養血順氣受孕

香附_{米一斤分四製酒醋重便當歸酒洗熟地酒洗白芍藥川芎_{各四}澤蘭葉白朮}

陳皮_{各三}黃柏_{酒炒}甘草_{酒炒}各一兩右為末酒糊丸桐子大每服七十九空心白湯送下

女金丹_{百三} 此韓飛霞方也一名不換金丹○內加熟地黃一兩即名勝金丹○治婦人久

虛無子及產前產後一切病患此藥能安胎催生妊娠臨月服五七丸產時減痛婦人子宮

寒冷無孕如服月餘男女自至又治半身不遂帶濁血崩及產後腹痛吐逆子死腹中氣滿

煩悶臍腹作痛月水不通中風口噤痢疾消渴敗血上衝頭疼寒熱血運血泄見鬼迷悶產

後傷寒虛煩勞瘦凡婦人諸疾不問久近並宜服之兼治男子下虛無力等證

人參白朮_炒茯苓甘草_炙當歸川芎白芍白薇_{酒洗}丹皮白芷藁本肉

桂玄胡沒藥_{另研}赤石脂_{另研}香附_{醋浸三日}炒右共十六味為末煉蜜丸彈子

大以磁瓶收貼封固每服一丸空心溫酒化下食乾物壓之服至四十九丸為一劑以癸水

調平受妊為度妊中三五日服一丸產後二三日服一丸醋湯下亦妙

琥珀丸_{百三} 治婦人或老或幼或產前產後百病及療三十六種諸病七疝八癢心腹刺痛

卒中癰瘰半身不遂八風十二痺子足痠疼乳中結核結毒懷胎驚動傷犯不安死胎不下

並治

琥珀_{各另}硃砂研沉香阿膠_{炒珠}附子製川芎肉桂五味子石斛_{各五}牛膝酒浸

當歸 肉蓯蓉酒洗 人參 熟地 續斷 木香 沒藥各一兩 一方有牛黃 珍珠

乳香 玄胡各一兩 共二十一味 右煉蜜為丸 彈子大 每服一丸 空心食前 午後溫酒化開服

○凡服法或薑湯或米湯或酒或燈草湯或隨證用引皆可下○若傷寒中風角弓反張用麻黃

湯隨證改湯引送下○孕婦臨月宜一日一服至產順利不覺疼痛○凡婦人服至五服十

服之後日倍飲食其功言不盡述服者當自覺也

延年益嗣丹百三

滋補元氣益精黑髮○按此方即還元丹也但製法分兩不同宜參酌用

之方在補陣一三九

人參 天門冬酒浸 去心 麥門冬同上 各三兩 熟地黃酒蒸 生地黃各二兩 白茯苓酒浸 地骨皮酒浸 各五兩

何首烏鮮者 半斤 右將何首烏去皮切片如乾者用米泔水浸軟拈切外用砂鍋入黑羊肉一

斤黑豆三合量着水上用甌罩單上放首烏煮而蒸之以肉爛為度鍋蓋取蜜勿令洩氣取

起曬乾為末煉蜜丸梧子大每服七八十九空心溫酒送下

續嗣降生丹百三

治婦人五臟虛損子宮冷憊不能成孕○并治男子精寒不固陽事衰弱

白濁夢泄婦人帶下寒熱諸虛百損益汗短氣無不感應○此方乃溫隱居求嗣保生篇所

載云東京焦貢外三世無續嗣後遇一神僧問其故曰無嗣者有三一祖宗無德自身無行

二夫妻年命恐犯禁忌三精神不守妻妾血寒焦公曰治之有道乎僧曰先修德後修身三

年之後到臺山令行童賜以方藥名續嗣降生丹依方賜之後不及二十年子孫數人皆貴

河神景岳全書 卷六十一 十四 長集

顯○此方無怪誕剋伐之品。且溫且固。凡血海虛寒者。服之必佳。但溫力有餘。補力不足。倘益以人參、白朮、熟地、川芎、天甘草各一兩。則八珍全而溫補贊育之功。當非淺也。因命名曰加味續嗣降生丹。

當歸酒洗 杜仲酒炒 茯神 益智仁 龍骨煨 桂心 吳茱萸製 乾薑半生 川椒去目 台烏

藥各一兩 白芍藥酒炒 川牛膝酒浸 半夏製 防風 秦朮 石菖蒲去毛 北細辛 桔梗各五

附子一枚重一兩者 臍下作一竅入硃砂為後用 牡蠣大片者 以重便浸四十九日每五日一換取

醋及酒外以鹽泥厚固之 候乾厚五斤 右為末。以酒煮糯米為丸。梧子大。以前硃砂為

衣。每服三五十九丸。漸至七八十九丸。空心滾白湯。或鹽湯溫酒下。

河車種玉丸百三

紫河車一具 只要母氣壯。藏厚大新鮮者。但去胞內瘀血。不必挑去鮮紅血脈。以米泔水

洗淨。用布紋乾。石臼內生杵如糊。用山藥末四五兩收乾。檢為薄餅八九個。於砂鍋內焙乾。

以香如肉脯為妙。

大熟地酒洗 杞五兩 白茯苓人乳拌 歸身酒洗 人參 兔絲製 阿膠炒珠 各丹皮酒洗

白薇酒洗 沉香一兩 桂心 山茱萸 香附米 用酒醋水三升 各半碗浸 大川芎酒浸 切

二兩 右煉蜜和丸。桐子大。每服百餘丸。空心或酒或白湯鹽湯任下。○如帶濁多者。加赤白

石脂各二兩。須以清米泔飛過。用○服藥後。忌生冷葡萄。生藕。蔥蒜。綠豆粉之類。

八珍益母丸百三

治血氣兩虛脾胃並弱飲食少思四肢無力月經不調或腰痠腹脹或斷

或續赤白帶下身作寒熱罔不獲效服一月之後即可受胎虛甚者用藥一斤必能受子

人參 白朮 土炒 茯苓 川芎 各一當歸 酒洗 熟地 酒洗 各二兩 炙甘草 五錢 芍藥 酒炒 益母草

四兩五六月採取止用上半截 右為末 煉蜜丸 彈子大 空心蜜湯或酒下一丸或為小丸 帶葉者不見鐵器 兩料為末

亦可○脾胃虛寒多滯者加砂仁一兩薑汁炒○腹中脹悶者加山查肉一兩飯上蒸熟○

多鬱者加香附一兩酒製○此徐思鶴醫統方又一方名八珍益母十全丸於前方內用益

母草八兩外加沉香四錢○思鶴曰資益坤元補養氣血除淋帶壯形體胎前和氣產後補

虛真婦之人聖劑超古今之神方有室家者不可不知也予哂斯世之醫惟集古方香附勝

金丹為女人開鬱調經之要藥殊不知不審古今虛實之異古人氣實故可用香附開導香附味

辛性燥但能開破而已多用之大耗氣血虛者愈虛病者愈甚而於滋補何有哉今世十婦

九虛非補不可再用香附以耗之寢成怯弱之證是辨之不早則危殆而難痊矣○婦人經

脈不調或氣血兩虛而身體素弱者宜服此以調養之○經不通者服一料即通不調者服

一月即調○素不孕者服一月即孕○胎前間用一服則胎固而安○產後用一服必重便

酒化開調下則無壅滯血運之候○多服之補虛活血凡治產後諸病極穩○若急欲取效

以酒調化服

烏雞丸百三

治婦人羸弱血虛有熱經水不調崩漏帶下骨蒸不能成胎等疾

烏骨白毛公雞一隻重二斤半許者悶殺之去毛雜外用艾葉四兩青蒿四兩切碎約一手

煮絕乾取出去骨餘俱同搗南香附去毛淨一斤分四分用未汁童便和水灌令沒雞二寸許

熟地當歸酒洗生地川芎白芍白朮川牛膝柴胡知母丹皮

各二鱉甲醋浸火白茯苓二兩秦光一兩黃連炒地骨皮貝母玄胡索乾薑炮薑各

煎炒等物及芫菜右俱為末用酒醋各半煮糊為丸桐子大每服五六十九漸加至百丸溫酒米飲任下忌

又烏雞丸百四

熟地當歸白朮山藥山茱萸棗肉柿餅蓮肉各四兩黃耆蜜炙三兩鹿角膠

狗脊杜仲枸杞蓮鬚香附阿膠川芎各二兩烏藥一兩右藥製淨用烏骨雞

一隻悶殺之乾去毛去雜連骨搗碎用酒醋各半同藥煮熟去骨烘乾共為末即將餘汁少

入麵打糊為丸任意用引送下

唐烏雞丸百四

人參懷生懷熟青蒿子去梗香附四裂鱉甲各三兩白朮棗仁肉枸杞麥冬

雲苓地骨皮去骨丹皮去骨白芍各二兩歸身二兩川芎甘草各一兩右先將諸藥備完

聽用乃取絲毛烏骨白公雞約重一斤許者撲倒去毛截頭足腸雜不用將雞切作四塊先

以鱉甲鋪銅鍋底次入雜藥以免焦腐漸漸加重童便約至斗許煮至極爛撈起曬乾為末將

鷓鴣甲去襍并雞骨。俱以原汁燕炙。至乾為末。同前藥煉蜜為丸。桐子大。每服空心用清湯送下。百餘丸。

秘烏雞煎丸二百四

治婦人百病。血氣勞虛。赤白帶下。

人參 官桂

地骨皮各二兩

茯苓

黃耆蜜炙

當歸各六兩

生地

熟地

香附各四兩

右將烏骨白雞一隻。男用雌。女用雄。籠住。將黃耆末和炒麵丸如芡實。喂雞二七日。將雞縛

死。乾搗去毛并腸雜令淨。搥碎其骨。入前藥於腹內縫密。用酒醋各一瓶。煮一宿。取去骨。焙

乾為末。用前汁打麵糊丸。桐子大。每服五六十丸。空心鹽湯下。

黃病丸三百四

治月經閉。臍腹作痛。及產後癥瘕等病。

乾漆炒烟出青

牛膝酒洗焙

右為末。生地黄汁一升。用砂鍋慢火熬膏。丸桐子大。每服二

十九。空心米飲下。

以下通用方

四君子湯百四

方在補陣一。

治脾肺氣虛諸證。

六君子湯百四

方在補陣五。

治脾胃虛弱。嘔吐吞酸等證。

五味異功散百四

方在補陣四。

治脾胃虛寒。飲食少思等證。

補中益氣湯百四

方在補陣三。

治勞倦傷脾。外感不解。寒熱瘧痢。氣虛不能補血等證。

四物湯百四

方在補陣八。

治一切血虛勞弱之病。

八珍湯_{百四}

方在補陣十九

治氣血兩虛調和陰陽

十全大補湯_{百五}

方在補陣二十

治氣血俱虛補救元陽

歸脾湯_{百五}

方在補陣三三

治心脾虛損

人參理中湯_{百五}

溫中補脾胃虛寒諸證

道遠散_{百五}

方在補陣九三

治肝脾血虛鬱怒傷肝等證

加味道遠散_{百五}

方在補陣九四

治肝脾血虛發熱等證

七味白朮散_{百五}

方在小兒七

治寒熱作渴

六味地黃丸_{百五}

方在補陣一二一

壯水制火之劑

八味地黃丸_{百五}

方在補陣一二二

治命門火衰之劑

薛氏四神丸_{百五}

方在熱陣一五二

治脾胃虛寒泄痢

五積散_{百五}

方在散陣三九

治感冒寒邪

參蘇飲_{百六}

方在散陣三四

治四時傷寒感冒

人參敗毒散_{百六}

方在散陣三六

治四時傷寒瘟疫

當歸六黃湯_{百六}

方在寒陣六五

治血熱陰虛盜汗

柴胡清肝散_{百六}

方在寒陣五九

治肝膽風熱瘡瘍怒火寒熱

梔子清肝散_{百六}

方在寒陣六〇

治肝膽三焦風熱

八正散

百六

方在寒陣百十五。

治藏府秘結小便赤澀。

五苓散

百六

方在和陣一八二。

治小便不利。

犀角地黄湯

百六

方在和陣七。

治心火動血及斑黃瘡疹。

導赤散

百六

方在寒陣一二二。

治心火及小腸熱秘淋澀。

桃仁承氣湯

百六

方在攻陣五。

治瘀血小腹作痛其人如狂。

玉燭散

百七

方在攻陣二四。

治血虛有滯經閉不通。

腎著湯

百七

方在熱陣百三十。

治腎虛身重腰冷。

舒筋湯

百七

方在和陣七七。

治產後血滯作痛。

交加散

百七

方在和陣二五二。

治產後口吐涎沫不省人事。

加味小柴胡湯

百七

方在散陣二十。

治乳母肝火發熱。

良方蜜酥煎

百七

方在補陣六六。

補虛潤肺止咳嗽。

柴胡石膏湯

百七

方在散陣二三。

治少陽陽明外感挾火發熱頭痛。

都梁丸

百七

方在散陣七七。

治胎前產後傷風頭痛。

瓜子仁湯

百七

方在外科一六四。

治產後瘀血腸癰腹中疔痛。

子和通經散

百七

方在攻陣四六。

治氣逆經閉。

二神散

百八

方在寒陣八七。

治吐血血崩下血。

評評... 長... 集...

小薊飲子百八

方在寒陣百二。

治下焦結熱。澁血崩淋。

海藏愈風湯百八

方在和陣二一七。

治一切失血。及產後搐搦。

續精丸百八

方在固陣二六。

治白濁白帶。

青蛾丸百八

方在補陣一四五。

治腎虛腰痛。

獨參湯百八

方在補陣三六。

治諸氣虛脫。

奪命散百八

方在補陣三七。

治諸邪傷氣暴脫。煩燥發渴。

加批 詳評 景岳全書

卷六十二

長集

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

小兒則古方

小兒

秘補脾湯一 治小兒久病面黃肌瘦。咬牙自割。頭髮稀少。誤藥所致。

人參 白朮

各一錢 白芍藥

酒炒 白茯苓

各八分 川芎

陳皮

各六分 炙甘草

黃耆

蜜炙 當歸

分

右每服二三錢薑水煎。

調中湯二 治傷乳食。瀉後脾胃虛噦吐瀉。

人參 茯苓

乾薑

藿香

白朮

甘草

木香

丁香

香附

砂仁

煎食前服

調中丸三 治脾胃虛寒吐瀉。

人參 白朮

炒 甘草

炒 乾薑

炮 右為末

蜜丸

菜豆大

每服二三十丸

白湯下。

薛按云。前二方乃本經自病之藥。即人參理中丸。若腎水侮土而虛寒者。當加半夏。茯苓。陳皮。或嘔吐更加藿香。泄瀉加木香。

人參理中丸^四 治中氣虛熱

人參 白朮炒 炙甘草等分 右為末。薑汁糊丸。菜豆大。每服二三十九。白湯下。

局觀音散^五 治內傷嘔逆吐瀉。不進飲食。漸至羸瘦。

人參一兩 神麴炒 茯苓 炙甘草 綿黃耆 白朮炒 白扁豆炒 木香各一錢 石蓮肉去心一錢半

右為末。每服一二錢。入藿香三葉。薑棗水煎服。

助胃膏^六 治脾胃虛寒吐瀉。飲食不化等證。

人參 白朮炒 茯苓 甘草炙 丁香各五錢 山藥一兩 砂仁四十個 木香三錢 白芷寇 豆肉

菴麵煨 一方無木香。名香砂助胃膏。右為末。蜜丸。芡實大。每服十九。米飲化下。

織七味白朮散^七 一名人參白朮散。治虛熱而渴。

人參 白朮 白茯苓 炙甘草 藿香 木香各一錢 乾葛二錢 右為末。每服三錢。水煎

溫服。如飲水多。多服之為妙。按此方治小兒虛熱而渴。如無氣滯吐瀉等證。則當減去木

香。藿香。以避燥而耗氣。

白朮散^八 方在和陣三十。治自汗盜汗極效。

太和餅^九

人參 白朮 白茯苓各五錢 山藥炒 木香 炙甘草各二錢 肉果麵煨 白豆蔻十四個 砂仁十四個

個 山查肉一兩 使君子肉六十個 煉蜜搗和為小餅。量兒大小與服。或再對證加減藥味用之。

圓參散十 治心虛血熱自汗盜汗。

人參 當歸等分 右為末。用雄豬心一個。切三片。每服二錢。以豬心一片煎湯調服。或用

水煎服亦可。

止汗散十一 一名敗蒲散。○治睡而自汗。

故蒲扇燒存性 右為末。每服三錢。溫酒調下。

調元散十二 治小兒變蒸。脾弱不乳。吐乳多嘔。

人參 白朮 陳皮 厚朴 製香附各一錢 炙甘草 藿香各五分 右每服一二錢。薑棗煎服。

平和飲子十三 治小兒變蒸。於三月後。每三日進一服。可免百病。百日內宜服。

人參一錢 白茯苓錢一 炙甘草五分 升麻二分 右咀。水半盞。煎三分。不時服。○弱者加白朮一錢。

調氣散十四 治變蒸吐瀉。不乳多嘔。欲發慢驚。

人參 陳皮 木香 藿香 香附 炙甘草各一錢 右為末。每服一錢。薑棗水煎服。

氏當歸散十五 治夜啼不乳。

人參 當歸 白芍藥各二錢 炙甘草一錢 桔梗 陳皮各一錢 右每服一二錢。水煎灌之。

撮要當歸散十六 治變蒸有寒無熱。

當歸二錢 人參 炙甘草 木香 官桂各一錢 右每服二三錢。薑棗水煎。

人參黃連散十七 治心經蘊熱夜啼。

人參二錢 黃連錢半 炙甘草五分 竹葉二十片 右薑水煎服

無
燈花散十八 治心躁夜啼

燈花二三

右研細。用燈草煎湯調塗口中。乳汁送下。日三服。一法用燈花塗乳上令兒吮

之。○如無燈花用燈草燒灰加辰砂少許亦妙。○一法用燈花七枚。礪砂一字辰砂少許。蜜調塗唇上立安。

寶
天麻散十九

治小兒急慢驚風發熱抽搐痰涎壅盛或脾土虛弱肝木乘侮吐瀉不食嗜

卧困倦

半夏七錢

天麻二錢 炙甘草半 白茯苓各三錢 白木各三錢

右為末每服一二錢薑棗湯調服

湯氏異功散二十

止渴消暑生津補脾胃

豬苓

澤瀉各三錢 人參各三錢 白朮各五錢 茯苓各五錢 陳皮二錢 硃砂一錢

右為末蜜丸芡實大每

服一丸燈心竹葉湯化下

柴胡散二一

治變蒸骨熱心煩啼叫不已

人參

炙甘草各二錢 麥冬各二錢 龍膽草酒炒 防風各一錢 柴胡五分

右每服二三錢水煎服

柴苓散二二

治壯熱來去

柴胡

赤茯苓各半 人參各半 麥冬各半 甘草各半 黃芩一兩

右每服二三錢入小麥二十粒青

竹葉三片水煎服

怪怪散 二三

治小兒傷寒時氣風熱頭痛目眇多睡痰壅欬喘息或痘疹已出未出疑似

之間

人參 白朮 炒 茯苓 甘草 北細辛 川芎 桔梗 炒各

一分

右為末

每服二錢入薄荷五

分

葉水煎服。一方有防風天花粉。

星蘇散 二四

治諸風口噤不語

南星 炒 地

右每服五七分紫蘇五葉薑四片水煎入雄豬膽少許溫服

錢黃龍散 二五

治發熱不退或往來寒熱

柴胡 五錢 赤芍藥 三錢 黃芩 炒 甘草 二錢

右每服二三錢薑棗水煎

人參羌活散 二六

治傷風驚熱

人參 羌活 川芎 白茯苓 柴胡 前胡 獨活 桔梗 枳殼 地骨皮 天麻 各

一分 炙甘草 減半

右用生薑薄荷水煎。治驚熱加蟬蛻。

牛黃散 二七

治溫熱壯熱或寒熱往來

牛黃 研 甘草 各半

柴胡 梔子 酒炒 龍胆草 酒炒 黃芩 炒各二

錢半 右為末每服五七分以金

銀薄荷湯調下

錢生犀散 二八

治心經風熱

犀角 鎔 三 柴胡 葛根 赤芍藥 地骨皮 各一 甘草 五錢 右為末每服一二錢水煎服

二黃犀角散 二九

治溫熱心神不安。火腑秘結。

犀角屑 大黃

酒浸 鈎藤鈎

梔子仁 甘草

黃芩 等分

右為末。每服五七分。熱湯調

下。量兒加減。

柴胡飲子 三十

解肌熱。蒸熱積熱。或汗後餘熱。脈洪實。弦數。大便堅實者。

柴胡 人參

各五分 黃芩 芍藥

各七分 當歸 一錢

甘草 四分

大黃 八分

右每服一二錢。水煎。

○按此方用藥頗善。但大便如常者。勿得輕用大黃。

地骨皮散 三一

治虛熱。壯熱。

地骨皮 知母

人參 柴胡

茯苓 半夏

甘草 等分

右薑水煎。有鬱熱。加蟬退。天

麻黃芩。

天麻定喘飲 三二

治喘嗽驚風。

天麻 防風

羌活 白朮

甘草 炒 人參

桔梗 川芎

半夏 麩 等分

右每服二三

錢。水煎服。

補肺散 三三

一名阿膠散。○治肺虛。惡心喘急。久患。嗽有痰。

阿膠 炒 兩半 鼠粘子

炒 馬兜鈴 各半 杏仁 七粒 糯米 一兩

甘草 三錢

右每服二三錢。水煎服。

錢阿膠散 三四

治小兒肺病。欬嗽喘急。或欬而哽氣。喉中有聲。

阿膠 炒 兩半 鼠粘子

炒 杏仁 七個 糯米 一兩

右每二三

錢。水煎服。

阿膠 炒 兩半 鼠粘子

炒 杏仁 七個 糯米 一兩

右每二三

錢水煎。

保和丸 三五

治飲食酒積停滯胸膈痞滿腹脹

神麴 陳皮

半夏

茯苓

各一兩

山楂肉

蒸兩

連翹

蘿蔔子

炒各五錢

右為末，粥丸，菜豆大。

○一方尚有炒麥芽一兩，黃連五錢。

大安丸 三六

治證同前。

即前保和丸加白朮二兩。

楊消食丸 三七

治乳食過多，胃氣不能消化。

砂仁 陳皮

神麴

麥芽

三稜

蓬朮

各半兩

香附

炒一兩

右為末，麴糊丸，麻子大白湯

送下，量兒加減。

消乳丸 三八

治嘔吐，消乳食，脈沉者，傷食不化也。

香附 砂仁

陳皮

神麴

尖甘草

麥芽

炒等分

右為末，米糊丸，黍米大，每服二十丸。

薑湯下。

白餅子 三九

治傷食腹中有蟲，嘔吐肚疼。先用此藥一服，推下食積，然後調治，不可服冷藥。

滑石 輕粉

半夏

南星

巴豆

各一兩

水一升

煮乾

研爛

右為末，糯米飯丸，綠豆大。

檢作餅，每服二三餅，煎葱白湯或紫蘇湯下。忌熱物，量兒加減。○薛氏曰：凡用此方，及利驚

丸，紫霜丸，三味牛黃丸，福銀丸之類，乃斬關奪門起死回生之重劑也。必審形病俱實，方可

施之。恐至失手，命在反掌。經云：邪之所湊，其氣必虛。留而不去，其病乃實。實者，病氣實，而形

氣則虛也。東垣先生云。形病俱實者。當瀉不當補。形病俱虛者。當補不當瀉。治者審焉。

宣風散 四十

治溼痰。去積滯。通秘結。攻黑陷裏實。以代百祥丸。牛李膏。

積柳 二個

陳皮 甘草各五錢 牽牛 四兩半生半炒 右為末。每一錢。量大小增減。與服。白湯調下。○一方。有大黃。木香。連前三味煎成後。加牽牛末調服。

人參養胃湯 四一

治外感風寒。內傷生冷。寒熱如瘧。或嘔逆惡心。

人參

厚朴 薑製 蒼朮 炒半夏製 草果仁 藿香 茯苓 各五錢 橘紅 二錢 炙甘草 二錢 右

每服二三錢。薑三片。烏梅一個。水煎。

人參安胃散 四二

治脾胃虛弱。傷熱乳食。嘔吐瀉痢。

人參 一錢 黃耆 二錢 生甘草 各五分 炙甘草 各五分 白芍藥 酒炒七分 白茯苓 四分 陳皮 三分 黃連 炒二分

右每服二三錢。水煎。

生附四君湯 四三

治吐瀉不思乳食。凡虛冷病。宜先與數服。以正胃氣。

人參

白朮 茯苓 炙甘草 附子 木香 橘紅 等分 右為末。每服一二錢。薑棗水煎服。

煎服。

釀乳法 四四

治胃虛吐瀉。睡中吐舌。搖頭嘔乳。額上汗流。驚啼面黃。令兒飢飲。

人參

藿香 木香 沉香 陳皮 神麴 炒 麥芽 炒 丁香 各等分 右每服四五錢。薑十片。紫

蘇十葉。棗三枚。水煎。每服半盞。○令母食後。捏去舊乳。方服。卧少時。却與兒飲。按小兒不能

飲藥者凡用補瀉諸劑皆宜此法。

銀白散四五 治胃虛吐瀉。

糯米炒二兩半 扁豆蒸二兩 白朮炒一兩 炙甘草三錢 丁香各二錢 藿香各二錢

右為末。紫蘇末飲調下。

直指方加炮白附子、全蝎、木香、石蓮子、薑水煎。

朱君散四六 治吐瀉後而為驚為瀉及囊青者。

人參 白朮 茯苓 炙甘草 鈎藤鈎 朱砂各一錢 麝香半分 燈心一團 右為末。每服

一錢。白湯調下。

二順散四七 治中暑霍亂吐瀉。煩悶燥渴。小便赤澀。大便血。肚疼。

白朮 炙甘草 茯苓 猪苓 澤瀉 乾薑炒 肉桂 杏仁去皮共炒 右為末。每服五

七分。不拘時。水調下。或用水煎服。

香朴散四八 治積冷嘔吐。

藿香葉 厚朴薑汁炒 陳皮各七錢 半夏湯泡七次一兩 炙甘草一錢 右每服三錢。薑棗水煎。○瀉甚

者。加木香、肉苳蔻。

沉香散四九 順胃氣。止嘔吐。

茯苓二錢 沉香 丁香 米香 藿香 厚朴 炙甘草各一錢 右為末。每服一字。米飲湯

調服。

玉露散 五十 治傷熱嘔吐。

石膏 寒水石 甘草 右為末。每服五分。白湯調下。

六神散 五 治面青啼哭。口出氣冷。或泄瀉不乳。腹痛曲腰。四肢厥冷。

人參 白朮 炒山藥 炙甘草 白茯苓 白扁豆 右為末。每服二三錢。薑茶

水煎。

香梅餅 五 治傷冷積瀉。

木香 青皮 陳皮 厚朴 神麩 麥芽 右為末。蜜和為餅。每服一枚。米飲

調下。

黃芩湯 五 治挾熱下痢。頭痛胸滿大渴。或寒熱脇痛。脈洪大而實者。

黃芩 芍藥 甘草 右每服二三錢。薑水煎。如嘔加半夏二錢。

瀉腸散 五 治小兒久痢。腸頭脫出。

訶子 炮赤石脂 龍骨 右為末。蠟茶少許。和藥摻腸頭上。絹帛捺入。

破故紙散 五 治膀胱虛冷。夜間遺尿。或小水不禁。

破故紙 右為末。每服一錢。熱湯調下。

陳肉豆蔻丸 五 治瀉痢水穀。或淡黃或白。不能止者。

肉豆蔻 訶子肉 白龍骨 木香 砂仁 赤石脂 枯白礬 右為細末。麵

糊為丸黍米大。周歲兒每服三五丸。三歲兒服百丸。溫米飲下。瀉甚者煎木香散。或異攻散送下。不止多服。○薛按前方。治陽氣虛寒腸滑之瀉劑。蓋腎主大便。若因腎氣不固而致前證者。宜用木香散送四神丸。如不應。急煎六君子湯。送四神丸補之。蓋豆蔻丸滯滯之功多。補益之功少也。

甯神丸 五七 治心虛火盛。熱躁驚悸等證。

人參 當歸身 生地 麥冬 各一錢 山梔仁 黃連 炒 炙甘草 各二錢 石菖蒲 三分 辰砂 八分

右加燈心半錢。水一盞。煎七分。調辰砂攪勻。食後溫服。

當歸養心湯 五八 治心虛驚悸。

歸身 麥冬 生地 酒洗 人參 炙甘草 升麻 少用 水一鐘半。加燈草一團。煎七分。食

遠服。

養心湯 五九 治心血虛怯驚癇。或驚悸怔忡。盜汗無寐。發熱煩躁。

人參 黃耆 遠志 當歸 川芎 棗仁 五味子 柏子仁 肉桂 白茯苓 茯神

半夏 麩各三錢 炙甘草 四錢 右每服二三錢。薑棗水煎。

茯神湯 六十 治膽氣虛寒。頭痛目眩。心神恐懼。或是驚癇。

人參 黃耆 炒 棗仁 炒 熟地 白芍 炒 柏子仁 炒 五味子 炒 茯神 各一錢 甘草 炒各五錢

右每服二三錢。水煎。

清神湯六一 治驚癩心虛血熱

犀角銜看連志 薑汁 白鮮皮 石菖蒲 人參 甘草等分 右為末。每服五七分。麥門冬

煎湯調服。

鐵酸棗仁湯六二 治心肺虛熱。煩躁驚悸。瘕疹血熱。血燥等證。

棗仁 炙甘草 人參 生地 麥冬 當歸身 梔子仁等分 右加燈心水一盞煎六

分。溫服。

黑附子湯六三 治慢脾風四肢厥冷。

附子炒去皮 木香 人參各一錢 白附子一錢 炙甘草五分 右為散。每服三錢。薑五片。水煎。

○若手足溫即止後服。

鈎藤散六四 治吐利脾胃氣虛。慢驚生風。

鈎藤鈎 人參 天麻 蝎尾去毒 防風 蟬殼各半 麻黃 礞石炒 炙甘草 川芎各二

麝香五分 右以咀。每服二三錢。水煎。○虛寒加附子一錢。○詳按慢驚之證。屬脾胃虧損

所致。前方乃辛溫散表之藥。而無調補之功。須審用之。

鈎藤散子六五 治小兒一切驚風潮搐。目視昏迷。

鈎藤鈎 防風 獨活 天竺黃 羌活各三 麻黃 升麻 甘草 龍膽草各二 川芎各三

蟬退五個 右每服二三錢。薑棗水煎服。○詳立齋曰。按右方若外感風寒。形證俱實者。

神效良方全書 卷六十二

長 集

宜用之。若形氣虛而病氣實者，宜用惺惺散。加鈎藤、麻黃。若外邪少而形病俱虛者，宜異功散。

錢鈎藤飲 六六

治小兒臟寒夜啼，陰極發躁。

鈎藤鈎 茯神 茯苓 當歸 川芎 木香 各一錢 五分

右每服二錢，薑棗水煎服。

○撮要方有芍藥一錢。○若心經有熱，臉紅便赤，去木香，加硃砂木一錢，木通湯下。

薛抑肝散 六七

治肝經虛熱發搐，或發熱咬牙，或驚悸寒熱，或木乘土而嘔吐痰涎，腹脹少食，睡不安。

軟柴胡 甘草 各五分 川芎 八分 當歸 白朮 炒 茯苓 鈎藤鈎 各一錢 右水煎，子母同服。

以蜜丸，名抑青丸。

大青膏 六八

治傷風痰熱發搐。

天麻 青黛 各一錢 白附子 煨 烏蛇 酒浸取 蝎尾 各五分 天竺黃 麝香 各一分 右為末，生蜜丸。

巨大，每用半粒，薄荷湯下。

地黃清肺飲 六九

治肺熱疳蝕穿孔，或生瘰肉，或鼻外生瘡。

桑白皮 炒 半兩 紫蘇 前胡 赤茯苓 防風 黃芩 當歸 天門冬 連翹 桔梗 生

地 甘草 各二錢 每服五七錢，水煎服，次用化癭丸。

甘草湯 七十

治撮口。

甘草一錢 生用 右水煎以綿裹蘸吮令出痰涎卻以猪乳點入口中即瘥

秘旨安神丸七一 治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

人參 棗仁 茯神 半夏各一錢 當歸 芍藥 橘紅各七分 五味子五粒 炙甘草三分

右為末薑汁糊丸芡實大每服一丸生薑湯下

七味安神丸七二 治心經蘊熱驚悸

黃連 當歸身 麥門冬 白茯苓 甘草各半兩 硃砂一分 冰片二分 右為末湯浸蒸餅

和積猪心血搗丸黍米大每服十九丸燈心湯下

十味安神丸七三 治驚

人參 茯神 麥門冬 山藥各一片 腦一分 龍齒二錢 硃砂 甘草 寒水石各五分 金箔

二片 右為末蜜丸雞豆大燈心湯調下。○一方有馬牙硝

硃砂安神丸七四 方在寒暄一四二 清心火養血安神

錢安神丸七五 方在寒暄一四三 除火邪熱渴清心化痰

安神鎮驚丸七六 驚退後調理安心神養血和平預防之劑也

天竺黃另研 人參 南星 薑黃 茯神各五錢 當歸 棗仁 炒麥冬 生地 芍藥炒各 黃連薑

炒薄荷 木通 山梔炒 硃砂另研 牛黃另研 龍骨粗各二錢 青黛一錢 右為末蜜丸棗豆大

每服三五丸量兒大小加減淡薑湯送下

龍腦安神丸 七七 治驚痰及痘中昏悶諸妄良方

大辰砂飛一分 龍腦半分 右研細末。取豬心、血、小豬尾、六血、和丸如菉豆大。每

服一九或二三丸。新汲水化下。或燈心湯、紫草湯俱可下。

鎮心丸 七八 治急驚、化痰鎮心。

硃砂 龍齒 牛黃各一錢 鐵粉 人參 茯苓 防風 琥珀各二錢 全蝎七枚 右為末。蜜

丸。桐子大。每服一二九。薄荷湯送下。

金箔鎮心丸 七九 治風壅痰熱、心神不甯、驚悸煩渴、唇焦頰赤、夜卧不安、謔語狂妄。

金箔十二貼 硃砂飛一兩 人參 白茯苓 甘草各半兩 山藥一兩 牙硝一錢 麝香五分 片腦一分

右為末。煉蜜丸。每一錢作十丸。以金箔為衣。每服一丸。薄荷湯化下。或合化亦可。

辰砂膏 八十 治眼閉口噤、啼聲不出、吮乳不得、口吐白沫。

辰砂 二錢 硼砂 馬牙硝各一錢 玄明粉 全蝎 珍珠各一錢 麝香 一分 右為末。每服一豆

許。諸驚薄荷湯下。潮熱甘草湯下。月內者。用乳汁調塗乳頭。令吮之。

琥珀散 八一 治急慢驚風、涎潮昏冒、驚搐目眩、內釣腹痛、或驚癇時發。

琥珀 牛黃 膽星此當倍用 白附子 天麻 殭蠶妙去 代赭石 全蝎 蟬退 乳香各一錢

硃砂半錢 右為末。每服一二分。白湯調下。

千龍膽湯 八二 治月內臍風撮口、四肢驚掣、發熱吐乳、及客忤鬼氣驚癇。加人參當歸。

龍膽草炒黑 鈎藤鈎 柴胡 黃芩炒 芍藥炒 桔梗 茯苓 甘草 大黃煨各二錢 蜣螂二

足翅 右為末。每服一二錢水煎。量兒加減。

梅花飲八三 治五臟積熱。喉中有痰。面色赤白。鼻流清涕。氣逆喘急。目赤。咳嗽。或因驚。夜啼。

礪砂 馬牙硝 芒硝 辰砂各一人參二錢 甘草五分 片腦半分 麝香一分 右為末。磁

器收貯。每服半匙。麥冬湯調服。或薄荷湯亦可。

擦牙通關散八四 治風搐關竅不通。痰塞中脘。留滯百餘。

南星二錢 麝香一字 牙皂二錢 煨薑一錢 赤腳蜈蚣一條 右為末。薑汁煎藥。少許擦牙。

或調服二三點。痰涎自出。

陳抱龍丸八五 治風痰壅盛。或發熱。咳嗽。或發驚。搐等證。

膽星九裂 天竺黃一兩 雄黃錢各五 麝香五分 另研。或

極濃汁搗丸。每兩作二十九。陰乾。用薄荷湯。或燈草湯。下一二丸。此方加牛黃四錢。即名

牛黃抱龍丸。加琥珀。即名琥珀抱龍丸。

至聖保命丹八六 治胎驚內釣。肚腹堅硬。啼叫不安。乃急驚風。眼目上視。手足抽搐。不省人

事。

全蝎十四個 防風二錢 炮南星 白附子 蟬蛻 殭蠶去絲 天麻 硃砂各一 麝香五分

金箔右為末 米糊和。每兩作四十九丸。每服一丸。白湯化下。有熱者。以南星易炮星。此方去

天麻加琥珀。搜成錠。以薄荷湯磨服。即名保生錠子。亦名太乙保生丹。治慢驚尚有陽證者。

定命丹 八七 治天鈞撮口。通利痰熱。

全蝎 七枚 天麻 南星 地白附子 各二錢 硃砂 青黛 各一錢 麝香 各五分 片腦 一字

右為末。朱糊丸。菘豆大。每服一二丸。荆芥薄荷湯下。可先研半丸。吹入鼻中。

九還金液丹 八八 此藥有輪旋造化之功。專治男婦痰厥氣急。中風不語。口眼歪斜。左癱右

疾。牙關緊急。及小兒急驚風。手足抽搐。不省人事。痰多氣急等證。功效不可盡述。

膽星 九製者 硃砂 飛一兩 生牛黃 五錢 礞石 五錢 牙皂 去皮絲炒 冰片 麝香 各五分 小麥麵

炒熟。煉蜜和勻。搗丸。艾實大。金箔為衣。黃蠟團收。藏。如大人牙關緊急。先以通關散開其

竅。隨用滋養湯化下一二丸。若治小兒。用薄荷湯化下一丸。

膽星天竺丸 八九 治小兒痰涎上壅。喘嗽不休。

膽星 一兩 天竺黃 三錢 半夏 薑製 白附子 湯洗去皮 天麻 防風 各二錢 辰砂 一錢 右為末。

甘草湯為丸。艾實大。每服一丸。空心薄荷湯。或淡薑湯下。

驅風豁痰定驚。

人參 防風 白附子 生用 真殭蠶 炒 全蝎 各一錢 南星 湯洗七次 天麻 各二錢 右用末。水糊丸。

粉紅丸 九一 治小兒心虛困卧驚動。痰涎不利。或發熱痰嗽等證。

粉紅丸 九一

治小兒心虛困卧驚動。痰涎不利。或發熱痰嗽等證。

上海醫學書局印行

天竺黃 五錢 天南星 硃砂 各半 冰片 麝香 各一 右以牛膽汁和丸。芫實大。每服一丸。砂糖湯下。

錢牛黃丸 九二

治風癩因汗出風邪乘虛而入。痰涎迷悶。手足搐掣。

牛膽南星 全蝎

蟬蛻 各二錢

防風 白附子 生用

天麻 礞石 炒各一

麝香 半字

右為

朱棗肉和丸

加水銀半錢同研細末。綠豆大。每服一二丸。荆芥生薑湯下。

雜牛黃丸 九三

治小兒驚風中風五癩。天吊客忤。潮熱痰涎。癰疽等證。

白花蛇 酒浸

白附子 川烏

全蝎 天麻

薄荷 雄黃 各五

硃砂 二錢

牛黃 麝香 各

錢 冰片 五分

右各另研為極細末和勻。用麻黃煎酒搗芫實大。每服一丸。薄荷湯下。

萬牛黃清心丸 九四

治心熱神昏。

黃連 生半

黃芩 山梔仁 各三

鬱金 二錢

辰砂 半錢

牛黃 二分

右為細末。臘雪調麵糊丸。

如黍米大。每服七八丸。燈心湯下。

三味牛黃丸 九五

治驚熱消疳積。

雄黃 飛

牽牛 各一

天竺黃 二錢

右為末。麵糊丸。粟米大。每服五七丸。薄荷水下。

涼驚丸 九六

涼驚癩熱搐暗赤。潮熱痰涎。牙關緊急。

龍膽草 炒焦

防風 青黛 各三

鈎藤 鈎 二錢

黃連 炒五

龍腦 一錢

牛黃 麝香 各二

右為

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

末。麵糊丸。粟米大。每服十丸。煎金銀花湯下。

利驚丸九七 治急驚。

天竺黃二錢 輕粉 青黛各一錢 黑牽牛炒五錢

一方無天竺黃。右為末。煉蜜丸。豌豆大。每

歲一丸。薄荷水化下。

鐵抑膏丸九八 治肝熱急驚搐搦。

羌活 川芎 當歸 防風 龍膽草等分 右為末。煉蜜丸。艾實丸。每服一二丸。竹葉湯

入砂糖化下。○此方加大黃。梔子仁。即名瀉青丸。

化痰丸九九 治驚搐喉內痰響者。暫用。

膽星 半夏 礞石製 枳實各二錢 麝香三分 右為末。薑汁糊丸。綠豆大。硃砂為衣。薑湯研

化量送。

比金丸一百 治驚癇。先用此藥。

人參 遠志薑製取肉炒 白茯苓 南星 川芎 石菖蒲細蜜者 天麻 硃砂 青黛 琥珀各

麝香一字 右為末。蜜丸。桐子大。每服一二丸。金銀薄荷湯下。

虎睛丸百一 治驚癇。邪氣入心。

虎睛細研 遠志薑汁洗 犀角銹屑 石菖蒲 大黃酒洗 麥冬等分 蜈蚣去足翅炒三枚 右為末。米糊

丸。桐子大。每服一二丸。竹葉煎湯。或金銀薄荷湯下。

五癩丸百二 一名五色丸。○治五癩。

硃砂 珍珠各五錢 雄黃 一兩 水銀二錢半 黑鉛三兩同水 右為末 煉蜜丸 麻子大 每服三四

丸煎金銀薄荷湯下。

斷癩丹 百三 治五癩瘰後復發。證候多端。連綿不除者。

黃耆 蜜炙 鈎藤鈎 細辛 炙甘草各半 蛇脫二寸 蟬退 四個 牛黃一錢 右為末 煮棗肉

丸麻子大 煎人參湯下。每服數丸。量兒加減。

消風丸 百四 治風癩。先宜此藥。

膽星 二錢 羌活 獨活 防風 天麻 人參 荊芥 川芎 細辛各一 右為末 蜜丸

桐子大 每服二丸 薄荷紫蘇湯調化下。

妙聖丹 百五 治食癩。因驚而停食吐乳。寒熱。大便酸臭是也。

赭石煅醋淬 巴霜三分 硃砂 雄黃 蝎梢各一錢 輕粉 麝香各一 杏仁微炒 右為末 棗

肉丸桐子大 每服一二丸。木賊草煎湯送下。

漏銀丸 百六 治癩癩。風涎癩。腹脹喘促。實滯者。

巴豆 水銀各五錢 京墨八錢 煨硫磺 黑鉛二錢半 麝香五分 右為末。陳米粥丸。綠豆大。每服二

三丸。煎薄荷湯下。

薛紫河車丸 百七 治癩癩。

紫河車肥大者 人參 當歸用為末 右將河車生研爛入二藥。搗丸。桐子大。每服五七十

丸日進三服。人乳化下。按此方。凡先天不足。後天虧敗者。俱可隨宜增用藥物。照此制服。無不可也。然河車必用酒煨熟方善。雖薛氏之意。用其生氣。但生者腥膩。恐不利於胃氣。且此物既離本體。尚何生氣之有。亦不過取其應求之性。味為血氣之資而已。別人之血氣。本皆熟物之所養成。而飲食之類。凡生用熟用。其補瀉有其相遠者。豈熟之即無益。而生之果無礙耶。余故曰熟之為宜。

大蕪荑湯 百八 治小兒脾疳發熱。作渴少食。大便不調。髮黃脫落。面黑。鼻下生瘡。能乳嗜土等證。

蕪荑 山梔 各五分 當歸 白朮 茯苓 各四分 柴胡 麻黃 羌活 各三分 防風 黃連 黃柏

炙甘草 各二分 右作二劑。水煎服。

生熟地黃湯 百九 治疳眼閉合不開。

生地黃 熟地黃 各半兩 川芎 赤茯苓 枳殼 杏仁 去皮 川黃連 半夏 麩 天麻 地

骨皮 炙甘草 各二錢 右每服二三錢。黑豆十五粒。薑水煎服。

蘭香散 百十 治鼻疳赤爛。

蘭香葉 二錢 銅青 燒灰 輕粉 各五分 右為末。乾貼。

四味肥兒丸 百十 治小兒食積五疳。目生雲翳。牙根腐爛。口舌生瘡。發熱體瘦。肚大筋青。髮

稀成穗。或白禿瘡疥。小便澄白等證。

燕美少神翅 麥芽少 黃連各等 右為末。豬膽汁丸。黍米大。每服二三十丸。木通煎湯下。

六味肥兒丸百十 消疳化蟲退熱。

黃連 陳皮 川棟子去核 神翅炒 麥蘖炒 白燕美半兩 右為末。糊丸。麻子大。每服一

二十九。空心米飲吞下。○薛氏曰。前方又治脾疳。飲食少思。肌肉消瘦。肚大頭細。髮稀成穗。

項間結核。發熱作渴。大便酸臭。嗜食泥土。或口鼻頭瘡。肚見青筋。嚙齒便白。五疳用此丸。加

乾蟾一兩。尤妙。

七味肥兒丸百十 治小兒食積五疳。頭項結核。髮稀成穗。發熱作渴。消瘦等證。

黃連炒 神翅炒 木香各一兩 檳榔二十 史君子酒浸 麥芽炒 肉豆蔻炒 麵糊丸。麻子大。

每服三五十丸。米飲下。良久。用五味異功散一服。以助胃氣。

蘆薈肥兒丸百十 治疳熱。

蘆薈 龍膽草酒洗 木香 人參 史君子肉 蚶蚶酥炙去頭 麥芽炒 檳榔 黃連去

酒 白燕美各三錢 胡黃連五錢 右為細末。豬膽汁為丸。黍米大。每服五六十丸。米飲下。

大蘆薈丸百十 一名九味蘆薈丸。○治小兒脾疳。疳積發熱。體瘦熱瀉。大便不調。或瘰癧結

核。耳內生瘡。牙顯蝕爛。目生雲翳等症。

胡黃連 黃連 蘆薈 白燕美炒 白雷丸做開赤木香 青皮 鶴虱草一錢

右為末。蒸餅糊丸。麻子大。每服一錢。空心白湯送下。○立齋曰。肉青皮以龍膽草代之。麝

香不用尤效。

加減蘆薈丸百十

治證同前。尤治小兒疳積腹脹。

蘆薈真者

宣黃連去翳

枳實

青皮各二錢

青黛錢半

木香

山查肉各二錢

麥芽炒三錢

麝香一分

乾蝦蟆一隻

酥炙

右為細末。湯浸蒸餅為丸。綠豆大。每服七八分。量兒大小與之。

按此方加史君子肉三錢。治溼熱生蟲亦佳。

當歸龍薈丸百十

方在寒陣一六七。治肝經實火大便秘結。

良蘆薈丸百十

方在寒陣一六八。治疳癖發熱諸證。

龍膽丸百十

治腦疳熱瘡。

龍胆草

升麻

苦棟根皮

赤茯苓

防風

蘆薈

油髮灰各二錢

青黛

黃連各三錢

右為末。牡豬胆汁浸米糕丸。麻子大。薄荷湯下。仍以蘆薈末數入鼻內。

木香丸百十

治疳痢。

黃連淨三錢

木香

紫厚朴

夜明砂紙炒各二錢

訶子肉炒一錢

右為末。飯丸。麻子大。乾艾生薑煎湯。食前下。

黃連丸百十

治疳勞。

黃連半兩

石連子

瓜薑根

杏仁去皮

烏梅肉各二錢

右為末。牛膽汁浸糕丸。麻子大。煎烏梅薑蜜湯下。

黃連丸百十

治疳勞。

黃連半兩

石連子

瓜薑根

杏仁去皮

烏梅肉各二錢

右為末。牛膽汁浸糕丸。麻子大。煎烏梅薑蜜湯下。

黃連丸百十

治疳勞。

黃連半兩

石連子

瓜薑根

杏仁去皮

烏梅肉各二錢

右為末。牛膽汁浸糕丸。麻子大。煎烏梅薑蜜湯下。

黃連丸百十

治疳勞。

黃連半兩

石連子

瓜薑根

杏仁去皮

烏梅肉各二錢

右為末。牛膽汁浸糕丸。麻子大。煎烏梅薑蜜湯下。

胡黃連丸百二 治熱疳。

胡黃連

黃連各五錢

硃砂二錢

右為末。填入猪膽內。以線扎懸掛鈔中。淡漿水煮數沸。取

此研蘆香、麝香各二錢入之。飯和丸。麻子大。每服一二十丸。米飲下。

蟾蜍丸百二

治小兒頸項結核。面色痿黃。飲食不甘。腹大發熱。名曰無辜疳證。一服虛熱退。

二服煩渴止。三服瀉痢愈。

蟾蜍個一二

夏月溝渠深土中。取腹大不跳不鳴者。是身多偏者佳。右將糞蛆一杓置桶

中。以尿浸之。即將蟾蜍跌死。投與蛆食一晝夜。用布袋盛蛆。置急流中一宿。取出瓦上焙乾。

為末。入麝香一字。粳米飯丸。麻子大。每服二三十丸。米飲下。其效如神。

天麻丸百二

治疳風疳眼。

天麻 青黛 黃連

五靈脂

夜明砂微炒

川芎

蘆薈各二錢

龍膽草

防風

蟬退去足

各一錢半

全蝎二枚

乾蟾頭天焦三錢

麝香

右為末。猪膽汁浸末。糕丸。麻子大。每服十九。薄荷湯下。

靈脂丸百二

治脾疳食疳。

白豆蔻

麥芽炒

五靈脂

砂仁

蓬朮煨

青皮

橘紅

史君子焙各二錢

螻蛄天焦三錢

右為

末。米糊丸。麻子大。每服十九。米湯下。

如聖丸百二

治疳熱泄瀉。

白蕪荑炒

川黃連

胡黃連各二兩

史君子肉一兩

麝香五分

乾蝦蟆五個酒

煨去骨

右為末。以蝦

蠟膏杵丸麻子大每服一二十九煎人參湯下。薛按疔之為患乃肝脾虛熱津液乾涸之證前方乃專於治疔清熱之劑若脾胃虛弱者當佐以六君子湯調補脾胃使邪氣退庶可收全功也。

痲子丸百二

治疔腫脹

蘿蔔子一兩

微炒陳皮

青皮炒

檳榔

五靈脂

蓬木煨

黑牽牛頭木炒

赤茯苓

木香二錢

右為末

麵糊丸綠豆大

每服十五丸

紫蘇湯下

消積丸百二

治食積大便酸臭發熱

丁香九個

砂仁十二個

烏梅肉三個

巴豆二粒去皮心膜

右為末

麵糊丸黍米大

每服五七丸

滾水

送下

壅氣丸百二

治肚腹膨脹

胡椒一兩

蝎尾五錢去毒

右為末

麵糊丸粟米大

每服一二十九

陳米飲下

紫霜丸百三

治驚積及變蒸發熱不解或食痢先寒後熱或乳哺失節宿滯不化腹痞便結

代赭石煨醋淬七次

赤石脂各一兩

杏仁五十個

巴豆三十粒去油

右先將巴豆杏仁研成膏入代赭

石脂研勻

湯浸蒸餅丸粟米大

每服三五丸

米飲送下

化蟪丸百三

黃連五錢

蜀椒去閉口者炒出汗

苦楝根白皮各二錢

右為末

用烏梅肥者七個

艾湯浸去核搗爛

和丸艾湯量兒大小送下。

下蟲丸百三 治疳蛔諸蟲

苦棟根皮新白者綠色貫眾

乾蝦蟇炙焦史君子五十取

肉三錢內加當歸川連各二錢五分

史君子丸百三 治五疳疔蟲脾胃不和心腹膨脹時復作痛不食漸瘦

史君子肉一兩厚朴製橘皮白芍藥甘草少川芎各一錢右為末蜜丸半角子大每服

一丸陳米飲化下

白玉散百三 治丹瘤

白土半二錢寒水石五錢右為末水醋或新水調塗

以下通用方

四君子湯百三 方在補陣一 治脾肺氣虛諸證

六君子湯百三 方在補陣五 治脾胃虛弱嘔吐等證

五味異功散百三 方在補陣四 治脾胃虛寒飲食少思等證

四物湯百三 方在補陣八 治一切血虛等證

八珍湯百三 方在寒陣十九 治氣血兩虛

十全大補湯百四 方在補陣二十。治氣血俱虛。大補元氣。

獨參湯百四 方在補陣三六。治氣虛氣脫。挽回元陽。

歸脾湯百四 方在補陣三三。治心脾虛損。

參朮湯百四 方在補陣四一。治氣虛泄瀉。嘔吐等證。

參朮膏百四 方在補陣四十。治中氣虛弱。諸藥不應者。

參苓散百四 方在補陣五四。治睡中汗出。

參附湯百四 方在補陣三八。治真陽虛極。喘急呃逆。

參朮白朮散百四 方在補陣五五。治脾胃虛弱。食少吐瀉。

理中湯百四 方在熱陣一。治上中二焦虛寒。諸證。

生脈散百四 方在補陣五七。治熱傷元氣。止渴消煩。定欬嗽喘促。

五福飲百五 方在新補六。補五臟虛損。

五君子煎百五 方在新熱六。治脾胃虛寒。嘔吐泄瀉。

理陰煎百五 方在新熱三。治脾腎虛寒。諸證。

溫胃飲百五 方在新熱五。治中寒嘔吐吞酸。泄瀉少食。

養中煎百五 方在新熱四。治中氣虛寒。嘔泄。

參薑飲百五 方在新熱八。治脾肺胃氣虛寒。嘔吐欬嗽。

六味回陽散

百五

方在新熟二。

治陰陽將脫等證。

六味異功煎

百五

方在新熟七。

治脾胃虛寒。吐瀉兼滯者。

大味丸

百五

方在補陣一二一。

壯水補腎。

八味丸

百五

方在補陣一二二。

益大補陽。

胃關煎

百六

方在新熟九。

治脾腎虛寒瀉痢。

佐關煎

百六

方在新熟十。

治生冷傷脾瀉痢。

五德丸

百六

方在新熟十八。

治脾腎寒滯一切瀉痢發泄。

二陳湯

百六

方在和陣一。

治和脾消痰。

芍藥枳實丸

百六

方在新和十六。

健脾消積。止腹痛。除脹滿。

枳朮丸

百六

方在和陣七九。

健脾胃。消食積。

大和中飲

百六

方在新和七。

治飲食留滯。

小和中飲

百六

方在新和八。

治胸膈脹滿。脾胃不和。

四順清涼飲

百六

方在攻陣二五。

治血熱壅滯秘結。

青州白丸子

百六

方在和陣一一二。

治風痰嘔吐。牙關緊急。

瀉青丸

百七

方在寒陣一五一。

治肝火急驚目赤。

掃蟲煎

百七

方在新和一四。

治諸蟲上攻。胸腹作痛。

加批 詳評 景岳全書

卷六十三

長集痘疹詮古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

痘疹

保元湯一 治痘瘡氣虛下陷者

人參二三錢

炙甘草一錢

肉桂五分

黃耆二三錢

此藥煎熟。加人乳好酒各半。蓋和服。更妙。酌宜用之。○頭額不起。加川芎三五分。○面部。加

升麻三四分。○胸腹加桔梗三四分。○腰膝加牛膝四分。○四肢不起。加桂枝。○嘔惡。加丁

香三四分。○元氣虛寒。加大附子七八分。或一錢。

調元湯二 按此即保元湯無肉桂者。名為調元湯。即東垣之黃耆湯也。東垣用為小兒治驚

之劑。魏桂巖用以治痘多效。因美之名。保元湯也。蓋小兒元氣未充。最易傷殘。用此保全。誠

幼科王道之妙方。但能因此廓充。則凡氣分血分虛寒虛陷等症。皆可隨症增減用之。無不

可奏神效也。

內補湯三 治痘瘡中虛等症

人參 黃耆 當歸 白朮 川芎 甘草 茯苓 陳皮 厚朴 右等分。水煎服。

托裏散四 治痘毒元氣虛弱或妄行起伐不能潰散用之未成自消已成自潰並治癰毒內
虛不能起發

人參 黃耆炒各二錢 當歸酒洗 白朮 熟地 芍藥炒 茯苓各一錢半 炙甘草五分

右每用一錢

水煎服○外科樞要方有陳皮一錢半無甘草

解毒內托散五 治痘癰

金銀花 黃耆 當歸 赤芍藥 防風 甘草節 荆芥 連翹 木通 右水煎入酒少許服

陳氏托裏清毒散六 治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參 黃耆炒 當歸酒洗 川芎 芍藥炒 白朮炒 茯苓 陳皮各一錢 金銀花 連翹 白芷

各七 炙甘草五分 右每服三五錢水煎服○外科方無陳皮

參香內托散七 治痘瘡裡虛發痒或不潰膿或為倒靨及瘡癰膿毒不化膿潰作痛等症

人參 黃耆蜜炙 當歸 川芎 厚朴蜜炙 防風 桔梗炒 白芷 紫草 官桂 木

香 甘草等分 入糯米一撮水煎服色淡白者去防風紫草白芷多加糯米○一方有芍藥

參香四聖散八 治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參 黃耆炒 白朮炒 當歸 川芎 芍藥炒 茯苓各五錢 紫草 防風 木通各三錢 右用水煎服

陳氏四聖散九 治痘瘡出不快及倒靨因內實者

紫草 草 木通 炙甘草 枳殼炒 黃耆等分 右每服一錢加糯米一百粒水煎待米熟溫服

加味四聖散十 治痘瘡黑陷倒陷。

人參 黃耆 炙川芎 甘草 紫草 木通 木香等分 蟬蛻 十個 右加糯米百粒水一

盞煎服。

如聖湯十一 治毒盛不起。

芍藥 升麻 乾葛 各一錢 紫草 木通 各五分 水一鍾 薑一片 煎七分 溫服 不拘時。

人參 固肌湯十二 治痘瘡發表太過 致肌肉不密 或痘痂久粘者。

人參 黃耆 當歸 酒洗 甘草 蟬蛻 等分 水一鍾 入糯米一撮 煎服。

人參 透肌散十三 治痘瘡虛而有熱 雖出快而不齊 隱於內膚間者。

人參 紫草 如無血 花代之 白朮 當歸 芍藥 茯苓 甘草 木通 蟬退 糯米 等分 右每

服三錢水一盞煎半盞徐服之。

十宣散十四 一名托裏十補散。調氣補血。內托瘡毒。五日後必用之方也。亦治癰疽。

人參 黃耆 當歸 各二錢 川芎 防風 桔梗 白芷 甘草 炙 厚朴 各一錢 桂心 三分 右

為細末 每服一錢或二錢 木香湯下。

芍歸湯十五 亦名活血散。大能養營起痘。

當歸 倍用 川芎 右為細末 每服一匙 紅花湯調服。

活血散十六 治痘疹血虛血熱 已出未盡 煩燥不寧 腹痛。

白芍藥酒炒 右為末每服一匙糯米湯調下。或荔枝湯亦可。○此方對四君子湯加歸者名

參歸活血散

當歸活血散 十七

治痘色淡白。

當歸

酒焙赤芍 酒炒川芎

紫草

紅花各五錢

木香

二錢

血竭

一錢

右為末每五歲者服

一錢十歲已上服二錢酒下。

養血化斑湯 十八

治白疹白痘。

當歸身 人參

生地 紅花

蟬蛻等分水

一盞生薑一片煎六分

溫服無時

人參胃愛散 十九

治痘疹已發未發吐瀉不止不思飲食等症。

人參 茯苓

甘草 丁香

藿香 紫蘇

木瓜 糯米

右每服三錢

薑棗水煎

溫服

二仙散 二十

治體寒肢冷腹痛口氣冷陰盛陽衰嘔吐泄瀉難發等症。

丁香 九粒

乾薑 炒一錢

右為細末每服五七分白湯送下。被蓋片時令脾胃溫暖陰反陽回

則痘變潤矣。量大小加減與之。

陳木香散 二十一

又名十一味異功散。○治小兒痘疹虛寒多滯者宜此。

木香 丁香

大腹皮 人參

桂心 炙甘草

製半夏

訶黎勒

赤茯苓

青皮

前胡等分

右每服二三錢

薑水煎

○薛按曰。前方治痘瘡已發未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活。五七日內泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或驚悸

或汗出。或寒戰咬牙。或欲屬不屬。瘡不結痂。或屬後腹脹泄瀉作渴。此皆脾胃虛寒。津液衰少。急用此藥治之。若誤認為實熱。用寒涼之劑。及飲蜜水。生冷瓜果之類。必不治。

陳氏十二味異功散 二二

治元氣虛寒。小兒痘疹色白。寒戰咬牙。泄瀉喘嗽等症。

人參 丁香 木香

肉豆蔻

陳皮

厚朴

白朮

茯苓

官桂

當歸

各二錢 半三錢 製

附子 半夏 各錢

右咀

每服二三錢

薑棗水煎服

○愚按陳氏此上二方

溫性有餘

補性

不足

用以治寒證則可

用治虛證則不及也

用者更當詳酌

陳氏人參麥門冬散 二三

治痘瘡微渴

麥門冬 一兩

人參

炙甘草

白朮

陳皮

厚朴

各製

右每服三四錢

水一大盞煎

至六分

徐徐溫服

量兒增減

○薛氏曰

前方治痘瘡熱毒氣虛宜用之

若因氣虛作渴

宜人

參白朮散

柴胡麥門冬散 二四

治痘瘡壯熱。經日不止。更無他證者。

柴胡 二錢

龍膽草 一錢

麥門冬 三錢

甘草 一錢

人參 一錢

玄參 一錢

各錢

右咀

每服三錢

水一大

盞煎

至六分

不拘時徐徐溫服

量大小加減

○按此方解表之功居六

清火之功居四

養營

退熱

此方最宜

升均湯 二五

治瘡已出不勻

或吐瀉發熱作渴

升麻 乾葛 人參 白朮

芍藥 茯苓 甘草 紫草

如無紅

花代之

右每服三五錢

薑棗水煎

升麻 乾葛 人參 白朮

芍藥 茯苓 甘草 紫草

如無紅

花代之

右每服三五錢

薑棗水煎

升麻 乾葛 人參 白朮

芍藥 茯苓 甘草 紫草

如無紅

花代之

右每服三五錢

薑棗水煎

升麻 乾葛 人參 白朮

芍藥 茯苓 甘草 紫草

如無紅

花代之

右每服三五錢

薑棗水煎

升麻葛根湯 二六 亦名升麻湯 解發瘡毒之良方

升麻 葛根 芍藥 甘草等分 右吹咀水一盞煎七分。溫服無時。○萬氏曰。古人治瘡。用升麻葛根湯為主。後世好奇。多立方法。法愈多而治愈難矣。苟能變通。則瘡疹諸證。皆可增減用之。不特發表解肌而已。今以葛根湯為主治。隨證立增損法於後。○初發熱解表。加柴胡羌活白芷桔梗防風。○口乾渴內熱也。加葛粉天花粉麥門冬。○自利。加條黃黃芩。○嘔吐。加半夏生薑。○腹中痛。加木香青皮枳殼山查肉腰痛。加獨活北細辛。○頭痛。加羌活。○薰本蔓荊子。○驚搐。加木通生地黃燈心。○小便少。加木通車前瞿麥。○大便秘。加大黃。○衄血。加山梔仁玄參生地黃。○發熱三四日。熱甚不減。須解其毒。加大力子連翹紫草。○瘡不出。加防風蟬蛻荆芥穗紅花子。○目痛。加龍膽草蜜蒙花紫胡。○瘡出太稠密。加人參當歸木香紫草大力子防風桔梗。○咽痛。加桔梗連翹。○瘡乾或帶紫或太赤者。血熱也。加當歸梢生地黃紅花地骨皮牡丹皮。○瘡平陷。灰白色者。氣虛也。加人參白朮防風木香官桂。○手足瘡不起。脾胃不足也。加人參黃耆防風官桂。○泄瀉者。裏虛也。加人參白朮訶子白茯苓。○瘡不著痂者。濕也。加黃耆防風官桂白芷。○愚謂前方乃胃經發表之劑。萬氏增減之法。大意已悉。但此方性味清涼。純於疎泄。必陽明多實多熱者。乃宜用之。然小兒氣血體質大都虛弱平和者。十居七八。故凡瘡瘡初起。乍見發熱。用藥最貴乎和。兼養營氣。則瘡乎盡善。若預用清涼。未免傷其胃氣。全用解散。未免虛其表氣。二者受傷。變患有不

可測矣。故余制柴歸飲為治痘之先著。所當酌宜用之。若治麻疹。則多屬火證。此方乃所宜也。

蘇葛湯 二七

初熱未見點。發表之劑。暫用之。分兩宜酌兒大小。以為增減。

蘇葉 二錢

葛根 二錢

甘草 一錢

白芍藥 錢半

連翹 葱白 三根 生薑 三片 水鍾半 煎七分 熱服

○原方有陳皮砂仁各五分。此惟氣滯腹痛者宜用之。否則不必。

連翹升麻湯 二八

散毒清火

連翹 一錢

升麻 一錢

葛根 一錢

桔梗 一錢

甘草 各七

白芍藥 五分

薄荷 少許

右加淡竹葉 燈草 水

一盞半 煎一盞 溫服 無時

柴胡橘皮湯 二九

柴胡 橘皮 人參 半夏 茯苓 黃芩 等分

右加竹茹 一團 水一盞 煎七分 溫服 不拘

人參敗毒散 三十

方在散陣 三六 治時疫斑疹

荆防敗毒散 三一

亦名消風敗毒散。○發散痘疹俱可用。及時氣風毒邪熱。

柴胡 荆芥 穗 防風 羌活 獨活 前胡 川芎 枳殼 人參 甘草 桔梗 茯苓 等分

右切細。加薄荷葉 水一盞 煎七分 去滓 溫服

柴葛敗毒散 三二

疑似傷寒。以此解散

柴胡 乾葛 人參 羌活 防風 荆芥 桔梗 蘇葉 甘草 右用生薑 三片 水煎服

柴胡 乾葛 人參 羌活 防風 荆芥 桔梗 蘇葉 甘草 右用生薑 三片 水煎服

參蘇飲 三三

方在散陣三四

治傷風咳嗽傷寒痘疹。

加減參蘇飲 三四

初熱見點解利之藥。但表邪未達而元氣強壯者宜暫用之。或前後感冒

風寒俱可暫用。

蘇葉一錢 乾葛錢半 前胡八分 陳皮七分 枳殼六分 桔梗 甘草各四分 水一鍾半。加生薑三

片煎服。

麻黃甘草湯 三五 冬月痘毒熾盛表實者宜用之。

麻黃錢一二 生甘草減半 水煎服。

柴葛桂枝湯 三六 表散痘熱。

柴胡 乾葛 桂枝 防風 甘草 人參 白芍藥 水一盞。加生薑三片煎七分。溫服。

桂枝葛根湯 三七 解散寒邪。

桂枝 葛根 升麻 赤芍藥 防風 甘草各一 右加生薑三片。淡豆豉一錢。水一鍾

煎七分。溫服無時。

十味羌活散 三八 此初熱見點解利之劑。若小兒身壯力強者可用蘇葛以行表。其次者宜

此和解疎利之藥。若虛而宜補者。必當兼顧元氣。不得單用此類。

羌活 前胡 防風各一 荆芥 獨活各八 細辛 白芷各三 柴胡 炙甘草 蟬退各四

水一鍾半。加薄荷三葉煎五分。不拘時服。○發搐及熱盛不退者。調入製過硃砂末服之。

神效。

十三味羌活散

三九

解熱散毒治風塵欲作瘡疹者。

羌活 獨活

防風

桔梗

荆芥

柴胡

前胡

地骨皮

炙甘草

蟬退

川芎

天花粉

天麻

等分

右為細末

每服二三錢水一盞

入薄荷葉三片煎四分

溫服

羌活湯

四十

解發瘡

兼治肝熱驚狂

羌活

川芎

防風

山梔仁

龍胆草

當歸

等分

甘草減半

淡竹葉

薄荷葉

水煎

溫服無時

雙解散

四一

瘡疹表裡俱實者

非此不解

防風

川芎

當歸

連翹

芍藥

薄荷

大黃各五分

石膏

桔梗

黃芩各八分

荆芥穗

白朮

桂枝各二分

滑石四分

甘草錢二

水二鍾

加生薑三片煎一鍾

溫服無時

此即防

風通聖散

去麻黃芒硝

梔子

外加桂枝也

柴胡飲子

四二

治瘡疹表裡俱實良方

柴胡

防風

當歸

人參

白芍藥

甘草

黃芩

滑石

大黃等分

右加生薑一片

水煎服

桂枝大黃湯

四三

治腹痛大便不通良方

桂枝

白芍

各二錢半

甘草五分

大黃一錢

右剉細

加生薑一片

水一鍾半

煎八分

食前溫服

防風芍藥甘草湯 四四

解痘毒及陽明經痘出不快

防風 芍藥 甘草 等分

右每服一二錢水煎服

荆芥防風甘草湯 四五

解痘毒及太陽經痘出不快

荆芥 防風 甘草 等分

右每服一二錢水煎溫服

蟬退膏 四六

治痘瘡虛陷不起

蟬退 當歸 川芎 升麻

防風 荆芥穗 等分 加人參 白芍藥

煉蜜丸如芡實大每服一九薄荷湯下

消毒散 四七

亦名消毒飲。○治痘瘡六七日間身壯熱不大便其脈緊或者用此藥微利之

荆芥穗 炙甘草 各一兩

右為粗散每服三錢水一盞煎七分不拘時徐徐服

四味消毒飲 四八

治痘瘡熱感毒氣墮過無間前後皆可服

人參 炙甘草 黃連 牛蒡子 等分

右為粗末每服一錢加生薑一片水一盞煎四分

去滓溫服不拘時

六味消毒飲 四九

解痘毒

牛蒡子 連翹 甘草 升麻 紫草 山豆根 等分

水一盞煎七分溫服不拘時

清毒化斑湯 五十

清風散毒清眼目咽喉

升麻 柴胡 桔梗 甘草 連翹 龍胆草 牛蒡子 防風 蟬蛻 蜜蒙花 水一

升麻 柴胡 桔梗 甘草 連翹 龍胆草 牛蒡子 防風 蟬蛻 蜜蒙花 水一

鍾半。加淡竹葉十片煎服。

解毒湯 五十一 治一切熱毒腫痛凡風熱癩瘡。

黃連 金銀花 連翹 右水煎服。

真人解毒湯 五二 治痘母。

忍冬花 斤半 甘草節 兩 木通 防風 荆芥 連翹 各三 右分作三劑。用水酒各一鍾煎服。

以腫消痘出為度。

葛根解毒湯 五三 解痘毒止渴良方。

葛根 升麻 減半 生地黃 麥門冬 天花粉 等分 甘草 減半 右取糯米泔水一盞煎七

分。入葛根自然汁一合服之。

貫表解毒湯 五四

人參 黃耆 當歸梢 生地黃 甘草 白芍藥 柴胡 升麻 酒片苓 玄參 地

骨皮 右入薄荷葉少許。淡竹葉十片。水煎服。

迴源解毒湯 五五 解胎毒之良方。

當歸身 川芎 生地黃 白芍藥 人參 生甘草 黃連 連翹 陳皮 木通 等分

水一盞。加淡竹葉十片煎半盞溫服無時。

陳氏解毒防風湯 五六 治痘瘡毒氣熾盛。

防風 黃芩 地骨皮 白芍藥炒 荆芥 牛蒡子 右每服四五錢水煎服或為末白湯

調下。○外科解毒防風湯方見本門六三。

化毒湯五七 治痘未出腹痛者

白芍藥 炙甘草各一錢 木香 青皮 枳殼各七 山查肉 連翹 肉桂各五 水一盞煎七分溫服不拘時

消風化毒湯五八 防風 黃耆 桂枝 荆芥穗 升麻 白芍 牛蒡子等分 甘草減半

右加薄荷葉七片水一盞煎七分無時服

涼血化毒湯五九 治痘瘡初出痘焦黑

歸尾 赤芍藥 生地黃 木通 連翹 牛蒡子 紅花 紫草 桔梗 山豆根 右

水煎服○或加童便一小盞亦可

犀角化毒丸六十 治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡口舌牙齦糜爛等

犀角屑錢 生地黃 當歸 防風 荆芥穗各一兩 牛蒡子炒并 赤芍藥 連翹 桔梗各七錢

薄荷 黃芩炒 甘草各五錢 右為末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷下

五福化毒丹六一 治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃 天門冬 麥門冬 玄參 熟地黃各三兩 甘草 硃硝各兩半 青黛兩半

煉蜜丸芡實大每服一丸白湯或薄荷湯化下 右為末

辨五福化毒丹 六二 方在外科七六 治一切熱毒瘡癰。

犀角散 六三 治痘瘡癰毒時毒熱感煩躁多渴小便赤澀或赤斑。

犀角 糖甘草 各一分 防風 黃芩 各一分 右為粗末。每服二錢。水一小盞。煎五分。溫服。無時。

紫草化毒散 六四 解實熱毒發痘。

紫草 升麻 炙甘草 等分 糯米 粒五十 水煎服。

紫草散 六五 治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起。

紫草 黃耆 炙甘草 糯米 各錢 右水煎服。

紫草飲 六六 治痘瘡黑陷不起。

紫草 當歸 芍藥 甘草 麻黃 等分 水一盞煎。不拘時服。

紫草飲子 六七 治倒靨腹脹大小便秘。

紫草 人參 枳殼 山查 木通 穿山甲 土炒 蟬蛻 等分 水一盞煎五分。作三四次。

溫服。

紫草快斑湯 六八 一名紫草湯。○治痘疹血氣不足。或血熱不能起發。色不紅活。不灌膿等。

症。

紫草 人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 芍藥 木通 等分 糯米 右每服三。

五錢。水煎服。

紫草木香湯 六九

治痘瘡裏虛癢癩黑陷悶亂。

紫草 木香 人參 白朮 茯苓 甘草 糯米

右每服三錢水煎服

紫草木通湯 七十

治痘疹出不快。

紫草 茯苓 人參 木通 甘草 糯米 等分

右每服二三錢水煎服

紫草膏 七一

紅紫黑陷者暫用之。

紫草 白附子 麻黃 黃洋 兩 乾葛 甘草 半兩 殭蠶 炒 全蠍 炒 各

兩 好酒半盞 先將紫草煎熬成膏 旋入各藥 九皂子 大每服一丸 紫草煎湯化下 就用補藥

調理○如治驚搐以金箔為衣 薄荷湯下。

紅綿散 七二 亦名天麻散 ○治痘疹身有大熱 面赤氣粗 無汗而表未散者 可服之 此藥以

麻黃 天麻 發表為主 有汗者不可服 蓋腠理已開 不可再發汗也 若有汗而熱 則當以惺惺

散為和解之劑 故仲景之治表證 有宜發汗者 有宜和解者 有宜調和營衛者 若有汗而熱

者 則和解為宜 如和中散寒之類是也。

麻黃 去節 天麻 荆芥 突甘草 各二錢 全蠍 七枚 右為末 每服一錢 以水半盞 薄荷葉二

片 入酒四五滴 煎二三沸 帶熱服之 如疹未出 再進一服 次又一服 即傷風寒證 服亦無妨

快狂湯 七三 治起發遲。

人參 五分 當歸 防風 木通 各一錢 甘草 三分 木香 紫草 蟬蛻 各二錢 水一盞 煎七分

快狂湯 七三 治起發遲。

快狂湯 七三 治起發遲。

溫服不拘時。

快斑越婢湯 七四

治瘧瘡手足不起發。

黃耆 炙 白芍藥

桂枝 防風 炙甘草

右加生薑一片。棗一枚。水煎服。

快透散 七五 治瘧出不快。

紫草 蟬蛻

木通 芍藥 炙甘草 等分

右每服二錢。水煎。○王海藏先生云。身後出

不快。足太陽經也。用荆芥甘草防風湯。身前出不快。手陽明經也。用升麻葛根湯。四肢出不

快。足陽明經也。用防風芍藥甘草湯。此皆解毒升發之藥也。不可不知。

鼠帖子湯 七六

治瘧獨身熱毒感服比以防青乾黑陷。并治斑疹稠密。

牛蒡子 炒 歸身

黃耆 炙甘草 柴胡

黃芩 酒炒 連翹

地骨皮 右等分。水煎。熱退

則止服。

射干鼠粘子湯 七七

治瘧瘡壯熱。大便堅實。或口舌生瘡。咽喉腫痛。皆餘毒所致。

鼠粘子 炒并

甘草 炙 升麻

射干 各一兩

右每服三錢。水一大盞。煎六分。徐徐溫服。○薛氏

曰。前方若瘧疹初出。發熱喉痛。根盤赤盛。或咽喉口舌疼痛。作渴引飲者。宜用。若因胃氣虛

弱發熱。而致前證者。宜人參麥門冬散。

錢獨聖散 七八

治瘧瘡倒靨陷伏。

用川山甲取前足爪上者。燒存性為末。每服四五分。以

木香湯入少酒服之。或紫草湯亦可。

無價散 七九 治一切瘡瘡倒陷焦黑危急之證

人牙 猪牙 狗牙 猫牙 右以炭火燒去烟存性等分為末。每服三分。熱酒調下。○如

瘡癩寒熱泄瀉。煎異功散調下。○一方。人牙散只用人牙燒去烟存性為末。酒調服。

三酥餅 八十 治初發熱。用以解汗表毒稀痘神效。

辰砂 擇上好明淨無砂石者以絹囊盛之 用麻黃升麻紫草荔枝同煮。去節湯泡晒。辰砂一日夜研細。仍用前湯飛過。晒乾再研。極細。用真增酥另調作餅。子麻黃乾研極細。亦

用增酥另調作餅。紫草研細。極細。亦用增酥。於端午日提增酥。取餅三。右方如遇時行痘疹。小

兒發熱之初。每三歲者特三餅各取半分。熱酒化下。蓋覆出汗。如不能飲酒。用敗毒散煎湯

化下。更好。○若痘已出。滿頂紅紫色。為熱毒之盛。宜煎紫草紅花湯。或化毒湯。將紫草辰砂

二餅調下。少許以解之。但痘出之後。不可服麻黃餅也。蓋辰砂能解毒。紫草涼心火。製過亦

能發痘解毒。麻黃能發表發痘。蟾酥能驅臟腑中作臭汗而出。此四藥。誠解毒稀痘之神方

也。

神應奪命丹 八一 治風邪倒陷。及痘毒入裏。

辰砂 擇輪壁鏡面者以白紗囊盛之 用升麻麻黃紫草連翹四味同入砂羅以新汲水。麻黃

連根節酒蜜一盞。夜取出。將砂研細。仍將煮砂藥汁去滓。飛取末。待乾。用二分。右共研細末。

用醋酒杵九分。作千粒。周歲者半丸。二歲者一丸。服止三丸。熱酒化服。厚蓋取汗。汗出痘隨

出也。擇天醫生。悉日修合。○此方與三酥餅功同。

萬奪命丹 八二 治倒陷解發痘毒

麻黃蜜酒升麻各五錢 山豆根 紅花子 大力子 連翹各二錢半 蟬蛻 紫草 人中黃各三錢

石研細末酒蜜和丸辰砂為衣薄荷葉煎湯下

東涼膈散 八三 解痘疹裡熱良方

黃芩 連翹 為君甘草 梔子 薄荷 桔梗 竹葉 右水煎服

退火丹 八四 治痘中狂妄神效

滑石 硃砂各一錢 冰片各三厘 共為細末冷水調一分服得睡少時神安氣寧痘轉紅活矣

陳通關散 八五 通心經降心火利小便良方

山梔仁 大黃炒各一分 木通 甘草 車前子 赤茯苓 人參 瞿麥 滑石各三分 扁蓄炒五分

玄參地黃湯 八六 治痘疹衄血

玄參 生地黃 牡丹皮 梔子仁各錢半 甘草 升麻各半錢 白芍藥錢一 蒲黃炒五分 水一盞

煎七分溫服○愚謂此方宜去升麻以塞上衝之源勿謂但屬陽明即宜用升麻也

萬清肺飲 八七 治肺熱喘嗽聲啞

麥門冬 桔梗各二錢 荊芥穗 天花粉 知母各錢 石菖蒲 訶子仁各八分 右水煎服○

此當與清肺湯參用方在後一四五

導赤通氣散 八八 治心虛聲不揚者

木通 生地黃 人參 麥門冬 當歸身 石菖蒲 甘草 右加燈心水煎服

甘桔清金散 八九 治肺熱咽痛聲不清者

桔梗 甘草 連翹 訶子皮 牛蒡子 右為細末每服一錢薄荷葉少許同煎服

加味甘桔湯 九十 咽喉腫痛暫用

桔梗 甘草 牛蒡子 射干 防風 玄參 水一鐘煎服或加生薑一片

熱甚者加黃芩去防風亦可

大如聖飲子 九一 治瘡疹痘毒又咽嗑腫痛熱渴或成腫毒不消等症

桔梗 甘草 鼠粘子 麥門冬 右每服二錢水煎

萬橘皮湯 九二 行滯消痰止嘔吐

橘皮 白茯苓 右如生薑三片水一盞煎七分溫服

勻氣散 九三 行氣化滯

木香 青皮 山查肉 右為末每服一錢甘草湯調服

前胡枳殼湯 九四 治痰實壯熱胸中煩悶大便堅實臥則喘急

前胡 枳殼 赤茯苓 甘草 大黃 右吹咀每服三五錢水一大盞煎至六分不

拘時溫服此方宜量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服○薛氏曰前症若屬肺胃實熱

氣鬱痰滯。大便秘結。小便赤澀。煩渴飲冷。身熱脈實者。宜用之以疎通內臟。使邪無壅滯。則
痘瘡輕而易愈也。

當歸丸 九五 治便堅。三五日不通者。

當歸 半兩 紫草 三錢 黃連 錢半 炙甘草 一錢 大黃 二錢 右以當歸紫草熬成膏。下三味研

為細末。以膏和為丸。如胡椒大。三歲以下兒服十九。七八歲兒服二十九。食前清米飲下。漸
加之以利為度。

百祥丸 九六 治痘瘡紫黑乾陷熱毒。便秘裏實等症。紅芽大戰。不拘多少。用漿水煮熟。去

骨。日中晒乾。復內原汁中煮汁。盡焙乾研末。水丸粟米大。每服一二十九。研赤芝麻湯下。

棗變百祥丸 九七 治同前而稍緩。可代百祥丸。

紅芽大戰 去骨青州棗肉 三十 右用水一碗。同煎至水盡為度。去大戰不用。將棗焙乾。可

和作劑。或搗爛為丸。從少至多。以木香湯吞服。至利為度。

排毒散 九八 治痘毒發癰。

大黃 當歸梢 各一兩 白芷 沉香 木香 各半 穿山甲 七片 土 右為細末。看虛實大小加

減。長流水煎沸調服。

苦參丸 九九 治痘後潰爛。瘡毒疥癩。

苦參 一兩 白蒺藜 何首烏 牛蒡子 荆芥穗 各半 右為末。酒調麩糊為丸。竹葉湯下。

○外科苦參丸見本門八八

稀痘方一百

用老鼠去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食葷時與食尤效

屢試屢驗

稀痘酒 百一

最能散毒稀痘

麻黃去節 紫草各二兩

右二味細切布囊盛之浸無灰酒一小罐泥封固凡過天行小兒發

熱時與半杯或一杯量兒大小服之出微汗為佳

三痘湯 百二

痘發時預服之

大黑豆 赤小豆

綠豆等分

右用甘草浸水去渣以甘草水煮豆熟為度逐日空心

任意飲其汁自然出少○此方冬月煮熟令兒常食尤妙

絲瓜湯 百三

解毒○一方無山查

絲瓜 升麻

芍藥酒炒

生甘草 山查

黑豆

赤小豆

犀角等分

右為粗散每服

三錢水一大盞煎至六分不拘時徐徐溫服量大小加減

辰砂散 百四

預解痘毒

好辰砂一錢 老絲瓜近蒂三寸連子燒灰存性此物發痘瘡最好

右研末蜜水調服多者可少少者可無或以

紫草甘草湯調服尤佳

保嬰丹 百五

稀痘

罐豆藤

或黃豆藤。八月生。取陰乾。用二兩。

防風

荆芥穗

牛蒡子

炒紫草茸。去根酒。

新升麻

水甘草。去皮。各三錢。黃真者。赤小豆。黑豆。綠豆。各三十。

蟾酥

真者

牛黃

一錢

赤小豆

黑豆

綠豆

勿好

砂用麻黃。紫草。為枝。煎升。同。

右另用

紫草

二兩

入水

二碗

煎膏

至小半盞

糖一小

鍾。將前各藥為細末。同紫草丸膏。如李核大。即以硃砂為衣。於未痘之先。濃煎甘草

湯

每磨服

一丸

太者

二丸

若已發熱

用生薑湯磨服。蓋被睡而表之。多者可少。少者可無。大

有神效。

○一方。無紫草茸。仍有經霜老絲瓜一個。連藤蒂五寸。燒存性同用。

洗肝明目散

百六

治痘後目疾。

當歸

羌活

柴胡

蜜蒙花

川芎

防風

木賊

山梔仁

龍胆草

各等

右為末

每服一錢

淡沙糖水調服。

洗肝散

百七

翳膜遮睛暫用。

歸尾

錢二

防風

八分

大黃

八分

羌活

川芎

薄荷

各四

梔子

錢半

甘草

一片

煎服

○熱甚便秘

加杏仁

羊肝散

百八

治痘毒入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

蜜蒙花

錢三

青箱子

決明子

車前子

各錢

右為末

用羊肝一大葉

薄批摻上

濕紙裏

煨

或無毒痘氣入眼

或無毒痘氣入眼

熟空心食之

痰壅散

百九

治痘瘡入眼腫痛。

白蔘 藜蘆 穀精草 防風 羌活 生蛤粉 等分 右吹咀。為細末。每服二錢。溫水調服。即退。

蟬菊散 百十 治痘疹入目。或病後生翳障。

蟬蛻 淨去土 白菊花 等分 每服一二三錢。水八分。加蜜少許。煎四分。食後溫服。

秦皮散 一十一 治大人小兒風毒赤眼。痛癢澀翳。眵淚羞明。

秦皮 滑石 黃連 等分 湯泡熱洗。日二三次。

通神散 一十二 治痘疹入眼。生翳膜。

白菊花 穀精草 綠豆皮 右為末。每服一錢。用柿餅一個。米泔水一盞。同煎。候水乾。只吸

柿餅。每日三五次。不拘。至七日效。

錢黃柏膏 一十三 用此護眼。可免痘毒入眼。

黃柏 一兩 綠豆末 二兩 生甘草 三兩 右為細末。以麻油調成膏。用塗耳前眼角。目下四五

遍。若早塗之。痘出必稀。若既患眼。塗之必滅。

痘疔散 一十四 雄黃 一錢 紫草 三錢 右為細末。胭脂汁調。用銀簪脚挑破黑痘。入藥在內。此下二方治痘疔

之良方也。

四聖丹 一十五 治黑疔。

牛黃錢二分 兒茶錢七分 硃砂 八分 珍珠 二分 右為極細末。以棉胭脂汁或油胭脂調勻。先用

銀針挑黑疔。拭去惡血。乃點藥疔上。

萬四聖散 一十六 治痘不起發。變黑而痛者。痘疔也。○亦名鬼痘。

綠豆四十九粒 莞豆四十九粒 各燒存性 珍珠 一分 油頭髮燒存性 一分

閉黑痘。以此塗之。 右為細末。用胭脂水調。先以醫脚撥

神效隔蒜灸法 一十七 治痘疔毒氣熾。使諸痘不能起發。已起發者。不能灌膿。已灌膿者。

不能收靨。或大痛。或麻木。痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。其毒隨火而散。其法用大蒜頭切

三分厚。安痘疔上。用小艾炷於蒜上灸之。每五壯。易蒜再灸。若紫血出後。腫痛不止。尤當用

灸治者審之。○愚在京師。嘗見治痘疔者。即以線鍼挑破。紫血隨出。諸痘隨灌。灌亦有生者。

痛不出血者難治。若用此法灸之。即知痛。更用鍼挑破。紫血隨出。諸痘隨灌。亦有生者。

胡荽酒 一十八 辟穢氣。使痘疹出快。用胡荽一把。以好酒二盞。煎一兩沸。令乳母每含一

兩口。噴兒遍身。或噴頭面。房中須燒胡荽香。以辟除穢氣。能使痘疹出快。煎過胡荽懸房門

上。最妙。○或用棗灸之。兒聞棗香。尤能開胃氣。進飲食。解毒氣。○按此酒。惟未出之前。及初

報之時宜用之。若起脹之後。則宜避酒氣。亦忌發散。皆不可用也。

茵陳黃法 一十九 用乾茵陳研末。搗棗膏和丸。如鷄子大。曬乾。用烈火燒烟薰之。

水楊湯 一二十 治倒陷之良方。水楊。即忍冬藤也。春冬用枝。秋夏用枝葉。生水邊。細葉紅

梗枝上有圓果。滿果有白鬚最出。切斷。用長流水一大釜。煎六七沸。先將三分之一置浴盆內。以手試其適可。仍先服煎藥。然後浴洗。漸漸添湯。以痘起發光壯為度。不拘次數。洗畢。照視。累累然起處。覺暈暈有系。此髮影也。如漿不滿。宜再浴之。若弱者。只浴頭面。手足亦可。此若則不厭多洗。洗後如無起勢。乃氣血敗而津液枯。多不可治。

秘傳茶葉方 一 二 一

舖床席用

茶葉要多。揀去粗梗。入水一煮。取起。再揀去梗。濕舖於床

上。用草紙隔層。令兒睡上一夜。則入水皆乾。

豬髓膏 一 二 二

治痘疹不靨。及痂靨不落者。塗之即落。

豬骨髓

白蜜 右二味。以火熬一二沸。退涼。用鷄翎掃上。即落。

百花膏 一 二 三

治痘燥痂皮濺起作痛。或痘痂欲落不落者。白蜜不拘多少。略用湯和。時時

以鷄翎潤痛處。瘡痂亦易落無痕。

蕎麥散 一 二 四

治痘瘡潰爛。以此敷之。蕎麥一味。磨取細麵。痘瘡破者。以此敷之。潰爛者

以此遍撲之。絹袋盛撲。或以此襯卧。尤佳。

胭脂汁 一 二 五

治黑痘之良方。先用升麻一味。煎濃湯。去滓。却用棉胭脂浸於湯內。搽出

紅汁。就以木綿蘸湯。於瘡上拭而塗之。

敗草散 一 二 六

治痘瘡抓破成瘡。膿水淋漓。謂之斑爛。用蓋屋牆爛草多年者佳。或曠野自

爛者尤佳。為末。搽搽之。或氣血虛熱不愈。而遍身患者。須多搽。薦舖上。令兒坐卧其上。其

瘡即愈。

白龍散 一、二、七

治爛痘及抓破者。

用乾黃牛糞在風露中多炙者。火煨成灰。取中心白者。

為末。以薄絹囊盛。裹於瘡上撲之。

殺苦滅癩散 一、二、八

治爛痘。以此傅面。如誤抓破者。用之傅貼最良。

蜜陀僧 滑石 各二

白芷 半兩

右為細末。濕則乾摻之。或用好蜜調傅。

滅癩散 一、二、九

治痘後面瘡。以此傅之。

蜜陀僧

白附子

白殭蠶

白芷 鷹夫白 等分

右研極細末。以水調搽面。神效。

辟邪丹 百三十

用燒於房中。能辟一切穢惡邪氣。

蒼朮 以黃連代

乳香

降真香

甘松

北細辛

芸香 各等分

右為末。水丸如豆大。每焚

一丸薰之。良久又焚一丸。不可太多。只是略有香氣。使之不斷可也。

磁法 一、三、一

治丹瘤。

用細磁器擊碎。取鋒芒者。以筋一根劈開頭夾定。用線縛住兩指輕

捻筋梢。令磁鋒正對毒頂。懸高寸許。另用一筋輕擊筋頭。令毒血遇刺而出。即可解散。

蟻鍼法 一、三、二

治痘癩及丹瘤。用水蛭大者五六根。放腫毒頭上。吮去惡血。可以消丹瘡。

決癰腫

雄黃散 一、三、三

治痘後牙齦生疔蝕瘡。

雄黃 一錢

銅綠 二錢

右為末。乾摻之。

雄黃 一錢

銅綠 二錢

右為末。乾摻之。

總論散 一三四 治瘡餘毒。肢體關節生瘡。膿水不絕。

出燒棉繭不拘多少。生白礬入繭內以炭火煨枯。右為細末。乾貼瘡口內。○此總治瘡毒。膿水淋漓。收

效之外劑。

擦牙散 一三五 治瘡後餘毒。攻牙生疳。一日瀾進一分。急用此搽之。

銅絲 雄黃 五倍子 枯礬 胡黃連 北細辛 烏梅同細辛包固。右等分。為末。搽之。

吹口丹 一三六 治疔。黃連 青黛 兒茶 片腦。右等分。為末。吹之。

生肌散 一三七 瘡後癰毒不收口。用之。神效。

枯礬 三錢 海螵蛸 赤石脂煨各二錢 龍骨煨 黃丹 飛炒 乳香 出汗 沒藥 出汗 各一錢 血竭 五分 輕粉

麝香各二分 右為細末。搽瘡口內。外以太乙膏貼之。

馬鳴散 一三八 治走馬疳良方。

人中白即屎紅底白泥也。以物刮取。新五倍子生者一錢。另用燒過二錢半。 枯白

礬二錢。即用五倍子。右為極細末。先以濃米泔水浸洗瘡口。以此傳之。

以下麻疹方

升麻湯 一三九 解散疹毒。

升麻 去鬚 葛根 去皮 各一錢 芍藥 酒浸 二錢 炙甘草 一錢 水一盞。煎五分。食遠。稍熱服。量兒大小加

減。○予按此方。即升麻葛根湯也。麻疹之證。多屬陽明火毒。凡欲解表散邪。但表實邪盛者。

最宜用此。然愚以柴胡代升麻用之更妙。若血氣稍虛而邪有未解者。惟柴歸飲為最妥。

升麻透斑湯 百四十 治疹瘡初見紅點。一日至三者。

升麻 枳殼炒各五分 柴胡後半 桔梗 前胡各一錢 川芎 茯苓各七分 陳皮 半夏

甘草各四分 右加生薑一片。水一鍾。煎五分。作十餘次。徐徐服之。

葛根麥門冬散 一四一 治小兒熱毒斑疹。頭痛壯熱。心神煩悶。

葛根三錢 麥門冬四錢 人參 川升麻 茯苓 甘草各二錢 石膏半兩 赤芍藥一錢 右咬

咀。每服三錢。水一大盞。煎至六分。不拘時。徐徐溫服。仍量兒大小增減。薛氏曰。前方足陽

明胃經之藥也。外除表邪。內清胃火。兼補元氣。若非發熱作渴。表裏有熱者不可用。若表裏

俱虛而發熱作渴者。宜人參麥門冬散。

葛根麥門冬湯 一四二 治表邪內熱。咳嗽甚者。此即前方去人參者。但分兩稍異耳。

麥門冬 葛根去皮各一錢 升麻去鬚四分 赤芍藥酒炒六分 茯苓六分 炙甘草四分 石膏煨一錢半 右水煎服

葛根柴胡四物湯 一四三 治疹後餘熱。

柴胡 當歸身 川芎 生地黃 白芍藥 人參 麥門冬 知母 淡竹葉 黃芩

地骨皮 右剉細。水一盞。煎七分。不拘時溫服。

生地黄散 一四四 治小兒斑疹。身熱口乾。咳嗽心煩者。

生地黄半兩 麥門冬七錢 款冬花 陳皮 杏仁各三錢 炙甘草二錢 右每服三五錢。水一

大盞煎六分。不拘時徐徐溫服。量兒大小加減。

清肺湯 一四五 治斑疹咳嗽甚者。或二母散。或麥門冬湯。

桔梗 去蘆片 苓 貝母各七分 防風 去蘆 炙甘草 各四分 知母 七分

右水一鐘煎五分。入搗碎

蘇子五分。再煎溫服。

清肺消毒湯 一四六 治疹瘡收完。不思飲食。鼻乾無涕。

防風 枳殼各五分 連翹 前胡 黃芩 桔梗各一分 荊芥 炙甘草 右水一鐘煎至五六

分。作十餘次徐服之。

門冬清肺湯 一四七 治疹後咳嗽不止。

天門冬 去心 麥門冬 去心 款冬花 知母 貝母 梗桔 牛蒡子 地骨皮 杏仁 去皮

馬兜鈴 甘草 等分 水一鐘半煎七分。食後溫服。

清肺消毒化痰湯 一四八 治疹後喘嗽。聲音不清。不思飲食。眼目不清。唇口乾燥。

牛蒡子 防風 荊芥穗 貝母各五分 連翹 黃芩 前胡 茯苓各七分 桔梗 枳殼各一

甘草 三分 右水一鐘煎五分。作十餘次徐服之。

清金降火湯 一四九 治疹後肺熱聲啞咳嗽。

當歸 白芍藥 酒炒 生地黃 酒洗 瓜蒌仁 白茯苓 陳皮 貝母 去心 川草 麥門冬 桑

白皮 桔苓 酒炒 山梔 炒 玄參 杏仁 去皮 蘇梗 天門冬 黃連 炒 石膏 右等分 加薑

一斤。水煎服。

二升散百五十

方在寒陣四九 治肺熱嗽欬及疹後嗽甚者

透斑和中湯 一五一

治疹瘡二三日泄瀉

升麻 乾葛 結苓 澤瀉 陳皮 半夏 川芎 茯苓各七

前胡 桔梗各一 柴胡半

甘草三分

右加生薑三片。水一鍾。煎至五分。作數次徐徐服之。

解毒化滯湯 一五二

治疹後吃食太早。咬指甲。搯口唇。撥眼毛。看手咬人等症。

防風 荆芥 枳殼 神麩 炒麥芽 炒各連翹 黃芩 茯苓 前胡各七

桔梗一錢 山查

甘草各三

右水一鍾。煎五分。作十餘次。徐徐服之。

大清湯 一五三

解斑疹大毒良方

生地黃 石膏 玄參 地骨皮 知母 木通 甘草 青黛 荆芥穗各等

右水一

鍾。加淡竹葉十二片。煎七分。溫服無時。

羚羊角散 一五四

治小兒斑疹後餘毒不解。上攻眼目。羞明。翳。眵。淚。俱多。紅赤腫閉。

羚羊角 煇者 黃芩 草決明 車前子 升麻 防風 大黃 芒硝 等分

水一盞

煎半盞。稍熱服。

羌菊散 一五五

治疹毒熱毒上攻。眼目生翳。并暴赤羞明。

羌活 甘菊花 蟬蛻 蛇蛻 防風 殺精草 木賊 甘草 白養黎 山梔子 大

黃連 沙苑蒺藜 等分 右為末。每服一錢。清米湯調下。

以下通用方

人參理中湯 一五六 方在熱陣一。治脾胃虛寒諸症。

六物煎 一五七 方在新因二十。治痘疹血氣不足。隨證加減用。

六氣煎 一五八 方在新因二十一。治痘疹氣虛。癰腐倒陷。

九味異功煎 一五九 方在新因二二。治痘疹虛陷。寒戰咬牙。虛寒諸症。

柴歸飲 百六十 方在新因十五。治痘疹初起。托散妙劑。

柴葛煎 一六一 方在新因十八。治痘疹表裡俱熱。散毒養陰。

疎邪飲 一六二 方在新因十六。治痘疹初起。表邪強實者。

五積散 一六三 方在散陣三九。溫散寒邪。

四順清涼飲 一六四 治血脈壅熱。大便秘結。

涼血養榮煎 一六五 治痘疹血虛熱血。地紅熱渴。

搜毒煎 一六六 方在新因十九。解痘疹熱毒。紫黑乾枯。

犀角地黃湯 一六七 方在寒陣七九。治痘疹血熱諸症。

升黃參湯 一六八 方在寒陣百五。治熱利。

通邪煎 一六九 方在新因二三。治痘疹初熱未出者。宜此蘇表法。



化斑湯

百七十

方在寒陣三。

治陽明熱渴。化斑除煩。

小柴胡湯

一七一

方在散陣十九。

散肝膽經表邪。往來寒熱。

益元散

一七二

方在寒陣百十二。

解煩熱。止渴。利小水。

四苓散

一七三

方在和陣一八七。

利小水。去濕滯。

導赤散

一七四

方在寒陣一二二。

降心火。及小腸熱證。

加批 詳評 景岳全書

卷六十四

春集外科鈴古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
古吳江家楨忍庵訂

外科

仙方活命飲 一 治一切瘡癤未成膿者內消。已成膿者即潰。此止痛消毒之聖藥也。

穿山甲 蛤粉炒黃 白芷 防風 天花粉 赤芍藥 歸尾 乳香 沒藥 貝母 皂刺 甘草

草錢 各二分 金銀花 陳皮 各錢 酒一碗煎數沸溫服。

托裏消毒散 二 治瘡疽元氣虛弱。或行攻伐不能潰散。服之未成即消。已成即潰。腐肉即去。

新肉即生。若腐肉既潰。而新肉不能收斂。屬氣虛者。四君子湯為主。屬血虛者。四物湯為主。

氣血俱虛者。十全大補湯為主。并忌寒涼消毒之劑。

人參 隨症黃耆 鹽水炒 當歸 川芎 芍藥 炒 白朮 炒 茯苓 各一錢 金銀花 白芷 各七分 甘草

連翹 各五分 右水煎服。○陳氏托裏消毒散內多陳皮。方在瘡癤。

秘方托裏散 三 治一切瘡毒。終始常服。不致內陷。

瓜蒌 大者一箇 小者一箇 當歸 酒洗 黃耆 鹽水炒 白芍藥 甘草 各一兩 熟地 天花粉 金銀花 皂刺 各

一 右每用藥五兩。以無灰酒五茶鐘。入磁器內。厚紙封口。再用油紙重封。置湯鍋內。蓋煮。

至藥者取出分服。直至瘡愈。○立齋曰。此方藥品平易。消毒之功甚大。且不動臟腑。不傷血氣。不問陰陽腫潰。屢用屢效。真仙方也。常治發背。腦疽。勢感者。更用隔蒜灸之。若脈沉實。大小便秘者。先用疎通。而後用此。功甚捷。若火毒已退。不作膿。或不潰者。更宜托裏。潰而不斂。及膿清者。用峻補。

神功托裏散^四 一名金銀花散。○治癰疽發背。腸癰乳癰。及一切腫毒。或焮痛。憎寒壯熱。

金銀花 黃耆 當歸 甘草^{等分} 右用酒水各一鍾。煎至一鍾。分病上下。食前食後服。

之少頃再服一劑。浮數患處。不問老少。虛實皆可服。若為未酒調服。尤妙。

參耆托裏散^五 治瘡瘍氣血俱虛。不能起發。或腐潰不能收斂。及惡寒熱者。

人參^{氣虛者用之} 黃耆^炒 白朮^炒 當歸 熟地 芍藥^{酒炒} 茯苓 陳皮^{各一} 右

水煎服。

參耆內托散^六 方在痘疹^七。治癰疽膿毒不化。及潰後作痛。

托裏養營湯^七 治瘰癧流注。及一切癰疽不足之症。不作膿。或不潰。或潰後發熱。或惡寒。

肌肉消瘦。飲食不思。睡卧不寧。盜汗不止。

人參 黃耆 炙當歸 西非川弓 芍藥^炒 白朮^炒 各熟地^{二錢} 五味子^炒 研麥冬 甘草^各

分 水二鍾 薑三片 棗一枚 煎七分 食遠服。

托裏黃耆湯八 治癰疽氣虛作渴甚效。

黃耆六錢 蜜炒 甘草各一 天花粉各一 水二鍾煎八分。頻服之。○加人參一錢亦可。○若氣血俱

虛。膿血大泄而作渴。或兼發熱者。宜用托裏養營湯。

內補黃耆湯九 治癰毒內虛不起化。及潰後諸虛。送見。

黃耆各一 麥冬各一 人參 熟地 茯苓 甘草各七分 芍藥 當歸 川芎 遠志 官桂

各五分 右每服一兩。薑棗水煎服。

托裏當歸湯十 治潰瘍氣血俱虛。或晡熱內熱。寒熱往來。或婦人諸瘡。經候不調。小便頻數。

大便不實等症。但瘡瘍氣血虛而發熱者。皆宜服之。久服亦收斂瘡口。

人參 黃耆 當歸 熟地 川芎 芍藥各一 柴胡 甘草各五分 右水煎服。

托裏健中湯十一 治瘡瘍元氣素虛。或因涼藥傷胃。飲食少思。或作嘔瀉等症。

人參 白朮 茯苓各二 半夏 炮薑各一 黃耆一錢 炙甘草五分 肉桂三分 右薑棗水

煎服。

托裏溫中湯十二 治瘡瘍膿潰。元氣虛寒。或因尅伐。胃氣脫陷。腸鳴腹痛。大便溏泄。神思昏

潰。此寒變內陷。緩則不治。

附子炮去皮 二錢 乾薑炒三錢 益志 丁香 羌活 沉香 木香 茴香 陳皮各一錢 炙甘草二錢

右薑水煎服。

托裏益中湯 十三

治中氣虛弱。飲食少思。或瘡不消散。或潰而不斂。

人參 白朮

茯苓

炮薑

陳皮

半夏

木香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎服。

托裏溫經湯 十四

治瘡瘍寒熱。皮毛鬱遏。經絡不得伸越。熱伏營中。聚結赤腫作痛。惡寒發

熱。或痛引肢體。若頭面腫痛。煖甚。仍宜砭之。

麻黃 升麻

防風

乾薑

白芷

人參

當歸

芍藥

甘草

蒼朮

各一錢

右水二

鍾煎一鍾服。臥煖處得汗乃散。或加柴胡。

托裏益黃湯 十五

治脾土虛寒。水反侮土。以致飲食少思。或嘔吐泄瀉等症。

人參 白朮

茯苓

陳皮

半夏

炮薑

丁香

炙甘草

各五分

右薑棗水煎溫服。

托裏清中湯 十六

治脾胃虛弱。痰氣不清。飲食少思等症。

人參 白朮

茯苓

陳皮

各一錢

半夏

八分

桔梗

七分

甘草

五分

右薑棗水煎服。

托裏益清湯 十七

治肝木侮脾。脾土虛弱。以致飲食少思。或胸膈不利等症。

人參 白朮

半夏

茯苓

陳皮

各一錢

芍藥

柴胡

甘草

各五分

右薑棗水煎服。

托裏營衛湯 十八

治瘡瘍外無焮腫。內便調和。乃邪在經絡也。宜用此藥。

人參 黃耆

當歸

甘草

炙

紅花

柴胡

連翹

蒼朮

各一錢

米泔炒

羌活

桂枝

七分

右酒水煎服。

托裏越鞠湯 十九

治六鬱所傷。脾胃虛弱。飲食少思等症。

詳辨... 卷六十四

二

人參 白朮錢各二 陳皮 半夏錢各一 山梔 川芎 香附 蒼朮錢各七 炙甘草錢五 右薑棗水煎服。

定痛托裏散 二十 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也。

粟穀去蒂炒 當歸酒洗 白芍藥炒 川芎錢各一 乳香 沒藥 肉桂錢各一 右薑棗水煎服。

內托復煎散 二一 治瘡瘍焮腫在外其脈多浮邪勝必侵於內宜用此托之。

人參 白朮炒 當歸 黃耆鹽水炒 茯苓 甘草炙 地骨皮 肉桂 防已酒炒 黃芩

各一 防風錢二 右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之。

內托羌活湯 二二 治腎癰堅硬腫痛兩尺脈緊無功。

羌活 黃柏錢各一 防風 當歸尾 葶藶 肉桂錢各一 連翹 蒼朮未泔洗 陳皮錢各五 黃耆鹽水

內寒散 二三 治陰虛陽和痰襲患腫或潰而不散或風寒襲於患處血氣不能運行久不能愈。遂成漏瘻。

附子重便 肉桂去皮 赤小豆 炙甘草 黃耆鹽水炒 當歸酒洗 茯苓 白芷 桔梗炒 川芎 人參 遠志去

厚朴製各 防風錢各四 右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸亦可。

沖和湯 二四 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致。

人參 陳皮錢各二 黃耆 白朮 當歸 白芷錢各一 茯苓 川芎 皂角刺炒 乳香 沒藥

金銀花 甘草節 右水酒各半煎服。

上海漢口路...

神效酒煎散 二五 治一切瘡癰能毒散毒其效如神

人參 沒藥 研另當歸尾各一甘草銜括其生半炒 右以酒三碗煎二碗分四服○或以為

末酒糊丸桐子大每服五十九用酒下善清毒活血

人參黃耆湯 二六 治清湯飲食少思無睡發熱

人參 白朮 蒼朮 參朮 陳皮 當歸 升麻 各五分黃耆錢黃柏分四 右水煎服

黃耆人參湯 二七 治清湯虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃耆 鹽水炒 人參 白朮 蒼朮 酒炒 當歸 升麻 五味子 炒各 甘草 炙 升麻

神麴 炒 陳皮 各五分 黃柏 酒炒 水二鍾薑三片棗一枚煎服

黃耆建中湯 二八 內托癰疽諸毒

黃耆 蜜炙 肉桂 各三分甘草炙二分 白芍藥 六兩 右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 二九 治肺疽脾氣虧損久咳吐膿或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否則不治

人參 白朮 各二分 黃耆 半錢 茯苓 當歸 陳皮 各一分 麥冬 七分 北五味 四分 桔梗 六分 炙

甘草 五分 右薑棗水煎服

參耆補肺湯 三十 治肺證咳嗽短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴

小便短澀

小便短澀

人參 黃耆 白朮 當歸 陳皮 茯苓 各一 山藥 山茱萸 各二 五味子 炙甘草 各五

熟地黃 一錢 參門冬 牡丹皮 各八 右薑棗水煎服

益氣養營湯 三一 治懷抱抑鬱。或氣血損傷。四肢頸項等處。心腫不問軟硬赤白腫痛。或日

晡發熱。或潰而不斂。

人參 黃耆 炒鹽水 當歸 川芎 熟地 芍藥 炒貝母 香附 陳皮 茯苓 各一 白朮 二

柴胡 分六 甘草 桔梗 各五 右薑水煎服。口乾。加五味子。參門冬。往來寒熱。加軟柴胡。地

骨皮。膿清。加入人參。黃耆。膿多。加川芎。當歸。膿不止。加入人參。黃耆。當歸。肌肉遲生。加白朮。官桂。

補陰八珍湯 三一 治瘰癧等瘡。足三陰虛者。

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 熟地 芍藥 黃柏 酒炒 知母 酒炒 各七 右水煎服

參朮薑附湯 三一 治瘡瘍真陽虧損。或誤行汗下。或膿血出多。失於補托。以致上氣喘急。

自汗盜汗。氣短頭暈。泄瀉。

人參 附子 各一兩 乾薑 炮 白朮 各五 右作二劑。水煎服。

附子理中湯 三四 治瘡瘍脾胃虛寒。或誤用攻伐。手足厥冷。飲食不入。或腸鳴腹痛。嘔逆吐瀉。

附子 人參 白茯苓 白芍藥 各三 白朮 四錢 右水煎服

六物附子湯 三五 治四氣流注於足太陰經。骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小便利。或手足浮腫。

附子 製防己 桂枝 各四 炙甘草 二錢 白朮 茯苓 各三 右作二劑。水一鍾半。薑三片。煎一

鍾食遠服。

附子八物湯 三六

治瘡瘍陽氣脫陷。嘔吐畏寒。泄瀉厥逆。

附子 炮 乾薑 炮

芍藥 炒 人參 炙甘草 茯苓 肉桂 各一錢

白朮 二錢 右水煎食遠溫服。

四物湯 三七

治脾腎虛寒。瘡屬純陰。或藥損元氣。不腫痛。不腐潰。或腹痛泄瀉。嘔吐厥逆。及

陽氣脫陷等症。

人參 白朮

黃耆各三錢

乾薑 炮

附子 炮

甘草 炙陳皮

當歸 各二錢

柴胡

升麻 各五分

右

水煎服。如不應。倍加薑附。

薛加減八味丸 三八

治瘡瘍痊後。及將痊口乾渴甚。或舌上生黃。或未患先渴。此皆腎水枯

渴。不能上潤。以致心火上炎。水火不能相濟。故煩躁作渴。小便頻數。或白濁陰痿。飲食不多。

肌膚漸消。或腿腫脚先瘦。服此以降心火。滋腎水。則諸症頓止。及治口舌生瘡不絕。

熟地 八兩酒

山茱萸 酒浸

山藥 各四兩

澤瀉 蒸焙

白茯苓

牡丹皮 各三兩

桂心 一兩

北五味 四兩

右為細末。入二膏。加煉蜜少許。丸桐子大。每服六七十丸。五更初言夢醒。或空心用鹽

湯送下。此即陳氏加減八味丸也。○方在補陣一二三。

加味地黃丸 三九

治肝腎陰虛瘡毒。或耳內癢痛出水。或服昏痰氣喘咳。或作渴發熱。小便

赤澀等症。

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味 各兩末 右將地黃

搗碎酒拌濕蒸爛杵膏入諸藥和勻加煉蜜為丸桐子大每服百丸空心白湯送下如不應
用加減八味丸

當歸川芎散 四十

治手足少陽經血虛瘡癩或風熱耳內癢痛生瘡出水或頭目不清寒熱

少食或婦女經水不調胸膈不利脇腹痞痛

當歸 川芎 柴胡 白朮 芍藥

各一錢 山梔 二分 牡丹皮 茯苓 各八分 蔓荊子 甘草

各五分 右水煎服

加味敗毒散 四一

治足二陽經熱毒流於脚根焮赤腫痛寒熱如瘧自汗短氣大小便不利

或無汗惡寒表裡相實者宜之

羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 人參 茯苓 枳殼 甘草 川芎 大黃 蒼朮

各一錢 水二鍾 薑三片煎服

九味羌活湯 四二

方在散陣四四 治瘡瘍風熱鬱遏焮腫作痛或遍身作癢或拘急不利

及頭痛惡寒脊強脈浮緊

加味羌活湯 四三

即前湯加金銀花連翹用解毒

白芷胃風湯 四四

治手足陽明經氣虛風熱面目麻木或牙關緊急眼目瞶動

白芷 升麻 各二錢 五 葛根 蒼朮 各八分 炙甘草 當歸 各一錢 半 草豆蔻 黃柏 炒 柴胡 藜蘆 各五分

羌活 麻黃 各五分

蔓荊子 殭蠶 各三分 右水煎服

葛根牛蒡湯 四五

治時毒腫痛而便利調和者

葛根

管仲

甘草

豆豉

牛蒡子

各二錢

右水煎服

犀角地黄湯 四六

治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角

生地

牡丹皮

芍藥

黃芩

升麻

各一錢

右水煎服

犀角升麻湯 四七

治時毒或風熱頭面腫痛或咽喉不利或發疽疔腮等症

犀角

升麻

防風

羌活

白芷

白附子

黃芩

甘草

各一錢

右水煎服

玄參升麻湯 四八

治心脾虛熱舌上生瘡或木舌重舌或連頰兩邊腫痛或咽痛發斑并治之

玄參

升麻

赤芍藥

犀角

桔梗

管仲

黃芩

甘草

各五分

水二鍾煎八分

入犀角末食後服

升麻黃連湯 四九

治胃經熱毒腮腫作或發寒熱

升麻

川芎

當歸

連翹

黃連

牛蒡子

白芷

各一錢

右水煎服

○若腫連太陽

加羌活連耳後加山梔柴胡

連翹湯 五十

治癰瘰時毒腫痛喉腫

連翹

升麻

朴硝

玄參

芍藥

白薇

防風

射干

各三錢

大黃

一兩

甘草

五錢

杏仁

八十個去皮共

右每服五七錢水煎服下惡物後服內托之類

五香連翹湯 五一

治腦癰癰疽時毒習氣壅滯不行者

乳香 木香 沉香 丁香 香附 黃耆 射干 連翹 升麻 木通 獨活 桑寄

生

甘草各一錢

右水煎服。

復元通氣散

五二

治乳癰使毒腫痛。及一切氣滯腫毒。或打撲損傷。閃跌作痛。及疝氣尤效。一方。

木香

船上茴香

炒青皮

陳皮

白芷

甘草

貝母

去心

川山甲

炒漏蘆

等分

有玄胡索白牽牛炒用。無白芷漏蘆。右為末。每服二三錢。溫酒調下。

當歸散

五三

通經絡。行血滯。

當歸

川山甲

炒

蒲黃

炒

辰砂

一錢

麝香

少許

右為末。每服三錢。熱酒調下。如不飲

酒。薄荷醋湯亦可。

方脈流氣飲

五四

治瘰癧流注。鬱結腫塊。或走注疼痛。或心胸痞悶。咽塞不利。脇腹膨脹。嘔

吐不食。上氣喘急。咳嗽痰盛。面目四肢浮腫。大小便秘。

當歸

川芎

芍藥

枳殼

黃耆

炙甘草

紫蘇

青皮

烏藥

半夏

製

枳殼

實

炒

防風

陳皮

各一

木香

大腹皮

枳殼

炒

檳榔

各五

煎八分。食遠服。

瘡科流氣飲

五五

治流注。及一切急怒氣結腫痛。或胸膈痞悶。或風寒濕毒。搏於經絡。致成

腫塊。肉色不變。或漫腫木悶無頭。

人參

當歸

酒

炒

黃耆

鹽水

芍藥

官桂

厚朴

製

甘草

防風

紫蘇

枳殼

烏藥

上海廣益書局印行

桔梗七分 檳榔 木香 川芎 白芷各五分 右水煎服

陳氏獨聖散五六 凡患瘡癤皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之

香附子薑汁浸一宿焙乾研末 右無時以白湯調服二錢漬以局方小烏沉湯為尤妙

乳香定痛散五九 治瘡毒損傷血凝氣滯壅腫拘攣筋骨疼痛

乳香 沒藥各另研 羌活 五靈脂 獨活各三錢 川芎 當歸 真綠豆粉 肉桂 白芷

白膠香各半兩 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下手足損痛不能

舉動加草烏五錢鹽湯送下

消毒散五八 治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜先服人參敗毒散一二劑方可

服此藥如無前證即服此藥二三劑或腫不消宜服托裏散

全銀花 青皮 天花粉 柴胡 殭蠶炒 貝母 當歸酒洗 白芷各二錢 水二鍾煎一鍾

食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心服

清熱消毒散五九 治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸 甘草各一錢 川芎 芍藥 生地各一錢 金銀花二錢 右水煎服

東黃連消毒散六十一 治腦疽背疽喉腫疼痛或麻木

黃連炒 羌活各一分 黃芩 黃柏 桔梗 藜蘆 防己各五分 歸尾 連翹 防風 獨活

知母炒生地各四分 人參 甘草各三分 黃耆 蘇木 陳皮 澤瀉各二分 右水煎服

連翹消毒散六一 治癰疽濕熱諸症。○亦名清涼散。亦即局方涼膈散。

連翹二兩 梔子 大黃 薄荷 黃芩各五分 甘草半兩 朴硝二錢 右每服一兩。水煎溫服。

加味解毒湯六二 治癰疽背熱。大痛不止。

黃耆鹽水炒 黃連炒 黃芩炒 黃柏炒 連翹 當歸酒拌各七分 甘草炙 白芍藥 梔子炒各錢 水二

鍾煎服痛即止。

解毒防風湯六三 治斑疹或癩或疔。

防風錢 黃耆 芍藥 地骨皮 枳殼炒 荆芥各二錢 水煎。徐徐服。

陳氏解毒防風湯六四 方在痘疹五六。治痘疹毒氣熾盛。

散腫潰堅湯六五 治瘰癧堅硬。氣血無虧。宜用之。

柴胡 黃芩各四分 白芍藥炒 升麻 連翹 黃柏酒炒 蓮肉 三棱煨 乾薑 歸尾各三分

知母酒炒 龍胆草酒炒 天花粉 桔梗 昆布各五分 炙甘草二分 右水煎服。

瓜蔓托裏散六六 治瘡瘍毒盛者。未成則易消。已成則易潰。既潰則生肌。

黃瓜蔓并一個 忍冬藤 乳香各一錢 蘇木五錢 沒藥錢三 甘草二錢 右用酒三碗。煎二碗。空心日午臨

睡分三服。○或以此為末。酒糊丸。彈子大。硃砂為衣。細嚼。用當歸酒送下。治打撲損傷尤妙。

萬金散六七 一名內托散。○治癰疽已潰未潰者。有清毒破血之功。

括萆一個沒藥一錢大甘草節二錢

右用酒二碗煎一碗去滓後入沒藥服

製甘草湯六八

治懸癰不拘腫潰亦治癰疽用大甘草一兩切三寸長用潤水一碗浸透

以漫火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却挫細用無灰酒二鍾煎七分空心服嘗有

人患此已破服兩劑瘡即合○一國老膏方用大甘草二斤以河水浸取漿汁去滓用銀石器熬成膏磁罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一方治癰疽用生甘草為末酒調服二錢連進數服自消

梅花飲子六九

癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎 乾葛

天花粉 黃耆 烏梅 甘草 蘇木各一兩 忍冬藤四兩 右作四劑水煎服

牛膠散七十

治癰疽便毒不內攻不傳惡症有益無損

牛皮膠破中明者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白湯

明膠飲子七一

治一切癰疽疔毒

明廣膠拾粉

粉甘草各一兩 橘紅五錢 右作三劑水煎服

護心散七二

解金石砒硫發疽之毒

綠豆末一兩

明乳香研細 右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散七三

一名金花散 解毒清心流行氣血散滯清火凡喉腫熱痛飲食如

常者太宜用之

綠豆四兩研末 砂另研 人參 甘草 白茯苓各三錢 朴硝另研 白豆蔻各五 麝香另研 雄黃各

錢冰片五分 右為末每服一二錢蜜湯調下。

蠟礬丸七 一名黃礬丸 ○治金石發瘡一切癰疽托裏止疼癩護藏府神效不問老少皆

可服之。

黃蠟一兩 黃色佳者各開 雄火一兩 明礬一兩 白礬淨者 研末 右二味和勻象手急丸桐子大每服二三

十九漸加至四五十丸熱水或鹽湯送下日進二三服至三四兩之上愈見其功矣 ○如

服金石發瘡別用白礬末一兩作三五服酒溫下尤效 ○有人遍身生瘡狀如蛇頭名曰蛇

頭瘡凡宜用之 ○治蛇蝎毒蟲咬傷溶化熱塗傷處痛止毒出仍服兩許 ○此方不惟止痛

生肌而已其護膜止瀉消毒化膿及內癰排膿托裏之功甚大

千金化毒丸七 治諸惡毒 用白礬三錢糊丸以葱頭七葉煎湯送下則腫痛俱退再用

仙方活命飲二劑以去其餘毒此本方原用礬末以葱湯調服因湯難服故易為丸 ○一方

士治瘡疔不問腫潰先用此藥二三服後用消毒藥甚效常治葛莖之人用此即退不用托

裏藥亦愈若金石毒藥發瘡者尤效蓋礬能解金石之毒也 ○一方用礬末五錢硃砂五分

熱酒下亦效此藥托裏固內止瀉解毒排膿不動藏府不傷氣血有益無損其藥易得其功

甚大偏僻之處不可不知此方或毒蟲所傷溶化熱塗患處更以熱酒調末服皆效

五福化毒丹七 治咽喉牙口瘡毒腫痛並小兒一切熱毒瘡癩驚惕煩躁口舌生瘡夜卧

不寧等症。

玄參 桔梗各二錢 茯苓三兩 人參 牙硝 青黛各一兩 甘草七錢 麝香少許 金箔二十 右為

末煉蜜丸。艾實大。每服一丸。薄荷湯化下。○若豆毒上攻。口齒生瘡。以生地黃汁化服。及用雞翎掃瘡處。

奪命丹七 治疔瘡發背等症。或麻木。或嘔吐。重者昏憤。此藥服之。不起者即起。不痛者即痛。

痛甚者即止昏憤者即甦。嘔吐者即解。未成者即消。已成者即潰。有奪命之功。乃惡症中之至寶也。

蟾酥酒化 輕粉 麝香各五分 枯礬 寒水石煨 銅綠 乳香 沒藥各一錢 珠砂三錢 蝮牛十二

個另研 右為末。用蝮牛或酒糊搗丸。綠豆大。每服二三丸。溫酒蔥湯下。或用葱白三四寸。

病者自嚼爛。吐於手心。包藥在內。熱酒和湯送下。如人行五七里。汗出為效。重者再服一二

丸。或外用一丸入瘡孔內。以膏藥貼之。

飛龍奪命丹七八 治一切疔毒瘡毒。出汗則愈。神效。

乾蟾酥二錢 沒藥 礞砂 寒水石煨 雄黃各三錢 乳香 珠砂 血竭膏成餅 枯礬各一

粉 冰片各五分 蜈蚣一條 去頭蝮牛四十九個 研為 右各研為細末。取蝮牛。蟾酥。研勻。入

諸末。熱拌丸。綠豆大。硃砂為衣。每服四五丸。嚼葱白一口。吐在掌心。將藥包蔥內。用溫酒吞

下。須臾汗出。或少吐瀉。毒即解。○立齋曰。前回生丹。乃燥悍攻毒之劑也。蓋無經不至。無氣

不動者。後奪命丹尚緩。若食一切禽畜毒物。及瘡脈浮緊細數。毒蓄在內。並惡毒證。凡宜汗

吐者。當用前丹有神效。若老弱之人。或瘡毒稍輕者。宜用後丹。或更以隔蒜灸之為良。

回生丹 七九

李嗣顏先生口授。非泛常之藥。萬寶之秘。專治一切疔毒。並有神效。

金脚信

明礞砂

明乳香

半夏

上紅丹

各五

巴豆肉

油不去

明礞黃

大南星

砂各一

大班貓頭

十五個

去

右為細末

旋取蟾酥

和丸麻子

大珠砂

為衣

每服十五丸

好酒

下看瘡生

上下

食前後服

能飲者

至醉為佳

凡腫毒

失治

毒氣入服

用此藥能起死回生

服後吐瀉俱作乃愈

通氣散 八十

治時毒腫甚

咽喉不利

取嚏以泄其毒

玄參 一錢

牙皂 川芎

各一錢

藜蘆 五分

羊躑躅花 二錢

右為末

取嚏為度

○按此方

止用皂角

川芎

北細辛

三味

即可

亦不必藜蘆

躑躅之毒品也

總不若

通關散為妙方在因陣九十八

梔子仁湯 八一

方在寒陣十九

治發熱狂躁

咽喉腫痛

六味梔子仁湯 八二

治時毒腫痛

大便秘結

脈沉數

山梔 炒枳殼

大黃 煨升麻

牛蒡子

炒鬱金

等分

右為細末

每服三錢

蜜水調下

或水煎服

清肝益營湯 八三

治肝胆小腸

經風熱血燥

筋攣結核

或耳項胸乳

脇肋作痛

並一切肝火之證

山梔 當歸

木瓜

不犯

茯苓

各一錢

柴胡

芍藥

炒川芎

各七分

龍胆草 八分

白朮 二錢

熟地

一錢

炙甘草 五分

右薑水煎服

清心湯 八四

治瘡瘍腫痛

發熱飲冷

脈沉實

睡語不寧

右方即防風通聖散

每料加黃連一

錢

上海廣益書局印行

錢。每劑用一兩。水煎。方在攻陣十六。

濟陰湯 八五

治瘍毒純陽腫痛發熱。

連翹 二錢 山梔 黃芩 炒黃連 炒甘草 各一芍藥 半錢 牡丹皮 二錢 金銀花 三錢 水煎服。

○大便若秘。量加大黃。

地骨皮散 八六 治瘡瘍氣虛內熱。煩渴不寧。

人參 黃耆 生地黃 地骨皮 柴胡 各一 白茯苓 石膏 煨知母 各一 薑水煎服。

一味苦參丸 八七 治一切癰疽毒瘡。癰腫作痛。或煩躁。

苦參 不拘多 右用水糊丸。桐子大。每服二三錢。溫酒下。

陳氏苦參丸 八八 治遍身瘡癩。疥疥瘡瘍。

苦參 四錢 玄參 黃連 大黃 獨活 枳殼 防風 各二 黃芩 梔子 菊花 各一 右為

末。煉蜜丸。桐子大。食後茶酒任下。三四十丸。日三服。

五利大黃湯 八九 治時毒痲腫赤痛。煩渴便秘。脈實而數。

大黃 煨黃芩 升麻 各二 芒硝 梔子 各一 水一鍾半。煎六分。空心熱服。

清涼飲 九十 治癰瘍熱毒熾盛。大便祕結。○此即前連翹消毒散。

連翹 一兩 大黃 山梔子 薄荷葉 黃芩 各五 甘草 半兩 朴硝 二錢 右每服一兩。水煎服。

宣毒散 九一 治一切癰毒。其功不可盡述。

大黃根 白芷各五錢

水二鍾煎一鍾食前服。○立齋曰：此方乃宣通攻毒之劑。若脈沉實便

秘者，毒在藏也。宜服之。其功甚大。若臟腑調和，脈不實者，不可用。醫林集要方用大黃一斤。

白芷六兩為末，每服三錢，熱酒調下。更用茶清調搽患處。名曰萬金散。蓋因其功而珍之也。

或用水跌為丸，以便於服亦可。吳江申僉憲兄患背疽堅硬，脈沉實，乃毒在內。用一服，大小

便下污物，再服而消。恐患者忽此二藥，故以此嘗驗者告之。

拔毒散九二 治一切癰疽腫毒，其功不可盡述。

乳香 沒藥 當歸 穿山甲炮 木鼈子 連翹各一錢 甘草分五 瓜蒌仁八分 牙皂炒 貝母

各七 忍冬藤二錢 大黃生熟各一錢半 右水酒各一鍾煎一鍾食前服。○此方攻毒止痛化膿之

良劑也。屢用屢驗。若膿成或已潰者，大黃可不用。恐泄其真氣，則膿者難潰，潰者難斂也。有

膿雖潰，脈仍洪數，或沉實喜冷者，火邪尚在，又所宜用。

內疎黃連湯九三 治瘡瘍發熱而嘔，大便秘結，脈洪而實。

黃連 芍藥 當歸 檳榔 木香 黃芩 梔子 薄荷 桔梗 甘草各一錢 連翹 大

黃連各一錢半 薑水煎，仍量虛實治之。

桃仁湯九四 逐瘀血

桃仁 蘇木各一兩 生地黃五錢 蟅虫去足炒 水蛭炒 各二 右每服三錢，水一盞煎六分，空心服。

漏蘆湯九五 治癰疽癰疽毒感實者。

漏蘆黃香 甘草 連翹 沉香各五錢 大黃一兩 右每服四五錢。薑棗水煎服。

千金漏蘆湯九六 治癰疽發背丹疹。時行熱毒。赤腫焮痛。

漏蘆 黃芩 白薇 連翹 枳殼 麩炒 升麻 粉草 麻黃去節 大黃濕紙裹 朴硝各一兩

右每服五六錢。薑水煎。去滓。空心服。下惡物為妙。

漏蘆升麻湯九七 治時毒頭面紅腫。咽嗑堵塞。水藥不下。若臟腑素有積熱。發為腫毒。疔瘡。

一切紅腫惡毒。

漏蘆二錢 升麻一錢 黃芩酒洗 生甘草 元參 牛蒡子炒研 若梗 連翹各一錢 藍葉如無

兼大黃酒浸量輕 水煎服。大便秘結者。加芒硝。

酒腸丸九八 治脾胃伏火。大腸乾燥。或風熱血結。宜用此丸通之。若結在直腸。宜用猪胆汁

導之。蓋腎王五液。開竅於二陰。若津液滋潤。則大便通調。若津液不足。脾氣虧損。必當培補

乃忌此藥。

桃仁去皮 麻子仁各一兩 羌活 歸尾 大黃 煨皂刺 秦光各五錢 右各另研為末。煉蜜或

猪胆汁丸。桐子大。每服三四十九。白湯下。若用猪胆汁導。而糞不能結燥者。須急補元氣。

沒藥丸九九 善逐滯血。

當歸一兩 桂心 芍藥各半兩 桃仁去皮 沒藥各三錢 燕蟲去足 水蛭炒各十個 右為末。醋糊丸。

桐子大。每服三五丸。空心醋湯下。

當歸丸一百 行血利水道大便。

當歸 半兩

大黃

桂心 各三錢

赤芍藥

葶藶 各二錢

人參

甘遂 各二錢

煉蜜丸如彈子大。

空心米飲化下一丸。

破棺丹 百一

治瘡瘍熱極汗多。大渴便秘。謔語發狂。

大黃 二兩半

芒硝 各二兩

甘草 各二兩

右為末。煉蜜丸。彈子大。每服一丸。童便酒化下。白湯亦可。

忍冬酒 百二

解諸癰毒。

忍冬藤 鮮者四五兩。若乾者。止可一兩。

大甘草節 一兩

二味入砂鍋內。以水二鍾。煎至一鍾。再入無灰酒一鍾。又煎數沸。去滓。分三服。病重者。晝夜兩劑。至大小便通利為度。另用忍冬藤研爛。入酒少許。卷患處。

金銀花酒 百三

治一切癰疽發背。疔瘡喉痺等症。用金銀花藤葉搗爛。取汁半鍾。和熟酒半鍾。溫服。甚者不過三五服。可保無虞。

槐花酒 百四

治癰瘍熱毒最妙。用槐花四五兩。炒微黃。乘熱入酒二鍾。煎十餘滾。去滓。熱服。未成者二三服。已成者一二服。但察其有熱毒未清者。皆可用。槐花治實熱之功。最為神速。惟胃寒者不宜服。大抵腫毒非用蒜。及槐花酒先去其勢。雖用托裏諸藥。其效未必神速。

蒲公英酒 百五

治乳癰吹乳。不問已成未成。皆可用。用蒲公英一握。搗爛。入酒半鍾。取酒溫服。澤貼患處。甚者不過三五服。即愈。

遠志酒 百六

能托散諸毒。治乳癰尤效。

遠志

不拘多少用米泔浸洗去心

右為末。每服三錢。用好酒一鍾調。遲少頃澄清飲之。以滓敷患處。

牛膝酒

百七

治楊梅風毒腰痛。

牛膝

川芎

羌活

五茄皮

杜仲

甘草

地骨皮

薏仁

各一兩

生地黄

十兩

二兩

右吹咀。用帛裹入無灰酒浸二七日。夏月三五日。每服一杯。日三五次。

海嬰酒

百八

昆布 三錢 海藻 五錢 沉香

雄黃 各一錢

海螵蛸 二錢

右咀。用好酒一升。湯煮任意。每服

一二鍾。或浸十餘日亦可飲。

桑枝煎

百九

大治口渴。

取嫩桑葉細切一升。炒以水三升。煎一升。日服三五劑。更多尤妙。

抱朴子云。療風痺乾燥。臂痛脚氣。四肢拘攣。上氣痰喘。久服補肺消食。利小便。輕身。耳目聰

明。令人光澤。其功不能盡述。

神仙截袖

百十

治癰疽發背一切惡瘡。預服則毒氣不入內。

真麻油

一斤 銀器內熬

右用酒兩碗。入油五盞。通口熱服。一日用。急則數日服之。○吳

安世云。吾家三世用之。無有不效。又聞獵者云。凡中藥箭。急飲麻油。藥毒即消。屢用甚驗。○

按古方。凡大便秘急而毒蓄於內者。最宜用之。以疏通其毒。若大便不實者。乃非所宜。

砭法

百十一

治丹毒疔瘡。紅絲走散。或時毒瘰癧。血壅。用細磁器擊碎。取有鋒銳者一塊。以

筋一根。劈開頭尖夾之。用線縛定。兩手指輕撮筋尾。令磁針正對患處。約懸寸許。再另用筋

一根頭擊筋頭。令毒血遇刺皆出。毒自減退。若毒氣入腹膨脹者難治。

刺少商穴 百十二

治咽喉急痛。穴在手大指內側。去爪甲角如韭葉。刺入二分許。以手自

臂勒至刺處出血即消。若重而膿成者。必須針患處。否則難治。

洪丞相蜈蚣針法 百十三

凡癰瘍勢欲腫毒成。血凝不散者。宜用此法以殺其勢。○治癰初作。

先以筆管一個。入大蜈蚣一個。以管口對瘡頭。使蜈蚣吮惡血。得去其毒即散。如瘡大須換三四條。若吮正穴。蜈蚣必死矣。屢試屢效。若血不止。以藕節上泥塗之即止。若瘡頭未明。以井邊

泥塗上先乾處即是。

騎竹馬灸法 百十四

治一切瘡瘍。無有不愈。○其法令病人以手肘凭几而坐。男左女右。將

手臂豎起要直。乃用竹篾一條。自臂腕中曲處橫紋間量起。貼肉直上。至中指盡處截斷。

為則。不量指甲。另用竹槓一條。令病人脫衣正身騎定。前後用兩人扛起。令病者脚不着地。仍使人扶定。勿令偃偻。却將前量臂篾從竹杠上尾骶坐處。直貼脊背。量至篾盡處記之。此

取中之處。非灸穴也。又用薄篾量男左女右手指節兩橫紋處。截為同身寸法。將此寸篾即

安前脊中點記處兩邊。各開一寸盡處。即是灸穴。各灸五七壯。瘡發於左。則灸右。發於右。則灸左。兩邊俱甚。則左右皆灸。蓋此穴乃心脈所過之處。凡癰疽皆心火之留滯。灸此則心火

流通。而毒自散矣。有起死回生之功。屢試屢驗。

神仙隔蒜灸法 百十五

治一切癰疽瘡毒。或痛或不痛。或麻木。及治瘰癧。毒氣熾盛。使諸瘰

不能起發。已起發者不能灌膿。已灌膿者不能收靨等證。如痛者灸至不痛。不痛者灸至痛。其毒隨火而散。此攻散鬱毒從治之法也。大有回生之功。其法用大蒜頭去皮切三分厚。安瘡頭上。用艾壯於蒜上灸之。五壯換蒜復灸。或三五十壯。或一二百壯。愈多愈妙。未成者即消。已成者亦殺其大勢。不能為害。如瘡大用蒜搗爛攤患處。將艾鋪上燒之。蒜敗再換。或陰毒紫白色不起發。不痛不作膿者。尤宜多灸。仍服托裏之劑。如灸後仍不痛。或不作膿不起發者。不治。此氣血虛極也。

附子餅

百十六

治潰瘍氣血俱虛。不能收斂。或風寒襲之。以致血氣不能運行。皆令不斂。用

炮附子去皮臍研末。以唾津和為餅。置瘡口上。將艾於鋪餅上灸之。每日灸數壯。但令微熱。勿令痛。如餅乾再用唾津調和。務以瘡口活潤為度。

豆豉餅

百十七

治瘡瘍腫毒。硬而不潰。及潰而不斂。並一切頑瘡惡瘡。用江西豆豉餅為末。

唾津和作餅子。如錢大。厚如三文錢。置患處。以艾鋪於餅上灸之。乾則再易。如灸背瘡。用救口水調餅覆患處。以艾鋪餅上灸之。如未成者即消。已成者亦殺其大毒。如有不效。必氣血虛敗也。

木香餅

百十八

治一切氣滯結腫。或痛或閃肭。及風寒所傷作痛。並效。

木香餅

百十九

右以木香為末。生地黄杵膏和勻。量患處大小作餅。置腫處。以熱熨斗熨之。

看附餅

百十九

治瘰癧流注腫塊。或風寒襲於經絡。結腫或痛。用香附為末。酒和量瘡毒大小作餅。覆患處。以熱熨斗熨之。已成者自潰。未成者內消。若風寒濕毒。宜用薑汁作餅。

神效桑枝灸百二十

治發背不起。或瘰肉不潰。此陽氣虛弱。用桑枝燃着。吹熄其燄。用火灸

患處。片時。日三五次。以助腫潰。若腐肉已去。新肉生透。宜灸四時。其陰瘡。爛癰。流注。腫瘡。惡瘡。久不愈者。亦宜用之。大抵此法。未潰則解熱毒。止疼痛。消瘀腫。已潰則補陽氣。散餘毒。生肌肉。若陽證。腫痛甚。或重如負石。初起用此法。出毒水。即內消。其日久者用之。雖潰亦淺。無苦楚。惜患者不知有此。治者亦不肯用此也。

神效葱熨法 一 二 一

治流注結核。骨癰。鶴膝。肢體腫塊。或痛或不痛。或風寒襲於經絡。流注

肢體。筋攣骨痛。或跌撲損傷。止痛散血消腫之良法。或先用隔蒜灸法。而餘腫未消。最宜用熨。以助氣血而行。瘦滯。其功甚大。用葱頭細切。杵爛炒熱。敷患處。冷即易之。再或熱熨數次。腫痛即止。其效如神。○或用葱煎湯。黃洗傷處亦妙。○或用葱一大把。束其數節。切為薄餅。置患處。用熱物熨之。或鋪艾炙之。亦可。必易餅多熨為妙。

神仙薰照方 一 二 二

雄黃 硃砂 血竭 真者沒藥 各一 麝香 二分 右五味。研細末。用綿紙捲為粗摺。約長尺

許。每摺中入藥三分。裹定。以真麻油潤透。點灼瘡上。須離瘡半寸許。自紅暈外圍周圍。徐徐照之。以漸將摺收入瘡口。所謂自外而內也。更須將摺向外拽。以引毒氣。此是手法。此藥氣從火頭上出。內透瘡中。則毒隨氣散。自不內侵。臟腑初用三條。漸加至五七條。瘡勢漸消。可漸減之。薰罷隨後用敷藥。○廣陵李杜云。背瘡所患。惟內攻與外潰耳。症屬火毒。醞釀斯成。

不能外散。勢必內攻。不能中出。勢必傍潰。醫者往往以涼藥圍解。多懼此二患。大陰瘡不起發者。止有隔蒜灸一法。然亦未見鑿鑿取效。此方初用藥擦薰照。以火引火。毒氣外散。後用藥敷圍。追膿止痛。毒從孔竅及瘡頂中出。可免傍潰矣。陰瘡一照。即起紅暈。狀如蒸餅。變為陽證。可保無虞。此其奇中大略也。照法。每日一次。初次用燃三根或四根。次日用四根或五根。再次漸至六七根止。大率看瘡輕重。酌燃多少。重者不過六七日。腐肉盡化為膿。從瘡口中陸續湧出。新肉如石榴子紫紫而生。此時不必再照。圍藥終始如一。隨瘡勢大小。漸漸收入。照圍後。不可聽醫用膏藥貼蓋。以致氣拂鬱。止割葱葉量瘡口大小貼之。凡照時。先須用猪蹄煎湯澄清。洗去圍藥。如法薰照。待瘡勢大愈。肉生將滿。始可用生肌散。或護以太乙膏。平復後。膏藥猶不可離。此其始末細微也。內服者。大要不出十宣散、護心散等方。最忌寒涼傷胃氣。此瘡由惱怒鬱結。厚味所致。受病以年計。愈久則愈甚。調攝之法。非懲忿窒慾。清散托裏。治以前方。即瘡扁復生。有望而走耳。又前方初止治背疽。其後一切腫毒。無不收功。蓋法無定。則醫貴變通。神而明之。存乎其人耳。余不佞善病。故留心方術。然未經累驗。不輕授人。此一方初驗於化南。再驗於陳大參景山。及范中翰舍初。其他證亦曾用以推廣。皆應手取效。輒贅其詳於此。其傳則道人孫氏。今大播廣陵。余先慈賴以保安者廿年云。○池陽朱陽伯曰。王孝廉良甫。為子言廣陵人有善神燈照者。瘡集發背神良。已求得其秘方矣。余識之已酉歲。余客廣陵。隅胛腫比於股。招所謂善療者照之。不膿得愈。又館友胡舍素患發背。大如覆孟。神

情情矣。延湯醫。束手待肉腐。方可用膏。徐長肌肉。問其術曰。至此。問其候。曰。百日果如其說。則舍素將成。烏有矣。遂急同弟輩。求得前方。刻未。按法治之。一日痛止。二三日神清。如脫桎梏。釋重負。肉腫如孟者。日縮而小。并未嘗腐。屢也。不月餘。盡。爽然起矣。奇矣哉。不表而汗。不針而潰。不灸而陷。舉不補而實。不下而毒盡。凡醫人之針刺。不必用也。至理歸於易簡。大道本在目前。所謂不可不思議者也。古今道術。入妙者。皆如此類。茲重刻之。故為此叙。○曲果。聶雲翰云。戊戌春暮。余病疽。京邸。疽據背。中。前與心對。初發微若黍粒。搔之痛癢。關心寒熱交作。甫十日。大若升。再十日。大若斗。食逆便結。匝月。目不一瞬。醫方所載。諸死候。業已十犯八九。兩絕復甦。自分無生。手條後事。偶從楊楚璞。得李肖衡所傳異人指授仙方。如法薰敷。越二日。毒漸解。適有起色。不易方。而竟就痊。距初發。淡甘旬。歸家。出以試人。輕僅踰月。重亦不出百日。靡不起者。蓋余所感。毒極重。勢極大。又治極遲。即二三內外科名家。皆束手失色。以為從所未聞。未見。及試人。則取驗更捷。蓋感有輕重。治有遲早也。顧念非此異方。不能起余。必死異證。非余起死回生。不能白此方之神異。余以此方活。安忍天下人。以此證危。因慮此方。莫獲廣佈於天下。又慮天下。忽視此方。而不加篤信。或亂於恥功。不已出之。醫口。疑似轉盼。間致誤大事。而悔無及也。因贅數語。以為此方之外。○咸林王維英曰。丙午端陽。印余左臂患疽。其大如拳。用騎竹馬灸法。灸至百十壯。泡起如銅錢。四圍腫覺退。箇中蓄此仙方。命製藥料。敬俟破後。薰之。不識其初。亦可薰也。客有備言。可薰者。因於當日。即薰十條。瘡

頂高收。四圍色白。夜間毒肉從邊化為稠膿。徐徐內流。粘同膠。每日如法薰照。洗貼五六次。中央毒肉脫落一條。共有十三孔。瘡外一指許。傍串三孔。且痛且癢。即極力照之。初出黃水。金銀花三色敷之。乾則覺痛。即去之不敷。並未用生肌散。惟護以太乙膏。月餘盡痊。當此瘡將愈。左臂又患一疽。正對無二。即照熱十條。敷以麩炒醋調文蛤膏。一日數更。次日五條。三日頂破。膿出不痛不癢。其毒盡散。同時有患別瘡者。余付藥以薰之。隨薰即散。並未成形。過知是方也。真仙方哉。持此療瘡。天下無瘡矣。余恐世人但知瘡破後可。不識照初發者尤易散。又恐因敷藥不全。前方並棄。不識敷藥不用亦可也。故備述終始。以神此方之用。

元藥神效散 一 二 三

洗陰照諸瘡

蛇床子 二兩 朴硝 一兩

右每用一兩。水二碗。煎數沸。洗瘡拭乾。搽生肌藥。

雄黃解毒散 一 二 四

治一切癰腫潰爛。毒勢甚者。先用此藥二三次。以後用豬蹄湯。

雄黃 一兩 白礬 四兩

寒水石 一兩

右俱為末。用滾湯二三碗。乘熱入藥末一兩。洗患處。以

太乙膏或神異膏貼之。

豬蹄湯 一 二 五

治一切癰疽杖瘡潰爛。去惡肉。潤瘡口。止痛。

白芷 黃芩

當歸 赤芍藥 獨活 生甘草 露蜂房

連子者佳 各五錢

用豬蹄一隻。水四

五碗。煮熟去油滓。取清湯入前藥一兩許。煎十數沸。去滓溫洗。惡肉隨洗而下。隨用膏藥貼。

之。○按此湯不必用黃芩。或以白礬易之更佳。

集香散 一 二六 洗癩瘡潰爛

白芷 藿香 茅香 香附 防風 各三 木香 甘草 各一 右用水三碗煎數沸去滓淋

洗患處。○立齋曰。此乃馨香之劑也。血氣聞香則行。得臭則逆也。凡瘡毒將盡未盡宜用之。

若有癢肉。宜先用雄黃解毒散解之。後用此方洗後。須即用膏藥貼護。勿使風入。肌肉易生。

直至收口為度。最忌用生肌之藥。

敷藥方 一 二七 車前草 芡實草 金銀花 五爪龍草 右四味鮮草一處搗爛。加以多

年陳米粉。即常用糲衣者。初起時。仍加飛鹽少許。共調為稠糊。敷瘡上。中留一頂。拔膿出。若

冬時無鮮者。用乾葉為末。陳醋調敷亦可。或五龍草一時難得。即單用三味。亦能奏功。不必

拘執也。○陽伯曰。毒瘡初起。毒盛者。須內服敗毒藥數劑。其有氣血薄弱者。亦須用托裏藥

數劑。則萬全之計耳。

秘傳圍藥鐵井欄 一 二八 敷一切惡毒。即收斂消腫神效。

牛糞炭 煨乾 灰用新磁罐 鐵線草 草烏 文蛤 白芨 白斂 貝母心 陳小粉 炒

黃芩 各 右為末。用高醋熬熱。調藥如糊。敷瘡四圍。中留錢孔。以出毒氣。乾則易之。瘡勢惡

甚者。用飛龍奪命丹等藥出汗。無不效。

大黃揭毒散 一 二九 敷熱墮腫毒。

大黃半一兩 白芨一兩 朴硝二兩 右為末并水調搽乾則潤之

草烏搗毒散百三十 治一切癰疽腫毒

草烏 貝母 天花粉 南星 芙蓉葉等分 右為末用醋調搽四圍中留頭出毒如乾

用醋潤

抑陰散一三一 治瘡瘍元氣虛寒。焮腫不消。或不潰斂。或筋攣骨痛。一切冷證。

草烏二兩 南星煨 赤芍藥炒 白芷各一兩 肉桂五錢 右為末葱湯調塗。熱酒亦可。

抑陽散一三二 一名洪寶丹。治瘡屬純陽腫痛發熱。

天花粉二兩 薑黃 白芷 赤芍藥各一兩 右為末茶湯調搽患處。

陰陽散一三三 治瘡屬半陰半陽。

紫荊皮炒五兩 獨活去節炒一兩 赤芍藥炒 白芷 石菖蒲各二兩 右為末葱酒調搽。

神功散一三四 諸發背癰疽及諸瘡。不問腫潰皆效。

黃柏炒 草烏炒各一兩 右為末。用漱口。水調入香油少許。搽患處。如乾仍用水潤之。

清涼救苦散一三五 治大頭瘟腫甚者。以此藥敷之。

芙蓉葉 霜桑葉 白欬 白芨 大黃 黃連 黃芩 黃柏 白芷 雄黃 芒硝

山茨茹 赤小豆 南星 金線重樓 右等分為末。蜜水調敷腫處。以翎頭搽之。

二黃膏一三六 敷一切腫毒。熱浮在外。或時氣熱壅者。

黃柏 大黃各等分 右為末。用醋調傅。如乾。用水潤之。

迴陽玉龍膏一三七 治陰疽發背。寒邪流注。風濕冷痺。諸脚氣冷痛無紅赤者。及跌撲所傷。

為敷涼藥。或人元氣虛寒。腫不消散。或不潰斂。及癰腫堅硬。肉色不變。久而不潰。潰而不斂。

或鼓雄風筋攣骨痛。一切陰寒冷證。唯一藥也。

草烏 肉桂各五錢 薑黃 南星 煨白芷 赤芍藥各一兩 右為末。葱湯或熱酒調塗。

冲和膏一三八 治一切瘡腫不甚。焮熱。積日不消。

紫荆皮炒五兩 獨活去節炒三兩 赤芍藥炒二兩 白芷 菖蒲各一兩 右為末。葱頭煎湯調搽。

麥飯石膏一三九 治瘡疽初起。先以麥飯石膏塗之。俟瘡根漸收。即敷神異膏斂之。但麥飯

石膏難於修合。用神異膏亦效。

白麥飯石炭大煨醋淬數次。研極細二兩。據本草所載。鹿角生取帶膠骨者。斷之用炭。凡石如飯。團粒粘結成塊者。即是皆可用也。 虎角木燒烟盡。研極細四兩。

右用米醋調和。入砂器煎。以竹片不住手攪。熬成膏。先用猪蹄湯洗患處。以鷲翎拂淨。三四圓

乾。則以醋潤之。若腐爛者。用布帛攤貼之。○李氏曰。麥石飯膏。治發背癰疽神妙。惜世罕知。

有患癰不潰而危者。全用此膏。一夕頓潰。凡疽得膿。其毒始解。或有不潰者。須用此膏。故錄

之。俾精擇修合。以取十全之功也。嘗見世間醫者。每有妙方。祕而不傳。或更改以惑人。誠可

惡也。余思西華麥飯石膏。守死不傳。其立心私刻。君子鄙之矣。

黑末子百四十 治節毒。用羊角連內骨燒存性為末。酒調三錢。分上下服之。瘡可斂。○立

上海廣益書局印行

齋曰。此方未嘗用。蓋祕方也。嘗治面上。或身卒得黑斑。或瘡或瘰癧。此而不治。亦能殺人。以
殺羊角燒存性。研為極細末。以鷄子清調塗之。甚效。本草亦云然。

乳香定痛散

一四一 治瘡瘍潰爛。疼痛不可忍。諸藥不效者。

乳香

沒藥 各二錢 寒水石 煨滑石 各四錢 水片 一分

右為細末。搭敷患處。痛即止。此方乳沒

性溫。佐以寒劑制之。故寒熱之痛皆效。

烏金膏

一四二 治發背中央肉死。塗即腐。未死塗之即生。若初起腫痛。用點數處。則解毒頓

消。若瘡肉腐黑。塗之即潰。若惡瘡頑瘡。元氣無虧。久不收斂者。內有毒根。以紙撚蘸。燻其內。
有等發背。因元氣虛弱。或因剋伐元氣。虧損毒氣。敷漫中黯外赤。不腐不潰。須服大補之劑。
中塗三四寸許。至五六日間。赤黯之界。自有裂紋。如刀劃之狀。中央漸潰。新肉內用純陽之
藥。以接其元氣。庶能收斂。若妄用刀鍼去肉出血。則陽隨陰散。元氣愈傷。或塗涼藥。則毒氣
不解。氣血愈虛。非徒無益。適以害之矣。其方用巴豆去殼炒黑。研為膏。貼腫處。或塗瘰癧肉
上。則自消化。或加乳香少許亦可。如塗瘡內。或加香油少許。調稀可用。若餘毒不斂者。以此紙之
不致成痛。

透骨丹

一四三 此潰膿藥。外科不可缺。

蟾酥

硼砂

輕粉

巴豆

各五錢

蠟牛

二個

麝香

一分

右先將巴豆研如泥。次入蠟牛。麝

香再研。後入各藥。研極細。以小磁餅收藏。每用少許。以乳汁化開。先用鐵鍼輕輕撥破毒頭。

挑藥米粒許納於瘡口外用清涼膏貼之

鐵頭散 一四四

治一切頑瘡內有膿管瘻肉或癰癧結核不化瘡口不合宜此藥追蝕腐之

赤石脂 五錢

輕粉 麝香各五分

乳香 白丁香各三錢

生砒

黃丹各一錢

蜈蚣一條

右為末

搽瘻肉上其肉自化若瘡口小或痔瘻用糯米糊和作細條陰乾縫入外以膏藥貼之凡瘡

口久不合者內有膿管必須用此腐之內服托裏之藥

代鐵膏 一四五

治瘡瘍膿熱不潰

乳香 二分

白丁香各五分

巴豆沙魚

碱各五分

右為末熱水調點瘡頭上常以碱水潤之勿令其乾

替鐵丸 一四六

治膿不成潰者

白丁香

硃砂另研沒藥

乳香各一錢

糯米

四十粒先以礬灰奉大一塊置碗內量入

如水晶狀取出用之

右各另為末然後和勻收貯用時以飯丸麥粒大每用一粒水濕

粘瘡頭上其膿自出○凡瘡瘍血氣壯實膿成不潰者宜用此藥以洩其毒則肌肉易生處

口易斂若氣血虧損者須用甘溫之劑以培根本否則不惟不潰且難收斂若肘骨疽及緊

要之地當及時鐵砭出之為善

三合散 一四七

治癰疽不肯作膿

新巴豆肉

明砒

斑猫等分

右為細末雜瘡內忌肉自化○立齋曰此方藥性大毒果

有惡毒之症宜用腐之取其以毒攻毒也若以陽氣虛不能腐化成膿者宜用大補之劑及

桑木灸之丹溪云。氣血壯貴。腹有湧出。大抵瘡之潰斂遲速。總由血氣之盛衰使然也。

藜蘆膏一四八 治一切癰疽將肉突出。不問大小長短。用藜蘆一味為末。以生豬脂和研如

膏。塗患處。周日易之。

生肌散一四九 治瘡口不合。

木香 輕粉各二錢 黃丹 枯礬各五錢 右為細末。用豬胆汁拌勻。晒乾再研。細搽患處。立

齋曰。此方乃解毒去腐搜膿之劑。非竟自生肌藥也。蓋毒盡則肉自生。常見患者往往用龍

骨。血竭之類。以求生肌。殊不知餘毒未盡。肌肉何以得生。反增腐爛耳。若此方誠有見也。

收口搽藥百五十 李氏曰。龍遊有患癰疽者。大洗五藏。僅隔膜耳。自謂必死。用鯽魚去腸。實

以鴉羊糞。烘燥為末。乾搽之。瘡口自收。此出洪氏方。屢用有效。故附於此。須候膿少。欲生肌

肉時用之。

桔梗湯一五一 治咳嗽吐膿。痰中有血。胸膈兩脇作痛。煩悶作渴。或出臭濁。已成肺癰症。

桔梗炒 貝母 當歸酒浸 瓜蒌仁 枳殼炒 薏仁 桑白皮炒 百合各一錢五分 五味子炒 知

母炒 地骨皮 甜葶藶炒 甘草節 防己 黃耆 杏仁各五分 水二鍾。煎服。

生 桔梗湯一五二 治肺癰咳嗽膿血。咽乾多渴。大小便赤澀。方如前。但少五味。葶藶。知母。

地骨皮四味。用水二盞。姜五片。煎八分。食遠服。大便祕者。加大黃。

人參五味子湯一五三 治氣血勞傷。咳嗽膿咯血。寒熱往來。夜出盜汗。羸瘦困乏。一切虛損肺

痿之證並治。

人參 五味子炒 熟地黃 當歸酒炒 白朮炒 白茯苓 炙甘草 陳皮 桔梗炒 前胡

各一錢 黃耆炙 地骨皮 桑白皮炒 枳殼炒 柴胡各七分 水一鐘半 生姜三片 煎八分 食後服。

四順散 一五四 治肺癰吐膿 五心煩熱 壅悶咳嗽。

貝母去心 紫苑去苗 桔梗炒 甘草七分 水一鐘半 煎七分 食遠服 如咳嗽加杏仁 亦可為末 白湯調服。

合歡飲 一五五 治肺癰久不斂口。

用合歡皮 白然二味 同煎服。合歡皮即椴樹皮也。亦名夜合。

紫苑草湯 一五六 治飲食過度 或煎煇傷肺 咳嗽喘乾 吐痰唾血 喘急脇痛 不得安卧 肺痿等症。

紫苑草去苗 桑葉煙霜者 欵冬花 百合蒸焙 杏仁去皮 阿膠蛤粉炒 貝母去心 半夏 蒲黃

炒各一錢 人參 犀角鎊末 甘草五分 水一鐘半 生姜三片 煎七分 入犀角末 食後服。

升麻湯 一五七 治肺癰胸乳間皆痛 吐膿腥臭。

川升麻 桔梗炒 薏苡仁 地榆 黃芩炒 赤芍藥炒 牡丹皮 生甘草各一錢 水二鐘 煎八分 食遠服。

如金解毒散 一五八 治肺癰。

桔梗一錢 甘草半錢 黃連炒 黃芩炒 黃柏炒 山梔七分 水二鐘 煎八分 徐徐陸續飲之 不可急服。

○按此方乃降火解毒之劑也 凡發熱煩渴 脈洪大者 用之即效 若脈數咳痰腥臭 或吐膿痰者 宜用桔梗湯。

如聖柘黃丸 一五九 治肺癰咳而腥臭或吐膿痰不問膿之成否並效肺家之病雖有痰惟

此方功效甚捷不可忽之

柘黃一兩 為末 百齒霜 二錢 即拔毒 用糊為丸如桐子大每服三五十九米飲下。○柘黃乃柘樹所生

者其色黃狀如雲芝江南最多北方鮮有

薑蔥散 百六十 治過食煎燒或飲酒過度致肺壅喘不能卧及肺癰濁唾腥臭

甜葶藶 桔梗炒 瓜蒌仁 川升麻 薏苡仁 桑白皮炒 葛根各一 甘草分五 水一鍾

半生薑三片煎八分食後服

知母茯苓湯 一六一 治肺癰咳喘不已往來寒熱自汗

知母炒 茯苓 炙甘草 人參 白朮 五味子炒 麥門冬 半夏製 薄荷 桔梗 桑

胡 欵冬花各一 阿膠蛤粉炒 黃芩炒各三錢 川芎 五分 水二鍾薑三片煎一鍾食遠服

四味排膿散 一六二 治肺癰吐膿五心煩熱壅悶咳嗽

嫩黃耆鹽水炒 白芷 五味子研炒 人參等分 右為細末每服三錢食後蜜湯調下

八味排膿散 一六二 治腸癰少腹脹痛裏急後重脈滑數或時時下膿

黃耆炒 當歸 酒洗 金銀花 川山甲蛤粉炒 白芷 防風 連翹 瓜蒌各三 水二鍾煎八

分食前服或為末每服三錢食後蜜湯調下如膿將盡去穿山甲連翹倍當歸加川芎

薏苡仁湯 一六四 一名瓜子仁湯○治腸癰腹中疔痛或脹滿不食小便短澀婦人產後多

有此證。縱非癰服之尤效。

薏苡仁炒五錢

瓜萸仁三錢

牡丹皮

桃仁去皮共二錢

右水煎空心服

牡丹皮散

一六五

治腸癰腹濡而痛時時下膿

牡丹皮

人參

黃耆少

白茯苓

天麻

白芷

桃仁去皮共

薏苡仁

當歸

川芎

各一錢

官桂

甘草各五分

木香三分

右水煎服

梅子仁湯

一六六

治腸癰腹痛大便祕澀

梅仁九個去皮共

大黃炒

牡丹皮

芒硝

犀角鎊各一錢

冬瓜仁三錢

右水煎入犀角末服

大黃湯

一六七

一名牡丹皮湯。○專治腸癰小腹堅腫而熱。按之則痛。肉色如故。或焮赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。其脈沉緊。膿未成者即服之。

牡丹皮

瓜萸仁各三錢

桃仁去皮共

大黃原

芒硝各二錢

水二鍾煎一鍾

食前服

○本方去瓜萸即名大黃牡丹湯。○立齋曰。此方乃行血破血之劑也。如發熱自汗惡寒。小腹作痛。小便如淋。脈未數者。有效。丹溪曰。小腹腫痞按之痛。小便如淋。或自調發熱身無汗。或復惡寒。其脈遲緊者。膿未成宜下之。當有血。此結熱所成也。故金匱用大黃利之。即此方也。若無前證。恐不宜用。其有脈滑數。腹內脹痛。或時時發重而膿已下。宜用八味排膿散。蠟礬丸。及托裏之藥。射干湯一六八。治胃脫癰吐膿血。

射干去尾

山梔仁

赤茯苓

升麻各一錢

白朮五分

赤芍藥一錢

右水煎服

槐花散 一六九 治腸風藏毒下血

槐花炒熟地黃 青皮 白朮炒 荆芥穗 當歸身 酒拌 升麻 各一錢 川芎四分 右為末 每服

三錢 空心米飲調下 水煎服亦可

除濕和血湯 百七十 方在和陣二一九 治陽明虛陰濕熱便血腹痛

夏枯草湯 一七一 治瘰癧馬刀 已潰未潰 或日久漏者

夏枯草 六兩 水二鍾 煎七分 去滓 食遠服 〇此生血 治瘰癧之聖藥 虛甚者 當煎濃膏服

並塗患處 多服益善 兼十全大補湯 加香附 貝母 遠志 尤善

必效散 一七二 治瘰癧氣血尚無虧損 瘰癧核不愈 內服此藥 外以鍼頭散腐之 若氣血虛者

先服益氣養營湯數劑 後服此藥 服後瘰癧盡下 再服前湯數劑

南礪砂二錢 輕粉 一錢 麝香 五分 巴豆五個 去膜 白橫柳 一個 斑貓四十四個 去頭翅 右同為細末

取鷄子二個 去黃用青調藥 仍入殼內 以濕紙數重糊口 入飯甑蒸熟 取出曬乾 研末 虛者

每服半錢 實者一錢 用炒生薑酒或五更用滾湯調服 如覺小腹痛 用益元散 一服 其毒俱

從小便出 胎婦勿餌 瘡毒去後 多服益氣養營湯 瘡口自合 〇此藥斑貓 巴豆 似為峻利 然

已且能解斑貓之毒 用者勿畏 余於京師 遇一富商 項有瘰癧 一片頗大 詢其由 彼云 因怒

而至 困苦二年 百法不應 忽有方士 與藥一服 即退 二三再服 頓退 四服而平 旬日而瘡 以

重金禮求之 乃是必效散 因修合濟人 無有不效 丹溪亦云 必效散 與神效瓜蔓散 藥服之

自有神效。常以二劑兼補劑用之甚效。故錄之。但此藥雖云峻利。於應毒之深者。非此不能解。故宜用之。惟血氣虛者不可用。恐其有誤也。又一道人治此證。用雞子七個。每個入斑貓一枚。飯上蒸熟。每日空心食一個。求者甚多。考之各書。應門及本草亦有之。然血氣虛者。恐不能治也。

射干連翹散 一七三 治寒熱瘰癧

射干 連翹 玄參 赤芍藥 木香 升麻 前胡 梔子仁 當歸 甘草 各一大黃

二錢 水煎食後服

如神散 一七四 治瘰癧已潰。瘻肉不去。瘡口不合。

松香末 一兩 白礬 三錢 為末。麻油調搽。乾疹亦可。

還仙無比丸 一七五 治瘰癧未成。膿其人氣體如常。宜服此丸。形氣覺虛者。宜先服益氣養

榮湯。待血氣少充。方服此丸。核消後。仍服煎湯。如潰後有瘻肉者。宜用鍼頭散。如不斂。亦宜

服此丸。斂後再服煎湯。

白朮 炒 檳榔 防風 黑豆 半生半炒 蜜陀僧 郁李仁 地黃 斑貓 去足翅用糯米甘草各

錢 右為細末。水糊丸。桐子大。每服二十九。早晚煎甘草檳榔湯下。服至月許。覺腹中微痛。

自小便中取下瘰癧。如魚目狀。已破者自合。未膿者自消。

附後治療方 一七六 凡項下卒結。囊欲成瘻者。用海藻一斤。洗去鹹。浸酒飲之。不可間斷。須

要時時飲二三杯。有酒氣方妙。

神効開結散 一七七 消癭塊甚效。

橘紅 四兩 沉香

木香 各二錢

珍珠 四十九粒 入砂礬內以鹽泥封固 煅赤取出 去火毒用

猪厥肉子 四十九枚 用豚猪生頭間如菓子者

右為末。每服一錢。臨卧酒調。徐徐嚥下。患小者三五服。大者一劑可愈。切忌酸鹹油膩滯

氣之物。須用除日於靜室修合。

生地黃丸 一七八

治師尼寡婦室女乍寒乍熱。而患瘡瘍及頸間結核。肝脈弦長而出魚際。

外無寒邪。內多鬱火者。宜此治之。

生地 一兩 酒洗

秦艽

硬柴胡 各半兩

赤芍藥 一兩

右為末。入地黃膏。加煉蜜為丸。桐

子大。每服三五十九。為梅湯日進二服。

外 昆布丸 一七九

治項下結囊欲成癭者。

昆布 酒洗

海藻 酒洗 各等分

右為末。煉蜜丸。彈子大。含化嚥之。

生 玉壺散 百八十一

治三種毒瘡。

海藻 海帶

昆布

雷丸 各一兩

廣茂

青鹽 各半兩

右為細末。老米飲為丸。桐子大。不拘

時。嚥化四五丸。

神効瓜葛散 一八一

治乳癰及一切癰疽。初起腫痛即消。膿成即潰。膿出即愈。治癰之方甚

多。此方獨神効。瘰癧瘡毒尤效。凡一切癰疽餘毒。皆宜用之。

瓜萸一個當歸酒洗生粉草各半乳香沒藥各一右用酒煎服。良久再服。如不能飲。以

酒水各半煎之。如數劑不效。宜以補氣血之藥兼服之。○若肝經血虛。結核不消。佐以四物

柴胡。升麻。白朮。茯苓。○若肝脾氣血虛弱。佐以四君。或歸柴胡。升麻。○若憂鬱傷脾。氣血虧

損。佐以歸脾湯。

海藻散堅丸一八二 治肝經癭瘤。

海藻昆布龍膽草酒并炒小麥醋煮炒右為末。煉蜜丸。桐子大。每服二三丸。臨卧白

湯送下。或噲化嚙之尤好。凡患瘰癧。服調治之藥未應。宜佐以此上三方。○一方有柴胡二兩。

連翹飲子一八三 治乳內結核。服數劑如不消。宜服八珍湯。初起有表證者。宜先解散。

連翹川芎瓜萸仁研皂刺炒橘葉青皮甘草節桃仁各一右水煎食遠服。

清肝解毒湯一八四 治肝經血虛風熱。或鬱火傷血。乳內結核。或為腫潰不愈。凡肝胆經

血氣不和之病。皆宜用此藥。

人參熟地湯芍藥炒茯苓山梔貝母各一柴胡牡丹皮川芎陳皮各五分當

歸白朮各一甘草五分右水煎服。

羌活白芷散一八五 治風熱血燥。手掌皸裂。或頭面生瘡。或遍身腫塊。或膿水淋漓。

羌活白芷荆芥軟柴胡蔓荊子防風甘草牙皂黃芩酒炒黃連酒炒右水煎服。

胡麻散一八六 治風熱癩疹癩瘡。

胡麻子二錢 苦參 荆芥穗 何首烏各八錢 威靈仙 防風 石菖蒲 牛蒡子炒 甘菊花

蔓荊子 白蒺藜炒 炙甘草各六錢 右為末每服二錢用薄荷湯食後調服或茶清亦可

四生散一八七 治腫腿瘡溼不愈或眼目昏花名腎藏風並治風癩疥癩血風瘡症

黃芩 獨活 白附子真者 白蒺藜等分 右為末每服二錢用猪腰子一枚批開入藥濕

紙包裹煨熟空心連腰子細嚼鹽湯送下

積蘇散一八八 治風濕流注脚脛酸痛或嘔吐不食

檳榔 木瓜 陳皮 炙甘草各一錢 香附 紫蘇各五分 水一鍾半生薑三片葱白三莖煎

一鍾空心服

升麻和氣飲一八九 治風癬疥瘡熱結大便不通

當歸 陳皮各一錢半 枳殼炒 芍藥酒炒 半夏 梔子 白芷 蒼朮未泔炒 乾葛 白茯苓

甘草各一錢 乾薑炒 大黃各五分 升麻三分 右水煎服

當歸飲百九十 治風濕血熱癩疹瘡癢膿水淋漓瘡疥發熱等症

當歸 川芎 生地黃 白芍藥 白蒺藜炒 黃耆 何首烏不見錄 防風 荆芥 甘草各一錢 右水煎

羌活當歸散一九一 治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或隱疹瘡膿水淋漓

羌活 當歸 川芎 升麻 防風 白芷 荆芥 鼠粘子蒸 黃連酒炒 黃芩酒炒 連翹

甘草 右用酒拌晒乾酒煎服

一掃散 二九二 治癬疥

防風 荆芥 苦參 地骨皮 薄荷 等分 甘草 減半 右為末。蜜水調服三錢。不過三五

服可淨。○或煉蜜丸。桐子大。每服五七十丸。食遠茶清送下。

烏金散 一九三 敷腎囊破爛下疳等症。

麩炭 紫蘇葉 右等分為末。香油調搽。用紫蘇葉包裹之。

蛇床子散 一九四 治一切風癬疥癩瘡。膿水淋漓。

蛇床子 獨活 苦參 防風 荆芥 各三錢 枯礬 銅綠 各一兩二 右為末。麻油調搽。

金黃散 一九五 敷天泡濕熱等瘡。

滑石 粉甘草 此當半用為是 右等分。為末。搽敷。○此方或加豨豆末。以治濕熱肥瘡。更效。○當

以此方加枯礬少半。用治肥瘡。大效。

白粉散 一九六 治諸瘡。

海蝶蛸 三分 白芨 一分 輕粉 一分 右為末。先用漿水洗拭乾傳。

滑石散 一九六 治小兒天泡瘡。

好滑石 黃柏 右為末。傳之。○仍內服荆防敗毒散。或金銀花散。熱甚者。宜服大連翹飲。

○一方名碧玉散。以青靛調前二味如泥。用皂刺挑破泡。水。次敷藥。神效。

秘方仙遺糧湯 一九八 治一切楊梅瘡。不拘終始。虛實。皆可取效。

土茯苓 即名仙遺根用鮮者二兩洗淨以木石拍碎 用水三盞煎二盞去滓入後藥煎服 當歸 生地 防

風 木通 薏仁 各七 金銀花 黃連 連翹 各一 白朮 白蘚皮 各七 皂刺 六分 甘草 四分

分 加燈心二十根用遺糧湯二碗煎一碗食遠服

土草解湯 一九九 治楊梅瘡及瘰癧咽喉惡瘡癰漏潰爛筋骨拘攣疼痛皆效○用土草解

即土茯苓二三兩以水三盞煎二鐘不拘時徐徐服之○若患久或服攻擊之劑致傷脾胃

氣血等證以此一味為主外加對證之藥無不神效

五加皮 二兩 治楊梅綿花瘡百發百中亦可煮酒以治結毒

當歸 木瓜 生地黃 熟地黃 羌活 薏仁 各一 防風 荆芥 赤芍 苦參 大楓

藤 各五 五加皮 二錢 甘草 五錢 右每服入土茯苓四兩猪肉四兩用水二大碗煎

一碗食前溫服渣再煎連肉食之忌生冷魚蟹沙氣牛肉茶酒醋所用土茯苓忌鐵器○若

治瘰癧口服此藥外以此藥煎膏或丹收或粉收貼之

換肌消毒散 二百一 一名草解湯○治時瘡不拘初起潰爛

土茯苓 五錢或二兩 當歸 白芷 皂刺 薏仁 各一 木瓜 不犯 白蘚皮 木通 金銀花 各

錢 甘草 五分 右水煎服○甚者土茯苓用至四五兩更效

獨瘰消毒散 二百二 治時瘡疥癩瘡

薑黃 土茯苓 獨活 各五 白朮 當歸 各一 芍藥 一錢 白芷 五分 右水煎服

七貼方 二百三

治楊梅棉花瘡

防風 忍冬

皂刺

蟬退去頭

連翹

白蘚皮

五加皮

荆芥

穿山甲

炒各一錢生地

木瓜去心

殘蠶炒各一錢

皂子七個

薏仁

三錢

土茯苓

四兩

右用水四碗煎二碗食遠分二

次服之

○忌牛羊茶酒醋房事

茯苓膏 二百四

治楊梅瘡並治風毒

當歸

白蒺藜

羌活

生地

熟地

甘草

去皮

連翹

木通

各三錢

土茯苓

半斤

右為

末用水五六碗

熬將半

用絹濾去滓

成膏待冷

每服一大酒鍾

日三服

輕者五六料

重者一

十料全愈

煎藥須用砂鍋

○忌房事鷄魚牛肉椒醋等發物

五寶丹 二百五

治九種楊梅結毒並及兒女者

琥珀

透明紅色者用

珍珠

炒過三分半

硃砂

透明者

乳石

用木香甘草各一錢

飛

羅麩

炒過三分半

冰片

時加

右俱為極細末

磁罐收貯聽用

○服法每日用土茯苓成塊一

斤洗淨

用石敲碎

先入水二升

煮取汁四碗

收磁器內

將前滓再入水四五碗

煮汁二碗

並

入前汁內

為一日之用

○若病在上者

加木香二錢

病在下者

加牛膝一兩

與土茯苓同煎

病者不得另飲茶湯

但將土茯苓湯時時飲之

若飲湯半鍾

加五寶丹二釐

飲一鍾

加四釐

體

厚者

加六七釐

一日內服盡

此湯為度

在上飽服

在下飢服

忌茶酒及一切發風動氣之物

其毒貼清涼膏

或加搽藥收口

若舊有輕粉等毒服藥後當盡發出無則不發也

○忌房事

○忌房事

○忌房事

○忌房事

寒導滯之劑。若久曠房室。大小便秘。發熱焮痛。或交感時強固積氣。以致交錯壅滯。而結為腫痛便秘者。最宜用之。若勢倦虛弱之人。不甚焮痛。大小便無熱秘者。不宜輕用。

牛黃雙解散 二百九

治便癰內蘊熱毒。外挾風邪。或交感強忍精氣。以致淫精交錯。壅結腫

痛。或大小便秘。先用此藥通解。更用調補之劑。

肉桂 大黃炒芍藥 牽牛并炒澤瀉 桃仁去皮尖炒炙甘草 乾薑各一 右分二劑

水煎。空心食前服。

內托羌活湯 二百十 治脣癰腫痛。兩尺脈緊。按之無力者。

羌活 黃柏各二錢黃耆炒防風 當歸尾 藁本 肉桂 連翹各一錢炙甘草 蒼朮

陳皮各半錢 右水酒煎服。

加味瀉肝湯 二一一 治肝經濕熱不利。陰囊腫痛。或潰爛皮脫。舉丸懸掛。或便毒及下疳腫

痛。或潰爛。皆治之。

龍膽草酒炒當歸梢 車前子炒生地黃 芍藥炒澤瀉 黃連炒黃柏酒炒知母酒炒防

風各一錢甘草梢二分 水二鍾煎八分。食前服。外敷烏金散。

加味託裏散 二一二 治懸癰不消不潰。

人參 黃耆鹽水炒當歸 川芎 麥門冬 芍藥炒黃柏酒炒知母酒炒金銀花 製甘草

柴胡各一錢 水二鍾煎八分。食前服。

加味十全大補湯 二一三

治懸癰潰而不斂或發熱飲食少思

人參 黃耆鹽水炒 白朮炒 熟地黃 當歸 川芎 芍藥炒 茯苓各一錢 甘草炙 肉桂 五味

子藹炒 麥門冬各五分 水二鍾煎一鍾食前服○莖腫加青皮○小便赤加酒炒黃柏知母

○小便澀加車前子山梔子俱炒用

五味當歸散 二一四

治婦人陰中突出一物長五六寸名陰挺

當歸 黃芩各二兩 牡蠣煨一兩 蝟皮炙一兩 赤芍藥五錢 右為末每服二錢食前溫酒調下滾

湯亦可如不應須以補中益氣湯倍加柴胡升麻兼服之○又方用當歸川山甲炒蒲黃炒

各半兩辰砂一錢麝香少許俱為末每服三錢酒調下尤效

婦人陰瘡 二一五 治婦人陰戶生瘡作瘻

杏仁炒 雄黃 白礬各五錢 麝香二分 右為末敷入患處

塌腫湯 二一六

治婦人陰戶生瘡或癢或膿水淋漓

甘草 乾漆各三錢 生地黃 當歸 黃芩 川芎各二錢 龍甲五錢 右用水數碗煎數沸去

滓當洗患處

白芷升麻湯 二一七

治婦人陰內膿水淋漓或癢或痛

白芷 升麻 黃連 木通 當歸 川芎 白朮 茯苓 右水煎服○更用塌腫湯浴洗之

痔漏腸紅方 二一八 其效無比

黃連去蘆毛淨一兩好酒浸一宿撈起陰乾為末百草霜用草芽燒者松柴為梅肉一兩蒸軟印用前右以三味同搗一處為丸桐子大如太乾仍如前酒搗丸之每空心用酒送下四五十丸三日見效十日全愈。

地榆散 二一九 治血痔 右用地榆為細末每服二錢七食前米飲調下日三服

臭穉皮散 二百二十 治痔下血及膿不止

臭穉皮微炒酸石榴皮 黃連去地榆阿膠炒珠各一兩艾葉三錢微炒右為細末每服二錢食前粥飲調下

秦艽防風湯 二二一 治痔漏結燥大便作痛

秦艽 防風 當歸酒拌白朮 黃柏 陳皮 柴胡 大黃煨澤瀉各一錢桃仁去皮紅花

升麻 甘草各五分右水煎空心服

豬臟丸 二二二 治大便痔漏下血

豬大臟一條烘乾以棉花炒為末填入臟內兩頭扎定瓦器內米錯煮爛右搗和再加糕糊為丸桐子大每服五七十丸食前米飲或當歸酒下。此方用黃連豬臟丸尤效。一方先用海螵蛸炙黃去殼為末以木賊草煎湯調下三日即效或後服黃連豬臟丸

痔瘡方 二二三 雄黃五分五靈脂燒斷五倍子炒通各一錢沒藥三錢半白礬生半右搗極

細末用紙托貼瘡口上

三品錠子 二二四

上品 去十八種痔。白明礬二兩 白砒一兩零五分 乳香 沒藥各三錢半 牛黃三錢

中品 去五漏及翻花氣瘡核。白明礬二兩 白砒三錢 乳香 沒藥各三錢半 牛黃二錢

下品 治瘰癧氣核。疔瘡發背腦疽諸惡證。明礬二兩 白砒一兩 乳香 沒藥各二錢半 牛黃三錢

右將砒末入紫泥罐內。次用礬末蓋之。以炭火煨令烟盡。取出。並各藥俱研極細末。用糯米

糊和為挺子。狀如線香。陰乾。維瘡內三四次。年深者五六次。其根自腐。如瘡露在外。更用蜜

水調搽瘡上亦可。嘗有一老嫗用此。治瘰癧。索重價始肯為治。其方法乃是中品。錠子紐

瘡內。以膏藥貼之。其根自腐。未盡再用。去皮更搽生肌藥。數日即愈。人多異之。凡見其治氣

血不虛者果驗。惟氣血虛者。雖潰去亦不能愈。蓋此與必効散相為表裏。皆攻毒去邪之藥也。

羊膽膏二二五 治痔漏下疳瘡。臘月取羊膽一枚。入片腦末一分。置風處晾乾。用時以涼

水化開。頻敷患處。內服槐子酒。或加味瀉肝湯。若得熊胆更佳。如眼痛者。點之尤妙。

水銀膏二二六 治蟲痔瘡不止。

水銀一兩 棗肉二兩 右和研水銀不見星。捻如棗核狀。薄綿裹內。釘門中。明日蟲出。若痛

加韶粉三分。丸內之。

熊胆膏二二七 治痔漏極效。

熊胆五分 冰片一分 右研細。用井花水調。鷄翎掃痔上。

蝟牛膏二二八 傳痔痛極效。

蝸牛一枚負殼
有角者

冰片麝香各少

右同研爛以磁器盛次早取汁敷痔上

先花線二二九

繫痔漏瘡核

用先花一握洗淨入木拍搗爛加少水絞汁於石器中漫火

煎成膏將線線於膏內度過晒乾以線繫痔當微痛候痔乾落以紙蘸膏納裏內去根當
永除根也○一方只搗汁浸線一夜用不得使水

枯痔水澄膏二百三十

治痔護肉

鬱金

白芨各一

一方加黃連右二味為細末如患內痔候登廁時翻出在外用溫湯洗

淨側臥於牀其痔即出用蜜水調藥得中以篋蘸塗殺道四邊好肉上留痔在外以紙蓋藥

上良久然後用後枯藥搽痔上仍用筆蘸溫水於紙上潤之勿令藥乾及四散好白芨四

生信石二錢
半錢硃砂一錢
極細

右各研為細末先將砒入紫泥罐底次將藥末蓋之用火煨令

烟盡使砒盡從烟去止借砒氣於藥內耳將藥為極細末看痔頭大小置藥末於掌中乃入

硃砂少許以唾調稀用篋蘸塗痔上週過一日三上看痔頭顏色焦黑為效至夜有黃水出

切勿他疑水盡為妙至中夜上藥一遍來夜依然上藥三次有小痛不妨換藥時以碗盛溫

湯用筆輕洗去舊藥更上新藥仍用護肉藥間用荆芥湯洗之三兩日之後黃水出將盡可

於藥中增硃砂減白芨則藥力即緩三兩日即可增減漸取之庶不驚人全在看色增減

數藥厚薄方是活法此藥是借砒信之氣又有硃砂能以解之一方士將此二方在京治人

多致致富一富商以百金求得之錄於予予雖未用傳人無不言效但枯藥則趙宜真煉師

已刊於青囊雜纂。如千金方則未見刊傳。大抵今人言能取痔者。皆此方也。其有氣血虛。或扶內邪者。還當兼治其內。庶不有失。

如神千金方 二三一 治痔無有不效。

好信石 黃明者三錢 打如豆粒 白礬 一兩 好黃丹 五錢 蝎梢 七個 洗淨 瓦草 為 光實者 去皮 右用紫

泥罐。先將炭火煨紅。放冷拭淨。先下明礬燒令沸。次下信。入礬內拌勻。文武火煨。候沸再攪。

勻。次看罐通紅烟起為度。將罐撥下待冷。取研為末。方入黃丹草烏蝎梢三味。再同研極細。

以磁罐收貯。如欲敷藥。先煎甘草湯。或葱椒湯。洗淨患處。然後用生麻油調前藥。以鷄毛掃。

藥痔上。每日敷藥三次。必去黃水如膠汁。則痔頭漸消。其年遠者。不出十日可取盡。日近者。

俱化為黃水。連根去淨。更搽生肌之藥。凡五痔皆可去之。此乃臨安曹五方。為高宗取痔得。

效後。封曹官至按察使。

秘傳正骨丹 二二二 治跌打損傷。骨節血瘀。而傷之重者。用此可續筋骨。

真降香 乳香 沒藥 蘇木 松節 自然銅 醋煨 七次 川烏 地 真血竭 各一兩 地龍 去土 酒生

龍骨 各一錢 土狗 十個 沒油 死烘乾 右十二味共重八兩八錢。同為末。每服五錢。隨病上下酒調服。

覺藥自頂門而至遍身。搜至病所。則風颯有聲。而筋骨漸愈。病人自知之。○服藥後仍服人。

參。白朮。黃耆。當歸。川芎。肉桂。甘草。白芷。厚朴。以調補元氣。 本事按骨方 二二三 治打折損傷。

接骨木 半兩 乳香 半兩 當歸 赤芍藥 川芎 自然銅 各一兩 右為末。用黃蠟四兩溶化。入前藥攪勻。衆手丸龍眼大。如打傷筋骨。及閃痛不堪忍者。用一九熱酒浸開。乘熱飲之。痛即止。

沒藥降聖丹 二三四 治跌打損傷。接續筋骨。

當歸 酒炒 白芍藥 川芎 生地黃 蘇木 川烏頭 炮去骨碎補 乳香 另研 沒藥 另研

自然銅 大瓶醋淬十次 右為末。生薑汁共蜜和丸。每一兩作四丸。每服一九。用米酒各半

盞煎至八分。空心熱服。○立齋曰。脾主肉。肝脾氣血虧損。或血虛有熱而不愈者。當求其本而治之。

十味沒藥丸 二三五 治打撲損傷。筋骨疼痛。或氣逆血暈。或瘀血內停。肚腹作痛。或胸脹悶

沒藥 乳香 川芎 川椒 當歸 芍藥 紅花 桃仁 血竭 各一兩 自然銅 四錢大瓶

右為末。同黃蠟四兩溶化。入前末攪勻。衆手丸。每服一九。酒化下。○立齋曰。按接骨散沒

藥丸。惟元氣無虧者宜用。若腎氣素怯。或高年虛弱者。必用地黃丸。或補中益氣湯。以固根

本為善。

花蕊石散 二五六 治打撲損傷。腹中瘀血脹痛欲死。服之血化為水。其功不能盡述。

硫黃 明者 花蕊石 一兩 右為末。和勻。先用紙筋和鹽泥固劑。瓦罐一個。候乾入藥。再用泥

封口。安在磚上。虛書八卦方位。用炭三十斤煨之。候罐冷取出。每服一錢。童便調下。○立齋曰。

前方若被傷已甚。元氣虧損。內有瘀血。不勝疎導者。用藥一服。其血內化。又不動臟腑。甚妙甚妙。

黑丸子 二三七

一名和血定痛散。治跌打損傷。筋骨疼痛。或瘀血癭腫。或外感風寒。肢體作

痛。或手足緩弱。行步不前。若洗注膝風。初結服之自消。若潰後氣虛發熱。與補藥煎服自斂。

百草霜 白芍藥 各一兩 川烏 南星 各三錢 赤小豆 半兩 白斂 六錢 白芨 骨碎補 當歸 各八錢

牛膝 六錢 右各另為末。酒糊丸。桐子大。每服三四十九。鹽湯溫酒任下。孕婦忌服。

封口藥 二三八

凡損傷皮肉破裂者。以此封之。

牡蠣 煅 赤石脂 生研 紅丹 上好者 等分 右為細末。香油調塗瘡口。○若欲消腫散血。合口。加血

竭乾 摻之。

當歸導滯散 二三九

治跌撲瘀血在內。胸脹腹滿。大便不通。或喘咳吐血。

大黃 當歸 等分

右為末。每服三錢。溫酒下。腸氣虛者。須加肉桂。

復元活血湯 二百四十

治跌打損傷。瘀血流於腦下作痛。或小腹作痛。或痞悶。及便毒初起。作腫痛。

柴胡 半錢 天花粉 川山甲 炒各一錢 當歸 酒拌 大黃 酒炒各一錢 紅花 甘草 各七分 桃仁 二十粒 去

右水一鍾。半加酒。半鍾煎八分。食前服之。以利為度。

金瘡方 二四一

凡金瘡出血不止。用牛胆。右灰。摻之即止。其方以腊月牛胆。入風化石灰。懸

當風候乾用。一方單用三七搗爛。敷之神效。又方。金瘡出血不止。以五倍子。生為末。乾貼之。

如不止。而血熱者。宜用犀角地黃湯之類。○大凡金瘡出血不止。若素本怯弱者。當補其氣。或

陰虛或有熱者。當補其血。若因怒者。當平肝。若煩熱作渴昏憤者。當補脾氣。若筋攣搐搦者。

當養肝血。不應用地黃丸。以滋腎水。

金瘡降真散 二四二

真降香 用節 松香

文蛤 三味等分為末。無論諸傷出血斷折。搽破處夾縛定。神效。

金瘡灰蛋散 二四三

治金瘡出血不止。及久年惡瘡。

石灰 細研 鷄蛋清 以和灰成餅為度

右將灰蛋餅于殿過。候冷研細。遇金瘡搽之。若多年惡瘡。以

薑汁調敷。一方。單以石灰搽傷處裏定。亦血止而愈。

龍骨散 二四四

治金瘡。

龍骨 赤石脂 五倍子

黃丹 海蝶蛸 各等分

右各研細。入麝香少許。共研勻。搽上如

乾。先以鹽水洗把乾。搽之。

桃花散 二四五

治金瘡。並一切惡瘡。

黃丹 軟石膏 等分

和勻。研如桃花色。搽傷處甚妙。

刀傷跌打經驗方 二四六

凡刀傷磕損。跌撲腫痛。或出血。用葱白細切。杵爛。炒熱。敷患處。葱冷

再易。神效。一方。以三七搗爛。卷之。神效。立齋曰。醫學綱目。稱前方有神效。余嘗以治前

證。青腫不散。死肉不潰。佐以健脾胃之藥。其功尤捷。此內外所以合一也。

損傷敷夾法 二四七

凡損傷骨折者。先須整骨。使骨正。隨用川烏。草烏。等分為末。以生薑汁

調貼之。夾定。然後服藥。無有不效。

暑跌閃腫痛 二四八 用生薑葱白同搗爛和麴炒熱卷之○如熱服而痛者用梔子加麴炒熱卷之
洗損傷方 二四九 凡傷重者用此淋洗然後敷藥

荆芥 去雷歸

生葱以斷一方
用生薑

右同煎湯溫洗或止用葱一味煎洗亦可

翦鐵竹木刺方 二百五十

百一方治竹刺在肉以蟾蜍虫研敷立效○演義方治竹木刺入

肉嚼牛膝根卷之即出○肘後方治翦鐵入骨以巴豆肉微炒同蟻螂研勻塗傷處俟蟻極
拔出之○孫真人治箭鐵針刺并蜈蚣塗患處自出

暑跌打夾棍傷 二五一

生薑 陳酒糟 各一

同搗爛炒熱卷傷處

治抄傷 二五二

凡抄傷手指者用皂礬二兩水四五碗砂鍋內熬滾將手薰洗良久即血活

疼止不致潰爛熱水忌銅鐵器其洗手水過夜即臭惡不可聞

杖瘡四方 二五三

用川大黃一兩加上好冰片二分另研俱為末和勻用水調如糊攤杖處

即時止痛一日後換膏為貼之○又方加甘草一兩○又方攤藥大黃白芷生半夏各七錢

右為末以鮮姜汁調敷乾即再敷以黑處血紅為度即換貼膏為神效 又方生半夏松

香各一兩

右研一處蜜水調成膏貼之勿令見風如乾再換一個即愈

諸骨諸物鯁 二五四

一治諸骨鯁用苧麻根杆爛丸彈子大將所鯁物煎湯化下○一治魚

骨鯁用細茶五倍子等分為末吹入咽喉立愈○一治稻芒糠穀鯁喉將鷲吊一足取涎徐

徐嘔之即消。○一治吞釘鉄金銀銅錢等物。但多食肥羊脂及諸般肥肉等味。必隨大便而下。○一治吞鐵或鍼。用錫湯半斤。濃煎艾汁調和服之。○一治吞髮繞喉不出者。取自己亂

髮燒灰。白湯調服一錢。

破傷風敷藥

二五五

治打撲損傷。傷風腫痛者。

南星 半夏

地龍等分

右為末。用生薑荷葉汁調搽患處。

蒜蒼酒

二五六

治破傷風外邪初入。或風入於臟者。神效。凡頭面身體。因破損傷風者。頃

刻發脹。遲則不救。速用蒜蒼草一二兩。酒水各半煎服。被蓋煖卧。少頃即可消散。能飲者純

用酒煎尤妙。

防風湯

二五七

治破傷風表證。未傳入裡。急服此。

防風 羌活

獨活

川芎等分

右每服五錢。水煎。調蜈蚣散服。方在後二六四。

白朮防風湯

二五八

治破傷風服表藥過多自汗者。

白朮 黃耆

各一兩

防風二兩

右每服七錢。水煎服。臟腑已和而自汗出者。可服此藥。若臟

腑秘小便赤而自汗者。急以後大芎黃湯下之。

羌活湯

二五九

治破傷風在半表半裡間。宜和解之。急服此湯。稍緩則邪入於裡。不可服矣。

羌活 麻黃

各一兩

防風二兩

細辛前胡

蔓荊子黃芩

石膏

白茯苓

枳殼甘草

各一兩

薄荷白芷

枳殼

甘草

各一兩

薄荷

白芷

各五

右每服五錢。姜水煎。日二三服。

美活防風湯 二百六十

治破傷風初傳在表脈浮緊。

美活 防風 藁本 當歸 芍藥 甘草

各四錢

地榆 細辛

各二錢

右吹咀每服五七錢

水一鍾半煎八分熱服量緊漫加減用之。○熱盛加黃連黃芩各二錢。○大便秘加大黃二錢。○自汗加防風白朮各五分。

大芎黃湯 二六一

治破傷風邪傳於裡舌強口喎項背反張筋惕搐搦瘖涎壅盛宜疎導者

急服之。

川芎 美活 黃芩 大黃

各一兩 右每服五七錢水煎服。

本玉真散 二六二

一名定風散。○亦名奪命丹。○治打撲金刃破傷風重者牙關緊急腰背

反張並蛇犬所傷。

天南星 湯泡七次如急防風等分

右為末每服二錢溫酒調服若牙關緊急腰背反張者

每服三錢用童便調服雖有瘀血亦愈至於昏死心腹尚溫者速進二服亦可保全若破傷

瘡口及瘰癧咬傷須用嗽口水或熱童便洗淨隨用生南星為末摻之以水調塗之出水為妙

養血當歸地黃湯 二六三

治破傷風氣血俱虛發熱頭痛服此以養氣血祛風邪不拘新舊並可治之

當歸 酒拌 熟地 各二錢

芍藥 川芎 藁本 防風 白芷 北細辛 各一錢 水二鍾煎一鍾食

遠服甚者加酒助之。

蜈蚣散 二六四

蜈蚣一對 鱉膠三錢

右為末用防風白朮煎湯調下

破傷風灸法 二六五

治跌打損傷或蟲獸傷破皮膚以致風邪入內才關緊急腰背反張或

遍體麻木甚者不知人事急用蒜搗爛塗傷處將艾鋪於蒜上灸之多灸為善仍用膏藥護

貼內服玉真散如毒蛇風犬咬傷先刺患處去毒血如前法治之

海愈風丹 二六六

治癩病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癩風癩疹皮膚瘙癢破成瘡

並皆治之

皂角一斤剉寸許無灰酒浸一宿以水一苦參一斤取烏梢蛇 白花蛇 土花蛇 各一條

乾酒浸取淨 右為末入前一味和丸桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓

之日三服間日浴之汗出為度

二聖散 二六七 疎風和血去癩毒

皂角刺燒存性 大黃半兩 右用大黃半兩煎湯調下皂刺末二錢早服樺皮散午以升麻

湯下瀉青丸晚服 二聖散

扁樺皮散 二六八 治肺癰風毒遍身癩疹癩瘡

樺皮 枳殼俱去燥存性 荆芥穗 一兩 突甘草半兩 杏仁二兩 去皮共用水一碗煮 右共

為末磁器收貯每服二錢食後溫酒調服

升麻湯 二六九 治諸風熱癩肌肉極熱身如蟲行或唇反綻裂

升麻三分 人參 茯神 防風 羌活 犀角鎊各一錢 羚羊角鎊各一錢 肉桂五分 水二鍾 姜三片

入竹瀝少許煎八分不拘時服。或下瀉青丸。

續命仙丹二百七十 治癘風遍身麻木

胡麻子炒 牛蒡子炒 枸杞子 蔓荊子炒各一兩 白蒺藜 苦參 天花粉 防風各半 右為

細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人輕重虛實以用之病重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忘一切鹽醋尖燥厚味止可食淡粥時菜及諸蛇肉以淡酒蒸熟食之亦可以助藥力

和子 浮萍散二七一 治癘癬疥癩

浮萍四錢 荊芥 川芎 麻黃去節 當歸 赤芍藥 甘草各二錢 水二鍾 葱二莖 豆豉一

撮煎服汗出為度

續換肌散 治癘風久不愈或眉毛脫落鼻塌爛其效如神

白花蛇 黑花蛇各三兩 地龍去土 當歸 川芎 赤芍藥 天門冬去心 甘草 何首烏

鐵沙參 胡麻子炒 天麻 紫參 苦參 白蒺藜炒 細辛 白芷 蔓荊子 威靈仙

荊芥穗 菊花 木賊草 不灰木 石菖蒲 定風草即草烏 草烏去皮 蒼朮 木龍各一兩

右各另為末和白每服四五錢食後溫酒調服加飲數杯尤妙

通天再造丸 二七二

治大風實熱內癰宜此攻之

鬱金丹

半兩

大黃 炮 皂刺 炒各一兩

白丑 半炒六錢

右為細末每服半兩日未出時面東以無灰酒調下晚利下黑頭小蟲病輕者則利臭穢之物○忘掌腥厚味半年犯則再作不可救此藥服三五次即愈

藥服三五次即愈

白花蛇丸 二七四

治癩風○丹陽荆上舍得癩疾一僧治而愈以數百金求方秘不肯傳館

容表生窺知藏納衣領中因醉之而竊錄焉用者多效

白花蛇

一條去頭尾

烏梢蛇 一條去頭

蟬蛻 去土

防風 去苗

金銀花 去葉

枸杞子

槐花

苦參

生地 各二兩

全蝎 去足味

黃芩

黃連

梔子

黃柏

烏藥

牛膝 川芎 牛

茅子

何首烏 不犯

連翹

天花粉

白蒸黎

威靈仙

荆芥穗

細辛

蔓荊子 金

毛狗脊

胡麻子 炒各一兩

漏蘆 半斤洗淨去

右為末

末糊丸

桐子大

每服五六十丸

茶清送

下空心午前臨卧各一服

白花蛇膏 二七五

治諸風癩疾適身生瘡

白花蛇

肉四兩

天麻 七錢

荆芥

薄荷葉 各三

右為細末

用好酒二升

蜜四兩

以銀磁器

蒸成膏

每溫服一酒杯

日三次

煎餅壓下

於暖處發汗效

防風天麻丸 二七六

治癩風癩病

此方應是仙傳

一年中常療數人

初服藥有嘔吐者不可

疑服而得愈其效如神

疑服而得愈其效如神

疑服而得愈其效如神

疑服而得愈其效如神

防風

去蘆天麻

升麻

白附子

地定風草

細辛

去苗川芎

人參

去蘆苦參 玄參

丹參

去蘆紫參

去蘆蔓荊子

威靈仙

川山甲

炒何首烏

另搗各二兩

蜈蚣

右為細末

同何首烏末拌勻。外用胡麻一斤。淘淨晒乾炒香熟。另研為細末。乃入前藥末二兩。又拌勻。

煉蜜和為丸。十九每服一丸。細嚼。溫漿水送下。不拘時候。日三服。宜食淡白粥。一百二十日。

大忌房勞。並將息慎口。

行藥方 二七七

治癩毒。

大黃

白牽牛

檳榔

各一兩

甘草

三兩

輕粉

五錢 右共為細末。每服二錢。用白蜜三匙。姜

汁二匙。五更時調服。病勢重者。七日行一次。稍輕者。半月一次。輕者。一月一次。或二十日一

次。以三五遍為度。

皂角散 二七八

治大風。

皂角刺

燒存性

大黃

輕粉

各五分

右為末。空心酒調服。取下惡物。○服藥數日。齒縫出血。其臭

雷丸散 二七九

取大風蟲。

雷丸

貫仲

二味

阿魏

各二錢

麝香

一分

水銀

硫黃

雄黃

各二錢

半兩

右為

細末。每服一錢。天明溫酒送下。

黑虎丹 二百八十

治大風諸癩惡瘡。毒虫內蝕。形骸變壞。

天靈蓋

三兩

人中白

桃仁

去皮

老皂刺

燒存性

穿山甲

炒

輕粉

二錢

麝香

五分 乾蝦

蜈二個去頭
足燒存性

殺勞瘵通用

右為末。煉蜜丸。桐子大。每服三十丸。月首五更未飲。連日服。取蟲盡。即愈。

苦參酒 二八一

治癩風瘡疥癬最多者

苦參五斤
切片

右以好酒三斗。浸三十日。量飲一合。日服不絕。覺瘡即瘥。

硫黃酒 二八二

殺癩風諸蟲

明硫黃研極細

右用酒浸。空心飲清汁。明日添硫黃再研。入酒如前飲之。

七珍湯 二八三

浴洗大風

青蒿 艾葉

忍冬藤

蒼耳子

桑條

槐條

柳條三條俱
搥碎用

右煎水一桶。入炒鹽半

斤。間日一洗浴。密室中以簾幕圍之。洗出汗為妙。不過十次愈。

烏頭湯 二八四

治大風瘡癩

草烏 麻黃根

艾葉

地骨皮

朴硝各一
兩

右為粗末。用水一桶。椒一合。葱三十根。同

煎湯。入醋一鍾。於密室中。自用手巾圍搭四肢。候湯可浴。令汗透。務使面上如珠。徐起。或坐

卧片時。汗乾。著衣避風。五日再浴。如此三五次。每浴後更服換肌丹等藥。

數癩方 二八五

雄黃 硫黃

白礬

旱烏

蛇床子燒存性
等分

右為末。用香油或濃蜜水調敷患處。

直指洗癩方 二八六

浴洗大風瘡

苦參 荆芥 防風 白芷 羌活 獨活 藥本各一兩 洛陽花四兩 大酒 右作三次煎水洗。令出汗

梅花白癩二八七

用香油二碗。入雞蛋黃三枚。熬將焦。去滓。熬油至一碗許。外用雄黃一錢。白礬三分。花椒五分。上共研細末。入油內再熬。熟收貯候用。○每用猪毛湯熱洗瘡垢。搽油三五次即愈。○愚按此方。於蛋焦去滓之後。入水銀五錢。微火漸熱之。然後再加硃砂細末二錢。並雄黃白礬等末。攪熟勻。熟收用。必效。

臘梨瘡二八八

用杏仁百枚。炒為炭。入葱白。蜂蜜。共搗爛。先用花椒煎湯洗淨。然後用此藥搽之。新舊瘡皆可用。但勿見風方好。

瘡瘡二方二八九

大楓子仁 木鱉仁 蛇床子各半兩 水銀三錢 研 右先以刀刮去瘡痂。花椒湯洗淨。外用

麻油熬成珠。調藥敷之。八日即愈。○又方用猪骨髓和輕粉搗爛。搽之。過夜即愈。

頭面黃水瘡二百九十

治小兒頭面患瘡。膿汁作瘡。痂厚者。名曰粘瘡。當用此方。或止用

礬丹二味亦可。○若作瘡出水。水到即潰者。名曰黃水瘡。當用後一方。

松香 枯礬 宮粉 飛丹 右等分為末。麻油調敷。或加香烟垢。於香炉蓋上刮取。用之

更效。○一方用桑豆松香等分為末。麻油調敷。極效。或內服荆防敗毒散等藥。○又方用益元散加枯礬。少年以麻油調傅。大妙。大妙。

諸癬疥頑瘡 二九一

油核桃 大風子 樟腦 水銀 右四色研勻搽之。此治有蟲者大效。○一凡無蟲而忽爾生瘡腫痛或濕爛者。但以柏油搽之即可愈。

白虎丹 二九二

發則頭面四肢眼目俱腫。而惟額上若共兩耳不腫。及不見赤色者。方是其

證。○先將馬桶洗淨。用沸湯傾入。蓋少頃。傾出盆內浴之。數次即退。○再用車前草。九里香。馬蹄香。枸杞苗。即雁翎菜。同搗爛。和麻油。遍身自上而下搽之。○大忌鷄魚生冷炙烤。日色火光。燈烟湯氣。極須謹慎。○又方。用生香附末。冷茶調服一二錢即愈。○又方。搗綠豆水去渣。飲一二碗妙。

紫白癜風歌 二九三

紫白癜風一般風

附子硫黃最有功

姜汁調勻粘帶搽

若經三度永無踪

又歌 紫癜白癜兩般風

水銀輕粉最有功

搗取生薑自然汁

只須一搽便無踪

又方治紫白癜斑汗等症

雄黃 硫黃 黃丹 蜜陀僧 南星 右為末。先用葱擦患處。次用姜煎藥末搽之。擦後

漸黑。次日再搽。黑散則愈矣。○又四神散 雄黃 雌黃 硫黃 明礬 各等分。先浴令

通身微汗。外以薑汁蘸擦之。再以熱湯淋洗。當色淡。五日除根。

汗斑四方 二九四

大黃二錢 枯礬 椒紅各五分 右用猪脂砂糖同搗爛。俟浴起以細麻布包擦。至痛而止。數

日即愈。或只用硫黃少入麻油。研如糊。浴用麻布蘸擦數次。即愈。○又玄覽院僧硫黃各

三錢。輕粉二錢。雄黃一錢。人言五分。右為末。姜汁調用。貼蒂蕪擦。三日內不沫。○又方。

雄黃。雌黃。各一錢。硫黃五分 麝香半分 浴後美顏。擦二三日勿洗。○又方。牛黃一兩。用醋

煮半日。海螵蛸三個。共為末。浴後以生薑蘸擦患處。須避風少時。數度即愈。

漆瘡方二九五 用香油調鐵銹塗之。○胃氣實者。內服黃連解毒湯。○胃氣弱者。以漆毒侵

犯。中氣致虛。多有作嘔不能飲食者。宜用六君加砂仁。藿香。酒炒芍藥之類。○又解漆毒法。

見因陣二三五 手足甲疽二九六 凡手足間。或因修甲傷肉。或因損足成瘡。潰爛上脚。用綠礬置鐵板上。煨

沸。色赤如溶金色者為真。沸定取研末。以鹽湯洗搽。

坐板瘡二九七 腫痛多膿者。 寶陀僧 生礬 大黃 等分為極細末。敷之。

膝瘡神效膏二九八 治膝瘡脚瘡。先看瘡形大小。用綿紙裁成四方塊。十二張。四角用小

樨釘住聽用。外以好香油二兩。用銅杓以文武火熬之。先下花椒四十九粒。煎黑。取起。次下

槐枝長一寸者。四十九節。煎黑。又取起。再次下黃占一兩。輕粉二分。枯礬一分。溶清。却入前

紙。浸油內令透。不可令焦。取起聽用。凡貼瘡時。先將槐枝葱椒煎湯洗瘡。令透。拭乾。乃以此

膏紙貼上。外面再以油單紙蓋護。乃用軟綿縛定。一日取下。揭去一層。復用湯藥洗淨。又貼之。盡十二張。無有不愈者。

隔紙膏 二九九

治腫瘡神效

黃耆末

五錢

輕粉

乳香

沒藥

各一錢

銀珠

一錢

血竭

五分

銅綠

二分

右為細末

真香油

調成膏

攤油紙上

再用油單紙一層

以鍼刺孔數十

掩膏藥上貼之

一日一易其膏

二味隔紙膏 三百

治腫瘡濕毒瘡

石膏 煨 枯礬 等分

右為末

用桐油調成膏

作隔紙膏貼之

更服荊防敗毒等散

如數劑不

愈再服黃耆人參湯

爛腿瘡久不愈方 三百一

用米糖即膠飴也

以碗盛於飯鍋內蒸化

先用花椒荊芥防風等

藥煎湯洗瘡淨

乃將膠飴薄攤瘡上

外以軟竹箬蓋定

用絹縛之

數日即愈神效

凍瘡方 三百二

憑青末

黃蠟

各一兩

麻油

一兩

右三味溶化

搽患處

湯火六方 三百三

凡被湯火所傷

速用冷灶柴草灰一二升

入鹽少許

以涼水調如稀糊

嘗

味微鹹為度

用以厚攤傷處

覺熱則易之

連易數次

則大毒皆拔於灰中

必腫痛隨散

結痂而

愈誠妙方也

○又方

治潰爛腫者

用生桐油調人中白敷之即愈

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

○又方

用皂礬

研細

和以冷水洗傷處

其疼立止

其腫即消

○又方

用大黃芒硝等分為末

鷄子青調貼之

神效。○又方。用石膏末香油調敷即愈。○又赤石脂散。治湯火傷肉爛赤痛。用赤石脂寒水石大黃等分。右為末。新汲水調塗。

湯火至聖膏 三百四

治湯火傷瘡。用雞子黃置銀石器內熬油。調胡粉傅之。○錦衣楊永興厨下

夜間回祿。凡睡此房已死將死者。灌以生蘿蔔汁。良久悉愈。凡遇此患者。以此治之。其應如響。

湯火止痛散 三百五

止痛生肌。

大黃末 微炒

當歸末 等分

右用麻油調搽。或乾糝亦可。

小兒丹毒 三百六

此毒多生頭面四肢。色赤或腫。遊走不定。甚者宜用前磁鋒砭法。使毒血

遇刺皆出。更以神功散傅之。內服荆防敗毒散。或五福化毒丹。若使毒氣入腹。則不治。或愈

而後發。皆因母食辛辣。以致內熱。宜於母藥中加漏蘆煎服。或令自服亦愈。

小兒驚口 三百七

凡小兒口內白屑滿口者。為驚口瘡。則不能飲乳。用髮或軟絹纏指。蘸井

水拭舌上使淨。如屑不能脫。膿煮粟木湯。以綿纏筋頭拭乾。即用飛過黃丹搽之。

加味太乙膏 三百八

一切瘡瘍。並宜貼之。先用隔蒜灸。更服活命飲。以收全功。

當歸

生地黃

芍藥

玄參

大黃 各二兩

加甘草 四兩

用麻油二斤煎再收。

景岳會通膏 三百九

凡諸癰毒瘡塊風氣骨節疼痛。無所不治。

大黃

木鼈仁

當歸

川芎

芍藥

生地

麻黃

細辛

白芷

防風

荆芥

蒼

朮

羌活

川烏

甘草

烏藥

南星

半夏

香附

官桂

蒼耳

骨碎補

草烏

艾葉 皂角 枳殼 三稜 蓬木 蘿菔子 水紅花子 巴豆 五倍子 獨活 桃
仁 蘇木 紅花 續斷 連翹子 苦參 槐花 皂刺 乾姜 單麻子 透骨草
穿山甲 全蝎 殭蠶 蜂房各一蛇退條一大蜈蚣十四根 蝦蟇三隻 血餘一團 獨蒜四頭
右五十四味。用麻油五斤浸三日。先煎血餘。單麻木龍。桃仁。巴豆。蝦蟇。獨蒜。待半枯。然後入
餘藥煎黑。去滓。丹收。後下細藥十味。阿魏二兩 乳香製沒藥 各一兩。木香。丁香。雄黃。硃
砂。血竭。兒茶。各五錢。麝香。不拘一二錢。右麝香。丁香。木香。三味。宜最後下之。以上收油法。
凡熬成熟油一斤。下飛淨好紅丹八兩。若欲微燥。則止下七兩五錢。
神異膏三百十 治癰疽瘡毒及收口甚效。此瘡瘍中第一方也。

麻油二斤 黃丹十二兩 黃耆 杏仁 玄參各一兩 蛇脫半兩 男髮如鷄子 蜂房一兩 右先
以黃耆。杏仁。玄參。入油煎至將黑。乃入蛇脫。蜂房。亂髮。再煎至黑。去滓。徐徐下丹。漫火煎收。
黃丹不必拘數。但以得中為度。凡膏藥用久必至老硬。煎時預留嫩膏少許。如硬量和之。
清涼膏三一 治一切瘡瘍潰後宜用之。

當歸二兩 白芷 白芨 木鱉子 黃柏 白薇 乳香 白膠香各五兩 黃丹五兩 麻油二十
右用油煎前六味。以槐柳枝順攪。油熟。丹收。然後下乳香等二味。

阿魏膏三一二 治一切瘡塊。更服胡連丸。

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 川山甲 生地黃 兩頭尖 大黃 白芷 天

麻 紅花各半

木鼈十枚

去殼亂髮一團

槐柳桃枝各半

右用麻油二斤四兩煎藥黑去滓入

煎髮再變化仍去滓入上好真正黃丹煎收軟硬得中入後細藥即成膏矣阿魏芒硝

蘇合乳香

沒藥各五錢

麝香三錢

右凡貼膏藥須用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用

熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨之

珠砂膏 三一三

治一切頑瘡破瘡杖瘡癰疽發背破傷者最妙最佳

麻油一斤飛母六兩

水銀一兩

珠砂准者一兩

好黃蠟四兩

先下油熬數沸下鷄子二枚敲

開連壳投之熬焦撈去子退火俟油定下水銀五錢再加微火攪熬飯頃即入丹漸收成膏

後下黃占再攪候大温下極細好珠砂一兩五錢攪勻磁罐收貯

神效當歸膏 三一四

治一切發背瘡瘍湯火疼痛等症去腐肉生新肉其效如神凡洗拭換

膏必須預備即貼之新肉畏風故也如用白蠟尤好此為生肌止痛補血續筋故與新肉相

當歸 生地黃

黃蠟各二兩

白麻油六兩

右先將當歸地黃各一兩入油煎黑去滓又

將二味各入一兩煎至微焦復去滓乃入蠟溶化候冷攪勻即成膏矣用塗患處以紙蓋之

如有死肉須用利刀剪去則生肌尤速

攻堅敗毒膏 三一五

亦名乾坤一炷散○專治瘡塊諸瘡毒痔漏

當歸 熟地 生地

白芍藥

赤芍藥

南星

半夏

三稜

蓬朮

木鼈

兩頭尖

川山甲

巴豆仁

肉桂

五靈脂

桃仁

續斷

玄參

玄胡索

草麻子仁

白芷

羌活 獨活 大黃 紅花 川芎 草烏 蘇木 川烏 防風 杏仁各一兩 右用麻油四十兩。浸諸藥三日。桑柴火煎成丹。收後下細藥。乳香製沒藥各一兩 真阿魏一兩 麝香三錢 右方於細藥中。加蘆薈 木香 各一兩。蟾酥 三錢。即名消痞大成膏。

消痞膏三十六

三稜 蓬朮

川山甲 木鼈仁 杏仁 水紅花子 蘿蔔子 透骨草

晒乾 大黃各一兩 獨蒜頭 四個 右用香油一斤。入前藥十味。煎油成。以飛丹收之。後下細藥。

真阿魏 乳香 沒藥各一兩 麝香 三錢 右先下乳。沒阿魏。三味。後下麝香。攪勻。冷傾水中。

浸數日。用磁瓶收貯。勿使泄氣。用時以白布或堅白紙攤貼。八九日一換。或見大便去膿血。勿以為異。亦有不去膿血而自愈者。若治瀉痢。可貼臍腹。忌房事生冷。○凡貼癰積痞塊。先用蕎麥麵和作一團。圍住患處四邊。其塊上放皮硝二三兩。蓋厚紙。以熨斗熨令熱氣內達。然後去硝膏藥貼之。○右原方用白花菜。同透骨草另煎膏二兩。攪入膏內收用。但白花菜惟西北方間有之。求覓不易。故余用獨蒜蘿蔔子代之。其功亦不減也。

琥珀膏三一七

治頸項瘰癧。及腋下初結小核。漸如連珠。不消不潰。或潰而膿水不絕。經久不瘳。或成漏證。

琥珀 白芷 防風 當歸 木鼈子 木通各一兩 丁香 桂心 硃砂 木香 松香各半兩 麻油 二斤 右先將琥珀等六味為末。其餘藥入油煎黑。濾去滓。徐入黃丹再煎。軟硬得中。入前藥成膏貼之。

得中。入前藥成膏貼之。

上海廣益書局印行

貼瘡琥珀膏 三一八 貼癰癩瘡塊

大黃朴硝各一兩為末以大蒜同搗膏貼之

水紅花膏 三一九 貼瘡塊

用水紅花或子每一碗以水三碗用桑柴文武火熬成膏量瘡大小用紙攤貼以無方為度仍將膏用酒調服忌葷腥油膩不飲酒者白湯下

火龍膏 三百二十 治風寒濕毒所襲筋骨攣痛及濕痰流注經絡墜痛不能行步並治歷節

風鶴膝風其效如神

生薑 八兩 取汁乳香

沒藥 各為半兩 真牛皮廣膠 二兩 右先將姜汁並膠溶化方下沒藥乳香調勻待少溫下麝香印成膏矣攤貼患處更服五積散如鶴膝風須服大防風湯

趙府膏 三二一 專貼疼痛腫毒

乾蝦蟆 三全蠍 殭蠶 各一 蜈蚣 細 斑蝥 四 商陸根 一兩 花椒 一兩 童子髮 六錢 雞內金 二個

槐枝 三寸長者 細藥 兒茶 乳香 沒藥 血竭 龍骨 黃占 白占 各五 麝香 一錢

右用麻油二斤煎飛丹收

蜜陀膏 三二二 此膏治腫濕諸瘡癰痛等症神效凡治疼痛先以葱薑擦患處然後貼之

先用蜜陀僧一二斤打碎將童便煮之覺其濁性去而童便氣清乃可止矣用便煮過則貼瘡不痛時乾研極細如麵候用用桐油不拘幾斤熬至將黑為度每熬油一斤用陀僧六兩

收之於將成膏之頃。取起離火。候稍涼。量膏多少。入冷水數碗。徐攪之。恐其泛出。俟少定。即
逼去其水。再上火熬化。復入水數碗。攪過如前。或三次更妙。然後熬淨其水。每油一斤。再入
宮粉二兩。熬收。其色方黑。凡熬此者。銅錫須大方可用。

八仙紅玉膏 三二二

治諸瘡

龍骨 赤石脂

兒茶

血竭

沒藥

乳香

各一錢

輕粉

五分

或

冰片

分三

右用麻油二兩。入當

歸五錢。煎枯去滓。入龍石茶場四味。再煎一二沸。次入乳沒。畧煎勻。後入黃占五錢。溶化。冷

定。入輕冰攤貼。

碧油膏 三二四

止痛排膿。多後宜用之。

桃枝 柳枝

桑枝

槐枝

各二

乳香

另

血竭

各半

黃丹

四兩

右用麻油十兩。煎膏成後

下乳香。血竭。

長肉膏 三二五

人參

黃耆

當歸

夜合樹皮

玄參

各一

血餘

三兩

老鼠

一個

細藥

血竭

龍骨

赤石

白蠟

各五

右用麻油一斤。煎

飛丹收。

保養元氣膏 三二六

此膏助元陽。補精髓。通血脈。鎮玉池。養龜存精。百戰百勝。待婦人經盡

之時。去膏而泄。則可成孕。並治膝腰疼痛。五癆七傷。諸虛百損。半身不遂。膀胱疝氣。帶濁浮

淋。陰痿不舉。無不效者。此即真人進御方也。

麻油一斤四兩八甘華二兩先

生地黄 熟地黄俱酒洗

麥門冬

肉蓯蓉酒洗

遠志肉 蛇

床子酒浸

牛膝酒洗

鹿茸

川續斷

虎骨

紫梢花

木鼈仁

谷精草

大附子 兔

絲子酒浸

肉桂各五錢

右熬成以煮過松香四兩飛丹半斤收之次下龍骨 倭硫黃 赤

石脂各二錢

又次下乳香 沉香

丁香

木香各一錢

又次下

陽起石

三錢麝香

五分蟾酥

鴉片各一錢

又次下黃占

五兩

右煎成入井中浸三四日每用膏七八錢紅絹攤貼臍上或

腰眼間每貼五六十日再換

煮松香法

三二七 凡用松香收膏者必用水多煮一二遍去其濕燥之性方可貼瘡不痛

若用貼癥瘕血塊則當加藥如後法煮過用之方妙

大都松香

三斤

皮硝一兩

水紅花

四兩

大黃

當歸

生地各二兩

三稜 蓬朮各一兩 右藥

七味用水一桶先熬汁去滓淨用煮松香徐徐添入以汁完為度收用之極佳一收油之法凡煮過松香一斤入熬熟藥油五兩即成膏矣

以下通用方

四君子湯

三二八 方在補陣一 治瘡瘍脾胃虛弱或因剋伐腫痛不散潰飲不能宜用此

以補脾胃諸證自愈若誤用攻毒則七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或欲作嘔或大腸不實

若脾胃氣虛瘡口出血吐血便血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之證宜於此湯

但加當歸脾胃既旺飲食自進陰血自生若用沉陰之劑脾胃復傷諸證蜂起

六君子湯 三二九 方在補陣二。治脾胃虛弱。或寒涼尅伐。腫痛不消。或不清飲。宜服此方。

以壯營氣。則諸證自愈。

加味四君子湯 三三〇 方在補陣二。治痔漏下血。面色痿黃。凡諸氣虛脾虛不能攝血等症。

四物湯 三三一 方在補證八。治瘡瘍血虛發熱。或因失血。或因尅伐。或因瀆後。致晡熱內熱。

煩燥不安。皆宜用之。蓋血生於脾。脾虛不能生血者。宜用四君子。加當歸酒炒。白朮以補脾。

八珍湯 三三二 方在補陣十九。治瘡瘍脾胃損傷。惡寒發熱。煩燥作渴。或瘡瘍潰後。氣血

虧損。膿水清稀。久不能愈。

十全大補湯 三三三 方在補陣二十。治瘡瘍氣血虛弱。腫痛不愈。或潰瘍膿清。寒熱自汗。

盜汗。食少體倦。發熱作渴。頭暈眩暈。似中風狀者。

補中益氣湯 三三四 方在補陣三一。治瘡瘍元氣虧損。惡寒發熱。或因尅伐。肢體倦怠。飲食少

思。不能起發。消散生肌收斂。或兼飲食勞倦。頭痛身熱。煩燥作渴。脈洪大弦虛。或微細軟弱。

歸脾湯 三三五 方在補症三十三。治瘡瘍夢思傷脾。血虛發熱。食少體倦。或脾不攝血。以

致妄行吐下。或健忘怔忡。驚悸少寐。或心脾作痛。自汗盜汗。或肢體腫痛。大便不調。或婦人

經候不調。晡熱內熱。或唇蒼流注。及不能消散潰斂等症。

獨參湯 三三六 方在補陣三十六。治瘡瘍一切失血。或膿水出多。氣血俱虛。惡寒發熱。作渴

煩燥。蓋血生於氣。故血脫者宜補氣。陽生陰長之理也。用人參一兩。棗十枚。姜十片。水煎徐服。

人參養營湯 三三七 方在補陣二十一。治瘡瘍脾胃虧損發熱惡寒。與氣俱虛。四體倦怠。

肌肉消瘦。面色痿黃。呼吸短氣。食少作渴。凡大病後最宜用此。

五味異功散 三三八

方在補陣四。

治脾胃虛弱。飲食少思。即四君子湯加陳皮。

生脈散 三三九

方在補陣五七。

治瘡瘍胃氣虧損。陰火上衝。口乾喘促。或肢體倦怠。肌

肉消瘦。面色痿黃。呼吸短氣。汗出不止。食少作渴。或膿水出多。氣血俱虛。煩燥不安。睡卧不

寧。或濕熱大行。火土合病。脾胃虛弱。身重氣短。或金為火制。絕寒水生化之源。肢體痿軟。脚

軟眼黑等症。

當歸補血湯 三百四十

方在補陣四五。

治瘡瘍脾胃虛損。或服峻劑。致血氣俱虛。肌熱大

渴。引飲。目赤。面紅。晝夜不息。其脉洪大。而虛重按全無。此病多得於飢飽勞役者。若誤服白

虎湯必死。

黃耆六一湯 三四一

方在補陣五十。

治瘡瘍陰陽俱虛。盜汗不止。

參朮膏 三四二

方在補陣四十。

治瘡瘍中氣虛弱。諸藥不應。或因用藥失宜。耗傷元氣。虛

症蜂起。但用此藥。補其中氣。諸證自愈。

東垣聖愈湯 三四三

方在補陣九一。

治脾胃虧損。膿水不止。或金瘡出血。心煩不安。眠睡

不甯。五心煩熱。飲食少思。

錢氏七味白朮湯 三四四

方在小兒七。

治瘡瘍胃氣虛弱。或因尅伐。或因吐瀉。口乾作渴。飲食少思。

陳氏五味子湯三四五 方在補陣五九 治瘡瘍腎水枯涸口燥咽乾喘促虛煩作渴

參附湯三四六 方在補陣三八 治瘡瘍失血過多或膿瘡大泄或寒涼汗下真陽脫陷上

氣喘急自汗盜汗氣短頭暈等症急服此湯以救元氣緩則不治

人參理中湯三四七 方在熱陣一 治瘡瘍脾胃虛寒嘔吐泄瀉飲食少思肚腹作脹或痛

或胸膈虛痞飲食不入

六味丸三四八 方在補陣百二一 此壯水之劑夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而致

此方乃天一生水之劑無有不可用者若腎虛發熱作渴小便淋瀝痰氣壅盛咳嗽吐血頭

目眩暈小便短少眼花耳聾咽燥燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足

等症尤多用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡此水泛為瘡之聖藥

血虛發熱之神劑也

八味丸三四九 方在補陣百二二 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒而患流注鶴膝

等症不能消潰收斂或飲食而不化臍腹疼痛夜多漩溺

陳氏加減八味丸三五十 方在補陣百二三 治腎水不足虛火上炎發熱作渴咽燥疼

痛口舌生瘡寢汗憔悴等症

還少丹三五十一 方在補陣一三七 治足三陰經虛損致患鶴膝風等症又補脾腎進飲食

之良劑也

大防風湯 三五二

方在補陣九

治足三陰虧損外邪乘虛內患鶴膝風或附骨疽腫痛

或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更全用調補之劑

十宣散 三五三

方在痘疹十四

治瘡瘍脈緩瀉體倦惡寒或脈浮緊細用之以散風助陽也

蘇四神丸 三五四

方在熱陣一五二

治瘡瘍脾胃虛弱大便不實飲食少思或小腹作痛

或腫後泄瀉肚腹作痛不思飲食

五積散 三五五

方在散陣三九

治風寒濕毒客於經絡致經蹇骨痛或腰脚酸疼或拘急

或身重並皆治之

二陳湯 三五六

方在和陣一

治癆癰中脘停痰嘔吐惡心或頭目不清飲食少思等症

小柴胡湯 三五七

方在散陣十九

治肝胆經風熱瘰癧結核或腫痛色赤或寒熱往來或

日晡發熱或潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽皆用此藥

小青龍湯 三五八

方在散陣八

治肝肺受寒咳嗽喘急宜服此發散表邪

人參敗毒散 三五九

方在散陣三六

治瘡瘍外有表邪焮痛寒熱或拘急頭痛脈緊有力

不換金正氣散 三百六十

方在和陣二二

治瘡瘍脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發熱服

此以正脾氣則痰氣自消寒熱不作

加味逍遙散 三六一

方在補陣九四

治瘡瘍肝脾血虛內熱發熱或遍身瘙癢寒熱或肢

體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發熱盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或

或胸乳腹脹小便欠利

防風通聖散

三六二

方在攻陣十六

治時毒熱毒便秘熱燥和實等症若非大滿大實有

不可輕用此藥

消風散

三六三

方在散陣四七四九

治風熱癩疹癢癢及婦人血風癢癢或頭皮腫癢或

諸風上攻頭目昏眩項背拘急鼻出清水噴嚏聲重耳作蟬鳴

犀角散

三六四

方在瘧疹六三

治時毒癰癤熱感煩躁多渴赤斑等症

黃連解毒湯

三六五

方在寒陣一

治癰瘡癩痛煩燥飲冷脈洪數或發狂言

普濟消毒飲

三六六

方在寒陣十三

治天行時毒頭面腫痛或咽喉不利若饑饉之後患

此者最宜用之仍當兼固胃氣

梔子清肝散

三六七

方在寒陣六十

治三焦足少陽風熱耳內作癢生瘡或出水疼痛或

胸乳間作痛或寒熱往來

柴胡清肝散

三六八

方在寒陣五九

治鬚疽及肝胆經三焦風熱怒火之症或胸項作痛

或瘡毒發熱

加味龍胆瀉肝湯

三六九

方在寒陣六四

治肝經濕熱或囊癰使毒下疳懸癰癩腫作痛

或膿爛不愈或辜丸懸掛小便澀滯或婦人陰瘡癢痛或男子陰挺痔漏腫痛或出膿水

清心蓮子飲

三百七十

方在寒陣三二

治膀胱陰虛濕熱玉莖腫痛或莖囊澀滯口苦咽

乾小便色赤或白濁夜安靜而晝發熱

黃芩清肺飲 三七一 方在寒陣三八 治瘡瘍肺經陰虛火燥而小便不通

東垣清胃散 三七二 方在寒陣五四 治膏梁積熱唇口腫痛齒齦潰爛喉痛上連頭面或惡

寒發熱

竹葉石膏湯 三七三 方在寒陣五 治癰疽胃火盛腫痛作渴

竹葉黃耆湯 三七四 方在寒陣七 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴

滋腎丸 三七五 方在寒陣一六三 治瘡瘍腎經陰虛發熱作渴便赤足熱腿軟等症凡不

渴而小便秘熱在下焦血分也最宜此藥經云無陰則陽無以化若脾燥肺熱所移此當清

其化源

瀉青丸 三七六 方在寒陣一五一 治肝經實熱瘰癧腫痛寒熱或脇乳作痛大便秘結

大蘆薈丸 三七七 方在小兒百十五 治肝火下疳潰爛或喉腫作痛或治小兒疳積食積

口鼻生瘡牙齦蝕爛等瘡並蝕肛門癢痛

五苓散 三七八 方在和陣一八二 治瘡毒下部濕熱小便短少

五淋散 三七九 方在寒陣百十七 治膀胱有熱水道不通或尿如豆汁或如沙石或如膏

油或熱沸便血

八正散 三百八十 方在寒陣十五 治下疳便毒小便淋瀝脈證俱實者

清肺飲 三八一 方在和陣三五 治瘡瘍渴而小便不利乃肺經有熱是絕寒水生化之

源宜用此藥以清化源其水自生而便自利

益元散 三八二 方在寒陣百十二 治瘡瘍小水不利內生煩熱作渴

四順清涼飲 三八三 方在攻陣二五 治瘡瘍煩躁飲冷熾痛脉實大便秘結小便赤澀

玉燭散 三八四 方在攻陣二四 治便難初起腫痛發熱大小便秘宜用此散行之若邪實

毒甚者宜桃仁承氣湯

人參平肺散 三八五 方在寒陣三七 治火剋肺金傳為疽癰咳嗽喘嘔痰涎雍盛胸膈痞

滿咽嗑不利

葶藶大棗瀉肝湯 三八六 方在和陣百四十 治肺證胸膈脹痛上氣喘急或身面浮腫鼻

寒聲重

枳殼散 三八七 方在寒陣百一 治煩熱便血

失笑散 三八八 方在婦人百四 治跌撲產後心腹絞痛或不知人事或經行瘀血作痛成

癰

槐角丸 三八九 方在寒陣一七五 治痔漏腫痛便血脫肛

紫金錠 三百九十 方在因陣一百二 治癰疽諸毒

良通關散 三九一 方在因陣九八 搐鼻開牙關



中國藥物新字典

△醫家必備之新本草

△途徑別開之新字源

△欲知藥物性質者...不可不看

△欲知藥物功用者...不可不看

△欲知藥物名稱者...不可不看

△欲知藥物種類者...不可不看

是編為吳縣江忍庵先生所輯。采錄古今名人本草匯合而成。依據字典按部列入。分為十二集。合訂一巨冊。計有四百四十八頁。其中所載藥物。約得六千數百餘種。搜羅宏富。鉅細靡遺。足與綱目相頡頏。且且每一字下。詳以音註。而於性質功用二者。倍加注重。不獨使醫家用備參攷。毋煩檢査之勞。即粗知文字者。亦不難翻閱而得。藉資研究。誠不愧為空前絕後之善本也。

△精裝一厚冊...定價洋二元

版權所有
翻印必究

●定價大洋四元五角●

(全書念四冊●布匣兩函)

加批景岳全書

原著者 會稽張介賓

批評者 長洲葉天士

校訂者 古吳江家楨

出版者 廣益書局

印刷者 廣益書局

總發行所 廣益書局

北平德勝門外南各中山馬路

廣州永漢北路長沙高陽街 廣益書局

漢口統一街開封書局街

分發行所