本草備要

乾

7
Z
511

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号 特7-511

ガラス使用

特7-511

本草備要凡例

註本草者當先註病症不然病之未明藥於何有從前作者罕明斯義第云某藥入某經治某病而已淺術視之蓋茫如也唯李氏綱目泉集諸家附著論說間及病源經疏因之釋藥而兼釋病補前人之未備作後學之指南茲集祖述二書更加增訂藥性病情互相闡發以便資用若每處皆釋則重複煩瑣反生厭瀆故前後問見或因藥論辨讀者彙觀而統會之可也

一藥品主治諸家析言者多如治痰之藥有治燥痰

丹波元簡手澤 安道榮藏書之記

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511

ガラス使用

者有治濕痰者諸書第以除痰藥之頭痛之藥有治內傷頭痛者有治外感頭痛者諸書惟言治頭痛而已此皆相反之症未可混施舉此二端其餘可以類推矣又每藥之下止言某病宜用而不言某病忌用均屬闕畧茲集並加詳註庶無貽悞

一每藥先辨其氣味形色次著其所入經絡乃爲發明其功用而以主治之症具列于後其所以主治之理即在前功用之中不能逐款細註讀者詳之

一徐之才曰藥有宣（上升下行曰宣）通（補瀉濟滑燥濕潤也）輕重十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣今爲分開以冠于諸藥之首（此十劑也陶弘景加寒熱二劑茲不具述然本集燥劑即陶氏之熱劑而通劑乃徐氏之燥劑也）

一藥品主治已註明某藏某府者則不更言入某經絡以重複無用也

一陰陽升降浮沉已詳于藥性總義中故每品之下不加重註

一主治要義及諸家名論用○病症用△藥名湯頭用┐頂上十劑用

一藥目次第每藥稍從其類以便查閱

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

一是書篇章雖約多有補綱目經疏之所未備者故曰備忘之一採用諸書悉仍其名氏使知爲先哲名言有可考據也間有刪節數行數句者以限于尺幅也有增改數句數字者務暢其文義也亦有用其文而未著其姓字者其間廣搜博採義圖貫通取要刪繁詞歸雅餙庶幾爽觀者之心目云爾

一藥有氣味形色經絡主治功用禁忌數端藥性歌賦雖便記誦然限于字句又須用韻是以不能詳括茲集文無一定藥小者語簡藥大者詞繁然皆各爲抒軸煆鍊成章使人可以誦讀若以本文另謄尤便誦習

一本草一書讀之率欲睡欲卧以每品之下所註者不過藏府經絡甘酸苦滷寒熱温平升降浮沉病候主治而已未嘗闡發其理使讀之者有義味可咀嚼也即如證類諸本採集頗廣又以衆說繁蕪觀者罔所折衷也是編主治之理務令詳明取用之宜期于確切言暢意晰字少義多作者頗費匠心讀者幸毋忽視

一是書將成始見汎林皇甫嵩所著本草發明乃萬曆戊寅年刻其書加倍于余其用意頗與余同始嘆前人亦有先得我心者其印板業已糢糊亦當時膾炙之書也世未有翻

者特表明之

一是書之作非爲醫林而設蓋以疾疢人所時有脫或處僻小之區遇庸劣之手脉候欠審用藥乖方而無簡便方書與之較證鮮有不受其悞者是以特著此編兼輯醫方集解一書相輔而行篇章雖約詞旨詳明攜帶不難簡閱甚便倘能人置一本附之篋笥以備緩急亦衛生之一助有識之士當不以愚言爲狂謬也

一昂自壯立之年便棄制舉蹉跎世變念著書作詩無當人意祇堪覆瓿難以垂遠然禽鹿視息無所表見竊用疢心故疲精瘁神著輯本草一書以爲有當于民生日用之實且集諸家大成貫穿箋釋或可有功前賢嘉惠來世易世之後倘有嗜吾書而爲重梓者庶能傳之久遠此區區立言之旨也

一素問類纂約註醫方集解二書嗣刻問世

訒菴汪昂漫識

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号 特7-511

ガラス使用

藥性總義

凡藥酸屬木入肝苦屬火入心甘屬土入脾辛屬金入肺鹹屬水入腎此五味之義也

凡藥青屬木入肝赤屬火入心黃屬土入脾白屬金入肺黑屬水入腎此五色之義也

凡藥酸者能斂苦者能瀉能燥能堅甘者能補能和能緩辛者能散能潤能橫行鹹者能下能耎堅淡者能利竅能滲泄此五味之用也

奧音軟 滲音慘 去聲

凡藥寒熱温涼氣也酸苦甘辛鹹味也氣爲陽味爲陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之陰味厚者陰中之陰薄者陰中之陽薄則發泄（表散）厚則發熱（温燥）味厚則泄（降瀉）薄則通利（竅滲濕）辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽輕清升浮爲陽重濁沉降爲陰陽氣出上竅陰味出下竅清陽發腠理濁陰走五藏清陽實四肢濁陰歸六腑此陰陽之義也

凡藥輕虛者浮而升重實者沉而降味薄者升而生（象春）氣薄者降而收（象秋）氣厚者浮而長（象夏）味厚者沉而藏（象冬）味平者化而成（象土）氣厚味薄者浮而升味厚氣薄者沉而降氣味俱厚者能浮能沉氣味俱薄者可升可降酸鹹無升辛甘無降寒無浮熱無沉此升降浮沉之義也（李時珍曰升者引之以鹹寒則沉而止者引之以酒則浮而上至巔頂一物之中有根升稍降生升降在物亦在人也）熟降者是

凡藥根之在土中者半身以上則上升半身以下則下降（雖一藥而根稍各別州之藥之爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲必爲幹或差服亦相効）

者內行藏府質之輕者上入心肺重者下入肝腎中空者發表內實者攻裏枯燥者入氣分潤澤者入血分此止下內外各以其類相從也

凡藥色青味酸氣臊性屬木者皆入足厥陰肝足少陽膽經肝與

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

膽相表裡膽爲甲木肝爲乙木色赤味苦氣焦性屬火者皆入手少陰心手太陽小腸經心與小腸相表裡小腸爲丙火心爲丁火色黃味甘氣香性屬土者皆入足太陰脾足陽明胃經脾與胃相表裡胃爲戊土脾爲己土色白味辛氣腥性屬金者皆入手太陰肺手陽明大腸經肺與大腸相表裡大腸爲庚金肺爲辛金色黑味鹹氣腐性屬水者皆入足少陰腎足太陽膀胱經腎與膀胱相表裡膀胱爲壬水腎爲癸水一藏配一腑膀胱爲壬水腎爲癸水一藏配一腑膀胱爲甲丙戊庚壬藏皆屬陽故爲乙丁己辛癸也十二經中惟手厥陰心包手少陽三焦經無所主其經通于足厥陰少陽厥陰主血諸藥入肝經血分者併入心包少陽主氣諸藥入膽經氣分者併入三焦命門相火散行于胆三焦心包絡故入命門

者併入三焦此諸藥入諸經之部分也

藥有相須者同類而不可離也如黃柏知母破故紙胡桃之類

使也相惡者奪我之能也相畏者受彼之制也相反者兩不可合也相殺者制彼之毒也此異同之義也

所苦急血燥故急急食甘以緩之肝欲散木喜條達急食辛以散之以辛補之以酸瀉之以散爲補以斂爲瀉心苦緩緩則散逸急食酸以收之心欲耎急食鹹以耎之以鹹補之按水能剋火然心以下交于腎爲補取既濟之義也以甘瀉之脾苦濕急食苦以燥之脾欲緩緩和舒急食甘以緩之以甘補之以苦瀉之肺苦氣上逆火旺克金急食苦以瀉之肺欲收急食酸以收

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

之以酸補之以辛泄之腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅
之急食苦以堅之以苦補之以酸瀉之此五藏補瀉之義也
風淫于內治以辛凉佐以苦甘以甘緩之以辛散之風屬木辛屬金金能勝木故治以辛凉過辛恐傷眞氣故佐以苦甘苦勝辛甘益氣也木性急故以甘緩之木喜條達故以辛散之熱淫于內治以酸寒佐以苦甘以酸收之以苦發之水勝火故治以酸寒苦甘勝酸佐之所以防其過也必甘苦者防酸之過而又以瀉熱氣也熱淫于內治以苦發之作實也熱淫故以酸收之熱結故以苦熬佐以酸淡以苦燥之以淡泄之濕淫于內治以苦熱佐以酸淡濕爲土氣苦熱皆能燥濕淡能利竅滲濕用酸者木能制土也故治以酸冷辛能滋潤酸能斂液苦能泄熱或徐其性而升發之也燥淫于內治以苦溫佐以辛潤之以苦堅之燥屬金苦屬火火能勝金故治以苦溫佐以辛也苦能緩辛能潤苦能下故以爲佐也寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以酸瀉之以辛潤之以苦堅之土能制水熱能勝寒故治以甘熱苦而辛亦熱品也傷寒內熱者以酸瀉之內燥者以辛潤之苦能泄熱而堅腎瀉中有補也此六淫主治各有所宜依藥性宜明而施用貴審也

人之五藏應五行金木水火土子母相生經曰虛則補其母實則瀉其子又曰子能令母實如腎爲肝母心爲肝子故入肝者併入腎與心肝爲心母脾爲心子故入心者併入肝與脾心爲脾母肺爲脾子故入脾者併入心與肺脾爲肺母腎爲肺子故入肺者併入脾與腎肺爲腎母肝爲腎子故入腎者併入肺與

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

肝此五行相生子母相應之義也

酸傷筋斂則筋縮辛勝酸苦傷氣鴻氣酸勝苦甘傷肉酸勝甘辛傷皮毛疎散辛勝辛酸傷血酸能滲泄甘勝酸滕理苦勝辛酸此五行相克之義也

酸走筋筋病毋多食苦骨得苦則陰益甚重而難舉也甘走肉肉病毋多食甘肉得甘則壅氣臃腫益甚也辛走氣氣病毋多食辛氣得辛則散而益虛也酸走血血病毋多食酸血得酸則凝澁而卩滯也酸能滲泄津液此五病之所禁也

藥之爲物各有形性氣質其入諸經有因形相類者如連翹似心而入心

荔枝核似睪丸而入腎之類有因性相從者如屬木者入肝屬水者入腎潤者走血燥者入氣本天者親上本地者親下之類有因氣相求者如氣香入脾氣焦入心之類有因質相同者如藥之頭入頭幹入身枝入肢皮行皮又如紅花蘊木汁似血而入血之類藥有以形名者人參狗脊之類是也有以色名者黃連黑參之類是也有以氣名者猪蕨香薷之類是也有以質名者石膏石脂歸身歸尾之類是也有以時名者夏枯款冬之類是也有以能名者何首烏骨碎補之類是也

△凡藥火製四煆煨炙炒也水製三浸泡洗也水火共製二煮煮

也酒製升提薑製温散入鹽走腎而軟堅用醋注肝而收斂
便製除劣性而降下米泔製去燥性而和中乳製潤枯生血蜜
製甘緩益元陳壁土製藉土氣以補中州麵煨麵製抑酷性勿
傷上膈烏豆甘草湯漬煎解毒致令平和羊酥猪脂塗燒成滲
胃容易脫斷去穰者免脹去心者除煩此製治各有所宜也

上卷

草部 一百七十六品

黄耆　甘草梢　人參蘆　沙參　丹參　玄參
白朮（ヒラモヤシ）　茅朮（ヤマヤシ）　遠志　牛膝　石菖蒲　甘菊　五味子　天門冬
麥門冬　款冬花　紫菀　旋覆花　百部　桔梗
白前　白薇　馬兜鈴　白及　半夏麴　南星麴膽星
貝母　粉葛　天花粉　夏枯草　海藻　海帶

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

昆布　當歸　芎藭
壯丹皮　續斷　〇骨碎補
延胡索　紅花　茜草
三七　地榆　蒲黃
蘆根　芋根皮　鬱金
威靈仙　天麻　秦艽
獨活　羌活　防風
白芷　細辛　藁本
麻黃根節　紫蕨子　柴胡
薄荷　雞蘇　木賊
白芍藥　地黃生乾熟　何首烏
赤　益母草子　澤蘭蘭草
蘭葉艾葉
紫草　淩霄花　大小薊
卷柏　〇萹蓄子　白茅根針
萯黃　萸茇　三稜
豨薟　鈎藤　茵芋莽草
荊芥　連翹　葛根葛汁
前胡　升麻
木賊　浮萍

著耳子　知母　黃芩
龍膽草　青黛　大青
芣遂　大戟　商陸
木通　澤瀉　通草
槀蓄　地膚子葉　石韋莖
青蒿　附子烏頭側子　烏喙天雄
黃連　胡黃連　苦參
大黃　牽牛　葶藶
芜花　〇莽花　防己
燈草　車前草子　瞿麥
海金砂　茵陳　香薷
草烏射罔　白附子　礜故紙
〇濕羊藿　使君子　益智子
草荳蔻草果　香附　木香

肉蓯蓉　瑣陽　巴戟天
菟絲子　覆盆子葉　蕨藜子
砂仁　白荳蔻　肉荳蔻
胡盧巴　仙茅　蛇床子

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

藿香　葛香　山柰
煙草　常山 蜀漆 藜蘆 藜實
杜牛膝　鶴虱　牛蒡子
漏蘆　貫衆　白頭翁
王不留行 冬葵子 葵花 旱蓮草
蓖麻子　木鱉子　馬勃

下卷

木部 六十八品

茯苓　茯神 黃松節　琥珀
松節 松脂　栢子仁　側柏葉
長薑 紅藍　甘松香　草蔻
白鮮皮　革薢　土茯苓 萸
山萸根　金銀花　射干
蒲公英　紫花地丁 白斂
青箱子　決明子　穀精草

肉桂 桂心 桂枝　酸棗仁　山茱萸
女貞子 白蠟　梔實　郁李仁
桑寄生　猪苓　扈子
訶子　檳榔　大腹皮
秦皮　海桐皮　石南葉
辛夷花　雞仁　蜜蒙花
藁木　沉香　檀香 紫檀
血竭　烏藥　冰片 樟腦
藤合香　阿魏　盧會
胡桐淚　蘇黃　皂莢 角刺
乾漆　巴豆 霜油　沒石子

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

大風子　吳茱萸　川椒
竹瀝竹茹竹葉　天竹黃　雷丸
菓部二十五品
蘗　桃仁水蛭蚯蚓　杏仁
山查　木瓜　柿乾柿霜柿蒂　梨
白菓　石榴皮　枳椇子
蓮子石蓮蓮鬚　藕節藕粉　荷葉
西瓜
穀菜部穀十八品菜十一品

胡椒畢撥茄　茶　荊瀝
烏梅白梅　陳皮橘核橘葉青皮
枇杷葉　橄欖
胡桃皮殼　龍眼肉　荔枝杉殼
芡實　甘蔗糖霜　蓴臍

糙米陳廩　糯米　飴糖　穀芽
赤豆　綠豆　白藊豆
薏苡仁　御米穀米　神麴
韭子　慈　大蒜芸薹葷
白芥子　薑薑皮黑薑乾薑
山藥　百合　甜瓜蒂
麥芽　浮小麥麥麩　黑豆
淡豆豉　胡麻麻油　大麻仁
紅麴　醋　酒
蒺藜子
胡荽

金石水土部金三品水十一品石二十八品土四品
金箔銀箔　自然銅　黃丹
石膏凝水石　滑石　朴硝芒硝　玄明粉　赤石脂　禹餘糧
浮石　蓬砂　慈石　礞石　丹砂　水銀　輕粉
代赭石　花乳石

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

爐甘石　陽起石　鍾乳
石硫黃　土硫　膽礬　白礬
青塩　食塩　急流水
百沸湯　陰陽水　黃蘆水
地漿　荔兒茶　白草霜

禽獸部　禽五品　獸十四品

烏骨雞　雞肫皮　臊鵝體
腎　肺　肚　腸　犬肉　腎
膽汁　肉
牛黃　阿膠　虎骨
白石英　紫石英　雄黃
皂礬　絳礬　石灰　癩灰　砒石
逆流水　井欄水　井泉水
露水　臘雪水　冰
墨　伏龍肝
五靈脂　夜明砂　猪心血　肝
竿肉肝　膽　睡骨　牛肉乳　喉
犀角　羚羊角　鹿茸　角　膠

霜
鹿　竣　麝香　熊膽
獺肝　象皮

魚蟲部　鱗十二品　介七品　更十二品

龍骨　齒　青魚膽　鱧魚膽
鯉魚　鯽魚　鰻鱺
白花蛇　烏稍蛇　穿山甲
蛤蚧　海螵蛸　海狗腎
蛻板　膠　尿　壯蟲　蛤粉　肉　石決明
鱉甲　肉　蟹
真珠　蜂蜜　黃蠟　殭蠶　蘭蛾
五倍子　斑蠶　莞青　亭長　地膽
原蠶砂　桑螵蛸　螳螂　鞱鼠
蜥蜴　五穀虫
蜈蚣　蟾蜍　蟾酥

人部

髮　人乳乳粉　紫河車　童便

糞清

秋石　秋冰　人中黃

本草備要上卷

沐寧訒庵汪昂著輯
叔作舟汪逢楫仝訂
伊調汪龜　同較
侄塔天一仇澐　同較
侄倩其兩汪端較正

草部

黃耆　甘溫。生用固表無汗能發有汗能止用實表虛自汗若表虛有邪發汗不出者温分肉實腠理補肺氣瀉陰火解肌熟炙服此又能自汗

用補中益元氣温三焦非脾胃一虛土不能生金則肺氣先絕脾胃緩和則肺旺而肌表固實補中生血生肌氣能生血血充則肉長排膿內托瘡瘢聖藥

補氣固表生亦瀉火　朱震亨號丹溪著本草補遺王好古號海藏著湯液不

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

無熱者宜之 合人參甘草生薑爲保元湯治瘡虛不起或加芎藭官桂糯米助之王好古曰實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治瘍寒尺脈不至補腎元是裏藥甄權謂其止崩帶者氣旺則無陷下之憂也蒙筌曰補氣藥多補血藥亦從而補血藥多補氣藥亦從而補血湯雖加當歸芍藥功破參朮補血湯數倍于當歸亦從當歸而補補血湯黃耆一兩當歸二錢氣藥多而六補血者也表旺者不宜用陰虛者宜少用恐升氣于表而裏愈虛矣

皮黃肉白堅實者良入補中藥梃扁蜜炙達表生用或曰補帶濕燭藥宜鹽水炒昇拔此說非也前症用黃者以非欲抑黃者使入腎也取其補中升氣則腎受瘡而崩帶濕燭之病自愈也有上病而下取補彼經而益及此經者此類是也

皮畏防風東垣曰黃耆得防風其功益其使也乃相畏而更以相使也

爲補藥之長故名耆俗作芪

茯苓爲保元湯治瘡虛不起或加芎藭官桂糯米助之王好古曰實衛氣是表藥益脾胃是中州藥治瘍寒尺脈不至補腎元是裏藥甄權謂其止崩帶者氣旺則無陷下之憂也蒙筌曰補氣藥多補血藥亦從而補血藥多補氣藥亦從而補血湯參朮補血湯黃耆一兩當歸二錢氣藥多而六補血者也表旺者不宜用陰虛者宜少用恐升氣于表而裏愈虛矣

皮黃肉白堅實者良入補中藥梃扁蜜炙達表生用或曰補帶濕燭藥宜鹽水炒昇拔此說非也前症用黃者以非欲抑黃者使入腎也取其補中升氣則腎受瘡而崩帶濕燭之病自愈也有上病而下取補彼經而益及此經者此類是也

皮畏防風東垣曰黃耆得防風其功益其使也乃相畏而更以相使也

茯苓 味甘生用氣平補脾胃不足而瀉心火炙用氣温補三焦益入汗劑前解肌退肌入表之熟

焦元氣而散表寒入和劑則補益入潤劑則養陰血能協和諸藥使之不爭生肌止痛主肌肉

涼劑則瀉邪熱入峻劑則緩正氣 薑附加之恐其僭上硝黃加之恐其墜下皆緩之之意

耳能通行十二經解百藥毒故有國老之稱中滿症忌之 令人滿然亦有生用爲瀉者以其能引諸藥至于滿所經云以耳補之以耳瀉之是已故別錄甄權並云除滿而反泄滿炙耳草得蜜則不資滿心湯治痞滿 大而結者良故云下氣除滿仲景有耳草瀉心湯治痞滿

補中炙用瀉火生用達莖中用稍 稍止莖中痛

漆爲使惡遠志反大戟芫花耳草遂海藻然亦有並用者 胡治痰淋濁症用之 白朮苦參乾

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

癖十棗湯加甘草東垣治
荒花同行非妙達精微者不知此理十棗湯荒花甘遂大戟
等分棗十枚仲景治傷寒表
已無心下有水喘咳之劑

大補元氣生亦瀉火

人參 生甘苦微涼熟甘溫大補肺中元氣東垣曰肺主氣肺氣旺則四藏之氣皆旺精自生而形自盛十劑只補可去窮人參羊肉之屬是也人參補氣羊肉補形瀉火得升麻補上焦鴻肺火得麥冬補下焦鴻腎火得麥冬瀉火而生脈得黃耆其功其溫退大熱東垣曰參耆甘草退火之聖藥被煩勞則虛而生熱得甘溫以益元氣而虛熱自退故亦謂之瀉火能補陰退正氣旺則邪火退而寧靜定驚悸除煩渴瀉火故開心益智安精神定驚悸除煩渴瀉火故津枯止渴通血脈血行則破堅積積化運則消痰水氣旺則痰行水消治虛勞內傷外傷千七情六慾飲食作勞爲內傷傷于風寒暑濕爲外傷如發熱無間內傷則時熱時止

惡寒症外傷雖察火不除內傷則得緩便解頭痛症外傷則連痛不休內傷則乍痛乍止外傷則手背熱內傷則手心熱外傷則鼻塞不通內傷則口淡無味外傷則人迎脈盛多屬有餘宜汗吐下內傷則氣口脈盛多屬不足宜溫補和蓋左人迎主表右氣口主裏也發熱自汗自汗屬陽虛參耆而反甚者以陽盛除虛陽愈補而除愈虛也又宜多夢紛紜嘔噦反胃虛欬喘促蒙筌曰清熱養血而汗自止熱還傷肺之劑惟言寒熱不辨虛實若肺中實熱者忌之虛熱者服之何害又曰諸痛無補法不用參耆若久病虛痛何當忌耶瘧痢滑瀉始痢宜下久痢宜補治瘧意同然亦有先補後下者丹溪曰氣口主氣人迎主表右人迎氣口脈俱盛此邪在表也宜正合汗之氣証子曰氣口脈虛形雖實而反陳藏器曰人參必過飽傷胃與參术陳芍十餘貼二日後胃氣稍完再與承氣湯二貼而安一人面白脈弦數獨胃脈沉滑因飲白酒作痢下淡水膿血腹痛後重小便不利參术爲君滑石甘草楝柳木香爲佐下保和丸二十粒次日前症盡減獨小便未利與六一散而安此治補兼施者大承氣證燥糞厚朴

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

皇甫嵩著本草發明乳香振

瀛經所謂塞因塞用也俗醫泥于作飽不敢用不知此服反

滋壅多服則宣通補中風中暑及一切血症東垣曰古人治之正所以導之也大吐血脈芤洪者並用人參脫血者先益其氣蓋血不自生須得生陽氣之藥乃生陽生則陰長之義也若單用補血藥血無由而生矣

凡虛勞吐血能受補者可治不能受補者難治

黃潤縣實似人形者良去蘆用補劑用熟瀉火用生鍊膏服能回元氣於無何有之鄉有火者天冬膏對服

參生時背陽向陰不喜風日宜焙用忌鐵秘爲使畏五靈脂惡皂莢黑豆紫石英人溲藜蘆反之

泰九內用人參皂莢是惡而不惡也古方療月閉四物湯加人參五靈脂是畏而不畏也又療痰在胸膈人參藜蘆同用而取其湧越是激其怒性也非洞奧達權者不能知

八參蓋蘆能湧吐痰涎體虛人用

之以代瓜蒂丹溪曰人參入手太陰之補陽中之陰蘆反能瀉太陰之陽亦猶麻黃根節止汗而發散之義一絡非吐不可吐中就有發散之義一婦性躁味厚暑月因怒而病吮作則舉身跳動昏不知人此人參五靈脂反氣不得降非吐不可以參蘆牛兩逆流水煎服吐頑痰數碗大汗昏睡而安

沙參 甘苦微寒味淡體輕專補肺氣因而益脾與腎脾爲肺子久嗽肺痿金受火尅者宜之寒客肺中作嗽者勿服人參補五藏之陽沙參補五藏之陰肺熱者用之以代人參

似人參而體輕鬆白實者良生沙地者長大生黃土者瘦小惡防己反藜蘆

丹參 氣平而降本經微寒別錄曰性應熱味苦色赤入心與胞絡破宿血生新血瘀去然後新生安生胎養血墮死胎去瘀調經脈風寒濕熱襲傷經脈則經水不

補水瀉無根之火

調先期屬熱後期屬寒又有血虛血瘀氣濕痰咽之不同大抵婦人之病首重調經經調則百病散

兼四物 一味丹參散**與四物湯同爲女科要藥治冷熱勞骨節痛風痺五**

隨手足緩散不隨人用也經曰足掌受血而能握**者有堪可徵痕者假也**腹痛腸鳴**崩帶癥瘕**音征加癥**移動聚散無常皆血病血虛血瘀之候又治目赤疝痛瘡疥**

腫毒痈膿生肌 畏鹹水忌醋及藜蘆

玄參 苦鹹微寒色黑入腎能壯水以制火散無根浮游之火腎水受傷眞陰失守孤陽無根發爲火病**益精明目利咽喉通二便治營熱傳屍**

傷寒陽毒發斑亦有陰症發斑者**懊憹**鬱悶不舒**煩渴溫瘧洒洒嗌痺咽痛**本腎藥而治上焦火症壯水以制火也腎脉貫肝肺入中循喉嚨系舌本腎虛則相火上炎此喉痺咽痛咳嗽吐

血之所由來也潮熱骨蒸亦本于此**瘰癧結核**寒散火軟堅**癰疽鼠瘻**音呂**扁**脾虛泄瀉者忌用 **蒸過焙用勿犯銅鐵惡黃耆菜菔喜棗反藜蘆**

白朮 苦燥濕經曰脾苦濕急食苦以燥之**甘補脾溫和中在血補血在氣**

補氣同血藥則補血同氣藥則補氣**無汗能發有汗能止**濕從汗出濕去汗止止汗同者考之**類發汗加辛散之味燥濕則能利小便生津液**既燥濕而又生津何也**氣不得施化津何由生用白朮除其濕則氣得周流而津液生矣**濕勝則**止泄瀉**凡水瀉濕也腹痛腸鳴而瀉火也痛甚而瀉瀉而痛減者食也完穀不化氣虛也在陽寒下痢則爲邪熱不殺穀也久瀉名脾泄腎虛而命火衰也脾虛濕盛宜白朮凡治瀉**消痰水腫黃疸濕痺補脾則能進飲食**脾主四肢虛土肌熱**勞倦**則四肢倦怠土肌肉**化癥癖**痞積一補名枳朮丸

補脾燥濕

汪機著本草會編水火相激則腸鳴

則積化也和中則能已嘔吐定痛安胎同黃芩則安胎黃芩除胃熱白朮補脾亦除胃熱利腰脊間血蓋胎氣繫于脾脾虛則帶無所附故易落血燥無濕者禁用能生膿作痛潰瘍忌之補氣故也肥白者出浙地名雲頭朮燥白者出宣歙名狗頭朮差勝于浙川糯朮泔浸借穀氣以和脾陳壁土炒藉土氣以助脾或蜜炙炒久乳拌用調其燥

蒼朮　苦溫辛烈燥胃強脾發汗除濕能升發胃中陽氣止吐瀉逐痰水許叔微本事方云蒼朮能治水飲之滯囊蓋燥脾去皮搗油麻兩半水二錢研濾汁和朮丸丹溪曰實脾土燥脾濕是治痰之本神朮名丹溪曰諸鬱皆因濕化朱丹溪曰諸鬱皆因痰病在中焦將欲降之必先升之升之越鞠丸用蒼朮香附蒼朮能徑入諸經疏泄陽明之濕遍行歛濡香附乃陰中快氣之藥一升一降故鬱散而平燥結多汗者忌用出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸切片焙乾同芝麻炒以制其燥二朮皆防風地榆爲使主治畧同第有止汗發汗之異古方本草不分蒼白陶隱居言有兩種始各施用

黃精　甘平補中益氣安五藏益脾胃潤心肺填精髓耐筋骨除風濕下三尸蟲以其得坤土之精粹久服不饑氣滿則不飢

足痿蒼朮陽明藥經曰治痿獨取陽明又能總辨痰火氣血合黃柏爲二妙散加牛膝名三妙散

濕食六鬱朱丹溪曰諸鬱皆因痰化失常氣不得升降病在中焦將欲降之必先升之越鞠丸用蒼朮香附蒼朮能徑入諸經疏泄陽明之濕遍行歛濡香附乃陰中快氣之藥一升一降故鬱散而平燥結多汗者忌用出茅山堅小有硃砂點者良糯米泔浸切片焙乾同芝麻炒以制其燥二朮皆防風地榆爲使主治畧同第有止汗發汗之異古方本草不分蒼白陶隱居言有兩種

始各施用

黃精　甘平補中益氣安五藏益脾胃潤心肺填精髓耐筋骨除風濕下三尸蟲以其得坤土之精粹久服不饑氣滿則

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

俗名山生薑九蒸九晒用

萎蕤　甘平補中益氣潤心肺悅顏色除煩渴治風溼毒目（平補而潤去風）痛眉爛風溼寒熱痺痛瘧（痺詩廉切痛不止者屬外感宜發散年痛不止者屬內傷宜補虛又有偏頭痛者左屬風與血虛右屬痰熱與氣虛腰痛亦有腎虛氣滯痰積瘀血寒濕濕熱之不同凡挾虛挾風濕者宜萎蕤代參耆不寒不燥大有殊功（坊用相近而萎蕤更勝）竹刀刮去皮節蜜水或酒浸蒸用畏醎鹵

狗脊　苦堅腎甘益血（腎能強腰）溫養氣治失溺不節（腎虛腳弱腰痛寒濕周痺（周身盡痺也）除風虛強機關利俛仰（滋腎益血則骨勁而筋強）有黃精而差小黃白多鬚（一名）

黃毛如狗形故曰金毛切酒拌蒸曝舂爲使萎蕤亦良

石斛　甘淡入脾而除虛熱醎平入腎而滋元氣益精強陰煖水藏平胃氣補虛勞壯筋骨療風痺腳弱發熱自汗囊濕餘瘧（兼數訊石解鐵銷）光澤如金釵股細短而中實生石上者良名金釵石斛長而虛者名木斛不堪用去頭根酒浸用細剉水浸

熬膏更良惡巴豆畏礬鑞

遠志　苦溫熟温壯氣辛散鬱主手少陰心能通腎氣上達于心強志益智補精壯陽聰耳明目利九竅長肌肉助筋骨治

迷惑善忘驚悸夢洩能交心腎非心經藥也與志皆藏于腎腎精不足則志衰不能上通于心故健忘夢洩也腎積奔豚一切癰疽經疏日癰疽皆從七情憂鬱惱怒而得遠志辛能散鬱昌蒲苦能散鬱亦補腎之力耳去心甘草水浸一宿曝用畏珍珠藜蘆

牛膝　苦酸而平足厥陰少陰經兼入手厥陰

甘酸而溫益肝腎強筋骨肝主筋腎主骨故理足補肝則筋骨自健陰痿失溺筋衰則陰痿久瘡下痢傷中少虛則失溺血行則痛止皆補以上皆補肝腎之功生用則散惡血破癥瘕結血行則結散治心腹諸痛淋尿血熟者膀胱溺濇而痛日淋氣淋便牆餘歷勞淋房勞即發冷淋寒戰後溲膏淋便出如膏仍淋精結成石

尿血即血淋也色鮮者心與小腸實熱色暗者腎與膀胱虛冷大法治淋宜通氣清心平火利濕不宜用補忌濕熱得補增劇也牛膝淋症雲藥亦可用之杜牛膝亦可又有屮宜用之益氣經所謂氣化則能出是也忌用淋經閉產難下行之功癰腫惡瘡金瘡傷折惡血之功出竹木刺之

以上皆散

失精及脾虛下陷因而腿膝腫痛者禁用出西川及懷慶府長大肥潤者良下行生用入滋補藥酒浸蒸惡龜甲畏白前忌牛肉

昌蒲本綱頌曰古方有單服昌蒲法蜀人治心腹冷痛捣末酒服方寸匕痛者取三寸搥碎同黍米煮飲之亦將隨行平心痛齊二寸熱湯或酒送下亦效

石菖蒲　辛苦而溫芳香而散補肝益心開心孔利九竅明耳目餐耆舉逐風去濕除痰消積寬中開胃療噤口痢

李士材著 藥性解本草通玄

宣祛風熱補肺腎明目

離屬脾虛亦熱閉胸膈所致用木香失之溫山藥失之膩閉唯參苓白朮散加菖蒲米飲下驚癎次一開自然思食

風痙崩帶胎漏消腫止痛解毒殺虫李士材曰仙經稱爲水草之精英神仙之靈藥用泔浸飲上蒸之糟穀氣而臻于中和眞有殊常之効又曰芳香利竅心脾良藥能佐地黃天冬之膩食其宣導若多用獨用亦耗氣血而爲厥

生水石間不沾土根瘦節密一寸九節者良去毛微炒用秦艽爲使惡麻黃畏鹽

甘菊花　味兼甘苦性稟平和備受四氣之氣飽經霜露得金水之精居多能益金水二藏肺腎以制火而平木肝木平則風息火降則熱除故能養目血去腎臟目風熱眩運散濕痺遊風以單瓣味甘者入藥木枸杞地

骨爲使黃者入陰分白者入陽分紫者入血分可藥可餌可釀可枕本經列之上品

五味子　性温五味俱備皮甘肉酸核中有鹹味酸鹹爲多故專收斂肺氣而滋腎水氣爲水助經曰肺欲收急食酸以收之

治氣生津肺生氣斂故能益夏月宜常服以鴻喜火而益金強陰濟精加入八味丸用以補腎補虛明目退熱斂汗止嘔住瀉寧嗽定喘感風寒而喘嗽者當表散痰壅氣逆而嗽者當清降宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味

除煩渴凉水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大嗽初起脈數有實火者忌用

丹溪曰五味收肺氣非除熱乎補腎非煖水藏乎乃火熱嗽必用之藥冠氏所謂食之多虛熱者收補之驟也

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

產紫黑者良入滋補藥蜜浸蒸入勞嗽藥生用俱槌碎核南
產色紅而枯若風寒在肺宜南者蔴蓉猱熬膏良

天門冬　甘苦大寒入手太陰肺清金降火益水之上源肺爲腎母
下通足少陰腎苦能堅腎寒能去腎家濕熱故亦治骨痿日腎主津液燥則凝而爲痰得滋腎潤燥消痰止渴蒙筌潤劑則痰化所謂治痰之本也澤肌膚利二便治肺痿肺癰肺痿者感于風寒咳嗽短氣鼻塞胸脹久而成痿有寒熱痿二症肺癰者熱毒蘊結成癰咳吐膿血胸中隱痛痿重而癰稍輕治痿宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱豁痰開提升散癰爲邪實痿爲正虛不可誤治吐膿吐血若泄血滯甚益元氣寒止血妄行痰嗽喘促嗌乾消渴頻頻飲多食善飢爲消渴由火盛津枯宜潤燥滋陰忌發汗虛勞骨蒸陰虛有火之症然性冷利胃虛無熱及

瀉者忌用　取肥大明亮者去心皮酒蒸地黃貝母爲使惡
鯉魚天冬滋陰助元消腎痰麥冬清心降火止吐欬二冬蒸富並良

麥門冬　甘微苦寒清心潤肺經疏云實足陽明之正藥強陰益精除煩
瀉熱微寒能瀉肺火火退則金清水生陰得水養則火降心寧而精益火宜知母石膏苓連屈桔午前嗽多屬胃夜重者多屬陰虛宜麥冬五味知母四物生津行水治嘔吐胃火上衝則嘔宜麥冬又有因寒因食因痰因虛者痰飈于足緩縱曰痿躄陽明濕熱爲痿虛勞客熱脈絕短氣同人參五味能生脈蓋心主脈肺朝百脈補肺清心則氣調而脈復夏月火旺爍金服生脈散尤良東垣曰人參甘寒瀉火熱而益元氣麥冬苦寒滋燥金而清水源五味酸溫瀉西火而補庚金益五藏之氣補肺痿吐膿血熱妄行經枯乳閉又能明目清火但性

寒而泄氣弱胃寒人禁用　肥大者畏去心用入滋補藥酒浸制其寒

地黃車前爲使惡款冬花畏苦參書箱木耳

款冬花　辛温純陽瀉熱潤肺消痰除煩定驚明目治嗽逆上氣氣喘肺虛挾火咳痺肺痿肺癰咳吐膿血爲治嗽要藥凡陰虛勞嗽通用款冬紫菀百部百合沙參生地麥冬五味知柏苓芩內熱甚蒸加丹皮地骨嗽而復瀉者爲肺移熱于大腸藏痺俱病嗽而發熱不止爲本草滙凡隆冬獨秀險虛火炎皆難治寒熱虛實皆可施用先春開數得腎之體先肝之用故爲温肺理嗽之最大抵欲必踰寒寒爲冬氣入肺爲逆款冬非肺家爲藥乃使肺邪從腎順流而出也

十二月開黃花如菊青紫蘤微見花未舒者良生當山上黨水傍世多以枇杷葉僞之

揀淨花甘草水浸一宿暴用得紫菀良惡玄參皂莢

硝石畏黃耆黃芩貝母連翹麻黃青箱辛夷雖畏貝母得之反良

紫菀　音鬱又音尉　土聲　辛温潤肺苦温下氣補虛調中消痰止渴治寒熱結氣咳逆上氣喘嗽膿血專治血痰爲肺經虛熱小兒驚癇亦虛而有熱能開喉痺取惡涎然辛散性滑不宜多用獨用本草滙云苦能達下辛可益金故吐血保肺收爲上劑雖入至高善于達下使氣化及于州都小便自利人所不知李士材曰辛而不燥潤而不寒補而不滯誠金玉君子非多用獨用不能速效

旋覆花　一名金沸草　鹹能軟堅苦辛能下氣行水温能通血脈入辛者良今人多以車前旋覆根僞之誤服誤人

產牢山東根如北細去頭鬚蜜水浸一宿焙用款冬爲使惡天雄瞿麥藁本遠志畏茵蔯

鞕音硬

肺大腸經消痰結堅痰唾如膠漆噫氣不除噫於介切俗作噯胸中氣不爽故噯以通之屬不足亦有挾痰挾火者屬有餘仲景治吐下後痞鞕噫氣有代赭旋覆湯頭目風然走散之藥冷利大腸虛者慎用類金錢菊去蓋大腹水腫去殼蒸用

潤肺殺虫

百部　甘苦微温能潤肺治肺熱咳嗽泄熱能殺虫蝨一切樹木蚰虫鱗烟即死治骨蒸傳尸痲積疥癬皆有虫睛珍曰百部亦天冬之類故皆治肺而殺虫但天冬寒熱嗽宜之百部温寒嗽宜之

實者竹刀去心皮酒浸焙用

桔梗　苦辛微温色白屬金入肺鴻熱兼入手少陰心足陽明根多岐成百故名取肥

宣開提氣血表

胃經開提氣血表散寒邪清利頭目噎喉胸膈滿氣凡痰壅喘促鼻塞肺氣不利目赤喉痺咽痛兩陰火齒痛陽明火鬱風熱口瘡肺癰乾咳火鬱在肺胸膈刺痛火鬱上焦腹痛腸鳴手大腸火鬱上焦宜苦梗以開之故治肺癰時珍既上行而又能下氣何也肺主氣肺金清濁氣自下行耳養血排膿補內漏成功

散寒邪鴻上焦火載藥上浮

為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至于至高之分

下氣即降火也

既上行而又能下氣何也肺主氣肺金清濁氣自下行耳養血排膿補內漏成功

散寒邪鴻上焦火載藥上浮

為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至于至高之分

胃經開提氣血表散寒邪清利頭目噎喉胸膈滿氣凡痰壅喘促鼻塞肺氣不利目赤喉痺咽痛兩陰火齒痛陽明火鬱風熱口瘡肺癰乾咳火鬱在肺胸膈刺痛火鬱上焦腹痛腸鳴手大腸火鬱上焦宜苦梗以開之故治肺癰時珍既上行而又能下氣何也肺主氣肺金清濁氣自下行耳養血排膿補內漏成功

散寒邪鴻上焦火載藥上浮

為諸藥舟楫載之上浮能引苦泄峻下之劑至于至高之分

下氣即降火也

鴻肺下痰

亦可識矣　去浮皮洪浸炒用畏龍膽白及

白前　辛甘微寒長于降氣下痰止嗽治肺氣壅實胸膈逆滿

鴻血熱

虛者禁用　似牛膝短小柔軟能變者白薇也粗長堅實易斷者白前也去頭鬚甘草水浸一伏時焙用忘羊肉一伏時即畫夜

白薇　苦鹹而寒入心腎利陰氣下水氣主中風身熱支滿忽忽不知人陰虛火旺則內熱熱則生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不知人血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此病宜白薇湯白薇當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢熱淋溫瘧寒熱酸痛寒熱作則營氣不能內營故酸痛婦人傷中淋露血熱產虛煩嘔經疏云古方調經種子往往用之蓋不孕緣于血熱血少而其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也陰清熱則血益陰虛火旺則內熱熱則生風火氣焚灼故身熱支滿痰隨火湧故不知人血厥汗出過多血少陽氣獨上氣塞不行而厥婦人尤多此病宜白薇湯白薇當歸各一兩參五錢甘草錢半每服五錢熱淋溫瘧寒熱酸痛寒熱作則營氣不能內營故酸痛婦人傷中淋露血熱產虛煩嘔經疏云古方調經種子往往用之蓋不孕緣于血熱血少而其源起于真陰不足陽勝而內熱故營血日枯也陰清熱則血

鴻肺下氣

自生旺而有子矣須佐以歸芍生地杜仲蓯蓉等藥　糯米洪浸一宿或酒洗用聚大

馬兜鈴　體輕而虛熟則四開象肺故入肺寒能清肺熱苦辛能降肺氣峭珍曰錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺取其清熱降氣則肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥治痰嗽喘促血痔瘻瘡肺大腸經熱瘻漏也音問亦音漏爲表裏肺移熱于大腸故腸風痔瘻清藏熱則腑熱亦清矣

黃大戟山茱萸東

實如鈴去筋膜取子用

補肺

白及　味苦而辛性濇而收得秋金之令入肺止吐血嘔血咯血試血法吐水內浮者肺血也沉者肝血也半浮沉者心血也各隨所見以羊肺肝心蘸白及末日一次之隹肺損者能

瘡 燥濕痰 調腎燥

復生之 以有形生有形也人之五藏惟肺葉壞爛者可以復生台州獄吏潤一重囚感之云吾七犯死罪遭刑拷肺皆損傷得一方用白及末飲日服其效如神後因凌遲剖其胸見肺間竅穴數十皆白及塡補色猶不變也治癰腫惡瘡敗疽死肌蓋去腐逐瘀以生新之藥除面上粉刺皰皯音干去聲面黑氣皰音砲面瘡也塗手足皴裂令人肌滑 紫石英爲使畏杏仁反烏頭

半夏 辛温有毒體滑性燥能走能散能燥能潤和胃健脾去濕補肝辛潤腎除濕化痰發表開鬱下逆氣止煩嘔發音聲利水道丹溪謂二陳能使大便潤而小便長燥去濕故利水辛通氣能化液故滿痰升則脹胸脇嗆痛成無已日半夏辛散行水氣而潤腎燥又局方半硫丸用治老人虛秘皆取其潤滑也俗

以半夏尚星爲性燥誤矣濕性燥也古方用治咽痛喉痺吐血下血非散血故破傷樸斫皆主之惟陰虛勞損則非濕熱之邪而用豈藥之咎哉甲乙利痰行濕之物是重竭其津液醫之罪也經曰胃不和則卧不安胃陽明氣逆故不得卧又曰用半夏和胃而通果性燥者乎陽氣滿不得入于陰陰氣虛故目不得瞑其陰陽又有喘嗽不得眠者左不得眠屬肝脹宜清肝右不得眠屬肺脹宜清肺反胃叩食痰飲散痞除癆瘦多痰屬痰消腫止汗勝濕孕婦忌生用治風痰寒痰燥痰濕痰不眠經通不生非二物之禁劑也二物亦能去則土燥痰升則血下血非痺吐血非

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

氣順則火降而痰消雖云忌之亦間有用者

濕痰有聲有痰曰咳嗽或因火因風因寒因濕因虛勞因食積宜分痰上治大法治嗽當以治痰爲先而治痰又以順氣爲主宜以半夏南星燥其痰枳殼橘紅利其氣肺虛加溫斂之味肺實加涼瀉之熱趙繡宗二陳治痰世醫執之內有半夏若風寒濕食諸痰則相宜至于勞痰失血諸痰用之反能燥血液血加痛故古有三禁之論家用家忌之

圓白而大者良浸七日逐日換水瀝去涎切片薑汁拌炒紫

胡粉干爲使畏生薑秦皮龜甲雄黃忌羊肉海藻飴糖反烏頭惡皂莢陳久者良故與陳皮名二陳湯治痰之總劑寒濕痰佐以蒼术茯苓風痰佐以南星前胡痞痰佐以枳實白术痰在上加引上藥痰在下加引下藥惟燥痰非半夏所司也

造麵法以薑汁磨湯和半夏末作餅楮葉包置籃中待生黃衣日乾陳者良

燥濕宣治風痰

天南星　味辛而苦能治風散血氣溫而燥能勝濕除痰性緊而毒能拔積攻腫補肝風虛凡味辛而散者能堪補肝木喜條達故也爲川脾肺三經之藥治濕痰驚癎風眩丹溪曰無痰不作眩身強口噤喉痺舌瘡結核結氣癰毒疥癩蛇虫咬毒調末敷之利水墮胎性更烈于半夏與半夏皆燥而毒故墮胎半夏辛而不毒陰虛燥痰禁用　根似半夏而大看如虎掌故一名虎掌以礬湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸熟竹刀切開以不麻爲度或薑渣黃泥和包煨熟用造麵法以薑汁礬湯和南星末作餅楮葉包待生黃衣日乾造膽星法臘月取黃牛膽汁和南星末納入膽

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

宣散結瀉熱潤肺清虛痰

中風乾年久者彌佳畏附子乾薑防風得防風則不麻火炮不燥且胜痛益用胜之功則毒性緩得牛膽則

貝母　微寒苦瀉心火辛散肺鬱心火降則肺氣寧詩曰言采其蝱（蝱貝母也）取其解鬱潤心肺清虛痰治虛勞煩熱咳嗽生氣吐血咯血肺痿肺癰

嗌痛君相火熱目眩火熱淋瀝小腸邪熱心與小腸相表裏肺爲氣化之源火降邪散癰瘍化痰乳閉產難功專散結除熱傷惡瘡斂瘡口非貝母性收斂也俗以半夏燥毒代貝母不知貝母寒潤主肺家燥痰半夏溫燥主脾家濕痰或恐用貽誤胚胎貝母非所宜也宜用半夏南星

糯米拌炒黃搗末用厚朴白薇爲使畏秦艽反烏頭

瀉火潤肺滑腸止血治熱痰

栝蔞仁　俗作瓜蔞　甘補肺本草苦寒潤下能清上焦之火使痰氣下降爲治嗽要藥肺受火迫失下降之令故生痰作嗽又能蕩滌胸中鬱熱垢膩生津利腸通乳消腫治結胸痺仲景小陷胸湯用之炒香酒服止血治一切血症寒火降瀉者忌用其實圓長黃如熟柿子扁多脂去油用枸杞爲使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏頭

天花粉　酸能生津甘不傷胃微寒降火潤燥滑痰解渴生肌排膿消腫行水通經止小便利膀胱熱解則水行而小便不數治熱狂時疾胃熱疽黃口燥唇乾腫毒發背乳癰瘡瘍脾胃虛寒者禁用　即栝蔞根畏惡同澄粉食大宜虛熱人

宣散結消癭　瀉熱軟堅消癭核

夏枯草　辛苦微寒氣稟純陽補肝經血緩肝火解內熱散結氣治癭癧濕痺目珠夜痛樓全善云目珠連目本餘目系也夜痛及點苦寒藥更甚者夜與寒皆陰也夏枯氣稟純陽補厥陰血脉故治此如神汪陽治陰也按日背白珠屬陽故晝痛點苦寒藥則劾黑珠屬陰故夜痛點苦寒藥反劇　冬至生夏至枯故名葉對節生細齒背白莖微方莖端作穗開淡紫花川莖葉

海藻　鹹潤下而軟堅寒行水以泄熱故治癭瘤結核陰瘭堅聚腹病日痛九竅飲腳氣浮腫之濕熱　出東海有大病日積音類　馬尾二種亦作海菜食洗去鹹水用反甘草　東垣治瘰癧乃海藻甘草

用益激之以潰堅也

海帶　下水治癭功同海藻而粗柔鈍而長

昆布　功同海藻而少滑性雄治癭瘤水腫陰瘭瘰癧之濕熱　出登萊者搓如繩索出閩浙者大葉如菜洗去鹹味用

補血潤腸

當歸　甘溫和血辛溫散內寒苦溫助心散寒諸血屬心凡通脉者必先補心　當歸苦入心肝脾爲血中氣藥血生心肝藏血脾統血　治虛勞寒熱咳逆上氣血和則氣降　溫瘧厥陰肝邪　辟痢便血頭痛腰痛心腹諸痛散寒和血　風痺無汗痺音畢　半身強項角弓反張日痙無汗爲剛痙有汗爲柔痙當歸辛散風溫和血產後亦有發痙者以脫血無以養筋也宜十全大補湯　疫痺癥瘕痺音征　筋骨緩縱足不任地日痿風寒濕客于肌肉血脉日痺有行痺着痺痛痺凝氣聚搜之堅硬日癥雖鞭硬而聚散無常日瘕尚未至癥也　癰疽瘡瘍羊

俗名流火即痺症也

衝脈爲病、氣逆裏急、帶脈爲病、腹痛滿、腰溶溶如坐水中、衝脈起于一陰之中、直衝而上、至胸、爲十二經脈之海、主血、帶脈橫圍于腰、如束帶、總約諸氣、及婦人諸不足、一切血症、陰虛而陽無所附者、潤腸胃、澤皮膚、養血生肌、血和則肉長、排膿止痛、血和則痛止、然滑大腸瀉者忌用、當歸爲君、生地爲臣、芎藭爲佐、以人參黃耆、血熱痛甚、芍藥爲使、名四物湯、治血之總劑、血虛佐以人參黃耆、血熱佐以大黃犀牛、昔按血屬陰、四物能養陰、陰得其養、則血自生、非四物能生血也、若氣虛血弱之人、當用人參、取陽壯生性、血之義多有過服四物陰滯之藥而反致害者、血滯能散、血虛能補、血枯能潤、血亂能撫、蓋其辛溫能行氣、分使氣調而血和也、使血氣各有所歸、故名全活血而不走、川產力剛善攻、秦產力柔善補、以秦產頭圓尾多肥潤氣香者良、名馬尾當歸、尾粗堅枯者、名鏡頭當歸、只宜發散用、治血酒浸有痰、蒸製畏菖蒲海藻生薑惡濕麵

芎藭　辛溫升浮、爲少陽引經、上入手足厥陰、心包、乃血中氣藥、助清陽而開諸鬱、氣升則鬱降、爲通利肝燥補肝虛、五藏中惟用以瀉爲補、所謂辛上行頭目下行血海、衝脈、搜風散瘀調經以散之、辛以補之、止痛治濕氣在頭、血虛頭痛、必用之、加各引經藥、太陽頭痛、羌活、陽明白芷、少陽柴胡、太陰蒼朮、少陰細辛、厥陰吳茱萸、丹溪曰、諸經氣鬱亦能頭痛、腹痛脇風氣鬱血鬱濕瘀血痺、寒痺筋攣、目淚多涕、肝熱本爲病、諸風眩掉、及癰疽瘡瘍、皆屬肝木、從六府生疽、從五藏生、皆陰陽相滯而成、氣爲陽、血爲陰、血行脈中、氣行脈外、須並周流、寒濕搏之則凝滯而行遲、爲不及、

火熱搏之則沸騰而行速爲太過氣鬱邪入血中爲陰滯于陽血鬱邪入氣中爲陽滯于陰致生惡毒然百病皆由此起也芎歸能和血行氣而通陰陽男婦一切血症然香窮辛散能走泄眞氣單服久服令人暴亡四物湯用之者特取其辛溫而行血藥之哉昇按血屬陰陰無陽不生芎歸辛溫爲陽故藉其相濟以生生血也蜀產爲川芎秦產爲西芎江南爲撫芎以川產大塊裹白不油幸甘者勝白芷爲使畏黃連硝石滑石惡黃蒼山茱萸

白芍　苦酸微寒入肝脾血分爲手足太陰行經藥脾瀉肝火酸斂肝以斂安脾脇固腠理肺主皮毛脾主肌肉肝木不爲瀉以散爲補安脾脇固腠理一劑肺氣則脾安上旺能生金則肺安則脾和肺和則腠理固和血脈收陰氣斂逆氣酸主利小便斂陰生津收斂

非通行之謂也緩中止痛斂汗安胎補勞退熱治瀉痢後重脾虛腹痛瀉痢皆太陰病不可缺此寒瀉冷痛亦忌用虛天民曰白芍不惟治血虛大能行氣古方治腹痛用白芍四錢甘草二錢名芍藥甘草湯蓋腹痛因榮氣不從通于肉裏白芍能行榮氣甘草能斂逆氣又痛爲肝木尅脾土白芍能伐肝故也心痛脇痛脘痛橫行則兩脇痛白芍能理中瀉肝二經往來之道其火上冲則脅脇脹端逆其收降之體又能入血海衝脈男女皆有之而至厥陰肝經治鼻衄鼻血曰衄音女六切月濇肝血不足肝無血病又曰產後忌用不得已酒炒用之可耳李時珍曰產後肝血已虛不可更瀉也戚氏曰減芍藥以避中寒微寒如芍藥古人猶諄諄告戒況大苦大寒可肆行而莫之忌耶同白朮補脾同參耆補氣同歸地補血同芎藭瀉肝同芣草止腹痛同黃連止瀉痢同防風發痘疹同薑棗溫經散濕婦人胎產及一切

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

瀉肝散瘀 大瀉火

赤白各隨花色單瓣者入藥酒炒用制其婦人血分醋炒下痢後重不炒惡芒硝石斛畏鱉甲小薊反藜蘆

赤芍藥 酸寒入肝經血分遍血脈瀉肝火散惡血治腹痛堅積血痢瘕痂邪聚腹內爲瘕外腎爲痂腸風經閉癰腫目赤皆散瀉之功白補而收赤散而瀉白益脾能子壯中瀉木赤散邪能行血中之滯

產後俱忌用

生地黃 苦寒大寒入心腎瀉丙火小腸爲丙火心與小腸相表裏導赤散與木通同用清燥金肺大腸火消瘀通經平諸血逆治吐血衄崩中唾血者血隨唾出咯血者咯出或帶血絲出腎經及肺經自兩腸逆上吐出者屬肺經吐血嘔血成盆成碗者是俱出胃經經漏不止日崩血熱則妄行宜以此涼之虛人忌用乾地黃可也傷寒陽強痘症大熱多服損胃製則不傷胃生則寒乾則涼熟則溫

生搗鮮者搾汁飲之或用酒

補陰涼血 乾地黃 苦寒沉陰而降入手足少陰心腎厥陰肝太陽經小腸滋陰退陽涼血生血治血虛發熱吐血衄血咳嗽咳嗽陰虛者地黃丸爲要藥亦能除痰丹溪曰久病陰火上升津液生痰不生血宜補血以制相火其痰自除有陽而無陰自動曰驚無陽而自動曰痿即征仲也有因心虛火動者有因肝虛者火炎水故悸也地黃能交心腎而益肝肺亦利水道故治之或憂思房勞所致多屬血虛尿血由心腎氣結虛寒不可盡作熱治

經曰陰虛陽搏謂之崩折跌絶筋塡

骨髓長肌肉利大小腸調經安胎又能殺虫治心腹急痛本草
滯日丹溪云氣病補血雖不中病亦無害也不知血藥屬陰其性凝滯若胃虛氣弱之人過服歸地等劑反致病邪飲食減少變症百出至死不悟豈不惜哉大抵血虛陰不可專補其氣而氣虛亦不可遽補其血凡勞病陽虛宜四君補氣陰虛者宜四物補血陰陽俱虛者宜合用名八珍湯　　庵江浙者南方陽氣力微產北方者純陰力大以此慶肥大菊花心者良酒浸則上行外行宜製則不泥膈惡具良異薑忌棗服葱蒜銅鐵器得酒門冬丹皮當歸良

熟地黃　甘而微溫入手足少陰厥陰經滋腎水補真陰填骨髓生精血聰耳明目耳為腎竅目為肝竅目得血而能視耳得血而能聽烏髭黑髮治

勞傷風痾胎產百病為補血之上劑丹溪曰產前當清熱養血為主雖有雜症從末治之王碩云男子多陰虛宜熟地女子多血熱宜生地　產後宜大補氣以好酒拌砂仁末浸蒸晒九次用地黃性寒得酒與火與之則溫性泥得砂仁脈弱者加桂附所謂益火之源以消陰翳也脈旺者加柏所謂壯水之主以制陽光也

何首烏　苦澁腎溫補肝濟收斂精氣傅云首烏添精益髓養血祛風治風先治血血活則風散強筋骨烏髭髮故名首烏令人有子為滋補良藥氣血太和則勞瘦風虛崩帶瘡瘕瘰癧癰腫諸病自已譜則癰腫消赤者止惡瘡蓋陰補肝瘡疾要藥而本草不言外科呼為瘡帚治瘡時珍曰不寒不燥功在地黃天冬諸藥之上　有赤白二種夜則籐交一名交籐有陰陽交合之

瀉伏火而補血

象赤雄入血分白雌入氣分以大如拳五瓣者良三百年者大如栲栳服之成地仙凡使赤白各半洱浸竹刀刮皮切片用黑豆與首烏拌勻鋪柳甑入沙鍋九蒸九晒用茯苓爲使忌諸血無鱗魚葱蒜鐵器此藥流傳雖久服者尚少明嘉靖初方士鄒應節進七寶美髯丹世宗服之效連生皇子遂盛行于世方用赤白首烏各一斤黑豆拌九蒸晒茯苓半斤乳拌牛膝半斤酒浸同首烏第七次蒸至第九次當歸枸杞菟絲子各半斤酒浸破故紙四兩黑芝蘇炒蜜丸並忌鐵器昂按地黃何首烏皆君藥也故六味丸以地黃爲君七寶丹以何首烏爲君各有配合未可同類而共施也即有加減當各依本方隨病而施損益今人多以何首烏加入地黃丸中合兩方爲一一藥二君安所適從乎失製方之本義矣

壯丹皮　辛苦微寒入手足少陰心包厥陰肝

瀉血中伏火凡色

退無汗之骨蒸

癒癡音熾纔壇音閑

補肝腎理筋骨

故入血分時珍曰伏火即陰火也陰火即相火也世人專以黃柏治相火不知丹皮之功更勝故仲景腎氣丸用之利血涼血而生血血熱則枯血涼則生破積血通經脈爲吐衄必用之藥治五勞中風癆癡癎驚癇筋急而縮爲癒癎緩而伸爲癎血屬陰本靜因相火所逼故越出上竅縮不已爲癒癎卒然眩仆癒癎抽掣或口眼喎斜吐涎而身軟時發時止爲癇皆陰虛血熱風火相搏痰隨火湯所致除煩熱療癇癎涼血之功退無汗之骨蒸張元素曰丹皮治有汗之骨蒸神不足者手少陰志不足者足少陰故仲景腎氣丸用丹皮治神志不足也按內經云水之精爲志故腎藏志火之精爲神故心藏神以華瓣花紅者入藥肉厚者佳酒拌蒸用畏貝母恶絲子大黃忌蒜訶梨蔓伏砒時珍曰花白者補赤者利人所宜分別之

續斷　苦溫補腎辛溫補肝能宣通血脈而理筋骨主傷中補

補腎 治折傷 經曰腎者主骨 髓之開也 前陰利水 後陰利 熟通行血

不足 經疏云味澁其故然 宮縮小便破瘀血 治腰痛胎漏 懷孕而漏血

崩帶遺精腸風血痢 平胃散一兩 川續斷二錢半 每服二錢 癰疽腫毒 又主金瘡折跌 以功命名 止痛生肌 女科外科需爲上劑 狀如雞脚節

節斷茂黃皺者眞 去向裡硬筋 酒浸用 地黃爲使

骨碎補 苦溫補腎故治耳鳴 耳鳴必心服腎主二便久瀉多屬腎虛不可專責脾胃也 齒搖牙痛 又入厥陰 心包下亦良 研末入豬腎煨熟空心 能破血止血 入血行傷故治折傷 以功命名 牙痛炒黑爲末

扁長去毛用 或蜜拌蒸

益母草 一名茺蔚 辛微苦寒 入手足厥陰心包肝 消水行血去瘀生新 瘀血去則經調 治血風血運血痛血淋漏產難崩中帶下 帶脈橫于腰間病生于此故名爲帶赤屬血白屬氣氣虛者補中益氣而兼升提血虛者養血滋陰而兼調氣 爲胎產良藥消疔腫乳癰瘰癧解毒 通大小便 方莖婦女節節生穗花紅紫或微白子三稜褐色近水濕處多有之

益母子 辛苦微溫入厥陰血分 活血順氣逐風 氣行則血行血活則風散 血虛而熱之候 崩帶胎產 治血分風熱明目調經行中有補治心煩頭痛 血滯病目則宜之 益精明目 有補陰之功 時珍曰益母根莖花葉實皆可同用若水行血則宜莖用子爲良若治瘡腫胎產消

澤蘭 苦泄熱苦和血辛散鬱香芳脾入足太陰厥陰經脾肝通

通行血 補肝 通行血 消水

国立国会図書館 タイトル『本草備要2巻』 請求記号 特7-511
ガラス使用

九竅利關節養血氣長肌肉破宿血調月經消癥瘕散水腫
防己爲使治產後血癰腰痛癆行尸走屍鬼疰叶血鼻衄頭風目痛癰毒樸損
補而不滯行而不峻女科多用之有澤蘭丸　時珍曰蘭草澤蘭
一類二種俱生下濕紫莖素枝赤節綠葉葉對節生有細齒
但以莖圓節長葉光有岐者爲蘭草莖微方節短葉有毛者
爲澤蘭嫩時並可採名那而佩之楚詞所謂級秋蘭以爲佩是
也朱文公離騷辨證云蘭花葉俱香燥濕不變方可刈佩今之蘭薰花雖香而葉無氣質弱易萎不可刈佩吳人
呼爲香草俗名孩兒菊夏月采置髮中則髮不腦浸油塗髮去垢香澤故名澤蘭蘭草走
氣分故能利水道除痰癖殺蠱辟惡而爲消渴良藥經曰數食肥甘

傳爲消渴治之以蘭除陳氣也澤蘭走血分故能消水腫塗癰毒破瘀除癥
而爲婦人要藥以爲今之山蘭者誤矣防已爲使（元宗奭朱丹溪並以
蘭草爲山蘭之葉李時珍集衆說以說之昂按蘭薰清芬佳品何以獨不入本草所蘭草即非蘭葉然蘭葉亦有功用自
可治病也按別本云蘭葉甘寒清肺開胃消痰利水調經辟
鬱李士材曰蘭葉稟金水之氣入肺藏血故入肺藏血方中常用之
內經所謂治之以蘭除陳氣者是也余屢驗之開產者九竅通利血氣宜理氣血燥逐寒濕

艾葉　苦辛生温熟熱純陽之性能回垂絶之元陽逼十二經
走三陰太少厥理氣血逐寒濕煖子宮止諸血温中開鬱調經
安胎治吐衄崩帶（治帶要藥）腹痛冷痢霍亂轉筋（皆理氣血逐寒濕之效）殺
蛇治癬（苦酒煎服）灸之能透諸經而治百病血熱爲病者禁用（灸火）

則氣下行入藥則熱上衝大抵外用之功多丹田氣弱臍腹冷者以熟艾入袋坐臍腹甚效寒濕脚氣亦宜灸此灸入內用陳久者槁搗如綿謂之熟艾灸火用婦人尤散酢煮搗餅再爲末用煎服宜鮮者酒香附爲使艾附尤調婦人諸病膠艾湯治虛痢產後下血宋時重湯陰艾自成化來則以蘄艾爲勝云灸酒墨一炙便透蒙筌發明並以野艾爲真蘄艾雖香實非艾種

延胡索　辛苦而温入手足太陰脾肺厥陰經心包能行血中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結上下內外諸痛不痛則痛崩淋癥癖月候不調產後血運暴血上衝氣血不和因而至產後血運暴血上衝痛崩淋癥癖月候不調凝滯不以時至產後血運暴血上衝為活血利氣第一藥然辛温走而不守通經墮胎血熱氣虛者禁用　根如半夏肉黄形小而堅者良酒炒行血醋炒止

血生用破血炒用調血

紅花　古名紅藍花　辛苦甘温入肝經而破瘀血活血瘀行則血活有熱結于中暴吐紫黑血者吐出爲妙吐未盡加桃仁紅花行之大抵鮮血宜止瘀血宜行潤燥消腫止痛熱血凡血非活血行血不能下瘀癖血瘀則作痛治經閉便難血運口噤胎死腹中俗用藥紅併作胭脂少用養血多則行血過用能使血行不止而斃血生于心肝屬于衝任紅花汁與相類故治血痲產婦血悶而死者以紅花數斤煎湯窠婦于上而薰之可穌

茜草　色赤入營氣温行滯味酸走肝而鹹走血本經苦寒入厥陰血分心包肝活血行血消瘀通經酒煎一兩治風痺黄疸疸有五黄

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

瀉血熱 瀉血熱 瀉血熱

去瘀消腫易愈此藥近時始出軍中特之從廣西山洞來者略似白及地黃有節味微甘頗似人參以末摻猪血中血化爲水者眞近傳一種葉似菊艾而勁厚有岐尖莖有赤稜夏秋開黃花莖如金絲盤紐可愛而氣不香根大如牛蒡味甘治金瘡折傷血症甚效與南中來者不同

地榆 苦酸微寒性沉入下焦除血熱治吐衄崩中血虛腸風禁口血鮮者爲腸風隨感而見也血瘀者爲臟毒積久而發也糞前爲近血當腸胃兼後爲遠血出腧脈方斷下多用之凉宗奭凡虛寒瀉痢及初起者忌用根似柳根外黑裏紅取上截炒黑用和反行血得髮良惡麥冬忌火

蒲黃 甘平厥陰血分藥心包肝生用性滑主行血消瘀通經脈利小便祛心腹膀胱之熱同五靈脂治心腹血氣痛療撲打損傷瘡癰諸腫一婦舌脹滿口以蒲黃頻檂此瘀用蒲黃乾薑末摻之愈觀此則蒲黃之凉血活血可知矣蓋活爲心苞心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也炒黑性濇主止血治一切血病崩帶洩精香蒲花中蕊居

卷栢 生用辛平破血通經炙用辛温止血治腸風收脫肛

生石上卷蠻如雞足俗呼萬年松凡使鹽水煮半日井水煮半日焙用

菴蕳子 苦辛微寒別錄微温入肝經血分行血散結散中有補治陽痿經漏腰膝骨節重痛閃挫氣痛折傷能制蛇蛇見之則斃

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

瀉火止血止嗽

苡薏爲使

白茅根　甘寒入手少陰心足太陰陽明脾胃補中益氣除伏熱消瘀血利小便解酒毒治吐衄諸血根甘和血寒涼血瘀則血閉寒熱則寒熱作矣引火下降故治之血閉寒熱則閉閉則淋漏崩中則血熱傷寒噦逆即呃逆說文曰噦氣悟也是肺熱喘急內熱煩渴黃疸水腫清火行水時珍曰良藥也世人忽之惟事苦寒之劑傷冲和之氣烏足知此哉

瀉熱止嘔

蘆根　甘益胃寒降火治嘔逆反胃寒內熱止小便數肺爲水之上源脾氣散精上歸于肺始能通調水道下輸膀胱腎爲水藏而主二便

茅針潰癰癤酒煮服一針潰一孔二針潰二孔

瀉熱破血

芧根　甘寒而滑補陰破血解熱潤燥治心腹熱疾大渴大狂搗貼赤遊丹毒癰疽發背金瘡傷折止血易癒皮與產婦作枕止血運安腹上止產後腹痛散之功

宣行氣解鬱瀉涼血破瘀

鬱金　辛苦氣寒純陰之品其性輕揚上行入心及包絡兼入肺經涼心散肝鬱下氣破血行滯氣破瘀血亦能生新血治嘔血吐血衄血尿血婦人經脈逆行經不下行上爲吐衄諸症用鬱金末加非汁薑汁童便服其血自清痰中帶血者加竹瀝血氣心腹諸痛產後敗血攻心顛狂失心顛多屬實

明徂古佳

鴻破血行氣

尚知畏懼症屬不足狂多忿怒人莫能制症屬有餘此病多因驚憂痰血塞于心竅所致鬱金七兩白礬三兩朱硼九服名白金丸鬱金入心去惡血明礬化頑痰故也痘毒入心下蠱毒同升麻服不吐即下出川廣體銳圓如蟬肚外黃內赤色鮮微香味苦帶甘者眞市人多以薑黃僞之

薑黃 苦辛本草大寒藏器曰大明曰熱色黃入脾兼入肝經理血中之氣下氣破血除風消腫功力烈于鬱金治氣脹血積產後敗血攻心通月經片子者能入手臂治風寒濕痺痛血虛臂痛者勿治痛其兼理血用時珍曰入臂中之氣可知

出川廣 陳藏器曰鬱金苦寒色黃蒜味苦色青二物不同所用各別經疏曰薑黃主治介乎三稜鬱金莪蒁形狀功用大畧相近但鬱金入心當治血薑黃入

脾兼治血中之氣莪蒁如乾薑者爲片子薑黃圓如蟬腹者爲稍爲不同今時以扁蒁形雖似鬱金而色不黃也

莪蒁音述 辛苦氣溫入肝經血分破氣中之血能通肝經開胃化食解毒止痛治心腹諸痛冷氣吐酸奔豚痃癖醋磨服痃音賢小腹積痃癖多見于男子癥瘕多見于婦人莪蒁香熟行氣通竅同三稜用治積聚諸氣良校五積心積曰狀如聚起臍上至心下肝積曰肥氣在左脇肺積曰息奔在右脇脾積曰痞氣在胃脘右側腎積曰奔豚在小腹上至心下治之不宜當用下藥恐損眞氣宜于破血行氣藥中加補脾胃藥氣旺方能磨積正旺則邪自消散經曰大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死東垣五積方用三稜莪蒁皆兼人參贊助成功攻治積諸藥神麴麥芽化穀食菜蕨化麵食硇砂阿魏山查化肉食紫蕪化魚蟹毒葛花枳椇消酒積麝香消酒積藜蘆牽牛芫花大戟行水飲三稜莪蒁鱉甲消癥

瘕木香檳榔行氣滯礞石玲瓏攻痰積雄黃厭粉攻堅積蜣螂水蛭破血積雖爲泄劑亦能益氣王好古曰故治氣短不能接續大小七香丸集香丸諸湯散中多用之

根如生薑茂生根下堅硬難攖灰火煨透入氣分乘熱擣之或醋磨酒磨入血分或煮熟用

荆三稜　苦平色白屬金皮黑肉白入肝經血分破血中之氣亦通聚血兼入脾經散一切血瘀氣結食停瘡硬老塊堅積乃堅者削之也從血藥則治血從氣藥則治氣須輔以健脾補氣之藥消腫止痛通經墮胎功近香附而力峻虛者慎用色黃體重若鯽魚而小者良醋浸炒或麵裹煨

威靈仙　辛泄氣鹹泄水本草苦氣溫屬木其性善走能宣疎五藏通行十二經絡治中風頭風痛風頑痺濕熱流于肢節之間腫屬濕痛屬熱宜清涼藥河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰順氣清痰則積聚痰水宿膿黃疸浮腫大小腸秘一切風濕痰氣冷痛諸病性極快利積病不痊者服之有捷效然疎泄眞氣弱者愼用和砂仁沙糖醋煎治諸骨哽許色深黑俗名鐵脚威靈仙忌茗麵湯

天麻　辛溫入肝經氣分益氣强陰通血脈强筋力疎痰氣治

諸風眩掉頭旋眼黑語言不遂風濕瘡頑痺小兒驚癇諸風眩掉皆屬肝木病不能榮筋故見前症天麻入厥陰而治諸疾肝氣和平諸風者禁用風藥能燥血故也剔治血血行風自滅根類王瓜莖名赤箭有風不動無風反搖一名定風草明亮堅實者佳濕紙包煨熟切片酒浸一宿焙用

秦艽　苦燥濕辛散風去腸胃之熱益肝膽之氣養血榮筋風藥中潤劑散治風寒濕三者雜合而爲痺風風勝經目風藥中補劑治風寒濕痺多爲痛痺濕勝多爲痛在于骨則體重在脉則血濇不仁在皮則寒遍身痿急榮筋虛勞骨蒸晡珍曰手足陽明經藥兼入肝胆陽明有濕則于足酸痛寒熱有熱則日晡潮熱骨蒸聖惠方治急勞煩熱秦艽柴胡各一兩甘草五錢爲末每服三錢治小兒骨蒸潮熱食減瘦弱秦艽炙甘草各一兩每服一二錢鐥乙加薄荷五錢疸黃酒毒腸風瀉血濕勝風溼之症利大小便牛乳點服形作羅紋相交長大黃白左紋者良菖蒲爲使畏牛乳

豨薟草　苦辛生寒熟温治肝腎風氣四肢麻痺筋骨冷痛腰膝無力風濕瘡瘍著痺痛山脚腎兩虛陰血不足不由風濕而得者忌服風藥能燥血江東呼猪爲豨其草似猪薟臭故名素莖直稜兼有斑點節葉相對背有細毛花黃以五月五日六月六日九月九日採者尤佳去粗莖留枝葉花實酒拌蒸晒九次蜜丸甚益元氣豨薟苦寒故必蒸晒九次加以酒蜜則苦寒之陰瀉盡去而清香之

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

美味見矣數不至九陰濁未盡則不能透骨搜風而却病也
煉蜜三味收之酒調服尤妙唐劉進士朝極言其効

宣除風熱定驚

釣籐鉤　甘微苦寒除心熱平肝風治大人頭旋目眩小兒驚啼癍癗熱癮客忤胎風發斑疹主肝風相火之病相火散行于胆三焦包風靜火息則諸症自除　有刺類釣鉤籐細多鉤者良去籐純用鉤功力加倍久煎則無力

宣去風濕

茵芋　辛苦微温有小毒治風濕拘攣痺痛時珍曰古方治風痺有茵芋酒治產後風有茵芋湯風濕諸症多用之茵芋石南莽草皆治風妙品近世罕知莽草·辛温有毒蘸頭日古方風濕諸酒多用之今人取葉煎湯熱含治牙疼喉痺甚効虺權曰不入湯

宣搜伏風去濕

獨活　辛苦微温氣緩善搜入足少陰氣分以理伏風治本經傷風頭痛同細辛頭旋目眩癰癗濕痺項背強直手足反張煩曰濕痺風勝濕故二活兼能去濕奔豚痿痱腎臟為奔豚風寒濕客不動無風反搖又名獨搖草蘸若活兼水宜用羌活

宣搜遊風發表勝濕

羌活　辛苦性温氣雄而散入足太陽膀胱以理遊風兼入足少陰厥陰氣分腎肝瀉肝氣搜肝風小無不入大無不通治風濕相搏本經頭痛同川芎治太陽少陰頭痛凡頭痛多用風藥者以頭之上唯風藥可到也督脈為病脊強而厥即痙症也傷寒無汗為剛痙傷風有汗為

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

柔痙亦有血虛發痙者大約風痙宜二活虛者忌用中風不語頭旋目赤目疾必用之藥散肌表之痛爲却亂反正之主藥若血虛表入風之邪利周身百節之痛頭痛遍身痛者此屬內證二活並禁用本經別錄二活並主中風諸風不知人中風惟西北風氣剛猛虛人當之往往卒中或喎邪口噤癱瘓不仁剛痙柔痙二活與諸風藥皆可用也若江南閩粵無剛勁之風多濕熱之患質脆氣虛多瘧多火雖有如前等病症相似而實不同此何間主乎火東垣主乎氣月溪主乎濕與痰是也此因氣血兩虛內熱生風痰涎上壅故致猝倒名類中風外感重者先祛風邪而後補中氣內傷重者先補中氣而後驅風邪但內傷無外感者宜清熱化痰養血順氣倘悞用風藥是愈燥其血液而加病矣命曰虛虛所當審慎

二活乃一類二種故入用微有不同獨活出隴西形虛大有力如鬼眼節疎色黃羌活出西羌又名胡王使者色紫節蕃去皮用

宣解表去風勝濕

輕宣發表祛風

防風　辛甘微溫升浮爲陽中之陽入肝瀉肺散頭目滯氣經絡留濕主上部見血用之亦能治崩上焦風邪頭痛目眩脊痛項強周身盡痛太陽經症足膀胱又行脾胃二經爲去風勝濕之要藥凡風藥皆能賊虛濕土伍甲賤之職隨所引而至乃風藥中之潤劑若補脾胃非此引用不能行散目赤瘡瘍若血虛痙急惡頭痛不因風寒內傷頭痛泄瀉不因寒濕火升發嗽陰虛盜汗陽虛自汗者並禁用同黃芩藥又能瀉表止汗合黃耆白朮爲玉屏風散固表聖藥聖其相畏而相使也

荊芥一名假蘇　辛苦而溫芳香而散入肝經氣分兼行血分其性

惡乾薑白斂花殺附子毒

黃潤者良上部用身下部用稍畏革蘼

輕宣散結

升浮能發汗散風熱清頭目利咽喉治傷寒頭痛身强項口面喎邪目中黑花其氣温散能助脾消食氣香入脾通行血脉治吐衄腸風崩中血痢產後血運產後去血過多腹内空虚則自生風故常有崩運之患不待外風襲之也瘰癧瘡腫搜風散瘀破結解毒結散熱清則爲風血涼而毒解爲風血病瘡家要藥荆芥功本治風又兼治血者以其入風木之藏即是藏血之地也李士材曰風在皮裏膜外者荆芥主之非若防風能入骨肉也炒黑治下焦血凡血藥用山庳乾薑地榆蒲黄五靈脂之類皆應炒黑者以黑勝紅也

連翹 微寒升浮形似心若入心故入手少陰厥陰心包心氣分而瀉火兼除手足少陽三焦手陽明經大腸氣分濕熱散諸經血凝氣聚營氣壅遏衛氣鬱滯而成瘡腫利水通經殺虫止痛消腫排膿結者散之凡腫而痛者爲實邪腫而不痛爲虚邪腫而赤者爲結熱腫而不赤爲鬱氣聖藥經曰諸痛癢瘡皆屬心火

輕宣解肌升陽散火

葛根 辛甘性平輕揚升發入陽明經能鼓胃氣上行生津止渴風藥多燥葛根獨能止渴者以能升胃氣入肺而生水耳薦入脾主熱脾主肌肉爲治脾胃虚弱泄瀉之聖藥經曰清氣在下則生飧泄葛根能升陽明清氣療傷寒中風頭痛張元素曰頭痛如破乃陽明中風可用葛根葱白湯若太陽頭痛根獨能升陽明清氣者不可便服升葛湯發之反引邪氣入陽明合病桂枝湯加麻黄葛根又有葛根黄芩解肌湯是用以斷太陽入陽明之路非太陽藥也血痢温瘧丹溪曰凡治瘧無汗要有汗散之要無汗扶本草備要 草 卷七 連翹 葛根

宣發表風濕

白芷　辛散風溫除濕芳香通竅而表汗行手足陽明大腸入胃

手太陰肺經色白味辛故入肺而爲陽明之脈營于面治陽明頭面諸疾

頭痛眉稜骨痛與瘧牙痛風熱鼻淵肺主鼻風熱乘肺上燥經曰腦滲爲涕同細辛辛溫治之腦故鼻多濁涕而淵

癰三經風熱之病及血崩帶下腸風痔瘻癩疽瘡瘍三經濕熱之病活血排膿腸有敗膿血淋露腥穢之物加辛芷如致膈腹冷痛須此排生肌止痛解砒毒

魚尾眼之上角

宣散風濕補肝胆潤腎燥

蛇傷種白芷又治產後傷風血虛頭痛能辟蛇氣虛頭痛者多在清晨宜芎藁倍參耆然其性升散血熱有虛火者禁用色白氣香者佳去皮微炒川當歸爲使惡旋覆花

細辛　辛温散風邪故諸風濕痺痛少陰頭痛獨活爲使辛散浮熱故口瘡喉痺齒蠹者宜之蠹齒蟲蝕至齦膿爛也辛益肝膽故膽虛驚痛風眼淚下者宜之水停心下則腎燥細辛之辛能行水氣以潤之腎燥者心亦躁火盛于水故躁也經曰腎苦燥急食辛以潤之雖手少陰引經心乃足少陰本藥腎能通精氣利九竅故耳聾鼻鼽音虯鼻塞不聞香臭也風寒入腦故氣不宣通寒宜表熱宜清便濇者宜之

宣去風寒濕

蔓本 辛温雄壯爲太陽經風藥膀胱寒鬱本經頭痛連腦者必用之凡巔頂痛宜蔓本防風酒炒升柴治督脉爲病脊强而厥督脉並太陽經貫脊又能下行去濕治婦人瘕痛陰寒腫痛腹中急痛皆太陽經寒濕爲病風泄瀉夏英公病泄醫以虛治不效霍翁曰此風客于胃也飲以蔓本湯而愈蓋蔓本能除風濕故即酒釀音查粉刺和白芷作面脂良

根紫色似芎藭 而輕虛味麻畏青箱

宣發表和裏升陽退熱

柴胡 苦微寒味薄氣升爲陽中之陽肝膽表藥肝爲清净之府無出無入當和解小柴胡湯之屬是也若病在太陽服之太早則引賊入門若病入陰經復服柴胡則重虛其表此味貽禍極多最宜詳慎治傷寒邪熱有大小柴胡及柴胡加芒硝等湯瘧熱結實虛勞肌熱冠宗奭曰柴胡龍膽柴胡加芒硝等湯疫熱結實虛勞肌熱冠宗奭曰柴胡治勞藥性論用葦莖皆言補虛勞本經並無一字時珍曰勞有五若勞在脏肌心包有熱或少陽經寒熱則柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥勞在脾胃有熱或陽氣下陷則柴胡爲升清退熱必用之藥惟勞在肺腎者不可用耳

平少陽厥陰之邪熱 胆胃心包三焦相火

宣暢氣血散結調經爲足少陽 下陷能引清氣上行而

宣去風寒濕

藁本　辛温雄壯、爲太陽經風藥、膀胱寒鬱本經頭痛連腦者必用之、凡巔頂痛宜藁本防風酒炒升柴、治督脉爲病、脊强而厥、督脉並太陽經貫脊、又能下行去濕、治婦人瘕疝陰寒腫痛、腹中急痛、皆太陽經寒濕爲病、霍翁曰此風客于胃也飲以藁本湯而愈蓋藁本能除風濕故耳酒炒升柴、治督脉爲病、脊强而厥、督脉並太陽經貫脊、又能下行去濕、治婦人瘕疝陰寒腫痛、腹中急痛、皆太陽經寒濕爲病、霍翁曰此風客于胃也飲以藁本湯而愈蓋藁本能除風濕故耳

音查　粉刺和白芷作面脂良

根紫色似芎藭而輕虛味麻畏青箱

宣發表和裏升陽退熱

柴胡　若微寒味薄氣升爲陽主陽氣下陷能引清氣上行而平少陽厥陰之邪熱胆胃三焦相火宣暢氣血散結調經爲足少陽胆表藥胆爲清淨之府無出無入不可汗吐下其經在半表半裏法當和解門若病入門若病入胃也飲以柴胡小柴胡湯之劑是也若病在太陽服之則重虛其表此味貽禍極多最宜詳慎治傷寒邪熱崩漏柴胡則太小柴胡及柴胡加有大小柴胡加芒硝等湯瘀熱結實虛勞叩熱冠宗奭曰柴胡本經並無一字龍骨柴胡加芒硝等湯瘀熱結實虛勞叩熱冠宗奭曰柴胡本經並無一字治禁藥性論用單子皆言補虛勞醫家執而用之貽悞無窮有熱或少陽經寒熱則時珍曰勞有五若勞在肝胆心包有熱或陽氣下勞在脾胃有熱或陽氣下柴胡乃手足厥陰少陽必用之藥惟勞在肺腎者不可用耳陷則柴胡爲升清退熱必用之冠氏一槩擯斥殊非通論心下煩熱諸瘧寒熱李士材曰瘧非少陽經愼有熱蓋外邪伏于半表半裏陽勝則熱出與陰爭則寒卽純熱無寒爲癉瘧温瘧純

藥性論雖載著

癉音亶

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

寒無熱爲北癘愛治自少陽而造其極偏枯徹亦必逮還少陽之界使陰陽和而後愈也請少陽而兼他經則有之謂他經而不波少陽則不成其爲瘧矣脈縱屢遷即久瘧正虐而弦之一字貫貫徹之也最易辨皆今人不離少陽猶效之不離干肺故經曰五藏六腑皆令人咳然必傳次與肺也知閣病瘧熱時如火年餘骨立醫用柴胡湯三服脫然瘳只此名勞瘧熱從髓出加貝母桑白皮虛在藏痰在骨髓在骨髓者非柴胡不可若得銀柴胡只須一服南方者力減故三頭眩目赤嘔吐服乃効也時珍曰觀此則得用藥之妙矣

邪在半表半裏則多嘔吐 **脇痛口苦耳聾** 皆肝胆之邪

婦人熱入血室 斷爲血凝即血

胎前產後諸熱小兒痘疹五痫癲熱散十二經瘡疽

血凝氣聚功同連翹治氣熱爲少異 **陰虛火炎氣升者禁用** 銀州者根長尺餘微白治勞痫良北產者如前胡而軟並良南產者强硬不堪用外感生用內傷升氣酒炒用根中及下降用稍有汗欬者蜜水炒

前胡 辛以暢肺解風寒甘以緩脾理胸腹苦泄厥陰胜之熱

寒散太陽膀胱之邪微寒一性云微温**而痰消**氣有餘便是火火則生痰**能除實熱**陰而降功當下氣下則火降**治痰熱喘嗽嘔逆痞膈**

霍亂小兒痃氣有推陳致新之績無外感者忌用按柴胡前胡均是風藥但柴胡性升前胡性降爲不同肝胆經風痰非前胡不能除

皮白肉黑味甘氣香者良半夏爲使惡皂莢忌火

升麻 辛微苦温足陽明太陰引經藥胃脾參者止行須此引之**亦入手陽**

輕宣升陽解毒

宣解表瀉下氣治風痰

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

明太陰大腸表散風邪引葱白陽明風邪同葛根能發陽明之汗引石膏止陽明頭痛齒痛升發火鬱能升陽氣于至陰之下引其温之藥上行以補衛氣之散而實其表柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明清氣上行故補中湯用爲佐使若下元虛者用此升之則下元愈虛又當慎用治時氣毒癘頭痛寒熱陽明頭痛痛連齒頰肺瘡吐膿下痢後重後重者氣滯也氣滯于中必上行而後下降經日地氣上爲雲天氣下降有病大小便秘者用升麻而反通利藥而罔效重加升麻而反遍按凡物必上行而後下降經日地氣上爲雲天氣下爲雨天地不交則萬物不遍也升溪曰氣升則水自降久泄下則生殮泄脫肛崩中帶下之縮急能緩帶脈陰痿足寒目赤口瘡遊風腫毒斑癮成朵如錦紋者爲斑隱隱見紅點者爲疹蓋胃熱失下衝入少陰則助君火而成瘡衝入少陽則助相火而成瘡升葛湯初發熱時可用痘出後氣弱或泄瀉者可少用否則見斑之後必不可用爲

輕發汗解肌

其解散也解百藥毒吐盡毒殺精魅性陽氣升味甘故也朱肱活人書言瘡血入裏吐衄血者犀角地黄湯乃陽明聖藥如無犀角代以升麻二兩性味相遠何以爲代蓋以升麻能引諸藥同入陽明也味甘二兌曰升麻性升犀角性降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血下行歸經耳倘悞用升麻血隨氣升不愈湧出不止乎古方未可盡泥也

麻黄 イヌトウガ

辛苦而温入足太陽膀胱兼走手少陰陽明心大腸而爲肺家專藥發汗解肌去營中寒邪衛中風熱調血脉通九竅開毛孔治中風傷寒頭痛温瘧痰嗽喘氣喘咳症宜瀉肺氣雖用麻黄而不出汗本草未載一日斑屬表虛不得再汗非便閉亦不可下只宜清解其熱

風寒鬱于肺經曰麻黄皮肉不仁木

赤黑斑毒胃熱

毒風瘰癧目赤腫痛水腫風

傷寒亦內有由而得者曰其寒飲食入胃則肺寒則內

腫過劑則汗多亡陽夏月禁用汗者心之液過汗則心血爲人參麻黃同用亦攻補法也東垣曰十劑曰輕可去實葛根麻黃之屬是也邪客皮毛勝理閉拒營衛不行故謂之實二藥輕清故可去之時珍曰麻黃太陽經藥兼入肺經肺主皮毛葛根陽明經藥兼入脾經脾主肌肉二藥皆輕揚發散而所入不同王好古曰麻黃治衛實桂枝治衛虛雖皆太陽經藥其實營衛藥也心主營爲血肺主衛爲氣故麻黃爲手太陰肺之劑桂枝爲手少陰心之劑時珍曰仲景治傷寒無汗用麻黃有汗用桂枝未有究其精微者津液爲汗汗即血也在營則爲血在衛則爲汗寒傷營營血內澹不能外過于衛衛氣外泄發熱而惡寒風傷衛衛氣虛弱津液不固故有汗發熱而惡風然風寒皆由皮毛而入皮毛肺之合也症雖屬太陽然面赤怫鬱咳嗽有痰喘而胸滿非肺病乎蓋皮毛外閉則邪熱內攻故用麻黃杏草同桂枝引出營分之邪達之肌表佐以杏仁喘者加石膏活人書夏至後加石膏治傷寒無汗而喘是麻黃湯雖太陽發汗重劑實爲泄肺而利氣汗後無大熱而石膏知母是皆泄肺火之藥

外合邪是也

根節濟欲汗

散肺經火鬱之藥喘理不密則津液外泄而肺氣虛虛則補其母故用桂枝同甘草外散風邪以滋表內伐肺木以防脾佐以芎藭行脾之津液而和營衛下後微喘者加厚朴杏仁以利肺氣也活人書加黃芩爲陽旦湯以瀉肺熱也參術實爲理脾救肺之藥也發汗

用莖煮十餘沸掠去浮沫或用醋湯浸撈起晒乾備用麻

免大發止汗用根節無時出汗爲自汗屬陽虛夢中出汗爲盜汗屬陰虛用麻黃根蛤粉粟米等分爲末絹袋盛撲之煽珍曰麻黃發汗駛不能禦根節止汗效如影響物理不可測如此自汗有風濕傷風風溫氣虛血虛脾虛陰虛胃熱痰飲中暑亡陽桑痙等証皆可加用當歸六黃湯加麻黃根治盜汗尤疑益其性能行周身肌表故能引諸藥至衛分而固腠理本草但知撲法不知服餌尤良當歸六黃湯當歸歸生地熟地黃芩黃柏黃連各七分黃耆加倍按汗雖爲心液然五藏亦各有汗出于腎疾走恐懼汗出于心持重遠行汗出于脾經日飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于脾

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号 特7-511
ガラス使用

宣發表散寒

紫蘇　味辛入氣分色紫入血分香温散寒通心利肺開胃益脾氣香發汗解肌和血下氣寬中消痰祛風定喘止痛安胎利大小腸解魚蟹毒多服泄人真氣同陳皮砂仁行氣安胎同藿香烏藥温中止痛同香附麻黃發汗解肌同芎藭當歸和血散血同桔梗枳殼利膈寬腹同卜子杏仁消痰定喘同木瓜厚朴散濕解暑治霍亂脚氣　苦面皆紫氣香者良忌鯉魚

宣下氣消痰

蘇子　與葉同功潤心肺尤能下氣定喘止嗽消痰利腸寬腸温中開鬱有蘇子降氣湯梗下氣稍緩虛者宜之葉發汗散寒梗順鬱消痰定喘表弱氣虛者禁用葉腸滑氣虛者禁用子　炒研

輕宣散風熱

薄荷　辛能散凉能清本經温蓋體温而用凉也升浮能發汗樓肝氣而抑肺盛消散風熱清利頭目治頭痛頭風中風失音痰嗽舌胎含漱眼目咽喉口齒諸病辛香通竅而散風熱皮膚癮疹瘰癧瘡瘍小兒驚熱骨蒸破血止痢能治血痢血痢病在凝濇辛能散凉能清虛人不宜多服能發汗疎表夏月多服耗人元氣

蘇產氣芳者良薄荷猫之酒也犬虎之酒也蛎蚧雞之酒也桑櫚鳩之酒也食之皆醉

輕散熱理血

雞蘇　一名水蘇一名龍腦薄荷　辛而微温清肺下氣理血辟惡而消穀治頭風目眩肺痿血痢吐衄崩淋嗌腥口臭邪熱諸病局方有龍腦雞蘇丸　方莖中虛色青似蘇葉而微長密齒面皺氣甚辛烈

輕發汗退目翳。

木賊　溫微甘苦中空輕揚與麻黃同形性亦能發汗解肌升散火鬱風濕入足厥陰少陽血分去肝邪鬱遏不能上通于目及痈痛脫肛腸風痔瘻赤痢崩中諸血病

輕發汗去濕。

浮萍　辛散輕浮入肺經達皮膚能發楊邪汗出蟲癢生于水又能下水氣利小便治一切風濕癱瘓赤遊風濃煮蜜丸治三十六種風濃煮汁浴治惡疾瘡癬遍身

輕發汗散風濕。

蒼耳子　一名菜耳即詩卷耳甘苦性溫善發汗散風濕上通腦頂下行足膝外達皮膚治頭痛目暗肢攣痿痛瘰癧瘡瘍采根葉煮名萬應膏遍身瘙痒作浴湯佳

子如耳　瑞去刺酒拌蒸忌豬肉米泔

瀉火補水潤燥滑腸。

知母　辛苦寒滑上清肺金而瀉火熱腎命相火下潤腎燥而滋陰爲二經氣分藥黃柏爲腎經血分藥故二藥必相須而行安胎莫非清火之用治傷寒煩熱壽勞虛煩久瘧下痢治嗽者清肺火也治渴者清胃火也利二便消浮腫小便利則腫消胃火也退骨蒸者瀉腎火也利二便消浮腫小便利則腫消東垣治便閉以渴不渴分之。

焦氣分便閉而渴乃肺中伏熱不能用淡滲之藥瀉火清金滋水之化源熱在下焦血分便閉而不渴乃真水不足膀胱乾涸無陰則陽無以化宜用黃柏知母大苦寒之藥滋腎與膀胱之陰而陽自化小便自通丹溪有隔二三之治如因脾濕不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔二三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺東垣前茯苓之類燥脾二术之類然苦寒傷胃而日小便不通有熱有濕有氣結于下宜瀉膀胱此正治如因肺熱不能生水膀胱絕其化源宜上二隔三之治如脾濕不運而精不上升故肺不能生水則燥胃健脾此隔二三之治瀉膀胱黃柏知母之類清肺東垣前茯苓之類燥脾二术之類然苦寒傷胃而

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

瀉火燥濕

黃芩 苦入心寒勝熱瀉中焦實火除脾家濕熱療澼痢腹痛便血日澼寒痛忌用凡腹痛有寒熱虛實食積痰血濕痰諸症寒宜温熱宜清虛宜補實宜下食積宜消導痰血宜行血濕痰宜燥燥濕化痰○痛時手不可按者爲實痛按之稍止者爲虛痛寒熱往來黃疸五淋血閉實熱在血分先逐水解渴安胎胎孕宜清熱凍血酒炒則上行瀉肺降火利胸中氣肺主氣熱傷氣熱所以保肺○焦藥火嗽喉腥目赤腫痛養陰退陽補膀胱水過服損胃血虛表出以爲戒上行酒浸下行鹽水拌忌鐵

寒中者禁用得柴胡退寒熱得芍藥治下痢得厚朴黃連止腹痛得桑皮瀉肺火得白术安胎之聖藥消痞日仲景治少陽症小柴胡湯太陽少陽合病下利黃芩湯少陽症下後心滿而煩用之若心滿而不煩者不可與也太陽少陽症雖在半表半裏而胸膈痞悶默默不欲食又兼胃中家濕熱使胃火不流入肺不致刑金即所以保肺也肺虛不宜者苦寒傷土損其母也少陽症滿實兼心脇上焦之邪心煩喜嘔默默不欲食又兼胃中焦之症故用黃芩以治手足少陽柴胡退熱不及黃芩不知柴胡乃苦以發之散火之標也黃芩乃寒能勝熱折火之本也東垣治肺熱身如火燎煩躁引飲而晝盛者宜一味黃芩湯煎服以瀉肺經氣分之火片芩一兩煎

黃明者 良中虛者名枯芩即片芩瀉肺火清肌表之熱內實者名條芩即子芩瀉大腸火補膀胱水上行酒炒瀉肝膽火猪膽汁炒山茱龍骨爲使畏丹皮丹砂

本草備要　卷二

黃連　大苦大寒入心瀉火王海藏曰瀉心實瀉肺也鎮肝涼血凡治血病風爲上部之使黃連爲中部之使地榆爲下部之使燥濕開鬱除煩解渴益肝膽厚腸胃消心痞治腸澼瀉痢而爲嘔噦者同人參煎湯呷之但得下咽便好解其外後調其內首用辛涼以解表云後重宜下腹痛宜和身重宜除濕脈弦宜去風風邪內結宜汗身冷自汗宜溫膿血稠粘宜重劑以竭之下痢赤屬血白屬氣分戴氏曰俗謂赤熱白寒者非也通作濕熱處治但有新久虛實之分心痛伏梁積目痛眥傷人乳癰疽瘡疥諸痛瘡瘍心火酒毒胎毒小兒初生合甘草爲末蜜調令嚥之明目定驚鎮肝除痙同豬肚蒸爲丸殺蛔蛔得苦則伏動苦則扰虛寒爲病者禁用久服黃連苦參反熟從火化也忌按炎上作苦味苦必燥燥則熱矣且苦寒沉陰肅殺之令伐傷生和之氣也韓忌曰黃連與肉桂同行能變心腎下煩刻珍曰治痢用香連丸水火散用黃連乾薑薑黃連吳茱萸治口瘡用黃連細辛吳茱萸湯下血用黃連大蒜一陰一陽寒因熱用熱因寒用最得製方之妙出宣州者粗肥出四川者瘦小狀類鷹爪連珠者良治心火生用虛火醋浸炒肝膽火猪膽汁炒上焦火酒炒有吞酸嘈雜等症亦有吐酸者名雖心宜黃連吳茱萸降火開鬱酌而施中焦火薑汁炒下焦火鹽水或童便炒食積火黃土炒治濕熱在氣分吳茱萸湯炒在血分乾漆水炒點眼赤人乳浸諸法不獨爲之引導蓋辛熱制其苦寒酸寒制其燥性用者詳之黃芩龍骨爲使惡菊花玄參殭蠶白鮮皮畏款冬牛膝忌豬肉胡荽肉脂丸嘗忌肉而不忌蘇府乎殺烏頭巴豆毒黃連鴻心火佐

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

瀉熱療驚　瀉火燥濕補陰

以龍胆瀉肝胆火白芍瀉脾火石膏瀉胃火知母瀉腎火黃柏瀉膀胱火木通瀉小腸火黃芩瀉肺火厄子佐之瀉大腸火黃連佐之瀉三焦火黃芩佐之

胡黃連　苦寒去心熱益肝膽厚腸胃治骨蒸勞熱五心煩熱心窩手心三消瀉而多飲爲上消肺熱也心移熱于肺傳爲高中消胃熱也傳成爲消中是也瀉而小便數有高下分腎熱而水虧也下消腎熱而腸澼痔瘡腸痔腸癰血溢血泄下流傷血又無所施洩則逼肛門而爲溫瘧瀉痢女人胎蒸消菓子證爲小兒驚痘良藥二味元旦觧吃烟責合茶服之甚效　性味功用似黃連故名出波斯國今泰隴南海亦有之心黑外黃折之塵出如烟者眞畏惡同黃連

苦參　苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝膽安五藏濕熱去則血氣和平利九竅生津止渴明目止淚爲治溫病血肝熱治風明目止淚爲治溫病血肝熱痢腸風瀉赤黃疸酒毒熱生風濕生虫又能祛風逐水殺虫治大風疥癩然大苦寒肝腎虛而無熱者勿服張從正曰凡藥皆毒也雖苦參丼草不可不謂之毒人服必偏勝之患按經曰大毒治病十去其七常毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也又曰五味入胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久之由也王冰註云氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有偏絕故令人暴天按人參補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心玄參補腎苦參則右腎命門之藥不在五參之內然名參者皆補

玄參爲使惡貝母惡絲子漏蘆反藜蘆

龍膽草　大苦大寒沉陰下行瀉肝膽而瀉火相火寄于肝胆有瀉無補瀉其

東垣云藥能醫病不能養人食能養人不能醫病　瀉肝胆火下焦

国立国会図書館　タイトル『本草備要2卷』　請求記号 特7-511
ガラス使用

本草備要　卷上

邪熱即所以補之也兼入膀胱腎經除下焦之濕熱與防己同功酒浸亦能外行上行治骨間寒熱腎主驚痫邪氣風火肝經氣濕熱痫黃寒濕腳氣足傷寒濕則成腳氣腫而痛者為濕腳氣宜清熱利濕搜風又有攣縮枯細痛而不腫者名鬼腳氣宜潤燥養血瀉肝散火鬱散忌用寒凉通服損胃根似牛膝而短色黃白味苦如細質衆小豆為使惡地黃甘草水浸一宿暴用

青黛　鹹寒色青瀉肝散五臟鬱火能解中下焦蓄蘊風熱毒治傷寒發斑熱甚傷血裏實表虛則發斑輕如疹子重如錦紋紫黑者熱極而胃爛也多死咽喉痈血陰虛火炎者忌用小兒驚癇痈熱丹熱傅癮癗蛇犬毒　郎說花坼

紫碧嫣嫩者水飛淨用內多石灰須淘數次

大青　微苦鹹大寒解心胃熱毒治傷寒時疾熱狂陽毒發斑陰症見斑忌用黃疸黃汗熱痢喉痺　莖圓葉長而青背淡葉對節生八月開小紅花成簇實大如椒色赤用莖葉

大黃　大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分其性沉而不浮其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分用以蕩滌腸胃下燥結而祛瘀熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥黃故譫語宜下之譫音占溫熱瘧瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚積久成形謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或痰或食聚多是氣　留飲宿食心腹

瘧瀉二便閉結（皆止鬱奪之）吐血衄血閉血枯一切實熱血中伏火行水通經趣膿消腫然傷元氣而耗陰血下多若病在氣分胃虛血弱人禁用病在氣分而用之是爲誅伐無過東垣曰如定禍亂以致太平所以有將軍之號海藏曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤時珍曰仲景治心氣不足吐衄血芩實瀉心包肝膽胃四經血中之火也又治心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃之濕熱非瀉心也病發于陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘在心故曰瀉心經曰太陰所至爲痞滿又曰濁氣在上則生膜脹是已病發于陽而反下之則結胸乃邪熱陷入血分亦結胸在上脘故大陷胸湯九皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分只用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足九陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢甚之火又心本不足肺肝各受其火邪而病作故用黃芩救肺黃連救肝肺者陰之主肝者心之母血之舍也肺肝火退則心血歸經而自安矣張元素曰以苦泄其熱就以苦補其心益一舉而兩得之李上林曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深一微益濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

生熟之不同生用更峻黃芩爲使忌冷水乾漆（欲取通利者不得緊進穀食大黃得穀食便不能通利耳）

韋牛　辛烈有毒屬火善走入肺經瀉氣分之濕熱肺主氣火能平金而肺能達右腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘利大小便逐水消痰殺虫瘴脹治水腫喘滿痃癖氣塊若濕熱在血分及脾胃虛弱人禁用（東垣曰牽牛苦寒誤矣其味辛辣久嚼猛烈雄壯所謂苦寒安

在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱傷也王好古曰黃引則入血用珍曰一婦腸結年餘六十餘服大黃藥則若閉如此三十餘年其人體肥高梁而泥瞑服硝黃藥則若閉如此三十餘年其人體肥高梁而多鬱日吐酸痰乃竟此欠三焦氣滯不能下泌腸胃并血燥也潤藥多滯硝黃入血不能入氣故無效用牽牛為末皂角高末綿裹便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不效予思此乃濕熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸膀胱也用楝實茴香吳山甲諸藥倍牽牛三服而下東垣補下焦陽虛天真丸用鬼牛鹽水炒黑佐沉香杜仲肉桂破故紙諸藥深得補瀉兼施之妙

有黑白二種黑者力速亦名黑丑碾取頭末去皮膚用得木香乾薑良

辛苦大寒屬火性急大能下氣行膀胱水肺中水氣積

急者非此不能除破積聚癥結伏留熱氣消腫除痰止嗽定喘水濕泛濫為腫脹為痰嗽為喘滿屬是也大黃洩陰分血閉亭蘆洩陽分氣閉氣味俱厚不減大黃然有甜苦二種甜者稍緩苦者性急泄肺而傷胃宜大棗輔之昂被輔以大棗補土所以制水

榆皮為使惡僵蚕

井遂　苦寒有毒能瀉腎經及隧道水濕直達水氣所結之處以攻決為用為下水之聖藥故大陷胸湯用之

主十二種水大腹腫滿名水蠱喻嘉言曰開為水穀之海五藏六府之源脾不能散胃之水精于肺而病于中肺不能通胃之水道于膀胱而病于上腎不能司胃之關時其輸泄而病于下以致積水浸淫無所底止王好古曰水者脾肺腎三經所主有五藏六

關也前陰利水後陰利穀

府十二經之部分上頭面中四肢下腰脚外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何藏方可用之拔水腫有痰飲食積成者有濕熱相生隧道閉塞而成者症屬有飲有眼涼傷飲食中氣虛衰而成者症屬不足宜分別治之然其源多因中氣不足而起用利水藥多致不效痰迷頭癎虛者當以健脾爲主使脾實而氣運則水自行宜參苓芪朮湯飲食積聚留飲宿食痰迷頭癎虛者

忌用 皮赤肉白根作連珠重實者良麵裹煨熟用或用甘草蓑苎

大戟 苦寒有毒能瀉藏府水濕行血發汗利大小便治十二

汁浸三日其水如墨瓜蒂爲使惡遠志反甘草仲景治心下以清爲度再麵裹煨熟以立功也有治水腫及腫毒者以甘遂末同用取其相反以立功也二物相反感應如此

水腹滿急痞積聚瘕結頸腋癰腫通經墮胎然瀉肺誤服損傷人漿水煮去骨用得大棗則不損脾畏菖蒲反甘草

杭產紫者爲上北產白者 真氣痺時珍曰痰涎爲物隨氣升降無處不到入心則迷成顛入肺則寒嗽爲喘咳背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則麻痺疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則瘰癧瘡腫陳無擇三因方通以控涎也得氣與大棗之本水也濕也得氣與大棗之本水也濕也非遂能行經絡水濕自消用者能收奇功也錢仲陽謂腎爲真水有補無瀉又云瘡症變黑歸腎用百祥丸以瀉腎水故也瀉其府則藏自不實百祥惟大戟一味能行脇脇之間乃腎邪實而瀉肝也質則瀉其子也大戟浸水青綠肝胆之色也瘡症毒盛火熾則水盡風搶不能化膿而青黑乾焰瀉其津液內竭故救腎扶脾也瀉心乃所以補心瀉腎即所以救腎邪熱退則真陰復矣

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

商陸　苦寒有毒　諸家辛酸沉陰下行與大戟甘遂同功療水腫脹滿腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行加單脹而不腫者名蠱蠱脹爲木橫起土難治腫脹則氣虛朝潛晡急爲氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治腫癰腫喉痺不通薄切醋炙外貼濕熱之病瀉蠱毒傳惡瘡塗喉外貼墮胎孕令人見鬼神　取花白者根赤者傷人只堪貼腐入藥少許小便利則腫消

黑豆湯浸蒸用得蒜良

芫花　苦溫有毒去水氣療癖療五水在五藏皮膚脹滿喘急痛引胸脇咳嗽療瘧者水積胞中堅滿如石黃汗者汗如栢汁久不愈必致癃腫特珍曰仲景治傷寒太陽症表未解心下有水而咳乾嘔發熱或喘或利者小青龍湯主之表已解

有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或嗽者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莝法也十棗湯芫花甘遂大戟等分貿十枚　葉似柳二月開花紫碧色葉生花落陳久者良醋煮過水浸暴用根療疥可毒魚反甘草闘訟者取葉擦皮膚蚘作汞腫假傷皮破人

莞花　辛散結苦洩熱行水提藥主治略同芫花能行十二經通腠理利九竅瀉下焦血中濕熱爲療風水之要藥治肺氣喘嗽水熱氣諸痺下痰降氣溫瘧脚氣足傷寒濕鬱而爲熱濕氣則痺防已爲主藥濕加苡仁蒼朮朮通熱加芩柏風加羌活革蕪痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便秘加桃仁紅花小便秘加牛

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

膀胱爲太陽寒水

藤蔓鴻痛連臂加威靈仙桂枝痛連脇加胆木腫風腫癰腫草又有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論

惡結或濕熱流入十二經致二陰不通者非此不可然性險而健陰虛及濕熱在上焦氣分者禁用

草即木通甘淡鴻氣分濕熱防已苦寒鴻血分濕熱紋色黃名漢防已黑黑黃腥本强者名木防已不堪用

治風用木防已治水用漢防已凡使酒洗惡細辛畏革薤

木通古名通草甘淡輕虛上通心包降心火清肺熱化津液則津液化水道通下通大小腸膀胱導諸濕熱由小便出故導赤散用之凡利小便者多不利大便以小便出水愈通大便愈燥也木通能入大腸亦利大便

輕通行水鴻火

血脈關節治胸中煩熱遍身拘痛楊仁齋云遍身隱熱疼痛屬于心宜木通以通心竅則經絡流行也大渴引飲中焦火盛淋瀝不通小腸相表裏也耳聾洩腎火移熱于小腸則淋秘口燥舌乾舌爲心苗咳痺咽痛俱上焦火鼻鼽鼻窒也熱壅則氣不宣通失音能清肺金肺痿好眠則好睡心爲脾母心熱清則脾熱亦除煩退熱排膿止痛行經下乳火不亢于內氣順血行故經調有準乳通竅催生汗多者禁用丹溪曰肺受熱邪津液氣化汁循常道熱癰閉約束則小便不通宜此治之朱二允曰火在上則淋閉足腫必在下則腫嘔噦浮腫在下則淋閉小便自利便利則諸經之火退則小便自利燥眼赤鼻乾在中則心煩口燥舌乾皆此甘平之性鴻諸經之火火邪皆從小水而下降矣○君火宜木通相火宜澤瀉利水雖同所用各別

簇有細孔兩頭皆通

利濕 熱瀉腎火

澤瀉 甘淡微鹹入膀胱利小便瀉腎經之火邪功當利濕行水治消渴嘔吐瀉痢淋瀝尿血濕精既利水而又止濕精也此乃濕熱爲病不虛滑者言也虛滑則當用補澁之藥○濕熱既除則清氣自行又能養五藏益氣力起陰氣補虛損止頭旋有聰耳明目之功○脾胃有濕熱則頭重耳鳴目昏澤瀉本經列之上品而云聰耳明目故六味丸用之今人多以昏目疑之○小便過利而腎水虛故也服中有水屬膀胱過利則水涸而火生張仲景八味丸用澤瀉冠宗奭謂其接引桂附入腎經李時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補藥必兼瀉邪去則補藥得力一瀉一闔一升一降此乃玄妙後人不知此理當一于補必致偏勝之患矣王履曰地黃山茱萸茯苓丹皮何待接引乎錢仲陽謂腎爲肺不知腎之眞水皆腎經藥莊附右腎命門之藥或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾眞水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去腎中留垢以其微鹹能瀉伏水故必倣昂按六味丸有熟地之溫丹皮之涼山藥之濇茯苓之滲山茱之收澤瀉之瀉相和相濟以成平補之功乃不淡之神奇所以爲古今不易之良方也即有加減或加紫河車一具或五味麥冬杜仲牛膝之類不過一二味極三四味而止今人多揀本草補藥一一加入有補無瀉日客倍于主責成不專而六味之功反一染加于虛倦失製方配合之本旨矣此近世庸師之慢也

輕通利水退熱

新鮮不蠹者良鹽水拌或酒浸用畏海蛤

脾喜燥腎惡燥故兼補爲難

通草 古名通脫木

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音淡通竅寒降退熱催生

輕通利水清熱

燈草 甘淡而寒降心火入心能清肺熱利小腸裏心與小腸相表心火清則肺

清肺清則小腸清而熱從小便出矣 通氣止血治五淋水腫燒灰吹喉痺塗乳止夜啼

車前草 甘寒涼血除熱止吐衄消瘕瘀通淋明目 凡利水之劑多損于目惟此能解肝與小腸之熱濕熱退而目清矣

車前子 甘寒清肺肝風熱滲膀胱濕熱利小便而不走氣與茯苓同功強陰益精令人有子腎有二竅車前子能利水竅而固精竅精盛則有子五子衍宗丸用之時珍曰入服食須佐他藥如治濕痰癰閉暑濕鴻涎目赤障翳能除肝熱催生下胎酒蒸搗餅焙研

瞿麥 苦寒降心火利小腸逐膀胱邪熱爲治淋要藥故入正散用之破血利竅決癰消腫明目去翳通經墮胎性利善下虛者愼用冤宗奭曰心經雖有熱而小腸虛者服之則心熱未清而小腸別作病矣

爛色甚媚媚俗呼洛陽花用蔬殼丹皮爲使惡螵蛸

扁蓄 苦平殺虫疥利小便治熱淋黃疸

引節間有粉三月開細紅花

地膚子 甘苦氣寒強陰益精入膀胱除虛熱利小便而通淋時珍曰無陰則陽無以化亦猶東垣治小便不通用知柏滋腎之意治癰疽散惡瘡煎湯洗瘡亦良

葉作洛湯去皮膚風熱丹腫洗眼除翳盲澁瘡

如萵子類蚕沙惡螵蛸

莖赤葉青

遍淋亦補

石韋　苦甘微寒清肺金以滋化源凡行水之藥必通膀胱而利水道益精氣補五勞利濕清熱之功治熱勞淋閉崩漏癰疽炒末冷酒調服　生石陰處柔韌如皮背有黃毛去毛淨微炙用杏仁滑石射干爲使得菖蒲良生古瓦上者名瓦韋亦治淋

遍淋

海金砂　甘寒淡滲除小腸膀胱血分濕熱治濕熱腫滿五淋熱利小便此金莖痛得扈子牙硝蓬砂治傷寒熱狂大熱利小便此金匱治熱狂瘋抽新之義也

遍除濕熱治諸黃

茵蔯　苦燥濕寒勝熱入足太陽經膀胱發汗利水以泄太陰陽明之濕熱胃有濕熱則發黃黃者脾土色也熱甚者身如橘色汗出染衣正黃如柏亦有寒濕發黃者身熏黃而色暗大抵治以茵陳爲主陽黃加大黃扈子陰黃加附子乾薑各隨寒熱治之又治傷寒時疾狂熱瘴瘧頭痛頭旋女人瘕疝皆濕熱爲病

宜清暑退熱遍利水

香薷　辛散皮膚之蒸熱溫鮮心腹之凝結屬金水而主肺爲清暑之主藥肺氣清則小便行而熱降暑必兼濕治暑必兼濕非暑也治水腫嘔逆口氣煎湯腳氣單煮服之治霍亂轉筋時珍曰暑有納涼太過飲冷太多陽氣爲陰邪所遏反中人內遂病頭痛發熱惡寒煩躁口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散水和脾則愈若飲食不節勞役作喪之人傷暑大熱大渴汗泄如雨煩躁喘促或瀉或吐者乃內傷之症宜用清暑益氣湯人參白虎湯之類以瀉火益元可也若用香薷是重虛其表而濟之熱矣蓋香薷乃夏月解表之藥如冬月之用麻黃氣虛者尤不宜多服今人謂能解暑槩用代茶誤矣李士材曰香薷爲夏月發汗之藥其性溫熟只宜于中暑之人若

身寒寒

字當熟字看傷寒必病熱鴻熱補勞

中熱者誤服之反成大害世所未知按潔古云中暑爲陰症經曰氣盛身寒得之傷寒氣虛爲不足中熱爲陽症爲有餘經曰氣盛身熱得之傷暑故中暑宜温散中熱宜清凉

青蒿　苦寒得春木少陽之氣最早二月生苗

故入少陽厥陰血分

膽治骨蒸勞熱童便搗葉取汁煎膏療勞虛熱之人風毒熱黃久瘧久痢瘡疥惡瘡鬼氣尸疰以其不犯胃氣也

身中鬼氣引接外邪有遊走皮膚洞穿藏麻每發刺痛變動不常者爲飛尸聞哭便作者爲遁尸纏結藏麻沖引心脇每發恍惚得風雪便作者爲風淫躍四末不知痛之所在每發欲死冷便作者爲沉尸鼻身沉重精神錯雜嘗覺昏廢每發者爲尸疰時珍曰月令逼纂言伏內庚日采青蒿懸門庭河辟邪冬至元旦各服二錢亦良則青蒿之鬼疰蠱亦有所伏也明目

童便浸

葉用使子勿使葉使

大燥回陽補腎命火逐風寒濕

根勿使葉

附子　辛甘有毒大熱純陽其性浮而不沉其用走而不守遍行十二經統無所不至能引補氣藥以復散失之元陽引補血藥以滋不足之眞陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒

同乾薑柱枝温引温煖藥達下焦以祛在裏之冷濕治三陰經散寒發汗

傷寒吳綬曰附子陰症要藥凡傷寒雖大熱而脈沉細者或厥冷腹痛甚則唇青囊縮者急須用之若待陰極陽竭而用之已遲矣東垣治陰盛格陽傷寒而赤目赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附湯加人參投半斤得汗而愈此神聖之妙也

中寒中風中暑重則爲傷又重則爲中卒中曰中猶傷曰傷輕爲感

氣厥痰厥虛寒而厥者宜之如傷寒陽盛格陰身冷脈伏熱厥欲寒者投之立斃宜白虎承氣湯

咳逆

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

吸門即咽門之下口也此上焦名膈朝食暮吐宿食積痰在大腸之上口也此下焦名反胃又有痰飲食積血壅寒胃口者如寒痰霍亂轉筋焦爲霍亂寒

風痙痰胃虛胃冷胃稿而成飲可下寒嗽痰寒膈噎膈噎多由氣血兩虛食不可下稿在吸門食下胃脘痛須吏吐出稿在賁門胃之上口也此上焦名噎食下良久吐出稿在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐稿在闌門小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積痰血壅寒胃口者如寒痰霍亂轉筋焦爲霍亂寒

客下焦肝腎爲轉筋熱霍亂者忌用拘攣風痺癱瘓積聚小兒慢驚瘡瘍灰白癱疽不斂一切沉寒錮冷之症經曰陰盛生內寒陽虛生外寒通經墮胎凡寒症用薑附藥宜冷服熱因寒用也若之以寒則陰益甚治之以熱則拒格不納用熱藥冷飲下嗌之後冷體既澈熱性便發情且不違而致大益此反治之妙也又有寒藥熱飲治熱症者此寒因熱用亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱正治寒以熱治熱此反治也經所謂必伏其所主而先其所因

是也故亦曰從治王好古曰用附子以補火必防涸水如陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾真陰愈耗精血日枯而氣無所附麗遂成不救者多矣

母爲烏頭附生者爲附子連生者爲側子

細長者爲天雄兩岐者爲烏喙五物同出異名附子以川產皮黑體圓底平八角重一兩以上者良生用發散熟用峻補

丹溪曰烏附行經仲景入味九用爲少陰嚮導後世因以爲補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯耳相習用爲風藥及水浸麵裹煨令發拆去皮臍乘熱切片炒令內外俱黃去火毒用又法甘草二錢塩水薑汁童便各半盞煮熟去火毒用畏綠豆童便犀角人參黃耆甘草防風忌豉汁反貝母瓜蔞半夏白及白斂服附子後身目紅者用蒺

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

大燥去風。宜吐風發。大燥補陽虛。大燥治手足風。

旋搗汁入黃連甘草各五錢煎服以解其毒如解遲血從耳目鼻口出者死或用泥漿水澄清亦可解

烏頭　功同附子而稍緩附子性重峻温脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭　畏惡同

烏附尖　吐風痰治癲癎取其銳氣直達病所

天雄　辛熱有毒補下焦命門陽虛元素張元素皆云補上焦丹溪曰可爲下部之佐時珍曰其尖皆向下生故下行然補下乃所以益上也若上焦陽虛則屬心病之分當用參耆不當用雄附矣治風寒濕痺爲風家主藥發汗又能止陰汗

側子　散側旁生其性輕揚宜于發散四肢充達皮毛治手足風濕諸痺

草烏頭　辛苦大熱搜風勝濕開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝川烏然至毒無所釀制不可輕投　野生狀類川烏一名烏喙薑汁炒或豆腐煮用熬膏名射罔傳箭射獸見血立死

白附子　辛甘有毒大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病陽明之脉營于面白附能去頭面遊風可作面脂消瘢疵補肝虛祛風痰治心痛血痺諸風冷氣中風失音陰下濕瘡　根如草烏之小者皺紋有節炮用陶弘景曰此藥久絕無復真者今惟涼州生

破故紙一名補骨脂　辛苦大温入心包命門補相火以通君火煖

大燥治頑痰。燥祛風濕治面疾。燥補命火。

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

芸薹油菜也補腎命滑腸

丹田壯元陽縮小便治五勞七傷五藏之勞七情之傷腰膝冷痛腎冷精流腎虛泄瀉腎虛則命門火衰不能薰蒸脾胃脾胃虛寒遲于運化致飲食減少腹脹腸鳴嘔逆泄瀉如鬲釜之下無火物終不熟故補命門相火即所以補脾婦人血氣婦人之血脫氣陷亦猶男子之腎冷精流墮胎孕出南番者色赤嶺南者色綠酒浸三日水浸三日蒸半日用亦有童便入乳浸鹽水炒者得胡桃胡麻良窓甘草唐鄭相國方破故紙十兩洗晒酒浸蒸焉胡桃瓤二十兩去皮爛研蜜和如飴每日酒調一匙服不飲者熟水調蓋破故紙屬火堅固元陽胡桃屬木潤燥養血有木火相生之妙忌芸薹羊血加杜仲名青娥丸肉蓯蓉甘酸鹹溫入腎經血分補命門相火不足滋潤五藏益髓强筋治五勞七傷絕陽不產腰膝冷痛遺精帶下峻補精血時珍曰補而不峻故有從容之號大如臂重至觔許有松子鱗甲者良酒浸一宿刮去浮甲劈破除內筋膜酒蒸半日又酥炙用忌鐵

補陽滑腸

補腎祛風

瑣陽甘溫補陰益精興陽潤燥養筋療弱者宜之滑大腸便燥者啖之可代蓯蓉煮粥彌佳

鱗甲椰北狀類男陽酥炙

巴戟天甘辛微溫入腎經血分强陰益精治五勞七傷辛散風邪治風氣腳氣水脹根如連珠擊破中紫而鮮潔者也中雖紫微有白糝粉色而理小暗者真也蜀產毛

但色白人或醋煮以亂之去心酒浸焙用覆盆子

肉蓯蓉瑣陽巴戟

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

燥補腎命除寒濕

燥補腎命

補腎命去風濕

胡盧巴　苦温純陽入右腎命門煖丹田壯元陽治腎冷陽氣不能歸元同附子硫黃治寒濕腳氣番痩痿冷氣同茴香巴戟川楝實吳茱萸治寒濕腳氣番舶者良云是番萊菔子嶺南亦生酒浸暴或蒸或炒

仙茅　辛熱有小毒助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心腹冷氣不能食温腎腰腳冷痺不能行煖筋相火盛者忌服　葉如茅而略濶根如小指肉黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸去赤汁出毒用忌鐵唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多驗照前製陰乾蜜丸酒服禁食牛乳牛肉許眞君書云其能養肉辛能養筋苦能養膚和苦酒服之必効也

蛇床子　辛苦而温强陽益陰補腎散寒祛風燥濕治陰痿囊濕生子藏虛寒腎命之病及腰酸體痺帶下脫肛喉痺齒痛濕癬惡瘡風濕諸病煎湯洗去風療時珍曰腎命三焦氣分之藥不獨補助男子世人舍此而求補藥于遠域豈非貴耳賤目乎似小茴而細微炒殺毒則不辣以地黃汁拌蒸三遍焦

菟絲子　甘辛和平凝正陽之氣入足三陰經腎脾肝強陰益精温而不燥不助相火治五勞七傷精寒淋瀝口苦燥渴腎燥而性陰熱蓋陰虛清熱故治之祛風明目補衛氣助筋脉益氣力肥健人脾之効無根蔓延草上子黃如黍粒得酒良海去泥沙酒浸一宿曝乾搗末山藥爲使

平補肝腎

覆盆子　甘酸微溫益腎藏而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便服之當覆其溺器故名　澤肌膚烏髭髮女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏固精無凝濇之害金玉之品也　狀如覆盆去蒂淘淨搗餅用時酒拌蒸葉絞汁滴目中出目弦亟除膚赤收濕止淚

平補肝腎

菟絲子　苦溫補腎辛溫瀉肺氣而散肝風益精明目凡補肝明目以肝能散爲補治虛勞腰痛遺精帶下肺痿咳逆喉痺目赤乳閉癥瘕痠痛漏癰腫肺肝腎三經之病催生墮胎刺蕤蓂主惡血故能破癥下胎

沙苑菟蓂綠色似腎故補腎炒用亦可代茶刺蕤蓂三角有刺去

補腎命

淫羊藿　辛香甘溫入肝腎補命門明三焦命門藥益精氣堅筋骨治絕陽不興絕陰不產冷風勞氣四肢不仁手足麻木一名仙靈脾北部有之一日百合食此薑所致故名去枝羊脂拌炒山藥爲使得酒良

使君子　甘溫健脾胃除虛熱殺臟蟲治五疳便濁瀉痢腹虫皆由脾胃虛爲小兒諸病要藥經疏曰五疳弱因而乳停食滯濕熱瘀塞而成脾胃健則積滯消濕熱散水道利而前症盡除矣時珍曰凡殺虫之藥多是苦辛獨使君子甘而殺虫凡大人小兒有虫病俱用此命空心食數枚虫皆死而出忌茶

補脾殺虫消積

按地黃亦甘而能殺虫

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511

ガラス使用

燥脾胃補心腎

益智仁　辛熱本脾藥兼入心腎主君相二火補心氣命門之不足心爲脾母補能滋精固氣又能開發鬱結使氣宣通味辛火故能生土帶温中進食攝涎唾出于胃縮小便腎與膀胱相表裏益智辛温入脾胃而崩濁者禁用

砂仁　即縮砂卷　辛温香窻補肺益腎利胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹痞塞而痞者有虛氣弱而痞者須分虛實治之不宜當用利氣藥恐變爲鼓脹鼓脹內脹而外有形痞脹惟覺滿悶而已皆太陰之爲病也出嶺南形如棗核杉用仁

宣行氣調中

砂仁　即縮砂卷　辛温香窻補肺益腎利胃醒脾快氣調中通行結滯治腹痛痞脹痞塞而痞者有虛氣弱而痞者須分虛實治之不宜當用利氣藥恐變爲鼓脹鼓脹內脹而外有形痞脹惟覺滿悶而已皆太陰之爲病也出嶺南形如棗核杉用仁

宣行氣緩胃

上氣咳嗽赤白泄痢濕熱積滯客于大腸霍亂轉筋奔豚崩帶祛痰逐冷消食醒酒止痛安胎氣行則痛止砂仁亦入大小腸經散咽喉口齒浮熱化銅鐵骨哽得檀香豆蔻入肺得人參益智入脾得黃潤腎燥引諸藥歸宿丹田也經疏曰腎虛氣不歸元用爲嚮導船勝桂附熟藥爲害出嶺南取仁研用

白豆蔻　辛熱流行三焦温煖脾胃轉諸症自平而爲肺家本藥肺主散濕氣消酒積除寒燥濕化食寬膨治脾虛瘧疾寒腹痛吐逆反胃肺胃火盛及氣虛者禁用白睛翳膜敷肺中滯氣太陽經目皆紅筋太陽脈起目皆番舶者良仁如砂仁研用

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

燥脾濕。溫腸。

肉蔻蔻一名肉菓 辛溫氣香理脾煖胃下氣調中逐冷祛痰消食解酒治積冷心腹脹痛挾痰挾食挾寒除瘧截瘧

草豆蔻一名草菓 辛熱香散健脾煖胃破氣開鬱燥濕祛寒除痰化食治瘴癘寒瘧佐常山能截瘧或與知母同用取其一陰一陽治寒熱瘴瘧蓋草菓治太陰獨勝之寒知母治陽明獨勝之火客寒胃痛霍亂瀉痢嘔膈反胃痞滿吐酸痰飲積聚腦寒齒痛酒毒魚肉毒故食料過劑助脾熟耗氣損目宜之

老弱愼用

閩產名草蔻如龍眼而微長皮黃白薄而稜峭仁如砂仁而辛香氣和滇廣所產名草菓稜密子粗而辛臭雖是一物微有不同麵裹煨熟取仁用忌鐵

香附一名莎草根 性平氣香味辛能散微苦能降微甘能和乃血中氣藥通行十二經八脉氣分主一切氣人身以氣爲主氣盛則強虛則衰順則氣下喜則氣上恐則氣耗悲則氣緩驚則氣亂思則氣結勞則氣散七情之氣也香附爲君隨症而利三焦解六鬱六鬱血鬱氣鬱火鬱濕鬱食鬱痰鬱加升降消補之藥止諸痛則不痛治多怒多憂痰飲腫脹腹痛痞滿飲食積聚霍亂吐瀉腎氣腳氣癰疽瘡瘍血凝氣滯所致吐血便血崩中帶下月候不調爲氣

宣調氣開鬱。

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

血配血因氣行經成塊者氣之凝痛者氣血俱虛也色淡亦虛也色紫黑則熱之甚也錯經者氣之亂肥人痰多而經阻氣之藥順則血和暢然須輔以涼血補氣之藥丹溪曰能引血藥至氣分而生血陰陽生陰長之義胎產百病能推陳致新故諸書皆云益氣行中有補丹溪曰天行健運不息所以生生無窮即此理也氣虛時珍曰凡人病則氣滯而餒香附爲氣分君藥臣以參佐以茸草治者虛怯甚速也

去毛用生則土行胸膈外達皮膚熟則下走肝腎旁徹腰膝童便浸炒則入血分而潤燥或蜜水炒鹽炒則補腎氣酒浸炒則行經絡醋入血分而斂浸炒則消積聚其旦以斂薑汁炒則化痰飲忌鐵時珍曰得參朮則補氣得歸地則補血得木香則散滿和中得檀香則理氣醞脾得沉香則升降諸氣得芎藭蒼朮則總解諸鬱得扈予黃連則清

降火熟得荻神則交濟心腎得茴香破故紙則引氣歸元得厚朴半夏則燥脾消脹得紫蘇藿香則治氣快膈得三稜莪朮則治血破積得檳榔青皮則治氣攻堅得乳香沒藥則治瘡腫得艾葉則治血氣病之總司女科聖藥之一語未有發明及此者

木香　辛苦而溫三焦氣分之藥能升降諸氣泄肺氣疎肝氣

和脾氣怒則肝氣上逆調則金能制木而肝氣平木不克土而脾和胃開則氣和食進

痛屬肝脾肝氣橫逆則痛脾氣鬱滯則痛氣血俱病則痛氣血俱虛則痛痰飲食積蛔蟲濕熱瘀血皆能作痛虛者不易治實者易治治一切氣痛九種心痛氣痛血痛食痛蛔痛悸痛痰痛蓄心者不易愈脅肋痛屬肝脾氣鬱者易愈脅痛屬肝腎虛者難愈心痛屬心君火不易愈胃脘痛屬心脾氣鬱者易愈心痛屬心腎虛者難愈腹痛屬寒屬熱屬虛屬實屬氣屬血屬蟲屬食屬痰屬瘀屬水屬氣

宣去惡氣

急殺鬼物禦瘴霧去腹臭實大腸消食安胎氣逆則安胎不安若陰火衝上者反助火邪或用黃栢知母以本香佐之過服泄真氣土好右味辛氣升主氣劣氣不足補也通壅導氣破也安胎健脾開胃補也除疾癖塊破也不同如此祇糊其口與補藥爲仇則補與泄藥爲讐矣

君則泄脾珍曰諸氣膹鬱皆屬于脾脾土焦氣濕則之也中氣不運皆屬于脾中焦氣濕則之者脾胃喜芳香也大腸氣濕則後重痞脹氣鬱則爲痛下焦氣不化則癃秘肝氣逆則嘔吐瀉心腹絞痛肺虛有寒上焦壅熱能

形如枯骨味苦粗舌者良磨汁用亦有蒸用者

麵裹煨熟用者煨腸止瀉畏火

辛甘微溫入手足太陰脾胃快氣和中開胃止嘔胃寒胃熱而嘔者忌用去惡氣治霍

霍香 正氣出交廣方並有節葉微似茄

藿香 古作蘹香 大葉辛

霍香正氣散正氣通暢則邪自除

葉古惟用葉今枝梗亦用之因葉多偽也

下食調中止嘔療

熟入腎膀胱經煖丹田補命門不足開胃小腸冷氣痛亦除痛有七疝氣血寒水腎經以厥陰脈循陰器絡于肝也多因寒濕所致亦有挾虛而發者當加參朮干温散藥中

食損日發瘧小尚

辛平理氣開胃亦治寒痛食料宜之 乾濕腳氣多

如麥粒輕而有細稜者名大茴 大

番舶來實八瓣者名八角茴香妙黃舡得酒良得鹽則入腎

發腎邪故治陰疝

受病于肝見疝子腎大小茴各一兩爲末猪胞一箇連尿入藥酒煮爛爲丸每服五

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

宣温中　宣煙煖胃散寒　宣理氣醒脾

十九

山柰　辛温煖中辟瘴治心腹冷痛寒濕腳氣風亜牙痛　生廣中根葉皆如生薑作樟木香氣入合諸香用

良薑　辛熱煖胃散寒消食醒酒治閊脘冷痛俗言心氣痛非也乃胃脘有滯或有亜及因怒因寒而起以良薑酒洗七次焙研四錢附子一錢四錢附二錢每一錢五分霍亂嘔吐悪噎膈瘴瘧冷癖肺胃熱者忌之

出嶺南高州子名紅薑薑温肺散寒醒脾燥濕消食解酒

東垣、脾胃藥中常用之並東壁土炒用

砂仁　辛温芬香　出温州及黔閩葉如茅根極繁密用根理諸氣開胸鬱治腹卒痛痛風疳齒蠹脚氣消食祛痰治水瀉氣痢牛乳煎服腹痛腸鳴冷痰悪心疫癖陰疝辛散陽明之浮熱治頭痛牙痛鼻淵多服泄真氣動脾肺之火損目　出南番嶺南亦有頻椹子而長青色去梗用頭醋浸刮淨皮窠免傷人肺

藿菱一作稜　辛熱除胃冷温中下氣消食祛痰治水瀉氣痢　出涼州及黔閩葉如茅根極繁密用根

煙草新增　辛温有毒治風寒濕痺瀋氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循常度頃刻而周一身令人通體俱快醒能使醉醉能使醒饒能使飽飽能使饒人以代酒代茗終身不厭故一名相思草然火氣薰灼耗血損年人自不覺耳　閩産者佳

煙草

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

常山　辛苦而寒有毒能引吐行水祛老痰積飲痰有六風痰熱濕痰熱痰飲食痰鬼痰及提出陽分之後用之瘧○常山蜀漆散取其苗性味苦辛寒至苦入口即吐能通痰飲氣痰伏飲于經絡爲瘧飲于肝爲懸飲飲于心爲支飲飲于肺爲痰飲飲于腸胃爲溢飲飲也在上者常山能吐之在下者常山能逐之專治諸瘧然悍暴能損眞氣弱者愼用時珍曰常山蜀漆散瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧○常山蜀漆散瘧風寒暑濕痰食瘧鬼瘧之別須分陰陽虛實不可緊論常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利得烏梅鯪鯉甲則入肝得小麥竹葉則入心得林檎黃則入脾得龍骨附子則入腎得草葉檳榔則入胃蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已李士材曰常山發吐惟生用多用爲然與甘草同用亦吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其或吐如故也泥于老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起○常山吐瘧瓜蒂吐熱痰烏梅斂肺止吐濕痰蔞蘆有毒辛寒至苦入口即吐能通頂令人嘔瘧症用之

實細而黃雞骨者良酒浸一宿炒用忌蔥茗

藜實　辛温温中明目耐風寒下水氣時珍曰古人種藜爲蔬收子入藥今惟酒麴用其汁耳以香藜青藜紫藜爲良有香藜青藜紫藜赤藜木藜水藜馬藜

白鮮皮　氣寒善行味苦性燥行水故燥入脾胃除濕熱兼入膀胱行水道通關節利九竅爲諸黃風痺之要藥時珍曰世醫止施之瘡科淺矣兼治風瘡疥癬女子陰中腫痛濕熱乘虛客腎與膀胱所致

根黃白而心實取皮用惡螵蛸桔梗茯苓草蘇

草蘇　甘苦性平入足陽明厥陰肝脾祛風濕益精明目治風寒濕屬燥屬濕厥陰主風屬筋補肝虛祛風堅筋骨筋骨堅則益精明目治風寒濕以固下焦陽明主肉

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

痺腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痰失溺墜扁遺濁痔瘻
惡瘡諸病皆陽明濕熱流入下焦革辭能去濁分清古方有
革辭分清飲吏國信云若欲興陽先滋筋次若激便清
先分肝火萬金讓命方云凡小便頻數便時痛不可忍苓
此疾必先大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚
則腑熟心躁如此重症也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷
腻之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也
此便數而痛與淋症濇而痛不同宜用革辭一兩塩水炒爲
末每服二三錢使水調轉入大腸仍以蔥湯頻洗穀道令氣
得通則便數
及痛自滅也

有黃白二種黃長鞭白虛軟軟者良意欲爲
使畏大黃柴胡蔺胡恳茗醋時珍曰革辭莢主治不甚相遠豈一類數
種乎革辭根細長淺
白莢莫根作塊赤黃

土茯苓　甘淡而平陽明主藥入胃大腸健脾胃祛風濕脾胃健則
能去濁分清古方有
欲興陽先滋筋次若激便清
先分肝火萬金讓命方云凡小便頻數便時痛不可忍苓
此疾必先大腑秘熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚
則腑熟心躁如此重症也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷
腻之物積有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也
此便數而痛與淋症濇而痛不同宜用革辭一兩塩水炒爲
末每服二三錢使水調轉入大腸仍以蔥湯頻洗穀道令氣
得通則便數
及痛自滅也

有黃白二種黃長鞭白虛軟軟者良意欲爲
使畏大黃柴胡蔺胡恳茗醋時珍曰革辭莢主治不甚相遠豈一類數
種乎革辭根細長淺
白莢莫根作塊赤黃

土茯苓　甘淡而平陽明主藥入胃大腸健脾胃祛風濕脾胃健則

營衛從風濕除則筋骨利利小便止泄瀉治筋骨拘攣楊梅
瘡毒楊梅瘡古方不載明正德間起于嶺表其症多屬陽明
氣虛陰陷而無他經蓋相火寄于厥陰肌肉屬于陽明故
也醫用輕粉汞劑共性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡
即乾癒然毒氣竄入經絡筋骨血液枯涸筋失所養變爲拘
攣瘡漏竟致廢錮土茯苓能解輕粉之毒去陽明濕熱用一
兩爲君攻仁金銀花防風木瓜木通白鮮皮各五分皂莢子
四分氣虛加人參七分血虛
加當歸七分名搜風解毒湯瘰癧瘡腫濕鬱而爲熱榮衛不
和則生瘡腫經云濕
氣害人皮肉筋脈是也土伏苓淡能
滲濕能補患膿疥者煎湯代茶甚妙

大如鴨子連綴而生
俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

杜牛膝　一名天名精　甘寒微毒
一名地菘
殺虫治乳蛾喉痺小兒牙關緊閉急慢驚風絞汁入好酒灌
之即甦以酷拌

国立国会図書館　タイトル『本草備要2卷』　請求記号　特7-511
ガラス使用

鶴風　苦辛有小毒殺五藏虫治蛇嚙心腹痛面白唇紅時發時止者爲重病

肥肉汁調末服　杜牛膝子或曰非此也別是一種最粘人衣有狐氣炒熟則香

牛蒡子一名鼠粘子一名惡實　辛平上升潤肺解熱散結除風利咽腦理瘡嗽消斑疹遍小便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利凝滯性滑而滑利瘀流腰膝之氣虛寒泄瀉者忌服

有白霜拭去用

實似葡萄而褐色酒拌蒸待

山萆根　苦寒鴆心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而

渣傅服汁吐瘧瘡驚風服之亦驚嗽汁止牙痛搗之傅瘡虫螫頭下服汁吐瘧瘡驚風致其吐瘀

毒根白如短牛膝搥敷爲餌

金清肺與大腸相表裏消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之肺金清則大腸亦清

蘸汁喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傅禿瘡蛇咬蜘蛛傷療人馬急黃血熱極所致

苗蔓如荳經冬不凋

金銀花　甘寒入肺散熱解毒清熱解渴補虛療風治癰疽疥癬楊梅瘡毒腸癖血痢風氣濕氣五種尸疰詳青高詩　經冬不凋故一名忍冬又名左纏纏

花葉同功花香尤雀釀酒代茶熬膏並妙忍冬酒治癰疽瘡發背不問發在何處初起便服奇效乾者亦可不及生者力速忍冬五兩甘草一兩水二碗煎至一碗再入無灰酒一碗畧煎分三服一日一夜吃盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到

射干一名烏扇　苦寒有毒能鴆實火火降則血散腫消而瘰結自

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

渣傳服汁吐瘧痰驚風服之亦嗽汁止牙痛搗之傳瘡虫蟲
頸下致其吐痰
毒根白如短牛膝地黃爲使

鶴虱　苦辛有小毒殺五藏虫治蛇嚙心腹痛面白唇紅時發
肥肉汁調末服　杜牛膝子或曰非也別是一種時止者爲虫痛
最粘人衣有狐氣炒熟則香

牛蒡子一名鼠粘子一名惡實　辛平上升潤肺解熱散結除風利咽膈
理痰嗽消斑疹遍小便行十二經散諸腫瘡瘍之毒利凝滯
腰膝之氣性冷而滑利痰瘀虛寒泄瀉者忌服

有白霜拭去用

山萆根　苦寒瀉心火以保金氣去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而
實似葡萄而褐色酒拌蒸待

金清肺與大腸相表裏消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之
肺金清則大腸亦清
蘸汁喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒傅禿瘡蛇咬蜘
蛛傷療人馬急黃血熱極所致

苗蔓如荳經冬不凋

金銀花　甘寒入肺散熱解毒清熱解是解毒補虛療風治癮疹疥癬
楊梅瘡毒腸滯血痢風氣濕氣五種尸疰詳青囊詩　經冬不凋

故一名忍冬又名左纏藤

花葉同功花香尤佳釀酒代茶熬膏並
妙忍冬酒治癮疹發背不問發在何處初起便服奇效乾者
亦可不及生者力速忍冬五兩甘草一兩水二碗煎至一
碗再入無灰酒一碗畧煎分三服一日一夜吃
盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到

射干一名烏扇　苦寒有毒能瀉實火火降則血散腫消而瘡結自

解故能消老血行太陰厥陰之積瘀肺肝治喉痺咽痛爲要
藥古方有射干麻黃湯烏扇散消結核瘕疹便毒瘡毋驚甲無用之皆取其降厥陰相火也
通經開利大腸鎮肝明目扁竹花根也洪水浸一日釜竹葉煮半日用

漏蘆　酸軟堅苦下泄寒勝熱入胃大腸通肺小腸散熱解毒通經下乳排膿止血生肌殺虫治遺精尿血癰疽發背古方以漏蘆湯爲及預解時行瘟疹毒取其寒勝熱又能入陽明故也出閩中莖如油麻深秋枯黑如漆者眞甘草拌蒸連翹爲使

貫衆　苦微寒有毒而能解腹中邪熱之毒治產後血氣腹痛

破癥瘕瘧瘧斑瘡王海藏快化骨硬能軟堅殺三虫斑散用之根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞解毒軟堅以此浸水缸中日飲其水能辟時疫

白頭翁　苦堅腎寒涼血入陽明血分腸大治熱毒血痢東垣曰腎欲堅急食苦以堅之痢則下焦虛故以純苦之劑堅之仲景治熱痢有白頭翁湯加黃柏黃連秦皮

齒痛骨痛腎主齒骨鼻衄禿瘡瘻瘧瘕痼疾血痔偏墜搗傳患處

有風反靜無風則搔近根處白蕈長寸餘故名得酒良

蒲公英　一名黃花地丁甘平花黃屬土入太陰陽明胃脾化熱毒解食毒消腫核治乳癰肝經病同金銀亦毒亦爲遍淋此諸品書

不言治瘰　擦牙烏髭髮有還少丹方東垣曰苦
試之甚驗　寒入腎腎經必用之藥　白汁塗惡刺
葉如萵苣有刺花如卓瓣黃菊四時有花花罷飛絮斷之
莖中有白汁

紫花地丁　辛苦而寒治癰疽發背疔腫瘰癧無名腫毒　葉
如柳而細夏開紫花結角生平地者起莖生潘壑者起蔓
白斂　苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌
止痛治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損斂瘡方多用之故名
白及　同黃柏末油調　同
相須　搽凍耳　蔓赤葉如小桑五月開花七月結實
根如卵而長三五枚同一窠皮黑肉白一種赤斂功用皆同

王不留行　甘苦平其性行而不住能走血分通血脈乃陽明
衝任之藥經曰陽明多氣多血除風去痺止血定痛通經利便下乳催
生俗云穿山甲王不留婦人服之乳長流　治金瘡止血癰瘍散血出竹木刺孕婦忌
用　花如鈴鐸實如燈籠子殼五稜取苗子蒸熟水浸用

冬葵子　甘寒淡滑潤燥利竅通營衛滋氣脈行津液利二便
消水腫通關格下乳滑胎　秋葵覆種經冬至春作子者名
冬葵子根葉同功春葵子亦滑不堪入藥蜀葵花赤者治赤
帶白者治白帶赤者治血燥白者治氣燥皆取其寒滑潤利
之功也

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511
ガラス使用

補腎

旱蓮草一名鱧腸　苦酸汁黑補腎止血烏髭黑髮當及時多收其効甚速

苗如旋覆實似蓮房斷之有汁須臾而黑或酒煎或熬膏

瀉肝明目

青箱子一名草決明　苦寒色青入肝經祛風熱鎮肝明目治青盲赤障重瘀惡瘡　類雞肝而穗尖長

瀉肝明目

決明子　甘苦鹹平入肝經除風熱治一切目疾故有決明之名又曰益腎精瞳子神光屬腎開竅于目其實亦黑豆作枕治頭風狀如馬蹄俗呼馬蹄決明搗碎煎惡火麻仁

輕明目

穀精草　辛溫輕浮上行陽明胃兼入厥陰肝明目退翳之功在菊花之上亦治喉痺齒痛陽明風熱收穀後荒田中生

小兒雀盲者用羊肝一具不洗竹刀剖開入穀精炙熟作丸日三服茶下

瀉通竅坂毒出有形滯物

菟絲子　辛甘有毒性善收亦善走能開通諸竅經絡治偏風不遂口眼喎邪搗餅左貼左貼右貼右即正口噤失音鼻窒耳聾搗爛綿裹塞鼻塞耳

喉痺舌脹油作紙能利水氣治水癥浮腫研服當下青黃水

能出有形滯物治針刺入肉即取敷傷處頻看刺出胞胎不下菟絲二物等分為末每服二錢酒調下藥恐努出好內胞胎下即去之若子腸提出者搗膏塗頂心即收能追膿拔毒

傳瘰癧惡瘡外用屢奏奇功能拔痂氣當外故諸瘡多用之

鴉雀糞燃有毒煙氣味頗近巴豆內服不可輕率　形如牛蜱黃褐有皮一生不得食蔴者一生不得食蔴者之則脹死

7
Z
511

木鱉子　味苦微甘有小毒利大小腸消癥瘕瘰癧疔瘡痔瘻斑蝥毒生肌除五色棟去油者用能毒狗

辛平輕虛上焦腑經藥清肺解熱散血止嗽治嗟痺咽喉外用傷諸瘡良　生濕地朽木上狀如肺肝紫

出取粉用

国立国会図書館　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511

ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『本草備要2巻』　請求記号　特7-511

ガラス使用