

醫方類聚卷之二百五十七

小兒門 十九

驚癇

聖惠方

天治小兒急驚風諸方

夫小兒急驚風者由氣血不和風有實熱為風邪所乘于於心絡之所致也心者神之所舍主於血脈若熱盛則血亂血亂則氣并於血氣血相并又被風邪所搏故驚而不安也



其候徧身壯熱痰涎壅滯四肢拘急筋脉抽掣項背強直牙關緊急是也

治小兒急驚風四肢抽掣拘急壯熱或則口噤天麻丸方

天麻壹分雄黃壹分烏蛇肉壹分蟬殼壹分乾蠍壹分麝香一分天竹黃壹分桂心壹分天南星壹分白芷一分白附子一分半夏一分湯洗膩粉壹分

右件藥並生用擣羅爲末都研令勻煮棗

肉和丸如菜豆大不計時候以薄荷酒下

三九醫方大成集成南北經驗量兒大小

以意加減

治小兒急驚風徧身壯熱筋脉不利手足抽掣口噤面青痰涎壅滯及疳氣所攻肌體瘦弱定生丸方

雀兒飯窠一兩內有物者蠶頭壹兩蘇蘇藜蘆半

去蘆猪牙骨壹分煨薑壹分天麻一分烏

蛇半兩酒浸去毒乾一分瓜蒂一分天南星

壹分 青黛壹分 朱砂壹分 龍腦壹分 雄黃壹分
 炮裂 麝香壹分 膩粉壹分 曲頭棘針壹分 蜣螂
 壹分 麝香壹分 膩粉壹分 曲頭棘針壹分 蜣螂
 去翅足壹分 半夏壹分 湯洗壹分 熊膽壹分 牛黃壹分
 細研壹分 去翅足壹分 半夏壹分 湯洗壹分 熊膽壹分 牛黃壹分

右件藥搗羅為末以猪膽汁和丸如棗豆
 大每先以温生薑湯研膏丸灌在鼻內得
 嚏後以生薑薄荷湯下三丸量兒大小以
 意加減

治小兒急驚風四肢搐搦多涎沫身熱如火

心神驚悸發歇不定救生丹方

龍腦壹錢 牛黃壹錢 雄黃壹錢 朱砂壹錢 盧會壹錢 胡
 黃連壹錢 麝香壹錢 鈆霜壹錢 天竹黃壹錢 曾青
 壹錢 真珠末壹錢 金薄五片 銀薄五片 犀角末
 一錢 乾嗽末一錢 雀兒飯糞三七枚內
 右件藥都研為末五月五日合和用大活
 蟾十枚於眉間各取酥少許同研令勻入
 飯和丸如彈子大著麝枕內用黃梢活蠍
 四十九枚著枕內令藥彈丸觸蠍毒斫入

藥內候毒盡放蠟然後重研藥彈令勻丸如菜豆大不計時候以薄荷汁先研壹丸滴在鼻內男左女右候嚏卽以薄荷酒服兩丸量兒大小以意增減

治小兒急驚風四肢抽掣牙關緊急頭熱足寒雄黃丸方○聖濟總錄治小兒急驚風四肢抽掣口噤上視

雄黃一分 鈿霜半錢 蟾酥半錢 乳香一分 朱砂壹分 熊膽半分 牛黃一分 蠟稍 麝香半分 白

礬灰半分 總錄

右件藥都研爲末以糯米飯和丸如菜豆大不計時候以溫水化三丸服之量兒大小以意加減

治小兒急驚風神效蠟尾散方

蠟尾二十壹 附子狀 巧七箇 全方 二十七 七七

膩粉壹錢 附子尖 半夏底 湯壹七

洗去天南星底 烏頭尖壹七 湯壹七

右件藥搗細羅爲散每服以薄荷湯調下

半字若見在百日內者壹字可分為四服
如要作丸即以棗肉和丸如菜豆大以馬
蘭草湯下壹丸臨時更量兒大小加減

治小兒急驚風返魂丸子方

獨角仙二枚去翅足於瓷合內白殭蠶半
燒勿令煙出研為末
微炒白附子半兩天南星半兩牛黃半兩青
黛半兩乾葛半兩甜葶藶半兩烏蛇肉半兩
朱砂半兩細研
右件藥搗羅為末用猪膽汁并蟾酥如豆

豆大和丸如粟米大先以酒化一丸滴在
鼻中即以酒或水下二丸若不嚏則不在
下藥

治小兒急驚風定命丹方

蟾酥紅豆大桑螵蛸壹枚獨角仙半錢去皮天
漿子七枚犀角屑半兩牛黃半兩雄黃半兩朱
砂半兩細研天竹黃半兩麝香壹分青黛
半兩飛過天南星半兩白附子半兩乾葛半兩膩粉
龍膽半兩去苗

右件藥並生用擣羅爲末以獾猪膽汁和
 丸如黃米粒大每服先以溫水化破一丸
 吹鼻內得嚏五七聲卽以薄荷水下二丸
 量兒大小以意加減

治小兒急驚風壯熱筋脉拘急腰背強硬時
 發搐搦牛黃丸方

牛黃一分麝香一分乾蠍壹分晚蠶蛾壹分
細研微炒微炒波斯青黛壹分
 微炒微炒蚱蟬三枚去翅足三枚波斯青黛壹分
 人研

右件藥擣羅爲末以糯米飯和丸如麻子
 大壹二歲兒每服用薄荷湯下三丸三四
 歲兒每服五丸不計時候量兒大小以意
 加減服之

治小兒急驚風天漿子丸方

天漿子壹七枚牛黃壹分麝香壹分白附

子壹分犀角壹分半夏壹分湯洗壹分蟾酥壹分

猪膽青枚取汁

右件藥擣羅爲末用麪糊入膽汁同和丸

如黃米大不計時候以薄荷湯下三丸量
兒大小以意加減

又方白附子一分天南星壹分天漿子二七

有物者乾嗽壹分烏驢耳塞皂炭子

右件藥搗羅為末研入驢耳塞令勻用糯
米飯和丸如菉豆大不計時候以熱酒研

三丸服之量兒大小以意加減大小以意

治小兒急驚風化涎鎮心牛黃丸方式三四

牛黃一分朱砂半兩天漿子三七枚

者 蚬 蚶 膩 粉 牛 夏 湯 洗 天 南

星 燭 麝 香 會 下 半 黃 木

右件藥搗羅為末研入牛黃等令勻用燒

粟米飯和丸如黍米大不計時候以荆芥

湯下五丸量兒大小以意加減

治小兒急驚風手足抽掣白附子丸方林

白附子壹分白殭蠶壹分烏蛇肉三分

黃牛黃一分乾嗽半兩麝香壹分朱砂半

細研水甜葶藶壹分青黛半兩蟾酥

半錢 蟻 蝦 壹分 微炒 天漿子 三七枚 內有物者

右件藥搗羅為末以豬膽汁和丸如棗豆大每先以冷水研膏九滴入鼻中候嚏竟兩聲便以溫水研三九服之或吐出粘涎得睡便差

治小兒急驚風身熱口噤四肢攣搐通腦方

意 腦 細研 雄黃 細研 蘆會 細研 丁香 牛黃 細研 木香 犀角屑 鈔霜 細研 天漿子 胡黃連

蠍尾 微炒 白花蛇 酒浸去皮骨炙微黃已上各一分 蟾酥 半

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服以桃心湯研下三九量兒大小加減服之

治小兒急驚風口噤手足抽掣眼目直視多吐涎沫四肢壯熱鶴壽丹方

天漿子 七枚 內有物者 微炒 蟬殼 二七枚 牛黃 壹錢 細研 青黛 壹錢 細研 地竜 三條 微炒 蟾酥 壹錢 細研 朱砂 半兩 細研 水飛

過防風半兩去蘆頭 蠶紙壹張燒灰 麝香一錢細研 烏蛇半兩酒浸去皮骨炙令黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黍粒大不計時候以新汲水研下三丸量兒大小以意加減

治小兒急驚風壯熱吐涎紅丸子方

朱砂半兩細研水飛過 蝎尾半兩微炒 膩粉一分 巴豆五枚去皮心紙裏壓去油

右件藥研為末用麵糊和丸如黍米大不

計時候以桃人湯下二丸量兒大小加減

服之神效萬全方同

治小兒急驚風搐搦不止扭坐方

白附子壹分 自殭蠶壹分 赤箭一分 半夏一分 天南星壹分 膩粉半分 蜈蚣壹分 烏蛇肉兩分

右件藥並生搗羅為末用酒薄荷汁各半

蓋同熬為膏和丸如菉豆大不計時候以

溫酒下三丸看兒大小相痛服之

治小兒急驚風口噤搐搦多涎問亂蟾酥丸

方

蟾酥半錢乾蠍壹分白附子壹分龍腦半
研入細麝香半兩朱砂三錢青黛壹錢
研細右件藥搗羅為末都研令勻以猪膽汁和
丸如菉豆大先用妳汁化破一丸滴在鼻
內良久如嚏得數聲即便以薄荷汁下
丸不嚏者難治看兒大小臨時加減

治小兒急驚風痰涎口噤手足抽掣朱砂丸
方

朱砂壹分犀角壹分鈆霜壹分天南星一
細研炮半夏壹分白附子壹分細辛一分
湯洗心壹分白殭蠶壹分烏蛇三分
微炒骨炙巴豆七枚去皮心研
紙裏右件藥搗羅為末壹半用無灰酒壹中盞

蒸為膏入其餘藥末同和丸如菉豆大每
服用生薑自然汁少許入竹瀝壹合煖令
温下二丸量兒大小加減服之
治小兒急驚風心胃痰涎擁閉口噤手足抽

掣水銀丸方

水銀壹分入少棗肉研令星盡膩粉壹分天

南星一分炮裂壹分微炒

右件藥搗羅為末同研令勻用棗肉總錄再添

肉棗和丸如黍米大不計時候煎乳香湯下

五丸神巧萬全方同摠量兒大小以意加

減

治小兒急驚風牙關緊急筋脉抽掣腰背強硬口內多涎雄黃丸方

雄黃壹錢細研麝香壹錢牛黃壹錢朱砂一錢

膩粉三錢巴豆七枚紙裏壓去油半夏二錢湯

去天漿子十枚內有水銀壹錢用棗肉滑物者微炒研令星蒸

右件藥都研為末入水銀膏同研令勻鍊

蜜和丸如黍米大不計時候以溫酒下二

丸量兒大小加減服之

治小兒急驚風化涎除搐搦百靈丸方

黑鉛壹分水銀壹分已上二味同天南星壹分

炮白附子一分炮裂壹分天麻一分蟬殼壹分

微麝香一錢 細研 牛黃青分 細研

右件藥擣羅為末糯米飯為丸如黍米大
不計時候溫酒下三丸

治小兒急驚風多發搐搦或夾食腹痛面色
變青或大小便不通真珠丸方

真珠末半兩 白附子半兩 天南星半兩 滑石

末青分 巴豆三十枚 去皮水浸三日取出曝乾研如膏 膩粉一分

右件藥都研令勻以糯米飯和丸如黃米
大百日已上兒以葱白湯下壹丸壹歲兩

丸三四歲兒三丸更量兒大小看病虛實
加減服之

治小兒初生及月內急驚風客忤邪氣發歇
搐搦涎聚上壅虎睛丸方

虎睛一對 酒浸未 牛黃一分 青黛壹分 麝

香半分 膩粉一分 乾蠍七枚 微炒

右件藥都細研令勻用蠟酥半錢以新汲
水少許浸他如麵糊溲前藥末丸如麻子
大初生及月內即以乳泔化下壹丸子百

日已上兒二九足壹歲兒薄荷湯下三九
更量兒大小加減服之

治小兒急驚風甚者宜服追風丸方

川烏頭壹分炮裂 乾蠍一分 白殭蠶壹分

白附子半分 乾薑半分 天南星半分

右件藥搗羅為末煮槐膠和丸如黍粒大

不計時候以溫酒下五九量兒大小以意

加減

治小兒急驚風頭熱足冷口噤面青筋脉抽

掣多痰延疾狀甚者宜服宣風丸方

巴豆七枚去皮心研 膩粉壹分 川烏頭壹分

裂炮去 白附子壹分 天南星壹分

右件藥搗羅為末入巴豆膩粉同研令勻

以棗肉和丸如黍米大不計時候以薄荷

湯下二九量兒大小以意加減

又方牛黃壹分 麝香一分 硫黃半分 青黛壹分 巴豆三枚

去皮心研紙
裏壓去油

右件藥都研為末以軟飯和丸如黍米大

不計時候以溫水下二丸量兒大小以意加減

治小兒急驚風搐搦口噤乾蠍丸方

乾蠍一分真珠末壹錢虎睛壹對酒浸鈎霜壹分

細研臘月紫驢護子一分細切炒令焦黃

右件藥搗羅為末用鷓鴣臍腦髓和丸如麻子大不計時候以乳汁下壹丸神効二歲已上加丸服之

治小兒急驚風化痰涎定搐搦利藏腑青黛

丸方

青黛壹分甘遂末壹錢膩粉壹錢竜腦壹錢半夏壹分

湯洗七遍焙乾蟾酥壹分麝香壹分

右件藥都細研用湯化蟾酥和丸如粟米大每服以薄荷湯下二丸微瀉是効未瀉再服量兒大小加減服之

治小兒急驚風痰涎壅毒壯熱腹脹天南星

丸方

天南星壹分炮裂朱砂壹分水銀壹分少棗

金薄二七片 銀薄二七片 麝香壹錢 巴豆
三枚去皮心研
紙裏壓去油

右件藥搗羅天南星爲末都研令勻鍊蜜
和丸如黍米大壹歲兒每服以煖水下壹
丸取下惡物爲効二歲已上加丸服之

治小兒急驚風青黛丸方

青黛壹分 蛇頭壹枚 半夏半兩 白殭蠶壹兩 蟾酥二片 柳葉七片
右件藥搗羅爲末以酒煮麩糊和丸如棗

豆大不計時候以薄荷湯化下三丸量兒

大小臨時加減

治小兒急驚風壯熱煩亂大便結澁續隨子

丸方

續隨子一分 青黛壹分 盧會壹分 胡黃連末壹分
麝香一分

右件藥都細研以糯米飯和丸如梧桐子
大不計時候以薄荷湯或溫水化破壹丸
服末差再服

治小兒急驚風兼去心間涎朱砂丸方

朱砂一分 豉三百粒 皂莢一寸炙 砒霜壹分 巴豆

十五粒去皮心
研紙裏壓去油

右件藥先研朱砂砒霜為粉次入豉巴豆
都研令細以棗肉和丸如黍米大壹二歲
兒每服以溫水下壹丸服後得吐瀉為効

治小兒急驚風喉中涎吐不出嚙不入壞涎

丸方

雄黃壹分 朱砂一分 水銀壹分 以少棗
細研令星盡 鈔

霜一分 甘草半分 每服以梨汁下二丸化涎盡為度○聖濟

右件藥都細研以糯米飯和丸如黍米大

每服以梨汁下二丸化涎盡為度○聖濟

總錄治小兒急驚風喉中有涎呀呷有聲

雄黃丹砂鈔霜三味 甘草炙為末 水銀用棗

令星盡 右五味等分壹處研糯米飯丸如

黍米大每服二丸以梨汁下化盡涎為度

更量大小加減

治小兒急驚風化頑涎利胃膈水銀丸方

時候以荆芥湯下二丸量兒大小加減服
天之大氣下三...
 治小兒胎風諸方

夫小兒在胎中之時藏腑未具神氣微弱其
 母或調適失宜食飲不節與怒無慮舉動驚
 胎或坐位不當風或觸肩寒暑痰理阻洩風邪
 所傷入於胞中兒生之後邪氣在於藏腑不
 得宣通而致洗浴當風包裹失度冷觸臍帶
 風傷四肢乳哺不調痰熱壅積則令壯熱吐

明睡裏驚驚心神不安手足抽掣身體強直
 眼目反張故号胎風若風熱不除變成癩疾
 也

治小兒胎風搐搦筋脉拘急牙關或時緊硬

犀角煎方前脈脈入胎風...

犀角煎 兩半 白花蛇 皮骨炙令黃 天南星 兩半

炮白附子 兩半 乾蝎 兩半 天麻 兩半 麻黃 兩半

去根 節

已上七味搗羅為末用無灰酒一大盞

攪令勻於慢火上煎旋添酒不住手攪
以酒盡為度

牛黃一分麝香一分膩粉一分朱砂一分虎睛壹對

龍腦一分水銀一分研令星盡以東

右件藥並細研都入酒煎膏內看硬軟和

并如菜豆大不計時候以竹漉下三九

兒大小加減服之

治小兒胎風驚熱手脚急强天竹黃散方

天竹黃一分牛黃一分胡黃連壹分犀角屑壹分

天麻壹分蟬殼壹分微炒

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候

以新汲水調下壹字二歲已上加藥服之

治小兒胎風驚熱搐搦心神煩亂或渴牛黃

散方

牛黃半分人參半兩去盧頭真珠末壹分甘草半兩

赤微判鬱金半兩川大黃碎半兩朱砂半兩研水飛

過胡黃連兩

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候

以蜜水調下半錢量兒大小以意加減服之

治小兒胎風心熱驚癇朱砂散方

朱砂壹分牛黃壹分天竹黃一分鐵粉壹分麝香半

右件藥都研令細每服以竹瀝調下半錢不計時候量兒大小以意加減

治小兒胎風驚熱牛黃散方

牛黃壹分天竹黃半兩鉉霜半兩馬牙消

壹兩人參半兩去蘆頭朱砂壹分細研

右件藥擣細羅為散每服以薄荷湯調下半錢量兒大小加減服之

治小兒胎風及驚風虎睛丸方

虎睛一對酒浸天麻壹分乾蠍壹分烏蛇肉

壹分羌活壹分獨活一分殭蠶壹分麝香壹分

細研

右件藥擣羅為末以麪糊和丸如棗豆大每服三丸研破不計時候以薄荷湯服之治小兒胎風發作抽掣渾身急強眼目反張

水銀丸方

水銀兩一 天麻兩壹 天南星兩壹 白附子兩壹
 乾蠍壹兩 白殭蠶壹兩 麝香壹兩 竜膽壹兩
微炒 微炒 微炒 微炒 微炒 微炒 微炒 微炒
 細研壹分 藿香壹分

右件藥搗羅為末先用少許棗肉研水銀星盡與諸藥末同研令勻鍊蜜和丸如菉豆大不計時候以薄荷酒研三丸服之量兒大小以意加減得汗出立効

治小兒胎風手足搐搦遍身壯熱牛黃丸子

方

牛黃壹分 水銀壹分 麝香壹分 天南星壹分
細研 細研 細研 細研
 犀角屑壹分 麝香壹分 天南星壹分 天南星壹分
細研 細研 細研 細研
 天南星壹分 麝香壹分 天南星壹分 天南星壹分

右件藥搗羅為末以糯米飯和丸如菉豆大不計時候以薄荷湯化破三丸服之量兒大小以意加減

治小兒胎中久積風熱發歇手足搐搦多驚不離露蜂房丸方

露蜂房半分炒蠶蛾半兩大槩子三十枚

天南星半兩朱砂半兩乾蠍壹分

粉一分牛黃壹分水銀壹分星壹分

右件藥搗羅為末都研令勻以鍊蜜和丸

如棗豆大不計時候煎槐柳薄荷湯下五

丸量兒大小以意加減

治小兒胎風搐搦壯熱多驚天竹黃丸方

天竹黃半兩天南星半兩鈆霜一分胡黃

連半兩牛黃壹分

右件藥搗羅為末研入牛黃等令勻用棗

肉和丸如棗豆大不計時候以乳汁研破

三丸服之量兒大小以意加減如三歲已

上用酒及荆芥湯下

治小兒胎風手足抽掣宜服牛黃丸方

牛黃半兩天竹黃半兩羌活壹分麝香壹分蠍二

頭半全炒

右件藥研羅為細末鍊蜜和為丸如麻子

大一二歲兒不計時候以薄荷湯下三丸

三四歲兒每服五丸量兒大小以意加減
治小兒胎風四肢驚掣痰涎壅滯宜服水銀
丸方

水銀

半兩黑錫半兩

天麻

壹分

乾蠍

壹分半

夏

壹分湯洗

鬱金

一分

白附子

一分

炮裂

右件藥搗羅爲末以軟飯和丸如菉豆大
不計時候以薄荷湯下一丸量兒大小加
減服之

治小兒天癆諸方

天小兒天癆者由藏腑風熱脾胃生涎痰涎
既生心膈壅滯邪熱蘊積不得宣通之所致
也此皆乳母食飲無恒酒肉過度煩毒之氣
流入乳中便卽乳兒遂令宿滯不消心肺生
熱熱毒既盛風邪所乘風熱相兼觸於心臟
則令心神驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢抽
掣故謂之天癆也

治小兒天癆手脚掣動眼目不定有時笑啼
或噴怒爪甲皆青狀似鬼祟宜服龍齒散方

龍齒 半兩 細研 鈞藤 半兩 白茯苓 半兩 蟬殼 二七枚 微炒

黃丹 一分 甘草 一分 川大黃 一分 微炒 鐵粉 一分

一分 細研 朱砂 一分 細研

右件藥擣羅為末入研了藥令勻每服壹

錢以水一小盞煎至六分不計時候量兒

大小分減溫服

治小兒天癆四肢拘急時復搐搦喉內多涎

夜仰驚厥宜服一字散方

天南星 壹分 壁魚兒 壹分 喬麵 壹分 半夏 七枚

用醋石榴殼 壹分 生醋石榴殼 壹分

右件藥都擣羅為末人在石榴殼內以搵

泥封裹於甕下慢火燒以泥乾燥為度取

出去散焙乾擣細羅為散如孩小兒即用

錢上壹字以乳汁調灌之壹歲已上即用

酒調壹字服之當得汗出為效矣

治小兒天癆眼目喎斜手足驚掣發歇不定

牛黃散方

牛黃 半分 木香 一分 羌活 半兩 獨活 半兩 白殭蠶

半兩朱砂半兩細研 乾蠍半分生用 乳香壹顆如栗

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候以乾槐枝煎湯調下壹字量兒大小加減服之

治小兒天癆牙關急硬筋脈搐掣宜服此方

乾蠍七枚生用 麝香半分細研 牛黃半分細研 朱砂壹分細研

胡孫頭骨半分塗酥炙黃

右件藥搗細羅為散不計時候用新汲水

調下半錢極者不過三服差量兒大小以意加減

治小兒天癆及驚風發歇不恒方

鸛鵲糞半分微炒 牛黃半分細研 乾蠍五枚微炒 麝香壹錢

右件藥同研為末不計時候新汲水調半

錢服量兒大小加減服之

治小兒胎風驚風搐搦狀如天癆宜服蟬螂

散方

蟬螂壹分微炒 白膠香壹分 白芥子三十粒 阿魏半分

研白殭蠶十五枚
入

右件藥搗細羅為散不計時候以薄荷酒

調下壹字量兒大小加減服之良久微汗

出差

治小兒天癆眼目搐上筋脉急蚱蟬散方

蚱蟬壹分乾蠍七枚牛黃一分雄黃壹分

右件藥細研為散不計時候以薄荷湯調

下壹字量兒大小加減服之

治小兒天癆多驚搐搦眼忽戴上吐逆夜啼

偏身如火面色青黃不食乳哺並無情緒水

銀丸方

水銀壹兩煮青州棗肉一天南星半兩

半白殭蠶半兩乾蠍二分牛黃壹分麝香壹分

白附子半兩鈇霜半兩

右件藥除水銀膏牛黃麝香鈇霜三味研

令如粉餘四味搗羅為末都研令勻用冰

銀膏和丸如黍米大一二歲兒每服用薄

荷湯下三丸三四歲兒每服五丸不計時

候量兒大小以意加減服之

治小兒天癩牛黃丸方

牛黃壹分朱砂壹分麝香半分蝸牛十枚蟾酥半

鈞藤壹分末壹分水飛過

右件藥都研令細以糯米飯和丸如黍米
大不計時候先以水化破二丸滴在鼻中
相次即以溫水更下三丸量兒大小加減
服之

治小兒天癩四肢抽掣眼目戴上精神恍惚

皮膚乾燥身體似火夜卧不安心中煩燥熱
渴不止宜服保生定命丹方

光明砂一兩細研水飛過膩粉一分金薄四十片牛黃

壹分龍腦壹分麝香壹分水銀壹兩煮肉星盡

右件藥都研如粉入水銀更都研令勻用
粟米飯和丸如麻子大一二歲兒每服用
新汲水研破三片服之三四歲兒每服五
丸不計時候量兒大小以意加減服之

治小兒天癩心胃痰壅攻咽喉作呀聲發熱

多驚不得眠卧保命丹方

牛黃細研壹分 乾蠍壹分 白殭蠶壹分 蟬殼一分

微天麻壹分 天漿子壹分 白附子壹分 蟾壹分

酥半分 犀角屑壹分 天南星壹分 青黛壹分

朱砂壹分 麝香半分

右件藥搗羅為末入牛黃等同研令勻用

獾猪膽汁和丸如菘豆大每服用水少許

化二丸滴三五點入鼻中令嚏數聲後即

冷水服壹丸日五四服量兒大小以意加

減

治小兒天癆身體壯熱筋脉拘急時時抽掣

釣藤丸方

釣藤半兩 天竹黃壹分 牛黃壹分 胡黃連半兩

天麻一分 白附子壹分 乾蠍壹分 朱砂一分

米粉一分 麝香半分

右件藥搗羅為末都研令勻用槐膠和丸

如菘豆大於額門上津調摩壹丸荆芥湯

下膏丸立効二歲已上消詳加之

治小兒天癆眼目翻上手足抽掣發歇不定
天麻丸方

天麻壹分朱砂壹分白芥子壹分鼈齒壹分
麝香半分鈆霜壹分天漿子二七天竹黃壹分
細研

右件藥搗羅爲末鍊蜜和丸如黃米大不
計時候以薄荷酒研下壹丸稍急加至三
丸或五丸立效

治小兒天癆身體發熱口內多涎筋脈拘急

時發驚掣蟬殼丸方

蟬殼一分烏蛇一兩酒浸去皮骨炙令黃青黛一分白
殭蠶壹分麝香壹分白附子壹分獾猪膽壹分
一枚蟾酥錢蜣螂三枚微炒壹分

右件藥搗羅爲末以軟飯入猪膽汁同和
丸如黍米大先將一丸用妳汁研破滴在
鼻中候嚏卽以薄荷湯下三丸三歲已上
加丸服之

治小兒天癆心神煩亂搐搦不定宜服朱砂

九方

朱砂壹分 細研麝香半分 細研乾蠍二七枚 微炒白僵蠶

一分 微炒胡黃連壹分 熊膽 壹分 牛黃 半分 細研

右件藥搗羅為末同研令勻以粟米飯和

丸如菉豆大不計時候以金銀湯下三九

量兒大小增減服之

治小兒天癆多涎及搐搦不定抵聖歸命丹

方

錫悵脂一兩 細研 水淘 黑水 令盡牛黃半分 水銀一分 以少 棗 瓢

研令 星盡麝香半分

右件藥都細研用軟粳米飯和凡如黍米

大不計時候以新汲水下二九量兒大小

增減服之

治小兒天癆多涎搐搦不定方

乾蠍半兩 微炒羌活半兩 麝香 一錢 細研鈔霜半兩 麝香 細研

酥半錢 研入

右件藥搗羅為末同研令勻鍊蜜和丸如

菉豆大不計時候以乳汁研破兩丸服之

更量兒大小以意加減

又方天竹黃壹分朱砂壹分乾蠍壹分白附

子壹分炮裂

右件藥搗羅爲末同研令勻以鍊蜜和丸

如菜豆大不計時候以淡竹瀝研下二丸

量兒大小臨時加減

治小兒天癆驚風搐搦牙關急閉目吐涎玄

參九方

玄參兩乾蠍壹分水銀兩

右件藥搗羅爲末以棗瓠研水銀星盡內

少鍊了蜜丸藥末和丸如菜豆大三歲已

下用薄荷湯研破三丸服之三歲已上卽

加丸數服之

又方天竹黃壹分雄黃一分阿魏半燕脂分

右件藥同研爲末以醋壹茶椀煎成膏入

蟬螂天麻烏蛇末各半分和丸如米粒大

不計時候以溫酒下三丸乳汁下亦得量

大小加減服之

治小兒天癆口噤戴目手足搐搦不定天南星丸方

天南星壹分天雄壹分白附子壹分半夏一分湯洗七遍

去水銀壹分後於銚子內先鎔黑錫半滑水銀結為砂子細研

右件藥生搗羅為末用槐膠和丸如黃米

大壹歲壹丸二歲二丸不計時候以溫薄

荷酒下

治小兒天癆藏腑風熱壅滯四肢抽掣大小便利膩粉丸方

膩粉半巴豆霜半麝香壹分地龍一分馬

牙消一分麝香半細研

右件藥都研令細以糯米飯和丸如菉豆

大壹歲壹丸以薄荷湯下三歲已上卽服

二丸

又方巴豆霜一分乾蠍半兩麝香半兩白殭壹兩半

右件藥搗羅為末以麪糊和丸如菉豆大

三歲兒以金銀犀角煎湯下壹丸如不動

靜更服兩丸下惡物烱煤及瓜汁相似便
差量兒大小加減服之

治小兒天癆及急驚風搐搦白殭蠶散方

白殭蠶一枚炒壹枚蚘螂壹枚炒壹枚葶藶子十枚炒壹枚

右件藥搗細羅為散用温酒調注入口中

令睡汗出即差如睡多不用驚起如壹二

歲兒患急即頓服之稍慢即分為三服

治小兒天癆藏腑壅滯壯熱搐搦宜服保生

丸方

巴豆七枚生用壹枚天南星壹枚蚘螂五枚
去皮心壹枚炮裂生用

右件藥時閉時初夜於北極下露之壹宿

明日且搗羅為末取豉四十九粒口內含不

語脫却皮爛研和丸黍米大隨年丸數以

温冰水下將味味搗搗取取入入散散內內即

又方五靈脂兩白附子壹分天南星壹分
生用生用

右件藥搗羅為末以頭醋壹升熬成膏後

命入蝸屎末二錢麝香末壹錢雜如紫豆

大每壹歲壹丸以姊汁研破服之如無姊

汁即以金銀湯下入口差

治小兒天癆眼目痛上并口垂掣動宜服此

方

天壁魚兒十枚濕者下枚乾者上枚天南星一分

右以妳汁相和研爛更入妳汁同灌入口

立効

治小兒天癆備急塗腹方

川烏頭末錢芸臺子末錢

右件藥取新汲水調塗斯在頂上立驗

治小兒壯熱欲發癩諸方

夫小兒未發癩之前癩欲發之候或壯熱連

滯或搖頭弄口或眼目抽掣如此是欲發癩

宜早療之也

治小兒未滿百日聚口吐沫此欲作癩候腹

內有冷熱癰實宜服牛黃散方

牛黃一分細研川大黃三分判柴胡一分半細

辛一分黃芩一分當歸一分判甘草壹分判蚱

蟬三枚防風壹分去蟻蝦三分

右件藥搗細羅爲散每服壹錢以水膏小
盞煎至五分和滓不計時候量兒大小加
減溫服

治小兒心腹結實身體壯熱四肢不利心神
多驚欲發癇者扶神散方

扶神壹兩川升麻壹兩玄參一兩秦艽壹兩

寒水石二兩龍膽一兩去川芒消三兩川大黃

三兩到
碎微炒

右件藥搗龕羅爲散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓分溫二服早晨午後夕
壹服更量兒大小以意加減

治小兒壯熱發癇或時時四肢抽掣多吐白
沫宜服釣藤散方

釣藤半兩人參一分去子芩壹分川大黃壹分

微炒三枚犀角屑壹分甘草半兩川升

麻半兩不膏兩

右件藥搗羅爲散每服一錢以水一小
盞煎至五分去滓入竹瀝半合牛黃末壹

字看兒大小分減服之

治小兒壯熱發癩心神驚悸多啼或吐白沫
龍齒散方

龍齒壹兩 鈞藤三分 川升麻三分 子芩三分 防風三分

去蘆犀角屑三分 麥門冬壹兩 去心焙 川芒消兩

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水壹小

盞入竹葉七片煎至五分去滓分為二服

日四服量兒大小以意加減

治小兒壯熱欲發癩宜服退熱清涼散方

白藥壹分 甘草壹分 麝香一分 黃芩一分 天竹

黃壹分 朱砂半兩 麝香半兩 細研

右件藥搗細羅為散都研令勻不計時候

以溫水調下半錢量兒大小加減

治小兒頭額體背俱熱大便秘澁眼赤心悶

乍睡乍驚精神昏濁與人不相主當欲作癩狀

治小兒驚熱入心擬成癩疾面色不定啼淚

不出發熱作時不喫乳食大便秘澁眼翻露

白手足逆冷牛黃丸方

牛黃壹分川大黃壹分到獨活一分川升麻

半兩琥珀半兩菘豆粉半兩大麻人半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大
不計時候以熟水研壹丸服之至五七歲

加金銀薄各五片藥兩丸研化下服之

治小兒欲發癩極熱不已生葛汁飲子方

生葛根汁壹合竹瀝壹合牛黃如杏仁

右件藥相和每服半合量兒大小加減服之

治小兒欲發癩壯熱如火洗浴石膏湯方

石膏五兩苜蒲二兩雷丸三兩

右件藥搗碎以水煮取三升適寒溫浴兒
并洗頭面佳

治小兒一切癩諸方

夫癩者小兒惡病也十歲已上為癩十歲已
下為癩其發之狀或口眼相引而目睛上戴
或手足瘳縱或背強直或頸項反折諸方說
癩名證不同大較其發之源皆因三種三種

者風癩驚癩食癩是也風癩者因衣厚汗出而風入為之驚癩者因驚怖大啼乃發食癩者因乳哺不節所成然小兒氣血微弱易為傷動因此三種變作諸癩凡諸癩正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲戾不隨也

小有

癩者風入為之驚癩者因驚怖大啼乃發食癩者因乳哺不節所成然小兒氣血微弱易為傷動因此三種變作諸癩凡諸癩正發手足掣縮慎勿捉持之捉則令曲戾不隨也

十日已上至朞歲而癩者皆由五脉不流骨法不成亦由乳養失所風邪所中也病先身熱瘈瘲驚啼喚而後發癩成病脉浮者為陽癩內在六腑外在肌膚猶易治病先身冷不驚掣不啼喚仍成病發時脉沉者為陰癩內在五藏及在骨髓極難治也病發身軟時醒者謂之癩也身強直反張如弓不時醒者謂之瘈也凡脉浮之與沉以別其病在陰陽表裏耳其浮沉復有大小滑澁虛實遲快諸證

各依脉形爲治也

凡癩病者小兒之惡病也或有不及求醫而致困者也然氣發於內必先有候常宜審察其精采其候手白肉際脉黑者癩候魚際脉赤者熱脉青大者寒青細爲平也鼻口乾燥大小便不利是癩候眼不明上視喜陽是癩候耳後完骨上青絡盛臥不淨是癩候清且大脉刺之令血出也癩候髮逆上啼笑而脂色不變是癩候也鼻口青時小驚是癩候鼻

熱小便難是癩候目閉青時小驚是癩候身熱頭恒汗出是癩候身熱吐兒而喘是癩候身熱目時直視是癩候臥惕惕而驚手足振搖是癩候臥夢笑手足動搖是癩候意氣下而忌怒是癩候疾咽乳不利是癩候目童子卒大異常是癩候喜久目上視是癩候身熱小便難是癩候身熱目視不精是癩候吐利不止癩痛時起是癩候已上二十條皆諸癩之初發候也

又有五藏癩及六畜癩肝癩之爲病面青目
反視手足動搖心癩之爲病面赤心下有熱
短氣息微脾癩之爲病面黃腹大喜泄肺癩
之爲病面目白口中沫出腎癩之爲病面黑
俛仰直視如尸膈癩之爲病目睛及上四肢
不舉大小腸癩之爲病四肢不動搖馬癩之
爲病張口播頭馬鳴欲反折牛癩之爲病目
正視腹脹滿鷄癩之爲病延頭反折喜驚自
搖羊癩之爲病揚目吐舌猪癩之爲病喜吐

末犬癩之爲病兩手屈如拳凡諸癩在陽屬
腑則易治在陰屬藏及人骨髓則難治若久
而不愈者必見困矣

治小兒五種癩手足動搖眼目反視口吐涎
沫心神喜驚身體壯熱朱砂散方

朱砂壹分細研白歛壹分桂心半兩牛黃壹分露蜂
房壹分杏仁一分湯浸去皮尖雙人麩炒微黃

右件藥搗細羅爲散入研了藥令勻每服
以乳汁調下壹字日五服量兒大小加減

服之

治小兒二十五種風癩無時發動宜服天麻散方

天麻三分防葵二分牛黃壹分真珠末三分天竹

黃三分葳靈仙三分蛻蝦三分川芒消三分

右件藥搗細羅為散更何乳入付有疾之時取雞冠血三兩滴子新汲水壹合打散

令勻調下半錢更隨兒大小以意加減

治小兒二十四種驚癩壯熱掣手足嘔逆夜

啼睡卧不安驚痢虎睛丸方

虎睛一對微研牛黃半兩梔子半兩白茯苓

兩半人參壹兩去黃芩兩生犀角屑一兩○

兩二鈞藤壹兩蛇蛻皮分萬全方壹分川大

黃壹兩剉碎微炒

右件藥搗羅為末和研令勻鍊蜜和丸如

梓桐子大一二歲兒院方三每服以熱水

研破壹丸服之三四歲兒每服二丸以粥

飲下亦得更隨兒大小以意加減

治小兒二十四種驚癇壯熱抽掣手足嘔吐
夜啼睡卧不安虎睛丸方

虎睛對微細研牛黃壹分人參半兩去白茯苓壹分川大黃壹分炒蛇蛻皮五寸

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菉豆大一

二歲兒每服以乳汁化破五丸服三四歲

兒薄荷湯化破五丸服更看兒大小以意

加減

治小兒二十四種諸驚癇眼口牽掣嚼舌反

拗牛黃散方

牛黃壹分細研釣藤壹兩石膏壹兩半甘草一

赤微蛇蛻皮半分白飲壹

右件藥搗羅為散每服二錢以水壹小盞

煎至五分去滓入牛黃壹字不計時候量

兒大小分減溫服

治小兒諸癇驚傷掣痰及中客忤宜服牛黃

丸方

牛黃半兩人參半兩去蘆頭細辛半兩炸蟬七枚

去翅

去翅

去翅

去翅

去翅

足微 川大黃 青兩到 赤芍藥 兩 當歸 兩

炒 蛇蛻皮 五寸炙 甘草 三分炙 藜蘆根 兩

防風 半兩去 巴豆 三十枚去皮 麝香 一分

右件藥搗羅為末入巴豆研令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如麻子大初生一月至百

日兒每服壹丸壹歲至三歲服兩丸四歲

至五歲兒每服三丸並用薄荷湯下令快

利為度 神功萬全方同

治小兒諸癩蛇蛻皮散方

蛇蛻皮 五寸微炙 細辛 半兩 甘草 半兩炙 釣藤

半黃耆 兩 川大黃 一兩到 蚱蟬 四枚炙令

牛黃 壹分細研

右件藥搗細羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分和滓量兒大小分減服之

治小兒未滿月及出月壯熱癩宜服釣藤

散方

釣藤皮 一分 蚱蟬 二枝 柴胡 半兩 升麻 半

蛇蛻皮 五寸微炙 甘草 壹分炙 石膏 三分 川大

黃半兩到黃芩兩半

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

蒸煎至五分去滓入竹瀝半合更煎三兩

沸量兒大小分減溫服

治小兒初生百日内發癩蚱蟬散方

蚱蟬三分黃芩兩半赤芍藥二分細辛兩半釣藤

分蛇蛻皮五寸炙黃耆兩半甘草兩半微赤到

牛黃一分麝香壹分川大黃一兩到碎微炒

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

之 羹煎至五分去滓量兒大小分減溫溫服

治小兒百日内發癩連發不醒及胎中帶風

體冷面青身體反張麻黃散方

麻黃壹分去根節甘草壹分羌活三分柴胡三分

去苗川大黃壹兩到川升麻壹兩子芩壹兩枳殼

半兩去葛根半兩蛇蛻皮五寸炙杏仁

雙人湯浸去皮尖石膏一兩半釣藤壹兩蚱

蟬二十枚

右件藥搗龕羅為散每服膏錢以水膏小
盞煎至五分去滓更入竹瀝半分煎三兩
沸量兒大小分減服之

治小兒百日已來至三四歲肝心風熱發驚
癇掣縱身體如火犀角散方

犀角屑一兩 鈞藤兩 黃芩兩 升麻兩 麥門
冬一兩半 竜齒兩

右件藥搗龕羅為散每服壹錢用水壹小
盞入竹葉七片煎至五分去滓量兒大小

分減溫服

治小兒壹歲至四歲壯熱入驚發癇石膏散
方

石膏一兩 細研 炸蟬二枚 柴胡壹兩半 川升麻

分二 鈞藤分三 子芩一兩 知母一兩 梔子人兩 龍齒

兩 赤芍藥兩半 麻黃三分 去 葛根壹兩 川大

黃兩 甘草壹分 微赤到

右件藥搗龕羅為散每服一錢以水壹小
盞煎至五分去滓入竹瀝一合更煎壹兩

沸量兒大小加減溫服

治小兒四五歲忽患驚癇釣藤散方

釣藤兩半犀角屑壹分牛黃壹分虎睛壹對防

風壹分梔子仁兩半石膏半兩細研水飛過蚱蟬

一枚壹分獨活壹分人參一分去

右件藥搗細羅為散每服壹錢水壹中盪

煎至五分和滓分為二服如人行二三里

進壹服更量兒大小以意加減

治小兒諸癇宜用固顛大黃膏方

川大黃三分雄黃一分丹參一分黃芩壹分生商陸

兩雷丸兩半猪脂壹斤附子半兩去皮臍生用

右件藥搗碎以猪脂先入鍋中以文火熬

令鎔以綿濾過然後下藥煎令七上七下

去滓細研雄黃下膏中攪令至凝於瓷器

中盛每用少許熱炙手摩兒顛及掌中背

脅皆使遍訖以蛤粉粉之

治小兒癇及百病傷寒雷丸膏方

雷丸一分甘草兩壹防風壹兩去白朮桔梗

三分去 莽草一兩 川升麻壹兩

右件藥搗羅為末以猪膏壹片先入鐺慢火煎令鎔後下藥末以柳篋不住手攪成膏篩濾入瓷合盛之每有患者摩其頂及背上

治小兒風癩諸方

夫小兒風癩者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣厚汗出腠理開張當風解脫風邪因茲而入初得之時先屈指如數乃發掣縮

是也巢氏病源當與施心湯又病先身熱瘈瘲驚啼或

笑巢源而後發癩脉浮者為陽癩內在六腑

外在肌膚猶得易治病先身冷不驚瘈不啼

笑而乃發癩脉沉者為陰癩內在五藏及在

骨髓極者難治病發時身軟時醒者謂之癩

身強直反張如弓不時醒者謂之瘵診其心

脉滿大肝脉小急瘈瘲筋攣尺寸脉浮俱直

上直下此者督脉必腰背強不得俛仰小兒

風癩三部脉緊急其癩可治小兒脉多似雀

啄巢源似雀鬪要若緊者必發癩諸癩發手
足抽掣慎勿持捉之則令曲戾不隨也

治小兒風癩筋脉抽掣夜卧驚悸四肢煩躁
皮膚壯熱天竹黃散方

天竹黃壹分細研牛黃壹分知母一分赤芍藥壹分

犀角屑壹分鈞藤壹分玄參壹分桔梗壹分去川

大黃一分剉壹分龍骨壹分白殭蠶一分茯神壹分

蟻蛭七枚去壹分檳榔壹分紙壹分

右件藥搗細羅為散每服以薄荷湯調下

半錢一日五服隨兒大小以意加減

治小兒心藏久積風熱發癩或徧身壯熱多

饒痰涎睡即驚悸手足抽掣水銀丸方神巧

方名軟銀丸

水銀兩黑鉛兩內半兩同水銀於銚子乾蠟二

壹枚頭尾全者微炒半夏壹分湯洗白附

子壹分天麻壹分鬱金壹分麝香壹分

右件藥搗羅為末都研令勻用糯米飯和

丸如麻子大每服以薄荷湯下三丸量兒

大小以意加減

治小兒風癩發動無時壯熱心煩筋脉拘急
牛黃散方

牛黃壹分木香壹分乳香壹分朱砂壹分白僵

蠶一分乾蠍七枚羌活兩

右件藥搗細羅為散不計時候以溫竹瀝

半合調下半錢量兒大小以意加減

治小兒風癩并心熱多驚七寶鎮心丸方

虎睛一對酒浸微炙金薄五拾銀薄五拾朱砂

牛兩細研雄黃兩琥珀兩真珠兩竜腦壹

麝香壹分

右件藥都細研如麩以棗肉和丸如棗豆
大每服以井華水下三九日三服量兒大

治小兒風癩精神昏悶遍身壯熱不得睡卧

茯神散方

茯神壹分木通壹分人參壹分川升麻壹分

子芩壹分龍齒三分犀角屑壹分鐵粉三分蜣螂三

微炒去翅足

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水煮小
煮煎至五分去滓入竹瀝半合不計時候
量兒大小分減溫服
治小兒心藏壅熱變為風癩身體壯熱驚悸
不安心神煩悶多啼少睡犀角散方

犀角屑三分羌活三分川升麻三分扶神兩半白鮮

皮兩半葛根兩半柴胡三分蛇蛻皮一分蚱

蟬參枚微炒石膏二兩甘草壹分鈞藤去翅足

兩半麥門冬兩半川大黃壹兩剉兩子苓壹兩

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小以意加減服

之神方同

治小兒風癩自三歲已來至十歲不差發時

口中白沫大小便不覺虎睛丸方

虎睛一對酒浸朱砂半兩研兩麻黃半兩

節鈞藤兩半鐵粉三分防風參分去兩子苓叁分川

大黃叁分剉兩龍齒壹兩細研銀屑叁分梔子兩

分羌活參柴胡半兩白鮮皮半兩升麻半兩
 雷丸兩沙參半兩去苗兩細辛一分石膏一兩細
 過牛黃兩細研兩蚱蟬四枚微炙去足翅
 右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸
 如菜豆大三歲已下以薄荷湯下三九日
 三服三歲已上以意加丸服之

治小兒風癩及一切驚熱蛇蛻皮散方

蛇蛻皮五寸細辛半兩鈞藤兩黃耆半兩川
 大黃一兩微炒兩蚱蟬四枚微炙去翅足甘草半兩微赤兩

鈎霜半兩細研

右件藥搗羅為散每服一錢以水壹小
 盞煎至五分去滓入牛黃末壹字放溫量
 兒大小臨時加減服之

治小兒風癩及天癩宜服雄黃散方

雄黃半錢朱砂壹分牛黃半分熊膽半錢天麻壹分
 晚蠶蛾半分天竹黃壹分麝香壹錢鈎霜壹分馬牙
 消半兩

右件藥同研如粉常以不津器貯之每服

用溫水調下半錢量兒大小以意加減服之

治小兒風癩發即迷悶手足抽掣口內多涎
良久不醒牛黃丸方

牛黃青分細研天南星兩半白附子兩半白僵蠶兩半

乾蠨青分半夏七分湯洗七遍去滑蟬殼壹分天麻兩半麝

香青分細研

右件藥並生用擣羅為末又以水銀一兩
煮棗三七枚去皮核與水銀同研令星盡

入前藥末和丸如菜豆大如隔日發者每
服煎黃牛乳汁下三丸日三服如驚風即

煎荆芥湯下兩丸

治小兒風癩手脚抽掣翻眼吐沫久患不可
者宜服黑金丹方

黑鈔兩半水銀兩半天南星兩半炮裂

右件藥先鎔鈔為汁次下水銀結為砂子

細研與天南星末和勻以糯米飯和丸如
菜豆大每一歲兒以乳汁研壹丸服之兒

稍大以意加之

治小兒風癩睡中驚叫兩眼翻露及疳風撮

口疳癆驚風並服此半黃散方

半黃一分天竹黃一分馬牙消一分兩鈔一分

右件藥細研為散不計時候以熟水調下

半錢量兒大小以意加減

治小兒心熱風癩發歇不定方

天靈蓋一分塗酥黃連一分去鬚

右件藥搗齏羅為散每服壹錢水壹小盞

煎取五分去滓溫服量兒大小以意加減

治小兒風癩秘驗方右取蠟三十枚衛生易

枚取壹大石榴割頭作瓮子去却子內蠟

於中蓋之以紙筋黃泥裏初沃乾漸燒令

通赤良久去火放冷取其中焦黑者細研

成散每服以乳汁調下壹字易簡方每服

之立愈良方調兒稍大以防風湯調下半錢經

下二字良方調

治小兒風癩化涎水銀丸方

水銀壹兩生黑豆末二錢

右以聚甗同研令星盡丸如菉豆大壹歲

每服以乳汁下一丸良久吐出粘涎神効

兒稍大加丸服之隨下宜字

治小兒熱癩諸方水其中熱出以除

夫小兒熱癩者由氣血不和內有積熱之所

致也用藥見骨木輕軟腸胃細微易為傷動

若乳食不恒藏腑壅滯蘊穢生熱不得宣通

熱極甚者則發癩也其狀口眼相牽手足抽

掣口中吐沫鼻裏作聲頸項反張腰背強直

身體壯熱或叫或啼者是熱癩之候也

治小兒風壅氣盛心胃痰滯壯熱發癩釣藤

散方

釣藤壹分蚱蟬二枚微炒麥門冬半兩去川

升麻半兩子芩半兩蛇蛻皮五丁川太黃半兩

微石膏二兩甘草半兩炙微赤判

右件藥搗籠羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓入竹瀝半合量兒大小

分減服之

治小兒熱驚皮肉壯熱煩躁頭痛宜服茯神

散方

茯神三分白鮮皮兩半羚羊角兩半鈞藤三分甘

草三分炙到川升麻三分石膏兩二龍齒兩壹犀角

屑三分蚱蟬三枚微炒去翅足

右件藥搗麤羅為散每服一錢以水一小

盞煎至五分去滓量兒大小分減溫溫服

之

治小兒百日已來至三四歲發熱癩瘰癧身

體如火宜服白鮮皮散方

白鮮皮三分黃芩三分川升麻三分地骨皮三分鈞

藤三分犀角兩三麥門冬壹兩去焙胡黃連三分

龍齒兩一甘草壹分炙到

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓入牛黃末壹字量兒大

小分減溫服

治小兒熱癩嘔逆煩悶體熱子苓散方

子苓兩半赤茯苓三分川升麻三分人參半兩去

犀角屑兩半鈞藤兩半甘草兩半微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服壹錢以水一

盞煎至五分去滓量兒大小分減服

治小兒熱癩時時戴上眼吐沫鈞藤散方

鈞藤三分蚱蟬二枚微炒人參半兩去子苓

半兩黃細研川大黃半兩剉

右件藥搗羅為散每服壹錢以水一小

盞煎至五分去滓入牛黃壹字量兒大小

分減溫服

治小兒體熱嘔吐發癩麥門冬散方

麥門冬壹兩去心焙鈞藤半兩黃芩參赤芍藤參

川升麻參茯神參川大黃參剉蘇干

右件藥搗羅為散每服壹錢以小壹小盞

煎至五分去滓溫服更量兒大小加減服

之

治小兒熱癩面赤心躁犀角散方

犀角屑兩半鈞藤兩半玄參兩半蚱蟬兩半微炒去翅足

甘草半兩炙川升麻半兩黃芩半兩梔子人半兩

麥門冬青兩去心焙

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小盞

入苦竹葉七片煎至五分去滓溫服更量

兒大小以意加減

治小兒熱癩不知人迷悶嚼舌仰日梔子散

方

梔子人半兩干芩壹兩龍齒二兩石膏二兩鈞藤壹兩

吳藍青兩川大黃三兩到

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞

煎至五分去滓溫服更量兒大小以意加

減

治小兒熱過迷悶發癩升麻散方

川升麻壹兩鈞藤壹兩使君子壹兩干芩壹兩石膏

龍齒二兩朴消一兩柴胡三分赤芍藥三分川

大黃三分到

右件藥搗羅為散每服壹錢水壹小盞煎

至五分去滓溫服更量兒大小加減服之

治小兒熱癩四肢抽掣每日數發宜服此除熱鎮心紫石英散方

紫石英青兩細研水飛過滑石二兩白石脂壹兩石膏

青兩細研寒水石壹兩川大黃半兩碎微炒朱砂

水飛過龍齒二兩甘草微赤剉犀角屑

右件藥搗細羅為散每服以溫薄荷湯調

下半錢量兒大小加減服之

治小兒熱癩發歇不定眼目直視身體壯熱

此決心神迷悶牛黃丸方

牛黃半兩蚱蟬三枚微炒去翅足龍齒二兩梔子

人三分川升麻三分犀角屑三分胡黃連三分杏仁

三分湯浸去皮尖石膏二兩細研鈞藤三分

金薄五十片銀薄五十片龍膽三分去川

大黃三分剉碎微炒

右件藥搗羅為末入研了藥內研令勻鍊

蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服以竹

瀝研五丸服之量兒大小以意加減

治小兒熱癇搖頭吐舌四肢抽掣心神驚悸

虎睛丸方

虎睛對酒浸牛黃半兩麝香細研鈞藤

兩犀角屑三分伏神兩半川大黃壹兩判人參

半兩去蘆頭朱砂壹兩細研水飛過

右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻鍊

蜜和丸如菉豆大壹歲兒以金銀湯研化

一丸服之日三服兒稍人加丸數服之

治小兒驚癇諸方

夫小兒驚癇者起於驚怖大啼精神傷動得

之氣脉不定因驚而發作成癇也初覺兒欲

驚急持抱之驚即自止故養小兒常須慎驚

勿聞大聲每持抱之時當常安徐勿令有怖

雷鳴時常塞兒耳并作餘細聲以亂之驚癇

當按圖灸之或摩膏治之不可大下何者驚

癇心氣不足巢氏病源不定下之內虛則甚難治丸

諸癇正發手足掣縮慎不可捉持則令曲戾

不隨也

治小兒忽得驚癇壯熱口躁釣藤散方

釣藤三分白茯苓三分黃芩參分川升麻三分白鮮

皮三分竜齒兩玄參兩石膏兩寒水石兩

右件藥搗羅為散每服壹錢以水壹小

盞煎至五分去滓入竹瀝半合攪令勻重

煎一兩沸分溫二服更量兒大小以意加

減減

治小兒驚癇發無時候牛黃散方

牛黃壹分川大黃半兩赤芍藥壹分露蜂

房壹分黃芩壹分人參壹分葛根壹分甘草

微赤分蚱蟬壹分芎藭壹分川芒消壹分

蜣螂壹分桂心壹分當歸壹分石膏兩蛇

蛻皮五寸杏仁壹分湯浸壹分微炒壹分黃

右件藥搗羅為散每服一錢水一小盞煎

至五分去滓溫服更量兒大小以意加減

治小兒驚癇發作不定蛇蛻皮散方

蛇蛻皮五寸蚱蟬十枚蜣螂三枚

麻黃半兩去人參三分甘草半兩

當歸半兩川大黃壹兩細辛半兩黃耆半兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水一小盞

煎至五分去滓入牛黃二豆許投令勻溫

服更量兒大小以意加減

治小兒風熱驚癇手足掣縮日數發者紫石

英散方

紫石英壹兩寒水石一兩龍骨半兩牡蠣粉半兩

石一兩赤石脂半兩藍葉一分川大黃壹兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水壹小盞

煎至五分去滓量兒大小分減溫服

治小兒驚癇仰目嚼舌精神昏悶宜服釣藤

散方

膏壹兩白石脂兩桂心半兩甘草半兩

右件藥搗羅為散每服一錢以水壹小盞

煎至五分去滓量兒大小分減溫服

治小兒驚癇仰目嚼舌精神昏悶宜服釣藤

散方

釣藤半兩龍齒壹兩石膏壹兩梔子一分子芩半兩

川大黃半兩麥門冬三分去心焙

右件藥搗羅為散每服一錢水一小盞

煎至五分去滓量兒大小分減不計時候

溫服

治小兒驚癇邪氣發即吐涎迷悶難醒白鮮皮散方

白鮮皮壹兩犀角屑三分鈞藤兩子芩三分龍齒

兩蚱蟬半兩去翅足微炒

右件藥搗羅羅為散每服一錢以水壹小

盞入清竹葉七片煎至五分去滓量兒大

小加減服之

治小兒驚癇壯熱心躁發歇不定宜服牛黃

散子方

牛黃一分馬牙消分鐵粉分龍齒三分神

已上三味

右件藥都細研為散每於乳食後以熱水

調下半錢量兒大小以意加減

治小兒心肺積熱發驚癇煩悶吐逆心神昏

迷痰涎壅滯朱砂方

朱砂一分牛黃一分乾椒一分膩粉一分蠶

蛾一分天漿子七枚內有鈔霜細研麝

香半錢龍腦半錢

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和丸如

黍米大每服以薄荷湯化五丸服量兒大

小以意加減

治小兒驚癇多涎體熱犀角丸方

犀角屑兩天竹黃半兩朱砂壹兩水飛過研天

麻半兩白附子半兩鈆霜半兩

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻以

軟飯和丸如菜豆大每服煎竹葉湯研下

五丸看兒大小加減丸數服之

治小兒驚癇鎮心丸方

金薄五十片銀薄五十片水銀半兩以少

星牛黃壹分川大黃叁分遠志壹分防

葵兩漢防已壹分白斂一分鐵粉半兩紫石英

半兩細研真珠末半兩雄黃半兩人參半兩

水飛過頭白芍藥兩茯神分

右件藥搗羅為末入金銀薄等都研令勻

鍊蜜和丸如菜豆大每服以薄荷湯研下

三九日三服看兒大小以意加減服之

治小兒驚癇壯熱心神不定犀角凡方

犀角屑兩半朱砂壹分天竹黃壹分麝香半

細研○神巧牛黃壹分天南星半萬全方一分

分○乾蠍壹分○微炒萬全○萬全右件藥搗羅為末水浸蒸餅和丸如菜豆

大每服以薄荷湯下三九日三四服量兒

大小以意加減

治小兒驚癇邪氣皮肉壯熱嘔吐心煩不得

安睡虎時九方

虎睛一對牛黃一分麝香壹分川升麻兩半

藤半兩甘草半兩犀角兩天竹黃壹分

梔子人川木黃壹分蛇蛻皮五寸蝎壹分

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如菜豆大三

歲兒以粥飲研云丸服之量兒大小以意

加減

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

治小兒驚癇頻發不定至寶九方

金銀薄各五十片升麻壹兩子芩一兩犀角屑

青蠅足參枚去翅炒梔子人兩龍齒二兩麥

門冬壹兩川大黃壹兩鐵粉二兩朱

砂水兩細研飛過右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻鍊

蜜和丸如麻子大每服煎竹葉湯研下五

九更量兒大小加減服之

治小兒驚癇煩熱眼卧不安龍腦丸方

龍腦半兩朱砂壹兩細研粉霜半兩鐵粉

細研人參參叁分去龍齒二兩

右件藥搗羅為末入研了藥同研令勻鍊

蜜和丸如麻子大不計時候以粥飲下五

九更看兒大以小意加減

治小兒驚癇發熱搐搦不定鈿霜丸方

鈿霜半兩鐵粉一兩朱砂一兩細研麝香

半兩馬牙消半兩人參三分去川大黃叁分

微羌活一分芎藭壹分白茯苓壹分牛黃細研乾

蠟壹分龍膽壹分去微炒龍腦壹分去

治小兒驚癇發熱搐搦不定鈿霜丸方

鈿霜半兩鐵粉一兩朱砂一兩細研麝香

半兩馬牙消半兩人參三分去川大黃叁分

微羌活一分芎藭壹分白茯苓壹分牛黃細研乾

蠟壹分龍膽壹分去微炒龍腦壹分去

右件藥搗羅爲末入研了藥同研令勻鍊
蜜和丸如菉豆大每服不計時候以荆芥
薄荷湯下五丸量兒大小以意加減服之

治小兒驚癇蛇黃丸方

蛇黃細研麝香半分細研銀薄五十片細研鬱金三分金薄五十片細研
爲未

右件藥同研令勻以粳米飯和丸如菉豆
大每服用磨刀水煎壹兩沸如人體下三
丸更看兒大小以意加減

治小兒驚癇體熱羸瘦釣藤煎方

釣藤一分子芩半兩知母半兩寒水石三分升麻
半兩沙參壹分去頭蚱蟬二枚去翅蟪蝦二枚
足炙甘草半兩炙赤

右件藥搗羅爲末入蜜五兩以慢火煎鍊
爲膏每以熱水調壹杏人大服日三服量
兒大小以意加減

治小兒驚癇頻頻發動經久不差肌體瘦弱
蚱蟬煎方

炸蟬參枚去翅麻黃一分去根節鈞藤一分柴胡

去苗半兩白芍藥半兩石膏半兩子芩一分知母一分龍

齒兩犀角屑兩沙參半兩去半兩甘草半兩微赤判

蛇蛻皮五寸燒灰生薑汁壹分牛黃壹分細研蜜兩生

地黃汁五合杏仁半兩湯浸尖雙人研為膏

右件藥蛇皮已上並細剉先以水二大盞

煎至壹盞去滓入竹瀝壹小盞又煎五七

沸內杏仁蜜薑汁地黃汁以慢火煎攪不

停手約十餘沸放冷於瓷合中盛入牛黃

攪令勻每壹合分為三服更量兒大小加減

治小兒發驚癇體瘦煩熱犀角煎方

犀角屑壹兩子芩三分知母壹兩升麻壹兩人參

三分去炸蟬二枚去翅蛇蛻皮三寸柴胡

去苗半兩鈞藤三分甘草半兩微赤判

右件藥搗羅為末用水二盞入銀鍋中以

文火煎取六分去滓入蜜二合竹瀝壹小

盞再煎如餵每服抄半錢以溫水調化服

之更量兒大小以意加減

治小兒驚癇四肢抽掣及反張目睛上視色

青大吽聲不轉者宜服寒水石散方

寒水石兩半 紫石英兩半 石膏兩半 龍齒兩 貝齒兩

兩半

右件藥搗碎以水二大盞煎至壹盞去滓

量兒大小分減服之

治小兒驚癇極妙方

鐵粉一分 石膏壹分 牡蠣粉壹分 黃丹兩半

右件藥細研為散以井華水調下半錢量

兒大小加減服之

治小兒驚癇不識人迷悶嚼舌仰目者宜服

此方牛黃壹粒豆大細研以蜜水調頓服

之

治小兒驚癇掣瘈方虎睛細研水調灌之量

大小加減服之

又方熊膽兩豆大研和乳汁及竹瀝服之○

肘後方又云得去心中涎至良衛生易高簡方同

家用効驗

又方雞子黃和乳汁量兒大小服之不過三兩枚自定

治小兒卒得驚癇方右刺取白犬血半合服

用後方如量兒大小與服又塗身上亦良

又方右以水銀酸棗許大好藤紙兩重濾候
透出紙外方與小服壹服令盡太効

又方右蛇黃以溫水磨服之

治小兒驚癇連發不醒體羸反張不堪服藥

麻黃拭體湯方

麻黃三兩去根節 葛根叁兩 金壹兩 蛇蛻皮壹條 雷丸

三兩 石膏五兩末

右件藥細剉用水七升煎取壹升去滓以

軟帛浸拭兒身上即効

治小兒驚癇除熱丹參摩膏方

丹參半兩 雷丸半兩 猪膏二兩

右件藥細剉猪膏入銀器中先煎然內諸藥煎七上七下膏成綿濾去滓用瓷合中

盛以摩兒身日三用之

治小兒食癩諸方

夫小兒食癩者由藏腑壅滯內有積熱因其
哺乳過度氣血不調之所致也此皆乳母食
飲無恒恚怒不節煩毒之氣在於胃中便即
乳兒致使結滯不消邪熱蘊積腸胃否塞不
得宣通則令壯熱多驚四肢抽掣故發癩也
治小兒食癩四肢抽掣壯熱驚悸乳食不消
痰涎壅滯發歇不定宜服代赭丸方

代赭

壹分

馬牙消

壹分

金薄

二十片

銀薄

二十

片細

水銀

一分以少棗

巴豆

七枚去皮心

研紙裏壓去

油膩粉

油膩粉

半入

天漿子

二七枚內

川大黃

壹分

對碎

對碎

蟾酥

一錢

朱砂

壹分

蠟梢

四十九

腦半錢

麝香

半分

川椒末

研碎

右件藥

搗羅為末

右件藥

搗羅為末

鍊蜜和

右如黍粒

大每

服以薄荷湯下

二九日三服量兒大小

服以薄荷湯下

二九日

三服量兒

大小

服以薄荷湯下

二九日三服量兒

大小

意加減

治小兒食癩及驚風百病虎疔方

虎睛一對 牛黃壹分 真珠末壹分 朱砂壹分

細研赤芍藥壹分 赤茯苓壹分 杏仁壹分

湯浸去皮尖雙 甘草壹分 牡蠣壹分 麝香壹分

香半分 犀角兩 巴豆壹分 紙裏壓去油 大黃壹分

右件藥搗羅為末用糯米飯和丸如棗豆

大每服以荆芥湯下二九量壯吹小以意

加減天漿干

治小兒食瀉朱砂丸方
朱砂半兩 細研川大黃半兩 桂心壹分

黃壹分 雲母粉壹分 半夏壹分 湯洗黃連壹分

去雄黃壹分 雷丸壹分 代赭壹分 真珠末壹分 乾

葛壹分 礬石壹分 豆壹分 心壹分 炒黃

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如黍米大百

日內小兒以乳汁下兩丸三歲至七歲以

粥飲下五丸量兒大小加減服之

治小兒食癩喘息麝香真珠丸方

真珠末壹分 天竹黃壹分 雄黃壹分 巴豆壹分 心壹分

油杏仁壹分 湯浸去皮 麝香壹分 丁頭代赭

一分搗
羅爲末

右件藥都細研令勻鍊蜜和丸如黃米大
一二歲兒每服以溫水下五丸量兒大小
以意加減神巧萬全方同

治小兒食癩乳癖積聚壯熱心神多驚牛黃
丸方

牛黃壹分麝香半分朱砂一分真珠末一分
鈇霜壹分犀角屑壹分牡蠣粉壹分杏仁壹分
去皮尖雙甘草壹分巴豆七枚去皮心
人研如膏微赤劉巴豆研紙裏壓去

油

右件藥搗羅爲末入牛黃等同研令勻鍊
蜜和丸如麻子大二歲兒以金銀薄荷湯
下二丸量兒大小以意加減

治小兒七歲已下食癩壯熱無辜疰癖等雄
黃丸方

雄黃半兩朱砂半兩麝香半兩牛黃半兩
石膏半兩水飛過細研麩人半兩湯浸壯癩
粉半兩巴豆半兩去皮心甘遂一分煨微黃

右件藥擣羅為末鍊蜜和丸如黍米大每服以粥飲下三丸如利三兩度勿恠更隨兒大小加減服之

治小兒食痢化聚滯妨食墜涎利大腸真珠丸方

真珠壹分天竹黃壹分朱砂壹分代赭半

雄黃半兩蟻蝦半兩麝香半兩巴豆十粒

與令褐色杏仁半兩湯浸去皮尖煎杏仁研雙人麩炒微黃

右件藥都研為末鍊蜜和丸如棗豆大每

服以生薑湯下二丸量兒大小以意加減

治小兒食痢心胃痰滯大小便常多秘澁防

葵丸方

防葵半兩牛黃半分巴豆二十枚滑石半兩

粉一分蛇蛻皮一條朱砂壹分麝香半

右件藥同細研以糯米飯和丸如黍米大

每服以粥飲下二丸量兒大小增減服之

治小兒食痢乳食不消心腹壅滯四肢驚掣

宜服此方

朱砂分一五靈脂分壹巴豆五枚去皮心研

右件藥細研如粉用燒粟米飯和丸如黃

米大一二歲兒每服用溫水下二丸以吐

利為妙量兒大小以意加減

治小兒乳食不消心腹結實壯熱煩悶搖頭

反目口吐涎沫名為食癩鈎霜丸

鈎霜壹分膩粉壹分巴豆五粒去皮心研

右件藥都研為末以糯米飯和丸如粟米

大每服以通草薄荷湯下壹丸二歲已上

加丸服之神效萬全方同

治小兒食癩瘰癧涎金薄丸方

金薄五片膩粉三錢甘遂壹分煨散

右件藥相和研令勻以棗瓢和作劑子以

四五片金薄裏上更著濕紙裏燒灰火煨勻

熱候冷取研凡如菉豆大每服以人參湯

下三丸量兒大小以意加減神效萬全方同

治小兒癩瘰諸疔心腹合對對不安

夫小兒癩癩者由風邪熱毒傷於手少陰之

經故也心為帝王神之所舍其藏堅固不受外邪若風熱蘊積乘於心則令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相并故發癩癩也又云小兒在胎之時其母卒有大驚精氣并居則令子癩癩也

治小兒心藏積熱時發癩癩嘔吐涎沫作聲

迷悶鐵粉北方

鐵粉壹兩 鈔霜壹分 天麻叁分 水銀兩半 黑鈔兩半 雄黃兩半 朱砂壹兩 龍齒壹兩 天南星壹分 朱砂壹分

半兩細研 麝香半分

右件藥搗羅為末都研令勻以鍊蜜和丸如棗豆大每服以竹瀝研化五丸服之量

兒大小以意加減

治小兒癩癩發動無時心悶吐沫雄黃丸方

雄黃半兩 朱砂半兩 鐵粉半兩 獾猪半兩

膽二枚 熊膽一分 鯉魚膽七枚 烏牛膽半枚 青羊膽半枚

二麝香壹錢

右以諸般膽汁相和令勻即入諸藥末和

丸如菉豆大每服以金銀湯下五九量兒大小以意加減

治小兒五歲至七歲發癩癩無時發動耳出白沫遺失大小便不覺虎睛丸方

虎睛一對朱砂半兩飛過細研露蜂房半兩麻

黃半兩去根節子苓半兩釣藤半兩防葵一兩川大黃

一兩剉微炒竜齒壹兩細研梔子人銀薄三十片

麝香壹分羌活叁分柴胡叁分去苗白鮮皮叁分川

升麻叁分雷丸叁分沙參三分去蘆頭石膏壹兩細研水飛

過牛黃一分細研蚱蟬壹兩去翅蛇蛻皮壹分剉微

炒天麻半兩甘草半兩微赤剉

右件藥持羅爲末鍊蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每服以粥飲下五九量兒大小

大加減服之

治小兒癩癩癩發歇無時地竜散方

乾地竜半兩虎睛壹對人參一分去蘆頭

以上三味同搗羅爲末

命薄三十片銀薄二十片朱砂一分雄黃一分天竹

黃壹分代赭壹分鉛霜壹分鐵粉壹分

右件藥都細研入前三味再研令勻每服

以溫水調下半錢更看兒大小加減

治小兒癩癩至大不差或發即口出白沫并

大小便出不知虎睛丸方

虎睛壹對酒浸一宿朱砂一兩細研鐵粉一兩

露蜂房半兩羌活半兩鈎藤半兩牛黃半分蚱

蟬四枚去翅防葵半兩麻黃半兩去根節龍齒兩

細研川升麻兩細辛壹分石膏壹兩細研水飛過

右件藥擣羅爲末都研令勻鍊蜜和丸如

麻子大每服以溫水下五丸更量兒大小

加減服之

治小兒癩癩連年不差方

鉛二兩硫黃兩水銀二兩鐵粉壹兩

右先將鉛於鐺子中令消即下硫黃炒不

住手就鐺研攪待硫黃煙氣似息入水銀

又攪次下鐵粉以武火燒少時將出一夜

露地出火毒後研令極細即以粟米飯和

丸如菉豆大每於食後以金銀湯下五丸
量兒大小以意加減

治小兒癩癧等疾方

光明朱砂二兩顆
坤者中令

右以金薄隨朱砂顆塊大小各裹之用磁

石末入固濟了餅子中實築中心留一坵

子卽以朱砂置坵子內上更以磁石末覆

之餅子口更以鈇一片可餅口大小蓋之

以文火養七日火常令鈇以筋刺得入養

一七日後去鈇大火斷之候冷出於乳鉢

中細研卽置於通油鉢子內上以馬牙消

末徧覆之卽置飯甑中蒸壹炊久其朱砂

化成水有患者食後以溫水調下半錢量

兒大小以意加減服之

治小兒癩癧欲發卽精神不足眼目不明癩

癧惡聲嚼舌吐沫雌黃丸方

雌黃壹兩細切黃丹壹兩炒麝香

右件藥相和細研如粉用牛乳壹升慢火

熬成膏可丸卽丸如菉豆大每服以溫水
下三丸日三服量兒大小以意加減服之

治小兒癩癩發歇不定朱砂丸方

朱砂壹兩細研 鈆霜壹兩 鐵粉兩 烏牙消兩

右件藥細研如麵以棗肉和丸如菉豆大

每於食後以熱水下三丸量兒大小以意

加減

治小兒患癩病差後復發諸方

夫小兒癩癩之狀或口眼相引目睛上掇巢氏

病源或手足癩癩或脊強直或頭項反折或

屈指如數皆由當風取涼乳哺失節之所為

也其差之後而更發者是餘勢未盡小兒血

氣軟弱或因乳食不節或風冷不調或更驚

動因而重發如此者多成常疾凡諸癩正發

手足掣縮慎勿持之捉則令曲戾不隨也

治小兒諸癩復發不問風之與熱發作多少

般數並宜服紫金散方

紫金粉一兩半名 麻黃三分去 石膏壹兩

亦烏脚

根節

細研

水飛 寒水石一兩 地骨皮一兩 赤石脂兩 秦朮
過 牛黃半兩 細研 烏蛇肉半兩 炙 虎睛一對
去苗 防風半兩 去 黃芩兩 牡蠣粉三 赤芍藥兩
蘆頭 葛粉兩 羌活半 當歸壹分 剉 朴消壹兩
兩 甘草半兩 炙 川大黃參分 剉 桂心壹分
微赤剉 右件藥搗細羅為散都研令勻每服煎竹
葉湯調下半錢更量兒大小以意加減服
之

治小兒驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不避及

除百病鈇丹方

鈇丹半兩 朱砂半兩 細研 鐵粉半兩 細研一分 獨
兩 活精半兩 黃一分 雄黃壹分 細研 蟻五枚 露蜂
房 微壹分 人參壹分 去 漢防已壹分 蛇蛻皮壹
黃 桂心壹分 甘草壹分 雞頭壹枚 去毛 赤
黃 茯苓兩 川椒壹分 去目及閉 汁
右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸
如菜豆大每服以粥飲下五丸量兒大小
以意加減

治小兒諸癩復發使斷根源天漿子丸方

天漿子十四枚去殼芎藭半兩炸蟬半兩去翅

川大黃兩半剉蟻足改知母兩半

牛黃細研人參兩去頭生乾地黃兩半蟲

三枚桂心兩蟬三分生乾地黃兩半蟲

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三子白桂油

如紫亞丸每服以粥飲下三丸日三服更

量鼎大小以意加減

治小兒驚癩發動經年不斷根源鴟頭丸方

鴟頭一枚是者蜣蜣七枚去翅桂心兩半赤

芍藥兩半炸蟬十枚蛇蛻皮五寸伏神兩半露

蜂房半兩黃甘草半兩炙當歸半兩剉芎藭

半丹參兩麝香壹分牛黃半兩細研葇葇子兩

炒令黑

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如棗豆大每服以溫水下五丸看見大小

加減服之

和劑局方

定命丹治小兒急慢驚風天吊撮口潮發搐
搦妳癩壯熱昏塞不省

青黛半錢天南星炮壹分蟾酥乾者一錢酒浸壹宿乾蠨

微炒白附子炮壹分麝香研一

右細研令勻以粟米粥和圓如棗豆大別

以青黛為衣每服壹圓荆芥薄荷湯化下

後困睡無疑但有患者先化半圓滴入鼻

中噴嚏者必瘥膏本云壹本不用天南星

八珍丹治小兒驚風壯熱精神昏憤嘔吐痰

涎驚悸恍惚或發癩癰目睛上視

牛膽製天南星 天麻去蘆朱砂飛研甘草剉炒

各五兩天漿子微炒三十箇雄黃飛研膩粉研各壹兩

壹分牛黃研膏銀箔七十片為衣

右為細末入研藥勻煉蜜圓如豌豆大以

銀箔為衣壹歲兒每服一圓薄荷湯化下

疾證未退可再服更量大小加減妳食後

服

太一銀朱丹治小兒驚風壯熱涎盛發癩手

足搐搦目睛上視及風壅痰實心膈滿悶嘔吐痰涎大便秘澁

黑鈔三兩煉十遍與水銀結砂子分為小塊同甘草拾兩水煮半日候冷取出

研膩粉研壹兩水銀結砂子三兩鐵粉三兩朱砂研

南星炮為末

右研麵糊圓如麻子大每服一歲兒壹圓川薄荷蜜湯下微利為度未利再服並乳

食後服

軟金丹治小兒驚風壯熱多睡驚掣精神昏

憤痰涎壅塞手足搐搦目睛上視項背強硬牙關緊急

寒食麵七錢青黛細研麝香細研胡黃連末史

君子一本炒充墨燒研膩粉各一分天漿子七

炒

右研勻白麵糊圓如小豆大每服壹圓煎金銀薄荷湯化下五歲已上可服貳圓更量大小虛實加減不拘時

返魂丹治小兒諸風癩癩潮發瘈瘲口眼相

引項背強直牙關緊急目睛上視及諸病久
虛變生虛風多睡昏困在葺不解速宜服之
品味與諸風門烏犀圓同

右如法修事搗研令細煉白蜜合和人酥
再搗參五千下圓如梧桐子大以金箔貳
十片爲衣每一歲兒壹圓溫薄荷自然汁
化下不拘時候

至聖丹治一切驚風天弔目睛上視手足搐
搦狀候多端用藥壹圓溫水化滴鼻中今噴

嚏叁五次更用薄荷湯下貳圓卽愈如久患
五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土可思妳
食愛咬指甲時擣眉毛頭髮稀疎肚上青筋
及久患瀉痢並用米飲下貳元如久患疳蝨
咬心發歇疼痛並以苦練子煎湯下貳圓如
鼻下赤爛口齒疳蟲并口瘡等用兒孩子妳
汁研貳圓塗在患處疳眼雀目用白羊子肝
壹枚以竹刀子批開入藥貳圓在內以麻縷
纏定用濁米泔煮熟空腹食之仍令乳母常

忌毒魚大蒜雞鴨猪肉等食之必令厚

青黛研胡黃連味雄黃飛研各辰砂飛研

粉同水熊膽用溫水蘆薈研各壹分

乙龍腦研鈔霜研蟾酥各壹字○壹本麝

香半白附子錢其水銀壹錢與前

右為細末入研藥勻用熬過獾豬膽汁浸

蒸餅為圓如黃米大退驚治風化蟲殺疳

除百病進乳食此藥若隔叁兩日膏服求

無百病不染橫天之疾壹本此下云凡

五福化毒丹治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁頰

赤咽乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩渴頭面

身體多生瘡癩

玄參洗桔梗各六兩○增茯苓去皮人參

去蘆○增牙消枯青黛研各甘草剉炒壹

麝香研半錢○增金箔各八片銀箔為衣

右為細末入研藥勻煉蜜為圓每兩作十

貳圓壹歲兒壹圓分四服薄荷湯化下及

瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣生地黃

自然汁化壹圓用雞翎掃在口內熱瘡肌
肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔化下食
後臨臥服

大天南星圓治小兒急慢驚風涎潮發搐目
睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直精神
昏寒連日不省

滴乳香 研 龍腦 研 牛黃 研各壹錢 ○增註
和劑御藥院方各
半辰砂 研三錢 天南星 牛膽製者半兩 麝香 壹錢 天
麻 去蘆 人參 去蘆 防風 去蘆各一分 乾蠍 十四枚 已
麻蘆 去蘆 人參 去蘆 防風 去蘆各一分 乾蠍 十四枚 已
枳末湯

浸潤去腹內土微炒
○院方二十四介

右研杵令勻煉蜜和圓如大雞頭火 此方
云每兩作 每一圓荆芥薄荷湯化下量兒

大小以意加減不計時候○醫方大成天

南星 牛膽製半兩 麝香 壹錢 腦子 牛黃 南北經

錢乳香 各半 朱砂 三錢各 全蝎 十四介 人

參 經方 天麻 防風 各二錢 右為末煉蜜圓

如雞頭大每服壹圓荆芥薄荷湯下 醫方
集成

同袖珍方典
經驗方同

虎睛圓治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏

憤睡多驚啼或發搐搦目睛直視

天漿子炒四兩青黛研七兩白附子炮麝香研

天南星炮各三兩天麻去苗胡黃連去膩粉研天

竹黃研茯神去木各五兩史君子筒一伯朱砂飛

二兩右為細末麴糊圓如梧桐子大每壹歲兒

服一圓薄荷湯化下更量虛實加減乳食

後服

天麻防風圓御藥院方治一切驚風身體壯

熱拔粹方施圓端效多睡驚悸手足抽掣精

神昏憤痰涎不利及風溫邪熱並宜服之

天麻去蘆○醫防風去蘆人參去蘆各朱

砂研水雄黃研麝香研○拔粹方端效甘

草各壹分○南北乾嗽炒○大成去

尾去毒白殭蠶炒各半兩牛黃壹錢○大成

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服壹圓

至二圓大成每薄荷湯化下不拘時管見

良方同總錄量 ○拔粹方右為細末煉蜜

兒大小加減服 丸櫻桃大朱砂為衣每服壹丸薄荷湯下

敵義無時端效方又云院方天麻去蘆防

風去蘆頭人參去蘆頭白殭蠶炒乾蝎炒朱

砂飛木雄黃研甘草炙已上麝香牛黃各

半貳錢

右為細末煉蜜為丸每兩作四十九每服

壹丸至二丸薄荷湯化下不拘時候

金箔鎮心圓治小兒風壅痰熱心神不寧驚

悸煩渴唇焦頰赤夜臥不安譫語狂妄

白茯苓去皮人參洗去甘草各五山藥百五

龍腦十兩牙硝枯過壹朱砂飛研一麝香五

研紫河車片黑豆水煮軟切金箔壹千二

衣片焙乾二十五兩伯片為

右為細末煉蜜為圓每壹兩半作五十圓

以金箔為衣每服一圓薄荷湯化下含化

亦得食後臨臥常服安心鎮神散邪熱涼

咽扁止驚啼管見大全 ○醫方大成治風

痰壅熱心神恍惚急驚搐搦紫荷車黑豆水煎

軟二山藥兩半甘草五錢牙硝錢半○南北人

參茯苓各五錢朱砂壹兩龍腦壹錢麝香研五錢○

袖珍方金箔十二片為衣○右為末煉蜜

成劑每兩作五十圓以金箔為衣每服壹

圓薄荷湯化下常服安心止驚散邪涼膈

醫方集成同

比金圓治小兒驚風體熱喘麓涎嗽心忪頰

赤大小便不利夜卧不穩

天南星炮壹十兩半膩粉研滑石各十兩巴豆百

箇去皮青黛二兩取霜半

右為細末麩糊為圓如麻子大每一歲服

一圓薄荷溫水下如急驚風頭熱足冷口

噤面青筋脉抽掣上膈頑涎疾狀甚者加

壹兩圓煎桃符湯下疎利下蘊毒熱涎立

便安愈小兒瘡疹後餘毒不解宜服食後

水銀漏圓子治小兒驚風壯熱涎盛喘麤或

發搐搦目睛上視及乳哺失節胃滿嘔逆精

神迷悶發癩瘰癧並宜服

鈔白霜研膩粉研乾蝎全青黛研百草霜

研牛黃研各壹分巴豆去皮膜醋煮黃黑鈔同水銀水

銀各一兩香墨燒碎三錢黃明膠炒令黃燥一錢

方壹錢右為細末入研藥勻以陳粟米飯為圓如

菘豆大捏褊每壹歲兒服壹圓二歲服二

圓三歲服三圓四歲已上服四圓用乾柿

湯下薄荷湯亦得更量虛實加減服利下

青粘滑涎為度乳食後服此藥不得化破

牛黃膏治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽

人參去蘆二兩牙硝研飛過朱砂研水飛各十兩甘草

燈五兩蛤粉水飛二兩龍腦研四兩雄黃研飛七兩

金箔各二百片為衣右為細末煉蜜搜和每壹兩八錢作二十

圓以金箔銀箔為衣壹歲兒每服如菘豆

大薄荷溫水化下量歲數臨時加減食後

服

辰砂金箔散治小兒心膈邪熱神志不寧驚
惕煩渴恍惚忪悸夜臥不安譫語狂妄齒斷
生瘡痰實咳嗽咽膈不利

辰砂

研飛七

桔梗

五兩

甘草

炙二兩

金箔

二百片

生腦子

二兩

人參

去蘆

伏苓

去皮

牙硝

枯各三

蛤粉

研飛八

拾兩

拾兩

右爲末一歲兒每服半錢薄荷湯調下未
滿百晬兒藏腑多熱睡臥不穩大便不利
蜜湯調下壹字更量兒加減如大人小兒

咽喉腫痛口舌生瘡每用少許搽在患處
嚥津立效大人膈熱每服壹錢新水調食
後臨臥服

朱砂圓鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

梅花腦

研

麝香

研各半兩

腦子

研

牙硝

枯各一兩

水石

燒赤四兩

甘草

五斤浸

鵬砂

研壹分

朱砂

研飛

五十兩

右研勻用甘草膏和每兩作一百圓每服
一圓含化小兒夜多驚啼薄荷水化下

太壹丹治小兒諸風驚癇潮熱搐搦口眼相引項背強直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之

白附子炮三錢半乾蝎微炒一錢半烏蛇酒浸炙去皮骨天

南星炮各三錢僵蠶去絲青炒四錢附子炮去皮臍天麻去苗

酒浸麻黃各半兩

已上為末水壹升調浸三日以寒食麩壹斗拌勻踏作麩須六月六日以猪葉罨七取出逐片用紙袋盛掛當風十四日可用

每麩末壹兩入下藥

琥珀研壹錢辰砂研飛六錢雄黃研飛三錢甘草炙半錢為

右合研煉蜜圓如雀鷄頭大每服壹圓溫

水化下不計時

大驚圓御藥院方名罷驚丸治驚風諸癇壯熱昏憤神

志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆

治之

青礞石研雄黃研飛一錢管見大朱砂

紫雲膏

紫雲膏

研飛鐵粉研貳錢半蝦蟇灰一錢蛇黃火煨醋
研飛貳錢○良方三錢

右研勻以水浸餛餅圓如梧桐大每壹圓

煎薄荷水煎院方良方剪刀股化下日二三

服此藥治驚化涎不用銀粉小兒藏腑口

齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須慎之則無

他苦

睡驚并治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜

臥不安睡中啼哭驚風搐搦常服安神鎮心

定驚控痰

使君子仁醫方大成集成南北茯苓去皮蛇

黃火煨紅米醋淬斤遍天南星碾為末用

和為餅炙熟鐵粉並搗羅為末各秤半斤

兩腦子別研麝香一兩銀箔研金箔各壹

方諸

右前後藥末合研勻糯米糊為圓如皂莢

子大朱砂為衣用薄荷湯磨下五歲兒膏

圓分貳服參歲已下兒壹圓分三四服更

量歲數加減
至聖保命丹治小兒胎驚內弔腹肚堅硬目
睛上視手足抽掣角弓反張但是涎痰壅盛
一切急慢驚風悉能治之

白附子 麝香 研天南星 炮蟬蛻 去白殭

蠶 直青者○管見大朱砂 研各 防風 去蘆

天麻 錢各二 全蝎 十四箇○良金箔 十

右為細末入研藥和勻以粳米燻飯收中

心軟者搜和圓每兩作四十圓初生兒半

圓乳汁化下周歲兒一圓金銀 良方薄荷

湯化下十歲已上有急候者二圓薄荷湯

化下常服鎮心安神化痰除一切驚風證

候○簡易方理一切急慢驚風惡候痰涎

壅盛目睛上視手足抽掣角弓反張忽然

倒地不省人事 胎驚內弔腹肚堅硬夜

啼發熱一切急候悉能主之 常服藥性

不冷鎮心安神壓驚化涎全蝎 炒十四枚

朱砂 光明者 天麻白附子 炮蟬蛻 去士各

南星炮僵蠶炮防風去蘆各壹錢射香研半錢金

箔十片右細末用粳米飯圓每兩作四十

丸朱砂為衣初生兒每服半圓乳汁化

下周歲兒一圓薄苛湯下十歲以下有急

候者壹服二圓常服只壹圓治療如神家

有嬰孩者能自合服庶不為銀粉所誤先

冰冷脾胃別致生病也王氏集驗方同施圓端效

方治小兒一切急慢驚風潮搐反張涎痰

壅塞鎮心安神除一切風寒傷表證防風

兩一白附子天南星炮白殭蠶炒朱砂雄黃

甘草炒各半兩天南一兩麝香一字金箔一片全蝎四十

个去毒右為細末糯米粥為丸壹兩作四十

丸或煉蜜為丸如櫻桃大每服壹丸薄荷

湯化下不拘時候

鎮心至寶丹治小兒一切驚風搐搦壯熱涎

多魚口鵝聲眼睛直視

白附子炮雄黃研天南星煨乾蝎各半兩

去絲白殭蠶去絲鬱金各壹兩良

方各半錢方各壹錢良

竜腦 麝香 各研二錢半。良方各壹字。 滑石末 二兩。良方。

方二 膩粉 二錢。良方壹錢。 辰砂 研壹分。良方壹錢。

右爲末煉蠶爲圓如皂莢子大金銀箔爲

衣每服一圓食後臨卧薄荷湯下常服鎮

心神凉咽膈

蛇頭圓治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直

視角弓反張證候危急者

蛇含石 十箇假三度醋淬却用甘草湯煮出酸氣研飛爲細末。 蝎梢

五靈脂 酒浸飛去砂石。 神砂 切。 鐵膩粉 白附子

鬱金 炮各二兩。 龍腦 別研半兩。 麝香 研一兩。 花蛇頭 十箇。

酒浸去骨用齒并白肉佳。

右爲細末麪糊爲圓如雞頭大每服一圓

薄荷自然汁磨以井花水化開量兒大小

加減與服

辰硝茯神膏治小兒急慢驚風潮涎搐搦手

足抽掣心膈煩躁及療驚啼睡不寧帖腹中

疴痛

代赭石 煨醋淬研。 酸棗仁 淨去殼。 乳香 炙別研。 茯

神夫水壹兩半朱砂研飛麝香研壹錢

右爲細末煉蜜圓如雞頭大每服一圓金銀薄荷湯研下更量歲數加減與服常服鎮心安神定志此藥比他驚藥大不同溫平不冷

防風導赤散治小兒初驚

生乾地黃 川木通 防風 甘草各等分

右生用咬咀每服叁錢水一盞竹葉少許

同煎朱氏集驗方同

寧神膏後用此藥

麥門冬去心半兩麝香壹分茯神 朱砂各壹兩

右碾細煉蜜爲小餅子每服一餅臨睡同

薄荷湯化服壹夜壹服嘗有一老醫云小

兒驚搐多是熱證若首先使用驚風藥白

附子全蝎殭蠶川烏之類便成壞證後有

鑿幼科驚藥只用導赤散加北防風淮壹

臧服導去心經邪熱其搐隨手便止次服

寧志膏神效朱氏集驗方云二方何統制智大云昨在江州日見子偶

有驚作遂訪一老醫求藥劑服三服適即
 全愈遂師問之渠云三代小兒科家傳只
 有四五藥加減愈人無數且如驚搐多是
 熱證若首先便用驚風藥白附子全蝎姜
 蚕川烏之類便口壞證家中驚藥只用導
 赤散加北防風進一二服導火心經邪熱
 其搐隨手使止次服寧神膏是家傳
 此本自後常以二藥救人取効甚多

醫方類聚卷之二百五十七

