

本草類方卷之七

癩瘍癩風第八十六

身體白駮

取樹木孔中水洗之搗桂末和傅之日再上。張文仲備急方

白癩風痒

水銀數拭之即消。千金方

赤白癩風

膽礬牡蠣粉各半兩生研醋調摩之。聖濟方

身面瘰癧

禹餘糧半夏等分爲末雞子黃和傅先以布拭赤勿見風日三十日十年者亦滅。○

聖濟
綠

身上癩痕

黃礬石燒令汁盡胡粉炒令黃各八分細末以臘月猪脂和研如泥以生布揩令痛

乃塗藥五度取鷹糞白燕窠中草燒灰等分矜入乳塗之其癩自滅肉平如故。○崔

本草類方

癩瘍癩風

元亮海上

集驗方

紫白癜斑

貝母南星等分爲末生薑帶汁擦之。德生堂方用貝母乾薑等分爲末如澡豆入密室中浴擦得汗爲妙。談埜翁方以生薑擦動醋磨貝母塗之。聖惠方用貝母百部等分爲末自然薑汁調搽

紫癩風疾

醋磨知母擦之日三次。衛生易簡方

癩瘍風病

白色成片以布拭醋摩硫黃附子塗之或硫黃白礬擦之。集驗方

白癩風疾

白蒺藜子六兩生搗爲末每湯服二錢日二服一月絕根服至半月白處見紅點神效。孫真

人食忌

汗斑白點

夏枯草煎濃汁日日洗之。乾坤生意

癩瘍風病

茵陳蒿兩握水一斗五升煮取七升先以皂莢湯洗次以此湯洗之冷更作隔日

洗不然恐痛也。崔行功纂要

赤白汗斑

蒼耳嫩葉尖和青鹽搗爛五六月間擦之五七次效。摘玄方

赤白汗斑

白附子硫黃等分爲末薑汁調稀茄蒂蘸擦日數次。簡便方

癩瘍風病

酢和硫黃末傅之。外臺秘要

汗斑癩風

端午日收紫背浮萍晒乾每以四兩煎水浴并以萍擦之或入漢防已二錢亦可。

袖珍方

身體癩瘍

斑駁女葳膏用魯國女葳白芷各一分附子一枚雞舌香木香各二分爲末臘猪脂

七合和煎入麝香一錢以浮石磨破日擦之。古今錄驗

本草類方

癩瘍癩風

二

白癩風癬 用小麥攤石上燒鐵物壓出油搽之甚效。醫學正傳

身面癩痕 馬齒莧湯日洗二次。聖惠方

白癩風斑 杏仁連皮尖每早嚼二七粒搯令赤色夜臥再用。聖濟總錄

赤白癩風 生薑頻擦之良。易簡方

身面白癩 以酒服生胡麻油合一日三服至五斗瘥忌生冷豬雞魚蒜等百日。千金

滅諸癩痕 春夏用大麥麩秋冬用小麥麩篩粉和酥傅之。總錄

白駁癩風 麻鞋底燒灰擦之。聖惠

白癩風 紅灰藿五斤茄子根莖三斤蒼耳根莖五斤並晒乾燒灰以水一斗煎湯淋汁熬成

膏別以好乳香半兩錫霜一分膩粉一分鍊成半暗二兩和勻。聖惠

汗斑癩風

羊蹄根二兩獨顆掃帚頭一兩枯礬五錢
輕粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴

用手抓患處起粗皮以布包藥着力擦之
暖臥取汗即愈也乃鹽山劉氏方比用硫

黃者更妙。
藺氏經驗方。

癩瘍風駁

醬清和石硫黃細末日
日搽之。外臺秘要

白癩風

青胡桃皮一箇硫黃一皂
子大研勻日日擦之取效

項上癩瘡

外臺用馬莧陰乾燒研臘猪脂和以暖泔
洗拭傳之。簡便治瘰癧未破馬齒莧同

靛花搗擦

日三次

癩瘍風駁

羊蹄草根於生鐵上磨好醋旋旋刮塗
硫黃少許更妙日日用之。聖惠方

白癩風瘡

楸白皮五斤水五斗煎五升去滓
煎如稠膏日三摩之。聖濟總錄

癰瘍風 青胡桃皮搗泥入醬清少許研砂少許合勻先以泔洗後傳之。外臺

癰瘍風駁 薰陸香白歛同研日日搗之并作末水服。千金方

紫白癰風 桑枝十斤益母草三斤水五斗慢煮至五升去滓再煎成膏每臥時溫酒調服半合

以愈為度
○聖惠方

白癰駁風 桑柴灰二斗甌內蒸之取釜內熱湯洗不過五六度瘥。聖惠方

紫白癰風 烏蛇肉酒炙六兩枳殼麩炒牛膝天麻各二兩熟地黃四兩白蒺藜炒五加皮防風

桂心各二兩剉片以絹袋盛於無灰酒二斗中浸之密封七日每溫服一小盞忌雞

鷺魚肉發
物。聖惠

白駁風 弊帚弊帛履底甌帶脯腊蟬頸蛇皮等分以月食時合燒為末酒服方寸七日三服

仍以醇醋和塗之忌食發風物
此乃徐玉方也。古今錄驗

身面白駁

鮎魚半斤一頭去腸以粳飯鹽椒如常作
鮮以荷葉作三包繫之更以荷葉重包令
臭爛先以布拭赤乃炙鮮包乘熱熨令汗
出以綿衣包之勿令見風以瘥為度。總
錄

紫癩風

除風散以白花蛇頭二枚酒浸炙蝎稍一
兩炒防風一兩右為末每服一錢溫酒下
日一服。

聖濟總錄

癩瘍風病

取塗中死蟻蝦杵爛措瘡令
熱封之一宿瘥。外臺秘要

癩風白駁

聖惠用蛇皮灰醋調塗。外臺用
蛻摩數百遍令熱葉草中勿回顧

白玷風

驢屎薑汁等分
勻頻洗。聖濟錄

本草類方

癩瘍癩風

癩瘍白駁 先以布拭赤用烏賊骨磨三年酢塗之。外臺秘要

赤白癩風 白煮猪肚一枚食之頓盡忌房事。外臺

消滅癩痕 以猪脂三斤飼烏雞一隻三日後取尿同白芷當歸各一兩煎十沸去滓入鷹屎白

半兩調傳。外臺

滅痕 千金用鷹屎白和人精傳日三。聖惠用鷹屎二兩殭蠶一兩半為末蜜和傳。總

錄用鷹屎白白附子各一兩為末醋和傳日三五次痕滅止

消滅癩痕 雞子五七枚煮熟取黃炒黑拭塗日三久久自滅。聖惠方

滅諸癩痕 大鼠一枚以臘猪脂四兩煎至銷盡濾淨日塗三五次先以布拭赤避風。普濟方

赤白癩風 猪脬一具酒浸一時飯上蒸熟食不過卜具。壽域方

白駮風

以荷葉裏魚鮮令臭拭熱頻
頻擦之取效乃止。千金方

面身癩痕

真玉口日磨之久
則自滅。聖濟方

滅癩痕

以凍凌頻熨之
良。千金方

癩痕凸起

熱瓦頻熨之
。千金方

夏月汁斑

如疹用蜜陀僧八錢雄黃四錢先以薑片
擦熱仍以薑片蘸末擦之次日即焦。活

人心
統

本草類方卷之七

癭瘤疣痣第八十七

面上黑子

每夜以暖漿水洗面以布揩赤用白檀香磨汁塗之。外臺秘要

面上黑子

芫荽煎湯日日洗之。小說

面靨黑痣

以草割破銅綠末傅三日勿洗水自落厚者再上之。聖濟總錄

面靨痣點

蔓菁子研末入面脂中夜塗之亦去面黚。聖惠方

痣靨疣贅

花鹼礦灰以小麥稈灰汁煎二味令乾等分爲末以針刺破水調點之三日三上卽去須新合乃

效。聖濟錄

項下氣癭

自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水其癭自消或火燒烟氣久久吸之亦可。楊

本草類方

癭瘤疣痣

仁齋直指方

項下氣瘦

一鍬砂入水缸中浸之飲食皆用此水十日

項下瘦疾

鼠粘子根一升水三升煮取一升半分
三服或為末蜜丸常服之救急方

項下瘦氣

黃藥子一斤洗剉酒一斗浸之每日早晚
常服一盞忌一切毒物及戒怒仍以線逐

日度之乃知其效也斗門方

項下瘦氣

用小麦一升醋一升漬之晒乾為末以海
藻洗研末三兩和勻每以酒服方寸七口

三品小

項下瘦氣

水涯露出椰根三十斤水一斛煮取五升
以糯米三斗如常釀酒日飲范汪方

項下氣瘦

外臺用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚙
汗日一具七日瘥千金用羊靨七枚陰

乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊
柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大每含一丸
燕津○雜病治例用羊靨猪靨各二枚昆
布海藻海帶各二錢洗焙牛蒡子炒四錢

右為末搗二靨和丸彈子
大每服一丸含化嚥汁

痰核紅腫

寒熱狀如瘰癧石灰火煨為末以白果
肉同搗貼之蜜調亦可○活人心統

疣痣瘤贅

石灰一兩用桑灰淋汁熬
成膏刺貼之○普濟方

身面瘰子

白礬味頻洗之
能鄙事

身面疣目

苦酒浸頻滴之
六七日取汁

身面疣目

蠟紙卷燂之有越
末少許點之
普濟方

身面疣目

艾火灸二壯即
除○聖惠方

本草頌方

瘦瘤疣痣

身面疣目

杏仁燒黑研膏擦破
日塗之○千金方

身面疣目

盜酸酒醅洗面咒之○疣疣不知羞酸酒
醅洗你頭急急如律令咒七遍自愈○

臺秘要

身面疣目

七月七日以大豆拭疣三過使本人種
於南向屋東頭第二溜中豆生葉以熱湯

沃殺即愈○
外臺秘要

身面疣目

牛口涎頻塗之
自落○千金方

身面疣目

以豬脂搯之令血出少
許神驗不可加○千金

身面疣目

每月望子時以禿帚掃疣
目上三七遍○聖惠方

身面疣目

鹽傳上以舌舐之不
過二度○肘后方

手足疣目

蕪藜子搽爛塗目上。○聖惠方

手足生疣

取白梁米粉鐵銚炒赤研末以衆人唾和塗之厚一寸即消。○肘后方

身面邱文

刺破以醋調赤土傅之乾又易以黑滅爲度。○千金方

面靨疣痣

永調礦灰一盞好糯米全者半挿灰中半在灰外經宿米色變如水晶先以針微撥

動點少許於上經半月汁出剔去藥不得着水二日而愈也。○集玄方

面上疣目

硃砂研三吹自落。○集效方

肢體疣目

地膚子白礬等分煎湯頻洗。○壽域神方

贅瘤焦法

甘草煎膏筆粧瘤之四圍上三次乃用芫花大戟甘遂等分爲末醋調別以筆粧其中勿近甘草次日縮小又以甘草膏粧小

暈三次如前仍上此藥自然焦縮。○危氏

六宜頁方

瘦瘤疣痣

七

消

痛

得效方

用麀肉或鹿肉剖如厚脯炙熟搗之可四
灸四易出膿便愈不除再以新肉用之○

外臺秘要

痰癰結核

南星膏治人皮肌頭面上生癰及結核大
者如拳小者如粟或軟或硬不痛不癢宜
用此藥不可輒用針灸生天南星大者一
枚研爛滴好醋五七點如無生者以乾者
為未醋調先用針刺令氣透乃貼之
覺癢則頻貼取效○巖子禮濟生方

黑子疣贅

續隨子熟時塗之
自落○普濟方

身面疣子

醋調南星末塗
之○簡易方

身面黑痣

黎蘆灰五兩水一大碗淋汁銅器重湯煮
成黑膏以針微刺破點之不過三次效○

聖惠方

身面粉瘤

人精一合青竹筒盛於火上燒以器承取汁密封器中數上塗之取效止。肘后方

漏瘤濕癬

浸溼日痛痒不可忍愈後復發出黃水羊蹄根搗和大醋洗淨塗上一時以冷水洗

之曰一次

腋下瘤瘦

用長柄茶壺虛燒存性研末搽之以消為度一府校老嫗右腋生一瘤漸長至尺許

其狀如長瓠子久而潰爛一方士教以此法用之遂出水消盡而愈。瀕湖集簡方

海藻酒

治瘦氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日

三酒盡再作其滓曝乾為末每服方寸七日三服不過兩劑即瘥。范汪方

瘦氣初起

海藻一兩黃連二兩為末時時舐嚙先斷一切厚味。丹溪方

瘦瘤疣瘰

九

瘦

氣

杏林摘要用猪鬃七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食二服效。醫林集要

開結散猪鬃焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢為

末臨臥冷酒徐徐服二錢五服見效重者

一料愈以除日合之忌酸鹹油膩滯氣之

物

蝕爛癰腫

及疔贅瘡痔柞櫟木灰四斗桑柴灰四斗石灰一斗五升以沸湯調濕甌中蒸一日

取釜中湯七斗合甌灰淋之取汁再熬至

一升投入消盡餅髮一雞子大消盡又剪五色

絲投入消盡餅髮一雞子大消盡又剪五色

煎時勿令雞犬婦人小兒見。普濟方

面上靨子

七月七日午時取甜瓜葉七枚直入北堂中向南立逐枚拭靨即滅。淮南萬畢術

疔癩初起

柳樹上花蜘蛛纏之。口消。簡便

面上痣疵

寒食前後取桑條燒灰淋汁入石灰熬膏以自已唾調點之自落也。皆效方

身項粉瘤

舊皮鞋底洗淨煮爛成凍子常食之瘤自破如豆腐極臭。直指方

疣痣黑子

巴豆一錢石灰炒過人言一錢糯米五分炒研點之。怪症方

鼻外瘡瘤

膿水血出蜂房炙研酒服方寸七日三服。肘后方

瘤

疣 取東邊者撚為線繫之七日一換自消滅落去也。

總微論

疣痣黑子

斑蝥三箇人言少許以糯米五錢炒黃去米入蒜一箇搗爛貼之

血痣潰血

一人舊有一痣偶爪破血出一線七日不止欲死或用五靈脂末擦上即止也。楊

拱醫方
選要

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

煎藥

煎藥之法。凡欲煎藥。必先將藥材洗淨。然後切片。或搗碎。然後放入煎鍋中。加入水。用文火煎。煎至藥水剩下一半時。即可取出。將藥水過濾。去渣。即可服用。

本草類方卷之七

瘰癧第八十八

癧破經年

濃水不絕用百年茅屋厨中壁土為末入輕粉調傅半月即乾愈。永類方

瘰癧結核

鉛三兩鐵器炒取黑灰醋和塗上故帛貼之頻換去惡汁如此半月不痛不破內消

為水而愈。劉禹錫傳信方

項邊癧子

以桃核於刀上燒烟燻之。陳氏本草

瘰癧結核

連翹脂麻等分為末時時食之。簡便方

項上瘰癧

梁州砒黃研末濃墨汁丸梧子大銚內炒乾竹筒盛之每用針破將藥半丸貼之自

落蝕盡為度。靈苑方

癰癧結核 苦參四兩牛膝汁九綠豆大每煖
水下二十九○張文仲備急方

年久癰癧 生玄參搗傅之日
二易之○廣利方

熱毒癰癧 小芥子末醋和貼之看
消即止恐損○肘后

癰癧潰爛 癰瘡牽至胸前兩腋塊如茄子大或牽至
兩肩上下四五年不能療者皆治之其效如

神武進縣朱守仁傳云其項不能回頭用
之數日減可如瘡爛破者用荊芥根下一

段剪碎煎沸湯溫洗良久看爛破處紫黑
以鍼一刺去血再洗三四次愈用樟腦雄

黃等分為末麻油調搽上出水次日
再洗再搽以愈為度○治法機要

癰癧結核 或破未破以新薄荷二斤取汁皂莢一挺
水浸去皮搗取汁同於銀石器內熬膏入

連翹末半兩連白青皮陳皮黑牽牛半生
半炒各一兩皂莢仁一兩半同搗和丸梧

子大每服三十丸煎連翹湯下○濟生方

瘰癧未穿

靛花馬齒莧同搗日日塗傅取效○簡便方

瘰癧已潰

葶藶二合豉一升搗作餅子如錢大厚二分安瘡孔上艾作炷灸之令溫熱不可破

肉數易之而灸但灸不可初起之瘡恐葶藶氣入腦傷人也○永類方

項邊馬刀

屬少陽經用連翹二斤瞿麥一升大黃三兩甘草半兩每用一兩以水一盞半煎七分

壯六十日决效○張潔古活法機要

瘰癧馬刀

不問已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水二鍾煎七分食遠溫服虛甚者則煎

汁熬膏服並塗患處兼以十全大補湯加香附貝母遠志尤善此物生血乃治瘰癧

之聖藥也其草易得其功甚多○薛已外科經驗方

癩癧未破

野菊花根搗爛煎酒服以渣傅之自消不消亦自破也。○瑞竹堂經驗方

癩

癧

水紅子不拘多少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二錢日三服已破者亦治久則效效則止。○
寇宗奭本草衍義

鼠瘦不消

通草煮汁釀酒日飲

癩癧疔瘡

發背諸腫紫花地丁根去粗皮同白蒺藜為末油和塗神效。○乾坤秘韞

癩癧結核

茜草一兩為末雞子白調塗帛上貼之日二易取效止。○聖惠方

風毒癩癧

赤腫地菘搗傅乾即易之。○聖惠方

結核氣

莖菜日乾為末油煎成膏摩之日三五度便瘥。○孟詵食療
按莖音勤即旱勤也

癩癧初起

氣壯人用芫根搗水一盞服大吐利即平。○黃州陳大用所傳。○集簡方

男婦瘰癧

貓兒眼睛草一二捆井水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬至一

碗瓶收每以椒葱槐枝煎湯洗瘡淨乃搽此膏數次愈○便民圖纂方

瘰癧喉痺

攻痛生商陸根搗作餅置癧上以艾炷於上灸三四壯○外臺秘要

瘰癧經年

木鼈仁二箇去油研以雞子白和入瓶內安甌中蒸熟食後食之每日一服半月效

瘰癧惡瘡

及軟瘡用白膠香一兩瓦器溶化去滓以草麻子六十四箇去殼研膏溶膠投之攪

勻入油半匙投至點水中試軟硬添減膠油得所以緋帛量瘡大小攤貼一膏可治三五瘡也○

儒門事親

瘰癧結核

草麻子炒去皮每睡時服二三枚取效一生不可吃炒豆○阮氏經驗方

瘰癧初作

未破作寒熱草烏頭半兩木鼈子二箇以米醋磨細入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻

本草類方

瘰癧

三

傅上以紙條貼令通氣孔妙。○醫林正宗

癩癧結核

或破或不破下至胸前者皆治之用九真藤一名赤葛即何首烏其葉如杏其根如

雞卵亦類癩子取根洗淨日日生嚼并取葉搗塗之數服即止其藥久服延年黑髮

用之神效

○斗門方

癩癧潰爛

冷飯團切片或為末水煎服或入粥內食之須多食為妙江西所出色白者良忌鐵

器發物。陸氏積德堂方

癩癧未破

用月季花頭二錢沉香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯽魚腹中就以魚腸封固酒水

各一盞煮熟食之即愈魚須安糞水內遊死者方效此是家傳方活人多矣甚驗。○

談埜翁試驗方

蛇盤瘰癧

頭項交接者海藻菜以蕎麵炒過白殭蠶炒等分爲末以白梅泡湯和九梧子大每

服六十九米飲下必泄出毒氣○危氏得效方

蛇盤瘰癧

團接項下用蕎麥炒去殼海藻白殭蠶炒去絲等分爲末白梅浸湯取肉減半和丸

綠豆大每服六七十丸食後臨臥米飲下日五服其毒當從大便泄去若與淡菜連

服尤好淡菜生於海藻上亦治此也忌豆腐雞羊酒麵○阮氏方

瘰癧潰爛

桑黃菰五錢水紅豆一兩百草霜三錢青苔二錢片腦一分爲末雞子白調傅以車

前艾葉桑皮煎湯洗之○纂奇方

瘰癧不斂

乾姜爲末姜汁打糊和作劑以黃丹爲衣每日隨瘡大小入藥在內追膿盡生肉口

合爲度如不合以葱白汁調大黃末搽之即愈○救急方

年久瘰癧

阮氏經驗方不蛀皂莢子百粒米醋一升
一箇服二錢同煮乾炒令酥看瘰癧上多少如
浸煮服亦可。聖濟總錄言虛人不可用

也。硃砂

瘰癧初起

七月七日麻花五月五日艾葉等
分作炷灸之百壯。外臺秘要

瘰癧結核

文武膏用文武實卽桑椹子二斗黑熟者
以布取汁銀石器熬成膏每白湯調服一

匙日三服
○保命集

鼠

瘦 梓木皮五升水一斗煮汁二升服當有宿
肉出而愈乃張子仁方也。外臺秘要

鼠瘦核痛

未成膿以栢葉搗塗熬鹽熨之
氣下卽消。姚僧坦集驗方

鼠瘦不合

石南生地黃茯苓雄黃雌黃等
分爲散日再傳之。肘后方

瘰癧潰破

用田螺連肉燒存性香油調搽。集要方

瘰癧瘦瘡

椒煎神方。秋分前後早晚令人持袋摘椒葉納袋斤秤取十五斤以水一石淨釜中

煎取三斗又換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升乃納不津器中用時先取麻油半

合蠟一分酥一栗子許同消化又取杏仁七粒生姜少許同研米粉二錢同入膏中

攪勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篋子勻塗椒煎滿瘡上仍以軟帛裹之旦日

一拭更上新藥不過五六上已破者即便生肌未破者即內消瘡後須將慎半年採

藥及煎時並禁孝子婦人僧道雞犬見之。篋中方

男婦瘰癧

經驗用牡蠣煨研末四兩玄參末三兩麩糊丸梧子大每服三十九丸酒下日三服服

盡除根。初虞世云瘰癧不拘已破未破用牡蠣四兩甘草一兩為末每食後用臘

茶湯調服一錢其效如神

內消瘰癧

不拘大人小兒經驗方用斑蝥一箇去翅足以粟一升同炒米焦去米不用入薄荷

四兩為末烏雞子清丸如綠豆大空心臘茶下三九加至五九却每日減一丸減至

一丸後每日五丸以消為度○廣利治瘰癧經久不瘥用斑蝥一枚去翅足微炙以

漿水一盞空腹吞之用蜜水亦可重者不過七枚瘥

瘰癧潰爛

流串者用荊芥根下段煎湯溫洗良久看瘡破紫黑處以針刺去血再洗三四次用

韭菜地上蚯蚓一把五更時收取炭火上燒紅為末每一匙乳香沒藥輕粉各半錢

穿山甲九片炙為末油調傳之如神此云進朱守仁所傳有驗方○保命集

瘰癧結核

用紅娘子十四枚乳香砒霜各一錢兩砂一錢半黃丹五分為末糯米粥和作餅貼

之不過一月其核自然脫去矣。○衛生簡易方

瘰癧潰壞

用黃魚破開入蓖麻子二十粒拈定安厠坑中冬三日春後一日夏半日取出洗

淨黃沉固濟煨存性研香油調傅。○按黃魚即黃頰魚黃鱗魚黃頰魚鰵魚黃魚諸名是也

頸項瘰癧

用帶殼螻蛄七枚生取肉入丁香七粒於殼內燒過與肉同研用紙花貼之。○救急方

鼠

瘰

劉涓子用山龜殼炙狸骨炙甘草炙雄黃桂心乾姜等分爲末飲服方寸七仍以艾

灸瘡上用蜜和少許入瘡中良

鼠痔成瘡

腫痛用穿山甲尾尖處一兩炙存性鱉甲酥炙一兩麝香半錢爲末每服一錢真茶

瘰癧

湯服取效
○直指方

瘰癧結核

無問有頭無頭用大蜘蛛五枚日乾去
足細研酥調塗之日再上○聖惠方
集驗方用鮫鯉甲二十一斤燒研傅之○
壽域方用穿山甲土炒斑蝥熟艾等分爲

瘰癧潰壞

末傅之外以烏相
葉即上灸四壯效

頰下結核

大蜘蛛不計多少好酒浸過同研爛澄
去滓臨臥時服之最效○醫林集要
茶蜈蚣二味炙至香熟搗篩爲末
先以甘草湯洗淨傅之○枕中方

瘰癧潰瘡

鼠瘦瘰癧

用豬膏淹生地黃
煮六七沸塗之

瘰癧未潰

連殼蝟牛七箇丁香七粒
同燒研紙花貼之○危氏

瘰癧初起

用壁虎一枚焙研每日
服半分酒服○青囊

瘰癧已潰

蝸牛燒研輕粉少許用生豬脊髓調傅之。危氏方

瘰癧潰爛

用黑色蝦蟇一枚去腸焙研油調傅之忌鐵器

瘰癧已破

土墻上白螺螄殼為末日日傅之。談埜翁方

鼠瘦腫核

已破出膿水者蜘蛛二七枚燒研傅之。千金

項上瘰癧

白殭蠶為末水服五分日三服十日瘥。外臺方

瘰癧已破

羊屎燒五錢杏仁燒五錢研末猪骨髓調搽。海上

鼠瘦瘰癧

千金五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白猪屎各一升於石上燒灰漏蘆末二

兩以猪膏一升煎亂髮一兩同熬五六沸塗之神驗。肘后治鼠瘦有核膿血用熱

牛屎封之日三

本草類方

瘰癧

三

療癰鼠瘻

以石菖蒲生研禽之微破以貓兒皮連毛燒灰用香油調傅內服白斂末酒下多多為上仍以生白斂搗爛入酒少許傅之效。○證治要訣

療癰汁出

不止用鴨脂調半夏末傅之。○永類方

多年癰癧

不愈神效方用蝙蝠一箇貓頭一箇俱搽上黑豆燒至骨化為末搽之乾即油調傅內服連翹湯

療癰結核

黑牛皮膠溶化難膏貼之已潰者將膏搓作線長寸許紐入孔中頻換拭之取效。○楊氏

經驗

療癰潰爛

臘貓屎以陰陽瓦合鹽泥固濟煨過研末油調搽之。○儒門事親

療癰腫痛

久不瘥用貓頭蹄骨並塗酥炙黃為散每日空口服

項下瘰癧用羊臙脰燒灰香油調傅

鼠瘦已潰雞卵一枚米下蒸半日取黃熬令黑先拭瘡令乾以藥納孔中三度即愈○千金方

瘰癧瘦瘡雄雞屎燒灰臘猪脂和傅之○千金方

鼠瘦潰壞新鼠屎一百粒收密器中五六日杵碎即傅之效○千金方

項上瘰癧左盤龍炒研末飯和九梧桐子大每服三五十九米飲下○張子和方

瘰癧已潰貓頭燒灰頻傅之○千金

鼠瘦潰爛鼠一枚亂髮一雞子大以三歲臘猪脂煎冷消盡以半塗之以半酒服姚云不傳之妙法也

○葛氏

瘰癧腫毒女人精汁頻塗之

本草頌方
瘰癧

七

瘰癧已潰 牛皮油鞋底燒灰麻油調傅之。○集玄方

瘰癧軟癰 白膠香一兩化開以蓖麻子六十四粒研入待成膏攤貼。○儒門事親

鼠瘦惡瘡 苦參二斤露蜂房二兩麩二斤水二斗漬二宿去滓入黍米二升釀熟稍飲日三次

○肘后方

鼠瘦已破 出膿血者白鮮皮煮汁服一升當吐若鼠子也。○肘后方

諸毒鼠瘦 玄參漬酒日日飲之。○開寶本草

項後結核 或赤腫硬痛以生山藥一挺去皮蓖麻子二箇同研貼之如神。○救急易方

本草類方卷之七

九漏第八十九

一切漏瘡有孔用信石新瓦火煨研末以津調少許於紙然上插入蝕去惡管漏多勿齊上最

妙○急救易方

冷瘡成漏

明礬半生半飛飛者生肉生者追膿五靈脂水飛各半錢為末以皮紙裁條唾和末作小然子香油捏濕於末拖過剪作大小然安入漏早安午換候膿出盡後有些小

血出方得乾水住藥自然生肉痊好○普濟方

一切漏疾

白馬通汁每服一升良○千金方

蝮蛄漏瘡

茜根燒灰千年石灰等分為末油調傅○儒門事親

下部漏瘡

苦參煎湯日日洗之。直指方

上下諸瘰

或在項或在下部用苦參五升苦酒一斗漬三四日服之以知為度。肘后方

瘰

瘡

楸枝作煎頻洗取效。肘后方

一切漏瘡

鹽麩和團燒研傅之。千金方

諸瘰不合

虎薊根貓薊根酸棗根枳根杜衡各一把斑蝥三分炒為末蜜丸棗大日一服并以小丸納瘡中。肘后方

蝎瘰五孔

相通者半夏末水調塗之日二。聖惠方

漏瘡惡穢

大腹皮煎湯洗之。直指

膿瘰不止

桃花為末豬脂和傅之日二。千金

五種瘦疾

芥子末以水蜜和傳乾即易之。○廣濟方

九瘦有孔

苦瓠四枚大如盞者各穿一孔如指大湯煮十數沸取一竹筒長一尺一頭插瓠孔

中一頭注瘡孔上冷則易之用遍乃止。○千金方

腦漏流膿

破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分血竭麝香各五分為末以好酒洒濕熟艾

連藥揉成餅貼在頂門上以熨斗熨之以愈為度。○孫氏集效方

漏瘡水溢

乃腎虛也牽牛末二錢半入切開猪腎中竹葉包定煨熟空心食溫酒送下借腎入

腎一縱一橫兩得其便惡水既泄不復淋瀝。○直指方

瘡久成漏

忍冬草浸酒日日常飲之。○戴原禮要訣

一切漏疾

千金用榭樹北陰白皮三十斤剉以水一石煮一斗去滓煎如飴又取通都厠上雞

鼠屎雌鼠屎各十四枚燒汁盡研和之納
溫酒一升和勻瘦人食五合當有虫出也

○崔氏纂要用榭白皮切五升水八升煮
令汁盡去滓再煎成膏日服棗許并塗瘡

上宜食苜蓿鹽飯
以助之以差為度

蝮蛄漏疾

榭葉燒存性研以米泔別浸榭葉取汁
洗瘡後乃納灰少許於瘡中○聖惠方

氣瘦疔瘡

多年不愈者應效散又名託裏散用地骨
皮冬月者為末每用紙撚蘸入瘡內頻用
自然牛肉更以米飲服二錢

一日三服○外科精義

漏瘡膿血

白乳香二錢牡蠣粉一錢為末雪糕丸
麻子大每薑湯服二十九○直指方

漏瘡腫痛

柳根紅鬚煎水日洗○摘玄方
用楊柳條罐內燒烟熏之即效

蛇瘻不愈

蛇腹盡燒灰
封之○千金

一切瘰瘡

鍊成松脂末填令滿日三四度。聖惠方

下部漏痔

大露蜂房燒存性研搽之乾則以真菜子油調。唐氏經驗方

一切漏瘡

不拘蜂瘻鼠瘻蟻蠅燒末醋和傅。千金

三因白花散

治九漏瘰癧發項腋之間痒痛憎寒發熱白花蛇酒浸取肉二兩焙生犀角一兩二

錢五分鎊研黑牽牛五錢半生半炒青皮五錢為末每服二錢入膩粉五分五更時

糯米飲調下利下惡毒為度十日一服可絕病根忌發物

諸瘻不愈

用蜥蜴炙三枚地膽炒三十枚斑蝥炒四枚為末蜜丸小豆大每服二丸白湯下

治諸法不效者。劉涓子鬼遺法

瘻有數孔

用耕垡土燒赤以苦酒浸之合壁土令熟以大黃鮮展轉染土貼之每日一次。千

方金

一切冷瘰

人吐蛇虫燒灰先以甘草湯洗淨塗之無不瘥者慎口味。千金方

諸漏有膿

蛇蛻灰水和傅上即蟲出。千金方

風瘦不合

露蜂房一枚炙黃研末每以一錢臘猪脂和塗。肘后方

瘰癧不愈

鮫鯉甲二七枚燒灰猪脂調傅。千金方

瘰癧有蟲

八月中多取斑蝥以片酒浸半日曬乾每用五箇銅器炒熟為末巴豆一粒黃犬骨

上毛二七根炒研硃砂五分同和苦酒頓服其蟲當盡出也

一切冷漏

自死蛇取骨為末封之火痛以杏仁膏摩之即止。千金方

翼蠶瘰瘡

五月五日蛇頭及野猪脂同水衣封之佳。千金方

漏瘡不合

以紙粘臘猪脂納瘡中
日五夜三。千金翼

一切惡瘻

中有冷瘧肉者用正月狐糞乾末食
前新汲水下一錢七日二。千金方

脇漏出水

不止用烏牛耳
垢傅之即瘥

五瘻漏瘡

鴛鴦一隻治如常法炙熟細切以五
味醋食之作羹亦妙。食醫心鏡

瘦瘡膿水

不止不合用啄木一隻或火老鴉亦可搵
泥固濟煨存性研末酒下二錢七。姚大

夫方

九漏有蟲

乾人尿乾牛屎隔綿貼之亟聞其氣
即出若痒則易之蟲盡乃止。千金

漏瘡惡瘡

乾水生肌用人牙灰油髮灰雞內金灰各
等分爲末入麝香輕粉少許油調傅之。

直指方

雀漏有蟲

母猪尿燒灰以臘月猪膏和傅當有虫出。千金方

石瘻出膿

堅實寒熱鼠粘子葉為末和雞子白封之。外臺秘要

本草類方卷之七

癰疽第九十

疔毒疽瘡

凡手指及諸處有瘡起發痒身熱惡寒或麻木此極毒之瘡也急用針刺破擠去惡

血候血盡口噉凉水吮之水溫即換吮至痛痒皆住即愈此妙法也。保壽堂方

癰腫初起

以熱湯頻沃之即散也。集簡方

腸

癰

死人塚上土作泥塗之良。千金方

發背癰癩

多年烟熏壁土黃蘗等分爲末姜汁拌調攤貼之更以茅香湯調服一錢七。經驗

方

癰疽惡瘡

着手足肩背纍纍如赤豆出汁剝痂以溫醋米泔洗淨用胡燕窠土和百日男兒尿

本草類方

癰疽

三

傳之。千金方。

腫毒焮痛

陳藏器本草用醋和泥蜂巢塗之。直指加川烏頭等分云未結則散已結則破也

婦人吹乳

用韭地上蚯蚓屎研細篩過米醋調厚傅乾則換三次即愈涼水調亦可。蘭氏經

方驗

時行腮腫

柏葉汁調蚯蚓泥塗之。丹溪方

一切癰腫

伏龍肝以蒜和作泥貼之乾再易或雞子黃和亦可。外臺秘要

發背欲死

伏龍肝末酒調厚傅之乾即易平乃止。千金

癰腫發背

醋磨濃墨塗四圍中以猪膽汁塗之乾又上一夜即消。趙氏方

瘰疬出汁

着手足肩背纍纍如米用竈突墨竈屋塵

四度。外臺秘要

發背腫痛 厨內倒弔塵為末以生葱極嫩心同搗膏傅之留頂一日一換乾則以水潤之。瀕

湖集簡方

石癰不膿 梁上塵灰葵根莖灰等分用醋和傅之。千金方

婦人妬乳 醋和梁上塵塗之。千金方

癰疽發背 熏鉛一斤甘草三兩微炙瓶盛酒一斗浸甘草乃溶鉛投酒中如此九度去滓飲酒醉臥即愈

○經驗方

懸癰腫痛 鉛白霜一分甘草半生半炙一分為末綿裹含嚥。聖惠方

發背惡瘡 諸癰疽好光粉二兩真麻油三兩慢火熬以柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許

本草類方

癰疽

毒

入器水浸兩日油紙攤貼名神應膏。直指方

發背初起

鐵漿飲二斤取利。外臺秘要

癰腫毒氣

紫石英火燒醋淬為末生姜米醋煎傅之摩亦得。日華本草

癰疽惡瘡

楊梅諸瘡水銀一兩硃砂雄黃各二錢半白礬綠礬各二兩半研勻罐盛燈盞蓋定

鹽泥固濟文武火鍊升罐口掃收每以三錢入乳香沒藥各五分洒太乙膏上貼之

絕效名曰五寶霜

癰疽瘕肉

石灰半斤蕎麥楷灰半斤淋汁煎成霜密封每以針畫破塗之自腐。普濟方

手足甲疽

熏黃蛇皮等分為末以泔洗淨割去甲入肉處傅之一頃痛定神效。近效方

疽瘡發背

銀朱白礬等分煎湯溫洗却用桑柴火遠遠灸之。日三次甚效。效意方

服上癰癰合之。李樓奇方

乳癰腫大如盃腫痛白薑石末和雞子清傅之乾即易。外臺秘要

潰癰作痒以鹽摩其四圍即止。外科精義

腫毒不破膽礬雀屎各少許點之。直指方

諸般腫毒吸鐵石三錢金銀藤四兩黃丹八兩香油一斤如常熬膏貼之。乾坤秘鑑

懸癰垂長咽中煩悶白礬燒灰鹽花等分爲末筋頭頻點在咽上去涎。孫用和秘寶方

發背初起惡寒箭箭或已生瘡腫隱疹硝石三兩暖水一升泡化青布摺三重溫搨赤處熱即換頻易取瘥。外臺秘要

惡疽卒腫硝砂半兩綿裹含之。燕津即安。聖惠方

本草類方 癰疽

癰疽疔腫

一切惡瘡金絲草忍冬藤五葉藤天蕎麥等分煎湯溫洗黑色者加醋。又鐵箍散用金絲草灰二兩醋拌曬乾貝母五兩去心白芷二兩為末以涼水調貼瘡上香油亦可或加龍骨少許

疔腫痛

貝母白芷等分為末酒調服或酒煎服以萍貼之。汞類鈴方

癰疽疔腫

惡瘡及黃疸慈菇連根同蒼耳草等分搗爛以好酒一鍾濾汁溫服或乾之為末每酒服三錢。乾坤生意

乳初腫

貝母末酒服二錢仍令人吮之即通。仁齋直指方

吹妳作痛

貝母末吹鼻中大效。危氏得效方

發背初起

疑似者便以秦芫牛乳煎服得快利三五行即愈。崔元亮海上集驗方

癰疽瘡腫性等分為末以茶或雞子清調塗。簡易

方

癰疽不合石硫黃粉以筋蘸插入孔中以瘡為度。外臺秘要

吹乳腫痛遠志焙研酒服二錢。袖珍方

癰疽腫毒已潰未潰皆可用黃連檳榔等分為末以雞子清調搽之。王氏簡易方

無名癰腫已破者研末乾塗。瀕湖集簡方

腫毒熱痛醋調白芷末傳之。衛生易簡方

一切癰疽遠志酒治一切癰疽發背癰毒惡候侵大有死血陰毒在中則不痛傳之即痛有憂

怒等氣積怒攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傳之即清

凉或氣虛冷潰而不斂傅之即斂此本韓
 大夫宅用以救人方極驗若七情內鬱不
 問虛實寒熱治之皆愈用遠志不拘多少
 米泔浸洗搥去心為末每服三錢溫酒一
 盞調澄少頃飲其清以
 滓傅患處○三因方

些小癰癩

發熱時即用粉草節曬乾為末熱酒服一
 二錢連進數服痛熱皆止○外科精要方

痒疽內固

黃耆人參各一兩為末入真龍腦一錢用
 生藕汁和丸綠豆大每服二十九溫水下
 日日服○

本事方

一切癰疽

諸發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻
 功效不可具述用大橫文粉草二斤搥碎
 河水浸一宿揉取濃汁再以密絹過銀石
 器內慢火熬成膏以瓷罐收之每服一二
 匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者亦解之
 或微利無妨名國老膏○外科精要方

乳癰腫痛

紫蘇煎湯頻服并搗封之。海上仙方

發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生薑篩末大

麥麩九兩和勻取好酥少許人肉下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上以

紬片及故紙隔令通氣冷則換已成者膿水自出未成者腫便內消仍當喫黃芪粥

為妙。又一法甘草一大兩水炙搗碎水一大升浸之器上橫一小刀子露一宿平

明以物攪令沫出去沫服之但是瘡腫發背皆甚效。蘇頌圖經

乳癰初起

灸甘草二錢新水煎服仍令人啣之。直指方

諸般癰疽

甘草三兩微炙切以酒一斗同浸瓶中使用黑鉛一片溶成汁投酒中取出如此九度

令病者飲酒至醉寢後即愈也。經驗方

婦人乳癰丹參白芷芍藥各二兩反咀以醋淹一夜
猪脂半斤微火煎成膏去滓傅之。孟詵

必效

癰疽秘塞生甘草二錢半井水煎服
能疎導下惡物。直指方

癰腫無頭龍葵莖葉搗
傅。經驗方

便毒腫痛貫衆酒服二錢
良。多能鄙事

熱毒癰腫秋後收連錢草陰乾為末水調
傅之生搗亦可。寇氏衍義

一切癰疽瘡癰疔癩惡瘡下疳疔瘰癧潰後外傷風寒
惡汁臭敗不斂並主之木香黃連檳榔等

分為末油調頻塗之
取效。和劑局方

癰疽瘡瘍曾孚先云凡癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而

血聞香卽行聞臭卽逆滄瘍皆由氣瀰而血聚最忌臭穢不潔觸之毒必引蔓陳正節公云大凡疽疾多因怒氣而得但服香附子藥進食寬氣大有效也獨勝散用香附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾碾爲細末無時以白湯服二錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈後服至半年尤妙。陳自明外科

酒毒生疽

一婦嗜酒胸生一疽脉緊而瀰用酒炒人參酒炒大黃等分爲末薑湯服一錢得唾

汗出而愈效
○丹溪醫案

乳癰初起

白芷貝母各二錢爲末溫酒服之。秘傳外科方

岐毒初起

芭蕉葉熨斗內燒存性入輕粉麻油調塗一日三上或消或破皆無痕也。仁齋直

本草類方

癰疽

方指

癰疽腫毒

連翹草及根各一升水一斗六升
煮汁三升服取汗。外臺秘要

一切腫毒

及傷寒遺毒發於耳之前後及項下腫硬
用見腫消草生白及生白歛土大黃生六

薊根野苧麻根搗成餅入芒硝一錢和貼
留頭乾即易之若加金線重樓及山慈菇

尤妙。傷寒蘊要

一切癰毒

及腸癰妳癰赤腫未破或已破而膿血不
散發熱疼痛能食者並宜排膿托裏散用

地蜈蚣赤芍藥當歸甘草等分爲末每服二錢溫酒下。和劑局方

甲疽延爛

崔氏方治甲疽或因割甲傷肌或因甲長
侵肉遂成瘡腫黃水浸淫相染五指俱爛

漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡日夜怪
憎醫不能療綠礬石五兩堯巨十壹千

色如黃丹收之每以鹽湯洗拭用木厚熨
之以軟帛煖裏當日卽汁斷瘡乾每日一
遍鹽湯洗濯有膿處使淨傅其痂乾處不
須近但有急痛處塗酥少許令潤五日卽
覺上痂起依前洗傅十日痂漸剝盡軟處
或更生白膿泡卽擦破傅之自然瘥也張
侍郎病此臥經六十日京醫並處方
無效得此法如神。王燾外臺秘要

婦人甲疽

婦人趾甲內生瘡惡肉突出久不愈名臭
田螺用皂礬日晒夜露每以一兩煎湯浸

洗仍以礬末一兩加雄黃二錢硫黃一錢
乳香沒藥各一錢研勻搽之。醫方摘要

乳癰腫痛

馬鞭草一握酒一碗生薑一塊
搗汁服渣傅之。衛生易簡方

癰疽赤腫

白芷大黃等分爲末米
飲服二錢。經驗方

一切毒腫

商陸根和鹽少許搗傅日
再易之。孫真人千金方

本草類方

癰疽

完

腹癰有膿

薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁十分附子二分敗醬五分搗為末每以方寸七水二

升煎一升頓服小便當下

即愈。張仲景金匱玉函

卒腫毒起

升麻磨醋頻塗之。肘后

癰疽諸瘡

王不留行湯治癰疽妬乳月蝕白禿及面上久瘡去重止痛用王不留行東南桃枝

東引菜莖根皮各五兩蛇牀子牡荊子苦

竹葉蒺藜子各三升大麻子一升以水二

斗半煮取一斗頻

頻洗之。千金方

發背癰疽

成瘡者蘇頌圖經云用龍葵一兩為木麝香一分研勻塗之甚善。袖珍方六一切

發背癰疽惡瘡用蝦蟇一箇同老鴉

眼睛草莖葉搗爛傅之即散神效

發背癰毒

痛不可忍龍牙草搗汁飲之以滓傅患處。集簡方

便癰初起

皂莢子七箇研末水服效一方
照年歲合之。儒門事親方

癰腫不破

黃葵子研酒服一粒則出
頭神效。衛生易簡方

發背初起

草決明生用一升搗生甘草一兩水三升
煮一升分二服大抵血滯則生瘡肝主藏

血決明和肝氣不損元
氣也。許學士本事方

便毒初起

冬葵子末酒服二
錢。儒門事親

腸胃生癰

懷忠丹治內癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷
痛用此排膿下血單葉紅蜀葵根白芷各

一兩白枯礬白芍藥各五錢為末黃蠟溶
化和丸梧子大每空心米飲下二十九待

膿血出盡服十宣散
補之。垣仙皆效方

癰腫無頭

孟詵曰三日後取葵子二百粒水吞之當
日即開也。經驗方云只吞一粒即破如

本草頁方

癰疽

三

吞兩粒則有兩頭也

癰疽腫毒

黃蜀葵花用鹽摻收瓷器中密封經年不壞每用傅之自平自潰無花用根葉亦可

指方直

一切癰瘡

婦人妬乳乳癰小兒頭瘡及浸淫黃爛熱瘡疥疽陰蝕並用天麻草切五升以水一

斗半煮一斗分數次洗之以殺痒。千金

癰疽惡毒

番降末楓乳香等分爲丸熏之去惡氣甚妙。集簡方

一切腫疾

紅花熱搗取汁服不遇三服便瘥。外臺秘要

乳頭裂破

燕脂蛤粉爲末傅之。危氏得效方

一切癰疽

發背初發二日但有熱證便宜服漏

服漏盧用有白茸者連翹生黃芪沉香各一兩生粉草半兩大黃微炒二兩為細末每服二錢薑棗湯調下

○李迅癰疽集驗方

勒乳成癰

益母為末水調塗乳上一宿自瘥生擣亦可。○聖惠方

瘡疽不出

紅花子紫草茸各半兩蟬蛻二錢半水酒鍾半煎減半量大小加減服。○龐安常傷

寒論

癰腫惡肉

不消者蒴藿灰石灰各淋取汁合煎如膏傅之能蝕惡肉亦去痣疵此藥過十日即

不中用。○千金方

乳癰初發

腫痛結硬欲破一服即瘥以北來真樺皮燒存性研無灰酒溫服方寸匕即臥覺即

瘥也。○沈存中靈苑方

身面石疽

狀如瘰癧而皮厚穀子
搗傅之。外臺秘要

便癰膿血

白膠香一兩為末入麝香
輕粉少許摻之。袖珍方

木占斯散

治發背腸癰疽痔婦人乳癰諸產癥瘕無
有不療服之腫去痛止膿消已潰者便早

愈也木占斯甘草炙厚朴炙細辛栝樓防
風乾薑人參桔梗敗醬各一兩為散酒服

方寸七晝七夜四以多為善此藥入咽當
覺流入瘡中令化為水也癰疽灸不發敗

壞者尤可服之內癰在上者當吐膿血在
下者當下膿血其瘡未壞及長服者去敗

醬一方加桂心。

癰疽惡瘡

紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗
爛酒一鍾絞汁服。楊誠經驗方

癰疽腫毒

李迅癰疽方云凡人病癰疽發背不問老
少皆宜服黃礬丸服至一兩以上無不作

效最止疼痛不動臟腑活人不可勝數用
明亮白礬一兩生研以好黃蠟七錢溶化
和丸梧子大每服十丸漸加至二十丸熟
水送下如未破則內消已破即便合如服
金石發瘡者引以白礬末一二匙溫酒調
下亦三五服見效有人遍身生瘡狀如蛇
頭服此亦效諸方俱稱奇效但一日中服
近百粒則有力此藥不惟止痛生肌能防
毒氣內攻護膜止瀉托裏化膿之功甚大
服至半斤尤佳不可欺其淺近要知白礬

一切癰疽

大能解毒也今人名為蠟礬丸用之委有效驗
及打撲傷損未破疼痛者以生地黃杵如
泥攤在上摻木香末於中又攤地黃泥一
重貼之不過三五度即
內消也○王袞博濟方

癰疽發背

初起未成者芋根熟搗傅上日
夜數易腫消則瘥○圖經本草

癰疽

發背初起

未成及諸熱腫以濕紙塌上先乾處是頭
著艾炙之不論壯數痛者灸至不痛不痛

者灸至痛乃止其毒即散不散亦
免內攻神方也○李絳兵部手集

便癰腫痛

鼠粘子二錢炒研末入蜜一匙朴
硝一匙空心溫酒服○袖珍方

一切腫毒

芭蕉根搗爛傳
之○肘后方

癰疽發背

無名諸腫貼之如神紫花地丁草三伏時
收以白麵和成鹽醋浸一夜貼之昔有一

尼發背夢得此方數日
而痊○孫天仁集效方

乳癰初起

內消花即玉簪花取根搗
酒服以渣傳之○海上方

便癰初起

淮人用黃蜀葵子七七粒皂莢半挺為
末以石灰同醋調塗之○永類鈴方

乳上生癰

脂麻炒焦搗爛以燈盞內

發背初起水調白飲未塗

發背初起地菘杵汁一升日再服
癢乃止。傷寒類要

一切癰疽發背惡瘡用鐵掃帚同松毛
牛膝以水煎服。乾坤生意

毒攻手足腫痛欲斷蒼耳搗汁漬之并以滓傅
之立效春用心冬用子。千金翼

疔腫乳癰地黃搗敷之熱即易性涼
消腫無不效。梅師方

癩子腫毒鼠粘子葉貼
之。千金方

癰癤惡肉地黃三斤水一斗煮取三升去滓煎
稠塗紙上貼之日三易。鬼遺方

癰疽便閉紫草括樓實等分新
水煎服。直指方

婦人吹乳鼠粘一錢麝香少許溫
酒細吞下。袖珍方

本草類方
癰疽

便毒初起 芫根搗水服以渣傅之得下即消
黃州熊珍所傳。瀕湖集簡方

發背欲死 芭蕉根搗爛塗
之。肘后方

乳汁結毒 產後乳汁不泄結毒者皂莢刺蔓荆子各
燒存性等分為末每溫酒服二錢。袖珍
方

萬應膏 治一切癰疽發背無頭惡瘡腫毒疔瘡一
切風痒腫瘡杖瘡牙疼喉痺五月五日採
蒼耳根葉數擔洗淨曬萎細剉以大鍋五
口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再濾復
入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新
罐貯封每以敷貼即愈牙疼即敷牙上喉
痺敷舌上或噙化二三次即效每
日用酒服一匙極有效。集簡方

癰疽發背 凡人中熱毒眼花頭運口乾舌苦心驚背
熱四肢麻木覺有紅暈在背後者即取鬼

花子一大抄鐵杓炒褐色以好酒一盃淬之乘熱飲酒一汗即愈如未退再炒一服

極效縱成膿者亦無不愈彭幸菴云此方三十年屢效者。劉松石保壽堂方

癰瘡已潰

芫花根皮搓作撚插入則不生合令膿易竭也。集簡方

癰疽疔腫

一切無名腫毒孫氏集效方用野菊花連莖搗爛酒煎熱服取汗以滓傅之即愈。

衛生易簡方用野菊花莖葉蒼耳草各一握共搗入酒一碗絞汁服以滓傅之取汗

即愈或六月六日採蒼耳葉九月九日採野菊花為末每酒服三錢亦可

癰腫初起

芫花末和膠塗之。千金方

癰疽不合

瘡口冷滯以北艾煎湯洗後白膠熏之。直指方

癰腫癩毒

潰爛疼痛用薔薇皮更炙熨之。千金方

本草類方

癰疽

三

陰卒腫痛

柳枝三

帛裏包

仍

以熱湯洗之

○集驗方

一

癰癤已潰

用牛膝根畧刮去皮

在外以嫩橘葉及地

人瘡口中留半寸

各一握搗傅上

小止痛隨乾隨

上

牛膝能去惡血

換有十全之功也

○陳日華經驗方

乳癰初腫

扁竹根如死蠶者同萱草根為末

蜜調傅之神效

○永類方

石癰如石

堅硬不作膿者

生商陸根搗擦之

燥即易

取軟為度亦治濕漏諸癰

○張文仲方

癰疽腫毒

一切惡瘡

豨薟草端午采者

一兩乳香一

兩白礬燒半兩為末

每服二錢熱酒調下

毒重者連進二服得

汗妙

○乾坤秘鑑

癰疽發背

及乳瘡

半夏末雞子

白調塗之

○肘后方

乳癰潰爛

銀杏半斤以四兩研傅之

○救急易方

以四兩研傅之

○救急易方

以四兩研酒服之

吹妳乳癰五月五日櫻箬燒灰酒服二錢卽散累效。濟急仙方

乳腫不消莽草小豆等分爲末苦酒和傅之。衛生易簡

癰疽惡肉白炭灰白荻灰等分煎膏塗之。餌盡惡肉以生肉膏貼之亦去黑子此藥只可留十日久則不效。

葛洪肘后方

發背潰爛陳蘆葉爲末以葱椒湯洗淨傅之神效。乾坤秘鑑

緩疽腫痛葛茹一兩爲散溫水服二錢七。聖惠方

發背疔瘡豨莶草五葉草卽五爪龍野紅花卽小薊大蒜等分搗爛入熱酒一盞絞汁服得汗

立效。乾坤生意

石癰堅硬不作膿者菘蓉子爲末醋和傅瘡頭根卽拔出。千金方

本草類方
癰疽

一切毒腫痛不可忍蓖麻子仁搗傅即止也肘后方

吹妳腫痛半夏一箇煨研酒服立愈一方以末隨左右嚙鼻效劉長春經驗方

乳癰堅硬新葇若子半匙清水一盞服之不得嚼破外臺秘要

婦人乳癰皂莢刺燒存性一兩蚌粉一錢和研每服一錢溫酒下直指方

羊疽瘡痒黎蘆二分附子八分爲末傅之虫自出也陶隱居方

一切癰腫權曰白欽赤小豆藺草爲末雞子白調塗之陶隱居方用白欽二分藜蘆一分爲末酒和貼

之日三上

癰疽腫毒川烏頭炒黃蘗炒各一兩爲末唾調塗之留頭乾則以米泔潤之深師方

疽瘡有蟲生麻油滓貼之綿裏當有蟲出千金方

乳癰腐爛

靴內年久樺皮燒灰酒服一錢日一服。唐璠經驗

腫毒初起

大黃五倍子黃蘗等分為末新汲水調塗日四五次。簡便方

發背初生

一切癰疽皆治單用紫荆皮為末酒調極佳自然撮小不開內服柞木飲子乃救貧

良劑也。

仙傳外科

柞木飲

治諸般癰腫發背用乾柞木葉乾荷葉中心蒂乾萱草根甘草節地榆各四兩細剉

每用半兩水二盞煎一盞早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自消

散也忌一切飲食毒物

許學士本事普救方

癰疽出汁

着手足肩背纍纍如赤豆用枸杞根葵根葉煮汁煎如飴隨意服之。千金方

癰腫焮熱

作痛大黃末醋調塗之燥即易不過數易即退甚驗神方也。肘后方

癰疽

癰疽

癰疽

癰疽弩肉

如眼不斂諸藥不治此法極妙附子削如
碁子大以唾粘貼上用艾火灸之附子焦

復唾濕再灸令熱氣

徹內卽瘥。千金方

癰疽肉突

烏頭五枚濃醋三升漬三口洗
之日夜三四度。古今錄驗

乳癰腫毒

金黃散用川大黃粉草各一兩爲末等酒
熬成膏收之以絹攤貼瘡上仰臥仍先以

溫酒服一大匙明日取
下惡物。婦人經驗方

諸癰發背

初起微赤栝樓搗末并華
水服方寸匕。梅師方

疔瘡發背

草烏頭去皮爲末用葱白連鬚和搗丸
豆大以雄黃爲衣每服一九先將葱一根

細嚼以熱酒送下或有惡心嘔三四口用
冷水一口止之卽臥以被厚蓋汗出爲度

亦治頭風。

乾坤秘鑑

便毒腫痛

皂莢炒焦水粉炒等分研末以熱醋調搗貼患處頻以水潤之即效。又方用猪牙

末空心溫酒服五錢。袖珍方

婦人吹乳

袖珍方用猪牙皂莢去皮蜜炙為末酒服一錢。又詩云婦人吹妳法如何皂莢燒

灰蛤粉和熱酒一盃調八字管教時刻笑呵呵

癰疽惡肉

烏金膏解一切瘡毒及腐化瘀肉最能推陳致新巴豆仁炒焦研膏點痛處則解毒

塗瘀肉上則自化加乳香少許亦可若毒深不能收斂者宜作燃紅之不致成痛。

外科精義

乳癰初發

大熱栝樓一枚熟搗以白酒一斗煮取四升去滓溫服一升日三服。子母秘錄

癰腫初起

孟詵食療用栝樓根苦酒熬燥搗篩以苦酒和塗紙上貼之。楊文蔚方用栝樓根

赤小豆等分爲末醋調塗之

諸般癰疽

新掘天門冬三五兩洗淨沙盆搗細以好酒濾汁頓服未效再服必愈此祖傳經驗方也。虞搏

醫學正傳

便毒初發

黃瓜萋一箇黃連五錢水煎連服效。李仲南永類方

癰疽毒瘡

臘月飴餈晝夜塗之數日則愈。千金方

癰疽毒瘡

紅內消不限多少瓶中文武火熬煎臨熱入好無灰酒相等再煎數沸時時飲之其滓焙研爲末酒煮麵糊丸梧子大空心溫酒下三十丸疾退宜常服之卽赤何首烏

也建昌產者良。陳自明外科精要。

發背不潰

皂莢刺麥麩炒黃一兩綿黃芪焙一兩苜蓿半兩爲末每服一大錢酒一盞乳香一

塊煎七分去滓溫服。○普濟本事方

對口惡瘡

野苦蕒搗汁一鍾入薑汁一匙和酒服以滓傅一二次即愈。○唐暹經驗方

骨攣癰漏

薛已外科發揮云服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成癰連年累月至於

終身成廢疾者士草薺一兩有熱加苓連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代

茶月餘即安。○朱氏集驗方用過山龍四兩即硬飯加四物湯一兩皂莢子七箇川

椒四十九粒燈心七根水煎飲

諸般癰腫

黃明膠一兩水半升化開入黃丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍白

消。○本

癰疽發背

榆根白皮切清水洗搗極爛和香油傅之留頭出氣燥則以苦茶頻潤不粘更換新

本草類方

癰疽

卷

者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之口合乃止神效。救急方

一切癰疽

馬蹄草即蓴菜春夏用莖冬月用子就於根側尋取搗爛傅之未成即消已成即毒

散用菜亦可。保生餘錄

乳癰腫毒

龍舌草忍冬藤研爛蜜和傅之。多能斷事

毒腫初起

水中萍子草搗傅之。則后方

發背初起

腫厥赤熱浮萍搗和雞子清搗之。聖惠方

腫毒初起

白芥子末醋調塗之。瀕湖集簡方

惡核腫結

小蒜吳茱萸等分搗傅即散。肘后方

癰疽發熱

疽着手足肩背累累如米起色白刮之汁出復發熱用蕪菁子熟壽引

○日夜勿止
○肘后方

乳癰堅硬

以罐盛醋燒熱不投之二次溫瀆之冷則更燒石投之下過三次即愈。千金

癰疽不潰

薏苡仁一枚石之。姚僧坦方

一切腫毒

松香八兩銅青二錢蓖麻仁五錢同搗作膏攤貼甚妙。李樓奇方

乳瘡腫痛

用脂麻炒焦研末以燈窩油調塗即安

癰疽發背

大如盤臭腐不可近桐葉醋蒸貼上退熱止痛漸漸生肉收口極驗秘方也。○醫林

正宗

無名腫毒

翻白草根五七箇煎酒服

風熱腮腫

絲瓜燒存性研末水調搽之。嚴月軒方

本草類方

癰疽

七

風熱腫毒

葶藶苗葉根蔓菁根各三兩為末以雞子清和貼之即消無蔓菁即以商陸根代之

甚效也。

近效方

忍冬膏

治諸般腫痛金刃傷瘡惡瘡用金銀藤四兩吸鐵石三錢香油一斤熬枯去滓入黃

丹八兩待熬至滴水不散

如常難用。乾坤秘韜

癰疽久漏

瘡口冷膿水不絕內無惡肉大附子以水浸透切作大片厚三分安瘡口上以艾炙

之隔數日一炙炙至五七次仍服內托藥

自然肌肉長滿研末作餅子亦可。薛已

外科心法

毒氣攻腹

手足腫痛擗樹皮和槲皮煮汁煎如飴糖以樺皮煮濃汁化飲。肘后方

足趾甲疽

腫爛者屋上馬齒苋崑崙青木香印城鹽等分和勻燒存性入光明珠沙少許專之

○外臺
秘要

乳癰寒熱

蔓菁根并葉去土不用水洗以鹽和搗塗之熱即換不過三五次即瘥冬月只用根

此方已救十數人須避風○李絳兵部手集

一切腫毒

生蔓菁根一握入鹽花少許同搗封之日三易之○肘后方用蔓菁葉不中水者燒

灰和臘猪脂封之

一切腫毒

發背乳癰便毒惡瘡初起者並用五葉藤或根一握生薑一塊搗爛入好酒盃絞

汁熱服取汗以滓傅之即散一用大蒜代薑亦可○壽域神方

婦人乳裂

秋月冷茄子裂開者陰乾燒存性研末水調塗○補遺方

癰口不斂

經霜黃桑葉為末傅之○直指方

忍冬酒

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或背或腰或脇或乳或手足皆有奇效鄉落之間僻陋之所貧乏之中藥材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取一把以葉入沙盆研爛入生餅子酒少許稀稠得所塗於四圍中留一口洩氣其腐只用五兩木槌槌損不可犯纖大甘草節生用一兩同入沙瓶內以水二盃文武火慢煎至一盃入無灰好酒一大盃再煎十數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡病勢重者一日二劑服至大小腸通利則藥力到沈內翰云如無生者只用乾者然力終不及生者效速。陳自明外科精要

癰疽托裏

治癰疽發背腸癰疔癰無名腫毒喉痛實熱狀類傷寒不問老幼虛實服之未成者內消已成者即潰忍冬菜黃芪各五兩當

蓋半煎一蓋隨病上下服日再服以渣傳之。和劑局方

便毒初起

大黑蜘蛛一枚研爛熱酒一碗攪服隨左右側臥取利不退再服必效。壽域

癰疽發背

初作卽服此使毒氣不內攻以麻油一斤銀器煎二十沸和醇醋二碗分五次一日服盡。

直指

發背散血

槐花綠豆粉各一升同炒象牙色研末用細茶一兩煎一盞露一夜調末三錢傳之

留頭勿犯婦女手。攝生妙用方

癰疽發背

菜米粉熬黑以雞子白和塗練上剪孔貼之乾則易神效。葛氏方

穿掌腫毒

新桑葉研爛會之卽愈。通玄論

五毒發背

金星草和根淨洗慢火焙乾每四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升

本草類方

癰疽

煎二三沸更以溫酒二三升相和入瓶器內封固時時飲之忌生冷油膩毒物。經

方驗

便毒癰疽

皂莢一條醋熬膏傅之屢效。直指方

婦人吹妳

水調麴煮糊欲熟即投無灰酒一盞攪勻熱飲令人徐徐按之藥行即瘳。聖惠方

護心散

又名內托散乳香萬全散凡有疽疾一日至三日之內宜連進十餘服方免變證使

毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌不食即危矣四五日後亦宜

間服之用真綠豆粉一兩乳香半兩燈心同研和勻以生甘草濃煎湯調下一錢時

時呷之若毒氣冲心有嘔逆之證大宜服此蓋綠豆壓熱下氣消腫解毒乳香消諸

癰腫毒服至一兩則香散

腫毒初起

帶泥山藥蓖麻子糯米等分水浸研傅之即散也。○普濟方

癰疽焮痛

止痛靈實散用鬼繫腰生竹籬陰濕石岸間絡石而生者好絡木者無用其藤柔細

兩葉相對形生三角用莖葉一兩洗晒勿見火皂莢刺一兩新瓦炒黃甘草節半兩

大瓜萼一箇取仁炒香乳香沒藥各三錢每服二錢水一盞酒半盞慢火煎至一盞

溫服。○外科精要考

發背癰腫

鬼繫腰即絡石也。已潰未潰用香鼓三升入少水擣成泥照腫處大小作餅厚三分瘡有孔勿覆孔上

鋪鼓餅以艾列於上灸之但使溫溫勿令破肉如熱痛即急易之患當減快一日二

次灸之如先有孔以汗出為妙。○千金方

一切癰疽

發背無名腫毒年少氣壯者用黑白牽牛各一合布包搥碎以好醋一盞熬至八分

六五頁方

癰疽

星

癰疽腫毒

露一夜次日五更溫服以大便出膿
血為妙名濟世散。張三丰仙方
重陽前取芙蓉葉研末端午前取蒼耳燒
存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不

走散名鐵井
關。簡便方

癰腫背瘡

血見愁一兩酸漿草半兩焙當歸二錢半
焙乳香沒藥各一錢二分半為末每服七

錢熱酒調下如有生者搗酒熱服以渣傳
之亦效血見愁惟雄瘡用之雌瘡不用。

楊清叟
外科方

一切腫毒

不問已潰未潰或初起發熱用金銀花俗
名甜藤采花連莖葉自然汁半盞煎八分

服之以渣傳上敗毒托裏散氣和
血其功獨勝。萬表積善堂方

時又換以油為度。外科精要

小金絲膏

治一切瘡癰腫毒瀝青白膠香各二兩乳香三錢沒藥一兩黃臘三錢又以香油三錢同熬至滴下不散傾入水中

勝眼膏

山藥沙糖同搗塗上即消先以麵塗四圍乃上此。簡便單方醫輿去聲瘡腫起

乳癰初起

葱汁一升頓服即散。千金方

乳癰不消

白麵半斤炒黃醋煮為糊塗之即消。聖惠方

下部懸癰

擇人神不在日空心用并華水調百藥煎末一碗服之微利後却用秋壺盧一名苦不老生在架上而苦者切片置瘡上灸二十七壯蕭端式病此連平一灸遂愈。永類

方鈴

癰疽出汗

生手足肩背累累如赤豆狀剝淨
以大麻子炒研末摩之。千金方

救腫拔毒

金銀藤大者燒存性葉焙乾為末各三錢
大黃焙為末四錢凡腫毒初發以水酒調
搽四圍留心洩氣

○楊誠經驗方

一切腫毒

初起用綠豆粉炒黃黑色猪牙皂莢一兩
為末用米醋調傅之皮破者由調之。邵

真人經
驗方

癰疽未成

用白芷紫荊皮等分為末酒調服外用紫
荊皮木蠟赤芍藥等分為末酒調作籜藥

○仙傳
外科

背瘡灸法

凡覺背上腫硬疼痛用濕紙貼尋瘡頭用
大蒜十顆淡或半合乳香一錢細研隨瘡

頭大小用竹片作圈圍定真瘡灸之

為率與蒜錢灸法
同功。外科精要

腫毒已破

青大麥去鬚炒暴花為末傳之成醫搗去又傳數次即愈

婦人吹乳

葛蔓燒灰酒服二錢三服效。衛生易簡方

便毒初起

葱白炒熱布包熨數次乃用傳藥即消。永類方用葱根和蜜搗傳以紙密護之外

服通氣藥即愈

手足癩疽

此疽喜着手足肩背纍纍如赤豆剝之汗出用蕓薹葉煮汁服一升并食乾熟菜數

頓少與鹽醬冬月用子研水服。千金方

癰疽初起

乾薑一兩炒紫研末醋調傳四圍留頭白愈此乃東昌申一齋奇方也。諸症辨疑

一切腫毒

赤龍散用野葡萄根晒研為末水調塗之即消也。儒門事親方

便毒初起

古文錢胡桃同嚼食二三枚能消便毒便毒屬肝金伐木也。時珍發明

便毒初起

肥皂搗爛傳之甚效。簡便方

乳癰妬乳

初起堅紫衆療不瘥柳根皮熟搗火溫帛裹熨之冷更易一宿消。肘后方

腫毒尿閉

因腫毒未潰小便不通用葱切入麻油煎至黑色去葱取油時塗腫處即通。普濟

一切癰腫

猪膽汁和芥子末貼之曰三上猪脂亦可。千金翼

乳癰初起

蔓刺子炒為末酒服方寸匕渣傳之。危氏得效方

乳癰紅腫

蒲公英一兩忍冬藤二兩搗爛水二鍾煎一鍾食前服腫消病即去矣。積德堂方

發背欲死

冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已小斂矣乃用膏貼之。肘后方

發背初起

生薑一塊炭火炙一層刮一層為末以猪膽汁調塗。每二日

癩癬惡瘡

皂莢刺燒存性研白芨少許為末傅之。直指方

陰腫如刺

汗出者小蒜一升韭根一升楊柳根二斤酒三升煎沸乘熱熏之。永類方

婦人乳瘤

因久積憂鬱乳房內有核如指頭不痛不痒五七年成癰名乳瘤不可治也用青皮四錢水一盞半煎一盞徐徐服

一切癰疽

初起不問發於何處用木蓮四十九箇搯去毛研細酒解開溫服功與忍冬草相上下。陳自明

外科精要

癰疽不潰

苦酒和雀屎如小豆大傅瘡頭上即穿也。肘后方

癰疽惡肉

丁香末傅之外以膏藥護之。怪證奇方

癰疽初作

赤小豆末水和塗之毒即消散頻用有效。小品方

本草頁方

癰疽

壹

服硫發癰

酢和豉研膏傅之
燥則易○千金方

癩疽出汗

生手足肩背纍纍如赤豆剝
淨以酒和麵傅之○千金方

癰疽痔漏

一上○子母秘錄
瘰癧研末傅之日

腫毒初起

麻油煎葱黑色趁熱通手
旋塗自消○百一選方

諸腫有膿

棘鍼燒灰水服一錢
一夜頭出○千金方

炸顯腫痛

醋調石灰傅
之○簡便方

婦人乳腫

小豆莽草等分爲末
苦酒和傅佳○梅師

婦人吹乳

赤小豆酒研溫服
以滓傅之○熊氏

露岐便毒

生莖蒲根搗傅

癰疽不斂 瘡口太深用絲瓜搗汁頭抹之。直指方

一切毒腫 不問硬軟取楸葉十重傅腫上舊帛裹之日三易之當重重有毒氣為水流在葉上

冬月取乾葉鹽水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫食膿血勝於眾藥。范

汪東陽方

一切腫毒 葱汁漬之日四五度。千金方

癰腫不散 生白藥根搗貼乾則易之無生者研末水和貼。圖經

瘡腫不穿 野百合同鹽搗泥傅之良。應驗方

石癰諸癰 赤小豆五合納苦酒中五宿炒研以苦酒和塗即消加括樓根等分。范汪方

異疽似癰 而小有異膿如小豆汁今日去明日滿用萋臺擣熟布袋盛於熱灰中煨熟更互熨

本草類方 癰疽

具

癰疽發背

之不過三二度無
葉用乾者。千金
一切腫毒莖麥麵即蕎麥麵硫黃各二兩
為末并華水和作餅晒收每用一餅磨水
傳之痛則令不痛不痛
則令痛即愈。直指

瘡瘍刺骨

草血竭搗罨之自
出。本草權度

婦人乳癰

一醉膏用石膏煨紅出火毒研每服三錢
温酒下添酒盡醉睡覺再進一服。經驗
未成者用活蟾一箇繫放瘡上半日蟾必
昏憤置水中救其命再易一箇如前法其

發背腫毒

蟾必跟踭再易一箇其蟾如舊則毒散矣
累驗極效。若勢重者以活蟾一箇或二

三箇破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不
可聞再易二三次即愈慎勿以微物見輕

也。醫
林集要

背瘡熱腫葢菜搗汁塗之留孔以熱毒令即易之○經驗方

癰瘡不合烏麻炒黑搗傅之○千金

一切腫毒野芫荽一把穿山甲燒存性七分當歸尾三錢搗爛入酒一盞絞汁服以渣傅之○

集簡方

骨疽不愈愈而復發骨從孔中出者蕪菁子搗傅之用帛裹定日一易之○千金方

妬乳乳痛丁香末水服方寸七○梅師方

癰腫熱毒家芥子末同栢葉搗塗無不愈者大驗得山芥更妙○千金翼

發背欲死雞腸草搗傅之○肘后方

輕粉毒癰左纏藤一握搗爛入雄黃五分水二升瓦罐煎之以紙封七層穿一孔待氣出以瘡

本草頁方
癰疽

卷

對孔熏之三時久大出黃水
後用生肌藥取效○選奇方

熱癰腫毒

芸薹子狗頭骨等分爲末醋和傅之○千金方

癰疽發背

生葛蒲搗貼之○瘡乾者爲末水調塗之○孫用和秘寶方

妬乳乳癰

蒲黃草根搗封之并煎汁飲及食之○咎殷產寶

大赫瘡疾

急防毒氣入心先灸後用乾蟻蝦爲末和鹽水傅四圍如韭菜澗日一上之○肘后

乳頭裂破

丁香末傅之○梅師方

癰疽惡瘡

膿血不止地骨皮不拘多少洗淨刮去粗皮取細白穰以粗皮同骨煎湯洗之膿血盡以細穰貼之立效有一朝士腹脇間病疽經歲或以地骨皮煎湯淋洗出血一二升家人懼欲止之病者曰直以少大巨木

升家人懼欲止之病者曰直以少大巨木

日結痂愈○
唐慎微本草

癰腫初起

桐油點燈入作筒內熏之得
出黃水即消○醫林正宗

癰疽腫毒

黃蘗皮炒川烏頭炮等分爲末唾調塗
之留頭頻以米泔水潤濕○集簡方

海馬拔毒散

治疔瘡發背惡瘡有奇效用海馬炙黃一
對穿山甲黃土炒硃砂水銀各一錢雄黃
三錢龍腦麝香各少許爲末入水銀研不
見星每以少許點之一日一點毒自出也

○秘傳
外科

橫痃便毒

雞子一箇開孔入紅娘子六箇紙包煨熟
去紅娘子食雞子以酒下小便淋瀝出膿

血即愈○陸
氏積德堂方

甲疽弩肉

膿血疼痛不愈用乳香爲末膽礬燒
研等分傅之內消即愈○靈苑方

本草類方

癰疽

是

癰疽寒顛

乳香半兩熟水研服顛發於脾乳
香能入脾故也○仁齋直指方

癰疽拔膿

癰疽不破或破而腫硬無膿斑蝥為末以
蒜搗膏和水一豆許貼之少頃膿出即去

藥○
直指

婦人乳癰

末成者即散已成者即潰痛不可忍者即
不疼神效不可云喻也用真陳橘皮湯浸
去白晒麴炒微黃為末每服二錢麝香調
酒下初發者一服見效名橘香散○張氏
方

毒腫入腹

雞舌香青木香薰陸香麝香各一兩
水四升煎二升分二服○肘后方

石癰堅硬

如石不作膿用橡子一枚以醋於青石上
磨汁塗之乾則易不過十度即平○千金
方

便毒初起

子和儒門事親用胡桃七箇燒研酒服不
過三服見效。○楊氏經驗用胡桃三枚夾

銅錢一箇
食之即愈

一切癰腫

背癰附骨疽未成膿者胡桃十箇煨熟去
殼槐花一兩研末杵勻熱酒調服。○古今

錄驗

乳癰腫痛

桂心甘草各二分烏頭一分炮為末和苦
酒塗之紙覆住膿化為水神效。○肘后方

一切腫毒

五倍子炒紫黑色蜜調塗之。○簡便治一
切腫毒初起無頭者五倍子大黃黃蘗等

分分新汲水調
塗四圍日三五次

諸瘡毒腫

全蠶七枚厄子七箇麻油煎黑去
滓入黃蠟化成膏傅之。○瘡寮方

魚口毒瘡

端午日午時取樹上青胡桃筐內陰乾臨
時全燒為末黃酒服少行一二次有膿白

大正頭方

癰疽

見

諸般癰腫

大便出無膿即消
三服平○楊誠經驗
拔毒止痛荷葉中心蒂如錢者不拘多少
煎洗拭乾以飛過寒水石同臘豬脂

腫毒初起

大蝦蟇一箇剝碎同炒石灰研
如泥傅之頻易○余居士方
用之○本事方

腸癰內痛

蟹甲燒存性研水服
一錢日三○傳信方

腸癰已成

小腹痛腫痛小便似淋或大便難澁下膿用
甜瓜子一合當歸炒一兩蛇退皮一條炙

咀每服四錢水一盞半煎一盞
食前服利下惡物為妙○聖惠

癰疽乳發

初起者黃蘗末和雞子白
塗之乾即易○梅師方

玉枕骨上如癰破後用

女人妬乳

乳癰汁不出內結成腫名妬乳用蜂房燒灰研每服二錢水一小盞煎六分去渣溫

服○濟

一切腫毒

已潰未潰者用鯉魚燒灰醋和塗之以愈為度○外臺

骨疽出骨

愈而復發骨從孔中出宜瘡上灸之以烏雌雞一隻去肉取骨燒成炭以三家甑破

三家砧水刮屑各一兩皆燒存性在導瘡中醉骨當出盡而愈○千金方

便毒腫痛

已大而軟者直指方用魚鱉膠熱湯或醋煮軟乘熱研爛貼之○戴氏治露真即羊

核用石首膠一兩燒存性研末酒服外以石菖蒲生研會之效

血疝便毒

不拘已成未成隨即消散斑蝥三箇去翅足炒滑石三錢同研分作三服空心白湯

下日一服毒從小便出如痛以車前木通澤瀉猪苓煎飲名破毒散甚效○東垣方

本草頁方

癰疽

五

婦人吹乳

蛇皮一尺七寸燒末
溫酒一盞服○產乳

便毒便癰

穿山甲半兩猪苓二錢並以醋炙研末酒
服二錢外穿山甲末和麻油輕粉塗之或

只以土塗之○直指

吹妳疼痛

穿山甲炙焦木通各一兩自然銅生用
半兩為末每服二錢酒下取效○圖經

發背初起

活蝸牛二百箇以新汲水一盞湯瓶中封
一夜取涎水入真蛤粉旋調掃傅瘡上日

十餘度熱痛止則瘡便愈○集驗方

甲疽潰痛

弩肉裹趾甲膿血不瘥者用牡蠣頭厚處
主研為末每服二錢紅花煎酒調下日三

服仍用傅之取效○勝金方

更毒初起

黃脚蜈蚣一條瓦焙存性為末

癰疽發背 及發乳諸毒用吳茱萸一升搗爲末用苦酒調塗帛上貼之。外臺秘要

癰瘡大痛 壁虎焙乾研末油調傅之即止。醫方摘要

癰腫未成 用此拔毒水調牡蠣粉末塗之乾更上。姚僧坦集驗方論

魚口瘡毒 初起未成膿者用南五倍子炒黃研末入百草霜等分以臘醋調塗於患處一日一夜即消。杏林摘要

骨疽膿出 黑色鯽魚一筒去腸入白鹽令滿紫定以水一盞石器內煮至乾焦爲末猪油調搽少痛勿怪。危氏方

風毒卒痛 用白酒煮楊柳白皮暖慰之有赤點處饒去血妙凡諸腫急痛慰之皆即止也。姚僧坦集

驗方

本草類方 癰疽

乳結硬痛

百藥煎末每服三錢酒一盞煎數沸服之取效。經驗方

腸癰內痛

大棗連核燒存性百藥煎等分爲末每服一錢溫酒下日一取效。直指方

魚口便毒

五倍子不拘多少以淨瓦器盛之用陳醋熬成膏用綿布攤貼之如乾卽換三五次

卽愈

腫毒初起

穿山甲插入穀芒熱灰中炮焦爲末二兩入麝香少許每服二錢陳酒送下。仁齋

直指方

癰疽不斂

不拘發背一切瘡用鼈甲燒存性研摻甚妙。李樓怪症奇方

積年骨疽

一捏一汁出者熬餘錦勃瘡上方破生鱗魚滄之頃時刮視蟲出更洗傳藥盡則

愈

腫毒無頭蛇蛻灰猪脂和塗。肘后

癰疽赤腫用米醋和蚌蛤灰塗之待其乾即易之。千金

發背初起古賁即牡蠣粉灰以雞子白和塗四圍頰上取效。千金方

癰疽不合破蒲席燒灰臘月猪脂和納孔中。千金方

石癰無膿堅硬如石用蛇蛻皮貼之經宿即愈。總錄

髻上便毒鯽魚一枚山藥五錢同搗傅之即消。醫林集要

吹妳疼痛蜘蛛一枚麩裏燒存性為末酒服即止神效

對口毒瘡已潰出膿取非地蚯蚓搗細涼水調傅日換三四次。扶壽

發背腫毒蛇頭燒灰醋和傅之日三易。千金

本草類方
癰疽

卷

吹妳疼痛

馬明退燒灰一錢五分輕粉五分麝香少許酒服。儒門事親

手足癩疽

者亂髮一雞子大豬脂一升同煎膏塗之

發背初起

鹿角燒灰醋和塗之日五六易。千金方

决癰代鍼

白雞翅下兩邊第一毛燒灰水服即破。外臺

發背初起

羊脂豬脂切片冷水浸貼熱則易之數日瘥。外臺

癩疽已潰

車釐脂和梁上塵傅之。外臺秘要

吹妳寒熱

用猪脂冷水浸搗熱即易之立效。子母秘錄

附骨疽漏

蟻蝦七枚同大麥搗薄。劉涓子方

癰疽發背

初作及經十日以上腫赤爛熱日夜疼痛百藥不效者用煨雞子一枚新狗屎如雞子大攪勻微火熬令稀稠得所搗作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時時看視覺餅熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如日多者三日貼之一日一易至瘥乃止此方穢惡不可施之貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已。千金方

乳發初起

母猪蹄一雙通草六分棉裹煮羹食之。梅師

發腦發背

及癰疽熱癰惡瘡用臘月兔頭搗爛入瓶內密封惟久愈佳每用塗帛上厚封之熱

痛即如水也頻換取瘥乃止。勝金

癰疽毒瘡

喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣入臟殺人宜燒鐵烙之或灸百壯日

飲犀角汁取瘥。千金方

對口毒瘡 熱雞血頻塗之 取散。皆效方

收斂癰疽 煎出油入白蠟少許調灰傳之外以膏護 貓頭一箇煨研雞子十箇煮熟去白以黃

住神妙。醫方摘要

癰疽出汗 生手足肩背纍纍如赤豆 剝淨以豬膽塗之。千金

婦人乳腫 愈。產寶方 馬屎塗之立

破決癰瘡 諸癰已成膿懼鍼者取雀屎 塗瘡頭即易決。梅師方

腸癰腹痛 其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠臍有瘡如栗 下膿血用馬蹄灰和雞子白塗即拔毒氣

千金

狗寶丸

治癰疽發背諸毒初起壯熱煩渴者用癰
狗寶一兩臘月黑狗膽臘月鯉魚膽各一

枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條礪砂乳香沒藥

輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝香

一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三

錢熬膏和丸綠豆大每服一丸或三九以

白丁香七枚研調新汲水送下暖臥汗出

為度不過二服立效食後白粥補之。濟

方生

瘡中朽骨

久疽久漏中有朽骨以烏骨雞脛骨實以
砒石鹽泥固濟煨紅出毒以骨研末飯丸

菜米大每以白紙撚送一粒入瘡中以

拔毒膏藥封之其骨自出。醫學正傳

吹妳嫩痛

鹿角屑炒黃為末酒服二錢
仍以梳梳之。唐氏經驗方

癩瘡作痛

用雀屎燕窠土
研傅之。直指

本草類方

癩疽

香

乳妬乳癰

雞矢白炒研酒服方寸七三服愈。產寶

癩

疽

愈着手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬屎和之曬乾燒

灰粉之

發背發乳

猪脂切片冷水浸貼日易四五片甚效。急救方

腸内生癰

雄雞頂上毛并尿燒末空心酒服。千金

潰腫排膿

夜明砂一兩桂半兩乳香一分為末入乾砂糖半兩井水調傳。直指方

乳頭破裂

雞矢白炒研酒服方寸七三服愈。產寶

癰疽癩毒

狗頭骨灰薰臺子等分為末水和敷之。千金

外腎癰瘡

抱出雞卵殼黃連輕粉等分為細末用藥湯洗淨香中調塗。千金

發背已潰

用雞肫黃皮同綿絮焙末搽之即愈

發背初起

用雞肫黃皮不落者陰乾臨時溫水潤開貼之隨乾隨潤不過三五箇即消。楊

氏經
驗方

骨疽不合

骨從孔中出掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎二升同艾及荊葉搗碎入坑內

燒令烟出以疽口就熏用衣擁之勿令洩氣半日當有虫出甚效。千金方

膿腫不合

牛屎燒末用雞子白和封乾即易之神驗也。千金月令

附骨疽瘡

狗頭骨燒烟日熏之。聖惠方

乳癰初發

黃明水膠以濃醋化塗之立消。楊起簡便方

癰疽發背

母猪蹄一雙通草六分綿裏煮羹食之。梅師

本草類方

癰疽

卷

癰疽有蟲

鹿角燒末苦酒和塗磨汁亦可

發背癰疽

用雄雞冠血滴疽上血盡再換不過五六雞痛止毒散數日自愈○保壽堂方

婦人吹乳

白丁香半兩為末以溫酒服一錢○聖惠

天柱毒瘡

生脊大椎上大如錢赤色出水驢蹄二片胡粉熬一分麝香少許為末醋和塗之乾

則搽之○聖惠

內癰未成

取伏雞屎水和服即愈○千金

發背腫毒

雞糞臍內黃皮焙研濕則乾摻乾則油調搽之○醫林正宗

便毒初起

水膠溶化塗之即散○直指方

之服此毒不內攻不傳惡症。談埜翁方。○談埜翁方。○效方以新瓦上燒存性研末酒二盞服之。

○唐氏經驗方又加穿山甲四片同燒存性云極妙無比。

一切腫毒

已成未成用水膠一片水漬粟當頭開孔貼之未有膿者自消已潰者令膿自出。

王燾外臺秘要

乳發初起

不治殺人鹿角磨濃汁塗之并令人嚼去黃水隨手自散。梅師方。

乳癰初起

牛尿和酒敷之即消。姚僧坦方。

背瘡潰爛

黃黑牛糞多年者晒乾為末人百草霜勻細摻之。談埜翁方。

癩毒腫毒

鹿角尖磨濃汁塗之甚妙。類湖方。

腸癰未成

馬牙燒灰雞子白和塗之。千金方。

本草類方

癰疽

卷

對口毒瘡

貓頭骨燒存性研每服三五錢酒服。吳球便民食療方

陰疽不發

頭凹沉黯不疼無熱服內補散不起必用人牙煨過穿山甲炙各一分為末分作兩服用當歸麻黃煎酒下外以薑汁和麩

之。又方川烏頭硫黃人牙煨過為末酒服亦妙。楊仁齋直指方

婦人吹乳

百齒霜以無根水丸梧子大每服三九食後屋上倒流水下隨左右暖臥取汗甚效

或以胡椒七粒同百齒霜和丸熱酒下得汗立愈。衛生寶鑑

一切癰腫

未潰用乾人屎末麝香各半錢研勻以豆大津調貼頭外以醋麪作錢護之膿潰去

藥宗 與衍義

生人腦即耳塞也鹽泥等分研勻以膏

癰農不出
人乳汁和麪
盡出不可近手。千金方

癰已
用新濕鼠屎黃連大黃各等分
黍米粥清和塗四邊即散。姚僧坦方

癰疽發背
一切腫毒用胡燕窠土鼠糞土榆白皮
根。分爲末以女人月經衣水洗取汁

和傳尸上乾即易之潰者封
其西園五日瘥。千金方

肺疽吐血
湯一盞調服
錢米醋二合白

婦人吹妳
鼠屎七粒紅棗七枚去核包屎燒存
性入麝香少許温酒調服。集要方

婦人乳痛
酒下梳垢五
丸即退消

乳癰初起
雄鼠屎七枚研末温酒
服取汗即散。壽域方

乳癰未潰
人牙齒燒研酥調
貼之。肘后方

發背欲死

燒屎灰醋和傅之
乾即易。肘后方

潰癰不合

老鼠一枚燒末
傅之。千金方

疔疽青爛

生於臍脛間惡水淋漓經年瘡冷敗為深
疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發

先以藥蝕去惡肉後用煨豬屎散甚效以
豬屎燒研為末納瘡孔令滿白汁出吮去

再為期有驗。千金方

癰疽發背

初起者用豬腰子一雙
同飛麪搗如泥塗之即愈

腫毒初起

敗龜甲一枚燒研
酒服四錢。小品

癰腫初起

藏器曰以水蛭十餘枚啞病處取皮斂肉
口為效冬月無蛭池中掘取暖亦養之冷

動先淨人皮膚以竹筒盛蛭合之
須臾咬啞血滿自脫更用

車螯轉毒散

治發背癰疽不爛者。取紫背光厚者。以鹽

泥固濟煨赤。出火毒一兩。生甘草末。錢

半。輕粉五分。為末。每服四錢。用括樓

六味車螯散

酒一盞煎一盞。調服五更。轉下惡物。度

未下再服。甚者不過二服。外科精要

治發背癰疽不問淺深大小。利去病根。則

免傳變。用車螯四箇。黃泥固濟煨赤。出毒

研末。燈心三十莖。括樓一箇。取仁炒香。甘

肩疽白禿

煎半盞。去滓。入蜂蜜一匙。調車螯末。二錢

醋和塗之

並用吳茱萸鹽淹過炒研。活幼口議

婦人乳毒

敗龜甲一枚。燒研。酒服四錢。小品

六五頁方

癰疽

藥

發背癰腫

服用白犬屎半升水絞取汁以滓敷之日再○外臺

癰疽惡毒

肉中忽生一斃子如豆粟或如梅子或赤或黑或白或青其鱗有核核有深根應心

能爛筋骨毒如臟腑即殺人但飲根汁可折其熱毒○姚僧坦集驗方 葵

陰下懸癰

生於穀道前後初發如松子大漸如蓮子數十日後赤腫如桃李成膿即破破則難

愈也用橫文甘草一兩四寸截斷以溪澗長流水一盃河水井水不用以文武火侵

慢蘸水炙之自早至午令水盡為度劈開視之中心水潤乃止細到用無灰好酒二

小盃煎至一盃溫服次日再服便可保無虞此藥不能急消過二十日方得消盡與

化守康朝病已破眾醫拱手服此兩劑即合口乃韶州劉從周方也○李迅癰疽方

女子石乳

生蔓菁根搗和塩醋漿水煮汁洗之五六

股陰癩癧 無名異二錢麝香一字研酒半盃
午後空腹服立效。多能鄙事

癰疽瘡腫 已潰未潰皆可用鹽白梅燒存性為末入
輕粉少許香油調塗四圍。王氏簡易方

一切癰疽 及瘡癩用蒼絲菜或根馬蹄草莖或子即
蕁也各取半碗同苧麻根五寸去皮以石

器搗爛傳毒四圍春夏秋日換四五次冬
換二三次換時以薺水洗之甚效。保生

錄餘

骨疽出骨 一名多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及
一月與六親骨肉交合感其精氣故有多

骨之名以蜜陀僧末桐油調
勻攤貼之即愈。壽域方

甲疽腫痛 石胆一兩燒烟盡研末傅之
不過四五度瘡。梅師方

肘骨疽瘡 榆皮燒研米飲每服
方寸七。千金方

本草類方 癰疽

卷

便毒初起

極力提起令有聲以鐵秤錘摩壓一夜即散。集簡方

魚口瘡毒

白礬枯研寒食麪糊調傳上即消。急救良方

甲疽瘡膿

生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者黃蓍二兩藺茹一兩醋浸一宿以猪脂五合微

火上煎取二合絞去滓以封瘡口。外臺秘要

癰疽毒瘡

肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤或黑或白或青其中有核核有深根應心

腫泡紫黑色能爛筋骨毒入臟腑殺人宜炙黯上百壯以酸模葉薄其四面防其長

也內服冬葵根汁其毒自愈。千金方

石癰堅硬

不作膿者蜀桑白皮陰乾為末泔膠和酒調傳以軟為度。千金方

本草類方卷之七

諸瘡第九十一

臙瘡不乾 白善土煨研末生油調搽。集玄方

白癩頭瘡 白炭燒紅投沸湯中溫洗之取效。百一方

楊梅毒瘡 方廣心法附餘用鉛末結砂銀硃各二錢。白花蛇一錢為末作紙撚七條初日用三

條自後日用一條香油點燈於烘爐中放。被內蓋臥勿透風須食飽口含椒茶熱則

吐去再舍。神燈熏法用銀硃二錢孩兒。茶龍掛香皂莢子各一錢為末以紙卷作

燈心大長三寸每用一條安燈盞內香油。浸點置水桶中以被圍坐用鼻吸烟嚥之

口含冷茶熱則吐去日熏二次三日後口。中破皮以陳漿木敷之。神燈照法治楊

本草類方

諸瘡

本

梅瘡年久破爛坑陷者用銀硃水粉線香各三錢乳香沒藥各五分片腦二分爲末以紙卷作撚浸油點燈照瘡日三次七日見效須先服通聖散數帖臨時口含椒茶以防毒氣入齒也

手指腫痛

漿水入少塩熱漬之冷即易之。孫真人方

一切惡瘡

雲母粉傳之。千金方

諸般惡瘡

拔毒散東牆上土大黃等分爲末用無根并華水調搽乾再上。瑞竹堂方

一切惡瘡

燕窠內外泥糞研細油調搽。一加黃蘗末。瑞竹堂方

黃水肥瘡

燕窠土一分麝香半分研傳之。普濟方

浸淫濕瘡

發於心下者不早治殺人用胡燕窠中土研末水煎服

足賺爛瘡

非地蚯蚓泥乾研入輕粉清油調傳。便民圖纂

手足發指

毒痛不可忍用壁間泥蜂窠為末入乳香少許研勻以醋調塗乾即以醋潤之。奇效方

疔瘡腫痛

土蜂窠煨蛇皮燒等分酒服一錢。直指方

濕渦疥瘡

胡燕窠大者用托子處土為末以淡鹽湯洗拭乾傳之日一上。小品方

代指腫痛

豬膏和白善土傳之。肘后方

外腎生瘡

蚯蚓屎二分綠豆粉一分水研塗之乾又上之。便民圖纂

燕窩生瘡

非地蠅屎米泔水和煨過入百草霜等分研末香油調塗之。摘玄方

代指腫痛

麻沸湯漬之即安。千金方

本草類方

諸瘡

三

白禿頭瘡

百年屋下燕窠泥蠟蚘窠研末剃後麻油調搽。聖濟錄

疔

腫

糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫服以滓傳瘡四圍疔自出也。聖濟總錄

下疳陰瘡

外科用孩兒茶末米泔洗淨傳之神效或加胡黃連等分。纂奇方孩兒茶一錢真珠一分片腦半分為末傳之。唐氏用孩兒茶一錢輕粉一分片腦一字為末搽之

廉瘡久爛

灶內黃土年久者研細末黃蘗黃丹赤石脂輕粉末等分清油調入油絹中貼之勿動數日愈縱痒忍之良。濟急方

赤黑丹疥

或痒或燥不急治遍身即死白瓷末猪脂和塗之。聖濟錄

身面白丹

白瓷瓦末和猪脂

白禿臘梨

灰窰內燒過紅土墜四兩百草霜一兩雄黃一兩膽礬六錢榆皮三錢輕粉一錢為

末豬膽汁調剃頭後搽之百發百中神方也。陸氏積德堂方

牛皮血癬

烟膠三錢寒水石三錢白礬二錢花椒一錢半為末臘猪脂調搽。積德堂方

臀生濕瘡

日以新磚坐之能去濕氣。集玄方

頭瘡諸瘡

以醋湯洗淨百草霜入膩粉少許生油調塗立愈。證類本草

白禿頭瘡

百草霜和猪脂塗之。簡便方

手搔瘡腫

作膿用鍋臍墨研細清油調搽。簡便方

賺瘡頑癬

銅綠七分研黃蠟一兩化熬以厚紙拖過表裏別以紙隔貼之出水妙亦治楊梅瘡

及蟲咬。筆峰雜興

楊梅毒瘡

銅綠醋煮研末燒酒調搽極痛出水次日即乾或加白礬等分研搽。簡便方

瘡似蜂窠

愈而復發胡粉硃砂等分爲末蜜和塗之。聖濟錄

瘡傷水濕

胡粉炭灰等分脂和塗孔上水即出也。千金方

黃水膿瘡

官粉煨黃松香各三錢黃丹一錢飛礬二錢爲末香油二兩熬膏傅之。邵真人方

反花惡瘡

胡粉一兩臙脂一兩爲末塩湯洗淨傅之日五次。聖惠方

時氣生瘡

胸中蒸鐵漿飲之。梅師方

妬精陰瘡

鉛粉二錢銀杏仁七箇銅銚內炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽效。集簡方

血風賺瘡

孫氏集效方用官粉四兩水調入盃內以蘄州艾葉燒烟熏乾入乳香少許同研香

油調作隔紙膏反覆貼之。楊氏簡便方用官粉炒過桐油周作扇氏占之

陰股常濕

胡粉粉之
○備急方

一切疔腫

鐵漿日飲一
升○千金方

遠近賺瘡

黃丹飛炒黃藥酒浸七日焙各一兩輕粉
半兩研細以苦茶洗淨輕粉填滿次用黃

丹護之外以藥末攤膏貼之勿
揭動一七見效○孫氏集效方

血風賺瘡

黃丹一兩黃蠟一兩香油五錢熬膏先
以葱椒湯洗貼之○陸氏積德堂方

楊梅毒瘡

黑鉛廣錫各二錢半結砂蜈蚣二條為末
紙卷作小撚油浸二夜點燈日照瘡二次
七日見效

○集立方

蛇皮惡瘡

鐵漿頻塗之
○談野翁方

疔腫熱毒

慈石末酢和封之拔
根立出○外臺秘要

六直頁方

諸瘡

卷

疔腫初起 多年土內鏽釘火煨醋淬刮下鏽末不論
遍次煨取收之每用少許人乳和挑破傅

之仍炒研二錢以蓋水煎
滾待冷調服○普濟方

雌雄疔瘡

鐵粉一兩蔓菁根三兩搗如
泥封之日二換○集立方

血風腫瘡

蜜陀僧香油入粗盃內磨化油紙
攤膏反覆貼之○孫氏集效方

代指腫痛

芒硝煎湯漬
之○聖惠方

楊梅毒瘡

水銀黑鉛各一錢結砂黃丹一錢乳香沒
藥各五分為末以紙卷作小撚染油點燈

日照瘡三次七日見效○方廣附餘用水
銀黑鉛結砂銀朱各二錢白花蛇一錢為

末作紙撚七條頭日用三條自後日用一
條香油點燈於爐中放被內熏之勿透風

頭上有瘡連頭蓋之○一方水銀一錢二

砂六分爲末分作十二紙摺以香油浸燈
蓋內點於小桶中以被圍病人坐之以鼻

細細吸烟三日後
口出惡物爲效

天泡濕瘡

無名異末并華水
調服之。普濟方

蟲癬瘙癢

水銀胡粉等分研傅。又水銀
蕪荑和酥傅之。外臺秘要

癬瘡有蟲

銀硃牛骨髓桐油
調搽。醫方摘要

一切惡瘡

水銀黃連胡粉熬黃各一兩研
勻傅之乾則以唾調。肘后方

黃水濕瘡

銀硃塩梅和搗
傅之。集玄方

惡肉毒瘡

一女年十四腕軟處坐物如黃豆大半在
肉中紅紫色痛甚諸藥不效一方士以水

銀四兩白紙二張揉熟蘸銀擦之
三日自落而愈。李樓怪證方

楊梅瘡癬

嶺南衛生方用永粉太風子肉等分爲末塗之卽愈。醫方摘玄用輕粉二錢杏仁四十二箇去皮洗瘡拭乾搽之不

白禿頭瘡

雄黃猪膽汁和傳之。聖濟錄

楊梅惡瘡

粉霜一味搽之。集簡方

蛇纏惡瘡

雄黃末醋和傳之。普濟方

下疳陰瘡

輕粉末乾摻之卽結靨而愈。萬表積善堂方

賺瘡潰爛

無名異號丹細研清油調搽濕則乾摻之。濟急方

牛皮惡癬

五更食炙牛肉一片少刻以輕粉半錢溫酒調下。直指方

賺瘡不合

以蘘汁溫洗拭乾用葱汁調輕粉傳之。一方輕粉五分黃蠟一兩以粉摻紙上以

蠟鋪之縛在瘡上黃
水出即愈。永類方

楊梅毒瘡

醫學統旨用輕粉一錢雄黃丹砂各二錢
半槐花炒龜版炙各一兩為末糊丸梧子

大每服一錢冷茶下日二服七日愈。楊
誠經驗方用輕粉胡桃仁槐花炒研紅棗

肉各二錢搗丸分作三服初日雞湯下二
日酒下三日茶下三日服盡五日瘡乾七

日痂落。一方用獾豬腎一對去膜批開
各摻輕粉一錢紫定麻油二兩燻熟頓食

不破口腫牙仍服金銀花藥。一方用大
雞卵一箇去黃留白入輕粉一錢攪勻紙

糊飯上
蒸熟食

漏瘡不合

童尿制爐甘石牡蠣粉外塞
之內服滋補藥。雜病治例

賺瘡不斂

銀珠一錢千年地下石灰五分松香五錢
香油一兩為末化攤紙上貼。應急良方

諸瘡

壹

血風癩瘡

生脚股上乃濕毒成風也黃蠟一兩溶化入銀硃一兩攪攤紙上刺孔貼之。簡便方

楊梅毒瘡

銀硃官香等分爲末以紙卷作燃點燈置稱中以鼻吸烟一口一作七日愈。又方銀硃二錢孩兒茶一錢龍掛香一錢皂角子一錢爲末如上法用。又方銀朱輕粉各一錢黃蠟清油各一兩化開和收以油紙攤貼瘡痂自脫也

魚臍疔瘡

四面赤中央黑銀硃米和丸每服一丸温酒下名走馬丹。普濟方

廣東惡瘡

雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢爲末洗淨以雄猪胆汁調上二三日卽愈百發百中天下第一方出武定侯府內。積德堂方

多年惡瘡

多年石灰研末雞子清和成塊煨過再研姜汁調傳。救急方

疔瘡惡毒

千金方刺四邊及中心以雄黃末傅之神
効。積德堂方用雄黃蟾酥各五分爲末

刺破瘡頂插入甚妙
葱蜜搗丸小米大以針

賺瘡日久

雄黃二錢陳皮五錢青布卷作大撚燒
烟熏之熱水流數次愈。筆峰雜興

瘡口不斂

生肌肉止痛去惡水寒水石燒赤研二
兩黃丹半兩爲末摻之名紅玉散。和濟

局方

下疳陰瘡

爐甘石火煨醋淬五次一兩孩兒茶三錢
爲末麻油調傅立愈。通妙邵真人方

日久頑瘡

不收者銀硃一錢千年地下石灰五分松
香五錢香油一兩爲末化攤紙上貼之。

應急
良方

疔瘡惡腫

石灰半夏等分爲
末傅之。普濟方

下部生瘡

已決洞者牡丹末湯服方
寸七日三服。肘后方

風毒熱瘡

遍身出黃水桂府滑石末傳之次日愈先
以虎杖豌豆甘草等分煎湯洗後乃搽。

普濟

方

血風癩瘡

船上舊油灰將泥作釜火煨過研末人輕
粉少許苦茶洗淨傳之忌食發物。邵真

人經

驗方

烏癩蟲瘡

雌黃粉醋和雞子黃
調塗之。聖惠方

脚指縫爛

滑石一兩石膏煨半兩枯白
礬少許研摻之。集簡方

牛皮頑癬

雌黃末人輕粉和猪
膏傳之。直指方

軟腐不愈

爛船底油石灰研末
由調傳之。明氏方

下體癬瘡 船灰牛糞燒烟熏之一日一次即安。醫方摘玄

疥瘡有蟲 石灰淋汁洗之數次。孫真人方

血風濕瘡 十年陳石灰研搽痛即止。藺氏方

諸般惡瘡 白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方

疔瘡發背 白浮石半兩沒藥二錢半為末醋糊丸梧子大每服六七丸臨臥冷酒下。普濟方

手足心毒 風氣毒腫鹽末椒末等分酢和傅之立瘥。肘后方

瘡口不合 一切皆治秦芫為末摻之。直指方

瘡癬痛癢 初生者嚼鹽頻擦之妙。千金翼

楊梅毒瘡 醋調膽礬末搽之痛甚者加乳香沒藥出惡水一二上即乾。又方胆礬白礬水銀

各三錢半研不見星入香油津唾各少許和勻坐帳內取藥塗兩足心以兩手心對足心摩擦良久再塗再擦盡即臥汗出或大便出垢口出穢涎為驗每次強者用

四錢弱者用二錢連用三日外服疎風散并燥洗。劉氏經驗方

一切諸毒

胆子礬末糯米糊丸如雞頭子大以朱砂為衣仍以朱砂養之冷水化一丸服立愈

○勝金方

一切瘡癩

土朱號丹牛皮膠等分為末好酒一盃沖之澄清服以渣傳之乾則再上。朱氏集

方驗

廉瘡經年

鹽中黑泥晒乾研搽之。永頴方

疔蒼重痛

白姜石末和雞子清傳之乾

豌豆毒瘡

未成膿者猪胆汁和芒硝末塗之。梅師

大風蟲瘡

有五色虫取下諸石丸用金星礬石銀星礬石雲母石禹餘糧石滑石陽起石慈石凝水石蜜陀僧自然銅龍涎石等分搗碎瓶盛鹽泥固濟之炭火十斤煨過為末醋糊丸小豆大每服十五丸白花蛇酒下一日三服以愈為度。太平聖惠方

妬精陰瘡

黃礬青礬麝香等分為末黃礬之不過三度。千金方

大風癘疾

眉髮脫落遍身頑痺禹餘糧二斤白礬一斤青鹽一斤為末罐子固濟炭火一秤煨之從辰至戌候冷研粉埋土中三日取出每一兩入九蒸九暴炒熟胡麻末三兩每服二錢荆芥茶下

天蛇頭毒

落蘇即金絲草金銀花藤五葉紫葛天蕎麥等分切碎用絕好醋濃煎先熏後洗。

本草類方

諸瘡

疾

急救

方

賺瘡不斂

葱鹽湯洗淨拭乾以馬屁勃未傳之即愈。仇遠稗史

疔瘡腫毒

雪白礬末五錢葱白煨熟搗和丸梧子大每服二錢五分以酒送下未效再服久病孕婦不可服

○衛生寶鑑

服石發瘡

疼不可忍者用紙圈圍之中心填硝石令滿以匙抄水淋之覺不熱痛即止。兵部

集手

疔瘡腫毒

好酒砂雄黃等分研以銀篦刺破瘡口擠去惡血安藥一豆入內紙花貼住即效毒

氣入腹嘔吐者服護心散。瑞竹堂方

代指腫痛

唾和白礬砂以麩作盃子套指入內一日差。千金方

敬申作瘡

足趾甲入肉作瘡不可履鞋礬石燒灰傅之能惡肉生好肉細紐割去甲角旬日取

愈此方神效

○肘后方

風癬有蟲

菖蒲末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕酒一日每服一升或半升○千金方

疔腫惡瘡

二仙散用生礬黃丹臨時等分以三稜針刺血待盡傳之不過三上決愈乃太醫李

管勾方○

衛生寶鑑

牛皮癬瘡

石榴皮蘸明礬末搽之切勿用醋即虫沉下○直指方

一切惡瘡

礬砂四兩甘草四兩真香油一斤瓶內浸之遇有毒者服油一小盞久浸尤佳○瑞

竹堂經

驗方

乾濕頭瘡

白礬半生半煨酒調塗上○生生編

本草類方

諸瘡

完

頭瘡白禿 貫眾白芷為末油調塗之。又方貫眾燒末油調塗。○聖惠方

便毒諸瘡 一枝箭搗爛塗之即消若毒大甚者洗淨以生白酒煎服得微汗即愈。○王永輔濟

世方

魚睛疔瘡 枯礬末寒食麪糊調貼消腫無膿。○崔氏方

陰濕瘡疱 硫黃傅之日三。○梅師方

頑癬不愈 傾過銀有蓋罐子入硫黃一兩溶化取起冷定打開取硫同蓋研末搽之。○孫氏集

效方

肺熱生瘡 遍身皆是用苦參末粟米飯九梧子大每服五十九空心米飲下。○御藥院方

諸瘡弩肉 如蛇出數寸硫黃末一兩肉上傳之即縮。○聖惠方

瘡腫初起

澤蘭搗封之良。○集簡方

疥瘡有蟲

硫黃末以雞子煎香油調搽極効。○急救良方

毒熱足腫

作痛欲脫者苦參煮酒漬之。○姚潛垣集驗方

癩風有蟲

硫黃末酒調少許飲汁或加大風子油更妙。○直指方

一切惡瘡

真君妙神散用好硫黃三兩蕎麥粉二兩為末井水和捏作小餅日乾收之臨用細

研新汲水調傅之痛者即不痛不痛則即痛而愈。○坦仙皆效方

疔瘡腫毒

白及末半錢以水澄之去水難於厚紙上貼之。○袖珍方

癬瘡作癢

刺薊葉搗汁服之。○千金方

楊梅毒瘡

龍掛香孩兒茶皂莢子各一錢銀朱二錢為末紙卷作捻點燈置桶中以鼻吸烟一

六直頁六

諸瘡

三

日三次三日止內服解毒藥瘡即乾。集簡方

代指腫痛

甘草煎湯漬之。千金方

冷露瘡爛

藿香葉細茶等分燒灰油調塗葉上貼之。應驗方

一切瘡疥

荆芥末以地黃自然汁熬膏和九梧子大每服三十五丸茶酒任下。普濟方

疔腫諸毒

荆芥一握切以水五升煮取一升分二服冷飲。藥性論

代指腫痛

地榆煮汁漬之半日愈。千金方

年深惡瘡

無心草根釣苓根狼毒白丁香各五錢麝香一字為末摻之。又方無心草根乾姜

各二錢釣苓根三錢為末摻之。並外科精義。無心草即薇徇音眉即本經糜銜

南人謂吳風草

疔瘡腫毒

生薺芫根搗汁服一合以滓傳之不過三度○千金翼

瘡癬初生

姜黃末搽之妙○千金翼

白禿頭瘡

皂礬棟樹子燒研搽之○普濟方

瘡中生蛆

綠礬末搽貼即化為水○摘玄方

諸瘡腫痛

撫芎煨研入輕粉麻油調塗○普濟方

火毒生瘡

如炙火毒氣入內兩股生瘡汁水淋漓者用薄荷煎汁頻塗立愈○張杲醫說

魚臍疔瘡

瞿麥燒灰和油傳之甚佳○崔氏方

癬瘡作癢

螺螄十四箇槌樹皮末一兩入盥內蒸熟人礬紅三錢搗勻搽之○孫氏集效方

人疥馬疥

馬鞭草不犯鐵器搗自然汁半盞飲盡十日內愈神效○董炳集驗方

本草類方

諸瘡

急慢疔瘡

聖惠方用益母草搗封之仍絞五合服之
消○醫方人成用益母草四月連花分之

燒存性先以小尖刀十字劃開疔根令血
出次遠根開破捻出血拭乾以稻草以熱

藥熬入瘡口令到底良久當有紫血小捻
令血淨再熬藥入見紅血乃止一日夜熬

藥三五度重者二日根爛出輕者一日出
有瘡根脹起卽是根出以針挑之出後仍

傳藥生肌易愈忌風寒
房室酒肉一切毒物

天泡濕瘡

天泡草鈴兒卽酸漿生搗敷亦
可爲末油調敷○鄧才雜興方

疔腫毒瘡

黑色焮腫者乃服丹石毒也赤色者肉麩
毒也用龍葵根一握洗切乳香末黃連三

兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡
大小傅之覺痒卽換去痒不可忍切勿搔

動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥
時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身

不得食羊血如無龍葵以
蔓菁根代之。○聖濟總錄

天泡濕瘡 龍葵苗葉
搗傅之

疔瘡惡腫 五月五日收旱蓮草陰乾仍露一夜收遇
疾時嚼一葉貼上外以消毒膏護之二三

口疔脫 ○
聖濟總錄

諸瘡惡腫 老鴉眼睛草搗酒服
以渣傅之。○普濟方

諸瘡腫痛 不可忍有葵花根去黑皮搗爛
入井華水調稠貼之。○普濟方

白禿頭瘡 葶藶末塗之
○聖惠方

癬瘡延蔓 決明子一兩為末入水銀輕粉少許研不
見星擦破上藥立瘥此東坡家藏方也。○

奇效
良方

癩毒已破益母草搗傳甚妙○斗門方

楊梅惡瘡馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽○陳嘉謨本草蒙筌

天泡熱瘡藍葉搗傳之良○集簡方

白癩風瘡馬鞭草為末每服一錢食前荆芥薄荷湯下○太平聖惠方

大風癩疾一名馬矢蒿一名爛石草炒搗末每服方寸七食前溫酒下一日三服一年都瘥○肘后方

豌豆毒瘡未成膿者波斯青黛一

身面惡癬紫背草入生髮研傅二

惡瘡不斂先以槐枝葱白湯洗後用瓦松陰

惡瘡不斂葱為○齊生秘覽

惡刺瘡痛李葉棗葉搗汁點之效。千金

疥瘡痛癢煮薤葉搗爛塗之。別後方

反花惡瘡有肉如飯粒破之血出隨生反出用蒼耳葉搗汁服三合并塗之日二上。聖惠錄

漏瘡腫痛豬胆七箇綿燕脂十箇洗水和勻搽七次即可。救急方

白禿頭瘡五月收漏盧草燒灰猪膏和塗之。聖濟總錄

惡瘡痂癢作痛扁竹搗封痂落即瘥。別後方

疔瘡惡腫干針草即大薊小薊四兩乳香一兩明礬五錢為末酒服二錢出汗為度。普濟方

反花惡瘡內生惡肉如飯粒破之血出隨生反出於外鼠尾草根切同猪脂搗傅。聖濟總錄

本草類方

諸瘡

卷

一切惡瘡

紫花地丁根日乾以罐盛燒烟對瘡
熏之出黃水取盡愈。衛生易簡方

惡瘡癩疾

但是惡疾遍體面目有瘡者皆可服之用
白艾蒿十束如升大煮取汁以麩及米一

如釀酒法候熟稍
服之。梅師方

大風癘疾

袖珍方用嫩蒼耳荷葉等分為末每服一
錢温酒下日二服。乾坤生意用蒼耳葉

為末以大風子油和丸梧子大每服三四
十丸以茶湯下日二服。又方五月五日

或六月六日五更帶露采蒼耳草搗取汁
熬作錠子取半斤鱧魚一尾剖開不去肚

腸入藥一錠線縫以酒二盃慢火煮熟令
吃不過三五箇魚即愈也忌鹽一百日

生肌肉

水紅花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研
末撒瘡上每月一次。談野翁試驗方

卒得惡瘡

人不識者牛膝根
搗傳之。千金方

風入瘡口腫痛劉寄奴為末搽之即止。聖惠方

鵝掌風病斲艾真者四五兩水四五盞煮五六滾入大口瓶內盛之用脉布二層縛之將手心

放瓶上熏之如冷再熱如神。陸氏積德堂方

賺瘡口冷不合熟艾燒烟熏之。經驗方

白癩風瘡乾艾隨多少以浸麴釀酒如常法日飲之覺痺即瘡。肘后方

惡瘡腫毒地菘搗汁日服三四次。外臺秘要

骨疽癩病及痞癰牛膝末酒服方寸七日三服。千金方

瘡疥熏法熟斲艾一兩木鱉子三錢雄黃二錢硫黃一錢為末揉入艾中分作四條每以一條

安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通聖散。醫方摘要

本草頂方

諸瘡

七

天泡濕瘡

野菊花根棗木煎湯洗之。醫學集成

卒得惡瘡

蒼耳挑皮作屑納瘡中

白禿頭瘡

芫花末猪脂和傅之。集效方

血熱生癬

地黄汁頻服之。千金方

癰瘡未潰

茵草一兩為末雞子白調塗帛上貼之日二易得痛為良。聖惠方

疥瘡瘙癢

藜茹末入輕粉香油調傅之。多能鄰事

惡瘡似癩

十年不愈者黃芩子燒研傅之。千金方

乾濕蟲疥

狼毒不拘多少搗爛以猪油馬油調搽患處方睡勿以被蒙頭恐藥氣傷面此雜

潘氏所傳方。簡氏經驗方

積年乾癬

生痴搔之黃水出每逢陰雨卽
痒用狼毒末塗之○聖惠方

癬瘡有蟲

貓兒眼睛草晒乾爲末香
油調搽之○衛生易簡方

瘡口不合

芭蕉根取汁抹
之良○直指方

積年疥癩

狼毒一兩一半生研一半炒研輕粉三合
水銀三錢以茶末少許於瓦器內以津液

擦化爲末同以清油浸藥高一寸三日待
藥沉油清過夜不見燈火蘸油塗瘡上仍

以口鼻於藥蓋上吸
氣取效○永類方

惡癬有蟲

葇荂根搗爛蜜和
傅之○千金翼

惡疾風瘡

狼毒秦芫等分爲末每服方寸
七溫酒下日一二服○千金方

瘡傷水毒

商陸根搗炙布裏熨之
冷卽易之○千金方

本草類方

諸瘡

卷

癩風鼻塌

手指攣曲節間痛不可忍漸至斷落用蓖麻子一兩去皮黃連一兩到豆大以水瓶

子入水一升同浸春夏二日秋冬五日後取蓖麻子三枚劈破面東以浸藥水谷之

漸加至四五枚微利下效瓶中水盡更添兩月後吃大蒜猪肉試之如不發是效也

若發動再服直候不發乃止○杜壬方

白禿蟲瘡

黎蘆末猪脂調塗之○肘后方

癩風眉

生半夏羊屎燻1等分爲末自然姜汁日調塗○聖濟錄

疥癬蟲瘡

黎蘆末生油和塗

反花惡瘡

惡肉反和傳日三五上○聖濟錄
如米黎蘆末猪脂

上白屑

山豆根末浸油日塗之

大風癘疾

潔古家珍用凌霄花五錢地龍焙殭蠶炒全蠍炒各七箇為末每服二錢温酒下先

以葱湯浴過服此出臭汗為效。儒門事親加蟬蛻五品各九箇作一服

走皮趨瘡

滿頰滿頂浸淫濕爛延及兩耳痒而出水發歇不定用野名悲羊瘡用凌霄花并葉

煎湯日日洗之。楊仁齋直指方

筋骨毒痛

因患楊梅瘡服輕粉毒藥成者野薺薇根白皮洗三斤水酒十斤煮一炷香每日任

飲以愈為度。鄧筆峰雜典方用刺薺薇根三錢五加皮木瓜當歸茯苓各二錢以

酒二盞煎一盞日服一次

癘風有蟲

眉落聲變預知子宮用預知子雄黃各二兩為末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至

五升入二味熬成膏瓶盛之每服一匙温酒調下有虫如尾隨大便而出。聖惠方

疥癬滿身

不可治者何首烏艾葉等分水煎濃湯洗浴甚能解痛生肌肉○王袞博濟方

楊梅瘡痘

小如指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚風熱不過十日愈用栝樓皮為末每

服三錢燒酒下日三服○集簡方

手足癩瘡

故履系燒灰傅之○千金方

穀道赤痛

兔絲子熬黃黑為末雞子白和塗之○肘后方

疔瘡初起

水調白斂末塗之○聖惠方

風瘡疥癩

生栝樓一二箇打碎酒浸一日夜熱飲○懼仙乾坤秘韻

豌豆斑瘡

蠶臺葉煎湯洗之○外臺秘要

楊梅毒瘡

鄧筆峰雜興方用冷飯團四兩白蜜煎筒水煎代茶飲淺者二七深者三七

○一方冷飯團一兩五加皮皂莢子苦參各三錢金銀花一錢用好酒煎日一服

久生疥癬

川烏頭生切以水煎洗甚妙○聖惠

眉鍊癬瘡

兔絲子炒研油調傳之○山居四要

大風癘疾

何首烏大而有花文者一斤米泔浸一七九蒸九晒胡麻四兩九蒸九晒為末每酒服二錢日二

服○聖惠方

楊梅天泡

天花粉川芎菊各四兩槐花一兩為末米糊丸梧子大每空心淡姜湯下七八十九

○簡便方

天泡濕瘡

天花粉滑石等分為末水調搽之○普濟方

瘡傷風水

腫毒取葱青葉和乾姜黃蘗等分煮湯浸洗立愈○食療

本草類方

諸瘡

三

濕毒脛瘡

磚縫中生出野園菱夏月採取晒收為末每以五錢汞粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出五六日愈此吳竹卿方也。簡便方

瘡頭黑凹

蕎麥麪煮食之即發起。直指

瘡久不瘥

積年者馬齒莧搗爛封之取汁煎稠傳亦可。千金

頭瘡不瘥

菖蒲末油調傳之日三夜二次。法天生意

頭上白禿

獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦赤傳之日一次。肘后方

賺瘡潰爛

端午日午時采翻白草洗收每用一握煎湯盆盛圍住熏洗效。劉松石保壽堂方

瘡犯惡露

甚者殺人薤白搗爛以帛裹煨熟去帛傳之冷即易換亦可搗作餅以艾炙之熱氣

入瘡水出即瘥也。梅師方

大風癬瘡

遍身黑色肌體麻木痺痛不常草烏頭一斤刮洗去皮極淨攤乾以清油四兩盪四

兩同入銚內炒令深黃色傾出剩油只留鹽并藥再炒令黑烟出為度取一枚擘破

心內如米一點白者始好白多再炒乘熱杵羅為末醋麪和丸梧子大每服三十丸

空心温酒下草烏性毒難制五七日間以黑豆煮粥食解其毒○繼洪澹寮方

大風癩瘡

大黃煨一兩皂莢刺一兩為末每服方寸七空心温酒下取出惡毒物如魚腦狀未

下再服即取下如亂髮之虫取盡乃服雄黃花蛇藥名通天再造散○十便良方

疔腫惡瘡

皂莢去皮酥炙焦為末入麝香少許人糞少許和塗五日後根出○普濟方

諸瘡不斂

白斂赤斂黃藥各三錢炒研輕粉一錢用葱白漿水洗淨傅之○瑞竹堂方

遍身生瘡

陰囊兩脚尤甚者草烏一兩盪一兩化水浸一夜炒赤為末猪腰子一具去腰煨熟

大風癩瘡

諸瘡

三

竹刀切片醋糊丸綠豆大每服三十九空心塩湯下。澹寮方

惡毒諸瘡 及發背疔瘡便毒等證二鳥膏用草烏頭川烏頭於瓦上以井華水磨汁塗之如有

日即塗四邊乾再上亦可單用草烏磨醋塗之。永類方

一切諸瘡 未破者草烏頭為末入輕粉少許臘猪油和搽。普濟方

疥癬蟲瘡 山豆根末臘猪脂調塗。備急方

漏耳諸瘡 治耳內外惡瘡及頭瘡肥瘡癩瘡黃馬散用黃蘗半兩乾馬齒莧一兩為末傅之。

聖惠

遍身癩瘡 律草一擔以水二石煮取一石漬之不過三作愈。韋宙獨行方

頭上秃瘡 三月三日收未開桃花瓣乾與桑椹赤者等分作末以者脂印先反欠十先去施即

塗之。

食療。

天火熱瘡

初起似癩漸如水泡似火燒瘡赤色急速能殺人。藁葉搗汁調大黃芒硝生鐵石

等分塗之。

○近效方。

大風癘疾

眉髮不生側柏葉九蒸九晒為末煉蜜丸梧子大每服五丸至十丸日三夜一服百

口即生。

○聖惠方。

梅花禿癬

用清油一碗以小竹子燒灰入內煎沸瀝猪膽汁一箇和勻剃頭擦之二三日即愈

勿令口晒。

○普濟方。

白禿頭瘡

白麩豆和研酢和傅之。○普濟方。

癬久不瘥

簡要濟衆方用羊蹄根杵絞汁入輕粉少許如膏塗之三五次即愈。○永類方和

癰經年者敗毒菜根獨生者即羊蹄根搗
 三錢入川百藥煎二錢白梅肉搗勻以井
 華水一盞濾汁澄清天明空心服之不宜
 食熱物其滓抓破擦之三次即愈。千金
 方治細癰用羊蹄根五升桑柴火煮四五
 沸取汁洗之仍以羊蹄汁和礬末塗之
 其頭白似腫痛不可忍先以針刺
 破頭及四畔以白芎滴孔中良

魚臍瘡

熱毒濕瘡

宗奭曰有人遍身生瘡痛而不痒手足尤
 甚粘着衣被曉夕不得睡有人教以葛蒲
 三斗日乾為末布席上臥之仍以衣被覆
 之既不粘衣又復得睡不五七日其瘡如
 失後以治人應手
 神驗。衍義本草

惡瘡痂癢

作痛以扁豆傳
 封痂落即愈

血注脚瘡

桑耳楮耳牛屎菰各五錢胎髮灰男用女
 女用男三錢研末油和塗之或乾塗之。

奇效良方

諸瘡腫痛

杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效不拘大人小兒。鮑氏

蜘蛛瘡毒

煖酒淋洗瘡上日三次。廣利方

眉鏡頭瘡

用小麥燒存性為末油調傳。儒門事親

大風癘疾

浮萍草三月采淘三五次窞三五日焙為末不得見日每服三錢食前溫酒下常持

觀音聖號忌豬魚雞蒜。又方七月七日取紫背浮萍日乾為末半升入好消風散

五兩每服五錢水煎頻飲仍以煎湯先浴之。十便良方

穀道生瘡

荇葉搗爛綿裹納之下部日三次。范汪方

烏癩風瘡

葛律草三杆切洗益母草一秤切以水一石五斗煮取一石五斗去滓入瓮中浸浴

諸瘡

一時方出坐密室中又暖湯浴一時乃出
暖臥而汗勿令見風明日又浴如浴時瘡
痒不可忍切勿搔動少傾漸定后
隔三日一作以愈為度。聖濟錄

狐尿瘡痛

杏仁研一兩沸及熟
浸之冷即易。必效方

頭瘡生蛆

頭皮內時有蛆出以刀切破擠絲瓜葉
汁搽之蛆出盡絕根。小山怪證方

手足癩瘡

炒臘月鯪傳
之。千金方

手足癩瘡

生薤一把以熱醋投入以
封瘡上取效。千金方

瘡冒風邪

腫痛用白芋燒灰傳
之乾即易。千金方

一切惡瘡

熬豉為末傳之不過三
四次出。楊氏產乳

脚膝爛瘡

金星草背上星刮下
傳之即乾。集簡方

反花惡瘡

雞腸草研汁沸之或為末猪脂調搽極效。醫林正宗

賺瘡潰爛

覆盆葉為末用酸漿水洗後搽之。日一次以愈為度。直指方

黃水瘡

芋苗晒乾燒存性研搽。邵真人經驗方

狐刺尿瘡

麴末和獨頭蒜杵如麥粒納瘡孔中虫出愈。古今錄驗

癬瘡作癢

雀兒草即酸母草擦之數次愈。永類方

身面癬瘡

日午搗桃葉取汁搽之。千金

足上癩瘡

桃花食鹽等分杵勻醋和傅之。肘后方

惡瘡見血

用血見愁草研爛塗之。危氏得效方

蟲

癬

清晨采露水絲瓜葉七片逐片擦七下如神忌雞魚發物。攝生泉妙方

大五頁方

諸瘡

全

天泡水瘡

黃藥子末搽之。集簡方

黃水面瘡

一百五日寒食節收桃花為末食後以水半盞調服方寸七日三服甚良。崔元亮

海上方

白禿頭瘡

乾桃一兩黑豆一合為末臘猪脂調搽。聖惠

蛙脚癩瘡

乾馬齒莧研末蜜調傅上一宿其虫自出神效。海上方

風疽瘡疥

凡脚脰及脚脈中痒搔則黃汁出者是也。以青竹高三尺着大豆一升在內以馬屎

糠火燒熏以器兩頭取汁搽之先以清和塩洗之不過三度極效。千金

大風癩疾

大麻仁三升淘晒以酒一斗浸一夜研取白汁濾入瓶中重湯煮數沸收之每效一

小蓋兼服茄根散乳

香皂散

足趾肉刺

先以湯浸刮去一層用黑木耳貼之自消爛不痛。近效方

反花惡瘡

馬齒莧一斤燒研猪脂和傅

惡瘡癰癩

十年不瘥者苦瓠一枚煮汁搽之。日三度。用后方

五般瘡癰

非根炒存性搗末以猪脂和塗之數度愈。經驗方

陰上粟瘡

取停水濕處乾卷皮為末傅之神效。外臺秘要

楊梅瘡癰

水萍煎汁浸洗。半日數日一作。集簡方

坐板瘡疥

絲瓜皮焙乾為末燒酒調塗之。攝生衆妙方

惡刺瘡痛

大豆煮汁清之取瘡。千金

天蛇毒瘡

似癩非癩天蛇乃早間花蜘蛛也人被其螫為露水所濡乃成此疾以秦皮煮汁一

斗飲之即瘥。
寇守奭本草

頭上肥瘡

一百五日寒食節收桃花為末食後以水
半盞調服方寸七日三甚良。崔元亮海

上方

頭上惡瘡

以黃泥包豆豉煨熟取出為末
以葶菜油調傅之。保幼大全

蛇纏惡瘡

鏡面草入鹽
杵爛傅之妙

諸瘡久潰

絲瓜老根熬水掃之
大涼即愈。應驗方

豌豆煩躁

大豆煮汁飲之
佳。子母秘錄

疔瘡疥毒

蒲公英搗爛覆之即黃花地丁也別
更搗汁和酒煎服取汗。唐氏方

麩豆諸瘡

煩熱甚者水研山豆根
汁服少許。經驗方

風瘡不愈陳菜子油同穿山甲未熬成膏塗之即愈。攝生眾妙方

豌豆斑瘡蔓菁根搗汁挑瘡破塗之。三食頃根出矣。肘后方

天泡濕瘡生百合搗塗一二日即安。瀕湖集簡方

疥瘡有蟲羊蹄根搗和猪脂入塩少許日塗之。外臺秘要

渾身疥癩端午日午時采翻白草每用一握煎水洗之

坐板瘡疥上脂麻嚼傅之。筆峰雜興

浸淫瘡癰醬瓣和人尿塗之。千金翼

斂瘡生肌黃蘗末麪糊調塗效。宣明方

天泡濕瘡絲瓜汁調辰粉頻塗之

大直頁方 諸瘡

多年惡瘡 蒲公英搗爛貼。救急方。

足上癩瘡 桃葉搗和苦酒傳之。肘后方。

濕癬肥瘡 大麻子傳之。五日瘡。千金方。

浸淫惡瘡 有汁多發於心不早治周身則殺人熬秣米令黃黑杵末傳之。肘后方。

一切頭瘡 雞腸草燒灰和鹽傳之。孟詵食療。

風瘡疥癩 血見愁草同滿江紅草搗末傳之。乾坤秘韞。

黃水濕瘡 真柏油二兩香油二兩熬稠搽之如神。陸氏積德堂方。

收斂瘡口 血竭末一字麝香少許大棗燒灰半錢同研津調塗之。充原方。

下部疔瘡 檄攪燒存性研末油調敷之或加孩兒茶等分。乾坤生意。

賺瘡不合 血竭未傳之以乾為度。濟急仙方

賺瘡熱瘡 黃蘗末一兩輕粉三錢豬膽汁調搽之。或只用蜜炙黃蘗一朱

頭上白禿 花椒末豬脂調傳三。五度便愈。普濟方

惡瘡有蟲 久不愈者以栢枝節燒瀝取油傳之三五次無不愈亦治牛馬疥。陳承本草別說

預免瘡癩 凡小兒每年六月六日照年歲吞皂莢子一枚林靜齋所傳方

也。吳曼扶壽方

鬚毛毒瘡 生頭中初生如蒲桃痛甚黃蘗一兩乳香二錢半為末槐花煎水調作餅貼於瘡口

○普濟方

一切惡瘡 水沉金絲膏用白膠香瀝青各一兩以麻油黃蠟各二錢半同溶化入冷水中扯干

諸瘡

遍攤貼之。
儒門事親

雞屎白禿

甜瓜蔓連蒂不拘多少以水浸一夜砂鍋
熬取苦汁去滓再熬如餵盛救每剗去
疔洗淨以膏一盞加半夏末二錢表汁一
匙狗胆汁一枚和勻塗之不過三上忌食
動風之物。

儒門事親

諸瘡寒熱

毒痺及六畜虫瘡鼠
生搗傳之。聖惠方

烏癩風瘡

大腹子生者或乾者連全皮勿傷動以酒
一升浸之慢火熬乾為末臘猪脂和傳。

聖濟

總錄

下部生瘡

生漆塗之良
。肘后方

脚肚生瘡

初起如粟搔之漸開黃水浸淫痒痛漬
遂致遶脛而成痼疾用酸榴皮煎湯冷定

日日掃之取愈乃止。○醫學正宗

赤龍皮湯

治諸敗爛瘡乳瘡用槲皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬温用洗之洗畢乃

傳諸膏。○肘後

一切瘡

鹿梨散用鹿梨根蛇牀子各半斤真剪草四兩硫黃三錢輕粉一錢為末麻油調傅之小兒塗於絹衣上着之七日不解自愈。○仁存方

一切癬

鹿梨根刮皮搗爛醋和麻布包擦之乾者為末以水和搗。○唐瑤經驗方

癬瘡濕癢

楮葉搗傅。○聖惠方

頭癢生瘡

楸葉搗汁頻塗。○聖惠方

諸瘡弩肉

時珍發明曰其蝕惡瘡弩肉雖是酸收却有物理之妙說出本經其法載於劉涓子

本草綱目

諸瘡

全

鬼遺方用烏梅肉燒存性研傅惡肉上一
 夜立盡聖惠方用烏梅和蜜作餅貼者其
 力緩按楊起簡便方云起臂生一疽膿潰
 百日方愈中有惡肉突起如蠶豆大月餘
 不消醫治不效因閱本草得此方試之一
 日夜去其大半再上一日而平乃知世有
 奇方如此遂留心搜刻

膿泡疥瘡

諸方始基於此方也
 柏油二兩水銀二錢樟腦五錢同研頻入
 唾津不見星乃止以溫湯洗淨瘡以藥填

入。唐瑤
 經驗方

疔腫惡毒

以針刺四畔用榴皮着瘡上以麪圍四畔
 灸之以痛為度仍納榴末傅上急裏經宿
 連根自出也。
 肘后百一方

風癬有蟲

桐皮蛇牀子等分爲末以臘猪脂調搽之。元英如宜方

諸瘡久壞

不愈者棗膏三升煎水頻洗取愈。千金

火赫毒瘡

此患急防毒氣入心枸杞葉搗汁服立瘥。肘后方

風癬疙瘡

梓葉木棉子羯羊屎鼠屎等入瓶中合定燒取汁塗之。試效錄驗方

天泡濕瘡

荷花貼之簡便方

徧身風癩

荷葉三十枚石灰一斗淋汁合煮漬之半日乃出數日一作良。聖惠方

瘡腫作痛

生椒末釜下土蕎麥粉等分研醋和傅之。外臺秘要

天泡濕瘡

蓮蓬殼燒存性研末并泥調塗神效。海上方

賺脛爛瘡

用柿霜柿蒂等分燒研傅之甚妙。筆峰雜興

諸瘡

諸瘡

八

惡瘡疼痛 楓香賦粉等分為末漿水
洗淨貼之。壽親養老書

久瘡不已 櫛木皮一尺濶六寸切以水一斗煮取五
升入白沙糖十挺煎取一升分三服即吐

而愈。

肘后方

癩瘡如眼 上高下深顆顆累垂如瞽眼其中帶青頭
上各露一舌毒 瘡裏者是也用生井蛙

皮燒存性為末密

調傅之。直指方

下部生瘡 櫛皮榨皮煮汁熬如膏
餅以導下部。肘后方

諸瘡不合 白膠香輕粉各二錢
豬脂和塗。直指方

久近瘰癧 白膠香為末以酒瓶上箬
葉夾末取之。補形方

下部疔瘡 白果核塗之
趙原方

大風癘疾

摩勒香一斤卽乳頭內光明者細研入牛乳五升甘草末四兩瓷盆盛之安桌子上

置中庭安劔一口夜於北斗下祝禱去食子蓋露一夜次日入甌中蒸炊三斗米熟

卽止夜間依前祝露又蒸如此三次乃止每服一茶匙空心及晚食前溫酒調服服

後當有惡物出至三日三夜乃愈也。聖惠方

癬瘡有蟲

川槿皮煎入肥皂浸水頻頻擦之或以槿皮浸汁磨雄黃尤妙。簡便方

下部蠶瘡

皂莢燒研綿裹導之。肘后方

臙瘡潰爛

海上方詩云左腳草鞋將棒挑水中洗淨大中燒細研爲末加輕粉洗以鹽湯傳卽

消

妬精下疳

大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後搽之或以荆芥黃蘗甘草馬鞭草葱白

湯洗亦可昔方士周守真醫唐靖爛莖
一二寸用此取效也。洪邁夷堅方

大風白癩

天蓼刮去粗皮剉四兩水一斗煎汁一升
煮糯米作粥空心食之病在上吐出在中

汗出在下泄出避風。又方天蓼三斤天
麻一斤半生剉以水三斗五升煎一斗去

滓石器慢煎如餲每服半匙荆芥薄荷
酒下日二夜一月見效。聖惠方

疥瘡風蟲

棟根皮皂莢去皮子等分
為末猪脂調塗。行效方

大風癩疾

鬚眉墮落皮肉已爛成瘡者用蜜蜂子胡
蜂子黃蜂子並炒各一分白花蛇烏蛇並

酒浸去皮骨炙乾全蝎去尾炒白僵蠶炒
各一兩地龍去土炒半兩蝎虎全用炒赤

足蜈蚣全者炒各十五枚丹砂一兩雄黃
醋熬一分龍腦半錢右為末每服一錢

溫蜜湯調下日
三五服。總錄

臘梨頭瘡

不拘大人小兒用獨核肥皂去核填入沙糖入巴豆二枚紫定鹽泥包煨存性入搗

再洗。普濟方

大風癩瘡

選奇方用黃蘗末皂莢刺灰各三錢研勻空心酒服取下水物並不損人食白粥兩三日服補氣藥數劑名神效散如四肢腫

取針刺出水再服忌一切魚肉發風之物取下一虫大小長短其色不一

血風賺瘡

胡粉煨過研桐油調作隔紙膏貼之。又方用船上陳桐油石灰煨過又以人髮拌桐油炙乾為末仍以桐油調作膏

楊梅毒瘡

乃陽明積熱所生槐花四兩略炒入酒二盞煎十餘沸熱服胃虛寒者勿用。集簡

大書類方

諸瘡

卷

脚脛爛瘡

臭穢不可近用。蜈蚣十條瓦焙研末油調傳之立效。救急方。

身首生瘡

榆白皮末油和塗之。虫當出。子母秘錄。

大風諸癩

大風子油一兩苦參末三兩入少酒糊丸。梧子大每服五十九空。心温酒下。仍以苦

參湯洗之。○普濟方。

荷錢癬瘡

巴豆仁三箇連油杵作泥以生絹包擦。日一二次三口痊好。○碑以正經驗方。

大風瘡裂

仍以設煎湯洗之。○嶺南衛生方。

反花瘡疾

蜘蛛膜貼之數。○千金方。

肺毒風瘡

狀如大風絲雲散用好桑葉淨洗蒸熟一宿日乾為末水調二錢七服。○經驗方。

瘡傷風水

腫痛入腹則殺人以桑灰淋。○梅師方。

脚肚風瘡

如癩桐油人乳等分搽之數次即愈。集簡方

大風諸癩

長皂莢二十條炙去皮子以酒煎稠濾過候冷入雪糕丸梧子大每酒下五十九。

直指方

疥癬濕瘡

松膠香研細少人輕粉先以油塗瘡摻末在上一日便乾頑者三二度愈。劉涓子

鬼遺方

楊梅惡瘡

大風子燒存性和麻油輕粉研塗仍以殼煎湯洗之。嶺南衛生方

濕癩瘡癬

荆木燒取汁日塗之。深師方

惡瘡防水

青布和蠟燒烟筒中熏之入水不爛。陳藏器本草

大風癩瘡

楊花四兩搗成餅貼壁上待乾取下米泔水浸一時取之瓦焙研末二兩白花蛇烏

本草類方

瘡

七

蛇各一條去頭尾酒浸取肉全蠲蜈蚣蟻
酥雄黃各五錢苦參天麻各一兩為末水
煎麻黃取汁熬膏和丸梧子大硃砂為衣
每服五十九溫酒下一日三服以愈為度

○孫氏集效良方

牛皮風癬

用槿皮一兩大風子仁十五箇半夏五錢
到河水并水各一盃浸露七宿入輕粉一

錢入水中秃筆掃塗覆以青衣數日有臭
涎出妙忌浴澡夏月用尤妙。扶壽方

頭耳諸瘡

眉癬燕窩瘡並用肥皂煨存性一錢枯
礬一分研勻香油調塗之。摘玄方

瘡傷風水

青布燒烟於器中以器口熏瘡待
惡汁出則痛痒癢。陳藏器本草

中練癬

厄子燒研和油傳
之。保幼大全

瘡潰爛

陳艾五錢雄黃二錢青布卷作大炷點火
熏之熱水流數次愈。鄧筆峰雜興方

一切惡瘡

巴豆三十粒麻油煎黑去豆以油調硫黃輕粉末頻塗取效。普濟

肺風毒瘡

遍身瘡疥如癩及癰疹瘙痒面上風刺婦人粉刺並用樺皮散主之樺皮燒灰四兩

只殼去穰四兩荆芥穗二兩炙甘草半兩各為末杏仁水煮過去皮尖二兩研泥爛

切勻每服二錢食後溫酒調下瘡疥甚者日三服。和濟方

瘡腫無頭

皂莢刺燒灰酒服三錢嚼葵子三五粒其處如針刺為效。儒門事親

腹内生瘡

在腸臟不可藥治者取皂莢刺不拘多少好酒一盃煎至七分溫服其膿血悉從小

便中出極效不飲酒者水煎亦可。藺氏經驗方

下蝕疔瘡

破絲網燒存性孩兒茶各等分研末以濃茶洗淨搨之三五次效忌生冷房事發物

○集簡方

疥瘡瘙癢

巴豆十粒炮黃去皮心右順手研入酥少許膩粉少許抓破點上不得近目並外腎

上如熏目著腎則以黃丹塗之甚妙。千金方

癬瘡不愈

以川槿皮煎湯用肥皂去核及內膜浸湯時時搽之。楊起簡便方

頭上生瘡

海螵蛸白膠香各二錢輕粉五分為末先以油潤淨乃搽末二三次即愈。衛生易

方簡

大風惡疾

眉髮脫落以桑柴灰熱湯淋取汁洗頭面以大豆水研漿解澤灰味爛佳次用熱水

入綠豆麪濯之三日一洗頭一日一洗面不過十度良。聖惠方

一切惡瘡

及沙虱水弩惡疽五月五日取蟻蝦蒸過陰乾為末油和傅之。聖惠方

大風惡瘡

猪肉松葉二斤麻黃去節五兩剉以生絹袋盛清酒二斗浸之春夏五日秋冬七日

每温服一小盞常令醺醺以效爲度。聖惠方

臙瘡黑爛

多年老杉木節燒灰麻油調隔箸葉隔之絹帛包定數貼而愈。救急方

肺風惡瘡

瘙痒用木乳卽皂莢根皮秋冬采如羅紋者陰乾炙黃白蒺藜炒黃芪人參枳殼炒

甘草炙等分爲末沸湯每服一錢。普濟方

牛皮癬瘡

舊皮鞋底燒灰入輕粉少許麻油調搽。直指方

反花惡瘡

肉出如飯粒根深濃潰柳枝葉三斤水五升煎汁二升熬如錫日三塗之。聖惠方

陰瘡濕癢

槐樹北面不見日枝煎水洗三五遍冷再暖之。孟詵必效方

卒得惡瘡

不可名識者柳葉或皮水煮汁入少鹽頻洗之。肘后方

足上風瘡

作痒甚者皂莢炙熱烙之。潘氏方

本道頭方

諸瘡

五

頭上癩瘡

芙蓉根皮為末香油調傅先以好毛柳枝煎湯洗之。傳滋醫學集成

頭上禿瘡

蠟燭頻塗勿令日晒久則自然生髮。集玄方

積年諸瘡

蜘蛛膜貼之數易。千金方

治癩白蛇膏

白花蛇五寸酒浸去皮骨炙乾雄黃一兩水飛研勻以白沙蜜一斤杏仁一斤去皮研爛同煉為膏每服一錢溫酒下日三須先服通天再造散下去虫物服此除根。

三因

大風

朝野僉載云商州有人患大風家人惡之山中為起茅屋有烏蛇墮酒罌中病人不

知飲酒漸瘥罌底見有蛇骨始知其由。治例治大風用烏蛇三條蒸熟取肉焙研

未蒸餅九米粒大以喂烏雞待盡殺雞烹

熟取肉焙研末酒服一錢或蒸餅丸服不

過三五雞卽愈。○秘韞用大烏蛇一條打
死盛之待爛以水二碗浸七日去皮骨入
糙米一升浸一日晒乾用白雞一隻餓一
日以米飼之待毛羽脫去殺雞煮熟食以
酒下之吃盡以熱湯一盆
浸洗大半日其病自愈

潔白蛇散

治大風病白花蛇烏稍蛇各取淨肉二錢
酒炙雄黃二錢大黃五錢爲末每服二錢

白湯下三日
一服○家珍

三蛇愈風丹

治癘風手足麻木眉毛脫落皮膚瘙痒及
一切風瘡白花蛇烏稍蛇土蝮蛇各一條

並酒浸取肉晒乾苦參頭末四兩爲末以
皂莢一斤切酒浸去酒以水一碗援取濃
汁石器熬膏和丸梧子大每服七十九煎
通聖散下以粥飯壓之日三服三日二浴
取汗避風○治例無蝮
蛇有大風子肉二兩

眉鍊癬瘡

生眉中者穿山甲前膊炙焦為末清油和輕粉調傳。直指方

雞峰白花蛇膏

治營衛不和陽少陰多手足舉動不快用白花蛇酒煮去皮骨瓦焙取肉一兩天麻

狗脊各二兩為細末以銀盃盛無灰酒一升浸之重湯煮稠如膏銀匙攪之入生姜

汁半盃同熬勻瓶收每服半匙頭用好酒或白湯化服日二次神效極佳。備急方

驅風膏

治風癱癘風遍身疥癬用白花蛇肉四兩酒炙天麻七錢半薄荷荆芥各二錢半為

末好酒二升蜜四兩石器熬成膏每服一盞溫湯服日三服急於暖處出汗十日效

○醫壘

元戎

俗傳白花蛇

治楊梅瘡先服發散藥後服此用花蛇肉酒炙龜板酥炙穿山甲炙蜂房炙輕粉朱

砂各一錢為末紅棗肉搗丸梧子大每服七丸冷茶下日三忌魚肉服盡即愈後服

土茯苓藥調之。方廣心法附餘治楊梅瘡用花蛇肉一錢銀珠二錢鉛二錢汞二錢爲末作紙撚九條每用一條於燈盞內香油浸點燈安烘爐裏放被中蓋臥熏之勿透風一

日三次

賺瘡漫淫

用黃魴魚卽黃鱔魚破開入蓖麻子二十粒拈定安廁坑中冬三日春秋一日夏半日取出洗淨黃泥固濟煨存

性研香油調傅。普濟方

瑞白花蛇酒

治諸風癘癰用白花蛇一條酒潤去皮骨取肉絹袋盛之蒸糯米一斗安麴於甕底置蛇於麴上以飯安蛇上用物密蓋三七日取酒以蛇曬乾爲末每服三五分温酒下仍以濁酒并槽作餅食之尤佳。瑞竹堂經驗方

血風賺瘡

生鰕黃丹搗和傅之日一換。集簡方

本草類方

諸瘡

大風癩瘡

取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鐺斤兩下姜汁於蜜中消之又秤之令知斤兩卽下蜜於鐺中微少煎令姜汁盡秤蜜斤兩在卽藥已成矣患三十年癩者平日服棗許大一丸一日三服溫酒下忌生冷醋滑臭物功用甚多不能一一具之。食

方療

一切惡瘡

蜘蛛晒研未入輕粉麻油塗之。直指方

一切風瘡

頑癬疥癩年久不愈者不過二三服必愈用黑大柴頭魚一箇卽烏鱧也去腸肚以蒼耳葉填滿外以蒼耳安鍋底置魚於上少少着水慢火煨熟去皮骨淡食勿入鹽醬功效甚大

○醫林集要

臙脛爛瘡

用桃柳槐椿棟五枝同荆芥煎湯洗拭淨以生黃蠟攤油紙上隨瘡大小貼十層以

帛拴定三日一洗除去一層
不用一月痊愈。醫林集要

頭上瘡癬

蜂房研末臘猪脂
和塗之效。聖惠

天口虞瘡

此歲有病天行斑瘡頭面及身須臾周匝
狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數

日必死差後瘡癩黯色一歲方滅此惡毒
之氣世人云建武中南陽擊虜所得仍呼

為瘡瘡諸醫參詳療之取好蜜通摩
瘡上以蜜煎升麻數七拭之。肘后

惡瘡似癩

及馬疥大如錢者白死蛇一條水漬
至爛去骨取汁塗之隨手瘥。千金

白禿頭瘡

乾地龍為末入輕粉
麻油調搽。普濟方

臙瘡生蟲

用小鰕三十尾去頭足殼同糯米飯研爛
隔紗貼瘡上別以紗罩之一夜解下掛看

皆是赤虫即以葱椒湯洗淨用舊茶籠
內白竹葉隨大小剪貼一日二換待汁出

盡逐日煎苦楝花湯洗之以好膏貼之

將生肉勿換膏藥忌發物。直指方

癩風成癩

祛風散用東行蝎虎一條焙乾大蠶沙五
升水淘炒各為末以小麥麩四斤拌作絡

索曝乾研末每服一二合煎柏葉

湯下日三服取效。衛生寶鑑

無名惡瘡

忽得不識者用死蟻
蝦杵汁塗之。廣利

浸淫毒瘡

凡卒得毒氣攻身或腫痛或赤痒上下周
匝頓毒欲死此浸淫毒瘡也生鯽魚切片

和塩搗貼頻易

之。聖惠方

肛門生瘡

肛門主肺肺熱即肛塞腫縮生瘡白蜜一
斤猪胆汁一枚相和微火煎令可丸丸三

寸長作挺塗油納下部臥

令後重須臾通泄。梅師

白禿頭瘡

破硃紅漆器剝取漆硃燒
灰油調傳之。救急方

癘風痛癢

白頸蚯蚓去土以棗肉同搗丸梧子大每美酒下六十九忌姜蒜。活人心統

鍊眉瘡癬

小兒面湮瘡又名鍊銀瘡乃母受胎時食酸辣邪物所致用百藥煎五錢生白礬二錢為末油調搽

之。外科精義

白

癩

大蝮蛇一條勿令傷以酒一斗沽之煉火溫令稍熟取蛇一寸和臘月猪脂搗傅。

肘后方

惡瘡似癩

十年不瘥者全蛇脫一條燒灰猪脂和傅仍燒一條溫酒服。千金方

一切濕瘡

蟾蜍燒灰猪脂和傅。千金方

賺瘡蛙爛

用黃鱔魚數條打死香油抹腹蟠瘡上繫定項則痛不可忍然後取下看腹有金眼

皆虫也未盡更作後以人脛骨灰油調搽之。奇效

文直頁六

諸膏

廉脛生瘡

用中鮑魚三尾洗淨穿山甲二錢以長臭
莢一挺劈開兩片夾住瘡之爛存性研末
先以井水洗淨濃水用白竹葉刺孔貼之
候水出盡以麻油輕粉調藥傳之日一次

○直指方

楊梅瘡爛

古牆上螺螄殼辰砂等
分片腦少許為末搽之

鯨膽散

治大風癩疾用鯨魚胆生白礬十綠礬膩
粉水銀麝香各半兩研不見星每服一錢

井華水下取下五色
涎為妙。聖濟總錄

妬精陰瘡

大田螺二箇和殼燒存性入輕
粉同研傅之效。醫林集要

諸般瘡毒

廉瘡金瘡湯火等瘡用黃蠟一兩香油二
兩黃丹半兩同化開頓令瓶收攤貼。玉

仲勉 經驗

一切惡瘡 用蛇魚骨為末入諸色膏藥
中貼之外以紙護之。經驗

龍纏瘡毒 水缸底虹蚓一條
連泥搗爛傅即愈

癩頭軟癩 及諸熱瘡用五倍子七箇研末香油四兩
熬至一半布絞去渣搽之三四遍即可勿

○普濟方
以水洗之

積年癬瘡 外臺用斑蝥半兩微炒為末蜜調傅之
○承類用斑蝥七箇醋浸露一夜搽之

破傷風濕 如瘡者以黃蠟一塊熱酒化開服立
效與玉真散對用尤妙。瑞竹堂方

風癩濕爛 五倍子末津調
塗之。普濟方

賺瘡朽臭 生龜一枚取殼醋炙黃更煨存性出火氣
入輕粉麝香葱湯洗淨搽敷之。急救方

繞指毒瘡 生手是瘡上以活田螺一枚生
用搗碎蠟之即瘥。多能鄙事

本草類方 論瘡

瘡口不收 五倍煨研末以臘醋脚調塗四周效

濕毒賺瘡 枯竹蛀屑黃蘗末等分先以葱椒茶湯洗淨搽之日一上

暴發紅腫 痛不可忍者臘糟糟之。談楚翁試驗方

白口惡瘡 狀如木耳不拘大人小兒並用五倍子青黛等分為末以筒飲之。端效方

風蟲癬瘡 用螺螄十箇槿樹皮末一兩同入碗內蒸熱搗爛入礬紅三錢以鹽水調搽。孫氏

一切癬瘡 五倍子去虫白礬燒過各等分為末搽之乾則油調。簡便方

一切諸瘡 五倍子黃蘗等分為末傅之。濟方

癩風蟲瘡 乾蝦蟆一兩炙長肥皂一條炙去皮子薰酒再炙為末以竹管引入羊腸內繫定以

麩鋪甑內置藥麩上蒸熟入麝香半錢去麩同搗為丸如梧子大每温酒服二十一

丸。直指。

頭瘡熱瘡

風濕。噴毒用五倍子白芷等分研末搽之。濃水即乾如乾者以清油調。衛生易簡。

女人趾瘡

甲內惡肉突出不愈蜈蚣一條焙研傅之。外以南星末醋和傅四圍。醫方摘要。

附骨壞瘡

久不瘥濃汁不已或骨從瘡孔中出用大蝦蟇一箇亂頭髮一雞子大猪油四兩煎枯去滓待凝如膏先以桑根皮烏頭煎湯洗拭乾煨龍骨末搽四邊以前膏貼之。

錦囊 秘覽

下部瘡瘡

全幼心鑑用。杏林摘要用五倍子花

椒去子炒各一錢。二日生肉也。先以葱湯洗淨。

下部蠹蟲

痛痒。收者新牛糞半兩肥羊肉一兩炒黃同搗。

諸瘡

成膏九蓮子大炙熱綿裏納肛中半日即大便中虫出四度永瘥。董炳集驗方

脚肚生瘡

初起如粟米大蚤之不已成片包脚相交黃水出痒不可忍久成癩疾用百藥煎末唾調逐瘡四圍塗之自外入內先以貫衆煎湯洗之日一次。醫林集要

反花惡瘡

魚一箇去腸以濁羊屎填滿存性先以米泔洗過搽之

牛皮風癬

調搽之名一掃元醃過燒灰油李樓奇方

豌豆如芥

赤黑色者煎青芥脂摩之。千金

燥癬作癢

雄雞冠血頻頻塗之。范汪方

白禿頭瘡

生羊骨髓調搽之先以泔水洗淨一日二次數日愈。經驗方

金顛瘡

初生如米豆久則穿蝕用雞內金焙鬱金等分爲末鹽漿漱了貼之忌米食。總錄

多年惡瘡 或痛痒生 費用馬糞并齒同研爛 傅上不
過數次 武丞相在蜀時 脛有瘡痒不可忍

用此而瘥 兵部手集

足瘡嵌甲

以橘皮湯浸洗 輕剪去 更以虎骨末傅之 痛即止 便民圖纂

頭癢生瘡

白鴿屎五合 醋煮三沸 杵傅之日三上 聖惠

脚上臭瘡

熟雞子黃一箇 黃蠟一錢 煎油塗之

赤禿頭瘡

出膿晝開夜合 馬蹄燒灰 主油調塗 聖惠方

陰頭疔蝕

雞內金不落 水拭淨 新瓦焙脆 出火毒 爲細末 先以米泔水洗瘡 乃搽之 亦治口疔

。經方

惡瘡不愈

狗頭骨 灰同黃丹末 等分 敷之 壽域方

牛皮風癬 牛蹄甲 糞各一兩 燒存性 研末 油調 抓破 敷之 五七日 卽愈。 藺氏經驗方

鬼舐頭瘡 貓兒毛 燒灰 膏和 傅之。 千金

長肉生肌 老狗頭 腦骨 瓦炒 二兩 桑白皮 兩 當歸 二錢 半爲末 麻油 調敷。 直指

浸淫瘡毒 不早治 周身 殺人 以雞冠 血塗之 日四五度。 肘后

頭瘡白禿 雄雞屎 末 和陳醬 苦酒 洗之。 千金

浸淫諸瘡 豬弓車 骨年久者 椎破 燒令 脂出 乘熱 塗之。 普濟方

狐尿刺瘡 刺人 腫痛 欲死 破烏 雞搗之 良。 肘后方

鵝口瘡 自內生 出可治 自外生 人不可治 用食糞 白鵝下 清糞 濾汁 入沙糖 少許 搽之 或用

雄鵝糞 眠倒者 燒灰 入麝香 少許 搽之 效。 永類鈴方

賺脛爛瘡

以薤汁洗拭刮虎骨末敷之。便民圖纂

腎風下注

生瘡用驢蹄二十片燒灰密陀僧輕粉各一錢麝香半錢為末傅之。奇效方

賺瘡潰爛

三四年馬牙匡骨燒研先以土窖過小便洗數次搽之

大風瘡癩

油調五靈脂末塗之。摘玄方

年深疥癬

遍身延蔓者硫黃艾葉研勻作熱浸油點燈於被中熏之以油塗口鼻耳目露之。

集玄方

疥瘡有蟲

猪膏煎芫花塗之。附后

裏外賺瘡

羊屎燒存性研末入輕粉塗之。集要

白禿頭癬

熊白脂傅之

濕癩浸淫 新羊屎絞汁塗之乾者

熱瘡腫痛 不可忍用家鴨糞同雞子清調傅即消。聖惠

反花瘡毒 初生惡肉如米粒破之血出肉隨生反出于外用鴉合尿三兩炒黃為末溫漿水洗

後傅之。聖惠方。

陰上疔瘡 駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效。龔氏經驗方

頭瘡白禿 雞子殼七箇炒研油和傅之。秘錄

白禿癩瘡 洗刮令淨以猪胞乘熟裹之當引虫出

牛皮風癬 每五更炙牛肉一斤食以酒調輕粉敷之。直指方

香瓣瘡 生面上耳瘡浸淫水出久不愈用殺羊鬚荆芥乾棗肉各二錢燒存性入輕粉半錢

每沉拭清油調搽二
三次必愈。聖惠方

浸淫瘡癬

洗淨以雀屎醬瓣和
研日塗之。千金翼

頭瘡白禿

鴿屎研末傅之先以醋泔洗
淨亦可燒研參之。聖惠

狐尿刺瘡

烏驢尿頓熱
漬之。千金

豌豆毒瘡

馬肉煮清汁洗
之。兵部手集

瘡口不合

雞臛脰皮
日貼之

鵝掌風

鴿屎白雄雞屎
炒研煎水日洗

穀道生瘡

久不愈用雞臛脰燒存性
為末乾貼之如神。總錄

頭上白禿

羊肉如芥臘法炙香熱搗
上不通數次瘡。肘后方

本草類方

諸瘡

三

廉脛爛瘡 牛蹄和傅。燒灰桐油。

痛瘡癢 熱牛屎塗之。千金。

脚脛生瘡 雄雞肫內皮洗淨貼之一日。易十日愈。小山奇方。

鬼舐頭瘡 貓兒屎燒灰臘豬脂和傅之。千金。

諸瘡傷水 或傷風寒痛劇用馬屎燒烟熏令汁出愈。千金方。

賺瘡不斂 牛胞衣一具燒存性研搽。海上方。

瘡傷風水 痛劇欲死者牛屎燒烟熏令汁出即愈。外臺秘要。

天泡水瘡 雞子黃熬油搽之甚效。唐瑤經驗方。

兩脚癬瘡 白犬血塗之立瘥。女效。

大風癩瘡

用新竹筒十箇內裝黑豆一層頭髮一層至滿以稻糠火盆內煨之候汁滴出以盞

接承翎掃瘡上數日即愈亦

治諸瘡○邵真人經驗方

下疳濕瘡

蠶繭盛頭垢再以一繭合定燬紅出火毒研搽○楊氏

癩癬惡瘡

生髮灰米湯服二錢外以生髮灰二分皂筴刺灰二分白芨一分為末乾摻或以猪

胆汁調○

直指方

下部疳瘡

天靈蓋燬研末先以黃蘗湯洗淨摻之神效○又一方入紅褐小紅棗等分同燒研

○劉氏

經驗方

臙瘡濕爛

人頂骨燒研二錢龍骨三錢金絲硫黃一錢為末用冬蘿薑芽陰乾熬水洗之乃貼

○劉松石

保諸瘡

婦人足瘡

經年不愈名裙風瘡用男子頭垢桐油調作隔紙膏貼之。簡便

男子陰瘡

因不忌月事行房陰物潰爛用室女血納瓦上燒存性研末麻油調傅之

鬼舐頭瘡

取小兒糞和臘猪油傅之。千金方

瘡口不合

貧髮露蜂房蛇蛻皮各燒存性一錢用温酒食前調服神效。蘇沈良方

男女陰蝕

肥猪肉煮汁洗不過三十斤瘡。千金方

抓瘡傷水

腫痛難忍者以耳垢封之一夕水盡出而愈。鄭師甫云余常病此一丐傅此方

廉脛生瘡

人乳桐油等分和勻以鵝翎掃塗神效。摘玄

下疳濕瘡

髮灰一錢棗核七箇燒研洗貼。心鑑

廉脛生瘡

頭垢枯礬研勻猪胆調傅。壽域方

賺

瘡

燒過人骨碎者為末
○壽域神方

頭瘡白禿

普濟用新破猪肚勿洗熱搗之須臾虫出
不盡再作○孫氏方用猪肚一箇入砒一

兩紮定以黃泥固濟煨存
性為末油和傅以椒湯洗

十年惡瘡

母猪尿燒存性
傅之○外臺方

男女下疳

母猪糞黃泥包煨存性為末以
米泔洗淨擦立效○簡便單方

疔瘡入腹

牡猪尿和水絞汁服
三合立瘥○聖惠方

疥瘡癢痛

猪肚一枚同皂莢煮
熱去莢食之○救急

積年疥瘡

猪肚內放皂莢煮熟去
皂莢食之○油珍方

消蝕惡肉

臘月積者與燒存性一兩雄黃
榔各錢為末傅洗○直指方

本堂頂方

諸膏

肺風白癩

大蛇卷七
温令

一條勿令傷以酒一斗漬之糠火
和臘月猪脂搗傅○

肘后

疥瘡腫毒

白芷一錢生姜一兩搗碎
取汗即散此陳指揮方也○
蓋温服

卒得癩瘡

常時生兩脚間用白犬
血塗之立愈○肘后方

外腎生瘡

綠豆粉蚯蚓糞
等分研塗之

足瘡生蟲

南方地卑濕人多患足瘡歲久生虫如蛭
乃風毒攻注而然用牛或羊或猪肚去尿
不洗研如泥看瘡大小入煨過泥糝半兩

已上研勻塗帛上貼之須臾痒入心徐徐
連帛取下火上炙之虫出絲髮馬尾千萬

或青白赤黑以湯洗之三日一作不過
次虫盡瘡愈○南

宮從响嘍神方

濕熱黃瘡

助脾去濕。鐵砂丸用鐵砂不拘多少，搗盡。鑄淘洗白色，以米醋於鐵銚內浸過一指。

炒乾再炒三五次，候通紅取出，用陳粳米半升水浸一夜，搗粉作塊，煮半熟，杵爛入。

鐵砂二兩半，百草霜炒一兩半，搗下丸。梧子大每服五十九丸，用五加皮牛膝根木。

瓜浸酒下初服，若泄瀉其病源去也。乾坤生意。

白頭禿瘡

糞藍煎汁頻洗。聖濟錄。

無名惡瘡

梁上倒掛塵二條，非地蚯蚓泥少許，生蜜和捻作餅，如大錢陰乾，用蜜水調，頻傅之。

簡便方。楊起。

多年惡瘡

天茄葉貼之，或為末貼。救急須燒灰針入。

疔腫惡瘡

亂髮。患處。集簡方。

本草類方

一切疔腫

封頭片一升熬搗以醋和

疔瘡腫毒

金方用。楊氏方用。地丁草搗汁服。雖極者亦

加新黑牛屎。搗貼之若瘤瘡。

疔腫初起

王不留行子為末蟾酥丸黍米大每服一丸酒下汗出即愈。集簡方。

疔瘡腫毒

艾蒿一擔燒灰於竹筒中淋取汁以一二合和石灰如糊先以針刺瘡至痛乃點藥

三遍其根自拔。玉山韓光以此治人神驗。貞觀初衢州徐使君訪得此方予用治三十餘人得效。

孫真人千金方。

疔瘡初起

白芷一錢生姜一兩搗酒一盞溫服。取汗即散。此陳指揮方也。袖珍方。

諸瘡腫毒

牛蒡根三莖洗煮爛搗汁入米煮粥食一碗甚良。普濟方。

疔瘡腫毒

鶴虱草葉浮酒糟同搗傅之立效。孫氏集效方

一切疔腫

洗曰危困者用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服一升日三服拔根甚效。養生方

用蒼耳根苗燒灰和醋淀塗之乾再上十次卽拔根出。邵真人方用蒼耳根三

兩半烏梅肉五箇連鬚葱三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗

疔腫垂死

菊花一握搗汁一升入口卽活此神驗方也冬月采根。肘后方

疔瘡腫毒

端午采菘菹草日乾爲末每服半兩熱酒調下汗出卽愈極有效驗。集簡方

疔腫復發

凡鈴根搗爛用蜘蛛網少時根出。肘后方

疔毒初起

草烏頭七箇川烏頭三箇杏仁九箇飛羅麩二兩爲末無水調搽留口以紙蓋之

乾則以水淋之。唐諸瘡

疔瘡腫痛

乾再附子末塗之

疔腫惡瘡

醋和傅之日三等分爲末

疔毒惡腫

生烏頭切片醋熬成膏

貼次日根出

出。普

濟方

天蛇頭指

痛臭甚者黑豆生研末入蠶內籠之。濟急方

疔瘡作痛

魚鱉草搗爛傅之痛一二時不可去草痛後一二日即愈

德堂

方

熱毒瘡腫

生茄子一枚窩去二分去瓢二分似罐子形合於瘡上即消也如已出膿再用取瘡

○聖濟

總錄

疔瘡惡毒

用門白灰一撮羅細以獨蒜或新蒜荅染灰擦瘡口候瘡自然出少汗再擦少頃卽

消散也雖發背癰疽亦可擦之

疔瘡惡腫

野灰薷菜葉燒灰撥破瘡皮唾調少許點之血出爲度○普濟

疔毒初起

不拘已成未成用翻白草十科酒煎服出汗卽愈

魚臍疔瘡

絲瓜葉卽虞刺葉也連鬚葱白韭菜等分同入石鉢內研爛取汁以熱酒和服以渣

貼腋左病在左手貼在左腋右手貼在右腋病在左腳貼左膞右腳貼右膞在中貼

心臍用帛縛住候肉下紅線處皆白則散矣如有潮熱亦用此法却令人抱住恐其

顛倒則難救矣○危氏得效方

瘡氣嘔吐

綠豆粉三錢乾胭脂半錢研勻新服小調下一服立止○普濟

諸瘡

惡瘡不愈

左卷十
確煎搽一把搗爛入雄黃五分水二升瓦
對孔熏之祇封七重穿一孔待氣出以瘡

癰子初起

葛蔓燒灰水調傳
後用生肌藥取效
選奇方

疔

腫

黑牯牛拋糞石上待生菌子焙乾
等分爲末以竹筒去兩頭緊縛合在疔上
用水和末一錢入筒內少頃沸起則根

疔瘡便毒

不問已潰未成初起發熱用金銀花俗名
甜藤采花連莖葉自然汁半碗煎入分服
之以渣傳之敗毒托裏散氣和

疔腫有根

用大針刺作孔削蔓菁根如針大染鐵生
衣刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗

塗於上有膿出即易須臾根出立瘥
忌油膩生冷五辛粘滑陳臭。肘后

疔瘡惡腫
刺破以老葱生蜜杵貼兩時疔
出以醋湯洗之神效。聖濟方

赤根疔腫
白粉熬黑和蜜
傳之。千金方

魚臍疔瘡
寒食錫塗之良乾
者燒灰。千金方

代指毒腫
取菱黃葱葉煮汁
熱漬之。千金方

一切疔腫
麩和臘猪脂封
之良。梅師方

瘡中惡肉
寒食麩二兩巴豆五分水和
作餅燒末擦之。仙傳外科

疔腫初起
用麩圍住以針亂刺瘡上
入圍中令容一盞冷即易三度根即出也
銅器煎醋沸傾

疔瘡惡腫
小豆花末傳
之。普濟方

疔瘡黑凹
用髮諸膏之外以葱蜜搗傳四圍。聖惠方

本草

頭上軟癰即乾芋搗傅之

數種疔瘡馬蹄草又鞭方益草大青葉臭紫草各等分搗爛以酒一磁爰之去滓温服三服立

瘡。經

驗方

手指腫毒了指惡瘡消毒止痛鏡面草搗爛傅之。壽域神方

疔瘡腫毒馬齒菜二分石灰三分為末雞子白和傅之

十三種疔春三月上建日采葉名天精夏三月上建日采枝名枸杞秋三月上建日采根名地骨並暴乾為

老冬三月上建日采根名地骨並暴乾為末如不得依法采得一種亦可用緋繪一

片裹藥牛黃一梧子大及鉤棘針三七枚赤小豆七粒為末先於繪上鋪亂髮一雞

子大乃鋪牛黃等為末捲作團以髮束定熨斗中炒令沸定刮搗為末以一方寸七

合前枸杞末二七空心酒服
二錢半日再服○千金方

疔瘡惡腫

胡桃一箇平破取仁嚼爛安殼
內合在瘡上頻換甚效○普濟

手指掣痛

普濟和蜜溫熱浸
之愈乃止○千金

疔瘡惡腫

普濟方用荔枝五箇或三箇不用雙數以
狗糞中米淘淨為末與糯米粥同研成膏
攤紙上貼之留一孔出毒氣○濟生秘覽
用荔枝肉白梅各三箇搗作餅子貼疔瘡
上根即
出也

水疔暗疔

水疔色黃麻木不痛暗疔瘡凸色紅使人
昏狂並先刺四畔後用銀杏去殼浸油中
年久者搗膏
之○普濟方

男子下疳

先以藥水洗之後搽地骨皮
末上服止痛○衛生寶鑑

本草綱目

一切疔腫皂莢子仁作末傳之五日

手足心腫乃風也椒蓋末等分醋和傳之良

指頭腫毒痛甚者烏梅肉和魚鱗搗封之妙

男子陰腫作痒用桃仁炒香為末酒服方寸七日二仍搗傳之

疔瘡發汗千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰一分每用一小匙先以薑水些少次傾香油些少入末攪勻沸湯一盞調下厚被蓋之一時大汗出也

暗疔昏狂瘡頭凸紅柏樹根經行路者取二尺許去皮搗爛并華水調一盞服待瀉過以三角銀杏仁漫油搗會

疔瘡惡腫九月九日采芙蓉葉陰乾為末每以井水調貼次日用蜒蚰螺一箇搗塗之

普濟患處

普濟錄

方

軟癰頻發

翠玉膏用通明瀝青八兩劉綠二兩麻油
三錢雄豬胆汁三箇先溶瀝青乃一油胆

傾入水中扯拔器盛每
用緋帛攤貼不須再換

疔瘡腫毒

一切癰疽發背不問已成未成但焮痛者
皆治槐花微炒核桃仁二兩無灰酒一鍾

煎十餘沸熱服未成者二三服已
成者一二服見效。醫方摘要

疔瘡惡腫

棘針倒鉤爛者三枚丁香七箇同入瓶燒
存性以月內孩兒糞和塗日三上之。又

方曲頭棘刺三百枚陳橘皮二兩
水五升煎一升半分服。聖惠方

疔腫惡毒

透骨膏用八角兒楊柳上者陰乾去殼四
箇如冬月無上用其窠代之。蟾酥半錢巴

豆仁研分泥入溶化黃麝香許以衆藥末和

大直頁方

諸瘡

條送子蜜收每以針刺瘡頭破出血用榆
瘡口瘡博膠粒大入瘡中以雀糞二箇放
破無血係是着坏不必再用也忌冷水如針
末刺出血糊藥又旬即男左女右中指甲
拇血糊藥如都無血必刺是八

天蛇毒

劉松篁經驗方云會水灣
蛇毒瘡一老翁用水蛇一條去頭上取中
截如手指長割去骨肉勿令病者見以此
皮包手指自然束緊以紙外裹之頓覺遍
身皆涼其病即愈數日後解視手指有一
溝如小繩蛇皮內宛然有一小蛇頭目俱
全

一切疔腫

及無名腫毒惡瘡劉松石經驗方用蒼耳
草梗中虫一條白梅肉三四分同搗如
貼之立愈。聖濟總錄用麻虫即蒼耳
肉虫炒黃色白蠟蠶江茶各等分末蜜

調塗之。又方蒼耳節內虫四十九條搥碎入人言少許搥成塊刺瘡令破傅之少

頃以手撮出根即愈

魚臍疔瘡

似新火針瘡四邊赤中央黑可刺之若不

大痛即殺人也用臘月魚頭灰髮灰等分以雞溲尿和塗

之。千金方

疔腫拔根

取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傅之乾即易一日夜根拔出大有神

效。

千金

疔腫惡瘡

楊柳上大烏殼硬虫或地新糞內及泥堆中生者取以蜜湯洗死新瓦焙焦為末

先以燒過針撥開

醋調傅之。

軟癰頻作

露蜂一三沸去豆用油調傅甚效。唐氏

本草類方

諸瘡

馬疔腫毒

穿山巴... 四次乃用... 存性貝母等分為末酒調服三

拔取疔毒

蟾酥以白麪黃... 指爬動瘡上插入重... 破納之仍以水

澄膏貼之
危氏方

諸瘡腫硬

針散用蟾酥麝香各一錢研勻乳... 和罐中待乾每用少許津調傅之外以

膏... 能為害也。保命集

疔腫魚臍

外臺用蛇蛻雞子大水四升煮三四沸服... 汁立愈。直指治魚臍瘡出水四畔浮漿

用蛇蛻燒存性
研雞子清和傅

疔瘡惡腫

蟾酥一錢巴豆... 大每服一丸姜湯下良久以篇蓄根黃

荆子研酒半碗服取行四五
次以粥補之。乾坤秘韞

頭上軟癩

蝦蟇剝皮貼之收毒
即愈。活幼全書

疔瘡拔根

斑蝥一枚捻破以鍼割瘡上作米
字形樣封之即出根也。外臺

諸瘡腫毒

鯽魚一尾剖去腸柏葉填滿紙裹泥包煨
存性入輕粉二錢為末麻油調搽。普濟
方

疔腫毒腫

不破則毒入腹青囊雜纂用蟬蛻炒為末
蜜水調服一錢外以津和塗之。醫方大
成用蟬蛻蠶蠶等分為末醋調

疔腫惡毒

塗瘡四圍候根出拔去再塗
用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人
行五六里許則疔出後以熱醋湯洗去。
濟急

仙方

一切瘡毒

蟾酥一錢白麪二錢硃砂少許并華水調成小錠子如麥大每用一錠并華水服如瘡勢緊急五七錠葱

湯亦可汗出即愈

天蛇頭瘡

生手指頭上用蜈蚣一條燒烟熏一二

疔瘡惡腫

先刺出血以海螵蛸末搽之其疔即出。普濟方

手足腫痛

欲斷取蚓三升以水五升絞汁二升半服之。肘后

拔取疔黃

蟾酥以麪丸梧子大每用一丸安舌下即黃出也。青囊雜纂

疔瘡惡腫

用田螺入冰片化水點瘡上。普濟

鬢邊生瘡

貓頭上毛豬頭上毛各一把鼠屎拉燒研油調傅之。壽域

赤根疔瘡

馬牙齒末臘猪脂和敷根即出也燒灰亦可。千金方

疔腫傷風

作腫以馬屎炒熨瘡上
五十遍極效。聖惠方

疔瘡惡腫

十二月猪胆風乾和
生葱搗傅。普濟方

代指腫痛

以唾和白鹵砂搜麩作椀子盛唾令滿入
瓶著鹵末少許以指浸之一日即瘥。千

金方

頭上軟癩

用抱出雞卵殼燒存性研末入
輕粉少許清油調傅。危氏方

疔瘡中風

腫痛用驢屎炒熨瘡上
五十遍極效。普濟方

赤疔瘡

狗寶丸用狗寶八分蟾酥二錢龍腦二錢
麝香一錢為末好酒和丸麻子大每服三

丸以生葱三寸同嚼細用熱葱酒送下暖
臥汗出為度後服流氣追毒藥貼拔毒膏

取愈。通玄論

本草類方

諸瘡

疔瘡惡腫 青羊屎一升水二升漬少時煮沸絞汁一升頓服。廣濟方

疔瘡未破 白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麩圍腫處醋洗去之根出大驗。肘后

疔瘡惡腫 黑牛耳垢傅之。聖惠方

疔瘡惡腫 牡狗屎五月五日燒灰塗數易之。又治馬鞍瘡神驗。聖惠

疔瘡惡腫 取白犬血頻塗之有效。肘后

疔瘡惡腫 鼠屎亂髮等分燒灰針瘡頭納入大良。普濟方

疔瘡初起 刮破以熱尿尖傅之乾即易不過十五遍即根出立瘥。千金

代指腫 鮮皮裹之先刺出血炙

瘡腫熱痛 靈鼠膏用大雄鼠一枚清油一斤煎焦滴水不散濾再煎下炒紫黃丹五兩柳枝不

住攪勻滴水成珠下黃臘一兩熬成黑色成膏熬瓶收之出火毒每用攤貼去痛甚

良。經

驗方

積年惡瘡

反花瘡漏瘡不瘥者牛蒡根搗和臘月猪脂日日封之。千金方

一切瘡種

木芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏洗之。多能鄙事

諸瘡腫毒

蒺藜蔓洗三寸截之以水五升煮取二升去滓納入銅器中又煮取一升納小器中煮如節狀以塗腫處。千金方

大風癩瘡

營氣不清久風入脉因而成癩鼻壞色敗用黃精根去皮潔淨溪水洗二觔暴納粟

米飯中蒸至米熟時時食之。聖濟總錄

大風瘡疾

百靈藤四兩水一斗煮三升去滓入粳米四合煮粥於密室中浴畢乃食暖臥取汗

本草類方

諸瘡

身面瘡疥

汗後皮膚起如蕤片每隔日一作五
六十日後漸愈毛髮即生○聖惠方

發熱者不得食熱物不用火為使但著厚
衣暖臥取油一匙含嚥戒怒二七日也○

枕中記云服丹石人先宜以麻油一升薤
白三升切納油中微火煎黑去滓合酒每

服三合百日
氣血充盛也