


• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 510 JAPAN TAUMA

說疫

四五



試
門號
卷2

604

辨疑小序

孟子曰盡信書則不如無書雖於武成尚而二三策况其下焉者乎風雲日露之文以訛傳訛尚無閑輕重獨至醫學治法稍有舛錯人命攸關貽害非淺況方書真贗混淆實繁有徒也即屬名醫後人不敢嘗議其中尚有泥於一時見解之偏執精力之滲漏偽習其說者心有未安何可一誤

再誤任估千裁疑圓牢不可破耶但所戒者多知妄作輕議為賢耳若能以一知半解匡古人之不逮以壽斯人倫德者有知當亦心許矣昔吳又可瘟疫論中有正誤數條夫誤者所失在人而疑者所蓄在已余學識疎淺焉敵匡古人之誤但私心以爲未穩者不能不疑也故作文以辨之扣峯謹

松峯說疫卷之四



諸城劉奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南瑛叅閱

表姪李逢慶謹菴錄

辨疑

辨溫病陰暑

此事難知云冬行秋令當寒而溫火盛水虧云云推作瘟病之原因爲近理乃又云火土合德濕熱相助故爲溫病是溫病必原於濕熱將濕熱一門並可以不立矣須知濕熱乃夏時之正氣瘟疫乃天地之雜氣二者迥乎不同謂

瘟病而兼濕熱則有之未聞濕熱而爲溫病者也。又云惟房室勞傷辛苦之人得之是省房室就安逸之人必無瘟病矣。有是理乎。每見瘟疫盛行之年節慾安逸之輩往往有無端而感者。又何以稱焉。又云多慾辛苦之下腎水內竭陽氣外泄庄化之源既絕身之所存獨熱云云謂瘟病中有此一種則可耳。若云瘟病蓋由乎此則萬無是理也。至于暑字字彙解爲夏天氣熱則人之受是氣者斷無尚有屬陰之理。其曰陰暑者祇因人畏暑納涼外受寒邪所致。仍是感冒乃拋却現在之受寒而止泥前此之受暑故

以陰暑名之亦猶之曰陰熱也有是理乎。知陰熱二字之不通則知暑之不可以陰言也明矣。

辨夏凉冬煖不足致疾

吳又可瘟疫論中駁冬溫之說曰夏凉冬煖轉得春秋之和氣豈有因其和而反致疾者。

四時之序應寒則寒應煖則煖所以人得天地之正氣不能爲病。若夏宜熱而反涼冬宜寒而反煖未有不致疾者。但夏過於涼其爲病也卽時而見惟冬令天氣過于和煦往往當時不能爲害至來歲春夏之間方大發瘟疫此余

屢經而屢驗者實非臆說也第夏應熱而反涼人感寒邪而閉塞腠理不能疏泄其爲病也固無足異唯冬時有非節之緩當時不卽病必至來歲春夏間始作此誠不可解也人動曰冬傷于寒至春夏變爲溫暑病余則曰冬過于溫至春夏多發瘟疫病彼吳又可謂冬緩夏涼不足以致疾也吾幸不以爲然蓋以緩属于春涼属于秋緩與涼爲春秋之正氣謂之和也始宜若見于冬夏之令夏涼此爲冬緩非其時有其氣則不得謂之和矣不和卽爲反常之戾氣此夏涼冬緩之多致疾也又烏得言溫緩清涼之未必爲

病也哉

辨吳又可偏用大黃

瘟疫一症感邪厲之毒十之六感溫熱之毒十之四故用黃連解毒等湯不唯在表時服之寒凝血滯厥疾不瘳卽邪熱內傳應服涼藥余往往不用黃連不過生地丹皮二冬元參銀花童便極數用石恙梔子黃芩而止無不奏效故吳又可戒用寒劑而專用大黃亦未可爲非蓋大黃雖寒其性走而不守當瘟疫膠固之時得此一番推盪邪便解散較純用寒涼者固勝一籌但邪未入腑而輒用之既

不能解。在經之邪。徒受寒中。破腹之患。其害有不可勝言者。又可之用大黃。雖不益浪。至是但宜下諸症。未免偏于攻擊。全忘下不厭遲之說。

若不善

師又可而舉。手卽用大黃。反引又可爲證。則又爲又可之罪人矣。

辨用老君神明散東坡聖散子

活人云一歲之中病無長幼率相似此則時行之氣俗謂之天行是也。老君神明散務成子萤火丸聖散子敗毒散不拘日數淺深吐下隨症施行所

以聖散子不問陰陽表裡也。

語云用古方治今病。譬如拆舊料。蓋新房不再經匠氏之手。豈可用乎。盲哉斯言。洵堪爲醫學用藥之準矣。夫古今之元氣不同。觀漢人之處方。動以兩訣。宋元而降。不過錢計而已。以漢人之方治今人之病。吾知其過于峻重。以今人之方治漢人之病。吾知其不及病情。此處方分兩之未可泥。也。至于用藥之權衡。則又不得以漫投者。蓋四方之風土。不齊。羣倫之老少各異。天道之寒暄。無定南北之燥濕。頓殊人在氣交之中。或偏于陽。或偏于陰。或有時而壯旺。

或有時而虛怯。卽一人之身。一日之際。內傷七情。外感六氣。其病情之出沒隱現。真有若雲龍之不可方物者。若必執一方以應無窮之變。也有是理乎。活人以老君神明散東坡聖散子爲治疫癘之的方。不拘日數之淺深病症之吐下。亦不問陰陽表裡便率爾妄投。其不殺人如麻者鮮矣。蓋二方中用烏附吳萸毒熱之品。陰寒直中者服之庶或無過。若傷寒傳經熱症以及瘟疫。瘟毒正宜用芩連大黃之時。若投此湯。入口必斃。神明散用絹袋盛帶以此外治。不服食尚不能爲害。至于聖散子。則煎服之藥。是斷斷

乎不可用者。此方藥味亂雜。卽真陰寒症用之。亦恐未能獲効也。後世因過信蘇長公。隨奉爲良劑。甘就死地。噫。抑何其爲東坡之名之所靈以至於此哉。以及神明散。不過平人所製。假以李蘇之名。以眩人之耳目。好異者遂深信而不疑。若必謂是方出自李蘇。則張景岳新方八陣中王母桃一品。豈真瑤池仙府之所垂乎。吾願世之業醫者。不可拘于一定之方。亦不可執其一偏之見。變動不拘。權衡有準。則干岐黃一道。過半矣。

辨賑賑散等方

分晰義中
病者飲昌

之尿取名游移
資生湯但病者
之尿有熱毒斷
不可服服重便
耳

二分晰義書中載賠瓜散一丸用大黃爲君而以僵蚕蟬
蛻蟬黃佐之共爲末蜜酒調服用治三十六般熱疫夫一
方而治多病者唯古應膏爲然除此則廣東蠟丸亦有此

說然彼必有一單一症用某引和服是尤雖一方而引因
病異則引之所問最大視無引而一方兼治者不侔矣且
瘟疫更與雜症同有表裡分傳之異經腑臟胃之殊老
少強弱之分天人風土之別焉能以一方而治三十六症
乎余始得此書遇瘟疫盛行之年曾修和一料備用後偶
出門一女孫患瘟疫家中人因取與服服之返泄瀉昏睡

增劇筠谷兄修曰此藥云乳蛾等疾服之甚效余細維其
故孫女服之增劇者以邪尚在表方內有大黃宜乎不受
至于六治咽喉或于熱毒相宜豈三十六症中詎無一應
藥以佐之中又有大小復甦飲子大小清涼滌
疫散靖疫飲驅疫飲等方總以黃連爲君更雜錄諸寒苦
者乎有至二十味之多者更斷不敢用也

辨張景岳言瘟疫

景岳全書各門中講解俱極精詳透闡唯瘟疫

然緣其將傷寒瘟疫二症攬作一團未曾分晰。

也。其論瘟疫曰。瘟疫本卽傷寒

無非外邪之病。但染時氣而病。無少長率相似者。是卽瘟疫之謂云云。

第傷寒爲寒所傷

或涼雨所逼。或風雪所激。或失足落水。或猝然脫衣。或當風而寢。以致頭痛憎寒。皮膚壯熱。脊強無汗。方謂之傷寒。此係自取之病。病只一人而止。而衆人不然也。至于瘟疫。絕無諸項感觸。而抖然患癥。且非一人。鄉邑閭里。動皆相似。其症雖有頭痛身熱。脊強而多汗。始終一干爲熱。

與傷寒迥乎不同。治法亦異如何。曰。瘟疫本卽傷寒乎。夫旣曰本卽傷寒。再立瘟疫一門。豈非贅瘤乎。且旣曰本卽傷寒。而又曰染時氣而病。吾不知先傷于寒。而後爲時氣所染乎。抑染于時氣而後爲寒所傷乎。抑二者并集于一人之身乎。總緣傷寒。瘟疫原未看清。猶倣帖括者。認題不真。下筆便錯。雖詞藻絢爛。而不中肯綮。總屬陳飯土羹。其何以言文哉。

最不敢從者。發汗峻補二條。抑知瘟疫。豈

嘔瀉大聲章

月

強汗之所能解者乎。而峻補豈可施於熱毒之人乎。唯汗下後或顯虛症或虛極久病之人而感瘧者用補法亦必不可少也。

辨嘔吐嘔呃逆欬逆噫氣

丹溪書嘔吐門曰有聲有物謂之嘔。此是混嘔吐爲一張景岳亦不以爲然而未嘗深辨及觀李東垣則以嘔爲有一聲有物孫真人則以吐爲有物無聲詳嘔吐字意當以孫李爲是字彙嘔亦同謳夫謳必有聲而訥菴謂氣逆則嘔蓋氣一逆必作聲隨擁所食之物而俱出矣。吐則較嘔所

出更易開口便痰出又豈有聲哉至于嘔之一症經中雜病篇直作呃逆而河間海藏則以嘔爲乾嘔張景岳謂呃逆古無是名其在內經卽謂之嘔是特古今之稱名不同而嘔與呃逆斷不可混爲一症也。嘔雖以河間海藏說爲是而東垣十書渢洄集中則謂嘔之聲濁惡長而有力直至氣盡而後止非如乾嘔之輕而不甚也是較之劉王所說則更明白曉暢矣至于呃逆卽東垣所謂吃忒者是此症稱名不一隨其方言而呼之有曰格得者有曰打呃者有曰打歌得者總與嘔爲二症明係今之所謂打呃是也。

渢菴卷之二

卷之二

辨疑

八

靈樞則謂之餉。音嘵所謂餉不得息者是也。觀金鑑中以爲格格連聲。氣從脣下來。自衝脈出口作聲。豈非善于形容者乎。至于欬逆與呃逆。則又不可相混。有以欬逆爲呃逆者。有以欬逆爲噦者。是皆未詳味經文耳。經本以欬嗽氣逆爲言。如氣交變大論曰。歲金太過甚。則喘咳逆氣。又曰。欬逆甚而血溢。蓋以欬嗽不止而血隨氣上耳。未聞打呃而見血者也。此欬逆之非呃逆亦甚明矣。而欬逆之非噦。又何待辨乎。至噫氣之說。靈樞云。寒氣客於胃。厥逆從上散復出於胃。故爲噫。仲景謂上焦受中。焦氣未和。不能

消是。故能噫。據此則噫者。卽噯氣也。亦卽俗之所謂拔氣也。此理甚明。人所易曉。總之有聲。有物。曰。樞。有物無聲。曰。吐。有聲無物。曰。噦。呃逆者。卽打呃之謂。欬逆者。欬嗽之甚。以致氣逆上衝也。噫者。字彙解作飽食氣滿而有聲。豈非所謂拔氣者乎。症各不同。斷難相混。至於得病之由。與其治法。各有虛實寒熱之異。散見諸門。茲不贅。

辨五疫治法

攢音費夕高積
擊搏也

龐氏云。春三月行青筋牽病。夏三月行赤脉攢病。秋三月行白氣狸病。冬三月行黑骨瘟病。四季月各餘十八日。土

王用事行黃內隨病後人又以木火金水土五疫配之治各有定法其中止有所謂五疫乃天地之厲氣人中之則各隨其臟氣以爲病之說尚屬近理如所謂青筋牽等名色矜竒立異無益症治其用方如春三月用羌活湯夏三月用雙解散等法亦見沾滯至秋三月天漸涼冷反用三黃石膏殊不近理至其所用藥俱係發散等劑亦非治瘟疫的方也

辨吳又可疫有九傳治法中先裡後表

吳又可九傳治法有先裡而後表者始則發熱漸加裡症

下之裡症除二三日內又發熱反加頭痛身痛脈浮者宜白虎湯按其瘟疫初起治法云脉長洪而數大渴多渴此白虎湯症又云白虎治瘟疫脉長洪而數又云脉長洪而數白虎清涼解散服之或戰汗自汗而解是凡三言白虎症而絕無脉浮之說也至于發熱頭痛雖列于白虎湯之下而又無身痛前後多所滲漏不符看來頭身痛脈浮三症似宜小柴胡加羌防始與症對而乃用白虎何也

辨瘟邪止在三陽經

吳又可之瘟疫論世所盛行其中達原飲固爲治瘟疫之

良方第言瘟邪浮越於某經者卽加某經之藥止有三陽在表治法至於邪之傳裡者僅有入陽明胃腑一條傳三陰則畧而不及夫云邪伏膜原自內達外不似傷寒之按次傳經則可若云邪總不入三陰是將臟腑經絡劃然中斷而人身之營衛總杆格而不通矣此豈理也哉卽傷寒傳足不傳手之說識者猶或非之至於瘟疫之傳變且並將三陰而遺之何也每見患瘟疫者腹脹滿大便實或自利發黃以及四肢諸症非傳入足太陰經乎舌乾口燥咽痛但欲寐非傳入足少陰經乎煩濶囊縮以及善怒號呼

衝逆動搖并脇肋諸症非傳入足厥陰經乎且不特此也患在皮毛氣分而哮喘咳嗽者知邪之入肺患在神志昏冒而面赤喜笑者知邪之入心是則五臟六腑瘟邪之傳變無所不到謂臟腑諸症不能一時皆現則可謂瘟邪止在三陽經必無是理也

辨內傷寒認作瘟疫

內傷寒之症初起無熱不渴止有胸膈脢脹滿悶面唇皆無光澤或漚而胸腹急痛手足冷自覺不舒快少情緒其脉沉細此症總由過食生冷傷於脾胃所致故方書名之

爲內傷寒而以治中湯溫散之此症多感於夏月而瘟疫盛行之時與瘟疫甫愈之後或感此症昧者悞認爲瘟疫而以疫法治之鮮有不敗事者其弊必至於卒不能食泄瀉不止而釀成大患唯用治中湯加減出入寒甚則加熟附食積則加麥芽神麴肉積則加山楂嘔惡則加藿香製半夏鮮薑砂仁兼濕則加茯苓蒼朮胸脇痛悶則加枳壳白芍柴胡若內旣傷生冷而外復感風寒則用藿香正氣散或五積散平胃散等加減治之

治中湯 即理中湯加陳皮青皮

藿香正氣散 治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔胸膈滿悶咳嗽氣喘及傷寒傷濕瘧暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣者並增減用之

錦按疫初起用達原飲等不效者用此方加減治之

藿香 蘿蔖 甘草 厚朴姜汁炒桔梗 白朮泔浸土炒
大腹皮洗極淨配鳥好集其核毛落皮上洗不淨殺人蒼朮泔浸炒原方無今加入無汗者更宜
又一方加木瓜傷食加消導藥 姜棗煎

五積散 治外感風寒內傷生冷其曰五積者能散寒積

食積氣積血積痰積凡身熱無汗頭身項背疼痛拘急
胸滿惡食嘔吐腹痛寒熱往來並治

蒼术

泔浸炒

厚朴

姜汁炒

陳皮

甘草半夏製

枳壳

麸炒

當歸

酒洗

川芎

酒洗

白芍

酒炒

茯苓

酒炒

甘草

半夏製

桔梗

白芷炒

蘇葉

麻黃改代乾薑表重者

肉桂

桂枝表重者用枝

生葱薑煎

平胃散

泔浸炒

厚朴

姜炒

陳皮

炙草姜棗煎

炙草

姜棗煎

如傷食加神麌麥芽或枳實濕勝加五苓散痰多加製

半夏脾倦不思食加參米瘤悶加枳壳木香附大便
結閉加熟軍小便赤澁加芩澤風寒加葱豉蘇芷防風
內傷寒發班

患內傷寒後又兼之寒熱間作鼻中微出血兩手脉沉濶
皮膚按之殊無大熱身上有班三五點此內傷寒班也調
中湯主之夾暑加香薷扁豆

調中湯、

陳皮

半夏製

甘草

桔梗

蒼术

泔浸炒

川芎

酒洗白芍

酒炒砂仁炒研

藿香

羌活

白芷 麻黃或代蘇葉 桂枝 枳壳 生姜煎

內傷寒發黃

內傷寒發黃者其人脾胃素虛或食寒涼生冷之物以致寒實結搏停滯不散中州變寒而發黃色或嘔吐或腹滿自利小便短少者宜調中湯見前加茵陳或理中湯加茵陳枳實草果手足逆冷脉沉者加附子

按內傷寒爲病本係雜症而採入瘟疫門中者因瘟疫愈後不戒生冷每患此症或再微發熱惡寒暎者

不察往往誤認爲瘟病之復而以疫法治之寒涼清

解害人不淺故特爲指出再者瘟疫之復不能吃煙

內傷寒始終能吃煙以此爲辨錦誌

辨汗無太早下無太晚

此事難知云汗無太早非預早之早乃早晚之早謂當日午以前謂陽之分當發其汗午後陰之分不當發汗下無太晚非待入之晚乃當日之後爲陰之分也下之謂當已前爲陽之分也

凡人初感寒邪一覺憎寒頭痛身痛身熱脊強便宜用溫散之劑速發其汗斷無不愈之理雖年老及平素虛怯之人不易作汗者覺病即服汗劑其邪亦無不即當時解散者此余屢用而屢效者也遲則寒邪稽留傳變百出而班

黃狂躁等症作矣。所以一覺感寒，便宜速治。若必如難知所說，或日午以後感寒，必遲至明朝午前服汗劑，不亦晚乎？假如午後感寒，此時雖屬陰分，亦宜速服散劑，且服之多未有當時卽汗者。必俟次早藥力旣行，又逢陽分出汗，更易易耳。所謂汗無太早者，明係預早之早，豈早晚之早乎？傷寒如此，瘟疫亦然。瘟病之所謂不宜發汗者，指麻桂紫蘇而言。至於元霜素雪等丹，豈非涼散之劑乎？瘟疫初一起，當卽服藥，亦不必拘以時日也。至所謂太晚之說，分明解作遲下，非早辰夜晚第此言爲庸醫，不應下而妄下之。

者說法耳。然其言不能無弊也。若遇宜急下之症，而必執下無太晚之說，則陽明胃府勢必被邪火燒至燥裂而不可救矣。下劑若必拘以時，不亦謬哉？早晚二字，當易以遲速。云汗無太速下，無太遲，則不須言而解矣。

辨鄭聲

論曰：實則譖語，虛則鄭聲。平聲語也。夫聲必有譖，語必有聲。蓋言聲則鄭，而語則重也。人虛而精神衰，之不能自主，語言重複絮聒，而聲則有類於鄭耳。鄭聲浮是狀其聲之啞，七唧唧頗似淫聲。惟馮氏謂聲戰無力，不能按續，造字

出於喉中爲得解。成氏亦謂鄭衛之聲而王氏駁之則非矣。又有解鄭聲爲鄭重者。夫曰鄭重其事則有矣。曰鄭重分明則有矣。以此解病人之聲得乎。要之指鄭之浮聲取譬無疑也。凡患此者其聲必低氣必短脈必無力色必萎陷其兼症則目無赤色舌無胎刺身無大熱口無煩渴小便清長大便滑潤或泄瀉凡自言自語喃喃不全者皆是也。瘟疫始終一於爲熱罕見此症或汗多亡陽下多亡陰者有之若果虛最忌攻伐少有差謬無不卽死速宜察其精神辨其陰陽斟酌溫補以救其根本爲要若昏沉上氣

喘促發呃不止不省人事者危

辨褚氏春瘟夏疫

瘟疫之說前諸論中已詳哉其言之矣。茲讀褚氏遺書審微篇有云春瘟夏疫內症先出是將瘟疫二字拆開分配春夏。

總緣平看瘟疫二字且未悉其理解。

須知諸凡雜症苟一時所患皆同者皆有疫氣以行焉。其間如徭役之役故悉得以役名之而所該之病甚廣。瘟疫不過疫中之一症耳。乃串講之辭若曰瘟病之爲厲疫如是也若必如褚氏春瘟夏疫之說是將瘟疫二字

拆開對待言之矣。由此以推則世之稱傷寒者獨不可云。
秋爲傷而冬爲寒乎？知分作傷病寒病之不通則知言。春
瘟夏疫者之未妥也明矣。至於褚氏言男女異脈云女子
陰逆自上生下故左寸爲受命之根。萬物從土而出故左
關爲脾生左尺肺肺生右寸腎腎生右關肝肝生右尺心

等說。

戴起宗曾非之今不

必再辯

諸方小序

諸繫書強半於每門中講究治法左前而
空置方名於後不列藥味止言於某卷某
門我尋令讀者欲閱一方必將全部呈羅
舉頭按次備閱夢以許精力始可余甚不
敢放論治中兩門多方而閑於卷末剰有
備採擇治曉其中方多簡便不費藥料間

詩六小序

有丸散亦可預為修和雋常而窮鄉僻壤
田父屢人以及征途旅次某肆遠省偶
得厥疾皆可以而信裕以宥猝施治勿苦
有喜則送福於羣倫者不亦鴻遠哉抑率
詣

松峯說疫卷之五

諸城劉 奎松峯著輯

男秉錦濯西述較

福山劉嗣宗南瑛叅閱

表姪李逢庚謹菴錄

諸方

避瘟方

雄黃丸 治瘟不相染

明雄研一兩

丹參

赤小豆炒熟鬼箭羽各二
兩

共爲末蜜丸梧子大每日空心溫水下五丸

避瘟丹 燒之能避一切穢惡邪氣

一 蒼术 乳香 甘松 細辛 芸香

降真香等分

糊爲丸豆大每用一丸焚之良久又焚一丸畧有香氣卽妙

福建香茶餅 能辟一切瘴氣瘟疫傷寒穢氣不時噙化

沉香 白檀各一兩見茶二兩 粉草五錢麝香五分

冰片三分

共爲細末糯米湯調丸黍米大噙化

透項清涼散 凡遇時令不正瘟疫流行人各帶之或嗅

鼻可免侵染

白芷 細辛 當歸 明雄 牙皂等分

共爲細末磁瓶貯勿洩氣用時令病者噙水口內將藥噙鼻吐水取嚏不嚏再啖嚏方止已患未患者皆宜用

神聖辟瘟丹

蒼术君倍 香附 羌活 獨活 甘松

三奈 白芷 赤箭 大黃 雄黃各等分

共爲末糊丸彈子大黃丹爲衣晒乾正月初一平旦焚一炷辟除一歲瘟疫邪氣

老君神明散 避瘟疫

蒼术一錢 桔梗二錢

細辛五分

附子

炮去黑烏頭皮各二兩去皮尖

共爲細末帶於身邊可免瘟疫 不可服

藜蘆散一名赤散辟瘟疫

藜蘆

躑躅

乾姜各一兩

丹皮

皂角

各一兩六錢

細辛

十八銖桂枝一作桂心附子研各六兩

共爲粗末絳囊係臂上男左女右覺病作取藥末少許納鼻中 嫌分兩多和時四分之一亦可後皆倣此

務成于螢火丸

主辟瘟疾惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠻諸

毒五兵白刃盜賊凶害皆避之

螢火丸

鬼箭羽

去反

蒺藜

磐石

各一兩煅枯

雄黃

雌黃

各二兩

麝羊角

鍛竈灰

鑄柄

入斧頭木燒焦各兩半

共爲粗末以鷄子黃錐雞冠一具和之如杏仁大紅紬縫三角囊盛五丸帶左臂上仍可掛於門戶

屠蘇酒

大黃

十五銖

白术十銖

桔梗十五銖

川椒十五銖

炒出沃

防風六銖

烏頭

六銖

桂枝十五銖

荳蔻六銖

乃今之二錢

炒

銖

半廿四銖爲一兩

入紅囊中于臘月每旦懸井中毋著水元旦出藥入酒

凌音校讎音略
疑卽凌校之記
藥名

中煎數沸於東向戶中飲之先自小者飲起飲三朝若每年飲可代代無病內外井中宜悉著藥忌猪羊牛內

生葱桃李雀肉

辟瘟丹

蒼术 紅棗

和丸燒之

又方

時瘟疫流行水缸內每早投黑豆一握全家無恙
五更潛投黑豆大搘干井中勿令人見飲水家俱無恙

入病家不染方

香油和雄黃蒼术末塗鼻孔既出紙條探嚏如無黃术
卽香油亦可飲雄黃酒一杯或止抹雄黃于鼻孔卽妙

瘟病不染

五月五日午時多採蒼耳嫩葉陰乾收之遇疫時爲末
冷水服二錢或水煎舉家皆飲能辟邪惡

避瘟良方 瘟疫盛行車前子隔紙焙爲末服卽不染

瘟疫不染方 將初病人貼身衣服甑上蒸過合家不染

又避瘟方 入瘟家以麻油塗鼻孔出再取嚏則不染

避瘟方 以桃葉上墨搗爛涼水調服瘟疫不染方正用桃
蟲屎

古今言

卷之五

又方 以赤小豆糯米浸水缸中每日取水用

又方 以貫仲浸水用之或蒼术浸水用

斷瘟法 密以艾灸病人床四角各一壯勿令人知不染
凡入瘟疫家常以雞鳴時默念四海神名三七遍百邪不犯

東海神阿明

西海神巨乘

南海神祝融

北海神禹強 每入病室存心念三遍勿出口

雉狐屎在山中石上或竹木上尖頭者燒之辟惡去瘟疫

茵陳烏梅湯 治瘟疫

九九盡日茵陳連根採陰乾遇瘟起每一人用茵陳五

分烏梅二个打碎水二盅煎八分熟服汗出即愈

赤豆避瘟法

正月七日

用新布囊盛赤小豆置井中三日取出舉家皆服男十
粒女廿粒瘟則遠避

薑酒避瘟法

凡遇瘟疫行時出門須先飲燒酒一盃回家時仍再飲一
杯然後食別物但勿至醉不能飲者出入可食姜蒜或
以塞鼻

神砂辟瘟丸

神砂一兩研細白蜜和丸麻子大以太歲日或平旦一家皆向東方用井花令水各吞廿一丸永無疫患忌葷一日

一方 元日五更以紅棗祭五瘟畢合家食之吉

一方 正月上寅日取女薺草末三合絳袋盛掛帳中能避瘟

避瘟殺鬼丸如要少做或四分之一或改兩作錢皆可
一方有空心青鱉甲作龜甲

雄黃

雌黃各三

山甲

龍骨

鱉甲

貂皮各二

川芎二兩

禹餘糧二兩

真珠附加

羚羊角七

兩

虎頭骨

七兩
鶴雞十五枚如無以
兩
芫青十五枚代

東門上雄雞頭一枚

共爲末蠟溶爲丸彈子大每正旦病家門口燒一兩丸

並每人帶一丸

男左女右

避疫殺鬼並弔喪問疾皆吉

太蒼公避瘟丹 凡官舍旅館久無人到積濕積邪容易

侵人焚之可以遠此五六月終日焚之可以避瘟

薯术一斤

台芎

黃連

白术

羌活各八兩

川芎

草烏

細辛

柴胡

防風

獨活

甘草

藁本

白芷

香附

當歸

荆芥

天麻

官桂

甘松

干姜

三奈

麻黃

牙皂

白芍各四兩

麝香三分

共爲細末揉入艾中紙捲點之

一方 除夜將家中所餘雜藥調和成一處者焚之並焚糞可避瘟疫

一方 除夜有行瘟使者降於人間以黃紙朱書天行已過四字貼於門額吉

一方 懸掛馬尾松枝可免瘟疫

一方 天行時氣宅舍怪異并燒降真香有驗

一方 梵木香燒之去惡氣除病瘟產九渠國

一方 燒青木香薰陸安息膠香可避瘟疫

燒香避瘟 樞密王博文每於正旦四更燒丁香避瘟

人病家不染 用舌頂上腭努力閉氣一口使氣充滿毛竅則不染

辟瘟丹 燒之避瘟邪氣

乳香

蒼术

細辛

生草

川芎

不染瘟方

雄黃

五錢赤小豆一兩

蒼木一兩

泔浸去皮壁土炒

共爲細末水調每服一錢

又方 姜豉和白朮浸酒舉家常服一方無朮

又方 初伏採黃花蒿陰乾冬至日研末收存至元旦審

調服

又方 六月六日採馬齒莧晒乾元旦煮熟鹽醋調食之

又方 元日用麻子三七粒赤豆七粒共撒井中避瘟

又方 立春後庚子日溫蔓菁汁合家并服不拘多少可

避瘟羅蔔汁亦可蔓菁亦云蕪菁

麻豆投井方 除夜四更時取麻子赤小豆各廿七粒並

佳人髮少許同投井中終歲無傷寒瘟疫

髮泥投井 除夜以合家頭髮燒灰同脚底泥包投井中

呪曰我家眷屬不害傷寒瘟魔遠遁四季平安急急如

九天金輪王勅令

避瘟方

於病人出汗時身下舒一挑担則不傳染須舒於褥底
下不得近身恐挑担涼冰汗不出

殺鬼丹

虎頭骨真者
酥炙
明亮者
另研 桃梟係桃之乾
在樹上者
去皮尖
炒黃 朱砂光明者另研
各一錢五分 犀角屑光明者另研
木香 白术鬼箭羽各一錢
七分 麝香五厘

共爲粗末帶之可避瘟疫

一方 於春分日用遠志去心水煎日未出時東面飲二盃探吐則疾疫不生

一方 於穀雨以後用川芎、蒼朮、白芷、藁本、零陵香各等分煎水沐浴三次以泄其汙汗出臭者無病

吐免疫

桃湯 元日服桃湯壓邪氣制百鬼

納椒井中 腫日之夜令人持椒卧井旁無與人言納椒井中可除瘟病一方除夜取椒廿粒行之

又方 元日飲蒼朮湯並用湯沐浴及焚燒可避終歲疫逐蠅祛疫法

憶昔年入夏瘟疫大行有紅頭青蠅千百爲羣凡入人家必有患瘟疫而亡者後傳一法用鐵盆不拘大小納白凡四兩用滾水傾入盆內令滿將凡化開次以口含

火酒連噴三口於盆內又取桃核一枚割兩頭令通去仁用紙包鎗共少許塞桃核空殼內用紅線繩一根穿入核內將紅線爲絃取桃枝縛作一弓安於鐵盆中凡水內弓背在下弓絃向上再用桃木作箭三枝插於盆外青蠅自當遠避舉家卽免瘟病其益隨便安於宅之僻處經歲莫動相傳極效松峯記

避瘟方 新布盛大豆納井中一宿取出每服七粒
避疫椒柏酒 除日用椒三七粒東向側柏七枝浸酒一瓶元日飲之

通治疫癘方 常以東行桃枝煎湯浴之未病已

避瘟方 以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右

預防熱病兼治急黃 賊風葛粉二升 生地一升 破半食後米飲服三錢

日三服已病則日五服

避瘟不染 稜米爲末頓服之

又方 三月三日取黍麴和菜作羹食

預解瘡疹

苦根煎汁入少酒服時行疹子正發時服此則可無患

李子建殺鬼元

辟瘟疫殺一切鱉魅魍魎 葵蘆三兩 虎頭骨半錢 雄黃兒白各五錢

天雄皂莢蕪荑各五錢 共爲末揉入艾絨中用壯紙二層

捲作箇。遇瘟疫時點著薰病人房中。

七物虎頭元辟瘟殺鬼虎頭硃砂、雄黃各半兩鬼臼皂莢蕪荑雄黃兩各一爲末。鎔蠟丸。彈子大紅絹袋盛一丸繫男左女

右臂上。又懸屋四角。晦望夜半各當戶燒一丸。晨起各

人吞小豆大一丸。則不傳染。

太乙流金散大辟瘟雄黃兩半羚羊角兩雌黃白礬兔箭羽各七錢半共粗末。三角絳囊盛一兩。帶心前并掛戶上。又青布包少許中庭燒之。

臘月鼠燒之辟瘟氣又于正旦所居處埋之辟瘟氣

除瘟方

松峯審定五瘟丹

一名涼水金丹。一名代天宣化丹。

專治時症瘟疫發熱

頭身腹痛。譫語無汗。日久不愈。或發黃班疹。與痧或二便五六日不行等症。並暑月一切熱症。又解痘疹毒。

甘草製甲己年爲君

黃芩乙庚年爲君

黃柏丙辛年爲君

梔子丁壬年爲君

黃連戊癸年爲君

香附去淨細毛

蘇葉鳳頭者

蒼朮

米泔浸

陳皮以上四味爲臣。明雄另研細。

硃砂另研細。

製甘草法

立冬取

大青竹杆一頭截去節。一頭留節納生甘草末于內。蠟封緊口。浸糞坑中。頭冬至取出晒乾。聽用。

前甘草等五味當以某年爲君者。多臣數之半。如甘草

等用二兩則香附等四味止用一兩也雄硃又減臣數之半止用五錢矣於冬至日將甘草等九味共爲末雄硃另研以一半入甘草等藥末中爲丸留一半爲衣再用飛金爲衣大人服者丸如梧子小兒服者丸如黍米雪水生蜜爲丸面東服五十丸病輕日淺者一服而愈病深日久者三四服而痊忌腥辛辣油膩煎炒一切厚味其分兩如君用一兩臣則五錢多寡不論總臣減君一半雄硃又減臣一半也

松峯曰此方見萬氏家傳瘟疫門中與馬氏瘟疫發

源書內所載互有異同萬氏有蒼陳而馬則無之萬氏香附製炒而馬氏言俱不見火萬氏用雪爲丸而馬氏用大黃膏子萬氏不帖金而馬氏則帖金萬氏服用滾白水而馬氏則用涼水萬氏甘草法製而馬氏不法製其餘俱各相同愚意甘草製之則成人中萬大能祛疫蒼木香附吾用其生者蓋炒之則未免有火氣飛金重帖亦妙以其鎮靜也至於用大黃膏爲丸於初感瘟疫邪尚在經者大不相宜當仍以雪水爲丸如恐不粘酌加生蜜則易丸初感瘟疫者用

滾白水送大熱時。令水送不大便時方用大黃水送
取二方而斟酌盡善此爲近之。

柴胡白虎煎 治陽明溫熱表邪不解等症

柴胡 黃芩 麥冬各二錢 石羔三錢 甘草七分

引用竹葉

柴葛煎 治瘟毒表裡俱熟能散毒養陰並治痘疹

柴胡 乾葛 黃芩 連翹去隔白芍 酒炒

甘草 水煎服

歸柴飲 治營虛不能作汗及真陰不足外感寒邪難解

者此神方也 大便多溏者以冬米代當歸亦佳

當歸一兩 柴胡五錢 炙草八分

流水煎或加薑三五片或加陳皮一錢或加參

人馬平安散 治一切時症風寒暑濕內傷生冷飲食頭

風頭痛心痛絞腸沙門氣小腹疝氣牙痛猪羊瘋症用

簪脚點兩眼角或吹鼻孔男左女右

焰硝二錢 硫砂 明雄各一錢 冰片五分 蘆香一錢

共爲細末端陽午時修合磁瓶收貯勿出氣

神仙祛痘方 服後已病者卽痊未病者不染

撫芎八錢五分 蒼朮三分三厘半 滅炒甘草一錢六分六厘 乾葛一錢三分六厘

生姜三片 葱三株 連根水二碗 煎八分 空心服病急者

卽當急服勿拘空心之說 撫芎用一錢亦效已試

葛根淡豉湯 治四時感冒

葛根五錢 淡豉三錢 煎服入姜汁少許

人中黃丸一味不拘多少飯爲丸綠豆大下十五丸

炒麸慰法

熱邪傳裡服藥後將鹽炒麸一升絹包於病人腹上熨之藥氣得熱則行大便易通

松毛酒 可避五年瘟

松毛細切末 酒下二錢日三服

姜糖引 治瘟疫兼治傷寒

白糖一兩 生姜五錢 摘爛 滾水和服不應再服

頭痛如破

連鬚葱半斤 生姜二兩 水煮溫服

姜熨法 治胸膈不寬一切寒結熱結水結痰結痞氣結

生姜搗如泥將汁濱出存用取渣炒熟絹包探熨心胸脇下渣冷入汁炒再熨

仙傳吐法 治一切瘟疫傷寒傷風傷酒傷食病初得用之更宜
飲百沸湯半碗以手採肚再飲再採直至腹無所容用
~~細~~翎採吐後煎葱醋湯飲之覆衣取汗甚捷

諸葛行軍散

菜豆粉一兩
麻黃末八錢

共研爛和勻每服一錢用無根水調服汗出即愈

靈寶避瘟丹

蒼朮一斤
降香四兩
雄黃二兩
硫黃一兩
硝石一兩

柏葉半斤
丹參二兩
桂皮二兩
藿香二兩
白芷四兩

桃頭四兩五月五日午時收
雄狐糞二兩尖頭者是
菖蒲根四兩升麻一兩
商陸根二兩大黃二兩羌活二兩獨活二兩雌黃一兩

唵叭香如無可減
赤小豆二兩
仙茅二兩
硃砂二兩
鬼箭羽二兩

以上共二十四味按二十四味爲末米糊爲丸如彈子
大棗一丸

松峯按桃頭不知何物豈桃樹尖耶唵叭香出唵叭
國色黑有紅潤者佳以軟靜色明者爲上燒之能避

邪魅

逐瘟方

地黃八兩巨勝子一升研再同牛膝四兩五加皮四兩

地骨皮四兩官桂

防風各二兩

仙靈皮三兩

用牛乳五兩同甘草湯浸三日以半升同乳拌仙靈皮放磁瓶內飯鍋中蒸之待牛乳盡出出字存疑方以溫水淘

切同前藥判細袋裝浸于二斗酒中數日藥味全下後

去渣十月朔飲至冬至

一方 雪水能解瘟疫當收貯
功用單飲煎藥俱可

一方 腫月取皂角燒爲末收貯遇時疫早起井華水調

服一錢或加姜汁蜜少許井華水清晨

第一次汲者

乾艾煎 治瘟疫頭痛壯 盛

乾艾葉三升 水一斗煮一升頓服取汗

松峯按水酒以升斗計不行於今久矣況艾葉采用

時艾葉計以錢水計以盃可耳

椿皮煎 治瘟疫頭痛壯熱初得二三日者

生椿皮一升切 水二升半煎每服八合

松峯云椿係香椿今之臭椿乃樗耳

蒿柳汁 治瘟疫傷寒不論日之多少

黃蒿心七个柳條心七个

入碗內搗爛或少加水亦可濾去渣用雞子一个飛金三貼和汁攬匀令病人一口吸盡隨卽炒鹽半碗研細羅下用手蘸鹽將病人胸腹並前後心遍擦再速用黃蒿柳條熬滾水將病人周身溫之照方如是者三次立時發汗而痊

呂祖塞鼻丹

歌曰沉香木香皆共乳香硼砂皂角共良薑細辛當歸各等分巴豆川椒及麝香又加硃砂雄黃等血竭硝砂熟棗穢搗爛每粒丸成桐子大呼吸補鴻便離床口含令

水面朝上仰不問輕重一炷香祖師留下靈丹藥諸病聞之自安康用此藥治瘟疫亦可故選入治瘟疫應去巴豆

人馬平安行軍散

明雄 硫砂 火硝 枯礬 乳香去油

兒茶

冰片

麝香

硼砂

沒藥去油

各等分共爲細末點大眼角男左女右冰麝少加亦可一點絞脣沙 二點氣腰痛 三點董傷風

四點魚蝄傷

五點火眼發

六點走風痛

七點急心痛

八點急頭痛

九點火牙痛

十點牛馬驢

神柏散 治瘟疫

用廟社中西南柏樹東南枝疑用嫩枝
帶葉者晒乾研末新汲

水下二錢日三次

六合定中丸

蘇葉炒二兩

宣木瓜二兩

微炒真藿香二兩

帶梗子丁香一兩

所用

白檀一兩

香薷一兩晒不見火

木香一兩見火

甘草一兩

微炒

共爲細末滴水爲丸如椒大每服二錢

一治胸膈飽悶用生姜二片煎水服

一嘔吐用滾水半盞對姜汁少許服

一霍亂用生姜二片煎水加炒鹽五分服

一不服水土煨姜三片煎水服

一絞腸沙炒鹽水煎服

一泄瀉生姜煎水服

藕蜜漿 治時氣瘟症

生藕搗取汁一盞入蜜一合和勻分作兩服

生姜益元煎

益元散

三錢生姜

三錢黃酒水各半盞煎三

滾溫服卽愈除瘟解毒

松峯云方書煎藥每言一滾者蓋言前滾取下落瘀
再煎再落如是者三

天行病心悶 用水中苔搗汁服

治瘧方

用紅糖入罐內封固蠟塞口彌月浸甕炕中二月取出

遇瘧疫用水調服

患疫忌葷一日

牛桑飲 治餘熱不退煩渴四肢無力不能飲食

牛旁根生搗汁約五六合空腹分二服服訖取桑葉一大

把炙黃水一升煮五六合服緩覆取汗無葉用枝

白藥散 治瘧疫

白藥子

出江西葉似烏臼子如桑葉

未空腹水頓服卽仰卧一食時候

心頭悶亂或惡心腹內如車鳴刺痛良久或吐利數次

皆勿怪服令粥一碗止之

神麃此方治瘧疫初起自直隸傳來試之亦不甚效意前或瘧疫由食積而發者服之始效耶

神麴五錢炒 青皮一錢 葛根一錢 枳實錢 紅麴五錢 元荽根七條鮮者更妙

括萎湯

大括萎一个取瓤剉置碗中熱湯一碗沃之蓋良久去渣不拘時服治熱病頭疼發熱

一方 船底苔療天行時疫伏熱溫毒

治瘟疫秘方

麥冬三錢去心 燈心三十 芫荽梗三十 杳三枝傍竹葉三十片

流水煎熱服

治瘟疫並大頭方

大力子防風各等分 共爲末每用五錢黃酒一盃水一

大盅同煎空腹溫服蓋被出汗

六一泥飲 治瘟疫八九日已經汙下不退口渴咽乾欲

飲水者 六一泥即蚯蚓糞 不拘多少新汲水調服

鷄子拖法

治同上

用鷄子打一孔留黃將青傾在病者腹上用手在腹上圓轉攤搓久則漸成白沫用手抹棄再敲開一雞子依樣搓之止用四五枚腹內便覺清涼

觀音救苦散 專治傷風傷寒並疫氣所侵稍覺頭昏腦

悶項背拘急吹鼻取嚏毒氣隨散永不染着仙方也

川芎

藿香

黎蘆

各三錢

丹皮

去心元胡索

硃砂

各二錢

雄黃

白芷

牙皂

各四錢

七味草藥共爲細末硃砂另研調入收貯用時先噙水在口內次以藥吸人兩鼻孔吐水取嚏未病者吹之不染牛馬等受瘡者吹之亦效

治鬼魅魘人法

降香

未一錢

皂角

未一錢

硃砂

雄黃

各三分

麝香

三分

麝香

上同研

艾葉

五錢

將藥末揉入艾中草紙裹爲長筒點放床

底則不魘兼祛百怪惡邪之氣

太乙紫金錠

一名紫金丹
一名玉樞丹

瘟疫煩亂發狂喉閉喉風以及陰陽二毒傷寒心悶狂言胸膈滯塞邪毒未出俱薄荷湯下凡遇天行時疫沿街閭戶傳染者用桃根湯磨濃滴鼻孔再服少許任入病家不染兼治數十種雜症用引各殊俱載醫宗金鑑外科脾發痘門中茲不錄

雄黃

三錢取明紅大塊研

朱砂

三錢大而有神氣者研

麝香

三錢真者揀淨皮毛研

川五倍子

二兩

一名文蛤炮破去虫屎研

紅芽大戟

一兩五錢去蘆根洗淨焙乾爲末杭

金鑑外

門中

茲不錄

卷之五

諸方

三

州紫色者爲上江南土大戟次之
北方綿大戟色白性烈害人勿用千金子七
一兩白者去油一名子續隨上藥各擇精品於淨室中製畢候端午七夕重
陽或天月德天醫黃道上吉之辰合藥前三日齋戒至
期更衣洗手薰香設藥王牌位焚香拜禱畢將前藥逐
味稱集入大乳鉢內再研數百轉入細石臼內漸加糯
米濃汁調和軟硬得中用杵搗千餘下至極光潤爲度
每錠一錢修和時除使令之人餘皆忌見倣此藥唯在
潔誠方效病人每服一錠勢重者再服一錠以通利爲
度利後溫粥補之

逼治瘟病

初得頭痛脉大壯熱

小蒜汁少加水頓服再服卽瘥

嵐瘴

大蒜生熟各

七片共食少頃腹鳴或吐血泄瀉卽愈

治時氣

猪脂如彈丸溫水化服日三次

苦參酒

治瘟疫欲死并治熱毒氣欲死苦參兩黃酒一壺煮半壺飲盡當

吐則愈諸毒病服之覆取汗皆愈

此方三見各有不同故并錄之

梓皮飲

生梓白皮

服切水煎

治時氣瘟病頭痛壯熱初得

一二日者瘧病復感寒邪變爲胃嘔治同

蘘荷汁

治傷寒瘟病初得頭痛壯熱脈盛者

蘘荷連根葉搗絞汁服

治瘟疫 虎耳草搗酒服治瘟疫

時行風熱 蒸菜音甜一名薯蕷搗汁飲之

梨甘飲 通治瘟疫 梨樹皮 大粉草各一

兩 黃秫谷一

爲末 百草霜錢共爲細末每服三錢白湯日二服

時氣頭痛煩熱 皂角燒研入姜汁蜜各少許水和二錢

服之先以熱水沐浴後服藥取汗即愈

時疾煩悶瀉痢大渴孕婦心熱等症 蘆根一

兩煎濃湯服

天行熱疾煩渴發狂及服金石心熱發渴 并煮荸薺服

瘟毒大熱 牡蠣乾糞水漬取清飲

