

Verzeichniß von 1833

über ganz gefüllte Georginen, Kartoffel-Sorten und perennirende Landpflanzen,
welche um beigesetzte Preise zu haben sind

bei Christian Deegen zu Köstritz bei Gera.

Die Zahlung geschieht in preuß. Courant.

	Fußhöhe	gr	Fußhöhe	gr
A. <i>Georgina variabilis</i> fl. plenissimo, dichtgef. füllteste Pracht-Georginen in allen neuen Formen und Färbungen, als:			48	carmineo-hermesina fulgida, lilaceo-holosericea, prächtig carmineosinrothe, mit lilla Samtschein
1 <i>alba crispa</i> , krausblättrige weiße	6	8	49	coccin. splend., glänz. scharlachr. (Cact. spec. ähnl.) T.
2 <i>sulphureo-flavesc.</i> grandifl., große schwefelgelbe, äußerlich nanquinfarbige T.	5	6	50	cupreo-violacea int. viresc., violettkupferf. in grünlich. T.
3 <i>flavescens</i> , lebhaft nanquinfarbige	6	6	51	carnea sord. chermesino-picta, trübhaufarbige, mit kupfrigen carmossin überstrichen T.
4 <i>aurea sordida</i> micans, trübgoldgelb-schimmernde T.	5	12	52	lilacea, purp. venosa glob., kugelrunde, lillasfarbige, mit purpurfarbigen Ädern T.
5 <i>vitellino-erubescens</i> . röthlich-dottergelbe	6	8	53	alba nymphaeformis, Seerosengestalt, weiße
6 <i>aurea</i> , coccineo-veriegata, goldfarb. scharlach überzogen	4	12	54	sulphurea nitens, leuchtend schwefelgelbe
7 <i>carmineo-lutescens</i> amabilis, liebliche, gelb-carmir. T.	5	16	55	alba paradoxa, sonderbar gebaute, weiße
8 <i>aurorans</i> triflora, dreiblumige aurorafarbige	4	8	56	camelina, lilacino-varieg., chamois. m. lilla a. d. Spiz.
9 <i>atropunicea</i> sordida frondosa, überlaubte trüb-dklblutrothe	5	6	57	coccinea formosa, prächtige scharlachrothe
10 <i>violacea</i> pall. humilis, niedrige halbviolette	4	6	58	carminea saturata, tief carminrothe
11 <i>lilacino-albida</i> suave caerulesc., weißlich-lilaf. mit bläul. Schein	5	8	59	caerulea, purp. picta, lichtblaue, m. Purp. überzeichn. T.
12 <i>rosea spectabilis</i> , ansehnliche rosafarbige	6	8	60	albida-canescens, striata, weißlichgrau mit Streifen
13 <i>lilacina hyalina</i> , lillasfarbige, blaulich-durchscheinend	5	6	61	rosea amoena, angenehme rosenfarbige, mit kleinen weißstreifigen Blättchen T.
14 <i>citrina</i> pall. lucida, leuchtend hellzitrongelbe	6	8	62	asterisimilis lilacina subt. arg., Asterähnliche, lillasfarbige, unten silberweiß T.
15 <i>coccin. holoseric.</i> micans, schimm. scharlachf. m. Sammt	5	12	63	roseo-diluta-sanguinea et flava striata, nelkengestaltige, dreifarbige, blutroth und gelbstreif. mit rosa verwachsen. T.
16 <i>lilacino-caerulescens</i> , hohe blaullasfarbige	7	8	64	atrovioletacea, purp. venosa, dunkelveilchenblaue, mit dun-felpurpurfarbigen Ädern T.
17 <i>violacea saturata</i> , tief dunkelviolette	5	8	65	atrocarmesina crispa, krausblättrige carmosinrothe T.
18 <i>purpureo-violacea</i> formosa, schöne dunkelviolett-purpurfarb.	5	8	66	cinnamomeo-erubesc. grandifl., große röthl. zimmtf. T.
19 <i>Xerampelina</i> , Herbstrothe	5	6	67	xerampelina fusc. pleniss., dichtgef. bräunl. Xerampelin.
20 <i>amethystea</i> pall. stellata, sternförmige hellamethystblaue	5	12	68	sulphureo-canescens, graulich schwefelgelbe
21 <i>coccinea praenitens</i> , feurigeponceaufarbige	5	12	69	isabellino-lutescens, gelbliche isabellfarbige
22 <i>coccinea</i> , suave livido-canesc., scharlachfarbige, über der Hälfte des Blattes kreisrund in mattgelbgrau übergehend	5	24	70	rosea superba, große, prächtig rosafarbige
23 <i>albida</i> , roseo-hyalina, weißliche, hellrosa durchscheinend	3	8	71	rubescens-luteo-striata max., größte, röthlich gelbstreifige
24 <i>lilacino-rosea</i> , purp. flammea, vielblumige, lillasfarbige, mit Purpur überflammt. T.	4	16	72	cherimesina canescens, große, carmosinr. m. grau getrübt
25 <i>atrococcineo-purp.</i> holosericea, frühblühende, dunkelscharlach-purpurfarbige mit tiefem Sammt T.	4	12	73	camelino-canescens, rubro-varieg., grau-chamoisfarbige, mit kreisrunden rothen Anhauch T.
26 <i>lilacino-albida</i> caeruleo-varieg., g. baßliff. m. bl. Spz.	5	16	74	atrosanguinea, purp. holosericea, große schwarzbilutrothe mit purpurnen Sammt
27 <i>aurea</i> , lateritia picta floribunda, blumenreiche goldfarbige, mit ziegelrothen Zeichnungen von Spizien herein T.	4	36	75	carnea pallens caryophyll., nelkengestaltige, blähhautfarb.
28 <i>aurantiaca-miniata</i> major, große, orangemennigrothe T.	4	8	76	rosea suavis rosaform., rosähnln. prächtig rosafarb. T.
29 <i>aurea</i> , erubesc. striata sphaer., knopff. golds. m. roth gest.	5	8	77	aureo, rubro-picta grandifl., große goldsb. m. roth gez.
30 <i>lilac. incan.</i> , purp. lin., purpurlin. a. grauliff. Gr. T.	5	20	78	purpureo-caerulea plenissima, dichtgef. dreiblum. purpurbl.
31 <i>carnea saturata</i> , gesättigt hautfarbige	6	6	79	miniata pall. obsoleta, matt hellmennigrothe
32 <i>alba laciniata</i> , schizoblättrige weiße	5	6	80	lucida-canescens int. flavesc., graubleifarbe. innen gelb
33 <i>chermesina vera</i> , rein carmosinrothe T.	5	6	81	cuprea saturata grandifl., große dunkelkupferrothe
34 <i>cinnamomea fistulosa</i> , röhrlige zimmetbraune	5	6	82	violacea purp. amoena, schöne violettpurpurfarbige
35 <i>violacea pallida</i> multiflora, vielblühende hellveilchenblaue	4	6	83	purpurea Reginae, königliche purpurfarbige
36 <i>atrosanguinea</i> , nigro-holoseric., dunkelblutrothe, mit schwarzblauem Sammt überzogen T.	4	8	84	crocea saturata, tief safrangelbe
37 <i>lilacina</i> int. purp. tenella, sanfte lillasfarbige, nach innen dunkelroth werdend T.	5	12	85	haematitica helianth, große, Sonnenros. ähnl. röthl. T.
38 <i>aurea-fulgescens</i> , goldfarb. mit feuerrothen Anhauch	5	6	86	atropunicea multifl., vielblum. schwärzlich blutigrothe T.
39 <i>aurantiaca saturata</i> canaliculat., rinnenblättr. dklorangef.	7	8	87	croceo-miniata caule-nigro, dkstengel. safranmennigrothe
40 <i>albida</i> , roseo-diluta lineata, weißliche, blaßrosa überwachsen, mit glasartigen feinen Linien	5	36	88	flavescens, carmineo-varieg., gelbl. m. carm. bunt schat.
41 <i>badio-erubescens</i> max., größte gelbbraunröthliche	6	6	89	ferrugineo-erubescens, papaveracea, ranunkelmohnähnliche, röthlich-rosafarbige T.
42 <i>caeruleo-holosericea</i> altiss., höchste Sammtblaue	9	6	90	rosea suave violacea subt. cerina, rosa, mit violett überzogen, unten wachsgelb T.
43 <i>pulcherrima tricolor</i> , schöne dreifarbige	6	6	91	caerulea-rosea rosaform., rosähnliche, lillarosafarbige
44 <i>aurantiaca speciosa</i> , große, prächtig orangefarbige	6	12	92	coccineo-fuscata corrusc., blendend bräunl. scharlachf. T.
45 <i>carmineo-haematitica</i> maj., große, röthelearminrothe	5	8	93	sulphurea pall., blaßschwefelgelbe T.
46 <i>camelino-flavesc.</i> suave ros., gelbl. chamois. m. rosa Schein	4	12	94	asterisimilis lacteo-lilacina, asterähnliche weißl. lillasfarbige
47 <i>cupreо-fuscata</i> , kupferrothbraune	5	6		

	Fußhöhe.	gr	Fußhöhe.	gr
95 <i>fusco-cinerea</i> int. lut., fahlrothgraue, innen gelb	6	10	159 <i>aurea-canescens</i> , bleichgoldfarbige in grau gezogen	5 10
96 <i>amaranthacea</i> altiss., hohe amaranthfarbige	7	8	160 <i>alba-caerulescens</i> , sanftweisse mit blaulichen Spiz'en T.	5 24
97 <i>roseo-caerulesc.</i> multifl., vielbl. rosafarb., in blau spielend	5	8	161 <i>ochracea</i> , rubra sordida, ackergelbe mit trübr. verw. T.	4 8
98 <i>carmineo-chermesina</i> lucida, leuchtend carmincarmosinr.	6	12	162 <i>aurea floribunda</i> , überausreichlichblühende hochgelbe T.	4 12
99 <i>aurea suave coccinea</i> multifl., vielbl. goldf. mit Scharlach kaum bemerkbar überzogen	5	12	163 <i>rosea argentea</i> , rosa mit Silberglanz	5 12
100 <i>candida</i> , rein weisse	5	6	164 <i>coccinea excellens</i> , hervorglänzende scharlachrote	7 10
101 <i>coccinea spectab.</i> , ansehnliche scharlachrote T.	4	12	165 <i>rosea albicans</i> , rosaform., rosenähnl. blaßrosafarbige T.	4 18
102 <i>tropaeolo-similis.</i> , <i>Tropaeolum</i> gelbrothe	5	6	166 <i>violacea</i> , lilacino-varieg., große violett-lillabunte	6 12
103 <i>coccinea</i> , atrobadio-holoser. große scharlachrote, mit schwarzbraunem Sammt überzogen	5	12	167 <i>persicino-rubic.</i> grandifl. große röthlich-hellpflanzblüthfs.	6 6
104 <i>aurea, fusco-varieg multifl., vielbl. goldf. m. graur. schat. T.</i>	4	8	168 <i>albo-lilic.</i> marg., weißlichlilla, m. dkln. Adern u. Saum	6 10
105 <i>coccineo-sanguinea</i> corrusc., blendend scharlachblutr. T.	5	10	169 <i>lutea sordida</i> erubescens, trübgelbe, röthlich angelaufen	6 8
106 <i>cerino-fulvescens</i> , wachsgelbbraunliche	5	8	170 <i>lilacino-caeruleus</i> , holoser., vielbl. lillablau mit Sammt T.	5 8
107 <i>coccinea saturata</i> ranuncul., ranunkelähnl. dklscharlachf.	5	8	171 <i>purpurea</i> , albo-varieg., weißliche mit Purpur überwasch.	5 8
108 <i>haematitica</i> sanguin.-grandifl. große dunkelröthelblutr. T.	5	12	172 <i>chermesina splendens</i> min., kleinste, leucht. carmosinr.	5 10
109 <i>sanguinea holosericea</i> , sammtige blutrothe	6	8	173 <i>sulphurea</i> , cerina multifl., vielbl., schwefelg., roth sch. T.	4 8
110 <i>pallida rosea</i> , albido-striata, verschämte sanftblaßrosenfarbige mit weißen Streifen T.	5	12	174 <i>luteo-lateritia</i> , ziegelrothe ins gelbe ziehend	5 3
111 <i>lateritia</i> int. flavescens, ziegelrothe mit gelb, innen heraus verwaschen T.	5	8	175 <i>lilacina albicans</i> , weißliche mit lilla umschlossen T.	5 12
112 <i>persicina saturata</i> rubro-margin., tiefpflanzblüthfarbige mit dunklem Einfass	6	12	176 <i>atropurp.</i> caerulesc., dunkelpurpur. innen blau schimm.	5 8
113 <i>purpureo-amaranthacea</i> , purpuramaranthfarbige	5	8	177 <i>ochrac.</i> satur. mult., vielblum. zarte dunkelockersarb. T.	4 16
114 <i>chermesina pall.</i> lilacino-distincte venosa, blaßcarmosinfarbige mit lilla scharfgeaderd	4	12	178 <i>lutea</i> , rubro-variegata, gelb und rothbunte	5 8
115 <i>carmin.</i> alb., semimarg., weißl. mit carmin umschlossen	5	18	179 <i>albida</i> , <i>rosea pallida</i> semi-marg., kleine weißliche, mit blaßrosa an Seiten und Spiz'en T.	5 1
116 <i>lilacea</i> int. albo canesc., lilla farbige, innen weißgrau	6	6	180 <i>violacea</i> int. alba, violette, nach innen weißlich	5 5
117 <i>flavo-fusca</i> globularis. rundblum., gelblich-bräunliche	5	12	181 <i>amaranth.</i> holos. florib., reichbl. sammt. dklamarhfs. T.	4 6
118 <i>camelino-lutescens</i> , gelblich-chamoisfarbige	6	8	182 <i>camelina flexuosa</i> , chamoisfarbige mit gebogenen Blättern	5 16
119 <i>punicea pumila</i> niedrige blutigrothe T.	3	8	183 <i>aurea saturata</i> nitida, leuchtend tiefgoldfarbige	5 6
120 <i>sanguin.</i> , fusco-holoseric., blutr. m. braun. Sammt T.	5	16	184 <i>violacea pall.</i> albo-striata, blaßviol. mit weißen Herzstr.	5 8
121 <i>lateritio-flava</i> multifl. vielblumige gelbziegelrothe T.	5	8	185 <i>cerina</i> , <i>cinnabarina</i> , wachsgelbe, nach innen zinnoberrot	5 8
122 <i>chermes. amaranth.</i> semifist. diethens. dklamrthearmosinr.	7	8	186 <i>atrocarmesina</i> , fuscato-nigro-late marg., dunkelcarmosinrothe mit schwarzbraunem breiten Einfass	5 16
123 <i>rosea tenella</i> , zart hellrosenfarbige	7	8	187 <i>violaceo-rosacea</i> , violettrosafarbige	5 8
124 <i>atrovioletacea</i> perfecta, vollendete veilchenblaue	5	16	188 <i>badia</i> int. aurea, fastanierbraune, innen hochgelbe	5 8
125 <i>purpureo-carminea</i> subt. viol., prächtige purpurcarmisrothe, unten violett T.	4	16	189 <i>atrocarm.</i> viol. spl. sanftglänz. dunkelviolette carminr. T.	4 16
126 <i>phoenicea</i> int. aurea, schimmernd feuerrothe	5	6	190 <i>atrosanguinea vera</i> , rein-dunkelblutrothe	5 8
127 <i>rosea</i> , <i>lilacina latemarg.</i> , rosaf. m. breit. lilla Einfassung	6	16	191 <i>flavo-erubescens</i> , bunte dunkelgelbe mit roth überzogen	5 12
128 <i>carminea crispa sphaerica</i> , krauze, carminrothe mit grünem Knopfe	7	6	192 <i>atrococcineo-brunea</i> , holosericea canescens, sonnenrosenähnl., bräunl., scharlachrothe mit grauem Sammt T.	5 16
129 <i>cereo-badio-rubra</i> erecta, gelbbräunrothe T.	4	6	193 <i>lilacino-canescens</i> purpureo-flammea, schönblaue, grau-lilla farbige, mit Purpurlammen und Streifen	6 20
130 <i>violac.</i> , chermes. latenarg. violette m. carmosin eingef.	6	16	194 <i>isabellina pallida</i> grandiflora, große hellisabellfarbige	6 8
131 <i>coccinea sordida</i> , trübcharlachrothe	6	8	195 <i>rufa</i> subt. gilva sphaer., knopff. fahr. trübgelb durchsch.	5 8
132 <i>atropunicea sordida</i> trübblutigrothe	5	6	196 <i>rubra sord.</i> subt. gilva mult., vielbl. schmzgr. unt. trübgelb	6 6
133 <i>fulva grandiflora</i> , große gelbbräune	5	6	197 <i>cinnabar.</i> canesc. multifl., vielbl. zinnober. in grau zieh.	4 8
134 <i>atroamaranth.</i> int. nigrescens max. größte dunkelamaranthfarbige, innen heraus schwarz T.	6	12	198 <i>coccineo-sanguinea</i> splendens subt. violacea, glänzend scharlachblutrothe, unten violett	6 18
135 <i>luteo-fusca</i> tenella, zarte gelbbräunliche T.	5	10	199 <i>nigro caerulea</i> , holosericea rhomboid., eckigebaute schwarzblaue mit Sammt	6 16
136 <i>nivea amoena</i> , sanft schneeweise	7	8	200 <i>atroamaranthea</i> , chermesina semifist., diethensförmiger dunkelamaranth-carmosinfarbige in halber Kugelform	7 18
137 <i>citrina</i> , <i>croeo cineta</i> , zitrongelbe m. safran. Umkreis	6	12	201 <i>aurantiaca</i> -canescens maxima, größte und vollendete orangefarbige, mit grauem Schein T.	5 24
138 <i>ochraceo-lutescens</i> , florib., reichblühende gelbckerfarbige	4	10	202 <i>amaranthea</i> , <i>carminea holosericea</i> subt. argentea, ausgezeichnete amaranth-carmisfarbige, mit kleinen weißstreifigen Blättchen, unten filber weiß T.	5 36
139 <i>luteo-minifata</i> monstr., monstr. gelbe m. mennigr. schatt.	7	6	203 <i>atropurp.</i> nigro-holos.; dunkelpurpur. m. schw. Sammt	5 12
140 <i>atroceraulea</i> rosaform., rosenähnliche schwarzblaue	5	6	204 <i>aurea</i> , rubro-striata, goldf. m. roth gesamt u. gestreift	4 8
141 <i>atropurpleo-caerulea</i> , dunkelpurpurblaue	5	6	205 <i>aurea</i> , rubra striata, goldf. m. roth gestreift u. gesamt	5 10
142 <i>cerina</i> , rubro-varieg., bunte, wachsgelbe mit roth schatt.	5	12	206 <i>caerulea-rosea</i> pall., blaulich-hellrosafarbige T.	5 5
143 <i>aurea</i> , miniat flammæ speciosa, prachtvolle goldfarbige, mennigroth gesamt und fein gesäumt T.	5	24	207 <i>albida suave</i> <i>roseo-diluto amoena</i> , sanftweisse, überzogen m. rosa, welches nach den Spiz'en zu lichter wird T.	5 24
144 <i>carminea praenitens</i> , fösliche feurig-carminrothe T.	5	16	208 <i>coccineo-phoenicea</i> , hochscharlachfeuerfarbige mit kleinen weißlichen Blättchen	7 16
145 <i>aurorans pellucida</i> , schimmernd aurorafarbige	5	8	209 <i>lilaceo-caerulescens</i> , zarte lilla farbige	5 10
146 <i>coccineo crocea praecox</i> , frühblüh. safranscharlachfarbige	6	8	210 <i>coccin.</i> chermes. <i>praecox</i> , frühbl. scharl. carmosinr. T.	5 8
147 <i>atrovioletacea</i> multiflora, vielblumige dunkelviolette	5	6	211 <i>chermesino-amaranthacea</i> , farmosin-amaranthfarbige	5 5
148 <i>flavo-miniata crispa</i> -frausblättrige gelbmennigrothe	5	6	212 <i>purpureo-sanguinea</i> subt. violacea, vielblumige dunkelpurpur-blutrothe, unten violett	5 10
149 <i>aurea</i> , rubro-varieg. florib., reichlichblühende hochgelbe m. lebhaften roth gesamt T.	5	24	213 <i>coccinea spec.</i> , große, prachtvolle, rein scharlachrothe T.	6 24
150 <i>lilaceo-caerulesc.</i> subt. canesc., helllilla farbige unt. grau	6	12	214 <i>cocc.-sang.</i> holos. undul. wellenbl. glänz. fröhlichbltr. T.	5 18
151 <i>atrovioletacea</i> , canescens holosericea, dunkelveilchenblaue mit sanftgrauem Sammt überzogen T.	5	8	215 <i>atrococcinea</i> purpurascens. schwarz-scharlachfarbige mit Purpur durchdrungen	5 12
152 <i>rubro-fusca</i> multiflora, vielblumige bräunlich-rothe	5	8	216 <i>cerina</i> , miniat late marg., wachsgelbe mit breiten menigrothem Rande	4 6
153 <i>rosea</i> , caeruleo hyalina, sanft rosaf., hellblau durchsch. T.	5	12	217 <i>coccineo-haematis</i> , scharlachrothe mit röthelroth geträubt	5 8
154 <i>pall.</i> viol. int. lact., niedr. blaßviol. inn. hera. weißl. T.	4	6	218 <i>atrocaerulescens altissima</i> , höchste schwarzblaue, mit kleinen weißstreifigen Blättchen	7 10
155 <i>lateritio-fulgescens</i> , gelblich-feuerfarbige	5	8	219 <i>croeo-miniata</i> , tief safran-mennigrothe	5 8
156 <i>purpurea nitida</i> subt. pall., leucht. purpur. unt. heller	5	8		
157 <i>rubro-livida</i> semifist, diethens. rothe mit bleif. Spiz'en	5	12		
158 <i>atroamaranth.</i> chermesina triflora, dreiblumige, prächtige dunkelamaranth-carmosinrothe T.	6	12		

uscato-purpureo semifistulosa, diethensförmige, bräunlichpurpurfarbige, halbkugelgestaltige T.	5	Fußhöhe.	gr
roseo-violacea triflora, dreibl. violett-rosenfarbige T.	6		
citrina flavescentia gigantea, riesengroße, häufig blühende	5		
dunkelgelbe, innerlich zitronengelb T.	5		
atroceresea holosericea splendens, kirsch-schwarze mit glanzvollen Sammt T.	6		
haematinica grandiflora, große röthelrothe	6		
coccin. flavescentia florib., blumenreiche gelbl. scharlachsf. T.	4		
citrina grandiflora, große zitronengelbe	6		
violacea, lacteo-venosa, violette mit milchweissen Adern	5		
rubro-cana multiflora, vielblumige graurothe T.	5		
cocc.-sang. int. aurea, scharlachblutrothe, innen goldfarb.	7		
sulphurea pall. lucida, leuchtend gr. bläschwefelgelbe	6		
aurea satur. cinereo-varieg., dunkelgoldfarbige, äußerlich rosa-grau überzogen	5		
fusca-sanguinea holosericea fulgens, bräunl. blutrothe mit glänzenden Sammt	6		
aurea, carmineo-variegato, goldfarbige, von den Spizien herein lebhaft karmin T.	5		
cinnabarina splendens, glänzend zinnoberrothe	7		
sulph. pall. rubic., bläschwefelgelbe röthl. kreisr. angeh.	5		
alba vera, rein weise	7		
purpurea splendens nigro-cincta int. nigerrima, durchglänz. purpur, breit-schwarz umfaßt, innen gr. schwarz T.	6		
miniata sordida multifl., vielblumige trübrothe	5		
flavesc., rubro-varieg., dunkelgelbe mit roth überw. T.	3		
puniceo-chermesina, blutig-carmosin	3		
sulphurea albida speciosa, prachtvolle, bläschwefelgelbe, nach den Spizien in weiß übergehend T.	5		
violaceo purpurea, violett-purpurfarbige T.	5		
violac. mutab. veränderlich viol., nach außen verschieß. T.	3		
citrina splendens, samtigglänzend-zitronengelbe	6		
nigro-fusca, violacea perlucidans, Scabiosenähnliche, schwarzbraune in violett übergehend T.	4		
purp. violac. anemonifl., anemonenähn. violett-purp. T.	4		
luteo-carm. anemonifl., anemonenähn. gelbcarmin. T.	4		
atrococcinea tricuspidata anemoniflora, anemonenähnliche dunkelscharlachrothe mit dreispitzigen Blättern T.	4		
rosea spect. anemonifl., prächt. rosaf. in Anemonenform	6		
sanguinea anemonifl., anemonenähnliche blutrothe	4		

Um den Freunden dieser überaus schönen und prächtigen Gartenzierpflanze die Auswahl zu erleichtern und selbst den Unbemittelten die Erlangung schöner Sorten um einen äußerst billigen Preis zu ermöglichen, habe ich aus den hier oben angeführten, einzig nur

prachtsorten enthaltenen Sortiment, kleinere Parthieen mit niedrigen Preisen bestimmt. Es werden daher:
 12 Stück in eben so viel schönen, nach meiner Wahl ausgewählte unter den zwar schon bekannten, jedoch bewährtesten Sorten, mit den Preis von 6—12 Gr. für 2 Thlr. 8 Gr.
 12 Stück nach meiner Wahl ausgewählt, unter den Sorten von 8—18 Gr. für 3 Thlr. 12 Gr.
 50 Stck. dergl. für 15 Thlr. 100 Stck. dergl f. 32 Thlr. abgegeben.
 Bei der Auswahl wird stets darauf geschen, daß unter 12 St. die Hauptfarben, unter 50 und 100 Sorten dieselben mit allen ihren Abstufungen und buntfarbigen Arten erwählt werden.
 Eine Farbenstufenleiter in ganz reinen Farben, von der lichtesten anhebend und bis zur dunkelsten übergehend, in 25 vorzüglich Sorten für 9 Thlr.
 25 vorzügliche Sorten, blos buntfarbige für 12 Thlr.
 Zu größern Parthieen und Anlagen, biete ich mein ganzes in 600 gefüllten Sorten bestehendes Sortiment an, und erlaße davon unter Angabe der Farben

500 Stück in 2—300 Sorten für 55 Thlr.

1000 = 3—400 = 100 =

1000 = in Nommel = 60 =

Ich habe vorgezogen, die oben aufgeführten Georginen, streng nach ihren Farben, unter zu Grundlegung einer Farben-Ansicht und nach genauer Vergleichung der Blumen miteinander, zu benennen. Den Georginenfreunden hoffe ich es erleichtert zu haben, die ihnen fehlenden Farben besser herauszufinden; besonders wenn sie schon im Besitz einiger Georginen mit Hauptfarben aus meinem Sortimente sein sollten. Sie können um so zuverlässlicher darauf rechnen, keine Doubletten zu erhalten, als fast mein ganzes Sortiment durch künstliche Befruchtung und Kreuzung untereinander verwandter Farben, selbstgewonnene, seltene Originale enthalten, welche jeglichen Kenner interessiren dürften; besonders werden die in höhern Preis gestellten Georginen die Seltenheit der Formen und Färbung und zugleich den erreichten Höhepunkt der Cultur beurkunden.—

Ein großer Theil vorzüglicher Georginen eignet sich auch zu einer vorzüglichen Flor in großen Blumentöpfen. Alle hierzu passende sind mit T. bezeichnet. Und um die Georginen in Gruppen hintereinander sichtbar aufstellen zu können, habe ich auf einem freien Standorte die Fußhöhe derselben vermessen u. solche bei jeder Sorte mit Zahlen angegeben.

Die Versendung der Georginen-Knollen erfolgt gegen Ende März oder Anfang April, nachdem die Witterung hierzu günstig ist. Die Knollen werden so vorbereitet versendet, daß sie beim Empfang sofort an ihren Ort verpflanzt werden können.

B. Kartoffelf = Sortiment

der gebräuchlichsten und neuesten Sorten.

1. Feine mehlige, englische ganz frühe Kartoffel,
2. Winter,
3. holländische blaoblühende,
4. vorzüglich grüne mehlige Futter=
5. lange, ganz frühe,
6. englische Rostbeef=
7. frühe, neue englische Corp-Carly=
8. sehr frühe englische Mistbeet=
9. neu amerikanische,
10. lange eschenblättrige Nieren=
11. immerwährende, *)
12. englische Spargel=
13. wilde,
14. lange schwartzblaue,
15. Zwittrigefärbte,
16. neue mexikanische,
17. frühe, glatte, weiße,
18. schottländische,
19. beste Speise=
20. Preis von Hollands=
21. Zwiebel=
22. volltragende Gurken=
23. Preis von Westerwalds=
24. gelbe Patata=
25. frühe, hellrote, volltragende Pfälzer=
26. große Bieh=
27. ächte Lerchen-, ganz vorzüglich zum Ganzkochen,
28. rothblau marmorirte,
29. reichlichtragende weiße,
30. peruanische,
31. Bachholder=
32. kleine Nuss=
33. blaue Horn=
34. Nock=
35. frühe, volltragende, rothe,
36. Kastanien=
37. kleine, runde, blaue,
38. englische große,
39. lange, rothe Nieren=
40. weiße =
41. gelbe Zapfen=
42. Buisquit=
43. Zucker=
44. frühe gelbrothe,
45. rauchsaalige, rothe, vortreffliche Speise=
46. lange, volltragende, spätgute,
47. Mandel=
48. unter u. über der Erde am Stengel wachsende Kart.

Von jeder Sorte werden 2—4 Stück abgegeben. Die

Sorte einzeln kostet 2 gr., das ganze Sortiment 2 fl. 12 gr.
 *) Um diese Kartoffel das ganze Jahr hindurch frisch zu haben, wird im Frühjahr zeitig eine Aussaat, eine spätere um Johanni wird mit ihrem eigenen Laube oder Stroh gegen eindringenden Frost geschützt. Bevor die Keimkraft im Frühjahr erwacht, wird die Kartoffel der Erde entnommen, und im Keller im trocknen Sand verwahrt, wo sie alsdann bis Johanni schmackhaft bleibt.

C. Einige der schönblühendsten perennirenden Landpflanzen.

	1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.	
<i>Achillea alpina</i>	3		<i>Aquilegia sibirica</i>	3	<i>Chelone glabra</i>	6
— <i>Ageratum</i>	3		— <i>viscosa</i>	3	— <i>obliqua</i>	4
— <i>asplenifolia</i>	3		— <i>vulgaris</i>	2	— <i>fl. albo</i>	6
— <i>ciliata</i>	2		<i>Arabis collina</i>	2	<i>Chrysanthemum roseum</i>	6
— <i>distans</i>	2		<i>Armeria latifolia</i>	3	<i>Chrysocoma Lynosiris</i>	3
— <i>grandiflora</i>	2		— <i>plantaginaria</i>	3	<i>S. Cineraria cordifolia</i>	3
<i>Impatiens</i>	2		<i>Arnica doronicoides</i>	3	— <i>corymbosa</i>	3
<i>mongolica</i>	2		— <i>scorpioides</i>	3	— <i>glabrata</i>	3
<i>magna</i>	2		<i>Asphodelus lutens</i>	4	— <i>robusta</i>	3
<i>millefol. fl. rosea</i>	2		— <i>tauricus</i>	4	— <i>sibirica</i>	3
<i>paradoxa</i>	3		<i>Asclepias pulchella</i>	4	<i>Clematis angustifolia</i>	3
<i>peregrina</i>	2		— <i>sibirica</i>	2	— <i>campaniflora</i>	3
<i>ptarmica fl. pl.</i>	3		— <i>Siegmanni</i>	4	— <i>erecta</i>	3
<i>setacea</i>	2		<i>Aster alpinus altaicus</i>	4	— <i>integerrifolia</i>	3
<i>speciosa</i>	3		— <i>altaicus</i>	3	— <i>hispanica</i>	3
<i>tanacetifolia</i>	3		— <i>amellus</i>	3	— <i>viticella</i>	4
<i>S. tomentosa</i>	5		— <i>amygdalinus</i>	3	— <i>fl. pl.</i>	8
<i>S. Acanthus cardifolius</i>	4		— <i>cordifolius</i>	2	<i>S. Convallaria bracteata</i>	8
<i>Aconitum album</i>	3		— <i>elegans</i>	3	— <i>majalis</i>	1
— <i>barbatum</i>	3		— <i>ericoides</i>	3	— <i>multiflora</i>	3
<i>Cammarum</i>	3		— <i>grandiflorus</i>	6	<i>S. Coreopsis Atkinsoniana</i>	6
<i>leucanthemum</i>	3		— <i>macrophyllus</i>	2	— <i>auriculata</i>	3
<i>Napellus</i>	2		— <i>novae Belgii</i>	3	— <i>lanceolata</i>	3
— <i>bicolor</i>	3		— <i>paniculatus</i>	2	— <i>tenuifolia</i>	4
<i>neomontanum</i>	3		— <i>punctatus</i>	3	— <i>tripteris</i>	3
<i>nitidum</i>	6		— <i>salignis</i>	2	— <i>undulata</i>	3
<i>sibiricum</i>	3		— <i>spectabilis</i>	3	<i>Coronilla Emerus</i>	3
<i>variegatum</i>	3		— <i>galegiformis</i>	3	— <i>varia</i>	3
<i>volubile</i>	6		— <i>Laxmannii</i>	2	<i>Corydalis aurea</i>	3
<i>S. Adenophora denticulata</i>	3		<i>Astrantia heterophylla</i>	6	— <i>capnoides</i>	3
— <i>comunis</i>	3		— <i>major</i>	3	— <i>fungosa</i>	3
— <i>marsupiflora</i>	3		<i>Aubertia deltoidea</i>	2	<i>Cucubalus fimbriatus</i>	3
<i>Actaea racemosa</i>	6		<i>Bellis perennis, div. Coul.</i>	1	<i>S. Cynanchum fuscum</i>	4
— <i>spicata</i>	3		<i>Betonica grandiflora</i>	3	<i>Cynoglossum bicolor</i>	2
<i>Agrostemma coronaria</i>	2		— <i>incana</i>	3	— <i>pictum</i>	2
<i>S. — — fl. pl.</i>	8		— <i>orientalis</i>	3	— <i>omphaloides</i>	1
<i>Althaea narbonensis</i>	2		— <i>stricta</i>	3	— <i>virginicum</i>	2
— <i>rosea fl. pl. in 80</i>			<i>Boltonia glastifolia</i>	3	<i>Cypripedium Calceolus</i>	4
div. <i>Garben</i>	2		<i>Buphthalmum grandifl.</i>	4	<i>Delphinium amoenum</i>	3
das Dtz. 18 Gr.			— <i>cordifol.</i>	3	— <i>grandiflorum</i>	3
<i>Allium globosum</i>	4		— <i>helianth.</i>	3	— <i>dystiocarpum</i>	4
— <i>Moly</i>	2		<i>Cacalia Saracenica</i>	3	— <i>elegans fl. pl.</i>	6
— <i>narzissifolium</i>	6		<i>Galtha palustris</i>	3	— <i>hirsutum</i>	3
— <i>odorum</i>	3		<i>Campanula divergens</i>	3	<i>Stavisagria</i>	6
— <i>paniculatum</i>	3		— <i>farinosa</i>	3	<i>Dianthus atrorubens</i>	2
— <i>purpureum</i>	2		— <i>gracilis</i>	3	— <i>Carthusian fl.</i>	
— <i>roseum odoratum</i>	4		— <i>grandiflora</i>	4	pl. 2	
— <i>sphaerocephalum</i>	4		— <i>gummifera</i>	3	— <i>chinensis</i>	1
<i>S. Ammobium alatum</i>	6		— <i>lilifolia</i>	3	4 Gr. 1	
<i>Anchusa capensis</i>	4		— <i>marantha</i>	3	<i>deltoides</i>	1
— <i>italica</i>	2		— <i>Medium fl. pl.</i>	2	<i>glaucus</i>	1
— <i>variegata</i>	3		— <i>obliquefolia</i>	2	<i>japonicus</i>	6
<i>Anemone hepatica fl. ru-</i>			— <i>persicifolia pl.</i>	3	<i>odoratus fl. pl.</i>	6
<i>bro pl.</i>	3		— <i>fl. pl.</i>		<i>plumarius</i>	1
<i>Anthericum Liliago</i>	3		— <i>albo</i>	4	Dtz. 3 Gr. 1	
<i>Antirrhinum majus</i>	1		— <i>pulla</i>	3	— <i>max.</i>	
— 12 Stcf. in div.			— <i>pyramidalis</i>	4	fl. pl. 3	
— <i>Coul.</i>	4		— <i>fl. albo</i>	12	<i>pulchellus</i>	2
— <i>maj. bic. prächt.</i>	2		— <i>sibirica</i>	4	<i>versicolor</i>	2
— 12 Stcf. 12 Gr.			— <i>speciosa</i>	4	<i>caryophyllus</i>	
— <i>dalmaticum</i>	3		— <i>suaveolens</i>	4	Sämlinge von aus- gezeichneten Gar- tenecken 1 Dutzd.	
— <i>jamajense</i>	3		<i>Cassia marylandica</i>	4	6 Gr.	
— <i>mollis</i>	1		<i>Catananche caerulea</i>	3	Dictamus Fraxinella	4
— <i>montevidense</i>	2		<i>Centaurea atropurpurea</i>	2	<i>Digitalis alba</i>	
<i>Apocynum androsaem-</i>			— <i>austriaca</i>	2	— <i>Eriostachis</i>	
— <i>folium</i>	4		— <i>glastifolia</i>	4	<i>fuscescens</i>	
— <i>venetum</i>	4		— <i>macrophylla</i>	4	— <i>grandiflora</i>	
<i>Aquilegia alpina</i>	3		— <i>ochroleuca</i>	2	— <i>Ianata</i>	
— <i>canadensis</i>	4		— <i>orientalis</i>	3	— <i>lutea</i>	
— <i>grandiflora</i>	3		— <i>spathulacea</i>	2	— <i>purpurea</i>	
— <i>praecox</i>	3		— <i>strobilacea</i>	3	— <i>Winterlü</i>	
— <i>stellata</i>	3		<i>S. Chelone barbata</i>	4	Dodecatheon Meadia	4
— <i>striata</i>	3		<i>S. — campanulata</i>	4		

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer