

外科集成




漢書門			
一	二	三	四
五	六	七	八
九	十	十一	十二
十三	十四	十五	十六
十七	十八	十九	二十
二十一	二十二	二十三	二十四
二十五	二十六	二十七	二十八
二十九	三十	三十一	三十二
三十三	三十四	三十五	三十六
三十七	三十八	三十九	四十
四十一	四十二	四十三	四十四
四十五	四十六	四十七	四十八
四十九	五十		
類	號	函	架


內閣文庫			
和	書		
四	五	三	七
五	〇	二	七
五	〇	二	七
十	架	冊	號
架	冊	號	類

(十三)

五十一

內閣文庫	
番號	和 45027
冊數	50 (31)
函號	196 50





大學東
校典籍
局之印

外科集成卷三十一目錄

口部第三十一

咽喉病總論


喉舌分經論

咽喉病輕重論

咽喉病看治總要

咽喉病通治論

乳蛾證治論



外科集成卷三十一

修澤舍活板

喉痺證治論

馬喉痺證治論

喉閉證治論

纏喉風證治論

喉風證治論

鎖喉瘡證治論

喉癰證治論

外喉癰證治論

兜腮喉癰證治論

松子喉疔證治論

斗底風證治論

咽喉瘡證治論

喉腫證治論

內外腫喉證治論

風熱喉證治論

飛揚喉證治論

爛沙喉證治論

紫色虛喉證治論

簾珠喉證治論

虛啞喉證治論

聲啞喉證治論

喉單證治論

喉困證治論

喉瘤證治論

喉癰證治論

小兒聾癰證治論

懸雍腫證治論

胃火小舌證治論

胃毒小舌證治論

純白小舌證治論

積熱小舌證治論

咽嗌痛證治論

傷寒咽痛證治論

婦人咽喉痛證治論

咽喉不利證治論

喉節證治論

喉中應聲虫證治論

喉疳證治論

尸咽證治論

狗咽證治論

穀賊證治論

天絲入咽證治論

諸物哽咽證治論

骨哽證治論

外科集成卷三十一

官醫瘍科栗崎道樞正弘編輯

口部第三十一

咽喉病總論

咽喉病總論咽喉會厭與舌此四者同
氣政喉氣通於天咽以納食故咽氣
通於地會厭管乎其上以同開關
其喉則共食下不掩之其喉錯必舌
抵上齶則會厭能開其喉矣四者交
相為用闕一則飲食廢而死矣子和
夫喉以候氣咽以嚥物氣載攸分

外科集成卷三十一

修澤舍活板

脫齒千六連珠風自舌下起初起一
齒又起一箇毛者三五七九箇連珠
生起十七峰守毒或在臉腮浮爛或
在喉關舌下作響色黃如蜂十式走
注瘰癧風頸項結核五七箇皮膚赤
腫作寒熱尋常咽痛者多是疔火
噫種類雖繁同歸於火蓋少陰君火
少陽相火二脈所絡於咽喉君火勢
緩則熱結而為瘰癧甚不通而痰寒
腫甚不仁故曰一陰一陽少謂之喉痺
一陰肝火心胞一陽少陽三焦四經
皆言相火痰者痰之本痰者火之標
故言火則痰在其中矣
舌亦包在其喉咽屬胃後屬肺乃一身
為咽右為喉咽屬胃後屬肺乃一身

之總要百節之關防呼吸出入之所
也經云一陰一陽結而為喉痺痺者
閉也風有相搏或寒或濕相聚其症不
或風火相搏或寒或濕相聚其症不
變幻不測故風腫而痰多者風也淡
白而牙緊者風寒也紫者血也而爛
者伏寒也紅腫而脈浮者風火也浮
沈實爛而不腫者毒也脈細數而浮
者虛火也細遲者虛寒也脈大寒濕
毒虛火也細遲者虛寒也脈大寒濕
症瘰癧皆類而推之可也天凡初起之
者胃火寸洪緊者肺也寸浮也兩關浮數
右寸沉遲者肝也左寸浮也兩關浮數
也右尺沉遲者脾也左尺洪數也
而有力者腎虛火也壯數者左尺洪數
大略也可總用六味湯加減治之若


凶險等症須診其脈相其形再詳其
 受病之源細詰其起之端而用藥
 對病自然愈之速矣故凡治咽喉之
 症其要在於脈與形名耳經云神聖
 功巧不過望聞問切以
 此推詳庶無差悞指掌

喉舌分經論

喉有二孔左為咽屬胃納食
 之關右為喉屬肺納氣之關
 日內上膈屬胃下膈屬脾舌之中心
 屬心四圍屬脾舌根屬心舌名
 帝丁屬胃喉之左右通舌根者肝經
 外兩耳垂下肝經喉應地位屬肝再
 進內寸許或爛或腫俱屬脾胃火毒
 之症結毒者亦有之粗而關脈浮者
 非結毒也沈者為真此
 乃分經之大略者指掌

咽喉病輕重論

三日發熱症必加重須問其大便
 通利與否如大便全利症候雖
 浮火上攻大症難處多成膿藥
 重三日前五六日患處多成膿
 散若至五六日患處多成膿藥
 破後爛喉疔為難愈如爛用口
 多加龍骨珍珠同止●一頸俱紅腫
 者亦極危也而帶紅紫面青帶白神
 氣少者俱無救不語者死略能語者
 尚有可生之機面色少神喜坐低處
 者亦難治帝中乃性命攸關吉緊下
 通於紅白腫不消傷之者死同上●
 初起紅色腫痛已成腫咽亦無表裏
 之症相無尋輕已成腫咽亦無表裏




舌以筋按之若色雪白起筋即緊紅
 色者此身內血已死然口若臭猶或
 可生尤忌口渴氣急痰多而稠如桃
 膠者死期已遠矣全●凡喉症凶者
 面發腫白亮無光彩脈微沈無力是
 伸氣外泄無陽之症斷不治若面發
 紅腫脈來洪大有力症雖極重是有
 元氣次氣盈治之易痊●凡寒
 喉症者無痰
 不治同上

平開路吐痰涎飲食稍進者原咽喉
 腫閉牙關緊急言謬不清痰壅氣急
 聲小者險咽不出聲喘閉痰涎壅塞
 不問深吐腫痛腐爛吐納不堪聲啞
 毒疔咽間腫痛腐爛吐納不堪聲啞
 者重久嗽痰火虛陽上攻咳傷咽痛
 但見聲嘶面紅者死●發時牙
 關緊閉舌喉俱腫如碎而臭或有重
 舌及舌上黃屑者即作熱症用石膏
 寒熱二便閉塞者即作熱症用石膏
 敗毒散主之然亦易愈之症如漸起
 三四日後而未減者牙關反不閉
 苦惟在症未減者牙關反不閉
 且不理如好入者不治命●凡寒
 者不治或連重舌發寒熱者猶可治也
 不治或連重舌發寒熱者猶可治也

咽喉病看治總要

不妨如氣血愈衰弱者涼藥不可多用
 多則氣血愈衰弱者涼藥不可多用
 安指掌●凡治喉中紅腫者須視或
 難或蛾認症不真不可下他藥先用
 不味湯一服吹金不換然後查清加
 減可也切勿不可輕易加減急者先針
 患上出血亦可止●凡帶了針時
 喉當甲為火一身之主●凡動刀針時
 切勿宜防犯犯則血出不止須得細照
 治也月犯犯凡夜深看症須得細照
 再三推諫如見症不真不可輕用刀
 針亂投藥石先服六味湯●貼令照
 者漱吮以候天明再看同吹藥不得
 症或病有痛腫口不能開吹藥不得



者灸頰中穴三五壯或用通關散吹
 鼻內或煎水灌於鼻中亦可令病者
 連女燕下開口為度可上凡針舌
 下內邊青筋血出者湯治厥塊黑
 者外若痰解毒為妙於胃中連服茶隔
 敢消痰解毒為妙於胃中連服茶隔
 少須揀道地者預備俱為細末臨時
 急用將白滾水泡一匙去渣瀝藥時
 下為度如煎不可多煎每季有時疫
 煎則不效矣止兩凡每季有時疫
 喉風俗名變鯉瘟此症乃少陽經之
 巷月一門傳深者此活牛勞柴湖
 思用六味湯加蘇葉如一分人多用
 各一後服之可愈蘇葉如一分人多用
 于服之料煎以銀打就細加大引針

頭上一粒如菜子樣略鑿一小缺有
 用針頭灸之法取其易放艾員耳
 凡艾要陳者為妙員如小葉大置於
 針頭缺處以香燃之灸或灸上
 看症之輕重耳此為針而灸者近來
 凡喉鎗不可用鋼潤頭長大者近來
 病人多良用牛法况喉間地少窄側
 如動手之時病者或搖頭退縮恐傷
 他處必要或銅或金銀外打一小筒
 中藏利刀收放處在牛擦出則鋒露收
 之則藏不傷別處矣同止凡針身
 首四肢之尤必用細針惟十指五次
 可用三稜針之必用細針惟十指五次
 喉凡看症若病者以舌登起不見
 天或骨或牙或角皆可壓之則舌不登起

●凡治懸疔藥必須依此分量不可因藥味太重次大黃等馬峻利少生疑忌不敢服之存心濟此決不
 用重劑候人古更不可輕聽入之言
 有害于患者或更不可輕聽入之言
 反誤其事惜乎此●凡吹喉藥四五管方
 醫家吹時氣須加平用管周遍為妙
 大全●凡吹喉症須吹藥四五管方
 得痰出三次可以全愈其出痰初吹
 宜多用金丹必直對喉中重吹之急
 提出管恐痰即嘔出也凡初起吹
 藥須令患者低頭流出涎痰

咽喉病通治論

夫咽喉雖屬於肺然所致
 之分緊喉慢喉之說又咽為心肝腎
 呼吸之門飲食聲音吐納之道此關
 係一身害人也如虛火者色淡微腫
 不待少頃也便清白大便自利此因
 思慮過多中氣不足脾氣不能中護
 虛火易至上炎此恙先從咽益乾燥
 飲食妨礙咳嗽吐痰涎草刺喉中
 苦薜壘看蝦皮有如下嘔吐酸水噓
 又如硬物溢於咽下嘔吐酸水噓
 甜涎甚則舌上白胎唇生凡色聲音
 睡啞喘急多痰以上等症皆出於虛
 火元氣不足中來治此不可誤投涼
 藥上午痛者屬氣虛補中益氣湯加

乳蛾上腭癰等症天惠雖腫而咽門
 半塞手開其病雖凶而喉道又隘又
 緊此者標病雖重無妨當用金鎖匙
 吐出痰涎利膈湯推蕩積熱膿膿
 者閉之損而痛者益之其患自安凡
 喉閉小刺血喉風不刺皆非法又
 膿喉癰乳蛾不刺皆非法又
 痰火勞瘦咳傷咽痛者無法可治
 ●經云一水不能言其真水之易虧而
 不能勝五火動也如犬怒則火起於
 相火之易動也如犬怒則火起於肝
 房勞則火起於腎飲食失節則火起
 于脾胃之類是故火者痰之木痰
 者火之標火性急速故痰或暴悍
 治之法必先太湧其痰或以鍼刺
 其腫處此急則治標之法也

麥門五子玄參午後痛者屬
 陰虛四物湯加黃柏知母桔梗玄參
 如服不效者必加薑附以爲引導之
 用亦爲佐治之法也實火者過飲醇
 酒縱食膏粱禮禱重食火者過飲醇
 致熱積於中久則火動痰生發爲咽
 腫甚者風痰止壅咽閉塞爲風湯
 水不入聲音不出此爲喉閉喉間
 是也入聲音不出此爲喉閉喉間
 泄毒血隨用桐油錢雞翎探吐稠痰
 務使痰毒皆盡內服清利藥可入
 詰聲得此乃正內服清利藥可入
 刊餘血如牙關緊閉難入必常先
 少齒出血其閉自開如針刺探吐
 痰聲不出者真死候也痰如湯水
 聲不出者真死候也痰如湯水

必須以內經從治之法而治之
 草玄參升麻防風羌活芥人參白
 朮茯苓之類少加乾薑附子等藥為
 嚮導徐名頻與不可頻服此為治之
 天法也切不可驟服寒涼之藥非徒
 無益而且促其死耳種之咽喉之
 疾皆屬火熱雖有數種而輕者可以
 異乃火之微也微而輕者可以
 緩治是而急有惟用破刺出血最為
 上策正傳喉痺喉蛾喉刺風喉
 喉閉風毒熱毒喉痺乳蛾刺喉不可
 亂治當吐則吐不可忘醫此等症係
 性命之根本生或立見不識其標本
 而攻之失其法則禍不旋踵矣全書
 治喉之證不一不寒則補之不熱不

寒依經調之湯劑蕩滌之外復有針
 刺等法要習急治時不可緩非若
 臍積久之病磨化調養之可比也
 而後藥者若可謂之急先勞矣同上
 種心咽喉者總是火有虛實火因
 過食煎炒蘊熱積火有虛實火因
 風痰上壅將發喉痺必先去風痰而後
 不刺脈弦而散治宜先去風痰而後
 解熱毒涼膈散加黃連三荊芥石膏或
 古荊黃湯防風通聖散三荊芥石膏或
 又風燥咽喉乾枯常如手刺吞嚥有
 碍敗毒散加黃茶半夏倍桔梗薄荷
 正薑煎服痰盛加石夏凡服此藥子
 服午攻如嘔吐傷食熱物及穀
 匹刺瀝風熱併興血氣相搏腫痛者

惟腎傷寒及帝出腫者忌針用蛇床
 子於瓶中燒煙令病人吸之入喉中
 愈人門●咽喉治法初起腫痛寒熱
 炎作腫痛發表邪在表也發散
 石力者宜發表邪在上也喉腫痛痰涎
 壅甚面紅口乾邪在上也喉腫痛痰涎
 喉閉痰涎壅塞氣急口噤難開先刺
 少商後行吐法已成服藥難開先刺
 身水不臥膿已成也宜急針之腫痛
 微紅脈虛無力卒後痛者屬陰虛宜
 滋陰降火腫痛色白咯吐多涎上午
 痛者屬陽虛宜補中健脾正氣●凡
 喉症二三日發熱症必加重須問其
 大小便通利與否如二便不利症候雖
 加不過浮大上攻服解毒消風消火

藥即愈若二便不通利必內有實火
 非用降火解毒重劑及通利二便之
 藥火何從而出病何從而解亦須問
 其頭痛與否如頭痛即兼傷寒難治
 凡喉症必俟大便去後方可望痊若
 大便便秘結未可輕許大至五六日
 初起便結而用之至五六日久而不
 大便降而用之至五六日久而不
 食大便結用之至五六日久而不
 虛豈宜再用確黃當有善法以處之
 同上●喉症初起一日寒戰即生發
 者發後身涼口小碎又無重舌或二
 便俱利不可認作熱症皆因陰氣虛
 寒而發其痰不可吊盡此痰即身內
 之津液所化莫熱症乳蛾腫舌之痰
 壅一處以流盡則愈者不同若亦流

乳蛾證治論

亦存形若粟者紅腫疼痛有單有
 雙見吹藥易到手法易治生
 於關後者難見形色藥吹不到手法
 難施故難治俱宜服清咽利膈湯吹
 水礪散見者膿熟針之難見者用雞
 翎探吐膿血若兼痰壅氣急聲小探
 吐不出者險急用三稜針刺少商穴
 ●紫黑血仍吹服前藥緩不取效驗
 ●喉閉蛾疔生咽之上也其瘡有
 二一雙蛾一單蛾也雙蛾單蛾之症
 亦有二一陰症也陽症也二症雖異
 而火則一也然而火有陽火陰火之
 分陽火實火也陰火虛火也

蓋則精神竭而心斃先宜藥吹或用
 水換之法使喉一通即施溫補滋養之
 藥散却解日再發寒戰或心疼骨痛
 脇疼等症留難治真止●婦人喉症
 腫痛有因經閉致火上升而者宜
 內服通經藥月事通則愈同上●凡
 喉症先碎者先吹長肉藥後吹碧丹
 五止●凡吹喉症欲進痰涎藥中用
 皂莢末少許日吹上●凡喉中無形紅
 腫者當用上
 燈心膏

喉乃至命之關此處在喉陰火勢最
 症然陽火勢若重而實輕陰火勢最
 輕而反直蓋貫於喉以寒散而應如
 必須溫散也倘治之得其道而應如
 于關口上雙乳蛾感胃時邪而免塵
 疔也身發寒熱不脈收數先針少商
 商陽或林液上出血亦妙先用六
 味湯加陳皮海浮石藤葉活各一
 錢半兩服可散三錢如腫不退六脈
 可加生大散未盡身熱惡寒必恐見
 傷寒後發散未盡身熱惡寒必恐見
 痧疹六脈浮數于雙蛾之傍或左
 或右用六味湯加蘇葉一錢治三
 錢鮮新元芩五錢如蘇葉一錢治三
 錢一服退五錢如蘇葉一錢治三

粉各二錢雙山棍赤芍木通各一錢全
 愈同止遺不河射先用藥與磨風
 毒打和些子用鷲毛挑入毒上令病
 人閉口良久滿口痰吐百効單
 跋風起咽喉間只生癰毒在一邊如
 蓮子者未起尖者只用薰藥三味散
 出痰後服銅鎖匙地黃散針法同前
 同上喉單蛾風者其形圓如小筋頭
 得妙咽●咽關上或左或右關下難治
 咽或全吞燕門外喉主出聲經云喉能
 吸氣咽能嚥物故喉中病總而言之
 故為之咽能嚥物故喉中病總而言之
 種各類喉醫者可別治之其症
 詳審此証雙乳蛾全青●左畔屬

伏寒乳蠟 連珠乳蠟

發用六味湯加川貝一錢五分庄地二錢
 茅子一錢煎服四錢五分
 木通一錢煎服四錢五分
 味湯用生地一錢半丹皮二錢象貝八分
 二分甘草一錢通六分薄荷葉一錢加
 麥冬一錢五分凡伏寒之症乳蠟其色
 燈心二分煎服愈為止吹雄黃退
 腫藥同法凡伏寒之症乳蠟其色
 必紫治法同紫伏寒之症乳蠟其色
 有單有雙有連珠多因酒色鬱結而
 發單經雙重初起一印痛二日紅腫
 三日有形如細白星發熱者四
 日勢定治之四五日可愈其症生於
 喉傍一處生者單蛾左右生者雙蛾
 喉白星上咽下咽忽腫作痛生雙蛾者
 凡人有咽下咽忽腫作痛生雙蛾者

風寒越 白乳蠟 石乳蠟

力那生大黃三錢脈虛用八仙散同
 拍枝白照前吃法三蘇葉各二錢
 啞肯寒六味湯加蘇葉各二錢
 細辛三分諸李頭風寒乳蠟因風寒
 而起腫大如李頭不能下視氣塞不
 通寸關之脈浮緊肺胃之症也即針
 灰商商陽少冲兩牛六欠用六味湯
 加蘇葉二錢差活三錢一服而愈若
 早用寒涼則不能退矣同止而愈若
 乳蠟者腫滿口寒用發寒熱六脈浮
 弦此症因肺受風寒用發寒熱六脈浮
 葉二錢細辛三分或一服加蘇
 愈局上●石乳蠟或胎生或因本原
 不足生干乳蠟地必用仍針此乃肝
 火老疼縱成惡血凡遇辛苦風熱即

飲食不能下五日不食即死矣但此
症實火易治而虛火難醫實火世人
已有妙方不連之類消之立消惟虛
火乃腎火不藏於命門浮游於咽喉
之間其症亦如實火惟夜重於日間
晨反覺少輕若實火清晨反重於口
反甚痛滑而不裂也以此蠟之失
不差不錯滑而不裂也以此蠟之失
腫痛其勢甚急變成雙蛾者其症痰
涎稠濁不時吐渴索飲疼痛不能
入候此陽火壅阻咽喉勢若重而病
實輕也夫陽火太陽之火也勝於
火也勝於太陽之火也勝於
火動腎火即來相助故直衝咽喉而
肺脾胃之火亦復相從上升於是借

經之痰涎壅阻塞於咽喉結成火毒
而不可解治法似宜滋潤數經矣然
其本實始於太陽泄勝於火則諸
經之火自安但咽喉地近於肺太陽
既假道於肺經險要之地即狹路
之戰場也安有舍戰揚要地不解其
圍血先搏其本國乎貴有兼治之法
也凡止陰蛾之症乃腎水虧乏火
不能藏於下乃飛越於上而喉中關
狹火不得直泄乃成蛾似蛾而非
蛾也早晨痛輕下午痛重至黃昏而
痛更甚得熱則快得涼則加其症之
重者滴水不能下喉作外感陽毒
治誤用山豆根等運施子之類則痛
益甚而關不開有不盡命而死者也
惟單補陰虛用引太歸源之法而痛

喉痺因膏梁積熱或稟賦有熱或乳
 母亡情之火鬱食之毒當分其邪蓄
 表裏與症之輕重經之所主而治之
 若左腮色青赤者肝膽經風熱也
 柴胡梔子散若赤者肺經有熱也
 也用瀉白散類間赤者與小腸
 經熱池用導赤散若兼青色黃脾
 搏也用加味瀉黃散若兼青色黃脾
 經有熱也用瀉黃散若兼青色黃脾
 土位也用柴胡梔子散若兼青色黃脾
 經有熱也用地黃丸凡此積熱內蘊
 二便不通者當發散之凡感風邪大復
 發寒熱者當發散之凡感風邪大復
 閉結煩渴痰盛者當發散之凡感風邪大復
 乳母管漿積熱者毋服東垣清胃散

漿不得入口者用解毒雄黃丸四五
 粒以極酸醃磨化灌入口內吐酸
 痰却服之問以生薑自然吐酸
 噎下之神效矣按喉痺惡寒者皆
 寒折熱寒則內熱於外熱鬱於內
 其外寒則內熱於外熱鬱於內
 凡酸寒等劑點喉反使其陽鬱結不
 伸又忌確黃等寒劑下之反使其陽
 下陷入裏則禍不旋踵矣靜祇和日
 寸脈弱少於關者宜消陽助陰東垣
 日兩寸脈不足乃陽氣不足故用表
 藥提其氣外以助陽也
 弱亦可其法也
 下意候之今月之內欲有伏氣假令
 舊有伏氣當須脈之微弱者當
 候中痛似傷實非喉痺也
 ●小兒

愈次去汚血宜針之
 瘰癧多是痰熱重者用探吐
 瘰癧呼及不通須臾欲絕
 瘰癧升平煎取二盞去渣
 通心蓮●煎取二盞去渣
 角合燕汁立愈
 角加霜梅為末噙之
 數不下蘿蔔汁咽之
 甚速調灌之
 研細調灌之
 黃甘葶青黛
 黃甘葶青黛
 合許神效
 合許神效
 滌去查恣飲便愈
 中惡痛等症用上好消梨
 飲之如患
 者能自嚼
 燕豆亦下
 多食

若因乳母患癰
 遙散票賦陰虛者
 當用輕和之劑以治
 峻利之藥以傷其氣
 癰之症其聲如斬
 此為肺絕之候宜用
 薑汁竹瀝放開頻服
 參膏先煎獨參湯救
 八次則全四五運則
 者●喉閉未破者名曰
 針之●以世其毒未破
 速用針法吐毒以救
 以曲竹管灌藥入喉
 癰因惡血不散改世
 必先發散發散不愈
 必發散發散不愈

片合燕汁外壘●又方青艾加莖葉
 一握用醋同拌傳痺處多月用車者
 丹心●又方用蛇床子亦有嘴瓶中
 燒令病者以瓶嘴含口中吸烟入喉
 內立愈上唇●又方葶麻子取肉乾
 碎蒜捲作筒燒烟吸之同止●凡喉
 痺勿論大人小兒非吐不可如膽參
 石綠之類為末薄荷汁入醪同調以
 雞翎蘸藥送入喉內徐石引痰吐
 為佳●喉痺刺手少陰即神門
 穴也●又法取豐隆涌泉關衝
 少商照海大衝東垣●喉痺乳蛾
 左女心主大指甲第一節灸二三小
 痺不能言温留曲池主之喉痺氣逆

為良大解熱毒惟金瘡產婦及諸脫
 血證不可食以其破血故也●一
 應瀝疽發背等證多食極妙者用鵬
 沈喉痺咽腫手足不和多惡寒者
 瀝神效同止以筋蘸藥點患處藥至即
 獨根者勿見風●喉痺入雞天以三
 爭醋研和泥生布拭喉●赤傳之
 搗紋取汁一喉痺塞不通取紅藍花
 冬月無濕花可浸乾者濃絞取汁如
 前服之極驗咽塞服之皆瘥●咽
 ●又方取蟬蛻虫疔點在喉中下咽
 即開方取蟬蛻虫疔點在喉中下咽
 降血虫之火●又方用茜草一片噙服

痺喉行天

其色鮮紅久而紫赤急用小排刀點
 又或用蘆刀點之血微出火已瀉矣
 赤服煎劑或冰片散吹之漸也
 赤色者變成淡紅色愈之漸也
 物風熱痰喉痺先以養陰解毒除痰
 時行咽痛宜用普濟消火除痰
 之候一鄉醫相以者屬天行運氣
 邪於內不得出也其病有二其屬
 火經云以陽所至為喉痺又曰屬
 司天之政三氣發暑至民病喉痺
 治宜仲景桔梗湯或面赤班者屬陽
 毒宜陽毒諸方汗之共二屬濕經日
 太陰之勝火氣內鬱喉痺治宜活人
 濕滯所餘病瘡腫喉痺治宜活人

痺喉熱風

痺喉單痺喉雙

口咽咽喉如扼狀行間王之喉痺
 膈水漿不下璇璣王之喉痺食不下
 鳩尾王之甲心雙喉痺生於上膈
 關內兩傍形如橄欖兩關洪大者是
 積熱所致或發寒熱兩關洪大者是
 也即針患處或商陽穴針之亦可
 用六味湯一服明日再加黃芩酒炒
 山梔木通玄參鹽水炒各一錢半再
 服而退如爛者不可針患處上吹金
 換指掌如喉痺或左或右治同前
 圓上風熱喉痺其腫紅而微紫其
 形如拳其人面赤血目上視外症壯
 熱惡寒儼若傷寒此病人聲音不響
 宜用潤肺之藥治之全書●風熱喉
 症之起出於憂思勞碌太過或對風
 言詬風入肺於憂思勞碌太多去痰
 要

長桂枝甘野湯或面青黑者屬陰毒
互陰毒諸方汗之謂日●洪武戊辰
春鄉村病喉痺者甚衆益前年終之
氣及當急初之氣二火之邪也子累
用甘桔湯加黃連半芩薑豕鼠粘子
根等劑發之扶虛者加參芪歸輩水
漿不天者先用解毒雄黃丸醋磨化
之灌喉痰不出更用生薑汁灌之却
上項藥無不神驗若用膽凡等酸寒
點過者皆不治蓋邪鬱不出故也
●天行喉痺取鴨嘴膽凡木牛錢吹
入喉中吐痰立愈如無膽凡以透明
綠凡代之正厚●亦有天行一種名
日大腫病俗呼為狸頭瘟天壹甚為
凶惡深之者十死八九宜推運氣治
之治法亦不甚遠也東垣普濟消毒

爛喉

飲子甚妙實為百發百中之劑學者
再宜詳究而擴沈之豁活以紫李
世幸甚正●陰毒喉痺如紫李
見黑色其色光血紅可治陰毒血黑
不治外症惡寒其身動振腰痛脚
冷此冬月感陰濕火邪相于其血
微紅及腫硬喉乾難治先服五福化毒
果甚腫硬喉乾難治先服五福化毒
丹次以蘇子降氣湯再吹冰片散一
月之內戒酒全書●爛喉因肝胃
熱毒外感時邪而發形如花辦爛腫
自班痛吐不食眼腫泛上六脈洪大
即針灸商陽關冲陰而六脈洪大
有血即生無血者用六味湯加片
大黃五錢鹽水炒玄參酒炒黃芩丹
皮坐地各二錢浮石山梔木通各一

痺喉毒酒

錢兩服後去大萬並六味湯再加厘
石膏栢子仁各二錢訶子一錢五分
冲製拍枝江半盃四服而愈吹釜不
換兼服八仙散每日二錢津化嚥下
此症脈大身涼不洽指津化嚥下
痺其形若雞心腫鮮紅其酒毒喉
外症發熱惡寒頭痛強此上焦積
熱心脾二經受之蓋心脾二經王上
焦肉脈●精子解毒湯治法同風壅
痺金書●酒毒喉痺其腫黃其血黑
其形若管其腫若坎外疔而赤目睛
上視此乃熱毒傷於心脾氣通於口
循環上下咽喉痛治法先取其痰
次用水片乾吹鼠粘子湯多加乾
薑天花粉生薑連山梔仁連芫如雞
祛梗標殼同●淡紅喉痺腫如雞

痺喉紅淡

痺喉色白

予喉食不下身發寒熱眼紅腫此熱
有班毒在內急對少陰商陽關
冲左右八沈或患上挑破六味湯加
蘇葉羌活身根各二錢鮮元要五錢
服二貼滿身發出痧疹嘔吐即止或
身熱不退喉外亦腫此內火外泄也
換加生大黃三錢葛根黃芩山梔玄
參花粉各二錢生石骨五錢滑石三
錢木通一錢服二貼後去大黃石膏
再用前藥照方四五貼乃痊如有爛
班用八仙散一方服津化嚥下無訖
枝汁此症因傷寒時邪未散之故兩
關沈細兩寸尺四脈虛數是也指掌
●白喉癰因肺胃受寒脈連身惡
大味湯加細辛三分活蘇葉各二
錢陳皮一錢二服可愈或二股後變

痺喉伏寒


紅色乾痛去前四味換加山支木通
消炒黃芩不生地黃栢各一錢痰多加
浮石半夏天花粉各一錢同止寒
伏喉痺脈瘦寒重色紫赤不大腫因
服原劑久之必爛凡遇此紫色者不
可作火治不味湯加細辛五分麻黃
桂枝蘇葉瓜蒌訶子丹旁各一錢甚
者或吐紫血塊者亦如此吃法末
爛者加蘇葉柴胡各一錢海浮石一
錢半細辛三分腫與不腫同治上

馬喉痺證治論

論曰馬喉痺之狀勢如奔
驟煩悶數々吐氣者是也宜生犀丸
天門冬丸龍腦散聖藥●走馬喉痺
係急症肝脈火閉不通而為痺或發
寒熱洪大者生沈細者死用六味
湯加葛根二錢柴胡一錢細辛五分
漱之再加角刺歸尾赤芍河車各二
錢生大黃五錢痰多加浮石三錢製
半夏二錢身熱背寒加羌活一錢節
針灸尚商錢陽關冲兩手六穴血多為
妙指掌●馬喉痺用馬脚錢一具以
水三升煎至一升細合燕聖濟●
馬喉痺喉相其狀從頷下腫連
頰下應喉內痛腫塞水漿不下甚者
腫潰盡若攻心助心煩悶全厥

喉閉證治論

喉閉因外感寒邪內傷熱物
 或大寒後便入熱湯洗故將
 入脾經故在少商穴出血稜
 刺手腕中筋上或出之仍
 將雄黃化丸冷茶磨化灌之
 將水片散吹入喉中漱出風
 痰為愈更服吹散入喉而
 閉者由肝火盛復氣散全相
 成咽腫痛如赤腫甚則項外
 腫喉中現如赤湯水難嚥言不
 出暴起身發熱急刺或針不
 合谷穴以開咽喉利服荊防
 敗毒散寒熱日退即清咽利
 兼吹紫雪散以隨以薑汁漱
 熱或用酈散以消積血痰壅
 油餞探吐痰涎若腫發於喉



痛者防透咽喉不可輕針急用皂角
 末醋調厚敷項腫喉閉聲嘶者肺氣
 用生羊肉片貼之喉閉聲嘶者肺氣
 欲絕急互獨參湯表之若卒然如啞
 吞吐不利係寒氣客於食厭也宜蜜
 炙附子片合之勿燕布終忠用苦寒
 之藥恐難預難又酒壅喉閉由
 酒毒蒸於心脾二經熱壅咽喉腫色
 黃其人而赤目睛上視以桐油餵導
 吐痰涎而服鼠黏子解毒湯亦用紫
 雪散吹之服鼠黏子解毒湯亦用紫
 心胸前腫痛氣促凡咽喉閉毒氣歸
 者此得助治急喉閉透不救蠱
 魚膈臘月收陰乾為末每用少許煎
 惠處藥至即收陰乾為末每用少許煎

●喉閉牙關緊強不得開者此皆風
 痰相搏壅塞咽喉牙關緊強不得開者此皆風
 萬壅口或溫蜜湯取醋水俱下玄明
 粉准喉急用錫翎攪之吐出痰涎幾
 碗行用五味末醋調敷之急服荊防
 二散湯口吹納喉甲急用燈籠底油脚
 灌下月吹納喉甲急用燈籠底油脚
 入喉中愈同上喉閉透不救蠱
 英去反弦子庄喉閉透不救蠱
 點少許在臍痛處更以醋糊調藥末
 厚塗項上須臾更敷血出立瘥同上
 ●入方用遠志去心水調傳項上一
 遭同止●喉閉刺半足陽平即關
 衝竅陰東五●喉閉刺半足陽平即關
 皆針之乃心●喉閉刺半足陽平即關

閉喉癰氣

●氣瘡喉閉為因聚毒塞於喉間痰涎稠實發寒熱者仍分上中下三關毒在下關者難治上中二關用吹喉藥吹數次茶湯送下雄黃化毒丸然後服參苓原氣散

閉喉寒蔽 閉喉毒消 閉喉寒傷 閉喉熱風

有少衝涌泉綱目咽喉閉塞取照
 海洞上熱因閉內亦俱腫牙其
 人久積熱毒因感風熱相搏發
 此外來助壅喉間其人面赤腮腫身
 用寒熱喉中塊如外血鮮紅先
 飲王字藥盤調點之傷寒喉閉者由
 傷熱遺毒不散致入九日喉閉者由
 因熱毒入於心經脾經急服四七湯
 二三日貼入於心經脾經急服四七湯
 飲二三日貼入於心經脾經急服四七湯
 上視者起也先用取痰法再用冰片
 散吹之清涼散附子切片蜜塗灸黃
 閉吞吐不利用附子切片蜜塗灸黃
 色每盒一危燕非末盡再換一片黃

外科集成卷三十一
喉風證治論

纏喉

風證治論

纏喉風者為纏喉風色纏喉風目耳邊過頰下赤
者為纏喉風得効●熱結咽喉遠於
外且麻且痒腫而大者名曰纏喉風
腎鑿●纏喉風喉閉其證先兩日胃
膈氣緊出氣短促忽然咽喉腫痛半
足厥冷氣閉不通頃刻不治丹心●
纏喉風屬痰熱咽喉裏外皆腫者是
也外無腫者必身發熱面赤此乃
熱毒之氣極也外面有腫者身亦發
熱邪火發外之原也或牙關不強外
面不腫但喉中紅者日暴感斃在心
如左邊病退傳右邊此餘毒未盡故
也全書●纏喉風外症●面症如
蛇纏頸身發潮熱頭印大痛其腫紫
糖色依總論治之水煎散內加雄黃

腦屬服荆竹粘子二陳湯急用鷄毛
 藤燈窩濁油攪去痰涎三四碗万活
 如痰不能去難生矣須要避風日上
 ●纏喉下外症身發寒熱頭痛同上
 不見咽風因腎經有熱內枯不能上
 潤致令心火盛故發此症服解毒散
 具探吐法在前仍用吹喉藥吹三五
 次又用白地松根醋搗汁漱出風痰
 如喉關雷響者不可治切宜仔細調
 ●纏喉風喉痺之症其人膈間素有
 痰涎或因飲酒過度或因忿怒失酒
 或因房室不節而發作也何則飲酒
 過度是胃火動也忿怒失常是肝火
 動也房室不節是腎火動也火動痰
 上而為痰熱燔灼壅塞於咽噎之間

所以內外腫痛而水漿不入其症
 可謂危且急矣治之決急則治標
 緩則治本湯藥以降火補虛已上方劑
 治本用湯藥以降火補虛已上方劑
 其於治標已詳其於治本尤缺略也
 諸方出證但云石風熱而未云治痰
 熱但曰治脾肺火而未曰降肝腎太
 予雖不敏贅以管見如挾痰加瓜
 葶半芩或重緡湯之類如挾痰加瓜
 以柴胡黃連或小柴胡湯左金丸之
 類如挾腎火加以生地黃黃蘗或四
 物湯加知母黃柏之類未知腎者以
 爲何如又常論之胃托腎三經之火
 各有所因而生富貴之家醇酒厚味
 多生胃火婦人隱憂不發多生肝火
 男子房勞致虛多生腎火人之五臟

六腑皆有火不如此三經之火常變
 見而為病之多也此方廣●經之喉風屬
 熱痰宜用蕭翎蕪桐油探吐之又法
 用射干逆流水吐之同止●纏喉風
 雄黃一坨新汲水磨急灌吐纏喉風
 ●又方皂角揉水灌下得吐愈同止
 ●反纏喉風喉痺飲食不通欲吐者用
 反魂草根一莖淨洗內入喉中取寒
 痰出痰神驗一變以馬牙兩津燕之即
 絕根反魂草一名紫苑同止●纏喉
 風束氣不通用一蛇蛻炙當歸等分
 為末溫酒調下錢七得吐愈可生
 ●有人思纏喉風食不能下大麥麵
 作柿糊燕之涼服易下燕以助胃
 氣衄義時以此代粥食也若能食者
 不必用此丹心●代粥食也若能食者

數不下牙關緊急不省人事用備急
 ●如聖散一豆大鼻內搐之立効●
 雙纏喉一邊腫者名單纏喉俱用藥
 吐痰次用礪砂散及地黃散壅陰陽
 纏喉風因肺感時邪痰上壅陰陽
 閉結內外不通如蛇纏頸關下牽塞
 甚者角弓反張牙關緊閉用開關
 散皂角刺一錢細辛五分冰片二分
 共研細末吹入鼻內再用針類車左
 石兩尤點又數壯牙關可開用雞毛
 白冲白凡湯嚙吐或用桐油蘸雞毛
 吐之或用膽心吐之或以為度如
 不吐或針十指五次少商陽關冲
 少陰少冲是也取血為度無血難治
 用六味湯加天黃一兩麻黃羌活蘇

風喉慢

風喉緊

喉風證治論

搏上壅咽喉腫痛聲嘶音難出湯水不
 下痰涎壅塞之聲頗似拽鋸初發暴
 速急刺守大指內側汝商穴出紫黑
 血以瀉其熱痰盛者以桐油錢導吐
 之痰後隨用甘草湯漱之以解桐油
 之氣內服雄黃解毒丸吐下之喉中
 吹白降雪散俟關開之後內宜服清
 咽利膈湯按法調治隨手應效者順
 若面青唇黑鼻流涎者逆若兼項
 邪遺腫即名纏喉風其治法雖與此
 證相同然終屬險惡難治金匙與慢
 喉風有因平素體弱更兼暴怒成
 食五辛而生亦有不思太過而成
 者俱屬體虛病寬其緩其色淡其

葉訶子各二錢同煎數沸嚥下或瀉
 或吐皆為妙如不治者
 六脉沈細者不治者
 白凡入喉中難子清一箇二味調
 勻灌入喉中如神此方活久不
 計數幸毋忽也
 為末每半錢水小半盞調服
 管吐痰涎極捷治喉痺亦如神

風喉癢

左右寸關弦緊洪大者在沈遲者難
 治吹雄黃消痰藥指摩●暴發暴虎
 者名曰走馬喉風又名鎖喉風醫者
 ●啞瘰癧喉風類候由肺胃蘊熱
 積久生痰外復受風熱與痰相搏
 湧塞咽膈之上而成斯疾初起咽喉
 腫塞疼痛湯水難嚥言不出牙關
 緊急此屬險候急用雄黃解毒丸承
 化用細竹篾為藥水吹入竅孔直達
 咽喉藥入作嘔即愈此藥通先與米
 關頓開咽喉即稍開通先與米飲
 之次服清咽利膈湯兼飲承散用
 藥不應者險者居鼻流涕者逆
 金匙●啞瘰癧者風痰犯於咽膈之
 以此口不能言牙關不開急用磨
 磨水滴水入鼻孔即開隨用桐油滴入

風喉鎖內

腫微其咽草舌見滑白胎大便閉
 六脈微細唇如凡色若午前痛者服
 補中益氣湯加清茶湯加麥冬黑
 參桔梗梗服之若年後作渴身熱
 足冷者陰陽兩屈也忌用苦寒宜灰
 甘桔湯以宜達之若面赤咽乾不渴
 者其脈必虛大以甘露湯服之必效
 俱兼用冰硼散一錢加燈草煨灰存
 性三分吹之立驗員上●內腫鎖喉
 風因肺胃之經陰陽相結內塞不通
 外無狀疎喉間痰喘先用吐痰法
 吐再月六味湯加麻黃二錢桂枝一錢
 五錢細辛一錢蘇葉二錢桂枝一錢
 羞治二錢煎數沸服之或瀉或吐為
 妙如不吐瀉針少商陽關冲曲池
 合谷兩手十先有血脈生無血則死

風喉食嗜 風喉閉重

即効 金 塞 弄 舌 喉 風 啞 不 能 言 舌
 出 常 將 手 拿 急 將 兩 手 大 指 側 爪 甲
 機 用 三 稜 針 每 指 刺 三 針 有 血 可 消
 無 血 不 治 若 針 少 商 尤 亦 須 用 銅 匙
 排 開 日 用 鷓 鴒 丹 吹 喉 甲 燈 篋 內
 油 脚 再 用 鷓 鴒 丹 吹 喉 甲 燈 篋 內
 風 甘 桔 湯 理 用 冰 片 散 吹 之 全 愈
 ● 重 閉 喉 風 毒 上 腭 浮 腫 生 毒 不 可
 針 先 用 靛 青 白 散 此 痰 及 用 地 黃 散 紫
 滂 散 或 口 眼 耳 竅 有 一 處 出 膿 者 久
 以 入 七 孔 相 穿 之 所 屬 不 可 治 針
 合 谷 曲 池 石 會 百 灸 喉 爛 不 可 治 針
 熱 毒 在 於 心 經 咽 喉 燥 而 無 痰 若 倉
 食 者 不 可 治 用 薑 蒜 煎 湯 吹 喉 若 倉
 刺 痛 者 仍 用 薑 蒜 煎 湯 吹 喉 若 倉
 下 如 久 不 治 登 飛 繩 勞 毒 能 傷 人

風喉舌弄

喉 中 仍 將 毒 毛 攪 喉 間 風 痰 出 盡 再
 用 甘 草 湯 解 相 油 之 氣 卽 用 冰 片 散
 次 之 夏 服 荊 防 敗 毒 散 連 進 三 服 如
 若 面 紫 舌 青 唇 黑 鼻 流 涕 弄 舌 喉
 風 由 心 脾 實 火 與 外 寒 鬱 遏 而
 成 咽 喉 腫 痛 痰 涎 壅 堵 音 啞 言 澀 舌
 出 不 縮 時 多 攪 動 舌 服 閉 常 欲 以 手
 捫 之 故 名 弄 舌 急 刺 少 商 穴 在 兩
 手 大 指 裏 側 去 指 甲 角 旁 韭 葉 質 卽
 是 用 三 稜 針 刺 之 有 血 者 生 無 而 者
 死 噲 蟾 酥 丸 徐 燕 藥 升 若 喉 涎 上 涌
 不 能 嚥 藥 者 急 用 桐 油 錢 探 吐 痰 涎
 隨 服 清 咽 利 膈 湯 吹 金 鎖 匙 若 喉 內
 迎 松 子 及 魚 鱗 米 不 堵 塞 者 此 屬 虛
 陽 上 浮 急 用 蜜 炙 附 子 片 噙 嚥 其 汁

命途音●此症因伏邪在肺聲啞
食六脉遲細屬險症指掌●或食鯉鱸
惡物發泡是也●或食鯉鱸
石髓食中寒不能吞用芒針破內
一池可取合藥燈散百効●針破內
月准吃粥病在將危就醫于余診
其脉病難常久脉尚有根或可治之
桂枝味湯加麻黃訶子皂莢各二錢
汁炒半芡二錢通細辛白芷各一錢
碗聲亞末除換加若梗一兩四錢
童便煨河子七錢半童便炒甘菓七
錢半童便煨河子七錢半童便炒甘菓七

風喉舌匝

風喉爛虛

滾嗽而且吃十貼乃愈後服補藥
脾收功●近小舌有泡或紅或紫
上唇兩旁腫喉內不腫舌捲粗大
外腫皆腫喉內不腫舌捲粗大
症也看治錢黃丹二錢大黃四錢連
加二錢連沖王樞丹一錢急進三四
喬有可生如牙關黑牌頭齒落者
或治此症乃肺肝積毒所致
難治喉風因承原不足暈火上炎
虛爛喉風因承原不足暈火上炎
于喉之關內上下紅白班爛不
暈六脉細數者是也初起用六味湯
加塩水炒女參煎炒黃芩二錢鹽
水炒山梔花粉丹皮各一錢湯加
錢連進二服後去六味湯加塩水炒
知母黃柏各一錢平服五貼如兩關

風喉寒酒

風喉碌勞

于關內滿喉灰有紅點根白不腫常
 有血腥氣勞碌即發不味湯加鹽水
 炒元參通各一錢炒知翅生地各二錢
 皮木通各一錢明山梔鹽水燒一錢
 酒炒黃芩各二錢湯換煎方鹽水燒一錢
 兩日後去六味湯換煎方鹽水燒一錢
 參二錢女貞生地各一錢半麥門酒
 炒黃芩各一錢丹皮拘犯各三錢龜
 板三錢生首烏五錢生甘州一錢再
 兩貼而愈其豚象六部數而中者
 此病疔脈走也同平而腫有痰
 酒後遇寒關內兩邊痛身無寒熱六
 紅塊四五粒燕物覺粉枳根子黃
 味共大用六錢乾葛一錢二服而
 心酒炒各二錢爛喉風因風火內熾腫

風喉毒酒

風喉白

沈大因寒色火伏于肺經白而小腫
 喉風因紫爛斑豚象不數身熱怕寒
 上有紅發用六味湯加葛根二錢麻
 火欲外發用六味湯加葛根二錢麻
 質蘇葉挂枝各一錢柴胡二錢粉蒸活
 各一錢半細辛五分服一花貼兼元
 仙散一錢服津化燕下變紅二色換加元
 參塩一錢炒黃芩酒炒各二錢山梔木
 通各一錢上錢貼可愈紫喉風同
 治法一月上錢酒毒瘰癧因醇酒厚味
 生于關內紅腫痰多熱物不肺脈
 獨遲兩關內紅腫痰多熱物不肺脈
 兩葛根一錢浮石三錢枳根子花粉
 各二錢山梔二錢皮各一錢日再
 木炒元參通各一錢明山梔鹽水燒一錢
 愈風上參生地丹皮各一錢半麥門酒

風喉根脚

風喉紅淡

知三各二錢丹皮澤瀉花粉各一錢
 二錢丹皮澤瀉花粉各一錢
 感胃風邪而發連小舌喉塞不通
 聲音唇舌清右寸關脈弦緊針灰商少
 冲關冲急者患上亦可挑破用六味
 湯加蘇葉治甚根二錢一服而退
 同上一脚根喉風者脚根發一起至
 喉間或一羊發一次物根發一可切
 忌熱物不得傷於怒氣其病一可切
 一穴雖然不妨只是要發用吹喉藥
 仍服敗毒散如腥惡發者死全書
 脚根敗毒散如腥惡發者死全書
 近腮滑炙七壯二尤妙得發下全書

風喉苦辛

風喉寒腫

風喉爛喉

爛筋如紅爛用六味湯加葛根花
 一錢如紅爛用六味湯加葛根花
 味各湯加一錢花當歸子仁各一錢
 母各一錢花當歸子仁各一錢
 牛廿二錢浮石三錢一錢
 連服二貼兼用柏枝打生一錢
 之六劑乃安同上腫寒喉風因肺
 受重寒生關弦緊平而不腫大痛難
 戢不穿寸爛背寒怕冷六味湯加
 食不穿寸爛背寒怕冷六味湯加
 活蘇葉各二錢常歸柴胡牛蒡桂枝
 各一錢蘇葉各二錢常歸柴胡牛蒡桂枝
 辛苦喉風因辛五分二服而痊不腫
 痛小舌左風因辛五分二服而痊不腫
 用六味湯加右常出血上部之脈洪緊
 連堯各二錢加塩木炒元參酒炒黃芩

鎖喉瘡證治論

功亦服速攻成由麋黃眼塞懸
 金能清治咽物心香清當難膺
 成咽通喉生與水心歸通之側
 利服腫於小片和之連漸次初
 膈生壘耳前積搗類散匣注邪
 湯茸疼聽聽熱搗之類破如風
 吹清痛會外之類化癩瘰瘰
 冰心妨礙尤感全蟻內膿瘰瘰
 礮丸礙尤感全蟻內膿瘰瘰
 散開飲形風盡蠅用早治能飲
 我關食如寒瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰
 方解此瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰
 應熱證瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰瘰
 效兼須漸而毒少生宜閉於腸




喉單

喉癰

證治論

論一氣熾盛致結聚腫痛不得消散
 上焦攻於咽喉結聚腫痛不得消散
 吸吐納無所妨礙若脾肺壅熱熏發
 外連於咽嗑其氣和平則呼
 論日肺氣上連於喉噴胃脘
 外連於咽嗑其氣和平則呼
 論一氣熾盛致結聚腫痛不得消散
 上焦攻於咽喉結聚腫痛不得消散
 吸吐納無所妨礙若脾肺壅熱熏發
 外連於咽嗑其氣和平則呼
 論日肺氣上連於咽嗑其氣和平則呼
 外連於咽嗑其氣和平則呼
 論一氣熾盛致結聚腫痛不得消散
 上焦攻於咽喉結聚腫痛不得消散
 吸吐納無所妨礙若脾肺壅熱熏發
 外連於咽嗑其氣和平則呼
 論日肺氣上連於咽嗑其氣和平則呼
 外連於咽嗑其氣和平則呼



外喉癰證治論

無痰涎內不見形跡此風毒喉癰也
 六味湯加黃芩荳蔻山甲歸尾赤芍
 河車各二錢紅花葛根各一錢乳香
 五分連進三服以消爲止如已成癰
 膿必成漏管用針全大補湯收功
 一關最爲惡毒乃心肝火炎於肺
 毒氣攻喉切忌刀針心喉癰生
 赤咽外正中腫痛妨礙飲食紅腫
 熟和必欲潰膿軟而痛者針之
 服值托之劑玉紅膏搽貼其肌完
 又有人俱亦無妨天益喉癰雖
 咽門來墨半閉其病雖因而喉道又

瘰癧古種

水難入或有爛斑肺脈沈滯脾胃
 洪大背寒身熱用六味湯加羌活
 錢葛根蘇葉各一錢一服漱之二
 後聲音不啞去前二味換加花粉
 錢乳香五分葛根黃芩酒炒歸尾
 芍山甲角剝各二錢再服八散王
 樞丹二貼全瘰癧多思此凡舌下
 人感熱性燥在喉腫痛即
 心舌爲瘰癧舌運喉腫痛即
 發瘰癧大抵兼者勢凶大症如

寬際此皆凶症雖重無妨
 瘡此毒因七情鬱結而成
 若不速治恐毒氣內攻喉
 致口內出膿雖不傷命即
 身之痲疾也同小●此症即
 見焉疽門項部發條宜參看
 瘡喉

兜腮喉癰證治論

發外用宮炎之法二壯用大味湯加
 山甲歸尾角刺川芎白芷各一錢分
 麻三分紅花乳香各五分以酒為度
 有膿即針之成漏者多用參芪內托
 吸可收功遇症
 不可輕忽指掌

斗底風證治論

斗底風者咽喉腫下注紅
 黃膏初痛過漿冰者可治
 不可熏只用青日散吐痰出痰右用
 礪散散如病極過水漿不得遍身疼
 痛氣急胸前未腫如吐痰不得者不
 可治暫用薰藥三味散重於腫痛處
 百効


處伯効

喉腫證治論

喉腫起於喉經因食煎煉油
 膩等物及飲酒太過而行房
 事以致毒氣不能流行聚結於喉根
 若不速治潰毒閉急即成治法先用
 醋水蘸汁攪去痰涎即用吹喉藥吹
 數次俟服八正順氣散全書●喉咽
 者脾胃之候氣所上下脾胃有熱氣
 上衝則喉咽腫痛者皆
 挾熱則為之若風毒結於喉間其熱
 盛則腫塞不通而水漿不入便能殺
 人藏氣微熱其氣衝喉亦能腫痛但
 不過重也●原●治喉中腫痛不得
 飲食燒筆頭灰漿木飲下方寸七

內外腫喉證治論

或有爛班火鬱之症用六味湯加酒
 炒黃芩三錢熟大黃五錢海浮石二
 錢吹紫雪釜不換明升換加丹皮一
 錢五分生地酒炒黃芩各二錢生石
 膏三錢山梔未通各一錢即針少商
 尤如背寒加羌活胃液加葛根栢枝
 汁亦可漱
 之
 指
 掌



風熱喉證治論

兩邊三四塊六脈洪緊用六味湯加
 梔一錢花元參二錢酒炒黃芩一錢山
 不換兼服八仙散
 發風熱喉感風熱而起滿喉
 細紅點根帶淡白舌下

飛揚喉證治論

飛揚喉因風熱上壅上膈
 紅腫氣不能通嚥物不下
 從小魚中飛揚滿口此係凶惡之症
 急針患上出血泄氣吹金不換用六
 味湯加連翹葛根黃栢山梔木通各
 一錢生石膏四錢一二服愈
 指掌

爛沙喉證治論

爛沙喉發于傷寒之後表
 邪未盡在關內腫爛右
 關脈急肺脾之毒可用六味湯半服
 加酒炒黃芩各二錢淡竹葉各二
 錢石骨河車各二錢五分葛根一錢
 連服三四劑如爛班不遇加黃三
 錢津化八仙散王樞丹每
 服五分三服可收功指掌

紫色虛喉證治論

劫起早服寒涼散也此症肺胃伏寒
 平而不可見此症認爲火症及用三黃
 甘之如見此症認爲火症及用三黃
 流犀角藥吃成症用三黃
 余凡見紫色之症不論名式喉間絕
 無形跡滿喉皆紫脈緩身原者用六
 味流加細辛五牙葛根蘇葉各二錢
 白芷川芎麻黃各一錢服後紫變爲
 紅換加鹽米炒元參消炒黃芩各二
 錢花柳一錢即愈

廉珠喉證治論


色赤而發其脈寸大痛此症因鬱積
 熱毒而下流之症也治宜清火用六味
 湯加鹽水炒黃芩山
 豆根生地鹽水炒玄參各二錢熟石
 膏五錢生山枝木通各一錢服一貼
 明日再加連香車各二錢紫地
 丁大熟地各三錢丹皮川連各一
 錢用金針一鐘製柏枝汁一鐘沖
 服皆妙吹紫雪金不換六七而愈

虛啞喉證治論

虛啞喉者喉間不腫兩邊
 關內少紅點聲啞不明
 牙關不開此內火外風之症因喜食
 酸滯之物肺氣不清故也用六味湯
 加細辛三分蘇葉二錢服一貼聲音
 不啞換加生地二錢丹皮二錢鹽水
 炒山枝一錢再二貼而愈
 粉一錢再二貼而愈
 指掌

聲啞喉證治論

但食米粥不能吃飯用六味湯加蘇
 葉麻黃各二錢細辛五分二服後麻
 黃蘇葉各減一錢再三日換加花粉
 真不活各一錢薑汁製平長一錢
 皂核二下粒訶子二錢半童便炒平
 生用倍梗五錢半童便炒平生用甘
 性五錢半童便炒平生用四
 症初起不可用藥指掌



外科集成卷三十一

喉單證治論

喉單因肝風鬱熱動氣而注
 關刃上部下垂根天頭小紅
 色大瀉先針兩邊患上出血吹金不
 換漱六味湯一服明且加柴胡鈞藤
 赤芍生地丹皮河車各二錢連素黃
 本酒炒禹蓮各一錢多煎數滾即愈
 指掌

外科集成卷三十一

修澤舍治頌

喉瘤證治論

喉瘤生於喉間而傍或單或
 雙形如圓眼大血絲相裹如
 瘰癧或名之此症肺經受熱多
 或痰中或高喉或肺經受熱多
 或酒或痰或高喉或肺經受熱多
 不痛須要飲神晏息以藥攻之則此
 症脫落矣不可用刀點破內服益氣
 疎風湯外屬香散吹之全書●喉痛
 症因惱怒傷肝或迎風高呼或本原
 不足或誦讀太急所以氣血相凝生
 干關內不時而發治宜調不養原之
 劑王樞丹地黃丸俱可常服難許速
 愈吹雌黃消痰藥霜造

外科集成卷三十一

喉癰證治論

有瘡名曰喉癰。陰虛咳嗽。肺花瘡。喉中痛者。必
 枯梗。甘草。不可用。冰片。吹藥。恐辛散。
 生魚鱗。刺也。難救。同。肺花瘡。喉癰。俗謂喉
 天患癰。刺也。難救。同。肺花瘡。喉癰。俗謂喉
 已枯。其喉上。有紅點。入上。升榮。血
 救者。死。勿。危。月。上。有。紅。點。入。上。升。榮。血
 炎。肺。金。太。旺。致。攻。牙。關。生。如。奇。至。火。上
 救。雖。不。至。喉。癰。命。久。則。咽。喉。失。音。而。不
 燥。初。覺。時。痒。次。生。苔。難。色。暗。木。紅。燥
 裂。疼。痛。時。吐。是。涎。妨。礙。飲。食。出。過。食
 炙。燥。藥。消。五。辛。等。物。以。致。熱。積。於。胃

外科集成卷三十一

胃火熏肺而厥斯疾五服廣筆鼠黏
 湯未清吹蔡精散已潰吹清涼散思
 者清心寡慾戒厚味發物或者十全
 一漫二若失治兼調理不謹致生微爛
 延蝕之狀多致不救金經●喉若蟻
 腎虛火旺發癰于喉不雁而紅上有
 班點青白不一如芥子大或豆大每
 點生芒刺入水太痛喉乾聲啞咳嗽
 無痰六脈細數者是用知柏地黃湯
 兼四物湯加麥冬鹽水元參女貞湯
 杞人參洋參俱鹽水炒淡黃湯每早
 服四錢五錢如服前每貼各三分煎冷
 服此引火歸原之法也玄武膏亦可
 服如六脈洪數恐難脫體吹紫書金

不換指掌●人有生喉癰於咽門之
 因以至喉痛且後必先作痒面紅耳
 熱血不可忍後則嚔唾隨覺乾燥必
 再加燕唾而後快久則成形作疼變
 為楊梅疔疔或疔或疔而為癰疾夫
 癰必有虫在咽喉之地此因腎水之
 耗以致腎火上升而肺金又燥兼治
 殺虫以治癰疔元參麥冬各一兩白
 掃也化癰神丹元參麥冬各一兩白
 蘇子日散廿三錢紫苑鼠粘子白芥子
 各一錢百部三錢水煎服二劑癰疔
 止又四劑癰疔盡成換用潤喉湯熟
 地各三錢冬各一兩薏仁五錢桑白皮生
 地各三錢煎服十劑癰疔俱除矣煎中
 再加茵桂一錢饑服為善後之計萬

舉萬全也
 時服膏子
 氣守戒一
 鼻孔俱爛
 不戴多有
 事此乃肺
 散治之月
 患嗽聲而
 喉閉聲啞
 漸飽鼻梁
 癰久不愈
 後方吹之
 一珠砂八
 錢珠一錢
 磁罐患者
 漱日吹三五
 次同茶汨

小兒每癰證治論
 聖藥小兒
 喉癰用碧
 丹吹不
 時服膏子
 氣守戒一
 鼻孔俱爛
 不戴多有
 事此乃肺
 散治之月
 患嗽聲而
 喉閉聲啞
 漸飽鼻梁
 癰久不愈
 後方吹之
 一珠砂八
 錢珠一錢
 磁罐患者
 漱日吹三五
 次同茶汨

胃毒小舌證治論

脉沈而洪大者真結毒也臨症者不
 可忽之亦有紅腫爛者治法亦同用
 十八味野藥同王樞丹每日一錢土
 茯苓每日用四兩煎湯代水多食為
 貴服二月後如不愈合箱毒紫金丹
 一料冲王樞丹同服亦用土茯苓湯
 送下早晚各三錢收功指掌

純白小舌證治論

滯右關之脈洪沈先用玉樞丹每服
 七分十服或五服再用生扶苓煎湯
 代水後用廣瀋藥二錢一服銀花湯
 送下如胃脈不沈反浮洪者作火症
 滑用六味湯加石膏三錢酒炒黃芩
 山枝木通各一錢車前子滑石各二
 錢葛根二錢二分天花粉一錢五分
 山豆根二錢三分二服此一症兩
 治之法也臨症必詳脈
 理然後用藥為妥指掌

積熱小舌證治論

硬日衣裏滿腫物不下右關之脈浮
 大者也用六味湯加山枝一錢連香
 酒炒黃芩滑石河車各一錢石膏三錢
 錢八分木通赤芍各一錢石開
 吹金不換後服玉樞丹
 二三服無有坏愈

積熱小舌因肝胃二經
 火毒飛騰所以小舌長

咽嗌痛證治論

地氣又日地氣通於嗌註云嗌謂咽
 喉下接連胃中肺葉之間嗌即咽之
 低處也咽即嗌者謂咽喉不能納唾與
 咽痛云益痛者謂咽喉不能納唾與
 食而地氣閉塞也云喉痺咽嗌痛者
 謂咽喉俱病天地之氣並閉塞也蓋
 病喉痺者必兼咽嗌痛者必兼咽嗌
 不能兼喉喉間氣逆而鬱為咽痛者
 客於喉間氣逆而鬱為咽痛者
 ●客於喉間氣逆而鬱為咽痛者
 結在上遂成咽痛脈必浮大重取必
 潛法此為近宜補陰陽參一味濃
 煎湯細飲之此證皆起諸方非徒
 者有之如用實喉痺證下諸方非徒

又陰喉民痛調鄒同根而髮既咽取一各
 曰之有病皆腫調珠妨直止懸非之兩咽
 嗌脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 中脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 腫脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 不脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 能脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 內脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 唾脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 時脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 不脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 能脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 出脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽
 唾脈二啞病皆腫盈珠妨直止懸非之兩咽

修澤舍活板

分百凡咽噲痛加陰醫草五何薑壽如無
 為藥白津網實竹虛以天用皆煎散丑益
 細煎晝極且熱瀝火雙花麥腎服加刺而
 末去晝極且熱瀝火雙花麥腎服加刺而
 每黑晝極且熱瀝火雙花麥腎服加刺而
 服皮晝極且熱瀝火雙花麥腎服加刺而
 一鵬梅又含山豆荷蜜置汁謂咽參
 錢砂和又含山豆荷蜜置汁謂咽參
 食甘吻同鵬砂或和膽細咽參
 後甘吻同鵬砂或和膽細咽參
 飲甘吻同鵬砂或和膽細咽參
 調甘吻同鵬砂或和膽細咽參
 潤甘吻同鵬砂或和膽細咽參

者刺然骨之前出血立日左刺右
 刺左入日邪客足先陰之絡令人嗑
 痛不可納養無故善怒氣上走貫上
 蟻屬刺足下中央之脈各三者凡六
 刺立已左刺右右刺左是也其二取
 平太陽經日少陽牛太陽之脈是動
 則病溢痛領腫視虛實寒熱陷下取
 之內經●咽中痛不可納食涌泉王
 之喉腫難言天柱主之喉痛
 瘖不能言天突主之甲四

傷寒咽痛證治論

伏氣之病謂平時暴寒
 中人伏於少陰經始不
 覺旬月乃發先發咽痛
 微弱在方謂之腎傷寒
 甘湯次用四逆湯主之
 八九日用上獨汗已不
 乾唇燥者此少陰散痰
 多兩得汗後未解傳入
 屬腎汗多則腎汁乾其
 潤咽喉故其病也如自
 足厥冷咽中腫痛不可
 唾及舌上乾者不治全
 寐者必陰也少陰病二
 與甘草湯不凝桔梗湯
 少陰客熱咽痛平夏散
 相搏咽痛平夏散及湯
 主少陰客寒

寒寸餘日已上病後頰滿咽喉痛舌
 捲而即縮者不治若寸餘日已上病
 不解傳變咽喉痛外症唇舌捲者
 此病屬厥陰經受病也難治咽
 痛無痰不治咽痛而唇捲不治咽
 喉痛而頭汗出不治口黑者難治
 鼻中塞者不治
 赤斑如錦紋
 赤小可治五疔疔疔疔疔
 毒疥身痛如被杖五日可治七日不
 可治疥身痛如被杖五日可治七日不
 云陰垂甘草湯至之雄黃蜀椒湯活久

婦人咽喉證治論

色在者此月經不調也經不能行則
 壅塞於上故咽腫痛也蓋由榮衛不
 和但男子以氣為主女人以血為主
 男婦各隨其氣血之分調治宜議榮
 湯可也如病勢重其色微白脚冷者
 此虛陽上攻宜服降氣湯探痰用水
 片散吹之全●婦人有孕心頭痛
 者不治或牙關緊強不得開心頭悶
 亂氣絕者可用皂角末吹喉中或婦
 人產前咽喉痛而脈浮者不出者自
 而目睛上視者不治
 不利心胃氣促四肢厥冷勿治
 仲胃弱紅甚舌捲面赤則止視者不

治血氣以心欲絕面紅勿治自利喘
 不洽手足厥冷不洽潮熱往來時發
 諸諾不洽胃腹脹急不洽喉中或雷
 聲或噎食不洽全書●婦人傷寒身
 發潮熱咽痛者此經行也治人書
 云婦人傷寒經水適來晝則明也
 則諸語如見鬼神狀此乃熱入血室
 無犯胃氣及上二焦不可下也
 胡湯主之冷咽喉痛而潮熱往來面
 赤唇紅者此邪上壅也不用小柴
 胡湯宜用竹葉石膏湯清上膈除心
 煩脈浮為妙次用四物湯同土除心

咽喉不利證治論

於喉間吞吐不利或塞或痛故言咽
 喉不利證原●療咽喉中痛不利用
 刀麻甘草炙鬼白射干丹參各一兩
 雄黃一兩否人射干丹參各一兩
 八味為末以酒服之亦得咽失聲不
 日三漸加之酒服之亦得咽失聲不
 利用良忌海藻菘菜●全●瘵咽喉
 不利方射于附子炮人參杏人桂心
 各一分石四味合搗下蜜丸如梧
 子含一分石咽汁日三夜一名下氣丸
 息猪肉本水同出●瘵口咽喉不
 利方當歸末二劑杏仁一兩右二味
 為末以蜜加為丸如梧子大二丸合
 漸五咽汁日三夜再名當歸丸合

喉節證治論

不其疾須三日漸上喉膈之閒吐不出
 喉中再服雄黃刺破後用膽硝丹吹入
 用四七氣湯連進五服再用冰片散
 吹之金氣●七情氣鬱結成痰涎隨
 氣滯聚堅大如塊在喉間或塞咽
 喉如梅核發欲絕避食飲宜四七湯得効
 男女或有曾喉問梅核者觸事
 勿怒飲食勿冷真梅核氣者宜
 得於咽食之間路不出下如梅
 按之狀走也始因喜怒太過積熱蘊
 隆乃成厲也發因致斯疾耳宜加味
 四七湯加味二陳湯皆鑿●論云喉

喉中應聲虫證治論

應聲虫每語後虫如
自物作聲相應者有
人敬誦本草至雷丸則無
聲乃頓服數枚而愈久門

喉瘖證治論

喉瘖乃勞嗽失音之類是也
 但喉中聲嘶而舌本則能轉
 運言語也
 滯而不發故瘖不能言
 聲嘶者此血虛受熱也
 用消痰蛤粉
 蜜調服之
 丹心●經云
 腎者音聲之關
 凡小兒卒然無
 音者乃寒氣客
 于喉則厥不能
 發
 若咽喉音聲如
 故而不能轉運
 言
 語則為舌瘖若
 舌本不能轉運
 言
 而喉中聲嘶者
 則為喉瘖此為
 風冷
 所客使氣道不
 通故聲不得發
 而喉
 無音也
 或因心經氣
 虛或因脾絡受
 風或因胃中積
 滯
 於脾之絡或因
 脾氣不足或因
 胃中積滯

氣不升皆足以致痞大抵此症亦有
稟父腎氣不足不能言者或
志之火遺兒熏閉滑道不能言者
或病津液耗損火傷肺不能言者
者有驚風中風不能言者遺熱與
津液耗者用益氣湯白朮散清氣不升
者用補中益氣湯白朮散清氣不升
傷肺者用六味地黃丸若仰腎咳
版體羸瘦且白睛多或兼解頤可欠
咬牙等症悉屬腎虛非地黃丸不能
救也立腎一遺精誤服參芪不能
升浮劑遂氣壅於上焦而痞聲不出
用童便浸透香附為末調服而疎通上
焦以治痞久附佐之為丸而填補下焦
知母香附佐之為丸而填補下焦以

治遺精十餘日良愈本州言童便生
久嗽失音故治痞多煎童便由童便
能降火故也升心平失音咽不出
陳皮五兩木三升煮取一升去查頓
服此方●冬月咽喉語聲不出者
細目●冬月咽喉語聲不出者
不出者●冬月咽喉語聲不出者
帝針經中說寒氣客於會厭卒然而
啞此藥主之●寒氣客於會厭卒然而
失音者●寒氣客於會厭卒然而
杏仁三分去皮尖熬另研桂一分如
沉和取杏仁大綿裹合細心咽之
五夜三服●寒氣客於會厭卒然而
氣湯去陳反加黃芩風寒失音者
桔湯加訶子散血虛入生地黃升潤之
或柯子散血虛入生地黃升潤之

肺九蜜脂煎尋常聲音不清者加味
 固本丸內傷風損咽瘡失音者無治
 法入月●舉兒感冒風熱攻通咽喉
 及痘瘡蘊熱上攻咽喉腫痛痰氣不
 順咳嗽失音者人參五錢桔梗蜜炙
 一兩甘艸半生半熟三錢不煎服成
 ●治失音以桂末着舌下燕屎一兩
 ●治風谷失音以紫梗煎茶根一兩
 研汁入酒和溫飲平蓋服無時
 ●治風谷失音和溫飲平蓋服無時
 而絞汁酒一大盞相和勻不計時
 候溫服半鐘同生●狐惑聲啞其證
 然目●欲眠目不能閉起居不安是也
 主之●瘖不能言合谷及涌泉陽交
 神門涌泉玉之●瘖不能言合谷及涌泉陽交

尸咽證治論

尸咽者陰陽不和脾肺壅盛
 虫發動上●蝕不痛或死如蠶之
 候也直●道家服藥務先去三蟲
 者以其為人害也尸咽之病亦本於
 此巢氏謂服中尸蟲上蝕咽能令
 生瘡善攝生者儻未能除去亦當服
 藥治之勿使妄動則毒矣●星●尸
 咽與傷寒一拾金●狐惑即虫症
 也如狐聽水樽不哭之義初起狀
 如傷寒或因傷寒變成其候四肢沈
 重欲食惡聞食氣欲眠中不能閉舌
 白齒晦面目色黃無常如食下即為
 心下唇有瘡其因啞殺大甚急者因汗

丁失丑邪熱入腹以致飲食少而腸
 胃虛也甚則三蟲舉而食人五藏食
 上節者三黃瀉心湯主之食下節者
 單苦參芩湯洗之食肛門外者用
 生又汁調雄黃末煨烟熏之通用黃
 連犀角湯治蜜核仁湯金液丹雄黃
 豎散入門●脈經云病入或從喉
 本飲土之咽或●從丁焦蝕其肛陰
 眠目不閉惡聞食臭不省人事半
 後又手足相強脈數而微細先
 瀝汗省人一服之忽胃中有汗腹鳴
 蓋汗飲之五六助而愈同上

狗咽證治論


溷之狀相似狙俗云誤不狗毛所
 消此病者以狙俗云誤不狗毛所
 所以謂之狗咽一搏飯其狗不食
 悉肺喉間氣結蘊積而下舌風熱
 於喉間氣結蘊積而下舌風熱毒
 之候俗曰此痰由誤食取差者禳
 法亦有將飯與狗分食取差者禳
 之法也●咽喉中壅悶氣塞不
 通狀如喉痺●咽喉中壅悶氣塞不
 通氣欲絕者馬牙煎風熱上攻咽
 喉忽覺結塞不通者馬牙煎風熱
 咽氣塞喘息不通者馬牙煎風熱
 蒜二枚煎去頭塞鼻中左思塞石
 石患塞左候甲膿血出立効聖

穀賊證治論

令喉裏腫結不通令風熱氣在於喉
 間與血氣相搏則生腫結如食穀賊
 者也故謂之喉中生穀賊不急治亦
 能殺人痛不通飲食妨悶如魚鯁不
 能腫下風熱加飲則結腫不消若不
 上療亦能殺人聖清●喉中疼痛刺欲
 急名曰穀賊此因誤吞穀芒刺在咽
 喉中痛不可忍用凡穀賊屬咽馬喉
 浮河分難用芝麻炒為末細吹喉
 之醫藥●穀芒帶咽門不能傳化
 改風熱●穀賊與血氣搏遂令腫刺也
 直指●穀賊衝咽喉兩頰上勝舌下
 暴腫嚥物妨悶疼痛用注凡石研末

外科集成卷三十一

修澤舍活板




少乃傳腫處以差為度有涎則吐之
 同上●又方馬牙稍研為末以綿裹
 半錢匙吞化燕津以差為度同上●
 又方以針刺破令黑血出後含馬牙
 確一少塊嚥津即癢且中涎灌
 麥芒下益毒能化穀也●
 之即下益毒能化穀也●
 芒粘咽不得出者箭頭草嚼嚥下
 ●又方白錫
 頻食同上

天絲入咽證治論
 凡露地飲食有飛絲之
 入食之令人咽喉生瘡

急以日餐巴豆燒
 灰吹入即愈本綱

諸物哽咽證治論

誤吞諸物若金銀錢齒
之類非病之自內然無
術以出之久則害人若
石出針皆意為之治不
藥治之主可謂用心精
● 吞諸珠蠟鉄而鯁方
內水中飲其汁立愈
一 能下乃命戴入戴人
一 策以淨白表紙令卷
一 縱橫亂割其端作鬚
一 著縛針鉤於其端令
咽甲輕提輕抑探之覺
之端不碍肌肉提之而
兒誤吞針靛喉不下兒
砂糖和黃泥為丸余兒



食之自出 錐目●竹木 又限咽出入
 不得者 致錐今燒赤 漬酒中反熱飲
 並得上 同●桃李 咽咽狗骨煮湯摩
 頭上服之 同●髮硬咽中用舊木梳燒
 灰酒服之 同●正髮●草石在咽不出用
 煎帶灰水服 一錢外臺●食中吞髮
 繞不出 又方取已頭亂髮燥作灰服
 一錢七

于內大腹而出 滯●喉吞針刺
 咽疼痛者 用亂麻筋 一團搓龍眼大
 以線穿繫 留線頭 在外湯淫急吞下
 咽頃刻 扯出其針 頭必刺入 麻中同
 出如不見 吞節再吞 磁石如出 為度証
 ●小兒誤吞 針用磁石 如吞核大 磨
 ●小兒鑽作 竅絲穿 命舍針自出 聖慮
 ●小兒誤吞 銅銹物 在咽喉內 不下
 用角燭根 燒細研 熟水調一 錢下之
 用上●鉄針 誤入咽 喉無藥 可施互
 用願取 數個將 頭刺去 倒坐流 血
 以益接之 得一盃 託鹿人 喉中移 時
 連針出 針自軟 曲金鑿 ●釣魚針
 勻入喉中 難出 先用木 錐撐口 次以
 糯米珠 煎集盤 珠樣 窮線 中扯直 厚
 出全●治錢 哽用 餘糖 一匙 漸

骨哽證治論

治之然有魚骨獸骨之分誤吞魚骨者用河中養蓄治鴨倒垂涎以磁盤接下會患人仰臥頻灌其骨盡化誤吞獸骨者用狗一隻倒掛按涎如前法頻灌其骨盡化俱効若失治咽喉慮痛潰膿互用冰硼散吹之不可矣服原藥若骨勢太甚與飲食難下餓倒胃氣者屬難救全愈●論日用藥之法有虎骨取於氣味時以意為用者若魚網虎骨之治骨鯁起也網能制魚乃魚之坑畏虎能火獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用之亦異矣至其●凡治哽之法皆以類推如鷓鴣泡與哽磁石治針哽髮

哽狸虎治骨哽用王簪花根八錢各隨
 所犯之肉為引煎湯服之轉出乃愈
 又諸骨治於咽下不能出者為龍
 蟻作丸龍眼大線雙頭處外用
 纒髮之推入咽內哽骨處其骨自
 頰下矣小片再推又存治諸骨哽
 王簪花根用乾飯燕之徐吐
 其骨自軟再用乾飯燕之自吐
 ●又萬王簪花根細取汁管灌喉
 中不可著齒則齒酥●魚鱧
 鹿角為末含津嚥下妙●魚鱧
 骨橫喉中六七日止不哽取魚鱧
 骨燒作屑以水服之則出未出夏
 竹木

簽刺喉中不下於膈月取鯁魚膽
 懸北簷下冷葦每魚鯁即取一皂
 許以酒煎化溫吞嚥得便吐
 卽隨頑涎出若未吐更喫溫酒但
 吐為妙酒卽隨性量力喫溫酒但
 煎一塊子無久痛黃瘦甚者服之
 在藏府中久痛黃瘦甚者服之
 出若卒求鯁與不痛黃瘦甚者服
 俱可臘月收之甚佳●魚鯁在喉
 皆下骨哽取一本皂子許溫酒化
 若得吐便出本皂子許溫酒化
 衆法不能去者取鯁糖心雞子黃
 大吞之不去又吞以糖心雞子黃
 効用●又方取虎骨為末服用得
 生七外●又方取虎骨為末服用得
 危刺不出●又方取虎骨為末服用得

秘此坊 聖藥 又方 猪牙皂角二條
 切碎生 細袋盛 滿線縛 項中立 消
 本綱 項下 爬之 亦可 煮竹 食之 者取 類
 足赤 骨哽 種樹 葉油 馬泥 勃之 破糖 三
 味熬膏 爲丸 噙之 累劫 日曬 乾骨 哽
 喉痛 用牛 屎上 生草 晒乾 爲末
 用砂 糖爲 丸徐 嚼之 吞下 仍用 砂糖
 爲衣 自然 汁根 牙同 在 吞下 仍用 砂糖
 搗自 然汁 濾去 渣查 服或 收晒 乾爲 末
 木和 法服 亦可 楮子 酸收 晒乾 爲末
 同方 橄攪 味濕 食久 煎甘 嚼汁 咽
 云可 立視 骨下 邵云 萱根 汁服 鹿蔥 也
 又名 宜男 固上 雞骨 髓用 水煎 羅蔔 徐
 切咀 之同 止 雞骨 髓用 水煎 羅蔔 徐

魚骨 鯁以 魚骨 不頭 立立 卽愈 下云
 警以 繩繫 沖繩 繩端 吞下 到鯁 白引
 柔以 繩繫 沖繩 繩端 吞下 到鯁 白引
 之懸 當隨 出 繩端 吞下 到鯁 白引
 上法 以茶 嚥下 引之 亦出 用韭 白如
 法用 綿一 塊以 蜜煮 用如 食法
 三反 覆擲 骨哽 仍取 所餘 者骨 左右
 手反 覆擲 骨哽 仍取 所餘 者骨 左右
 方解 衣帶 目窺 後立 出 骨 雜物 顛
 万好 蜜以 匙抄 稍吞 咽之 命下 同
 哽入 喉口 稱爲 則下 咽之 命下 同
 以綿 裹喉 口許 噙之 旋吞 燒烟 吸久 之卽
 出 綿裹 喉口 許噙 之旋 吞燒 烟吸 久之 卽
 卽吐 出 許吹 入鼻 骨哽 不出 者
 次皂 角吹 許吹 入鼻 骨哽 不出 者

解○又○春○諸○骨○髓○以○象○牙○末○吹○之○
 燈○心○以○竹○筒○填○滿○火○燒○取○
 同○心○又○方○弓○弦○槌○冷○頭○散○吞○引○之○
 又○出○生○靈○又○方○弓○弦○槌○冷○頭○散○吞○引○之○
 水○張○且○取○水○氣○哽○當○自○下○服○一○盃○合○口○向○
 方○白○芷○半○夏○等○芬○末○水○服○一○錢○
 嘔○出○木○半○夏○等○芬○末○水○服○一○錢○
 在○上○即○吐○出○在○下○即○吐○出○
 方○威○靈○仙○一○鐘○溫○服○上○一○兩○
 一○盞○水○一○鐘○溫○服○上○一○兩○
 蒜○塞○寬○甲○自○出○同○上○
 醋○煎○之○同○上○
 未○人○取○得○魚○狗○去○腸○用○陰○陽○瓦○泥○固○

汁○飲○之○骨○髓○以○象○牙○末○吹○之○
 用○金○鳳○花○子○嚼○爛○下○無○子○用○根○亦○
 好○用○上○治○諸○般○生○皮○數○升○水○酒○各○
 五○并○煮○取○四○升○稍○煎○服○之○
 骨○鯁○在○喉○即○以○沙○淘○砂○口○咀○嚼○咽○之○
 立○下○圓○服○又○以○沙○淘○砂○口○咀○嚼○咽○之○
 方○時○細○服○又○以○沙○淘○砂○口○咀○嚼○咽○之○
 本○時○細○服○又○以○沙○淘○砂○口○咀○嚼○咽○之○
 泥○每○用○龍○眼○天○如○被○雞○骨○化○所○傷○
 羹○化○下○如○龍○眼○天○如○被○雞○骨○化○所○傷○
 得○又○方○南○鵬○骨○魚○骨○哽○用○霜○梅○肉○槌○成○
 指○大○作○丸○將○綿○裹○用○線○穿○在○內○冷○
 茶○送○下○胡○梁○膠○攪○拌○在○牛○一○嘔○即○出○
 茶○送○下○胡○梁○膠○攪○拌○在○牛○一○嘔○即○出○

