

張公讓著

中西醫學比較

卷二

第一集

梅縣松口張公讓診療所發行

自序

醫學之目的在治病。治病之方術甚多。藥物也。針灸。劑劑也。以至於日光電療。精神等皆是也。而以藥物爲最主要。藥物因地域不同。隨時代而有異。古時民智未開。其藥物不及今日之繁博也。南方之土藥。北方所無也。況乎西洋相隔萬里。氣候物產。風土人情。皆與東土不相侔。其藥物之相異。亦必鑄也。然則自文化交流後。彼處相互融會。棄短取長。則其相異者必漸歸相同。中藥之沈香。丁香。胡蘆巴。訶黎勒。檳榔。紅花。胡麻。胡桃。胡椒。西洋參。皆昔日之西藥也。而吾國之當歸。麻黃。西人亦取之而去也。百數十年後。今日之中西藥將渾然而不復能分辨也。今世之妄分東西。嚴立門戶者。何漢所見之淺與所信之狹耶。

中藥發源自單方。即古人有病。隨意取草木金石之品以治之。治之得效。乃廣爲宣傳。後以一劑力薄。遇病情複雜者。合數藥以治之。此爲中藥治病進異之階段。數千年來。醫萬千醫哲之試驗研究。第良藥二三千種。蔚爲今日之本草。於戲。豈不盛哉。惜乎。宋元以後中醫誤入歧途。以五行。歲時。色。聲。香。味。解釋醫理約效。循至珍貴寶貴之中藥學。益焉墮入魔障。然而中藥之真價值。仍未失也。此則有待於後之學者。冠蓋戮理而發揚耳。

西方醫學。經昔亦無足稱道。惟自近世。科學昌明。乃大進步。藥物除自鑄界物品外。復挾科學之利器。從事人工製造。六〇六。大德盧。電銀膏。亞特平。皆人工製品也。而效驗非常。將來之進展。尙無涯涘。以視今日中藥之遵古法製。故步自封者。相去何啻霄壤。然中西藥物過去之成就。皆各有千秋。苟能拾短取長。一爐共冶。則今日之治療學。必更爲完善。枉死城中。亦可少添許多新鬼鬼。公讓治醫之日淺。且用力又不專。更無實驗室。動物試驗之設備。以爲研究之助。僅憑幾本參考書。及臨床所得。以論中西藥物。豈能管窺蠡測。祇上談兵之謂。然而值此世界大戰。干戈未戢。國環境醫求。西醫之欲研究中藥者。大有人在。中醫之欲研究西藥者。亦復不少。則此區區小冊。中西交論。明其約效。較其短長。未始不可爲其研究之引。講通之先導也。是爲序。

中華民國三十二年冬張公讓自序於松口平民醫院

中西醫藥比觀第一集卷二藥物篇目次

解熱劑

阿司匹靈 三
 藥胡 六
 獨母納 一三
 熊胆 一五

麥斯林 四
 荷荷 八
 抽龍 一三
 鹿角 一五

接骨木 四
 普勞 一六
 樹骨皮 一四
 羚羊角 一六

沙糖 四
 山梔子 一七
 牛黃 一四
 常山 一六

梔子 五
 再蓋 一七
 蘇葉 一四
 防風 一七

發汗劑

麻黃 一〇
 秦光 一六
 浮律 一八
 紫麻 一四

桂枝 一一
 烏俱 一三
 麩 一八
 薄荷 一四

荆芥 一三
 香薷 一三
 蘇活 一四
 獨 一四

解毒劑

示參 一五
 升麻 一八
 牛勞子 一九
 馬背 一九

金銀花 一七
 荷葉 一八
 蒲公英 一九
 綠豆 一九

蓮翹 一八
 紫草 一九
 山豆根 一九
 薏苡仁 一九

利尿劑

利 一〇
 一〇

洋酒	參一	澤瀉	參六	茯苓	參八	煎根	四一
醋殺神	參二	葶藶	參六	滑石	參八	大豆黃卷	四一
利尿毒	參參	陳蒿	參七	防己	參九	大腹皮	四二
咖啡因	參四	郁李仁	參七	木通	參九	白朮	四二
烏雞鱗品	參四	蜀葵	參七	鱧膚皮	四〇	蒼朮	四二
珀琥	參五	冬葵子	參七	轉金砂	四〇	爾莨草	四二
赤小豆	參五	瞿麥子	參八	石韋	四〇		
車前	參伍	茅根	參八	鄧蘭	四〇		
西瓜	參六	豬苓	參八	淡竹葉	四一		

下劑

油類下劑	肆七	植物性下劑	肆八	硫黃	肆九	大戟	五一
蓮麩子油	肆七	大黃	肆八	鹽類下劑	五〇	芫花	五一
巴豆油	肆七	蘆苈	肆九	鹽硝硫酸鎂		續隨子	五一
火麻仁	肆八	金屬下劑	肆九	鎔錫鹽煨制鎂炭酸鎂		麩牛子	五二
鱒鹵石蠟	肆八	甘汞	肆九	甘遂	五一	射干	五二

祛痰鎮咳劑

(一) 養解性祛痰劑 53
慮遠……………五七
前胡……………五九

麴曲香檜……………五叁
甘草……………五七
沙參……………伍九
蒜頭……………六一

鍾靈……………五肆
檳榔……………五七
錦覆花……………伍九
沒藥……………六一

(二) 潤燥性祛痰劑 54
枳實……………五八
紫苑……………六〇
茴香……………六二

吐根酒……………五肆
五味子……………五八
百部……………六〇
良薑……………六二

(叁) 順咳劑……………五肆
桔梗……………五八
桑白皮……………六〇
竹瀝……………六二

紫霞可待因……………五五
麥門冬……………五八
天門冬……………六〇
天竹黃……………六二

陪節散……………五五
良母……………五九
馬兜鈴……………六一
枇杷葉……………六二

(肆) 潤肺劑……………五五
款冬花……………五九
杏仁……………六一

胃腸劑……………六三

小蘇打……………六伍
次水楊酸鈉……………六七
黃栢……………六八
三棱莖朮……………七〇

瀉……………六伍
黃連……………六七
牛黃……………六八

次水楊酸鈉……………六六
龍胆……………六七
厚朴……………七〇

次沒食子酸鈉……………六六
胡黃連……………六八
葛蒲……………七〇

強壯劑……………七一

概……………七一
鐵……………七
黃芪……………七
人參……………八

糖黃……………八二

杜仲……………八肆

益智……………八伍

桑寄生……………八六

胡鶴……………八叁

補骨脂……………八肆

芡實……………八伍

活手藤……………八六

阿膠……………八叁

肉桂蓉……………八四

菟絲子……………八伍

仙茅……………八六

鹿茸……………八二

蛇床子……………八伍

山茱萸……………八伍

巴戟天……………八七

山藥……………八三

遠肉遠志……………八伍

栝子仁……………八六

象齒鱉甲……………八七

狗祀子……………八肆

蔓荊子……………八伍

何首烏……………八六

興 奮

劑……………八七

毛皂黃……………八八

咖啡國屬……………九二

附子……………九五

辛夷……………一〇一

斯托洛香汀……………九一

腎上腺素……………九二

皂莢……………九八

韭……………一〇一

海蔥……………九一

馬錢子……………九三

蟾酥……………九九

樟腦……………九一

酒……………九肆

吳茱萸……………一〇〇

麻 醉 鎮 靜 劑

……………一〇一

鴉片劑……………一〇二

以脫……………一〇肆

阿托羅平……………一〇六

鈉巔鈞……………一〇八

溴化鉀……………一〇三

抱水格魯兒……………一〇肆

辰砂……………一〇七

白芍……………一〇八

苛卡因……………一〇三

酸量仁……………一〇伍

白芷……………一〇七

赤芍……………一〇九

哥羅芳……………一〇肆

龍腦……………一〇六

天麻……………一〇八

延胡索……………一〇九

綱辛……………一一〇
 牛膝……………一一〇
 乳香……………一一一
 續斷……………一一一
 五加皮……………一一二
 草薺……………一一二
 威靈仙……………一一二

調經劑

得歸……………一一六
 桃仁……………一一八
 川芎……………一一七
 紅花……………一二〇
 香附……………一一八
 艾葉……………一二〇
 丹參……………一一一
 烏參……………一一八
 牡丹皮……………一二〇
 乾漆……………一一一
 益母草……………一一一
 茜根……………一一一
 麥角……………一一一

虫類藥

蜈蚣全蝎蠶絲蠶頭蜈蚣等……………一一三

補遺

三七……………一二肆
 烏賊骨……………一二六
 鐵粉……………一二伍
 蕪黃……………一二六
 竹茹……………一二伍
 白芨……………一二六
 伏龍肝……………一二七
 訶子……………一二八
 鱉板……………一二伍
 魚便……………一二七
 五靈脂……………一二八
 石榴……………一二八
 槐花……………一二八
 五倍子……………一二六
 荷葉……………一二八
 槐花……………一二八
 白頭翁……………一二九
 罌粟殼……………一二九
 地榆……………一二九
 代赭石……………一二九
 白附子……………一二九
 天南星……………一三〇

穿山甲	一二九	烏梅	一三三	紅降汞	一三七	山道傘	一肆〇
粉砂	一三〇	扇蓄	一三三	黃降汞	一三七	醃漬	一四二
雞冠菜	一三〇	麝香	一三三	柳酸汞	一三七	銻養粉	一四二
蕪荖	一三〇	葱	一三三	由降汞	一三七	醋酸鉛	一四二
土伏苓	一三〇	御清昆布	一三肆	紅色流化汞	一三七	硫後銻	一四二
木賊	一三〇	夏枯草	一三肆	水銀膏	一三七	醋酸銀	一四三
豆豉	一三一	蒼耳子	一三肆	礬劑	一三八	蛋白銀	一四三
桑葉	一三一	木瓜	一三肆	礬化錒	一三八	龍銀膠	一四三
淨小麥	一三一	龍骨龍刺	一三肆	硼酸	一三九	明礬	一四三
青黛	一三一	牡蠣	一三五	魚石脂	一三九	石灰水	一四三
大楓子	一三二	石斛	一三六	石炭酸	一三九	硫酸銅	一四四
檳榔子	一三二	水銀劑	一三六	黃礬	一四〇		
香楝子	一三叁	甘汞	一三六	鎳化錒	一肆〇		
便君子	一叁叁	昇汞	一三六	錒錳酸錒	一肆〇		

解熱劑

體溫之發生由於食物之變化及身體之活動，而其去路則爲肺及皮膚及大小便。神經中樞以調節之，體溫得以保持攝氏三十七度（華氏九十八度六分）之度。不變更，若病則體溫上升，是曰發熱。

發熱之原因爲體內侵入異物菌毒等刺激體溫中樞之故，有謂爲直接刺激肌肉及臟腑器因而增加新陳代謝者，並非是，驚恐羞恥癩癩亦能發熱此爲神經受刺激之明證也。菌毒之強弱與發熱非成正比例，如破傷風菌，毒力雖大，病人不發熱，以無毒細菌之培養液注射人體反發熱，是其證也，又各人之感受性亦不同，甲受之發熱者乙受之未必發熱，發熱之原因複雜如此，發熱之現象爲新陳代謝之旺盛，熱高，脈數，呼吸迫促，口渴，尿短亦，甚者皆譫狂妄，體內之脂肪，糖質，蛋白質燃燒劇烈，病人日見消瘦，（中等熱持續八週可消耗而死），解熱劑即對發熱而成立，或謂發熱有利於病情者，因發熱爲菌毒入侵之警號，猶敵國之入侵，本國乃全體動員以抵抗之，發熱即動員之警笛也，發熱時可以增高血液之循環作用，如軍警之白血球復大量出動以禦敵，其爲有利明矣，然高熱持久，體蛋白消耗過甚，隨高熱而來之狂燥煩渴失眠，於健康又復不利，健康已不能維持，則抵抗力必隨之而減，此則解熱劑所以



必用矣。

解熱劑今所知者爲二種，一爲安靜調溫中樞者，如阿斯匹靈之類是，一爲減低新陳代謝者，如規寧之類是，二者皆於發熱時無解熱作用，於發熱時始能奏效，然於發熱病之初期，熱度正上升時或熱積留時亦無效，須在其後期發現弛張時或漸降時始能奏效，俗語云無進醫病頭，有進醫生醫病尾，蓋即病之初期解熱劑無能爲力，病之後期始能奏效也，俗語誠爲確評，又解熱劑無愈病作用，非熱退後病即愈也，湯寧奈斯，瘧疾（規寧之治瘧非用其解熱作用）用解熱劑熱雖退而病復，於病情無大補，不過可減少病人之痛苦，節省其精力耳，節省其精力體內可以多產生抗病能力，（自然療能）亦於病情有利，惟輕病如感冒等用解熱發汗劑可以縮短其經過，謂全無利者又非是。

(一) 安靜調溫中樞之解熱劑

此類藥有共同作用數點

- (一) 解熱，此類藥有麻醉中樞神經作用，尤以麻醉調溫中樞而奏降熱之效。
- (二) 止痛，此類藥因能麻醉中樞神經，止痛作用甚強，凡頭痛，身痛，傷風，感冒，發熱，疼痛，皆能止之。

(三)發汗，此類藥能擴張肌表血管，奏發汗之效，發汗可幫助解熱（然以阿托羅平止其發汗，亦能解熱，止瀉，故發汗非解熱之必要條件），

此外此類藥有麻醉作用衰弱心臟，并能使病者安睡，因其能解痙攣，故能止痙攣性咳嗽，（安知必林可治百日咳，惟阿斯匹林能刺激延緩中樞，及呼吸中樞，令起痙攣及呼吸困難，但有時阿斯匹林治咳嗽甚佳），

屬於此類之藥物為安知必林，阿斯匹林，波拉美同，菲拿西汀等，中藥則頗難摘舉，羌活，獨活，桂枝，麻黃，荊芥，防風，秦艽，薄荷等為發汗劑，非解熱劑，其似能解熱者乃其發汗作用耳，汗出可以散熱也，（其中惟防風據化驗報告稍能解熱），故用為解熱時，須加石膏黃芩等解熱劑，如麻杏甘石湯等否則其解熱力不大。

(二) 減低新陳代謝之解熱劑

新陳代謝旺盛則產熱過多，若皮膚肺臟不增加其放熱作用，則發熱矣，若所放不敵所產，亦發熱，此類藥可以規率為代表，彼等能安靜調溫中樞，但其力量遠不及安知必林之類耳，中藥則參胡知母石膏黃芩骨皮等似屬於此類，今將各藥摘要分論之，

阿斯匹林

ASPIRIN 即醋柳酸為白色粉末，味酸入口不呈作用，（有收胃之弊，拜耳出品較佳），平腸遇腸液始行分解吸收能解熱，（麻醉調溫中樞）止痛，

(麻醉腦神經中樞，使知覺麻痺不知疼痛)，治關節風濕，肌肉風濕，其他凡發熱身痛頭痛，經痛，喉痛，氣管炎，感冒皆可用之，用量一次〇・五——一・〇一日三次，

安知必林

Aspirin 為白色粉末，解熱止痛有卓效，功勝全者，凡風濕頭痛經痛皆可治之，并解痙攣如喘息及百日咳由於氣管枝痙攣者，撒佈於局所有止血

之效，用量一四〇・五——一・〇一日可服三次，虛弱及小兒老人遞減，

彼拉米同

Pyramidon 本藥為白色粉末，解熱止痛似安知必林而勝之，有安睡作用，病人熱高煩燥者服少量即能退熱止痛安睡，余最喜用之，用量〇・二——

〇・五平常〇・二既足，一日可用三次，拜耳出品加管即本品與Zonalin等分混合製劑，退熱止痛極佳，余在中山大學附屬醫院時，一中年婦人患慢性胸即風濕痛劇，不發熱內科主任柏爾諾一次用〇・六、一日二次竟於二日內愈之，但大量宜慎用，有致虛脫之虞，若熱病後期則〇・〇五既能發汗退熱，

上列二藥若合咖啡因，二則止頭痛之功更大，(因咖啡因能擴張腦血管，解除其痙攣也，

沙羅

SALOL 為白色粉末為六分柳酸與四分石炭酸合成有解熱止痛消毒制酵之效，在胃不

勝脫炎腎盂炎淋疾霍亂腸炎血疰病神經痛及腸熱有卓效，局部用為漱口劑，與黃標等分混合

爲外科撒布料，用量○。五至二〇一百三次，

以上四種西藥解熱劑爲最常用者，其他解熱藥甚多，但類似之，今不多介紹，欲知其詳請選讀西醫藥物學可也，中藥之麻醇調溫中樞之解熱劑，無一勝西藥者，今人以爲麻桂羌獨似之，實乃發汗劑耳，無解熱作用也，

規寧

Qinine爲一種樹皮製品，能殺瘧原虫及解熱，故除治瘧外其他發熱病皆可用之。（但本品是否直接殺瘧原虫，抑爲刺激身體生一種抗體而殺虫，尙有問題，中山大學

藥物學教授德人范爾朋曾言之），

規寧殺瘧原虫爲專殺方破血球而出之小原虫，若其長大及有性生殖體則不能殺之，故服規寧須於瘧發前二四小時服之，（服常山亦如此，故常山之功用頗似規寧，）待吸收入血後，小瘧原虫方破血球而出，即破殺滅，（注射則瘧發前一小時之可也），其解熱作用在滅低熱陳代謝，減少體溫之來源，但亦能安靜調溫中樞，惟遠不及安知必林屬耳，熱正高及稽留時，則無效，此須安知必林及柴胡也，（柴胡用於寒熱往來即弛張熱也），

本品治惡寒用靜脈注射○。五至一。○有卓效，雖在高熱昏譫危急時亦可行之，惟注射時須極慢，且病人須臥床否則有虛脫之虞，若心弱則先用強心劑，無須用阿特平及撲滅母星也，（海危時阿特平無效，反不如靜脈注射規寧之能建奇功也），

濕寧除痰治解熱外，又可治頭痛，風寒痲濕之疼痛，及神經痛此由其能澀弱知覺中樞之感受性也。

本品雖能安靜中樞神經，但能刺激呼吸，胃腸黏膜，膀胱黏膜故患腦膜炎，胃腸炎，膀胱炎者忌之，又能收縮平滑肌，臟器，如婦人服之有收縮子宮致下胎之危險，此時加溴劑或鴉片酒則可免此弊，（好癩婦患癩以用擦癩母星阿特平爲佳）。

百日咳由於迷走神經之興奮致氣管枝痙攣者本品能麻痺之解其痙攣也。

本品味辛少毒能刺激胃黏膜分泌胃之液（苦味能胃劑）但多搽則刺激胃粘膜炎，合砒鐵同用則爲補劑，但令經膈遠不及其價值也。

紫胡

本經謂主心腹痛，去胃腸結氣，飲食積聚，寒熱邪氣，推陳致新，吉谷東洞謂主治胸膈苦滿，治寒熱等症，腹中痞，脅下痞，利彬先生動效試驗，謂紫胡對因

大腸菌引起之瀉瀉增高有解熱作用。觀以上所述及余所經驗，知紫胡有解熱作用。此或由於其鎮靜調溫中樞也，但能否減輕新陳代謝則不明。又因其鎮靜中樞神經，能減低知覺感受性，故治頭痛腹痛及其他中醫所謂肝氣者皆效，（消痛散以紫胡爲君藥加川芎白芷于鹿治頭痛有卓效），東洞爲云本品主治胸膈苦滿，時賢章太炎先生等以爲含毒液之滯滯，實非是，蓋淋巴管與血管猶大溪與小流耳，互相纏繞者也，發熱病新陳代謝旺盛，而腎非深，何

致稠鬱滯淋巴液，若謂胸管（巴淋管）發炎，則其症不難胸為苦悶已也，今其所言乃空
洞之臆想耳。時賢震於章氏之文名，一唱百和，殊無謂也。在我推測，胸管苦滿或為肺部受
而現像，胃炎亦有此現像，蓋胃部神經經過於胸管，胃有病胸肺部當覺苦悶，此猶胃腸下垂
，刺刺膈膜，反射的覺為胸痛是也，人身構造甚為複雜，某處疼痛其病緣常不在某處，凡解
熱藥皆有鎮靜作用，余經驗柴胡能止痛及解滑不肌之凝滯止痛既如上述，解凝滯則為解子宮
凝滯，及胃腸凝滯，月經困難之由于宮凝滯者得柴胡劑可以緩解，如柴胡四物湯是也，胃腸
凝滯亦常有因柴胡者，千金方治瘕瘕因柴胡，治月經不通因柴胡可以証之，（瘕瘕多由胃腸
或子宮之暫時凝滯，非必為病腫，若直痛隨即柴胡不必治之），及柴胡大量劑刺激腸粘
膜致瀉下，此不知其由何種作用，茲以章次公文於下，一宗人太史先生之病人有病經閉者，
一老醫傳一方，柴胡半斤分數次服，病人以一周二履經稍不行，遂并其肝餘者頓服之，瀉血
幾升，（公曰按此瀉血必有腸出血非子宮出血也），幸參湯得免。吾自聞先生之說欲試諸貴
驗，會記字會來一病人，名吳文仁者，患腎虛水腫。日服藥水之劑如茵黃等，漸次減退，吾
一停上下藥，令服柴胡二劑，凡一日，腫之水消，但不如確黃所瀉之多而已，觀上記可知柴
胡有瀉下作用，一經謂推陳出新者其即此也，章近於中毒歟，

柴胡湯，治寒熱往來，心煩喜嘔，或腹中痛，小便不利，柴胡 黃芩 半夏

黨參 甘草 大棗 生艾 上方去熟參 甘草加枳實赤芍大黃由大棗胡協治小柴胡湯症而須

煎下者 煎法初水大棗胡湯之使用實較小柴胡湯爲多，

四逆散治小陰病四逆（手足厥冷）其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重柴胡只實芍

湯甘草用量二三錢至七八錢，

石膏

天然礦質其成分爲硫酸鈣含二分子水 $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 若以火燒之則二分子水失

落屏量極微，生石膏煨者容解量較多，（煨石膏入水取回水分子仍可變成生石膏），所以
煨石膏入煎劑不可以爲分量大小爲標準，應以水之多少爲標準，如以二碗水煎一錢石膏，實
勝於一碗水煎二兩石膏。因前者溶解量多，後者溶解量少也，然而今日醫生處方皆以石膏之
分釐計其效用 而不顧及其溶解量，此亦宜改正者也，若照其粉末則較爲準確，大約服其粉
末五分勝於煎劑一兩，關於此點，余未有精密之計算，將來再研究發表之，

石膏爲硫酸鈣，吸收收入血後必變爲硫酸與鈣二伊洪，其變化是否如此，抑尚其他，未經精密
之化驗，余不敢妄測，不過以理度之必爲如此，鈣伊洪有增強心臟、收縮、及促進血液澆固
之作用，又能減骨格肌之興奮，故於痙攣性、痙攣質、緊張過度等病有效，如煩躁狂暴者石
膏有鎮靜之功，鈣質有減少血管之透過性而消散炎症之作用，故能治疹斑、蕁疹等病，惟對

於腎臟排泄含氮素物不充分者，因能藏血管之透過性不無促尿毒素之發生，故鈣鹽於此時爲禁忌，

以上所錄爲鈣鹽之生理作用，依余臨床觀察，石膏之作用亦正似此，然尚有一極主要之作用，卽解熱作用也，其解熱似在減弱新陳代謝，減少體溫之來源，凡煩躁狂渴脈洪大尿短赤卽新陳代謝旺盛者，得石膏而緩解，可以知之，然似又能鎮靜腦中樞神經，因治高熱時之頭痛如做者如神也，

回憶十餘年前，家母遠行受暑，高熱狂渴，昏不知人，頭痛如做，余與家父商治，皆主竹葉石膏湯，每劑石膏一兩，日進兩劑次日卽愈，其解熱治頭痛有如此者，石膏一物歐美尙不知有用，且忽視之，故其在體內之變化，尙無研究報告者實一憾事也，然在吾國數千年來用爲重要之解熱劑，其效驗無可疑也，然石膏對於熱正上昇及熱稽留時亦無效，腸壅扶斯前二週之高熱，石膏無能爲力（若用坎拉米端或安知必林則可暫時退熱，卽此之暫時退熱，中藥無一能及之者，故余曰安靜調溫中樞劑，中藥不及西藥），

余經驗石膏對於惡寒之昏譫甚有效，卽熱退而神識不清時，石膏亦甚佳，同事老醫李業賢先生極善用石膏，凡惡寒愈後神識不甚清明，口微覺乾燥者，皆用之有效，石膏對於腦神經作用似甚大，余願不得其解，今苦思得一解答如下，當否則尙待科學之證明也。

餘皆諸病皆隨代謝旺盛，體內常發生過量之酸，如尿酸、硫酸、磷酸、乳酸、尿酸等，酸質過多則致酸中毒，此時若者除質以中和之，則可以解除，石膏之鹼性中和其酸質歟，（石膏亦爲鹼性類，湯本求真則稱之爲鹼，似不妥當，此或湯本之過，今仍作鹼質論，然恐不能成立也），物有相對而毒有某種作用歟，相對神經有某種作用歟，此皆爲未解決之問題，然其皆治癆瘵劑事實也。

石膏強心之說（因含鈣質）服錫鐵質鐵糖陸潤常諸先生倡之甚力，惟譚次仲先生反對之，余則同意譚先生，余經驗服石膏後，多虛而持久有衰疲之感，十年前，余癩病在家，一次牙痛自擬玉女煎服之，每劑石膏一兩服三四劑而愈，嗣後步行無力，當時不自知爲何故，以後始悟爲過服石膏也，又一友告余云，彼服石膏後即成陽痿，間有脚軟者，譚先生謂石膏爲衰弱心臟之猛劑，余則以爲減低細胞之活力與體力也，時賢謂爲強心者，豈得無誤，

石膏除治高熱皆善頭痛狂渴尿短赤外，又可爲消炎藥，如牙齦炎之腫脹疼痛者，服石膏可以消炎退腫，氣管枝炎肺炎白喉服石膏可以頓挫炎勢，如席香甘石湯是也，湯本求真頗稱用石膏治糖尿病，謂能減低血液中之酸度，促進糖質之燃燒也，惟未知是否，

煨石膏有偽爲真珠者外用有吸濕收斂作用，和他藥治皮膚炭瘡等有效，

（單方）水瀉腹中雷鳴，熱如火者，石膏糊丸如梧子大，以丹爲衣，米飲下二十九良效，（

公讓按急性腸炎之水瀉發熱者，余經驗石膏甚佳，蓋有止瀉消炎作用也，但虛寒者太忌。婦人乳癰初發每服石膏三錢溫酒下，再服即散，陽火灼傷，石膏末敷之佳。

白虎湯治脈洪數，大渴，大汗，大熱者，或難以轉側口不仁而喘噤語地尿即汗出者，石膏知母 粳米 甘草 口渴舌枯黑或久病者加人參（今多加洋參）名人參白虎湯大熱骨節疼痛而嘔者加桂枝名桂枝白虎湯，

竹葉石膏湯治傷寒解後虛少氣，乾嘔，氣逆，欲吐者，竹葉 石膏 半夏 人參 麥冬 甘草 粳米 用量三——三〇，

黃芩

據比利彬先生實驗報告謂（一）能增加血糖（二）有利尿作用（三）對於 *Organism* 所引起之體溫增高有解退作用 本經謂療痰熱，胃中

熱，小腹痛，消穀，利小腸，女子血閉，淋露，下血，小兒腹痛，根據仲景的用法黃芩多用以治胃腸粘膜炎，後世則喉炎，氣管枝炎，肺炎，皆用之，其有消炎作用似無可疑，但其解熱作用是安靜調溫中樞，抑壓抑新陳代謝，則尚無詳確之報告，或二者兼而有之，本品有利尿作用，時醫多忽略之，

黃芩清肺飲，治渴而小便不利黃芩梔子各三五錢水煎服，
黃芩芍藥湯治衄血，熱痢，腹痛，黃芩 芍藥 甘草，

黃金丸治小兒吐血，衄血，下血，黃芩一味膽末煉蜜爲丸，雙湯下，腸風下血湯，治便血，槐花一〇黃芩三，用量一—三，

山 梔 子

今中醫多用以治失眠，衰弱性神經衰弱的失眠，以棗仁爲主，但熱性病的失眠，則以梔子爲主，大約梔子主治腦充血，腦神經過度興奮之失眠，族人某喪愛妾，六七日夜不睡，衰弱甚余初用酸棗仁湯棗仁用至一兩數劑無效，後改用梔子黃芩黃柏黃連一劑而得睡，是乃悲傷過度大腦過於興奮以致失眠也，梔子芩連之類能安靜腦神經，給安眠劑余經驗中無不及而藥，如臭劑，抱木克羅拉耳，Chloralhydrate 阿特靈 ADALIN 有等卓效，

梔子在安眠之外，又能止血，衄血吐血尿血便血皆有效，有單服梔子一兩以止衄者，此恐爲降低血壓之故，血壓降低則血行緩爲和緩，又或能擴張內臟血管，減少頭胸四肢血氣，凡此皆爲止血之要件，中醫謂能治上焦煩熱者，亦在降減低上分血氣也，

梔子有無解熱作用，不得而知，但似有局部消炎作用，十二摺腸炎性黃疸、有用梔子以消炎退黃者，（梔子色黃中醫多用如胆汁色素之物以退黃疸，如茵陳黃柏之類甚奇），

梔子因湯治身熱虛煩不得眠反覆顛倒心中懊惱 梔子 香鼓各三五錢煎服用量三一—二〇，

三三三

中醫謂爲退熱之最和平者，蘇派醫多用以代柴胡治療，嶺東一帶則不喜用之，惟多用以治虛勞骨蒸，大約此藥含揮發油，有發汗利尿作用，本藥其通經閉治白帶痛，風者豈能緩解子宮痙攣，減少炎症分泌乎，又云能治咳嗽，喘息或能鎮靜氣管枝痙攣也，生搗敷金瘡能止血，外用洗瘡疥殺虫，虛勞寒熱骨蒸盡便製爲末，烏梅湯下，用量一——三

知母

本品合石膏成白虎湯，爲有名之解熱劑，咳嗽勢熱骨蒸煩渴多用之，又能治水腫，按經利彬先生之化驗報告謂（一）對於由大腸菌引起之體溫增高，是顯著解熱作用，

（二）中等量能麻痺呼吸中樞，及使血壓下降，大量則呼吸停止而死，（公讓按廣州中醫用知母有一劑用一兩者，未見是麻痺呼吸中樞作用，其所謂中等量及大量未知指幾何而言，然知母多用二三錢，仍用其小量也，余經驗氣管枝炎肺炎黃芩知母皆可用，大約是二藥能消炎利尿也，）（三）中等量能使心臟麻痺而衰微，大量則心臟停止活動，（按據此則知母有衰弱心臟作用矣，其解熱作用，或以減低新陳代謝乎）（四）對於血糖無作用。

據上述化驗報告，則知母能解熱消炎和水，但能衰弱心臟，虛症忌之，用量二——五

用藥

即蚯蚓，西醫少以動物入藥，中醫則多用之，鄉人遇小兒發熱，輒以本品煎服，或用蔥薑煎服甚效，此類虫類有解熱作用甚奇，日本更有用本品抽出物製成注射劑用，於解熱者，本品除解熱外又有利尿作用，治淋病及小便不通，療用海藍頭磨之，耳道

剉燒灰，油滴入，甲量二——五

地骨皮

爲茄科苦犯之根皮其實曰枸杞，有解熱作用，治骨蒸勞熱，有一次單服四兩以治瘧者，此恐用其解熱作用不啻殺瘧虫也。

地骨皮 治骨蒸壯熱肌肉瘦瘵夜多盜汗，地骨皮 柴胡 只壳 紫菀 饅甲 知母 當歸各等分（按此方治肺癆發熱盜汗甚佳，而似愛爾那巴³。之有時勝之）用量三——五

牛黃

爲牛之膽石今山羊及羚羊之膽石亦謂之牛黃且多偽品可治驚風（痙攣）止癇，鎮靜，解毒，解熱，其約有安靜，鎮靜作用，據日本的研究報告，胆汁有造血機能，與免疫作用，初生兒嚙口不開，牛黃五分，以酒灌服，小兒腹瀉兩手緊握額有汗液，泣者牛黃大豆許爲末乳調服，小兒百病狂癩寒熱均宜用之。

日本明治十二年時明治天皇之一唯子，幼時多病，常患痙攣（驚風），百藥無效，群醫束手之際，遇有漢醫田宗伯進牛黃，以蜜治其疾，用量〇，一——〇，五

猴棗

爲猴之胆石功用頗似牛黃，用治癆瘵，熱痰，肺炎之發熱者似能制止氣管枝分泌，并有解熱作用，滑膜塗癰疽，膿瀝，痰核，橫痃甚佳云，用量二至三分此外有所謂豪猪果者，豪猪之胆石也，其作用大約皆在解熱鎮靜及制止肺泡氣管枝分泌，故用治咳嗽，排痰，開治腸壁扶斯可以縮短其經過，未知是否，用量同猴棗。

熊胆

爲熊之膽囊，藥用其汁，與牛黃猴棗等有相似之作用，本草謂其性寒涼心平肝，明目，殺虫驚癇，癩癧，癩癧，心胸痛，大約本品有鎮瀉，鎮痛，消炎，解毒等作用，（單方）眼結膜炎本品搽水點之，喉痛發熱本品浸水塗之，痔疾浸水外塗，（上三例消炎）小兒急驚風，瀉瀉卒倒本品水化灌之，冬瀉本品五分水化用辰砂五分送下（上三例鎮瀉）心腹卒痛，本品水化服（鎮痛）用鼠○，一——○，五

犀角

爲犀牛之角今藥用多以牛羊角僞充之，黑者曰犀角，白者曰羚羊角，用時宜求其真者，本品含炭酸石灰，磷酸石灰，膠質等，或謂其有效成分爲硫化硫酸，今中醫多用爲解毒解熱止痛劑，嶺東民俗凡發熱病皆磨犀角服之，（嶺東與南洋交通發達，由南洋寄回真犀角不少）余詳察其解熱作用，可疑，或謂其解毒作用甚佳，血中毒而高熱狂言身有斑疹者，（癩疹爲血管中毒）用之甚效云，但此恐爲其所食之鈣質作用，蓋鈣質能強心臟低血管之滲透性，減少血球遊走於血管之外，（消炎）其消斑疹治疥癩或即此作用，其治吐血者或亦鈣劑作用也，（鈣能凝固血液）中醫視爲解血毒，（葡萄狀球菌或聯鎖狀球菌中毒）之神品，可疑，若與西藥百浪多息，大停風，電銀膏，相較，則恐不如獲甚也，然亦各有其特長。

（單方）小兒驚癇，天吊，直視，犀角濃磨服，（按似此則犀角鎮痙作用甚強），產後惡血

衝心，(血毒症)犀角磨汁沖陳酒服。

犀角地黃湯治吐血而下面血，血高熱斑疹狂語。犀角 地黃 丹皮 赤芍(斑疹狂語可加石膏紫草元參牛蒡子連翹紅花)。

消毒犀角散治發斑癩疹，咽喉疼痛。犀角 牛蒡子 荆芥 防風 桔梗 甘草 元參 連翹

卜荷用數三分至一二錢

羚羊角

爲羚羊之角，今藥舖多偽品，前人稱氣熱用羚羊，血熱用犀角，然其同爲角其成分頗多相同，故其作用亦多相同也。本品以鎮痙攣著稱，大約能鎮靜中樞神經，凡癩癩或大腸皮質，受剌激而發生之痙攣，皆可治之，又可用以解熱，然余經驗其解熱無效，廣州中醫黃君以善治腸室扶斯聞，腸室扶斯初來彼輒用羚羊治之，余觀察其經過，完全無效，解熱劑本無效於熱性病之初期，而有效於後期，然羚羊之解熱恐於後期亦無大效，腦膜炎本品無大效，中醫謂有卓效者乃誇張之詞(中醫對熱性病之發腦症狀如惡寒，及小兒熱病之痙攣者，每誤以爲腦膜炎)，遠不及西藥之大健風，或百浪多息也。

羚羊角之功效仍可以鈣質闡明之，請閱犀角條用量三分至一錢

常山

爲蜀麻之根，含秘魯培林與黃連鹼，今專用爲截瘧劑，不知其退熱亦有神效也，據利彬先生之化驗報告(一)對於因大腸菌所引起之體溫增高，確有顯明之解熱作用，

馬關夫先生動習試最亦證明其解熱作用大於柴胡，然今人皆不用其退熱作用，坐使良藥湮沒，可惜孰甚。

常山截瘧有卓效其功用頗似規寧須於瘧發前三四小時服三五錢，多服令人嘔，和甘草服亦令人嘔，嶺東每屆夏秋瘧疾必大流行，余主松口平民醫院，窮人多來索藥，規寧價昂，余率以常山草葉撰榔青蒿大黃朴硝之類應之，皆效。

規寧須先以大黃一 朴硝五 取快瀉三四次後於瘧發前三四時服

常山三一五 檳榔二一四 草薹一只 柴胡(或青蒿)一一三 連服三劑。用量三一—五(有一次用二者)

防風

中醫多用於感冒及風痛風濕，其功用頗似阿斯匹林而遠遜，據經利彬先生之化驗報告(一)對血糖無作用(二)對於因大腸菌與*Bacterioides* *Hydrophila* *typhimurium*

三所引起之高熱能解退之。

據此則防風有發汗退熱作用，或或由於安靜調濕中樞也，用量一——三

解熱劑中西藥皆有其特長，若單藥力大則中不及西，當知必林被拉米姆中藥無此藥品也，然西藥亦為一妙藥，解熱外尚有預防由新陳代謝所生毒物之作用，其他藥品亦不少，使然其神而明之而已。

發汗劑

凡能刺激汗腺神經而發汗者謂之發汗劑，與發汗同見者為皮膚血管充血。中醫發汗劑如麻黃桂枝羌活獨活防風荆芥葛根香薷藜蘆羌活薄荷蘇浮萍蔥白生薑等皆為發汗劑，非發汗劑（其中惟防風據利彬先生化驗報告有解熱作用，其他藜蘆荆芥等或亦為解熱劑，但其力甚不大）。所以為發汗劑為解熱劑者非也，蓋解熱劑必須能安寧溫中夏，或減低新陳代謝者，今發汗劑無此功能又能增加新陳代謝，不過其所生之熱不致其所散之熱耳，（安寧溫中夏之解熱劑如安知本林等亦有增加新陳代謝作用）今時醫界以發汗劑為解熱劑。因發汗時皮膚充血，廣皮膚面積且體內之熱而奔集皮膚，增加冷卻作用，出汗時熱隨汗蒸發而散，凡此皆發汗劑之解熱作用，然仍不得認為解熱劑也，利尿劑，瀉下劑亦非減去一部份體溫，亦不得目為解熱劑也，（體溫之放散以皮膚為最大四十分中皮膚放散三十二分，呼吸器放散七分，大小便放散一分）。

發汗劑多含芳香或辛辣性揮發油，能刺激性能刺激汗腺神經而發汗，故桂枝荆芥羌活香薷生薑葱白之類莫不含刺激性，揮發油，然而亦有賴於煎藥之湯湯作用，葱白佐膳吃半碗而不發汗，若以改根煎湯一大碗頓服，可發汗。此由溫湯頓服增體溫，旺盛皮膚血行，能幫助發汗也，但有仍須厚裘溫覆者，亦由溫覆可減體溫之放散，擴大皮膚之血管亦能幫助發汗也。

發汗作用亦有由發汗中樞之受刺激者如服少量薄荷煎劑增加脈搏，繼則呼吸徐緩，血壓降低，由中樞神經之受激而傳導於末梢神經使毛細管散大，促進汗液之分泌。

發汗劑之作用（一）爲解熱因大汗可挾帶一部分體溫而俱去（二）爲排除毒液，（三）爲排毒（食鹽尿酸燐酸硫酸鹽之類）（四）爲使皮膚血管旺盛。

因其有解熱作用故熱高無汗者可用之但有時須兼用解熱劑如黃芩石膏之類否則汗雖發，而熱仍不退也，有服麻黃桂枝汗不出而熱反高者，因其有排除體液作用，故水腫病可用之，因其有排毒作用故腎臟病水腫尿毒不能由腎臟排除者可用之（但有時血液濃度增加毒素集中反易中毒）因其能使皮膚充血，故斑疹疥癬可用之，（因可改良皮膚血行增加排毒作用，又可破壞病變組織促其吸收治愈也）且由於皮膚充血，減少內部血量，咽喉炎氣管炎，胃腸炎，腎炎，可因以促進治愈，且由於發汗而血液濃厚，可促進炎症分泌物之吸收，如肋膜炎關節炎之用發汗劑是也，其理與利尿瀉下劑同。

發汗劑之用於解熱，退水腫，排毒，發斑疹，及內部組織炎症，既如上述，然過汗能衰弱心臟，減少體液，散失體溫，故心弱，體液不足，及體溫低落者忌之，又夏月皮膚血管擴張血液本自奔集肌表（使體溫外散以減溫），發汗劑宜輕用，冬月皮膚血管收縮，（防體溫外散以保溫此乃人體自衛功能）發汗劑宜重用，吾鄉有一讀書不通之中醫生，見書上說「麻黃

不可輕用。彼以爲宜重用也，乃於夏月治用麻黃三錢治一童子一汗而斃，至今傳爲笑話。

麻黃

有強心作用，能收縮內臟血管，擴張皮膚血管，其發汗作用可疑，或由於擴張皮膚血管也。能增高血壓，對腎血管初收縮後擴張，利尿作用甚強，又能治喘息，因此

能解氣管枝痙攣也。

麻黃非解熱劑，今人多以爲能解熱者誤也，似乎曹穎甫先生有一醫案，用麻黃湯麻黃用至三錢不出汗，熱反高，後請其徒章次公先生商量再用五錢，仍元熱不出汗，是不知麻黃乃非解熱也，若加石膏（如麻杏甘石湯大青龙湯之類），則必汗出而熱解矣。

麻黃治腎臟性水腫甚佳日本曾有良好實驗。

陸備甫先生謂本品合桂枝發汗，合石膏利尿，甚益，蓋桂枝有刺激汗腺神經作用，石膏則非利尿劑，其利尿仍爲麻黃之本能也，有麻黃合石膏反以上汗者，皇漢醫學麻杏甘石湯，越婢湯確有治例，麻黃根反能止汗亦甚奇。

麻黃湯治頭痛，項強，惡寒，發熱身疼，腰痛，嘔逆，脈浮緊，無汗而喘者，麻黃 桂枝

杏仁 甘草。

越婢湯治風水濕風，一身患腫，脈浮不渴續自汗出無大熱者，麻黃 石膏 甘草 生羌 大棗。

「按」麻質強心發汗利尿治喘而已今西醫提出其有效成用治喘咳甚佳然解熱則否也用量七八分（夏月）至三四錢（冬月）

桂枝

爲肉桂樹之小枝，含揮發油及單寧酸，能刺激汗腺神經發汗，亦非解熱劑，揮發油之適有作用，在胃腸能刺激其粘膜使充血，及旺盛其分泌，催促其運動及吸收量，其作用，又能防腐，制酵，驅風，吸收後一部由氣道排洩，有却痰作用，又能防腐氣道，減其分泌，故用於肺壞疽，化膿性氣管枝炎，有防腐制洩之效，一部由腎臟排洩，刺激腎血管等增利尿，并防腐其尿，一部由汗腺排洩，刺激其汗腺神經，奏發汗之效，若外敷於皮膚，能引赤起泡。若用大量能刺激胃腸粘膜炎，致腹瀉吐瀉，故有碍引起腹瀉起瀉之適應，然少發却能解胃腸之逆學，止吐止瀉，及安撫子宮，減輕經痛，桂枝又含單寧酸有收斂作用，能止痢止瀉，中醫謂桂枝可治上衝，大約上衝爲頭部充血之感覺，發外感時血氣奔馳於皮膚及頭部，頭部充血，乃感覺上衝，桂枝能擴張皮膚血管，使血液多集於皮膚，故能平其上衝也，（若新陳代謝旺盛發熱甚高者，桂枝刺激太大，不可用，用之又增其熱，不可不認平其上衝，反增上衝也）此時須合退熱降血藥劑。桂枝可治發熱，發熱爲必發汗呼吸困難，呼吸困難時如有物上衝之感，實非有物上衝也，全經論桂枝湯以發汗可上汗，傷寒論麻黃之，其所以能止汗者，大約爲汗腺神經衰弱，桂枝能興奮汗腺神經，

故能止之，用量一——三錢（燥者忌之）。

荆芥

含揮發油似薄荷油，能發熱利尿，中醫謂能止吐衄，腸風，崩中，血痢，甚不可解，一可知其能治瘧疾也，未知可移用於治破傷及子癰否耳，余曾試用似無大效，二次仲先生告余云彼曾聽某軍醫云，有荆芥治愈破傷風之例，余索其方不得，不知可盡否。

紅花土荆芥，廣東俗名紅花癩癩草，梅縣彭致遠醫師告余，謂能治腫瀉，（由於腎炎者方效，若來自心臟性者則不佳云），及肺炎肋膜炎云，余以之治腎炎性腫瀉確有效，惟肺炎肋膜炎未試過，此諒由該藥之利尿作用也。

皮膚疥癬，發癢，荆芥治之頗佳。此或因荆芥能旺盛皮膚血行，促使其病變組織之吸收故也，用量一至三錢。

秦艽

治風濕骨痛下肢重痛，合蒼朮 薏苡仁 防己用之更佳，但發熱作用似甚微，不能與阿斯匹林比擬，本品又能解熱治虛勞骨蒸，又能利尿（單方）小便不通，腹瀉腹

悶，秦艽一兩煎服，或加多莢子酒煎服，又本品有輕瀉作用治腸風下血。
秦艽養甲湯治骨蒸潮熱，消瘦，顏紅，盜熱，柴胡 鱉甲 龜骨皮 秦艽 當歸 知母用量

葛根

含多量澱粉，今中醫用為清涼解熱劑，民俗治熱性病用生葛根一二斤打碎煎水服甚佳，中醫謂能發汗者可疑，仲景用治項背几几，肌膚不仁，豈在消其末梢神經炎乎，胃腸炎用葛根者恐在攝護作用，惟廣州之葛根用石灰水浸，是有石灰鹼性作用矣，可以止瀉，若謂葛根能治剛痙等者，恐非是，若剛痙之由高熱者尚可，若由於腦膜炎破傷風者必無效，

葛根連湯治熱劑 葛根 黃芩 黃連 甘草 用量三一—二〇

香薷

含揮發油有發汗利尿作用，胃腸病，霍亂吐瀉多用之，香薷散，治暑熱霍亂，吐瀉腹痛，香薷 厚朴 陳皮 茯苓 黃連 甘草用量一

浮萍

發汗之力頗強，又能利尿，可治水腫，治皮膚搔癢功似荆芥，請問荆芥條，有謂能治衄血者則不可解，一

浮萍散治諸風癱瘓 浮萍 當歸 川芎 白芍 荆芥 麻黃 甘草 用量一—三

蟬蛻

為蟬初出土時脫出之外皮，中醫用以治熱性病，及小兒痲疹，中醫解熱及鎮痙多用，虫類藥，如民俗解熱用蚯蚓蠶螂，鎮痙用蜈蚣，全蝎類，一錢之類是也，廣州有一

兒科中醫治小兒發熱必用蟬腿花，（蟬之將出土者）若謂蟬腿有發汗及退眼膜作用則可疑，用燈〇，五——二

羌活獨活

或謂是二藥爲一類二種，或謂羌活爲土當歸嫩根，獨活爲土當歸老根，余無考，不知孰是，今謂上部痛用羌活，下部痛用獨活，但不甚嚴謹，身

痛即痛亦用羌活也，大約此二藥有鎮痛作用，似安知必林，阿斯匹林，用於風濕，骨痛有效，又可發汗，惟其解熱力如何則不明，中醫視爲溫性發汗劑是則忽視其解熱力矣，或謂能鎮痙攣者，或有鎮痙作用也用燈一——三

紫蘇

含揮發油功似薄荷而較溫性本草云紫蘇之用有四（一）溫散風寒而出汗不峻（刺激汗腺神經發汗）（二）行氣而消痰定喘（緩解氣管枝痙攣，減少氣管枝分泌）（三）

調中而開胃進食，（促進胃腸液分泌，旺盛胃腸運動）（四）去濕治風濕脚氣（擴張皮膚血管，緩解末梢血管之攣縮，治末梢神經炎）其中以溫散風寒爲第一，蘇子與蘇葉大略相同，能解胃腸痙攣，治腹痛，（或謂子勝於葉）孫淑平兄告余云二十六年夏彼患痢甚劇，人教以煎服紫蘇一大把而愈，此腸炎之下痢也，若真痢疾則必無效，用量一至三錢。

薄荷

含揮發油及單寧少許，有鎮痙隨胃，驅風，通經，發汗，却痰作用，用其油檢鼻粘膜炎可以收縮血管而消炎，塗湯火傷金瘡止痛消炎，茲摘錄日本記載於下。

薄荷霜治結核（內服用六，○）偏頭痛，神經痛，齒痛，子宮痙攣，歇斯內里，鼓腸，胃痛，下痢，霍亂，嘔吐，耳內癢痛，（薄荷油有效），薄荷霜撒布創面有利於遲緩性肉芽，內服可治（一）輕度盜汗，（二）鼓腸，（三）消化不良，（四）乳糜尿，（按乳糜尿用川朴一兩，茯苓一錢水酒各一碗煎服聞有治愈者但未知與薄荷之功力如何，）用量每次一至三錢油及霜卅○，○五錢○，一五瓦。

解毒劑

中藥藥慮數千百種，其奏效之神，解毒劑實居大功，此誠似爲今世之論中藥者所忽畧，瘡疾病之發生，皆由細菌，若能直接殺之，或解其毒，或刺激身體產生一種抗體以殺之，或制止發炎部血球遊走於血管之外，以消炎，皆爲最有價值之治療，今中醫頗多此類藥品如元參，升麻之油咽炎解斑疹也，金銀花馬齒莧風尾艸之治腸炎痢疾也，白花蛇舌艸之治盲腸炎也，白菊花葉搗黃糖外敷之治瘰疔也，野苦麻搗敷之治皮炎也，中藥消炎退腫之劑，筆不勝書，奧西邊之百浪多息，大非風，電銀膠，百病散之類并無遜色，二者合用更有相得益彰之妙，今爲特開一門專論之（此類藥有歸腎劑利尿劑清涼劑者）。

元參

解毒劑中余特先標出元參者蓋元參解毒有軍效也，但中醫以元參色黑入腎，及以其多膠爲滯，（即阻碍消化之意）炎症初來不敢用，又不敢用於各部之炎症，此誠

埋沒元參之功矣，余今特爲之昭雪。

據利彤先生之化驗報告（一）小量對於心臟，有輕微強心作用，大量即呈中毒現象，（二）能使胃擴張（三）小量能使血壓輕微上升，繼而下降，大量僅使血壓下降，（四）不能解除因大腸菌引起之高熱，（五）能使血糖下降。

日本荷蘭藥鏡曰：根葉亦用之。治腺腫、淋、結核、惡性硬腫、無效熱之頸間腺腫等，以之作煎劑內服，或貼莖布，或搗碎與藥用行驗研和貼患處，自消散。痔疾盲痔腫痛內服煎劑或爲蒸漬藥或爲以膏貼之。疣瘰癧根貼之。即消散。潰瘍洗滌膿血除去腐肉內服煎劑或作洗滌藥。佳。兼治疥癬惡性浸淫瘡汚穢疥疹瘡症取根研末服之有殺虫之效。

觀上述記載元參治疥癬，瘰癧，粘膜炎，皮下蜂窩織炎，瘰癧，痔漏有效，今更以余之竊驗證之。

百年前梅縣一善士張貼一方云，治疥癬有神效，俾觀者廣爲宣傳，其方爲元參兩，銀花七錢，蒲黃公英各五錢，先祖父得之，屢試屢驗。

扇排腺炎高熱喉痛，西藥電銀膠百浪多息大鷓風百病液等皆有卓效，但元參之神效亦不讓之，方元參 升麻 射干 連翹 牛蒡子 荳根 桔梗 甘草 薄荷 元參可用至一兩，便秘可加大黃，發熱惡寒可加荊芥 防風，熱高可加石膏有神效。

大人有用元參一斤治無名腫毒者宗任慶和用辨症奇聞方治一極劇烈之上臂皮下蜂窩織炎得效
方元參一斤柴胡三錢甘艸錢水煎二日分數次服元參治各種炎症皆有奇效惟須重用一劑至少用
五錢多可用者二三兩其在體內變化若何則尙無之精確之化驗報告，經利彬先生之報告尙簡
略，惟可知者爲鎖心及擴張血管增高血壓耳，余意身體各部炎症皆有效，氣管炎，肺炎，胃
腸炎皆甚佳，惟未知腎臟炎，腦膜炎，肝臟炎，心肌炎等如何耳以意度之當亦有效，（吾中
西醫界其試之乎忍使良藥湮沒而不聞也，蓋同一炎症也，若其病原菌相同，則無論其在何部
發至炎症其治療亦相同，惟元參所殺滅或剷服之病菌，不知何種耳，以意度之，爲化膿菌乎
，此即有待於將來之考研也，余對此無充分之經驗，用量三——二〇

金銀花

之作用頗似玄參，亦爲有力之消炎劑，瘡癤，斑疹，血毒，口腔炎，胃腸炎，
氣管炎，皆有卓效，民俗治下痢煎銀花一兩和蜜服，神效。

解毒湯治一切瘡瘍 金銀花一〇 甘草五 黃芪三 皂角刺三 當歸三 乳香二 沒藥二
疔毒後生疔毒走黃（血中毒）頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死 牲利三 山楂三 銀花八 木
通三 連翹四，牛蒡子四 乳香三 沒藥三 皂色刺三 花粉三 大黃五 地骨皮三 水燭
各半煎服便秘加朴硝，用量三——一〇其藤名忍冬功用同。

連翹

功似銀花，消腫，排膿，治疔癰，斑疹有卓效，張錫純先生用一兩以發汗，但其發汗作用可疑，有利尿作用，其心含揮發油芳香，習偽充為麝香者，有止嘔作用。

清熱解毒湯治疔癰，喉痛，赤痢，黃連 山梔子 連翹 當歸 芍藥 生地 銀花 甘草用

量二一六

升麻

中醫用以治一切以毒斑疹癰瘰及咽痛口瘡諸症，仲景之升麻湯甲湯治陽毒發斑，以本品為主，謬云仲先生謂本品治鼠疫有卓效，日煎服一二兩可以預防鼠疫，此說不可忽視之殺菌解毒劑也，中醫謂升提在非疊，謂一劑不可用過錢在亦非是。

升麻散治上焦毒口舌生疔咽喉墜腫痛，升麻 赤芍 玄參 桔梗 乾葛 甘草 大青 黃

柏 射干 牛勞子 用量〇，五——二〇

菊花

有利尿消炎作用，治風熱頭痛，眩暈，結膜炎，疔疔等，西醫有以其淨劑洗直腸腸

尤嗽口者，其利尿作用甚強。

菊苣散治風熱上攻頭痛不止，菊花 覆花 石膏 防風 蔓荊子 羌活 貝殼 川芎 白芷

治胃炎性頭痛眩暈，菊花 元參 川連 白芍 生地 麥冬 夏枯草。

治風熱，濕熱眼赤腫痛方，蒙花 菊花 荊芥 胆草 黃連 防風 白芷 甘草

治疔瘡腫痛不可忍垂死者方，生菊花(一握)絞汁連服二三碗，渣則外敷，無花取葉代之，

公讓按此方治口唇打極神效。

紫草

治癩痘疥癬有卓效，中醫用爲治癩痘專藥，又有輕瀉作用，大便秘泄者忌之，研末麻油調敷治頭瘡等有效。

紫草消毒吹，治痘疹，血熱，咽痛，紫草 連翹 牛蒡子 荆芥 甘草 山豆根用量二——

四

牛蒡子

功用頗似連翹并能止咳治氣管粘膜炎，扁桃腺炎，痔瘡，癰疽，風熱喉腫咽痛，牛蒡子三錢煎服用量二——四

蒲公英

利尿，輕瀉，解毒，治乳癰，疔毒，通淋，洗目，治結膜炎用量三——五

山豆根

中醫專用以治咽喉痛，又可治齒痛，齧腫，咳嗽，下痢，痔瘡，有消炎退腫也
用量一——三

馬齒莧

上海時報曾治細菌痢，久服有效，民服用治虫咬，蛇咬，內服外敷用莖五七錢並敷向民間用以佐膳以治胃腸炎（濕熱）

綠豆

中醫多用爲解毒藥，癰疽多用之，可以佐膳，既能消毒，又能利尿。

薏苡仁

有健脾作用，并值利尿，治疣，盧人則館下貽，日本記載謂本品治疣有特效，余未試用今摘記之於下。

蓋苡仁治疣之效果由疣之種類而大有差異蓋疣有二種一作半球形隆起，其質柔軟，表面光滑凡此者服薏苡仁數日至數十日輒有效，（兼研末油搽外敷）一種恰如尖圭 *Condyloma* 其面斷裂呈鋸齒狀（白濁梅毒常生此）則薏苡仁絕無效云。

中醫消炎退腫解毒之藥甚多，上列不過舉其十一二耳，然而西醫在此亦大有成就，且皆為人工製品，如各種血清，疫苗是也，天花豆漿白喉血清其最著者也，（疫苗為利用細菌減弱之毒質，刺激人體而生抗體，血清為利用動物既生之抗體，移植於人體，前者多用於預防，後者直接用於治病）此外如膠體藥劑如膠體銀，膠體碘，膠體錳等治皮膚炎，敗血病，丹毒，腸室扶斯；腸炎，淋疾，罕九炎，咽喉炎，有卓效，異性蛋白注射治療之範圍亦廣，此中尤不可不大述特述者，為百濟多息，大健風，烏利龍之類，龜類製劑殺化膿菌之力極大，凡由化膿菌所致之病如丹毒，敗血病，疔癰，淋疾，肺炎，腦膜炎，皆竊卓效，中藥無此神品，余常合中藥解毒劑用之，有相得益彰之妙。

利尿劑

凡能增加尿量之藥物皆謂之利尿劑，利尿劑之作用（一）排除體內之毒素（細菌毒，新陳代

謝所生之毒，吸收後之食物藥物毒，因利尿劑可以增加排除），（二）治療水腫，（三）濃縮血液促進炎症滲出物之吸收，（如肋膜炎關節炎之滲出用利尿劑可以促其吸收）（四）促進炎症之治愈，（胃腸炎，皮膚炎，及他部炎症有用利尿劑而治愈者），（五）洗滌膀胱尿道炎症產物。

利尿劑何以能增加尿之排泄（一）由於擴大腎之血管如茶堍咖啡因等，（二）由於增高血壓如毛堍黃黃芪等，（三）由於刺激腎上皮如各種揮發油等（四）由於變更血液與組織間之滲透壓，吸收組織間之水分入血，然後排泄於腎，如汞劑甲狀腺製劑等，（五）由於使細尿管濾出加多如各種鹽類等。

利尿劑之功用如此其大，在治療上實居重要之地位，洗滌體內之毒質，改變血液之滲壓，排除過分之體液，以奏排毒消炎退腫之效。

利尿劑之屬於植物者能多排水液，屬於鹽類則多排雜質，利尿劑過去皆以為俱作用於腎，其實非也，若組織間之液體不歸血液，腎亦莫由而排泄之，故須將組織尤其皮下結締組織之蛋白質降低膨脹壓，以分離結合於膠質之水分而入血中始得排泄於腎，大約咖啡因因為作用於組織及腎之利尿劑，汞劑及甲狀腺製劑則作用於組織之利尿劑，今將各藥分論之。

汞劑

今以酒利汞爲代表，余經驗中西藥之利尿劑中，以酒利汞之效力爲最大，除急性心臟炎腎臟炎外，各種水腫皆可用，其作用在吸收組織之液體而排洩於腎，注射後即可排尿大半而其效力能及於次日，注射前服鎂鹽五至八瓦可增其排尿量，松口一老尼患心臟瓣膜閉鎖不全性水腫，余用酒利汞注射，旋愈而旋復，（利尿劑本爲對症治療非根治之劑，惟由於傳毒者可根治耳，但不能治既損壞之器質病），一次喘急欲死，危坐不能臥，蓋左心室運動微弱，肺發生鬱血性水腫，不知者將以爲法降性肺炎也，余仍爲注射本品合毛地黃下水數公升而喘平，其生命又得苟延數月。

醋酸鉀

爲醫類利尿劑之卓卓者，此類鹽入血液後在生理上爲異物不能客於生體之中，故漸由腎臟排洩，排洩時偕大量水分以去，故現利尿作用，腎炎之水腫爲組織間水分與氫化物增加之故，前者皆以爲係損壞之腎不能排泄所致，但現際則以爲係體中組織所攝取，腎不得排泄之，與腎之排泄能力無關，體內組織既需要鹽類又以生理作用而須吸收水分以沖淡之，乃成水腫，且組織所需要者乃氫化鈉，如以氫化鉀代之則水腫即形減少而尿之排洩加增數倍。

利尿劑雖爲對症治療，然組織因水分過多而防礙營養，今得利尿劑本分去而營養恢復，故於病者爲有益，若著明之浮腫及滲漏停積能壓迫毛細管靜脈成血液循環之障礙，或因阻止呼吸

運動及其他一般肌肉運動爲血液及淋巴液還流之障礙，得利尿劑而各種症狀除，有因此而永久治愈者。

錫伊洪又能刺激腎臟上皮細胞奏利尿之效，故不可用大量及持長使用，恐因刺激更腎炎也，肋膜炎腹膜炎之炎性滲出物胸水腹水蓄留液，可以本品促其吸收排泄。

本品對心腎性水腫有卓效，如爲心病須合強心劑用之，用量一次二，五日四，〇至一〇，〇。

處方醋液鉀液 (三四%) Lig. Kalii aco+ (34%) 一八，〇

咖啡因息香酸鈉 100 + 100 — 100 — 1，〇

(或) 用毛地黃酒 五，〇

糖漿 110，〇

水一日分三次服完 加至一〇，〇

利尿素 Diuretin 爲水楊酸鈉及可耐之複合物，興奮腎臟分泌機能之作用頗強，(與奮腎髓之作用弱，故不起腎臟動脈之收縮而抑制利尿，) 對於心腎病及各

水腫皆有效 且能擴張冠動脈增進心臟本身之營養 用量一次一〇一日四〇至六〇

〇可含毛地黃用之

咖啡因

Coffein 之利尿作用無關血脈，為對尿管之上皮細胞呈特異作用，增強尿分泌機能，雖有時不飽奏效者因能增加骨髓之反射興奮作用，以興奮血管神經中樞，而收縮全身之血管，腎之血管同時亦收縮，腎臟血行減弱，尿分泌減，故此時尿量反為減少，然用之咖啡因，血管神經木與奮之劑，腎臟之機能已得興奮，尿量增加，故以利尿目的用本品時，先服飽水克羅拉耳等麻醉血管神經中樞之藥品以制止腎血管之收縮，則為效更大，本品又能擴張心竇動脈，奏強心之效，又能擴張腦血管解其痙攣以止痛，又能興奮中樞神經及助長肌肉之收縮，以解疲勞，用量○.○五至○.○三

烏羅透品

DR. OHORIN 有利尿溶解尿酸及防腐之效，可為尿道消毒劑，又為腦膜炎及流行性脊髓灰白質炎之注射劑用量○.五至一.○

此外含揮發油之芳香樹脂，如白檀油，華橙茄，哥拜巴之類有利尿，鎮痛，鎮痙，制止分泌諸作用，可治尿道炎症但無殺菌之效，且久服激腎。

石炭酸與柳酸等製劑如沙羅，阿斯必林等亦有鎮痛，利尿，殺菌等作用，但久服激腎。中藥之利尿劑極多，大抵凡排洩於腎而能刺激腎臟者，即有利尿作用。

琥珀

為松脂埋於地中而化石者，含樹脂，揮發油，琥珀酸，斯可企涅，及硫黃等，有利尿，鎮痙，鎮痛作用，有謂用治淋病有效者，大約功用同白檀油用量○.三——一

商陸爲利尿劑，用治腳氣水腫，慢性腎炎，肋膜炎，心臟水腫，腹水有效，又能刺激血管中樞，升騰血壓奏利尿之效，又此藥有蓄積作用初不見效，特長用之始見效者如服後四五日尿反減少，又四五日或半月後尿始加多。

經利彬先生之化驗報告（一）小量能使血壓輕微上升，大量則下降（二）無利尿作用。

今據化驗報告謂本品無利尿作用者恐因本藥有蓄積作用，須蓄積至某程度始現效也。

平水丸治脾氣腫滿等 吳萊黃 芒硝 芫花各三商陸四廿遂一糊丸或蜜丸用註〇，一一〇，五

赤小豆

豆類皆有利尿作用，本品及落花生其尤著者也，腎炎性水腫民間用落花生加黃糖大蒜煎服有效，聽後水腫全每用此治之，（黃糖大蒜皆有利尿作用），六君五皮之類無竒也。

豆類有消腫排膿作用，如本品及綠豆是也，本品又可通乳止血，（乳汁不食赤小豆粥，下血赤小豆二兩歸斃半研末一日三次分服），又可治下痢用食不拘。

車前

車前子實俱用爲利水藥，子實尤勝，治眼結膜炎，腸炎之泄瀉，又治氣管枝炎之咳嗽，可謂爲利尿止咳止瀉及消粘膜炎劑也。

據日本之化驗報告本品能促呼吸運動深大緩慢，大有鎮咳作用，又能促進分泌增潤氣管

及氣管枝之結核分泌及消化液之分泌數可用爲鎮咳却痰健胃劑然今日中醫多不以此便用之矣。

治結核小便不通車前子一味爲末，水調服，無華子亦可，一名斷痢湯。

療熱淋方 車前子 各葵子 兩草 芒硝 荷蘭藥鏡曰車前之根葉子俱有收溼清涼去汚之效，而根尤勝（吾人以爲子勝者誤也），又能使血液稠厚，治下痢，血痢，吐血，婦人月經過多，白帶下赤證，以根煎水服，久咳咳血肺癰下痢等症生根加水搗取汁加糖服，有殊效，口瘡咽喉煎水含嗽，日亦煎水洗，不蝕錢之車前草。經此寒陰後一靈而爲良藥矣，用量二——五

西瓜

之利尿作用或謂在增加血液水分，有止渴排毒之效，夏月用之殊佳，仁亦利尿，或謂本品可治黃疸，豈在其通利大小便加增胆色素之排除歟，用量：仁 三——一〇

肉不拘。

澤瀉

用於水腫中暑吐瀉之利尿劑，東桐謂治眩暈，其眩暈豈因尿毒或血中毒質之鬱積歟，用量——三

葶藶

爲利水及却痰劑，氣管枝炎分泌過多者，及鬱血性肺水腫，本品俱可治之，大約本品有制止毛細血管分泌及吸收組織液作用，余每用治痰多喘急者甚效，虛人忌用。

神功葶藶散治水氣面目四肢浮腫，咳嗽，喘急，不得安臥，葶力三，豬苓二，椒目一，五，黑牽牛一，澤舍一，右加葱白二根水煎服。

葶力大棗瀉肺湯，治肺癰喘不得臥，（實治肺水腫）葶力，大棗水煎服。

陷胸丸治結胸，短氣，煩燥心中懊惱，心下痞鞭，大黃，葶力，芒硝，杏仁（寔治肋膜炎）用量〇，五——三

茵陳蒿

爲中醫治黃疸專藥，并能利水，其治黃疸或有利胆作用，茵陳蒿湯治身黃，二便不利，身微熱，（此方治十二指腸炎性黃疸）用大黃以去積，消痰，枚子消

腸炎），茵陳，大黃，枚子。

茵陳五苓散黃疸病渴者（胆色素吸收收入血，停留於組織用大隊利尿劑以排除之）茵陳，茯苓，澤舍，白朮，豬苓，桂枝用量五——二〇（須用量大）

郁李仁

利水滑大便（仁有油餘滑腸）用量三——五

蜀葵

根莖治小便淋瀝。

冬葵子

治霍亂水腫又用作孕婦催生藥，惟孕婦水腫可用之者，其根莖效同用量三——八。

瞿麥子 爲利尿劑或閉合屬蓋其效更大，又能通經用量三——五

茅根

有利尿止血作用，止血作用甚強，其效何在甚不可解，或在能低血壓和緩血行乎，又能退熱此或由利尿之故也，熱性病可煎湯當茶飲，如腸熱癆廣州西醫多用茅根竹蔗水，煎而吐血下而可獨煎大貝服，余治熱性關節風濕用茅根一二兩加入風濕藥中甚佳，效力亦頗廉，誠一頗堪推獎之藥品也，用量三錢至二兩

豬苓

專供利水用，功大於茯苓而較涼，（高熱不可用茯苓而可用豬苓），用量一至三錢。

茯苓

爲松樹斫斷後約經五六年其松根生出一種如菌之物，即茯苓也，有赤白二種，抱松根而生者曰茯神，中醫用爲利尿安神劑，心虛怔忡小便不利用之，又作爲健胃劑，但余經驗其力不大，有謂發熱用之，反增熱者，本草謂補心脾白朮於赤利濕熱赤勝於白可倍。

治怔忡不眠神志不足 茯神 柏子仁 酸冬仁 黃芪 人參 熟地 遠志 五味 用量二——五

滑石

主成分爲含水硅酸鎂此外含有少許雜物有謂含有辰砂者未知是否中醫用爲利水去滯藥治中暑積熱嘔吐煩渴黃疸水腫脚氣淋閉吐瀉諸瘴腫毒但其功用可疑 用量一——

防己

利水去身痛之力甚大，西藥界有用其製劑治風濕骨痛者，民間用為痧藥，治胃腸痙攣，怪疹痛有卓效，週身痠痛余常以本品合川芎蒼朮苡仁治之甚佳，其冷水腫更有神效，經利彬先生之化驗報告（一）鹽酸防己寧之作用與防己科植物脂酸相似，但其毒力較大（二）大量能使血壓下降（三）少量刺激呼吸中樞，大量則呈麻痺（四）少量能刺激十二指腸及子宮肌肉而使其收縮加大，大量反使其麻痺（五）對於大腸菌引起之高熱，積有解熱作用。

防己茯苓湯治四肢浮腫，水氣在皮膚，防己 黃芪 桂枝 甘草 茯苓防己湯治風濕多汗，防己 黃芪 白朮 人參 生姜 甘草用量一至三錢

木通

利水之力甚大，在猪苓茯苓澤舍之上，本草謂通利九竅血脈，煩驚遍身疼痛，大渴引飲，淋瀝不通，耳聾目眩，口燥舌乾，喉痺咽痛。

木通散治疔瘰四肢浮腫或遍身兩目俱腫謂之子腫，（按此方大滑利壯實者可用，虛人宜四物四君合杜仲續斷菟絲子之類，白朮 木香 檳榔 紫蘇 貝壳 茯苓（各五分）木通 黃芩，（各八分）

猪苓散治腫滿口燥，咽乾小便絕少，解煩熱，止泄瀉，猪苓 白朮 澤舍 茯苓 車前 木通 茵陳 枳麥用量〇，七一，二

地膚子

爲利尿劑。淋疾皮膚病用之，用量二三錢

海金沙

爲利尿及鎮靜藥用於淋疾，莖痛，濕熱，腫滿

三種散治諸淋急痛 海金沙一，五 滑石二

余十二歲時，一日早起小便忍痛而閉，服上方調蜜而愈，或謂加燈心木通麥冬更妙用量〇，

八——二

石韋

利尿藥治勞熱，淋閉，崩漏，癰疽。

石韋散治腎氣不足，膀胱有熱，水道不通，臍腹急痛，水瀉石韋各二，滑石 白朮 瞿麥

白朮芍 葵子各三 當歸 甘草 王不 留行各一。右研末小麥湯下每服二錢日三服用量

一——三

澤蘭

調月經，散水腫，本品似能制止血管之分泌有消炎作用。

家父秘傳一方治手足疔癰紅腫，微惡寒發熱者，（如皮下蜂窩織炎之類）有卓效，澤蘭向

白芨三 阿膠五

臍上加白芷三 臍下加午七三 水酒各半煎服，此方實出陳修園 中用量三錢至兩。

淡竹葉

去積熱，利小便，竹葉心治肺炎煩熱但余經驗其力甚弱用量三——一〇

蘆根

爲利尿劑并有消炎之效今用以治肺炎腸室扶斯等又可治黃疸及其他各臟器之炎症。

治肺炎氣管枝炎（名曰肺炎消解湯），蘆根二兩 浙貝三錢 北杏二錢 陳皮一錢 桑皮三錢 竹黃四錢 即竹葉心 苡仁三錢 前胡二錢 川朴一錢 花粉三錢，此方有強瀉作用
載詳肺炎氣管枝炎篇屢見其功者也。

治腸室扶斯方（名曰肺熱清解湯），蘆根兩半 苡仁五錢 薤仁八分 北杏叁錢 桑仁四錢
木通錢半 滑石五錢 半夏二錢 川朴 一錢

島方有強瀉作用（杏仁、仁合油質分揚若胃其瀉下之力則加大麻仁五錢）及制酵（薤仁川朴半量）利尿作用（木通滑石苡仁）若欲增其腸道之消炎則蒼連枝柏皆可加入，用量五錢至二錢。

大豆黃卷

廣東一帶，少人用惟江蘇蘇派，多人用之功效極速，倘有利尿作用（如大豆類如赤豆落花生等）有利尿作用）若用以治各種熱病離奏大功用量二

至四錢。

大腹皮

檳榔子之皮治霍亂中暑及水腫，余見治水腫一次用 奏尚亦極大效，此藥之功用疑。

五皮飲治水腫，薏皮 茯苓皮 砂皮 桑皮 腹皮用各三錢至一二兩

白朮

含揮發油，健胃利小便，中醫強壯劑之一，虛損可帶用大身白朮止之，此藥含揮發油，腸肌肉運動，增加其吸收力，為一極有力之健胃劑也。

蒼朮

性較白朮燥烈，含揮發油利尿之力較白朮，風濕骨痛多用之，經劉彬先生化學報告，(一)有抑制血糖之作用其抑制作用以注射後二小時為最甚，(二)小量可

血壓輕微上升大量則下降其對呼吸作用不論大小均有促進之發生暫時促進現象，利尿作用，(四)對於蟻蟻心臟運動有減低現象，對心律有時慢作用，但，服用使心臟搏動，(五)能使蟻蟻血管輕微擴張，(六)對於家兔十二指腸之蠕動有使之作用作用似處於肌肉方面。

熱癩草

此為土藥據彭致遠醫師云：紅花土荆芥也，冷腎臟炎性水腫，卓效，惟心臟水腫則不可用，用之反為不妙，可治肺炎肋膜炎及腦膜炎，此乃利尿劑也。

少發症後出效，或變更慘感，吸收其滲出物之故，其利尿作用或即在此也，余等驗上，其效亦有此功效，青蒿亦或同之，因皆屬同類之藥，其所含揮發油及其有效成分或有同功也。

下劑

能促進便道者謂之下劑，下劑之作用第一爲增進大小腸之蠕動，使腸內之糞便，因蠕動而迅速下行，第二爲保持食物之容量，劑之腸壁增加蠕動，使糞便加速下行，前者如巴豆油蓖麻油大黃廣芥甘汞硫黃之類是，後者如朴硝硫酸鎂澆動石蠟之類是。

下劑之作用固爲催促排便，但附帶而發生者爲引起腹腔充血，減少身體他部血量，故使用下劑有二目的焉，排便與使腹部充血是也。

下劑既有二種作用，故在治療上（甲）掃除腸內容物（二）凡食物醱酵腐敗導致下痢（消化不良性下痢）宜再用下劑以下之，故下劑反可以止痢，此宜以用甘汞爲佳，因其含有消毒殺菌作用，既能掃除腸內容物，又可制止腸內之醱酵腐敗也，（二）排除宿便，小腸發炎，或大腸吸收水分之力增加，或蠕動不足，常致便秘，此時宜用油類下劑，最好爲蓖麻油，因蓖麻油能促進小腸蠕動，（不能動大腸）及潤滑腸壁，其其排便之力亦甚速，中藥之火麻仁、瓜蒌仁、杏仁，當歸之類含油質，其功用同蓖麻油而力較弱，亦可用之，若腸痿瘰（多在乙字腸部）大便不得下，則下劑無功，而反增秘，因腸蠕動越甚，瘰瘰亦越甚，大便越不得下也，此時宜用鴉片，阿托羅平，莨菪，半夏，干菴，附子，肉桂等鎮靜解痙劑，痙瘰除而大便自下也，若腸管痙攣，（在大腸全部）無催動大便下行之力者，亦致便秘，此時宜用藥鴉

腸肌劑，如黃芪，人參馬錢子之類是，或加下劑用之，黃龍湯、參芪歸地加大黃朴硝、硫半丸（硫黃半夏）西藥之士的單葯若大黃合劑是其例也，故便秘之原因不同，而所用之下劑亦如異，非可一見便秘即用番黃巴豆也，（乙）治胃腸炎，胃腸消化不良物積滯腐敗，每致胃腸炎，宿便嵌頓腸內不下，刺激腸壁亦致發腸炎，宜用下劑以除積滯，病原去炎症自除也，此，以不用刺激性之下劑為佳，巴豆刺激性最大，為不可用，甘遂亦有刺激性，但以其毒劑制，故有時亦用之，惟以一次用大粒為佳，（一次服〇，七二）多次小量則停滯腸內之時間久，反增刺激，故各皆一次用大量，排便速而劑數少也，下劑之劑數少者為鈉鹽、（一、十二瓦亦三次服，蓖麻油，火麻仁之類刺激性亦少，大黃雖有刺激性，其在油其含尿酸，酸酵可消炎）之故，腸炎甚可用之，朴硝硫酸鎂之濃厚液相有益，性，然其濃厚液則劑數少，凡此皆可因厚勢而用之，然中醫治腸炎用下劑之外，兼用劑劑如銀花、連翹、黃連、黃芩、黃芩、白芍、地黃、地榆、槐花等，（部元參、升麻、菊花、紫草等），解毒消炎亦可，然其甚少用之，此由其所見換也）較之單用下劑者似勝一籌而為之妙羅密之雷得奴耳，葯特靈、單寧酸、鉍劑亦有收斂消炎作用，常繼下劑後用之，（丙）一導血下行，凡身體上部充血，如腦充血，頭面部充血，腦出血，腦炎，腦膜炎，鼻衄，牙血肺胃出血等，用下劑使血液歸於腹腔，助上部充血除而病減，此時以用能健大腸劑為之

上劑如大黃葶苈爲佳，大腸蠕動則引起骨盤充血多，血液大部歸於腹腔，三黃湯治吐衄，大承氣湯治腦膜炎卽其例也，(丁)退水腫凡由心肝腎病及他病而致之水腫，下劑可以除之，因下劑可以防止腸內水分之吸收，又能刺激大腸增加分泌，鹽類下劑如朴硝硫酸鎂之濃厚液又能用滲透壓作用吸收腸壁血管之液份，凡此皆有利益退腫，(戊)消炎凡身體他部發炎，可用下劑引起腹腔充血，減少患部血量因而或輕其炎勢，或因血液之水份由下劑而減少，變爲濃厚，因滲壓之變化而吸收其炎症產物，此時宜用刺激性下劑，如巴豆甘遂大黃之類，因此類藥刺激性強，引起充血作用烈，如大陷胸湯十棗湯之治肋膜炎，疔毒百效丸(大黃巴豆雄黃叁錢)之治疔癰紅腫，桔梗白散(桔梗巴豆)之治鎖喉風(卽急性喉炎之致呼吸道閉塞者)，是其例也，(己)催經，下劑能引起骨盤充血，子宮血旺，排血自易，此時以用葶苈大黃爲佳，因引起充血作用較強也，然妊婦用之有下胎之虞，(庚)減傳染病之熱勢病勢，凡傳染病新陳代謝旺盛，血中毒素亦盛腦中血液充盈易中毒，頭痛，昏謔，寒戰，痙攣，皆腦中毒之象，下劑可減少腦部血液，亦卽減少腦中毒之可能成分，腦部充血則腦質所受壓力大，(頭痛熱高)用下劑腦充血減，則腦壓亦減，故傳染病之病勢烈者得下劑而勢殺，然外感初來或傳染病之初期，熱勢盛宜急於退熱者，則不可用下劑，宜先用發汗劑，因此時以退熱爲先，皮膚面積大，散熱之量最多，(人體散熱作四十分針，皮膚至十二，肺散七，大

小便停散一，出汗可以退熱，同時可以排毒，故此時宜用發汗劑，若用下劑則集於皮膚之血液，復歸於腔，熱不得外散，（下劑所歸減少之熱度有限，不宜於急於退熱之時），若妄用之，反不利病情，故仲景有外感宜先發汗之明文，下之名曰內陷，然病有先發汗而後下之，或汗下同用之治法，傳染病所用之下劑，似以硫酸鎂、朴硝等劑為佳，因該劑能減腦壓之力甚大，然大黃除瀉下之外，似有消炎退熱作用，余檢實用之，甘汞除制醇消毒瀉下之外，有利膽作用，亦為佳品，瘧疾腸室扶斯初期即宜連瀉數日，上列數種下劑，皆為余所實用者也。（辛）治腎臟炎之尿閉，腎臟炎尿閉時，下劑既可減去其水腫，又可排除其尿毒，腎臟得六腸之代其頓黃而得休息，可增其治愈之機，故有用下劑而尿利漸通者，此時宜用朴硝，或硫酸鎂。

下劑之治效及各種下劑之使用，畧如上述，然下劑妨礙營養物之吸收，虛弱者不可妄用，又能引起腹腔充血，腦貧血、好娠及月經多者忌之，腹膜炎、盲腸炎、化膿期、腸室扶斯之腸潰瘍、脫痲期、須安靜腹腔各臟器者不可妄用，用之有危險，下劑在治療上佔一重大部門，用之得法，愈疾於反掌，否則招禍於眉睫，在善用者神而明之耳。

命論下劑將完時，覺有須補充者，下劑有緩下峻下之別，巴豆酸下劑也，朴硝、硫酸液動石、緩下劑也，大黃、蘆薈、甘汞、蓖麻油、介乎二者之間者也，然峻下劑之小量可變為緩下

劑，緩下劑之大量亦可變爲峻下劑，峻下緩下之別，常依其量而不同非有割然之界限也，又夏月胃腸易受刺激，故多泄瀉症，冬月反之，同理居於熱帶者較居於寒帶者其腸胃易受刺激，故絲帶多泄瀉症，寒帶少之，北人用大黃可一兩，南人參錢卽大瀉，此因氣候地域而不同也，又下劑亦因人之感受性而不同，甲得之太瀉者，乙得之未必，故下劑之使用，因人，因地，因時而異，此在醫者之善爲斟酌用之耳，今將各藥分論之。

油類下劑

(一) 蓖麻子油

中醫少用，西醫則極常用之，實一極和平有捷效之瀉劑也，在胃內無作用，至腸遇鹼卽始遊離蓖麻油酸，刺激小腸運動神經節，增進蠕動（有雷鳴），不刺腹大腸，故無痙痛之弊，又能潤滑腸粘膜，使糞便易於下行，其刺激性甚弱，故腸部有炎症時，虛弱者，好婦，月經時可用之，且此油吸收入血後有營養作用，惟氣味不佳，有服之作嘔者，服時宜先以白糖咖啡或酒類沖開水一大碗，後加此油，一次服下，用量一次二〇，〇—三五，〇瓦。

(二) 巴豆油

爲瀉劑中之最猛烈者，在胃不變化，至腸遇鹼液始發生作用，服後三十分至二時卽大瀉，刺激腸粘膜發炎，遇疔瘡走黃鎖喉風疔始可用之，其他不可妄用，日本東國翁喜用巴豆，論者多非之，用量一次十分之一滴至一滴瀉不止時可飲冷水止

之。

(三) 火麻仁

即大麻之仁含油質，在胃不變化，至腸遇鹼性液始變脂肪酸，刺激小腸促進蠕動，功似蓖麻油而較弱，此外瓜蒌仁，郁李仁，杏仁，及當歸等含油質者

，俱有刺激小腸潤滑大腸奏瀉下之效，中醫皆用爲緩下劑，用量三錢至一兩（動物脂亦有瀉下之效，如在寢會多吃脂肪每致瀉但少入藥用。

(四) 流動石蠟

在胃腸不被分解吸收，故無刺激腸壁增蠕動之力，其所以用爲瀉劑者在潤滑腸壁及保持其容量，藉此以刺激腸壁增蠕動以排便耳，但腸生潰瘍

腸壁非薄時，反因增加腸之負擔而致穿壁之虞，用量一〇——二〇。

植物性劑下

油類下劑亦多屬植物性者，此指刺激大腸增進蠕動之下劑而言，

(一) 大黃

含醱酸服一二分有健胃收斂作用，三分以上則起下瀉，能刺激大腸故發痙痛，（無雷鳴，食物在小腸尙爲液體，故小腸蠕動旺盛則雷鳴，至大腸其水分被吸收

餘不生雷鳴，而發痙痛矣）能引起骨盤充血，用量三分至五錢。

(二) 蘆薈

藪前若爲大能引起骨盤腔充血（刺激大腸者皆有此作用）用爲通經催產膠黃作用似之加新加拉則較緩可持長用之。

金屬下劑

甘汞

卽中醫之輕粉有雜質且多偽品刺激小腸并影響及於大腸背地○，一至○，五排出黃色粥狀便味乃因 Bilirubin 之變化而生 Biliverdin 所致，故服後排黃青色之便，

不可懼，然腸內雖無胆汁其便亦可呈綠色，此或由腸內發生硫化汞故也，甘汞刺激神經催進運動，或謂甘汞在胃一部與蛋白質化合，至腸被胰液分解，一部變爲昇汞，而其消毒劑作用，消化不良下痢用甘汞反可以止痢，卽此故也，惟富腸炎時若用甘汞過量，反因刺激而增步勢，宜慎之，用量○，三——○，五——○，七一次用大量爲佳，以免停留腸內多刺激腸粘膜致發炎，本品小兒頗服有退腫利尿之效，惟急挫腎最忌之，（嬰兒自己藥片卽以此爲主藥，蓋小兒多消化不良，此藥可以防腐制酵輕瀉清腸）。

硫黃

在腸內化爲硫化氫，硫化鹼，有刺激大腸粘膜緩下之效，一次可用五分。

鹽類下劑

此類瀉劑之代表為芒硝及硫酸鎂。在腸內能保持溶解本藥之水分，不被吸收，使小腸內容物之液狀形態不受變化，直達大腸至排便時大便溏薄，此類藥劑激腸粘膜之力雖微，但亦有劑激性，故腸炎有因以增劇之虞，然稀薄液則甚少。

鈉鹽

爲鹽類下劑中劑激性最弱者，巖質碳酸鎂亦屬此類，熱性病如結核，腦膜炎等初起宜用鹽類瀉劑，有降腦壓殺病勢之效。

鹽類下劑宜於早晨投與，若以時投與，身體不運動腸亦減少蠕動，水分被吸收，乃失其瀉下作用，又宜沖水一大碗服吃。若水少亦常不瀉下。

鹽類下劑與植物性下劑如大黃甘遂等常合用，因大黃等能增進腸管蠕動，鹽類下劑則保持食物容積，二者合用易於排便也，若腸內容積乾燥排泄困難者，則油類下劑甚佳，因鹽潤滑腸壁也，在中醫此三者常合用，下劑能發生腸痙攣疼痛者，宜合用鎮痙止痛劑以減病人之痛苦，如承氣湯之用皂莢厚朴，西藥之下劑加阿托羅平阿片，生薑等是其例也。

下劑妨礙腸內容物之吸收，故宜避免與他種營養物及藥物同用，（緩下劑較少此弊惟鹽類下劑則妨礙甚大），惟虛弱人之下劑宜與強壯劑合用，因恐至虛脫也，如賢龍湯硝黃與參芪

合用，西醫亦有下劑加士的年之例，今將各中藥下劑略論之。

甘遂

瀉下之力極強，在大黃蘆薈之上，惟不巴豆耳，因能刺激腸粘膜，亢進分泌奪去鹽液。各藥水腫皆用之并能利尿。

甘遂九源黃疸，體大如囊，陰腫如斗，甘遂 葶刀各二兩 杏仁五十枚 巴豆四十枚 蜜和
九三消丸治腫脹 甘遂 木香 巴豆各等分研末米糊丸每服一錢用薑三至八分。

大戟

爲猛下劑，惟力遜甘遂耳并利小便。

神佑丸治陽水腫脹大小便秘， 大戟 芫花 甘遂 大黃 黑牽牛 輕粉各等分研末棗肉爲丸每次五七丸日三次。

控涎丹治骨下積痰作痛（肋膜炎）大戟甘遂白芥子各等分研末糊丸每服十五至二十九用量○，五——一，五

芫花

治水腫并祛痰。

十棗湯治胸腹裂痛（肋膜炎） 芫花 大戟甘遂各二分研末大棗十只和服用量○，五——一，五。

日本湯本求真論，甘遂 大戟 芫花 葶藶曰此四藥爲主治瀉下胸膈停水之峻藥（公選按其他炎症滲出物亦皆可以瀉下吸收之）但以甘遂之力爲最大，大戟 芫花次之，葶力更次之，醫雖主治胸痛，及咳嗽，喘鳴，但前三者鎮痛作用爲主，喘咳作用爲客，葶力則治喘咳作用爲主。鎮痛作用爲客，今世治腎者多平庸之輩，治病多先求無過，不求有功，一味以庸懦應付，坐便雄兵而將廢棄不用，可不嘆哉，（甘遂大戟芫花市醫少用惟葛刀較多用之）。

續隨子

功似同大戟，甘遂，又治疥疔除疣黑子（塗疥疔，去殼取白者壓去油用相傳爲毒虫所螫用本品磨碎磨擦能去毒）用量○，七——二

牽牛子

有黑白二種，黑者力速名黑丑，白者力緩名白丑，利大小便，逐水消痰治水腫，喘滿痰癆，氣塊，一切瘡癰，發腎，無名腫毒，服本品後膿血從大便下，病自愈，（按此亦如疔癰百效丸之以猛瀉以消痰去毒也）。

牛黃散治肺熱，脈滑大，氣急，喘滿，大黃兩 白牽牛二兩 研末蜜水調服二錢立止

舟車丸治水腫水脹形氣俱實 罌粟牛四 大黃二 甘遂一 大戟一 芫花一 胃皮一 桔紅

一木香○，五 輕粉○，一 研末爲丸

牽牛丸治痺痛，風濕，毒腫，鶴膝風，脚氣，手氣，牽牛一味研末糊丸服用量○，三——一

射干治咽喉腫痛專藥并有輕瀉作用，通經閉，利大腸，鎮肝明目，用量一——三

祛痰鎮咳劑

呼吸器之病變甚複雜，而所用之藥物亦甚複雜，氣管及肺氣泡粘膜炎時能分泌一種粘液，粘液過多堵塞氣道，氣管粘膜炎受刺激乃反射的而生咳嗽將其粘液咳出，此咳嗽之所由生也若粘液粘稠不易刮離者則須稀釋之，此時宜用溶解性祛痰劑，使其粘液稀釋而易咳出，若老人或小兒或虛弱而無力咳出者，則須增強其咳嗽力，此時宜用刺激性祛痰劑，將其粘液咳出，若氣管粘膜炎過敏，咳嗽頻繁，妨礙睡眠，及其安寧者，則須減少其咳嗽，此時宜用鎮咳劑，使其安靜恢復原氣，若氣管氣泡分泌旺盛，粘液壅塞有礙換氣作用者，則須減少其分泌物，此時宜用制泌劑減少其分泌物，今再將各劑分論之。

(一) 溶解性祛痰劑

能稀釋氣管之分泌物，使粘稠變為稀薄，俾易咳出，西藥之鈣母尼亞（簡稱鈣）有卓效，中藥無其匹也，鈣為鹼性物，能溶

解粘液，內服吸收後由氣道排泄，增加粘液之分泌，其濃液能麻痺粘膜細胞之毳毛運動，為消液反亢進之，小兒氣管狹小，若分泌太多，堵塞氣道，妨礙排氣，致成肺氣腫，故鎮咳在小兒宜慎用，不可用大量，且每加刺激性祛痰劑用之。

鐘齒香精

ALMOND OIL FOR ENIGMA 為齒香油二分，稀酒精八十分，鉍水十七分混和而成，痰粘稠不易咳出者用之，有興奮作用，內服或注射治虛脫，外用塗

療，治風濕之疼痛，用量一四〇，二——〇，五

銨氣鹽 AMMONIA FLUORIDA 稀釋痰液并利尿治水腫

治傷風咳嗽方 銨氣鹽三，〇 什草硫膏二，〇 水一〇〇，〇 一日三次分服。

(二) 刺激性祛痰劑

刺激口腔氣道粘膜炎進分泌惹起咳嗽，又由其體弱而使咳嗽稀薄，（有咯血時及胃腸障礙時禁用，因本品乃胃腸之作用

非用其吸收作用也，又高熱時亦禁用），老人虛人咳嗽反射消失，痰液壅塞喉嚨，每致肺氣腫，此時宜用此類藥。西藥之吐根中藥之遠志桔梗屬之。

吐根酒

以吐根一分侵於稀酒精十分而成用於氣管枝炎，肺炎，肺癆，肺氣腫，咳嗽者，（痰粘稠則含銨劑用之，咳甚妨礙睡眠者則合可待因劑用之）

一次〇，五至一，五（十滴至三十滴）本品又可用於催吐，凡呼吸器病，喉頭炎，氣管炎，吐者用之，用於催吐者一次用二，〇至四，〇。

治老年痰多咳嗽發熱鼻塞吐根酒五，〇 水楊酸鈉四，〇 杏仁水九，〇 銨茴香精五，〇 氯化銨二，〇 水二〇〇，〇 一日三次，二日分服。

(三) 鎮咳劑

能鎮靜氣管枝痙攣而止咳嗽，咳嗽頻繁妨礙罹病臟器之安靜，甚或引起咯血，且能將胸內壓力昇騰，而致循環障礙，或妨礙睡眠，如此則病情益甚。

力甚大，宜用鎮咳劑使咳嗽減少以安靜之，西藥之可待因嗎啡有卓效，中藥無其匹也。起者，半夏，干姜，砂皮，茴香，雖有多少鎮咳之才，然亦不如。

磷酸可待因

codein Phospho 由鴉片中提出，鎮咳之力優於嗎啡鴉片，其治疼痛及下痢，用量一次〇，〇二——〇，〇五，一日三次。

陀佛氏散

由鴉片一分，吐根一分，硫酸鉀八分混和而成，可鎮咳，止瀉，發汗（鴉片能刺激汗腺有發汗作用，但對其他分泌腺則有收斂作用如對唾腺腸粘膜

線是也）用量一次〇，二——一，〇，一日三次。

(四) 制泌劑

心弱常致肺臟鬱血，（此指非急性性炎而言）血清滲漏於血管之外而成，稀薄壅盛之痰液，阻塞氣管，妨碍換氣，此時宜用制泌劑制止其過盛之分泌，

遠之可待因，嗎啡有制泌作用，松節油蒸氣噴喉亦可制止分泌，但中藥治此亦極足稱道，細辛，干姜，半夏，陳皮，桂枝，茴香等制泌之力甚強，白朮，茯苓等溫性利尿劑亦有制泌力，凡痰液稀薄壅盛者余常用此類藥以建奇功，似乎西藥不及也，然痰液壅盛有由於神經分泌障礙者，此類刺激興奮劑亦有卓效。

呼吸迫用藥約如上述，然一哮喘亦為常見之呼吸器病，哮喘為氣管枝痙攣，然有發於心清者，有發於腎病者，其治法甚為複雜，若發於氣管枝痙攣者則鎮痙劑麻酔劑可用可待因，嗎

啡，麻黃，細辛，干姜，五味，半夏，陳皮，厚朴，蘇子，杏仁等皆佳，若發於心病者則用
驗心劑如毛地黃，樟腦，黃芪，地黃，人參之類，若發於腎病者則強心利尿并用，西藥之毛
地黃利尿素，中藥之附桂八味丸可用，若氣管枝炎粘膜炎腫脹妨礙擴氣作用有似喘息
者，則以消炎為先，通心鎮咳在其後矣，百日咳亦為氣管痙攣，可待因，嗎啡，安知必林，
溴劑，抱水克羅拉耳，Chloral hydras 規寧等鎮靜麻痺劑有卓效，中藥不及也，余經驗中
藥治百日咳惟白朮，地骨皮，牛蒡子，馬兜鈴，杏仁，陳皮之類有效，小青龍湯，鸛鴛丸
效力不確，然亦不及西藥也，又碘化鉀久服可稀釋痰液久年哮喘咳嗽用之甚佳。

肺炎氣管枝炎 余經驗西藥大體頗有效，余希望中醫界採用之，然中藥之消炎劑亦有足稱
者，竹瀝，竹黃，石膏，前胡，牛蒡子，貝母，桑白皮，葶前，知母，葶藶，蘆根，桔梗，
甘草，薄荷皆為妙品，此外如通用於各種炎症之消炎劑，如元參，連翹，銀花，菊花，玄芍
，升麻等亦有效，惜時所見甚少採用之耳。

余治傷風咳嗽喜用西藥，因稀釋性祛痰劑如鋁者為中藥所無，刺激性祛痰劑如吐根遠志亦有
藥之銀不及，鎮咳劑之可待因嗎啡中藥無此神品，僅制止分泌劑如細辛，半夏，干姜之類似
勝西藥耳，消炎劑則如有所缺，余常中西合用，收效似更大，昔年大煙風一類藥未發明時，
余見西醫治肺炎多不效，非常痛心，今大煙風出可以稍減其過矣，中藥則竹瀝竹黃極可贊賞

，西藥之成藥治咳嗽有極效者，自抗戰軍興此類藥既不易得矣，今列數種如下TUSSONAG-CocillinaCo, Creiva L.Sedatusin及白松糖漿可供病家之採擇也，今將中醫祛痰劑分論之。

遠志

為刺激性祛痰劑能刺激氣道使分泌增加，痰易咯出，心腎病而成水腫者有用以利尿，但於心之制阻甚大，無論心有何病皆不宜用，其主要作用在氣管枝炎，每兼他類藥痰劑之，以上為西醫之記載，中醫却太相反，凡心悸，怔忡，不寐（神經性心臟病）皆用之，以為安神寧心強壯之品，無用之却痰者，此中醫之誤耶，抑西醫之化驗未確耶，猶待將來之研究也。

遠志湯治心虛，煩熱，夜臥不安及病後虛煩， 遠志 黃芪 當歸 麥冬 棗仁 石斛 茯苓
神 甘草用量一——三

甘草

用於氣管枝炎，催促氣道分泌能使喉頭氣管粘膜炎減少則痰為和緩祛痰劑中醫多用調味甘藥用量一——三

栝樓

處名瓜蒌，子及根（天花粉）皆入藥用，子用作祛痰鎮靜藥，兼滑腸緩下，根息消渴，通乳，消腫，治結胸胸痺，用量三——五

枳實

含揮發油，有祛痰，利尿，發汗，消化，止瀉作用。藥效詳若香性健胃劑篇，中醫有只壳只實之分，妄也，中醫治瀉罔用只實，厚朴，瀉罔即消化不良，只朴消化痰也，故治之又謂能寬中下氣，實同一意義用量——三 陳皮功用大略同此。

五味子

祛痰治喘息，中醫以其味酸謂有收斂作用，非是，乃一鎮咳劑也，又當作生津止渴補益之品，○，五——二

桔梗

為刺激性祛痰劑，似遠志而融血作用過之，故治咳嗽實不及遠志，中醫謂有昇提作用，用意謂能將藥效及病變昇提於上，（如脫肛用桔梗能將直腸提起，和各藥共服能將各種藥效升提於身體上部）不知何所根據，仲景用桔梗為排膿劑，（排膿湯為桔梗芍藥只實）陳漢齋先生盛贊排膿湯治炎症如喉炎，胃潰瘍，膀胱炎有卓效，但余覺其效力可疑，用量

一一三

麥門冬

含許多植物粘液，其作用為局部作用，非吸收作用，蓋呼吸器發炎時咽喉上部之粘膜紅腫因此藥之敷佈，可以免外界刺激而咳嗽乃除，乾燥之感亦除，因此間接促成深呼吸吸道炎症之治愈，天門冬，玉竹之類亦同此，中醫以為能生津止渴除痰止咳者，實過於誇張之詞，蓋此類藥實無大效用也，用量二——五

貝母

有川產浙產之制，止氣管枝分泌，減少痰液，有用於治療癆者，豈有消痰作用歟，
用量二——三

款冬花

爲祛痰藥，性溫潤，久嗽而乾咳者宜之，初咳不宜，久咳款冬花置火上燉之用
管及其烟此中醫之噴霧劑也。

百花膏治喘咳不已，痰中有血，款冬花百合各等分蜜丸羌湯下。

前胡

有解熱消炎作用，其解熱較柴胡爲和平，今中醫多用以止咳，似有消氣管炎及解其
痙攣作用，用量二——三

滑火寧嗽湯治粘嗽吐痰有熱胸中痞悶 桔梗 貝母 前胡 貝母 赤茯 黃苓 麥冬 桑皮

甘草 生羌用量一——二

沙參

爲祛痰劑治久咳肺痿，張錫純先生謂治肺癆每日煎服三四錢連服十餘日有效，但恐
未必用量二——三

旋覆花

屬菊科有消炎作用功效或同菊花，詳解毒劑篇，其治咳嗽者或爲消氣管粘膜炎
，其治隔噎則消胃粘膜炎也。

旋覆花代赭石湯治心下痞硬，噯氣不除者（胃炎） 旋覆花 甘草 人參 半夏 生羌 代
赭石 大棗。

治風濕痰飲，上攻頭目，眩脹，齒疳花 天麻 甘菊花 用量二——四

紫苑 常與款冬花合用，治虛人久咳，癆嗽爲溫潤祛痰劑，治咳之力甚大。

射干麻黃湯治咳逆上氣，喉中作水雞聲，射干 麻黃 生姜 細辛 紫苑 款冬 五味 大棗 半夏。

百部

根似天門冬爲止咳及皮膚殺虫藥，治肺熱咳嗽，骨蒸，傳尸，疔瘡，癬疥，蚤虫，(水煎三五兩外用有殺蚤虫之效)黃勞逸謂能減退中樞神經之興奮，以鎮靜呼吸機能之神經，并減輕氣管之分泌。

止咳散治諸般咳嗽(此方治久嗽不愈，余經驗甚效，余雲帥謂治傷風咳嗽甚佳) 桔梗 荆芥 紫苑 百部 白前 陳皮 甘草用量二——四

桑白皮

爲利水及鎮咳藥，有消炎作用，急性氣管枝炎，肺炎用之甚佳，(瘡) 桑白皮散治腳氣，腹脹滿悶喘息，桑白皮 桴橘皮 枳殼 木香 大黃 牽牛子 杏仁

天門冬

功似麥門冬用量亦相同隨時醫多用麥門冬而少用天門甚不可解。

馬兜鈴

祛痰清肺熱，大約有消炎鎮靜作用，用量二——四

杏仁

有南北之分，北杏仁味苦含階酸有鎮咳作用，南杏仁無之，故無鎮咳之效，僅可用其粘漿作用安撫喉頭粘膜，減輕炎症之刺激而已用量三——六

半夏

功似阿托羅平 Atropin 能緩解胃腸痙攣，止吐，止瀉，并解氣管痙攣止咳，定喘，有效成分大減，余喜用生者惟隨俗加生姜以制其毒耳，（俗謂生姜可制半夏毒未知是否）用量二——八

蒜頭

有健胃，祛痰，利尿，消腫之效，先祖母一次久咳不愈，吃蒜數次而愈。

石蒜類似吐根 *Veratrum* 毒性比吐根弱，催吐比吐根強又能殺阿尾巴亦痢菌及肺二口虫惟未知可否用以代吐根。

沒藥

爲一種樹脂含揮發油，中醫作用止痛破瘀癥宿血，西醫則用治氣道分泌過多而無效出力者，是視同吐根遠志類矣，此外又用以調經健胃舒筋，大約有鎮痙鎮痛作用，外用煎水漱口，治牙齦潰爛，口瘡，蓋有收斂作用也，用量二三錢（煎劑）

茴香

含揮發油中醫用爲行氣藥，日本謂其稀薄液有催乳作用，濃厚液則有通經及遏止乳液之分泌，（藥物有因大量小量之不同而功用完全相反者）此外有健胃，驅風，催胃腸分泌，又能使氣管粘液易咯出凡此皆一般揮發油所通有之作用也，用量一——三

良薑

含揮發油越發新，澱粉護膜等有祛痰鎮靜健胃作用，治吐瀉腹痛咳嗽，功似干姜而稍異，用量二三錢

竹瀝

用生淡竹截成寸許去節破成四片架火上炙之兩端有液流出以碗盛之卽竹瀝也，本草謂治中風口禁痰逆大熱煩悶消渴血虛自汗先父謂氣管枝炎痰多者有大效大約有消炎制泌作用譚次仲先生謂可治腦出血用釐四五勺

天竹黃

苦竹淡竹生屑，其節孔中分泌水液，繼漸收乾，凝結成塊狀卽天竹黃也，頗似砂礫，色白灰或黑灰，今藥德多僞品，購時須注意，其成分百分中含珪酸七十分，鉀鈣有機物水分等三十分，可治驚風，中風，神經痛等，功用略同竹瀝，余用以治肺炎，氣管枝炎有大效，大約有消炎退腫止泌作用，用量一——五

枇杷葉

治咳嗽嘔痰，解暑，降逆，大約有消炎作用，咳嗽喘逆者中醫常用之功用略同覆碗花，肺癆咳嗽有單煎枇杷葉或膏治之者，其治嘔喘卽治胃炎也，本品又有利尿作用中醫用以解暑熱（單方）脚氣衝心枇杷葉煎水服 枇杷子含鞣酸 功用同杏仁可代

杏仁 用量二——三

胃腸劑

用於腸胃之藥多稱為健胃劑，然該類藥不獨健胃已也，故今改稱為胃腸劑。

胃腸病在疾病中佔頗大之數，蓋今世對於營養飲食多不講究，富有者酒肉徵逐，貧困者則多食粗糙難消化之物，尤其士兵狼吞虎嚥，不細細咀嚼，胃首當其衝安得不病，胃炎，消化不良，胃酸過多，胃潰瘍所以屢見不一見也，胃病而消化不良，食物又不宜，腸亦隨之而病，腸炎，泄瀉下痢亦多見也，尤於暑天，腸易受刺激，食即多不慣，泄瀉下痢亦多見，今據統計致小兒死亡最多之疾病為腸病之泄瀉，可不慨哉。

胃腸劑最多使用者為健胃劑，健胃劑皆利用其局部刺激作用，刺激胃腸粘膜充血，催進分泌，增加蠕動，及旺盛其消化吸收，其含揮發油者又能制解腸風，此類藥可分為三類，（一）苦味劑如胆草，黃連，黃芩，馬錢子，規寧之類是，（二）芳香劑如木香，藜香，陳皮，川朴，只實，薄荷，蘇葉之類是，（三）辛辣劑如胡椒生薑肉桂豆蔻之類是，苦味劑如胆草等應有消炎作用，芳香劑含揮發油多，易飛散，吸收速而排泄亦速，作用不能持久，用以驅風制酵有效，芳香辛辣劑有鎮靜止痛作用，此三類藥除健胃之外，止吐止瀉消炎亦用之（常三藥合用）。

胃酸過多症及胃潰瘍在今世亦與日俱增，制酸劑爲主要藥，小蘇打，澱製鎂，炭酸鎂可以中和酸質，胃痛得此立止，胃潰瘍余經驗次確酸鈣極佳，有收斂保護之效，一次可用大量（十瓦至十五瓦）Lancet + Idi 亦效，中藥無勝之者，陳遜齋先生謂排膿散（枯梗芍藥貝實）治胃潰瘍有效，但未知有治驗統計否，余覺其效可疑也，胃潰瘍常時愈時發，偶而病愈不能歸功該劑。

胃腸因食物不慎常致發炎，每見嘔吐胃痛（亦有不嘔吐者）腸炎每見泄瀉不痢（小腸發炎則常致便秘）故消炎劑如元參、銀花、升麻、連翹、菊花、牛蒡子、槐花、白頭翁之類可用，然今世中醫少注意及此，僅用銀花、槐花、白頭翁而已，使用範圍未免大狹，埋沒良藥也，黃連黃芩亦爲消炎佳品，川朴只實白芍鎮痙制酵止痛，尤其白芍止腹痛（腸痙攣）有卓效，時醫喜用木香榔檳治直腸炎之裏急後重，余覺其功效可疑。

胃腸下垂，疝肌門脫出者，由於胃肌腸肌系膜韌帶等痿弱之故，余經驗黃芪有興奮強壯之功，可治胃腸下垂，胃擴張脫肛者用之可以縮小縮回，馬錢子（士的單）亦有效，但余無經驗，黃芪直接興奮肌肉，抑或興奮神經至今不明，余對衰疲及弛緩性下痢用黃芪每見奇功，今將各胃腸藥分論之。

小蘇打

即重碳酸鈉爲鹼性健胃劑，可中和酸質，溶解粘液，胃酸過多之胃痛，及胃發酵之嘔吐而頭痛者服之皆有效，胃粘膜炎，膀胱粘膜炎，尿石，胆石，痛風，脂肪過多，糖尿病等血中酸質過多者，用之有效，關節風濕，以本品溶液浸布裹於痛處有效，用量一回〇，五——一，五瓦一日一〇，胃分數次服。

胃製酸藥

爲鹼性健胃劑，用於胃酸過多，醱酵過多，又可爲瀉劑，用量健胃制酸〇，二

亦用以中和酸質，鈣劑有止瀉之效，鎂劑則有瀉下之效，故因大便關係，制酸藥中鈣劑當與鎂劑合用，或相間使用，何者應多用何者應少用，每視其大便之形情而定，便秘者多用鎂劑，便滑者多用鈣劑。

治療胃酸過多及胃潰瘍，余親病人服制酸劑每嫌其量不足，多服實無妨，且宜於每飯前一二小時服用，晚睡前宜再服一次，因人睡後胃酸常分泌遊離酸也，鹼劑多服無碍，然過量亦致危險質過多症其症候爲頭痛，厭惡食物口乾燥大渴，疲倦，惡心，嘔吐，有此病象發生即宜停服，俟病象除後再服。

中藥之制酸劑無有勝西藥者，牡利龍骨，未服可以常之，然亦不如西藥製遺之精良，惟香砂六君子湯，加味茯苓飲（請閱卷一胃炎等篇），對胃酸過多，胃潰瘍有效，其作用在制酸之

外也。

次硝酸鉍

爲酸鹵藥，時醫多用以爲護膜，收效作用極強，能殺殺發炎之粘膜，及潰瘍而保護之，免受外來之刺激，其收效瘡口，促癒治愈。

本品又能止瀉，因其能防腐可制發酵過多，又與既生之硫化水素結合而減弱刺激腸管之作用，故於各程之下痢。

本品與小蘇打混和，經時過久有爆炸之虞，然數日之內用之尙無碍，用法一，〇——三，〇如胃腸潰瘍一次可用一五。

處方次硝酸鉍六，〇阿片末〇，一二分上六包二日分服爲止瀉藥

止瀉劑以阿片爲第一，中藥無勝之者，惟止瀉劑不可用於瀉痢之初期，用之太早，有留毒之患，阿托羅平，莨菪，闊羊花，天仙子之屬能麻痺腸管止痙攣以止痛止瀉，功似半夏，中醫止瀉常用苦味劑如黃連，黃芩（消炎收斂）芳香劑如藿香，川朴，陳皮，蒼朮（鎮痙止痛制酵）辛辣劑如干姜，胡椒三種或加利尿藥如茯苓白朮澤瀉之類用之。

次沒食子酸鉍

DESMIDIN + O.I. 功似次硝酸鉍而防腐及使局部乾燥之功勝之，可代黃磷用，撒布潰瘍而有保護收斂之效，可用於止瀉用量〇，二

次水揚酸鈣

功用同次磷酸鈣，腸內分解而排出水楊酸，故防腐之效較強，用於腸內食物之腐敗發酵之下劑用量〇，三——一，〇。

中藥治胃腸病極可稱道，余治肺部病每實用西藥，惟胃腸病則實用中藥，六君子湯，茯苓飲，理中湯，藜香正氣散之類，善用之確甚效，茲將各中藥略分論之。

黃連

為苦味健胃劑，主要作用在消腸胃炎，但結膜發炎、及大腸興奮（瀉任）亦用之，余常用三黃湯（芩連大黃）以治大腸興奮之狂瀉，甚效，是則黃連有減身體七部充血、減大腸興奮之效歟，然與抱水克羅拉耳Chloral hydras及司科科拉民Scopolamin相較則又不知也。

或云黃連有收縮子宮作用，對於胃腸之炎症有收斂及制止醱酵作用，波爾氏謂一般含苦味質之藥均能刺激腸粘膜，與附近之淋巴管，使淋巴增殖，消退炎症，更能刺激胃腸神經令胃腸之蠕動增加，又可促進胃腸之消化及吸收力而使食慾增加，用量〇，五——三。

龍胆

刺強味覺神經，引起唾液之分泌量增加，或謂食後用苦味劑，每見胃液分泌減少，反致消化不良，然胃中之苦味質消失時，胃液之分泌又急劇增加，故飯後用苦味劑實有碍消化，惟於飯前用之，有刺激胃腸而具健胃作用耳，然而久服及服大量反於消化有碍，中醫界所常經驗者也，用量〇，五——三。

胡黃連

味苦，健胃，殺虫，然今中醫多用於骨蒸癆熱，其退熱作用如何尙無精確之實驗報告，不過腸瘻扶斯及肺癆之久熱不退者，用之或有功。

黃栢

合比比靈 *Chelone* 與黃連同而量較小，研末外用治粘膜炎，結膜炎，（浸水點眼），及油調治皮膚紅腫甚佳，內服治胃腸炎，凡此皆似黃連而力較弱耳。

上列苦味劑之用量一次約微分至二三錢，其他苦味劑如黃芩，規草，士的牟之類皆利用其局部刺激作用（凡味苦皆有此作用）處於原條，若吸收作用則各別矣，惟中醫極少用苦味劑以健胃者，其香薷亦少用，最外用者爲辛辣劑。

生姜

屬辛辣健胃劑，含揮發油有解腸胃痙攣，止吐，止瀉，止疼痛，防噁，制毒作用，婦人經閉而子宮痙攣疼痛者，可以此緩解之，受寒之經閉服之其效尤顯，能增加腸部之吸收力，故可治泄瀉，加於瀉藥內共服可免腸部痙攣，胃腸無緊張力者可以此興奮之此劑辛辣劑又能刺激汗腺神經，奏發汗之效，若服大量則刺激胃腸發炎而致吐瀉，大量吸收後排泄於腎刺激腎臟發炎，致小便時疼痛，尿亦濃稠，若腎官能遲鈍者，服少量可以刺激之以通利小便，慢性腎炎有免蛋白尿之能，慢性咽喉炎扁桃炎可以此類藥，局部刺激之，興奮之，促其治愈，然用大量又增炎勢矣，故適可即止，又辛辣劑外敷可以引赤，可以治腰痛，頭痛風濕，凍瘡等。

丁香，肉桂，豆蔻，披殼，良羌，胡椒，辣椒等辛辣劑，雖有多少不同，然其一般作用與生菴大略相同，并曾聞發汗劑桂枝條可也。

芳香性健胃劑所含之揮發油，較辛辣劑所含者揮發性較大，故吸收較易，排泄亦較易；其鎮靜作用止疼痛及驅風之力亦較大，然其力量則不如辛辣劑之持久，且不如辛辣劑之能透腸之下部也，又刺激力亦以辛辣為較大，且辛辣劑刺激胃壁，反射的能興奮遠隔臟器之機能，故辛辣劑有強心興奮作用，此芳香劑所微有而遠不及者也，又辛辣劑因有刺激興奮作用，血管弛緩性之出血待之可以興奮血管中樞，收縮血管以止血，干姜之用於止血即其例也，肉桂亦有此功，又肺部小循環鬱血，血液滲漏稀薄液，壅塞肺泡及氣管，同時肺部鬱血分泌增加，咳嗽稀薄痰液之時，干姜細辛胡椒之類能旺盛血液循環，緊張血管，制止滲漏，所以痰飲支飲用干姜細辛半夏胡椒等，可以速減其痰液即此故也，然炎勢旺盛者忌之。

木香，藜香，薄荷，蘇葉，香薷，茴香，沉香，檀香，降香等氣味芳香者屬於香性健胃劑，干姜，胡椒，辣椒皆屬於辛辣健胃劑，若肉桂，高麗，厚朴，貝實，陳皮，丁香，波菴等則介於芳香辛辣之間，若健胃則三者中（苦味芳香辛辣）以辛辣為勝，以其刺激力大也。上述三類藥，雖名健胃劑，然健胃之外效用仍甚廣，苦味劑之消胃腸炎，芳香辛辣劑之治吐瀉腹痛，除痰飲，辛辣劑之強心興奮，旺盛血行，滅除稀薄痰液，及止血，用之得宜，可除

痰，起沉疴，以健胃名之，不嫌其狹，又此類與全酸者，有收斂止瀉之效（大黃肉桂

厚朴

理化驗報告與苦苣所合之揮發油相似，仲多治飽滿，喘急（胃腸慢性消化不良
醫薛生氣體）治霍亂，中暑，單服可治泄瀉，用量二——五

白朮

功用如其他芳香辛辣，止吐瀉，解胃腸痙攣，除腹痛，中醫謂能開心竅者非也，大
約胃腸消化不良時，食物積滯飽滿病人極不舒服，得此芳香劑制薛風所患頗多，

神清爽，中醫誤以為開心竅也。

二棱莪朮

含揮發油介於芳香辛辣之間，二者常合用，效用大約相同，中醫常用以通
經，在能引起骨盤充血，及解子宮痙攣也。

此外陳皮，木香，荳蔻，茴香，只實皆芳香或辛辣劑功用大略相同，請閱上文及發汗劑桂枝
條。

此外麥芽含澱粉消化素，鷄內金含胃液素，神曲含酵母，山查含酸質，皆有助消化，西藥之
胃液素，澱粉化素，出品不少，但皆功效不大似不如辛辣健胃劑之能卓效也，然白朮人參黃
芪茯苓健胃之力亦極大，請讀原條。

強壯劑

凡欲使身轉弱爲強者，皆隨之強壯劑，健胃劑能增加營養物之吸收，鉄劑補血，磷劑補腦，砒劑滅弱異化作用，其他旺盛新陳代謝與各臟器機能之品皆可爲廣義的強壯劑，然今所討論者範圍較狹。

強壯之品西不如中，一頗有地位之西醫告余曰其所治之病人，病將愈時輒捨彼而治於中醫，蓋中藥之病後調理劑勝於西藥也，中藥之人參，白朮，當歸，黃芪，茯苓，陳皮之類健胃與奮之力甚大，尤以人參，黃芪，白朮可使衰弱之腸胃，在短期內恢復至健康程度，西藥之消化素遠不及也，若鉄劑則效力極慢不可與參芪朮同日語矣。

砒

內服少量砒劑，能旺盛身體之同化作用，組織增殖，尤以皮下蜂窩組織脂肪沉着，外表頗豐滿光澤健康之象，且能擴張皮膚血管，可治慢性皮膚病，如濕疹，苔癬等，此由於砒對病理組織有破壞作用故也，（對健康組織起同化作用，惟對於病理組織則起異化破壞作用，因病理組織較少安定性故也，其治皮膚病及惡性瘤腫卽此理）。

中藥之天生硫磺內含微量砒質，漳州葛誠氏人參卽以天生硫磺製鍊者，故其功等效於服砒，張錫鏡先生謂硫磺（指普通中藥店所售之硫磺）有補命門火，壯元陽之功，治虛寒泄瀉，虛弱有卓效，其所著之衰中參西錄言之甚詳，宗任守仁告余曰其妻虛弱消瘦，服葛誠氏人參

發即見肥壯，此即砒砒盛組織之同化作用也，然多服為不利，或有縮短生命之虞，身體強壯者不可服，吾見有服該藥後反生頭痛飭血者，不可不知也。日本藥理學謂砒砒非旺盛組織之同化作用，實減低其異化作用也。

鐵

鐵為微赤血球及肌質內血色素之重要成分，體內不含血色素之組織亦含之其作用如砒砒充進同化作用，奏強壯之效，鐵劑局部有止血作用，吸收入體可治貧血病，平常食物含

鐵甚富，可供體內之需，惟失血之貧血病，需要鐵質以製造血色素時，非服鐵劑不可，此時鐵可視為一種營養劑，若惡性貧血病，白血病，痿黃病，則鐵劑能刺激造血器官生血而奏治愈之效，此時鐵劑為治療劑，而非營養劑矣，豬血牛血及各動物血含鐵甚富，而血色素蛋白質養價值又高，故血實一極佳之補劑也。

砒鐵劑過量則中毒，自製過其分量不准確有危險，不如選購市售成藥，紅色補丸即砒鐵製成者甚佳，惟價太貴耳。

今世科學進步，研究所得始知人類之衰老乃由於睪丸卵巢內分泌之凋殘所致，所以補充該項內分泌即可以返老還童，此為二十年來甚露塵上之補劑，根據此種學理而產生之藥物，亦層出不窮，賜保命，英丹兒明，安樂根之類即其例也，（余經驗拜耳之安樂根與喬性悉有卓效，為此類傷生命之藥物，不可濫用）繼他命之於健康，其重要猶內分泌也，以上二種皆須專

文討論非此短篇所能盡也。中藥之強壯劑甚多今介紹數種極重要者言之。

黃芪

中醫謂大補陽虛，益元氣，生肌生血，排膿，內托疔癰，陽虛而麻痘不起者宜之，有汗能止無汗能發，中醫對本藥之藥效解釋如此，今觀仲景之處方。

(一) 蒼芍桂枝苦酒湯治身體腫，發熱汗出而渴，狀如風水，汗沾衣色正黃如葯汁厥自沉一方。黃芪 桂枝 白芍 加苦酒(醋)

(二) 防己黃芪湯治脈浮身重，汗出惡風，又治病者但下腫，從腰以上和，腰以下常腫及陰，難以伸者。一方。防己 黃芪 甘草 蒼朮 生薑 大棗。

(三) 防己茯苓湯治四肢腫水氣在皮膚中一方。防己 黃芪 桂枝 甘草 茯苓。

(四) 黃芪桂枝五苓湯治血痺外症身體不仁如風痺狀一方。黃芪 白芍 桂枝 大棗 生薑。

(五) 桂枝加黃芪湯治身常暮盜汗，又腰以上汗出，下無汗腰腹弛痛如有物在皮中狀，身疼重，小便不利一方。桂枝 白芍 黃芪 甘草 生薑 大棗

(六) 黃芪越中湯治虛勞羸弱諸不足一方。黃芪 桂枝 白芍 甘草 生薑 大棗 仲景之用黃芪也可得一概念，(一) 治水腫一二三五各方皆有水腫之症候，第四方身體不仁如風

瘰狀似爲皮下組織積水，壓延神經發生麻痺感，大約黃芪有強心增高血壓作用，心臟之木犀用強心劑可以利尿去腫，(一)治虛勞凡心弱，血氣降低各臟器因而得不適血液之滋養而疲弱者，黃芪可以強心，提高血壓，多灌注血液於各臟器(血脈停滯，血液多在靜脈系，無營養作用)因此虛勞得以恢復。(此虛勞指陽虛而言，若陰虛(發熱，脈數，口乾，神經有敏感者)則萬不可用)。

今世化驗黃芪之報告不多，經利彬先生之報告謂(一)對於血糖無作用(二)有利尿作用但余每用以治糖尿病甚效，劉先生之化驗亦嫌簡陋。

今世在臨床上驗黃芪之作用最精詳者無過於饒錫鍾今介紹其名方升陷湯及其治驗於下 黃芪

六 知母三 桔梗 柴胡各一，五升麻一

本方之組織黃芪爲主，知母制黃芪之熱，其餘三味助黃芪升提耳(升提之說專商，後三味可不加入，虛人可不用知母，此方實可當黃芪一味看)，主治氣短不足以息，或努力呼吸有似喘，或似氣息將停，危在頃刻，滿悶怔忡或神昏健忘接以七所說乃心感衰弱之症，今舉其治例以明之，(一)一人年二十餘因夏田過勞，發胸中大氣下陷，(按張錫鍾以爲幹旋全身愈生理者全賴胸中之大氣，今太氣下落於腹，不能營正常之工作，人體不能呼吸，有輕則增胸重則致死之危險，其實非也，不能呼吸，或氣息停止，或氣短及呼吸困難之一種現象

，多見於重症心臟病，動脈硬化，慢性腎炎及全身衰弱等病，黃芪所以能治之者乃強心增高血脈，使全身血液暢流，全身細胞活潑，及興奮呼吸中樞傳呼吸數增大故耳，重症肺病亦有此種呼吸困難然此非黃芪所能治也。四肢懶動，飲食減少，自言胸中悶悶，一經治之不愈，延至二十餘日喘不能臥，晝夜依膝而坐（呼吸困難實不能平臥），服蘇片時，氣息即停，心下突然脹起，急呼醒之，連灌喘息數口，始覺氣息稍續，（按約為俾與氏哮喘，即呼吸停滯相間者也，重症肺病如胸膜炎等及全身衰弱見之此人必為後弱極無疑）持臥片時，覺腹中重千斤，（此疲弱之感覺）不能轉側，且不敢仰臥，延命診治，其脈乍有乍無，再動而止，乃投黃芪一兩柴胡升麻茵肉各二錢煎服，片時腹中尚重十肆，（按小腸動也）有似昏憤，瞬息須臾，恍然醒悟，自此呼吸復常，可以安臥，轉側自如，六脈皆見。

此種呼吸困難與氣管枝痙攣之喘息不同，服錫鈍謂呼吸困難者為太氣下陷，吸難者為腎不納氣，前者可用本方，後者不可，非也，呼吸困難者呼吸皆覺困難，不能單由呼吸氣數氣分之，氣管枝痙攣之喘息，黃芪當無效，若喘息之由於心腎病血管硬化全身衰弱者則黃芪有大效合醫別例明之。

一人年三十餘，動則作喘，時或咳嗽，醫治數年，病轉增劇，皆以為癆疾不可治，其脈非常微細，而指下若不覺其動者，知其氣下陷，不能鼓脈外出以成起伏之勢也，投以升陷湯加

人參天冬各二錢，連服數劑而愈，（按此爲心臟性喘息或兼患肺勞）。

一人年四十餘，失音半載，備覺咽喉發緊，且常潰爛，（按此病頗似喉頭結核喉頭結核如肺病不劇，全身狀況尚佳，亦可治愈否則必死）畏風惡變（按即發熱）冬日所着衣服，至孟夏猶未換易，飲食減少，癡感虛勞，多方治療病轉增劇，診脈兩手微弱，毫無軒起之象，知其胸中大氣下陷也，投以升陷湯加元參四錢兩劑咽喉卽不發緊，遂減去升麻，（按升麻治潰瘍有卓效以不做去爲佳）連服十餘劑而愈（按喉頭結核能以此方治愈甚奇，此爲全身強壯療法也）。

一人年四十許，每歲吐血兩三次，如此四年，年甚一年，且常咳嗽，痰涎壅滯，動則作喘，且覺短氣，其脈沉遲微弱，右部尤甚，知其病源係大氣下陷，（按實肺癆而兼心弱也，其吐血乃由於肺髓發血而致，用強心劑以暢流血行，其血自止，而喘咳及由發血而生之痰涎壅滯亦除黃芪強心暢血行故有效也）投以升陷湯加龍骨牡蠣生地各五錢（至芍實有止血作用）原方知母改爲五錢，連服三劑諸病皆愈，遂減去升麻，又服數劑以善其後。

一人年四十七，咳嗽短氣，大汗如洗，晝夜不止。心中怔忡，病勢危急，遣人詢方，俾先用山萸肉二兩以止其汗，翌日迎恩診視，脈弱欲絕，呼吸略似迫促，自覺大汗驟止，而仍有出汗之時，怔忡見輕，仍覺短氣，知其確係大氣下陷，投以升陷湯，爲其有汗加龍骨牡蠣各五

錢，三角而愈，（按此類似虛脫山莫黃芪之力若是之大乎）。

一教員譚演氣急喘：不出諸口，欲說不能，亦服升陷湯而愈，一婦人年三十餘得下痿症，兩腿痿癱，不能伸屈，上半身常常自汗胸中短氣，少腹下墜，小便不調，疑不能寐，服升陷湯加龍骨牡利各五錢兩劑汗止，腿稍龍屈伸，後以該方出入加減漸愈，（按自汗乃汗腺神經衰弱也黃芪能強壯之）。

此外張錫純以黃芪治愈呼吸困難之證例甚多，余本身作大病（肺癆）之後，身健虛弱，從前之不能服姜附參芪者，今可服大量矣，尤以黃芪每當工利繁重之時，早晨煎服二三兩，一日精神奕奕，工作能力增加，惟晚上服之則防礙睡眠，蓋本品有興奮大腦作用，能令腦部充血，可興奮各神經中樞，防礙睡眠也，惟心臟病之腦充血而失眠者，服之當可安睡。

黃芪能收縮腹部內臟血管，擴張心肺皮膚腦血管，其能治氣虛頭痛即擴張頭部血管也，故可治貧血性之頭痛，頭暈，其強心或在刺激心肌或興奮心臟神經裝置，現尚不明，但能擴張心臟動脈增加心臟本身之營養，心力因此增強則無疑，黃勞逸謂黃芪能降低血壓者或指其利尿而言若其藥用量必為增高血壓也。

黃芪之治皮膚病如瘡癩等亦在其能擴張皮膚血管旺盛皮膚血行，然此僅能用於衰弱性疥癬，即平常慢性皮膚血行不良，化膿遲緩者，得黃芪改善血行可促其化膿及增強病變物質之吸收

，（中醫謂托裏消毒）若痲癩初發，勢急劇烈者，用之反增勢，此時宜用元氣花，神石之類以消去其毒，黃芪非其時也。

黃芪之能發汗在其以盛心力，擴張皮膚血管，止汗在其能收汗腺神經，中醫所謂無汗能發汗能止是也，今經驗黃芪對陽虛（神經衰弱）之汗甚佳，黃芪發汗之理尚易瞭解，但何以能止汗則常使人不解，今引一文於下以明之。

披羅卡平 Pilocarpin 為發汗強劑，但汗腺神經衰弱之盜汗，阿托羅平不能止者，披羅卡平能止之，因其能激動虛弱之汗腺使復原也。

黃芪之止汗或亦激動衰弱之汗腺使其復原，汗之利尿未知是否在增高血壓，但心臟性之汗，余經驗黃芪無利尿之效，其利尿作用豈在吸收組織之水歸於血液，腎臟始得以排除之歟，請讀下案。

德微論：小便不通用黃芪二錢水二盞煎一盞溫服。

陸定剛冷感時話載海寧許珊林觀察精醫題：官度卅時，幕友杜某之戚王某山陰人，有秋忍患腫脹，自頂至踵大倍常時，氣喘聲嘶，大小便不通，危在旦夕，因求觀察診之，令用生黃芪四兩糯米一酒鐘煎一大碗用小匙逐漸呷服，至盡許氣喘稍平，即於一日間服盡，移時小便大通，溺氣易三次，腫亦漸消惟腹面消不及半，自後仍服此方，黃芪自四

兩五一兩渣消殞滅，佐以却濕平胃之品，兩劑復元，獨脚面有錢大一塊不消，恐次年復發，勸其歸，屆期果患前證，延紹城醫士診治，痛詆前方，以爲不死乃是太幸，遂用除濕猛劑十數服而氣絕，次日將及蓋棺，其妻見其兩目微動，呼喚衆人環視，運動數次，復用苡米湯滿救至滿口不能下，少頃眼忽一睜，湯俱下咽，從此聲便出矣，服黃芪至數斤並脚面之腫全退而愈，觀察之弟辛未曹部謂此方治驗多人，爲是搜吳氏患子死腹中，渾身腫脹，氣喘身直，危在頃刻，余兄徧檢名人醫案，得此方遵服，便通脹消，旋卽產下，一無所苦，復在平度有姬顧姓患腫脹，視胎此方數服而愈，繼又治愈數人，王某更在其後矣，蓋黃芪實效：虛則水聚皮萎膜而成腫脹，得黃芪以開通水道，水被祛脹自消矣。

觀上案可知黃芪有利尿作用，然余對此殊無經驗，因所遇水腫皆以他法治愈，未用本品也。黃芪之治腦出血不可用於病發二三日之內，因急增高血壓，增大裂口，更加出血也，如有昏睡發熱時更不可用，俟裂口封閉後，方可用之，黃芪能擴張腦血管，改善腦質之營養，激發腦細胞增加工作，并賴自然作用從容吸收或鹽化出血部及病變部，腦出血反應期過後用之有大效，王清任之補湯還五湯，用黃芪四兩爲一有名之治中風劑，惟在二三月後用之似乎效力不大，豈腦出血經過數月而組織之變化既定無可改變歟。

黃芪爲一興奮強壯劑，有健胃作用，病後服之恢復體力極易，西藥無此妙品。

黃芪又能緊縮弛鬆之組織，如胃腸下垂，脫肛，胃擴張，腸弛緩等症得黃芪可以緊張縮小，（此作用在興奮神經中樞或興奮末梢或直接興奮肌肉尙未得實驗報告，然其增加平滑肌之收縮力，則爲事實），西醫則用馬錢子，弊多而力不及，不如黃芪遠甚，胃腸虛弱性之下瀉附挂理中湯加黃芪奏效甚大，黃芪固有若是之效，然若高紹新師代謝旺盛，脈眩硬，血壓高，腦充血，不眠，頭痛，牙痛，中醫所謂陽虛實症者不可用，用之必增病勢。

玉屏風散治目汗不止，髓氣虛弱，易感風寒 黃芪 防風各一 白朮三

歸脾湯治身體衰疲，心虛怔忡吐血下血，（爲病後調理之妙方）人參 白朮 茯苓 當歸 棗仁 遠志 元肉 木香 甘草 加姜棗煎（加熱地名黑歸脾）內托黃芪丸治瘡癰不紅潤或不收口（按虛症可用陽虛實症不可用）

黃芪八 當歸三〇 肉桂一〇 沉香一〇 木香五 乳香五 研末綠豆粉四兩糊丸如梧子大 每服五十九用薑三——一〇（虛人可用至四兩余會治一大虛症一日用一斤）

人參

俗謂爲補品之王，然世人似乎過於重視，中醫用爲興奮強壯藥，用於衰弱癆瘵，虛性熱健胃止瀉瀉等，日本化驗報告一人參鎮靜大腦，少量興奮血管運動神經，及呼吸中樞，大培麻痺之，興奮新陳代謝，抑制尿糖，又有利尿作用，治貧血，神經衰弱，係慾

激退。

仲景時所用之人參有謂爲今之黨參者，黨參種類極多，有防黨，欽黨，潞黨之別，恐不下多數十種，余經驗以潞黨之力爲大，三小兒二歲時喜吃肥豬肉，但消化力不佳，吃後輒下瀉，余煎路黨與服日二兩，數日而愈，至今五六年肥碩異常，不致因吃肥豬肉而作泄矣，余日煎服防黨半斤不覺有健胃強壯之效，惟煎服路黨半斤則效力甚大，一人患脾腸肌痿，夜夢時常因痿而瀉，中脘胃氣血不行，用路黨參錢兩吃數次而愈，余本人吃高麗參毫無效果，有一次吃白山生參曾得甜睡，但再服已無效，惟服黃芪則效力甚大，但黃芪之副作用極大，門後有弗牙牙痛不眠之弊，篤誠氏之白泡人參聞爲劣參用天生硫磺製煉者，有健胃強壯作用，其副作用仍在天生硫磺所含之砒也，詳論他篇。

經利藥之化驗黨參之報告(一)可使腦中糖量增加(二)能使紅血球增加白血球減少(三)能使白血球增加血液濃厚(四)有緩低血壓之作用(五)有抑制胃上腺素之作用，此等藥爲補血劑，用量隨各病參而不同黨參可用至二三兩。

地黃

爲通氣及強壯藥，能止血而補血除奸婦腹中痛經利彬先生之化驗報告曰：(一)中等量有顯著之強心作用，對於衰弱之心臟其強心作用更爲顯著，但大量反使心臟中毒(按缺性病之心臟衰弱地黃實爲一妙品，因既能強心又能利尿以堆毒解熱也，惟生地液多，有微消化，吸收不易，宜少量頻服爲佳)，(二)能使血壓上升(按此藥吾人寤床所見似相背，乘地黃之止血似在其降低血壓也)，(三)小量常使血管收縮，大量反使血管擴張，(四)有利尿作用(五)能使血中糖絲減少，并有抑制炭水化物引起過血糖之效，(中醫有以八味丸治糖尿即在此乎)。

將生地黃加波羅砂仁生薑等九蒸九晒則變爲熟地黃，此法創自後世，仲景時無之，此不過將難消化之生地加芳香辛辣之波羅砂仁生薑以助消化促吸收耳，又熟地經過百數十年其所含膠質消滅殆盡，則消化較易而其有效成分或仍保存，故中醫以老熟地爲珍品也。

八味丸(一)治脚氣上入少腹，(二)治虛勞腰痛小腹拘急小便不利，(三)治短氣有欲飲當從小便去之(按短氣即喘息此爲心臟或腎臟性喘息)，(四)治子消渴小便反多以飲一斗小便亦一斗(按此顯然爲糖尿病)，(五)問曰婦人病飲食如故，煩熱不得臥而反倚息者(按不得臥而反倚息爲呼吸困難)何也師曰此名轉胞不得溺也，以胞系了戾故致此病，但利小便則愈八味丸主之(按此頗似腎炎) 地黃 山萸萸 山藥 澤瀉 丹皮 茯苓 玉桂

附子 用量三錢至一兩

中醫以液多而無刺激者曰養陰劑如生地，元參，淮山之類是，液少而刺激者曰壯陽劑如干羌肉桂之類是，不問其所含之有效成分如何，實極錯誤之觀念也，熱性而後期心臟衰弱而弱又未退者，須強心而兼退熱，但強心劑每有增熱之弊，如附子干姜士的年等是，退熱劑每有弱心之弊，若欲強心而無碍於熱候者，譚文仲先生頗主用麝香，麝香之力極易消失，實不如地黃之能強心爾又能治退熱也。

胡桃

欽肺，定喘固腎，滲精，勝金櫻蓮鬚常與破故子合用。

人參胡桃湯治痰喘（人參定喘帶皮胡桃欽肺）人參（一寸）胡桃肉（二個去殼不剝皮）

阿膠

爲駝皮牛皮所煎之膠今專用以止血猶西醫之魚膠也（有促進血液凝固作用）。

鹿茸

今證明含內分泌，鞣丸素服之有除去一切衰老病，而反老還童之效，余經驗其效力甚大。

山藥

乃含澱粉甚多之營養品其成分器如甘薯，其醫治作用為不大，吸錫鈍以其粉調羹服治泄瀉，并謂其爲補陰聖藥，續余試之無大效，日本化驗謂山藥含消化澱粉之消化

素，但久煎則效失，是則當用未服矣，（在鹼性液中其功效失在弱鹽酸性中其功效乃見）。

枸杞子

爲性神經興奮藥俗云「歸家千里勿食枸杞」去虛勞，補精氣，滋腎補肺可治咳嗽，明目，久服致陽，經利彬先生之化驗報告曰，(一)能使血糖下降，(二)無利尿作用(二)對於因 *Disturbance of the* 所引起之體溫增高有解退作用觀此則枸杞可用以退熱矣其根曰骨皮爲退虛勞骨蒸之妙品用量三——一〇。

杜仲

爲強壯藥治腰膝痛有卓效，譚次仲先生告余曰，杜仲與牛七(非淫牛七)治脚軟有卓效，家母時患腰痛，余日煎杜仲二兩與服盡八兩而愈，數年不再發。

杜仲酒療卒然腰痛 杜仲 丹參各半斤 川芎五兩浸酒隨飲之用益三五錢(余常一稱用二兩)

補骨脂

即破故芷爲強壯藥，壯元陽，縮小便，止泄瀉，治腰痛。

青娥丸秘補壯陽治腰膝痛，故芷四 胡桃八 杜仲四 蜜丸早晚服。

唐鄒相國方治虛寒嗜噉腰脚酸痛故芷(十兩酒蒸爲末)胡桃肉(去皮研爛)右調蜜如飴每習酒服 用量三五錢

肉從蓉

爲強壯藥益髓強筋治陽痿，遺精，并滑腸治虛秘 用量三——一〇

蛇床子

爲壯陽藥，外用可洗濕癢，陽事不起蛇床子五味子菟絲子各二錢煎服，男子陰囊癢，女子陰戶癢，蛇床子一兩白礬二錢煎水洗之，用量一——三

蓮肉蓮鬚

爲滋養強壯劑遺精用之，用量三——五

蔓荊子

治拘攣頭痛，筋骨間風寒濕痺，大約有鎮靜之效，用量二——三

益智

治遺精小便餘瀝，夜中尿多，泄瀉，爲強壯收斂劑，脾腎氣虛，腹脹，大瀉日夜不止，百方無效者，益智仁二兩濃煎飲立止，婦人血崩煎飲佳。

芡實

固腎澀精補脾去濕治風濕作痛夢遺泄瀉小便不禁腰膝痠痛，用量三——二〇

菟絲子

爲強壯收斂藥，用量二——四。

菟絲子丸

治腎氣虛損，目眩耳鳴，四肢倦怠，夜夢遺精，石蓮肉二、菟絲子五、茯苓一

山藥二

山茱萸

強壯收斂藥，止虛汗之力甚強，張錫純用治虛脫謂功勝參芪，又逐寒濕痺治寒熱，截瘧，一老婦動血八日不止，余用張錫純方山茱萸兩、醋骨兩、牡利兩

加三七三錢 赭石六錢 一劑而愈，又此方可治虛人吐血余用之有效有不效，蓋山萸與荷之力甚大，非極虛弱者不可用也，用量三五錢。

柏子仁 滋養強壯藥，用量一——三。

何首烏 爲補血劑黃勞逸兼生謂可促進腸管之運動，有輕瀉作用，又能緊張腸管促進消化及吸收，是以亦用作強壯劑，然而中醫之使用則與此不同，中醫謂可代熟地用，有熟地之補而無熟地之滯也，又用以治虛弱，用量五七錢。

桑寄生 除四肢風濕骨痛，能降血壓又能強筋骨，止崩漏，用量二——三

淫羊藿 一種羊日交白過，疲弱欲死吃此草即復健，故名。爲有名之性神經興奮藥，陽痿用之，并有利尿作用，其壯陽作用與拜耳安樂根較遠不如也，昔年余在廣州時，友人好狎邪遊者向余索壯陽藥，余用大隊滋陰固腎藥中加淫羊藿一兩每有大效，因之該方遍傳花界，又此藥利尿作用甚強，服後小便頗多，用量三至一〇。

仙茅 爲壯陽藥「使君日夜求藥去，今日人來乞藥銘」唐人好色多服之，然與安樂根較遠不如也，用量二——五

巴戟天

強壯固腎，余經驗性神經衰弱之益精有效，（性神經興奮者不可用），用蓋三錢至一二兩。

龜板髓甲

爲龜板之骨殼，中醫用以治骨蒸，癆瘵前者治難痊，後者治癆瘵，其理甚不可解，一人患久瘵，脾腐腫大，余囑吃鱉魚盡效只而愈，惟未知可通治

各瘵毋否耳，（瘵母即脾腐腫大）

興奮劑

凡能刺激神經，心臟，旺盛呼吸及血行，使精神興奮者，謂之興奮劑，興奮劑大抵用其小量則興奮，大量則麻醉，如酒及附子馬錢子之類是也。

興奮劑在中醫謂之行氣劑，或壯陽劑，與強壯劑有不同，強壯劑如黃芪人參（黃芪或亦可入興奮劑）砒鐵其力緩而持續，服者可漸臻健康，興奮劑則其力速而消失亦速，如酒及附子等不過興奮一時，過後則如平時或反有憊困之感，然生命垂危之際，興奮劑有起死回生之功，故興奮劑可偶用不可常用，非如補劑之可常服也，又皮膚受冷熱刺激或打撲刺激及內服大量胡椒，生姜，胃粘膜受辛辣刺激，皆能反射而興奮神經中樞，及興奮遠隔臟器機體誌，其功用同興奮劑，然此非藥物，不入興奮劑也。

毛地黃

爲西藥強心劑之圭臬，能強盛心肌收縮力，心弱無力攙送血液入動脈系使血液暢流無阻者，毛地黃可以使其暢流，血液循環滯（卽不暢流）之病機甚大，

動脈系少血，靜脈系則多血，成鬱血狀態，靜脈系之血脈既缺養氣，復合許多廢料及碳酸氣，且其血液歸向心臟，不作營養各細胞之用，靜脈鬱血又壓迫各臟器細胞，致成弱各臟器機能，腦鬱血則頭痛，昏悶，失眠，肺鬱血則喘息，咳嗽稀痰液，胃腸鬱血則生慢性胃腸炎，泄瀉嘔吐，腎鬱血則尿閉，心臟本身鬱血則心肌衰弱，肌肉鬱血則無力，血液停滯靜脈即滲漏於血管之外而成浮腫，（因地心吸力之故浮腫，先現於腳部，漸及全身）要而言之動脈系少血靜脈鬱血，所能發生之病象，指不勝屈，毛地黃可以錫其血行不復其種種病象，其功豈不偉哉，中藥可與之比者余獨選黃芪，雖干姜附子人參麝香亦有此功，然不如也，附子大量反麻痺心臟，中藥以附子爲強心第一妙品，誤也，詳辯於附子條。

毛地黃能使脈搏徐緩，脈量增大，心弱多見脈數，此蓋心臟輸出之血量不足，身體之神秘機關，爲求多輸血量起見，乃多搏動心臟以補救之，然而心臟（當擴張時）左室容量不足，雖多搏動亦無補於事，毛地黃乃擴張其容量，徐緩其脈搏，輸出於動脈系者既增多，靜脈血之反流者亦多，血液在動靜脈脈之不平衡者乃平衡矣，（中醫有一大誤解以爲脈沉遲是心弱，實則遲非心弱，心弱多見數脈），若心弱而脈遲者則先注射阿托羅不使其脈搏轉數，然後用

毛地黃。

毛地黃之用於心肌衰弱也，須在其機能衰疲者方可，若心肌變性如脂肪变性等者，則毛地黃反能促其進行變化，及因增大其容量，心臟有因而破裂之虞，不可不慎之。

毛地黃能收縮腹腔內臟血管，擴張心肺腦腎四肢皮膚等血管，血液之處於此者盈於彼，心肺腦腎四肢皮膚得多量血液乃增加其功能，此中醫所謂目得血而飽視，手得血而飽御也，（飯後血液歸腹腔內臟，營消化工作，此時不可用腦及做工，以分其血液），因其能收縮內臟血管及能增加血壓，血行乃極暢達，（血壓低則人感衰疲不振，服黃芪人參後覺精健者即增血壓及心肺腦多得之故也）又常用發汗劑時，若心弱不能送血液於皮膚而作汗者，須加用強心劑，麻疹內陷（即疹發而復陷）亦須用強心劑，毛地黃麻黃參芪皆上選也。

毛地黃之力若是之大，然其發生作用甚遲，內服常於二三日之後始見效驗，（靜脈注射則見功效速）惟既見效驗則持續不失，此即所謂蓄積作用也，故西醫常合斯托洛潘汀用之，蓋斯托洛潘汀效力易現而易失，可以補毛地黃之不足也。

總觀毛地黃之作用，在強心，增高血壓，通暢血流，而其治效則除浮腫，（腎血壓增則利尿，組織間之滲漏液，又因血流暢行而一部復歸血管而得排於腎），去呼吸迫促及喘息，除痰液（除肺部鬱血及增強呼吸則喘息及痰液除）按睡，止頭痛，（腦鬱血常致頭痛失眠）健胃

(胃腸等血除則消化機能恢復)，活潑心臟(毛地黃除直接與齊心肌外又改善心冠動脈血行，增進心肌之營養)，恢復諸肌疲勞(肌肉不得血液營養則成疲勞，得毛地黃後營養增加，疲勞可以恢復，尤以呼吸肌之恢復，恆為調節肺循環之助，呼吸困難可以除之)及活躍各臟器之機能，毛地黃固有若是之效驗然久服能敗胃，(飯後服之較不擾害胃之功能)又久服能刺激心臟之肌肉，促其退行變性，故見效後即宜停服，藥效雖失而心臟既復，可維持治效於長久也，又常因蓄積作用而中毒，用後見麻木不整，或過於遲緩者即宜停服，若頭痛，眼花閃發，皮膚蒼白，眩暈，意識渾濁，嘔氣，嘔吐者為急性中毒之徵，即宜停服。

處方 毛地黃酒三，○ 斯托洛番汀一，○ 水一〇〇，○ 一日三服每服

要而言之，強心劑之作用在調節血液之分佈耳，血液在動靜脈各佔其半，若靜脈多血，動脈少血，則各臟器肌肉成貧血狀態，(靜脈血不用以為營養)各臟器肌肉貧血即得不到營養物，其機能乃減弱，其病象不可勝言也(中醫有目得血而能視，耳得血而能聽，手得血而能御之言，古代中醫既知血液之重要矣)又血液之分佈，腹腔各內臟幾佔其半，頭胸四肢皮膚又佔其半，若血液多歸腹腔則成腹腔充血，他部貧血狀態，其象猶靜脈鬱血，動脈貧血也，一般強心劑能將靜脈之血液驅入動脈，又能收縮腹腔內臟血管，擴張其他各部血管，將腹腔血液驅入心，肺，腦，四肢各部，如此則各病可除，健康可復，故強心劑之功用全在調整血

液之分佈，對於血液之增生等無直接之功，非如鐵劑及富歸也，此猶大將之調兵，兵聚於中樞或生亂萌，若分佈於邊陲，可禦強敵，兵之性質及數量不變也，因其分佈之不同而功用乃大變矣。

斯托洛番汀

Strophantin 作用似毛地黃效力易顯易失，毛地黃二三日始能發揮作用，本品即日可以發揮，故急性心臟衰弱，及症候嚴重迫不及待者，

心臟病患者發熱時，常捨毛地黃而用本品，或將本品合毛地黃用之，胃過敏或因肝鬱血而胃腸吸收障礙者，亦捨毛地黃而用本品，若急性心臟衰弱則毛地黃之效力較為持久而力亦較大也，可用靜脈注射，內服則其劑一瓦一日分三次沖水服。

海葱

作用似毛地黃，效力速現亦速失，有刺激性急性胃炎腎炎忌之，但利尿作用勝於毛地黃，余經驗其水腫之力甚佳。

樟腦

中醫用以霍亂吐瀉甚佳，濟衆水十滴水皆以此爲主藥，中醫之痧藥亦可以此爲主藥，余治痧氣病（痧氣病範圍甚廣，中醫更神化之，謂有七十二種，凡急性腸胃炎，心弱，腦貧血，中暑皆名爲痧氣），用本品一二分，沖一碗冷開水服甚佳，（一定要用冷水，因冷水有刺激作用）。

急性心臟衰弱顯虛脫者多用本品，其功用似毛地黃，即強盛心肌收縮力，增大脈量，刺激血

管神經中樞，收縮腹腔內臟血管，上升血壓，又刺激呼吸中樞，增大呼吸量，肺血管擴張血行通暢，於是右室負担減輕，左室有多量血液流入，心臟動脈擴張，心力賴以回復，凡虛脫，肺充血性炎症，肺水腫，呼吸中樞障礙呈呼吸困難時用之有卓效用法內服及注射俱可（製劑甚多）。

咖啡因屬

此屬藥數種，皆由茶及咖啡製出，咖啡因興奮中樞及脊髓反射機，其他作用於中樞較少，能收縮腹腔內臟血管，擴張心肺腦腎血管，尤以擴張心臟動脈之力極大，增進心肌之營養，又直接刺激心肌增強收縮力，上升血壓，刺激肌肉，增強工作能力，刺激腎分泌機體，增加利尿，能擴張腦血管治頭痛，興奮大腦，妨碍睡眠。

處方 咖啡因一，○ 一日三次分服

處方 利尿素 Diuretin 五，○ 一日六次分服（此藥利尿優於咖啡因，不可久用，久用則腎生習慣性）。

腎上腺素

能刺激交感神經，增加血中糖量，凡決鬥時，能愕臨全身緊張，腎上腺即增加分泌，刺激肝臟及肌肉產糖，（由肝及肌肉之動物澱粉變為葡萄糖）

蓋糖質為工作能力之源，決鬥及工作時所必需者也。

本品收縮內臟血管擴張肌表血管之力極強，心弱脈不出者用之，腎血管初收縮繼擴張，腦血

管初亦收縮因其管壁薄弱血壓上升，反作他動性擴張，心臟動脈亦擴張，其作用不在血管神經中樞，而在血管壁之神經末梢也。

因刺激交感神經故增加心搏動非強盛之，（一方因血壓上升興奮迷走神經中樞），又常用於心臟特強肌纖維，增大心收縮力，因重症發熱病之血管痙攣，血壓下降而虛脫者，本品有卓效，蓋能收縮腹腔內臟血管，上升血壓，輸送血液於心臟及動脈系，及本品能強盛心肌收縮，使血行轉佳故也，惟因心臟病而起之心機不全，則本品無效。

局部出血本品止血之力甚強，蓋能收縮微血管也，同理，外用塗布治結膜炎，鼻膜炎，喉頭炎。

糖尿病，老年心臟血管有病者，肺之發炎性疾患，常常咳血者皆忌之，用法皮下注射，若靜脈注射須用生理食鹽水沖淡一百倍，徐徐用之。

喘息之由氣管枝痙攣者，本品皮下注射十分一溶液半至一西有卓效，麻黃之功用以此，又可以內服，效力亦甚持久，故喘息亦用之。（本品內服將分解而失其效用）。

本品所含之成份為士的寧，商人多用以毒走獸及飛禽，少入藥用，坐使良藥去藥，其味甚苦，其味甚苦，內服少量可以健胃，刺激骨髓中之原射器，興奮延髓中呼吸神經，以刺激呼吸，遂起呼吸諸中樞，收縮血內臟血管，上升血壓，徐徐緩必掉，強盛呼吸，（

此等作出見於不起癱瘓之故。慢性病之血管麻痺，血壓下降，頗於虛脫者用之。

本品又能增強視覺，用於弱視，前報載飛機師服之可增其視力，又用於各種運動不全麻痺，脚力痿弱，痠痛者，余經驗有效，胃腸肌弛緩下垂者，本品可以緊張提縮之，此為增強肌力，其作用頗似黃芪，然不如黃芪之力大而持久也。

酒

為我輩日常之飲料，小量有興奮作用，能收縮腹腔內臟血管，擴張皮膚心肺頭部血管，

飲後皮膚發熱，心力旺盛，補助活潑，若飲大量則呈痲痺作用矣，急性病見心弱者，酒可以活潑其心臟，擴張其皮膚血管以散熱，或謂對血中毒素有某種作用，據實驗報告，飲酒後體內抗體增加，惟常飲者則反減少，中山大學婦科教授富亞（德人）謂客家產婦飲酒，為一劣俗，蓋酒可增抗體殺病菌，客家產婦之少產褥病或即此故也，酒又能產生熱力，一瓦可生七、二加路里，似此可代糖質及脂肪之燃燒，而有營養作用矣，惟燃燒時消耗蛋白質不少，故又稱營養性之養物，糖尿病患者酸中毒而昏迷時，（由於血糖不能為燃料致脂肪不能徹底燃燒至中間階段成醋酸蓄積而止之故），可飲酒以燃燒其變化不盡之脂肪酸，而解其毒，酒固有若是之功效，然若飲成習慣性，則為害不勝言矣，蓋飲酒者多患心臟病肝硬變且其子孫多患精神病者其本身壽命亦較短促，酒又有健胃及安睡作用惟有因飲酒而為致弱奮一夜不眠者。

附子

今日中藥奉爲真心痛之聖藥，然余不信其爲，經醫醫到爲之說，則非真心痛，反爲血脈凝滯制劑。（或疑名爲窮心痛）其相反有如此者，亦百醫藥之論，多相同，而獨對附子相反如此，此豈中醫之誤歟，抑西士科學實驗不可靠歟，今請觀仲景之用附子。仲景之用附子有以下數標準。

（一）治惡風惡寒滿汗，如桂枝加附子湯之治太陽病發汗遂瀉不止，其惡風，桂枝去芍藥加附子湯之治太陽病下之發脈促胸滿者微惡寒，芍藥甘草附子湯之治發汗病不解反惡寒，附子瀉心湯之治心下痞而復惡寒汗出，四逆湯之治下利厥逆而惡寒，附子湯之治少陰病得之二三日口中和共背惡寒，四逆加入參湯之治惡寒脈微而復利。

以上各方皆因惡風惡寒滿汗而用附子，惡寒惡風其病在血管，血管凝滯現象，大約附子能擴張皮膚末梢血管，解除其虛寒，滿汗爲汗腺神經衰弱，附子常合桂枝治之，大約附子桂枝有興奮汗腺神經作用，解詳黃芪條。

（二）治疼痛解凝，如桂枝附子湯之治傷寒八九日風濕相搏，體疼煩不能轉側，甘草附子湯之治風濕相搏骨節煩疼，掣痛不得伸屈，近之則痛劇，大烏頭湯爲頭桂枝湯之治寒疝繞臍痛，烏頭湯之治病節歷不可伸屈，疼痛，脚氣，痠痛不可伸屈，寒疝腹中絞痛，附子粳米湯之治腹中寒氣脹，雷頭切痛。

以上各刀皆以附子治疼痛解癱瘓（痲痛）西醫亦有用者蓋附子有刺激不梢臟器之作用而分佈此末梢臟器之知覺運動分泌等神經尤甚，先起興奮後乃麻痺，用本品於皮膚粘膜則刺激其知覺神經，初有搔癢刺痛溫暖之感，次發劇痛，其灼熱，然此刺激狀僅暫時即消失而移於麻痺症狀，故於神經痛可用本品爲止痛劑，仲景之用附子乃用其較大量之麻痺鎮痙作用也。

（三）治脈沉微肢厥（脈微肢厥爲同一病理，蓋四肢血管收縮，血液不能外注，體溫不能外達，捺理脈微肢厥病象）如麻黃附子細辛湯之治少陰病始得之反發熱脈沉者，干姜附子湯之治脈沉微，四逆湯通脈四逆湯白朮湯四逆加入參湯之治脈微吐痢手足厥冷。

以上皆以附子治脈微肢厥，大約附子用其少量有興奮作用，（大量則麻痺矣）能收縮內臟血管，擴張皮膚四肢血管，使血液多輸送於軀表四肢，此爲強心作用，但仲景用附子治脈微肢厥時，常合干姜用之，蓋干姜刺激胃粘膜反射的能興奮心臟也，通脈四逆湯之名強脈而倍用干姜而不倍用附子者可以知之，故干姜亦爲強心劑，或合麻黃細辛用之，麻黃細辛亦能強心，更有脈不出加入參之明文人參爲世人皆知之強心劑也，總觀仲景之用附子以強心也，附子不居主要地位或竟居次要地位，麻黃細辛干莞人參反居主要地位，故附子實非強心主藥，或謂附子之居強心元帥之位者千百年矣，今日吾子曰非強心主帥，不有詳說何以服世人之心中今摘西醫之解釋於下曰。

一服少許之附子後心臟之運動因心臟內運動神經節之興奮而覺活潑，（按此強心之所由來也）且時或起蠕動運繼乃麻醉心臟自動中樞，并興奮心臟內制止機關，而運動爲之緩慢而不整，後以自働中樞制止機關并爲麻痺，而心臟之鼓動漸漸微弱遂至遏止。

附子之強心也不過服少量時終那爾之作用耳。若服大量非能謂爲衰弱心臟，且仲景不用附子爲強心主藥也。彭彭朋甚，不然何以通脈四逆湯之脈微欲絕不倍用附子而倍用干菴，且炙甘草湯之脈代結，當歸四逆湯之手足厥寒脈細欲絕此二者實爲心弱之標準病，何以亦不用附子，且何以脈不出加人參而不加附子，仲景之不用附子爲強心主藥也，蓋可知矣，余詮註傷寒論時再詳論之。

（四）治下痢清穀如四逆湯四逆加人參湯通脈四逆湯白通湯之治下痢清穀。

下痢清穀爲腸管感覺過敏，吸收衰弱發生之痙攣性下痢，附子有麻醉作用，可安腸管其痙攣以止瀉也，在此場合必合干菴用之，蓋干菴亦能解痙攣止疼痛及增強吸收作用。附子粳米湯之治腹中寒氣脹，間時切痛，烏頭湯等之治寒疝腹中絞痛亦以附子緩解其腸管之痙攣性疼痛也。

余仲景之用附子也最多爲風濕骨痛，寒疝，惡風惡寒，漏汗多兼用桂枝，自利清穀脈微肢厥多兼用干菴，對於心臟衰弱病多不以附子爲主要藥，未知時賢以爲如何，將來詮註傷寒論時

再詳論之。

本經論附子曰：主治風寒，咳逆，邪氣，寒濕，腰寔，拘攣，膝痛不能行步，破癥瘕積聚，血癥瘕瘕。

吉益東洞曰：附子主逐水也，故能治惡寒，身體四肢及骨節疼痛或沉重，或不仁，或厥冷，而旁治失精下利。(按附子確有利尿作用，若謂主逐水則妄也)。

別錄曰：附子主治腰膝風寒，腳氣冷弱，心腹冷痛，霍亂轉筋，下痢赤白，溫中強陰，堅肌骨，又鹽豉爲百藥長。

湯本素真謂附子能興奮全身之代謝機能，可起死回生，則去真理遠矣，時醫誤信其說，一唱百和，附子有知，將竊笑其妄也。

皂莢

即皂角其子爲皂角子，余雲岫先生云：皂莢含石鹼素甚多，故鄉間多用以滌瑕蕩垢，今肥皂行而皂莢廢矣，吾輩所用之却痰劑如西尼加根，遠志，桔梗皆含有石鹼素，所謂刺激性驅痰劑也，今用牙皂之莢以代西尼加根頗可驅痰，用法取牙皂去其核刮去其外皮，每日用一克開水作浸劑，已足驅痰之用，若日用二克則服於口中涎垂墜下矣，其催促分泌之用甚大，欲進而試驗溶血作用及動物試驗則未遑也，余用純莢二三年，今年遇日本藥學博士中尾萬三偶談此，彼謂對皂莢已有工作，確含石鹼甚多，且與西尼加根類同，可代西尼加云。

章次公曰本品劑激性甚強，爲瀉吐風痰之聖藥，余常治中年某咳嗽氣逆，不能平臥，形體素虛，其爲濕痰無疑，遂用二陳湯合降氣之品，加入皂角灰五分。

（以皂角去皮子焙焦爲末）沖服之，後至三小時而諸病悉平，其效有不可思議咳嗽上氣，然必審此爲濕痰者方可施用，若陰虛久嗽之腎氣不納，痰飲喘嗽之衝氣上逆，投之或差，死可立待，用之者其慎諸。

皂角自見余章二先生之說後，余亦試用以代西尼加運志枯梗等，以其價廉而效大也，又此藥治喉風甚佳。

常竊趙氏家傳喉風藥甚效，不肯以方授人，一日趙氏子與庠友連銀，同席金間酒次，趙子喉間忽痛，有頃痛不可忍，乃曰爲我求猪牙皂角細末以酸醋遠和來，入喉四五嗽，痰大吐痛立止，藥乃偏告同人，傳者甚衆。

余試用本品治喉炎甚效，但分量不可太多，多則劑激強，令人不能耐。

蟾酥

爲蟾蜍皮膚之分泌物，其強心作用似毛地黃，能復脈撥少脈之容積增大，而壓土升，尿量增加，若其作用再稍加劇，即誘起心臟收縮之休止，（中毒）然無便血球

溶劑作用，其有效量與中毒量之距離，較毛地黃稍大，又無毛地黃之蓄積作用，用量二至五釐。

據日本之實驗報告本品中所存在之物質有四種如下，(一)如苛卡因機之屬所麻醉性物質(故製葯膏外用可以止痛)(二)如腎上腺素之血管收縮物質(三)如毛地黃之強心物質，(四)如Picrotoxin之中樞興奮物質。

吳茱萸

含揮發油有苛辣味，中醫用治吐瀉腹痛及溫經，大約辛辣健胃劑之作用此皆有之，故有健胃止嘔與解胃腸痙攣驅風等作用，治虛寒泄瀉常於理中湯中加本品用之，外用爲皮膚引赤劑，今西醫之實驗報告如下。

吳茱萸含盧他明 *Heptaminol* 動物用多量則起痙攣繼動運麻痺遂因心臟麻痺而死，小量起子宮收縮，(陣痛機)決不陷於殭直，臨床上用於子宮出血，陣痛微弱等，亦見起子宮定期的收縮，多量則元盛腸蠕動，其於對腸及子宮生作用者非平滑肌亦非自律神經末梢乃其臟器之自働中樞也。

今據上述之實驗，知本品能縮收子宮，增強陣痛，及止子宮出血，產後子宮，弛緩者可用之。

黃瓜湯治霍亂吐瀉心中懊惱， 吳茱萸 木瓜 食鹽

乾姜茶葉湯治霍亂乾嘔 干姜 吳茱萸 用量二——五

辛夷

含揮發油中醫用以治頭風腦痛，鼻塞，聲重，酒後（鼻竇蓄膿症）用量〇·五——一，五

韭

爲吾人常吃之蔬菜與辛夷等皆有興奮作用能治噎隔反胃止胸腹痛（解痙攣）止吐血嘔血等症神治陰萎遺精遺尿家父治胃腸疔瘰癧痛疼常以本品生者一大把煎汁和五錢脂五錢有卓效。

麻醉鎮靜劑

凡能使人昏沉欲睡減弱其知覺運動者謂之麻醉鎮靜劑，此類藥，中不及西，後漢方技傳謂華陀精於解剖木奏力前先用麻藥使失其知覺然此法後世不傳豈古有而今無歟何學術距西土日有進步而吾國反不如前也。

麻醉（或稱麻痺）劑有麻醉中樞神經者，有麻醉神經末梢者，有麻醉臟器本身者，又有局部麻醉及全身麻醉之別，其麻醉全身者神經細胞受其侵襲後，大腦即被麻醉，該官能之意識，知覺及隨意運動，漸次消失，以至昏迷，惟反射機尚存亦有先呈似昏迷之症狀者實非昏迷也，不過各神經中樞不於同時呈相等之麻醉，於是腦之諸官能遂起一種錯亂，所謂精神中毒是也，其次脊髓麻醉，反射機消失，麻痺乃漸及於延髓諸中樞，（呼吸血管中樞）及心臟而至於死，今擇要介紹於下。

鴉片劑

中西醫皆用之，其主要成分爲嗎啡，其他爲數種類似嗎啡之植物鹼，爲全身性麻醉藥，（在腸道自働中樞）知覺運動皆受麻醉，有止利（泄瀉初期忌用可於後期用之此時用鴉片爲佳）止咳（劇咳而乾性防礙睡眠者用之，若氣管枝炎初期痰液多者忌用，因之液蓄留氣道，反碍換氣作用，非咳出不可，但嗎啡又有制止分泌作用，痰量不甚多者仍可用）此時以用可待因爲佳，止痛（各種疼痛皆可止之，腸痙攣之便秘，用嗎啡以解痙攣，反能通便）（小兒易中毒須注意）止血（肺結核之咳血，可用此以鎮靜其咳嗽，增加肺都之安靜，促其血栓之成形），止喘（氣管枝痙攣性之哮喘，本品能鎮靜之，）鎮痙攣傷風，子痙攣在皆用以安靜大腦鎮其痙攣，止其狂躁，此外能安靜各臟器減少其蠕動，腸出血，腹膜炎，盲腸炎皆用之，因本品能麻醉交感神經，故用於糖尿病，尿崩症等，此類病可耐大量嗎啡，但凡麻醉藥皆有弱心之弊，心臟衰弱者皆忌之，或用其少量，或與強心劑合用方可，嗎啡雖有安睡之效但不如催眠劑抱水克羅拉耳爲佳。

處方 鴉片酒（一分鴉片十分酒之浸劑）一回〇，五——一，五 嗎啡注射，一回〇，〇〇五——〇，〇二

副作用：神經極及衰弱者易起興奮狀態或失眠，女子且易發嘔吐頭痛，強壯者則偏於麻醉狀態，固有起利尿障礙者，但心臟病患者有現中樞性利尿制止之狀態者，屢見尿量減少，此時

用嗎啡反有利尿之效，蓋心臟病患者利尿制止中樞在醒覺時因種種刺激與奮奮狀態顯著，嗎啡可鎮靜其興奮也。

溴化鉀

（溴化鉀溴化銨大略相同不另述）鹼鹼中樞神經系之興奮，主治癲癇，痙攣，痙咳，怪神經興奮之遺精等。

處方 溴化鉀一，六 安知必林一，六 咖啡園〇，六 分五包每二小時服一包治頭痛止停後服。

處方 溴化鉀二，〇 溴化鈉二，〇 溴化銨二，〇 水一〇〇，〇 硼砂一，〇 混和一日三次分服治癲癇。

苛卡因

爲局部麻醉藥，用於粘膜爲鎮痛及麻醉劑（用其百分之二之溶液點眼治眼痛，百分之十至二十之溶液以咽喉直腸鱗齒等止痛），內服治胃痛，痙咳，局部麻醉

皮下注射。

處方 一，苛卡因〇，〇五 次硝酸銨二，〇 碳酸鈉二，〇 白糖三，〇 分三包一日三次服胃痛瀉胃潰瘍。

二，苛卡因〇，〇四 蛋白銀〇，〇四 甘油一，〇 汽水五，〇爲點眼料一日三次治一切急傷性風火眼，結膜炎。

哥羅仿

調製痛可以小棉球浸本品塞齒齦腔內，神經痛風濕關節痛用本品單味或和樟腦精或酒精等作擦劑，內服治種種疼痛，痙攣性疾患，如胃痛，頑固性嘔吐，船暈，破傷風，中毒等，及胃腸發酵，寄生蟲諸症，但有刺激胃腸之弊，用量內服 〇，二——一，本品最要作用為全身麻醉藥。

以脫

(一) 本品之用於全身麻醉一如哥羅仿，但各有短長今二者多混合用之。

(二) 為興奮藥於虛脫，昏暈，內服，嗅入，或注射。

(三) 為鎮痛藥凡種種之疼痛及痙攣性症狀如胃痛，嘔吐，腸痛，歇私的里用於內服，胆石痛奏效尤神，用量內服 〇，三——一，〇 一日數次。

抱水格魯拉兒

為極常用之催眠劑，麻醉大腦，用於精神興奮而起之不眠，優於嗎啡，若於疼痛，咳嗽，及其他異常之感覺，則不如嗎啡，又為

鎮靜藥，用於譫妄，癡狂，精神異常興奮，子癲，破傷風，舞踏病，狂犬病，喘息，痙咳等，又為鎮痛藥用於分娩時減却陣痛，有局部刺激性，胃炎潰瘍等忌之，小兒且宜灌腸，用量一，〇——二，〇。

西藥之麻醉鎮靜劑，約如上述，似皆爲中藥所不及中醫界宜採用之，此外類似之製造品甚多如 LuminAl, Ahalin, BromuNal 等皆有神效茲不多介紹，以下爲中藥之麻醉鎮靜劑。

酸棗仁

中藥之安眠劑，用於臨睡病之後者用梔子，（熱症病雖漸愈然仍煩燥不得眠者梔子豆豉等治之，大約梔子能平腦充血解熱劑篇），虛症者用酸棗仁，但

不眠之原因甚多，有由於胃腸消化不良者，（須用陳半六君之類）有由於心弱而腦部鬱血者（須用毛地黃黃芪肉桂姜附路黨之類）有由於腦部充血者（須用梔子蒼連黃柏大黃之類）有由於疼痛者（須用嗎啡之類）有由於高熱者（須用披拉米同石羔知母黃芩之類）有由於怔忡者（須用龍骨牡利貝仁遠志茯苓溴劑餘粉之類）原因除即能安睡，固不獨梔子棗仁也，余思需梔子棗仁之力亦甚微，有時甘麥大棗湯反有效（俾小麥大棗甘草）其理甚不可解，然中藥可以直接麻醉大腦之安睡劑，則甚少此爲不及西藥者也。

本品中藥用爲鎮靜滋養強壯藥，酸棗仁湯治煩燥不得眠，酸棗仁 甘草 知母 川芎 茯苓。

歸脾湯治心虛怔忡不眠衰疲吐血下血等（按此方爲極有效之病後調理劑）棗仁 人參 黃芪 白朮 當歸 茯苓 遠志 木香 甘草 用量三——一〇

鰵腦

即冰片又名梅片爲一種樹脂，中醫用於傷食，霍亂，中暑，胸膈痛，咳嗽等。又外國多用之。

日本稻子氏等實驗云，本品有鎮靜或麻醉之效，然因是而生之害亦不少，試投本品於溫血動物，則反射觸動減退，心臟及血管亦漸漸麻痺，血壓沉降，幾至死亡，此殆因量中毒而

也。

德國川芎丸消風化滯除熱消痰通利水竅爽氣清神

桔梗一五 連翹六 縮砂二 白豆蔻五 薄荷三

阿托羅平

Atropin 原屬於此類者如中藥之鬧羊花藥 Hyosyamin 莨菪碱 Atropin 阿托羅平及西藥之比拉瀉那 Belladonna 等各藥皆有相

似之作用。

此類藥爲極有效極常用之藥管中醫多棄而不用，而藥用且多不備者，今中醫十九皆不知有鬧羊花藥，莨菪，曼陀羅花之名者，甚矣今日中醫界之孤陋寡聞也。

此類藥之作用一則犯中樞神經系，初與奮發麻痺，一則犯末梢臟器，麻痺逃走神經末梢有散體加速心跳衰弱各腺分泌（唾液，汗液，胆汁，睪汁，尿等分泌減少）諸作用，對於滑平肌臟器向胃腸子宮膀胱氣管等能制止其運動，緩解其痙攣，此由於麻痺逃走神經末梢之故，與

其肌肉本身無菌，故在醫治上用以散腫止痛（解氣管枝痙攣）止吐泄（解除胃腸痙攣）安靜其蠕動）止汗除痰止咳（減少氣管分泌緩解其痙攣）通下（腸痙攣之便秘本品解除痙攣奏通大便之效腸痙攣之吐衄症每以本品解除痙攣而治愈）止痛（除滑平肌如氣管胃腸膀胱子宮輸尿管等之痙攣性疼痛）又用其少量可興奮腦中樞，腦之一般麻痺狀態者，如嗎啡中毒及其他之精神病可用之。

以上對阿托比拉同那之作用，惟開羊花葉及莨菪麻痺大腦之力較大，可用為催眠劑，尤以後者多用於精神發越狂暴之癲狂症，（安靜其骨骼肌）半夏之作用頗似此而局部麻痺作用或較大，然亦有不同處，此則有待於精細之化驗與實驗矣。

此類藥可製為注射劑內服劑及坐藥等用之有猛烈毒性慎勿過量。

辰砂

（百分中含水銀八十六硫黃十四為硫化汞天產品中多雜土質有鎮作用，中醫用以治怔忡，安神，定驚（小兒驚風發熱夜泣者牛黃一分硃砂半兩每服一字（二分五厘）犀角磨水調下）又能解毒（小兒痘疹初發或取出辰砂半錢為末蜜水調下則痘出用蠟○，二

一。

白芷

含揮發油，止頭痛，牙痛，又用於瘡癤，排膿止痛生肌，大約有擴張頭部肌表血管，奏鎮痙止痛之效，與川芎同用止頭痛有卓效，神昏散治腦風石膏白附子（炮

〔天南生〕 白芷 菊花 川芎 天麻各等分研末每服一錢 薄荷湯下用薑一——三

天麻 專用爲鎮靜藥；治（一）大人風熱頭痛（二）小兒風痲驚悸（三）諸風麻木不仁（四）頭旋目眩暈倒言語不遂兩足一——四。

鈎藤鈎 爲鎮靜藥，治大人頭旋目眩，小兒驚啼癩癩高熱斑疹，似有鎮靜退熱作用，（斑疹不快鈎藤紫葶茸等分研末酒下一錢）。

鈎藤湯治驚癇發熱類赤腫睡 鈎藤 野蚤 白芍 辰砂 犀角 甘草 生薑用量二——四。

白芍 本經曰芍藥味苦平，主邪氣腹痛，除血痺，破堅積，寒熱疝瘕，止痛利小便，余經驗白芍解腸胃子宮痙攣止疼痛之力甚大，婦人妊娠五六月常患腹痛，投當歸芍藥散

卽止，（當歸川芎白芍茯苓澤瀉白朮白芍用六錢至一兩）張錫純謂白芍能利水，一友有一心腹性水腫病人余一次用白芍四兩無效後未再試之矣，梅城有一醫治痢用白芍四兩當歸四兩一二劑而愈亦甚特別。

據科學化驗白芍含安息香酸，樹脂葡萄糖等，按安息香酸能增加組織之新陳代謝，及尿之酸度，并消毒殺菌，防腐腸道，治慢性膀胱炎，淋病，形性風濕，形性喉炎，氣管炎，對呼吸器病之虛弱者有興奮却痰之效，餘今日中醫之用白芍與此有異矣，用量五——三〇

赤芍

中醫以其色赤者較清利，有謂白補而收，赤散而瀉，然赤芍是否仍含安息香酸不得而知，本草謂赤芍治腹痛，堅積，血痺，瘕疝，腸風，經閉，癰腫，目赤（歸血赤芍二錢水煎服木舌口噤古躄腫滿塞口赤芍甘草，水煎服似此赤芍煎治口腔炎與安息香酸之治急性咽喉炎同）。

芍藥散治婦人脅痛 白芍 玄胡 肉桂 香附

赤芍散治歷節風骨節痛四肢腫行立無力 赤芍二 附子一 當歸一 川芎一 防己一 海桐皮一 草薢一 肉桂二 桃仁〇，五（余經驗此方甚效）

延胡索

治週身肢體疼痛，腹痛，月經不調，爲鎮痙止痛神藥。

延胡索湯治心腹疼痛及婦人氣血凝滯，月經不調（按余經驗此方極效 延胡 蒲黃 芍藥

黃芩 當歸 浮香 木香 官桂 沒藥 甘草 生姜

據日本伊藤博士之研究，謂本品有如嗎啡之中樞神經系之鎮靜作用，及如右加因之局部麻痺作用，其作用雖不甚強，然富有持續性，又臨床上之成績則用大量於腹痛疝痛等其作用而不若嗎啡之強，然能阻止肺結核患者之咳嗽發作，又用於神經痛，效果顯著而有持續性。荷蘭藥師謂本品有發汗利尿通經之效，并可以殺腸寄生蟲，咽喉腫痛以本品煎劑含漱佳，創

將滑精痔瘡搽此藥末，其效與馬兜鈴根同用量二—三

細辛

含揮發油，治咳逆頭痛，仲身多用以治咳則用以止頭痛治咳常與干姜半夏五味三味

合用，急性氣管枝炎，時及忌之惟慢性炎症，痰液壅塞而虛弱者用之甚佳，大約飽
肝盛則腦血行，制止氣管枝分泌，復能解氣管枝痙攣，哮喘咳嗽用之甚佳，古人謂治停痰宿
水者即指肝盛血行制止分泌而言也，一老人七十餘時，衰弱羸寒，驟盛夏猶擁重裘，鼻涕終
年不絕，喘咳多痰，余與荅桂朮甘加細辛半夏干姜五苓胡椒川椒吳萸一劑而惡寒止鼻涕少遠
照十餘劑各病皆除，蓋細辛半夏除喘咳痰飲有卓效，呼吸困難，依息不得臥，濕痰壅盛者堪
稱第一，中西藥恐無其匹也。

本經曰細辛辛溫主咳逆頭痛，百節拘攣，利九竅，藥徵曰細辛主治宿飲停水，水氣在心下，
咳滿或上逆，脅痛，醫此可以知細辛之大要矣，用量〇，五—一五（廣州奇醫有一劑用細辛
八兩者）

牛膝

中醫謂能引血下行，竅部以下生瘡打撲，皆用牛七和諸藥治之，以為可引藥效下行
至病所也，猶桔梗之能引諸藥上行，皆為中醫神秘之理論，大約牛七能擴張腹腔血
管，降低血壓引起骨盤充血，故可以催經及破胎，中醫又用以治腰膝痛，蓋有鎮靜止痛作用
也，張錫鑄云一文獻風而睡，受外感，牙痛甚烈波及於腦亦痛各藥不效，乃獨煎淮牛七一兩

服之而愈，陳次仲先生告命杜仲牛七治脚氣痿痛甚佳。

牛七有二種一曰淮牛七，一曰川牛七，茲補降血壓則以前者爲佳，若治脚軟痛則以後者爲佳。

本草曰牛膝治腰膝骨痛，足痿，筋癢，陰痿，失溺，并治心腹諸痛，淋痛血尿，經閉，難產，喉痺，（喉炎痛杜牛七有卓效）齒痛，癰腫，惡瘡（按牛七治瘡癰確甚效）經利彬先生試驗報告曰。

懷牛膝，（一）可使血壓暫時下降但恢復後反使血壓一度輕微上升，（二）有輕微利尿作用（三）有使蟻蝨心臟搏動轉弱之作用，（四）有使十二指腸收縮轉弱之作用，（五）過當劑量對於子宮之運動有刺激性。

牛膝湯治婦人月水不利臍腹疝痛 牛膝 桂心 白芍 桃仁 紅花 延胡 當歸 丹皮 川芎 木香 用量三——一〇

乳香

爲一種樹脂，含揮發油，治瘡癰及心腹痛，常與沒藥合用，用量一——五

續斷

治瘡癰，續骨折，止痛生肌，并治腰痛，用量二三錢。

五加皮

治疝氣腹痛，強筋骨，除濕痺，用量三——五

革薺

治風濕，瘰癧，陰痿，失溺，遺精，痔瘻，惡瘡，用量三——五

威靈仙

爲痛風要藥，又利尿管，和漢三才圖會曰：商州有人病手足不遂，不服地者數十

年，莫能療，親屬置之道旁，以求治，偶一新羅僧見之，告曰：此疾一藥可治，但不知此土有否，因之入山求索，果得，乃威靈仙也，使服之，數日能步履，其後山人知之，遂傳其事，以性猛曰威，以功神曰靈仙，用量一——三

調經劑

婦人有月經，有生誼，其病多於男子，故醫學有婦科產科而無男科也，婦人固有月經生產之累，故其活動力不及男子，回憶昔年讀佛經時，見如來成道後，其姨母請其收爲弟子，如來不肯，（如來生七日而母喪，由姨母代爲乳哺）後其姨母再度請求，如來又不肯，第三次其姨母跟隨數百里，必欲如來收爲弟子，如來感其誠，乃不覺不收之，收後喟然嘆曰：吾道可旺千年，自收女弟子後僅旺五百年耳，（佛教在印度有幾度興衰）此時佛經不在乎，以上所錄大意似乎如此，余當時讀竟甚不解，何以如來賤視女人若此，且佛教有女人須經幾度輪

題始得轉爲男身之說，豈因女人在生理上多牽累之故耶，通訪佛學家皆不齒答，然何以說孔老夫子又曰「唯婦人與小人爲難養也，近之則不遜遠之則怨」婦人與小人并稱又何以蒼頡先師造字時，嫉奸妖妒等意義險惡之字，皆標女字於其旁，豈女人皆不肯者耶，甚矣吾感之釋也，十餘年來，夢寐不忘，思有以解釋之道，後讀生物學，始知生物實以女性爲主，男性爲副，因其在謀「生」上居主要地位，兇惡，自私，墜忍乃落於男人，其被隱視豈非在此乎，（兇惡自私非詆毀咒咀，請女同胞不要生氣，若要生氣則請免向蒼頡先師，孔老夫子算賬，與小子無關也），今請談男女主副問題，未言主副之前，先言「食」「色」。

生物有二大本能，謀「食」以求其生命之生存，一好「色」以求其種族之延續，食也色也，生物對之故感興趣者也，以孔老夫子之聖尚曰「吾未見有好德如好色者」，社有一顯現象，「可以食色廣釋之，亦可歸納於食色，食色實爲進化之原動力，然食色之本能祇在男女間之發展，有偏重乎，曰有，男子多發展在食，女子多發展在色，吾國男治外女治內之說，不無根據，西說男女平等反無常也，食色既同其重要矣，男女間亦各有專司矣，科學上亦有根據乎，曰有，請觀生物之進化。

下等動物如海胆等之卵，可用溫熱刺激而產子，然須雄性之交媾，此爲傳統上雄性不居重要地位之明証，有一種下等雌蚌，殼有四袋，以盛四雄，共同生活，雄性儼然爲雌蚌之附庸，

蜜蜂之蜂王爲雌性，其數僅一，其餘千百皆雌性及中性也。蜘蛛大者爲雌，小者爲雄，雌一而雄八百，螳螂亦似蜘蛛，其雌雄之地位與數量相差若是之遠，雌性較雄性爲重要，是此可見及乎，生物進化愈高，雄乃愈進，雌乃愈退。雌雄之差異愈微，雌雄不及也，雄弱之雄或雌弱不如也，二者雌雄之數亦相若也，豈雌雄主副之位，因進化而相易耶，（遠附文有雌雄同沐之說以釋之）然其兇惡堅韌，雄實不如雌，生育時尤甚，及乎人類今日雖號稱男權社會，（古代有女權社會）然細觀其內容，則男子多受制於女人，曾代之赫赫名流，豈非多瀕內者乎，美國且公然有重女輕男之勢，將來之社會男人謀一食之本能爲科學機替代以後，不難轉爲女權社會也。

由生物進化上觀之，雌性實較雄性爲重要，此或下等動物雌性謀食與生育之工作，無須雄性協助與保護之故，雄性僅爲交尾之用耳，故其地位較雌性遠爲低下，若進化至高等動物，則生物因構較爲複雜，生存較爲困難，而雌性之作用亦較大矣，交尾以外可爲尋食及保護子女之用，故其外觀雖較雌強爲雄偉莫麗，然亦僅爲雌性之附庸與保鏢耳，此吾人所謂「半世老婆奴」也。

或曰生物界既以女性爲中心男性爲附庸，在其體質上亦可尋其根據乎，曰有，試以人類言之。

人類男女身體之構造，男不及女，余非生理學專家，然亦有可得而言者，由生理學男多於女，然死亡率即男孩較女孩多，其數約五與四之比，即男死五而女死四也，我國重男輕女之社會，男孩雖保護較爲週密，然死亡率亦在女孩之上，其抵抗力女較男強於此可見，又女抵抗疾病能力亦較大，茲引外人之論文於下。

萬國梅約博士，曰男性抵抗疾病的力量遠不及女性，阿來博士在洛却斯特大學研究過三十萬個病人之後，發現男性更容易患消化系肺部腎部和腦部的疾病，以及一般官能上的疾病。

男子易患病，而死亡亦易，男子強而脆，女人弱而韌，且我輩所習知者女人壽命較長，此雖由於男權社會男子多與社會接觸，競爭較烈，且患病之機會亦較多之故，但女人身體之構造亦似較強，故女人在「一生」之義意上較重於男子，其身體之構造亦勝於男子，似爲強矣，今言女子之強病。

或曰君之所論謂經之耳，何滔滔不竭談生動論食色，盡數千言而不知返耶，曰不明「食」之「色」不足以言文化，不明男女不足以知社會，况乎醫學，神秘玄奧，不明消化之生理，何以言醫學，不謂言歸正傳。

女人在這痛苦者爲月經困難，即每當經期之先或行經時下腹發生痙攣性疼痛，延至腰及腿，

歷數小時乃至數日之久，常覺頭痛周身不爽甚或嘔吐，此患多見於月經初見之少婦，嫁後多試輕亦有增重者，其原因甚為複雜，大約為子宮內膜充血，排經困難，因而子宮發生痙攣故也，若加子宮位置異常則排經更困難而疼痛亦更甚，此種婦人多有神經過敏者，在健康者經期（或謂子宮有收縮復而作痛）子宮雖有多少變態但亦不感覺什麼，而神經過敏者則必覺陣痛矣，今中西治法皆用鎮靜痙攣止痛劑，西藥如阿托羅平，嗎啡，阿斯必靈，安知必林之類，中藥則當歸，川芎，白芍，香附，烏藥，半夏，乳香，沒藥，三棱，莪朮，木香，元胡，柴胡之類，蓋皆所以鎮其痙攣，止其疼痛也。

當歸

為通經清涼藥，本經曰主治咳逆上氣，婦人漏下絕子，諸惡瘡瘍金瘡煎汁飲之，本草曰主嘔逆，虛癆，寒熱，下痢，腹痛，崩漏，女人瀝血，腰痛止崩中補諸不足。

據劉紹光先生之試驗報告曰當歸含揮發油毒，各動物之離體受孕或未受孕子宮皆呈立即弛緩作用，使子宮各部得弛緩休養，效用極長，而不大變更，如精油消滅後子宮立即恢復原狀為治月經痛及不調之特效藥，如阿托羅平等性太大不認代用，其毒性劑量可使血壓下降，呼吸受制阻，但小量亦使血壓輕微下降，同時為一呼吸興奮劑。

據此則當歸最大之功用為變緊張之子宮為弛緩，故月經困難之疼痛可以解除，為通經第一妙藥，但因其能弛緩子宮故崩漏者（子宮出血）忌之，本草謂能止崩中者未敢贊同，或謂當歸

吸入血後能刺激血液中養化酵素，令血液之養化迅速，增進新陳代謝，及誘起卵巢充血，外用能生肌潤皮膚，又當歸能下降血壓引起腹腔充血亦能解腸之痙攣性疼痛，故用於痢疾甚佳，其所含之揮發油又能潤滑腸壁，增進排便作用，（因含揮發油故不可久煎，久煎則其效力消失，宜先煎各藥後下當歸）。

當歸芍藥散治孕婦腹痛絕佳，當歸 川芎 白芍 茯苓 澤瀉 白朮（白芍可用至一兩當歸二三錢即足）

當歸補血湯治產後無乳 當歸 黃芪 用量一——二〇

川芎

含揮發油據勞逸先生之記載謂腎局部呈多少刺激作用，少量內服則與鴉片血管運動

神中樞，呼吸中樞，及脊髓及反射中樞，使血壓上升，用大量則大腦及腦幹麻痺，血壓沉降，體溫下降（譚次仲先生列本品為解熱劑者豈指其大量乎），呼吸困難，並一般運動麻痺脫離尋象，心臟亦受麻痺之影響，直接擴張末梢血管。

本草曰芎藭味辛溫，去中風入腦，開竅，寒痺，筋禁緩急，金瘡，婦人血閉錮子，大因曰其微結而通養血。

其在臨床觀察川芎和白芷治頭痛極佳，或在其他能擴張頭部血管解其痙攣也。又用於月經困難，其作用極似當歸，即弛緩子宮之緊張痙攣也，皮膚疥癬亦多用之，此或為擴張皮膚血管改

善皮膚血行也，其治平滑肌之痙急疼痛頗佳，少量微有興奮作用，藥用上皆用其小量也。

治平滑有頭痛者 川芎 土茯苓（土茯苓有降低血壓作用）用量一——三

香附子

含揮發油為芳香劑，詳胃腸痙攣，有止胃腸痙攣止痛驅風，止吐瀉作用，月經時子宮痙攣性疼痛，本品可緩解之，故中醫用為通經藥，本草云治風氣腹痛

，頭痛，頭旋及粘液鬱塞，粘液腫，痰黃病，用量二——五

烏藥

含揮發油，治霍亂，吐瀉，止腹痛，功用似木香香附。

烏藥湯治婦人經行不調（解子宮之痙急）烏藥 香附 常路 木香 甘草 用量二——四

桃仁

日本藥學博士下山云，本品「含苦扁桃油，但其量極微，恐不能作藥品用」桃仁杏仁苦扁桃仁之類皆含脂肪酸，少量脂肪酸能刺激呼吸中樞，呼吸運動為之旺盛，但刺激之後必起麻痺，故究難應用也，往者有以脂肪酸為鎮痙劑而用於痙攣性咳嗽，及鎮痛劑而用於疼痛者，不甚見效，然中醫之用桃仁則另有神秘之說在。

中醫以桃仁紅花等為破血藥王清任以百病皆為瘀血作祟，故其論治皆不離破血，桃仁紅花其必用者也，失眠破血，胸脅苦悶破血，癩癩破血，百病皆以桃紅為主藥，其所見可謂偏矣，所行可謂怪矣，東土湯本號稱西醫明理之士，然亦視瘀血為煞有介事，破瘀血為神奇莫測

，亦可見其呆矣（蓋本質大呆大笨，余非有意毀謗也）然瘀血謂爲毒耶，似亦有之，然其爲何物則不能明，余不敢如湯本之實指爲某物某物也，今試言之。

瘀血（毒血）似有此物，然到底如何物，今尙未得科學家之證明，今所知者爲女人月經來潮時，週身不快，頭痛，腹痛，甚或嘔吐，不思飲食，更有精神上起變化而發病者，據科學之總計女人在月經來潮時犯罪者最多，此或不可以普通之月經困難解釋之，或經血爲一種毒質，亦未可定，今先論月經是否毒質，古代有女人經期不可近神祇花草之傳說，古人似既知經血有毒矣，有科學家據此將月經血清澆花草，與常人血清比較，所得結果，尙謂有毒性者有謂無者，仍不能得確切之證明，然謂其有毒性似仍得多數學者支持，今經血假定其有毒矣，（中醫以爲瘀血可發生不少病變）然何以桃仁紅花水能蠱虫，蠱虫，乾漆能破之，此爲余數年來疑莫能明之問題，恐病非瘀血，而破血藥亦另一作用非破血也，今問題雖不能決，然余治癩瘡腦膜炎每用桃紅而得佳效，開且疫用桃紅亦佳，更有謂霍亂亦可用桃紅者，豈桃紅有此神奇功效歟，仍有待科學之證明也。

本經曰桃仁主瘀血，血閉，癥瘕，邪氣，殺小虫，別餘曰止咳逆下氣，消心堅硬去卒暴衄血，通月水，止心腹痛，總徵曰主治瘀血少腹滿痛，故兼治腸癰，及婦人經水不利，（單方）心腹卒痛用桃仁二錢煎服可見桃仁有鎮痛作用亦必可以鎮咳也用益二——四

紅花

據衛生實驗處劉紹光先生之實驗：紅花毒性不太，動物雜體受孕或未受孕子宮，立即增加緊張及伸縮度，作用甚長久，爲刺壞子宮之特效藥，對呼吸亦俱刺激作用。據此則紅花爲收縮子宮增強陣痛，及止子宮出血之品矣，本草之記載曰破瘀血，活血，潤燥，消腫，止痛，治經閉，便難，血暈，口噤，胎死腹中，痘瘡，血熱有毒，本草之記載與劉先生之實驗不無杆格處，依臨床經驗紅花爲破血藥月經不調多用之。

紅藍花酒治腹中血氣刺痛 紅藍花一兩 酒一升煎取一半 頓服一半 未止再服用量〇，五

一三

艾葉

爲緩性通經藥，別餘曰灸百病，可作煎止吐血，下痢，下部瘰癧，婦人血崩，利陰氣，生肌肉，辟風寒，使人有子，今中醫多用以止吐衄通經閉，似又可治喘，聞其根有銀鹽作用，可治癩痢，請中西醫界試用之，又本品治赤白下痢及泄瀉或心腹痛及痔血甚效，用量三——一〇。

牡丹皮

用於月經不順及痔瘡，破瘀血通經脈，爲吐衄必用之藥，據黃勞逸先生云，本品能使子宮腔充血，有通經之能，惟甚徐緩耳并有退熱之效，仙景甫之治腸瘵，（大黃牡丹皮湯）或有消炎作用也，用量二——四

益母草

據劉紹光先生之化驗報告本品毒性小各動物之受孕未受孕子宮，立即增加肌肉緊張及伸縮度，作用甚持久，為刺激子宮之特效藥，產後服之可以止血，及使

子宮恢復正常狀態，小量為呼吸刺激劑，大量則對血壓及呼吸呈輕微之抑制作用，據此則益母草與麥角花作用相向矣，中醫謂益母草經藥者誤也，實有止血瀉，止血及催生作用，（引起子宮收縮增加陣痛）其子實名芫蕪子有鎮靜止癢作用，可治心腹痛及肢節牽引，拘攣，用量

二——四

茜根

爲止血道經藥，治血崩血暈痔瘻疝，本品或亦爲收縮子宮止血劑，非強經劑也，不然豈有一藥而能通經又能止崩漏，作用相反者乎。

茜根丸治崩血無時

茜根 艾葉 烏枚 用量一——三

丹參

爲通經強壯藥，余經驗治腹痛甚佳，或有鎮靜作用，本草謂破宿血，生新血，調經理脈，除煩熱，用量二——五

乾漆

能破陳久瘀血又可通經及癆瘵喉痺（單方）愈喉痺燒本品用管從鼻吸其烟。

麥角

能收縮子宮增強陣痛，多用於催產（用於分娩後期若用於娩出期以前則胎兒有窒息及使子宮破裂之虞）及子宮出血又有收斂止汗之效，可治肺癆盜汗，能收縮各平滑肌用於膀胱麻痺，尿淋瀝，及多尿症等，用量〇三——〇，五一日數回。

虫類藥

中醫頗多以虫類入藥者。西醫除斑蝥外，似無之，惟牛苗，血清，毒菌製劑，內分泌等藥物。性如蟻等，則不作虫類藥物。

動物類多入藥者為鯉魚蝮蟻治水腫，鯽魚治瘰癧，野鴨之嘴及爪解疔，泥鳅，糜，一按，利尿治水腫，近有一婦患糖尿病十餘年矣，偶多食糖質則病發，一禁則病愈，二三年即作痛尤以手腕及肩關節為甚，舉手為艱，此因體內新陳代謝異常，蛋白質毒積聚關節作祟也，百藥不愈，不料因偶吃番鴨（其種來自南洋，嶺東多畜之）而愈，是則番鴨有解毒其毒質將其排除之作用歟，噫動物之作用亦多不可思議也。

中醫之虫類藥如殭蠶，全蝎，蜈蚣，白花蛇，蟬退（廣州多用蟬退花，即蟬在土中之幼虫）等多為鎮痙約如西藥之溴劑等，有鎮痙神經作用，凡小兒患熱性病發搐者多用之，若蚘蚘，蟻類則有退熱作用，蟻類又治驚癇，鄉下人多用之甚速不可解，鎮痙作用以蜈蚣為最著，全蝎次之，殭蠶蟬，退又次之，張健純謂蟬退有發汗作用，可疑。

白殭蠶治咽喉炎甚佳（咽喉腫痛喉痺既危者，白殭蠶焙末生薑汁調灌立愈）又治疔瘡（為末封疔腫，根即拔出）虫類藥多可以治皮膚炎瘡毒甚奇，大小兒三歲兒時下頰患急性皮膚炎，如腫痛而有粘液，家父以金絲蜘蛛（即蜘蛛有青色彩紋者）焙研研末調茶油塗之愈，又黃蠟

人罕生云疔癰用杜雞（客家土名形似蟋蟀而無羽，廚房中多有之，晚上出而覓食）搗爛敷之有卓效，聞蜈蚣搗敷亦有效。

水舌（即舌炎）白蟻蠶爲末敷舌上，痰吐出即愈。

宣毒丸 治一切瘡腫未成膿者兩三服、消散惡毒，并治疔疫溫毒，赤腫，腫痛 大黃兩 白殭查兩炒 牡利兩燒 三味研末煉蜜丸如梧子大薄荷湯下三五十丸。

牽正散 治中風口眼喎斜半身不遂 白附子 羌活 全蝎 右分爲末服二錢熱湯下

蜈蚣 治小兒撮口驚風諸症，全蝎之功用亦如之，以活蜈蚣浸麻油中，二十日後收用，凡發

一切毒虫毒蜈咬傷作痛者，取陰之立能止痛消腫，火傷亦用之。

蘇亡水蛭更爲有名之破血藥，其理甚不可解，發炎充血西醫亦有用水蛭吸血，但無厚以內服者。

抵當丸 治小腹痛，小便自利，其人如狂，血証者水蛭二十只 蟻虫二十五只 桃仁二十只

大黃三兩礬木糊丸服至下血爲度。

瘰癧痢方大梨水蛭各等分爲霜，每服一錢，日二服，至七日不發者可試令食蕩蕩，如再發作，服如前，必食後寧發，爲爲愈。

補遺

藥品之不易列入上述各篇者皆關於補遺篇，蓋一藥常有數種作用，入甲固不可，入乙亦不能也。

三七

中醫用爲血毒藥，散血，定痛，治吐血，衄血、血崩，血痢，紅眼，癰腫，（散磨塗即散，已破者爲末搽之）爲金瘡杖瘡要藥，其葉搗汁可治金魚病，無名瘡癤按葉敷之。

按三七爲止血，消腫，定痛名藥，田七或其同種屬之物，曾在中山大學附屬醫院時，有患肺癆咳血者，每朝痰中帶血，百藥不效，余囑嚼吞田七日四五錢，彼乃二嚼服二兩，二日而愈，因知三七止血之神也，後治肺癆吐血，輒以田七，或三七爲主藥，成績甚佳。

德利彬先生之化驗報告曰雲南三七（一）注射適量（約當體重二至百分之二）可致家兔與白鼠之毒死（二）注射後血壓初則輕微上昇，繼則下降，呼吸較常時爲寬大（三）心臟初呈麻痺，尚可恢復用許氏肥皂草素（從三七中提出之品）則心臟只現麻痺，不能復甯 此其不同之點（四）有抑制小腸運動之作用（五）能使血管收縮，用量一——三（研末沖服不可煎）

鐵粉

分三種，(一)鐵器燒紅之鐵片煨冷時皮層剝落者，可祛痰及治水腫，(二)鐵砂針工造針時，鎚刀碾下之粉末，染白髮用之，(三)鉄錫錄上生出之赤衣，和油調治惡瘡，疥癬，又蜘蛛蜈蚣咬傷亦可以此塗搽。

浙乘之鐵粉係將鐵磨成粉或鋼鐵以利碾削之，中醫用爲錫錠壯劑，治怔忡(西醫亦用以治怔忡)又用以治黃疸水腫等，脚氣衝心，鐵粉六七錢，水二杯煎取一杯服，按鐵粉水煎極難溶解，若服其粉末，小腸亦能吸收。

西药用鐵劑有二，一爲直接供給造血之原料，一爲刺激造血器官生血(爲刺激興奮劑)與中醫使用有不同也。

竹茹

治吐血，衄血，血淋，止呃逆，或有消炎作用，用錢二——五(須用大器煎效)

側柏葉

治吐衄，血痢，血崩，去冷濕痺，歷節風痛。

不絕，側柏葉芍藥(或木賊)各等分沖服三錢用量二——四

鐵金

其成分含黃色素，樟腦油，鐵粉等用治血瘰金瘡，氣血心腹諸痛(作用同香薷)又有止血作用治小便下鮮血用蛋○，五——二

五倍子

百子中含單寧酸六十至七十分，故收斂，止血，庇覆，制酵作用極佳，口瘡咽
喉腫痛，調蜜塗或以末滲之佳，又治下血水瀉，惟其作用限於局部，吸收入血
則效失，用量不拘（外用）阿仙約又名兒茶功同五倍子。

烏賊骨

含磷酸鈣炭酸鈣膠質等，用作暫傷止血藥，（參傷口止血）擦傷皮膚疥癬紅腫
，調雞卵黃塗之，又為牙粉原料。

治湯火傷

烏賊骨 葛粉 五倍子 柿核 黃柏各等分研末麻油調敷（按此方有卓效）

蒲黃

止血治吐衄，去瘀癰，紅腫，胎漏（即孕婦產門下血）崩漏用本品五錢強二兩水煎
服，又可用以催生，大葯本品與麥角有相同處，能收縮子宮止血及增強陣痛也。

尖笑散治產後虛羸，痛欲死，蒲黃五錢脂各等分加醋水煎服二錢，按五錢脂有鎮痙止痛作用
，余用本方治胆石痛均有效用量二——五

白芨

治吐血及疥癬，一七郎中治吐血必用白芨四五錢甚效，不解其故豈因其質膠粘能促
進血酸之凝固乎，又先父治痔瘻皮下蜂窩織炎有一種方用白芨二錢，該方為澤蘭一

兩白芨三錢，阿膠五錢，病在臍上加白芷三錢，臍下加牛七三錢，（按此方實出自陳修園藥
中）豈白芨阿膠能制止血球離走於血管之外，以奏消炎之效歟用量二——五

伏龍肝

爲灶心黃土，能止嘔逆，吐血，此或由其爲鹼性及收斂庇護作用，減弱胃之敏成，胃中有潰瘍，或炎症時，本品有庇護滅外來之刺激，并消其炎症也，中醫謂能治筋帶，尿血，遺精，腸風，癰腫（搗調塗）催生下胎者，則或爲誇張之詞，蓋一黃土耳，何能有若是之作用哉。

日本醫官神嘉謨作氏曰：治好振嘔吐西藥皆不效，不如伏龍肝蓋甚，法以黃土燒製之爐（黃土即尋常土之一種其主成份爲珪酸礬土與水，此外尚含酸化鐵，水酸化鐵，加里鹽類等）擊細投炭火中燒之，另取他盛水取燒紅之碎片，盡淬水中，經二三分鐘取出，再燒再淬，反覆至數十次乃止，廢碎片不用，將此水濾過成澄清液，收貯備用，用時每服約二合，服後緊避不過一二小時，氣靜即見恢復，食慾增進，曾試驗多次，治愈數人，無不立奏奇效，按若以此水煎小半夏加茯苓湯則止好振嘔吐當更有效。

童便

陳修園譚次仲以此爲污穢不堪用，余經驗止吐血極佳，余昔年曾患吐血症，服自己小便一月，早晚各一次，初覺鹹澀不易入口，習慣後亦無他，止血甚效，余治肺癆咳血皆以此爲主，每收奇效，今世科學進步，現發小便內有辜丸內分泌素，列爲補品之一矣，（該素有反老還童之效）天下之虛弱者，何不多服小便，以代鹿茸乎。

荷葉

今用爲止血解暑藥，又可解菌毒云用錢三——五

大薊小薊

皆用爲止血藥，小薊優於大薊，二者皆利尿去水腫，又可治療瘰，瘡癰云用錢三——五

血竭

爲一種樹脂，有收斂止血作用，除血痛，散瘀生新，入跌打藥，末參跌打傷可止血，用量〇，五

訶子

含鞣酸甚多，有收斂作用，口含咽治喉炎，內服治下痢泄瀉，用量一——三梅

五靈脂

爲一種鳥糞，用於胎前產後之血症，余經驗有鎮痙止痛作用，子宮胃腸各平滑肌痙攣性疼痛皆治之，合蒲黃治血崩，（其止血作用恐在黃蒲），用量二——

五。

石榴

含鞣酸極多，收斂作用甚強，止痢止血崩帶，脫肛，其根皮可驅穢虫，用量一——三。

槐花

治血痔有卓效，血痢，目赤，吐衄，崩漏亦用之，大約有消炎收斂作用，腸炎下血頗有效，用量三——一〇

白頭翁

治痢疾，經閉，痔瘡腫痛，治大腸發炎極佳，大約有消炎作用也，用量三——五。

罌粟殼

含鴉片成分甚少，或無之，其作用同鴉片止痛，鎮咳，止痛，然效力甚微，不如罌用鴉片，用量二——五。

地榆

止血收斂用於吐血，下血，赤痢，月經過多，今多用於大腸炎，及痢疾之下血，用量三——五。

代赭石

由氧化鐵及粘土而成，服錫鈍劑有降逆作用，治吐血鎮驚，用量三——一〇。

白附子

治中風，失音，頭面避風，陰囊濕癢，本品似有發表微逆作用。

市風口喝半身不遂（按半身不遂恐難效，中風口眼喎斜爲外感陰虛面神經麻痺也）白附子
蠶蠶 金蝎 各等分末每服二錢日三次，用量〇，二——〇，五

天南星

功似半夏，有鎮逆，治驚癇，制止分泌，祛痰，健胃，發汗，驅虫作用（按發汗可疑）用量一——三

穿山甲

發表麻疹，痘瘡，疥癬，發膿乳，消腫，止痛，排膿，中醫治癰多線形，以爲穿山甲善鑽走，其甲亦有同性也，用量一——三。

縮砂

含揮發油，爲一芳香健胃劑，作用詳胃腸篇。

雞冠花

花葉子俱用於瘡疾，下痢，及白帶，作用頗似白頭翁，消液作用甚強，并可治吐血，下血，用量一——五。

菝葜

又名山歸來，土茯苓亦名山歸來，蓋土茯苓菝葜與本品皆同種屬之物，功用亦多相同處，余在本集第一卷有菝葜可治糖尿病，借嶺東無此物以供試用之文，後歸元孫先生乃以菝葜來口，君嶺東無此物者，實遍地有之物也，余愧甚，不知此遍地皆是之菝葜，乃俗名馬甲子也，又本品治糖尿病勝於根云。

本品可治腰背疼痛，風痺，草解相彷彿，又可治糖尿病，聞甚效，但余未試過，土茯苓則曾試過一次有效，但僅一例也，用量二——五。

土茯苓

饑民有用以充饑者，中醫用治梅毒，瘡癤，除風濕、止泄瀉，利小便，治筋骨飽舉，肢節痛，有清血排毒之效，用量五——二〇。

木賊

具利尿發汗藥，又可治結膜炎，退翳膜，治血痢，疝痛，痔瘡，腸風，崩漏，

日人研究本品利尿之力極強，用後必患血尿，僅可用於因腎臟衰弱而分泌小便機疲而發之水肿，及小便閉，蓋本品爲劇激性利尿劑，急使腎炎忌之，替用於急性腎炎，將更增腫勢，

本品大約為消痰利尿劑，發汗之力可疑，用量二——三。

豆豉

為大豆經醱酵製成者，中醫以本品和葱用以發汗，仙方則以本品加枝子，名枝子豉湯，治熱性病之煩燥而不眠者，作鎮靜用余疑其醱酵時含維他命甚多，且有健胃

作用，其發汗鎮靜皆不可靠，用量五——八。

桑葉

則可治盜汗及手足麻痺，及吐血，洗眼明目，今中醫多加入風藥中用之，恐無當，用量一——五。

浮小麥

治濕熱盜汗，又有鎮靜大腦安睡作用，仲景甘麥大棗湯即以本品為主藥，先父七十餘時，常失眠，余奉以此湯，得安睡，如經浮麥則麩皮亦可代之，又治骨

蒸癆熱，其治盜汗者豈因鮮熱之故乎，用量五——四〇。

青黛

為一種色素，今西藥最新製品如百浪多息，黃色素之類皆色素也，可治小兒驚癇，及諸虫咬傷，止血，及瘡毒，咽喉腫痛，似有解熱消炎鎮靜作用，中醫喉風散多用

本品入藥。

利筋丸 治小兒驚風，輕粉一分 青黛一分 天竹黃二分 黑牽牛末五分 研勻蜜丸如豌豆

大 一歲一丸 溫薄荷湯下（按）輕粉即甘汞有輕瀉作用，嬰孩自己藥片即以此為主藥，黑牽牛亦為瀉劑，天竹黃解熱，消炎減少氣管枝分泌，青黛清涼消炎去腫，此方能導引血液下行

，小兒腦部充血，常發生驚風癇症，此方有卓效。

碧玉丸 治心肺積熱，止咳咽喉，腫脹閉塞，水漿不下，或生疔，重舌木舌，青黛 益硝
蒲黃 甘草 各一兩研末砂糖爲丸薄荷湯下。

口中懸爛青黛黃柏各等分研末塗之，按此病余經驗五倍子成兒各研末調蜜塗亦效，又本品不可入煎劑，須研末沖服，或外塗用量〇，五——三。

大楓子

含脂肪油有興奮身體之代謝作用，變化其營養狀態，增進抗體，間接可以陣病毒殺菌也，無直接殺菌之效，昔用治療瘋，但效驗不著，又治疥癬癬疥等用甚

一——五。

檳榔子

含劇微副交感神經之物質，其作用與半夏阿托羅平等相反，有輕瀉發汗及收縮腫孔作用，然中醫之用此也不如此，中醫多用以治腸胃病，痰水，積結，宿食

擊化，下氣，痢疾等，又能殺蠱蟲，別錄曰本品主消殺送水（有謂可治水腫者）除痰癖。腳氣衝心本品二錢童便服，疝氣衝逆，本品末酒調服。溫則草中毒本品采白湯服，嘔吐痰水本品一個陳皮二三錢煎服。

胃本中村俊士治惡阻病以本品一錢水煎，一日分六次服，連服八日惡心嘔吐全然消退。檳榔散療吐酸水每食則變作酸水吐出，（按即胃酸過多也）檳榔二 人參〇，五 茯苓一

陳皮一 華梭○，五

化蟲丸 治、入小兒諸虫痛，鷓鴣菜二○ 甘草 白礬各○，五 鶴虱 檳榔子蜀椒各一○

牡蠣一 糊丸服（按）余加棟樹皮質衆雁子尤佳用量一——三

苦楝子

本品有驅蛔作用，但治胃腸痙攣性疼痛亦甚效，大約有鎮痙止痛作用也。苦楝樹皮驅蛔作用亦強，但甚冷敗，須合檳榔用之，用量二——六

使君子

本品用以驅蛔或謂能除虛熱，止瀉痢痢水，用量○，五——一

烏梅

今中醫多用以治痢疾，謂有收斂之效，又謂能殺虫不知殺何種腸寄生虫耳。嘗聞能解熱治咳生津，止渴則中醫今少用之用量一——三

扁蓿

當合單麥用以利尿，亦可治霍亂，腹痛，黃疸下，蚘虫用量三——六

麝香

為一種鹿之臍部分泌物，含揮發性物，有興奮強心之效，譚次仲先生用以代麝子，謂能性病之心弱而不能附子者可用本品，本草論其治效大多不可盡，七約與香薷，胃腸劑之辛辣芳同請參閱便可明藥之作用也。

葱

合揮發油，有刺激汗腺乾汗及利尿之效，加大黃朴硝等下劑用之又可解腸痙攣性，疼痛，民間多合生薑煎湯服溫覆以發汗，用葷葱白五七根，（按其發汗多由溫湯增熱作用若

無酒湯則煮吃大半碗亦即發汗)。

海藻昆布

爲海產物含碘質爲變質劑，可治瘰癧，請參碘化條 用量二——五

夏枯草

中醫用以治療瘰，又可治子宮陰道粘膜炎，胃炎亦可用之，用量一——三

蒼耳子

治瘰癧，內服成煎膏外敷有奇效，昔年俾開可治癩瘋，今既無人遺之矣，用量二——五

木瓜

治瘰癧轉筋，及風濕脚氣。

木瓜湯治風濕脚氣 木瓜 腹皮 紫蘇 木香 羌活 茯苓 陳皮 甘草

木瓜吳萸湯治妊娠帶亂吐瀉脚轉筋 木瓜 吳萸 生姜 用量二——五

龍骨龍齒

此二物皆爲一種獸骨之化石，今謂爲龍骨者非是，蓋龍之爲物，不可考也，其成分爲碳酸鈣磷酸鈣之類，其作用同鈣劑，鈣伊洪(即在血內起作用

時之鈣原子)能催促血液凝固，爲止血劑，又增強心之收縮力及骨骼肌之興奮性，有安靜作用，可治破傷風及驚狂，近時研究鈣能減弱血管壁之滲透性減少血球及血清滲出於血管之外，有消炎及緩解滲出性癩癧之效，蕁麻疹，濕疹，猩紅熱，疥疹等用之。

龍骨龍刺之作用約同上述之鈣伊洪，惟在水中溶解極難，中醫皆入煎劑，實應末服，然若末服，則雜質甚多，不潔淨。

中醫謂龍骨主治心腹，鬼疰，欬逆，洩痢膿血，女子漏下，瘕瘕堅結，小兒熱氣驚刺，夜臥自驚，汗出，止汗縮小便，溺血，定魂魄。

中醫謂龍齒主治大人驚癇，諸溼癩疾，狂走，心下結氣，小兒五驚十二癇

中醫以此二藥爲鎮靜收斂劑耳，盜汗失眠可用之用量煎劑三——二〇末服，〇，五——一卽足。

牡蠣

所含成分器同龍骨效用亦大略相同常二藥合用。

中醫謂本品主治營衛虛熱，驚癇，煩滿，心痛，氣結，止汗止渴，療洩精，澀大小腸，治喉痺，咳嗽，心脅下痞熱，粉身止盜汗。

上列三藥之主成分爲碳酸鈣，有解酸作用，可代小蘇打煨製鎂爲制酸劑，然不及西藥之精鍊純潔也，吸收入血或能中和血中過多之酸質，又能包圍慢性炎症病，杜促其治愈，如結核性及化膿性瘡灶外圍皆有石灰質包圍，可以証之，用量同龍骨。

石解

為經派醫最喜用之滋陰藥，以為滋而不膩也，但嶺東醫却甚少用，僅於陰虛牙痛及熱病後津液枯燥時用之。

中醫謂本品為滋陰強壯健胃藥，治陰痿，消渴，陰虛發熱，病後枯燥，止虛癆之自汗盜汗，肌肉消瘦，用量二——五。

水銀劑

水銀吸收入血有輕微營養刺激作用，如砒礬鐵等，能增加赤血球，增加體重而體力，亦頗有力焉。

昇汞

一萬倍之溶液可為外科消毒，千分之五至十之溶液外塗可治頑癬，（若神經皮膚炎之皮膚極粗厚者余常用百分五之溶液或再加百分五之柳酸加波力之類甚佳）四十分之一之溶液可用以洗眼，治紅彩炎，結膜炎，脈絡膜炎等，其三分一至十分之一之酒精溶液可為局他藥，治狼瘡，贅肉，梅毒性潰瘍等，（或為軟膏用之）。

甘汞

即中藥之輕粉為瀉劑，述於下劑篇，外用，撒布可為消毒藥，治潰瘍，梅毒性潰瘍，即結膜炎等，內服小量（○，○——○，○三）可治水腫及治梅毒，但余經驗其治水腫之力甚弱，不及注射沙利汞甚。

紅降汞

即中藥之紅三仙丹，多製為百分二至十之軟膏治梅毒潰瘍，眼臉緣炎，下疳，尖形贅肉等（眼科用百分二）。

黃降汞

即中藥之黃三仙丹，治角膜翳及種種難愈之眼炎（用千分三至百分二之軟膏），炎症急者用千分三至五，因恐炎症不受刺激也，慢性炎可用百分二。皮膚炎有分泌

物者，余經驗用本品百分二之軟膏甚效。

柳酸汞

治梅毒及寄生性皮膚病，淋病顆粒性結膜炎等，又可製為肌肉注射劑。

白降汞

此為應用極廣之皮膚病藥，如梅毒潰瘍，寄生性皮膚病，（疥癬，頑癬，頭癬，陰虱）（用十分一至十分二軟膏），眼臉緣炎（百分五之軟膏）等。

紅色流化汞

即中藥之辰砂，中醫用作鎮痙藥，詳於麻酔鎮痙劑篇，外用製成十分一之軟膏可治慢性濕疹，及梅毒等，中醫多用以內服，且常用大量可治

癩病。

水銀膏

為水銀三十分，豬脂十八分，牛脂四十二分，混和而成者，治梅毒瘡，瘰癧丸，淋巴腺及管炎，皮下蜂窩織炎，橫痃及疔瘡，頭虱，毛虱等，凡用水銀糊時不

可用藥劑，恐在組織化合成碘化汞，使組織壞死也。

碘劑

本品殺菌之力極大，以碘片七分酒精九十分碘化鉀二分製成碘酒，塗於皮膚，能剷激發炎，奏引赤痢炎之奏，故於關節炎、腺炎、骨膜炎、肋膜炎及一切無名腫毒均用之，又收毒性皮膚病及潰瘍亦用之，內服一滴至三滴可治頑固之嘔吐，（交感性嘔吐）（平常消毒用碘酒有百分之二，五成分既足少加碘化鉀可防酒精之變壞）。

碘化鉀

環碘類今舉碘化鉀言之，碘化鉀海產動物如海帶昆布含之甚多，三期梅毒本組織細胞結合，若該組織有慢性炎症或為膿瘍組織，（如淋巴結腫，樹膠腫，結核組織膿汁，瀰腫，肉腫等）則其物質代謝旺盛，尿酸之發生多，（碳酸越多則遊離之碘伊洪越多）碘之遊離亦多，與組織結合後，發生局部刺激而呈異化作用，使組織之破壞進行加速，且慢性長性組織及腫毒其安定性較少，更易被破壞也，第二碘劑有亢進甲狀腺機能作用，故全身物質代謝亦間接為其亢進，第三碘化鉀又有鉀鹽類之吸收作用，能增加尿量，代物質代謝亢進，有此三作用，故在藥物學上乃所謂發汗劑也。

本品有上述諸作用故可用以淋巴腺乳腺羣丸及甲狀腺腫，中醫以海帶，昆布治療癰，不為無因，拜耳出品安妥碘治療癰余經驗有卓效，但甲狀腺腫有用碘劑而機能亢進而發甲狀腺中毒症，不可不察。

本品用於肋膜炎，膈膜炎，腦出血，腹膜炎，以吸收其滲出物，但效力不確，亦須用於慢性者，又用於各種優性病，如慢性氣管枝病及腳氣關節風濕等。

本品十分一之軟膏製劑，外用能消腫，促進滲出物之吸收。

硼酸

功似硼砂治各種皮膚粘膜炎症，為一極平和之消炎收斂劑，成水溶液及百分十至二十軟膏用，洗眼嗽口外敷疥癬。

魚石脂

Ichthiol (一)有制腐敗做鎮痛制癢作用，能殺寄生虫，紅腫，疥癬，潰瘍多用之，但余經驗遠不及漢法醫典所載之會蛇膏，(二)內服少量用於胃粘膜炎，

又為子宮及卵巢之消炎藥作坐藥插入腔內又塗布於子宮及痔核結節。

用量塗布用百分三至五之酒精溶液或百分十之軟膏此藥西醫常用但余覺其效力極弱聞此藥初由外國輸入時較佳，今不如昔云。

石炭酸

殺菌力甚強，為外科消毒劑，百分二之水溶液敷治創傷潰瘍，以綿花蘸其濃溶液塞鬪齒可止牙痛，其功用猶幾阿蘇Creosol也本品濃厚液腐蝕力極大，可做

贅疣，(以本品結晶體加少量水燉融即成液體)，外用於慢性濕疹，疥癬及諸種皮膚病(週身搽搽以本品一二十瓦沖溫水一大桶洗身甚佳)內用於糖尿病霍亂及腸胃之異常酸酵，(小量)。

黃碘

Iododorm 爲極佳之防腐劑，無刺激腐蝕作用，可做布於創面潰瘍面，如火傷，橫痃，子宮口糜爛，乳頭潰瘍，陰門炎，梅毒潰瘍，軟性下疳，結核潰瘍等，又可爲軟膏劑，其百分之一之溶液，注入尿道治淋病。

氯化鉀

即做火柴之白藥也，其百分三之水溶液爲含嗽劑，治口咽各種炎症潰瘍，爲一極佳消毒劑也。

過錳酸鉀

一磅爲灰錫養以少量置水內即成紅色液體，消毒性甚強，洗滌各種炎症潰瘍，內服用於胃酸中毒，癩中毒等爲解毒劑，因其所含養原子甚富可利用

之以破壞毒素也。

幾阿蘇 *arsenic* 及怪阿寇 *Grainolium* 今多用於肺結核，實爲胃腸消毒劑，間接可以降胃，增加營養耳，其治肺結核之力可疑。

山道穿

爲最有力之驅蛔劑，灌腸可治蟻虫。

處方 山道穿 〇，〇二 甘汞 〇，〇二 乳糖 〇，三 上爲一包早晚各服一包，連用三四日 (三歲至八歲小兒用大人倍之)。

知母爾 *Thymolium* 能驅十二指腸虫，及制胃腸異常發酵，外用爲防腐藥，治火傷及慢性皮

瘡病。

用殺蟲用二——入外用製成百分二至五軟膏。

處方 知母兒四，○入於膠囊每食後分服服此藥之前後，各服蓖麻油二十五，收效尤佳，然余經驗殺十二脂腸虫以拜耳靈雷丁為最佳，中藥則絳礬丸開有卓效，（載於本集第一卷）但無經驗。

秘露樹漿 *Balsam Peruvianum* (一)用於疥癬有毒殺疥癬虫兼殺其卵之功，(二)有防腐作用，不刺激亦不引起炎症，治凍傷，火傷潰瘍等，(三)內服能促進消化，減少分泌，故用於慢性氣管枝炎及淋病。

用量內用○，二——二，○外用則單味或和以軟膏或為酒精溶液。

披羅士平 *Pilocarpin* 有刺激副交感神經作用發汗力極強，用於腎長性水腫，（因能衰弱心臟性水腫須慎用）（但鹽液失去太多，體中毒素濃縮，有更加中尿毒症之可能）字瀉亦用之，其他耳下錢炎心囊炎感冒諸病須發汗者亦用之，又因增加氣管枝分泌，用於氣管枝炎為祛痰藥，點眼可以縮瞳。

鞣酸

即單鞣酸植物中含之頗多。如五倍子、兒茶、茶葉、大黃、藕節、肉桂、石榴根皮等，尤以五倍子含之最富，有收斂止血消炎之效，和澱粉爲撒布藥，用於潰瘍面及吹入鼻喉喉口或爲百分之之永溶液爲含嗽藥，或洗陰道膀胱等有減少分泌防腐之效。

本品與蛋白化合物名爲鞣酸蛋白，在胃不變化至腸始復分解爲二物，有止瀉消炎收斂之效。
處方 鞣酸蛋白〇，六一三 陀佛氏散〇，五 次硝酸銀〇，六一三〇上分六包 一日三次 二日分服用於赤痢或腸炎 服通下藥後爲止瀉約有卓效。

鋅養粉

(亞鉛華)和澱粉或再加硼酸粉爲撒布藥，用於一切潰瘍面，創傷或濕疹有收斂分必使其乾燥之效，又可爲百分之十至二十之軟膏治上述各病。

醋酸鉛

(鉛糖)有收斂消炎作用，百分之一之水溶液敷急性皮膚炎及打撲等，二百倍之溶液點眼，二百至五百倍之溶液洗白帶，淋病，膀胱粘膜炎，結膜炎，皮膚病等有減少分泌，制止化膿收斂作用，內服可以止血用於肺出血，胃腸出血，因有收縮血管之效。

硫酸鋅

爲收斂消炎藥，力弱於硫酸銅，二百倍至五百倍之水溶液點眼，結膜炎，百倍至二百倍之水溶液洗尿道，陰道，治淋病，白帶，爲軟膏治惡性潰瘍，狼瘡，

內服爲吐劑(內服〇，〇一一〇，〇五吐劑〇，三一，〇)。

硝酸銀

(一) 百分二至十之水溶液有收縮血管，減却分泌，防腐制酵，撲殺分裂菌之作用，為收斂藥，用於咽喉炎扁桃體及結膜長會慢性的，及尿道炎膀胱炎等塗布或注入，(二) 濃厚溶液有腐蝕表面作用，外用於潰瘍面，濕疹，白喉，化膿性扁桃腺炎，結膜顆粒，丹毒，下疳，其結晶條能腐蝕贅疣，千分一二之溶液，內服治胃潰瘍，胃瀉及潰瘍性下痢，脊髓癆，脊髓炎等，本品為一使用極廣之藥，怕日光須貯於有色瓶內。

蛋白銀

PROTARGOL 功用似前者而力較弱，治淋病咽喉炎，結膜炎等每量由百分一至百分十之水溶液。

電銀膠

有防腐殺菌之效，製為百分五之軟膏治淋巴管炎，蜂窩織炎，結膜炎等，注射肌肉治葡萄狀球菌敗血之病，血產褥熱，敗血病，各種疥癬血毒等有卓效。

明礬

即白礬有收斂消炎作用，其百倍至二百倍之水溶液，治咽喉炎，扁桃腺炎，白帶，淋病，結膜炎，鼻血，子宮出血(吞嗽注入或為坐藥)。

石灰水

即浸石灰之水(一) 能溶解白喉之纖維，減少潰瘍面之分泌，奏收斂防腐之效，故外用於白喉潰瘍，火傷，濕疹，(二) 內服可為制酵藥，用於酸類過多之

胃酸嘈雜，及小兒之夏日下痢，因能中和胃酸，減少腸之分泌，及蠕動。

處方 石灰水五，○ 亞麻仁油(或橄欖油或花生油或豆油)五，○ 知母爾○，二 混和

齒馮火傷。

硫酸銅

有腐蝕收斂作用以其結晶塗治結膜頸拉，結膜腫痛用其二百倍之水溶液點眼以其百倍至二百倍之水溶液注入治淋病及慢性膀胱炎又用爲催吐劑治癩或麻醉藥

中毒每十分至十五分間服○，○五——○，一

附錄

中藥使用標準

此爲漢法醫典附錄，由萬病回春及母花每盡錄別錄摘來者，今轉錄於此可窺中醫用藥之一般（但不可囿信）

中風^心倒不能言^目用皂角刺

細辛

傷寒頭痛用羌活川芎

發狂用大黃芒硝

遍身疼痛用蒼朮羌活

發熱用石膏知母

痰氣瘰癧用天南星木香

發汗用麻黃桂枝

胸膈膨悶用桔梗枳殼

語言蹇澀用石菖竹瀝

久汗不出用紫藤青皮

心下痞悶用枳實黃連

口眼過斜手足搐搦用防風羌活

汗出^汗桂枝芍藥

懊惱用梔子豆豉

表熱用柴胡

身熱用竹葉石膏

左難右^難（左右半身不遂）用當歸川芎人參白朮

裏熱用石膏黃連

不眠用竹茹枳實

大熱譫語用黃芩石膏梔子黃藥

鼻乾不眠用葛根芍藥

諸風用防風羌活

發斑用玄參升麻

發黃用茵陳梔子

黃柏瀉膀胱火

六鬱(氣滯濕滯血食滯)用蒼朮
香附

中寒陰症用附子炮炙

木通瀉水腸火

中暑用香薷扁豆

梔子瀉齒疔火

結痰用瓜蒌仁貝母枳實

中濕用蒼朮白朮

內傷元氣用參芪甘草

濕痰用半夏茯苓

黃連瀉心火

脾胃虛弱用白朮山藥

風痰用白附子天胡星

黃芩瀉肺火

山查子草果消肉積

痰在四肢絡絡用竹瀝姜汁

芍藥瀉脾火

黃連葛根烏梅清酒積

痰在兩脅用白芥

石膏瀉胃火

神麩麥芽消食積

老痰用海石榴

柴胡瀉肝火

巴豆消冷積

肺癆咳嗽用黃芩桑白

咳嗽日久用款冬五味

久泄用訶子肉豆蔻

知母瀉腎火

大黃消腸積

肺寒咳嗽用麻黃杏仁

水腫用豬苓澤瀉

氣喘用蘇子桑白

久泄下痢用柴胡升麻

寬中用縮砂仁枳殼

瘧疾(新久)用常山白豆蔻

霍亂用蒼苓半夏

積聚用三棱莪朮

痢疾初起用大黃

嘔吐用藜蘆半夏

左積(死血)桃仁紅花

真急後重用木香檳榔

咳逆用柿蒂

右積(食積)用香附枳實

熱痢氣滯用黃連枳殼

吞酸用蒼朮神麩

中積（痰飲）用半夏

黃疸用茵陳

補陽用黃耆附子

補陰用當歸熟地黃

補氣用人參黃耆

左頭痛用川芎當歸右頭痛用

人參黃耆

凝氣用升麻桔梗

癆熱痰嗽用竹瀝童便

癩症用當歸黃連

癩症用天南星半夏

健忘用遠志石菖

驚悸用茯神遠志

癩煩不寐用竹茹酸棗仁

口舌生瘡用黃連

諸痛在上用羌活枯梗桂枝

威靈仙

白痢氣虛用白朮茯苓
赤痢血虛用當歸川芎

泄瀉用白朮茯苓

水瀉用滑石

補血用當歸生地黃

破瘀血用當歸尾桃仁

麻木濕痰用桃仁蒼朮半夏

諸頭痛用蔓荊子

便鬚髮黑用何首烏

耳鳴用當歸龍腦

身中生瘡用黃芩

鼻塞聲重用荊芥防風

鼻淵（濁涕流出）用辛夷

牙痛用石膏升麻

眼腫用大黃荊芥

嗜睡用炒梔子乾姜黃連

煩氣用烏藥附子

痞滿用枳實黃連

脹滿用大腸皮厚朴

眩暈用川芎天麻

麻痺氣虛用人參黃耆

頭風弱用藜蘆白芷

暴吐血用大黃桃仁

久吐血用當歸川芎

衄血用黃芩芍藥

止血用京黑菲汁

瀉血用木通梔子

虛汗用黃耆白朮

止諸痛用乳香沒藥

腰痛用杜仲故紙

眼中雲翳用白豆蔻

骨痛用胥皮白芥

諸痛在下用牛膝木通防風黃

柏

霧障昏睛用熟地黃

手臂痠用羌活薄荷桂枝

咽喉腫痛用桔梗甘草

清渴用天花粉

結核用夏枯草

疝氣用小茴香川楝子

生津液用人參五味子麥門冬

肺癰肺痿用薤白仁

脚氣濕熱用蒼朮黃柏

心胃痛用炒梔子

下元虛弱用木瓜牛膝

赤白濁尿用茯苓

腹痛用芍藥甘草

痿痹用人參黃耆

遺精用龍骨牡蠣

腹冷痛用吳茱萸良姜

肢節痛用羌活

小便閉用木通車前子

大便閉用大黃芒硝

婦人滯下用炒乾姜

去敗膿用白芷

便血用槐花地榆

婦人安胎用黃芩白朮

惡瘡疔疽用貝母白礬

痔瘡用黃連

婦人難產用川芎當歸

便毒用木賊子穿山甲

脫肛用升麻柴胡

婦人產後惡露用益母

魚口瘻用半條穿山甲

諸虫用便君子檳榔

產後虛熱用乾姜

疥瘡用五倍子

婦人諸病用香附子

婦人吹乳用貝母白芷

楊梅瘡用土茯苓

婦人腹痛用吳萸黃香附子

乳汁不通用穿山甲

腫疔用輕粉黃柏

小兒驚風用辰砂

杖瘡跌傷用盞便好酒

婦人經閉用桃仁紅花

瘰癧瘻背用金銀花槐花

瘰癧瘻夏枯草

諸藥冷熱主藥例

破傷風用天南星防風

湯瀉火傷用白礬

犬咬傷用杏仁甘草

冷咳逆用養香丁香木香

熱嘔用黃芩梔子

瀉下痢用黃連黃柏

頭骨痺喉用狗涎類服

(以上抄自萬病回春)

小兒冷瀉用肉桂乾姜茯苓

熱咳家用三黃

疥瘡用白礬硫黃

瘰癧風用影陀僧

熱咳用黃芩梔子

冷咳用半夏參杏仁

熱咳逆用黃連黃芩梔子

冷瀉用肉桂人參養香蜜

鹽

喉諸毒用香油灌喉

中砒毒用豆豉蚯蚓

龜吐瀉用三黃

冷吐瀉用養香木香

寒熱往來用知母黃柏柴胡

小兒黃瘦知母黃柏肉桂

婦人血崩用蘆黃

諸疥瘻毒用理翅牛蒡

諸吐血用芍藥地黃梔子

熱瀉用黃芩麥門冬瓜蒌根石

瀉狗咬傷用羌活

蛇咬傷用白芷

冷嘔用人參養香乾姜桔梗

冷下痢用乾姜肉豆蔻

小兒龜瀉用鼠尾草

(或知母黃柏梔子三黃)

大瀉熱結用三黃芒硝

大瀉冷結用乾姜白朮肉桂

冷症常用四物五香川芎當歸

腹熱服用三黃

小便熱數用瓜蒌根黃柏知母

腹冷服用莪朮木香

出熱汗用黃蘗知母三黃

裏急後重實者用三黃

小便冷數用龍骨肉桂附子

出冷汗用肉桂白朮黃耆

裏急後重虛者用乾姜肉桂

熱熱常用石薺知母

殺熱虫用三黃柏

實浮腫用玉丹寶丹大乙丸

頭冷痛用沉香川芎白芷細辛

殺冷虫用乾姜莪朮木香

虛浮腫用白朮茯苓

熱病不食用三黃

冷氣上衝用人參黃耆蒼香白朮

腹冷痛用肉桂乾姜莪朮木香

冷病不食用莪朮

熱氣上衝用黃芩梔子香附枳殼

瘕瘕用犀角

中藥之生理的分類

(以上鈔自梅花無盡園別錄)

古藥藥品之分類法，或由于自然之形狀，或由于化學之性質，或由于醫治效用，諸說紛紛，各有得失，至今日尚無完全之分類法，惟因藥物之應用上便利，參用生理的分類法，茲記中西藥物之著名者于左。

魯類

西

藥

中

藥

沈靜藥

溴化鉀 亞鉛華 酒精 醋羧

川芎 蘇草

鎮遠藥

溴化鉀

羚羊角 天麻

與奮藥

酒精 加加阿實 珈琲 甘硝 石硝

白芷 茴香 茶 薄荷 烟草 樟腦 麝香

墮胎藥

麥角 薩昆那

麝香 牡丹皮 地黃 香附子 益母草

通經藥

麩荳 鐵劑 隱昆那

知母 竹節人參 龍骨 胡柴 水

解熱藥

規寧 柳酸鈉 安知必林 安知欺

薄荷油 夏枯草 荳蔻 硝石 蔓

清涼藥

酒石酸 枸橼酸 稀鹽酸類

荊子 薄荷油 夏枯草 荳蔻 硝石 蔓

驅蟲藥

綿馬根 加麻劑 香蘇 山羅辛 百

石榴根皮 南瓜 合歡皮 檳榔子

殺菌藥

季利 沙爾並 那布管林

和 大黃

驅梅毒藥

碘化鉀 水銀劑 六〇六

土茯苓 皂角子 白欬 白芨

腺病藥

肝油 碘鐵

銻金沙

中西醫學比較觀

(七)

健麻質斯藥
(風濕藥)

柳酸鈉 沙羅 安知歌脫林 安知必林

防風 決明子 瑞得皮

痛風藥

加里亞 利生每鹽

蜀羊泉

加兒答藥

尿酸藥類

明礬

清血藥

撒爾撒根

士伏茶

苦味健胃藥

胆神 根倫模 羅矢亞 昆樹 蘭格皮

熊膽 芍藥 黃連 龍膽 苦參

芬香健胃藥

橙皮 葛斯 加里刺 桂皮 丁香

糖沙 菘朮 艾葉 茵陳蒿 吳茱萸 忍冬

消化藥

胃布頓 牛膽 巴思乙涅 稀鹽酸 小蘇打 糖化酵素

水飴 麥芽 鈉豆

驅風藥

香味料 蝦蟹鎂 依的兒

牛蒡(用一錢至二錢爲十倍之丁兒) 胡荽子

制血藥

鐵劑 規寧 揮靈油

地黃 燕麥

骨形成藥

蘇打 蝦蟹鎂 炭酸鎂

牡蠣 烏賊骨

緩和藥

脂肪油 甘油 扁桃 膠囊 亞麻仁 粘滑液 沙列布根 藥粉 膠質 糖類

甘草 無花果 山藥 蜀葵根

鎮咳藥 治疝藥 收歛藥 噴嚏藥 引赤藥 發泡藥 止血藥 緩下藥 止瀉藥 吐劑 鎮吐劑

中

西醫學比觀

吐根 菲沃斯 溴化鉀 龍腦

佛昆那

佛兒雲拔爾撒謨

單寧酸 阿仙蘭 明礬 石灰水 次

澱食 沒食子

佛蔡 沒食子

藜藜根 柳酸 撒昆那葉 的列並底油 酒精 安母

尼亞區謨

芫菁

過氫化鐵液 單寧酸 明礬 麥角

石鹼 施那 加兒兒斯泉 草麻子

油 舍利鹽

次硝酸 蒼鉛 柳酸蒼鉛 次沒食子

酸蒼鉛

吐根 次硝蒼 修(草頭)攝

杏仁 桔梗 罌粟殼

薏苡仁 續隨子

大楓子 雷丸

五倍子 地榆 蘇木 拳參

胡椒

芥子 松脂 山俞(草頭)藥 大蒜

芥子 澤瀉 瑞香皮

屬勃 蒲黃 蕪麻

大黃 硫黃 大棗 芒硝 天門冬

五倍子 荆芥 鼠尾草 郁李仁

桔梗 瓜蒂

半夏

利尿藥

醋酸鉀 吐松子 硝石 重價石醋鉀

防己 燈心草 多瓜子 猪苓
單麥子 商陸 茯苓 車前子

祛痰藥

吐根 濕泥子沒藥 安世尼亞劑 松
佛油

志遠 貝母 五味子 麥門冬
冬 良姜 茴香 香附子

發汗藥

撒里索 接骨木花 耶僕蘭日葉 加
密列花

地龍 麻黃 烏犀角 天南星

變質藥

典(石旁)化鉀 撒爾撒根 瘧瘡木
儼沙雷 拉斯木

連翹 續斷

治瘧藥

緩劑藥 粘渴劑

胡瓜根 虎杖

強壯藥

銹劑 苦味健胃劑 鱗劑鹽類

杜仲 烏藥

滋養藥

肉趨几斯 百市頓 肝油 山米他司
其他各種相似之藥品

水飴 胡麻子 糖類

中藥劇毒藥

中藥中毒性最強者如左(公認按不盡然)

茵芋 鉤吻 格注草 唐土 營實 川烏頭 羌青 半夏 坐墊草 丹 白桃花 商陸 射干 綠
豆 天雄 鳳仙 皂白 貝李子 偏籃子 石黃 防葵 牛扁 甘遂 常山蜀漆 射干 綠

育 天南星 藜蘆 鱉黃 澤漆 白附子 遠牛子 斑蝥 芫花 礞石 苘麻子 椰子 水銀
 虎掌 藤黃 羊躑躅 軍烏頭 射蒙(石旁)石 瓜蒂 慈石 藜蘆 蘇子
 鷓鴣石 木藜蘆 密陀僧 大戟 葇石(艸頭) 蔓陀羅華 莽艸 藜蘆 蘇子
 續隨子 狼芽 輕粉 附子 阿片 扁玉簪 厚麻 砒石 金蝸 殺木 雄黃
 雄黃

中藥配合之禁忌 (公認按不準確)

中藥配合之禁忌，其理由尚未十分明確，茲將育來所稱遺之說，如中藥品中忌銅及鐵之藥品，及十八反，十九畏等歌列于後。

銅鐵皆忌者四種

地黃 玄參 益母草 肉豆蔻

備忌鐵類者 二十七種

人參 菖蒲 龍胆 茜根 五味子 稻摻根 麻黃 芍藥 知母 牡丹 藜蘆 香附子
 商陸 棉花 皂莢 雷丸 踏芥 蒺藜 桑白皮 藜蘆 棟子 石榴皮 桑寄生 桑耳

辰砂 雄黃 何首烏

十八反之歌

相反與只十八味 逐一從頭說與君 人參芍藥與沙參 細辛玄參及紫參 苦參丹麥並煎葯

一見藜蘆便殺人 白芨白飲並半夏 瓜蒌貝母五瓣真 莫見烏頭與烏啄 逢之一反疾如神

女較芫花並海藻 甘遂以上反甘草 苦瓠吐虫與鬪腸 尋常用之都不好 真蜜蠟與葱相視

石決明休見雲母 慈殿切葛使來侵 人若狂之必受苦

十九畏之歌

硫黃原是火之精 朴硝一見便相爭 水銀莫與砒相見 狼毒最怕蜜陀僧 巴豆性烈最為上

偏與牽牛不照情 丁香莫與鬱金見 牙硝難合京二棧 川烏忌烏不願群 人參又忌五靈脂

官桂善能調冷氣 若逢石脂便相欺 大凡修合看順逆 炮爐(火旁)炙博竊相同

中藥品之焙炒法

將細剉之中藥，製成煎藥或振出之，常行焙炒法，其法為散布酒，味淋，或稀薄之酒于藥品

內，俟其乾潔之後，用焙子或土器炒之，則製劑發佳藥之香味，且其殘微藥液變或藥色

僅俾發注及芳香性之藥品，不宜用此法，適當中藥品中忌焙炒者，有三十五種如

青黛 犀角 羚羊角 茜根 柴胡 木香 雲母 辰砂 芒硝 鱉乳 禹餘糧

滑石 雄黃 菊花 川芎 藍葉 乳香 甘松 桂心 丁子 白檀 藿香 白芷

牛黃 薄荷 紫草 沈香 黨陸香 胡椒 荊芥 紫蘇



比觀第一集卷一勘誤表補遺

頁數	行數	字數	誤	正	頁數	行數	字數	誤	正
二四	一四	一六	？量	數量	一〇七	九	二二	不得時	不得已時
四〇	二	十	大抵	大	一一六	八	八	十發日	十餘日
五一	一	一三	頓坐	頓挫	一一七	四	一三	善寄生	喜寄生
六〇	九	一	臂	臂	一一八	八	三〇	燥溫法	燥濕法
七七	八	一四	肩臂	肩背	一一八	十	三四	滲淡濕法	滲淡利濕法
七七	一一	二三	歇的里	歇斯的里	一一八	一	一七	要藥	西藥
七八	二	一一	神衰弱	神經衰弱	一二〇	四	三	淋巴淋	淋巴腺
八二	十	一三	瀆	瀆	一三八	二	六	Atrocin	Atropin
八四	一	二	渴氣	沼氣	一五一	一一	二九	狀態	狀態
八四	一二	二二	炎腺	腺炎	一五三	三	一三	內分必疾	內分必疾患
八五	五	一四	乃定	百乃定	一七五	四	五	余痛驗	余痛驗
八七	七	一四	Guaculia Guaculia	Guaculia Guaculia	一八三	四	二	半平	半平
九〇	二	二五	軟外音塗	軟音外塗					
一〇三	五	一	茅	弟					

卷二 勘誤表

頁數	行數	字數	誤	正	頁數	行數	字數	誤	正
一〇	一一	七	皆讀	昏讀	二〇	二〇	七	解讀也	解讀也
一一	一〇	〇	所有V字	應改爲R	二〇	一〇	二五	上汗也	止汗也
一二	一	二〇	瞻末	研末	二一	一三	一四	心腦性	心腦性
一三	六	三三	是	有	二二	一三	三二	發熱作用	解熱作用
一四	四〇	〇	用，於	以	二二	一三	三二	發熱作用	解熱作用
一五	十	二二	之可也	行之可也	二四	一一	七	田宗伯	淺田宗伯
一六	一	四	癩治	治法	二七	一〇	二〇	豆	豆
一七	四	一二	腫痛	腫痛	二七	一四	三八	使熱在	使用者
一八	三	五	小陰病	少陰病	二八	一四	一六	能刺激性	有刺激性
一九	二	三二	抑尙其他	抑尙有其	二九	二	二二	散大	散大
二〇	二	七	皆讀	昏讀	二九	一一	一〇	其理與	其理與用
二一	一〇	〇	所有V字	應改爲R	二九	一	一〇	夏月治用	夏月用
二二	一	二〇	瞻末	研末	三〇	一〇	二五	上汗也	止汗也
二三	六	三三	是	有	三一	一三	一四	心腦性	心腦性
二四	四〇	〇	用，於	以	三一	一三	三二	發熱作用	解熱作用
二五	十	二二	之可也	行之可也	三二	一一	七	田宗伯	淺田宗伯
二六	一	四	癩治	治法	三二	一〇	二〇	豆	豆
二七	四	一二	腫痛	腫痛	三二	一四	三八	使熱在	使用者
二八	三	五	小陰病	少陰病	三二	一四	一六	能刺激性	有刺激性
二九	二	三二	抑尙其他	抑尙有其	三二	二	二二	散大	散大
三〇	二	七	皆讀	昏讀	三二	一一	一〇	其理與	其理與用
三一	一〇	〇	所有V字	應改爲R	三二	一	一〇	夏月治用	夏月用
三二	一	二〇	瞻末	研末	三二	一〇	二五	上汗也	止汗也
三三	六	三三	是	有	三二	一三	一四	心腦性	心腦性
三四	四〇	〇	用，於	以	三二	一三	三二	發熱作用	解熱作用
三五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	八	二一	×濕	竹瀝
三六	五	三	用量一四	用量一四	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
三七	四	三	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
三八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
三九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
四九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
五九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
六九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
七九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
八九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九一	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九二	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九三	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九四	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九五	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九六	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九七	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九八	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
九九	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子
一〇〇	三	三〇	功勝至者	功勝前者	三二	一〇	一四	一童子	唯一童子

頁數	行數	字數	誤	正	頁數	行數	字數	誤	正
二三	一五	二八	殭，一殭	殭錢	三八	一六	三九	不自可信	白不可信
三四	一四	一八	健胃	健胃	三九	五	三六	稍有	稍有
二五	一四	二三	單效	卓效	三九	九	一九	淨舍	淨海
二六	一六	二六	冬五錢	各五錢	四一	四	八	卽竹葉心	(或加竹葉心)
貳六	一三	一	扁排腺	扁桃腺	四一	六	參六	參仁	參仁
二七	三	二一	尙無之	尙無	四一	六	二〇	參白朮	大於白朮
二八	七	二九	錢在	錢者	四二	六	二〇	參白朮	大於白朮
二九	六	二五	扁桃腺	扁腺桃	四二	一五	參五	成參	成參
三二	八	三三	不能容	不能容	四三	一一	二參	具其	且其
三三	一四	參〇	水分	水分	四四	二	四〇	亦如異	亦各異
三三	三	一五	奏水尿	奏利尿	四四	四	參〇	除清源	除清源
三三	三	三六	更腎炎	更增腎炎	四四	八	八	亦奏次服	亦奏次服
三四	一	七	Coffein	Coffein	四四	八	參八	此或油其	此或由其
三四	四	一四	木與畜	未與畜	四五	參	一九	刺激	刺激
三四	七	四	肋長	助長	四五	五	貳貳	或等	儉輕
三五	二	二四	符長用之	持長造之	四四	一四	二	外殼	外殼

中華民國三十二年十月初版

中西醫學比觀 第一集 (藥物篇)

定價國幣六拾元 (寄費另加)

(全集共四卷合購一百八拾元)

版權

著述者 張公讓

發行所 松口張公讓診所

印刷者 梅縣時代印務局

寄售處 外埠各大書局

所有

痢疾丸

專治細、紅、白、膿、血、痢、屬、巴、痢、及、大、腸、炎、凡、痢、紅、白、膿、急、後、重

肚腹絞痛一日下痢二三十回以至七八十回

或水瀉無度者久痢新痢俱可治之

每包拾元

疥瘡膏

專治疥瘡頑癬及疥搔癢功、勝「滅疥」


每瓶拾五元

百痧丸

專治疴嘔肚痛絞腸痧氣山、嵐瘴氣傷風感冒

每包五元

公讓研究中西藥物有年創製良藥不少上列三種為日常銷流最廣而極俱神效者特刊附於此廣告病家批發從廉



卅五年七月十一日

著者贈