



中外藥新纂

張若霞著



上海經緯書局發行

草藥新纂弁言

諺云。草藥一味。氣煞名醫。此謂草藥之效驗。有時爲名醫所不及者。蓋草藥乃先民對於疾病療治經驗之結晶。其一枝一葉。所貽於後人者。莫不有其特殊之效能。然草木繁夥。難以盡識。心傳口授。舛誤至多。不有人也。評究而明辨之。則草藥之效未盡彰。而數千年來先民所貽於吾人之經驗。亦將湮沒而無聞。豈不可慨也夫。予自清季以來。潛心於草藥之研究。凡草木之可以供藥用者。必詳稽植物之誌。以明其形性。博訪野老之言。以審其時效。更參考藥理之學。以究其應用。然後試之於疾病。以睹其經過。而一一筆之於書。若是者。凡十餘年。得確實有效之草藥數十種。因彙輯成帙。付之剞劂。題曰草藥新纂。藉供國內醫家之參攷。自民國六年十一月初版發行。未及年而書罄。流佈所至。遠及東瀛。乃重加修訂。於翌年十一月再版。次月復以訂購者衆。又印行三版。八年九月。更付四版。而國內學者。以草藥問草相諮詢磋商者。紛至沓來。復有所增訂。迨十五年間。予繼續研究。

所得之草藥。又有數十種。乃再輯集印行。而題曰草藥新纂續編。不久書罄。遂將正續二編。合刊行世。去年主編紹興民國日報醫藥常識。更將近年研究所得之草藥數十種。編入該刊。而名曰草藥新纂再續編。綜計予研究草藥。凡三十餘年。所得草藥。凡二百餘種。已悉供諸世。惟平日搜集之草藥驗方。尙未發表。以人事繁劇。無暇整理。今夏避暑山鄉。爰將前刊草藥新纂各編。及各種驗方。詳加別擇。輯爲上下兩編。仍題曰草藥新纂。上編詳載各草藥之形性效能。蓋集前刊之正續各編而成者也。下編爲草藥處方。卽以歷年搜集所得之草藥成方。及予實驗所得之草藥驗方。分類編輯而成。俾讀者覽上編而識草藥之形性。究下編而諳草藥之處方。因病而施。效各響應。非敢自詡爲有起沉疴而肉白骨之功。亦不過將我國數千年流傳之靈效藥方。保存之而不使有所湮沒。使後起者得進而爲更深切之研究耳。惟草藥至夥。遺漏仍多。倉卒付刊。更難免有亥豕魯魚之誤。深望國內賢達。不吝指示。俾再版時可據以更正。書成。手民索序急。乃將本書編輯之經過。弁於篇首。以代序焉。

草藥新纂目次

上篇 草藥形性

【強壯藥】

平地木 虎刺 郁李皮 野菊花 黃精 荷包草 魚鱉草 南五味子 竹節人參 土人參 野朮 牛筋草 仙掌子 虞美人 石南葉 兔絲 費菜 小草 金櫻 淫羊藿 南天竹 夜闌門

【行氣藥】

遍地香 五香草 土藿香 蘭孫 馬蹄香 水菖 石菖 香草 金鐘薄荷 雞鴨脚艾 爛耐草 苦橘皮 石見穿 香橐皮 薜蘿子 土青木香 金寄奴 樟根

【止痛甯睡藥】

土三七 山芋麻 倒掛金鐘 鬪羊花 田雞草 鵝郎草 茉莉根 僧鞋菊 接骨仙桃 活血草 鴛粟殼

【吐藥】

芥子末 綠荳 老鴉蒜

【瀉藥】

玉餛飩 烙鐵草 鼠李 槐葉 牽牛子

【利尿藥】

野芹 山芥菜 葶苈根 車前草 黃蜀葵 苦薺根 杜荊 摘梅條 金雀花根

藥草新纂目次

玉蜀黍根 篇蓄 石韋 萱草根 一枝黃花 地枯蕒 榆皮 松枝皮 杜松實 松節 水燈心 葫蘆殼

【發表藥】 接骨木 馬鞭草 常春藤 土荊芥 葱白 浮萍 桑 土薄荷

【退熱藥】 土地骨皮 茅根 柳枝皮 野薔薇 大青葉 繡球花 酸漿 野靛青 飛鸞草

元寶草 蕨 水蘆 檉柳 淡竹葉 柞枝 忍冬 黃荊條

【殺蟲藥】 棟根皮 石榴根皮 薺 羊蹄 侵木 羊齒 綠葉樹 蜀漆 夜嬌嬌 苦參

【祛痰鎮咳藥】 鳳尾草 野芋苳 金背茶匙 合歡皮 白頭翁 狼把草 望江青

【刺戟藥】 蒜 酸斑莖 韭根 瑞香皮 虎掌草 石龍芮 獨腳蓮 薤 白屈菜

【收斂藥】 芙蓉 地蜈蚣 摘摘莓 刀傷草 擗樹皮 石榴皮 木槿 龍芽草 薊 棕櫚

皮 水蘇 槌牛兒 無花果 冬青 雞冠 南連 白雲英 白躑躅 翻白草 臭椿皮 蓮蓬殼 白石榴花 白藕豆花 茄根 紅藤 夏枯草 土牛膝

【變質藥】 芭蕉根 松蘿 接莢 蒲包草 山海螺 鐵烏鈴 遺糧 龍鬚草

【防腐消毒藥】 三白草 半支蓮 蝴蝶花根 九頭青 萬年青 虎掌草 水仙 雪裏金丹

景天 鴨跖草 玉簪花 紫荊 蓼 金剪刀 蛇莓 五爪龍 天青地白草 狗尾草 金豆子 半嬌紅 野苧薺 白茄蒂 馬蘭根 金鎖銀開 蒼耳草 石巖蕪 烏扇

【雜藥】

棉花根 地蘇木 刀豆根 芝麻殼 千里光 荳草 馬齒莧 杉木節 青箱花
繁縷 續兒刺 牛蒡 野葡萄根 蒲公英 伸筋草

一之錄目書圖局書緯經

青年修養用書

古今中外格言集成	六〇〇〇
新青年手冊	一〇〇〇〇
社會交際學	四〇〇〇〇
立身與處世	二〇〇〇〇
名人名言名事	五〇〇〇〇
青年修養指導	八〇〇〇〇
中學生座右銘	八〇〇〇〇
給經濟壓迫青年的信	八〇〇〇〇
給失業青年的信	五〇〇〇〇
給煩悶青年的信	八〇〇〇〇
煩悶青年日記	七〇〇〇〇
人生觀集粹	二〇〇〇〇
岳飛全集	九〇〇〇〇
世界十二科學家傳	八〇〇〇〇
格言三千句	九〇〇〇〇
顏氏家訓	八〇〇〇〇
讀書自修用書	六〇〇〇〇
小學模範作文	六〇〇〇〇
小學模範日記	六〇〇〇〇

中小學升學書

中學模範作文	一六〇〇〇
中學模範日記	一六〇〇〇
模範日記作法	八〇〇〇〇
學生模範尺牘	一〇〇〇〇
蜘蛛的日記	五〇〇〇〇
老漁夫的船	五〇〇〇〇
模範鋼筆匯集	六〇〇〇〇
學畫自通門徑	六〇〇〇〇
精選六百諺語	九〇〇〇〇
小學升學指導	二八〇〇〇
中學升學指導	二八〇〇〇
算術自修升學指導	一六〇〇〇
基本英文法詳解	一〇〇〇〇
算術難題詳解	四〇〇〇〇
代數難題詳解	二〇〇〇〇
三角難題詳解	九〇〇〇〇
物理難題詳解	四〇〇〇〇
化學難題詳解	二〇〇〇〇
算術自修捷徑	六〇〇〇〇
英文法作文正誤通	五〇〇〇〇

上海經緯書局發行

號三〇六五四·諸電 號七十六(弄二四九)里壽高路郵海海上·址總
街城順江臨慶重·局分慶重 街堂祠部成·局分部成

草藥新纂

張若靄編

上編 草藥形性

強壯藥

平地木 (老勿大)

平地木。生於山地。常綠樹。高不盈尺。葉卵形而厚。夏日開淡紅色小花。結實如梧子大。至冬紅赤。下綴可觀。入藥莖葉根實並用。

【功用】爲強壯藥。治虛勞盜汗。咯血。

【用量及服法】鮮用一兩至一兩五錢。乾用三錢至五錢。加糖適宜。水煎服。

虎刺 (引線包)

虎刺。生於高原。常綠樹。長尺餘。葉端有刺。冬月結實。細小赤色。入藥莖葉並用。



(南)

【功用】爲強壯藥。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。乾用二錢至六錢。水煎服。

■ 郁李皮

郁李，觀賞植物。高四五尺。葉廣披針形。有鋸齒。花小五出。淡紅色。結實小而圓。熟則紫色。入藥用根皮。

【功用】作補藥。開胃。

【用量及服法】乾用二錢至五錢。水煎服。

■ 野菊花

野菊。生於山野。多年草。莖多分枝。高三四尺。葉如菊葉相似。但比菊較小。有深缺刻。及細鋸齒。秋晚開花黃色。亦比菊較小。單瓣。入藥用葉及花。

【功用】花能健胃。葉可治疔癤。

【用量及用法】花。每用一錢五分至二錢。水煎服。採葉數十片。搗敷疔癤。

■黃精 (山搗白)

黃精。生於山野間。莖高二尺餘。葉如竹葉而短。花如風鈴。淡綠色。根如萎蕤。有節。節狀如白。可蒸而乾藏之。

【功用】作強壯藥。

【用量及服法】不拘多少。蒸熟頻服。

■荷包草

荷包草。生於山野。宿根。二月抽苗。其葉形如荷包。秋時開黃色小花。結實灰褐色。入藥根葉並用。

【功用】治勞損。吐血下血。

【用量及服法】鮮用一二兩。水煎服。

■魚鱉草

魚鱉草。生於巖石陰間。不易採取。葉一長一圓。俗稱長則為魚。圓則為鱉。入藥莖

葉並用。

【功用】治虛勞咳嗽。

【用量及服法】乾用二三錢。水煎服。

■南五味子

南五味子。生於山野。常綠蔓生植物。能纏繞於他物上。木質含有許多粘液。葉革質。長卵形而厚。有光澤。夏月開花。花小白。或淡黃色。有細梗約寸餘。生於葉液。果實自赤色之小球集合而成。入藥用果實。

【功用】作強壯藥。治久欬。

【用量及服法】每用三五錢。水煎服。

■竹節人參

竹節人參。多年草。生於山地。春日抽芽。三年後。莖高二三尺。其根與竹根相似。故名。葉掌狀複葉。一柄有三五小葉。花細小。白色。實大如小豆。赤色。入藥用根。

【功用】作強壯劑。

【用量及服法】每用二錢至五錢。作煎劑。

■土人參

土人參。產於高原。多年草。春二三月發苗如蒿艾。而葉細小。本長二三寸。作石綠色。映日有光。夏月採根。蒸晒入藥。

【功用】補氣生津。治咳嗽喘逆。痰湧火升。久瘧淋瀝。難產。經閉。泄利。反胃。噎膈。

【用量及服法】每用一兩至二兩。作煎劑。

■野朮（天生朮）

野朮。多年生草。野生。莖高二三尺。葉橢圓形。有二裂。頗深。單葉。或爲複葉。自三枚。或五枚之小葉成。互生。秋月開花白色。或淡紅色。根細長。類指。大者如拳。皮細帶黃。肉白。而有朱點。

【功用】健胃。和中。補氣。生血。利溼。止泄。

【用量及服法】每用二三錢。作茶劑或煎劑。

■牛筋草 (行儀芝)

牛筋草。生於平原。宿根草。夏初發苗。葉似茅而柔。五六月間。莖長一二尺。開花三。又其莖弱。拔之不易斷。最難芟除。故有牛筋之名。入藥莖葉並用。

【功用】作強壯藥。治脫力黃勞。

【用量及服法】每用二三兩。入烏骨鷄腹中。蒸熟。去草食雞效。

■仙掌子

仙掌子。卽仙人掌之子也。此植物。爲常綠灌木。莖扁闊多液。外面有刺。長尺許。幅一二寸。互相層疊。夏月開黃赤色複瓣之花。實之形狀如蜜果。外面多毛刺。熟則可食。生產於氣候乾燥而雨量稀少之處。今多栽培庭園。以作觀賞。惟開花結實者甚少。入藥用子。

【功用】補諸虛。

【用量及服法】不拘多少。生食宜。

■虞美人 (麗春)

虞美人。葉莖花實皆似罌粟。而莖有毛。一本數十花。入藥用根。

【功用】治貧血。

【用量及服法】以根搗汁一盞。空心。頓溫服。須臾即行三兩次。其疾立已。不
瘥。隔七日再一劑。永瘥。

■石南葉

石南葉。爲常綠灌木。生於高山。春生新葉。葉大。其下面有毛。腰圓形而尖。夏日開
花。淡紅色。入藥用葉。

【功用】作強壯藥。補腎興陽。

【用量及服法】每用三錢。水煎服。

■兔絲

草藥新纂 上編 草藥形性 強壯藥

兔絲蔓草。生於山野。纏繞於他植物上寄生。莖細長。黃綠色。葉小鱗狀。花小形。赤色。入藥用莖葉及花。

【功用】作強壯藥。

【用量及服法】每用五錢至一兩。水煎服。

■ 費菜

費菜。人多栽培之。多年生草本。春月自根部抽苗。高七八寸。叢生。葉肉質甚厚。長橢圓。或長倒卵形。緣邊有鋸齒。互生。夏秋莖頂開花。小而黃。各部俱五數。入藥採摘其嫩腦用之。

【功用】作強壯藥。治虛弱。

【用量及服法】採嫩腦九個至十四個。以母雞一隻宰殺。去毛淨。剖腹去腸。納入。入蒸或煮。待熟食鷄。

■ 小草

小草。自生於山野。常綠草本。莖細。多倒於地上。葉小互生。夏月開花如蛾。紫色。實扁平。入藥根及莖葉並用。

【功用】作強壯藥。治咳嗽。消痰。補虛弱。安神。
【用量及服法】每用一錢至二錢。作煎劑。

■金櫻

金櫻。山野自生。其莖長。多刺。夏日開白花。單瓣。亦有淡紅色者。果作壺狀。亦有刺。根實俱可入藥。

【功用】實作強壯劑。治虛弱。療腎泄。根治風痛。

【用量及服法】實每用三四錢。水煎服。根水酒各半煎服。

■淫羊藿

淫羊藿。生於山野。多年生草本。莖高一二尺。葉二回掌狀複葉。自九小葉成。小葉心臟形。春日開花。紫或白色。花瓣長而如錨。入藥用葉。

【功用】作強壯藥。與陽治陰痿。

【用法及服法】每用三四錢。水煎服。

■南天竹

南天竹。生於山野。爲觀賞植物。多栽培庭園。常綠。幹高四五尺。葉互生。初夏開小花。白色。結果球形。經霜紅赤可愛。入藥用子。

【功用】作強壯藥。

【用量及服法】每用三錢。水煎服。

■夜關門

夜關門。一年生草本。莖長三四尺。葉如苜蓿。秋時開花黃色。結實成莢。入藥莖葉及子並用。

【功用】作強壯藥。治虛勞咳嗽。

【用量及服法】每用五錢至一兩。水煎服。

行氣藥

■ 遍地香 (連錢草)

遍地香。葉圓而邊有鈍鋸齒。莖方形而長。莖葉俱有香氣。花唇形。青紫色。入藥莖葉並用。

【功用】爲行氣藥。強壯藥。能退熱。止血。療久咳。又爲鎮痙藥。治小兒驚癇。

【用量及用法】採葉二三片。塞鼻孔。又以三錢至五錢。作煎劑。

■ 五香草

五香草。生於山野。葉小莖短。莖葉俱有香氣。五月五日。採莖及葉。晒乾用。

【功用】爲行氣藥。主痧氣霍亂等症。

【用量及服法】乾用。每以一錢至一錢五分。作茶劑。

■ 土藿香

土藿香。多栽培園圃。宿根草。莖高三四尺。葉心臟形。緣邊有鋸齒。對生。花小。青紫色。香氣頗盛。入藥莖葉並用。

【功用】行氣、健胃、治胃病、療霍亂、嘔泄、氣鬱等症。

【用量及服法】每用二三錢。泡飲、或煎服。

■蘭孫

蘭孫。即蘭花開後結成之子房。俗名蘭孫。

【功用】治呃逆。

【用量及服法】每用二枚、或三枚。與地枯婁同煎服之。

■馬蹄香 (杜荷) (南細辛)

馬蹄香。多年生草。葉心臟形。葉柄甚長。四五月開花。暗紫色。結子如鈴狀。入藥根莖葉並用。

【功用】行氣、健胃、止嗽。

【用量及用法】乾用。一錢至一錢五分。作茶劑。或煎劑。或研末嚙入鼻孔。有取嚏之效。

■水菖 (白菖)

水菖。生於池澤。根莖甚長。多年草。葉劍狀。爲平行脈。葉長二三尺。花小形。淡黃色。爲肉穗。花葉根俱有香氣。

【功用】根爲行氣藥能健胃。

【用量及服法】採根二三寸煎服。

■石菖

石菖。爲菖蒲之附石而生者。葉長一二寸至尺餘。根盤屈有節。乾則堅實。拆之心微赤。嚼之辛香。根花俱入藥。

【功用】根行氣健胃。花調經行血。

【用量及服法】每用一錢五分至一錢。水煎服。

■ 香草

香草。觀賞植物。多栽培庭園。春月下旬。莖長尺餘。葉小青色。夏間開紫色小花。莖

葉花俱有香氣。

【功用】爲行氣藥。治氣鬱、中暑、及霍亂。

【用量及服法】鮮用。採腦五至七個。泡飲。

■ 金鐘薄荷

金鐘薄荷。宿根草。產於山地。形狀與薄荷同。而葉較細。入藥莖葉根並用。

【功用】內用。治腹痛、齒痛、跌打損傷。外用。治諸蟲咬傷。

【用量及用法】內用。每服二、五錢。作煎劑。外用。以根加醋搗敷。

■ 雞鴨腳艾

雞鴨腳艾。葉細多歧。間有鬮者雜之。狀如雞鴨腳然。莖葉搓之有艾香。

【功用】治疝氣及脚氣。外用治風濕。

【用量及用法】每用三四錢。作煎劑。外用黃酒煎洗。

■ 孀甜草 (孀孩兒)

孀甜草。處處有之。葉尖大如指甲。有枝梗。夏月開紫花成簇。結子甚細。今人多栽

培庭園。作觀賞植物。婦人暑月採之插髮。可辟膩。入藥莖葉並用。

【功用】作行氣藥。治霍亂吐瀉。

【用量及服法】鮮用。四錢至六錢。水煎服。

■ 苦橘皮

苦橘皮。爲通常橘實之皮。嘗之味苦而香。

【功用】健胃行氣。

【用量及服法】每用一二錢。作煎劑。或研末爲散劑。

■ 石見穿

石見穿。一年草。生於平原。莖方形。高二三尺。生枝甚多。葉對生。如紫蘼而小。綠色。

莖葉皆有香氣。秋間開花。紫色。唇形。入藥莖葉並用。

【功用】行氣消食。治胃病胸痞。腹痛瀉利。

【用量及服法】每用三四錢。作煎劑。

■香櫚皮

香櫚皮。爲柑橘類之一種果實之皮。果較橘大而圓。皮甚香。肉酸。不可食。

【功用】破氣消食健胃。治臌脹。

【用量及服法】每用二三錢。作煎劑。

■蒔蘿子

蒔蘿。一年生草。高二三尺。葉細如絲。夏日開小黃花。瓣內缺。子大如黍米。橢圓微。

扁而香。黑褐色。入藥用子。

【功用】行氣開胃。治呃疝氣。

【用量及服法】每服八分至一錢。作煎劑。或散劑。

止痛寧睡藥

土三七

土三七。人家多植之。莖高二三尺。葉如蒿艾而較闊大。互生。六七月間。開黃色小花。入藥用根與葉之汁液。

【功用】治跌打風痛。葉之汁液。治毒蟲螫傷。頗效。

【用量及服法】鮮根二錢至三錢。用黃酒煎服。

山苧麻

山苧麻。生於山野。葉卵形而尖。有鋸齒。背面有白毛。花小。綠色。其莖與皮。可以製繩索。入藥用皮。

【功用】止痛。治跌打損傷。

【用量及服法】一錢至一錢五分。黃酒煎服。

■倒掛金鐘 (紫葳花)

倒掛金鐘。生於山野。藤本。莖高二三丈。葉五奇數。羽狀複葉。七八月間。開五出鐘

狀之花。紅黃色。下垂。入藥用根及花。

【功用】根、治風痛。花、活血調經。

【用量及服法】根、每二三錢。浸酒。或以酒煎服。花、作煎劑。

■闊羊花 (羊躑躅)

闊羊花。生於山野。葉披針形。三四月間。開黃色之花。花後結實。有六軸。名六軸子。

又名土連翹。入藥用根與花及子。

【功用】根與花、止痛。治風痛及跌打損傷。子、治風寒濕痺。癰腫腫脹。撲搗疼痛。

【用量及服法】花、以三朵或五朵。水煎。加黃酒沖入服。根、浸酒用。子、爲散。每服五分至七分。黃酒送下。

■田雞草

田雞草處處有之。葉圓有鈍鋸齒貼地而生。莖細匍行地上。入藥用葉。

【功用】治跌打。

【用法】採葉搗爛貼患處。

土青木香

土青木香。生於山野。多年生草本。葉鈍頭長心臟形。與薯蕷之葉相似。莖細纏繞於他物上。夏月開花如喇叭。上部黑紫色。下部綠色。結實如鈴狀。入藥用根。

【功用】爲行氣藥。能清血毒。調經。

【用量及服法】乾用一錢至二錢。水煎服。

金寄奴 (消飯花)

金寄奴。生於山野。多年草。每自宿根抽苗。莖長三四尺。葉羽狀深裂。裂片披針形。緣邊有銳鋸齒。秋間。梢上分小枝。開黃白色之小花。入藥莖葉及花並用。

【功用】行氣消食。治金瘡。

【用量及服法】乾用三錢至五錢水煎服外用。以鮮揉損貼之。

樟根

樟生於山野。落葉喬木。全部有香氣。高達數十尺。葉卵形而尖。有葉柄。初夏葉腋抽出長軸。開黃白色之小花。子黑色球形。如豌豆大。入藥用根。

【功用】爲行氣藥。強心藥。能治胃痛。霍亂。噎氣等症。

【用量及服法】每用一二錢。水煎。或研末服之。

鵝郎草 (羊奶)

鵝郎草。隨處皆有。爲二年草。或一年草。春夏二季。俱能萌生。葉如非字。葉脚抱於莖上。莖高二三尺。春夏二季開花。黃色。花後有白毛成簇。形如鎖刷子。見風便飛入藥根莖葉並用。

【功用】有麻醉性。能戒煙。治風痺。

【用量及服法】鮮用二三錢。水煎。沖入黃酒適宜。溫服。

■茉莉根

茉莉。爲觀賞植物。其性畏寒。葉弱枝繁。莖圓形而尖。夏季開小白花。重瓣無蕊。秋盡乃止。花皆夜開。清香襲人。入藥用根。

【功用】作迷蒙藥。用以接骨。則不知痛。

【用量及服法】取根。酒磨寸許服之。

■僧鞋菊 (草烏頭)

僧鞋菊。爲觀賞植物。有毒。生於山野。莖高三四尺。葉廣闊。掌狀分裂。綠色。花濃紫色。或紫碧色。入藥用根。

【功用】作麻醉藥。治打撲風痛。及瘡癰。

【用量及用法】乾根。用時須用薑汁炒。或製後用之。每以三五分。作散劑。或煎劑。或浸酒服。治疾。用醋或酒磨塗。

■接骨仙桃

草藥新纂 上編 草藥性形 止痛留腫藥

接骨仙桃。生於田野。穀雨後生苗。葉光。長類旱蓮。高尺許。莖空。摘斷不黑。立夏後開細白花。亦類旱蓮而成穗。結實如豆大。中空。內有小蟲。入藥連蟲焙乾用。

【功用】治跌撲損傷。

【用量及服法】每用五錢。水煎。沖入黃酒一盃。溫服。

■活血草 (荷包牡丹)

活血草。草本。莖高二尺許。葉如牡丹。花如荷包。一花軸上着數十花。下垂如俛。花色淡紅。鮮茂嬌豔。以供觀賞。入藥用根。

【功用】作麻醉藥。治金瘡。

【用量及服法】搗汁一小盃。酒沖服。

■鴛粟殼

鴛粟殼。爲鴛粟果。曾割取阿片而廢棄之果殼。球形。其色黃褐。

【功用】能止痛甯睡。止瀉利。

【用量及服法】每用二三錢。作煎劑。

吐藥

芥子末

芥子分黑白兩種。入藥俱佳。或以黑白各半。合研用。

【功用】作吐藥。治誤食毒物。外用。作引炎藥。俗名吊藥。

【用量及用法】五分至一錢。吞服。開水下。引炎。加麵粉調外貼。牙痛。貼敷頰部。胃痛。敷心口。小兒驚癇。敷足心。感冒頭痛。敷足底。其他各部痛。則按其部位而敷之。

綠荳

綠荳。旱地作物。形狀性質。近於荳類。高尺餘。葉複葉。以二小葉成。花黃色。蝶形。莢細長。荳綠色。入藥用荳及根。

【功用】作吐藥。治中食物毒。

【用量及服法】用荳生搗加水取汁飲。採根一二兩。生搗取汁服。如未吐。以雞毛探喉效。

老鴉蒜（石蒜）（金鎖匙）

老鴉蒜。生於山野。多年生草本。高至一尺餘。地下莖及其他之形狀。與鐵色箭相似。葉叢生。細長。闊二三分。長一尺許。如線狀。有平行脈。冬季生葉。至夏則枯。秋間發花莖。頂上着花數枝。如繖形。花紅色。花蓋六片。深裂。各裂片。開出而反卷。有長雄蕊六枚。突出於花外。雌蕊一枚。比雄蕊更長。葉與花時期互異。亦同鐵色箭。惟鐵色箭花呈黃赤色。分裂較淺。各裂片不反卷。雄蕊比花蓋不長。故有差別。此爲有毒植物。若誤食其花。則有言語澀滯之虞。

【功用】作吐劑。又能治外症。（一）治雙單喉蛾。（二）治對口初起。（三）洗痔漏。

【用量及用法】（一）取根搗汁一小杯漱口。（二）搗爛隔紙貼之。（三）與

鬼蓮蓬同搗好酒煎置瓶內先薰後洗一日三次。

瀉藥

■玉餛飩

玉餛飩生於陰地。葉圓。葉柄處有缺陷。根莖細。入藥莖葉並用。

【功用】治水脹。

【用量及服法】五錢至一兩。水煎服。

■烙鐵草（紫花地丁）

烙鐵草生於山野。葉形如烙鐵。葉柄長。三四月間開紫色花。入藥用根及葉。

【功用】作瀉藥。及催吐藥。外用治疥瘡。

【用量及用法】採根乾用。以三錢至五錢作煎劑。瀉劑加蜂蜜一兩沖入。尤效。外用與大楓子油、水銀、硫黃合搗為疥瘡藥。

■鼠李

鼠李生於山野。中爲落葉灌木。高至丈餘。枝梢有針。葉橢圓形。或倒卵形。有鋸齒互生。五月間開淡黃綠色之小花。叢生於葉液花瓣及雄蕊各四枚。雌蕊一枚。果實黑色圓形。大如小豆。採而乾貯之。入藥根及果實並用。

【功用】能平肝助膽。潤腸。便大便。

【用量及服法】根。鮮用。三錢至四錢。果實。乾用。一錢五分至二錢。水煎服。

■槐葉

槐。落葉喬木。高二三丈。葉爲一回羽狀複葉。互生。小葉數奇而形小。下面帶白色。初夏。各花排列。爲大圓錐花序。開蝶形黃白色之花。果爲蒴果。入藥用葉。

【功用】利大小便。治水臌。

【用量及服法】每用五錢至一兩。水煎服。

■牽牛子

牽牛子。生於平原。一年生之纏繞草木。葉心臟形。有三裂。互生。夏間葉液開花。如漏頭狀。顏色不一。朝開。日出即萎。子球形。三室。各室含有二子。入藥用子。

【功用】作瀉藥。

【用量及服法】每以八分至一錢五分。水煎服。

利尿藥

■野芹（水芹）

野芹。生於卑溼之處。多年生草本。根甚長。藉以繁生。春月生苗。葉二回羽狀複葉。自多數葉成。互生。莖長一二尺。夏日莖頂開白色小花。此植物有特殊之香氣。嫩葉可供食用。根莖葉俱可入藥。

【功用】爲利尿藥。能治小便不通。又能開胃。調經。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。水煎服。

■ 山芥菜

山芥生於山野。草本。莖高一二尺。下有葉柄。葉如萊菔狀。其端裂片大。稍爲圓形。上葉無柄。葉基脚抱莖如耳。四五月間。頂端開花。總狀黃色。入藥用根。

【功用】能利小便。治白臙疽（皮膚蒼白而腹部脹大如臙）。

【用量及服法】取根一二兩。搗爛。臙上罨之。

■ 薏苡根

薏苡人多栽植之。春間實生。或自宿根生苗。葉如初生苞芽。高四五尺。五六月抽莖開花。結實尖圓而有殼。種子卽薏苡仁。供食用或藥用。以根入藥。功效尤勝。

【功用】利小便。主濕熱及水腫。

【用量及服法】採根一二兩。水煎服。

■ 車前草

車前。俗名野甜菜。生於山野。多年草。葉廣卵形。有葉柄。花淡紫色。四片如筒。子卽

車前子。入藥根葉子俱可用。

【功用】爲刺戟緩和性利尿藥。

【用量及服法】根苗鮮用一兩至二兩。水煎服。

■黃蜀葵

黃蜀葵。人家多植之。高約三四尺。地下有肥大之根。葉掌狀。有深裂。互生。秋季開黃色五瓣之花。入藥用根。

【功用】治淋疾。

【用量及服法】每用五錢至一兩五錢。水煎服。

■葶薺根

葶薺。多栽培於水田。亦有野生者。宿根。地下生塊根。扁圓色黑。莖高三四尺。圓形如管。花如筆頭狀。生於莖頂。塊根供食用。入藥用細根。

【功用】利小便。治黃疸。

【用量及服法】鮮根二兩至四兩。水煎服。

■ 牡荊

牡荊爲灌木。高四五尺。葉掌狀複葉。葉小有鋸齒。七八月開青色或紫色小花。入藥用葉。

【功用】能利尿通經。

【用量及服法】每用八錢至一兩。作煎劑。

■ 摘梅條

摘梅條。生於山野。或籬邊。高至三四尺。葉小而厚。橢圓形。入藥用條。

【功用】利小便。治腫脹。及小兒白臍疽。

【用量及服法】鮮用二兩至三兩。水煎服。

■ 金雀花根

金雀花。山野自生。爲常綠灌木。高至四五尺。自三小葉成。花生於葉液。花形如雀。

呈赤黃色。亦有白色者。名銀雀花。頗美麗。供觀賞之用。入藥用根。

【功用】利小便。治痛風。

【用量及服法】乾用。三錢至五錢。水煎服。治痛風。亦可以根用酒浸出類飲。

■玉蜀黍根

玉蜀黍。爲禾本科植物之種子。供食用。入藥用根。

【功用】利小便。

【用量及服法】乾用。八錢至一兩五錢。水煎服。

■篇蓄

篇蓄。一年生草。多生於路傍。高尺餘。弱莖。引蔓節。促有粉葉。狹長而厚。略似竹葉。夏月葉腋開淡紅花。甚細。入藥莖葉並用。

【功用】利小便。通淋。治黃疸。

【用量及服法】乾用。以三錢至五錢。水煎服。

■石韋

石韋。隱花植物。多生崖罅處。其地下莖有茶褐色之鱗片。葉深綠。長者近尺。闊寸餘。柔韌如皮。背面密佈濃褐色粉末。並生子囊。羣莖柄甚長。入藥用莖及葉。

【功用】利水。治淋濁。

【用量及服法】乾用。四錢至八錢。水煎服。

■萱草根

萱草。生於山野。多年生草本。莖高二尺餘。葉如蒲蒜輩而柔弱。夏月莖梢着以數花。花蓋六片。呈紅黃色。朝開而暮萎。此花及嫩芽可食。根如麥門冬。入藥用根。

【功用】利膀胱。治淋濁。

【用量及服法】鮮根。一兩五錢至三兩。水煎服。

■一枝黃花

一枝黃花。生於山野。多年生草木。春間自舊根作芽。高至二三尺。莖細而強。其色

紫黑。葉卵形或橢圓形。或披針形而尖。有明顯之細脈。秋末莖梢開花。黃色。攢簇而生。入藥。採其莖葉之帶花者。

【功用】治腎病。及膀胱病。並可洗腫毒。

【用量及用法】內服。三錢至五錢。水煎服。作用。以水煎洗。

■地枯蕒

地枯蕒。卽枯萊菔。爲採種時所拔取者。

【功用】利水。治腫脹。止呃。

【用量及服法】乾用。三錢至一兩。水煎服。

■榆皮

榆。生於寒地。爲落葉喬木。生長易。大者高達十丈。幹皮深褐色。有扁平之裂口。剝脫如鱗狀。葉爲橢圓形。或倒圓形。頗大。緣邊有鋸齒。厚而剛甚粗糙。三四月間。先開花而後生葉。花細小。淡綠色。果實扁圓。有膜質之翅。入藥用皮。

【功用】利小便。

【用量及服法】乾用，五錢至八錢，水煎服。

■松枝皮

松枝皮爲松樹枝條之皮。

【功用】通小便治淋濁。

【用量及服法】鮮用，三錢至六錢，水煎服。

■杜松實

杜松生於山野，常綠樹，高至數丈，葉針形，果實爲球果，入藥用實。

【功用】利尿治淋濁。

【用量及服法】每用三錢至五錢，水煎服。

■松節

松節，卽松木枝幹上膨大而形如節者。

【功用】利濕。治風痛腫脹。

【用量及服法】每用四錢至八錢。水煎服。

■ 水燈心 (燈心草)

燈心草。生於溼地。長二四尺。莖圓綠色。如繩線狀。有圓橫斷面。其外觀却如葉。內有白心。葉則在莖之基部及花部。鱗狀。夏間莖之上部。側生花梗。分歧甚多。各綴以小而黃綠色之花。入藥用莖葉及花。

【功用】利水。鎮痙。

【用量及服法】每以二三錢。水煎服。

■ 葫蘆殼

葫蘆。蔬果類。一年生蔓草。莖細長。由卷鬚而纏繞於他物上。葉圓心臟形而尖。掌狀淺裂。花白色。果長形。兩端膨大。中部有細腰。入藥用其果實之乾殼。

【功用】利尿。治腫脹。

【用量及服法】每用五錢至一兩。水煎服。

發表藥

■接骨木

接骨木。生於山野中。爲落葉灌木。莖高丈餘。葉對生。奇數。羽狀複葉。小葉長卵圓形。有鋸齒。花小形。綠白色。果實如球。紅白色。入藥用花。

【功用】爲發汗藥。治寒冒。又爲鎮痛鎮痙藥。

【用量及服法】每用一錢至三錢。作茶劑。

■馬鞭草

馬鞭草。生於原野路傍。高三三尺。草本。葉對生。有三裂。更有羽狀之齒裂。花細小。紫色。爲穗狀花。

【功用】作發汗藥。又可爲婦血調經藥。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩水煎服

■常春藤

常春藤。生於山野。蔓生。葉柄甚長。互生。卵圓形。全邊有鋸齒。花開於頂端。小形黃色。入藥用莖葉。

【功用】作發汗藥。

【用量及服法】鮮用四錢至五錢水煎服。

■土荆芥

土荆芥。野生。二月生苗。莖高至二尺餘。葉如線形。至夏梢頭成穗。開細小唇形花。色帶淡紅。種子細小。黃赤色。入藥宜於開花時採集陰乾。

【功用】作發表藥。退熱藥。治頭痛。骨節炎。與寒冒發熱等症。

【用量及服法】每用三錢至四錢作煎劑。

■葱白

葱白。卽吾人食用之葱。而採用其近根呈白色之一部。每莖可入藥者寸許。

【功用】作發表藥。能發汗。助消化。

【用量及服法】每用三寸至五寸。泡飲。

■浮萍 (水萍)

浮萍。一年生小草。其體扁平。倒卵形。上面綠色。下面帶紫赤色。其根纖細無枝。於體之下面叢生。浮生於水。田池沼等滯水之上。

【功用】作發表藥。能發汗。治風痛。

【用量及服法】乾用二錢至四錢水煎服。

■桑

桑。落葉喬木。多栽培於園圃。葉卵圓形。具鋸齒。有分裂。有不分裂者。春末開花。淡黃色。果實長橢圓形。略與懸鉤子相似。入藥。用葉及初茁之芽與果實。

【功用】葉與芽。作發表藥。治感症。及頭痛。風痛。果實。作收斂藥。與強壯藥。

【用量及服法】桑葉。每用三錢至四錢。作煎劑。桑芽。每用一錢五分。作茶劑。果實。乾用三錢至四錢。作煎劑。或煎製成膏。每以三錢。用沸水沖服。

■土薄荷

土薄荷。生於溼地。爲多年草。有地下莖。繁殖甚盛。莖高一尺餘。方形。葉卵形而尖。緣邊有鋸齒。對生。秋日開花。花小。唇形花冠。紫色。此植物之莖葉。有香氣。入口有涼快之感。可以入藥。

【功用】爲解表藥。能驅風。興奮。殺菌。可治齒痛。

【用量及服法】每以三四錢。水煎服之。

退熱藥

■土地骨皮

土地骨皮。生於平原。莖長四五尺。莖上有刺。葉長橢圓形。挾長柔軟。互生。春月開

花紫色。花瓣五數。秋間結小漿果。紅色。卵形而尖。稱土枸杞子。其葉供食用。入藥用皮根。

【功用】退熱發表。治瘧疾。潮熱。及骨蒸勞。

【用量及服法】鮮用八錢至一兩二錢。乾用三錢至五錢。水煎服。

■茅根

茅。又名白生茅。於山野。多年生草本。葉細長而尖。種子有長毛。其根甚長。白軟如筋而有節。其味甘。山家小兒多採食之。入藥用根。

【功用】退熱。治咯血。利小便。

【用量及服法】鮮用二兩至三兩。水煎服。

■柳枝皮

柳枝皮。卽楊柳枝條。去其木心。而用其青色之皮。外面外黃黑之粗皮。悉剝除而後入藥用。

【功用】作退熱藥。治瘧疾。及風濕骨痛。

【用量及服法】鮮用一兩至一兩五錢。水煎服。

野薔薇

野薔薇。生於田野籬邊。葉如薔薇而本多刺。花有純白粉紅。皆單瓣。香味極似玫瑰。可蒸餾取油。入藥用根及花與其果實。

【功用】能退熱。根治泄痢。消渴。小便失禁。煎汁含漱。治口舌糜爛。花可治瘧疾。果實治腳氣。咳嗽。風痛。與婦女月經不調。與帶下諸症。

【用量及服法】根每用五錢至八錢。花十朵。果實三錢至五錢。俱水煎服。

大青葉

大青。多年生草。葉爲掌狀複葉。形如羊蹄而少短。夏月開黃綠色之小花。入藥用葉。

【功用】能涼解。治傷寒熱病。喉痛。入微毒等症。

【用量及服法】鮮用四錢至六錢。水煎服。

■繡球花

繡球花。多栽培庭園。爲觀賞植物。落葉灌木。葉橢圓形。有鋸齒。夏初開花。有多數花集生成球。先白後微紅。頗爲美觀。入藥用花及葉。

【功用】花能退熱。葉治疥癬。

【用量及用法】花乾用一錢至二錢。水煎服。葉搗敷。

■酸漿

酸漿。生於山野。多年生草本。春間自宿草抽苗。高二三尺。葉卵形而尖。夏月開花。五出。白色。帶微綠。實爲漿果。赤色。下垂。頗爲美觀。入藥莖葉根果實並用。

【功用】莖葉根能退熱果實。治小兒疳疾。

【用量及服法】莖葉根鮮用。五錢至一兩。果實五枚至十枚。水煎服。

■野靛青

野靛青。一名鴨青。處處有之。葉狀如莧。中有青暈。入藥莖葉並用。

【功用】治結熱黃疸。

【用量及服法】每用五錢至一兩。水煎服。

■飛鸞草

飛鸞草。生於背陰之處。形如飛鸞。有頭。有翅。有三尾。雪中開五色花。中抽一莖。直

上著花。葉狀如金絲荷葉。而光面青。而背銀紅色。葉有黑毛。而不開花者。卽斷腸草。能殺人。不可誤採。故須雪中見花者爲真。根如生薑。入藥用葉。

【功用】解熱毒。治咽喉及口內諸病。

【用量及服法】取葉七片。泡飲。

■元寶草

元寶草。生於田野。草本。莖高尺餘。葉無柄對生。其基脚連合爲一體。極似莖自葉心抽出者。兩葉供計。長三四寸。闊約一寸。花小形黃色。頂生聚繖花叢。萼五

片長橢圓形。花瓣五片。橢圓形。雄蕊三體。花柱三個。蒴果。

【功用】退熱。治吐血。衄血。跌撲。閃腰。挫痛。癰毒。

【功用及服法】每用一二兩。水煎服。

■ 蕨

蕨。俗稱蕨萁。生於山野。為多年生草本。根長。匍匐於地中。隨處生葉。葉為數為複葉。長二三尺。葉嫩時。可供食用。根採製澱粉曰蕨萁粉。入藥用根。

【功用】為退熱藥。治黃疸。癩癰。腫風痛。目痛。主咽喉熱症。傷寒溫病。

【用量及服法】乾用三錢至五錢。水煎服。

■ 水蘆

水蘆。生於河傍池沼。潛水之處。莖高丈餘。葉有平行脈。秋間莖頂抽花。種實有白毛。入藥用嫩根及新芽。

【功用】為退熱藥。主傷寒熱病。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩作煎劑。

■ 檉柳

檉柳。俗名西河柳。葉細如絲。婀娜可愛。爲觀賞植物。一年三次作花。故又名三春。

柳花水紅色。入藥用嫩莖葉及花。

【功用】葉爲退熱藥。治麻疹。花治中風。

【用量及服法】乾用以三錢至四錢作煎劑。

■ 淡竹葉

淡竹葉。一名碎骨子。生於山地之草本。葉如竹葉而軟。長三四尺。梢上抽花。分岐。

綠色。其根如鬚。鬚上結球如麥門冬而細小。入藥根莖葉並用。

【功用】性涼潤。治熱病瘡瘍。

【用量及服法】每用三錢至四錢。作煎劑。

■ 柞枝

草藥新纂 上編 草藥形性 退熱藥

柞木。本生於山野。高至丈餘。莖有刺。葉常綠卵形。緣邊有鋸齒。秋間開黃色小花。結球狀漿果。入藥用枝。

【功用】性涼。治熱病。療小兒口炎。流涎瘡毒。

【用量及服法】鮮枝一兩至二兩。水煎服。

忍冬

忍冬。生於山野。多年生纏繞植物。葉卵形。或橢圓形。對生。經冬不枯。初夏開花。集生於葉腋。花唇形。分裂白或黃色。入藥用莖葉及花。

【功用】退熱。治溫病。療瘡腫。

【用量及服法】每以三錢至五錢。水煎服。

黃荊條 (山楊柳)

黃荊。山野自生。莖高丈餘。枝條細軟。葉披針形。如柳葉。多栽植以作生籬。入藥用枝條及根。

【功用】退熱。敗毒。治耳下腺炎（俗稱疔腮）及瘡腫、齒痛。
【用量及服法】每用八錢至二兩。水煎服。

殺蟲藥

■棟根皮

棟根皮。即採取棟樹根上之皮。

【功用】殺蟲。治小兒腹內生蟲。

【用量及服法】鮮用三錢至六錢。水煎加糖服。

■石榴根皮

石榴根皮。即石榴果樹。採取其根部之皮。鮮乾俱可入藥。

【功用】殺蟲。有收斂性。治小兒蟲病。

【用量及服法】乾用一錢五分至三錢。水煎服。

■薺

薺。產於平原。初生時。可作蔬菜。秋間或春初生葉。二三月間抽莖。上開四瓣白色小花。結實如莢。入藥在開花期內採集之。

【功用】避蚤。治赤痢。

【用量及用法】採花陰乾。散布於臥床上。避蚤效。乾用三四錢。（治赤痢）水煎服。

■羊蹄

羊蹄。生於稍濕之處。高二三尺。葉大形。廣披針形。互生。花小形。淡綠色。叢生於花軸。根粗大黃色。入藥用根。

【功用】治疥癬腫毒。

【用法】以根搗汁塗布。

■櫻木

椴木。生於山谷。高五六尺。葉細長。有鋸齒。互生。冬季枯落。至春自枝梢抽穗。長二三寸。開小白花。花後結實。入藥用葉。

【功用】爲殺蟲藥。能驅除毛虱。治疥癬。及蛇毒咬傷。

【用法】驅虱。治疥瘡。用水煎洗。治蛇毒。用葉搗塗。或研末敷。

■羊齒

羊齒。生於山地。多年生隱花植物。葉羽狀複葉。花如鱗狀。長至三四尺。往往有許多葉片叢生。子囊生於葉之下面。有圓腎形狀之被包。入藥用地下莖。

【功用】治繸蟲（小兒蟲病之一種）

【用量及服法】每用三四錢。水煎。加糖服之。

■綠葉樹（鹿藿）

綠葉樹。生於山野。爲常綠樹。葉卵形而尖。煎汁可作染料。夏間開黃白色小花。氣甚芳香。入藥用該樹之根皮。

【功用】治疥瘡

【用法】與硫黃、花椒、豬油等同搗敷之。

■蜀漆

蜀漆。生於山野。葉橢圓形。落葉灌木。發惡臭。春暮開小花。淡黃色。入藥莖葉並用。

【功用】治瘧疾。殺蟲。

【用量及用法】莖葉焙乾。治瘧疾。以三錢至四錢。水煎服。又以莖葉煎汁。用以殺牛馬之虱。甚效。

■夜嬌嬌（紫茉莉）

夜嬌嬌。爲觀賞植物。栽培於庭園。莖高二三尺。葉卵形而尖。對生。有葉柄。夏月每至夜間開花。花紅或白色。如漏斗狀而小。子黑色。內含如乳狀之胚乳。可爲婦人面粉。紅色之花。可以點唇。入藥用葉。

【功用】治疥癬

【用法】葉揉潰塗布。

■苦參

苦參。生於山野。多年生草本。自一根抽數莖。高至二三尺。葉羽狀。自許多小葉成。互生。花蝶形。黃綠色。果實爲莢。有毒。入藥用根。

【功用】殺蟲。治疥癬。

【用法】鮮根搗汁塗敷。乾根煎汁洗之。

祛痰鎮咳藥

■鳳尾草

鳳尾草。蕨類。多生於石砌。或井口邊。常綠草本。根莖生密毛。葉長尺許。叢生。羽狀分裂。裂片線形。上部漸細。排列如雞足狀。入藥莖葉並用。

【功用】治咳嗽。

【用量及服法】鮮用五錢至八錢。水煎服。

■野芋苳

野芋苳。生於溝澮間。葉與芋苳相似。而狀較小。根部不如芋苳之發育。而無球根。入藥用根上之葉柄。

【功用】治肺炎。

【用量及服法】鮮根六錢至一兩二錢。水煎服。

■金背茶匙

金背茶匙。水龍骨科。生於巖石及陰濕處。葉如石韋而狀較短小。背面生黃紅色

細毛。或纍纍如金星。經冬不凋。入藥根莖葉俱用。

【功用】鎮咳。補虛。治咯血。

【用量及服法】鮮用八錢至一兩五錢。水煎服。

■合歡皮 (夜合皮)

合歡。生於山野。落葉喬木。高丈餘。葉爲二回羽狀複葉。自許多小葉成。早開暮合。五月開花。散如垂絲。淡紅色。實爲長莢。入藥用皮。

【功用】治肺癰。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。水煎服。

■白頭翁

白頭翁。生於山野。多年生草本。全部密生白毛。高尺許。葉羽狀複葉。簇生於地下。春月開花紫色。甚美麗。結實甚多。有鬚。至成熟呈白色。恰似老翁之頭。其植物之全部供藥用。有刺戟性之毒質。若用之過量。往往中毒。甚至於死。

【功用】治氣管之病及痢疾。

【用量及服法】乾用一錢五分至三錢。水煎服。

■狼把草

狼把草。生於濕地。一年草。莖高二尺。葉下部有三裂或五裂。有粗齒。上部之葉廣

披針形。亦有粗鋸齒。至秋枝稍開筒狀黃色小花。頭狀花序。果實有細刺。易於附着他物。入藥莖葉並用。

【功用】治肺結核及氣管諸病。

【用量及服法】乾用五錢至八錢。水煎服。

望江青

望江青。生於澤旁湖岸。穀雨後生苗。莖中空。葉狹長而尖。有鋸齒。對生。小滿後抽莖。開花成穗。色細紫。層層而上。寒露時枯。根多鬚。節間方而白。中空而長。入藥用根。

【功用】治肺虛失音。咯血旁損。

【用量及服法】每用一兩。水煎服。

刺戟藥

■ 蒜

蒜。爲香辛類園蔬。臭氣甚強。多年生草本。高至二三尺。地下有鱗莖。葉細長。夏日

抽花軸。花白色帶紫。雜有珠芽。人家多植之。入藥用鱗莖。

【功用】蒜頭。內服爲健胃藥。治霍亂痢疾。及一切腸胃病。外用爲吊藥。治水腫。蒜梗。治痔漏凍瘡。

【用量及用法】內服。每以鱗莖一二枚。煑食。外用以鱗莖搗爛。置於臍上。俟起水泡。搗去（水腫）蒜梗。以水煎溫洗。

■ 酸斑莧

酸漿草。生於平原。葉柄甚長。葉由三片之倒心臟形小葉合成。春末開黃色五瓣小花。入藥用葉。

【功用】治痲疾。及打撲疼痛。蛇毒疥瘡。

【用量及用法】痲疾。每用二錢至三錢。水煎服。打撲疼痛。用葉加鹽搗爛。擦俟

皮膚現青色效。蛇毒疥瘡。絞汁塗布。

■ 韭根

韭。蔥屬。多年生草本。春月生苗。高至尺餘。葉細長而扁。花有花被六片。白色。雄蕊六枚。集生於花莖之頂。繖形花序供食用。入藥用根。

【功用】利尿。治目內障星。

【用量及用法】利尿。鮮用八錢至一兩。水煎服。治目。以根搗爛。貼脈上。男左女右。俟起水泡。搗去。水泡。用銀針挑破。流出黏液。頗效。

■ 瑞香皮

瑞香。觀賞植物。栽培於庭園。爲常綠小灌木。高四五尺。葉長橢圓形。質厚。有光澤。冬月葉間抽出花蕾。至春分前開放。團繖花序。花爲合萼四裂。有紅白兩色。芳香甚盛。入藥用該植物之皮及葉。

【功用】皮作引炎藥。葉治瘡瘍。

【用法】搗爛敷之。

■虎掌草（毛茛）

虎掌草。生於山野中。多年草。高至一二尺。有毛。葉爲單葉。掌狀分裂。夏間從其根出葉之處。抽出花莖。分枝開花。於莖頂。花五瓣。黃或白色。實細小。此植物全部有毒。具苛烈刺戟性。而色黃如乳之汁液。入藥莖葉並用。

【功用】爲發泡藥。能引炎。治水腫及螺疔。

【用法】與鹽數粒同搗。罨患處。最效。水腫。如上法罨臍上。俟起水泡。以銀針挑破之。

■石龍芮

石龍芮。生於水邊濕地。高一二尺。莖中空。葉單葉。互生。掌狀分裂。花小。五瓣。黃色。果爲乾果。橢圓形。攢簇於花托之上。入藥用莖葉。

【功用】爲引炎藥。作發泡劑。

【用法】搗爛敷之。

■獨腳蓮 (鬼燈檠)(天車草)

獨腳蓮。生於深山之宿根草。莖高二尺許。葉爲一回掌狀複葉。以五小葉排列如風車狀。夏月頂端簇生小花。白花微青。入藥根葉並用。

【功用】治疔腫癰疽。

【用法】以根醋酒磨塗。或以葉揉損貼之。

■薤

薤。卽胡蔥。生於山野。葉長尺餘。與韭相似而圓。開白帶紫色小花。入藥用根。

【功用】能發散。解表。健胃。開膈。

【用量及用法】每以七個至十四個。搗碎。泡飲。

■白屈菜

白屈菜。生於山野中。多年生草。莖脆弱。高至二三尺。斷之則有黃色之汁液。葉羽

狀複葉。小葉有缺刻。互生。上面黃綠色。下面白色。有毛。花有長柄。四瓣黃色。果實如角。入藥根莖葉俱可用。

【功用】治胃癆。

【用量及服法】乾葉五分至八分。水煎服。

收斂藥

芙蓉

芙蓉。觀賞植物。多栽於庭園。春間生葉如楮。莖高六七尺。花有純紅、純白、淡紅、各種。入藥用木皮及根。

【功用】根治癰疽、發背、乳癰、惡瘡。皮治帶下。

【用量及用法】治瘡。無論已成未成。用根皮生研。入蜂蜜。調塗於腫之四圍。中間留孔。乾則頻換。帶下。以皮三錢至五錢。水煎服。

■地蜈蚣

地蜈蚣。生於山野。葉狀如瓜子。面有白毛。對生。根莖貼生地面。入藥用葉。

【功用】治金瘡出血。

【用法】以齒咬損。貼患處。

■摘摘莓 (木莓) (懸鉤子)

摘摘莓。生於山野。莖高四五尺。葉圓。或有分裂。有鋸齒。花白色。結果呈紅花。如有

多數之小肉果合成。山村小兒多採食之。入藥用根。味苦而澀。

【功用】性收斂。治久痢。流疽。

【用量及服法】鮮用五錢至一兩。水煎服。

■刀傷草

刀傷草。生於高原。莖長一二尺。葉如梅葉。經冬不凋。入藥用葉。

【功用】治刀傷。

【用量及用法】採葉二三片，揉熟貼之。

■ 槲樹皮

槲樹俗名柴樹。其子名柴子。生於山野。落葉樹。葉長橢圓形。子有碗狀之殼斗入。

藥用該樹之皮。

【功用】收斂。止血。治久痢。白帶。牙齦潰爛。

【用量及用法】內服四錢至八錢。水煎服。外用黃汁洗滌。或含漱。

■ 石榴皮

石榴皮。即石榴果上之皮。鮮乾俱可用。

【功用】治久泄。盜汗。喉症。

【用量及用法】乾皮一二錢。水煎服。外用薑汁漱口。

■ 木槿

木槿。人家多栽培以作籬籬。落葉灌木。高至七八尺。葉卵形。有缺刻。各楔狀。七八

月間開花。紫紅或白。有單瓣複瓣。結蒴果。其木扦插即活。不開花結實者。曰雄木。槿。入藥用該樹之根皮。或根之全部。

【功用】性收斂。止血。治久痢。白帶。腸風下血。雄本槿根。治肺癰。

【用量及服法】根皮五錢至一兩。根一兩至二兩。水煎服。

龍芽草

龍芽草。生於山地。葉有缺刻。莖長二三尺。秋初開黃色小花。入藥用該草之全部。

【功用】治赤白痢。及咯血吐血等症。

【用量及服法】每用三錢至六錢。水煎服。

薊

薊有大薊小薊二種。生於山野。莖淡綠。高二三尺。葉深綠色。大而有鋸齒。其鋸齒之端有刺。花如紅花。有紫白二色。入藥大薊小薊並用。

【功用】治吐血。衄血。下血。並治腫毒。

【用量及用法】乾用。四錢至六錢。水煎服。外用棕根葉搗塗。

■椶櫚皮

椶櫚栽培甚多。葉如車輪。葉柄下部有絲狀物結合成張。包於木上。八月開花黃

色。十月結實。入藥用皮。

【功用】止血。治婦人血崩。

【用量及用法】炒成炭。研末。淡酒沖服三錢。如鼻血。可以此末噴之。

■水蘇

水蘇。生於濕地。全體頗似紫蘇。莖方中空。葉似紫蘇而稍長。有細鋸齒。葉皺色青。

對生氣甚辛烈。七八月頃開成穗之花。淡紅色。穗中有細子。入藥莖葉並用。

【功用】治吐血。衄血。下血。血淋等症。

【用量及服法】陰乾。五錢至一兩。水煎服。

■牻牛兒

罐牛兒。生於山野。春時自宿根抽苗。莖細長有節。蔓延於地上。長達四五尺。葉掌狀分裂。裂數自三至五葉。面有紫黑色之斑點。葉柄長對生。夏間葉間抽枝。生花。多以二花集生。花似梅而小。白色。或紅紫色。花後結長蒴。熟則五裂。散出種子。入藥莖葉並用。

【功用】鮮用治切傷。乾用治痢疾。

【用量及服法】鮮用。揉潰敷。乾用。二錢至八錢。作煎劑。

■ 無花果

無花果。爲果樹園藝之一。莖高十餘尺。葉大而糙。或三裂。或五裂。夏月開花。花單性。隱於倒卵形囊狀之總花托內。總花托綠色。著生於新枝之葉腋。果實爲肉果。倒卵形。長寸餘。至盛夏或秋季成熟。色有紫色。綠色。白色。各種。入藥用果實及葉。

【功用】果實。潤腸助消化。葉。收斂退熱。治痔瘡。

【用量及用法】果實作食品。葉煎汁熏洗。

■冬青

冬青爲常綠喬木。生於山地。葉互生。卵形。全邊而尖。其質厚。有光澤。夏月開花。花小。黃白色。雌雄異株。子圓形。赤色。入藥用根皮。

【功用】治月經過多。赤白帶下。

【用量及服法】鮮用八錢至一兩。作煎劑。

■雞冠

雞冠。多栽培庭園。爲觀賞植物。一年草。莖高二三尺。赤色或黃綠色。葉互生。披針形。花有紅黃等色。形似雞冠。莖葉及花均入藥。

【功用】治吐血。下血。及痔瘡。

【用量及服法】鮮用八錢至一兩五錢。作煎劑。

■南連

南連。生於山野。宿根草。二月發苗。莖葉與羊蹄無異。但甚短小。四月抽莖。高尺許。

花細成穗。結實初青後紅。子藏稜中。夏至後枯萎。入藥用根。

【功用】治血痢。

【用量及服法】切片。炒成炭。每用一二錢。水煎服。

■白雲英

白雲英。生於田野。越年草本。莖塌於地上。葉爲羽狀複葉。小葉全邊。春月抽出長花軸。翹然直立。頂端著以短總狀花序。如繖形花冠。白色。子爲莢。呈黑色。入藥用花。

【功用】治吐血。咯血。下血。

【用量及服法】每用二三十朵。水煎服。

■白躑躅 (白杜鵑)

白躑躅。生於山野之小灌木。葉倒長卵形。或倒披針形。枝葉間有毛茸。四五月間

開花白色。花冠如漏斗狀。邊緣五裂而深。雄蕊五。雌蕊一。萼片頗小。可作觀賞之用。入藥用花。

【功用】治咯血。吐血。下血。

【用量及服法】每以花十朵至十五朵。水煎服。

翻白草

翻白草。生於原野。多年生草本。地下有塊根。春初佈地叢生。羽狀複葉。各小葉緣邊有鋸齒。葉背及葉柄多白毛。春間抽莖一尺餘。開花黃色。塊根供食用。入藥莖葉並用。

【功用】爲收斂藥。治下血。及婦人漏下。

【用量及服法】每用三錢至五錢。水煎服。

臭椿皮 (樗白皮)

臭椿。爲落葉喬木。高數丈。葉頗大。互生。奇數。一回羽狀複葉。長二三尺。小葉甚多。

夏日開花。花小。白色帶綠。果實爲翅果。膜質如線。中間含一種子。入藥用該樹之皮。

【功用】爲收斂藥。治血痢。療婦人白帶。

【用量及服法】每用四錢至八錢。水煎服。

蓮蓬殼

蓮蓬殼。一名蓮房。卽蓮採收果實後。而廢棄之子房。曬乾用。

【功用】作收斂藥。治泄利下血。療乳頭開裂。

【用量及用法】每用一枚。水煎。加紅糖適宜。俟溶化後服之。乳裂。炒研爲末。外敷。

白石榴花

白石榴花。卽石榴花之白色者。

【功用】爲收斂藥。治下痢。

【用量及服法】每用五朵至七朵。水煎服。

■白蘊豆花

白蘊豆花。卽蘊豆花之色白者。亦卽白蘊豆之花。

【功用】治赤白下痢。

【用量及服法】乾用。二錢至三錢。水煎服。

■茄根

茄根。卽蔬品之茄。採其根部。曬乾用。

【功用】性收斂。治赤白下痢。

【用量及服法】每用三錢至五錢。水煎服。

■紅藤

紅藤。一名省藤。藤本。莖細而長。倚於他木上。有長至數百尺者。但其周圍。不過四五寸。葉長。爲羽狀複葉。自許多小葉成。入藥用莖。

【功用】作收斂藥。治婦人月經過多。及痛經。療血痢。腸癰。

【用量及服法】每以三錢至五錢。水煎服。

夏枯草

夏枯草。生於山野。草本。莖方。高至一尺餘。葉長卵形。有葉柄。對生。葉與莖。俱有毛。茸。六月間開花。生於莖之頂端。紫色。入藥用莖葉及花。

【功用】爲收斂藥。及變質藥。止瀉利。治瘰癧。

【用量及服法】每用三錢至五錢。水煎服。

土牛膝

土牛膝。生於原野。高三四尺。莖方。有膨大之節。葉橢圓形。或長卵形。對生。夏間開

花。小苞細長。其狀如針。綠色。花後結實。有刺。易附着於衣服。入藥用根。

【功用】爲收斂藥。及利尿藥。清血消毒。治喉症。

【用量及用法】鮮用以五錢至一兩。水煎服。喉症搗汁漱口。

變質藥

■芭蕉根

芭蕉。多年生草。本高八九尺。春末抽葉。葉大。長橢圓形。中肋之兩側。有平行脈。夏
月。葉心橫出花軸。其苞形大。花簇生於苞腋。果質肉質長形。多栽培庭園以
供觀賞。入藥用根。

【功用】清血毒。治瘰癧。

【用量及服法】鮮用二三兩。水煎服。

■松蘿 (金線草)

松蘿。生於深山之樹梢。爲淡黃色之絲狀物。長二三尺。下垂。有分歧甚多。

【功用】治瘰癧。

【用量及服法】每用二三錢。水煎服。

■ 蕨 藜 (紅梗刺根)

蕨藜。生於山野。為多年生植物。莖上有刺。葉互生。卵圓形。有托葉。葉下有卷鬚。以

纏繞他植物上。花黃綠色。入藥用根。

【功用】清血毒。治微瘡。

【用量及服法】鮮用二兩至四兩。水煎服。

■ 蒲包草 (鬼蠟燭)

蒲包草。生於水澤。葉如野菰。秋間結實。宛與蠟燭相似。有詩云。風搖無弄影。煤具

不燃煙。人採其實。以治金刃傷。

【功用】實能止血。根葉治瘰癧。

【用量及用法】實外罨。根葉鮮用二三兩。水煎服。

■ 山海螺

山海螺。生於溪澗濱濕地上。葉五瓣。附莖而生。根如狼毒。皮有皺旋紋。與海螺相

似。秋後結子。扁圓。旁有四葉護之。入藥用根。

【功用】治腫毒。瘰癧。楊梅惡瘡。腸癰便毒等症。

【用量及服法】搗汁一小杯。以熱黃酒沖入服之。

■鐵烏鈴（鐵鈴草）

鐵烏鈴其本青黑色。葉梗根堅實如鐵。其汁黑。可染鬚髮。入藥根葉莖並用。

【功用】治楊梅惡瘡。大風癱瘓。

【用量及服法】鮮用一二兩。水煎服。

■遺糧（山歸來）（土茯苓）

遺糧。生於山野。藤本。春月延蔓。葉長形而厚。有光澤。葉下有卷鬚。葉腋出花梗。開

花十餘。色紫紅或綠。實圓。色黑。入藥採用其塊根。

【功用】清血毒。治楊梅惡瘡。

【用量】鮮根一兩至二兩。水煎服。

■龍鬚草 (石龍芻)

龍鬚草。生於低溼之地。莖細圓。如鬚。下部有鱗片之小葉。高一二尺。夏間開綠色

小花。莖極似燈芯草而少短。入藥莖葉並用。

【功用】清血毒。治結核瘰癧。

【用量及用法】鮮用二兩至三兩。搗汁服。並外塗之。

防腐消毒藥

■三白草

三白草。生於濕地。莖長二三尺。葉圓而尖。初抽青色。後變白色。或一葉有青白二色。春季開小白花。入藥用葉。

【功用】治人咬成瘡。

【用法】取鮮葉揉損貼之。

■半支蓮

半支蓮。生於溪邊石砌等處。有青紅二種。青者葉尖。紅者葉團。葉厚有肉。莖長六七寸。初夏開小黃花。入藥用莖葉。

【功用】治疔瘡。

【用量及用法】內服五錢至一兩。水煎服。外用。加食鹽少許。搗爛貼之。

■蝴蝶花根

蝴蝶花。爲觀賞植物。多年生常綠草本。莖高一二尺。葉劍狀。淡綠色。夏日開花如蝴蝶。白色或紫色。中心黃色。入藥用根。

【功用】治咽喉腫痛。

【用量及用法】採根搗汁漱口。

■九頭青

九頭青。爲藤本植物。莖長一尺餘。葉如桃葉。生於山野間。入藥用葉。

【功用】治毒蛇咬傷。

【用量及用法】採葉揉爛貼之。

■萬年青

萬年青爲觀賞植物。人多栽培之。常綠草。本葉叢生。長尺餘。自地下莖叢生。春夏之間。抽莖開花。莖長二三寸。花白色。攢簇而生。果實球形如豆。赤色。入藥用根。

【功用】治喉症。凡一切爛喉。喉蛾。喉痺。俱有效。

【用法】以根加醋少許。取汁漱之。

■虎耳草 (天荷葉) (石荷葉)

虎掌草。大多栽植於花砌石罅及背陰之處。其葉似荷錢。而有紅白線繚繞其上。

三四月間。開細小白花。入藥用葉。

【功用】治小兒耳瘡及天疱瘡。

【用法】搗汁滴入耳內。或塗布。

水仙

水仙。球根植物。春初抽葉。莖高尺餘。莖頂開黃白色之花。供觀賞之用。根有毒。但能防腐消毒。故入藥用。

【功用】治癰疽腫毒惡瘡。

【用法】加鹽搗爛。貼患處。

雪裏金丹

雪裏金丹。生於山野。球根。多年草。葉如韭。冬月開黃色小花。入藥用根。

【功用】治喉症。

【用量及服法】用根七至十四球。煎汁漱口。

景天

景天。宿根草。葉互生。橢圓形。其色白綠。表裏如塗有白粉。且肉厚多漿。莖頂開細

小成簇之白花。入藥用葉。

【功用】治瘡腫。吸膿甚效。

【用法】將鮮葉剝去薄皮。貼之。

■鴨跖草 (竹節草)

鴨跖草。生於卑濕之地。三四月間抽苗。莖紫色。葉如竹而柔軟。花碧色。蛾形。而葉似翼。結角尖曲如鳥喙。角中之子。大如小豆。入藥用葉與花。

【功用】治瘡腫。

【用法】採花與葉。搗爛。罨之。或取汁塗布。

玉簪花

玉簪花。觀賞植物。多栽培庭園。葉似車前。大而柔軟。三四月間生葉。高一尺內外。七八月抽莖開花。長形如簪。入藥用根。

【功用】治癰腫。

【用法】搗汁塗之。

■紫荊

紫荊多栽培庭園。落葉喬木。高丈餘。葉圓形而尖。春月先葉節節攢簇生花。花爲

蝶形。花冠紅紫色。果實爲莢。入藥用木皮。

【功用】治癰疽及獺犬咬傷。

【用法】研末。以黃酒或砂糖調塗。

■蓼

蓼生於濕地。葉狹。緣或紫色。花開蓓蕾而細。長二三寸。枝枝下垂。入藥用花與葉。

【功用】治脚氣。

【用法】煎湯洗之。

■金剪刀

金剪刀產於山野。爲單子葉植物。莖長尺餘。冬月凋落。入藥用根及莖。

【功用】治咽喉病。

【用法】取根及莖搗汁含漱。

■ 蛇莓

蛇莓。生於山野。多年草。莖匍匐地上。長二三尺。葉有微毛而不滑。小葉三片。緣邊如生粗鋸齒。葉互生。柄長。春夏間由葉腋抽花。有長花梗。萼外有苞。花瓣五片。黃色。雄蕊約二十枚。雌蕊甚多。果實細小。熟時花把膨脹呈赤色。此植物有毒。入藥莖葉並用。

【功用】治疔瘡。療目生蟹睛。

【用法】俗稱疔瘡藥。搗敷頗效。治目。揉爛塞入鼻孔。

■ 五爪龍 (烏蘇莓)

五爪龍。蔓生。夏日繁茂。莖有卷鬚。藉以卷絡他物而上。葉爲掌狀複葉。自五小葉合成葉腋抽花莖。開黃綠色四瓣之小花。花盤黃赤色。入藥用葉。

【功用】治諸瘡潰爛。

【用法】揉損貼患處。

■天青地白草（野苧麻）

天青地白草。生於山野。立春後生苗。長二三尺。葉圓而尖。有鋸齒。色面青背白。有麻紋。結子細碎。根搗之有滑涎。入藥用根。

【功用】能活血。止血。發散。止渴。通蟲脹。外用治諸毒。及小兒丹毒。

【用量及用法】內服。以根一二兩。水煎。加黃酒溫服。外用。以根搗取滑涎。塗布。

■狗尾草（莠）（光明草）

狗尾草。生於山野。一年生草。本高二三尺。莖葉穗均似粟而小。有綠色之芒。至夏秋之季。種子成熟。其形似稗。可採取為製酒原料。入藥用莖。

【功用】治目痛。

【用量及用法】每以一二兩。水煎服。或煎湯薰洗。

■金豆子 (草決明)

金豆子。生於平野。一年草。二月生苗。長二三尺。葉如槐而少大。處暑時開小黃花。莢似綠豆而扁。入藥用葉及子。

【功用】治疔腫及目痛。

【用量及用法】以葉鮮搗。或加醋敷之。目痛。以子三錢至五錢。水煎服。

■半嬌紅 (水雞冠)

半嬌紅。生於平野。或濕地。立夏後生苗。一莖直上。葉長狹而尖。花生莖頂。紅色。入

藥莖葉並用。

【功用】治風痺跌撲。

【用量及服法】每用一兩至一兩五錢。水煎服。

■野苧薺

野荸薺。生於田野。宿根草。春月抽苗。葉圓而細。葉上有光澤。其根如荸薺而小。年久者稍大。入藥用根。

【功用】能去面黝斑痣。治目星努肉。

【用法】治面病。搗汁塗布。治目疾。取汁點之。或取其澱粉配合目藥。

■白茄蒂

白茄。園圃栽培。一年草。高二三尺。葉橢圓形。或卵形。互生。花合瓣。花冠花與果實俱白色。入藥用果實之蒂。

【功用】治發背。及一切癰毒初起。

【用量及服法】每以十四個至二十一個。水酒各半煎服。

■馬蔞根

馬蔞。山野自生。多年草。高二三尺。葉長卵形而尖。粗澀。有鋸齒。互生。秋後枝梢開花。紫色。其嫩葉可供食用。入藥用根。

【功用】治咽喉諸病。

【用法】以鮮根搗汁漱之。

■金鎖銀開

金鎖銀開。生於陰溼之處。多年草。葉爲複葉。由多數之小葉集成。莖長二三尺。根

部膨大如壘丸。入藥用根。

【功用】治喉蛾、喉痺及一切喉症。

【用量及用法】乾用。每以三四錢。水煎服。又以鮮根搗取汁漱之。

■蒼耳草

蒼耳草。生於山野。一年生草本。莖高三四尺。葉卵形而尖。有缺劑及鋸齒。粗糙。夏

日稍上開小花。帶綠色。秋間結實。比桑椹短而多刺。入葉莖葉及子實俱可用。

【功用】治大麻瘋。及瘡瘡疔毒。

【用量及用法】以莖葉二兩。水煎服。或熬膏。日服一二瓢羹。鮮葉搗如泥。塗一切瘡瘍。子實三錢至五錢。水煎服之。治疔毒甚效。

■石巖薑

石巖薑。生於巖石或老樹上。其地下莖如薑。全體有棕色之毛茸。葉橫生於根莖。貼於地上。綠色。狀如石葦而較短。入藥用根。

【功用】治齒痛及髮癬。

【用量及用法】齒痛。鮮用去毛茸。以五錢至八錢。水煎服。髮癬。燒酒浸汁塗之。

■烏扇

烏扇。生於山野。葉長一尺內外。有平行脈。集生如扇。夏秋莖頂開花。黃色。結實如豌豆大。黑色。入藥用根。

【功用】治喉症。

【用量及服法】鮮用三錢至六錢。水煎服。

雜藥

棉花根

棉花根。即採取棉花之根部。鮮乾俱可入藥。

【功用】催生。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。（乾用減半）水煎服。

地蘇木 （透山龍）（茜草）

地蘇木。生於山野。春季生苗。蔓延。莖中空。葉爲卵形。一節輪生四葉。莖葉俱有刺。
初秋開淡黃色成簇之小花。入藥用苗或根。

【功用】能通月經。

【用量及服法】苗鮮用五錢。根四錢至八錢。水煎服。

刀豆根

刀豆栽培於園圃。一年生蔓草。常纏繞於他物上。葉大複葉。自二三小葉成。花爲蝶形花冠。青紫色。果實爲莢。果長大而扁平。含大種子。其種子有紅白二色。其嫩莢可醃藏。白色者。則收其成實。供熟食之用。入藥用根。

【功用】治頭風。

【用量及服法】每用五錢。水煎服。或沖入黃酒一盃服之。

■芝麻殼

芝麻殼。卽油蠟植物之芝麻。採用其種子之外殼也。

【功用】治半身不遂。

【用量及服法】每用五錢至八錢。酒水各半煎服。取汗。

■千里光

千里光。生於山野。宿根草。立夏抽苗。一莖直上。高數尺。葉類菊。互生。秋開黃花。入

藥莖葉並用。

【功用】治目光不清。迎風流淚。

【用法】煎湯薰洗。

■ 葶草

葶草。生於平野。其形如蓼。莖高五六尺。莖與葉密生毛茸。葉大卵形而尖。葉柄長。

秋間枝頭開花。紅色如穗。入藥莖葉並用。

【功用】治疝氣。

【用量及服法】乾用三四錢。水煎服。

■ 馬齒莧 (豆板菜)

馬齒莧。生於園圃中。葉厚有肉。倒卵形。赤青色。莖橫臥地上。夏日枝梢開花。五瓣

黃色。入藥莖葉並用。

【功用】治痢疾。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。水煎服。

■杉木節

杉木節。卽杉木之枝幹上。生有隆起。其狀如節者。其木皮亦可用。

【功用】治諸瘡。脚氣。及痞塊。

【用量及用法】每以節一二個。剖開。或皮二兩。水煎洗之。

■青箱花（筆頭花）

青箱花。生於山野。一年生草本。其狀如雞冠花。花小尖形。色淡紅。入藥用花。

【功用】治目痛。

【用量及服法】每用三錢至五錢。水煎服。

■繁縷

繁縷。蔓生地上。莖細長。自五六寸以至二尺。廣卵形。平滑。早春至夏。開白色五瓣

細小之花。入藥用莖葉。

【功用】治乳閉。

【用量及服法】鮮用一兩至二兩。水煎服。

■貓兒刺

貓兒刺。木本。山野自生。葉光滑有刺。夏間開小而青黃色之花。秋季結實。紅色。入藥用嫩葉。

【功用】治乳吹。

【用量及服法】鮮用一兩。水煎加酒服。乾用。焙搗成末。黃酒送下。

■牛旁

牛旁。栽培園圃。其根供食用。莖高四五尺。根粗。長至二尺餘。葉心臟形。有長葉柄。花及種子。俱有棘刺。入藥用葉。

【功用】治橫痃。

【用量及服法】搗汁塗之。或鮮用一兩至二兩。水煎服。

■野葡萄根

野葡萄。其植物全部與葡萄相同。但俱弱小。入藥用根。

【功用】治風痺骨痛。

【用量及服法】以根八兩。燒酒十六兩。浸七日。一日數回。每回飲一小杯。

■蒲公英

蒲公英。生於山野。多年草。莖高七八寸。汁液如乳。葉自根部抽出。叢生。倒披針形。葉緣有大鋸齒。向下。春月。花莖自葉叢間抽出。頂上着花。深黃色。結子有白色冠毛。根葉及花供藥用。

【功用】能解毒消熱。治乳癰。及疔腫惡瘡。

【用量及服法】每以三五錢。水煎服。

■伸筋草 (寬經草)

伸筋草。生於山野。莖細長如蔓。匍匐地上。處處生根。長至數尺。有許多之枝。分枝為數條。葉小。細長而尖。如鱗片狀。密生於莖上。入藥莖葉並用。

草藥新纂 上編 草藥形性 雜藥

【功用】治風痺筋絡不舒。

【用量及服法】每用三錢至五錢。水煎服。