

明崇川陳實功著

發背論第二十三

吳江徐大椿靈胎評

海甯

許光耀宣校

發背有五一曰陽毒先因風熱或患熱毒消渴或先患傷寒餘毒蓄積於背脊脅之間不拘椎數但從兩夾脊起滿背掀熱赤紫或紅色如燄膜毒難成後痛不除數日之間忽然平塌昧者誤謂腫消殊不知此是內攻肉陷不可復藥矣此二句徐國此曰此乃始時高腫以後忽平故爲陰惡若本不起發雖屬虛證反可施治二曰陰毒乃氣冷而作初如黍米隱隱而痛直應前心頭自昏重寒熱如瘡五七日後始覺攻腫膜毒淡沈遲緩未透急宜以補氣湯藥內托徐國外以抽膜藥貼之三曰服金石燒煉藥毒初起如丹鱗之狀繫繫漸開如湯火所傷顏色如硯心膈煩躁多渴嗜冷此句徐國其瘡難起則驚人尤甚於陰陽二毒但根柢分明須以解金石毒湯散急治其內方保無虞四曰酒食毒乃平時或餓或因飽食卽睡或多食酒食冷熱黏滑肥鮮油膩之類積於臟腑兼之不慎帷幕恣意當風脾臟氣虛不能承受乃毒發於背徐曰此所謂背梁之邊足生大疔者也不問椎數初起頭如小禪子後大如拳其堅如石痛連四肢加之拘急口若舌乾腹急便澀十數日後頭面手足浮腫臟腑滑泄急痛如利是其候也初腫時急用收腫發穴瀉膜湯藥內實臟腑外泄膜水治之遲緩潰腐愈甚傷骨爛筋復感外邪而致內敗死矣五曰冒山嵐瘴氣毒其人素歷瘴鄉觸冒嵐瘴蓋諸臟腑久而不發至氣血衰弱及斬喪虧損之時而後發露初起腫色青黑形如靴皮附筋微骨頑如木石引手加深方覺痛處至五七日毒氣浮淺膜高色變青白有如拳打之狀寒戰似瘡頭痛口歪又若有風手足厥逆眼黑睛小白多此因內有邪氣相搏急宜破清血三升方有黃白膜出然其皮猶腫痛不止直至青白之色退盡方愈此宜急急追趕膜毒出外方爲無害否則有未不至於危者也相案發背乃大證而原本無總論但有治驗各條列於卷二腫瘍治法之後而統名之曰癰疽治驗殊爲闕略失次今取徐批瘍科選粹中發背論補于治驗之前并載徐批而移在腫疽之後庶幾以類

相從其方藥原本不別出散非於腫潰瘍諸方及醫道門並專治背疽之方故仍其舊

### 發背治驗

一男子年五十餘背心生疽十三日矣湯水不入煩悶不語背堅硬如貢石皮色亦紫瘡勢雖重喜其根脚交會明白毒尙結局於此未經入內須行拔法使毒氣外發不致內攻隨煮藥筒提拔一次去惡血碗許徐曰最忌出血又脈實便閉用內疎黃連湯及猪膽導法徐曰何必大便通利二次使內外毒氣皆得通泄夜臥即安背重失其大半次用托裏排膿之藥外以桑木灸法腫硬漸腐膿毒漸出換服十全大補湯加麥冬五味數服腐肉自脫飲食漸進瘡口漸合調理兩月餘而愈

一老婦年近七旬背疽已過半月形勢可畏其家已置不治整備後事適予往看童稚瘡證見面間之羸言待覈旦夕予強請觀半背皆腫瘡雖不高亦不內陷以手按之外實而內腐老年內虛釀毒中隔不得外發故也雖飲食不進且善根脚兩無混雜臟腑各無敗色治之可生其家堅執不信且言鐵龜命卜俱斷必死予歎曰再三四日不治內膜穿潰此命死於無辜矣次日予自往謂曰予非相強實見其可生不忍聽其死耳藥金分毫不取愈後任從酬謝何如其家首肯乃先用葱艾湯淋洗外面俱是不腐頑肉隨用拔針利翦取去正中二寸頑肉放通膿管以手輕里之間擦淨內蓄釀血約有三碗旁觀無不失色釀血稍盡仍換前湯洗淨用膏封貼內用回元大成湯二服徐曰膿已出可用以接補真氣後用人參養榮湯倍參尤加香附早以八味丸八味丸徐勒八仙鬚相兼調理使其脾健食進腐脫肌生亦此婦亦謹慎調理並未更變不出百日瘡愈身健始信予言不謬也

一監生年過五旬素有渴證體又極肥生背疽約有尺許至十二朝後請治視其形勢微腫色淡微紅根脚半收半散此陰陽相等之證也肥人內虛瘡勢又大非補托瘡必難起毒必易陷誠恐緩不及事便以托裏散因其內候至十五日外用拔針小小從頂放通三孔緣勢大不可過放走泄元氣致釀難成但令有路可出

而已內用參耆內托散倍加人參黃耆各三錢服至二十日大膿將發日至升許早以參水膏午用十全湯加參耆各四錢麥冬五味子各一錢徐曰用五味子不通則氣收引而難愈也服至月餘內腐通潰膿似湧泉間用聖愈湯兼之八仙餌調理保助脾胃增進飲食尚恐前藥不能勝病加熱附一錢脾健膿稠色黃而正四十日外瘡熱方得微退時值仲夏酷熱病者生煩誤飲冷水二碗瘡隨下陷不痛無膿身涼脈細腹痛足冷變爲陰證非辛熱不能回陽急用十二味異功散倍人參熟附各三錢不應徐曰用人參則寒氣不出矣換用生附人參各五錢人參五錢徐又早晚二服外徐又附子亦用十兩餘此句徐勒方得全安此證設用解毒傷脾宣利等藥徐曰原不可寒氣不出矣用何勞耽得不

用辛熱峻補豈有生理

一鄉官年踰七旬背瘡已經八日形雖微腫色淡不紅勢若龜形根漫不聳乃老年氣血衰弱之故診其脈帶微數而有力此根本未撥雖老可治隨用排膿內托散加皂刺以潰膿托裏服至十三日後瘡漸高腫色亦漸赤但不能潰膿此食少脾弱未能培養之故也又用十全大補湯數服徐曰總不可當頭取開寸許捺通膿管膿果隨出以猪蹄湯洗宜蠻補膿始漸出不能快利乃因膜中隔不通故也不可畏其老而致誤事隨用拔針徐曰不可當頭取開寸許捺通膿管膿果隨出以猪蹄湯洗淨膏蓋復用服藥每日一次外肉亦腐爲膿病者形色枯槁更用人參養榮湯倍加參耆徐曰亦靈托裏腐肉將脫者取之新肉欲生者培之但老年氣血衰不能速效又加服參水膏早晚二次新肉方生飲食頓倍調理七十餘日而安

一庠生年六十餘患背瘡已十日外其形堅硬色亦深紫頭發甚多含若螺子豎長尺餘根橫半背喜其高腫光亮發熱掀痛脈洪數有力此膏梁醇酒濕熱交蒸之故雖重不妨隨用照藥三條相繼照畢其內含螺子

盡欲吐出即用搘腳刮去流出惡血鍾許徐曰總不宣刮傷葱湯洗淨搽上腐藥用紙蓋貼周圍根脚以吸毒散敷之

收其毒氣使不閉大次日仍照仍敷三日後外肉漸腐內服托藥培助脾胃解毒爲濃早服八味丸徐曰不切以

治腎水徐曰亂道換洗蹄湯仍將膏貼候至腐盡其深寸餘隨用玉紅膏日漸生長但此公好飲雖病不戒兩月

後新肉雖平嬌嫩不能結皮完口復將浮嫩之肉盡行翦去以上十字徐又批曰此等法出於何典其人不死幸也

膏貼數日肉平復鑿珍珠散數次方結皮蓋八十日而安

一老年人患疽半月其瘡貫脊偏背皆腫上至肩膊下至腰脇腫若瓜形頭計數百其家以爲不治余診其脈微洪而不鼓瘡形腫掀外發飲食知味年雖老而根本尚有餘也先用托裏消毒散二服其勢稍定外用桑木灸法助其腐潰根以鐵桶膏瓶之更服排腫內托散正腫漸出但老年氣血不充外肉不易就腐視其肉色變而不腐者用針鉤利翦徐徐翦去約四寸餘見長紅肉便用膏塗新肉已生將半時值隆冬其家自行開看房中不著炭火兼蓋被未暖致被寒侵瘡色淡白膿亦清稀飲食減少氣體不舒幸其瘡本屬陽證隨用濃葱湯乘暖淋洗將玉紅膏融化搽上外用膏貼以熟綿軟絹覆疊數層繩蓋甚密內用神功托裏散早晚連進二服次早復看其瘡自回陽矣徐曰不輕用參丸故易愈

以後遵法調理百日而安

一老人年過六旬患背疽十二日矣其形半腫半紅微疼微熱發於背心之下腎俞之上高低平等廣開八寸根脚泛腫色若水噴徐曰色若水噴最爲壞證頂軟無神似腐非腐脈浮而大重按則虛余曰此瘡易於腫潰而難於收斂不可治也其家笑而不信復請里中老醫觀之見病者起居平和言語清利舉動加常飲食有味以爲五善俱具安若泰山其家亦喜隨用其藥日漸有功濃潰腫退徐曰此即陷也腐盡肌生余謂其親族曰此病必死於收口至錢大時也衆皆不信果至口如錢大時變證一出不四朝而死始以余言爲神

一男子六旬有二發右搭手予用艾灸形勢漸高腫堅硬不痛半月後尙未潰腫日生煩悶恐其毒陷先用針通隨行拔法拔出惡血鍾許徐曰此六字稍得輕便日搽化腐之藥膏蓋三日後瘡漸腐潰至二十日出正腫壞

內潤脫新內潤生外  
字渝勃又曰峻補必兼托毒  
亦不全在參附吾從有據

江字徐園失於岐祖四

肉潤脈新肉漸生外治之法盡矣其家與一內科醫甚密謂其開方不離外科補托之法字徐園失於峻補四亦不全在參南歸經有難每日人參不過二錢余曰不及當用五錢兼熟附二錢不然必變其家與內科醫俱不信後果肉色淡白癟口散大臘水清稀飲食減少敗證具矣雖強投溫中健脾大補之藥終至形體消削臘水臭穢延至六十日瀝盡氣血而亡悔已無及凡大癟每日臘出一碗用參必至三錢以此爲則此人日出臘三碗用參二錢謂之大攘小補安得不死又外科乃破漏之病最能走泄真氣如損補兩不相敵無以抵當多致不救徐曰此說亦是然補法亦儘多此人不信補而自取敗亡惜哉論曰參固可用若益人亦有變通之法

一男子年近六旬其孫患癆邀余往視彼坐於堂時值仲夏余見其背生熱癆凡二十餘內有一癆甚小余謂曰此非癆比其毒甚大一發卽不可治彼笑而答曰固無恙也及送至門余又謂曰可急請他醫視之彼仍不信至十日形勢稍發命里中一醫視之曰癆也又十日形勢內陷敗證齊出始信前言央親友邀余往視彼臥於堂帛覆癆上余登堂未數步卽退親友問故余曰敗氣滿前死期速矣何必再視急備後事更七日死果如期不爽

疔瘡論二十四

夫疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之淺深各隨臟腑而見證有曰火燄疔其患多生臍口手掌指節間初生一點紅黃小泡抓動癢痛非常左右肢體麻木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發躁言語昏憤此出於心經之病也有曰紫燕疔其患多生手足脰脛筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目睛指甲純青舌強神昏睡語驚惕此出於肝經之病也有曰黃鼓疔初生黃泡光亮明潤四邊紅色纏繞多生口角腮頰眼胞上下及太陽正面之處發之便作麻癢繃急硬強重則恶心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾嘔此出於脾經之病也有曰白刃疔初生白泡頂硬根突破流脂水驟然癢痛易腐易陷重則腮損咽焦毛聳肌熱咳吐

頭瘡鼻瘻氣急此出於肺經之病也有曰黑屬疔其患多生耳竅脇腹腰背偏僻軟肉之間初生黑斑紫治

毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如釘痛微骨髓重則手足青紫驚悸沈困軟陷孔深目睛透露此出於腎經之病

也以上五疔內應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人多作寒熱甚者

惡心嘔吐遲治則紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血此十一字徐圖尋至初起瘡上挑破俱用蟾酥

條插入膏蓋蟾酥徐勒批曰點拔毒藥爲炒內服汗藥散之自愈凡治此證貴在乎早此句徐圖初起卽治者十全十活稍遲者十

全五六失治者十全一二初起項以上者二陽受毒必用拔針刺入瘡心四五分徐曰必用金針挑斷疔根令

出惡血隨用回疔丹或蟾酥條插入孔內膏蓋之如項以下者三陰受毒卽當艾灸此句徐又曰灸之不痛亦須針

刺插藥方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其大汗二字徐勒批曰醫言不可太過毒方得解不致稽留毒氣致生變證

今人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小

其惡甚大再加艾灸益其勢逼毒內攻反爲倒陷走黃之證作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如尸

脬七惡頓起治雖有法百中難保一二外又有疔名數種形狀紛紛有舊說未及重錄

徐曰此篇皆是古人舊說不可不知但疔不可灸以其全屬火也 梁案徐言疔不可灸全生集冒疔藥不可用酒皆古人未發之論凡藥不忌酒煎而疔獨忌之者疔善走黃也

### 疔瘻看法

初起如疥形如粉刺或小泡或瘻瘻結脈不散者順瘻腫不作寒熱亦不惡心飲食有味手足溫暖者順瘻腫內不腫四圍白色多痛少癢作瘻者順已灸出瘻瘻仍高腫肉色鮮明根內紅活漸平者順初起似疔非疔軟漫灰色四邊瘻根平塌漫腫者凶未發前先作寒熱如瘻惡心不食後出瘻如蚊跡蚤班或青紫黑泡軟陷無根腐爛深孔氣粗足冷者逆瘻形似魚臍頂凹灰白軟漫相兼脈細身冷者多逆肉腫瘻不腫根脚走散瘻頂空腐血水氣蠶者死凡疔項以上針刺不疼埋以下灸之不痛俱死已經走散頭面耳項俱腫煩躁脈細瘻動

危

徐曰大段與諸證同 案徐批有附錄繡波公一條云症癥全看部位如部位不佳者甚爲難治余觀其毒將走之證用針破其四圍挿入拔疔之藥其浮腫處用針鏽之出其惡血此法甚妙 又案他書載疔形闊如韭菜長可寸餘肉色紫黑者忌行針刺

### 疔瘻治法

初生在項以上者必先針刺徐曰亦宜斟酌以去惡血庶毒不內攻在項以下者必先艾灸此四字徐又以殺其勢庶不侵良內發熱惡寒身體拘急六脈緊數邪在表也宜汗散之身體發熱口燥咽乾脈實有力二便秘澀者宜下之針刺之後瘻不作腐邊腫不消仍加挿藥二字徐又內用補托初起誤灸致毒走黃不住者急當隨走處砭去惡血四字徐點發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏當解毒清心托裏護膜此二句徐圖潰後氣血受傷神怯食少睡臥不甯宜助脾胃斂神氣將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急滋養腎水徐曰宜真清心胃之火

### 疔瘻治驗

一監生右額下生疔三日形如魚目麻癢不常此肺經受毒也用針刺入四五分此句徐勒批曰鑄做其硬如骨有聲隨用蠅酥條搗至三日猶不腐化徐曰肉已變此堅頑結聚之病也非此藥所能勝徐曰爲藥所害換用三品一條槍挿至七日以上九字徐勒批曰好外用紙封蓋至十一日脫出疔根一塊約有指許徐曰皆好肉以長肉玉紅膏搽之先服托裏消毒散加金銀花二錢白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥門冬黃耆陳皮各一錢調理月餘肉已平用珍珠散撒上結皮而愈

一監生中年縱欲自服補腎助陽之藥以致腎水受傷以上四字徐圈批曰是不能上制心火左額生一泡先紫後黑麻木不知痛醫黑屬腎經其毒不淺幸四邊尚未定散即用針刺此二字徐勒批曰鑄上以冰蠅散厚糊作條挿入患孔以上八字徐勒批曰鑄上

皮薄如何  
可用插藥

仍用紙封勿令泄氣朝服加減八味丸以滋腎水

八味丸徐勒批曰  
此乃增腎火也

午服益氣養榮湯接補真氣晚用琥珀蠟礬丸護心解毒至十一日外疔根與藥結成一塊

以上八字徐勒批曰凡好肉遇惡藥皆爲死肌

依期脫落乃用生肌斂口補助調理脾胃之藥二十日而愈後因不慎保養及三年復成勞瘵而歿

徐勒批曰病根仍在自然致死

一婦年近四旬與夫不相得懷抱鬱鬱季夏腮發一疔六日後方延余治毒已走散頭目脣項俱腫形色紫赤

余曰內腫癰不腫葉已走黃不治之證

徐勒批曰亦非必死之證

婦流涕歎曰一家皆絕也余問其故婦曰吾夫不肖

有一女二子尙未婚嫁我死而托命於夫必致流蕩故我死則家絕矣余聞其言不忍棄而不治但瘡勢既

大非藥力所回因先雇一貧人與飯吃飽再飲水酒數杯隨用針刺腫上十餘處

以上七字徐勒批曰

令其吸出惡血數

蠟礬丸清心護表兼服降火化痰開鬱安神之藥餘腫稍退又六日其夫言何以不死婦聞暴怒腫甚於前

復用針刺約十餘處出血三四碗

以上十三字徐勒批曰

針孔上蓋小膏餘腫仍用敷藥出血既多其內必虛服人

參養榮湯

徐勒批曰出血多

加香附貝母數日後針口漸濃餘腫漸消其瘡頭乃得高腫仍用蠟酥條挿化腐潰

勒條徐外用生肌斂口之藥內服開鬱和中養血健脾之劑百日外方愈此瘡勉強治之得生其後二子一女

俱婚配夫先故婦今六十五歲矣

一婦二十二歲右耳垂向前一寸生疔一日請余視之約有豆大頂陷色灰此肺經白刃疔也又根脚綿軟毒

不結聚爲陷伏陰證未針刺

徐勒批曰若針

出血亦死其舅曰何恙也余直告曰疔瘡彼冷笑不信余因辭不用藥復請他醫

視之曰不過風熱痃瘡耳用消風散藥二服毒氣全收昏憤喘急而死

一少婦額下生瘡瘡作癢子欲針之

此四字徐勒批曰

針刺出血亦死其家不信自用灸法次日四邊漸腫瘡漸陷

曰灸之害如此

又三日

頭面大腫復請余視灸處已結黑疊乾陷無膿此毒氣內陷外肉已死又面目浮瞞光亮發熱形狀不堪此

正氣衰而邪氣實也治必不效其家悔之無及後半月而死

**蟾酥丸** 蟾酥丸用奇功

乳沒砂礬輕粉同  
鍋牛原麝共蜈蚣

治療瘡發背脣疽乳癰附骨臂腿等瘻一切惡證及瘡不痛或麻木或

嘔吐病重者必多昏憤此藥服之不起發者卽發不痛者卽痛痛甚者卽止昏憤者卽甦嘔吐者卽解未成者卽消已成者卽潰真有回生之功乃惡證中至寶丹也

**蟾酥** 二錢酒化輕粉五分

枯礬寒水石

銅綠

各一錢

乳香

各一錢

沒藥

各一錢

瞻礬

各一錢

麝香

各一錢

鍋牛

各一錢

原麝

各一錢

共蜈蚣

各一錢

治療瘡發背脣疽乳癰附骨臂腿等瘻一切惡證及瘡不痛或麻木或

嘔吐病重者必多昏憤此藥服之不起發者卽發不痛者卽痛痛甚者卽止昏憤者卽甦嘔吐者卽解未成者卽消已成者卽潰真有回生之功乃惡證中至寶丹也

**蟾酥** 蟾酥二錢酒化輕粉五分枯礬

**寒水石** 寒水石一錢

**銅綠** 銅綠一錢

**乳香** 乳香一錢

**沒藥** 沒藥一錢

**瞻礬** 瞻礬一錢

**麝香** 麝香一錢

**鍋牛** 鍋牛一錢

**原麝** 原麝一錢

**共蜈蚣** 共蜈蚣一錢

**治療瘡發背脣疽乳癰附骨臂腿等瘻一切惡證及瘡不痛或麻木或**

**黃連解毒湯**

黃連解毒湯黃連  
黃翹甘草牛蒡子

黃柏黃芩山梔根  
口乾內熱即時捐

治療毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者

**黃連**

**黃芩**

**黃柏**

**山梔**

**連翹**

**甘草**

**牛蒡子**

各等分

**水** 水一茶匙

**燈心** 二十根煎

**八分不拘時服**

**徐曰**一味寒涼亦宜酌用

楣案全生集有奪命湯爲痘毒主方余初疑其家傳祖方後得鈔本仙傳治疔

方有之乃知其古方也方用羌活獨活防風青皮黃連赤芍藥細辛甘草蟬蛻蠶蠶草河車澤蘭金銀花各等分鈔本防風青皮分兩稍重云初起急服此方能內消也余曾見將走黃者服之亦效

**立馬回疔丹**

立馬回疔丹輕粉  
蟾蜍礬砂金頂等  
雄乳礬砂金頂等  
化疔恰似雪投湯

治療瘡初起已用針刺後又或誤灸失治以致疔毒走散不住乃

走黃險惡證也急用此捕

**蟾酥** 蟾酥酒化礬砂各一錢

**輕粉**

**白丁香** 白丁香各一錢

**蜈蚣** 蜈蚣一條

**雄黃**

**礬砂** 礬砂各二錢

**乳香** 乳香六分

**麝香** 麝香一分

**金頂** 金頂五分

**基础** 基础五分

共爲細末糊成麥子大凡遇疔瘡針破用此一粒挿入孔內膏蓋之追出膿血疔根爲效  
疔曰疔有毒肉必用此拔出降藥亦能拔疔 又曰總屬剛燥之藥不宜輕用 文曰蟾酥乃點頭必用之  
藥 又曰代針丹有血竭硼砂冰片

疔毒復生湯

疔毒復生湯壯瘍  
花粉連翹黃皂刺  
銀花牛蒡骨皮同

疔疔走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者

牡蠣 山梔 金銀花 木通 連翹 牛蒡子 乳香 沒藥 角刺 花粉  
大黃 地骨皮 各八分 水酒各一茶鍾煎一半食遠服不能飲者水煎臨服入酒一杯和服亦效脈實  
便秘者加朴硝

徐曰此表裏兩解之方實火宜用

七星劍

疔瘡最怕七星劍  
野菊河車與蒂丁  
加入半枝蓮有靈

治十三種疔瘡初起憎寒作熱惡心嘔吐肢體麻木痛癢非常心煩作  
踴甚者昏憊急宜服之

野菊頭蒼耳頭

豨莶草

半枝蓮

蒂丁草

麻黃一錢

草河車二錢

用好酒一斤煎至

一碗瀘濁熱服被蓋出汗爲度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦效

徐此所謂草頭方也

鉛粉散

鉛粉散治疔瘡  
輕粉黑鉛澄黑粉  
諸般陰爛可回陽

治疔瘡生於脚上初起紫白泡疼痛微骨漸至腐爛深孔紫血水氣穢

經久不瘥用此大效

黑鉛

四兩燒杓化開倒入水中取起再化如  
此百遍以鉛盡爲度取水澄下者三錢  
松脂一錢 黃丹五分麝香一分輕粉五分

共研先用葱湯洗淨麻油調塗

瘡口油紙蓋外

徐曰治濕毒之證下豐臚瘻最宜

化疔內消散

化疔內消散山甲  
知母天花粉皂角  
半夏銀花赤芍藥

治療瘡初起或已針已灸之後服之能令內消

皂角刺

金銀花 知母

貝母 天花粉 穿山甲

白芨

穿山甲 乳香 赤芍

半夏 甘草 草河車各一

水酒各一茶鍾煎一半量病上下食前後服之徐曰亦通治之方重

出 檀案天花粉徐軟

白芨曰生大黃

治療瘡針刺之後餘毒走散作腫宜此藥罐之

束毒金罐散

東毒金罐散白芨  
黃柏鬱金輕豆粉

敷闊諸毒不開張

鬱金

岬肚者白芨

白芨 白芷

大黃各四

黃柏二兩

輕粉五錢

菜豆粉一兩

共爲細末醸米麯調

罐四邊夏熱甚者蜜水調

徐曰卽園藥意義

解毒大青湯

解毒大青湯知母人黃入黃麻梗桔

元參參冬生石膏大黃木通二個調

治療瘡誤灸逼毒入裏致生煩躁譴語不定者

元參

桔梗

知母 大青葉 升麻 石膏

人中黃 山梔

麥門冬 木

通各一大黃

便秘燒人糞水一茶鍾淡竹葉燈心各二十件食遠服

相案人中黃燒人糞徐俱批不入

藥陸君以活謂人糞入藥具載他書功效甚著王君士雄謂不入藥有不入煎劑也以其穢惡耳如遇火盛毒重之證改用陳年糞清澄澈無穢氣者頗有殊功醫者不可不知也

消疔箇便方

消疔箇便方二般每服三錢溫酒下

葱白七莖和白礬如湯浸雪勝羅丹

治療瘡及諸惡毒初起但未成膿者

白礬末三錢葱白七莖

右一味同搗極爛分作七塊每塊用熟酒一杯送下服畢用厚被蓋之再吃葱白

湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其痛苦脫此雖味澀難服其效更妙凡居鄉村之處倘有緊病不及請醫只傳此方服之活人甚衆誠爲良便方也

太乙紫金丹

太乙紫金丹麝砂大戟干金子百倍諸瘡應手良

解諸毒療諸瘡利關竅通治百病此藥真能起死回生製之濟人

奇效不可盡述凡居家出入與大工動大兵及閩廣雲貴仕宦者不可無之

山茱萸

山茱萸洗去毛皮淨焙二兩

川文蛤

川文蛤一名五倍子破淨焙一兩

麝香

麝香揀淨毛皮乾者研淨三錢

千金子

千金子一名續隨子仁白者去油一兩

紅芽大戟

杭州紫大戟爲上江南次之北方綠大戟

色白者性烈或利損傷元氣服之有致吐血慎勿  
用取杭州之上品者去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢整

礞砂有神氣者研細末三錢

雄黃詳紅大塊者研細末三錢

以上之藥各擇精品於

潔衣帽臨日方入室中淨手薰香預立藥王脾位主人率衆焚香拜禱事畢各將前藥七味復置稱準入於大乳鉢內再研數百轉方入紅石臼中漸加糯米濃飲調和軟硬得中方用杵搗千餘下至極光潤爲度每錠一錢每服一錠病勢重者連服二錠以取通利後用溫粥補之修合時除合藥潔淨之人餘皆忌見此藥惟在精誠潔淨爲效治一切飲食藥毒蠱毒瘴氣惡菌河豚中毒及自死牛馬猪羊六畜等類之肉人誤食之必昏亂卒倒或生異形之證並用水磨灌服或吐或瀉其人必甦南方山巒瘴氣烟霧癘疫最能傷人感之纔覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔卽磨一錠服之得吐利便愈癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛇節紅絲等疔及楊梅瘡諸風癰瘍新久痔瘡並用無灰淡酒磨服外用水磨搽瘡上日夜數次覺癥而消除陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘟疫煩亂發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服赤白痢疾肚腹瀉泄急痛霍亂絞腸痧及諸瘧喘並用薑湯磨服男子婦人急中顛邪渴叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼竈失心狂亂羊兒猪頭等風俱用石菖蒲煎湯磨服中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語蹇澀筋脈掣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸瘧並用酒磨頓熱服下自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風犬毒蝎溪瀉諸惡等蟲傷人隨卽發癰攻注遍身甚者毒氣入裏昏悶醫叫命在須臾俱用酒磨灌下再吃葱湯一碗被蓋出汗立甦新久癰疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服小兒急慢驚風五疳五疳脾病黃腫癰瘍痘牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽腫上年歲幼者每錠分作數服牙痛酒磨塗打撲損傷松節無灰酒研服年深月近頭脹頭疼太陽痛極偏頭風及時疫道眼眶損爛者俱用清水磨塗打撲損傷松節無灰酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不通紅花湯下凡遇天行疫愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不通紅花湯下凡遇天行疫

證延街及巷相傳遍染者用桃梗湯磨濃搭入鼻孔次服少許任入病家再不傳染又治傳尸勞溼諸藥不能禁忌一方土指敷服此每早磨服一錠至三次後逐下惡物尸蟲異形怪類後得脫然以此相傳活人不計其數一女子久患勞溼爲屍蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也

徐曰此諸毒邪氣內外要方無病不治 又曰此秘藥中之第一方也用藥之奇不可思議

人參清神湯

人參清神湯丸書  
柴陳遠志黃連等

功效還同地骨皮

治療癥瘕腹後餘毒未盡五心煩躁精神恍惚不甯言語睡臥不

清服之降火清心保扶元氣

人參

黃耆

當歸

白朮

麥冬

陳皮

茯苓

地骨皮

遠志

各一

甘草

柴胡

黃連

各五分

水二茶鍾糯米一撮煎八分食遠服

徐曰此愈後調養方毒未盡者不可服

內托安神散

內托安神散丸書  
決神駿藥志陳皮  
夢冬五味菖蒲草

加上人元參更宜

治疗癥瘕後已出癰時元氣虛弱睡臨驚悸心志不甯或毒未盡流入心竅致多健忘亦宜服

人參 茯神 黃耆 白朮 麥冬 元參 陳皮

各一錢

酸棗仁 遠志 甘草

石菖蒲

五味子

各五分

水二茶鍾煎八分臨服入硃砂末三分和勻食遠服

徐曰與前方相可刪

疔瘡應用方

蟾酥條

部前蟾酥丸作  
係搗研用之

琥珀蠟

碧玉丸

玉紅膏

如意金黃散

托裏消毒散

護心散

見瘡門

八珍湯

益氣養榮湯

珍珠散

見瘡門

水螭散

見瘡門

脫疽論第二十五

夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏梁薰蒸臍丹石補藥消燶腎水房勞過度氣竭精傷兼用房術

之藥或噙舌下化水直至丹田或納臍中使熱徑投內腎爲丸掌握作香鼻嗅或抹陰鼎或搽陽器圖使堅

硬希求常濟多致陽精竭惑淫火猖狂徐曰下濕往往有之其蘊蓄於臟腑者終成燥熱火証其毒積於骨髓者終爲疽

毒陰癰巧人行拙誰防禍起薰鬚智者多愚自謂喜從天降直至骨枯髓涸臟敗腑亡方悔解脫無方罹殃

有故凡患此者多生於手足手足乃五臟枝幹癰之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮如煮熟紅瓈黑氣

侵漫傳遍五指上至腳面其疼如湯潑火燃其形則骨枯筋縮其穢異香難解其命仙方難活故謂血死心

敗筋死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死腎敗此五敗者雖有靈丹喪命而已生此疾者死生付於度外孫真

人曰在肉則割在指則切卽此病也治之於早乘其未及延散時用頭髮十餘根繩患指本節盡處遠扎十

餘轉漸緊之毋使毒氣攻延良肉隨用蟾酥餅放原起粟米頭上加艾至肉枯瘡死爲度徐曰灸而後割不至病極血涌亦良法也

次日本指盡黑方用利刀尋要本節縫中將患指徐順取下血流不住用如聖金力散止之餘腫以妙貼散

敷之次日倘有黑氣未盡單用蟾酥定研末參之膏蓋黑氣自退患上生臙照常法用玉紅膏等藥生內護

骨完口此爲吉兆內服滋腎水養氣血健脾安神之劑若內外無變証十中可保其三四矣若割取之後黑

色仍漫痛腫尤甚敗惡無臙口乾舌硬精神不爽食不知味者終死凡治此不可一已專任必與高明衆議

聽患者願割與否因此証首尾吉凶難定故不可輕易醫治又有似是而實非者詳註在後宜參觀之

徐曰此証十死八九卽治之得法亦難輕許其活此論却是一篇勸戒文不獨生脫疽者然也

### 脫疽看法

起疽不渴口潤舌和性志尋常無妄暴急循循爲吉初出形如麻子掀熱作痛一指皆腫根脚收束者吉已成頭便作腐內不紫黑疼痛有時臙出腫消者吉已潰先臙後腐內色紅活毒不走散氣不腥穢者吉未癰先渴喜冷無度晝睡舌乾小便頻數陽瘻者逆初起形如粟米肉便紫色不顯刺疼黑氣延散者逆已成瘻形枯爛

用辛熱散寒活血熏洗等藥不應又延黑脚面骨節一段甚疼余曰後必十指齊脫其生疑爲脫疽余曰似是而非尚可不妨令常用桑木火灸之取其溫暖活血又能解散鬱毒患處漸腐漸脫自不走散內服健脾養血之藥外用紅黑二膏生肌百日外愈

徐曰此凍極血凝之症

一侍女年十二歲貌頗美主嫌腳大用布任意纏緊以線密縫脹痛不堪訴主不聽半月後流出臭水方解視之雙足前半段盡皆黑腐骨肉已死余曰已壞者不可復救只救未壞者可也先煮麥粥食之次煎葱湯令主家僕婦將兩足浸入湯內淋洗再換湯浸但腐肉不痛者逐一翦割連續知痛者以花蕊石散搽之俾將壞者復生已壞者得脫內服補中益氣湯外擦生肌玉紅膏此與前案男僕雖俱得愈俱廢疾終身

一男子右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰疼不腫有如刀刺視其形色眞脫疽也診其脈又細數無力此腎經敗症詢知生平大飲內有妻妾三人精力已竭縱治無功遂起辭之後延至腳面足底皆穿疼痛不止飲食日少氣血日衰形體日削一月後百苦而終

徐曰此陰毒之症多不治

### 脫疽主治方

解毒濟生湯解毒濟生湯花萼  
知柏二花兼遠志  
附粉紫草歸漢冬

心志恍惚不寐者

川芎 當歸 黃柏 知母 天花粉 金銀花 麥冬 遠志 柴胡 黃芩  
犀角 茯神各一甘草 紅花 升麻升麻手指 牛膝足指加各五分 水一茶鍾煎八分臨服入童便一杯

隨病上下服

徐曰藥味甚雜不足法

陰陽二氣丹

陰陽二氣丹 淳瀉天冬 冰柏元參青黛同人中甘草有殊功

治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾至飲冰雪不知

其冷此孤陽獨旺宜服此解之

天冬

搗膏 麥冬

搗膏

五味子

生用研

元參

湯泡去根皮

青黛

色墨

甘草

桔梗

辰砂

爲衣

澤瀉

各三錢

冰片

一錢

各爲細末同元參二冬膏子加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其效如神

徐曰此方無法不可學

清神散

清神散內半硃砂 豆粉 梅花冰片加解毒更兼甘草節 諸瘡煩惱自然痊

不食

治脫疽疔瘻發背毒積甚者

理發越不盡煩躁悶亂睡則謔言嘔吐

甘草五錢

豆粉

梅花冰片加

三錢

人中白

小兒潤者

元參

湯泡去根皮

青黛

色墨

桔梗

徐曰此治熱毒犯心經之方

雌雄麝靈火

雌雄麝靈火純陽

麝香

二錢

丁香

一錢

雄黃

三分

雌黃

各二錢

麝香

一錢

右四味共研極細搓入艾中作黃豆大丸放於患上

灸之毋論痛癢以肉焦爲度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛爲妙免後仍用提

疗麥子貼上膏蓋次服蟾酥丸及解毒濟生湯回活色有驟爲妙

徐曰陰症灸法

金匱戊土丹

金匱戊土丹五味

牛黃神志冰麝香

石菖蒲與人中黃

治脫疽及疔瘻發背先因縱食膏粱厚味法酒又或丹石補藥

勉力入房多致積毒臟腑久則胃汁中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中消腎饑飲多乾能食多

瘦九竅不通醫忤健忘見此諸症後必發疽多難治療宜預服此可轉重就輕移深居淺又解五金八石之毒藥也

內黑皮焦痛如刀割毒傳好指者逆已潰肉枯筋腐血水臭汗疼痛應心零仃徹骨者逆

### 脫疽治法

脫疽多生足指少生手指初起水竄黃泡者卽灸之初生如粟變可容穀皮色紫赤不作撮腫髮孔仍灸已灸之後瘡受火氣發泡作臘外藥罐之內兼補托毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻脚面者評議割取既割之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水破後氣血受督脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡臥不寧日晡發熱疼痛苦楚煩悶譴妄俱宜大補氣血貴貴及膏梁素蠶色慾每於房術縱恣日久禁行割法

徐曰看法與諸証同治法前已說明重明不必

### 脫疽治驗

一男子年近五旬右足小指初生如粟米形漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也用艾光明灸十三壯始大痛乃止又用針刺灸頂貼蟾酥餅膏蓋其餘紫腫用拔針鑿刺七八處發泄毒血用蟾酥  
人參二解其表證次用黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又用托裏消毒散加金銀花牛膝數服早  
字徐勤用八味丸晚用蟾酥丸相兼服之隨又針刺徐曰針刺本不必泄其毒氣解毒爲驕腫方不散後用十全大  
湯此四字加山萸五味徐勤麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不針灸發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻之必傷元氣豈能保乎

徐曰此證並非脫疽乃濕毒也總解毒清火藥卽愈因誤治遂成大證

一客商右足次指生一紫泡癢痛異常次日指甲俱紫欲黑余曰此乃肝腎二經之毒甲乃肝之餘氣甲紫則  
所受毒也骨乃腎之餘腎傷則骨黑彼問何以致之余曰凡人勞疲筋力傷於肝誤服熱藥傷於腎此句徐勤  
批曰名醫

旁人曰情實有此彼久客狎妓常服興陽細丸恣情取樂已二年矣余欲辭不治彼哀告求生冀得還鄉余令先取妓者頭髮十餘根擦線纏扎患指盡處隨將艾炷在紫色處排勻三炷每灸七壯各貼蟾酥餅膏蓋過夜一指皆黑是其筋骨皮肉俱死用利刀順節取脫患指徐曰此乃冰冷惡物預煎甘草湯浸洗良久候疾迫稍盡以止血散繆之次日灸處紫色不退恐其上延又以神燈法照之候血散皮綱合蟾酥丸料多加海羊研爛敷之早晚二次腫不復作紫色變紅紅色潰爛外用生肌止痛活血收斂之藥又熬參朮地黃膏丸服接補真元午服健脾藥以固胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月而愈或問用妓髮何也余曰以彼心愛之髮貼肉雖疼而不疼徐曰神其說以欺人妓又如在目前此妙用也

一婦中年肥胖患渴三載右手食指纏養月餘節間生一小泡隨後本指漸腫疼痛不堪原泡處生黑斑半指已變紫黑此亢陽之極乃成脫疽脈洪大數而有力與肥人相反如再黑色上延壞人迅速詢知此婦本富室無嗣口縱膏梁冬熾爐炭又多服種子熱藥中年喪夫家業爲嗣子蕩盡久懷憂鬱後與寡母同棲身耽寂寞此先富後貧所願不得又爲失榮證辭不可治再三哀懇余乃遵孫真人治法在肉則割在指則切先服人參養榮湯隨用軟絹條尺許纏裹黑色盡處好內節上以漸收緊次用利刀放淨依節切下將手浸甘草溫湯中片時血出不多疼亦不甚余曰切而不痛此爲風血筋骨俱死此指雖脫未可得愈因以八味丸科八味丸徐加人參麥冬大劑煎服先救腎水次扶脾胃間用金液戊土丹以解藥毒後三日將纏裹處漸漸放鬆以通血脉搽貼紅黑二膏生肉止痛既而手背手掌日漸發腫勢惡之甚惟不黑色此內毒已出之故仍用神燈服法搽以猪蹄湯淋洗其腫處又出數流去膿血無數兩月方得腫稍退膿稍減又以參朮膏人參養榮湯兼服半年外始愈而指失矣

徐曰此脫疽之類也

一男僕冬月嚴寒主使赤足履地不敢移血凍麻木一日十指俱紫又數日全變黑色麻木不癒請余視之強

入中黃

錢法在

烏梅肉

芥連

胡黃連

五味子

附一石菖蒲

辰砂

雄黃

遠志

各爲淨末配準前數共入乳鉢內再研于端午七  
夕或二至二分吉辰在淨室中先將烏梅地黃二膏搗極爛和藥漸加煉蜜少許徐徐添搗軟硬得中每藥  
一兩分作十九金箔爲衣每服一丸用人乳童便共一大杯化藥隨病上下食前後服之此藥最解營梁金  
石藥毒殺三戶除勞熱極有奇功又治煩顛安神志辟瘡瘍及諸邪魅譎語失心喪志者俱效修合之時  
服藥之際俱忌婦人僧尼孝服雞犬等見之此藥用蠟封固收藏不泄藥味愈久愈效

徐曰此亦通治之方此等前已有相案全生集載脫疽治法大人以陽和湯小孩以小金丹最得者以犀  
黃丸皆可消之如色紅者即非脫疽當作瘻治又案歌有麝香而方無之方有胡黃連而歌無之製法有  
地黃膏而歌與方皆遺之

脫疽應用方

針刺法 蟬酥丸 蟬酥餅見疔瘡門 蟬簪丸 神燈照法 太乙膏 真君妙貼散 內疎黃連湯 托裏消  
毒散 猪蹄湯 玉紅膏見腫瘡門 十全大補湯 參水地黃膏 人參養榮湯 補中益氣湯 加減八味  
丸見癰瘍門 桑木灸法見腦膜門 人參敗毒散見時疫門 如聖金刀散 花蕊石散見金瘡門

硝石

各三錢

牛黃


冰片

各一錢

金消

二十張爲衣

各爲淨末配準前數共入乳鉢內再研于端午七



明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯許光煥實訪校

瘰癧類第二十六

編辛木訂

夫瘰癧者有風毒熱毒氣毒之異又有瘰癧筋癧瘀癧之殊風毒者外受風寒伏於經絡其患无寒後熱結核浮腫熱毒者天時亢熱暑中三陽或內食膏梁厚味釀結成患色紅微熱結核堅腫氣毒者四時殺厲之氣感冒而成其患耳項胸腋驟成腫塊令人寒熱頭眩項強作痛瘰癧者累累如貫珠連接三五枚此不作寒熱其患得於誤食蟲蟻鼠殘不潔之物及宿茶陳水或內有汗液其患先小後大初不覺疼久方知痛筋癧者憂愁思慮暴怒傷肝蓋肝主筋故令筋縮結蓄成核生於項側筋間形如棋子堅硬大小不一或陷或凸久則虛羸多生寒熱勞怒則甚痰癧者飲食冷熱不調饑飽喜怒不常多致脾氣不能傳運遂成痰結初起如梅如李生及徧身久則微紅後必潰破易於收斂凡觀此症分別施治風毒者散其風除其濕如防風解毒湯是也熱毒者清其脾瀛其熱連翹消毒飲之類是也氣毒者調其血和其氣霍香正氣散之類是也瘰癧者散其堅和其血散腫潰堅湯之類是也筋癧者清其肝解其鬱柴胡清肝湯之類是也痰癧者豁其痰行其氣芩連二陳湯之類是也又有寡婦尼僧鰥夫庶妾志不得發思不得遂積想在心過傷精力此勞中所得者往往有之最爲難治宜先養心血次開鬱結益腎安神疎肝快膈如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木香之類是也又男人不宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗盜汗女人又忌眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦有此後必變爲癆瘵難治之症體實者初起可服散腫潰堅攻利之藥得效者十中三四有不察虛實盡劑追伐損傷元氣致成壞病者十有八九此非患者之命自由誤於醫人之手予常治初起成核服前藥未效者用針刺核內深入三四分用冰蟾散擦成條挿入核內糊紙封上待至二七後核子自然落出隨用紅黑二膏搽貼內服補劑不久便愈常見有用斑蝥牽牛巴霜大黃等藥追餌多致危亡切宜戒之

徐曰此篇論甚詳備 又曰實症結瘀乃可用冰蠅散此方本治此症之藥也 桶案實症結瘀用冰蠅散

不若用余所製消核膏爲安仍須內服子龍丸

即控涎丹方見卷二消核膏方見後

### 瘰癧看法

初起核高腫痛色紅軟活微作寒熱肩項不強者順已成根不堅硬內無小核羣生脾健氣血不衰者順已潰  
膿稠肉色紅活核腫漸消肩項自便漸斂者順潰後易消易斂氣體平和胸膈寬利飲食知味者順未成形體  
消瘦寒熱往來結核頑硬痰癥相兼者險已成核堅連續如珠大小不等項強筋急脈虛者險已潰膿水清稀  
肌肉消鑠自汗盜汗寒熱不睡者逆潰後陰虛煩躁作渴大便泄小便祕男子骨蒸女人經閉俱逆

徐曰看法與別症同

### 瘰癧治法

初起腫痛憎寒壯熱四肢拘急項強頭眩者表散之腫硬發熱便利口乾胸膈不利惡心脈實者宜利之膏梁  
厚味醕酒積熱濕凝結而成者宜化痰降火清中憂思過度鬱怒傷肝筋縮結核者宜養血開鬱疎肝房慾  
勞傷陰虛肺熱自汗咳嗽形體消瘦者滋腎健脾失利亡名懷抱鬱結積想在心所如不得乖隔陰陽虛熬歲  
月而得者精血俱傷先養正氣次治標病堅而不潰腐而潰之潰而不斂補而斂之皆活法也

### 瘰癧治驗

一 男人項核腫痛拘急惡寒用荆防敗毒散二劑表症悉退餘核不消用散腫潰堅湯加川芎香附貝母十餘  
服其核漸消外以琥珀膏貼之月餘而安  
一 男子仲冬渡江暴冒霧氣又值驚恐次日寒熱交作頭面耳項俱腫先用靈香正氣散二服寒熱即止面腫  
漸消惟項間堅腫不退紅掀作痛此毒聚必欲作膿仍用正氣散加芎歸皂刺數服候膿熟針之腫痛頓退  
又用十全大補湯丸健肌生完口

徐曰此風熱之毒只宜內消亦不必用十全大補湯

一婦婦居六載子幼未立憂鬱成核已半年兼經水不調寒熱交作形體消瘦脈亦弦數此勞傷氣血肝火妄動而或所謂損者益之不可用追蝕之藥損而復損先用逍遙散加香附牡丹皮貝母和其血脉疎其肝氣寒熱盡退次用益氣養榮湯服至月餘氣血漸復經事漸調元氣漸醒外用火針徐曰不必核上點破四孔用黃線藥挿入五六次以上九字徐勤候至孔大換用冰蠅散搽核上封之至十三日外其核自落外搽玉紅膏生肌收斂內服人參養榮湯加香附木香三十餘劑其口自完此婦憤起居忘七情戒口味盡調理故可得愈否則必不能矣

一室女年十七因父擇婿未遂就至二旬懷胞鬱久項生數核堅硬如石此肝經凝結筋縮之病也兼經水斷絕寒熱如瘡咳嗽脈數惟不額紅此陰虛火動已成勞瘵症也非藥能愈視其形狀喜無散色余曰欲治此病當先治其心父問曰何藥治心余曰非藥也易曰天地相溫萬物化醇男女構精萬物化生此天地男女生成化育之道也斯病起於孤陰寡陽不生不化所謂逆理之病由於女大失配是謂當至而不漸成失度之候此句徐曰其病不生而自生故藥不能挽回必得陰陽和而兩澤降此句徐曰夫婦和而家道成斯時方可用藥其父始悟隨卽擇嫁三月後復請余視前症稍定先用逍遙散加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疏肝塞熱漸止次以人參養榮湯丹皮加紅花通其血脈使心血易生容顏稍澤又用益氣養榮湯倍參丸徐曰不必培助脾胃增進飲食間用歸脾湯加麥冬五味遠志沙參收斂神氣寬慰性情又製參朮地黃膏服至半年精神頓復經事亦通惟核不能全退用火破一核針大針點破琥珀膏貼之漸腐爲臘又兩月而得收斂尚有三亦核漸針漸潰漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈

一男子年近三十項生數核面白神疲皮粗脈數此元氣受傷之症先當補養氣血待根本壯實再治其癥隨

用養榮健脾藥十餘劑末效彼以爲緩

徐曰此等  
人極多

又爲方士所惑冀圖內消自服斑蝥巴麝之藥

徐曰自取其死

連瀉

十數行後致小便淋漓不已更增虛熱飲食減少又復請視形色已敗辭而不治又請內科強投扶助降心之藥終不應而死

婦壯年性急大渴不爲家左項生核半載漸至雞卵大堅硬如石皮外紅絲纏繞左右脈俱弦數弦屬肝火妄動數乃脾熱之甚徐曰此本不治之症以後半愈而根不除所以復發卽治得法尙難收功况誤治乎用梔子清肝湯平伐肝木五服而脈始平又用清肝解鬱湯數服散其鬱結次用益氣養榮湯調其氣血間服散腫潰堅湯軟其堅腫外以琥珀膏貼之調理百日元氣乃復堅硬已消八九只存小核彼以爲愈止不服藥後一載因夫賭訟未勝暴急驚恐前腫復作兩手脉細而多數此陰血虧損陽火乘之非前有餘症也又兼胸膈不利飲食無味經水先期過多形容憔悴不澤此神傷於思慮則內脫意傷於憂愁則肢廢魂傷於悲哀則筋掣魄傷於喜樂則皮槁志傷於暴怒則腫脹不能俯仰以上俱七情內損症也法當滋養氣血調和脾胃益腎清心開鬱散滯庶保無虞彼不肯信仍欲服散腫潰堅之藥并灸腫處以圖內消余辭不治彼請客醫仍服前藥灸腫處并灸肘尖真氣虛而益虛邪氣實而益實反加發熱自汗咳嗽項強四肢不收灸瘡無膿血水不絕腫亦熾盛致成癰瘍已瘍之候又傳爲氣聲噎塞血交出而歿余嘗見病家及庸醫不辨虛實妄行用藥多致不救所當猛省 稽案中間引成語爲文其實此症無喜樂

瘰癧主治方

防風解毒湯

防風解毒湯辨證  
薄荷根梗各一錢  
知母連翹草石膏  
牛蒡連翹草石膏

治風毒瘰癧寒暑不調勞傷溼襲多致手足少陽分耳項結腫

或外寒內熱痰凝氣滯者

防風

荊芥

桔梗

牛蒡子

連翹

甘草

石膏

薄荷

枳殼

川芎

蒼朮

知母各一錢

水二茶鍾燈心二十根煎八分食後服

徐曰此風癰之方

連翹消毒飲

連翹消毒飲陳皮  
桔葛射干花粉等

甘桔元參芩芍歸  
紅花還與大黃隨

治熱毒瘰疬過食炙燙酒膏梁以致蘊熱腮項成核或天行亢

熱濕痰作腫不能轉側者

連翹

陳皮

桔梗

元參

黃芩

赤芍

當歸

山梔

葛根

射干

天花粉

紅花各一錢

甘草五分

大黃

初起便加  
者加之

水二茶鍾煎八分

食後服有癰者加竹茹一錢

徐曰此方通治之藥

加味霍香散

加味霍香散甘桔  
丸白芷附朴芎

青陳柴蘇半夏及  
夏枯草效爲君說

治氣毒瘰疬外受風邪內傷氣鬱以致頸項作腫肩膊強痛四肢

不舒寒熱如癰及胸膈不利

霍香

甘草

桔梗

青皮

陳皮

柴胡

紫蘇

半夏

白朮

茯苓

白芷

厚朴

川芎

香附

夏枯草各等分

蜜三片

棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服

滋榮散堅湯

滋榮散堅四物湯  
陳皮升麻香附貝

紅花昆布共煎醫

治一切瘰疬憂抑所傷氣血不足形體瘦弱潮熱咳嗽堅硬腫痛

無分新久但未穿潰者並效

川芎

當歸

白芍

生地

陳皮

茯苓

桔梗

白朮

香附各一錢

甘草

海粉

貝母

人參

昆布各五分

升麻三分水二茶鍾蜜三片棗二枚

煎八分食遠服身熱加柴胡黃芩自汗盜汗去升麻倍人參黃耆飲食無味加霍香砂仁食而不化加山楂

麥芽消膈痞悶加澤瀉木香咳嗽痰氣不清加杏仁麥冬口乾作渴加知母五味子睡臥不寧加黃柏遠志

棗仁驚悸健忘加茯神石菖蒲有汗惡寒加薄荷半夏無汗惡寒加茅朮霍香女人經事不調加延胡索牡

丹皮腹脹不寬加厚朴大腹皮

徐曰此等方藥味雖與瘰疬頗切然雜亂無章毫無主意凡外科之方往往如此皆因習外科之人不甚讀

書祇記某藥能治某病因而湊合互相傳習所以全無法度學外科者宜知之

益氣養榮湯

益氣養榮湯尤善

參苓陳貝附歸宜

抑鬱二

或勞

氣血或四肢頸項筋縮結成累累如貫珠

芍芍桔甘銀熱地

勞傷癰癧大堪施

字徐勑

治抑鬱

抑鬱二

或勞

氣血或四肢頸項筋縮結成累累如貫珠

者謂之筋癰此皆由思慮太過神氣受傷乃勞中所得也其患或軟或硬或赤或不赤或痛或不痛或日晡發熱或潰而不斂者是

人參 茯苓 陳皮 貝母 附香 當歸 川芎 黃耆 熟地 白芍各一錢

甘草

桔梗各五分

白朮二錢

薑三片

棗二個

水二茶鍾煎八分食遠服

徐曰此潰後補劑其藥亦不外諸味如胸膈痞悶加枳殼木香飲食不甘暫加厚朴蒼朮往來寒熱柴胡地骨皮膚潰渴倍參耆歸朮腹多或清倍當歸川芎脇下痛或痞加青皮木香肌肉生遲加白芍內桂痰多加半夏橘紅口乾加麥門冬五味子發熱加柴胡黃芩渴不止加知母赤小豆蔻不止倍加人參黃耆當歸潰後反痛加熟附子沈香虛煩不睡者倍人參熟地遠志棗仁

芩連二陳湯

芩連二陳湯半夏牛蒡木香兼甘桔

消痰散核效如神

治癰癰

生於少陽部分項側結核外皮漫腫色紅微熱或至缺盆

高骨上下發腫形長堅硬作痛名曰馬刀初起並宜服此已成氣弱者不宜

黃芩

黃連

陳皮

茯苓

半夏

甘草

桔梗

天花粉

牛蒡子

連翹各一錢

木香三分

夏枯草三錢

薑三片

水二茶鍾煎八分食後服津再煎臨睡服

徐曰此方重前諸方

散腫潰取湯

散腫潰堅芩芍歸知翹連柏三棱北

升柴贈草葛根隨

升柴贈草葛根隨

治療癰馬刀堅硬如石或在耳下或至缺盆或在肩上或至腋下

皆手足少陽經症又發於下頰或至頰車堅而不潰或已破流膿又屬足陽明症也此方治有餘之症效多

不足之症效少

黃芩八分

白芍

當歸

龍膽草

桔梗

知母酒炒黃柏酒炒天花粉

昆布各五分連翹

葛根 炙甘草 黃連 三棱酒拌炒裁茂各三分 柴胡四分 升麻三分 水二茶鍾煎八分食後服臨  
服入酒一小杯亦效此藥可爲末煉蜜爲丸桐子大每服八十九丸卽散腫潰堅丸治症同前臨睡食後俱白  
滾湯下

徐曰此方亦重

升麻散堅湯升麻散堅湯甘草 葛根荆防桔梗夏枯草 草芍歸芩共鹽 治瘰癧邊頸或至頸車屬足陽明核深陷隱曲肉底又屬足少陰俱作腫塊堅硬大小不一

升麻 甘草 菴述 三棱 陳皮 桔梗 黃連 龍膽草 葛根 白芍

夏枯草 連翹 黃芩 當歸 各五分 天花粉 有病加 水二茶鍾煎八分食後熱服再用上藥加倍

爲末蜜丸菉豆大每百丸黃酒臨睡服頭不枕更妙

徐曰義重前方

夏枯草湯夏枯草湯歸朮陳 捷甘生地貝母等 香附柴胡白芷芍 加上紅花效若神 治瘰癧馬刀不問已潰未潰或已潰日久成漏形體消瘦飲食不甘

寒熱如瘡漸成勞瘵重效

夏枯草二錢當歸三錢白朮 茯苓 桔梗 陳皮 生地 柴胡 甘草 貝母

香附

白芍各一錢白朮

茯苓

桔梗

陳皮

生地

柴胡

甘草

貝母

服將藥渣同前夏枯草渣共再煎六七分臨臥時入酒半小鍾和服宜食淡味物件

徐曰此亦此症之主劑

潤血化堅湯活血化堅湯朴芷 防桔粉陳皮草 乳香龍脂銀花使 治一切瘰癧及癰瘤痃核初起未潰者

防風

赤芍

歸尾

天花粉

金銀花

貝母

川芎

角刺

桔梗各一錢

僵蠶

厚朴

五靈脂

陳皮

甘草

乳香

白芷

稍各五分

水二茶鍾煎八分隨服用

酒一小杯食後服

徐曰義重前方不必存

逍遙散

逍遙散當歸芍藥丹皮薄荷甘草水

茯苓香附共柴胡婦女之病效可圖

治婦人血虛五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忡煩赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥及血熱相搏月水不調脅腹作痛寒熱如瘡及治室女血弱榮衛不調緩峻漸熱肌體羸瘦

漸成晉蒸

當歸 白芍 茯苓 白朮 柴胡各一錢 香附八分 丹皮七分 甘草六分 薄荷 黃芩

有熟分各五分

水二茶鍾煎八分食遠服有寒加薑三片棗二枚

徐曰此通治疎肝之方

通治癲癇方

通治癲癇方陳允苔正營香夏枯草

柴桔芩歸芍芍藥

治癲癇不分新久表裏虛實及諸癥結核並效

陳皮

白朮

柴胡

桔梗

川芎

當歸

白芍

連翹

茯苓

香附 神火

夏枯草

黃芩

各一錢 雪香

半夏

白芷

甘草各五分

薑三片

水二茶鍾煎八分入酒一小杯臨睡時服

徐曰諸方不出此隨症加減可也

芎歸養榮湯

芎歸養榮湯當九味

參芍砂仁熟地黃五味茯神丹遠志夢冬甘草共煎

體發熱惡寒肌肉消瘦飲食少思睡臥不寧盜汗自汗驚悸恍惚

歸身 二錢 人參 黃耆 白朮 川芎 白芍

各一錢

五味子

當歸

甘草

茯苓

各五分

牡丹皮

砂仁各三分

水二茶鍾煎三片棗二枚煎八分食遠服

徐曰重出

冰蠅散

冰蠅散內用田螺

白砒將來紙糊

治癲癇

日久堅癩不消及癲癇藥不效者用此點落癲核如馬刀根大

面小及失榮等症忌用

大田螺五個去殼日中擦穿鹽乾白砒一錢三分冰片一分礦砂二分

用鹽乾螺肉切片同燒熟白砒碾爲細末加礦砂再

碾小罐密收凡用時先用艾炷灸核上七壯次後灸瘻起泡以小針挑破將前藥一二釐津唾調成餅貼灸頂上用綿紙以厚糊封貼核上勿動七日後四邊裂縫再七日其核自落換採玉紅膏內服補藥兼助完口此藥又治癰瘻患大蒂小及諸般高突異形難狀者

徐曰點去惡肉亦不可少但不可輕試惡毒之肉乃爲合宜

紫蟹膏

或靈膏品不多般  
加入麻油如紫漆

銅綠松香一處鐵  
百般滋證貼當安

治療癰瘻初起未成者貼之自消已成未潰者貼之自潰及治諸色頭瘻腫瘻濕痰濕氣新久棒瘻疼痛不已者

明淨松香

淨末銅綠淨末  
一斤銅綠二兩

用麻油四兩銅鍋內先熬至滴水不散方下松香熬化次下銅綠熬至白烟將

盡其膏已成候片時傾入磁罐時湯內頓化旋轉旋貼

徐曰方極和平卽千挫膏之祖方也 又曰此方單重銅綠一味方簡而意深

琥珀膏

琥珀膏內桂防歸  
丁木二香草麻子

木通白芷共相隨 治瘰疬及腋下初如梅子結腫硬強漸若連珠不消不潰或潰後膿水

不絕經久不達漸成漏症

琥珀一兩木通

桂心

當歸

白芷

防風

松脂

礦砂

木鱉肉

草藥各五分

丁香

本香各二錢

麻油二斤黃丹

飛炒十

先用琥珀丁香桂心礦砂木香爲細末其餘切片

浸油內七日入鍋內慢火熬至羣藥焦黃爲度絹濾淨油餘下黃丹以柳枝手撮候至膏成滴入水中軟硬

得中撮下鍋來以盆頓穩攪至烟盡方下末藥撮勻磁器盛之臨時取少許難貼

大紅膏

大紅膏用竭銀砂  
膠粉南星併石礦

乳香樟骨醋調塗

硝石樟冰相與俱

治療癰瘻核結塊不分新久但未穿破者

南星二兩銀砂

血竭

硝石

樟腦各三錢輕粉

乳香各二錢貓頭骨一具石灰

一兩用大黃一錢切片  
同炒石灰紅色去大黃

右共爲細末陳米醋熬稠調藥敷核三日一換數後皮嫩微損者另換紫草膏貼之

其核自消 桐案銀硃猫頭骨石灰徐圈

火針法

火針之法獨辟雄  
燈草桐油相協方  
當頭一點核無蹤

破核消炎立大功

治瘰癧痰核生於項間初起堅硬或如梅李結聚不敢宜用此法針之指藥易消用繩衣大針一條將竹筋頭劈開以針雙夾繩內相離一分許用線紮定先將桐油一盞用燈草六七根油內排勻點著將針燒紅用手指將核捏起用針當頂刺入四五分核大者再針數孔亦妙核內或痰或血隨卽流出候盡以膏蓋之次日針孔必漸作脹輕者用黃線藥挿之核堅硬者用冰輪散糊打成條臘乾挿之外以糊紙二重封固次日其核發脹作痛不妨乃藥氣攻入於內又至七日外自然核外裂開大縫再至七日其核自落葱湯洗淨換用玉紅膏搽入外以膏蓋內服益氣養榮湯或十全大補湯加香附兼戒勞動氣惱房事發物煎炒海腥等件

徐曰強實人方可用 又曰此方治獨脚頑癰或可用

三品一條槍

三品一條槍最靈  
明礬白信煅成粉  
加上乳雄爲線藥  
疔瘡漏蘆根平

上品錠子去十八種痔中品錠子去五漏翻花癰瘤氣核下品錠

子治癰瘍疔瘡發青腫疽等症此爲古之三品錠子但藥同而分兩不同故治病有分別今方名三品一條槍隨症可用藥品又簡易而不繁此句徐勒

明礬二兩 白砒一兩 雄黃二錢  
五錢雄黃四分乳香二分

砒礬二味共爲細末入小罐內加炭火煅紅青烟已盡旋起白烟

約片時上下紅徹住火取罐頓地上一宿取出約有砒礬淨末一兩加入雄黃乳香共研極細厚糊調稠搓成如線條陰乾凡遇前症有孔者插入孔內無孔者先用針放孔竅早晚插藥二次自有孔以下十二字徐勒 插至三日後孔大者每挿十餘條挿至七日下徐勒 患孔藥條滿足方住以後所患四邊自然裂開大縫共至十四日前後其疔核癰瘍疔瘡漏管自然落下隨用湯洗搽上玉紅膏虛者兼服健脾之藥

徐曰此治惡毒頑瘍間有可用近日庸醫不論何瘍俱用此法殺人無算深爲可恨製方之人原只用以治

不知瘡癰之癥及死肌頭內誰知後世惡人竟視爲必用之品不得不歸咎於作倅者也 相案徐於此方之上加又又二字字旁又垂戒深矣

### 瘰癧酒藥方

治年久瘰癧結核串至滿項頑硬不穿破者

鶴虱草半斤忍冬藤六兩野蓬蒿四兩野菊花四兩五爪龍三兩馬鞭草一兩半 上藥切碎用醇酒十五斤將藥袋貯縣於酒內封好罐口煎三炷香爲度取起水頓浸一伏時初眠醉出汗爲效已後隨便飲之盡酒一料病愈不發

徐曰此所謂草頭方也藜藿之人用之竟有愈者若體虛之人用之竟有大害甚至於死余見極多所以患病之人斷不可聽傳聞之方而輕試也

相案

瘰癧一症內治固無速效之外治亦鮮良藥不獨火針三

品一條槍不可用卽所開琥珀膏內有木蠍壁虎蜘蛛等

全生集易名子龍丸

余試其膏蘊熱重者或反至紅腫蓋內有木蠍壁虎蜘蛛等

亦毒藥也偶聞人述一名醫言治瘰當加入消癰藥因悟各種結構皆有癰氣遂以控涎丹爲主加入麻黃

一味煎膏施貼甚效故友湯秀高又加入數味二十年來求者甚衆初起貼之卽消年久者可不再大以貼

乳核及各種結核無不其應如譽因名爲消核膏惟已潰者不可貼宜換用陽和解凝膏陽和膏已於卷二

附錄今將消核膏錄後

### 消核膏

製甘遂二兩

紅茅大戟二兩

白芥子八錢 麻黃四錢

生南星一兩

禹貢半夏一兩

殼鹽一兩 藤黃一兩

朴硝一兩

用眞麻油一斤先投甘遂南星半夏熬枯撈出次下僵蠶

三下大戟麻黃四下白芥子五下藤黃逐次熬枯

先後撈出六下朴硝熬至不爆用絹將油濾淨再下鍋熬滾徐徐投入炒透東丹隨熬隨攪下丹之多少以

膏之老嫩爲度夏宜稍老冬宜稍嫩膏成趁熱傾入水盆中扯拔數十次以去火毒即可攤貼宜厚勿薄此

膏妙在不用毒烈之藥雖好內貼之無損 案煎膏亦自有法藥有堅脆如一同投入則脆者先枯其勢  
欲燃不得不一同撈出然堅者實未熬透是銖兩雖多而藥味反少矣此方甘遂南星半夏最堅故先下僵  
蠶次之大戟麻黃又次之麻黃尤脆大戟熬至半枯時下麻黃更妙白芥子爆油故又次之藤黃多液而少  
渣故又次之朴硝無質故最後下凡煎他膏亦當如此 又案潰瘍諸膏皆不可太嫩以貼之即黏揭之易  
落爲度難時不可過厚嫩而過厚揭時非帶脫皮肉即黏住皮肉凡尋常熱瘡本可無疤而或生胬肉或如  
蟠鏡者皆膏藥之過也獨消核膏宜稍嫩但令貼時勿烊塌而已難須極厚蓋此膏本以代敷藥而厚則藥  
氣沈浸醜郁而能深入又皮肉如常帶脫無慮黏住可洗也 又案諸書皆言藥油煎至滴水成珠方下黃  
丹余歷試知其不然油至滴水成珠則已過老難之如麵筋一般無復黏性不能再下黃丹矣只須熬令濃  
黑便可下丹下丹最要耐性不可貪多貪快每次挑入少許不住手攬徐徐再加以老嫩適可爲度如此熬  
法又黑又亮又光其所以黑之功在久熬亮之功在多攬光之功在丹細而藥油瀝淨也滴水成珠四字卽  
下丹亦不可泥大抵膏浮水面以兩指取丸不沾手其膏已成倘一滴便直下水底成珠則膏已老矣 又  
案癰瘍治法諸書皆不甚相遠惟全生集特異初起小塊皮色不異者控涎丹每服三分淡豆湯送下日服  
三次至消乃止小孩不能吞丸者每日服小丹一粒眼法詳卷二其已潰爛間有成膿未潰者亦有未成膿者  
宜服犀黃丸止其已潰之痛鬆其成膿未潰之脹消其未成膿之核已成膿者兼用咬頭膏穿之日服溫補  
祛瘀通腠活血壯氣之劑外貼陽和解凝膏其延爛不堪至胸膈者一日服洞天救苦丹兩日服犀黃丸凡  
九日共服洞天丹三次犀黃丸六次皮色變白孔內紅活接服大棗丸肌肉漸長用生飴藥收功其爛潰不  
堪與內腑止隔一膜者以山蓮散摻之奇功立見尙有爛至咽喉者用量指炙法因原書敍述欠明白故不  
錄其治驗兩案附錄方後以備醫者參究

蜂巢要露天有子者雄者是鼠兩頭尖青皮

槐樹子立冬後採者佳

右藥瓦上各炙存性各研細末稱準等分研和每服

三錢陳酒送下醉蓋取汗

### 大棗丸

山羊糞 大棗 右將山羊糞曬乾入鍋炒炭存性悶熄磨粉收藏遇久爛不堪將見內腑者以大棗去皮核先搗爛如泥然後酌量入前粉搗至成丸每服四錢仍以黑棗湯送下

### 山蓮散

山羊糞 大活鯉魚一尾麝香一錢 右將鯉魚破腹去雜以山羊糞塞實魚腹瓦上慢火炙乾存性研末加入麝香再研磁瓶固貯勿泄氣

### 附錄全生集治驗兩案

一楓嶺閔姓年十七頸患瘰疬爛成牙片延至耳腋及腰如手掌大者數處瘦弱成怯初以洞天救苦丹與服毒水大流十日後以陽和湯醒消丸每日早晚各服一次又十日項能舒轉飲食日增接服大棗丸始終用荆芥湯洗以山蓮散敷外貼陽和膏凡九十日收功因未服子龍小金二丸毒根本除後腋生惡核服子龍丸而消

一王姓媳頸患瘰疬數個兩腋惡核三個又大腿患一毒不作疼癢百餘日後漸大如斗按之如石皮現青筋常作抽痛經歷數醫皆謂是癌余曰癌乃軟者世無石硬之癌此石疽也問可治否答曰初起時皆可消日久發大上現筋紋雖按之如石然其根下已成膜矣抽痛卽有膜之證也上現青筋者內作黃漿可治如上現小塊高低如石巖者不治三百日後主大痛不潰而死如現紅筋者其內已通血海不治倘生瘻點卽自潰之證潰卽放血三日內斃今所現青筋醫令至軟爲半功潰後釀漿濃厚可收全功乃以活商陸搗塗內服陽和湯十日而抽痛止十三劑裏外作療十六劑頂軟十八劑周圍皆軟其頸項之瘰疬兩腋之惡核盡

行消散無蹤止臍石疽起立則內臍袋下令服參一錢再行開刀因在筋絡之處先以銀針刺穿後以刀開其口以紙釘塞入孔內次日兩次流水斗許遂用大劑補托千金內托散刪去人參倍增生晉

善防風宜桂白芷厚朴川芎桔梗生甘草共九味生耆倍增須用一兩

媚案于金內托散用入參生黃

連進十劑相安已極適有伊戚亦業外科者令其耆草皆炙不三日四圍發腫內作疼痛復延余治仍令服前方耆草不炙又服二十餘劑外用陽和膏隨其根盤貼滿獨留患孔加以布綑綁人問因何用膏貼又加綑綁答曰凡屬陰疽外皮活內膜生故開刀傷膜膜爛則死所出之膿在皮裏膜外中似空衝又不能以生肌藥放入故內服溫補滋陰活血之劑外帖活血溫暖膏藥如以綑綁使其皮膜相連易於臍盡且又易於連接肌生耳果綑後數日內臍濃厚前方加參服兩月收功

### 癰癧應用方

玉紅膏

見臍門

朱胡清肝湯

見臍門

梔子清肝湯

見臍門

桔梗散

見臍門

防敗毒散

見臍門

十全大補湯

見臍門

歸脾湯

見臍門

### 癰疽論第二十七

夫癰疽者乃手少陽三焦相火妄動又兼腎虧不能生水或外受風熱所感但此經多氣少血肌肉最薄凡有

患最難腐潰此皆起於情性急暴房慾血虛火動肝氣凝結而成疽之初起寒熱交作頭眩痛微太陽甚則耳目連養通腫治法不可妄用針灸

此句徐闡批曰何以亦有此妙誤

此二句

必分陰陽表裏邪正虛實治之庶不有誤且如初見癰

時多寒少熱口乾作渴好飲熱湯六脈虛數無力其患堅硬不掀痛不潰無臍瘻根流散此乃真氣虛而邪氣實也治以托裏爲主消毒佐之

此二句

如清肝養血湯托裏消毒散之類是也又如見症時熱多寒少頭

徐闡

眩作痛口燥舌乾渴欲飲冷二便秘澀六脈沈實有力癰亦掀腫疼痛身體發熱易腐易臍根脚不開此乃

正氣實而邪氣虛也

字徐勒

治以消毒爲主托裏佐之

此二句

如梔子清肝湯梔子湯之類是也又有未

見癰時先作渴症或一年半載然後爲癰疽其形色多紫黑癰多平陷堅硬無臍毒流耳項又兼氣昧不正形容不澤精神不明飲食不進者俱爲不治

徐曰邪氣無虛之理必實字之誤經云邪氣盛則實正氣奪則虛最爲明曉 案正氣實而邪氣虛蓋言正氣盛邪不能勝耳著書者筆下欠清遂致辭不適意

### 癰疽看法

初起無口乾無寒熱飲食有味舉止如常者順已成瘍頭腫起根脚不散形色紅活掀痛濃膿者順已潰膿硬色鮮紅活腫消痛止項便頭輕口和者順潰後瘍內易腐新肉易生瘍口易平飲食有味者順初起瘍頭如粟頂軟不高色紫根散木痛食少者逆已成瘍形紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脈虛者逆已潰膿水清稀氣息臭穢壞肉不腐新肉不生者逆潰後飲食厭餐身體發熱口乾不眠肉削皮粗者逆

徐曰此亦與諸症同法

### 瘻疽治法

初起掀腫堅硬內熱口乾脉數有力邪實也當利之已成憎寒壯熱四肢拘急脈浮者邪在表也宜散之赤腫作痛血凝滯也宜散血清肝色黯漫腫宜升陽助胃已潰堅腫不退脈細而數日晡發熱者宜滋陰健脾胃肝膽怒火上攻心煩作踴腮額紅熱者宜抑陰降火已潰膿清腫痛尤甚虛煩食少者宜養氣血健脾胃潰後氣血俱虛身涼脈細大便多溏者宜峻補溫中潰後不斂新肉生遲瘍口淡白膿水不止宜健中補脾

徐曰亦與諸瘴同

### 瘻疽治驗

一男子患此三日掀腫寒熱脈浮數服荆防敗毒散一劑表症悉退腫痛不減已欲作膿服托裏消毒散膿消又服益氣養榮湯加麥冬五味漸斂而愈

一男子患此五日頂高根若錢大形色紅活此肝經濕爲患用繩子大艾灸七壯徐曰不服繩子清肝湯二劑必為腫勢稍止以蟾酥餅膏貼灸上更用柴胡清肝湯加白芷黃耆天花粉數服膿潰腫消半月愈

徐曰此極輕之症

一男子渴疾三年寒半月自以爲瘡瘍間忽生一小瘡三四日外形如粟瘡平堅硬此四字徐勒色暗不澤脈洪數而無力此水竭火旺之症終難潰斂不敢治另請他醫以爲易治用針刺腫處此五字徐勒去紫血鍾許內服解毒藥次日邊傍愈腫醫謂腫高屬陽易治其家懽悅又三日腮頭俱腫此四字徐勒口噤不食用針又刺腫上此六字徐又批曰本是死證行刺又速其死日加昏憒余曰死將及矣此症未病先作渴腎水已竭外形如粟裏可容穀形色紫黑氣敗血衰脈洪無力元氣內敗如此豈有不死者凡二十一日而歿

一男子腫掀五六日彼欲內消外敷涼藥徐又內服大黃泄氣等劑掀腫雖退乃生寒熱惡心乾嘔肩膊牽強診之脈數無力此內虛毒氣入裏涼藥之過也此五字東垣云瘡瘍之發受之有內外之別治之有寒溫之異受之外者法當托裏以溫劑反用寒藥攻利損傷脾胃多致內虛使外毒乘虛入裏受之內者法當疎利以寒劑徐曰瘡瘍總不宜寒清涼疎表之品爲安反用溫劑托裏使骨髓之毒外徹皮毛裏通潰共爲一瘡助邪爲毒苦楚百倍此八字徐密點批曰說得是輕則變重重則死矣前症既由寒藥之過投以托裏健中湯二服嘔吐全止又以十全大補湯加白芷數服而原瘡漸起又以人參養榮湯間服腐潰膜稠兩月餘收功 案徐批瘡瘍總不宜寒清涼疎表之品爲安足與全生集相發明

一婦人患此腫硬掀痛寒熱口乾脈洪大有力此表裏俱實也投以防風通聖散一劑便行二次前症稍退又一劑大行數次大行二字徐勒熱退渴止惟原瘡硬用銀針點破挿入蟾酥條此五字徐勒內服托裏消毒散漸潰膜而安案徐勒大行二字蓋表裏俱實稍泄其裏以疏表毒則可若大行則裏虛而表陷也前言瘡瘍總不宜蹇意亦如此

一男子患此三四日瘡高根活且無表裏之症此肝經濕熱爲患用針挑破瘡頂以蟾酥餅蓋貼此十二字徐勒批出微膿足矣內服加味逍遙散加皂角針數劑頭出微膿根腫亦消何必用此

瘡疽主治方

柴胡清肝湯

柴胡清肝草芍歸  
防風牛蒡天花粉

黃芩梔子地黃隨

川芎

當歸

白芍

生地

柴胡

黃芩

山梔

天花粉

防風

牛蒡子

連翹

甘草節各一錢

水二茶鍾煎八分食遠服

徐曰此瘡疽主方

梔子柴胡一味徐圈

鼠黏子湯

鼠黏子湯甘桔歸  
元參木通天花粉

赤芍連翹地骨皮  
防風大黃不可遺

治瘡疽初起熱多寒小頭眩作痛口燥咽乾渴常飲冷二便秘澀六

脈沈實有力煩悶疼痛者

鼠黏子

桔梗

當歸

甘草梢

連翹

元參

地骨皮

天花粉

防風

木通各一錢製大黃二錢

水二茶鍾煎八分食前服

徐曰同前

加味逍遙散

加味逍遙白朮芩  
當歸梔子地黃隨

紅花丹芍柴胡陳  
甘草羚羊角效更神

治瘡疽七日以上根盤深硬色紫掀痛者

白朮

茯苓

牡丹皮

白芍

柴胡

陳皮

當歸

山梔

天花粉

貝母各八分甘草

紅花

羚羊角

各五分

水二茶鍾淡竹葉二十片煎八分食後服

徐曰亦同前

梔案羚羊角徐圈

梔子清肝湯

梔子清肝湯柴芍  
黃連甘草丹皮等

牛蒡石膏等當歸  
火盛用之效最奇

治少陽經虛肝火風熱上攻遂成瘡疽痛連頸項胸乳太陽等處

或寒熱晡甚胸滿口苦舌乾

牛蒡子

柴胡

川芎

白芍

石膏

當歸

山梔

丹皮各一錢

黃芩

黃連

徐曰此治火盛者餘藥俱同前

甘草各五分

水二茶鍾八分食後服

清肝解鬱湯

清肝解鬱湯守歸人參牛夏丹皮附

川芎熟地草陳宜

治暴怒傷肝憂思鬱結致肝火妄動發爲鬱疽頭眩痛徹太陽胞

膚瘡連兩脣嘔酸水者

當歸

白芍

白朮

貝母

熟地

山梔各一錢半夏

人參

柴胡

丹皮

陳皮

香附

川芎各六分甘草四分

水二茶鍾薑三片煎八分食遠服

徐曰方雜

麥芽內托散

參芩內托散當歸  
熟地官桂甘山藥附子雪丹地骨皮

芩陳皮白朮隨  
附子雪丹地骨皮

治鬱疽已成堅而不潰潰而不斂氣血俱虛身涼脈細飲食少思

口淡無味及形體消瘦者

歸身

黃耆

川芎

陳皮

白朮

山藥

熟地

茯苓

人參各一錢

甘草

肉桂

熟附子

丹皮

地骨皮各五分

薑三片

蜜二個

水二茶鍾

煎八分食遠服

徐曰此治虛寒之症非治癥乃治本原也亦須備用

保安萬靈丹

見腫門

治寶疽初起憎寒壯熱頭眩惡心四肢拘急者

製疽應用方

托裏消毒散

見趣  
瘡門

荊防敗毒散

見時  
毒門

蟾酥餅子

見疔  
瘡門

人參養榮湯

托裏建中湯

益氣養榮湯

見瘡門

十全大補湯

見消  
瘡門

防風通聖散

見時  
毒門

人參養榮湯

托裏建中湯

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光煊實訪校

咽喉論第二十九

潤辛木訂

夫咽喉雖屬於肺然證有虛火實火之分緊喉慢喉之別又咽爲心肺肝腎呼吸之門飲食聲音吐納之道關係一身害人迅速故曰走馬看咽喉不待少頃也虛火之證色淡微腫脈亦細微小便清白大便自利此因思慮過多中氣不足脾氣不能中護虛火易至上炎其患先從咽喉乾燥飲食妨礙咳吐痰涎呼吸不利斑生苔蘚壅若蝦皮有如茅草常刺喉中又如硬物隘於咽下嘔吐酸水噦出甜涎甚則舌上白胎層生磬色聲音雌啞喘急多痰以上皆是虛火由元氣不足中來不可誤投涼藥此句徐又批曰風火要引來此句徐又批曰風火要引來此句徐又批曰收上午痛者屬氣虛補中益氣湯  
此二字徐勒批曰死八九牛蒡元參午後痛者屬陰虛四物湯加黃柏知母桔梗元參如不敷必加薑附以爲引導之用此句徐又批曰風火要引來此句徐又批曰風火要引來此句徐又批曰死八九亦爲佐治之法也佐治二字徐勒實火之證由於過飲醕酒縱食膏梁疊薄重食餌飧辛烈多致熱積於中久則火動痰生發爲咽腫甚者風痰上壅咽門閉塞少頃湯水不入聲音不出此爲喉閉卽緊喉風是也用藥不及事先用針刺喉間此句徐又批曰死八九發泄毒血見血者多死隨用雞翎蘸桐油探吐稠痰務使痰毒出盡咽門得鬆湯可入語聲得出乃止內服清咽利膈湯疎利餘毒如牙關閉難入必當先刺少商穴出血此句徐又批曰其閉自開如針刺探吐無痰聲如曳鋸鼻掀端湯水不入語聲不出者眞死候也又有喉癰喉瘻乳蛾上腭癰等證其患雖腫而咽門半塞半開其病雖凶而喉道又寬又腫此皆標病雖重無妨當用金鎖匙吐出痰涎利膈湯推動積熱脹脹痛者開之損而痛者益之其患自安凡喉閉不刺血二字徐又批曰死八九此皆非法又有火勞嗽咳傷咽痛者無法可治少商穴在手掌外側二分是去爪甲角

徐曰此篇所論服藥針刺等法皆殺人之利刃也人多祖此施治十死五六又曰此篇乃殺人秘訣不知

殺過多少傷哉 又曰喉證多端惟熱氣壅塞喉腫不通提痰無效乃用金針刺出紫血以洩其火又喉癰成釀塞住喉管當用坡針瀉其釀除此二者皆不可針針者十死八九或有病輕而不死亦必發作幾次而後除根并有變成喉痺而爲弱證者戒之

### 咽喉看法

初起紅色腫痛語聲清朗亦無表裏之證相兼者輕已成腫痛咽喉半閉半開咯吐痰涎飲食稍進者順咽喉腫閉牙關緊急言語不清痰壅氣急聲小者險咽喉驟閉痰涎壅塞口噤不開探吐不出喘喘者死時疫之後之後毒結咽間腫痛腐爛吐納不堪聲啞者重久嗽痰火虛陽上攻咳嗽痛但見聲嘶面紅者死

### 咽喉治法

初起腫痛寒熱交作頭眩拘急者邪在表也宜發散初起腫痛發熱脈有力而便秘者邪在內也宜下之三字  
批曰在上在表之邪禁下腫痛寒熱口乾作渴脈洪大而有力者宜發表攻裏咽喉腫痛痰涎壅塞口噤難開先刺少商此句徐國後行吐法已成脹痛咽喉壅塞湯水不入腹可針若無膿但腫針者多死宜急針之腫痛微紅脉虛無力午後痛者屬陰虛宜滋陰降火徐曰亦不得用滋膩藥腫痛色白咯吐多涎上午痛者屬陽虛宜補中健脾

### 咽喉治驗

一男子咽喉腫痛發寒體倦脈弦有力此邪在表以荆防敗毒散加牛蒡元參一劑表証已退腫痛未除又以元參解毒湯二劑腫痛減半又二劑而安

徐曰此風火極輕之証

一男子咽喉腫痛痰涎壅盛用金鎖匙先吐稠痰清咽利膈湯推蕩積熱腫痛稍減惟色紅甚此火熱也又以黃連解毒湯加桔梗二劑紅腫亦退而安

一男子素飲火酒一時咽喉腫閉口噤舌強痰涎壅塞勢頗危急用針先刺少商二穴此八字徐密點口噤方開以涼

銳蘸桐油探吐稠痰數碗語聲方出仍用針刺腫上此六字徐勤批曰不得輕用出紫血鍾許溫湯漱淨冰硼散擦之以涼

膈散加芒硝天花粉利去積熱又服連翹散二劑而安

一婦人肥甚暑熱咽間腫痛痰涎上壅語聲不出甚危先用針刺毒血此六字徐勤次以金鎖匙吐出稠痰五六碗

服清咽利膈散腫痛稍減去硝黃再服而安

一男子勞甚咽喉腫痛自服清咽利膈藥不應診之脈細而虛此勞傷虛火之証朝以補中益氣湯徐勤批升加麥冬五味子此二字徐勤批反真是以藥誤人此二字徐勤批桔梗元參晚以四物湯加黃柏知母炒黑乾薑乾姜一錢徐勤加蜜便服之不數日

腫痛消而咽愈

一婦人咽痛微腫色白吐痰不利診之脈亦細數此中氣不足虛火假証也用理中湯二服徐勤批亦有用之者其痰頓止又用補中益氣湯徐勤批亦可用之者

徐勤批

其痰不復作

一男子腫痛日甚服清咽利膈藥不應必欲作嘔用防風通聖散去硝黃二服喉嚨脹痛下針便愈此八字徐勤批曰有驗可

針

### 咽喉主治方

清咽利膈湯清咽利膈湯經引甘桔荆防梔薄銀

大黃牛蒡黃連等

朴硝加上黑元參

治積熱咽喉腫痛痰涎壅盛及乳蛾喉嚨腫重舌木舌或胸膈

不利煩躁飲冷大便秘結等証

連翹

黃芩

甘草

桔梗

荊芥

防風

山梔

薄荷

金銀花

黃連

牛蒡子

元參各一錢大黃

朴硝各二錢

水二鐘煎分食遠服

徐曰此咽喉主方但硝黃斷不可輕用

元參解毒湯元參解毒湯山梔葛根生地黃荆芥

甘草黃芩桔梗薄荷

竹葉心加入宜

治咽喉腫痛已經吐下飲食不利及餘腫不消

元參 山梔 葛草 黃芩 桔梗 葛根 生地

荆芥各一錢 水二鐘淡竹葉燈

心各二十件煎八分食後服

徐曰前方已

連翹散

連翹散內葛根等  
麥冬牛蒡同甘草

赤芍山梔桔梗升  
木通加上欒如神

表裏証相兼者

連翹 葛根 黃芩 赤芍 山梔 桔梗

水通各八分 水二鐘竹葉一千片煎八分食遠服

徐曰卽前方

涼膈散

涼膈散中蕷苓防  
元參石膏牛蒡子

薄荷粉桔梗大黃  
貝母山梔功效良

治咽喉腫痛痰涎壅甚膈間有火大便秘潤

防風 荆芥 桔梗 山梔 元參 石膏

薄荷 黃連 花紛 牛蒡子

貝母

大黃各等分 水二鐘煎八分服

徐曰此治實火之方

金鎖匙

金鎖匙中用雄黃  
加硫砂研細末

煅鹽冰片雄黃燒  
咽喉腫閉卽時消

治喉閉癰喉風痰涎壅塞口噤不開湯水不下

● 酸硝

兩半研細末

五錢冰片一分白僵蠶一錢雄黃三錢

各研爲末和勻以竹筒吹患處癰涎卽出如癰雖

出腫痛仍不消急鍼患處去惡血服前藥

徐曰此摻喉通治之方但只宜摻不宜吹吹則風入喉中心發噤而更腫其方亦甚多不得專恃此一方也

理中湯

理中湯內藥四錢  
加上人參水煎服

甘草乾姜白朮炭

虛陽之火立時竈  
此句

治中氣不足虛火上攻

以致咽間乾燥作痛吐痰妨礙及脾胃不

健食少作嘔吐腹陰疼等証

人參 一錢 甘草五分 乾薑五分

白朮二錢 炒黑

水二鐘煎八分食遠服

徐曰用此方者百不得一

桐油錢

桐油錢今桐油錢  
探吐頑瘞日照霜

回生起死真堪羨  
治喉風如神見

治喉風喉閉其證先兩日胸膈氣急呼吸短促驀然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治先用溫湯半碗加入桐油三四匙攪勻用雞翎蘸油探入喉中連探四五次其瘻湧出再探再吐以人甦醒聲高爲度後服清咽利膈之藥

徐曰此治喉間痰塞不能嚥藥之方

治喉烏龍散

烏龍散只二品薑  
開闢利膈效如神

處火實火要斟酌  
加上硼砂病自瘥

用猪牙皂角七條去皮弦爲粗末水一鍾煎五分入人乳三匙冷服卽時非吐卽瀉治咽喉腫痛涎壅盛喉風喉癰乳蛾等證並效惟經喉風牙關緊閉者不可與恐痰上

出而口不開此句徐園批曰壅塞無路而出故也除此皆效又久病咽痛忌用此句

徐園

徐曰此治風痰之法

神效吹喉散

神效吹喉散薄荷  
白礬火硝黃連等

加上硼砂黑朴硝和  
蠶蟻青黛火硝硼砂四味徐園

治繩喉風閉塞及乳蛾喉痺重舌木舌等證

薄荷

僵蠶

青黛

朴硝

白礬

火硝

黃連

硼砂各五錢

上藥各爲細末

臘月初一日取雄猪膽七八個倒出膽汁用小半和上藥拌勻復灌胆殼以線紮頭胆外用青缸紙包裹將地掘一坎闊深一尺上橫竹筋懸掛坎中以板鋪平用泥密蓋候至立春日取出掛風處陰乾去胆皮青紙盞罐密收每藥一兩加冰片三分同研極細吹患處神效

徐曰此方宜合備用

相案僵蠶青黛火硝硼砂四味徐園

少陰甘桔湯

加味甘桔湯黃芩  
川芎升麻併慈白

柴胡羌活元參陳少陰喉痛卽安寧

治少陰咽痛頭眩脈沈細而身猶熱者

桔梗二錢甘草一錢陳皮

川芎

黃芩

柴胡

元參各六分羌活

升麻各四分水一鍾

徐曰此方本仲景而失其旨

徐曰此方本仲景而失其旨

清音噙化丸

清音噙化丸詞子

天夢歸夢黃柏參

治肺氣受傷聲音嘶啞或久嗽咳傷聲啞亦宜

熟地各一兩

詞子

阿膠知母生熟地

烏梅人乳鹽牛津

治肺氣受傷聲音嘶啞或久嗽咳傷聲啞亦宜

熟地各一兩

人參三錢

烏梅肉十五枚

將藥共爲細末和入稠膏加煉蜜搗成丸如芡實

大每用一丸仰臥噙化日用三丸如改作小丸每服一錢詞子煎湯或蘿蔔湯送下亦可取效

徐曰雜亂

治暴失音方

暴失音方豬板油慢火煎至稠膏住

再加白蜜兩相投每日三匙不用薑

雄猪板油一斤入鍋先煉成油濾去渣入白蜜一斤再煉少頃縮

濾淨磁器內冷定成膏不時挑服一茶匙其音漸清無疾時亦可常服潤肺

徐曰此潤喉之法

噙化丸

噙化丸用白礬真膽草臺肉丸成就吐嚙酸澀第一方

治梅核氣乃痰氣結於喉中嚙之不下吐之不出如毛草常刺作癢新

則吐酸妨礙久成閉塞

瞻磬

硼砂

明礬

牙皂

雄黃

各等分爲末紅棗煮爛取肉爲丸如芡實大空心噙化

一丸溫黃酒一杯過口內服蘇子降氣湯

徐曰此藥入口即大吐不止作此等方者以意爲之並未自試也此等極多

蘇子降氣湯

蘇子降氣湯厚朴官桂一錢甘草半

陳皮半夏共前胡

治虛陽上攻氣不升降結患咽喉痰涎壅塞

蘇子一錢半厚朴

陳皮半夏前胡

官桂各一錢甘草五分水二鐘量三片煎八分食遠服

徐曰此方絕非治咽喉之方不可用

冰硼散

冰硼散效質堪誇五分冰片五硼砂

治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

冰片五分

硼砂六分元明粉

製法詳冰片硼砂各五分

共研極細末吹搽患處甚者日搽五六次最效

徐曰此亦通治之方

咽喉應用方

黃連解毒湯

見疔瘡門

防風通聖散

見門

荆防敗毒散

見門

四物湯

見門

補中益氣湯

見門

時毒論第二十九

夫時毒者天行時氣之病也春當溫而反寒夏宜熱而反涼秋當涼而反熱冬宜寒而反溫此四時不正之氣感於人而爲疾也宜分別陰陽表裏寒熱虛實施治初起與風寒相類惟頭面耳項發腫爲真此九字徐國其患寒熱交作體強頭眩浮緊數者爲邪在表以荊防敗毒散或萬靈丹發汗以散之如兩目鼻面漸次傳腫者乃正陽明受病其患掀腫發熱便秘口乾多熱少寒脈數有力爲邪在裏五利大黃湯四順清涼飲下之

又頭角兩耳前後結腫者乃手少陽經受之其患耳鳴筋痛寒熱嘔吐口苦咽乾煩躁時甚當以知母石膏湯小柴胡湯和之通用防風通聖散加牛蒡元參解毒攻裏勞役凶荒沿門闢巷傳染者醫濟消毒飲藿香正氣散以安之表裏俱解腫尚不消宜砭去惡血腫熱甚者如意金黃散敷之微熱不紅堅硬者沖和膏選而用之自後仍不消者必欲作臘宜託裏消毒散加白芷皂角鍼託之已潰體倦食少者補中益氣湯臘穢脾虛食而嘔吐者香砂六君子湯潰而不斂者十全大補湯又有毒中三陽自項以上俱發腫者光如水色雙目合縫脣似猪形口角流涎腫不消潰聲音不出飲食不入咽喉腫閉關難開破流臭水穢氣連縣不絕者俱爲不治

徐曰此乃時行濕毒之氣發於頭面世所謂大頭證是也以其能作臘出毒故入外科

時毒看法

初起寒熱交作頭面一處作腫紅赤發熱疼痛者輕已成高腫發熱疼痛有時語聲清朗湯藥易入者輕已潰爛稠堅腫漸消疼痛漸減飲食漸進身溫者吉潰後臘水漸止腫退肌寬神彩清甯睡臥安穩者順初起多寒少熱頭面耳項俱腫光如水晶不熱者險已成漫腫無頭牙關緊閉湯水不入聲音不出者逆已潰臘水清稀

氣味敗臭腫痛不除如尸發肿者死瀆後臭水淋漓腫不知痛手足多冷常出譖言者死

### 時毒治法

寒熱交作頭眩體痛六脈浮緊邪在表也宜汗散之頭面赤腫作痛口燥咽乾大便秘實邪在裏也宜下之外有寒熱內亦口乾脈弦有力表裏俱實宜發表攻裏表裏俱解腫痛仍不消者乃瘀血凝滯宜砭去惡血砭血之後腫痛不消者欲作膿宜託膿健脾腫日甚而脹痛者已有膿急鑑之更兼補託調理脾胃潰後腫痛不減膿清腥穢脾胃弱也更宜溫中健脾胃年時毒流行傳染者忌用攻發當和解兼養正氣

### 時毒治驗

一男子耳環腫痛發寒熱脈浮數以荆防敗毒散一劑寒退熱存又以連翹消毒飲一劑便行三次內熱頓退餘腫不消本方去大黃加川芎數劑而愈

徐曰輕證

一男子先發寒熱次日頭面俱腫又二日口噤湯水不入診之脈洪數而有力此表裏俱實也又咽喉妨礙湯藥難下先用針刺咽間去惡血鍾許此二句徐又批曰必死不死者幸耳牙關稍開用防風通聖散一劑徐徐服之便去三四次腫上砭去惡血以金黃散敷之次日腫勢稍退又用普濟消毒飲二劑面腫漸消惟兩耳下堅腫不退此必作膿又用託裏消毒散數服候膿熟而針之膿然二字徐審圖次用十全大補湯去肉桂加陳皮十餘劑而效

一男子牙根腫痛次傳腮頸俱腫頓生寒熱此陽明熱上功用荆防敗毒散加石膏一劑石膏一味徐勤批曰初起不得用寒藥寒熱頓退腮腫不消以針刺牙根腫上此七字徐密點批曰牙根可針出毒血以冰硼散擦之外敷真君妙貼散內服牛蒡子湯數劑而愈

一男子冬月耳面赤腫發熱口乾脈洪實而便秘此三陽蘊熱證也必捨時從證治之以五利大黃湯一劑便行二次赤腫稍退內熱稍疎又以升麻解毒湯二服腫亦消而病愈

一婦人冬月面腫咽痛口噤難開診之脈洪數有力又見房中暖氣如蒸此爐火盛也用黃連解毒湯加元參一劑次日腫消咽利又服二劑全愈

徐曰此偶觸火邪之輕證

一男子勞甚鬢間腫硬內色不變余曰勞傷氣血濕痰凝滯之證與外感時毒不同又診脈細數而無力爲內傷損病治當養氣血調經脈理勞績損彼欲內消自服仙方活命飲二劑腫不見消脾胃已損又請一醫乃行攻利復損臟腑徐勒此八字數日後飲食不進便泄不止徐曰此必死之證腫硬愈堅拔逆愈甚復請余視之余曰今不可治凡病有主末治有權宜此病初起肉色不變者血不足也堅硬不熱者脾胃弱也脈細數而無力正氣氣衰也豈可用有餘之藥以攻不足之病旋又強溫中補劑不應而死 案此條當入鬢門時毒主治方

荆防敗毒散

荆防敗毒散桔梗茯苓根葛同甘草

羌獨前柴芩人參  
寒甚加葱薑力行

治時毒初起頭眩惡寒腮項腫痛脈浮者

荊芥

防風

羌活

獨活

柴胡

川芎

桔梗

茯苓

枳殼各一錢

甘草

人參各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服寒甚加葱二枝

徐曰此爲主方惟人參不宜輕用

五利大黃湯

五利大黃湯黃芩升麻桔梗柴芩人參

時毒城腫大便秘  
實驗用之即安甯

治時毒掀腫赤痛煩渴便秘實有力者

大黃

燒黃芩

升麻各二錢芒硝

梔子各一錢

水二鍾煎八分空心服未利者瀉再煎服

徐曰此治陽明熱毒之方大實熱者可用

連翹消毒飲

連翹消毒飲芍藥  
黃芩花粉桔梗草

升麻大便秘  
實驗用之即安甯

治時毒表裏二證俱罷餘腫不消疼痛不退者

連翹

川芎

當歸

赤芍

牛蒡子

薄荷

黃芩

花粉

甘草

枳殼

桔梗各一錢升麻五分

水二鍾煎八分食後服便燥者加酒製大黃

徐曰卽前方意

防風通聖散

防風通聖大黃芍  
桔梗梔子白朮  
荆芥麻黃滑石膏

薄荷青葛草朴硝  
荊芥麻黃滑石膏

治時毒發寒發熱煩躁口乾表裏脈證俱實者

防風

白芍

薄荷

川芎

白朮

當歸

連翹

荆芥

麻黃

滑石

石膏

甘草

芒硝

一錢大黃酒炒  
五分一錢

水二鍾煎八分空心溫服

徐曰此乃治表裏俱熱之方所謂兩解法也須審定內外俱熱之證乃可消息試用

普濟消毒飲

普濟消毒飲芩連  
柴桔翹藍併馬勃

元草參陳半夏橘  
升麻僵蠶共水煎

治時毒疫癰初覺憎寒發熱肢體沈重次傳頭面作腫或咽喉不利舌乾口燥煩渴不寧者

黃芩

黃連

各二人參一錢  
錢人參一錢去白元參

甘草

柴胡

桔梗

連翹

牛蒡子

馬勃

板藍根

升麻

僵蠶

各五分

水二鍾煎八分食後服如大便燥加酒煨大黃一錢或二錢以

利爲度腫勢甚者宜砭去惡血

徐曰此治陽明熱毒之方亦治危急咽喉證 又曰此方甚雜當對證選用 相案元參牛蒡子馬勃板藍根升麻僵蠶徐國王君謂方中升藥太多用者極宜斟酌

通氣散

通氣散內用延胡  
川芎牙皂共爲末

羊蹄躅花與藜蘆燃於鼻內嚥沾滿

治時毒挾腫疼痛咽喉不利語言不爽者

延胡索一錢半川芎

牙皂各五分桑蘿三分躑躅花二錢半共爲細末用紙搘蘸藥少許于鼻內取喚爲效

徐曰備用可也

托裏消毒散

見附  
瘡門

治時毒表裏俱解腫尚不退欲作膿者

牛蒡子湯

牛蒡子湯首萬根  
貴衆甘草各等分

豆豉須用江西橘  
鹽當時毒可安雷

治時毒熱甚腫痛脉數而無力者

葛根

貫眾

甘草

江西豆豉

牛蒡子

半生半熟研各二錢

水二鍾煎八分食後服

十全大補湯

見附  
瘡門

治時毒潰後膿水清稀形容消瘦脾胃虛弱飲食減少虛熱不睡自汗盜汗及不收斂者

時毒應用方

金黃散

見腫  
瘡門

黃連解毒湯

見疔  
瘡門

冰硼散

見咽  
喉門

升麻解毒湯

見楊梅  
瘡門

真君妙貼散

見腫  
瘡門

癰瘤論第三十

夫人生癰瘤之証非陰陽正氣結腫此句徐勑乃五臟瘀血濁氣痰滯所成癰者陽也徐曰癰瘤二證倒說了色紅而高突或蒂小而下垂瘤者陰也徐曰此句當批曰不通作瘤者陰也色白而漫腫徐曰瘤亦有根大肝統筋脈動肝火血燥筋掣曰筋瘤心主血暴急太甚火旺逼血沸騰復被外邪所搏而腫曰血瘤脾主肌肉鬱結傷脾肌肉消薄上氣不行逆於內裏而爲腫曰肉瘤肺主氣勞傷元氣腠理不密外寒搏而爲腫曰氣瘤腎主骨恣慾傷腎腎火鬱逼骨無榮養而爲腫曰骨瘤余謂筋瘤者堅而色紫纍纍青筋盤曲甚者結若蚯蚓治當清肝解鬱養血舒筋清肝蘆薈丸是也血瘤者微紫微紅軟硬間雜皮膚隱隱繩若紅絲擦破血流禁之不住治當養血涼血抑火滋陰安斂心神調和血脈本連二母丸是也肉瘤者軟若懸硬似饅皮色不變不寬終年只似覆碗然治當理脾寬中疎通戊土開鬱行瘀調理飲食加味歸脾丸長也氣瘤者軟而不堅皮色如故或消或長無熱無寒治當清肺氣調經脈理勞傷和榮衛通氣散堅丸是也骨瘤者形色紫黑堅硬如石瘤高起推之不移昂昂堅貼於骨治當補腎氣養血行瘀散腫破堅利竅調元腎氣丸是也此瘤之五名治瘤之五法徐曰諸瘤皆始聚頑又立齋云筋骨呈露曰筋瘤赤脈交結曰血瘤皮色不變曰肉瘤隨憂喜消長曰氣瘤堅硬不可移曰石瘤此瘤之五名也通治瘤瘤初起元氣實者海藻玉蘆湯六軍丸久而元氣虛者琥珀黑龍丹十全流氣飲選服自然縮小消磨切不可輕用針刀掘破此句出此句多致立危久則釀血崩潰滲漏不已終致傷人又一種粉瘤作紅粉色多生耳項前後亦有生於下體者全此句徐是蠟氣凝結而成宜拔針破去脂粉蜜蠟此句徐以三品一條槍插入數次徐勑以淨內膜自愈又一種黑砂瘤多生脣腮腫突大小不一以手攝起內有黑色是也亦用針刺內出黑砂有聲此句徐密點軟硬不一又一種髮瘤

多生耳後髮下寸許軟小高突按之不痛亦針之粉髮齊出又一種蛆蟲瘤生於脇下又一種蛆瘤連生肩  
膀以上數瘤詳在後治驗中非謬也予觀古又有風瘤焉要皆五臟濕熱邪火濁氣瘀血所感而成非正病  
也

### 瘻瘤看法

初起紅色光亮微熱微痛根脚浮淺不堅實者輕已成紅赤高腫作熱掀痛頂破皮穿膿潰腫消者輕已潰膿  
稠色鮮根脚縮小內肉漸生外皮漸緊者順潰後氣體平和飲食如故腫消痛止口平收斂者順初起肉色不  
變寒熱漸生根脚散漫時或陰痛者險已成堅硬如石舉動牽強咳嗽生痰皮寒食少者逆已潰無膿惟流虛  
水腫不消痛不止脾氣衰弱者逆破後血水不止腫硬更增腐不脫魄氣惡心者死

### 瘻瘤治法

初起無表裏之証相兼但結成形者宜行散氣血已成無痛無癢或軟或硬色白者凝聚也宜行痰順氣已成  
色紅堅硬漸大微癢微疼者宜補腎氣活血散堅形如茄蒂瘤大下垂者用藥點其蒂茄落生肌收斂已破流  
膿不止瘤仍不消宜健脾胃爲主佐以化堅己潰出血不常瘤口開泛者宜養血涼血飫以清肝潰後瘤腫漸  
消脾弱不能收斂者補腎氣兼助脾胃

### 瘻瘤治驗

一男子醫瘤五年形如覆盤按之隱隱黑色此黑粉瘤也以針破之按出黑砂兼黑粉共約碗許用三品一條  
槍挿入患內此九字徐勸批曰十餘日每次捺出黑膜其瘤漸消內服十全大補湯健脾胃養氣血月餘而  
效

一男子腮上生瘤半年形若覆桃皮色不變按之微紅此粉瘤也針破之搽去脂粉挿前藥半月而愈  
一義烏兵士肩胛下連生小瘤五枚三月後發癢異狀以手刮之呻吟攻動如蝦余謂此必有異蟲以針破其

一枚先出紅水一匙少頃取出黑嘴紛紅蟲一條徐曰  
奇證形如蛆樣長六七分又破一枚亦然其人漸覺昏暈此泄氣之過也餘瘤停針服補中益氣湯加味劑用膏蓋已針者又五六日病者方健漸次破之仍用補藥十餘服而愈

徐曰確有此證乃蟲瘤也

一婦人及一女子耳後髮際下一寸各生一瘤半年餘漸大用針破之先出脂粉後出頭髮數根徐曰  
奇證長約二尺餘齊根翦斷出血少許俱用挿藥數日化出內膜而愈以此觀之知有髮瘤也

一婦人腰間生一肉瘤三年餘方漸微痛一日潰後出小蟲三條長約五寸置溫湯湯中游動半時方息時病者形體衰弱面黃肌瘦朝以八味丸八味丸  
徐勑午用人參養榮湯人參養榮  
湯徐勑服至百日外元氣漸醒又百日其口

方收余意其蟲乃經絡氣血所化

徐曰此亦奇證余見一人有蟲數十條肚皮內各處攻到以藥敷之則遷往他處已愈其半而此人一去竟不復來不知其愈否

一婦人氣衝穴生瘡紅紫堅硬乃血瘤也心肝二脈俱已洪數此心氣鬱結肝氣受傷之故辭以不治後請京師一醫治之頭已穿潰雖強投補托化堅涼血等劑日潰日爛終至不應破經兩月一日湧出紫血盈許而亡人問其故余曰心脉洪數心火旺也肝脈弦數肝氣傷也火旺逼血妄行肝爲不能藏血破必出血不止多致危亡余所以預辭不治也

徐曰血瘤破後往往不治 又曰此證用大劑涼血補血之藥亦有愈者

### 癰瘤主治方

清肝蘆薈丸清肝蘆薈丸夢芍  
海粉當歸甘草節筋瘤治宜用此方

乳布青連皂地黃

喜則安遇怒則瘤者 治惱怒傷肝致肝氣鬱結爲瘤堅硬色紫纍纍青筋結若蚯蚓遇

川芎 當歸

白芍各二兩 生地酒浸搗膏二兩 青皮

蘆薈 昆布

海粉

甘草節

牙皂

黃連各五錢

右爲末神麵糊爲丸如梧子大每服八十九自滾湯量病上下食前後服之

徐曰方亦近理但恐不能見效

柏案青皮昆布海粉牙皂徐圈

芩通二母丸

芩連二母丸青芍  
蒲黃生地與骨皮

熱地當歸羚羊角  
甘草柏葉爲丸服

治心火妄動逼血沸騰外受寒涼結爲血瘤微紫微紅軟硬間雜

膿隱隱纏如紅絲皮破血流禁之不往者

黃連 黃芩 知母

貝母

川芎

當歸 白芍 生地

熟地 蒲黃

羚羊角

地骨皮各等分 甘草減半

右爲末側柏葉煎湯打寒食麵爲丸如桐子大每服七十丸燈心湯

送下或作煎劑服之亦效

徐曰血瘤破後用大補氣血之品尙恐難效此等丸藥那能取效

順氣歸脾丸

順氣歸脾丸貝母  
靈仁遠志歸參等

木香各三錢 治思慮傷脾致脾氣鬱結乃生肉瘤軟如綿腫似饅脾氣虛弱目

久漸大或微疼或不疼者

陳皮 貝母 香附

烏藥

當歸

白朮

茯神

黃耆

酸棗仁

遠志

人參各

一木香

甘草各三錢

水香合歡根

右爲末合歡樹根皮四兩煎湯煮老米糊丸如桐子大每服六十丸食遠

白滾湯送下

徐曰肉瘤破亦非此方所能治

通氣散堅丸

通氣散堅丸半夏  
香附桔梗益海藻

南星枳實共黃芩

治憂鬱傷肺致氣濁而不清取結爲瘤色白不赤軟而不堅由陰

陽失度隨喜怒消長者

陳皮 半夏 茯苓

甘草 石菖蒲

枳實炒

人蔘

膽星

花粉

桔梗

川芎

當歸

貝母

香附

海藻

黃芩酒炒各等分

右爲末荷葉煎湯泛爲丸寒豆大每服

一錢食遠燈心二十根薑三片泡湯送下

徐曰此通治瘤之方如欲用藥亦不過如此耳

調元腎氣丸調元腎氣丸參地  
麥冬龍骨香砂柏

山藥丹歸黃澤苔

治房慾勞傷憂恐損腎致腎氣弱而骨無榮養全骨瘤堅硬如

石形色或紫或不紫推之不移堅貼於骨形體日漸衰瘦氣血不榮皮膚枯槁甚者寒熱交作飲食無味舉

動艱辛脚膝無力並宜服之

生地酒煮搗膏四兩黃肉

山藥

丹皮

茯苓各二兩

人參

歸身

澤瀉

麥冬搗膏

地骨皮

龍骨各一兩

木香

砂仁各三錢

黃柏鹽水炒

知母

右爲末鹿角膠四兩醇酒化調加蜜四兩煎滴水成

珠和藥爲丸如桐子大每服八十九丸空心溫酒送下忌白蘿蔔火酒房事

徐曰此泛常補陰之方非治瘤之法也

海藻玉靈湯海藻玉靈湯貝陳

昆布芍歸連翹青夏瑞活甘草節海帶同煎效有靈

海藻

貝母

陳皮

昆布

青皮

川芎

當歸

連翹

半夏

甘草節

獨活各一錢海帶五分

水一鍾煎八分量病上下食前後服之

凡服此門藥先斷厚味大葷次宜絕慾虛

心爲妙

徐曰此亦瘤癰痛治之方

活血散瘻湯活血散瘻湯芍歸

青陳芍半地黃隨參芩昆布丹皮草

紅花肉桂木香附

治瘤癰已成日漸大無痛無癢氣血虛弱者

白芍

當歸

陳皮

川芎

半夏

熟地

人參

茯苓

丹丹各一錢紅花

昆布

本香

甘草等各五分青皮

內桂各三分水一鍾煎八分量病上下服再飲酒一小杯

徐曰與前方意重

六軍丸六軍丸內用蜈蚣

全蝎僵蠅蟬蛻可見功

治瘤癰已成未潰者不論年月新久並宜服之

蠅頭去頭足蟬蛻

全蝎僵蠶炒去絲夜明砂

穿山甲以上等分爲細末神龜糊爲丸粟米

大硃砂爲衣每服三分遠酒下忌大黃煎炒日漸可消

徐曰此治結癥實證不得柴用恐誤人

枯瘤

方枯瘤方用白砒屬乳香沒藥硼砂等

雄黃田螺米粥調

治瘤初起成形未破者

未破者字徐園二及根蒂小而不散者

不破者字徐園

白砒

腦砂黃丹

輕粉雄黃乳香沒藥

硼砂各一錢斑蝥二十個

田螺

僵乾切片共研極細

溫調和捏作小棋子樣曝乾先灸瘤頂三炷以藥餅貼之上用黃柏末水調蓋敷藥餅候十日外其瘤自然枯落次用斂口藥

徐曰此亦可修合備用 案白砒勝砂斑蝥田螺徐圈 又案蒂小而不散之瘤有以蜘蛛切之者此本古方吳廣文元祐言友人子牙縫生多肉用此法而愈是不獨可治瘤也

秘傳斂瘤膏

秘傳斂瘤膏血竭象皮乳香各等分

雞子熬油一處調

治癰瘍枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

血竭

輕粉龍骨海螵蛸

輕粉龍骨海螵蛸

治癰瘍枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

血竭

輕粉龍骨海螵蛸

輕粉龍骨海螵蛸

治癰瘍枯藥落後用此搽貼自然生肌完口

研和入雞蛋油內攪勻每日早晚甘草湯洗淨患上雞翎蘸塗膏藥蓋貼

徐曰此方用處頗多

琥珀黑龍丹

琥珀黑龍丹海帶海藻木香併京墨麝香加上更相宜

南星心血竭五味脂

治五癰六癰不論新久但未穿破者

琥珀

一兩血竭二兩京墨

五靈脂炒海帶

海藻南星姜汁拌炒

木香三錢麝香一錢

以上各

爲細末和匀再研煉蜜丸一錢重金箔爲衣臘乾密收每用一丸熱酒一杯量病上下食前後化服如患在下部服後隨用美膳壓之

徐曰輕證初起者可用

十全流氣飲

十全流氣飲陳皮木香烏藥苦歸芍

赤茯苓青皮香附奇甘草同煎效最奇

治變癰傷肝思慮傷脾致脾氣不行逆於肉裏乃生氣癰肉瘤皮

色不變日久漸大者

陳皮 赤苓 烏藥 川芎 當歸

白芍各一錢香附八分青皮六分甘草五分木香三分

鹽三斤棗二個水二鍾煎八分食遠服

徐曰此通治氣鬱之方 案案瘤中無粉砂等物如肉瘤氣瘤血瘤之類余所製消核膏初起亦可貼又秘方用甘遂大戟芫花各四錢研極細末白酒調勻圈在瘤根留出其頂另用生甘草二兩煎膏圍在前藥之外初起亦消此方與消核膏同

癰瘤應用方

三品一條 人參養榮湯

見瘡門補中益氣湯

八味丸

十全大補湯

見瘡門寒食麵卷

肺癰論三十二

夫肺癰者金受火刑之證也

此句徐謹

蓋肺爲五臟華蓋其位至高其質至清內主平氣中主聲音外司皮毛又兼

主乎貴賤壽夭金清而氣管深畏者其音自清其韻自高其聲自洪此三者主壽主貴亦主通達如金濁而氣管短細者其音自焦其韻自低其聲目小此三者主天主賤亦主蹇滯故肺金獨旺於秋者應其輕清之候也倘有所尅其病自生患肺癰者先因感受風寒未經發越停留肺中初則毛壅惡風咳嗽聲重胸膈隱痛強不能轉側是其真候也久則鼻流清涕咳吐痰黃色腥穢甚則胸脅脹滿呼吸不利飲食減少脈洪自汗法當清金甘桔湯主之麥冬清肺飲調之

麥冬徐又批曰禁用

又久嗽勞傷咳吐痰血寒熱往來形體消削咯吐

痰膈聲嘶咽痛其候轉爲肺痿如此者百死一生治宜知母茯苓湯主之人參五味子湯調之又有七情餓飽勞役損傷肺者麥冬平肺飲主之

麥冬徐又批曰禁用

紫苑荳陽調之又有房慾勞傷丹石補藥消鍛腎水者宜腎

氣丸主之金液戊土丹調之又勞方內傷迎風響叫外寒侵入未經解散致生肺癰初起脈浮微數胸熱氣粗寒熱往來咳嗽生痰者當以小青龍湯主之麥冬清肺飲調之

麥冬徐又批曰禁用

通用金鯉湯蠟礬丸太乙膏清金盞

肺丸等相間服之亦效如手掌皮粗六脈洪數氣急顙紅汚膿白血嘔膿水鼻漏不殲食者俱爲不治此證以身涼脉細膿血交流膿色鮮明飲食知味膿血漸止者生反之則死

### 肺癰看法

初起脈浮虛細身體不熱咳嗽有痰呼吸調勻者順已成脈浮微數咳嗽吐膿痰形色鮮明語聲清朗者吉濁後咯吐膿痰間吐鮮血時發時止飲食知味者順吐膿漸漸稀少胸脴不疼面色微微帶黃使調多穢者順初起脈洪弦數身熱多寒胸疼氣喘面紅多汗損傷已成咯吐膿痰氣味滋臭黃痰如膠黏固層反終亡咯吐再兼白血氣急多煩指由紫而帶轉終歸冥路手掌反如枯樹面豔額紅咽痛音如鶴聲鼻掀終死

### 肺癰治法

初起風寒相入頭眩惡寒咳嗽聲重者宜解散風邪汗出惡風咳嗽氣急鼻塞項強胸脴隱痛宜解表清肺日間多寒喜覆衣被夜間發熱多煩去被宜滋陰養肺口乾喘滿咳嗽身熱脈弦數者宜降火抑陰胸滿喘急咳嗽膿痰身熱氣虛不得安臥宜平肺排膿熱退身涼脉來短濶精神減少自汗盜汗宜補肺健脾

徐曰余平日因此證甚多集唐人以來治肺癰之法用甘涼之藥以清其火滋潤之藥以養其血滑降之藥以清其痰芳香之藥以通其氣更以珠黃之藥解其毒金石之藥填其空氣數法而行之屢試必效此係從渾溪醫案采

入

### 肺癰治驗

一議官仲冬時河道督工不常迎風呼喚致肺受傷初起寒熱交作咳嗽聲重氣急生痰謂內科醫治越治越重乃請余視脈浮而數面光而澤此肺癰也視其痰果有膿意用桔梗湯二服咳嗽稍止復用排膿散四服其膿漸多惟胸膈疼痛不減脈亦帶芤此胸有瘀血也用四順散加紅花牡丹皮二服吐出紫血碗許膈痛漸止又以金鯉湯兼人參五味子間服人參五味子金鯉月餘而愈  
批曰早用不可

一男子久嗽不已咳吐膿痰面白神勞胸中隱痛脈浮微數此屬肺氣不足火尚有餘用知母茯苓湯數服其  
膿漸少又以清金寧肺丸服之而愈

徐曰未成肺癰輕劑可愈

一男子因勞傷咳嗽不止至夜身熱尤甚日久咯吐膿血診之脈弦而數此虛火假證也先以童便日飲三四  
次又服紫苑黃湯數劑至夜身熱不發又兼服金鯉湯月餘漸瘳蓋童便能退陰火嘗治瘧癥虛熱不退者  
極效

一男子鬱鬱不遂意患嗽半年時或咳吐膿血且形體衰弱飲食減少脈亦微數聲漸將雌惟面不紅將成肺  
癰而尙可治投以清金二母湯十餘服咳吐減半又以金鯉湯與人參五味子湯兼服徐曰如有風火眼人參五味子必死 又早  
飲人乳晚飲童便各一鍾調理百日外而安

一男子生平好飲口乾作渴致肺壅熱成癰咳吐膿痰喘滿難臥用葶苈散二服而喘定易睡又以紫苑黃湯  
加乾葛花粉十餘服而膿痰漸少隨後早以加減八味丸此二字徐勒批曰不切 午用清金寧肺丸服之兩月而愈  
一男子五十餘歲平素寵妾膏梁無厭咳嗽發熱此二字徐勒 吐痰腥臭手掌枯澀面白微紅臟中帶白血脈亦細  
微而數此肺癰所忌也辭不治他醫許其可生強爲用藥終不應而死人或問故余曰手掌乾澀血枯土傷  
不能生金也面色微紅相火已動痰有白血正肺受傷脈細而數真氣虛敗肺癰犯此豈有不死

### 肺癰主治方

麥冬平肺飲麥冬平肺飲人參赤芍檳榔赤茯苓陳皮甘桔同成劑 治肺癰初起四字徐又批曰初起宜可用此方邪退後或可用之 咳嗽氣急胸中隱痛嘔吐膿痰者

人參 麥冬 赤芍 檳榔 赤苓 陳皮 桔梗各一 甘草五分 水二鍾煎八分食鹽  
眼

元參清肺飲

元參清肺飲柴陳  
麥冬骨皮同蜜煎

甘桔橘梗蜜灸苔  
生姜童便效如神

治肺癰咳吐痰癰胸膈脹滿上氣喘急發熱者

元參八分銀柴胡

陳皮 桔梗 茯苓 地骨皮

當歸

水一錘薑一片

徐曰姜煎八分臨服入童便一杯食後服

麥冬各一薑苡仁二錢人參

甘草

徐曰此通治之方然人參麥冬生薑亦不宜輕用

甯肺桔梗湯

甯肺桔梗湯貝母  
防己百合夢五味

歸夢根殼草桑皮  
米仁知母地骨皮

治肺癰胸膈隱痛兩脇腫滿口燥咽乾煩悶多渴自汗盜汗眠臥不得時吐稠痰腥臭者

不得時吐稠痰腥臭者

桔梗

貝母

當歸

瓜蔞仁

黃耆

枳殼

甘草節

桑皮

防己

百合

米仁各八分

甜夢夢

地骨皮

知母各五分

水一錘薑三片煎八分不拘時服

加百

加百

加百

合身熟如柴胡黃芩大便不利加炙蜜大黃一錢小便澀滯加燈心木通煩躁兼血加白茅根痛甚加人參

白芷

徐曰此亦通治之方百合五味不可早用

四順散

四順散內藥有五  
甘草杏仁相協力

桔梗紫苑貝母同  
肺癰喘咳建奇功

治肺癰吐痰五心煩熱壅悶咳嗽氣急不能安

貝母

紫苑

桔梗各一錢

甘草

杏仁各七分

水一錘煎八分食遠服或爲末白湯調服二錢

清金甯肺丸

清金甯肺貝甘陳  
銀柴天夢青連芍

桔梗紫苑貝母同  
地骨皮等共桔芩  
五味白朮地熱生

治肺癰咳嗽日久壅痰不盡身熱虛羸漸成勞瘵者

陳皮

茯苓

桔梗各一錢

甘草

杏仁各七分

水一錘煎八分食遠服或爲末白湯調服二錢

白芍

桔梗連錢各六分

五味子

當歸

人參

黃芩各五分

麥冬

地骨皮川芎

細末練蜜爲丸如梧子大每服七十丸食遠白滾湯送下

徐曰肺藏之燥用蜜丸之藥此不知用藥法度者其方亦雜而無紀

人參五味湯

人參五味湯陳丸  
桑皮紫苑前地骨草

肺癰虛乏可煎嘗  
善桔歸芩枳地黃

治氣血勞傷欬嗽或咯血寒熱往來羸瘦困乏一切虛損之證

人參

五味子

前胡

陳皮

桔梗

當歸

茯苓

熟地

甘草

黃耆

地骨皮

桑白皮

枳殼

柴胡

各五分

水二錘薑三片煎八分食後服

徐曰雜亂無紀後世習外科者皆無本之學此種方外科書極多不足取也

相案此方徐又

紫苑茸湯

紫苑茸湯參犀角杏仁百合與阿膠

冬花桑葉草半夏貝母蒲黃姜共下

治膏梁厚味或煎炒法酒飲食過度致傷肺氣咳嗽咽乾吐痰唾血

喘急脇痛不得安臥

紫苑茸

犀角

炙甘草

一人參各五分

桑葉用經霜者

款冬花

百合

杏仁

阿膠

貝母

半夏

蒲黃生各七分

水二錘薑三片煎八分入犀角末食後服

徐曰咳血多而傷肺者

此方爲宜血證中亦可採用

相案紫苑茸桑葉款冬花蒲黃餘羣

排腥散

排腥散內用黃耆

白芷人參五味子

每服三錢蜜調下

肺癰瘍瘍效神奇

治肺癰已吐腥後宜服此排腥散補肺氣

黃耆

白芷

五味子

人參各等分

右爲細末每服三錢食後蜜湯調服

徐曰太斂

知母茯苓湯

知母茯苓湯橘梗

薄荷人參

五味子柴胡

半夏

治肺癰喘嗽咳吐痰涎或自汗盜汗往來寒熱

茯苓

黃芩

各一分

知母

甘草

桔梗

薄荷

人參

五味子

柴胡

半夏

川芎

款冬花

白芷

阿膠

麥冬各六分

水二錘薑三片煎八分加童便一杯食後溫服

徐曰太雜不成方

瀉痰湯

瀉痰湯內二陳先

麥冬枳實膽星煎竹茹加上病安痊

治心火尅肺金久而不愈傳爲肺癰咽喉此嘔胸膈痞悶嘔吐痰涎喘急難臥者

陳皮

半夏

茯苓

甘草

麥冬

膽星

枳實

黃連

人參

桔梗

各五分

竹茹一錢

水二錘煎八分食後服

甯肺丸

滑肺丸中二般藥

烏梅蜜拌取肉

日久嗽略吐，腥血胸膈不利，咳嗽痰盛，坐臥不安，言語不出，甚則聲音雌啞者。

烏梅

蜜拌取肉，去膜蜜拌炒，每服二錢，功最效。

肺癰肺瘍同堪服，同烏梅膏再搗爲丸，每服二錢。

徐曰：此等方非試過，不得輕用。

清金二母湯

清金二母湯，桔梗，瓜蒌五味，陳皮參。

甘草當歸救其呈

治肺痿多嗽少痰，午後發熱口乾煩躁，不甯者。

知母

貝母

桔梗

茯苓

當歸

白朮

陳皮

各一錢

桑皮

紫蘇

杏仁

柴胡

瓜蒌仁

黃芩

五味子

甘草

麥冬

各五分

水二鍾煎八分入童便一杯，食後服。

徐曰：太雞

梔子仁湯

梔子仁，大青葉，石膏，淡豆豉，共黃芩。

升麻柴胡，甘草，人參五味，效同龍。

治肺痿發熱潮熱，或發狂亂，煩躁而赤咽痛者。

梔子仁

赤芍

大青葉

知母各七分

黃芩

石膏

杏仁

升麻

各一錢

梔子

淡豆豉百粒

水二鍾煎八分食，遠服。

徐曰：此大寒之劑，必見執毒證，乃可酌用。

加味理中湯

加味理中湯，半夏，乾姜細辛，併甘草。

人參五味效同龍。

治肺胃俱虛，咳聲重，發熱不已，及兼脈浮數而無力者。

炙甘草

半夏

茯苓

乾薑炮

白朮

陳皮

細辛

五味子

人參各五分

水二

鹽煎八分食，遠服。

徐曰：此等方非治肺癰，乃治患肺癰之時，另見純寒欲脫之證耳。

金鯉湯

金鯉湯方，破魚腹，再加童便，重湯頓服。

惟將貝母參之宜，服盡此魚病可醫。

治肺癰已成未成，胸中隱痛咯吐腥血者。

金色活鯉魚

一尾約四兩重，貝母一錢。

先將鯉魚連鱗剖去肚腸，勿經水氣，用貝母細末，撒在魚腹內，縫紮之用。上白童子小便半大碗，將魚浸童便內，重湯頓煮，魚眼突出為度，少頃取起，去鱗骨，取淨魚肉，浸入童便內。

頓熱內與童便作一三次一日食盡其功效甚捷

徐曰此單方也

亨麗散

亨麗散中葱皮丹皮同葛根  
瓜萎升麻桔梗等

治過食炙燙或飲酒過度致肺熱氣壅喘急不臥及肺癰渴吐腥臭胸

膈脹滿不食者

桔梗

瓜萎仁

升麻

米仁

桑皮

葛根各一錢

炙甘草五分

甜葶藶八分

徐曰此清肺之方亦不治肺癰

腎氣丸

丹皮氣丸中澤瀉熟地同春蠅丸服所然心腎當

茱萸山藥白雲苓

丸服所然心腎當

治腎氣素虛不交於心津液不降敗濁爲痰致生咳逆

乾山藥

四兩山茱萸去核四兩

澤瀉熟地

丸服所然心腎當

牡丹皮

白者佳

白茯苓

各三兩

熟地

用生者八兩酒拌砂器蒸半日搗膏

右爲末地黃煮爛杵膏

蜜丸如桐子大每服七八十九丸空心用滾湯或鹽湯溫酒送下

蜜丸如桐子大每服七八十九丸空心用滾湯或鹽湯溫酒送下

徐曰有附桂者名腎氣丸此名六味地黃丸 又曰此緩治之法亦不甚切

楣案全生集治肺疽法似較

有把握大略謂此證吐膿多白當稱肺疽初起有兩脚骨疼痛者或脚骨不痛而舌下生如細豆一粒者再

心口之上微痛咳嗽口乾咽燥此皆肺中生毒之兆卽用生甘草桔梗各三錢煎服如覺稍安肺疽無疑投

以犀黃丸十服可全愈此是預識預治百無一死之法世人但見脚痛便去醫脚見嗽醫嗽舌生細粒便用

刀刺凡肺毒輕者粒色必淡毒愈亦消重者色必紫黑刀刺立危惟犀黃丸治無不效貧人無力服犀黃丸

以陳年醃芥菜漬每晨取半杯用滾豆腐漿和服服後胸中定有一塊塞上塞下塞至數次方能連吐惡腥

目服至愈乃止凡患此證者終身戒食鳴蛋白

紅蘿蔔石首魚著甲魚食則復發難生

服醃芥菜漬法亦見他書乃古方法也

肺癰應用方

金液戊土丹

見脫疽門

徐曰千金葷羣湯爲肺癰主方此反遺之何也今附錄於後

千金葷莖湯

治咳有微熱煩渴胸中甲錯

此六字是爲肺癰  
徐園

葷莖

二升

慈以仁

半升

桃仁

五十個半升

鳳鈿

半升

右四味

以水一斗先煮葷莖得五升去滓納諸藥發取

二升服

一升再服當吐如痰