

家藏蒙筌

五

中風門

肝無補法辨

中風脈候吉凶

類中風

附辨製用附子法

痺證

瘡證

濕證

黃疸

痿證

家藏蒙筌卷三

目錄

家藏蒙筌卷三

後王世鍾小溪氏纂輯男迪哲久瑞校訂

中風門

內經所載風之傷人也或爲寒熱或爲癘風或爲偏枯皆指外邪而言其卒暴僵仆神魂昏憤言蹇口噤吐沫痰壅癱瘓拘攣並未言及所以張景岳辨明非中風乃屬風也何爲屬風屬風者因風而致也奈今人一見有卒倒昏迷之類並不察其有無表邪或寒或熱率皆謂之中風肆行消散全不顧及元氣所以患此症而斃者居多不思外感之風豈能頃刻遂使人卒倒耶

實由內傷以致之耳但其中有兼表邪者並或兼寒兼熱兼痰  
兼濕者諸方誠亦不可廢也復考至真要大論曰厥陰司天其  
化以風氣風氣大來木之勝也土濕受邪脾病生焉諸暴強直  
皆屬於風諸風掉眩皆屬於肝所以景岳謂之屬風劉河間曰  
此症由於將息失宜心火暴盛腎水虛衰不能制之則陰虛陽  
實而熱氣拂鬱心神昏冒筋骨不用而卒倒無所知也李東垣  
曰此症非外來風邪乃本氣病也凡人年踰四旬氣衰之際或  
因憂喜忿怒傷其氣者多有此疾壯歲之時無有也若肥盛者  
則間而有之亦是形盛氣衰而如此耳朱彥修曰西北氣寒間  
亦有真爲風所中者東南氣溫而地多濕有疾病者非風也因

濕土生痰痰生熱熱生風也東垣又曰中血脈則口眼歪中腑則肢節廢中臟則性命危有三者之分焉夫中腑者爲在表宜微汗之中血脈者爲在中宜調營焉中臟者爲在裏宜滋潤之至內經謂三陰三陽發病爲偏枯瘦弱四肢不舉亦未嘗必因於風而後致也況風火氣濕之殊望聞問切之間豈無所辨乎不得以內傷偏枯氣脫卒倒厥逆等症悉認爲中風而散之攻之庶析理明而治不誤矣

丹溪曰半身不遂大率多痰在左屬死血與無血宜四物湯加桃仁紅花竹瀝薑汁在右屬瘀屬氣虛宜二陳湯四君子湯加竹瀝薑汁據此說似乎近理而其實非也夫人身血氣本不相

離不可以左右分血氣但當以左右分輕重耳男子不宜病左女子不宜病右而再參以脈理則在氣在血自不致誤矣

肝無補法辨

肝無補法一語因前賢未能明明指出所以然之理以故從古至今相傳俱以伐肝平肝爲事殊不知厥陰肝爲風木之臟木能生火體陰用陽其性剛主動主升必藉腎水以滋之肺金以肅之脾土以培之庶剛勁之體轉爲中和之象而條達暢茂之機遂則自無病矣況藏血人卧則血歸於肝是肝之所賴以養者血也不覩陳臨川有云醫風先醫血血旺風自減蓋謂肝邪之來由於肝血之虛而虛則燥氣乘之而未從金化風卽生矣

月中風一症多由肝腎二經虧損何也夫肝主筋肝藏血腎主  
骨腎藏精人之精血虧損不能滋養百骸故手足拘攣痿痺不  
仁等症作矣茲若不辨明僅以伐肝爲事愈疏愈虛害有不可  
勝言者又不觀經曰目得血而能視手得血而能握足得血而  
能履而謂肝不可補乎究其所謂因經有曰無胃氣則死木魁  
工是肝能犯胃爲胃之賊也故有此論試思五臟乃金木水火  
土生成之理豈肝木無故而尅脾土乎實因肝血虛則肝火旺  
肝火旺則肝氣逆風勁之氣起而爲患耳然肝之虛誠又由脾  
腎之虛而來腎水虛不能生肝木脾土虛不能自衛所以肝邪  
得能犯胃也假使肝腎不虛肝邪又豈能乘患乎或疑古人言

無補爾言不宜伐不亦與古大相逕庭乎誰其信之不知溪非  
固言其定不宜伐也如果肝氣有餘不可以補暫宜伐也然此  
不多見卽如此症或筋攣角弓抽搐非血虛乎或目眩爪枯頭  
痛非血虛乎或脇肋少腹痞病非血虛乎又如半身不遂非血  
氣枯槁乎由此思之肝血可不補乎然補肝血又莫如滋腎水  
水者木之母也母旺則子強經曰虛則補其母是滋化源之深  
義矣溪思古人並未言肝血之不宜補不過未明言出肝之  
邪氣不宜助宜伐宜平耳後人須默知之溪今特爲拈出有心  
者其亦謂是否

中絡者邪方入衛尚在經絡之外故但肌膚不仁中經則入榮

脈之中骨肉皆失所養故身體重着至中腑中臟則邪入深矣  
中腑必歸於胃者胃爲六府之總司也中臟必歸於心者心爲  
神明之主也風入胃中胃熱必盛蒸其精液結爲痰涎謂之大  
絡入心痰涎壅盛堵其出入之竅故中腑則不識人也諸臟受  
邪進入於心則神明無主故中臟者舌縱難言廉泉開而流涎  
沫也

廉泉穴在舌下竅通於腎津液之所出也

中風之症有因外感有因內傷言風者外感也言氣者火也言痰  
者內傷也然外感者亦因內有鬱熱腠裏疏豁中氣不固暴風  
得而中之內傷者氣上逆而爲火火亢極而生風風行水動水  
湧爲痰故氣也火也痰也其實一源流也爲治之法外感者分

中血脉中腑中臟之異而治之內傷而緩者先用開閑利竅次用固本調元急則只爲取本吐容次第蓋命在須臾緩則援生不及也嚴用和曰人之元氣強壯外邪焉得爲害必真氣元虛營衛空疎邪能乘虛而入若內因七情者法當調氣不當治風卽外因六淫者亦當先救本氣後依所感六氣治之

用藥之法寒因熱用熱因寒用乃正治也今中風癱瘓之症本風火陽邪而用烏附等熱藥治之何哉蓋中風癱瘓乃濕痰死血結滯於臟腑經絡之間非烏附等熱藥焉能開啟流通此非正治從治也經曰從少從多各觀其事則從治之藥只可爲引經而已濕風本於熱而生豈可概謂虛寒用附子取效者必中

寒陰毒之症及肥白人多濕者丹溪所謂肥白人多濕少用烏附行經是也若中風陽毒之症忌之但至癱瘓既入則痰火拂鬱若於辛涼藥中而無香熱之藥爲之向導則將扞格而不能入也況此時陽症多係假象蓋真火旣已上升而爲病矣有何真陽仍存坎宮而不動耶所以烏附爲對症之宜但必兼滋補便可制其僭熱矣惟中臟陰寒之症又宜純陽忌同陰藥蓋畧兼陰藥則陽藥便難小效甚有益令陽亡試思無陰則陽無以化當此以希之陽能經陰藥一化乎所以參尤蕤附等湯有時不入地黃當歸者此耳

一凡飲食如常但失音不語者名曰啞風只宜小續命湯去附

子加石膏菖蒲各一錢

一凡初中昏倒急宜招人中俟其甦醒方用痰藥或用吐法若脫勢急迫不能姑待者急爲補精補神補氣以爲性命之需慎勿降火降痰降氣益促喪生之速河間東垣專治本而不治風可謂至當不易之論氣血之根者何火爲陽氣之根水爲陰血之根而火與水之總根兩腎間動氣是也此五臟六腑之本十二經之源呼吸之門三焦之根又名守邪之神經曰根於中者命曰神機神去則機息根於外者名曰氣立氣止則化絕今人縱情嗜慾腎氣虛衰根先絕矣一或內傷勞役六淫七情少觸皆能卒中此陰虛陽暴絕卽內奪暴厥之症也須以參附大劑

峻補其陽繼以地黃九十補丸之類填實真陰又有心火暴甚  
腎水虛衰兼之五志過極以致心神昏悶卒倒無知其手足牽  
掣口眼喎邪乃水不能榮筋筋急而統也俗云風者乃風淫未  
疾之假象風自火出也須以河間地黃飲子峻補其陰繼以人  
參麥冬五味子之類滋其化源此根陰根陽之至論若夫所謂  
痰者何獨中風爲然要知痰從何處來痰者水也其原出乎腎  
仲景曰氣虛痰泛以腎氣丸補而逐之觀此凡治中風者既以  
前法治其根本則痰不治而自化矣惟初時痰涎壅盛湯藥不  
入暫用稀涎散之類使咽喉疏通能進湯液卽止若欲盡攻其  
痰頃刻立斃矣

家醫學卷三  
遺尿係元陽真氣虧極必須大用參术芪附益智五味以保元  
陽脫勢時時服之補接誠活命之第一閑也蓋人之所賴以生  
者此陽氣也此氣一虧時時可脫故服補藥亦宜時時接之不  
可不慎不可不知

東垣之論專以氣虛爲主縱有風邪亦是乘虛而襲經曰邪之所湊其氣必虛當此之時豈尋常藥餌能通達上下哉急以人參烏附大劑煎服卽甦此誠有通經達絡之能斬閼奪旗之力然每服必用人參兩許補助真氣駕驅其邪否則不惟無益適足以取敗觀先哲耆附參附等湯其義可見若遺尿手撒口開鼻鼾雖爲不治然服前藥多有生者喻嘉言曰臟爲陰可勝純

陽之藥腑爲陽必加陰藥一二味制其僭熱經絡之淺又當加和榮衛併宣導之藥劉氏之論則以風爲末而以火爲本然火之有餘緣水之不足也劉氏原以補腎爲本觀其地黃飲子可見矣但治中風之症凡勢在危迫之際當純以補陽爲要陽者生之本也陽生而陰自長蓋補陰力緩恐不及矣況陽氣大虛雖有假火若略兼陰藥則陰翳之火驟消亡陽之勢益露挽回何及迨至危勢漸平又當兼以填補真陰其陰虛有一有陰中之水虛有陰中之火虛火虛者專以河間地黃飲子水虛者當以六味地黃丸故至當之治法總以固陽爲保生之首重繼以滋補精血爲去病之根基風自火出火自陰虧陰血一得風火

自息不知此而以風燥致斃者多矣

凡精神短少運用太過一時接續不來便有無故卒倒之患若天眞未竭尺脈有根者須臾自醒倘天眞已竭尺脈無根者則元陽潰散口開鼾聲遺尿汗湧脫勢具備難望其有生矣故平時能於根本用力善保水火則氣血自然和平斷無是病旣病而未至根本大傷水火偏絕則調理得當水火猶可和平氣血何難漸復倘不知此正當氣血虧極發露之時元陽走散依稀之際見其搐竄治風見其涎湧治痰驅逐尅削標病縱濶正氣益傷重則暴亡輕則痼疾故能於水火立命之處看明氣血生長之源參透則外假之象雖變現百出亦有主見於胸中不爲

所感矣況翫靈樞經曰虛邪偏客於身半其入深者內居營衛  
營衛衰則真氣去邪氣獨留發爲偏枯其邪氣淺者脈偏痛又  
曰辨之爲病也身無痛者四肢不收志亂不甚其言微知可治  
甚則不能言不可治也可見必由真氣去而邪氣獨留及志不  
亂言微知爲可治志亂不能言爲不可治則知全以正虛爲本  
外邪爲標者十之一二何必拘以中風局中風方紛紛立論乎  
況人受水火之真以成而後臟腑具備漸有筋骨形骸故臟腑  
之根繫於真水真火陰陽氤氳釀成氣血流行臟腑灌溉百骸  
故水火爲本氣血爲標也凡真陰真陽虧極則邪氣乘虛直中  
於臟內臟受傷害人性命若氣血不足未至根本虧極則邪不

能直達於裏或中腑或中血脈則形骸受傷乃有偏枯瘓痺要知真陽虧極我身之陰寒可以聚而乘之非謂必外有風火也真陰虧極我身之風火可以動而乘之非謂必外有風火也所謂內起之風由於內起之火耳識得標只取本乃治法萬全之要領何況當此大虛頃刻存亡之症以風火痰氣之假象而失其生人精氣神之根本豈能奏功萬一乎祛風適足以走洩元神清火無非以消滅陽氣治痰則不足之真陰愈加銷爍理氣則丹田之浮泛益令無根虛陽變至亡陽閉症變成脫症凡中風閉爾手握固爲閉症可治若口開手撒眼合遺尿鼾聲爲脫症難治此皆治標者之罪也

當瀉肝理風以安脾脾安則食自如常也雖然亦因臟腑之脂膏耗竭有陽無陰所以孤陽用事如中消者然雖多食未必長其精華然借食尚堪抵其消耗惟爲補養精血俾脂膏足而自復如常何必瀉理風爲事哉

見庚子靖難舉文獻卷之三十一

陽氣衰乏者陰必湊之令人五指至膝上皆寒名曰寒厥宜六物附于湯陰氣衰於下則陽湊之令人足下熱熱甚則循三陰而上逆謂之熱厥宜六味地黃丸氣爲人身之陽一有拂鬱則陽氣不能四達故令手足厥冷與中風相似但中風身溫中氣身冷名曰氣厥宜八味順氣散

中風脈候吉凶

凡脈浮弦無力爲風浮滑不清爲痰浮數有力爲火沉弦有力爲氣沉實有力爲便結沉濇而數爲血凝凡下元無根則兩腎脈不應或沉滑微細若尺浮而無力腎氣不足尺洪而弦數腎陰大虧若痰塞氣滿併宜於上有升無降則虛弦搏急一如沸釜或精神元氣一時暴絕則虛散而欲絕脈來緩滑或浮滑或滑數有神者易治或弦滑或浮數或洪大者難治若兩尺絕無下元已絕寸關虛豁而空大真氣已散或舉之搏大按之絕無孤陽無依者死口開手撒遺尿者屬氣虛爲陽暴絕也速宜大料參附補救之如因無血而不能滋養其筋是以舉動則痛者爲筋枯也不治諸中或未甦或已甦或初病或久病忽吐出紫紅色者死

一凡中風口開爲心絕手撤爲脾絕眼合爲肝絕遺尿爲腎絕氣喘面黑鼻鼾爲肺絕及吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋痛面赤如裝髮直搖頭上竄或頭面青黑汙如綴珠痰聲漉漉並脈急數弦大無倫者死

此證金匱書中分爲四證一口眼喎斜肌膚不仁邪在絡也一左右不遂筋骨不用邪在經也一昏不識人便溺阻隔邪在腑也一神昏不語唇緩涎流邪在臟也其脈浮遲者吉若堅大無倫急小如纖者凶浮主晝死沉主夜亡不可治也正勝邪者可直攻正不勝邪者卽宜固本

仲景曰風之爲病當半身不遂卽經所謂偏枯也或但兩臂不

遂者非中風也卽痺病也蓋痺爲陰病脈多沉澁風爲陽病脈多浮緩不得混視須各分別如脈微而數中風使然其脈微者正氣虛也數者邪氣勝也故病風中之人因虛而召風者未有不見微弱之脈者也因熱而生風者未有不見數急之脈者也通關散 治初病厥倒不省人事牙關緊急藥不得下

猪牙皂角

去皮弦炙爲末一錢好北細辛爲末蘇薄荷葉爲末一錢

明雄黃

爲末白芷爲末一錢自簪爲末五分

右合勻每遇厥證不省人事者

用少許吹鼻切不可吹多候有噴嚏可治無嚏不可治

開闢散 治口噤不開用此藥末擦牙其噤可開

烏梅肉

焙乾研末

片三分

生南星三分爲末

右合勻以

指蘸藥根

○若口噤不開湯藥不能下咽者則將應服之藥啣在病人口內用筆管插入病人鼻孔使氣運藥吹之其藥自能入咽不可用金器撬之恐傷齒也

蘿葡子湯 治痰涎壅盛填塞胸膈湯液俱不能入用此吐法  
蘿葡子二兩生用搗細末以湯湯和徐飲之少頃卽吐出  
卽有吐不盡者亦必從下行矣

參附湯 治真陽不足風邪乘虛而入一時卒倒手足厥冷值此危劇之際豈等常藥餌所能挽回哉速宜用此

人參一兩 附子六錢生用或用甘草湯浸軟火紙厚包仍用  
甘草湯浸濕紙包灰火煨熟用亦可

水煎溫服

稀涎散 治中風口噤並治單蛾雙蛾

江子仁

二粒一粒分作三四片

猪牙皂角

炙爲末一錢

明礬五錢

先將礬化開次入二味攪勻待礬枯爲細末每用五分痰涎壅盛者燈心湯下在喉卽吐在膈卽下

烏藥順氣散

局方

治初中風手足癱瘓語言蹇濁脚氣等證宜

先服此以疏氣道然後隨症用藥

烏藥

三錢

陳皮

二錢

麻黃

三錢

白芷

三錢

川芎

三錢

桔梗

三錢

枳殼

三錢

乾薑

二錢

甘草

一錢

直殼杏

三錢

○或加當歸天麻○皮膚燥癢加虫退蘇薄荷

八味順氣散 治中風先服此藥順氣次進治風藥此方又可

治氣厥身冷似中風者

人參三錢白朮三錢茯苓三錢青皮二錢陳皮二錢

白芷二錢台烏二錢甘草一錢

水煎服

攝生飲 治初中風並一切痰厥氣厥不省人事先用此以疏導之然後隨症用藥

半夏三錢蒼朮二錢米細辛一錢

石菖蒲二錢甘草一錢

南星

用紙包水浸溫火煨熟三錢

廣香

挫細末對眼

大秦艽湯

機要方

治中風血弱不能養筋故手足

不能運動舌強不能言語

當歸

芍藥

白朮

土炒

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

秦艽

石膏

各二錢

北細辛

一錢此藥微氣不宜重用

如春夏加知母一錢五分

痰湯 古方 治中風痰迷心竅舌強不能言

南星三錢 製半夏三錢 只實一錢 炒芥苓一錢 橘紅一錢五分

石菖蒲一錢 人參一錢 甘草五分 竹茹八分 姜汁炒

薑水同煎

黃芪五物湯 治因虛致風中經絡半身不遂須審其人舌強難言神氣不清是痰火爲病不宜此方若心清只難言是營衛不足之病宜用此方

黃芪一兩 蜜炙桂枝四錢 白芍四錢 酒炒生薑四錢 紅棗三五枚 去核擘

君黃芪補衛以起不用臣桂芍益營以治不仁佐薑棗以和營衛○若血虛者加當歸四錢○病在下者加牛膝木瓜○脈沉遲屬寒者加附片炮薑此方專於補外故不用參草屢

誠屢效神方也

三化湯 漶古治中風外有六經之形證先以續命湯主之內有便溺之阻隔以此方主之○便閉脹滿可用

厚朴 姜製 枳實 三錢 大黃 三錢 羌活 三錢

本方卽小承氣湯加羌活

續命湯 金匱 治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處拘急不能轉側

麻黃 三錢 人參 三錢 當歸 三錢 石膏 三錢 桂枝 三錢

川芎 三錢 乾薑 三錢

甘草 一錢

杏仁 去皮尖一錢半

炒微黃搗碎

半

○無汗惡寒用本方去石膏○有汗身熱不惡寒去麻黃乾薑加知母防風羌活○有汗無熱惡風去麻黃石膏○有汗身熱不惡風加葛根去乾薑汗多去麻黃加白芍。無汗身涼去石膏加附片

小續命湯 千金方通治八風五痺

麻黃

三錢去節人參三錢芍藥二錢甘草一錢川芎二錢官桂二

酒炒

甘草

一錢川芎二錢官桂二

防杞

二錢酒炒防風三錢附片二錢黃芩二錢生黃三片

紅棗

三枚擘去核杏仁去皮尖錢半炒微黃搗碎

○精神恍惚加白芍志肉

○精神恍惚加白芍志肉

骨冷痛

或寒宮桂易桂枝○煩躁小便澁去附片加竹瀝

○煩躁小便澁去附片加竹瀝

臟寒下利

去防杞黃芩加白朮倍附片脚弱加牛膝石斛

○脚弱加牛膝石斛

身痛加秦艽羌活○腰痛加桃仁杜仲○自汗去

麻黃杏仁加白朮○血虛加當歸

○血虛加當歸

按此方去黃芩不用張景岳已斥之但未力去不特此也奈

屢來名賢每以乾薑黃連並用稱曰病之寒熱相雜故藥亦

寒熱推用以相監制之義在古人之意固如此也若據溪愚

見宋者終寒熱者終熱或因寒極而熱生熱極而寒生畢竟

此方去黃芩不用張景岳已斥之但未力去不特此也奈

屢來名賢每以乾薑黃連並用稱曰病之寒熱相雜故藥亦

寒熱推用以相監制之義在古人之意固如此也若據溪愚

有分水炭不同似不宜雜用以啓後人  
妄用誤人之漸並尚希高賢再爲正之

千金還魂湯 治風邪中經絡氣粗神昏無汗拘急身體偏痛

乃屬表邪此爲閉證宜用此方

肉桂 三錢 麻黃 四錢 甘草 一錢 杏仁

二錢去皮尖  
炒微黃搗碎

奪命散 治風邪中臟腑神昏口噤痰結喉間

腹滿便閉湯藥  
不下宜用此方

巴豆

用紙搥去油七分

白芷 三錢 半夏 三錢 莩薢

三錢搗碎

麝星

二錢姜汁水炒

祛風至寶湯 治風邪中腑屬熱者六脈浮數身熱心煩面赤

不語等症

滑石 防風 當歸 川芎 薄荷 大黃 芍藥

麻黃 連翹 石膏 黃芩 枯梗 荆芥 山梔

白朮 甘草 芒硝 以上防風通聖散加全虫天麻細辛

蔓荆子

一兩防風一兩

苦參五錢

五錢五味五錢

廣香五錢

龍腦

少許研

麝香

少許研

硃砂

研爲衣不拘多少

麻黃

一兩熬膏

右爲末以麻黃膏和或少加蜂蜜亦可共杵一萬五千下每  
兩分作十九每服一丸以溫酒食後臨卧一呷嚥之重衣蓋  
覆當出汗卽瘥方加調補及避風寒

活絡丹

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰死血者

草烏

泡去皮

川烏

泡去皮

膽星

各六兩

地龍

去土乳脊

焙乾去油

沒藥

各三兩

蜜丸

桐子大

每服二十九

溫酒茶清任

天仙丹

治卒暴中風口眼喎斜

天南星

一大白芨

二錢

大草烏頭

一箇

僵蚕

七箇

爲末用生鮮血調成膏敷嚼處覺正洗去

又方 用鱠魚血入麝香少許塗之卽止

稀簽丸 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇濶手足緩弱

稀簽草 生於沃壞間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸  
用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾爲末煉蜜丸桐子大每  
服百丸空心溫酒米飲任下一方每稀簽草一斤四物料各  
半兩川烏羌活防風各二錢九服

搜風順氣丸

錦紋大黃

酒浸九晒要黑  
色五兩爲主

火麻仁

微炒去壳二兩

郁李仁

泡去皮二兩

兔絲子

水沉淨酒煨爛搗

山茱萸

酒蒸去核二兩

乾山藥

酒蒸二兩

枳殼

麵炒二兩

車前子

二兩錢炒

獨活

二兩

枳榔

二兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服七八十九茶酒任下

百無所忌久患賜風便血服之除根癱瘓語濇服之平安酒

後能進一服宿酒盡消中年以後之人過用厚味酒肉多有

痰火且不能遠房事往往致陰虛火動動則生風所謂一木

不能勝五火也故以此方疏風降火孕婦勿服

加減天麻丸

治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻

六兩酒浸透

牛膝

六兩酒浸透

附子

甘草湯浸軟灰火燒熟四兩半

萆薢

六兩研細

當歸

二十兩研細

羌活

十兩當歸研細

熟地黃

一斤熟地黃

獨活

五兩

杜仲

薑汁炒八兩另研細

煉蜜丸桐子大每服六七十九

凡人忽然卒倒若無痰氣阻塞必係正氣道而邪氣乘之急

宜因其正氣先用參附峻補元氣隨用熟地甘杞當歸身爲

以填補真陰或少佐以祛瘀除邪之品此爲上策若單行攻

地黃飲子

河間方

治陰中之火虛者考風痺偏枯瘡瘍三病皆

屬外中微甚不同風痺者四肢不收身無痛處也偏枯者半

身不遂身有痛處也其言不變志不亂乃邪爲淺病在外腠

營衛之間宜前黃耆五物湯以治之若甚不能言志亂神昏

則爲瘡瘍者乃腎虛內奪少陰不至而厥病已

入臟也難治速宜用此飲

熟地

五錢

棗皮

二錢酒洗

巴戟肉

三錢石斛二錢

肉蓯蓉

三錢酒洗

五味研一錢 茯苓二錢 志肉二錢 麥冬二錢 石菖蒲二錢 酒炒

肉桂二錢 薄荷二錢 附片二錢

薑棗煎

史國公藥酒 治中風語言蹇澀手足拘攣半身不遂痙痙不

羌活

二兩

防風二兩

白朮二兩

當歸二兩

川牛膝二兩

酒洗

川牛膝酒浸

川草薢

二兩 杜仲二兩

姜炒松節二兩

川牛膝二兩

柱礪

秦艽二兩

虎脰骨二兩

酥炙

鱉甲二兩

晚蠶砂二兩

炒紅杞二兩

五兩

蒼耳子二兩

炒槌碎

白茄根二兩

八兩飯上蒸

泡酒三十効

先將藥爲粗末絹袋盛入酒煮熟

理土內一日退去火毒取服

薰蒸方 治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停於腿膝

經絡致成脚痺疼痛宜用此法

花椒一撮

火葱莖三根

麥麩約四升

鹽一把

酒一盞

醋以拌前藥多少

或加薑肉桂亦妙

右放銅器內炒令極熱擲臥

爲度忌見風

禱下將患腳薰蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汙出爲度忌

## 類中風

類中風者忽然昏倒人事不省類乎中風實非中風也如諸書有云中虛中氣中食中寒中火中濕中暑中惡等證似之有云氣厥血厥痰厥酒厥臟厥蛔厥等證似之紛紛名目實足亂人心目何也如風寒暑濕氣血食痰等類既各有專治之門又何必多論反滋後人之疑此症旣曰非中風則必係元氣虛損營衛失調偶感外邪卒倒昏憒卽當以顧扶元氣爲主若邪重者

不得不選邪之品爲佐若無邪者則故本不暇何敢攻散乎  
但先賢立論太繁溪今約之曰陰虛陽虛而已陰虛者脈多沉  
微無力手足厥冷或畏寒喜熱二便清利是也治法專宜用陽  
藥如寒甚者當先益其火宜理中湯四逆湯繼以六味回陽飲  
十補九之類主之至若生地芍藥麥冬黃芩等清涼之藥皆當  
忌之陽虛者脈多滑數有力手足俱溫或畏熱喜寒二便秘赤  
等證是也治法專宜用陰藥如火甚者當先制以寒宜白虎湯  
抽薪飲續以六味地黃丸益陰丸之類主之至若人參白朮肉  
桂乾薑之品亦不宜輕用如此說來庶乎簡當俾後人一目了然豈不甚善

附辨製用附子法

夫人病至於危手足厥冷六呢沉細無神附子乃必用之藥也  
實有起死回生之功陰症上緊之需奈今之市賣附子皆用水  
泡水煮氣味全失是有附子之名而無附子之實雖用猶未用  
也若陰症勢迫可用麥麵以水調和不乾不稀爲度將附子包  
裏麪中灰火煨熟去皮臍不用餘酌用之自然有功無害若緩  
用補劑者先酌量附子之多宜用甘草一味熬濃湯將附子泡  
浸數日刮去皮臍切爲四塊又添濃甘草湯再浸二三日捻之  
軟透爲度再切片入鍋文火炒至將乾口嚼尚有辣味是其度  
也晒乾收貯聽用

獨參湯 治元氣大虛卒然昏倒不論陰脫陽脫均可服之

人參茶 一二兩銅刀切片放人茶鍾酌量添白開水泡定將  
一鍾蓋穩不通氣置飴上蒸熟頓服大能回生

理中湯 治中虛生痰中氣虛損脈沉微無力手足厥冷畏寒

喜熱或太陰病自利不渴陰寒腹痛霍亂嘔吐或

瘧疾瘴氣  
瘟疫等證

人參

三錢

炒

乾薑

三錢

炒

黃芩草

一錢附子

半者用三錢

水煎服

四逆湯

治陰症自利裏寒外熱脈沉身痛而厥等症

乾薑

四錢炒黃

附子

二錢

炙甘草

一錢半

水煎溫服

六味回陽飲 治陰陽將脫等證

人參

一二兩

製附子

一二錢

乾薑

二三錢

熟地

五錢或

炙甘草

一錢半

當歸身

二錢如泄瀉者或血動者以白朮易之

水煎溫服

口如肉振汗多者加炙黃芩四錢○如泄瀉者加北五味二十粒○如虛陽上浮者加茯苓三錢○如肝經鬱

帶者加肉桂二三錢

十補丸 治真水真火虛極神疲氣怯危劇等證難以名狀

熟地

八錢

棗皮

四錢酒山藥

五錢炒茯苓

三錢

乳蒸

牛膝

三錢淡酒炒

杜仲

三錢浸洗

姜

北味

一錢牛

製附子

一錢牛

鹿茸

羊油炙

四錢搗碎

鹿茸

錢搗碎

四錢搗碎

水煎服

白虎湯

治一切中暑煩熱熱結班黃狂躁大渴並治傷寒脈

浮滑表有熱裏有邪用此以解內外之熱

名人參白虎湯

石膏

五錢搗碎

知母

三錢

甘草

一錢糯米

撮加入參

三錢水煎溫服

拙薪飲 治諸凡火熾盛而不宜補者

黃芩

三錢石斛

三錢木通

三錢梔子

三錢黃柏

三錢

水煎服

枳殼

二錢澤瀉

二錢細甘草

一錢

水煎服

六味地黃湯 治水虧火旺

熟地八錢 山藥四錢 藜皮四錢 澤瀉二錢 丹皮二錢 白茯苓二錢 水煎服

益陰丸 治腎水不足火浮口燥等證

熟地八錢 山藥五錢 藜皮四錢 白茯苓四錢 紅枸杞四錢

麥冬去心三錢 牛膝二錢 口如火甚者加龜膠四錢 水煎服

痺證

痺病者風寒濕三氣雜而合爲患也夫痺閉也謂血氣爲邪所閉不得流通也其風氣勝者爲行痺以風善行走走注歷節無有定所是爲行痺乃陽邪也寒氣勝者爲痛痺以血氣受寒寒

則凝聚是爲痛痺乃陰邪也濕氣勝者爲著痺以血氣受濕則濡滯滯則肢體沉重而頑木疼痛是爲著痺亦陰邪也此三痺也又有五痺謂皮脈肌筋骨是也病入臟腑者謂內舍五臟之痺也以皮痺不已復感於邪內舍於心成心痺也肌痺不已復感於邪內舍於心成心痺也肌痺不已復感於邪內舍於肺成肺痺也脈痺不已復感於邪內舍於肺成肺痺也筋痺不已復感於邪內舍於肝成肝痺也骨痺不已復感於邪內舍於肝成肝痺也又周痺亦在血脉之中但患有定處痛無歇止不似眾痺痛有歇止周痺或手足偏廢不仁而似中風但口眼不喎斜耳

經曰以冬遇此者爲骨痺以春遇此者爲筋痺以夏遇此者爲

脈痺以至陰遇此者爲肌痺以秋遇此者爲皮痺此以所遇之時所客之處

命名以時令配五臟所合而言也至陰者六月也

又曰其入臟者死其留連筋骨間者

疼其留皮膚間者易已又曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁者痛久入深營衛之行經絡時疎故不痛皮膚不營故爲不仁蓋痺在於骨則重在於脈則血凝而不流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在皮則寒故此五者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則縱皆由內虛爲本可以風名不可以作風治風寒濕三氣客於經絡爲病不一或爲痛或爲癢或爲麻痺不仁或爲手足緩弱所以然者有新久輕重之分有濕痰死血之異耳治以攻補兼施而標本兼顧也薄桂味薄能橫行手臂頭

南星蒼朮等藥至痛處成功歲靈仙治上體痛風漢防已治下體痛風然虛弱人並當以氣血藥兼之方能有力運行藥勢終以滋養肝腎以壯筋骨堅強此其治也又治外者散邪爲亟治臟者養正爲先治行痺者散風爲主禦寒利濕仍不可廢大抵必參以補血之劑蓋治風先治血血行風自減也治痛痺者散寒爲主疏風燥濕仍不可缺大抵必參以補火之劑非大辛大溫不能釋其凝寒之害也治着痺者利濕爲主祛風解寒亦不可缺大抵必參以補脾補氣之劑蓋土強可以勝濕而氣足自無頑麻也病退之後內節慾以保筋髓慎寒冷以却外邪戒酒麵以杜濕熱服補養以生氣血則病不復發矣

靈樞曰衛氣不行則爲麻木丹溪曰麻是氣虛木是濕痰死血然則曰麻曰木者以不仁中分而爲二也雖然亦有氣血俱虛但麻而不木者亦有虛而感濕麻木兼作者又有陰虛而感風寒濕三氣乘之故周身掣痛麻木併作者古方謂之周痺治法宜先汗而後補也當以類而推治然麻木者不仁之漸也麻爲木之微木爲麻之甚古方名爲麻痺原病式曰麻者亦猶澀也由水液衰少而燥澀氣血壅滯而不得滑澤通行氣強攻沖而爲麻也俗方治麻多用烏附者令氣行之暴甚衝開道路得以通利則中氣行而麻自愈也然烏附止能溫行更必虛兼以補益蓋麻木未有不由於氣血兩虛也或謂麻木爲風雖三尺之

童皆以爲然。然如久坐而起亦有麻木。假如以繩縛繫釋之亦覺麻木。久則自己者此非因風邪。乃氣不行也。故不須治風。當補其肺中之氣。則麻木自去。亦有因陰火乘其陽分。火動於中爲麻木者。當兼治陰火。則愈不必去火。補陰而火自息也。大抵諸脈有餘痺在表。諸脈不足痺在裏。

十指麻木。丹溪云是乃胃中有濕痰死血。宜二陳湯加蒼朮。尤桃仁紅花附子。

有或腿足或肩背一塊肌肉木者。此陽氣不足。能周及以致陰寒凝滯也○治此證者須察其表裏寒熱。若寒勝者宜五積散之類。○風勝者宜烏藥順氣湯之類。○風勝而兼微火者大秦艽湯之類。

○濕勝者羌活勝濕湯之類兼小便不利五苓散○痰用二陳  
湯之類○脈滑數熱甚者加味升陽散火湯之類○脈細緩寒  
甚者獨痺湯之類○風勝行痺小續命湯倍防風○寒勝痛痺  
小續命湯倍附子去黃芩○濕勝者痺小續命湯倍防已○以  
下通用小續命湯加減法皮痺加黃芪桂枝脈痺加紅花桂枝  
肌痺加葛根白芷筋痺加羚羊角續斷骨痺加虎骨甘杞有汗  
減麻黃寒勝減黃芩加乾薑熱勝減附子加石膏如其病而加  
減治之或五痺不已乘虛入臟留連日久宜用獨活寄生依三  
痺湯加桑寄生除去黃芪續斷爲主蓋此證總由真陰衰弱精  
血虧損故風寒濕三氣得以乘之或用三氣飲大防風湯爲主

亦妙其有宜酒者卽以三氣飲浸酒或易老天麻丸亦可須知  
痺證屬寒者居多治痺之法母期速效切忌過用風寒濕痰之  
藥以再傷陰氣最宜峻補真陰或於純補中少佐祛邪之品使  
氣血流通久之而寒邪自去矣

五積散 見傷寒門

大秦艽湯 見中風門

五苓散 見傷寒門

小續命湯 見中風門

易老天麻丸 治諸風濕

天麻

姜汁炒

牛膝

酒炒

萆薢

各六兩

玄參

大兩

當歸

十兩酒洗

羌活

兩

生地

一斤

附片

二兩

獨活

五兩

杜仲

七兩

姜汁炒

用蜜

爲丸或泡

酒服亦可

羌活勝濕湯 治外傷濕氣一身盡痛

羌活三錢獨活三錢藁本二錢防風二錢川芎一錢

蔓荆子

一錢打碎炙甘草一錢

○如身重腰痛沉沉然經有寒也

加防已一錢酒炒附片一錢

烏藥順氣湯

方見前中風門

二陳湯

局方

治痰飲嘔惡風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘

不快等證

陳皮三錢半夏三錢白茯苓二錢炙甘一錢

薑棗煎

加味升陽散火湯

治瘧病而肌熱如火名曰熱瘧

羌活三錢獨活三錢芍藥三錢防風三錢

羚羊角挫末三錢

柴胡三錢乾葛三錢升麻二錢甘草八分犀角

挫末三錢

蠲痺湯

治周痺及手足冷痺脚腿沉重身體煩疼背項拘急

當歸三錢 赤芍三錢 黃芪三錢 薑黃三錢

羌活三錢 甘草一錢

薑棗煎

三癰湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾久癰宜用

人參三錢

白茯苓三錢

炙草三錢

當歸三錢

川芎三錢

熟地三錢

白芍三錢

酒炒黃芪三錢

蜜炒肉桂三錢

杜仲三錢

姜汁炒續斷二錢

防風二錢

秦艽二錢

獨活二錢

細辛一錢

牛膝二錢

酒炒

薑棗煎

依本方減去黃芪續斷加桑寄生

獨活寄生湯寶鑑 治腎虛臥冷寒濕當風腰腳疼痛

人參三錢

白芍三錢

炙草三錢

當歸三錢

川芎三錢

熟地三錢

白芍三錢

酒炒肉桂三錢

杜仲三錢

姜汁炒防風二錢

秦艽二錢

獨活二錢

白芍三錢

杜仲二錢

姜汁炒防風二錢

秦艽二錢

獨活二錢

姜汁炒

熟地三錢

當歸三錢

川芎三錢

熟地三錢

獨活二錢

細辛 錢半 牛膝 二錢 桑寄生 三錢 酒炒 薑煎

景岳方

治血氣虧損風寒濕三氣乘虛內浸筋骨歷節

痺痛之極及病後鶴膝風痛等症

當歸

三錢

甘杞

三錢

熟地

五錢

牛膝

二錢

杜仲

三錢

姜

白芍

二錢

白芍

一錢

肉桂

二錢

細辛

或用獨活

白芷

各錢半

薑

片煎

○氣虛加人參白朮

○風寒勝加麻黃

○此飲亦

可浸酒服

大防風湯

局方

治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內侵患鶴膝附

骨等疽不問已潰未潰宜先用此及治痢後脚膝更痛不能

動履名曰痢後風此藥祛風順氣活血壯筋骨行履如故

人參

三錢

白朮

製

熟地

三錢

防風

二錢

杜仲

三錢

姜汁炒

羌活二錢黃芪二錢官桂錢半炙草錢半川芎錢半

白芍

酒炒牛膝錢半酒炒附片二錢

一方有當歸無官桂加七片

五痺湯

治風寒濕之氣客留肢體手足緩弱麻頑不仁

片子薑黃

一兩羌活一兩白朮二兩防已二兩甘草微炙五錢

每服五錢薑水煎病在上食後服在下食前服

羌活湯

治白虎歷節風毒攻注骨節疼痛發作不定

羌活

二兩附子五錢秦艽五錢桂心五錢木香五錢

川芎

五錢當歸五錢牛膝五錢甘草炙五錢桃仁去皮尖酒浸錢麵炒

防風

各一骨碎補一兩每服四錢煎水煎溫服

續斷丸

治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

當歸一兩  
炒川續斷一兩  
草薢一兩  
川芎七錢  
天麻一兩  
防風一兩

雨

附子一兩  
乳香五錢  
沒藥五錢  
爲末蜜丸如桐子大每服四十丸  
溫酒米飲任下

活血丹 治遍身骨節疼痛如神

熟地黃三兩  
當歸一兩  
白朮一兩  
白芍一兩  
川續斷一兩

人參一兩  
爲末酒糊丸桐子大或作五劑煎服更效

治酒濕痰痛風

黃柏一錢  
炒蒼朮三錢  
羌活三錢  
甘草三錢  
歲靈仙五錢  
酒炒

陳皮一錢  
芍藥一錢  
爲末每服一二錢沸湯入薑汁調服

溪老母今年七月有八矣得痺證十餘載未愈溪自慚術淺思請高明者治愈豈不深幸母亦欣然囑溪無與其事另命孫

製藥孰知不數劑而愈不堪矣嗟乎當今之世類皆虛譽中工

亦難得矣能不令人深有哉如老母之證方書云風氣勝者爲

行痺寒氣勝者爲痛痺此證正合痛痺夫肝主筋腎主骨肝病

則血虛腎病則水虧虧則不能生肝而肝木益虛虛則不能養

筋而筋攣骨疼作矣肝腎皆屬陰被寒凝滯不通所以疼痛寒

亦屬陰是陰中陰中不宜用陰藥陰主靜靜則宜用辛溫之藥

以鼓動之今論其病則日久論其脈則沉微論其年則老衰雖

有對證之藥亦難期其速效然用之當雖未必卽愈亦屬無害

用之不當則害立至矣何以見之溪思戚友處與老母同時病

此證者五六人不三年間而俱亡矣如老母雖未全愈茲幸猶

在據溪愚見斯證斯脈無論邪之輕重均當用辛甘溫補之劑  
不宜用滯潤消散之品以殘傷生機至有時不用熟地者因六  
脈沉微熟地爲陰中之陰故暫爲停忌先用陽藥俟脈稍起乃  
可用耳何況他藥乎第念此證先哲雖立有治法而人之臟腑  
各異年衰病久變態不一未可以成法拘也人但知三陰虧損  
而不知三陰中之陽氣虧損也所以寒邪入而與陰相合留滯  
不散奈無有參故用芪朮炙草以溫後天附氣桂附乾薑以補  
先天之陽虛當歸甘杞陰中之陽以補肝腎杜仲以化精中之  
氣鹿角以溫氣中之精君熟地專補天一之水少佐以羌活防  
風之類以祛血老母服之亦頗平安姑錄此以告後之得此證

者務於補劑中少兼散邪斷無有誤若求速效純用驅痰散風逐邪之品是自速其危也方名

固木湯 新方

熟地五錢

嫩黃芩三錢

粉甘草一錢

蜜炙肉桂錢半

白朮錢半

炒心土水三錢

附片二錢

打碎乾薑錢半

炒黃紅杞二錢

歸身一錢

酒炒鹿茸霜二錢

杜仲二錢

姜汁炒

或加羌活防風各一錢

下部患者加牛膝一錢

酒炒

老母得痛痺之證復擬此新方奈鄉地無有參虎鹿其方名

人參虎鹿湯

新方

人參三錢

白朮三錢熟地五錢

焰乾歸身三錢

炒炙甘草一錢

紅杞三錢

附片三錢肉桂三錢

杜仲三錢姜虎脰骨敲細生

汁水炒用五錢

鹿茸火燎去毛敲細生用三錢

此方有回天奪化之功惜乎無藥未用

若將湯變爲丸凡真陰衰敗者服之自覺神奇

薰蒸外方見中風門

## 瘡證

太陽病發熱無汗惡寒者名曰剛瘡

此因於風寒所以發熱惡寒無汗其脈浮緊其狀身強直而口噤其勢勁急故曰剛

太陽病發熱汗出而不惡寒者名曰柔瘡

此因於風濕所以發熱汗出不惡寒其脈浮緩其狀項強而身不強直其勢濡弱故曰柔

程知曰太陽病發熱無汗惡寒爲傷寒發熱汗出不惡寒爲溫熱以證有頸項強急甚則反張故

不謂之風寒溫熱  
病而謂之症也

病身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭面搖卒  
口噤背反張者痙病也

病人身熱惡寒太陽證也頸項強急面赤目脈赤陽明證也  
頭熱陽鬱於上也足寒陰凝於下也太陽之脈循背上頭陽  
明之筋上挾於口風寒客於二經則有  
頭搖口噤反張拘強之證故名痙病也

太陽病發熱脈沉而細者名曰痙

太陽病發熱脈當浮大脈若沉細兼少陰也今發熱脈沉細  
而名曰痙者何也以其已病痙證而得沉細脈不可名太陽  
少陰傷寒之脈當名太陽風濕痙病之脈也因風邪鬱於陽  
故病發熱也湿邪凝於陰故脈沉細也此承上痙病得沉細  
脈沉細卽名之曰痙病也  
方有執曰發熱太陽未  
除也沉寒也細溫也

張璐曰發熱脈當浮數而反沉細知邪風爲溫氣所著所以身雖發熱而脈不能浮數是陽證見陰脈故金匱指爲難治太陽病發汗太多因致痙

程應旄曰卽此一端推之凡病出汗過多新產亡血過多而因虛致寒因虛致燥者不少蓋陽氣者柔則養筋發汗太多則亡其陽而損其經脈之血液故也

經筋篇曰足少陰之筋循脊內挾膂上至項結於枕骨與足太陽之筋相合由此觀之則痙之爲病乃太陽少陰之病也蓋腎與膀胱爲表裏膀胱爲津液之腑而腎爲藏精之臟病在二經真陰虧虛可知陳無擇曰夫人爲風寒濕熱所中而成痙者非無因而然也實由亡血過多筋無所營故邪得以干之所以傷寒汗下過多與夫病瘡人及產後致斯疾者槩可見矣診其脈皆沉伏弦緊但

陽緩陰急則久久拘繩陰緩陽急則反張強直二證各異不可別  
凡見此證當審察風寒濕燥內外虛實之因分別施治庶不致  
悞慎勿槩指爲風也

○若剛痙發熱惡寒無汗係實邪也宜用葛根湯○柔痙發熱  
汗出不惡寒係虛邪也宜用桂枝葛根湯○若兼風寒濕雜因  
者宜用小續命湯隨風寒濕輕重治之○若過汗表虛汗出不  
止因而成痙者宜桂枝湯加附子以固表祛風○若婦人產後  
或金瘡大傷亡血過多筋無所營因而成痙者宜用桂枝湯合  
補血湯○若腹脹滿大小便不通裏實者宜用大承氣湯之類  
○若婦人產後惡露不盡少腹硬急宜用桃仁承氣湯○或瘡

毒潰後去濃血過多爲風所襲者宜用十全大補湯加祛風之藥治之○王海藏治剛症兼濕者用神尤湯加羌活獨活麻黃○治柔症兼濕者用白尤湯加桂心黃芪○若陰虛者宜大營煎十全大補湯之類○若陽虛自汗倦怠者宜參附芪湯○若多火熱燥出汗者宜當歸六黃湯○若泄瀉者宜胃開煎○若陰虛火盛者宜清涼飲○若有痰者宜二陳湯之類○若陽氣大虛陰極畏寒邪不解而症者宜大溫中飲主之

葛根湯見傷寒門

桂枝葛根湯

卽桂枝湯加葛根升麻防風是也

小續命湯見中風門

桂枝湯加附子

卽桂枝湯加附子一味是也

桂枝湯合補血湯

卽桂枝湯全用補血湯黃芪當歸二味是也二湯合用

大承氣湯

見傷寒門

十全大補湯

見補益門

桃仁承氣湯

治瘀血小腹痛大便結或譫語口乾漱水不嚥

通身黃色小便自利或血結胸中胸腹脹

痛手不可近或寒熱昏迷其人如狂

桃仁二錢半去皮尖搗碎

大黃四錢甘草一錢

六分

肉桂

水煎服

神水湯

治風濕惡寒脈緊無汗

蒼朮

三錢米炒

防風

三錢甘草一錢羌活

三錢獨活

三錢麻黃

三錢

白朮湯

治風濕惡寒脈緩

白朮

三錢

防風

三錢

甘草

一錢

肉桂

刮去皮一錢半

黃芪

三錢

大營煎

當歸

熟地

紅杞

杜仲

白芍

山藥

午膝

肉桂 炙甘草

參附芪湯 治陽氣虛弱自汗倦怠

人參三錢 附子二錢 黃芪三錢 紅棗三枚

蜜炙 紅棗三枚

薑三片 水煎服

當歸六黃湯 此方又能治盜汗

當歸三錢 黃芪三錢 生地二錢 熟地三錢 黃連一錢 黃芩一錢

熟地一錢半 黃連半錢 黃芩半錢

黃柏一錢半

胃閑煎 治脾胃虛寒作瀉或甚至久瀉腹痛不止冷痢等證 神方

熟地五錢 山藥三錢 白扁豆三錢炒

炒去殼 炒

炙草一錢半

乾薑二錢半 白朮三錢炒 吳茱萸一錢

洗四五次

新方清涼散 治六脈浮洪滑大有力陰虛水虧不能濟火煩

熟乾燥一切諸火用此極妙

熟地四錢 生地三錢

麥冬去心三錢

知母二錢

白芍生用三錢

玄參二錢

牛膝二錢

水竹瀝對服

二陳湯

治一切痰飲嘔惡風寒咳嗽等症

廣皮三錢

半夏三錢

白芥二錢

炙草一錢

薑片三錢

紅棗三枚

劈破

水煎服

大溫中飲

方見傷寒門

## 濕證

痺病曰風寒濕三氣雜至合而爲痺也濕氣勝者爲著痺又長刺節論曰肌膚盡痛名曰肌痺因傷於寒濕也蓋濕之爲病或

因天氣雨露地氣泥水飲食生冷久着汙衣等類皆能致之使人不自覺也若夫肌表經絡之病濕由外而入也飲食血氣之病濕由內而生也然悉由乎脾腎虧損邪氣始能乘入其爲證也在肌表則爲發熱爲惡寒爲自汗在經絡則爲痺爲重爲筋骨疼痛爲身痛不能轉側在肌肉則爲麻木爲腫脹爲黃疸爲按肉如泥不起在臟腑則爲嘔惡爲脹滿爲小水不利爲大便泄瀉爲腹痛爲後重脫肛癩疝等證凡治此者必當辨表裏察虛實而必求其本但濕證雖多其要惟二一濕熱一寒濕而已病熱者謂之濕熱病寒者謂之寒濕濕熱者宜瀉宜利寒濕者宜溫宜燥知斯二者而濕無餘義矣考古人治此證莫不以理

脾清熱利小便爲主故曰治濕不利小便非其治也然其中亦有不宜利者如虛損寒濕便清之輩是又未可執

一以概論也明慧者察之

蒼朮乃治濕之要藥上下部濕皆可用若脾胃受濕沉困無力怠惰好卧宜去濕痰燥濕健脾須用蒼白二朮半夏茯苓之類凡治上部濕宜蒼朮功烈下部濕宜升麻提之外濕宜表散內濕宜淡滲下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防已黃蘖知母草龍膽蒼朮之類

有濕熱發黃一身盡疼發熱者當從鬱治凡濕熱之物不鬱則不黃當用逍遙散切禁茵陳五苓散用之者十不一生

○濕家外證身疼痛脈浮細者宜用羌活勝濕湯之類○內證

發黃小便不利脈沉細者宜用茵陳五苓散之類○若惟身煩疼而不發黃脈浮濇者則爲外感寒濕宜用麻黃加尤湯以發其汗切不宜用火以發汗恐憎熱至變也○濕家一身盡痛風濕一亦身盡痛然濕家痛則重者不能轉側風濕痛則輕掣不可屈伸此痛之有別者也至發熱濕家之熱早暮不分爲甚風濕之熱則日晡必劇蓋以濕無來去而風有休作故名風濕原其由來或爲汗出當風故久傷濕氣復受風冷所致宜用麻黃杏仁薏苡甘草湯發散風濕日晡申時也至申陽衰陰盛濕爲陰邪故至旺時而甚也

○風濕脈浮身重汗出惡風者防已黃芪湯主之傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂

枝附子湯主之若大便堅小便自利者去桂枝加白朮附子湯  
主之○若寒濕之氣中於外者宜溫而兼散如五積散平胃散  
加胃五苓散不換金正氣散之類主之

○濕熱證必其證多煩渴小水赤澁大便秘結脈見洪滑實數  
者治宜清利如熱甚者以清火爲主而佐以分利熱微者以分  
利爲主而佐以清火如四苓散小分清飲或大分清飲茵陳飲  
之類皆可擇而用之

○寒濕證凡病內濕等證者多屬氣虛之人氣屬陽陽虛則寒  
從中生寒生則濕氣留之此陰陽之性理出自然有不必外中  
於濕而後爲之濕也此之變病惟腫脹泄瀉痰飲嘔吐等證多

有之病之微者宜溫宜利宜燥如五苓散滲濕湯六味地黃丸  
理中湯聖尤煎或佐閑煎胃閑煎薛氏加減金匱腎氣湯之類  
臨證加減用之

五積散

見傷寒門

不換金正氣散

見傷寒門

五苓散

見傷寒門

六味地黃丸

見補益門

八味地黃丸

見補益門

胃閑煎

見瘧證

四苓散

卽前傷寒門五苓散去肉桂

加胃五苓散

卽五苓散加羌活

治濕勝身痛小便不利發渴此太陽  
經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

理中湯

卽補益門人參理中湯

茵陳飲

治熱熱泄瀉熱痢口渴喜冷小水不利黃症

濕熱閉證

茵陳三錢梔子三錢澤瀉三錢青皮三錢甘草一錢

菊花一錢

水煎陸續飲熱瀉一服愈

小分清飲 治小水不利濕滯腫脹不受補等證

茯苓三錢澤瀉三錢薏苡三錢猪苓三錢枳殼一錢半

厚朴一錢半姜

汁水炒

○如陰虛水不能達者加生地牛膝○如

黃疸加茵陳○如無內熱而寒滯不行者加肉桂

大分清飲 治積熱閉結小水不利或致腰腹下部極痛或濕

熱下利黃疸溺血邪熱畜邪腹痛淋閉等證

茯苓三錢澤瀉三錢猪苓三錢木通三錢梔子

或倍之

枳殼二錢車前子二錢 ○如肉熱甚者加黃芩黃柏草龍

膽○如大便堅脹滿加大黃○如黃疽小水不利熱甚者加茵陳○如邪熱畜血腹痛者加紅花青皮

佐閔煎

治生冷傷脾瀉痢未久腎氣未損者宜用

此以去寒  
濕安脾胃

厚朴

錢半陳皮

錢半山藥

三錢炒去壳扁豆

三錢炒炙草

猪苓

澤瀉

乾薑

炒黃

肉桂

各二錢

○如腹痛甚者加

廣香或吳茱萸○瀉甚不止者加故紙或肉豆蔻

滲濕湯

治寒濕所傷身體重著如坐水中小便或赤澁大便

溏泄因坐卧濕地或爲陰雨之所襲也

蒼朮

白朮

炙草

茯苓

丁香

乾薑

橘紅

聖尤煎

治飲食偶傷或吐或瀉胸膈痞悶或脇肋疼痛或過

用尅伐藥致傷臟氣脈息無力氣怯神倦速宜用此不得因其虛痞虛脹而畏用白朮此中虛實之机貴乎神悟也若痛脹覺甚者卽以此煎送神香散最妙若用治寒濕瀉痢嘔吐  
尤爲聖藥  
白朮用冬朮味甘佳者八錢或一二兩炒乾薑二錢內桂二錢陳皮酌用或不用  
水煎溫服

○若治虛寒瀉痢嘔吐等證則人參炙草之類任意加用○  
若治中虛感寒則麻黃柴胡任意加用○神香散丁香白蔻  
二味等分爲末  
加減金匱腎氣丸薛氏 治脾腎陽虛不能行小便不利腰重  
脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛以成膨證若非速  
救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛又何以制水

此必用之劑也苟不知此必不能救若病急變丸爲湯主之

熟地

淮山

棗皮

白芍

澤瀉

丹皮

肉桂

附片

牛膝

車前子

卽八味加車前牛膝

甘草附子湯

治風濕相搏身體疼痛不能自轉側宜用此

炙草

附片

白朮

桂枝

蓋以甘草益氣和中附子溫經散濕白朮能勝濕燥脾桂枝祛風固衛故也若脈浮實加麻黃○若大便被風燥而鞭小便自利者去桂枝此證須發汗貴微微似欲汗出者風濕俱去也切忌大發其汗

麻黃杏仁薏苡甘草湯 治一身盡痛發熱風濕在表也

麻黃

五錢去節炙草

一兩

苡仁五錢杏仁

十二粒去皮尖研

溫服微汗避風凡汗均宜忌風

防已黃耆湯 治脈浮風濕身重汗出惡風

防已

酒炒五錢

黃耆錢

白朮四錢

炙草錢

生薑二錢

大棗三枚

水煎溫服

脈浮風也身重濕也寒濕則脈沉風濕則脈浮若浮而汗不出惡風者爲實邪可與麻黃杏仁薏苡甘草湯汗之浮而汗出惡風者爲虛邪故以防杞白朮以去濕黃耆甘草以固表生薑紅棗以和營衛也

羌活勝濕湯 見前痺證

麻黃加朮湯 治寒與濕合一身煩痛宜用此微汗之

麻黃二錢

桂枝二錢

炙草二錢

杏仁二錢

白朮四錢

麻黃

去節二錢

桂枝二錢

炙草二錢

杏仁二錢

白朮四錢

此方卽麻黃湯加白朮是也蓋以麻黃得白朮則汗不致於驟發白朮得麻黃則濕滯得以宣通

桂枝附子湯 治傷寒八九日風濕相搏身體痠煩不能自轉側不嘔不渴脈浮虛而濇者桂枝附子湯主之若其人小便鞭小便自利者去桂枝用白朮附子湯主之

桂枝五錢附子去皮脐大一錢四錢炙草二錢生薑三錢切片紅棗擘水煎溫服  
按不溫不渴是無傷寒裏病之證也脈浮虛是在表虛風也濇者是在經寒濕也然後知風濕之邪在肌肉故以桂枝表之不發熱爲陽氣素虛故以附子逐溫兩相結合自不能留矣

白朮附子湯 治大便鞭小便自利今不議下者以其非邪熱入裏之鞭乃風燥濕氣之鞭去桂枝者不欲其發汗再奪建

治也用白朮者以身重著濕在內分用以

佐附子逐湿於肌此用方之義也

附子

去皮臍火  
四錢

白朮

四錢

炙草

二錢

生薑

三錢

紅棗

四枚

擘

水煎溫服

### 茴陳五苓散

猪苓

三錢

澤瀉

四錢

白朮

三錢

茯苓

三錢

肉桂

刮去皮一錢

茴陳

五錢

水煎溫服

### 二妙散

主濕熱爲患腰膝疼痛不能行動

黃芩

乳潤一宿

蒼朮

米泔浸七宿

二味等分爲末空心酒服三錢

濕性就下故病在中半以下濕則生熱濕熱相搏其痛乃作  
黃柏味苦勝熱且能下行故以爲君蒼朮性燥燥勝濕且  
能辛散故以爲臣黃柏可去熱中之濕蒼朮可去濕中之熱  
兩者相綰各有妙用故曰二妙

虎附湯 治風濕相搏腰膝疼痛中氣不足四肢重著

白朮 四兩 附子 (炮去皮脐) 一兩五錢

每服三錢薑棗水煎熱服

加味平胃散 (秘方) 治脾胃不和伏暑水瀉不進飲食

蒼朮 (米泔浸) 五斤 厚朴 (姜汁炒)

廣皮 (各三兩) 甘草 (三十克)

扁豆 (二兩炒)

三斤

木通 (一斤加此二味尤得醒)

脾分利之功其效更捷

右爲末每服五錢

姜棗水煎服或用姜湯調服

御院平胃散 調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕

厚朴 (製)

橘皮

蒼朮 (米泔水浸)

甘草

茯苓

人參

薑棗水煎服

一方棗肉小丸心薑湯下五十

黑虎散 神治寒濕筋骨疼痛

川烏 一兩

草烏 (兩半去皮) 蒼朮 (兩半)

生薑 (一兩取汗)

乳香 (去油) 五錢

五靈脂

五錢

去油藥

川甲子

土炒

自然銅

火煅

葱

八兩去味

揭和

處晒入後藥

共爲細末。醋丸。好酒空心服。壯者一錢。二分弱者七八分。

○一切寒濕肺氣。風氣。肩臂腿痛。及偏正頭風。於大伏天以新瓦數塊。晒極熱。輪流熨於患處。如此數日。無不愈者。蓋寒濕侵入皮膚筋骨之間。得太陽之真氣。則陰寒頓解。且借瓦性燥裂之土。而濕氣賴以收之。故其効如神。

## 黃疸

黃土色也。土病則見之。脾胃屬土。脾爲陰土。主濕。胃爲陽土。主熱。若趺陽脈數。是熱勝於濕。則從胃陽熱化矣。熱則消穀。故能

食謂之陽黃若趺陽脈緊是濕勝於熱則從脾陰寒化矣寒則不食故濕卽滿謂之陰黃陽黃則爲熱疸酒疸陰黃則爲穀疸女勞疸若尺脈不沉而浮則爲傷腎亦女勞疸胃脈不緩而緊則爲傷脾亦穀疸又古人名其有五疸曰黃汗黃疸酒疸穀疸女勞疸雖名目如此然總不外乎陰陽陽證多實陰證多虛也黃疸一證乃濕熱鬱久外發肌膚而然也其候偏身面目皆黃甚則深黃面如烟薰之狀其中又有陰陽之別如面紅口渴尿赤色亮身熱者乃脾家濕熱此陽黃也口不渴而色暗黃身冷如冰者乃脾腎寒濕此陰黃也治者宜分別施治

陽黃一證原因濕熱而成治者當詳審之如表實無汗宜外發

其汗齒陳麻黃湯主之使黃從表解也裏實二便秘濇腹滿者宜茵陳蒿下之使黃從表解也若表有汗裏不便秘腹滿是表裏無證不可汗下惟利小便宜用茵陳五苓散使黃從水道利陰黃者乃脾濕腎寒兩虛而成此最爲危候溫脾去黃以理中湯加茵陳主之溫腎去黃以齒陳四逆湯主之

木道利之則愈

陰黃係內傷不可以黃爲意專用清利宜卽培補心脾如歸脾湯之類或真水真火六味地黃湯八味地黃湯之類

○傷寒發黃表熱未清而濕熱又盛者宜柴芩湯或茵陳五苓散○若內熱甚而表邪仍在者宜柴芩煎

○若勞役飲食內傷中州變寒之病生黃者非傷寒壞之而得

只用大小建中湯不必用茵陳也

桂枝湯加黃耆 治黃病脈浮宜汗者

桂枝四錢芍藥三錢炙甘草一錢黃耆三錢 方中用桂枝湯以解肌肌解則汗自出加黃耆以助表表和則營衛亦通矣

大黃硝石湯 治黃病脈沉腹滿便閉自汗裏濕者

大黃四錢芒硝四錢黃柏四錢梔子三錢

方中用梔子清上焦濕熱大黃瀉中焦濕熱黃柏清下焦濕熱芒硝於苦寒之中而有燥烈發散之意使藥力無所不至而湿熱悉消散矣

齒陳麻黃湯 治陽黃身無汗

茵陳蒿五錢麻黃五錢水煎加黃酒少許服之

茵陳四逆湯 治腎陰虛寒而黃者 脈必沉遲

附子

去皮臍大  
銀二錢

乾薑

三錢  
炒黃

甘草

四錢  
炙甘草二錢

茵陳理中湯 治脾虛致濕而黃者

乾薑

三錢  
炒黃

白朮

三錢  
土炒

炙甘草

二錢  
炙甘草三錢

茵陳五苓散 治黃疸病小便不利

茵陳

五錢  
炒黃

猪苓

二錢  
赤茯苓

三錢  
水炒

澤瀉

四錢  
四錢

肉桂

二錢  
水煎服

引用燈心水煎服

此方治濕熱成疸之法 蓋以茵陳散熱鬱五苓利濕瘀也

小半夏湯 治胃寒虛氣上逆而噦者用此散逆止噦又治嘔

吐穀不得下及心下有飲者

半夏六錢生薑四錢切片水煎服

茵陳蒿湯 治濕瘀熱鬱內蒸閉結食後卽頭暈目眩心煩不安是爲穀疸六錢  
茵陳六錢梔子四錢大黃三錢引用燈心水煎服

小建中湯 治虛勞面黃小便自利

白芍六錢炙草三錢桂枝三錢生薑三錢切片飴糖一兩

乘熱藥對服嘔家不宜建中湯以甜故也

梔子大黃湯 治酒黃疸心中懊惱成熱痛此症必小便不利  
心中熱足下熱何也胃脈貫膈下足跗濕熱上熏胃脘則心  
中熱下注足跗則足下熱也

梔子三錢大黃三錢枳實三錢豉一撮水煎溫服

猪膏髮煎 治一切黃病

新鮮豬油

上者十兩  
煎去渣淨

亂長髮

用熱水多洗數次洗淨如雞子  
大三枚人油文武火煎至髮化

完入上蜂蜜四兩熬成膏入磁罐內封固乘熱埋

土內一日夜出火毒取出每服二三匙白湯點服

此方黃輕者服之卽愈

茵陳飲 兒濕證

大分清飲 兒濕門

梔子蘖皮湯 治傷寒身黃發熱

梔子

四錢甘草二錢黃柏五錢

柴芩煎 治傷寒脈滑數陽證熱渴喜冷及瘧痢並行又兼治表邪發黃等因

柴胡

黃芩

梔子

澤瀉

木通

枳殼

○如動血者加白芍甘草○如濕勝氣陷者加防風

柴苓湯

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

柴胡

黃芩

十四味大建中湯 治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛及營衛

失調積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧漸成勞瘵或生黃者

人參

白朮

白苓 炙草

熟地 當歸

川芎

白芍

肉桂

附片

麥冬

去心

黃芪

蜜炙

半夏

肉蔻

蔻蔻

酒浸

薑

鋤黃丸

專治黃腫不甚虛者

此治標之聖藥也奇效

如神百

發百中

青礬 一名綠礬挾鮮明上色者四兩五錢入小砂罐內用合  
式碗底搪罐口黃泥封固剛炭火燬紅罐點一支香久取起

研極細當歸三兩酒浸炒焙乾亦研極細百草霜二兩亦研  
極細照分各秤準共合研勻用米湯加極細米麪打糊丸如  
梧子大卽時烘乾或熱酒或白水每次吞四五十丸

此以箬能勝濕破癥當歸能引箬氣入血草霜黑能束紅當亦鋪黃轉紅矣

茵陳橘皮湯 治身黃脈沉細數熱而手足寒喘煩燥不渴者  
茵陳 橘皮 生薑 白朮 半夏 茯苓

柴胡茵陳五苓散 治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑煩渴發  
熱此以汗下太早濕未除以致遍身發黃

猪苓二錢 白朮二錢 炒茯苓二錢 澤瀉二錢 官桂二錢  
茵陳五錢 車前子一錢 木通一錢 柴胡一錢 燈草引

○因酒後者加乾葛二錢

小茵陳湯 治發黃脈沉細四肢及遍身冷汗

茵陳五錢附片五錢黑薑五錢炙草三錢

### 痙證

岐伯曰肺主身之皮毛心主身之血脉肝主身之筋膜脾主身之肌肉腎主身之骨骼故肺熱葉焦陽明虛弱津液不化筋骨失養皮毛痺痙發爲痙躄不能行也因而心氣熱爲脈痺則脛節縱而不任地肺兼心病也因而腎氣熱爲骨痺則腰脊不能舉舉肺兼腎病也因而肝氣熱爲筋痺則筋失所養拘攣不伸

肺兼肝病也因而脾氣熱爲肉痠則胃燥而渴肌肉不仁肺兼  
脾病也今人多以痿痺爲一病不知痿病多係兩足痿軟不痛  
不似痺病通身肢節疼痛觀前賢治痿不用風藥則可知痿病  
多虛不同痺病之多實也又丹溪曰諸痿起於肺熱而治痿獨  
取陽明蓋肺金體燥居上主司氣而畏火脾土性溫居中主四  
肢而畏木火惟炎上因嗜慾無節則水失所養火無有制而遂  
侮所勝肺得火邪而熱矣木性剛急肺受熱則不能管攝一身  
脾傷則四肢不能爲用而諸痿作矣瀉南方則肺金清而東方  
不實何脾傷之有補北方則心火降而西方不虛何肺熱之有  
故陽明實則宗筋潤能束骨而利機闊矣此治痿最妙之法也

痿證若草木失其培植枝葉枯槁根本尚未大傷以其不咳嗽  
不吐血不發寒熱爲異於虛勞耳故久沾床蓐而形色絕無病  
狀亦並無痛楚麻木若痺證也蓋脾證由於三氣外傷病在經  
終血脈之中氣血閉滯者也尚可作有餘論痿證由於氣血不足  
受病在五臟六腑之中不能充固者也當純從不足治

夫痿熱症也本於內臟不足而其原則由於肺論治則獨取陽  
明蓋真氣受於天與穀氣并而充身穀始入於胃以溉五臟真  
氣者天之道穀氣者地之道真氣與穀氣并而後形氣之道立  
陽明虛則五臟無所稟不能行氣血而奉生身者弱矣陽明主  
周宗筋宗筋足之強弱所係故曰偏枯痿易四肢不用者脾病

也經曰四肢皆稟氣於胃必因於脾乃得稟也今脾病不能爲胃行於津液水穀日虛氣日以衰脈道不利筋骨肌肉皆無氣以生而四肢不舉經又曰歲土太過中滿食減四肢不舉是四臟之痿又獨重於陽明者明矣及後世諸賢立論有主乎虛損成患者有主於實邪爲病者當兼以脈候辨之有曰精虛血耗內臟不足而成痿者有曰燥金氣鬱血液衰少不能榮養百骸而成痿者有曰陽明濕熱熏蒸於肺困水之工源而成痿者有曰使內太過水少不能勝心火火燄肺金而六葉焦以成痿者有曰腎主骨而藏精肝主筋而藏血嗜慾無度則肝腎虛而成痿者凡此皆論內傷不足爲病而總歸於熱故曰痿病無寒不

可作寒治又曰痿屬濕熱不可作風治當以清熱補精養血爲主觀此則知痿病之無外感也明矣但始因氣熱而成不可驟用辛熱峻補之劑耳其以實邪爲病立論者有曰勞心大過心氣熱則火獨光腎脈隨火上行而痿者有曰燥金受邪寒水生化之源絕而濕熱下流腎肝而痿者有曰醇酒膏梁命門相火過盛逼陰於外而痿者有曰長夏服熱藥太過陽明火邪內伏而痿者有曰肺氣不舒鬱遏成火而痿者又曰濕痰聚於中焦手足軟而痿者有曰腎肝氣虛風邪襲虛而痿者卽經文治痿獨取陽明亦非謂陽明之本虛立見否則何以病痿之人飲食日盛形體日肥而足終痿易不用豈水穀入海陽明氣旺獨不

能運化精微以強筋骨乎此乃火邪伏於胃中但能殺穀而不  
能長養血氣以生津液灌漑百骸是以飲食倍於平人而足反  
爲之不用此所謂壯火食氣胃熱消穀善饑是也陽明之熱邪  
原是肺熱中傳來故治痿獨取陽而者非補陽明也治陽明火  
邪勿使干於氣血之中則濕熱清明筋骨強足痿自起此經不  
言補而言取者取去陽明之熱邪耳凡此皆以實邪爲病立論  
也然名病雖一而脈候自殊虛實之間豈無辨乎要知虛者乃  
正氣虛實者乃邪氣實豈有氣血精髓充足而筋骨爲之者乎受病  
○東垣治此證取黃柏爲君黃芪等輔佐以治諸痿無一定之  
法有兼痰積者有濕多熱多者有濕熱相半者有挾氣者臨病

量其宜而加減其亦治瘧之良法也

○凡瘧由濕熱遞洪滑而證多煩熱者必當先去其火宜二妙散隨證加減用之

○如兩足疼痛兼濕痺似火燎之狀從足漸至腰胯或麻痺痠軟皆係濕熱爲患宜加味二妙湯主之

○若時令所感濕熱勝者宜東垣清燥湯

○若陰虛兼熱者宜加味四物湯虎脰骨丸或

丹溪補陰九滋陰八味丸之類

○若絕無火證而只因腎肝虧損者不宜兼用涼藥以伐生氣

惟鹿角膠丸爲最妙或加味四斤丸八味地黃丸金剛丸之類皆可擇用

○纂要云濕熱者宜用東垣健步丸加蒼朮黃柏黃芩以

燥濕降火

○濕痰宜用二陳湯加蒼朮白朮黃柏黃芩入竹瀝薑汁

○血虛用四物湯加蒼朮黃柏下補陰丸

○氣虛用四君子湯加蒼朮黃柏

薛立齋曰痠證多因足三陰虛損若脾腎不足而無力者用還

少丹若肝腎虛熱而足無立者用六味地黃丸如不應急用八味地黃丸

○若胃虛減食宜芳香辛溫之劑以治之如藿香養胃湯之類

二妙散 見濕證

加味二妙湯 治感濕熱之邪兩足痠軟而熱者

防已 三錢當歸 三錢秦艽 三錢黃柏 三錢川草薢 三錢酒炒

龜板 酥炙牛膝 三錢酒炒 蒼朮 三錢米汁水炒

東垣清燥湯 治六七月間濕令大行子能令母實而熱濕熱

相合刑庚大腸故用寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源則腎虧痿躯之病作腰以下痿軟癱瘓不能步履

黃芪

蜜炙二錢

生地

二錢

人參

一錢

蒼朮

米汁水炒

白朮

土水炒

麥冬

去心

澤瀉

酒炒

黃柏

酒炒

黃連

白茯苓

猪苓

澤瀉

神麃

黃柏

炙草

北味

研

升麻

北味

研

柴胡

北味

研

炙草

各八分

加味四物湯 治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動

熟地

三錢

當歸

一錢半

川芎

白芍

人參

黃連

杜仲

各八分

五味

九粒

麥冬

去心

蒼朮

米汁水炒

黃柏

各一錢

知母

五分

牛膝

足不與者不用

水煎服酒糊丸亦可

虎脰骨丸

治兩足痿弱軟痛或如火燎從足踝下上衝腿膝

等證因熱所成者經驗

牛膝二兩歸尾二兩

龜板一兩

防已一兩

虎脰骨一兩

酥炙

蒼朮

米汁浸宿四兩

黃柏米浸日晒四兩

爲細末麵糊爲九梧子大每

服百餘丸空心薑湯或鹽湯送下

○一方加炮附子五錢

丹溪補陰丸 一名虎潛丸降陰火滋腎水

黃柏

酒炒或青鹽水炒

知母

青鹽熟地各三兩水炒熟地兩

龜板

酥炙四兩

白芍

酒炒二兩

當歸

二兩

牛膝

二兩酒炒虎脰骨酥炙

瑣陽

酥炙陳皮各一兩

五錢

右爲細末酒煮羯羊肉爲丸桐子大冬加乾薑半兩每服六十九丸薑鹽或酒下治陰虛火盛下焦濕熱等證又可變丸爲湯服

滋陰八味丸

山藥四兩丹皮三兩白茯苓三兩棗皮四兩

浸洗

酒澤瀉三兩青

鹽水炒

熟地八兩 黃柏青鹽水炒三兩 知母鹽水炒三兩

鹿角膠丸 治血虛虧損兩足痿弱不能行動久卧牀褥者  
鹿角膠一斤 鹿角霜八兩 熟地八兩 當歸四兩 人參三兩 牛膝三兩  
兔并三兩 白茯苓三兩 白朮二兩 虎脰骨土水炒 鱉板炙各一兩半 杜仲二兩  
右爲末先將鹿角膠用無灰酒溶花加煉蜜搗丸桐子大每  
服百丸空心鹽薑湯下

加味四斤丸 治肝腎二經氣血不足足膝酸痛步履不隨如  
受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脰骨一斤 酥炙乳香另研 没藥另研 川烏炮去皮牛膝酒炒一兩  
肉蓯蓉二兩半 洗天麻二兩姜汁水炒 木瓜十兩去穰蒸

右爲細末先將蓯蓉

木瓜搗膏加酒糊和杵丸桐子大空心溫酒或鹽湯任下

八味地黃丸

見補益門

六味地黃丸

見補益門

金剛丸

治腎損骨痿不能起牀宜此益精

草薢

杜仲

姜汁炒

肉蓯蓉

酒洗

菟絲子

酒洗

并〇本方加木瓜牛膝名

加味金剛丸

用酒煮猪腰子搗丸桐子大每服七

十九空心

溫酒送下

丸

難

東垣健步丸

治脚膝無力屈伸不得腰背脚腿沉重行步

防已

一兩酒炒羌活

柴胡

滑石

花粉

酒洗各五錢

炙草

五錢

防風

三錢

澤瀉

三錢

苦參

酒洗各五錢

川烏

炮各一錢

肉桂

五分

爲細末酒糊丸桐子大空心服〇如濕熱加蒼朮黃柏黃芩

二陳湯

治濕痰者

陳皮三錢 半夏三錢 白茯苓二錢 炙草一錢

本湯卽陳半芩草四味加蒼朮白朮黃芩黃柏竹瀝薑汁

四物湯見補益門

治血虛者於本方內加蒼朮黃柏下補陰丸

○蒼朮黃柏治癥要藥也

四君子湯見補益門

治氣虛者於本方加蒼朮黃芩黃柏

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗

遺精白濁真氣虧損肌體瘦弱等證

熟地三兩 山藥

棗皮

杜仲

姜汁

甘杞

各二兩

牛膝酒炒

遠志姜汁浸炒

肉蔻蓉

酒洗

北味

川續斷

楮實子 小茴

兜井

巴甘戟各

各二兩

煉蜜爲丸

藿香養胃湯 治胃虛不食筋無所養而成癰

藿香

白朮  
土炒水人參

白苓

苡仁

半夏

神龜

名三烏藥

二錢

縮砂

姜水炒二錢

草澄茄

二錢

炙甘

一錢

生薑

五片

紅棗

三枝

水煎溫服

滋陰堅骨湯 治痿證屬陽明胃火鑠腎水則骨中空虛無滋潤不能起立服此方自雙足有力

其方見補益門

五加皮酒 治筋痠拘攣疼痛不便屈伸

五加皮

半斤

蒼耳子

六兩

枸杞子

四兩

薏苡仁

四兩

生地黃

二兩

木香

五錢

以好酒一大埕將藥用囊盛懸埕中浸七日取出焙乾爲末  
煉蜜丸如桐子大空心酒吞八十九丸其酒聽飲但常使酒  
十全散 治氣血俱虛四肢不用男婦諸虛不足五勞七傷拘  
瘞蜜丸如桐子大空心酒吞八十九丸其酒聽飲但常使酒  
氣相接爲妙

急疼痛面色痿黃脚膝無力脾腎氣弱等症

人參

黃耆

白朮

茯苓

甘草

肉桂

當歸

川芎

熟地

白芍

各等分

爲粗末每服四五錢薑棗水煎服

○桂芍藥甘草小建中湯也加黃芪卽黃芪建中湯也人參

白朮茯苓甘草四君子湯也當歸川芎地黃芍藥四物湯也

以其氣血俱虛陰陽並弱法天地之成數故名曰十全散

滋腎舒筋健步丸 治痰濕手足不便血虛筋骨軟弱

當歸

酒洗

白芍

酒洗

牛膝

酒洗

杜仲

酒洗各

一兩

羌活

獨活

生浸宿培

木瓜

酒浸培

川芎

防已

酒浸培

茅山蒼朮

米泔製

二兩

肉桂

西銖皮

白朮

二兩

熟地

酒洗一兩

桑寄生

酒炒六錢

共爲細末

酒丸

桐子大

每服百丸

空心淡鹽湯

下天陰薑湯

下酒服亦可

○一方加虎脰骨酥炙一兩

溪向年治張戚之母得瘻廢已年餘矣諸醫不效招溪診之六脈洪大有力色蒼體壯雖年將六旬氣元充旺詢之善飲酒醴知係釀成濕火蘊結下焦所以二便常常滯滯兩足不能伸縮此爲脈痿證也溪量擬一方用大黃六兩甜酒九蒸九晒生地六兩銅刀片焙乾牛膝三兩酒蒸焙乾黃柏三兩黃芩黃連各三兩共爲細末將大黃搗膏各藥末又合搗勻酌加煉密爲丸

每空心白水服三四錢服至一月積滯去盡後服滋陰八味丸

全愈

岳周文盛藏板

雨黃芩黃連各

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮

頑斯夫在於山中嘗歸鄉半世共清廉民天知曉也善炮苦頭  
髮而手毒素頭之母縣寒微古早始與吳當醫不效時勞怨之云

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮

地榆

大黃

甘草

桔梗

升麻

葛根

柴胡

白芍

白朮

白芷

白朮