

長樂陳修園原著

吳縣潘偉如增輯

醫西學易通

上海中華新教育社印行

醫學易通卷三

長樂陳念祖原本

吳縣潘 蔚增輯

裏證

傷寒

傷寒病陽明經大渴大熱法用白虎湯為表中之裏證及其傳裏謔語胃腹滿不大便為裏中之裏證宜三承氣湯擇用詳於傷寒門不贊劉河間先生用三一承氣湯代上三方

○傷寒裏證詩

表中之裏是陽明熱渴汗多白虎湯行胃實晡潮加謔語裏中之裏枳

實大黃平三承氣湯隨其見證而用之

白虎湯見瘧

三一承氣湯見瘧

大黃附子湯

此為寒熱互結剛柔並濟之和劑

大黃貳錢

附子炮貳錢

細辛壹錢

水煎服

○歌曰

大黃附子細辛湯。半用辛溫半用涼。脈見緊弦寒已劇。脇旁偏痛效為良。

心腹諸痛

心痛

心為君主之官受邪而痛手足寒至節名胃膈痛

肺氣胃脘痛

不和

兩脇痛

肝膽不洽此云心痛乃心胞絡痛也

大腹痛

脾屬小腹痛之病

昔人每證皆分別九種曰飲曰食曰

風曰冷曰熱曰蟲曰悸曰注曰去來悸者心虛而動痛也注者邪氣着而

痛也去來者作止不常亦邪氣也但注陰而去來為陽耳其實是小家伎

倆不必泥也宜以上中下兩旁部位分之自心胃至脘胃為上部宜宣其

陽氣陽氣虛宜黃耆氣實宜枳實氣結宜貝母瓜蒌皮氣逆宜半夏薤白

氣滯宜檀香砂仁之類自胃脘至臍為中部宜調其陰陽仲景理中丸以

人參味甘多液甘草味勝於氣補陰以白朮乾薑補陽為萬古準繩即如

人參為陰分藥

甘草亦陰分藥

補陰以白朮乾薑補陽為萬古準繩即如

通脈四逆湯急於回陽。若有腹痛，必加苦寒之芍藥以養陰。黃連湯重于清火，因有腹痛，不離辛熱之薑桂以開陽。此理甚微，非熟於內經者不可與語也。自臍下至陰器為下部，宜破其陰氣。金匱名為寒疝，腫今人以單九後痛徹前陰，陽無分界限，宜加赤石脂壹兩以堵截之。以生薑當歸羊肉湯藉羊肉之濁氣引入陰分以破陰，尤為神妙也。脇肋一帶為側部，宜利其樞轉，肝膽之氣其行在側。小柴胡湯為少陽之正藥，當歸四逆湯為厥陰之正藥，或再加鮮橘葉肆拾玖片則得矣。以上諸證脈細而遲寒也。以薑桂附子吳茱萸之類為主，脈大而數熱也。以金鈴子黃連沙參芍藥之類為主，痛而利者虛也。以附子理中湯之類為主，痛而閉者實也。以小承氣湯之類為主，亦有寒實而痛者，宜大黃附子湯以溫通之。若吐蟲則用附子理中湯去甘草加當歸川椒黃連烏梅，若食積則先以平胃散加麥芽山查以消導之。否則以承氣湯下之。若因怒氣而痛，則以七氣湯加貝母撫芎香附以解之。人人共知不必贅也。又仁齋直指治脾痛攻刺百

藥固效用和劑抽刀散如神。心腹為陰故列於裏證。

○心腹諸痛詩

痛分四面定醫方。下主於陰上屬陽。介在陰陽中部位。樞行在側轉斯康。

黃耆湯 治氣虛諸痛。

黃耆 壹兩 當歸 叁錢 肉桂 伍錢

水煎服

枳實湯 治氣實諸痛。

枳實 叁錢 半夏 肆錢 生薑 捌錢

水煎服

○歌曰

心腹諸方虛實詳。黃耆枳實兩名湯。虛宜耆桂當歸品。實證須知枳半薑。

丹參飲 治半虛半實諸痛。

丹參 壹兩 白檀香 砂仁 各壹錢

水煎服

○歌曰

心腹諸疼有妙方丹參為主義當詳擅砂佐使皆遵法入藥咸知效驗

苦萆半夏白酒湯 治實證

薤白 伍錢 苦萆 肆錢 半夏 叁錢 白酒貳杯煎服

○歌曰

胃脾不卧背連心。氣短還兼欬喘侵。薤伍夏叁加肆苦。兩杯白酒一同

斟

理中湯 傷寒論方

通脈四逆湯 傷寒論方

黃連湯 傷寒論見暑證方

黃連 治寒痛此方治熱病 炙草 乾薑 桂枝 各壹錢 半夏 貳錢 大棗 貳枚 水

煎服

當歸生薑羊肉湯 治諸病裏急並治寒疝腹

羊肉 伍兩 生薑 肆錢 當歸 玖錢 水捌杯煎至叁杯每服壹杯日三服寒

多加生薑痛多而嘔加陳皮陸錢白朮參錢酌量加水

○歌曰

寒疝腹痛貴扶陽神妙歸薑羊肉湯多嘔再加陳與朮若論堵截赤脂

良

小柴胡湯

方見傷寒表證治脇痛多嘔寒熱往來若腹中急痛先服小建中湯再服

小建中湯

即桂枝湯原方加膠飴伍錢水煎去滓納飴微火清解

○歌曰

腹中急痛建中方脇痛因由屬少陽柴草參芍薑夏棗轉樞側部小柴

良

當歸四逆湯

傷寒論細欲絕者履冷脈細

當歸 芍藥

各錢貳 桂枝 炙草

細辛

木通

各壹錢

大棗

肆枚

水煎

服寒者加生薑吳茱萸各貳錢酒水各半煎

金鈴子散

治諸痛服熱藥更甚者

金鈴子去核元胡索各等分研末清酒下貳叁錢

金鈴子

去核

元胡索

各等分

研末清酒下貳叁錢

○歌曰

金鈴胡索等同研。清酒連吞壹貳錢。脈大而洪拋熱藥。就中加減效如

仙

七氣湯

治七情氣逆諸病

茯苓

叁錢半夏

厚樸

各貳錢紫蘇葉壹錢

加生薑叁片水煎服

○歌曰

壹蘇貳樸夏苓叁。七氣湯能祛疾煩。因怒再加芎附貝。人人共解不須

譚

和劑抽刀散

川白薑

伍個剉入

巴豆肉壹錢糯米

陸兩壹錢良薑

伍兩入斑蝥貳拾伍個同炒至蝥黑去蝥

石菖蒲

伍兩半炒

右為末每服貳錢空心溫酒調下

○歌曰

抽刀散自異人傳。怪底醫家祕不宣。川白良薑菖米外。已斑並炒宿疴

痊

滑氏補肝散 治肝虛脇痛目昏爪枯

酸棗仁 肆錢 炒 熟地 白朮 各壹錢

獨活 五味子 各壹錢 為末每服伍錢水煎服

○歌曰

肝虛脇痛補肝施 錢半歸芍瓜藥萊 酸棗肆錢須炒熟 叁分味活助筋

舒

龍薈丸方 治肝火脇痛脈弦急數實

龍膽草 當歸 洗并酒 梔子 黃連 黃柏 黃芩 各壹兩 大黃 酒浸 青黛

蘆薈 各伍錢 木香 伍錢 麝香 伍分 蜜丸小豆大薑湯下貳叁拾丸

○歌曰

當歸蘆薈梔將木麝二香及四黃 龍膽共成十一味 諸凡肝火此能

攘

苦萋湯 治左脇痛

大苦萋壹隻重壹貳兩者連皮搗爛粉甘草貳錢紅花伍分水煎服蓋

柴胡龍薈青黛龍膽之類苦寒益資其燥而苦萹柔而滑潤於鬱不逆
甘緩潤下故奏效捷也

○歌曰

苦萹壹隻搗連皮粉草紅花各有宜最喜甘柔選潤下左邊脇痛效皆

知

推氣散

治右脇痛
脹滿不食

片薑黃

枳殼

桂心各壹

炙草貳錢

為末每服貳錢薑棗湯調下食

遠服

○歌曰

桂心枳殼片薑黃炙草同研下棗湯每服貳錢推氣散右邊脇痛此良

方赤茯苓湯

治息積脇下
氣逆滿悶

赤茯苓

桂心

陳皮炒

大腹皮

各伍錢

甘草壹分

高良薑壹兩

吳茱萸

叁分每服叁錢水煎

○歌曰

赤苓湯內桂陳皮。大腹良薑茺草奇。息積氣高兼脇痛。百般滿悶各相宜。

白朮丸

白朮

陳土炒

枳實

麩炒

桂心

各壹兩

人參

陳皮

炙草

桔梗

各壹兩

右

為末蜜丸

梧子

大空心酒下

叁拾丸

日貳服

脇痛

左屬肝

主血

右屬肺

主氣多痰積然悲哀惱怒鬱傷肝氣兩脇骨疼痛筋脈拘急腰腳重滯

是也

○歌曰

桔草枳陳朮桂。人痛連兩脇嘆頻頻。左肝傷血右傷氣。先戒愁哀惱怒

辰

枳殼煮散

枳殼

肆兩

細辛

桔梗

防風

川芎

各壹兩

葛根

壹兩

甘草

壹兩

為粗

末每服肆錢水壹盞半薑棗同煎至柒分空心食前服

○歌曰

悲哀煩惱鬱傷肝。通利三焦枳殼安。川桔細辛辛以散。葛防張氣草求

甘

龍膽泄肝湯

治脇痛、口苦、耳聾、耳腫、筋痿、陰溼、熱、瘰、陰、腫、白、濁、溲、血、等證。

龍膽草

酒炒

黃芩

炒

梔子

酒炒

澤瀉

水通

甘草

生地

酒炒

各等分

水煎服

柴胡

車前子

當歸

○歌曰

龍膽泄肝通澤。柴車前生地草歸。偕梔芩一派清涼品。溼熱肝邪力可

排

備急丸

治寒氣冷食積留胃中、心腹滿痛、大便不通者。

大黃

乾薑

各貳兩

巴豆

研如脂、去皮

先搗大黃乾薑為末。內巴豆合搗千

杵和蜜丸如豆大。藏密器中。勿洩氣候。用每服叁肆丸。水酒下。

○歌曰

薑豆大黃備急丸。專攻閉痛及停寒。兼療中惡人昏倒。陰絕垂危得此

安

失笑散

治產後心腹絞痛欲死或血迷心竅不省人事

五靈脂

蒲黃等分 每服參錢酒煎服

獨聖散

南山查肉

炒壹兩

水煎用童便炒糖和服

○歌曰

失笑蒲黃及五靈。暈平痛止積無停。山查貳兩便糖入。獨聖功同更守

經

按黃氏治脾肝下陷病在少腹者用薑苓桂枝湯治胃膽上逆痛在心

胃者用柴胡桂枝鱉甲湯今附載

薑苓桂枝湯

桂枝 白芍 茯苓

乾薑

各叁錢

甘草

貳錢

水煎溫服

血燥加當歸生地首烏

柴胡桂枝鱉甲湯

柴胡 桂枝 鱉甲

各叁錢

芍藥

貳錢

水煎溫服

血燥加當歸生地首烏

柴胡 鱉甲

各叁錢

桂枝

半夏

白芍

茯苓

各叁錢

甘草

貳錢

水煎溫服

胃寒加乾薑
川椒附子

○歌曰

肝脾下陷腹中疼。桂芍薑甘與茯苓。若在心胃為膽胃去。薑加夏豔紫靈。

痰飲

痰飲證乃水氣上泛得陽煎熬則稠而為痰得陰凝聚則稀而為飲。此證以脾腎為主以水歸於腎而受制於脾也。痰宜二陳湯隨寒熱虛實加減。怪病老痰宜滾痰丸飲宜桂苓甘朮湯真武湯二證愈後以桂附八味丸收功。

○痰飲詩

痰病都緣水泛成。滾痰丸峻烈。二陳湯和平。桂苓甘朮湯同真武。一化太

之氣一鎮少五飲源流一派清。
陰水藏之氣

附錄

痰飲之病源皆水也。經云三焦者決瀆之官水道出焉。設三焦失職因之。

聚成痰飲變證多端。古人論痰有四痰飲懸飲溢飲支飲詳於金匱要畧。宜細辨之。然又有聚而不散者。名留飲。僻處脇下者。名癖飲。流移不定者。名流飲。沉伏於內者。名伏飲。又因酒而成癖者。名酒癖。因寒所傷者。名冷痰。因熱所傷者。名熱痰。總由於三焦失職。氣道不盪所致。是以氣行即水行。氣滯即水滯。唯能宣通三焦之氣。則為治其本。而清其源矣。金匱曰。當以溫藥和之。此六字為金針之度也。所以然者。人之氣血得溫則宣流。及結而成病。有尤在溼新立七法在。

一曰攻逐

古云治痰先補脾。脾復健之常。而痰自化。然停積既甚。譬如溝渠壅滯。久則倒流。逆上。污濁臭穢。無所不有。若不決而去之。而欲澄治。已壅之水。而使之清。無是理也。故須攻逐之劑。

神仙墜痰丸

黑牽牛

取頭末

皂角

醋炙

白礬

生各

為末

水丸

梧子

大酒下

叁伍拾

丸

○歌曰

墜痰丸用黑牽牛。皂角白礬一併投。研末水丸梧子大。酒吞下後自然

瘳。

控涎丹

甘遂 大戟

白芥子各等

糊丸。臨卧薑湯服伍錢丸。至拾丸痰猛。

加丸數

○歌曰

控涎丹善去痰涎。遂戟還同芥白研。臨卧薑湯吞服後。伍錢頻加用最

便。

十棗湯傷寒論

芫花熬甘遂

大戟等分

大棗十枚

右三味別搗為散。以水壺升半先

煮大棗肥者取捌合。去滓內藥末。強人服壹錢。羸人服半錢。得快下

利後糜粥自養。平旦溫服。若下少病不除者。明日更服。

礞石滾痰丸

青礞石研畧碎入磁瓶加焰硝壹兩以鹽水泛為丸每服壹錢伍分仰臥而勿行動貳時方許行動飲食服後喉間稠塞乃藥與病相拒少頃自愈

○歌曰

隱君遺下滾痰方礞石黃芩及大黃少佐沉香為引導頑痰怪證力能匡

二曰消導

凡病痰飲未盛或雖盛而未至堅頑者不可攻之但宜消導而已消者捐而盡之導者引而去之也

青礞石丸

青礞石

敲碎如棗子大以焰硝壹兩以鹽茯苓半夏天南星漫煨製黃芩各伍

風化硝

參錢盆洗者冬月以右為細末神麴糊入薑汁為丸如梧子大

每服叁拾伍丸薑湯下 一方有枳實倍礞石

○歌曰

礞石風硝與茯苓黃芩半夏共南星丸須薑汁加神麴食積成痰攻不
停

竹瀝丸

半夏 陳皮 白朮 茯苓 大黃 黃芩 人參 炙草 青礞石

製法同前 沉香 伍錢 研末以竹瀝壹大碗半薑汁叁匙拌勻晒乾如此

伍陸度仍以竹瀝薑汁糊丸小豆大每百丸臨卧薑湯下

○歌曰

竹瀝丸兼半夏陳朮苓參草並黃芩大黃礞石沉香入薑汁和丸竹瀝

勻

半夏丸

半夏薑汁製皂莢伍挺去皮搽生薑伍兩同半夏搗作餅炙乾為末蜜為丸如梧子

大薑湯下貳拾丸

○歌曰

半夏研同伍兩薑還將皂莢共煎嘗蜜丸更用薑湯下喘逆邪痰仗此

方

三曰和

始因虛而生痰。繼因痰而成實。補之則痰益固。攻之則正不支。惟寓攻於補。庶正復而痰不滋。或寓補於攻。斯痰去而正無損。是在辨其虛實多寡而施之。

香砂六君子湯

見痰疾

四曰補

夫痰即水也。其本在腎。痰即液也。其本在脾。在腎者氣虛水泛。在脾者土虛不化。攻之則彌甚。補之則潛消。非明者不能知也。

濟生腎氣丸

見腫證

桂苓甘朮湯

傷寒論

茯苓

肆錢

白朮

今補歌訣

桂枝

各叁錢

炙草

壹錢伍分

水煎

歌曰

甘朮桂苓湯四味。酌加清水共熬煎。達木扶脾功最捷。消痰利便效為

先

六君子湯見瘧疾

五曰溫

凡痰飲停凝心膈上下或痞或嘔或利久而不去或雖去而復生者法當溫之蓋痰本於脾溫則能健之痰生於溼溫則能行之

沉香茯苓丸溫脾胃膈和氣血

沉香壹兩 茯苓 半夏 人參 丁香各貳兩 甘草 陳皮 檳榔 肉

豆蔻煨各伍錢 蜜丸薑湯下貳拾丸

○歌曰

沉香壹兩更丁香。半夏參苓貳兩將。甘草再加肉豆蔻。陳皮半兩與檳榔。

榔

本事神朮丸健脾利溼許叔微極贊其妙

茅山蒼朮壹斤去末 生芝半兩研濾取汁 大棗拾伍枚煮爛 參味搜和乘

熱入臼杵丸如梧子大乾之每日空腹溫湯吞下伍拾丸加至壹百丸

貳百丸忌桃李雀蛤初服心膈微燥進山梔散一服不燥矣山梔乾為末沸湯點服

予治癩癩病每用此方加香附神麴川芎參味以薑棗湯和藥為小丸如菜豆大每服壹錢黃米湯下極效

七製香附貳兩茅山蒼朮貳兩川芎壹兩神麴肆兩生芝蔴伍錢水

貳蓋研濾取汁

○歌曰

本事傳來神朮丸棗芝蒼朮共相拌若加芎附和神麴薑棗湯調癩癩安

六曰清

或因熱而生痰或因痰而生熱交結不解相助為虐昔人故言痰因火而逆上者治火為先也其證咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重或欬吐稠粘面目赤熱

二陳湯加黃芩連翹山梔桔梗薄荷水煎服

○歌曰

二陳湯用夏和陳。益以茯苓甘草臣。

半夏錢、茯苓錢、陳皮壹錢、茯苓和氣調

中兼去溼。諸凡痰飲。此為珍。

七曰潤

肺虛陰涸。枯燥日至。氣不化而成火。津以結而成痰。是不可以辛散。不可

以燥奪清之。則氣自化。潤之則痰自清。

王節齋化痰丸

天門冬

酒芩

苦萸仁

橘紅

海石粉

各壹兩

香附

鹽水炒

芒硝

桔梗

連翹

各伍錢

青黛

錢

煉蜜入

生薑汁少許

和丸

細嚼壹丸

清湯

下

○歌曰

節齋舊有化痰丸。香附冬芩苦橘摶。桔黛硝翹海石粉。蜜薑丸嚼自然

安。

附載諸方

桂附八味丸

即腎氣丸

熟地黄

肆兩

山茱肉

各貳兩

茯苓

丹皮

澤瀉

各壹兩

附子炮

肉桂

各伍錢

蜜丸

如梧子大

每服伍拾丸

米湯下

以美膳壓之

○歌曰

六味滋陰益腎肝。茱萸丹澤地苓丸。再加桂附扶真火。八味功同九轉

丹

外臺茯苓飲

治痰飲吐水。氣滿不能食。

茯苓

人參

白朮

各伍兩

橘皮

枳實

生薑

水煎

日叁服

○歌曰

茯苓飲自外臺傳。白朮薑參枳實先。更有橘皮通滯氣。心胃痰飲並安

痊

指迷茯苓丸

治中焦停痰。飲食少進。

半夏

貳兩

茯苓

壹兩

枳殼

伍錢

風化硝

伍錢

薑汁

糊為丸

每服叁拾丸

薑湯下

○歌曰

指迷最切茯苓丸。風化芒硝分外看。枳半合成四味藥。停痰伏飲勝靈丹。

痢疾

痢疾。伏邪之為病也。夏月受非時之小寒。或貪涼而多食瓜果。胃性喜寒。初不覺其病。久則鬱而為熱。從小腸以傳大腸。大腸喜熱。又不覺其為病。至於秋後。或因燥氣。或感涼氣。或因飲食失節。引動伏邪。以致暴瀉。旋而裏急後重。膿血赤白。小腹疼痛。甚則為噤口不食之危證。當知寒氣在胃。熱氣在腸。寒熱久伏。而忽發之病。用芍藥湯。蕩滌大腸之伏熱。令邪氣一行。正氣自能上顧脾胃。如若未效。即用理中湯。以溫胃中之伏寒。加大黃以泄大腸之伏熱。一方而兩扼其要。紅者可加地榆。白者可加木香。紅白兼見者。並加之。倘久而不瘥。可用理中湯原方以補之。或用真人養藏湯以瀉之。或間用香連丸以堅之。此定法亦活法也。如初起而發熱不休。方書皆云死證。其實非經絡不和。即外感風寒所致。惟審其發熱而仍惡寒。

者用當歸四逆湯發熱胸脇滿而嘔吐者用小柴胡湯和其經絡而下利自鬆倉廩湯更面面周到足補古人所未及痢為腸胃之病故列於裏證

○痢疾詩

痢分寒熱各相爭

張氏說心在近時人

伏邪論最精

腸熱而伏為病

根胃寒胃喜寒日受寒

標本寒本暑過

寒氣欲動

秋至餘熱猶然序

時更理中湯

蓋克貪涼病加味

前湯加大

黃命鬱火清初患尚輕休語此止

從芍藥湯定權衡

○痢疾救逆詩三首

發熱如焚痢可愁

當歸四逆湯

探源流小柴胡治嘔兼寒熱

倉廩湯中

再講求

噤口垂危亦可醫

大承湯氣神妙少人知

芩連葛草葛根黃連黃芩甘草湯

相需用

奪出生關在片時

真人養藏湯

直腸需

水穀直間用香連丸

止下趨仲景桃花湯

春有腳

個中誰識反三隅

陰虛下痢發熱膿血稠粘及休息痢用駐車丸

○陰虛下痢詩

千金傳下駐車丸兩半歸連重一般。參兩阿膠薑壹兩。陰虛久痢得靈丹。

阿膠參兩黃連當歸各壹兩半。乾薑炒壹兩醋煮阿膠為丸。每服肆伍拾丸。晝夜叁服米飲下。

奇恆痢異於恆常。乃三陽並至。三陰莫當。積並則為驚。病起疾風。至如礮礮。九竅皆塞。陽氣旁溢。噤乾喉塞。痛並於陰。則上下無常。薄為腸澼。其脈緩小遲瀋。血溫身熱。死熱見七日死。蓋因陽氣偏劇。陰氣受傷。是以脈小沉瀋。此證急宜大承氣湯泄陽養陰。緩則不救。醫者不知奇恆之因。見脈氣和緩。而用平易之劑。此又何異於毒藥乎。予故曰服平和之藥而愈者。原不死之病。勿藥亦可服。和平湯而後成。不救者醫之罪也。

○奇恆痢疾詩

奇恆痢疾最堪驚。陽並於陰勢莫京。喉塞噤乾君切記。
嘉慶戊午夏。泉郡王孝廉忠刺。

七日忽於寅午之交聲微啞語半刻即止酉刻死七月榕城葉廣文
觀鳳之弟患同前證未延自言伊弟亦不重飲食如常唯早辰嗑乾
不必病如診令其速回看果於酉戌之交死大承急下可回生

芍藥湯初起三日乃用之

芍藥各錢當歸各錢黃芩各錢黃連各錢枳殼各錢檳榔各錢甘草各錢木香各錢肉桂各錢

桂分伍水煎服或以肉桂換乾薑一方無枳殼

此時醫通用之方大意以行血則便膿自愈調氣則後重自除頗為合

法

○歌曰

初痢多宗芍藥湯芩連檳草桂歸香須知調氣兼行血後重便膿得此

良

真人養藏湯治瀉利久病脫

訶子煨壹錢嬰粟殼壹錢肉豆蔻壹錢當歸伍錢白朮炒壹錢酒白芍各陸

木香肆分肉桂捌分生甘草壹錢水煎服藏寒甚加附子壹錢伍分

○歌曰

和 真人養藏木香訶粟殼當歸肉寇科朮芍桂參甘草共脫肛久痢即安

葛根黃連黃芩甘草湯 傷寒論

葛根 肆錢 黃芩 伍分 黃連 壹錢 甘草 壹錢 水叁杯先煮葛根至壹杯半

吹去沫入諸藥煎柒分服日貳服夜壹服此方治傷寒協熱下痢而喘

者借治下痢及熱瀉如神

理中湯 見暑證

香連丸

黃連 陸兩 木香 壹兩 先用吳茱萸叁兩水拌浸壹宿同炒去吳茱萸共

木香研末水泛為丸梧子大每服貳叁錢米湯送下 歌見吞酸左金丸下

桃花湯 傷寒論 治少陰下痢

赤石脂 壹兩 陸錢 研末 乾薑 壹錢 粳米 伍錢 水煎調石脂末服日夜作叁

服

當歸四逆湯 見腹痛

倉廩湯

即人參散毒散加陳皮參錢見瘟疫

小柴胡湯

表證寒

大承氣湯

傷寒論

大黃

貳錢厚樸去皮

枳實

參錢炒

芒硝

貳錢

先以水煮枳實厚樸去滓

內大黃再煮去滓

內硝

更上微火一兩沸分溫再服得下勿服

按黃氏論痢疾溼寒為本溼熱為標病在少陰則始終皆寒病在厥陰

則中變為熱故仲景於少陰膿血用桃花湯於厥陰下利用白頭翁湯

俱見而總緣於土溼水侮土則鬱為溼寒木克土則鬱為溼熱用桂枝

茯苓湯

桂枝 白芍

丹皮

茯苓

澤瀉

橘皮

肉茯苓

洗淨各參錢

甘草

水煎溫服溼寒加乾薑溼熱加黃芩後重加升麻若結瀉難下須用重

劑茯苓湯

乾茯苓用壹兩

蕩滌陳宿使滯開痢止然後調其肝脾

○歌曰

桂枝丹芍橘甘苓澤瀉煎湯治痢靈
薑治溼寒苓治熱升麻後重記惺

怪

泄瀉

泄瀉之證內經所謂溼勝則濡泄是也。宜以胃苓湯為主。如寒甚則下利清穀。加乾薑附子。吳茱萸。如熱甚則下痢腸垢。去桂枝。加黃連黃芩乾葛。如食積加麥芽。山查炒黑。如虛甚加人參。若五更後依時作瀉。名脾腎瀉。宜四神丸。去肉豆蔻。加人參。白朮。罌粟殼。乾薑。茯苓。以棗湯壘丸。臨臥以薑湯送下。肆伍錢。久瀉宜聖濟附子丸。又金匱翼乳豆丸。治滑泄不止。諸藥罔效。方用肉豆蔻生為末。通明乳香。以酒浸過。研成膏丸。如梧子大。每服伍拾丸。空心米飲送下。

○泄瀉詩

泄瀉病因溼勝來。胃苓湯舊法出新裁。四神丸固腎時傳外。苦領酸甘效首推。

胃苓湯

茯苓 豬苓 澤瀉 白朮 桂枝 蒼朮 厚樸 陳皮 各壹錢 炙

草捌分 生薑叁片 水煎服

○歌曰

五苓朮瀉茯苓枝。加入蒼甘與樸皮。專治膨脝還瀉利。生薑煎服胃苓宜。

四神丸

補骨脂

肆兩

炒肉豆蔻

麵煨

五味子

各貳兩

吳茱萸

湯泡壹兩

加大棗捌拾壹粒

生薑肆兩

同煮爛

去皮核

和為丸

如梧子

大臨睡

以米湯送

下肆錢

一

去豆蔻

加人參

茯苓

乾薑

附子

罌粟殼

以米湯

泛丸

更效

○歌曰

四神故紙與吳萸。肉蔻除油五味須。大棗須同薑煮爛。五更腎瀉火衰

扶

聖濟附子丸

治洞泄寒中

注下水穀或不消

赤白食已即出食物不消

或痢

黃連

烏梅肉

各叁兩

乾薑

附子

炮各壹兩

煉蜜丸

每服叁錢

米湯下

日

貳服

○歌曰

附子丸中連與薑烏梅炒研佐之良。寒中瀉痢皆神驗。互用溫涼請細

詳

千金溫脾湯

治積久熱痢赤白

大黃

肆錢人參

甘草

各氣錢熟附子

壹錢

炮乾薑

貳錢

水煎溫服

冷

痢去甘草加桂心參錢倍人參薑附減大黃壹錢

○歌曰

溫脾桂附與乾薑樸草同行佐大黃。泄瀉流連知銅冷。溫通並用故非

常

按原方有厚樸貳錢無人參

神朮

湯主冷而發熱及脾瀉腸風

白朮

參錢防風

貳錢甘草壹錢 無汗用蒼朮加蔥白生薑有汗用白朮

生薑

○歌曰

朮防甘草溼家嘗神朮名湯得意方。自說法起麻桂上。可知全未夢南

陽

王海藏以此方代麻黃桂枝湯

秘結

秘結證金匱真言曰北方黑色入通于腎開竅于二陰氣厥論曰膀胱移熱于小腸隔腸不便藏氣法時論曰腎苦燥急食辛以潤之開腠理致津液通氣也雜病篇曰厥氣走喉而不能言手足青大便秘不利取足少陰讀此則知秘結之證除陽明結熱輕者用脾約丸重者擇用三承氣湯外無不由之於腎蓋腎主二陰而司開闔彼大小便不禁者責其開而不闔而大小便不通者又當責其闔而不開故腎熱者涼而滋之腎寒者溫而滋之腎虛者補而滋之腎乾燥者潤而滋之且滋腎而膀胱亦治移熱隔腸之病自己矣秘結多由於腎故列於裏證

○秘結詩

秘結三承

瀛慎用之麻仁丸又名潤澤不支離須知腎藏為陰主補瀉

寒溫總是滋

脾約丸

一名麻仁丸

厚樸薑製枳實麩炒芍藥各捌兩大黃蒸焙壹斤麻仁捌兩杏仁去皮去炒伍兩半
右為末煉蜜和丸梧子大每服貳拾丸臨卧溫水下大便通利則止

○歌曰

燥熱便難脾約丸芍麻枳樸杏黃餐潤而甘緩存津液溺數腸乾得此安

大承氣湯見痢疾

小承氣湯傷寒論

大黃肆錢枳實叁錢厚樸貳錢水煎下止服

調胃承氣湯傷寒論

大黃肆錢去皮清酒洗甘草貳錢芒硝叁錢水煮大黃甘草去滓內芒硝令沸

少少溫服之

膈食

膈食證水飲可下。食物難入。高主拳專主陽明。用左歸飲去茯苓加生地。當歸以養胃陰。此法從薛氏醫按。胸滿不食。以六味湯加此二味得來也。

去茯苓者恐其旁流入坎不如專顧陽明之速效也。用此方俾胃陰上濟則賁門寬展而飲食進胃陰下達則幽門闌門滋潤而二便通十餘劑可效。如若不愈人鏡經專主內經三陽結謂之膈一語以三一承氣湯節次下之令陳莖去則新物納此峻劑也。然此證多死即勉治之亦不過盡人事而已。又有朝食暮吐名反胃為中焦虛寒下焦無火宜吳茱萸湯附子理中湯加茯苓半夏川椒之類或以真武湯八味丸間服然金匱有大半夏湯主降衝脈之逆為膈證反胃初起之神方。

○膈證詩

左歸飲去茯苓傳心入加生地當歸養胃陰病重必須求峻劑三一承氣

通結得良箴

○反胃詩

食入反出胃家寒信服吳茱萸湯治不難更有下焦之火化理中入湯加椒

附令加餐

○膈證反胃總治詩

胃反金匱以吐首推半夏湯厥名曰大邁尋常陽明能納衝能降不在

寒溫論短長

左歸飲頭方見

三一承氣湯見瘧

附子理中湯即理中加附子見暑證

真武湯見腫

吳茱萸湯見頭痛

大柴胡湯傷寒論

柴胡半夏各錢叁黃芩白芍枳實各錢貳生薑叁片大棗貳枚水煎

日三服此方本有黃芩

小柴胡湯見傷寒表證

生薑瀉心湯五瀉心湯俱傷寒論交

生薑肆錢炙甘草人參黃芩各錢叁半夏貳錢黃連乾薑各壹大棗

叁枚水煎溫服

卷之三 裏 膈食

甘草瀉心湯

炙草肆錢黃芩

乾薑各叁錢

半夏貳錢

黃連壹錢

大棗叁枚

水煎溫服

半夏瀉心湯

半夏肆錢黃芩

乾薑 炙草

人參各叁錢

黃連壹錢

大棗叁枚

水煎

溫服

大黃黃連瀉心湯

大黃肆錢黃連貳錢以麻沸湯漬之去滓服

附子瀉心湯

大黃錢浸黃連炒黃芩炒各錢附子叁錢去皮別煮以麻沸水漬絞去滓內附子

汁溫服

越鞠丸治一切鬱證

香附 蒼朮 撫芎 梔子 六神麴各等

○歌曰

六鬱宜施越麴丸。芎蒼麴附并梔餐。食停氣血溼痰火。得此調和頃刻

安

大半夏湯

半夏洗去涎

陸錢人參貳錢

白蜜捌錢

水叁杯半

和蜜揚貳百肆拾遍

煎捌

分服

○歌曰

大半夏湯參蜜膏。甘瀾貳百肆番揚。降衝半夏參生液。利水甘瀾蜜潤腸。

腰痛

腰痛證內經刺腰痛篇曰。足太陽脈浮。令人腰痛。言外感也。以五積散主之。脈要精微論曰。腰者腎之府。轉搖不動。腎將憊矣。言內虛也。以六味地黃丸。桂附八味丸。加牛膝。杜仲。淫羊藿。鹿茸。補骨脂。主之。痛如刺者。為死血。以鹿角為末。又以肉桂。牛膝。乳香。沒藥。元胡。桃仁。紅花。酒煎。送下。肆錢。痛而重着。如帶五千錢者。為溼氣。宜腎着湯。痛而游走。或作止不定者。為痰積。宜二陳湯。加南星。及快氣之品。使痰隨氣運。又白朮。能利腰臍之死。

血凡腰痛諸藥固效者用白朮兩許少佐他藥一服如神太平聖惠方治風冷寒痺腰痛用川草烏叁個生搗為末少加鹽水攤於紙上貼痛處即愈以腰為腎府故列於裏證

○腰痛詩

腰痛外邪五積宜內虛六味湯化裁之若加鹿角消瘀血腎着病即用腎

着沉沉不轉移

腎着湯

茯苓

白朮

生用各叁錢

乾薑

貳錢

炙草

壹錢

水煎服

金匱名甘草乾薑茯苓

苓白朮湯甘草各貳兩薑苓各肆兩藥亦與此方同而輕重不同耳蓋

以腰者腎之府也腰痛自當補腎腰痛而重是寒溼之邪不在腎之中

間而在腎之外府故其治不在溫腎以散寒而在煖土以勝溼若用桂

附則反傷腎陰矣

按黃氏用茯苓桂枝乾薑附子阿膠湯甚有奇效

○歌曰

腰痛如帶五千錢腎着湯方豈偶然甘草茯苓薑與朮長沙老法譜新

編

五積散節見歷

桂附八味丸見痰飲

六味丸見痰飲

二陳湯見痰飲

不寐

不寐證金匱主肝魂不守宅。用酸棗仁湯。余以陽不歸陰。用乾百合壹兩半。紫蘇葉叁錢。龍骨牡蠣。茯神。棗仁之類。隨宜加入。

○不寐詩

不寐內經論最詳。肝魂招納酸棗仁湯。紫蘇百合歸陰分。侶山堂類辨云。余植百合

其花朝開。暮闔。紫蘇之葉朝挺。暮垂。俱能引陽氣而歸陰分。龍牡。茯神。佐使良。

酸棗仁湯

酸棗仁捌錢。生用。甘草壹錢。伍分。知母伍錢。各叁茯苓伍錢。伍分。芎藭壹錢。伍分。水叁杯。先煮酸

棗仁至貳杯。入諸藥。再煎。捌分。服。尤在涇云。人寤則魂寓於目。寐則魂

藏於肝。虛勞之人。肝氣不榮。故以棗仁補斂之。然不眠由於虛煩。必有燥火。痰氣之擾。故以知母。甘草清熱。滋燥。茯苓。川芎行氣除痰。皆所以求肝之治。而宅其魂。

○歌曰

酸棗捌錢知茯苓。草芎錢半睡能酣。虛煩燥火兼痰氣。龍螭神仁隨意探。

小半夏湯

半夏伍錢 生薑捌錢 水煎服

○歌曰

小半夏湯夏伍錢。生薑重用捌錢煎。除痰降氣能平胃。不寐施之亦可痊。

不能食

不能食者。胃中元氣虛也。然有虛冷。虛熱之異。虛冷者。面黃白。身常怕寒。所食不能化。懶不欲食。大便澹祕無常。病在上中二焦。宜用消食丸。若

病在下焦命門之火化之職宜用本事二神丸虛熱者面黃中帶赤身常惡熱胸膈飽悶不欲食間或吐酸小便短大便不通病在上下二焦輕者用資生丸重者用凝神散若病在下焦高鼓峰謂腎乃胃之關關門不利升降息矣關門即氣交之中天之樞也故腎旺則胃陰足胃陰足則思食急當以六味加歸芍養之若血燥大腸乾枯有黑糞壅積胃底則當以熟地伍錢當歸麻仁各叁錢白芍桃仁各貳錢微微潤之視其形體如常氣血常足可加大黃貳錢助血藥大腸一順利胃自開矣又此證有穀勞一證其人怠惰嗜卧肢體煩重腹滿善饑而不能食食已則發穀氣不行使然也金匱翼用沉香湯肘後云飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重默默欲卧食畢輒甚用大麥芽壹升川椒壹兩並炒乾薑叁兩搗末每服方寸七日參服

○不能食詩

不食胃虛冷熱分

二神思食效超羣

二方治寒令

凝神散並資生丸

九妙

二方治虛

熱以上皆病在上中二焦之方也

議到下焦勇冠軍

二神丸治腎中之水虛

六味湯治腎中之水虛

二方治虛

○穀勞詩

穀勞食已即貪眠。責在胃虛氣不前。肘後椒薑大麥研。沉香湯取善盤旋。

消食丸

麥藥 神麴 各壹 乾薑 炮 烏梅 肆 各 蜜丸服拾伍丸日再加至肆拾

丸亦治反胃

○歌曰

消食丸中麴麥升。薑梅肆兩炮焙曾。便澹食懶中焦病。不信年來食未能。

資生丸

白朮 味甘 水浸 用山黃土 肆 橘皮 山查 蒸 神麴 炒 各 白茯苓 肆 人乳

上蒸 晒乾 去土 切片 焙乾 參 兩 浸透 飯 鍋 桔梗 炒 伍 扁豆 炒 蓮肉 炒 去心

壹兩 伍錢 白豆蔻 炒 人參 上 蒸透 參 兩 右為末煉蜜丸每服

貳錢 細嚼淡鹽湯下

○歌曰

參苓薏苡蔻連查扁朮神皮桔藥茅開胃健脾調五藏。資生丸自昔時

誇

凝神散

人參 白朮 茯苓 山藥 各壹錢 扁豆 知母 生地黃 粳米

甘草 各壹錢 淡竹葉 地骨皮 麥冬 各伍錢 薑叁片 紅棗壹枚 水煎食遠

服

○歌曰

凝神散用朮苓參著豆知黃粳米尋。甘草骨皮兼竹葉。麥冬薑棗效方

深

二神丸 方用肉豆蔻以安腎故稱二神

肉豆蔻 肆兩 破故紙 半斤

右各為細末用肥大紅棗取肉研膏和藥杵為丸如梧子大每服伍柒

拾丸空心米飲入鹽送下加木香貳兩名三神丸加茴香貳兩名四神

醫學下易通 卷三 裏 不能食 食亦

二十二

丸

○歌曰

二神肉果骨脂兼。棗肉和丸伍。漆。主治食時常苦便。空心米飲入微。

鹽

沉香湯

沉香

白朮

土炒

紫厚樸

薑汁炒

人參

白茯苓

各捌錢

半夏

薑製

木香

草豆蔻

甘草

陳皮

黑乾薑

生薑

各伍錢

大棗

伍枚

水煎

分溫參

服

○歌曰

沉香湯用朮參。樸蔻木香半夏陳。甘草二薑和大棗。水煎溫服健脾

經

食亦

食亦者。飲食不為肌膚。言雖食亦若飢也。內經云。大腸移熱於胃。善食而瘦。謂之食亦。夫胃為水穀之海。所以化氣味而為營衛者也。若乃胃受熱

邪消燥穀氣不能變化精血故善食而瘦也。又胃移熱於膽亦名食亦以膽為陽木熱氣乘之則燥土而消穀宜甘露飲主之。

○食亦詩

食亦皆因胃熱乘。雖能納穀瘦難勝。慈仁若肯垂甘露。飲營衛細溫氣上騰。

甘露飲

生地 熟地 天冬 麥冬 片苓 石斛 甘草 枇杷葉 枳殼

茵陳各等 水煎 叁錢服

○歌曰

甘露二冬二地均。枇杷苓枳斛茵陳。合和甘草平虛熱。口爛齟糜吐衄珍。

黃疸

黃疸證已食如飢。但欲安眠。一身面目及小便俱黃是也。此為胃熱脾寒。寒則生溼。或腎得風而熱。脾得寒而溼。溼熱內鬱。則膀胱之氣不化。膀胱

主一身之肌表不化氣則溼熱無去路而成疸矣。金匱淺註言之最詳。今唯以陰陽提其大綱。凡陰黃疸色暗如薰黃。氣短小便自利。證多虛。宜理中湯。建中湯之類。主之。陽黃疸色明如橘子。氣逆小便不利。證多實。宜茵陳蒿湯。梔子檠皮湯之類。主之。又有從房事而得者。身黃而額上黑。微汗出手足心熱。名女勞疸。取婦人月經布和血燒灰。空腹酒服方寸匕。日再。不過三日必愈。然金匱淺註不可不讀。此黃色雖現於表而鬱熱則盛於裏。故列於裏證。

○黃疸詩

黃疸皆由溼熱成。色分暗滯與鮮明。陰黃色暗滯。陽黃色鮮明。理中湯。小建中湯。陰黃

主陽證茵陳蒿湯。梔子檠皮湯。行。

理中湯見暑

建中湯傷寒

白芍陸錢 桂枝 生薑各叁錢 甘草貳錢 飴糖壹合 大棗肆枚 水煎去滓

內飴糖化溫參服

茵陳蒿湯

論傷寒

茵陳蒿

陸錢

梔子

參錢

大黃

貳錢

先去皮

先以水煮茵陳內

二味同煎

小便當

尿如皂角汁色正赤

一宿腹減黃從小便去也

黃氏治穀疸加

生甘草參錢

加

加

加

加

加

加

加

加

加

梔子

參錢

黃蘗

貳錢

水煎服

梔子

參錢

甘草

壹錢

黃蘗

貳錢

水煎服

黃氏治穀疸

日暮寒熱者

用茵陳五苓散

證

汗出腹滿者

用硝黃梔

子湯

大黃肆錢芒硝

酒疸心中懊懣熱疼惡心欲吐者

用梔子大黃湯

枳實各叁錢大黃

色疸額黑身黃者

用元滑苓甘散

枳實

各叁錢

大黃

色疸

額黑身黃者

用元滑苓甘散

證

證

證

證

證

證

證

內熱者

當用薑附茵陳

不可誤服硝黃也

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

其脾腎溼寒無

長樂陳念祖原本
吳縣潘 蔚增輯

寒證

傷寒

傷寒麻黃湯證。桂枝湯證。表寒也。三陰寒化證。用理中。四逆。真武。吳茱萸等湯。裏寒也。頭痛項強惡寒又兼嘔逆腰腹痛。表裏俱寒也。時法用五積散。

○傷寒證詩

麻湯麻黃湯桂枝湯桂枝湯二湯去表寒。理中湯理中湯四逆湯四逆湯裏寒看。若還表裏皆寒證。

五積散五積散方中叩兩端。

麻黃湯麻黃湯見傷寒表證。

桂枝湯桂枝湯見傷寒表證。

理中湯見著證

四逆湯傷寒論

炙草氣錢

乾薑壹錢 附子叁錢 水煎服

真武湯見腫證

吳茱萸湯見頭痛

五積散見歷節

霍亂吐瀉

霍亂吐瀉乃中氣虛寒陰陽雜錯凡大吐大瀉一陣緊一陣者其人必汗出如雨身冷如冰目眶塌陷聲音低小鼻脣指甲青黑手足攣急肌肉消脫或但吐不瀉或但瀉不吐六脈沉伏或六脈全無生死緩急止爭頃刻初起寒多不欲飲水者理中湯主之頭痛發熱身疼痛熱欲飲水者五苓散主之若吐瀉甚而煩燥吳茱萸湯主之若吐瀉汗出發熱惡寒四肢厥冷小便自利脈微欲絕而拘急者通脈四逆湯主之不可加人參反緩薑附之功若服肆伍劑厥冷漸瘥惟手足拘攣已甚加猪膽汗以救其津液又加人尿以

助之。若加之太早，則陽反不能回矣。庸醫強立名色，有乾溼之分，或用藿香正氣散，香薷飲，六和湯，不換金正氣散，諸方。又或令服陰陽水，生梅水，西瓜汁，甘蔗汁，竹瀝之類，殺人無算。其尤謬者，凡遇此證，必先令吞痧藥，辛寬諸品，一服無可解救。各處配合施送，鄉愚無識，每病輒服，為害不可究詰。是欲生之而反殺之也。此證多起於暑月，伏陰在內，至白露後漸輕而愈。苟能勿貪陰涼，少食生冷，脾陽既旺，陰氣潛消，亦何至有此劇證哉。

○霍亂詩

吐瀉交來霍亂名，陰陽雜錯理中湯。
平渴而思水，五苓散脈脫筋攣四

逆湯

程通脈四逆加豬膽汁

理中湯

千金名治中湯

人參乾薑白朮甘草各各水煎服不瘥再服遠行作丸如梧子大服叁

拾丸轉筋者加石膏肆兩仲景加減法

五苓散見暑

通脈四逆湯見暑

通脈四逆加猪膽汁湯

即原方加猪膽汁半合

黃氏治霍亂用桂苓理中湯人參壹錢茯苓甘草砂仁各錢乾薑桂枝

白朮生薑各錢水煎溫服吐不止加半夏泄不止加肉蔻外有寒熱表

證加麻黃轉筋痛劇加附子澤瀉此屢經試用之方慎勿泥時令而用

清涼致人命夭枉也

噉脹

噉脹證因食積而起者宜胃苓湯加半夏乾薑五穀蟲木瓜以麥芽打糊

為丸陳米湯送下叁錢因熱而起者亦用前丸加黃連為佐此皆實證易

治也惟有虛證必用聖朮煎加附子守服肆伍拾劑方效即單腹脹亦不

外此法更有因於吐酸而起者宜理中加黃連名連理丸心下聚結如盤

者宜桂枝湯去芍藥加麻黃附子細辛日服貳劑夜服壹劑取微汗令大

氣一轉其結乃散即以枳朮湯苦以泄其滿此仲景聖法也此病屬寒者

多故列於寒證

○噉脹詩

驟然膨脹胃苓湯虛證當知聖朮煎方病起吐酸連理丸妙桂甘麻附
細辛湯良

○蠱脹詩

蠱脹由來少的方。山風卦內得津梁。良安止息能胃能。二宗均廢異則
順從氣弗揚。此證須振肝木之氣以衝開胃土。方得參透生機原主動
其止也當矯治法。庸醫尚云法取平肝。當矯之以剛果。今醫用腎氣丸
之以昏發。矯須知大氣本乎剛。一其派靜柔之品。雜以些少之桂附。不
待仲師心下如盤訓。宜苦宜辛二法詳。水氣無形也。宜泄之以苦。死

胃苓湯見泄

聖朮煎

白朮微炒 乾薑參錢 肉桂 陳皮各貳錢 水煎服虛甚加附子 白朮補

脾得補則善運善運則食消而脹去欲其運多於補則生用欲其補多
於運則熟用凡藥生則行速熟則行緩自然之理也若炒焦則全失其
本性反令損脾增脹陳皮達結氣於外乾薑祛寒氣於中肉桂化太陽
之氣於下下焦氣化而上下二焦之氣亦治矣

○歌曰

聖朮煎宜白朮陳乾薑肉桂水煎頻。若還虛甚須加附。景岳方中此最

純

連理丸

人參 白朮 乾薑 川連各貳兩 炙草 壹兩 蜜丸每服叁錢米湯送下

日兩服

○歌曰

連理丸消腹脹。堅理中湯內入黃連。蜜丸每服叁錢重。米飲頻吞痛自

痊

桂甘薑棗麻辛附子湯傷寒論治氣分心下

桂枝 生薑各叁錢 炙草 麻黃 細辛各貳錢 附子 壹錢 大棗肆枚水叁

杯先煮麻黃至貳杯去沫入諸藥煎捌分溫服日夜叁服汗出如蟲行

皮中即愈

枳朮湯

治心下堅大如盤邊如旋盤而不如旋杯邪尚散水飲所作全價特提

別於氣分也枳實貳錢白朮肆錢水煎服日叁服腹中與即當散也胃為陰陰常

有餘脾為陽陽常不足胃強脾弱則陽與陰絕矣脾不能為胃行其津液則水飲作矣方中用朮以補脾用枳以抑胃藏府分理所以治水飲之原易老逞其庸淺之見變湯為丸只認為一補一消之法學者切勿述此陋語為有識者笑

○歌曰

胃虛濕壅食難消枳朮相加一倍饒或用荷煨陳米飲和丸送用白湯調

四七湯治七情內傷因而致脹

半夏錢各叁茯苓錢各叁厚樸貳錢蘇葉壹錢生薑叁片水煎服此方妙在

紫蘇葉壹味辛以散結香以醒脾而順氣消脹行水乃其餘事

○歌曰

四七湯中半夏先茯苓厚樸共相煎更宜蘇葉辛香品散結醒脾妙用全

白朮附子湯 治寒中腹脹涎涕膠稠多溺足痛不能履地骨乏無

白朮 去喜睡兩丸多冷時作陰痛或見鬼夢亡脾脊多痛 附子 皮去膽 蒼朮 陳皮 厚樸 薑製 半夏 洗 茯苓 猪苓 去皮各半

兩澤瀉 肉桂 肆錢 每服半兩薑叁片同煎食前服量虛實加減

○歌曰

腹脹中寒附桂先生薑樸瀉二陳全茯苓應合猪苓用蒼朮還同白朮煎

疝氣

疝氣者罌丸腫大而痛也。大抵屬於任脈與肝經之病。而他經亦有之。七疝之名亦不必拘。後賢于此證加一氣字。可知治此證以調氣為主。統以五苓散作湯。加小茴木香木通金鈴子主之。如痛甚者。須防其潰爛。加金銀花為君。再加乳香沒藥為佐。如麻木不痛者。恐其為癩疝。難治。數年後如升如斗。宜加桃仁附子。華撥沙參。蒺藜蜜丸。鹽湯送下。此證多屬寒氣。

凝滯故列於寒證

○疝氣詩

疝為任病與肝經。尚小苗木木通金鈴是典型。合入五苓湯散妙。石灰

搗如米大入綿布中以棉縫好包腎囊。隔夜再易之。外法亦神靈。

五苓散證見暑

按黃氏論疝氣。由於腎水漸寒。肝木菟過。擁腫結鞭。結於少腹。而盤於陰丸。水凝則結。而為內寒。木鬱則發。而為外熱。法宜溫水。木之寒散。肝腎之結。結寒溫散。癢疝自消。仲景用大烏頭煎。烏頭桂枝二方。今加茱萸澤瀉。去其寒溼。以絕其根。名茱萸澤瀉烏頭桂枝湯。亦猶陳氏意也。

吳茱萸泡澤瀉烏頭泡桂枝白芍生薑各叁甘草貳錢大棗肆

水煎溫服。其擁腫偏墜者。用此藥湯熱洗之。或用藥末盛帶中熱熨之。

日作數次。令其囊消而已。

○歌曰

醫學易通 卷四
五
菴萸澤瀉桂枝烏棗芍薑甘相與俱偏墜兼資湯熱洗或將藥末帶中
敷

厥證

厥證者四肢逆冷是也。傷寒寒厥初病即厥。表宜當歸四逆湯。裏宜通脈四逆湯。傷寒熱厥多見於傳經之後。輕者宜四逆散。脈長者宜白虎湯。脈沉實大便閉者宜承氣湯。詳於傷寒門不贅。若內經之論厥多端。陽氣衰於下則手足寒亦名寒厥。宜桂附八味丸。陰氣衰於下則手足熱亦名熱厥。宜六味地黃丸。血之與氣並走於上則為大厥。厥則暴死。氣復還則生。不還則死。此不能以藥治。當徐俟之。或半夏末搐鼻取嚏。厥回後議藥。尸厥身脈皆動而形無知。宜還魂湯。方用麻黃參錢杏仁去皮共貳拾伍粒。炙草壹錢水煎服。如藥灌不入。分病人髮左右捉搦。按肩引之。令服取效。煎厥者陰虧陽擾。心如火燎。不必手足逆冷。病在於中。宜白虎加人參湯。薄厥者氣血俱亂。相薄成厥。似大厥而稍輕。病在氣血。宜先蒲黃壹兩黑豆貳兩炒以清水淋下取飲。血厥者似大厥而亦稍輕。婦人多有之。宜白

薇湯方用白薇人參當歸各貳錢炙草壹錢水煎服氣厥者因怒氣而得
宜七氣湯痰厥者痰涎如湧宜二陳湯加蒼朮白朮製南星竹瀝薑汁食
厥者因過飽而得宜平胃散加蘿菴子叁錢煎服探吐酒厥者醉後發厥
宜五苓散去桂加黃連黃芩乾葛此皆昏不知人而名之其實為風癘之
類近醫於猝倒之厥多混認為傷寒熱厥誤人不少內經寒熱二厥雖手
足合言究竟寒熱先從足起知其陰陽先衰於下不待手寒手熱皆當以
厥論也說本張心在附經此證雖寒熱俱有而仲景每指肢冷而言近時
稱名從仲景而不照內經故列於寒證

○厥證詩

醫書論厥互相譏寒熱攸分辨細微裏熱三承湯氣表四逆散內寒通脈
湯四逆外當歸當歸四同中互異明標本證上籌方別範圍最是追魂湯

先聖法白薇湯又重閨闈治婦人血厥如死人

當歸四逆湯見心腹

七氣湯見心痛

通脈四逆湯

見暑證

白虎湯

見瘧疾

承氣湯

見結秘

腎氣丸

見痰飲

二朮二陳湯

見溼證

五苓散

見暑證

防風通聖散

見中風

四逆散

見傷寒論

柴胡

白芍

枳實

甘草

各等分

研末每服叁錢米湯調下日叁服

六味地黃丸

湯

歌見八

熟地黃

肆錢

山茱肉

山藥

各壹錢

茯苓

丹皮

澤瀉

各壹錢

水煎服

錢作兩煉蜜為丸如梧子大每服叁錢

還魂湯

詳本論

白薇湯

詳本論

蒲黃酒方

詳本論

平胃散

見寶證加減詳本論

寒證統論

寒證有分經治者。有不必分經治者。桂枝麻黃驅表寒。乾薑附子溫裏寒。羌活獨活祛表之風寒。吳茱萸川烏溫裏之風寒。肉桂去血分之寒。香附佐薑附除氣分之寒。一隅三反可也。理中湯補中土以統治諸藏。中和之劑也。吳茱萸湯大建中湯宣上焦之陽也。真武湯扶下焦之陽以行水也。附子湯回坎中之陽以驅寒也。四逆湯救四肢之厥冷。白虎湯通脈四逆湯更有斬關奪命之奇能。寒甚脈絕熱藥拒格不納者必用白通湯加人尿膽汁寒甚格陽亦用之。勞傷下寒上熱者宜二加龍骨湯若不宜剛燥之劑。小便不利者可用桂附八味丸。若已戰天肉莖蓉小茴香沉香補骨脂皆溫補命門之善藥。與勞傷證相宜。