

秘傳證治要訣卷二

明

大醫院使戴元禮

述

漆園世人陳岐

校刻

念西居士王肯堂重校刻

諸傷門

傷風寒 附感冒

入病人家不令染着二味雄黃研末塗鼻孔及
須知避忌行從客位邊入男子病穢氣出於口
女子病穢氣出於陰坐立
對語之間自宜識得向背

傷風傷寒俗呼為傷寒傳經分三陽三陰三陽是太陽
陽明少陽經也三陰太陰少陰厥陰經也經之陰陽以

臟腑言腑為陽膀胱胃膽是也臟為陰脾腎肝是也病
之陰陽乃是外邪之陰陽陰氣陽氣是也陰陽二氣皆
能犯臟腑故陽氣犯太陽則為傷風惡風而有汗陰氣
犯太陽則為傷寒惡寒而無汗在太陽未得解轉入陽
明少陽二經則純乎陽不如太陽易其治若陽氣未能
罷以次傳入陰經則為陰中之陽蓋緣陽經之陽氣來
入陰經雖有自利欲寢唇青手足厥冷舌卷囊縮等證
不可妄投熱藥宜瀉其陽之在陰經也 若陽病下之
太過陽氣已脫遂變為陰所謂害熱未已寒病復起或
初得病便是陰證此是陰中之陰蓋緣陰氣攻陰經陰

自得傳非自傳諸陽經來只當以溫藥和其陽故陽入
陰者變陽以救陰陰入陽者用陽以救陽二者不可不
辨傷風傷寒初得病時俱見發熱頭疼體痛屬太陽
經但傷風惡風有汗傷寒惡寒無汗並宜和解散芎芷
香蘇散或人參養胃湯加草芎各半錢熱服溫覆若的
是傷風有前自汗惡風等證可用桂枝湯合其熱服溫
覆喘加杏仁壹錢咳加五味子壹錢渴加參半錢外熱
未止者敗毒散熱而有汗者敗毒散加桂枝半錢或陽
旦湯嘔者不宜用桂枝湯合於本方加半夏壹錢添薑
煎此非合病之嘔係傷寒雜病即非正傷寒故可用也風

寒一證理當發汗而其人虛不可汗者宜桂枝湯加黃
芪半錢若的是傷寒有前惡寒無汗等證可用五積散
熱服厚被覆之取汗喘嗽者杏子湯加麻黃半錢欲汗
而不得汗者再進已汗而身熱不退者參蘇飲或敗毒
散加桂枝半錢嘔者養胃湯此非治合病之嘔若風寒
俱傷或惡風而無汗或惡寒而無汗疑似之間只宜五
積散半貼和敗毒散半貼名交加散喘嗽者小青龍湯
有初得病太陽證具但寒而未即為熱至一二日後方
熱此傷於寒若傷風即有熱矣但寒未熱者五積散發
汗有已服解表藥不惡風不惡寒諸表證已罷於裏又

未躁未渴小便亦未赤大便如常獨身熱未除者宜香
蘇散敗毒散小柴胡湯加桂枝半錢有已服解表藥證
已罷又無裏證其人體痛不減者恐是發汗多榮衛不
和所致宜小建中湯用半厚半薄之桂若風寒二證
傳經後身熱煩渴小便赤大便不通言語不得睡不寧
鼻乾頭目疼日晡增劇不惡寒反惡熱舌上白胎中有
斷文或黑胎方為極熱甚則昏不知久此屬陽明經宜
大柴胡湯小承氣湯下之若具諸證而大便自調者宜
白虎湯小柴胡湯若胸脇俱痛頭疼耳聾口苦或渴
或嘔大小便或利或不利往來寒熱如瘧此屬少陽證

宜小柴胡湯嗽加北五味子半錢渴甚加枯萆根半錢
不渴而外有熱者加桂枝半錢自汗而尚惡風者以小
柴胡湯半貼加桂枝湯半貼如婦人病中經水適來
或經水失節此為熱入血室其血必結故使寒熱往來
如瘧書則明了夜則譫語宜小柴胡湯或加生地黄半
錢若胸膈不快手足自溫或自利而渴或腹滿時痛
此屬太陰經自利不渴宜理中湯重則加附子四逆湯
此陰中之陰也腹滿而痛當得通壅宜桂枝湯加芍藥
即是小建中湯但易厚桂為桂枝耳不愈小柴胡湯去
黃芩加芍藥壹錢或枳芍各半錢腹痛甚大使不利者

桂枝湯加大黃壹錢臨熟入或大柴胡湯以諸實各痛
當下此陰中之陽也 若兀兀欲吐心煩喜寐或自利
口燥而渴或口中和而背惡寒此屬少陰經但少陰用
藥有陰陽之分自利而渴者宜豬苓湯蓋陽執傳入腎
少陰經腎係舌本故自利口燥而渴以豬苓湯利腎中
之熱不愈則當自大便去之古法合用大承氣湯若難
用大承氣湯則用小承氣湯或且進白頭翁湯上項諸
藥為陰中涵陽者也 泄利下重其人四逆先以水盞
半葱白二根煎一盞去葱煎四逆散至七分咳加此五
味子乾薑各半錢悸加桂枝壹錢小便不利加茯苓壹

錢腹痛加熟附半錢 若審是下利清穀手足四逆其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛四逆湯倍乾薑面赤者加葱一根腹痛加芍藥壹錢半嘔加生薑咽痛加桔梗壹錢 若口中和而背惡寒宜正方四逆湯不必加減四逆散四逆湯俱治少陰下利四肢逆冷泄利下重者與下利清穀者一涼一溫又自有陰有陽之別 若初得病便見少陰證其人發熱惡寒身疼頭不痛者宜麻黃細辛附子湯微汗之或五積散加熟附半錢或五積散加以順元散 若煩悶厥逆或舌卷囊縮或下利清穀裏寒外熱此屬厥陰經下利清穀者陰中之陰宜進

通脉四逆湯或當歸四逆湯加生薑萊菔舌卷囊縮不
特陰中之陰有之陽明之熱陷入厥陰亦有之蓋陽明
主宗筋宗筋為熱毒風所攻故弗榮而急引舌與卯凡
以舌卷囊縮當瀉陽以救陰宜大承氣湯陽傳太陰而
利故用小建中湯及小柴胡湯去黃芩加芍藥此一藥
治太陰洩利腸鳴而痛已利而痛為虛虛則腸鳴蓋為
傳陰之陽氣漸微不敢過用冷劑但以芍藥通壅耳
南陽謂傷寒手足必微冷若手足自溫者係太陰也說
欠分曉若陽明手足安得微冷少陽厥陰必大冷安得
言微冷但當言三陰經少陰厥陰手足厥冷惟有太陰

手足自溫耳。凡渴問其所飲欲冷欲熱欲多欲少若
飲多而欲冷者陽渴也更須審其有何證在經也其太
陽證小便不利而渴者五苓散其陽明證大便不利而
渴者宜於前本經求之已利猶渴宜白虎湯其少陽證
寒熱往來而渴者小柴胡湯去半夏加括萸根如其數
陰亦有自利而渴各已見本經但陰有渴古人多用冷
劑以其皆挾陽氣耳經雖陰而病則陽也然亦有下清
穀不係熱利純是陰證而反見渴者此是陰在下隔陽
於上兼因泄瀉津液既去枯燥而渴其人雖引飲所飲
自少而常喜溫不可投冷劑宜理中湯或四逆湯加入

參壹錢渴甚連理湯 有陽證不渴陰證反渴者陽明
不甚渴太陽乃大渴不可不知治渴一也有堅腎水而
渴止者有利小便而渴愈者堅腎水則用天花粉之屬
利小便則用茯苓豬苓之類蓋太陽以利小便為先陽
明以利小便為戒少陽以膽經半表半裏未可下之其
人或大渴不止當以小柴胡湯加天花粉之屬堅其腎
水腎水既堅自還滲入大腸大便微通熱去而渴解若
病在太陽太陽在膀胱腎經非利小便則熱無從去渴
何由愈外有非太陽證煩躁發渴此乃陰盛隔陽不當
潤其渴惟當治其陰 煩躁陰陽經皆有之陽明經胃

有燥屎故煩此當下之太陽經已得汗而煩者五苓散
少陽亦或有煩宜小柴胡湯陰煩少陰為多由陽氣
傳入陰經陰得陽而煩自利而渴煩不眠者辰砂五苓
散若非是陽氣傳陰陰氣犯陰經吐利手足厥冷而煩
經云陽虛陰乘之故煩又云陰盛發躁欲坐井中吳茱
萸湯甚者四逆湯加蔥白二根外有虛煩一證乃是
病愈後陰陽未復時發煩執竹葉石膏湯痰多睡不寧
者溫膽湯嘔者橘皮湯詳見寒熱門潮熱虛煩證若誤
用藥下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯自利須辨
陰陽三陽自利各已本經見之太陽與陽明合病下利

頭痛腰疼肌熱目疼鼻乾宜葛根湯太陽與少陽合病
下利身熱胸脇痞滿而嘔或往來寒熱目疼鼻乾宜大
柴胡湯一太抵陽熱之利與陰寒之利自不同陽利糞
色必焦黃熱臭出作聲臍下必熱得涼藥則止得熱藥
愈增陰利必洞下清穀糞色或白或淡黃臍下多寒宜
溫中止瀉之劑此之謂陰利陽利指陰陽二氣而言非曰
陰陽一經也緣陰中亦有陽利不可因下利便以為
陰也 外有太陽證醫反下之遂下利清穀身體又自
疼痛者急用四逆湯救其裏後得大便已調身上疼痛
却用桂枝湯解其表 又有內不大滿猶生寒熱未可

下而便下之內虛熱入挾熱自利臍下必熱大便赤黃
色及下腸間津汁垢膩名曰利腸宜白頭翁湯黃芩湯
要知均為自利身不熱手足自溫者太陰身體四逆
者少陰厥陰其餘身熱下利皆屬陽經然陰利有反發
熱或初病無熱利後却熱或初得病即身熱繼而自利
此陰利非陽傳陰經之利詳見後段發熱證又有大便
秘五六日以藥利之利遂不止用極熱劑方差陽有利陽
有秘當更以他證別之 外熱內煩下利上渴或痞或
痛或嘔常法多用黃芩湯半夏瀉心湯亦可不若生薑
瀉心湯之當或溫膽湯加入黃連其中枳殼去取在久

諸陽發熱已見前三陽經陰不發熱惟少陰能發熱然少陰發熱有二證初得病即見少陰證發熱惡寒頭不疼宜麻黃細辛附子湯若下利清穀身熱躁擾裏寒外熱仲景謂之反發熱此乃陰盛陽宜四逆湯附子理中湯蓋陽氣傳陰經而下利者乃是熱利陽陷入裏外所以無熱陰氣入陰經而下利者乃是裏寒自利寒既在裏為主則陽氣必客於外所以外反熱要知陰陽二證發熱自是不同發於陽而發熱者頭必疼發於陰而發熱者頭不痛此為驗也又發汗後只惡寒者為虛虛乃表虛發汗後只惡熱者為實實乃裏實只惡寒者

是發其汗或汗出太過所謂陽微則惡寒宜芍藥甘草
附子湯只發熱者是表已解而裏不解所謂陰微則發
熱宜大柴胡湯或小承氣湯 又有汗下後陰陽不相
入水火不相濟致餘熱未退不可更用冷藥內外俱未
可攻宜小建中湯若其人已虛虛能生熱宜小建中湯
加當歸壹錢或四君子湯加黃芪半錢或十全大補湯
調其榮衛虛者四柱湯真武湯 審知是邪熱未解雖
經汗下却不可畏虛而養病宜竹葉石膏湯 又有潮
熱一證經云潮熱者胃家實也屬陽明經當下此之潮
熱乃獨熱往來多於日晡時發如潮之長落有期非若

先寒後熱寒往即熱來比也

外有病瘥後多食發熱

名曰食復作勞發熱名曰勞復復者愈而復作之義食

復宜小柴胡湯加大黃壹錢勞復空積實梔子湯或小

柴胡湯今人有澡身浣衣沐髮易牀之戒遂有幽冥鬼

神之說蓋慮患者初愈以垢穢為嫌作勞太過致成勞

復耳嘔吐有寒熱二證無物為嘔有物為吐何以為

吐有物古語只聞有乾嘔不聞乾吐太陽與陽明合病

身熱頭疼項強煩熱鼻乾目疼而嘔宜葛根湯加半夏

壹錢太陽與少陽合病頭痛腰痛待來寒熱胸脇疼痛

而嘔宜黃芩湯加半夏壹錢半入生薑五片煎若少陽

證具不係合病嘔而熱者宜小柴胡湯若陽明證具雖
顯然有可下證者兼之嘔多猶屬上焦未可遽下宜小
柴胡湯若太陽不與少陽陽明合病而獨見太陽證或
吐瀉者恐病人膈間素有痰飲停飲傷滯且以二陳湯
定之候嘔吐定徐進解太陽經藥若先嘔却渴者宜豬
苓湯先渴却嘔者宜治膈間之水小半夏茯苓湯渴欲
飲水水入即吐吐已復渴名曰水逆由心經受熱而小
腸不利也宜五苓散若少陰不渴而吐或乾嘔者理中
湯去白朮加生薑嘔而吐涎沫者吳茱萸湯 太陰厥
陰間有嘔吐太陰宜理中湯厥陰宜四逆湯並加生薑

煎已上陰證乃陰中之陰宜用熱劑陽入陰者能為利而不為嘔嘔屬上而近於外也陽之所入者深故利也又有陽證病新瘥後見嘔別無所因此餘熱在胃脘也宜竹葉石膏湯或橘皮竹茹湯大凡得之太陽而嘔者必是合病嘔乃病漸入內非正太陽也曾記有人初得病太陽證有嘔吐不在藥投熱劑莫能治之知太陽已汗解固當用冷劑是太陽見嘔非合陽明則合少陽其嘔為熱用暖劑非矣又記有人初病具太陽證而嘔一家少長患狀悉類與養胃湯八服無不立效此時行之氣適然如此是為傷寒雜病又非可以正經傷

寒_ハ律_リ之_ヲ 面_ニ赤_シ分_ニ陰_ニ陽_ニ二_ニ毒_ヲ太_ク陽_ノ不_レ解_レ陽_ノ氣_ヲ拂_ク鬱_ス令人_ノ
面_ニ赤_シ宜_シ敗_レ毒_ヲ散_ラ下_シ虛_ニ故_ニ面_ニ戴_レ陽_ノ而_シ赤_シ此_ハ陰_ノ證_ニ更_ニ審_ム有_レ何_ノ
病_ハ在_レ何_ノ經_ニ用_ニ藥_ヲ施_セ治_ス 仲_景謂_ク咳_逆為_レ噦_有陰_陽二_ノ證_ニ
陰_ノ證_ハ乃_ハ胃_ノ寒_ノ所_レ生_ル亦_ハ有_レ初_ニ本_ニ是_レ熱_ノ因_テ發_ス汗_後復_レ吐_下之_ヲ
攻_レ熱_ヲ太_ク過_ス以_テ致_ス胃_ノ寒_ノ因_テ寒_ニ而_シ咳_逆者_ハ橘_皮乾_薑湯_或半_夏
夏_生薑_湯咳_逆就_レ桔_梗枳_殼湯_中加_半夏_陳皮_等分_生
薑_十片_煎亦_治陰_咳逆_陽證_咳逆_乃胃_家熱_小柴_胡湯_橘
橘_皮竹_茹湯_陽咳_逆而_又兼_腹痛_者問_其前_後知_何部_不
不_利前_部豬_苓湯_後部_調胃_承氣_湯 發_黃有_陰陽_二
證_陽證_發黃_留執_蓄在_脾胃_痰熱_與宿_穀相_搏蒸_鬱而

黃凡病人身體發熱頭面汗出頸以下都無汗渴引水
漿小便不利通身頭目悉黃身乾無汗溺又不利則熱
不外越必蘊蓄而成黃證宜五苓散用茵陳煎湯調或
梔子湯調服 又有瘀血一證遍身亦黃但瘀血則發
狂大便必黑小腹按之急痛而大便却自利以蓄血不
可利小便也宜桃核承氣湯 陰黃乃太陽經中濕體
痛發熱身如薰黃然不如陽黃之明如橘子色也當即
其小便之利與不利小便自利木附湯小便不利大便
反快者五苓散 瘕有剛瘕柔瘕又有陰瘕陽瘕瘕有
汗為柔無汗為剛緣先因傷風又感寒濕致然外證俱

能發熱惡寒頭項強急腰背反張或瘈瘲口噤狀如發
瘧又如產後角弓反張風瘳小續命湯皆可用審是柔
瘳有汗者桂枝湯加葛根壹錢重則附子防風散 審
是剛瘳無汗宜葛根湯若胸滿口噤卧不着席脚攣咬
牙不惡寒者大承氣湯 發狂陽證有二陰證有一陽
證畜血如狂已見發黃條中陽毒發狂躁而狂走妄言
叫罵如見鬼狀面赤咽痛鼻如烟煤或身斑如錦或下
利赤黃宜陽毒升麻湯陰證乃是病發於少陰不當正
發汗醫見惡寒遂強發之汗因漏不止其人亡陽故狂
大畧與陰極發躁同南陽云亦無此一證當用陰躁之藥

加以收汗之劑玉屏風散入熟附子壹錢仍外以溫粉
傳之或冷汗自出手足逆冷其人狂不止者宜四逆湯
冷進醫治傷寒多問其小便利不利赤不赤以別其
陰陽亦有小便利自利遍數多所出自少色不甚清不可
因其利而遽謂之陰必是小便如常清而不赤又無諸
陽證方信裏之無熱若病在太陽身體熱太陽屬膀胱
未有小便不赤者不可因其赤遽謂之實熱必是小便
如灰汁或如陳酒或如血色無諸表證方見其熱已入
裏又有因發汗過多津液枯竭以致小便利不利或澀而
赤醫者往往利之重竭其津液又陽明病不大便而小

便赤澀或誤利小便則津液愈無胃愈乾燥此又利小便之戒。不得眠陰陽皆有之。正病於不得眠者陽明也。若少陰當病於欲寐。今乃不得眠緣陽氣入少陰經非少陰正病也。仲景云二三日身熱目疼鼻乾不得眠者陽明也。於前陽明證中求藥。少陰下利而渴不得眠宜豬苓湯。若少陰病得之二三日以上心中煩不得眠黃連阿膠湯。外有因發汗太過胸中煩躁不得眠欲飲水者少少與之。其人發渴小便不利者五苓散。若因吐下後心煩氣乏晝夜不得眠宜酸棗仁湯。若下後復汗晝夜煩躁不得眠夜則安靜不嘔不渴身無大熱者是

汗太過陽氣衰遂成陰證乾薑附子湯外有傷寒已解
或因飲食復劇煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得眠宜黃
連解毒湯又有病瘥後自不得眠宜濕膽湯或眠而精
魂散亂異夢驚悸者溫膽湯尤宜 古論鼻衄屬太陽
經風寒皆有之既衄而表證仍在於寒當用麻黃湯於
風當再用桂枝湯且謂發煩目瞑極者必衄既發煩目
瞑豈純是太陽經兼陽明之脈循鼻是太陽侵入陽明
汗下俱難若衄已而熱不退者惟升麻葛根湯敗毒散
陽旦湯為穩衄而煩渴飲則吐水先服五苓散次服竹
葉石膏湯大衄不止宜茅花湯或黃芩芍藥湯加茅花

一撮若少陰初得病醫誤以止發汗之法致迫血動
經妄行而衄其血非獨出於鼻或從口中或從耳目又
有陽陷入陰四肢厥逆醫見其厥謂寒邪在表從而汗
之當下反汗以致動血是謂下厥上逆為難治先哲云
桂枝下咽陽盛則斃正以此也要知汗不出徹為陽之
衄誤發其汗為陰之衄二者大不同也又云陽盛陰虛
汗之則死惡寒陰陽皆有之太陽經傷寒病在表故
惡寒少陽半在表半在裏亦微惡寒陽明在裏本不惡
寒陽明或惡寒者與太陽合病未可下宜小柴胡湯
三陰惟少陰經有惡寒之證太陰厥陰皆不惡寒然少

水部
十日
平四
人三
以極
東力
水部
二日
大對

大對
二日
水部
二日
大對
二日
水部
二日
大對
二日
水部
二日

論合支時... 中書合... 陰者無熱而惡寒宜溫之屬

陰惡寒又有二證發於少陰者無熱而惡寒宜溫之屬
理中湯四逆湯少陰無熱惡寒似與前太陽經未即熱
一條相似所謂寒未即熱者為太陽證具而未熱耳此
之無熱惡寒蓋無太陽頭痛等證知為少陰也陽氣傳
入少陰者或惡寒而暍時時自煩不欲厚衣屬大柴胡
湯若太陽得汗後大惡寒者表虛也芍藥甘草附子
湯表虛惡寒而筋惕肉瞤者真武湯外有太陰自利不
渴厥陰下利厥逆俱或惡寒太陰宜理中湯厥陰宜四
逆湯前既言一陰不惡寒今又言或惡寒要知太陰厥
陰皆不惡寒者此陽傳陰者也三陰皆能惡寒者陰入

陰者也特在少陰為多耳背惡寒有二證三陽合病背
惡寒者必口中不仁口燥舌乾也少陰病背惡寒者必
口中和也以此別之合病白虎湯少陰附子湯身體
痛陽證病在太陽陰證病在少陰厥陰在太陽宜汗於
前本經求藥自利而身體痛無熱證者為陰病也急當
救裏宜四逆湯附子湯真武湯去芍藥加乾薑或加官
桂如其數苦發汗後身大痛不止宜小建中湯和其榮
衛加以筋惕肉瞤者真武湯外有陰毒身疼如被杖與
中濕風濕等證皆能身體痛重活人書載之已詳茲不
復述自汗九證備見活人書但少陰不得有汗而或

善其文內丸出家帝
善其文內丸出家帝

限入證士好又輝其味史本始昆丁酉熟益劉八員辛之徒訓

反自汗出以陽氣衰少無以固陰液故汗不當出而出
空真武湯陽明病法多汗而或反無汗如蟲行皮中狀
者以病人久虛津液竭不能為汗宜用黃芪建中湯得
津液既和而陽明證仍在徐用小柴胡湯若太陽發汗
多遂漏不止其人惡風宜桂枝湯加熟附子壹錢漏汗
而筋惕肉瞤身欲振振擗地者真武湯外有頭汗數證
引飲小便不利身必發黃已見前發黃證胸脇微痛但
頭汗出往來寒熱心煩者小柴胡湯心下緊滿無大熱
但頭有汗此名為水結胸以頭汗別水結證小半夏茯苓
苓湯內加苓倍半夏白胎舌上微白者未可便為熱證

必胎白而厚其止如刺焦裂破紋摸之略無小潤甚成
黑胎方為熱極加以下證悉具無表證方可用小承氣
湯大柴胡湯亦有病屬陰證下利清穀陽氣客於上焦
煩躁引飲舌胎如前證或鼻如烟煤欲去衣被不可誤
以為陽附子理中湯四逆湯冷服陰陽之病皆能發厥
故有陽厥有陰厥皆病之深也二厥惟陽厥易誤當問
其初得病如何若初得病頭不痛四肢逆冷足多攣臥
而惡寒或汗自引衣蓋覆或不渴或利清穀或小便自
調人多惺惺而靜此寒厥也是為陰中之陰宜四逆湯
附子理中湯若初得病頭痛發熱外別有陽證至五六

天示平如論脈象皇帝天寶八婦論脈象大聖皇帝十宣辨證論

日方發厥其人雖厥或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁
不得眠大便秘小使赤多昏愊者此熱厥也是為陰中
之陽宜白虎湯或大承氣湯熱厥雖手足冷而指甲却
煖不若寒厥并指甲俱冷此辨陰陽要法也近有陽病
自腰以上極熱兩脚常冷蓋三陰脉上不至頭故頭不
疼三陽脉下不至足故足冷也咽喉痛有陰陽二證面
赤身發斑如錦唾膿血而咽喉痛者此陽毒證宜陽毒
升麻湯手足厥冷或吐利而咽喉痛者此少陰證宜通
脈四逆湯中加桔梗壹錢 又有非是暴寒中久伏氣
於少陰經旬月方發先咽痛而次下利宜半夏桂甘湯

謂之腎傷寒。亦有初得病頭痛發熱無陽毒少陰諸證而咽喉自痛者。此因感冒後頓用厚衣被堆壅。或用蠻法服生薑熱酒。即引遂成上壅。或先有壅熱欲取涼快。致為外邪所襲。既有風寒。又有熱壅。宜參蘇飲倍桔梗。加木香半錢。或消風百解散。或敗毒散。或五積散。敗毒散各半貼。名交加散。腹肚滿痛有陰陽之別。腹痛屬裏。正大陽經。腹不痛少陽有胸脇痛而無腹痛。若有陽明腹滿急而痛。此為裏實。宜大柴胡湯。小承氣湯。此總論太陽經陽中之陰。三陰下利清穀。而又腹痛者。裏寒故也。四逆湯。附子理中湯。陽氣傳太陰經。腹滿而痛。

其證有二一有實痛有虛痛腸鳴泄利而痛者虛痛也以
獨論太陰經陰中之陽小建中湯即桂枝加芍藥湯但
桂有厚薄耳不瘥則小柴胡湯去芍加芍藥如數腹滿
大便秘按之痛者實痛也桂枝湯加大黃壹錢此之虛
痛實痛乃是以陽邪漸消為虛陽氣正失為實 又陽
氣傳少陰六七日腹脹滿不大便者當下宜大承氣湯
痞結胸皆誤下所致按之胸膈石鞅而痛小結胸也
不按自痛者大結胸也心下滿而不痛者痞也惡寒身
熱病發於陽未有不證而反下之則為結胸惡寒無熱
病發於陰不當下而反下之則為痞二證之中又各分

陰陽痞結胸皆應下。表未解尚惡寒者，且宜解表，用桔
梗枳殼湯。和桂枝湯各半貼煎。如表已解，則可用小陷
胸湯以攻小結胸。大陷胸湯以攻大結胸。或先宜用桔
梗枳殼湯不効，則用大小陷胸湯。此大小結胸乃為熱結。
其人必煩躁燥渴，心中懊惱。又有寒實結胸，雖痛而
無煩躁等證。此因下後虛逆，寒氣獨結。宜理中湯加枳
實半錢，茯苓壹錢，或枳實理中圓。又有水結胸，無大
熱證，頭微汗出，宜小半夏茯苓湯。如寒痞，則用理中
湯加枳實半錢，茯苓壹錢，或枳實理中圓。陽痞時有熱
證者，先用桔梗枳殼湯，次用黃連瀉心湯。雖有熱而復

惡寒汗出者附子瀉心湯表解而胃中不和心下痞鞭
乾噫食臭腹中雷鳴下利者生薑瀉心湯或甘草瀉心
湯痞而有陰陽雜證半夏瀉心湯痞而渴飲水即吐者
五苓散亦有下因誤下而自痞者蜜在何經且當治本
經病痞甚則攻其痞大結胸為陽然亦有陰結用理
中熱劑痞則為陰亦有陽痞用三黃涼劑此蓋隨陰陽
變通不可執也 喘嗽有陰陽太陽經喘嗽略於前本
經言之詳見嗽門少陽有嗽無喘有喘非少陽也其見
少陽證而嗽者宜小柴胡湯加北五味子六分乾薑四
分陽明有喘無嗽有嗽非正陽明也其陽明証喘有潮

熱者宜大承氣湯陰證喘唯少陰有之若四肢沉重疼
痛小便如常大便自利而嗽者真武湯去芍藥加北五
味乾薑各半錢細辛三錢此陰中之陰若四肢厥逆腹
中痛泄利下重而咳四逆湯加北五味乾薑各半錢下
利嘔渴身煩不得眠而咳嗽者豬苓湯此陰中之陽諸
陰喘促最為危證反陰丹 讖語屬陽鄭聲屬陰經云
實則讖語虛則鄭聲讖語者顛倒錯亂言出無倫常對
空獨語如見鬼狀鄭聲者鄭重頻繁語雖謬而諄諄重
復不自已年老之人遇事則諄語不休以陽氣虛故也
此讖語鄭聲虛實之所以不同也二者本不難辨但陽

盛裏實與陰盛陽皆能錯語須以他證別之大便祕
小便赤身熱煩渴而妄言者乃裏實之讖語也小便如
常大便洞下或發躁或反發熱而妄言者乃陰陽之
讖語也裏實宜下調胃承氣湯熱躁甚而妄言不休大
渴喜冷宜理中湯陰陽宜溫膽湯四逆湯附子理中
湯又有不係正陽明似困非困間時有一二聲譫語
者當隨證施治外有已得汗身和而言妄者此是汗
出後津液不和慎不可下乃非陽非陰者宜小柴胡湯
和建中湯各半貼和榮衛通津液若陽傳入陰自利手
足厥逆語或錯亂此雖已自利其中必有燥屎猶當下

之陰中之陽宜調胃承氣湯瘀血在裏大便黑小便利
小腹痛其人如狂譫語者桃核承氣湯婦人傷寒發熱
經水適斷此熱入血室其血必結亦能譫語宜小柴胡
湯病後血氣未復精神未全多於夢寐中不覺失聲如
魘此不係譫語鄭聲宜溫膽湯去竹茹入人參半錢或
用六君子湯多寐四證風濕多寐見活人書不可更
發汗宜敗毒散屬太陽經久不得寐一旦欲寐別無
餘病此為陰陽和而愈也若少陰得病但欲寐者急
投四逆湯外有狐惑忽忽喜寐當於活人書求之
小便難須別陰陽經云陰虛則小便難然陰虛則陽必

溱之於小便故難而其色赤黃者為陽所溱中有熱也
是陰血虛不足以勝陽氣則陽盛而便難宜五苓散加
滑石末太陽病發汗遂漏不止其人惡風四肢微急難
以屈伸而小便難者是陽氣虛不足以固陰液則液乾
而便難宜桂枝湯加熟附子壹錢或更加茯苓又有陽
明短氣腹滿脇下及心痛鼻乾不得汗身黃小便難潮
熱而噦者小柴胡湯加茯苓壹錢 經云日晡所發潮
熱者胃家實也此屬陽明當下證然亦有每至晡時發
熱五更復退而大便自利用薑附辛熱劑而愈豈可以
日晡潮熱遽謂之陽遽謂之實要須以他證參之愚曾

治患人沈其姓之子乃所親見而親試者也 三陽有
頭痛三陰無頭痛此論古矣然陰間有頭痛陽間有不
頭痛似非正法曾治隣叟范家身熱頭略不疼進小柴
胡湯八服纔愈亦不可不知諸病已解無別證但頭疼
者連鬚葱白生薑煎湯若發汗太過致頭疼甚者宜小
建中湯加芎壹錢 陽病能食陰病不能食熱則消穀
善饑陰證能食為欲愈以陽氣復也然猶不可多與之
食恐脾氣尚怯不能消化陽病不節食則增病愈後多
食則病復生古謂之食復今謂之發哺以穀氣多則助
陽氣稼穡作甘辛甘辛發散為陽也所以病後虛煩一

陰陽辨論其如陰毒陽毒風

證先賢以為損穀則愈傷寒治法陽有此證陰亦有

此證似陽而陰似陰而陽最難分別毫毛之差千里之

謬前之所述慮證及此故逐條辨論其如陰毒陽毒風

溫濕溫疫溫瘧吐血吐衄發斑兩感百合狐惑陰陽

易毒心氣包絡當並遵南陽活人書用藥何在具陳况

治傷寒大綱不出陰陽舉其綱則雖節目纖悉有未能

盡不妨於活人書參考胃中冷必吐衄吐衄人皆知

為陰也然亦有陽證吐衄者蓋胃中空虛既無穀氣故

就上而求食至咽而吐又看別證如何不可專以胃冷

為說曾記一人陽黃吐衄又大發斑陽毒證口瘡咽痛

自撰證吐衄之
半復浮心湯
梅得効

吐衄皆以冷劑取効是亦有陽證矣 傷寒先犯太陽
以次而傳此特言其槩耳然其中變證不一有發於陽
即少陰受之者有夾食傷寒食動脾脾太陰之經一得
病即腹滿痛者亦有不循經而入如初得病徑犯陽明
之類不皆始於太陽也亦有首尾止在一經不傳他經
亦有止傳一二經而止者不必盡傳諸經也至如病之
踰越不可泥於次序當隨證施治所以傷寒得外證為
多仲景云日數雖多有表證者猶宜汗日數雖少有裏
證者即宜下 古論少陽居陽明之次此以五行生剋
論若謂陽主生則水生木太陽勝胱陽水合傳之少陽

瞻木兼太陽在表少陽表裏之間陽明在裏自外漸入
內次第正當如此果如傷寒論中所說一日太陽二日
陽明三日少陽豈可第二日病在裏而第三日方半表
半裏者乎愚固不能輒反其說然於心終所未安也傷
寒六日或七日若一手有脈一手無脈若兩手俱無此
欲成候也宜半夏瀉心湯或生薑瀉心湯此合病之劑
陽明下證已具其人喘嗽或微惡寒為太陽陽明或
往來寒熱為少陽陽明於陽明證中而有太陽少陽證
未罷此非正陽明也慎未可遽下所以古註陽明有三
常須識此有傷寒雜病有傷寒正病傷寒雜病者難

以正病治如病人證狀不一有冷有熱陰陽顯在目前當
就其中大節先治其餘證則徐治然亦不可用獨熱獨
寒之劑又如嘔渴煩熱進小柴胡湯嘔渴煩熱止矣而
下利不休以小柴胡湯為非則嘔渴煩熱不應止以為
是則下利不應見吐利厥逆進薑附湯吐利厥逆止矣
而熱渴譫語昏不知人以薑附為非則吐利厥逆不應
正以為是則熱渴譫語不應見此亦傷寒雜病雖無前
項冷熱二證顯然並見之跡而陰中有陽陽中有陰潛
伏其間未即發見用藥一偏此衰彼盛醫者當於有可
疑之處能反覆體認無致舉一廢一則盡善矣 傷寒

有壞病者緣已發汗吐下仍不解為壞病如或病中又感寒熱異氣若重感於寒則先熱後寒而為溫瘧重感於風則四肢不收頭疼身熱常自汗出而為風溫重感溫熱則身發斑為病最重而為溫毒致此則經候傳變無復紀綱皆名壞傷寒當於活人書中本病治之傷寒要緊處在分表裡而為汗下有病人自汗自下者有醫用藥汗之下之者中間節目頗多汗藥宜早下藥宜遲此亦太綱之論耳且失血家不可發汗淋家不可發汗如以等類豈宜遽用表劑當徐徐解散苟或不當汗而強汗則津液耗竭變生百病因茲夭傷豈可一以

汗藥宜早為說陽明汗出而多宜急下少陰下利而渴
宜急下厥陰舌卷囊縮宜急下如此等證當用速利之
劑苟或當下而不下則熱毒轉深遂致失下不可救療
豈可一以下藥宜遲為說又發汗之法但欲遍身澀
澀不欲淋漓下之法進一服後如人行十里許未通方
進次服已通之後服不必盡劑傷寒用藥不可輕易
解表雖當用麻黃桂枝亦宜先用芫芷朴朮如和解散
芫芷香蘇飲加蒼朮之類攻裏雖當用大承氣大柴胡
且先用小承氣小柴胡又陰證雖合用四逆湯且用
理中湯欲用真武湯且用三白湯庶不失古人重敵之

意若證候已危不可失機勿拘此說 傷寒有陰證而
頭或疼未有正陽證而頭略不疼者有陰證而反發熱
未有正陽證而身不熱者有陰證而或小便自赤未有
正陽證而小便不赤者此當正法治也 感冒為病亦
有風寒二證即是傷寒外證初感之輕者故以感冒名
之若入裏而重則是正傷寒初感用藥與前項太陽證
一同今病人徃徃惡言傷寒不知輕則為感重則為傷
又重則為中有其病而諱其名甚為無義特以俗呼為
大病故諱言之耳 曾有病人發熱畏寒身疼頭痛醫
謂太陽證以五積散表之五六日後發渴譫語大便自

得病竟不通用小柴胡湯繼以大柴胡湯得利後忽四肢逆冷舌卷囊縮氣息喘急面裏睡卧用真武湯利不止而病如故遂用附子理中湯四逆湯方得利止手足稍温當夜貼然次日忽又發熱譫語口渴小便赤痛又經六七日大便仍復不通再用潤腸圓通得大便而諸證不減後只用温膽加入參及減桂五苓散久而漸愈此病用涼藥則陰勝用温藥則陽勝隨手輒變皆是用之過也若四逆之後陽證仍復醫苟不審再用大柴胡承氣之屬必又復為陰所以終收功於温膽湯五苓散以平穩故也故出為用藥太過之戒 春病曰温夏病

曰熱不出此諸證但因時而異其名耳其時有不正之
氣感襲於人因得時氣之名今俗總呼為傷寒只是天
氣尚熱古人有用熱遠熱之戒桂枝湯宜加黃芩名陽
旦湯五積散宜加石膏升麻知母其真武湯乃陰證之
先劑或未敢遽用熟附則不若生附為穩或半生半熟
若其人多痰附子尤宜生用尋常感冒和解散香蘇飲
或可加蒼朮不換金正氣散普賢正氣散對金飲子養
胃湯皆是手面表散之劑解肌熱及上焦熱參蘇飲敗
毒散百解散十神湯 太陽有風與寒之不同三陽有
正證合病之不同不可不別 北人初得病以蒼朮麻

黃並用相半為發汗第一義纔覺壯熱便用防風通聖散南北殊俗其稟受素實故也 曾記一老成人言感冒服發汗藥得汗證候盡除只身熱未退再用熱藥而熱仍在表裏都無別病溫涼汗下俱所不可者宜進養正丹四五十粒 病愈後別無他證只微熱未盡除其人脾氣久虛欠調理脾主肌肉故生餘熱燥補不可宜用理中湯加蜜一匙許煎 元是陽證因汗下太過遂變成陰便當作陰證治却不可謂其元初是陽拘拘於陽傳陰之說乃是三陽壞證轉為陰也此為陽之反而非陽之傳 有虛人感冒發熱纔得一日熱不為又又

不為重便見謔語此乃虛不禁熱不可遽用十分冷劑
三陰不頭痛自是正病然陰盛隔陽者亦有頭疼以
其病本在陰而陽又為陰所病故亦見陽證也有元是
陽證因冷劑太驟遂見下利不止而諸陽證仍在略不
少衰此當以煖藥固其下洞稍定又宜隨證治之不可
用熱初病是陽絰見頭痛以次陽傳入陰頭略不疼不
可便謂頭不疼為陰證須問其得病之初頭疼與否
有汗下而熱不退多用涼肌藥而又不退動至半月或
兼旬者乃是陽氣離經不能復還客於皮肉之間病此
甚衆此當調補收斂之不可用辛熱重劑藥又病六七

日候至寒熱作汗之頃及大躁擾復得汗而解蓋緣候
至之時汗已成而未徹或者當其躁擾誤用冷劑為害
非輕不可不審也 有微惡風微發熱起居飲食自如
常但不甚清快又不可過用表劑若投以和解養胃對
金之類不効者宜神木散有陽證下後熱退脉平而神
思恍惚昏昏不知痛痒處不省人事如癡如瘖不可謂
其為虛妄投補劑只一味參湯或不藥自愈 陽證身
熱而胸膈痞塞者減桔梗枳殼之半前胡柴胡足其數

傷暑

傷暑必自汗背寒面垢或口熱煩悶或頭疼發熱神思

倦怠殊甚所謂暑傷氣而不傷形是也但身體不痛與
感風寒異宜香薷飲六和湯香薷湯嘔而渴者浸冷
香薷湯或五苓散兼吞消暑圓嘔不止者枇杷葉散去
茅根吞來復丹嘔而痰卻暑散吞消暑圓或小半夏茯
苓湯或消暑飲瀉而渴者生料平胃散和生料五苓
散各半貼名胃苓飲間進來復丹此丹本非治瀉之藥
唯施之暑瀉則宜然瀉甚亦不可用瀉定仍渴春澤湯
或縮脾飲傷暑心頭痞悶人皆謂暑毒攻心不知有
暑即有痰痞悶者痰為之也盛暑途中倉卒無水渴
甚急嚼葱頭二寸許抵飲水二升瀉而腹痛有積者

生料五苓散藿香正氣散勻各半貼若瀉雖無積其腹
痛甚生料五苓散加木香柒分或六和湯加木香半錢
或不加木香止與二藥煎熟去滓調下蘇合香圓又
有不渴而腹乾痛者六和湯煎熟調蘇合香圓尤宜
瀉而發熱者胃苓飲瀉而發渴者胃苓飲兼進縮脾飲
瀉渴兼作未透者湯化蘇合香圓吞來復丹或研來復
丹作末白湯調下已透者香薷飲感冒外發熱者六和
湯香薷湯香薷飲身熱煩者五苓散或香薷湯加黃連
壹錢熱而汗多畏風甚者生料五苓散熱而渴者五苓
散兼進縮脾飲暑氣攻裏熱不解心煩口乾辰砂五

苓散或香薷飲加黃連壹錢若大渴不止辰砂五苓散
吞酒煮黃連圓暑氣攻裏腹內刺痛小便不通生料
五苓散加木香柒錢冒暑飲酒引暑入腸內酒熱與
暑氣相并發熱大渴小便不利其色如血生料五苓散
去官桂加黃連壹錢或五苓散去桂吞酒者黃連圓
暑氣入腸胃而小便艱澀不通者加味香薷飲仍佐以
三黃圓暑氣入心身煩熱而腫者宜辰砂五苓散或
香薷飲加黃連壹錢傷暑而傷食者其人頭疼背寒
自汗發熱畏食惡心噫酸臭氣胸膈痞滿六和湯倍砂
仁若因暑渴飲食冷物致內傷生冷外傷暑氣亦宜

此藥暑偏要入心者心屬南方離火暑氣所入各從其類小腸為心之腑利心經暑毒使由小腸中出五苓散利小便為治暑上劑也 有傷於暑因而露卧又為冷氣所入其人感暑復感冷自汗怯風身疲頭痛去衣則凜着衣則煩或已發熱未發熱並宜六和湯內加扁豆砂仁一方用藿香一方用紫蘇正治已感於暑而復外感於風寒或內傷生冷以藿香紫蘇兼能解表砂仁扁豆兼能溫中然感暑又感冷亦有無汗者只宜前藥若加以感風則斷然多汗審是此證宜生料五苓散內用桂枝為佳市井中多有此病往往日間冒熱經營夜間

開窓眠卧欲取清凉失蓋不覺用藥所當詳審有此證而發潮熱似瘧猶未成瘧者六和湯養胃湯各半貼相和煎有此證而鼻流清涕或鼻孔熱氣時出六和湯加川芎半錢羌活柴分有因傷暑遂極飲以冷水致暑毒留結心胸精神昏憤語音不出煎香薷湯化蘇合香圓服有因傷暑用冰沃面或入水洗浴暑濕相搏自汗發熱身重小便不利宜五苓散傷暑而大汗不止甚則真元耗散宜急收其汗生料五苓散倍用官桂或加黃芪如木之數此亦古法也傷暑自汗手足厥冷者煎六和湯調蘇合香圓傷暑自汗手足時自搐搦

者謂之暑風緣已傷於暑毛孔開而又邪風乘之宜香
需飲或香需湯並可加羌活壹錢痰盛者六和湯半貼
和星香散半貼暑月身痒如針刺間有赤腫處亦名暑
風末子六和湯和消風散酒調服暑風而加以吐瀉兼
作者六和湯藿香正氣散各半貼加全蝎叁箇有暑
毒客於上焦胸膈痞塞湯藥至口即出不能過關或上
氣喘急六和湯浸冷調入麝香少許伏暑煩渴而多
熱痰者於消暑圓中每兩入黃連末貳錢名黃連消暑
圓或二陳湯或小半夏茯苓湯並可加黃連壹錢暑氣
久而不解遂成伏暑內外俱熱煩躁自汗大渴喜冷宜

香薷飲加黃連壹錢繼進白虎湯若服藥不愈者暑毒
深入結熱在裏譫語煩渴不顧去近衣大便秘結小便
赤澀當作熱病治可於傷寒陽明證求藥

傷濕附痺

傷濕為病發熱惡寒身重自汗骨節疼痛小便澀大
便多泄腰脚痺冷皆坐卧卑濕或冒雨露或着濕衣所
致並除濕湯 又前諸證而腰痛特甚不可轉側如纏
五六貫重皆由濕氣入腎經腎屬水從其類也宜腎着
湯或浸濕湯煎服 小便秘大便澹者尚書兩泄腹疾
者是也五苓散吞戊己圓戊己屬土土能尅水因以得

名五苓乃濕家要藥經云治濕不利小便非其治也義
蓋取此傷濕而兼感風者既有前項證而又惡風不
欲去衣被或額上微汗或身體微腫汗積衣濕當風坐
卧多有此證宜除濕湯桂枝湯各半貼和服令發微汗
若大發其汗則風去濕在已得汗而發熱不去者敗毒
散加蒼朮壹錢防已半錢傷濕又兼感寒有前諸證
但無汗慘慘煩痛宜五積散和除濕湯各半貼微發汗
已仍復熱而渴者除濕湯半貼和五苓散半貼傷濕
而兼感風寒者汗出身重惡風喘滿骨節煩疼狀如歷
節風臍下連脚冷痺不能屈伸所謂風寒濕合而成痺

宜防已黃芪湯或五痺湯詳五痺用藥於風濕最宜若
因浴出未解裙衫身上未乾忽爾熟睡攻及腎經外腎
腫痛腰背攣曲只以五苓散一貼入真坯少許下青木
香圓如此三服臟腑纔過腫消腰直其痛自止

傷酒

傷酒惡心嘔逆吐宿酒昏冒眩暈頭痛如破宜沖和
湯半夏茯苓湯或理中湯加乾葛柒分或用末子理中
湯和縮脾飲酒渴縮脾湯或煎乾葛湯調五苓散久困
於酒遂成酒積腹痛泄瀉或暴飲有灰酒亦能致然並
宜酒煮黃連丸多飲結成酒癖腹中有塊隨氣上下

冲和湯加蓬朮半錢酒停胸膈為痰飲者枳實半夏湯
加神麴麥蘖各半錢冲和湯加半夏壹錢茯苓柒分
多飲酒積入脾遂成酒黃詳見拾遺門疸證

傷食

傷食之證胸膈痞塞吐逆噯酸噫敗卵臭食頭痛發
熱惡寒病似傷寒但身不痛耳治中湯加砂仁壹錢或
紅圓子小七香圓和服食過多而傷停留中脘聞食
氣則嘔二陳湯加砂仁壹錢未愈更加丁香半錢或治
中湯加砂仁壹錢丁香拾粒大嘔不止者大使去之枳
實半夏湯加砂仁壹錢白豆蔻仁半錢噯感應圓初

因食一物過傷得病後再食之舊病復作一味紅圓子
常服傷食腹痛脹滿大便不通遂成食積小七香圓
一貼用冰一盞薑三片煎入分去薑吞感應圓

傷食瀉 見大小腑門泄瀉證

傷於生冷油膩停滯膈間脾氣不溫食難消化或多食
糯食及一切非時難化之物並宜紅圓子金上牢內消
圓傷食兼感風寒其證與前同但添身疼一證俗謂
之夾食傷寒宜生料五積散或養胃湯香蘇飲和解散
選用若不瘥而病入裏者宜下之見諸傷門傷風寒證
食釐太過致傷一味丁香是以治之有飲食不節所傷

以致半身不遂狀如中風不可作風治蓋人之飲食下咽而入肝由肝而入脾由脾而入胃因食所傷肝氣不理故痰涎壅塞若中風然亦有半身不遂者肝主筋故也治以風藥則悞矣宜用消食之劑其中當木瓜散却不可安下之食毒物非時物多病血不傷脾不傷胃而傷肝病不在下故不可安下

俞子容王宇泰以為恐有謂夫原禮一時醫流巨孽豈有無警之論哉余嘗觀蘭人解體真圖及近載解尸之写真皆曰脾者在大腹之後邊左季肋與胃之間則原禮卓見明識不俟解而洞識內景可謂秘傳證治要訣卷二明達矣

崇範