新刊医林状元寿世保元

069288

〈五〉

新刻校正詳補太醫院吏目金鉉肇庭賢子才編輯
太醫院使劉完素河間校

外科諸證

癰疽

夫癰疽氣壅瘡瘍癤者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣壅結深而發焉癰疽也亦有久服丹石燥熱之藥熱氣佛鬱於內以致陰陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久病虛羸之人以其平昔所食肥膩炙煿妄生不節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰疽者雍也氣壅而不通也瘡瘍者其總名也癤者有頭小疼也經云諸瘡瘍皆屬心火之熱而主血凝滯而主癰疽之類也

然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六腑積熱騰出於外則肌肉之間發暴甚皮腫光軟侵淫廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於心者疽也初生一頭如痛癢白色焦枯觸之而痛應心者疽也浮腫根小不過三寸者癰也大癰生於六腑若癆原之次則浮腫根小不過三寸者癰也大癰生於五臟沉澁難療若陷空室之遂則潰骨髓難療而易瘥復夫諸瘡之中惟背疽疔瘡最爲急症其次貴如腦疽則易療若疔瘡遍體懸癰瘡腫則易療惟難療者也疔瘡腫脇瘰癧云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也大癰疽須要察其是實是虛或重或輕對症用藥無失先後矣序

癰便不可輕易待之有視不見之處宜速志治之庶幾得救壁豈之急慢以爲常疾每見從微至顯喪命者多矣便其理亦由是也凡瘡未破毒攻腑腑一亡臟腑俱潰臟腑既

敗飲食不進一毫冷藥亦不可用此是先後次第之要訣也大瘡有五善七

寒不可不辨若動息自
鮮不良二善也神彩精明言語清朗四善也
腹痛瀉甚渴利無度小便如淋一惡也膿血
也滿悶氣短氣恍惚嗜臥三惡也未濕先半汗
頂不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔
氣鼻青唇黑面目四肢浮腫七惡也更有氣噴
耳聾恍惚譫語言顛倒背見惡症五善見三則善七惡見四必危而死矣

審症虛實訣

凡大拔乃痛者痛深小拔便痛者痛淺拔之處陷不復者無膿拔之處即復者有膿急當破之若拔上下不熱者無膿若熱甚者有膿也用諸拔毒之藥數數塗之不可計破也一邊軟亦可有膿都堅者此為惡疽或有氣也都軟者此為有血血瘤也

當審堅軟虛實為要若堅疽積久後若更潰
破也軟疽者温煖畏寒忌之可若針灸刺破不可療也

雜忌須知

一凡病時忌怒忌憂忌勞身體不潔入來看忌
醃藏等物疼日歇百日後不作溺症者方可食生冷瓜果
凡一切瘡腫將好未好之時如往孝有喪之家弔孝并拜謝其
瘡腫即復發切忌切忌
房

用藥治法

凡癰疽瘡初起二三日內即服飛騰神駿膏此藥治瘡初起至
將潰之際俱可服服後汗出將惡毒毒氣發散腫痛立消其勢加神若瘡已
潰爛勿服如無神駿膏初起即服拔花酒或五香連翹湯亦可
瘡未之非初出至七日內皆可忽也七日外不可忽瘡未及忽初起即以葱
薑膏或蟾膏貼之即消至四五日腫痛未消用芙蓉膏敷之至
膿之時不以頭破用針先頻點瘡頭自然破出膿

瘡自初起至此膿潰出未出之際即服八活命飲一二劑清
濕熱用猪蹄湯洗淨以三神膏揉之內服十全大補湯以護膈膜一藥相兼服之勿問不計其數再看濕爛流膿不止此氣
血二虛急須用猪蹄湯洗淨將生瘡未飲已用猪蹄湯洗淨將生肌散揉上外貼
神異宮內服十全大補湯加減八味丸可久服自愈好後再服加減八味丸可
以絕根本無病時宜預服之免為防患於未然也以上治法
俱要依次第而行未有不奏效者昌于良發百中之良法也
○一論癰疽

○二論疔瘡

飛龍申發背瘰癧風瘡氣痲發背瘰癧風瘡氣痲疾專門之方其效捷如神
昌

一四兩熱水泡去皮尖用砂鉢擂爛又入水同擂
去尸淨四升　地骨皮去骨淨四兩
甘草四升　黑豉一堀
水　發葦一大把　大把濕一大把
大鐵鍋一口將藥入鍋內注清水

一二錢煎至五六分濾汁再入水二三桶又熬至五六分濾汁前汁兩如前法三次去滓將前五味藥三味不出其味香甜磁罐收貯一鍋熬至乾去黑鉛頭髮證草三味不出其味香甜磁罐收貯

二次沙井作一鍋熬至乾去黑鉛頭髮證草三味不出其味香甜磁罐收貯

被不可被風吹次早用術蹈踏喂食汗後忌風吹次早用術蹈踏喂食汗後忌

調服隨人酒量以酣為度汗出立愈此治瘧毒初起至潰破時前後皆可服好熱酒調服隨人酒量以酣為度汗出立愈此治瘧毒初起至潰破時前後皆可服

神效

○一論凡初患惡瘡皆已結未結赤熱腫痛即用炙法先以濕紙摺其上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片如前法炙之三壯換一蒜片如前法炙之

上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片如前法炙之三壯換一蒜片如前法炙之

方住最緊要者即結頭處取大蒜去皮橫切三片如錢厚安在頭上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片如前法炙之三壯換一蒜片如前法炙之

方住最緊要者即結頭處取大蒜去皮橫切三片如錢厚安在頭上用大艾炷於蒜上炙之三壯換一蒜片如前法炙之三壯換一蒜片如前法炙之

日者三四日者不復多痛不痛多至不痛不痛多至不痛

日者三四日者不復多痛不痛多至不痛不痛多至不痛

餘予補瘡頭上聚要處亦可者若上初發赤腫內有一粒膿黃如粟米者的

餘予補瘡頭上聚要處亦可者若上初發赤腫內有一粒膿黃如粟米者的

用徹蒜切片如前法炙之次日去痂膿自潰矣

用徹蒜切片如前法炙之次日去痂膿自潰矣

○一論凡癰疽發背一切無名腫初起
○生葱生蜜搗膏
○生葱生蜜猪膽汁搗膏　治症同前
○生白礬末五錢加麝香
頂出氣不過一夜即愈
○論發背及一切方腫堅
不問已成未成但痛者
○槐花四五兩炒黃乘熱
入酒二鍾煎十餘沸去渣
○論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不識初起壯盛人宜
黑白牽牛各一兩搥碎好酒一碗煎六分露一宿次日溫服大便下膿盡
即愈
○金蚯蚓一論凡癰疽發背一切無名腫毒初起
生葱生蜜猪膽汁搗膏　治症同前

膚壯熱大便閉結小便赤澁宜
大黃消毒散
連翹二錢 黃芩一錢 赤芍一錢
天花粉一錢 牡蠣一錢 當歸尾一錢
金銀花五分 甲珠一錢 防風一錢
右剉一劑酒水各半煎服
○一論腸癰便毒疔腫癤疽初起即消已腫即潰血從大便中出癤潰後勿服
加減瘡大活命飲 又名千金內消散
當歸尾酒洗一錢五分 赤芍一錢 白芷一錢
金銀花三錢 皂角刺一錢 水酒煎
乳香一錢 沒藥五分 白蠟蚯一錢 水煎
大黃三錢 甘草節五分 瓜蔞仁去殼一錢 水煎
右剉一劑水酒煎服 川山甲蛤粉炒一錢 天花粉一錢
○一論癰疽發背腫痛初起未潰宜急治不可忽者蓋此癰疽雖痛止
於膏肓 黃耆六錢 當歸三錢 甘草二錢
於藥中加入乳香沒藥各等分為末

仁味子仁二合 陳
○一治癰疽將潰之捺
三神膏 苗麻
右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪
續揀上共搗成膏用雞翎續
○一治癰疽毒證經旨瘍醫
加味蜈蚣丸 九
右為細末用蜆蜜化為
黃蠟一兩 乳香一
沒藥一 雄
右為細末用蜆蜜化為
梧子大每服五十
逆下
○一治癰疽發背由氣
痛生肌長肉之劑當用
右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪
加味蜈蚣丸 九
右為細末用蜆蜜化為
黃蠟一兩 乳香一
沒藥一 雄
右為細末用蜆蜜化為
梧子大每服五十
逆下
○一治癰疽發背由氣
痛生肌長肉之劑當用

仁味子仁二合 陳
○一治癰疽將潰之捺
三神膏 苗麻
右三味置鍋中用槐條攪成膏先將猪
續揀上共搗成膏用雞翎續
○一治癰疽毒證經旨瘍醫

[illegal] 千金內托散

黃芪 鹽水炒 人參 當歸酒洗 川芎 白芍酒炒 白朮
川厚朴 姜炒 桔梗 官桂 甘草炙 去殼 金銀花
瓜蔞仁 去殼

右剉每服二兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進三服之後潰口有黑血出者及有汗出此藥之功也不問症候猶惡未成膿者固散已成膿者即潰矣○

痛甚加乳香沒藥倍當歸名補氣和血和胛肩托毒外出實爲切要凡瘡潰後須當大補氣血

○一論癰瘍陽虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載主時令醫者當細察病安漫不知省無補拔謂壹之功慾後虛症覓

因而轉爲[illegal]

收功萬全湯

黃芪 鹽水炒 八錢 一兩 當歸 川芎 白芍 白朮 酒炒 七分 一兩 五分 官桂 甘草 各五分

白芷二分

川芎 七分 烏藥 酒炒七分 懷牛膝 酒洗 一兩 五分

白朮 去蘆 炒 白茯苓 去皮 各一兩 半夏 薑湯泡七次 陳皮 五分

甘草二分 防風 五分

右剉生薑一片水煎溫服（）如作湯加
地黃麥冬各二錢加竹葉十片名竹葉湯
加澤瀉○如有痰加橘紅半夏○如泄瀉
加陳皮○如心悸不眠加遠志酸棗仁炒○如
加減法 腹滿不寬加厚朴薑炒○如小便不利
加茯苓澤瀉○如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
八珍湯去茯苓去芎四兩乾山藥去蘆四兩炒白朮去蘆米泔浸炒四兩
白茯苓去皮切片炙四兩甘草炙二兩 上為末每服二錢水一鍾煎至七分
去滓溫服 加減法 如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
加減法 如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
八仙糕 人參去蘆四兩去皮乾山藥去蘆四兩炒白朮去蘆米泔浸炒四兩
不油白茯苓去皮切片炙四兩甘草炙二兩 上為末每服二錢水一鍾煎至七分
去滓溫服 加減法 如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
右將藥末米粉糖霜和勻作一片白糕米細末二兩 上為末每服二錢水一鍾煎至七分
去滓溫服 加減法 如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
再焙乾任意食之 白扁豆去皮薑汁炒微黃四兩 上為末每服二錢水一鍾煎至七分
去滓溫服 加減法 如腹後寒氣血虛弱不長肌肉不合口膿
後脚胃損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者
敷治止痛收 處處損傷氣血筋骨折斷用竹力劄成小片長短闊狹

○一論癰疽發背潰爛便溏此湯瀉洗

薯蕷湯　當歸　川芎　白芷　羌活　防風　桔梗　白蘞　赤芍藥　乾薑　各五錢　甘草　白朮　各一錢半　人參　茯苓　各一錢　半夏　麥門冬　各二錢　大棗　三枚　生薑　三片　水煎服

右細細銼者軟滑汁分爲兩次發去上面油花并下面渣肉每次用藥一碗投水三升再用文武火煎十數沸紙蘸湯溫溫徐徐洗之洗訖勿弃即以乾軟綿裹藥納瘡口氣吹之有胡臭人并月經見行婦人及備大前不許入房內洗瘡切忌觸犯破出膿

○一論一切惡瘡癰疽發背諸毒主死因有膿無頭上

白蘞湯　白蘞　白芷　當歸　各一兩　川芎　甘草　各五錢　乳香　一錢　半

苷針丸　人言　爲末入鍋內土蓋曲熱候癰不熟勿動度一利

砂五分　巴豆十枚　研

用水一升煮取三分　去滓以故帛蘸藥塗瘡上日三夜一

浸藥二分　白堆子香七枚

右為細末炙痲油調末炙痲子川烏二味磨化頻點癤頭上
替針散　　川木鼈上不一時即穿
　　再刷上
○一論治瘡發背發頂發腦等大毒不拘已潰未潰俱用此敷周圍腫掀之處其破口處以神効
清遍敷自消如已潰將此敷
換兩三
二合消毒不許見風神効
次蛤蚧
　　敘
右末合為一處用新涼水調令不稀不稠如瘡毒未破塞孔為末寒水石煨為末各一兩
膿處遍敷之用綿紙覆乎上但乾即以水掃之朝夕更換二次如夏月或午
一時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膿破口處用神異
膏滿貼之不必留口亦一日三換

○一論癒痘發苔潰爛久不生肌肉用此立效

合口收功散

血蝎二禾　乳香
龍骨各一禾五赤石脂二禾　朱砂
右共爲細末散在瘡口上即生肌肉

○一論癒痘發苔潰爛膿瘡不合口者　神效

兩三次中毒猶輕力方能勝毒諸瘡毒未
神異膏　輕粉
當歸尾五禾　川芎五禾　赤芍二禾　沒藥
生地黃四禾　防風五禾
羌活五禾　白芷五禾　玄參五禾　黃芪五禾　官桂三禾
桃仁四十九箇杏仁四十九箇　何首烏三禾　牛蒡子五禾
穿山甲四禾　露蜂房三禾蛇退二禾　大黃二禾　黃柏二禾
乳香　沒藥　海蛸各五分　蜈蚣一條
右用芝麻油二斤四兩將藥入鍋內浸春五
日夏三秋七冬十

火煎濾取
丹十四兩柳條攪不住手成膏軟硬得所再
降真香末二錢次冷定下
射香末二錢水浸三日去火性搗
用

○一論癰瘍

不能上潤以致心火上炎水火不能既濟故口舌生瘡不絕
陽痿飲食不多肌膚漸削或腿腫腫脚先瘦服此以生腎水降心火諸症頓止
及治口舌生瘡不絕

加減八味丸

黃八兩好酒拌炒鍋內蒸半日搗爛
懷生地黃八兩好酒拌炒鍋內蒸半日搗爛

山藥一斤 兩桂心去皮五錢 茯苓去皮石斛淨肉四兩酒蒸搗爛
白茯苓去皮名五茶 澤瀉切片焙乾
石斛末八兩加煉蜜少許丸如梧子大每服六七十丸空心鹽湯送下
牡丹皮五茶

○凡八叉以後服此加減六味丸必肥健而多子晚年服此不生癰疽諸毒不能消

渴等症

○一患瘧痢之人雖云有熱皆因虛而得之愈後瘧痢非八味丸不能治

○一八病瘧痢多有愈後發渴而不救者治之惟八味丸最効若渴而不救者治之惟八味丸最効若渴而不救者治之惟八味丸最効若

為他病而在劇者多矣

附骨疽

丹溪曰附骨疽者是骨因久得厚味及勞役與酒後涉水得此陽濕之症也又曰環跳空痛不止生附桂仲牛膝以生甘草為佐作大料煎之入藥十數劑發不動少加麻黃二三劑又不動者恐疽將成桂枝裹急者恐前藥寒濕甚者恐前藥少熱急掘地坑以火煅坑通紅沃以小便令患者赤體坐于坑中以被抱下體使氣蘊蒸勝理開氣血通暢而愈

○一論癰生腿外側或因寒濕得附骨疽於陰陽經分微侵足陽明經髀股

當歸尾　連翹　防風　羌活　獨活　柴胡　黃芩　桔梗　川芎　白芷　大力子　薏苡　甘草各二錢

黃耆湯

右剉一劑水酒各一盞煎至一盞食前温服

○一治附骨疽

黄連酒洗 芫活各五錢 黄芩
歸尾酒洗 生地酒洗 知母
人參 甘草 陳皮
蘇木

右十九味切作一劑水煎服一老人年七十因寒濕地氣得附骨疽于左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分漸六七寸長一小尺堅硬痛不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至骨大痛與此藥一服即止次日腫消

○一論頑瘡惡毒久不愈多有附骨在內先用貝母濃煎湯洗淨刮去腐用蛇蛻脳子五六箇搗爛敷上其骨即出然後用大言五

用力撚去附骨或用蛇蛻脳子五六箇搗爛敷上其骨即出然後用大言五

線系研細用

珍珠象牙膏　楚蕙江傳

珍珠用豆腐一塊切開兩片將珠鋪在內兩片合住縛定入水煮三炷香為
珍珠研細末一禾　象牙末五分官粉末一禾　白蠟一禾　香油五禾

治諸瘡大疼痛不辦膿色漫腫光色紅名曰附骨癰又治瘡口久不合酒調
服燒灰存性研末酒調服一錢七分

露蜂房　蛇蜕　亂髮洗淨各等分

丹溪曰發癰瘡者露房小腹之後在下此陰道遠位僻雖有腫痛發之脉症但見虛弱便與氣運不到血亦容來中年後元虛患此證補血氣可保終吉若無滋補之功其多在結痂之後或半年以來乃病

多致失手悔之悔之

○一論冠太陽經中左右尺脉俱緊拨之無汗

內托羌活湯

羌活 蒼术 洗 各一錢 黄柏酒炒各八分 防風 甘草炙五分 各一錢 歸尾各一錢

桂三分

右剉一劑水酒水同煎空心温服以衣覆蓋息處使藥力行當不可去衣

腸癰 附膿

丹溪曰腸癰常作濕熱積滯入風毒治于金調腸癰雖治必殺人其病小腹重強拨之則痛小便如淋時汗出復惡寒身皮甲錯肚腹緊急如腫之狀脉數者微有膿也第云洪數已有膿脉若遲緊者未有膿成宜轉側有水聲或膿自潰生瘡或膿出或大便

○一論腸癰痛宜初起即消已腫即潰血隨大便中出宜

千金內消一論肚內生癰及癰疽惡瘡
內托散方見癰疽節加減法八活治飲
消疾雪湯
當歸身　白芍
香白芷　貝母
薑甘草　乳香
陳皮　皂角刺　沒藥
金銀花　木香　連翹
天花粉　廢字
穿山甲　
潛水煎服秘方是世所奇授之如
論腸癰腹痛不安或腹滿不食小便赤
癰已潰膿多者加大黃
薏苡仁二兩　牡丹皮
煎一兩水煎　瓜蔞一
方加川芎桃仁
穿山甲炒　白芷
貝母　殭蠶　大黃
水煎服申出節愈後再無患宜小食煎炒熱物

○一治腸癰曰久潰爛出膿屎臭內刺痛不可忍者用鐵打一月長三枚劍將腸一條貫鉗住送到痛處方是瘡癰之處即將腸腸排動針尖出剩破其膿而出用手重按痛處膿出盡而愈此仙傳秘法也

腸癰

丹溪曰腸癰者濕熱下注也有作膿者此污氣順下將流入滲道或虧水道不利而然膿盡自安不藥可也惟社善於周匝又有囘腹腫漸流入囊腫甚而囊首裂開澤九懸掛水出以輔炭末敷之外以膩粉佐之雖膿

○一論癰疽久囊會治數人死由濕熱入肝經虛治而用補陰藥佐之雖膿潰亦腫不消潰後不斂或潰處皮者以香仙調敷囊無

○一 系雅 煩瘧

論煩瘧雖此麻生葛根湯證則破而大小便通者從此出不可治矣

麻生葛根湯

用横紋大甘草二兩截長三寸許取出洞中流水一碗煮性須用三時久水盡爲度候草軟爛去滓分温二碗煮至一碗温服一日一服半日消盡爲度

○一 右 大黄 黄芩 甘草節 白芷

龍膽瀉肝湯

為末酒調空心服○虚弱加當歸一分

論肝經濕熱腫痛或便濇濁或

龍膽草酒拌炒黃　澤瀉一分　車前子
生地黃酒洗　當歸尾酒洗　山梔

右劑水煎空心服

痰疹

痰癇癎癇偏風偏氣痰熱必起於陽明一經不守禁忌延及陽明太陰延及陽明太陰抵食味之厚盖氣之積自風自熱皆此二端拒引發換須分虛實實者易治虛者可慮此甚虛且氣多血少婦人見此其月經如期不作寒熱者易治

積久轉爲潮熱危矣自非斷慾食滋神仙不治也

一論痰癇者經所謂結核是也或有耳前後連及頤頷下連鈌盆皆爲癇癧或在胸前及胸之側下連兩脇皆爲馬刀牛皮核續數連結者爲癇形長如蛤有爲馬刀蟲比癧蟲延胸前頤連腋下者名曰瘰癧左耳根腫核者名曰鼠瘰右耳根腫核

消毒飲 ○二論瘧瘧嘔吐前後或項不舒胸脇聞食即欲作嘔
常歸一錢 白芍六分
連翹一錢 柴胡一錢
升麻七分 桔梗一錢
陳皮八分 生甘草四分
薄荷四分

升陽調經湯 右劉一剖生姜煎服○一方加甘草節知母貝母海藻更佳
升麻八錢 葛根五錢
黃芩酒炒五錢 生黃芩酒炒四錢
三稜酒炒五錢 莪朮酒炒五錢
連翹五錢 桔梗五錢
歸尾三錢 甘草炙五錢

作明日午前一半勿研為末煉蜜為丸如蕊豆大每服五十丸白湯下一半
論久患癭癧流注以致氣血兩虛懷抱抑鬱飲食少思或四肢患腫肉色

抑氣湯 ○ 有如老人幼孩氣虛不能久立或久坐者
蔞炙 八參 白朮去蘆炒各五分當歸酒洗
烏苓炒黃 懷生地酒炒 川芎
柴胡 地骨皮 陳皮 香附
桔梗 甘草各五分
共一劑水煎食遠服○如有痰加橘紅
如午後有熱或頭微眩加黃柏炒○如腹脹水清倍人參畜或當歸
有鬱氣胸膈不利倍香附
員丹○如月經不調加牡丹皮當歸
二論癥瘕兼諸癆證治
氣滯消散 川芎 白朮去蘆炒 烏皮去核
半夏姜炒 陳皮 羌活
桔梗 防風 甘草 烏藥
獨活 厚朴姜炒 水香
香附 檳榔各一
刃蘇子一 刃五

右劉寄奴散 粉草 五禾參

○一論服五十九酒送下

內消調經散 山東李壽西嶺傳

右劉寄奴散為癥癖宜

黃耆桂 葛根

芍藥 龍膽草 黃連

甘草各五分 當歸尾 烏梅各三分

右劉寄奴散為末酒調方寸匕

胡四倫 栝樓

栀子 三稜

柴胡 連翹

柴胡通經湯 桔梗 遠志

○一論在右為馬勞瘡未破宜

黃耆 桔梗

紅花 甘草

右劉一劑水煎熱服 歸尾

栝樓各二分 黃連

右十味水煎服

○一論瘰癧已破者

佛勝壽湯

蟾蜍一条　人參三分　甘草五分當歸
白芍各二分　陳皮三分　升麻　柴胡各五分遠志一条

右剉水煎服

○一治瘰癧腫或痛宜夏秘草水煎頻頻服
草一把水煎不收數服前證悉消
○一治瘰癧已潰元氣無虧用此以去之若瘡已後仍服前湯瘡
元氣怯弱宜先補後服瘡未成者亦宜
消已潰者數須元氣壯者可服

必效散

南硼砂　二条半　輕粉　射香五分
巴豆五个去皮心用

右研極細末取雞子一箇去黃用清調藥仍入殼

既蒸熟取出曝乾為末每服五分用炒牛蒡子酒五更初調服如嘔亦服
益元散一服其毒俱從大便出
治遠年風瘧瘧神方
松香半兩 乳香二錢半 血蝎一錢 銅綠一錢半
右為細末合作一處同乳汁油攪勻搥搗千下成膏用絹片攤
一婦人患瘧癖久而不愈或以為氣旺之症不宜於春預用散腫潰堅湯腫
硬益甚余以為肝經風盛用六味丸補中益氣湯至春而愈此症若用經
若金來尅木須補脾土生腎水若行攻我則脾胃薄弱不生木用六味丸致來尅去矣
一婦人項核腫痛發寒熱自病元氣無虧可服散腫潰堅湯一服去之更以益氣柴湯
三十餘劑補之而消此症初起而血氣虛弱者先用益氣柴湯得其氣
血稍充乃用必效散以去其毒仍用補藥無不奏效若已成膿者即針而補

疔瘡

疔瘡者由四時迭更陰陽二氣不和寒熱交爭癰疽發焉風大露久寒大激者不能避而遁襲於皮膚入於四体傳注經絡遂成疔毒之名有十三種必發於手足間結滿陰陽二氣不得宣通遂成疔毒之名有十三種必發於手足間生黃泡其中或紫色有一帶紅線道直入者用針於線處刺去毒血水針時以知痛出血為妙色則紅線入腹攻心必致危困凡治疔毒先以趁瘡飲飲之吐則是不吐則非也次抵脉洪而數者難愈拙

飛龍奪命丹方見諸瘍

取效凡不慎飲食七情者不治

托之氣血復而核不消者服散堅之劑不應灸附火宜隔一穴用千槌膏線灸宜員愈若氣血壯實不用追蝕亦能自腐用藥攻腐之者便易於收斂耳若血虛而用追蝕不慎無論適以

治疔腫及無名瘡毒拆頭法巳水以慈
一治無名腫毒疔瘡手指無故生蛇頭指腫痛不可忍有紅筋
蜈蚣二條　歸尾二錢　雄黃一錢　土赤芍二錢　白芷二錢
右剉為末頭生酒熁服神効一
一論一切惡毒疔瘡諸般無名腫毒及四肢暗傷風傷寒壇寒壯熱無汗初者
府小靈丹
乳香　沒藥　軽粉　血竭
草烏尖　細辛　巴豆霜　蟾酥
右為細末糯米糊為丸如黃米大雄黃為衣每服十三丸小兒五七丸用葱
白三根搗開入丸在內細嚼好酒送下以被蓋出汗避風婦人有孕不可服
一論一切疔瘡惡毒腫痛神効
蒼朮　朱砂
甘草各五　麝香一分
細辛　皂角刺　川烏　草烏
薄荷　防風

○ 一有揚潤 五夫虛

○ 一有爲細末雞清調塗患處留頂一

不知毋 貝母 皂刺 金銀花 穿山甲炒 生夏 天花粉

皂角刺一劑用無灰酒一大碗煎至半碗去渣作一服溫服不得加減再將渣兩揚爛用蜜調丹劑必用第二服藥也過一宿自然消不

凡患疔瘡癰癤瘡毒此藥能令內消未成膿化爲黑水從小便出萬無一失

乳香名一錢

可乾視

○ 一有名一錢

知毋 貝母 皂刺 金銀花 穿山甲炒 生夏 天花粉

皂角刺一劑用無灰酒一大碗煎至半碗去渣作一服溫服不得加減再將渣兩揚爛用蜜調丹劑必用第二服藥也過一宿自然消不知乾再用蜜水

○ 一有揚潤 五夫虛

八脚面生疔形雖如粟芒時乃知痛更屬虛弱以陽基發利之藥攻之因其虛攻之因其弱必用第二服藥甘緩之藥調其氣宜參歇漸愈

人手陰之下道遠位僻且性弱之人用峻利之劑則藥力未到胃氣先傷虛之禍有所不免不知疔疽之爲害

便書毋

便秘一名血燥血虚或先有痔瘻
疎利之劑卽散或鼽膿
○一論便毒是厥陰
二三行立効射干
追毒散
當歸尾 赤芍 白芷 金銀花
皂麥蟲炒六枚 杰 天花粉各一錢
甘草節一錢 山甲片大黃三錢
右剉一劑好酒煎
○一論便毒方八再
神異散
露一宿五更熱服厚蓋發汗利二三行卽愈甚者
薬煎將就
二沸用之。一方加射干去補

金銀花　天花粉　水艷子各二錢甘草三分連翹
山梔子各七分川山甲炒二錢
右剉一劑酒水煎空心服
○一治便毒腫痛神力徐完愚傳
蠍退　全蝎
貝母
羌蠶
當歸尾各二錢
安山甲杜炒成黑甘稍
右各一帖水煎後加入大黃煎二沸去渣入好生酒同服如未散加蜈
蚣條同煎服
○一治瘡瘍腫痛方
用猪膽一枚投鮮酒一碗溫服即內消
○一治魚口去先三箇巴豆去先二箇燒川山甲炒羌蠶三箇
右爲末黃酒調下
○一治便毒方
陳雲岩傳

下

下痢瘡乃男子玉莖皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸漬發成瘡毒自久不愈或成瘻或損爛陽物多致危篤又婦人陰中先有宿痾因而交接虛鑿鑿遂即成此疾初發在陰俗云痘瘡未已便痘瘡復來生也

婦人陰瘡此蓋因嬉戲之痛或類拂之痛不痛爲異耳

海狗腎散毒瘡方

防風六分　獨活六分　柴胡二錢五分　連翹七分

似海狗腎而小海狗腎出清臙作白乳狀味鹹之大痛婦人有生於玉門內正

○一治下疳瘡

右爲細末摻瘡上

○一治下疳潰

右爲細末摻瘡口

○一薰下疳瘡方

皮硝一錢

乳香

雄黃六分

孩兒茶各五分

○一治下疳瘡

右爲極細末先用

官粉煅五次

天靈蓋煅

○一治下疳痛不可

忍如神

水片二分

水銀三分用錫三分製

○一治下疳瘡

右爲細末摻瘡口

珍珠燒存性片

腦各一分

○一薰下疳瘡方

硝一錢

雄黃六分

孩兒茶各五分

血竭九分

龍膽草九分

甘草二分

十四寸水煎

○一治下疳瘡

蘭賊

○一治下疳瘡

右劑

紅褐

好細茶煎濃洗淨摻之

○一治下疳瘡

右爲細末摻瘡口

小紅棗燒存性各等分

○一薰下疳瘡方

硝一錢

雄黃六分

孩兒茶各五分

血竭

龍膽草

甘草二分

二錢

○右九小歸門外用牛糞火煨熱鋪其
○珠一右治陰頭上疳瘡
何和宋傳
五倍子 燒灰存性一朱砂七分
水片 牛分
輕粉二分五厘
○右共爲細末撒患處
如從一邊爛起加
狗骨燒灰二分○右
方疳瘡秘方
○鼻
乳香
海巴 炮一箇 珍珠
象皮 刀煨
孩兒茶五分
水銀一分
○右爲細末先用米泔水洗瘡拭乾摻
上神效
紅褐子灰
龍骨煨各五分

水片二分　珍珠末二分　研勻

蘆薈　輕粉　麝香油調搽

右共研細末搽患處如有殼香油調搽

○一治瘡癤未搽瘡上

黃柏以豬胆塗上炙炙

天靈蓋火煅存性為末二分

○一治瘡癤未搽瘡上

黃柏煎水洗却用膩粉末敷之

○一治陰證瘡癤生瘡

用甘草煎水洗却用膩粉末敷之

○一治陰證瘡癤生瘡

用淡菜中螺螄入乾鍋內煅過先以溫水洗五七次後取此末敷之

○一治妬精瘡

用大田螺兩箇和殼煅過存性為末輕粉敷之

○一治熱瘡生瘡

用菜豆粉一分蚯蚓屎三分水研塗干又敷

○一治瘡癤

日曬風發瘡痂

用紅椒去自水浸牛日和生杏仁研爛擦兩手掌捺外腎極効

治下部生瘡濕瘡熱瘡西瘡遍異赤小便淋漓食亦減身面微腫

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻敷上

治下疳瘡

白礬一兩　黃丹八分　乳香研爲細末以溝渠中惡水洗過拭乾敷上

治蝕陰蝕神方

鍾乳石二分　朱砂三分　珍珠三分　琥珀一分五厘

片腦正一分五

神分厘右件爲細末每用半茶匙兩猪蹄二兩煎水三碗早間服一碗調前藥末四厘晚間服一碗調藥末四厘一日服三次二日服盡其瘡必愈其猪蹄隨用煮熟之忘動風發物生冷肉燒酒最忌之

楊梅瘡

大麻癮者一名楊梅癮者因形相似乃氣血受之其形偏增而潰又名鬼子瘡亦類其發作呼之也北又曰天泡瘡皆一名異而實同源始瘡當別自致者重傳染者也俗傳以初陰處起火及縱酒啖雞鯉毒物發出謂毒盡殊不知在火上添油矣又有帕露出而求速効者過服敗毒散則傷五內胃氣盡益腫延潰不能杜絕手足心皮枯徹骨疼痛風塊瘡遇此患非真解毒湯仍用千里光煎明湯頻頻洗落白揭掌風反後筋攣致便出不得出大効

裏解毒湯

當歸一錢　黃芩五分川芎一錢　赤芍一錢
黃芩一錢　蒲黃一錢　連翹一錢
羌活一錢　防風一錢　生甘草三分　生地黃一錢
薑三片　蘆根一錢　荊芥穗七分　酒炒
生甘草三分　甘菊花一錢　防己一錢
水煎四兩溫服者四兩

白芷 千金 頭風 川芎 細辛 水煎一碗煎一碗濕服
防風 蒼朮 碗滓再煎服○虛弱人加人參一錢
羌活 黃連 水煮一錢半睡一錢半衝服帖帖煎三次
蔓荊子 黃芩 服帖
甘草炙五錢 薄荷 光明湯
升麻 麻黃 青水香 黃連
柴胡 黃柏 荊芥 蒼朮
蒼耳子 蛇牀子 甘草炙
甘草炙五錢 薄荷 腸鳴倍
麻黃 黃芩 凍青葙
防風 羌活 子倍
蔓荊子 黃連 水煎一碗煎一碗濕服○虛弱人加人參一錢
川芎 細辛 碗滓再煎服○虛弱人加人參一錢
蒼朮 白芷 帖帖煎三次一服帖
青水香 黃連 荊芥 蒼朮
蛇牀子 甘草炙 蒼耳子
薄荷 腸鳴倍 甘草炙五錢
麻黃 凍青葙 升麻
防風 羌活 麻黃
蔓荊子 黃連 黃柏
川芎 細辛 黃芩
蒼朮 白芷 千金
青水香 黃連 頭風
荊芥 蒼朮 川芎
蛇牀子 甘草炙 細辛
薄荷 腸鳴倍 白芷
麻黃 凍青葙 丁香
防風 羌活 乳香
蔓荊子 黃連 槐角各一錢煎水調散十餘劑後服此收功永無後患
川芎 細辛 當歸
蒼朮 白芷 慈八分

○右爲細末飯爲丸如梧桐子大每服三十九生姜
湯送下

○右治楊梅瘡先服防風通聖散加漿草一兩同煎服後服此

白蘚皮二分　皂角子仁十一箇　防風二分
川烏二分　蔓烏二分　薏苡根面分

○右到千劑每一劑用土茯苓一斤猪肉半兩同煎服

治傷梅瘡　黄芩傳

連翹四分　金銀花四分　牙皂二分
蝴退三十一个　肥珠子仁十一冷飯團一片

○右到用酒拌炒作十帖水煎服

治楊梅瘡毒　黄柳洗傳

青藤二分　當歸尾二分　皂角刺二分　金銀花一分
五加皮一分　白蘚皮二分

○右到劑作十二劑每劑用土茯苓四兩水煎服先服二劑通服

治楊梅瘡　南塘徒驗

漢防己七錢　槐花二兩　五倍子四兩

右三味㕮咀分四服用酒煮艱難渣

○一治楊梅瘡良方　胡黃連一兩　研爛猪肉半斤

刃三錢　黃芩一刃三錢　大黃一刃三錢　木瓜一刃

歸尾一刃三錢　牛膝一刃八錢　蟬退五錢　土茯苓二斤

金銀花二刃三錢　皂角刺　廉皂果皂角子各十枚

右剉細作十帖每帖用紅棗水煎臨臥服息

○一治楊梅瘡神方

蓼豆

用鐵秀紅釅醋磨濃搽瘡致成一切難狀之疾或楊梅瘡爛見骨經年不收口者或筋骨疼痛不消或遍身起皮發癢如蟲行或赤癜白癜手足皸破出血或當及年久腑瘡不愈一切風癬皆神效

○一論凡人患楊梅天泡瘡發無時或遍身疙瘩致成一切難狀之疾或楊梅瘡爛見骨經

○ 再不用 右 燥 ○ 羅麗膏

一治楊梅風塊作腫作痛及瘡瘍癰毒一切無名腫毒

草烏四刃 南星三刃 半夏二刃

大黃一刃 黃柏一刃 姜黃一刃

乾生薑五刃 同煮五兩 炒熟

五倍子三兩 共研細末 醋調成膏貼患處 消腐度

牛油 香油 桕油

楊梅瘡愈後遺癬毒一層頑皮痒不可當

黃蜴格一只 搗化傅患 虫丹

逼仙

去疥癬因風癬癬與癬因藉客於皮膚之所致風毒濕淺者爲疥癬也毒之深況者爲癬也多癬毛散而藏汁而外藏有從手足或至遍身癬則肌肉瘡疹或圓或斜或如芒均有蟲者治去風殺蟲是也

右銀硃一禾五分官粉二分銭射香五分

一方治楊梅瘡不論遠近先將火烤癬令痒極破擦上藥再烤再擦如此九次服防風通聖散十數劑後服此丸效神

一方治楊梅瘡不論遠近先服防風通聖散十數劑後服此丸效神

輕粉一禾　孩兒茶一禾　糯米飯一禾　芝麻一禾

右為末入內擅勻先將火烤癬令痒極破擦上藥再烤再擦如此九次服防風通聖散十數劑後服此丸效神

治楊梅瘡不論遠近先服防風通聖散十數劑後服此丸效神

孩兒茶不計多少忘最鹽要鮮戒

雄黃二禾五分真輕粉一禾杏仁去皮尖二十个

研為細末入杏仁再研如泥用雞豬胆汁調搽瘡要先洗淨乾搽三日效

○一論風濕骨痛麻痺不仁或腫痛或癱瘓或半身不遂或口眼歪斜或語言蹇澁或小便不通或大便秘結或風熱瘙痒或風敗壞疽或瘡瘍腫毒或癰疽發背或乳癌或瘰癧或疥癬或白癜風赤遊風血風脾疳丹癮及破傷風在上部者加桔梗一錢在下部者加木瓜牛膝各一錢如瀉氣盛憎而在下去蟬退減

防風敗毒散

枳實 赤芍 柴胡各五分 荊芥

薄荷 牛蒡子 前胡 蒼朮各六分 羌蚕

川芎 獨活 甘草各一錢 生薑三片水煎服

連翹飲 名七分 蟬退 羌活 胳八

○一蒺藜卻掃 木鼈子一个 雄黃一釐 甘草一錢 生薑三片水煎服

右剉一劑分作二次熱服

○一蒺藜卻掃 木鼈子一个 雄黃一釐 甘草一錢 生薑三片水煎服

右五味為末以紙捲條陰陽乾盛磁罐兩端塞腐蝕處被蓋之臥定在外先以布

包裹一便

○一蒺藜卻掃 雄黃

花椒

右三味共為末將紙捲筒放被內蓋之

薪炙

洗疥如神

吩風 荊芥 馬鞭草
白蘞 花椒 苦參 野菊花
治疥如神 徐金坡傳
大楓子二十五个 水銀渣二钱 樟腦二钱 五分
右用油核桃同搗爛絹帛包擦疥上

蕈疥妙方

油核桃去殼一半留一半搗入言未入厘攪勻仍燒給
治諸瘡疥願一帰光又名五綵球
大楓不內四十九个 杏仁 砲去皮尖 各二味同研九子如四
水銀三钱 茶葉兌研末一钱 樟腦二钱 三味同研丸
右和勻再研聽用先以槐柳桃楮桑五木枝煎湯洗疥拭乾擦
藥擦上一日擦三次忌羊雞魚猪頭等毒物

香油四兩用花椒三兩熬黑焦黑研爛入大楓子去殼輕粉一錢攪入言三分爲末入油內搽之

黃一錢入

去骨

白礬枯

川椒去目炒研

大楓子

右共和勻用柏油入錢俱入研

癢搔痒將藥丸子患處擦過

○治濕身風痒生瘡疥

桂疾藜蘆煎酒洗之

○治老

藜蘆根為末脂油調搽即愈

○鼻聞香痒瘡後山茶懷

大楓子去殼研極

水銀一錢研

雄黃

杏仁四十个去皮同研

輕粉

水銀

檳榔一个研末

水銀二錢研毛不見水

金錢星為度後入

核桃仁十个

癬疹

風癬膿瘡疥癩瘙癢腫毒

歸尾一兩五分　赤芍　黃芩　黃連　黃柏各一兩　大黃各三兩　防風八分　金銀花　苦參各二兩　水龜子去壳一个　治一切癬瘡瘙癢其者更服四物湯臟毒下血去水龜子加槐花一兩

胡粉另研　雄黃另研　硫黃另研各一兩五分　大蕳烏一个生用　金蠍稍三兩　蛇蛻五分　天南星　蕳烏各一个生用

治乾癬不癢

斑猫一兩

右為細末先用羊蹄根醋擦動次用藥末許擦患處

露宵三兩生用

右到一劑水煎露一宿五更服之若參苓加槐花一兩

右為末用羊心內以竹筒盛之在內用紙蓋口勿令泄氣用時擦手心內即已或搽亦可

右爲末用羊蹄根搗
○一治遍身頑癬
大楓子四十九个川楝皮二兩五个去
核研如泥入輕粉二錢研勻
右共爲末以河水井水各一碗浸一夜
取汁擦之
○一治癩癩傳
大楓子仁二錢研如泥入輕粉二錢研勻
右爲末用馬蜂窩一个仰放瓷瓶上酌
醋調塗
○一切疥癩瘡及諸瘡不
脚醋調塗瘡上即愈
○一治癩癩及諸瘡不
腹腥草搗爛敷患處
右爲末紙捲燒烟薰患處立効
○一治疥癬神効
大楓子去殼四十九个
枯礬二錢
輕粉二錢
右爲末臘猪油搗白先將椒湯洗令
乾方擦患處大
川椒一錢
朝腦一錢

一治牛皮癬極痒抓爛斗脚瓜燒灰存性爲末香油調搽 立効

一治癬癢用鋼針磨令極尖當痒時於癬上各刺百針出血漸漸刺再洗

禿瘡

白禿髮甚洗去痂刮淨其痂頭皮瘡孔即動頭大衷有膿汁出來痛而有微孔是蚘蟲動作而成此瘡乃至百小及長大不療頭

一治禿瘡方

藜蘆三釆 枯礬二釆

藜蘆三釆 香油調搽

○一治禿瘡方　臨瀕楊子登傳

右用鯽魚以香油煎熟去魚將油調仙人垢塗上一錢厚一二次愈

仙人垢即埤墓过人棺板底上垢膩也研爛不拘多少

○一治禿瘡

先用水洗令淨用燒酒和苏末調塗患處立已

○一治禿瘡三矛乳香二矛沒藥二矛黠草五矛食鹽三矛水桕油一矛

右同黠草煎熟久下前三味末研細入桕油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨拭乾用藥三矛石乳二矛和勻用二淮臨炒一

○一治禿瘡

雲松弟驗

右為細末桕油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨拭乾用藥一次神效

○一治小兒白禿瘡

黃桕皮五矛枯礬一矛五分研細末

右為細末桕油調勻先將頭髮剃淨再洗令淨拭乾用藥一次神效

輕粉各一矛

治疙瘩頭瘡

甲鯽魚一箇重三四兩去腸肚以鹽髮瑣滿紙黑燒存性
未清油調敷先以苦練皮燒猪頭灰洗拭後用藥

又方

瘋風

瘋風白癜風乃因心火汗出乃酒醉入浴後毛竅開時乘風
而立致皮膚麻散或追風丸外以洗擦藥治之
論紫白癜風并癬及面上酒渣多名粉瘡面刺很可服之

胡麻散

胡麻子赤色扁者另研五分
白芷二分 何首烏二分 防風二兩 蔓
甘菊花二分 升麻二分 蟬蛻仙二分 苦參酒炒二分 川
小川芎二分 牛蒡子德炒二分 白蒺藜炒去刺二分 川
薄荷葉二分 片黃芩酒炒二分 白芍酒炒二分 連

右為細末每服三錢食遠服秋分後至春分後調服

調服用米糊湯

○一治白癜風

白蒺藜

迫風丸

何首烏四刃　荊芥穗四刃

右為細末好肥皂三斤去皮弦子入砂鍋內水熬成膏丸如梧子大每服五六十丸空心溫酒或豕任下

○一治白癜風

用雄雞腎肉煮熟搗爛擦患處

○一治汗斑方

白蓮花　半夏

右各等分為末飛麪糊為丸如彈子大用大麥燒灰

○一治紫癜風白癜風

皂角如今汗取生之類

密陀僧

白各等分為細末用猪皮生薑白礬
一治紫白癜風神方
雄黃二禾硫黃二禾白礬二禾並用透明者件
右共為末每用時先以湯淋洗
次以搗生姜拌藥布包患處擦之良
久以熱湯通身出一浴八ヤ通身出汗次以搗生姜拌藥布包患處擦之良
三治白癜風方
蔓荊子生搗爲末作湯服之每服二錢

癜風

夫癜風者天地殺物之風燥金之氣也故令皮膚枯而不潤燥金之体濕而不膿燥而不濕金之体濕而不膿故一客于人則榮衛之行澁令人不仁而麻木也毛落眉脫者燥風伐其榮衛之虛不可誣也甚者上氣攻下血得燥而變諸痛癢瘡瘍虛癆皆燥也白花蛇血氣之屬也用血氣之屬以驅風豈不油然從而潤乎然其性中可毒同氣相求承連

癘風毒舍之處豈不居然而効乎白宅角之性善於潔身則亦可以去風昔八吞以防風通聖散此方乃去熱則亦可之性善於去風昔八吞以防風通聖散此方乃去風通聖散此方乃非茱萸湯所宜今以王屏風散更之則黃芪可以用膽補氣湯茱萸湯所宜今以王屏風散更之則黃芪可以用膽補氣湯曰水可以實肺而補肌矣

補氣湯茱萸湯曰水可以實肺而補肌矣

黃芪三分人參二分當歸三分生地黃四分黃連三分黃芩四分

升麻六分桔梗五分甘草一兩五分

連翹六分全蠍三分烏蠍去尾一枚炒

桃仁二箇蘇木三分麝香也許一粒細研

右剉一劑水前煎服

右剉一劑水前煎服

○一論治癘風手足麻木毛落倡脫遍身癩瘙痒成瘡毒症

愈風換肌門

白花蛇一條頭尾全者酒浸炙去皮骨五兩去皮欵酒浸炙

蒼耳四兩

右為末以好酒調下二三日去骨除風取出以杵熬

皂角湯和丸桐子大每服七十丸以防風通聖散送下

用苦蔘末一斤防風
參丸 苦蔘 羌活 獨活
金銀花 連翹 黃芩 梔子
石爲末煉蜜丸如梧子大每服五十丸白湯下
如聖散 治癎癲風 天麻 羌活 獨活 防風
全蠍 蟬退 蠶蛹 僵蠶 細辛 白芷 川芎 薄荷
制芥 人參 白朮 枳殼 桔梗 黃芩 甘草 當歸 滑石
白芍 大棗 生薑
黃柏 大黃 芒硝 麻黃 石膏
大瘋引子 皂角刺 蠻金 山梔子 連翹 獨活
白三十味爲細末用紅氷糊爲丸如梧子大每服五七十丸
日三服半身全愈小便如淋水瀝色此病之漿者只用此
蔘一料如胃毛

口

口

口

鬚髮全愈

一遍

春分秋分服防風通聖散一

晒空心服利三四次以粥補之

方見中風

治癮風眉髮脫落者

取皂角刺九蒸九晒為末每

服一錢溫酒送下久服眉髮再生凡虛悶

服目倍明

治大風惡疾雙目昏暗眉髮

皂角刺三斤炭火蒸炙晒乾

為末煉蜜丸梧子大每服

百丸煎湯洗春夏石膏滑石依方秋冬二味減半

連布袋浸之良久取起晒乾再用乾草煎湯浸晒乾又用童便浸晒乾又用姜蔥煎湯投藥入內不必取起就放鍋內煮乾就

焙乾為末每服二錢嚼酥三丸共為末虛人

治大麻風即大風瘡

用八蛆一升細布袋盛之放在急水內流之乾淨取起以麻黃莖炒將焦

明諸病丸瘡

治大麻風即大風瘡

皂角刺三斤炭火蒸炙晒乾為末煉蜜丸梧子大每服百丸煎湯洗春夏石膏滑石依方秋冬二味減半

自落鼻窠崩倒肌膚瘡爛此方特効

間髮生肌潤口

腫

瘡

大膿瘡者皆由腎臟虛風邪毒氣外攻三里之旁濯於陰交之側風熱毒氣流注而成肌生瘡腫爛痠痛臭穢難近病生于膚骨為重以其當乙肉少薄故也

虫蝕後敷藥須翹足端坐勿多行履庶可瘥

一治腫瘍腿生瘡或癬疥等瘡

四生散

白附子 南星 半夏 川烏 右各等分為末每服三錢用猪腰子批開入藥濕紙裹包煨熟細嚼薑酒下

二論腫瘍乃濕毒所致及治遍體瘡

黃芩散 赤活 沙苑蒺藜

一治瘡癤遠年近日一切膿瘡潰爛不斂生肌如神

黃柏去皮一兩輕粉三錢為細末、

青二錢　松香三錢

乳香青二錢

右為細末先用豬胆汁調塗瘡則乾撈

貼患處藥居中上用完竹包綜子魯葉薄着患密針刺孔將藥攤其上用芳葉

松香末入葱根鬚葉共分同搗為餅外用石乳香為末少撈藥餅

一日一換鹽湯洗淨仍前貼之効

一方用上揩在瘡口布帛數扎二日一

一治臁瘡濕癢頑瘡遍瘡徧瘡

右為末將油紙剌孔桐油掃紙上摻藥在油上隔紙貼之効

一治臁瘡濕癢頑瘡遍瘡徧瘡

密陀僧二兩黃蠟三兩乳香油三兩

桕油二兩黃蠟二兩白蠟

右將前四味入粗碗內火上煎化須臾入

血竭二錢　銅青八分

上摻藥在油上隔紙貼之効

密陀僧二兩玉粉為末

油紙刺孔上藥油紙反摺以孔在下貼瘡
口一治雨足生臁瘡諸瘡久不已後山李懷厳傳
右用猪枝油向揚爛開油紙上貼瘡外帛包縣一日換一次先用鹽茶水洗
口一治臁瘡爛脚方 宮粉二錢
先用米泔水洗淨用黄丹不拘多少乳香減
調搽碗裏以艾燒烟薰至黄色上用隔紙當即之妙也

諸瘡

口一專治疔瘡發背腦疽對口癰附骨疽一切無頭腫毒惡瘡服之便有頭緊
瘡者服之立愈此乃惡瘡藥中至寶痛已成者立効復甦重
飛龍奪命丹 雄黄三錢乳香二錢沒藥二錢銅綠二錢
硃砂二錢輕粉五分血蝎

胆禁一味 寒水石 紅藍 各五錢 蜗牛二十个 去殼
右為細末先將蜗牛連殼搗爛和前藥為丸如
梧桐子大每服二丸汗由即效三五日病重者再進
二丸即愈如病人不能嚼葱
捕爛亦可瘡在下食後服猪
肉湯送下以汗盡為度為末麪糊為丸
如梧子大每服五十丸白湯
送下以大便
通利為効

一條頭痛侵
眶骨痛不
可忍先將蜗牛二十个去
殼豆大灯九二
不就入酒打而
病人口噤爛吐
風處以衣蓋護之勿行人五
病动覺二丸
即消如汗不出
二丸即愈如
捕爛亦瘡无黄過
內濕瘥一切
動發風證
皆治

一人寒水石紅藍各五錢蜗牛二十个

切無名腫毒疔瘡瘡疽乳硬非瘡初發時即用
真香油一柘溫熱飲之則毒不攻心可以緩
切無名腫毒瘡　須臾腫起痛難當　即將　妙藥頻敷
兒使得行作禍殃
治無名腫毒發背癰疔瘡等毒
白礬不拘多少爲末入
貼之更貼十數次立消
方用蕊頭竹爛炒熟熨患處冷則易之
方用五倍子炒爲末醋調塗患處
方用大黃爲末醋調塗患處
方以端午日取白礬研
切無名腫毒初起
牙皂七个燒存性爲末入
敷諸瘡腫未破者
與世同功

切無名腫毒疔瘡瘡疽乳硬非瘡初發時即用
真香油一柘溫熱飲之則毒不攻心可以緩
切無名腫毒瘡　須臾腫起痛難當　即將　妙藥頻敷
兒使得行作禍殃
治無名腫毒發背癰疔瘡等毒
白礬不拘多少爲末入
貼之更貼十數次立消
方用蕊頭竹爛炒熟熨患處冷則易之
方用五倍子炒爲末醋調塗患處
方用大黃爲末醋調塗患處
方以端午日取白礬研
切無名腫毒初起
牙皂七个燒存性爲末入
敷諸瘡腫未破者
與世同功

每服三錢加葱頭切
方以端午日取白礬研
切無名腫毒初起
牙皂七个燒存性爲末入
敷諸瘡腫未破者
攬勻用生酒調服

每服三錢加葱頭切
方以端午日取白礬研
切無名腫毒初起
牙皂七个燒存性爲末入
敷諸瘡腫未破者
攬勻用生酒調服

一治諸瘡惡瘡腫瘡疔瘡搭手背瘡瘡

蝦蟇一个先以石灰炒過後將蝦蟇剉爛同研細泥用綿裹

右三味為細末貼瘡節効

一外治腫毒初起未破

猪苦膽一个取汁醋一盞

和一處以好京墨磨濃抹腫處立消

一治外科諸毒腫痛初起未破

用連翹愈數根用稻程燒過半熟搗爛入蜜三匙再搗勻成餅并敷患處

一治無名腫毒

消內服白礬鉛化為末九朱砂為衣每服二錢用葱酒送下汗出立已

一切無名腫毒

樹上馬蜂窠二枚燒灰研細酒調服

用家園生地搗爛搽瘡敷之立已

疥鬼茶各八錢雞胵皮一錢

右為末研和破一錢攪香三根共鋪紙上捲作筒紙燃頭入鼻吸煙出口中
着照患處如腫盛加艾少許
一治諸般惡毒腫痛不可忍者　鷹扇膝
一枝箭　知母　牙皂　乳香　沒藥　天花粉　右到一劑酒二鍾煎一鍾
白及　貝母　瓜蔞仁　金銀花　生甘草　穿山甲　酌多矣
温服汗出即愈未成膿加火礬頭三次即消膿水拔出而消散矣
一切瘡毒腫痛成膿未成膿
右為末二兩　黃蠟二兩
右為細末退腫又能止痛出膿後成膿如熱盛用三分羔汁
性熱能引血潮敗血破而後成膿或用三分羔汁
用雞清調敷取其難乾如熱湯燒瘡亦同也
一切腫毒瘡痛赤腫不退者

南星　草烏　白芨　白斂
○一治血風瘡并瀝青癮疹發無
追風解毒湯　白芷　防風　荊芥　黃柏　烏梢蛇
連翹　獨活　全蝎　羌蠶　蒼朮　雞清調敷
黃芩　黃精　甘草　赤芍　甘草　許者
薺蒿　金銀花　天花粉
威靈仙　歸尾
右劑各等分水煎服
一治血風瘡癢痛發熱并症
大楓子去木油一兩　輕粉
或瘍藥發作
右共研爛為丸如彈子大放手掌忌揉擦其
○一治軟疳腫痛不可忽者
徐完初試驗
核桃肉十个
痛自已連擦四五次以愈為度

巴豆用霜紙裹壓去油研細
○一治坐板瘡　珀四九兒傳
花椒炒一禾　胡椒七分　枯礬
○一治坐板瘡痛痒經年弗愈
八言示分　密陀僧三分　硫黃三
分　研細油調搽
右為末猪油調搽患處　中州傳聞
○一諸瘡口收斂後又發作
馬齒莧搗爛取汁周圍立止
○一諸般瘡毒方不瘥或痛
雄黃　生白礬
右各等分煎水洗之效
○一治濕攙瘡方
黃蜡一禾　白礬一禾
銅綠一禾　黃丹一禾　童友髮一

右用香油二兩入銅勺內炙熱將紙
撚入藥同煎將紙

○一治凍瘡用茄子根濃煎湯洗井山雀腦髓塗之

○一諸處頭瘡久不斂先痒後瘡
用雄黃一枚槐爛蟲蟻各壹分清油減
如泡脚手凍瘡用楸槐燒存性為末入輕
粉油調塗上

○一治頭上風瘡膿痛臭爛
用包銀硃粗紙燒烟熏髮蟲即死而愈

○一治蛇頭指
用雞子開一竅將指入內待蛋化水又換
用蛇頭指痛不可忍良久開
一條痛乾為末調塗

○一手足患瘡石灰搗爛敷上立已
用菊加石灰搗爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍良久開
用蛇頭指痛不可忍良久開
一條痛乾為末調塗

○一治凍瘡用茄子根濃煎湯洗井山雀腦髓塗之

○一諸處頭瘡久不斂先痒後瘡
用雄黃一枚槐爛蟲蟻各壹分清油減
如泡脚手凍瘡用楸槐燒存性為末入輕
粉油調塗上

○一治頭上風瘡膿痛臭爛
用包銀硃粗紙燒烟熏髮蟲即死而愈

○一治蛇頭指
用雞子開一竅將指入內待蛋化水又換

○一手足患瘡石灰搗爛敷上立已
用菊加石灰搗爛敷上立已

○一蛇頭指痛不可忍良久開
用蛇頭指痛不可忍良久開

又指無名腫毒遍不可忍

白芨末一錢　蟾酥三分

共和爲一處用雞清調塗當時腫消痛止

治血風瘡

雪膏　硫黃

百草霜

治肥瘡黑泉瘡

紅豌豆末　枯礬　黃丹　官粉

香油調搽

爲細末凉漿調搽之乾則易治脚上諸般瘡毒用此藥方

黃丹五錢　細茶三錢

腦三厘　真冰油

石乳香五分研　乾胭脂三厘

水銀一錢　沒藥五分研

輕粉一錢　黃蠟五錢

乳香研極細冰筵過用黃蠟麻油同煎用文武火慢熬紙薄抹隨瘡大小爲度不宜太潤二字

松香豬一錢　銀硃三分

換骨脫用後第煎水洗淨瘡口方服

大黃　苦參　金銀花　艾葉
右各等分前湯洗瘡口
一名年頑瘡瘍久愈者并諸瘡不收口者
黃蜡一兩　輕粉　乳香　蜈蚣一条
血蝎　孩兒茶各
右爲細末先將頭麻油半斤熬熱滴水成珠下黃蠟化開再入黃丹就起
丸如梧子大每服二三十丸　胡粉二分　珊砂　沒藥各二条
二袖花瘡及似花之狀用
貝母各三分　黃柏　蒼朮　防風
右爲細末先用瀘漿水洗淨後
胭脂　輕粉　沒藥各二分
二月蝕瘡蟲咬小耳內
黃丹煅　黃連　輕粉
胡粉炒　微黃枯白礬

一治歇癤方

用牛膠將滾水泡軟中留一孔出氣貼患處久之自落永不生瘡妙不可言

一治脚前脛上生瘡腫痛頑毒潰爛久不已

用鵝掌黃皮燒存性爲末敷之如水出用飛黃丹入花蕊石粉摻之

一脚生雞眼作痛者以掃雞湯劇洗效

一脚指縫白爛者

用鵝掌黃皮燒存性爲末敷之如水出用飛黃丹入花蕊石粉摻之

一治脚前脛上生瘡腫痛頑毒潰爛久不已

枯礬三錢　密陀僧三錢　龍骨煅二錢　黃丹水飛三錢

右用油紙將布針刺孔桐油調摻上貼患處

一治歇癤方

用牛膠將滾水泡軟中留一孔出氣貼患處久之自落永不生瘡妙不可言

一治瘡癤風痒熱毒若楚難禁宜製此爲服之

八累年遍身生瘡

當歸酒洗二兩　白芍乳汁炒二兩　懷牛地黃酒洗二兩

防風去芦二兩　川芎酒蒸一兩　熟地黃酒蒸一兩　荊芥炒一兩　稻蘆不炒一生名童便

氣鬲肚疼一
右
一服
知母去毛二錢 陳皮 半夏 白朮 茯苓各一錢 甘草五分
水煎食遠服

治一切風寒濕氣手足拘攣膏藥
治痰火者爛搗和藥末爲丸如梧子大每
服五十丸酒送下忌雞鴨魚牛羊肉
治瘧痁火不愈
當歸二兩五錢 白芍二兩 川芎一兩 厚朴五錢 官桂七分
白茯苓二兩 白朮三錢
陳皮一兩 炙甘草一錢

治一切風寒濕氣手足拘攣膏藥節酸疼男子痞積婦人血瘕及腰脇諸般
疼痛結核瘰癧歷頑癬積年不愈腫毒初發楊梅腫塊未破者俱貼患處
氣鬲肚腹疼痛瘟瘴疾似瘧貼臍上痢白頗效吃欵嗝噦受氣惡心胸膈眼
黃尤效吃欵嗝噦受氣惡心胸膈眼黑面色蠟黃心疼氣痛傷力閃身痛者貼後心腰眼腰服痛小腸
疝氣痛貼臍下治細不

神農

水香　川芎　細辛
桑乳　歸尾　生夏
羌活　藁本　秀朮
貝母　赤芍　半朕
續斷　威靈仙　連翹
茅葉　連翹　肉桂
丁皮　霍香　丁香
玄參　白蘞皮　烏藥
山楂子　牙皂　桃仁
骨碎補　蒼耳頭　蟾甲
蔴黃　白芨各一兩　五倍子
穿山甲　五加皮　大楓子
蝦蚣甘一條　蟾甲　茅朮
蜂房　全蝎　兩頭尖
蜈蚣甘一條　蟾甲　白芷
右用桃柳榆槐桑練槍七色樹枝各三七
斤浸藥置三宿春五秋冬十宿後煎
二十二寸俱切粗片用麻油十
兩大黃
枯油要煮度用麻布濾去渣貯

神秘效驗萬金膏

一治磁器內外以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每香二兩用藥酒四兩
拭乾器內另以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每香二兩用藥酒四兩
哮吼咳嗽貼背心瘟痢貼肚臍治風寒濕氣所侵跌撲損傷損一切紅腫疼痛貼
乳哮吼咳嗽貼背心瘟痢貼肚臍治風寒濕氣所侵跌撲損傷損一切紅腫疼痛
腸上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒疔瘡癤癰皆貼患處心腹疼痛
腸上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切無名腫毒疔瘡癤癰皆貼患處心腹疼痛
即消已成亦能潰膿長肉止痛甚
即消已成亦能潰膿長肉止痛甚
萬金膏

鳥鬚　川芎
白蘞　連翹
大黃各六錢當歸　赤芍
白蘞　烏藥
白及　木鱉子各四錢

右加蒼耳草一把柳桃葉各一把皂角條五
錢入槐柳桃葉煎各四錢
右加蒼耳草一把柳桃葉各一把皂角條五
錢入槐柳桃葉煎各四錢

香油再入鍋內以炙武火熬至藥黃色以生絹濾去渣不用
香油再入鍋內以炙武火熬至藥黃色以生絹濾去渣不用
度半宿用文熬至滴水成珠不散方下飛過丹十二兩要妙
度半宿用文熬至滴水成珠不散方下飛過丹十二兩要妙
入加酥合香二兩沒藥末各四錢攪勻聽用
入加酥合香二兩沒藥末各四錢攪勻聽用
萬應紫金膏

○治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰白其毒始盡生肌最速但
死而用之自潰新肉易生潰不破內肉糜爛其外皮因內煩乾縮堅硬不潰脈症致臚脹無從而泄內愈脹痛難以遽不救若杖瘡內有瘀血者即用有鋒芒磁片於患處砭去瘀血亦淺生肌之際亦不結痂又免攻撬之痛疼着外力風症每致死肉自潰膿穢自出所潰亦淺生肌之際亦不結痂又免攻撬之痛疼着外力風症每致

當歸 生地黃 麻油六兩

右先將當歸地黃入油熬黑去渣入蠟熔化候冷攪勻即成膏凡新內相宜白蠟尤妙

神效萬靈膏 玉臺山無窮禪師秘藏方

當歸 川芎
防風 羌活
赤芍 獨活
生地黃 熟地黃
連翹 山梔

黃連 九黃
五倍子 兩頭尖
白蘞 八十个 赤小豆 四十个
烏梅子 四十个 杏仁 四十个 去皮尖
紅芽大戟 山慈菇 天花粉 皂角 去皮弦 桔梗 玄參 苦參 皂莢 官桂各六錢

右剉散用真麻油二斤四兩熬髮餘四兩入薤白鍋內文武火熬如棚柳枝長寸許各三十根同熬焦色用麻布濾去渣再放油鍋內放滴水成珠不散頭出瓶去熬至二兩桐油三兩松香二兩黃蠟二兩桐油三兩內秤準油二斤下乳香沒藥各三錢射香五分或一錢輕粉三錢研細末藥投下早了恐浪藥氣再熬不粘手為度將膏名治虛腫法于後

○一瘡瘡腫毒疔瘡發背治虛腫法于後 每服一丸 一日貼將火焙雙手一上一下摩貼十七高藥便罷不用手摩貼有膿血之瘡貼盡有膿血之瘡貼盡

疥瘡瘙癢貼上不用手摩

風癎及虛先用木鼈子火煨熱搗爛放腫上貼之

咽喉喘嗽貼喜盲焙手摩百次

無名腫毒貼患處癒初起焙手摩出汗諸毒發陰陽男子貼丹田婦人貼

血海癒手摩百次

打破損刀傷貼患處如虛腫貼腫處焙手摩百次

熱嗽冷嗽傷刀貼肺俞焙手摩百次

風瘀痰壅塞貼心坎痛處焙手摩百次

男婦諸瘡塊用麪作圈放瘡上用皮硝一兩鴿糞五錢大蒜二顆搗爛放圈內以熨斗火剋熨上要透熱煨木鼈子肉放

婦人偏正頭風俱貼太陽穴焙手摩百次

高內小兒瘡塊不用硝熨焙手摩百次

男婦遺精女人白帶煨木鼈子肉焙手摩百次

男子虛貼丹田女貼血海焙手摩百次

○一左臁若痲濕氣疼痛貼鼻、嚏爐木鼈子肉焙手摩百次

○一暗風貼肺俞穴并心俞下三寸焙手摩百次

○一月經不調貼血海焙手摩百次

○一醉後嘔吐貼肺俞心俞下三寸焙手摩百次

○一冷氣沖心痛吐腹疼貼脊心焙手摩百次

○一目時傷寒貼脊心焙手摩百次

已上諸般疼痛依病大小貼焙手摩百次

杖瘡

○一杖打破腫腿腫痛

金鳳花科一根搗爛敷患處即愈

○一杖瘡久不愈者

雄猪胥髓日夜搽破腫處立已

○一杖打破血侵痛

右以三錢入水撈澄再入香油五錢用金鐶脚攪打成膏以雞羽掃上使
血水長流須臾腫消痛止

右以末杖之先
用烏蠟細切入碗內滾酒泡服打着不痛
杖瘡方

用麻油二分黃丹一錢入碗內調用銀簪攪成膏用鴨翎刷上亦用
紙貼口四五次趕血下行立時腫消痛止
治杖瘡及違犯逼目一切頑瘡

黃蠟二兩 黑油不用 香油三兩爲末去油溫

乳香末五分沒藥末五分
先將蠟入磁碗內慢火化開用攪磁邊續續入黃香乳末取碗離火入
香油於內攪勻待冷入水盆內去火毒三日取出油單紙攤藥貼患處
杖打傷重敗血攻心欲死

蘇木三兩 紅花三兩 歸尾三兩 大黃二兩

鍾愈等一鍾不拘時熱服

口一杖 薤瀉爛久不愈者此氣血虛也
人參 白朮去蘆炒 白茯苓去皮 當歸
熟地黃 香附子 貝母
右剉一劑水煎空心服口往來寒熱加柴胡地骨皮口戶乾加五味子麥門
冬口膿清加川芎口膿多加黃芪口膿後遲塞加白芷肉桂
烏龍棒瘡膏方 外異入傳
臘猪油 白蠟各二兩 乳香一錢 沒藥二錢
朝腦二錢五分
右為末以猪油同二蠟化開入膏藥末調攤貼之
寄杖神丹 何和宇傳 此草
乳香 沒藥各五分 輕粉 沒藥二錢
木茸炮乾 白蠟各二錢 水片一分
琥珀二分 天靈蓋炙 孩兒茶 三七各一錢
右為末每服三五好酒送下卻打着不甚疼痛未愈者
青木香一錢 海螵蛸五分

陳度

用雨手趕背即消
一杖瘡潰爛生蛆用皁礬煅過爲末乾摻其內蛆即死

折傷

夫折撲墜墮度不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮破出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者兼補行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛後調氣養血補益氣血氣無不效也

大凡傷損不問壯弱及有無瘀血停積俱宜服热童便以酒佐之推陳致新甚大其效

一論跌傷骨折用藥一厘黃酒調下如重者行十里之後其骨接之有聲初跌之時整理如舊對住縫衣蓋之勿令見風方服藥休移動端午日製息婦人雞犬等物

一厘金 大黃 土鱉蟲 乳香 牛夏 生用 各箇 沒藥 半分

自然銅火燒七次開淬七次用些須
右爲細末每服一匙如酒送下不可多用多則補得高起妙不可言
○一被打傷未甚急努開口以
○一跌打傷重惡血攻心或變未定急
訪取藥未傷重便灌之一方用
○一凡跌傷打傷腫痛不可忍者以生葱搗爛熱罨之甚妙
○一折傷骨節離位者即將折處腫
凡攬勻乘熱飲之仍將連根葱搗爛炒熱敷上包綿冷再換亦治刀傷痛
白蠟爲末每用七沸湯一碗化之以帕蘸拭熱敷傷處少時痛止然後排
整骨貼藥
○一治傷損煩痛紅腫扁熱
濟陰丹
天花粉　黃芪
白芷　赤芍藥各一兩
白蘞者井接斷

○治跌打傷損傷骨先用手扯伸後用小奶雞一二隻搗爛搽上外用杉木板夾之次日再換取刻如神

○一論打撲傷損傷至重大小便不通瘀血不散肚腹膨脹上攻心腹至死者此藥逐下瘀血方可服補損藥

大成湯

大黃三錢　芒硝三錢
桃仁二錢　枳殼二錢
蘇木一錢　紅花五分
厚朴一錢　當歸一錢
木通一錢　甘草少許

右剉水煎溫服

○一論從高墜下惡血流於脇下痛不可忍

復元湯

柴胡五錢　當歸六錢
瓜蔞二錢　大黃酒浸二錢
甘草二錢

右剉一兩水二盞酒一盞煎八分溫服以利為度

○一論墜墮閃挫開氣血凝滯攻刺腰痛

穿山甲法炒二錢　桃仁去皮五箇　紅花二錢

桃仁湯

蒼朮米泔炒黃蘗
牛膝去苗
當歸尾
杜仲酒炒
玄胡索
桃仁去皮
破故紙炒
小茴香酒炒

治跌撲傷損

紅花
乳香
宜桂

右剉一劑水半水半酒煎服

右剉一劑炒焦枯仔性爲細末每服五錢好酒一鍾調熱服後

治一兩
乾冬瓜皮一兩

右二味剉碎入鍋內同炒焦得微汗痛卽止一宿接完卻初極

仍飲熱酒三三盞厚蓋得

論跌撲爲敷涼藥或入元氣虛寒腫不消散或不潰潰而不歛或筋骨節一切冷症並治

不痛肉色不變久而不歛或筋骨節一切冷症並治

草烏二兩炒南星二兩煅乾當歸一兩炒

阿陽玉龍膏

右爲末蔥湯調搽熱酒亦可

白芷二兩 赤芍一兩

附桂五分

接骨止痛神方

右二味用水一碗煎至七分加酒一鍾調入火煨過去渣服息處

甘菊花枝又名品藏樹又名夜合花根皮

治跌撲傷損

蟹二隻連殼搗爛好酒一碗煎至渣服敷患處

治打撲青腫疼痛

用青橿杉磨水頻搽患處其青腫立退

治刀傷出血諸般腫毒出膿後肌肉不生痛二止者

右為細末每服三錢陳酒調入火煨過去渣温服當以捺患處血止痛定肌生

治傷損筋骨久服三錢歐石高炒去兩朝腦少許

乳香三錢　沒藥三錢　血蝎三錢　黃丹飛過五錢

白芷二錢五分龍

治傷損筋斷骨折痛不可忍或因跌仆血氣耗損指甲青黑寒熱發熱煩燥作渴

治傷損瘀血

珍珠湯

右㕮咀

一治被人打傷筋骨跌撲氣血虛弱等症宜

萬病無憂酒調下方見補劑

一治打撲損傷落馬墜車

乳香定痛散　沒藥　川芎　白芷　赤芍各一錢　甘草三分

乳香　牡丹皮　防風各二錢　溫酒并童便調下

右為細末每服三錢溫酒并童便調下

一治風損如神膏　謝醫風傳

用生當歸　川芎　白芷　赤芍各一磅下黃丹未半斤同熬又下香油四兩再入

桐油四兩熬至滴水成珠不散下黃丹二兩再熬成珠入射香五分貼風

損如神

大破傷風

大破傷風者有因卒暴傷損風襲之間傳播經絡致使寒熱互作身体反張口噤不開甚者目邪氣入臟有因諸瘡不癒若乘傷風之候有諸瘡不收能染入於瘡為破傷風之候有諸瘡腫不收則發熱甚則發熱則生風掀動筋脈諸瘡不可勝數微則發熱甚則生風掀動筋脈諸瘡不可勝數微則發熱甚則生風掀動筋脈諸瘡不可勝數微則發熱甚

○一論破傷風邪初在表急服此藥以解之稍遲則邪入於裏則
羌活防風 蒼朮 川芎 甘草各一錢 皂莢
羌活防風湯
○一論破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣
柴胡 地榆 細辛
柴胡桂枝湯
○一論破傷風邪初在表急服此藥以解之稍遲則邪入於裏則
和解湯
羌活 防風 川芎 麻黃
石膏 前胡 蔓荊 枳殼
白芷各五分 菊花 細辛 薄荷
甘草各二分
葛根湯
葛根 麻黃 甘草各五分 桂枝 芍藥 生薑各三分 大棗二枚
○一論破傷風邪入於裏一舌強口噤項背反張筋惕搐搦痙瘛盛胸腹滿
悶便溺閉亦時或汗出脉洪數而弦也宜導之
通聖湯

右剉水煎溫服臟腑通和爲度

○一論風傷腎而腰痛者或左右痛無常處牽引兩足宜積散加防風全蝎三箇方見中等

○一論破傷風及金刀傷打撲傷損并癲狗咬傷能定痛生肌

積散

天南星爲防風所制服之下麻

右各等分爲細末破傷風以藥敷口然後以溫酒調一錢如牙關緊急角弓反張用藥二錢童便調下○打傷欲死但心頭微溫以童便灌下二錢并進二服○癲狗咬破先以嚼藥水洗浮用綿拭乾鼎藥貫不再發無腫大効

○一治被傷風

初覺有風急取熱糞堆內蠐螬蟲一二箇用手掉任待蟲已中出水就抹被處身安稍厚蓋兩脇微汗出立効如風緊急速取此蟲三五個即去尾服內黃水自出塗瘡口再酒些少熱飲之汗出

奪命丹

川烏火煅去黑皮一兩 雄黃一錢

右爲末慈汁爲丸如梧子大每服一九用慈葉一片將窾裹煨熟嚼

〇一治破傷風及風毒大咬傷方見灸法

立效散

雄黃 香白芷

右各等分好酒煎服如牙關緊急者灌之即活

〇一治破傷風牙關緊急服之神效

立效爛草房上亦有此蟲

蟬退去頭足土淨五錢

右爲末用好酒一碗煎滾服之立愈

湯火

○一切湯火所傷切勿用冷物冷水冷泥塗之反遇湯火所傷切勿用冷物冷水冷泥塗蓋熱氣得冷氣則却深搏痛若一面急搗生地黃醋調敷瘡上次以和米醋調敷瘡上候疼止雖厚至數寸不妨

○一切湯火傷呪云龍樹王如來救吾行持止方壬癸禁火大法是北方壬癸水收斬千里火星辰千里火星辰必降急急如律令呪畢即握眞武印吹之即用少許水洗雖火燒手足成瘡亦可療

○治湯瀹破瘡毒疼痛三方俱效

○方用大黃末密和塗之立愈

○一方用鷄子清磨京墨塗之上用三層濕紙蓋之

○一方用生白礬爲末香油調塗瘡破處不拘時

○治湯火傷

用掃帚毛不拘多少焙乾燒灰存性研細末眞香油調塗患處大小周圍

○一治厚敷於上中留一孔一日一次慢慢圍龍加敷急速灸不留口則潰而成瘡

清宮膏 治湯瀼火燒此藥止痛解毒生血

生地黃二兩 黃連 山梔子 皂莢 各一兩 蔥白十根

右剉細用香油四兩煎至地黃等藥黑濾去渣再煎入黃蠟五錢漫灸塗瘡

○一治湯火傷用木鱉旋取新者搗取鼻涕少許砂鍋內熬成膏攷

雞翎掃敷瘡上

○一治湯火傷用木鱉旋取新者搗取鼻涕少許砂鍋內熬成膏攷

雞翎掃敷瘡上

○一治湯火傷用木鱉旋取新者搗取鼻涕少許砂鍋內熬成膏攷

雞翎掃敷瘡上

化毒散 治湯火燒瘡

家園生地黃旋取新者搗取鼻涕少許砂鍋內熬成膏攷

雞翎掃敷瘡上

○一治湯火傷用木鱉

癲狗咬力

一斑猫一日二日三日共用七个
以七日外記日每日一个至百个
雄黄二分小兒不用亦可
麝香三厘或用二三厘消石五六分或
一刀亦可

一喫便吞倶觀人事氣虛實用糯米一勺與斑猫同炒以赤為度取
出或口吐出都是大小塊子毒出後於瘡口下去三寸灸三壯効○先
以香油一碗次用油洗瘡日○又沙糖水調服如不飲酒米湯亦可調塗仍服藥去毒物如小

被虎傷

用生葛根汁服并洗傷處或白礬末納瘡口痛即止

被驟馬咬

用馬鞭草燒灰油調敷之

百虫入耳

用蒜汁滴之或葱汁尤良或猪肉俏許含口吸之出蓋過耳

□□□ 一止不一時小便出如狗形下來即已避鑼敲風邊看出

蜈蚣入耳以雞肉置耳邊引出

蜈蚣咬痛不可忍用燒紙捲緊燒烟熏咬口立止○又宜鳥雞雄水調塗之

蜘蛛咬痛不止彈塵處痛止

蛇咬方

雄黃

五靈脂

白芷

貝母

□□□ 一治各等分射香臍半端午日取蝦蟇新膽酥和爲丸一擦立止

一癲狗咬傷方

朱砂 雄黃 膽礬

一癲狗咬傷神方

斑猫去翅足七个香附七分

一蝎虎咬者吃豬肉湯一碗即已避鑼敲風一七日

一蜈蚣咬者吃卽看腦項上有紅頭髮急宜拔去

一蝎虎咬者吃卽看腦項上有紅頭髮急宜拔去

一蝎虎咬者吃豬肉湯一碗即已避鑼敲風一七日

斑猫去翅足七个香附七分

一癲狗咬傷神方

朱砂 雄黃 膽礬

一蛇咬方

雄黃

五靈脂

白芷

貝母

右各共分爲末每服一錢熱酒調服又以白礬用滾水泡化洗傷處效

一蜘蛛 端午製

雄黃 白礬生研

右各共爲末溶黃蜡爲丸如梧子大每服七丸念藥王菩薩藥王菩薩

遍數不迭下

雄蝎整八痛在一處雄蝎整八諸處齊痛但將蜘蛛牛搗爛塗傷處勿動解

散蜘牛食蝎故也手浸冷水痛亦止

一治蝎螫

天南星三个 膽礬玉末

右用燒稍半斤化成水入二味未攪勻滴成錠子每遇蝎螫之立愈又治

牙疼角燒酒八此錠少許滴口數次即止

一治蛇傷

用生薑連研生酒吃几被所傷將綿帛扎住勿令氣上行服藥發後即鬆解

白禿蓋之或二或三

有息肉

一犬十一日咬三八止一八周

辟蚊虫法

鼈甲炒 練花

芫花 苦參

用鰻鱺魚乾者於室內燻之即化爲末

丹蛇入七竅劈開蛇尾綳川椒數粒以紙封之其死自出

或飲酒食蟹以解內青勿被蛇咬食蟹飲酒動發毒虫傷並劾

蘇方 蘇儒

風大必急急於無風處以冷水洗淨即服韮汁一碗隔

九日共七碗百日息肉方得保全否則十傷九死一風

用此方得活親試其驗一用膽礬末傳患處立愈

鼈甲炒 練花

芫花 苦參

用鰻鱺魚乾者於室內燻之即化爲末

丹蛇入七竅劈開蛇尾綳川椒數粒以紙封之其死自出

或飲酒食蟹以解內青勿被蛇咬食蟹飲酒動發毒虫傷並劾

楸樹葉 絲瓜梗葉

治各甘芩芍四味煎煙煙澀一年燒四次

治虫入耳

用猫尿滴耳中即出取猫尿以生薑擦鼻其尿自出或用麻油滴之則虫死難出或用炒芝麻接之則虫亦出更不如猫尿之速也

治百生入耳

搗韭汁灌耳中即瘥○又宜川椒末一撮以酢半升調灌之即出

治蟻入耳

用川山甲燒存性爲末水調灌之即出

百虫入耳不出

以雞冠血滴入耳中即出

蜒蜿入耳

地龍一條納葱葉中化水滴耳中其蜒蜿亦化爲水

黃蜂螫

以熱酒洗之立効或用清油搽上即愈

○一辟蚊虫用蓖荆二十兩末八二言末加艾以紙捲燒烟薰之

○一辟蟹風虫用蜈蚣燒烟薰之○一方壽鹽水灌洗尿帳永絕其迹

新刊醫林狀元謝氏保元集九卷終

單品雜治

食鹽治驗

一凡覺胸中酒食停積或被人勸飲過多一切諸物心下脹滿只用鹽花擦牙齒溫水漱下不過三次如湯潑雪即時舒暢通暢也

一用鹽揩擦牙齒少時吐水放掌中洗眼夜見小字此擦牙固洗眼明

一小便卒不通炒鹽納臍中即下

一乾霍亂上不得吐下不得利出冷汗氣將絕用鹽一大匙即愈俗名攪腸沙腹痛

便一碗二咏溫和服之少頃吐下

一肝臟氣虛風冷搏於筋遍体轉筋入腹不可忍熱湯三斗入鹽半斤精

清之

香油治驗

一中風不語或瘂瘂氣厥忽然倒仆不省人事急用香油三四兩入射香末
二三分攪勻將病人之口強開灌下通其關不即使甦醒如無前香用生

一齒齦宜露每早捻鹽納口中以熱水含漱百遍不過五日堅密

一眼生浮翳粟翳露膜遮精取雪白鹽生研少許以大燈草蘸鹽輕手揩
浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢劄之如出血出水自愈

一面上酒刺并酒齄鼻切忌手搓手擠只用無灰好鹽炒過研細將鹽按在傷處止之久即除根

一帽瘡痛不可忍以鹽塗之即已

一婦人陰戶極痒痒極難忍以鹽塗擦脚滕至兒甲淹少時却用熱水泡洗即已

一寸白虫上攻心痛用鹽煮焦研末吹患處五七次吐出涎即愈

一喉痺腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎即愈

一齒齦宜露每早捻鹽納口中以熱水含漱百遍不過五日堅密

一眼生浮翳粟翳露膜遮精取雪白鹽生研少許以大燈草蘸鹽輕手揩
浮翳就點凡三次不疼痛勿驚恐屢劄之如出血出水自愈

一面上酒刺并酒齄鼻切忌手搓手擠只用無灰好鹽炒過研細將鹽按在傷處止之久即除根

一帽瘡痛不可忍以鹽塗之即已

一婦人陰戶極痒痒極難忍以鹽塗擦脚滕至兒甲淹少時却用熱水泡洗即已

一寸白虫上攻心痛用鹽煮焦研末吹患處五七次吐出涎即愈

一喉痺腫痛用鹽炒紅研末吹患處五七次吐出涎即愈

薑自然汁半盞同服亦可

一中信毒或因氣惱自服急用香油灌之

一癌瘡癰毒發散於周身也

調服者難救甚毒發散於周身也

一人以磁瓶收貯每早晚用熟油一鍾對好無灰酒一鍾漉服半斤八水半鍾煎煉油耗白烟起住

一心疫禁口吁關欲死者用而年老葱白三五根搗如泥取汁將病人口斡開用銅箸甩箸時將腹中所停虫積等物化為黃水從大小便出微利為

嗄其人即甦少時將腹中所停虫積等物化為黃水從大小便出微利為

佳忌不再發若發乾無汁加水在內搗汁灌之即出

一諸虫入耳香油灌之即出

一產後生腸不收用香油煉熟以盆盛盆候溫却令產婦坐油盆中約一頓反

一傷寒三五日忽有黃用生香油一盞水半盞雞子白一枚和之令勻頓之服

一虫咬心痛香油臨熬熟服一盞

一中藥用香油一盞入甘草末拘多少煎一沸勿令黑絞
去滓下蜜一匙再煎令稠候冷以綿裹塗治瘡

一嘔吐不止用生薑一大塊薄切勿令折斷層層撚鹽在內用水濕苧麻布
裹之外用紙裹水濕火煨令紙乾取出麻布并紙用生薑擂爛和稀米湯
呷服即止北方無苧麻用夏布亦可

一咳嗽連嗽四五十聲者用連皮生薑一大塊連根葱白七根連殼核桃
一個搥碎細茶一撮打碎細茶一撮水三碗煎熟服被蓋出汗

一感冒風寒發熱頭疼腹痛用連皮生薑一大塊連根葱白七根連殼核桃
三枚打碎細茶一撮水三碗煎熟服被蓋出汗

一痔瘡突出疼痛坐立不便先用韭菜洗淨以沸湯煎於無木器內薰之通
手洗先用生薑切薄片放於痔上痛甚處以熨熟交作炷於上
久三壯黃水即出自消若肚門上有三兩個痔三五日後如前法逐一灸
之屢效

一老人咳嗽喘急煩熱不食食即吐逆腹脹滿生薑汁十五合白沙糖四

慈
雨二味相和微火溫之
二傷寒胸膈不寬一切寒
痞氣結者俱用生薑搗
其滿痛豁然自愈如薑
渣冷再入薑汁再炒再尉熱結不
自治驗　神効慈尉法
二虛怯人肢體羸憊腫塊或
攣瘨痛又治流注并跌
易之再尉腫處即已此
刀斧傷破血流不止痛
慈冷再三易遂不復痛
畏分作兩處更替尉慰膳
婦人胎漏時時下血用
婦人吹乳乳癌腫痛不
急治即殺人急用連根慈白一斤搗爛炒熟以帛
下即通加此亦射香在內
慈白一把濃煎汁飲之
川忍用連根煮盛火益
乳患處上用元雞盛火益

雜證

一人大小便不通

白虎風走注痛痒用三
年陳釀醋一碗葱白一斤煮煮濾出
即愈

一人年陳釀醋一碗葱白一斤煮煮濾出布帛熱熨
當患處立愈

一人疔腫瘡無名腫毒以蒸
白共蜜搗如泥貼患處立愈

一人因傷其拇指并爪用
劈裂索金鎗藥裹之其痛不止急取蒸
熱有湯取搽損處仍多熅取絞續易熱者凡三易
之立愈又一夫因候截去一指亦用此法則血止痛消亦不潰爛也

一婦產後
一婦產後
一婦產後

蒜

吐血并衄血用蘿蔔搗汁一鍾入鹽少許服之即止或以蘿蔔汁欵及滴入鼻中亦妙

牙宣出血用白蘿蔔一碗加鹽一錢不時漱口即止

疥瘡瘙痒不止用蘿蔔一個內取一孔納硫黃不拘多少仍塞口灰火中燒成汁取出搗研再加猪油同搗外加硫黃銀硃各少許搽疥效

服之不過三服能語聲切片入皂角一挺去皮子水一碗煎至半碗以下

蒜治驗

蜈蚣咬傷痛不止用獨頭蒜擦蠆處痛立止

痢疾用白蒜中石灰大如梧子大米湯送下立消

心痛五月五日午時取獨蒜五個搗如泥入黃丹三兩為丸雞頭子大晒乾醋磨一丸服之

蒜味辛熱為陽中之陽能令人氣實憒亂而自吐若蛇虫蠱瘧猶為宜之

苦參

一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九 二十 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三十 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四十 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五十 五一 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六十 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七十 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八十 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九十 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一百

苦參治驗

時疫熱病狂言心燥結胸垂死

苦參切片微炒每服五錢水煎溫服連進數服有汗無汗自癒達齋以酒炒熱服

傷寒四五日頭痛壯熱胸中煩痛

苦參五兩烏梅二十個 剉片水二升煎一升分服

傷寒三四日已嘔吐更宜吐之

苦參為末每服二錢酒調服得吐立癒

天行時病四五日結胸滿痛身體壯熱

諸證以苦參一升吐李道念之雜齊諧記云郭坦之見養蚪一睡吐消食龍於煩刻苦之妙用如此

小兒白秃瘡凡頭上團團然白色以苦參白處早朝使之通用個頭大苦燒生皮綿裹納下部氣立通又治開格服滿大小便不通苦參之冷則易之劾

治腹滿不能服藥以此

苦參
參醋藥不解用溫覆取汗愈

一狂邪發惡或披頭大叫欲殺人不避水火
苦參為末審九如梧子大每服十丸薄荷湯下

一遍身風熱細瘡痒痛不可忍連胸脇腹及近陰處皆然痰涎亦多夜不得臥
苦參一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參末為丸如梧子大食後溫水送二十九至三十九次日便愈

一瘡疥甚者取一升二合盡飲食當吐即愈大行請病非前

一發背或瘡皮痛疥癩痒
苦參炒為末水飲下

楊梅瘡
苦參生搗汁飲之效

一腸風瀉血并血痢熱痢
苦參三錢酒送下

苦參炒爛出爲末水飲下一方炒焦爲末水丸梧子大每服五十丸飲下

一發黃穀疸食勞頭旋惡心怫鬱不安而發黃由失飢大食胃氣微弱

穀疸者因芳爲名

穀疸者因食而勞

苦參三兩龍膽草一合爲末牛膽丸如梧子大生大麥湯下五十丸日進三

服男疸加枳子仁三七個

一治卒心痛又治飲食中毒魚肉菜等取吐愈

苦參三兩好酒一升半煮八分分二次熱服

一治酒渣鼻赤

苦參四兩當歸二兩爲末酒糊丸茶下

一治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生瘡癢痒不忍時出黃水及生大

風手足爛壞眉毛脫落一切風疾並治

苦參四兩荊芥一兩爲末水糊丸梧子大每三十丸茶下

一治楊梅瘡風等瘡能治內托消瘡毒補心益氣

苦參半斤洗淨劉寄奴分作二處將綿裹塊浸酒一壺春冬浸一宿秋夏浸

一吐血不研末生蜜調下

一吐血不研末生蜜調酒調服米湯亦可

一吐血不研末生蜜調酒調服米湯下

一久瘧不愈

一白癜風肚腹疼痛

一霜重其苦能安齒蠹能去風熱也後人以無風蠹有用苦參湯潔齒久而病腰

一苦參湯治驗

一胛胃常服每塡雲用半斤有瘡用一斤

一苦參湯治大人病齒齲齒君公爲之作

一苦參湯日漱三升五六日病愈蓋取

一霜重其苦能安齒蠹能去風熱也後人以無風蠹有用苦參湯潔齒久而病腰

一苦參湯治驗

一胛胃常服每塡雲用半斤有瘡用一斤

一苦參湯治大人病齒齲齒君公爲之作

一苦參湯日漱三升五六日病愈蓋取平居無病浸此藥消一切風毒理

一口鼻中出血用一字吹入鼻

一皮破血出及炙瘡出血摻半錢立止

一便血血痢男用公猪血和百草霜丸女用雌猪血

一血崩用

陳槐花一兩百草霜半兩爲末每服二錢燒紅秤鎗淬酒下

一諸瘡并膿瘡

過江龍即石駁燒過爲末二味研細摻瘡上即取水

百草霜

舌腫硬閉塞悶亂

食鹽

等分井花水調塗舌上

一治熱心氣煩躁每服三錢熬童子小便調下

百草霜未每服二錢井花水調服

一婦人產後下血不止

豬草燒灰二錢酒調服

一治吐血及傷酒飽食低頭搊損吐血至多并血妄行口鼻俱出但去恭心

雜方

者投之無不効已試
治跌撲損傷惡血入腸胃下血溺如瘀血
和服
者蕓薹研細好酒調服

法製茶曾府傳清火化痰消食止渴解酒
芽茶一斤洗過炙令白檀香五錢末白豆蔻五錢
拌勻茶將三味藥末敬爲酒乾不拘時嚼
製枸杞子曾府傳補諸虛滋腎水延年益壽
甘枸杞子半斤白檀香五錢末白豆蔻四
子十片腦另研右用甘草膏拌
片腦另研右用甘草膏
末片腦三分研右甘草膏同煎
丸爲衣

法製
清
上

龍腦薄荷三兩　烏梅肉二兩秘烏梅茶五
貢武明粉五糸　水片三分　白砂糖三
兩
梅蘇餅　清上焦潤咽膈腸生津液化痰降火止
大喘花　一方有訶子無玄明粉　百藥
煎　紫蘇葉二兩　紫蘇葉五糸白粉葛一
咳嗽
兩白砂糖八兩烏梅肉一兩半
勻和煉蜜和成劑略帶硬些丸
研細施入同研
桂花餅　清熱消痰降火止嗽生津
桂花一兩　訶子七箇
右剉末入片腦一分半研細施入同研
和一丸滾水下
露露霜　甘草五分
貢乾葛豆粉一斤　研細薄荷葉二斤
白糖霜四兩和勻用之
底上用綿布隔住薄荷葉上又
用薄荷鋪上蓋住紙糊封固蒸
以水微溫之用瓶先將薄荷鋪

用鮮枇杷葉十斤去核共
加入蜜四兩共熬成膏
法製半夏
大半夏一斤先用湯泡七次薑汁浸七日
皂角水浸三日再用白礬苦鳴煎水浸一
日一易至七日大者切片小者
爲末如霜入者名法製半夏
歌曰
開腠屢蘇實効　止嘔未必虛談　更能
夏膏能消暑渴　冬天却解沉寒　隨時
治嗽化延痰　蘊積胸中不散
細嚼有餘甘　利濟人生萬
上上各香油　排草未四兩檀香一兩甘松一兩凌霄香三兩
白芷五兩大黃三兩北細辛五錢荔枝殼七
丁香三錢薄荷葉紅藍膠三
兩蘇合香油兩二
右爲細末

德州肥皂 未用

右為末

獨活五糸 白芷三兩 細辛七糸 紅豆五糸 白芷三兩 三柰二兩 大黃三兩

肥皂三斤 磨為末 糖糖一斤 共搥

餅 爛為丸

上香 蔡徽二兩 柯子皮兩 皃蔡二兩 硼砂一兩

檀香 烏梅肉糸五 右為末 甘草一斤 水七斤 熬

盛膏 為丸 再加此些 氷片尤妙

京山王府香豆豉

鹽一兩 薄荷葉 刷一 蕳去皮 蒔蘿

花椒 砂仁

陳皮 官桂二兩

橙皮 切絲二兩 甘草去皮切 三兩 杏仁

紫蘇 切絲二兩 生薑

紅豆一合 斗水淘淨 浸一宿 酒乾

五皮切四片 瓜仁

五糸

小茴 一兩

紅豆

二兩

臨時用 切

小茴五糸 細辛七糸 薄荷葉 兩

右藥俱為末 於三月三或五月五用大蔴

指厚用黃蠶或楮葉井底蜜覆七日上有走
六日下不用水攪勻一日拌四五次裝壇蓋固
乾濕復入壇內取用或將油拌即是濕豆豉

糯米醬法

糯米一小斗如常法做成酒帶漿入炒鹽一斤淡豆豉半斤花椒三兩
胡椒五錢 大茴二兩 小茴二兩 乾薑三兩 右為細末調和五味最佳

延壽

神仙醋法

清明日用粘米一小斗注水浸一七日不換許下手放水
將米放浦包甭在屋簷上四月六日取下米入水三壺桃條攪一七月封
固罐內六月六日來開其味酸美

壽酒

好上等堆花燒酒一壇久龍眼去殼一斤桂花四兩白糖八兩封固經年

療痘豪簽簡圖

寶襄陵酒妙方

烏頭去皮臍脐細辛白芷良姜官桂去粗皮白朮去油芦各一兩去皮一斤六兩

右爲末入白麪二兩片攪令勻用黃蠟包裹外用白紙包裹當風處置陷攤上過一七許

次成小塊內用黍麻葉包裹外用白紙包裹當風處置陷攤上過一七許

頭



此圖為
瘟疫證兼
鼻症若吐血者行七日愈
用阿膠二兩鼻孔入三分要緊乳
內不可出氣治紅痰每次用小酒盞煮頭入
乳雞一隻新鮮者臟子油切極細三味攪
勻碗盛砂鍋內蒸熟每早空心服
七日吃七次每阿後方吃

此圖專治虛勞遺精白濁氣虛用阿膠臍上赤治女人經血不通兼止血崩之先將射香一錢研細入臍中以麪圍定用艾灸七壯

三厘乳香一錢孩兒茶一錢研細入臍中以麪圍定用艾灸七壯

共爲細末煉蜜調作餅一餅貼臍上用生薑自然汁磨化塗餅上炙熱熨臍內如此數次

一片切如藥餅大半簡銅錢厚用艾灸九如豆子大不論九數燒得薑熟覺得臍內微熱即去藥就門之先一次用此藥以後不必用

口阿處

入馬三氽

此圖入

在病人馬口內進三分

流精晝夜不止初開馬口竅先用黃蠟條如

快頭透

開

三綵圖器總論

每阿論病者藏次爲阿數每歲一阿要足

阿要三百六十阿有零寧可多阿幾阿更好不可缺數

凡去阿氣的男女俱要采阿女人阿婦人病男子阿用好酒肉白米飯與食補起他的氣

方纔氣完病者得効更速左男子病用童女人病用童男壯盛無病者阿

之若丈夫病用女人阿婦人病男子阿亦可

一陰一陽道之體也二弦之氣道之用也

神仙授命秘訣

三家之鬼爻感於神室名而成丹

也萬卷丹經但言三家相會畫夜三五合之門此喻中五郎戊也眞龍眞虎眞鉛眞汞金木之處神室眞道中央戊己之鄉此四象皆喻陰陽玄牝二物也煉水火此二物運用典已一章言盡三家矣千言萬語但講三姓會合相干即典大地運行日月無二而已矣但還爲器張次將烏兎藥採取天度數分在六十四卦之內以爲坐蹄雖語句不同其理則一而已矣

訣曰 此乃仙丹日已相付之和有朝進陽火夜退陰符其數內暗含也

三三四五典三七四九行來五十一六十三分七十五八十七

知此陰陽數便是神仙上天梯

河圖數

都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西四其艺戊己

自居生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一元良度

五一

暮少陰符	朝進陽少	戌時	寅時	辰時	午時	申時	酉時	亥時	子時
遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也	遭正謂此工夫也
慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千	慶幾週旋幾千
戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之	戊時居右自十六起至四止煉已之
遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運	遭數藥升西降詩云河車運
朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火	朝温養火
温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩	温養也曩

待光泰至自十六起至四至止就換於左起三至十七止即換於左用四六八十吹噓此道盡之矣蹇兌乖離默默窺百刻周然前然勉節沐浴也經云抽藥爲野戰罷功爲沐浴此之謂也自此得藥之後却行温養火候之功一日十飯不覺飽百日不食不

凡
行頓
人吸鶯可
入乳即能解之

通治

一論解諸毒療諸瘡利關竅通治百病此藥真能起死回生嘗製丸數萬錠
齊人奇効不可盡述居家出入與大工動大兵及闖廣重貴往往行兵
九不可無之

紫金丹 一名紫金錠 一名玉樞丹

山洩瘴南北處有之俗名金灯籠苗似非花似灯籠魚白土有黑點綠
月開花三四月新苗枯尖地得之子則酒

府渭入春矣時有毒者夜之不相類但赤無川文恰一名五倍子八枚天
毛次流有毛包果入去皮洗拯淨緒乾二兩胡令爭燒乾二兩研極白
千金子一名小人之色白兩研紙無油成霜為度一兩肉用巴梁魚抵胡十
細研浮紅牙大戟枏州紫大乾為上江古南土戟次之去苗根洗拯淨
三分紅牙一兩此方綿大戟色貝者大凌利反能傷人弱人井
有已而者慎之慎之

右製法宜端午七夕重陽或天月德黃道王吉日修合量藥多寡預期數
日前主人及醫王俱齋戒沐浴易新潔衣中於僻靜室焚香陳設藥品拜禱
八卒醫士焚香陳設藥品拜禱天地罪用數盞各逐盞配合分兩攪和數百次極勻仍重羅兩遍依方用糯
米濃飲調和於木臼內杵數千下極光潤為度每錠一錢每服一錠病勢
重者連服通和二兩行無勞用溫粥補住要在齋心至誠極其擦淨如法
修製每令丸見之
一切飲食藥毒蟲毒瘴氣不服華馬駝羸等諸畜盡用涼水磨服
南方蠱毒瘴癘煙瘴傷人綿屬磨服一錠或吐或利即愈

一切惡瘡諸風隱疹赤腫未破
時及痔瘡並用無名汙腫楊梅等
立消已潰出膿血者亦減分數
陰陽二毒傷寒心悶狂言妄語胸膈進滯邪毒未發及瘟疫及急喉纏喉風
冷水薄荷一小盞研下
心氣痛并諸氣用淡酒或淡薑湯磨服
赤白痢疾泄瀉肚腹急痛霍亂慢腸滑等症及諸痰症並用薄荷湯磨服
男子婦人急中顛邪鬼哭鬼笑鬼胎鬼氣狂亂失心羊兒叫亂走鬼交鬼胎用
中風中氣口服喎斜牙關緊急語言謇澁筋脉拳縮骨節風腫手脚腰腿
周身疼痛行步艱辛諸風諸癇並用疫無
自縊溺水死心頭暖者驚死鬼逐死未隔宿者冷水磨灌下
蛇毒風大一應惡毒傷冷水磨塗傷處另用淡酒磨下
久近瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨下
小兒急慢驚風五痫牌痫黃一十疹痘痫牙關緊急並用蜜水磨下

小葉同磨下久搽量兒大小一丸作二三服

一牙痛酒磨塗及含漱少許良久吞下

一湯火傷流水磨塗傷處

一打撲傷損炒松節無灰酒下

一年深曰近頭疼太陽疼用酒入薄荷研爛磨紙花貼太陽分下

一諸蟲腫脹大麥芽煎湯下

一婦人女子經水不通紅花煎湯下有孕婦人不可服

一家患傳屍勞兒弟五人已死者三方士令服此藥遂各進一錠二下惡物如膿狀一下死虫如蛾形俱獲生遂以此藥廣濟屍症無不驗者

一女子久患勞瘵爲屍虫所噬磨一錠時吐下小虫十餘條後服之一時吐下小虫十餘條後服之

合香丸凡半月遂如常服藥雖不言補氣補藏瘦人服之無效誠衛身之寶也

每料費銀不過二錢可救數十人內有山茨菰千金方言有可種仁人

君子合以濟人陰功不小

一牛馬六畜中毒亦以此藥救之

勇寧一方治雄黃透明者三錢歷試治諸瘡極効

右八病血氣能救世間苦

青皮去絡黃連去毛各巴豆三十五個去殼去皮心二十一方個

陳皮去白朮水香一兩烏梅七個合仁

乳香 沒藥絡二錢 檳榔二十個 枳殼去絡一兩 牛夏易泡七次 丸個

右為末用黃蠟熔開入藥末和勻如硬加蜜少許為丸如梧桐子大每服一百丸湯倒干後口紅痢甘草湯下口白痢乾薑湯下口赤痢黃芩湯下口噤口痢連肉山藥防風粟米湯下口久痢下

湯下口產後痢當歸湯下口禁口痢連肉山藥防風粟米湯下口久痢下

如魚腦濃汁四肢無力養臟湯加附子一片煎湯下口氣虛痰冷心下元虛損酒下口氣痛宿食不消生薑湯下口嘔噦桔梗杏仁湯下口

頭痛腰疼冷氣沖心痛陳橘皮湯下口蠱毒咬心痛檳榔子藁連湯

酒下口腹痛蔥白湯下口臍下痛茶葉湯下口蠱毒咬心痛檳榔

湯下口時氣井花水下口渾身壯熱沙糖水下口陽毒傷寒柴胡竹茹湯下

子秦皮湯下口渾身壯熱沙糖水下口陽毒傷寒柴胡竹茹湯下

粒食者當以其涉在仙境之境

絶粮失食門

備急欲死方

絶便能致命本草有不飢之文而醫方皆言斯休糧者生人之所資歟曰乏非庸俗所能遵故也遂使荒饉之歲餓殍橫路良云若脫値奔竄窮谷空井深

○上焦虛熱去黃湯下
便不通本通湯下○一
傷損酒下○小兒天吊
奪命丹

三稜 莪朮 水香
巴豆

右爲細末粟肉爲丸如
梅核氣一鼓滿一
冷心疼 食積

櫻桃大每一丸空心凉水送下
積聚痞結 一癥瘕痕氣塊 一冷腹痛熱水下
氣積 一冷積 一經脉不通

○脾胃虛寒酒下○一切風痛升麻湯下○大小
切瘡疼毒雞鳴湯下○金勞七傷猪胆湯下○打撲
驚風防己湯下

沉香 丁香 沒藥 川芎 皂角 菖蒲

塚之中四顧迴絶便須飲水服氣其服法如左
閉口以舌料上下齒取津液而嚥之一曰得三百六十嚥便隹漸習乃可至子
目然不飢三五日小疲極過此便漸輕復有水者亦無器便與左手貯祝
之地不能曉方面汲時之早晚故不論此若有諸醫以自防畢三叩齒若手指
曰丞掾更之賜盡之粮正之後復有盈器貯水九隹亦左手執右手以物扣
手如此三遍便飲一二時六成者諸法恐危逼之如法曰服三升便不復飢
若可得遊涉之地周行山澤間者
谷日中三升便隹又搗取白菜根洗淨切服之此三物得行曝燥若上搗碎服服者食方寸匕
市執以水服盡此則解十碎一曰又有大豆煮汁碎一升碎十日
草中有米天門冬黃耆赤小豆赤隹得熬三豆黃耆米服一二升碎十日
擅偷肖皮並可碎飢也
若遇荒年穀貴無以充粮應須藥濟命者有

取稻米一斗淘汰之百蒸
食自行三百里
又方糉米一斗酒三升漬之
曝之又漬盡
出

金瘡

金瘡或刃傷鈴劍所傷
用清心補血而調理之大
抵脉浮細易治緊數者難
治

泰金瘡者出血不止若出血太多者外用止血生肌之藥內
服當歸一兩赤芍藥一兩赤石脂兩一
倍子兩血竭三錢乳香少許
為細末以冷水洗淨傷
處盡發百中
蝎五分
〇一治刀傷若猛損血不止
用慈一大把切爛炒如
膿毒不可忍
泥熱研乘熱傅之如冷再換其瘡即止
〇一治傷破手足血出不止
一時無藥即以自己小便淋洗傷處雖瘡甚即愈

○一止血住痛生肌
金瘡丹用硃上陳石灰研細末
傳腫破處血止即愈不痛神效

右各等分石白揭爛入嫩
未敷患處息婦人雞犬見
之瘡斷梁等瘡

菲菜根
石灰末於內摻乾成餅為陰虛乾用時以刀刮
○一論金鎗所傷并一切腫
松金
用蜘蛛月黑牛胆一箇裹
研和敷患處
○凡一切乎足虛偏然出
血不止或鎗刀刺傷破血院血
住牛日或一二日即住急服

八石灰四兩白礬二兩陰乾取出入黃丹炒一兩
○八物湯生血氣為主
手指斷或傷能收斂金瘡口
無疤痕

用松樹懸皮生爲末立効

治金瘡箭鏃所傷

用藍靛用靛青探癤立愈

治打破肢體血出不止

用生半夏爲末摻患處立止

凡刀斧所傷血不止卽

用鵝管石爲末撒在四圍瘡頭自出

熱湯盒之令冷水浸之

箭頭入骨肉不能出

右同降

治箭鏃頭入骨肉不能出四圍瘡頭自出

用鵝管石爲末撒在四圍瘡頭自出

金瘡箭鏃所傷斷手足血出不止痛入骨

用松香五兩

和勻敷之止血收痛口神効

中州傅體愛傳

而死者多若血不止急以布醋

隨急用手拔上捉住

住痛生肌接骨

○一治金瘡腫痛出血不止寒熱口乾此氣虛血無所附而血不歸經也以補口益氣湯加五味麥門主之陽氣復而愈

○一治刀斧傷破打破跌破出血不止開口不合用此止血生肌住痛立時効

金瘡散

銀末　血蝎　髮灰　八

右爲細末研勻每用掺於患處立効

○一治腎針入而針折在肉中以鼠腦搗如膏塗之（）鉄煉竹末諸刺在肉中不出并蛇骨刺入毒痛方燒死鼠敷之

齒痛

○一論人齒咬破指頭痛不可忍久則爛脫手指并手掌諸方不載恐用人尿用食蛇龜殼燒灰敷之如無龜

人爲百藥所中傷其脉洪大者生微細者死又
死大凡百毒所中用甘草豉水煎服之能
一治信毒水粉山礬霜一切殺人之毒
巴豆穀壯者十四箇弱者七箇 花椒去目五分
壁上滾水泡服立止
一論中砒霜毒於肉飯中得之者則易治飲
若在胃脘作楚可吐在腹中可下急服藥得
一中砒霜毒諸方
一方用綠豆半升細擣去渣以新汲水調服
一方用人糞汁灌之立愈已
甘草五分
服其毒盡如嘔吐不出用舊
酒中得之者則散歸百脉難治
吐泄則愈

一方用早稻草燒灰以新汲水淋汁絹巾濾過冷服一碗壽縫一下刺

一方刺羊血飲之立効

一方用黑燃鉛井水磨服効即愈

一方用生麻油一碗灌之即愈

一方用羊血陰乾收貯用井花水調服

一方用新殺鴨血吃之不用水調

○

中砒霜水粉壽

用膽礬各一分研爛入井水一小盞和勻服之立解

○

中山砒霜水粉壽

用絲瓜根木槿葉研涼水吃一二碗立解

○

中信壽水粉壽

用絲瓜根木槿葉研涼水吃一二碗立解

○

中巴豆壽者黃連湯飲之立解

○

中巴豆壽利下不止

黃連灶

(一)右各等分爲細末每服二錢
中水粉青
陳壁陽去硝屑水丸百草霜爲衣水送下
解砒霜青
硫黃四錢　黑豆粉五錢
爲細末冷水調頻頻服冬月用温服如肚
痛再加一服待肚不痛用雞
探吐吐後用温温淡稀粥調
治誤吞金鏇井銅
治誤吞銅鉄或金銀等物不能化者
羊脬貫炭火燒存性爲末每服三錢水飲送下取下物從大便中出
用砂仁濃煎湯服之其物自下
治誤吞針
用雄磁石爲末水丸如櫻桃大吞下即服通利之藥打下大便而出○昔
有一女子將針失燕下肚諸醫不治用奎豆煮熟同韭菜吃下針同菜從

一方用兒茶大便而出

一方用黑砂糖和黃泥爲丸令見吞下泥裹針於內大便而下

一方用木炭燒紅急搗細末米湯調服之

一方用磁石一塊當阿之自出

一方半夏毒以生薑汁飲之

一方杏仁毒搗鹽汁解之

一方桐油毒研柿餅噉吃立解

一方花椒閉氣不通新汲水飲之

一方八角茴香毒煮酒飲立解

一方蓖麻毒煮汁服之

一方黃鳥川烏附子之毒研咽吐不止以香油灌下立解

一方芫花毒或致不省人事用醋酒煎熱入砂糖灌下

一方探吐之

○二治人或酒後口渴或發熱大甚夜開吃水誤食水蛭在腹或面黃肌瘦腹脹滿悶諸藥不効
用泥土為丸香油為衣丸如菉豆大每服二三百丸或二三百丸空心溫水送下其蛭隨土而下且油能泄濕泄土水蛭之出也故効
○二治誤食河豚魚毒一時危困命卒無藥最能殺人用香油多灌之毒出盡即癒又法用白礬末以滾湯調灌之立解
○三治誤吞田螺哽喉不下死在須臾
用鴨一隻以水灌入口中少頃將鴨倒懸令出涎水盡患人即蘇
一治誤食鱔鱉鼈蛻毒
用豆豉一大合新汲水浸令豉水濃溫服之此三物令人大小便秘脉不
痛有致死者
○三方以生藕汁或煮熟飲二兩盞即解
○四治凡中六畜肉毒用蒜汁服俱効
○五治人誤食蛤蜊毒用屠角濃磨水服一碗良

○治誤食中斑蕈毒煮黑豆汁飲之又宜澤蘭葉研汁飲之

○補遺

○治服言毒方　建昌胡春寰傳

仙生乾者七錢　蜈蚣粉一錢　芝蘇一錢

味入涼水二碗攪勻先服一碗次將雞毛如服信用白雞毛一根入喉中即吐次又服前藥妥

威靈仙研爛同下二味

又吐三分雞尾毛如服紅

○治信毒神方　建昌鄧少山傳

百草霜一錢　硇黃五分　白礬各煮成吹過三粒

右水研化濾去渣將藥入內調下所未　燒雞清爾　黃土兩

○一方用蒼耳粉白礬甘草各等分為細末每服三錢煮葛湯下

○一治牛與傷成脹滿用乾稻草灰煎湯服之立消

○一中箭毒砒霜豆粉蜜和少許研蜜豆汁解之

中鰣魚骨可食鮭魚節解之
二中食牛馬肉毒甘草四兩研酒服盡量飲之須臾即吐或瀉如渴切不可
飲水飲之即死

骨骾骾喉

一治一切骨骾或竹木簽刺喉中不下

勝金方

於臘月中取鮫魚膽縣北簷下令乾每有魚鯁即取一皂子許以酒煎化
即隨性量力也若未吐更吃溫酒俱以吐爲妙漉
出再煎一塊子無不出者此藥應是鯁在臟腑中
溫溫呷下若得逆便吐魚鱗魚無不得鱘魚鯉魚俱可服之
出若卒求
一治雜魚骨所鯁
用金櫻子根將竹簽取出搥爛水煎用鑵嘴插入喉內灌下勿犯牙

表世倒方

○治諸骨骾喉

用玉簪花為末無花用根取汁用好醋調汁灌服不可犯之即落

○治雞魚骨鯁

用霜梅肉搗成指大丸子再將綿裹用線穿在內冷茶送下扯住線頭在手一嘔即出

論諸骨骾喉吞在須臾百方不効用此符屢試屢驗神妙不可言者

打諸骨骾符

鼉魚鳳雞鼉虎猫鼉 鼉 鼉

呪水治骾法

以淨器盛新汲水一盞捧之面東默念云謹請太上東流順水急急如律令勅一氣念七遍即吹一口氣入水中如此七次患人飲此水立下用此呪可以令食針井竹刺皆治之

治魚骨鯁不出以蒜納鼻中即出

治雞魚骨骾

燈心灰以米糖如指大藥炭置喉中勿令咽津液飲之即下

治諸骨骾喉以狗涎小塊口含化即下

治骨骾取硼砂一大小將溫茶飽服多多為佳然後服一丸當時諸骨或化如泉水傳

或下如神

一雞骨骾

用香油煎滾待溫服之即吐出

○一諸般骨鯁魚骾咽喉吞吐不得極欖食下即化如無欖用菽煤灰小調下亦化

邪祟

脉來乍大乍小乍長乍短爲邪祟脉之寸尺有脉關中無脉爲鬼脉鬼脉口得病之初便諳語或發狂六部無脉切之大指之下寸口之上有動脉者是不用服藥宜徐究治之或從俗送鬼亦可承祖炙鬼法

○一治一切驚狂譫妄踰垣上屋罵詈不避親疎等症

用細麻繩扎縛定以大艾炷置於其中頭令出即不効灸七壯神効

○一論孤狸精迷人不問男女被他婬惑直僵至死無法可治者指角肉四處着火處不着其孤狸精來先用口陰戶云其人即昏迷不省或男子藏陽物上一展即氏旨逆用直桐油抹在陰戶

辟邪丹

虎頭骨二兩朱砂 雄黃 蜈蚣各一 鬼箭羽 鬼臼 皂莢

右爲末煉蜜爲丸如彈子大晝燄一丸男左女右發癎驚上誠當病人房內燒之一切鬼邪不敢近耳

最効

外得之令人心腹絞痛脹滿氣喘人心煩多忿道間門客忤者中惡之類也研墨水和服一丸

不可得近見屍喪聞哀臭便作

毎發輒吐涎沫知痛之所作毎發宜灸得風雪便作

廢毎節氣至則輒至大

（一）

備急丸 或下之若不下者不治 論中惡客忤心腹脹滿痒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以熱湯或酒送下若不下牀頭起灌令下喉須臾更痛未甦更與三丸腹當鳴轉卽吐吐卽痛已瘥慎猪肉冷水肥臭之物

大黃 巴豆去殼去油乾薑各等分

右爲細末煉蜜爲丸如小豆大初服三丸量老幼虛實加之以知爲度若下血便死不知人事及厥逆心腹痛如錐刺痛氣急不得嘔則氣迴下之倉公淳于意方故名之

（二）

倉公散 白礬生 皂莢炙 雄黃 黎蘆各等分

右爲細末每用如豆大綿裹竹管中吹入病人鼻內得嚏則氣迴以得嚏爲度能起死回生（一方治喉風痙如聖散加蝎稍七枚吹鼻吐痰）

用鼈甲搗末以水調方寸七匕
一論凡遇屍喪玩古廟入無人所居之室及造大地鬼神壇場
赤無語者名曰尸疰亦曰鬼疰即中至人焚香北面禮拜之更行後火酷惡鼻法則可復避西則可復避西則死宜速面而死
一論凡感異穢瘴毒暴絶者名曰尸厥陽在表以不患人鼻受醋氣則可復蘇以醋汰之方見霍乱
霍香正氣散服之方見霍乱
一凡男婦交感而死在男子名曰脫陽在女子名曰脫陰陽脫死雖死陽猶繼續不委交子雖死陰脫死陰必繼然不閉亦有夢中脫死者其陽必舉陰必甚尸容自黑色易可辨也腎在不救
一論初到客舍館驛及久無人居房廳中為鬼物所厭宜闔其人吃吃作聲便令人叫喚如不醒可用
雄黃各一錢 朱砂五分
右共為細末每用一錢床下燒一釆用酒灌之

丹溪治一婦人如癎或作或輟恍惚悠忽省人事一日略甦醒診視脈沉而澁此血虛赤從而虛邪因虛入理或有之逐有氣血俱虛者有氣虛而血不虛者有血虛而氣不虛者有氣血俱不虛者有氣血俱虛者有氣虛而血虛者有血虛而氣虛者有氣血俱虛而邪氣乘虛入理者有氣血俱虛而邪氣不乘虛入理者有氣血俱虛而邪氣乘虛入理而邪氣自去者有氣血俱虛而邪氣乘虛入理而邪氣自去即愈者有氣血俱虛而邪氣乘虛入理而邪氣自去我

錯雜不倫或刻駛暴至或緩伏或雙弦或
部大於寸関或関部大於尺寸皆是染黒
衰多見於脈横隔促散多見於心脈大抵
易盈心藏神肝藏魂心虚則驚煬肓述神
補遺一
卒死

〇一治客忤卒死 杏仁七十箇去皮
還魂湯 麻黄三兩去節 杏
右剉水二碗煎至一碗去滓灌之通治諸
〇一男子被鬼撃身有青痕作痛者
金銀花煎湯飲之即愈本草謂此藥大
治五種飛尸此其驗也

五絶 五絶
一五絶 二曰白癍 三曰瀉
水 四曰厥逆 五曰柬死

井塚

凡夏月不可淘井井中及深塚中皆氣入則令人鬱悶殺人如投之直下至底則無伏氣毛若徘徊不下則有毒物即死若或不甘而入當先以酒氣數升先酒井塚中四邊畔定少時然後可入若覺有此氣衝飲死者還取其井中水洒人面令飲之又以灌其頭及此體即活若無水取他水用之

腹痛欲死者使四人捉手足各一寸十四壯又生薑一片鹽如棗濃煎服又醋煮衣絮令徹溫裹轉筋人脚助開即甦

鹽主毋

○萬○蠆○水
肉皆爛者不即治食人五
臟則死此病有緩有急急者十數
日即死緩者延
引歲月遂走腹內氣力漸
衰骨節煩疼重發則心腹煩燥而
瘦弱況重發則心腹煩燥而所中之物毒參爲
之法令人吐中者大抵脉數而細死浮緩而疾者
感之氣而毒人也令人心腹攪動痛如有物攻血
○一治蠆毒方
福建茶各二兩
調下即吐效也未吐再服必吐
被狐蠱毒蛊毒菌毒河豚毒瘧疫
疽發背并一切惡瘡諸風癮疹及無名腫毒隨手
取效萬無一失凡人家出入不可無此藥
紫金母方見通治
但煮一雞卵去殼以小銀釵押入其中併毒入口
即爲中毒

品　　　

救荒本穀門

穀仙方

黑豆五升淨洗後蒸三遍晒乾去皮
火麻仁三升湯浸一宿濾出晒乾膠
右爲末用糯米粥和成團如拳大入
磁器內盛貯不令風乾每服二三圓以
日不食第二頓七七日不食第三頓三
滋潤臟腑容貌勝常若要重吃物用
待冲和無也

救荒代糧丸

黑豆去皮 茯苓 貫衆 個
右切碎用水五升同豆熬煮取豆
雞頭子大納瓶口封住食前葉可以

防儉餅
栗子紅棗胡桃柿餅四
收之以防荒儉之用○
磚塊紙包晒乾收叠櫃
後遇飢荒人皆逃竄而
防飢饉行以賑濟飢人
此莫大之陰功也

素所不識亦無毒者餅
煨進飯糗亦同
果去核皮於磚內一處搗爛錄
朱見一僧化緣但有所得即噉此
內二兩月晒一次積久至多砌作一墻人莫能之
富翁製此成

辟穀散
山藥 蓮肉
去心皮 茯實去殼
白扁豆去殼炒
仁去殼十 小茴炒四兩
二兩 白糖菜炒黃二兩
白湯調服或用白湯調蒸糕食之亦妙
右共麪為末每五錢濃
欲省緣休糗用黃芪赤石脂各三錢防風半
揭一干杵煉蜜丸如彈子大要行遠路飽吃飯
頓服一丸可行五百里服
二丸可行一千里

長生不老辟穀丹

雲南雪巳大茯苓去黑皮令淨定粉黃丹白松脂白沙蜜黃蠟各二兩朱砂
以水飛過三錢金箔二十个水銀三錢先將蠟松脂於淨磁碗內鎔為汁傾藥在內
五味末半錢水三小盞煎湯温送下不嚼破服後第三日覺饑以手頭研如泥
水飛過為衣看死水銀法先洗手淨用金箔都在藥上蜜器收貯服時用乳
香未半錢水三小盞煎湯温送下不嚼破服後第三日覺饑以手頭研如泥
九搓揉後以
天清地寧至神至靈三皇助我六甲護形去除百病使我長生清淨淨心為
上如此七遍畢以乳香湯送下呪曰
金爐香未生烽烙盛煎餅食半飽已後藥在丹田永不饑渴久則衰過五臟陰滓俱盡長
生不死諸病所忌使人添氣力悅顏容身輕體健百病皆除救貧苦賞濟世之良方長生之妙法其間若欲飲食俱不妨事但七日之內
抜著新衣服時面東持藥念呪一遍次在藥

養元壁　治脾胃虛損固元氣填精補髓能令瘦者肥老
者用和脾胃補虛損辟穀丹安五臟消百病秘
用黃犍牛肉不拘多少去筋膜切作碁子大片用河水洗數遍令血味盡仍
加河水浸一宿次日再洗二三遍水清爲度用無灰好酒入砂鍾內黃泥封
固桑柴文武火煮一夜取出焙乾爲末如黃沙色者佳焦黑無用每午未一
入參四兩　白朮去苗炒　陳皮去白筋曬乾　山藥炒黃　蓮肉去心
懷山藥炒黃去葱鹽炒　茯苓去皮筋曬乾　芡實仁去殼
小茴香炒四兩　乾薑炒四兩　白扁豆薑汁炒　川椒去目炒
砂仁炒二兩　烏梅肉二兩焙　甘草四兩
粳米炒黃取
右藥爲末與米粉爲糊和勻外用小紅棗五斤煮熟去核加煉蜜一斤半共
搗爲丸如彈子大每服二丸不拘冷熱湯水化下
嚼吃一日服三五次永不飢按此方實至道之妙　用乎時預合亂亂之時

灸法門

定例

定分寸取本人男左女右手中指相屈如環節以稈心從中節旁側量兩頭橫紋角卽截斷爲一寸用之不誤爲最爲的當

點穴法皆要平正四體無使歪斜灸時恐穴不正徒勞好肉若坐灸立點則坐灸臥點則臥動則不得其並不得牽縮坐點則坐灸臥點則臥動則不得其直宜安然平火則影灸陽後陰先上後下先左後右先少後多宜審用之

論艾炷大小經云凡灸欲艾炷根下廣三分若不及三分使火氣不得達病未能愈則是炷欲大惟頭與四肢欲小耳但去風邪而已小兒及体弱者如麥大

二點艾火古忌松柏桷榆桑棗竹木切宜避之今用清麻油點燈傳火於艾莖點發其艾是也兼滋潤灸瘡至愈仍不疼痛用蜘燭更佳

着艾時宜正巳午前用火若午後未時氣盛不可下火并先
憂愁恐怒罵詈喜笑天陰兩下風雷閃電人神血忌並皆忌之
着艾時必先以蒜切片擦穴上然後安艾不然則動止之間甚
着火有眩暈者神氣虛也仍以冷物厭之即令其神復如前法以終其事
或羹湯與飲之以壯其神
着艾火後須要瘡發所患即瘥不得瘡發其疾不愈若見灸瘡
故鞋底灸令熱慰之三日而發仍以小雞鯽魚豆腐等熟調食之
謂以毒攻其瘡必發若氣血衰弱者調之以藥便
灸後瘡未發宜烏桕樹葉貼之
灸後切宜避風冷節飲酒戒房事違七情可擇幽靜之居養之為善
灸瘡痛不止用桕葉葵苓葉端午午時採陰乾為細末每遇灸瘡重盞子
脫了水調少許如膏貼之即愈
灸瘡紙上貼之即愈
灸瘡洗法以葱艾薄荷煎水溫洗令遂風邪

火瘡已発黒爛疼痛用桃枝柳枝蜘
蛛出血用百草霜為末揉之即止
久瘡已発可用膏藥貼之二三日一見使瘡膿出多而疾除也甚宜用
一点麻油入治病之藥或祛風除濕養氣滋血撩損補虚之藥隨症入之妙
取火法

眷骨二十一節大椎三節共二十四節
合谷一名虎口手大指次指岐骨間
曲池肘外輔骨屈肘横紋頭
頰車一名何關耳下曲頰端近前陷中開口有空
肺俞項後第三椎下兩傍相去各一寸五分千金対乳引強度之
心俞五椎下兩旁相去各一寸五分正坐取之
肝俞九椎下兩旁相去各一寸五分正坐取之
脾俞十一椎下兩旁相去各一寸五分正坐取之

賢俞上十四椎下兩旁相去各一寸五分與膂平正坐取之
高肓俞前四椎下近五椎上兩旁相去各三寸正坐曲肘手
着膂前令端直手大指與膂頭齊以物支肘毋令搖動取之
壯多至五百壯如病人已困不能正坐當令側臥挽上臂令
大齊下氣海毋問穴中極四穴取一穴又灸足三里以引火氣
腰俞二十一椎節下兩手以臂
後乃取其穴
百會前頂後一寸五分頂中央旋毛中可容豆直兩耳尖
中脘心蔽骨與臍之
腹上四寸居
會上紀者中脘也
丹田關元
臍下三寸宛宛中男子生氣之海
氣海臍下一寸半宛宛中女子胞門
三里膝下三寸胻骨外廉大筋內分間陷中兩筋肉分間取之極重按

之則趺上動脉止矣大

衆諸病法

一論中風口噤不開牙關緊閉欲死秘穴頬車二十六穴

八中二穴頬車三里二穴合谷

一論卒中惡風心煩悶毒徼前至五年耻久之取兩足大指下橫紋隨左右即語

一論中風口噤不開机關二穴在耳下八分徼前至五耻骨肢躰廢口中腑則牲命危

一論風中血脉則口眼喎斜口中腑則耻骨扶持疾病若要收全功火戈爲

凡治鼻如癸表調氣血治痰諸法然

聽會二穴在耳前陷中張口得之有穴動脉應手

類車二穴在耳下二世旅許陷者宛中開口得

地倉二穴在橫口吻傍四分外近下有脉微動着是

員也

凡喎向右者爲左边脉中風而緩也宜灸右喎噫中二七壯
右边中風而緩也宜灸左喎噫中二七壯
論風中腑手足不遂等症
百會一穴在頂中央旋毛中
肩髃二穴在肩端兩骨間者宛宛中
曲池二穴在用外轉骨屈肘曲骨中以手洪胸取之
風市二穴在膝外兩筋骨平立舒下兩手着腿中指盡處宛中
三里二穴在膝下三寸胫骨外大筋内筋骨之間陷者宛宛中
絶骨二穴在足外踝上三寸動脉中
凡覺手足痺或不仁或痛良火乃已此中腑之候宜灸此七穴病
論風中臟氣塞涎上不語昏危者下火立効
百會一穴在頂中央方毛中
風池一穴在頷顬後髮際陷中

大椎一穴在項後第一椎下陷者是
肩井二穴在肩上陷卻
曲池二穴在肘中并皆取之
間使二穴同前
足三里二穴同前
凡覺忽中憒亂神思不怡或手足麻痺此
邪氣之客五七壯自
別氣之隨年壯妙素看風八
死凡八風發強忽然痛不止氣
浮中臟之候不問是風濕氣
寸半以三指拨之當其中指下
多一七壯重者二七壯井男左

一論暴啞不能言者
速灸腰俞下四寸并小便陰毛際骨間中各
女右手兒中指頭盡處各灸三壯神效

一論癲癎不拘五般
以兩手中指相合灸之神效

一治癲疾
陽蹻申脉在外踝下赤白肉際
陰蹻照海在內踝下赤白肉際各
三壯要四處着艾作
七壯

一治癎疾
書符灸頭
夜叉神效
陰蹻及癲往諸穴皆宜
并兩足大拇指甲
以兩手
用麥兩處盡燒一處不燒
秘法九夜盡處盡者由平旦神
不知此法
氣不足致使睡臥
神不守舍魂
不依体
九竅燈照之但向暗
中呼其名即醒又
一法攝患人
足拇即大指甲側即甦又法用牙皂末吹
入鼻中亦妙若經
可灸之又一法灸大敦穴
一論婦人
一治陰囊腫痛
取左右膝骨前旁各有一小窩共四穴俗
先以男左女右手足中指頭畫處各灸三
壯又灸腰俞穴
如雞瓜疼痛
謂之鬼眼各灸三
壯即愈
壯又灸腰俞下一寸五分名氣海

六二寸名閉元穴各灸七壯極効

一論眞陰証四肢厥冷腹痛如錐脹急服大附子桂如水此中焦寒之甚宜急灸臍上二穴臍下一次臍左右兩穴

一論中寒陰症神法但手足温暖脉至知人事無汚要有汗即生不暖不汗即死

氣海穴在臍下一寸五分丹田在臍下二寸茨二穴各灸七壯即効

一論哮吼神法

胸甲兩邊名鬱中二穴百會一穴用艾灸之立已

一論霍乱吐利久傷寒忽患咳逆連声不絶指許臂間隨甲婦正直氣不容一壯男左右火到即瘥只是三壯不可多灸

一論吧逆即欬

乳根在乳頭旁寸半

一論欬嗽氣海三五壯氣海直臍下一寸半

令病人仰臥以綿量兩乳中焦其半從乳比至下頭灸處是穴男左女

一治癇如神

式樣 ○十穴 ○十穴

先點定於平正處並脚立用繩一條量脚板周圍截斷却於項前般當中是穴先點記

一論腹中有積及大便閉結心腹諸痛或腸

以巴豆肉搗爲餅填臍中灸三壯可至百

一論咳逆連年咳嗽不愈者

將本人乳下大約離一指頭着其低墮之

骨穴如婦人即按其乳頭直向下看其乳

位灸三壯其灸只可如赤豆大男灸左

不愈則其病再不可治也

論驚風於兩腰眼低陷中之

先備一日前點洗兩腰眼低陷中之穴每穴灸七壯若一壯

灸每穴灸三壯其灸七壯其日期更宜重俱從

處與乳直對不偏者此爲直

頭所到之處卽是直量之地

灸多亦不可灸錯其穴嗽卽愈如

大便中出即用火炙之乘於江河中如虫有黑嘴者即其首也避灸有數節如蛔虫如小蛇如蝦蟇如馬尾如瓜絲如爛麪如蒼蝿如油虫上紫白形鉸定細而可已或如人形如鬼狀

論四花穴治骨蒸勞熱以陷穊心量三縫如石閘斷其多少如此長哉

別圊長陷穊踏脚下前取脚大指爲止後取脚曲跃還在結喉下垂向背後看陷穊止處即以前小孔紙角也可久七壯此四穴並治太陽行背二行扁俞者

名灸至二三十壯而愈者

久垂死者

開三寸是氣海一穴在臍下一寸半

論霍乱已死而腹中有煖氣者
以鹽納臍中以艾灸
不計其數
論偉陽垂死
男左灸右手拿棍
灸三壯即効
論雷胃噎瞤神効
亶二穴令病兩手
亶旁各開三寸四
成下灸至
百壯愈住
膻中一穴在膺部中
行兩乳中間陷中卿肘取之灸七壯
三里二穴在膝下三
寸節外廉兩節間多
止連年不愈謂之厥逆頭痛
耳捲前立灸上二門灸五七壯左痛灸左右痛灸兩
愚眉灸微近後骨縫中小廉骨陷中灸
久乃定永不發

論手族在地上與肩一般高肩上有穴名肩井八

論牙疼痛隨左右所

論牙痛百藥不効
用艾灶如麥大久而
論治心疼神法
兩手肘後陷處酸痛
爛為灶每處炙五壯
論偏墜氣痛妙法
韭麻子一歲一粒去
皮研爛貼頭頂顖上
以帶子綁住一中指
於兩指合縫處艾炙
論蟲病及病魂
中脘一穴或兩分三
再用線比患人五手
十石開三穴分水一
指之長作朝圓黃銅錢圈下
一箇懸於頸上適中
懸於喉上向背后垂
以雙線繫開元舊錢
為率却將頂上之線

耳當門火上三壯立已

是穴先用香油半鍾重湯煮温服即發
其痛立止

皮研爛貼頭頂顖上即令患人仰臥將兩腳掌相對
於兩指合縫處艾炙粒大久久七壯即時上去神効

穴在右當門穴

背至此錢所止脊二骨

之中再錢之兩边點
處各灸一火至一餘壯更服他藥癒積即消其効甚速

論黃疸

病人脊骨自上數至下第十二椎下兩旁各量一寸灸二七壯立止凡灸此入腦注法也

論衄血良法

頂後髮際兩筋間宛中灸三壯立止凡衄血自此入腦注法也

治血秘法

急用綿一條纏足小指左孔取左右孔取右猶出則俱聽取於三壯如衆豆大若血多暫不止者屈手大指就骨節尖上灸各三壯左取右右取左俱衄則俱取

永斷根不發

論脫肛秘法

拔其穴處瘡方可灸不痛則不灸也灸訖後消息人平立取之即向絕地至膀心截斷令患人平立取之即向絕地

百會一穴尾骶一穴各灸三壯灶如小麥當正午時用桃柳枝煎湯不止者

脐平處椎上灸七壯或年深着更於椎上兩旁各灸痔疾先以柳枝濃煎湯洗痔便艾灸其上連灸三五壯忽覺一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢

灸諸瘡法

論一切瘡毒灸痛或不痛或麻木如痛者灸至不痛其毒方拔引聲毒此從治之法也有回生之功隔蒜灸法

隨次而散蒜大以暢達錢厚安瘡上用艾灶於蒜上灸之三壯換蒜復灸殺其大勢不能爲害如瘡大用蒜不起發或陰虛火盛指爛難愈處將如不痛或不作膿及不起發或陰虛火宜多灸而者不治此氣血虛之極也

一論腦項後疽一名天疽
男左女右脚中指下俯
第三紋正中用好蘄艾炙七壯
圍用麪餅敷住上用艾炙卵殼尖上
俗爲對口

一論一背盡疽初起未破
用雞卵半截蓋瘡上四
或泡急灸疔瘡爛揚成竇
灸百餘壯無不愈

一論灸痔神法
四圍當瘡頂以艾炷灸之以爆爲度如不爆難他
者又灸瘡疔蛇蟠蜈蚣大咬癮癧皆效

一論痔漏腫痛膿未粘痛
用艾炷如梧桐子大灸
不可忍
尾細骨尖上七壯全愈

一論癧癧
左右手搦拳後紋當處脈見大艾炷灸二炷三
壯立消

一論瘧歷用蒜搗湯其瘧
上用艾灸皮上七
壯立消
一治兩脚俱是疣瘡腫毒
骨痛用獨蒜切片換再灸至
愈爲効
一論赤白汙班神法
或以針刺之出血亦已
之染毒處即是穴也
此方最易而效良
凡滿仍用槐白皮襯扣傷處用艾灸之亦愈
一論癩狗咬傷并治瘧瘧
有將傷處如前灸之若遍身汗
出其人大困則愈遠年
舂山丹 劉黃士炒熟
艾 班猫
豆大每一 齒傷處用烏桕葉貼瘡口灸十四壯如
七貼之

一八被人打死或踢死急急救負會穴在頭頂中央各旁二寸壯立針
一論婦人難產及胞衣不下
急於產母右脚小指尖不久不再孕及懷孕不成者
一論婦人無子及經生子
一寸反指向上量之用草一條量九寸折半為度
右手中指節文至草盡處以筆點定此不是穴却以原草平摺以
所量畢皆自臍心直垂下兩頭是穴按之有動脈各灸三壯如筋
攣橫安前點處其草
七日內口噤不吮乳多啼者是客風中於腦循流
灸癩骨後是穴
唇撮
稜下宛宛中是穴次頰車二穴各七壯在耳下
一方用
論小兒臍風以艾炙臍
曲頰骨後是穴
兩胃口圓圈一百餘下即止
以黑氈之放臍中四下灸七壯又用新針七箇刺
又用房四角量為火將小兒在火上左右各轉三

遭令出汗即已
論小兒慢驚慢慢脾危
灸百會穴其穴直取
旋毛處是也如有雙
灸後仍與醒脾散等
論小兒雀目夜不見
如小麥大
論小兒吼氣
無名指頭灸之最愈
論小兒脫肛瀉血每
斷臍後撮痛不可忍者
百會二壯
論小兒驚風
男左乳黑痣女右
乳黑痣上週歲灸三壯三歲灸五壯神效
癍棄力不到者但看兩脚面中間帽處有大衝脉即
前後髮際折中橫取兩耳尖折中在頭之中心端正
旋及旋毛不正者非灸灶約小麥許但三五壯而止
補藥
物灸手大指用後一寸內廉橫文頭白肉際者一壯

倫敦人被蛇所傷用茨當
經傳太乙真人藏膀
胱香玉分為末入膀
內後用漆末放射香
時密換棚皮

龍骨　虎骨
朱砂　乳香
五靈脂　小茴
丁香　南木香　雄黃
兩頭尖　青鹽　阿子
沒藥　胡椒　夜明沙

失
人膀胱為五臟之華蓋聲
音之所出人皮毛以
虛而入矣有七情當
音之滋潤腎水由之而生喚理不
入膀胱中用茨炙之有鬱結當解和之或不
則氣不散留滯於肺中多生粘痰而喘急咳嗽或傷
使吐血咳血作寒作熱精神恍惚飲食不
益則必用此丽治其
大無不入小無不主
師無滿世經明妙以
旗人腎以實其子使

之症蚊子盛飛吸人血而得天人之氣故蚊子盛飛
傷人病非此不能達也乳香沒藥來香小茴升麻其
骨蛇骨蛇妙在黃以削痰其元氣宴血行血室
不足用攬皮之漿開胸頭尖巡視谷經絡有推前拽之功以
氣歸氣宅疾散急促之患用炙甘草波五靈脂連操其性使無定
拽諸藥之性使無定復之患用炙甘草波五靈脂連操其性使無定
思勞療失血陰虛潮熱不睡精神昏憒疾
下子宮冷極無子凡百重病無所不能療若用此炙
法則接人性命鬱滯之成功延年益壽得盧扁之妙術矣其法先用麩
作三分先以鋪脊次脇後以麩圈畱藥在內按緊以
至三十枚但覺熱氣自上而下或自下而上一身熱
而睡矣至六十枚必大汗如淋上至泥丸下至湧泉
腳平五勞七傷盡皆拔除至一百枚則病鮮有不永
戒油膩生冷酒色其效難以備述當珍藏之毋輕洩