

醫方類聚卷之二百三十六

婦人門 三十一



產後 七

婦人大全良方 二

產後寒疝

王子亨云產後臍腹大痛山呼吸冷氣乘虛入客於血官局方當歸建中湯  
羊肉湯療虛及產婦腹中痛虛眩不能支持兩脇當臍急痛氣上衝前後相引痛治之如

神

精羊肉四兩當歸 川芎各半兩 生姜壹兩

右細切以水十盞煎至三盞掠去沫去滓

分四服空心熱服壹日來日再作兩日滓

合為壹日煎當壹劑服得效方同 千金當歸

湯療婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞

痛其方無川芎有芍藥 陳無擇云仲景

羊肉湯治寒疝右用生姜羊肉湯服之無

不驗有壹人產當寒月寒氣入產門臍下

腹滿手不得犯此寒疝也醫將治之以抵

當湯謂有瘀血或曰非其治也可服仲景

羊肉湯少減水二服遂愈

產寶療產後心腹切痛不能飲食乏氣忽然

往來寒熱

當歸 川芎 黃芩 人參 甘草 芍

藥 防風 生姜各三分 大黃二分宜相人

之挑人八十分

水七升煮取二升下大黃更煎三沸分

自三服

羊肉湯由千金方無大黃人參桃人有羊肉煮汁

煎藥崔氏同

產後兩脇滿氣痛

經効療產後血氣脇肋脹痛

當歸十分〇得効方八錢芍藥 苦梗 檳榔 枳

穀各八分〇得効方各四錢桂心 青木香 柴胡

各六分〇得効方各三錢

右咬咀以水二升煎取八合去滓空心分

溫二服

療產後惡露不下血氣雍痞脹痛不下食

蘇木 紫葛各十分二分芍藥 當歸各八分桂心

蒲黃各六分生地黄汁叁分

右咬咀以水二升煎取七合下地黄分二

服

當歸散治產後腹痛腹脇脹滿

當歸 乾姜等分

右為末每服三錢水壹錢煎八分入塩醋



少許食前熱服選奇方用酒煎

經効理血氣煩悶脇肋脹滿及痛

芍藥八分 蒲黃 延胡索各四分 當歸六分 荷葉

燕參介

右水二升煎取七合後入蒲黃空心分作二服

廣濟療產後腹痛氣脹脇下悶不下食兼微

利

茯苓 人參 當歸 甘草各六分 生姜

陳皮各四分 厚朴八分

右咬咀以水二升煎取八合去滓分温服  
產後積聚癥塊

京三稜散治產後積血不散結聚成塊或時寒熱不思飲食

京三稜 熟地黃 鱉甲各一兩 桂心 當

歸 川芎 牡丹皮 劉寄奴 赤芍藥

各半 大黃炒 桃人 牛膝各參兩

右爲粗末每服三錢水壹大瓊姜三片煎



至七分去滓溫服

桂心元治產後血氣不散積聚成塊上攻心腹或成寒熱四肢羸瘦煩疼不思飲食

青皮 乾漆

炒烟盡各參分

沒藥

檳榔

當歸

桂心 赤芍藥

牡丹皮

各半兩

大黃

炒桃

人 鱉甲 厚朴

三稜

延胡索

各一兩

右為細末煉蜜元如梧桐大溫酒下三十員

產後血痕

鱉甲元治產後惡露不盡結成血痕乍寒乍

熱心腹脹痛不欲飲食四肢羸瘦或時口乾

當歸 木香

赤芍藥

各半兩

鼈甲

乙兩 大黃

乙兩 牛膝

白朮

水蛭

製

蝨蟲

製

乙分 牡

丹皮 桂心

各參分

鬼箭羽

半兩

右為細末煉蜜員如梧桐子大桃人湯吞

下二十員食前服更宜加減不可連併服

治產後血氣不調腹中生痕結而不散生地

黃煎元一名萬病元

方見調經

凌霄花散治血痕血塊及產後穢露不盡兒枕急痛應于積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之

凌霄花壹分牡丹皮 山梔子仁 赤芍藥

紫荷車 血竭 沒藥 礪砂 地骨皮

五加皮 甘草各二兩紅娘子十桃仁 紅

花 桂心 延胡索 當歸各一兩

右為細末溫酒調壹錢服

產後血痕腹痛及喉痺熱塞本人呼血痕為

兒枕產後即起痛不可忍鐵秤錘煨令通赤滓酒中候溫飲之用斧亦得

治產後血海氣虛腹臍疼痛心胃注悶每遇

紅脉行或多或少及有塊積者蓬莪散博濟

莪茂 桃仁去皮尖 大黃濕紙煨 當歸炒各一兩

桂心 川芎 木香 牡丹皮 延胡索

炒赤芍藥各半兩

右為細末溫酒調壹錢空心臨卧服

產後餘血奔心煩悶

餘血奔心蓋是分解了不便與童子小便并  
擀心下及卧太速兼食不相宜之物所致但  
能依方療之無不痊可

療產後七日內宿血不散時時衝心迷悶

荷葉六分延胡索八分地黃汁二合

右水二升煮二味取八合下延胡索空心

三服忌肉食壹日

經効療產後氣虛冷搏於血血氣結滯上衝

心腹脹滿

當歸 桂心 川芎 吳茱萸 橘皮

生姜各二兩芍藥三兩

右咬咀以水三升煮取壹升去滓空心服

治產後餘血奔心右用陳白梅搥碎濃煎湯

喫金黃散出博濟方治產後惡血衝心時發躁

延胡素壹兩蒲黃半兩桂心一分

右為細末烏梅煎湯冷調下壹錢

沒藥元出博濟方治產後心胃煩躁惡血不快



沒藥研 蠻姜 延胡索 乾漆炒 當歸

桂心 牛膝 牡丹皮 乾姜等分

右為細末醋煮麵糊元如桐梧子大煎麩湯下十元至十五元

產後虛煩

千金療婦人產後短氣欲絕心中煩悶不解

必効方方見干金方

壹方用竹皮若胃中氣逆加半夏二兩忌如

常法與竹根湯淡竹茹湯大同小異

尋常治諸虛煩熱者以竹葉石膏湯温膽湯

殊不知產後與尋常不同如石膏等藥不

宜輕用用之必死

產後口乾痞悶

四物湯方見三因方

產後血渴

黃芩散治產後血渴飲水不止出楊氏家藏方

黃芩 麥門冬等分

右咬咀每服三錢水棧半煎至八分去滓

溫服無時

栝樓根湯療產後血渴出集驗方

栝樓根四兩 麥門冬 人參各參兩 生乾地黃

甘草各二兩 土瓜根五兩 大棗二十枚

右咬咀以水八升煮取二升半分三服產

無地黃麥門冬有牡蠣粉等分

竹葉湯出千金方療產後虛渴少氣力

竹葉升 甘草 人參 茯苓各乙兩 小麥五合

生姜 半夏各參兩 麥門冬五兩 大棗十五枚

右咬咀以水九升先煮竹葉小麥生姜棗

取七升去滓內藥再煎取二升去滓壹服

五合日三夜壹

延胡散出博濟方療產後血渴不止

延胡索 蔚金 乾葛 桂心 青皮

枳殼製等分

右並以好醋浸壹宿焙乾杵為細末每服

壹錢拔粹方徐氏胎產方二錢 冷橘皮湯調下永類鈔方同

不過三服差○胎產方壹方用黃芩麥門

冬去等分煎服

產後乍寒乍熱方 產後瘧疾附

五積散 方見大方科傷寒門

產後乍寒乍熱心痛月候不來如何荅曰敗血充心痛遠臍腹面色無采縱然得効暫時安痊不過三兩日又發服局方黑神散大

効

知母湯治產後乍寒乍熱通身溫壯胃心煩悶方

知母 各二兩 芍藥 各二兩 黃芩 各二兩 桂心 各二兩 甘草 各二兩

右五味咬咀以水五升煮取二升半分三

服 永類鈐方二服 壹方不用桂心加生地黃

產後方論

郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血爲害或陰陽不和所作若作瘧疾治之誤矣如陳無擇評曰只可云敗血循經流入閉諸陽則熱閉諸陰則寒血氣與衛氣解則休亦未盡



善亦有產後病瘧而作寒熱有一日一發或  
 一日二三發或間日一發或三兩日壹發或  
 先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多  
 寒少或但寒但熱者亦有產前病瘧而產後  
 未愈者最難用藥如柴胡常山信砒等斷不  
 可用今有經効草菓飲子生熟飲子用之有  
 效謾備檢閱如易簡方四獸飲亦可用男六  
 德補遺

草菓飲子治婦人產後瘧疾寒熱相半者或

多熱者

半夏泡 赤茯苓 甘草炙 草菓炮去 川芎

陳皮 白芷各二錢 青皮去白 良姜 紫蘇各

錢 乾葛四錢

右咬咀每服三錢重水壹大錢得效方壹盞半 姜

三片棗二个同煎至七分去滓當發日侵

早連進三服無有不安拔粹方承類鈞方同

生熟飲子治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻 草菓仁 厚朴生去粗皮 半夏 陳

皮 甘草 大棗去核 生姜

右八味等分細判和勻壹半生壹半用濕

皮紙裏煨令香熟去紙與一半生者和勻

每服秤五錢重水二錢煎至七分食前一

服食後二服得効方拔料方食前壹服食後壹服永類鈞方云與四獸

飲相似半生半熟亦有法

### 產後羸勞方

許仁則療產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺頭膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此

### 爲羸勞

猪腎乙雙去脂膜四破 當歸 芍藥 生姜各二兩

葱白切 桂心各乙兩

右水八升煮腎取六升下藥煎取二升分

温爲二服永類鈞方同

人參鱉甲散出胡氏方治婦人產後羸勞皆由在

產內未滿百日體中虛損血氣尚弱失於將

理或勞動作傷致成羸勞其狀虛羸乍起乍

卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發歇無常



夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服此大効○永類鈴方治產後日淺起居勞動大過頭膊肢節皮肉痛乍寒乍熱兼咳嗽頭目昏痛盜汗寒熱背膊拘急沉困在床

人參 桂心 當歸得効方去尾 桑寄生 白

茯苓 白芍藥 桃人得効方去皮夫 熟地黄得効

方洗 甘草 麥門冬各半兩○得續斷分

牛膝參 鱉甲炙 黃耆各乙

右為細末每服兔以猪腎壹對去筋膜以

水兩大錢生姜半分棗三个煎至壹錢去

猪腎姜棗然後入藥末二錢鈴方壹錢 入葱三

寸烏梅壹个荆芥五穗煎至七分去滓空

心晚食前温服此藥神妙

增損柴胡湯老孫太保秘方 治產後虛羸發寒熱飲

食少腹脹方出養生必用

北柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮

川芎 白芍藥各等分

右咬咀每服三錢水壹大錢姜五片棗二



枚煎七分去滓食前後溫服日二服拔粹方永

類鈐方同

黃耆元治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛百  
骨節疼痠氣力羸乏

黃耆 鱉甲 當歸炒各兩桂心 續斷

白芍藥 川芎 牛膝 菴蓉 沉香

栝子仁 枳殼各三分北五味 熟地黃各兩

右為細末煉蜜員如栝桐子大食後粥飲

吞下四十員

療產後大虛心腹急痛血氣上搶心氣息乏

補益方

黃耆 白朮 當歸 甘草 人參各二兩

生薑四兩

右先以白羊肉三斤去膜以水壹斗九升  
煮肉取汁五升後下諸藥更煎取三升分

溫三服永類鈐方同

療產後喘乏氣羸腹內絞痛自汗出

類聚書  
廿四

黃耆 人參 茯苓 甘草 白朮 五

味子 芎藭 當歸各八分 澤蘭葉 陳皮

各六分 麥門冬 呵子各二分 桂心 熟乾地

黃各十分

右爲細末煉蜜員如梧桐子大空心溫酒  
下三四十員日再服

胡氏牡丹散治婦人產後虛羸發熱自汗欲  
變羸勞或血氣所搏及經候不調及發寒熱  
自汗羸瘦前宜服之

白芍藥 當歸 五加皮 地骨皮 人

參各半兩 沒藥 桂心各二錢 牡丹皮二錢

右爲細末每服二錢水酒各半瓊如不飲  
酒只川水壹瓊開通錢壹錢麻油蘸之同  
煎七分去滓通口服煎不得攪喫不得吹

產後虛羸方

產寶論曰產後虛羸者因產傷損藏府勞侵  
氣血輕者將養滿日即差重者日月雖滿氣  
血猶不調和故患虛羸也夫產後氣血虛竭

臟腑勞傷若人年齒少盛能節慎將養滿月  
便得平復如產後多因血氣虛弱雖逾日月  
猶常疲乏或因飲食不節調適失宜為風冷  
邪氣所侵搏於氣血流注於五臟六腑則令  
肌膚不榮顏容痿悴故曰虛羸

人參散治產後虛羸脾胃之弱四肢無力全  
不思飲食心腹脹滿

- 黃耆 人參 苝菜仁 厚朴 附子各
- 兩 白朮 當歸 白茯苓 木香 川芎

- 桂心 甘草各半兩 陳皮 良姜 阿梨勒

皮各參分○得  
効方各半兩

右改咀每服四錢水壹錢姜三片棗壹枚  
煎至六分去滓無時溫服

澤蘭補虛元出剛  
繁方療婦人虛勞或本來虛寒  
或產後血脈虛竭四肢羸弱飲食減少血脈  
斷絕血脈不通虛實依源

- 澤蘭葉九分 石膏八分 川芎 甘草 當歸各
- 分 白芷 防風 白朮 藁本 川椒



本草綱目卷之五

十一

厚朴 乾姜 桂心 細辛各五分

右為細末煉蜜員如梧桐子大酒下二三  
十員日再忌海藻菘菜桃李生葱雀肉

羊腎湯治產後虛羸乏力短氣

羊腎乙雙去脂膜 麥門冬 羚羊角屑 北五味

子 茯神 桂心 續斷 黃耆 川芎

當歸各半 人參 附子炮 乾姜各分 熟乾

地黃乙兩

右咬咀先以水二大瓊煮腎至壹瓊去腎

入藥五錢椒二七粒姜錢二片棗三枚煎  
至五分去滓空心溫服

黃雌鷄湯治產後虛羸腹痛

小黃雌鷄乙隻去頭足翅羽腸肚細切 當歸 白朮

熟地黃 桂心 黃耆各半兩

右咬咀先以水七升煮鷄至三升每服藥

四錢以鷄汁壹瓊煎至六分去滓溫服日

三

產寶療產後經三膈諸疾退後身虛無力

澤蘭葉炒 細辛 熟乾地黃各五分 黃耆

當歸 防風各十分 麥門冬去心八分 石膏七分

藁本 白芷 川芎 栝子仁 五味子

甘草各四分 桂心三分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三四十元

救急療產後羸乏不復令肥白方大烏豆淨

拭熬熟如造豆黃法去皮搗為末以臘月

猪脂成煉者和員如梧桐子大酒下五十

負日再服一月內肥白也無所忌

當歸散治產後補虛益血

當歸 羌活各乙 延胡索兩半

右為細末用猪腰子壹隻切作片以水壹

錢入藥末二錢同煎至七分同腰子喫

佛手散治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳

嗽有痰

當歸 川芎 黃耆各乙 北柴胡 前胡

分

右咬明每服三錢袖珍方五錢水壹大瓊桃柳枝各三寸棗子烏梅各壹枚姜三片煎至六分去滓溫服如有痰去烏梅

當歸羊肉湯療產後雖無疾狀但覺虛弱兼

心腹痛欲得補氣力出許仁則方

肥羊肉乙斤去脂水乙斗當歸兩五黃耆兩四

生姜兩六

右以肉汁煮三味取二升五合分為四服若覺惡露下不盡加桂心三兩惡露下多

覺有風加芎藭三兩有冷加茱萸壹兩有氣加細辛二兩有熱加生地黃汁二合療產後雖無餘苦但覺氣虛

當歸十二分乾地黃十分澤蘭葉八分地骨皮

芍藥各七分黃耆 防風 續斷各六分人參

桂心各五分

右為細末煉蜜元如梧桐子大溫酒吞下貳十員

療產後虛羸



類身書

十一

黃雌雞乙隻去毛背上破 生百合煨三枚 白粳米升半  
右依尋常著五味調和縫背合五味汁煮令熟開腹取百合并飴相和汁作羹食之肉亦食令盡略卧佳

產寶療產後虛乏不思飲食四肢皆倦心腹陣痛補虛治氣

人參 芍藥 桂心 甘草 生姜各乙兩  
當歸乙兩 生地黃二兩  
右咬咀每服三錢水兩錢棗貳枚煎至壹

錢去滓溫服日三服

產後風虛勞冷方

治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力面色萎黃飲食減少日漸羸瘦補益白薇元

木香 當歸 桂心 澤蘭葉 牛膝  
白薇 牡丹皮 枳殼 人參 川芎  
厚朴 白朮 續斷 熟地黃 北細辛  
赤石脂 龍骨 禹餘糧 黃耆各乙兩  
茯苓 附子各一分 吳茱萸乙分

右為細末煉蜜為元如梧桐子大食前温酒下三十元

產瘳瘳產後風虛羸瘦勞弱不止肌肉

黃耆 當歸 芍藥 人參 桂心

甘草 川芎 生姜 大棗

右水七升煮取三升分温三服

瘳產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸 人參 生姜 黃耆

豉 粳米 薤白

右水一斗五升先煮猪腎取六升後下諸藥煎至二升分為三服

又方猪腎壹雙煮入葱豉作臠如常食之

延年澤蘭元主產後風虛損瘦不能食令肥

悅方

澤蘭葉 當歸 甘草 厚朴 藁本

食茱萸 蕪荑 白芷 乾姜 芍藥

分石膏 人參 栝子仁 桂心 白

木 分五



藥集卷之三十一  
三十一

右為細末煉蜜丸如梧桐子大酒服十五  
丸至二十五元日二服忌生冷鮓滑猪牛  
肉麪生葱桃李雀肉海藻菘菜

古今錄驗澤蘭元產後風虛勞損羸弱百病  
必效方

澤蘭葉分六白芷 川椒 蕪荑仁 藁本  
北細辛分各四人參 白朮 栝子仁 防  
風 桂心 厚朴 丹參分各五 川芎 當  
歸 甘草分各七 乾地黄分十

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒  
下二十凡至三十九日二服忌如前  
廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥  
白悅澤方

澤蘭分七厚朴 人參 石斛 蕪荑仁  
續斷 防風 桂心分各參 川芎 白朮  
栝子仁 北五味子 黃耆 遠志分各四  
赤石脂 甘草 乾地黄分各六  
右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下二十



九至三十九日二服忌如前

延年增損澤蘭元主產後風虛勞損黃瘦方

澤蘭熬七分 防風 乾地黄 當歸 北細

辛 桂心 茯苓 芍藥 人參 甘草

藁本 烏頭炮 麥門冬 石斛 紫苑

川芎各五分 乾姜 栝子仁 蕪荑仁 厚

朴 川椒各四分 白朮 黃耆各六分 紫石英

石膏各八分

右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下二十

元或三十元

產後嘔逆不食方

療產後嘔逆不止鄧知縣傳

橘紅膏兩 半夏 麩 甘草各半兩 藿香參兩

右為細末每服二錢水壹瓊半姜三片煎

至六分無時候

產後霍亂方

訶子散胡椒湯亦妙方見霍亂門

產後傷寒方

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之  
此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰  
虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之  
劑與服必效如玉露散方見管見或四物湯大全良方  
以生地黄易熟地黄加北柴胡等分煎服或  
人參當歸散秦艽鱉甲散人參輕骨散人參  
百解散逍遙散皆可選用多見不學無聞纔  
見產後發熱不退便以爲熱入血室便以小  
柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而

死者亦有見前失而投以溫劑其熱愈熾者  
諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰  
臆度枉傷人命殊不知此等疾狀是產後去  
血過多而陰虛發熱亦有寒極生熱但以上  
件之藥以脉證選用無不獲安若是陰陽不  
和乍寒乍熱宜增損四物湯如敗血不散者  
宜奪命丹大調經散五積散加醋煎却效  
王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰  
陽俱虛大凡有疾如中風傷寒時氣之類雖



當發汗如麻黃謹不可用取汗毋令過多以  
意斟酌

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脉微弱不  
能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而  
厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下  
厥孤陽上出故但頭汗出所以為產婦無汗  
出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復  
所以便堅者嘔不能食也方可用小柴胡湯  
加生乾地黃主之

秦艽鱉甲散方見大方科諸虛門人參輕骨散神仙百

解散方並見大方科傷寒門

陽且湯治婦人產後傷風十數日不解頭微  
痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

桂枝 芍藥各三兩 甘草炙 黃芩各二兩

右咬咀每服三錢水壹瓊姜三片棗壹枚  
煎至七分去滓溫服無時候自汗者去桂  
加炮熟附子壹枚渴者去桂加栝樓根三  
兩下痢者去芍藥加乾姜三兩心下悸者



去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之煎時入膠飴爲佳若脈浮緊無汗發熱者莫與也

治產後惡露方下忽耳斷絕晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由爲熱入血室不卽治之諸變不測宜服柴胡地黃湯四物湯加北柴胡

產後頭痛方

川芎散治產後頭痛

真天合烏藥皮

大川芎

等分

右爲細末每服三錢秤鎚淬酒調服○袖珍方右等分爲末霹靂酒調下三錢

芎附散治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者

徐明仲先生傳

大附子壹枚醎醋壹碗用火四畔

炙透蘸醋令盡去皮臍川芎壹兩並爲細末每服二錢茶清調下

一奇散治產後頭疼取當歸川芎爲細末每服二錢水一錢煎七分溫服

產後咳嗽方

夫肺者主氣因產後血虛肺經壹感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也若產後喫塩太早而欬嗽者難治  
產後血氣不通咳嗽者何荅曰產後咳嗽多因食熱麵壅納或熱病或有氣塊發時克心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方真黑神散五積散加棗煎服

二母散治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此藥如傷風痰嗽得効方却以尋常傷風藥主治○永類鈴方產後敗血上入於肺咳嗽宜服如傷風嗽則旋覆湯等主治

知母 貝母 白茯苓 人參各半兩 桃仁

杏仁並生去皮尖各一分

右爲細末每服三錢袖珍方八錢水壹錢半煎

至八分無時溫服袖珍方去滓溫服食後如覺腹痛

併服之立有神効



經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母各六分 桑白

皮 茯苓各八分 淡竹葉二十片

右咬咀水二升煎取八合去滓食後分二

服

療產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗各六分 桑白皮二分 乾百合

赤茯苓各八分

右咬咀水二升煮取七合去滓食後分二

服

產後咳癆方

石蓮散治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思

飲食出婦人經驗方

石蓮肉炒兩半 白茯苓兩 丁香兩半

右為細末每服三錢米飲調下無時候珍袖

方永類鈞方同

靈苑治欬逆羌活散

羌活 附子 茴香炒各兩半 木香 白姜各



分一

右五味為末每服二錢水壹錢搗壹捻煎

壹二拾沸永類鈐方十餘沸熱服壹服止

產後血崩方

芎藭湯加芍藥方

芎藭 當歸 芍藥等分

右哎咀每服四錢水錢半煮取七分出滓

無時熱服

治產後崩中下血不止虛羸無力阿膠元

阿膠 赤石脂各賣兩半續斷 川芎 當歸

甘草 丹參各一兩龍骨 鹿茸酥炙烏賊骨

鱉甲炙各二兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒

下二三十元

瑞蓮散治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮百枚燒存性 棕櫚燒存性 當歸 桂心各一兩

袖珍方 鯉魚鱗燒 川芎各參分 檳榔二枚

右為細末每服三錢煨姜酒調下如未止

更進二服或非時血崩無藥可治但進三服卽止

產後月水不通方

夫婦人衝任之脈爲經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經上爲乳汁下爲月水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣而或去血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或壹歲之內而月經不行此是常候卽非病也何必通之諺云

姪假是也若半歲而行者或四五个月便經行者皆是少壯血盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必四肢尪羸肚大青筋頭大髮焦疔啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脈虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥自然通行若以牛膝紅花蘇木乾漆蟲蟲水蛭等藥以通之則爲害滋大經水枯竭則無以



滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之自明補註

### 產後四肢浮腫方

夫產後勞傷血氣腠理虛則爲風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變爲水腫氣腫者發汗卽愈水腫者利小便差也治產後遍身青腫疼痛產後血水疾

出婦人經驗方

乾漆 大麥蘖

等分

右各爲細末以新瓦罐子中鋪壹重麥蘖壹重乾漆如此填滿用塩泥固濟火煨通赤放冷研爲散但是產後諸疾熱酒調下二錢

永類鈔方同

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉 防己

等分

右爲末每服二錢溫酒調下不能飲者醋湯調亦可

永類鈔方同



產後腹痛及瀉痢方

的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入  
大腸爲瀉分過則愈雖洞泄不禁下青黑  
色物亦驗因食傷動用調中湯方見和荆劑局方  
芥大者四五穗於琰內然火燒成灰不得  
犯油火入麝香少許研沸湯壹兩呷調下  
此藥雖微能愈大病宜勿忽之得效方同

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方

產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿

虛乏未復或勞動太早或誤食生冷若行起  
太早則外傷風冷乘虛入於腸胃若誤食生  
冷難化之物傷於脾胃皆令洞泄或瀉甚者  
變爲痢也若血滲人大腸則爲血痢難治泄  
謂之產子痢是也得冷則白或如魚腦得熱  
則赤黃或爲驟血若冷熱相搏則下痢赤白  
或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食  
不進便利無常日夜無度產後本虛更加久  
痢不止無力瘦乏愈見羸弱謂之虛羸下利

又有產後氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢  
治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則  
調之滑者澁之虛羸者補之水穀不分者當  
利小便若產婦性情熱者不能寬解須當順  
其氣未有不安者也治之各有方  
黃連元深師療產後冷熱痢

黃連

六兩 烏梅 三兩 乾姜 二兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大空心米飲  
下三十元忌猪肉 永類鈔方同

經效治產後赤白痢臍下氣痛

厚朴

八分 當歸

枳殼

阿子肉

各六分 甘草

五分 肉豆蔻 五分 薤白 參分

右水壹升煮取九合空心分爲三服

張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連

四兩 阿膠

蒲黃

梔子仁

各壹兩 當歸

壹兩 黃芩 二兩 黃蘗皮 參兩

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大飲下六十  
丸日三夜膏立定破血止痢



必效療新產後赤白痢疾心腹刺痛

薤白切乙 當歸二兩 酸榴皮參 地榆四兩 粳米

五阿膠 人參 甘草 黃連各兩半

右咬咀以水六升煮取壹升日三服壹方

有厚朴壹兩千金方只有前五味永類鈐方同

療產後赤白痢疾

黃連八分 阿膠六分 赤茯苓 當歸 黃蘗各四分

右為末煉蜜員如梧桐子大粥飲吞下二

十員空心

療產後下痢赤白有血

赤石脂 黃連 地榆各六分 當歸四分 乾姜

甘草各參分 厚朴拾二分 葱白七莖

右水二升煎取八合空心分作兩服

膠蠟湯深師療產後下痢

阿膠 當歸各六分 蠟壹斤 雞子大 粳米一合 黃連十分

右細切以水六十先煮米令蟹目沸去米



內藥煮取二升入阿膠蠟煮冷烱分溫三服

又療產後赤白痢臍下氣痛

當歸八分厚朴 黃連各十分肉豆蔻五枚甘草

六分

右哎咀以水五升煮取二升去滓分溫三

服

必効療產後痢日五升行者方取木裏蠹虫

糞炒令黃急以水沃之稀稠得所服之差

止獨狐柰酒訥方

硃砂煎元治一切積滯化氣消食補益真氣

產後逐敗血補虛至善

硃砂揀通明無石者別研如粉金鈴子去皮核天雄無用

煮五七百沸候軟刮去皮常歸各淨秤二兩巴戟 檳榔

舶茴香炒木香 附子炮沉香各壹兩阿魏

半兩米醋磨成膏入諸藥肉蓯蓉一兩

右為細末以無灰酒煮白麵糊員如梧桐子大每服三十元空心日午溫酒下此方

家家有子家婦人常病蓐中下痢日久甚  
困篤百方不差士人李潛善醫曰蓐中痢  
與他痢不同常痢可用苦澁藥止之蓐中  
痢生於衄不足投澁藥則血愈不行痢當  
更甚

又許仁則祕方

神麴末

五合炒

枳殼

白朮

各六分

人參

四分赤

石脂

拾分

右爲細末米飲調下方寸匕

療產後下血不止

桑耳

各

芍藥

各

地榆

茜根

牛角腮

阿膠

各六分

艾葉

鷄蘇

各六分

白龍骨

十二分

右咬咀以水二升煮取八合分三服  
當更甚爲予作礪砂法云此藥最能治產後  
痢先以桂元小下之次投礪砂元日九十  
元利頓減半次日遂愈礪砂元產後雖無  
疾亦宜服之能養血氣去積滯

桂元方

沉內  
翰方



礪砂 桂心 甘遂 丁香 木香

芫花 以礪砂炒焦 已上等分 巴豆 去心皮不 去油減半

右為細末麵糊元如菜豆大每服三元三元溫水下加減更量虛實潛名醫也云此元取積最勝不以久近皆能消化

產後痢疾作渴方

產後下痢作渴夫水穀之精化為血氣津液以養臟腑臟腑虛燥故痢而渴若引飲則難止及溢水氣脾胃既虛不能剋水水自流溢

浸漬皮膚則令人腫但止其渴痢則自差必効療產後痢而渴飲無度數

麥門冬 十二分 烏梅 二十箇

右細剉以水壹升煮取七合細呷

經效療產後久痢津液竭渴不止

龍骨 十二分 厚朴 茯苓 黃耆 麥門冬

人參 各八分 生姜 六分 大棗 十四箇 並細剉

右水壹大升煮取七合空心分兩服 永類 同



產後大小便不通方

產後大小便不通者腸胃本挾於熱因產血  
水俱下津液燥竭腸胃痞澁熱氣結於腸胃  
故令大小便不通也

葵根湯療產後淋瀝

出千金方

葵根二兩通草二兩車前子一斤亂髮灰大黃

桂心各一兩冬瓜汁七合生姜六兩滑石末別研壹兩

右丸味切以水七升煮取二升半去滓下  
滑石末分三服以愚考之既有大黃亦可

治大便不通故錄于此更宜斟酌量虛實而  
投之

產後遺糞方

廣濟療產後遺糞方取故燕窠中草燒為末  
以酒調下半錢亦治男子

集驗方

礬枯牡蠣熬

右等分為末酒服方寸匕日三亦治男子  
產後諸淋方

產後諸淋因產有熱氣客於脬中內虛則起  
數熱則小便澀痛故謂之淋

又有因產損氣虛則挾熱熱則搏於血血即  
流滲於胞中故血隨小便出而為血淋淋者  
如雨之淋也

集驗療產後患淋小便痛永類鈔方此下云此氣虛挾熱產前

當安胎產後當思逐血

通草參兩大棗二十枚葵子一升白朮兩榆白皮

五石葦各二兩黃芩兩

右以水八升煮取二升半空心服溫呷干

金有甘草生薑

治產後小便淋澀不通

葵子一合朴消八分

右水二升煮取八合下硝分兩服

滑石散千金療產後淋

滑石五分通草五分車前子各四分葵子各四分

右為末以漿水調服方寸匕永類鈔方同至二

匕為妙



療產後小便不通張不愚方

陳皮壹兩 去白

右為末空心溫酒調二錢壹服便通

療卒不得小便

杏仁十四箇 去皮尖

右炒為末和飲頓服立通

古今錄驗療產後勞傷熱大小便赤澁

雞蘇壹分通草拾分冬葵子叁分芍藥 滑石

芒硝各八分生地黄拾二分

右水三升煮取八合下芒硝空心分三  
療臍轉小便不通八九日

滑石十分 叁分寒水石八分

右水二升煮取八合空心分三服

治產後小便不通腹脹如鼓悶亂不醒蓋緣

未產之前內積冷氣遂致產時尿胞運動

不順用搯於產得効方 產婦臍中填可與臍平

却用葱白剝去麤皮十餘根作壹縛得効方 作

束切作壹指厚安搯上用大艾炷滿葱餅



子大小以火灸之覺熱氣真入腹內即時  
便通神驗不可具述出產乳集

木通散治產後小便不通

木通 大麻仁 葵子 滑石 檳榔

枳實 甘草各半兩

右為粗末每服三大錢水盞半煎至七分  
去滓溫服

產後小便數方

栝樓湯集驗療產後小便數渴

桑螵蛸 甘草並黃連 生姜各二兩 栝樓

根 人參各參兩 大棗五十箇

右細切以水七升煮取二升半分三服忌

猪肉冷水承類鈔方同

產後小便不禁方

廣濟療產後小便不禁以雞尾毛燒作灰細

研溫酒調方寸匕服日三

固脬散治婦人臨產時傷手胞破小便不禁

黃絲絹自然黃者不用染成者參尺以炭灰汁煮極化爛用清水洗去灰令

盡入黃蘗半兩蜜壹兩白  
芫根二錢馬屁勃木二錢

右用小壺升再煎至壹瓊空心頓服服時  
飲氣服之不得作聲如作聲無効

產後陰脫玉門不閉方

當歸散治陰下脫方見前

陳氏玉瀧湯治婦人產後用力太過產門突  
出以四物湯入真竜骨末少許煎空心連  
進二服麻油湯熏洗

樗枝散治產後子腸下出不能收拾不論年

深者皆治之

樗枝取皮焙乾

右用水五升連根葱五條漢椒壹撮同煎

至三升去滓傾在盆內乘熱熏候通手淋

洗如冷傾入五升瓶內再煎壹沸依前用

一服可作五度用洗了睡少時忌蘆藏鮮

醬濕麪發風毒物及用心力房勞等事得

同方

古今錄驗療產後陰下脫方



驚頭

二箇 陰乾 葛根 壹斤當 作壹兩

右二味為末酒服方寸匕日三服

皂角散治產後魘

皂角樹皮

川練樹皮

各半

皂角核

壹斤

蓮壹合 去心

右為粗末用水煎湯乘熱以物圍定熏通

手洗於淨房中就熏洗處鋪薦席纔熏洗

可以自挹乾便喫玉露通真元熱酒下二

元使仰睡

方見 通治

產後乳汁或行或不行方

凡婦人乳汁或行或不行者皆由氣血虛弱

經絡不調所致也乳汁勿令投於地蟲蟻食

之令乳無汁若乳盈溢可發東壁上佳或有

產後必有乳若乳雖脹而產後覺作者此年

少之人初經產乳有風熱耳須服清利之藥

則乳行若累經產而無乳者亡津液故也須

服滋溢之藥以動之若雖有乳又却不甚多

者須服通經之藥以動之仍以羹臠引之蓋

婦人之乳資於衝脉與胃經通故也有屢經  
 產而乳汁常多者亦婦人血氣不衰使然也  
 大抵婦人素有疾在衝任經者乳汁少而其  
 色帶黃所生之子怯弱而多疾  
 療乳婦氣脉壅塞乳汁不行及經絡凝滯妳  
 乳脹痛留蓄邪毒或作癰腫此藥服之自然  
 內消乳汁通行

葵菜子

炒縮砂仁 各等分

右為細末每服二錢熱酒調下永類鈴滋方同

益氣脉榮衛行津液上蔡張不愚方常用  
 極有驗

產寶療產後乳無汁以猪脰如食法煮清粥  
 食之驗

靈苑方下乳汁立効方

粳米 糯米 各半 藜苳子 壹合並淘淨 生甘草

兩半

右煎汁豈升研前藥令細去滓分作三服  
 立下



湧泉散療乳無汁成都教授單驤方亦治乳  
結癰腫

穿山甲洗壹兩灰炒令燥

右爲細末酒調服方中B

下乳方

大麻仁去殼生鰕

右同研爛去滓用酒水各壹瓊瓦翳輝玉

壹瓊半有餽食後臨臥溫服仍用被覆睡

乳卽通流劉柳溪傳

又方必用方云漏蘆栝樓皆要藥或云多食  
猪蹄羹栝樓取子淨洗炒令香熟槌碎取  
仁研細瓦上攤漚令白色研爲細末溫酒  
調下壹錢服了合面臥少時未效再作壹  
方瓜樓壹枚熟擣以白酒壹斗煮取四升  
去滓溫飲壹升日三

產後乳汁自出方

產後乳汁自出蓋是身虛所致宜服補藥以  
止之若乳多滲滿急痛者溫帛熨之產寶有

是論却無方以治之若有此證但以漏蘆散亦可亦有未產前乳汁自出者謂之乳泣生子多不育經書未曾論及

產後吹妳方

夫產後吹妳者因兒喫妳之次兒忽自睡呼氣不通乳不時洩蓄積在內遂成腫硬壅閉乳道津液不通腐結疼痛亦有不痒不痛腫硬如石名曰吹妳若不急治腫甚成癰產後吹妳最宜急治不爾結癰逮至死者速與服

皂角散 栝樓散 傅以天南星散以手揉之則

散矣 出指迷方

栝樓散方 徐氏胎產方 ○永類鈴方治產後

吹妳腫硬疼痛欲結癰輕則為吹妳妬乳重則為乳癰

乳香 一錢 栝樓根末 一兩

右研令均溫酒調二錢服 按梓方河

天南星散 天南星為末用溫湯調以鵝翎塗

之 按梓方徐氏胎產方同永類鈴方又以南星末姜汁調南星作末塗之效



皂角散方詩曰婦人吹妳意如何皂角燒灰  
蛤粉和熱酒壹盃調八字須臾揉散咲呵

呵承類鈴方同  
淨軒方拔粹方

治妳結硬疼痛出經驗方百藥煎為細末每  
服三錢酒一錢煎數沸熱服

產後妬乳方

療產婦乳初結脹不消令敗乳自退方

瓜樓青箇半生半炒大粉草一寸半生半炙生薑一塊半生半煨

右同剉用酒壹碗煮取壹錢去滓服之其

痛一會不可忍即拽去敗乳臨卧再一服

順所患處乳側卧於床上令其藥行故也

婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔之黃汁

出方

集驗論曰凡婦人女子乳頭生小淺熱瘡搔

之黃汁出浸淫為長百種療不差者動經年

月名為妬乳病婦人飲兒者乳皆欲斷世論

苟抄乳是也宜以赤龍皮湯及天麻湯洗之

傅之物飛鳥膏及飛鳥散佳始作者可傅以

黃芩漏蘆散及黃連胡粉散並佳

赤龍皮湯方

槲皮切叁升

右以水壹斗煮五升夏冷水秋冬減之分以洗乳亦洗諸深敗爛久瘡洗畢傅膏散千金同

天麻草湯方

天麻草切五升

右以水壹斗半煎取壹斗隨寒温分洗乳

以殺痒也此草葉如麻葉冬生夏著花赤如兒尾花亦以洗侵淫黃爛熱瘡痒疽濕陰蝕瘡小兒頭瘡洗畢傅膏散千金同

飛鳥膏散方

用燒朱砂作水銀上黑煙名細粉者叁兩兩熬令焦燥

石叁兩  
煨粉

右二味以絹篩了以甲煎和之令如脂以傅乳瘡日三作散者不須和有汁自着可用散亦傅諸熱瘡黃爛侵淫汁瘡蜜瘡丈



夫陰蝕痒濕諸小兒頭瘡疔蝕口邊肥瘡  
蝸瘡等并以此傅之千金同

黃連胡粉膏散方

黃連二兩胡粉拾分水銀壹兩同研  
令消散

右三味擣黃連為末三物相和合皮裏熟  
按之自和合也縱不成壹冢旦得水銀細  
散入粉中也以傅乳瘡諸濕痒黃爛肥瘡  
若著甲煎為膏千金同

宣明論

當歸人參散治產後虛損痿弱難以運動疼  
痛胃滿不思飲食

當歸 白朮 黃芩 芍藥 大黃

茯苓去皮陳皮各半兩人參 黃耆剉厚朴去

生川芎 官桂各三錢甘草一兩枳殼四錢去

右為末每服三錢水一盞生姜三片煎至  
六分去滓不計時候溫服如大便閉以此  
散下和中丸

辰砂大紅丸治產後寒熱運悶血食塊硬疼

痛不止

朱砂壹兩壹半入藥一半衣 附子炮 沒藥半兩 海馬半錢

乳香 菴蓉 肉桂 玄胡 薑黃 礪

砂各半 班猫分一 生地黃壹兩

右為末酒煮麵糊為丸如酸棗大每服壹丸煎當歸酒下放溫經水不行煎紅花酒

參聖散治產後赤血痢不止

烏魚骨炒 燒絲灰 血餘灰汁脂者各等分

右為細末每服壹錢煎柘榴皮湯調下熱

服

沒藥丹治產後惡不下月候不行血刺腰腹急痛或一切腸垢沉積堅滿痞痛作癢往來或燥熱煩渴喘急悶亂支體疼倦大小人心腹暴痛孕婦自利惡物過多不宜服燥熱極甚血液衰竭不可強行宜調氣養血細詳證用

沒藥壹錢 當歸 大黃壹兩 牽牛二兩 官桂壹分

同為輕粉 礪砂各壹錢



右研勻醋麵糊爲丸如小豆大每服五丸  
至拾丸溫水下以快利及積病下爲度雖  
利後病未痊者後再加取利止心腹急痛  
前乳香下未止亦大便利

朱砂班猫丸治婦人產後喫硬食變作血氣  
食塊無問久新

皂角末二錢巴豆四個朱砂壹錢礪砂壹錢皂子壹錢

乾蝎壹箇斑猫十個紅娘子五個水蛭三個

右爲細末蜜和丸都分作十五丸每服壹

力至一九三丸溫酒下初更喫平明取下  
血化水十年之病皆治之或大便或小便  
不多

東垣試効方

半產妄用寒涼藥有悞論

婦人分免及半產漏下昏冒不省瞑目不知  
覺蓋因血暴亡有形血去則心神無所養心  
與包絡者君火與相火也得血則安亡血則  
火之上熾故令昏冒火乘其肺瞑目不省人

事是陰血暴去不能鎮撫也血已虧損往往用滑石甘草石膏之類乃辛甘大寒之藥能瀉氣中之熱是血虧瀉氣乃陰虧瀉陽使二者俱傷反爲不足虛勞之病昏迷不省者上焦心之熱也此無形肺之熱用涼寒之藥驅令下行豈不知上焦之病悉屬於表乃陰證也汗之則愈今反下之幸而不死暴虧氣血生命豈能久活又不知內經有說病氣不足宜補不宜瀉但瞑目之病悉屬於陰宜汗不

宜下又知傷寒鬱冒得汗則愈是禁用寒涼藥也分免半產本氣不病是暴去其血亡而補血又何疑焉補其血則神冒常時血下降亡今當補而升舉之心得血而安神不昏矣血若暴下是秋冬之令大旺能舉而升之以助其陽則目開神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足名曰全生活血湯



柴胡二錢當歸身二錢酒製生地黃壹錢夏熟地壹錢

黃川芎壹錢防風二錢

諸陽既陷何以知之血下脫故也

細辛各五分蔓荆子各五分藁本一錢羌活壹錢獨

活各二錢升麻叁錢葛根二錢白芍藥叁錢炙甘草

二紅花三錢

右件咬咀如麻豆大每服五錢水二盞煎

至壹盞去滓稍熱服食前

御藥院方

黑神丹治婦人產後大發熱消渴不止煩燥不休或汗病後胃腕愛水者並宜服之

黑附子炮製去皮天麻去蘆天南星炮製

去蘆半斤半夏漿水煮麻黃去根乾姜炮已上

半草烏頭二兩炮製白附子炮黃色麝香

去毛細天雄二兩慢火上炙熱好酒內蒸

童子小便內蒸七遍搗一坵子約深五寸

先用熱火坵內炙乾去火坵內酒酒約半

升天雄在內用磁椀蓋定周匝泥了不教漏氣冷定取出用之

右壹斗膏味各修製訖處碾為細末煉

蜜和搜成劑約搗千餘杵凡如彈子大發  
熱渴用蜜水化服欲出汗熱酒化服下病  
後胃脘硬愛水依前用蜜水化服壹丸  
當歸血竭丸治婦人產後惡物不下結聚成  
塊心胃痞悶及臍下堅痛

當歸二兩炒剉血竭二兩蓬莪茂二兩芍藥二兩五

靈脂四兩

右件爲細末醋麩糊和丸如梧桐子大每  
服袖珍方五四十九溫酒下或溫粥飲下  
六拾九

空心食前

得効方

遺溺

補脬飲治婦人產後傷動胞破終日不能小  
便但漏濕不乾

黃絲絹生者乙白牡丹根皮末千葉者白

及末乙

右用水壹椀煎至絹爛如飴空心頓服服  
時不得作聲作聲不效



恠疾

婦人產後忽兩乳伸長細小如腸垂下直遇  
 小肚痛不可忽危亡須臾名曰乳懸經驗良方  
名芎歸湯將川芎當歸各二斤半斤剉散於瓦  
 石器內用水濃煎不拘時候多少溫服余  
 嘗斤半剉作大塊用香爐慢火逐旋燒煙  
 安在病人面前卓子下要煙氣直上不絕  
 令病人低頭伏卓子上將口鼻及病乳常  
 吸煙氣直候用此壹料藥盡看病訂如何

或未全安略縮減再用壹料如前法煎服  
 及燒煙熏吸必安如用此二料已盡雖兩  
 乳略縮上而不復舊用冷水磨草麻子壹  
 粒於頭頂心上塗片時卽洗去則全安矣  
 產後

芸薹散治產後血氣衝心不記人事

芸薹子 生地黃各等分

右同研入生薑七片酒水各半盞童便少  
 許煎五分服

奇效方治產後油珍方經驗良方血上心已

死徐氏胎產方血止右用真鬱金燒存性

為末袖珍方每服一錢臘醋壹合調灌之

立活

半夏茯苓湯治產前胸中宿有痰飲產後多

致眩暈

半夏湯洗白茯苓去皮陳皮去白白朮各壹兩丁香

縮砂各五錢粉草壹錢

右剉散每服肆錢生薑三片烏梅壹箇煎

食前溫服

芎歸湯治產後去血多眩暈頃刻害人多服

取効心悶氣絕紅花末酒調壹匕服未效

併服方見前

又方舊漆器燒微烟逼面熏之却不可太甚

恐虛怯人不禁

又方韭菜切入藏瓶中以熱米醋燒紙密封

瓶口勿令泄氣以瓶背向產婦熏立醒

加味五積散治產後敗血不散陰陽相勝作



爲寒熱入米醋半合煎或外感寒邪頭痛  
體疼發熱不退除木香茴香加生姜棗子

煎方見  
通治

產後傷寒多因血虛以下諸方選用至於竹  
葉石膏湯單小柴胡湯雖是傷寒退熱之  
劑更宜審訂似難輕用恐致天枉

逍遙散治產後血虛發熱感冒熱潮身疼頭

重心忪口乾方見  
調經

五苓散治產後煩渴潮熱把葉去白毛蜜

塗炙麥門冬二十粒去心煎湯服方見大  
方科諸

暑  
門

黃耆益損湯治產後血虛自汗痰嗽寒熱口

淡微泄服燥劑不得者宜服方見大方  
科諸虛門

柴胡地黃湯治產後惡露方下忽然斷絕晝

日明了暮則膽語寒熱往來如見鬼狀此由

熱入血室不即治之諸變不側

北柴胡去蘆  
二兩半夏湯洗  
條參去蘆黃芩各  
兩豉粉

草五錢生乾地黃二兩

右劉散每服四錢水壹盞半生姜三片紅棗壹枚煎服未效再服四物湯加北柴胡有痰加半夏

神效白散子治產後痰血結滯發為潮熱心胸如火煩燥口乾諸藥不効

大川烏去皮南星 半夏 白附子各壹兩

羌活去蘆黃芩各五錢

右生用劉散每服三錢生姜五片水壹盞半煎服効

大聖散加朱砂酸棗仁湯下効方見求嗣

蘇合香元童便調服即醒方見大方

妙香散生乾地黃當歸湯調立効方見大方

又大聖散治產後血虛肉理不密故多汗因

遇風邪搏之則變瘧口噤不開背強而直

如發癩狀搖頭馬鳴身反折須臾十發氣

息即絕宜速斡開口此藥灌之稍緩即汗

出如雨手扶不及不可治宜加大川烏細

辛防風嫩黃耆方見求嗣



獨活寄生湯治產後血虛生風手足抽掣筋  
脉攣急時發搐搦乍息不遂或因勞役太  
早風邪乘間而入服之立愈有痰問服加  
味壽星元力見大方科腰  
痛門及諸風門  
麻黃根散治產後虛汗不止○永類鈴方此  
下云此陰血裏虛陽氣表實陽加於陰陰虛  
不復者汗出不止遇風則變為瘧或虛乏羸  
瘦唇口乾燥經水斷絕津液竭也

當歸

黃耆

麻黃根

牡蠣

煨爲粉

人參

粉草

各等分

小麥

二合○  
鈴方無

右剉散每服四錢水澄盞煎溫服不拘時  
候

如神湯加桃仁木瓜煎治產後餘血不盡流

入腰脚疼痛至甚

即加味五積  
散方見通治

五香連翹湯除大黃入竹瀝少許煎治惡露

方行忽然斷絕腰痛兩股如錐刀刺痛皮

膚或有堅赤腫處恐爲癰瘍急服此散方見

大方科  
癰疽門

產後嘔逆不止方

橘紅壹兩半夏麩

甘草各半兩藿香兩參

右判散每服二錢水壹盞生姜三片煎不

拘時溫服

產後霍亂三方渴而飲水者五苓散不飲水

者理中元虛冷者加附子來復丹亦效方見

大方科諸暑門及泄瀉門痼冷門

大科煮芎藭湯治產後榮血暴絕氣急喘促

方見產難即沸手散

四物湯治產後血乾痞悶心煩去地黃加人

參烏梅方見通治

當歸芍藥散血渴方見娠

黃耆散治產後風虛勞後羸瘦不思飲食四

肢疼痛

黃耆 白朮 木香 羚羊角屑 人參

當歸去尾桂心 白芍藥 川芎 白茯苓

各半兩甘草壹分

右判散每服三錢生姜三片紅棗二枚煎



不以時溫服

小調經散產後性理鬱發喘急桑白皮杏仁

煎湯調下方見三因方

石蓮散治咳逆嘔吐心怔目暈可思飲食

石蓮肉炒兩半 白茯苓兩一 丁香兩半

右為末每服三錢米食調不以時服

加味五積散治產後因飲動傷腹痛至甚水

穀不化洞泄腸鳴除麻黃加高良姜熟蘇

附生姜烏梅紅棗煎方見通治

四君子湯治產後腹微疼泄瀉不止烏梅陳

米煎湯調服方見小方科通治門

黃連阿膠元治產後熱證下痢全赤煩渴發

熱小腑不利每服三十元陳米烏梅湯下

方見大方科咳嗽門

理中湯治產後虛證下痢純白腹痛裏急外

重手足冷加木香煨肉豆蔻每服三錢陳

米煨烏梅煎空心服方見大方科泄瀉門

真人養臟湯產後虛弱冷熱不調下痢赤白

或有膿血裏急後重臍腹疔痛日夜無度

宜服 方見大方科泄瀉門

阿膠枳殼圓治產臥水血俱下腸胃虛竭津

液不足大便秘澀 方見和劑局方

又方用蒸涎調好茶爲元復以茶吞下必通

或用葱白十數莖濃煎點茶連葱嚼服神

効不動真氣

又方四物湯去熟地黃用生地黃加青皮去

穰煎服效

蘇麻粥治產後有三種疾鬱冒則多汗汗則

大便秘難於用藥惟此方效 方見大方科秘澀類

木通散治產後小便不通

木通 大麻仁 葵子 滑石 檳榔

枳實 甘草 各半兩

右判散每服三錢水壹盞半煎溫服不拘

時候

蒲黃散治產後大小便不利下血

車前子 黃芩 蒲黃 生地黃 牡礪



芍藥 各等分

右為末空心米飲服方寸匕忌麪蒜

治產後子腸下山不能收者年深者皆治之

枳殼去穰二兩煎湯溫浸良久即入

又方考鴉酸草壹握煎湯用草不開孔纔熏

可收壹半稍溫下手洗並收入而安

濟陰丹治產後百病百日内常服除宿血生

新血令人有孕生子充實亦治男子亡血諸

疾

木香 炮 茯苓 京墨 燒 桃仁 去皮尖炒 秦

芎 甘草 炙 人參 桔梗 炒 石斛 酒浸 蠶布

燒 藁本 各二兩 當歸 桂心 乾姜 炮 細辛

牡丹皮 川芎 各半兩 川椒 炒 山藥 各叁兩 澤

蘭 熟地黄 香附子 各四兩 蒼朮 八兩 大豆

卷升 半 糯米 炒壹升

右為末煉蜜元每兩作六元嚼細食前溫

酒醋湯任下

人參養血元治女人稟受怯弱血氣虛損常

服補衝任調血脉宜藥破積退邪熱除寒痺  
緩中下堅脹安神潤顏色通氣散悶兼治婦  
人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈及產  
出月羸瘦不復常者

人參 赤芍藥 川芎 菖蒲妙各當歸

熟地黃五兩 烏梅肉兩

右爲末蜜搜杵數千下元如梧子大每服  
五十元至一百元溫酒或米湯下食前服  
捷徑方治用毒藥攻胎藥毒衝心外證牙關

緊急口不能言兩手強直握拳頭低自汗  
身微熱外證與中風相似但其脉浮而軟  
十死一生醫多不識若作中風治之必死  
無疑用白扁豆二兩生爲末新汲水調下  
卽效

內灸散治婦人產前產後壹切血疾血崩虛  
憊腹脇疔痛氣逆嘔吐冷血冷氣凝積塊硬  
刺痛泄下青白或下五色腹中虛鳴氣滿堅  
疝瘕血腰疼口吐青水頻產血衰顏色青黃



勞傷劣弱月經不調下血墮胎血迷血運血  
疲時發疼痛頭目眩暈惡血上心悶絕昏迷  
惡露不乾體虛多汗手足逆冷並宜服之

藿香葉

丁香皮

熟乾地黄

洗肉桂去

皮各壹兩

甘草炙山藥

當歸

去蘆洗白朮

白芷

各八兩藁本

去蘆

乾姜

炮

川芎黃耆

去苗各

木香壹兩陳皮

去白

白芍藥十兩茴香

壹兩

右剉散每服三錢水一大盞入生姜五片

艾一團同煎至七分空心食前熱服爲末  
溫酒調下亦得如產後下血過多加蒲黃  
煎服惡露不快加當歸紅花煎服水瀉加  
肉豆蔻末煎服嘔吐加藿香生姜煎上熟  
下冷加荆芥煎但是腹中虛冷血氣不和  
並宜服產後每日一服則百病不生丈夫  
虛冷氣刺心腹疼痛尤宜服之

下乳汁

奇効方麥門冬不拘多少去心焙爲末酒磨

真犀角約一錢同麥門冬末二錢溫酒調  
不過二服便下不以時候

澹軒方

初產後

婦人產後要平安急飲新泉數口覺惡露胞  
衣隨即下更無血暈解相干

產中風搐

凡血風皆治農  
煎荆芥易亦得

荆芥專祛產毒風折來新蕙火微烘研為細  
末調溫酒一服三錢立見功

產前後血渴

產前止渴用蒲黃濃煎茅根作點湯設若湯  
生并產後茅湯壹味亦良方

血暈

火煉松煙墨二錢通紅醋淬更重研急溫好  
酒來調下血暈須知壹服痊  
產後須訪血暈人急燒乾漆器來熏直教煙  
入鼻中去便是惺惺無事人

產後渴



產後渴生何藥治只須剝取縮砂皮煎湯百沸通口服壹盞止之多不宜

產後傷風眼昏

產後傷風眼不明藥求荆芥不難成日乾新蕪研爲末好酒童便服便寧

乳硬

傍乳堅硬不和桑酸醋同調細麪糊盪以佳湯乘熱貼自然消散更無憂

產後發狂

產後因驚或發狂清心多用服牛黃清心更有一般荆芥末當歸湯點亦良方

產後陰脫腸脫

陰脫蛇床子最宜盛於絹袋蒸熨之生腸不下煎枳殼湯浸移時腸復歸

產後血渴

產餘血渴五靈脂炒末二錢水服之或取烏梅二三个水煎同服亦能醫

產後血上心

產後衝心人已死爵金壹味効神靈燒灰存  
性醋調服灌下二錢能再生

產後大便秘

產後大便多秘澁只以正氣驟乖常細研壹  
味真蘇子數沸湯煎服最良

肘後方

產後血運絕方細斷生鷄肝內一升熱酒中  
訖漉出滓淳酒冷如人肌壹服不能飲者  
可數口進

傳效運方生地黃汁半升酒半升相和頓服  
血卽下立即愈

又方阿息山白石藥研如乳法令至細人指  
以酒服半棗許神驗亦治產後血不利研  
石麓後爲瘡常用之

治產後諸色諸患方

產後腹痠痛燒斧令赤內臍酒中飲之  
葛氏若腹中惡不除身強痛方生姜三片以  
咀以水壹斗煮取三升分爲三服當下惡



血○衛生易簡方治產後血餘不盡疼悶  
心痛用生姜汁壹盞盞飲之

又方羊肉壹斤水壹斗二升煮取七升去肉  
內生姜五兩當歸四兩煮取三升分爲四  
服此小羊肉湯療產後及傷身微病寒疝  
虛勞者

又方大黃牡丹桂各壹兩桃人三十枚以水  
三升煮取壹升半分爲三服

又方芍藥四兩牡丹蟲蟲各三兩梔子十四

枚水五升煮取二升分爲三服

若下血不止者燒桑白皮水煮飲之

若中風口禁舌直不得語目睛不轉者烏雌  
鷄壹頭悉破取腸腎以酒五升煮取半去  
滓盡服汗出愈不汗者可厚覆取汗又鷄  
腎中矢勿去治頭勿令傷

若中寒風痺通身冷直口噤不知人方木四  
兩以酒煮取壹升頓服之

葛氏若風腫滿方搥五升熬令黑鷄尾壹把

燒作灰合以水壹斛作湯和之以浴姚云  
鷄毛是

若血氣逆心煩滿者生竹皮壹斤水三升煮  
取壹升半分爲再服

又方燒羚羊角若水羊角末服之

又方煮水一沸停少煖和羚羊角灰服立定

可壹二服

徐王效方產婦胷脇及腹肚熱痛時來時止  
方羚羊角大者一半燒作灰細末之冷水

服

治產後腫滿烏豆一斗水壹斗五升煮取五  
升澄清去滓如此三度不令有濁又以清  
酒五升合煮煎二升分爲五服

葛氏血路不絕方竈埃墨酒服壹匕日三舌  
效方

隱居方澤蘭湯主產後惡露不盡腹痛往來  
兼腹少氣澤蘭八分當歸生地黃各三兩  
芍藥生姜各十分甘草六分棗二七枚水



九升煮取三升分溫三服墮身欲死者得差

又穢汗不盡腹滿小豆湯小豆五升水一斗煮熟飲汁數升即差

隱居羊肉湯主虛汗乏氣不欲食卒急血結中風顛倒悶亂方羊肉三斤芎藭甘草炙各壹兩芍藥當歸各二兩生姜五兩以水一斗五升煮肉取九升去肉內諸藥煮取三升分溫三服大効壹方云大補虛損有

黃耆三兩人參二兩而已

又產後大虛劣氣補湯黃雄雞一頭赤小豆五升大豆亦得乾地黄壹兩甘草桂心黃芩芍藥各二兩七物以水二斗煮雞豆得一斗去滓內藥煎取四升分爲四服

又膏蜜湯主產後餘血衝心痛煩急欲死方猪膏二升白蜜生地黃切各壹升膏煎地黄赤色出之內蜜和之令稠分五服日三葛氏若產後虛損煩亂不得眠枳實芍藥分

等亦炙末服方寸匕日三服之

產後腹中如弦常絞痛無聊賴者當歸屑二匕內白蜜一升煎頓服之

葛氏治產後諸所有病不佳者甘草五兩炙當歸乾姜人參朮各二兩擣篩蜜丸如彈子摩內豈升酒中作一服日三此方補虛去血止痛已試了神驗

產後時行兼邪氣似瘧者羚羊角鱉甲炙各六分知母甘草炙各二兩香豉五合牡蠣

豈兩以水五升煮取豈升八合去滓分五服近用有殊効

葛氏產後乳無汁者燒鵲巢三指撮酒服之又末土苽根半錢七若石膏壹匕米飲服之日三

若乳汁溢滿急痛但溫石以熨之

若因乳兒乳汁不可止然者燒鷄子黃食五六枚

產後赤白下久不斷身面悉腫方蒲黃大豆



熬小麥各一升吳茱萸半升以水九升煮  
取三升分三服此方神驗

產後連下不止者黃連黃蘗阿膠灸各三兩  
熟艾二兩四物以水六升煮取二升半分  
溫爲三服

用効方產後赤白下腹絞痛不可忍方黃連  
四兩黃蘗三兩阿膠灸蒲黃各一兩當歸  
六兩黃芩二兩擣蜜丸如梧子飲下六十丸  
日二夜一服立定已具痢條中兼破血也

療婦人生產多臍下冷數痢瘦不能食令人  
復發花色方麴剉者二升寬器中熬令香  
發卽止地黃五升淨洗朮五兩三物擣篩  
每日以好酒服兩大匙無酒飲及熱乳下  
亦得服訖飽食宜檢本條諸方

子母秘錄治產後心悶手足煩熬厭厭氣欲  
絕血暈心頭硬作寒乍熱增寒忍不禁續  
斷皮一握剉以水三升煎取一升分三服  
溫服如人行三二里再服無所忌此藥救

產後垂死

梅師方治產後血泄不禁止餘血彌痛兼塊  
桂心乾薑等分爲末空心酒調服方寸匕

衛生易  
簡方同

千金翼方治產後煩悶不能食白犬骨一味  
燒研以水服方寸匕

經驗後方治婦人產後血不定奔四肢并違  
墮狗頭骨灰酒調下二錢匕甚效

子母秘錄主產後中風困篤或背強口噤或

但煩熱苦渴或身頭皆重或身痒極嘔送  
直視此皆虛熱中風大豆三升熬令極熟  
候無聲器貯以酒五升沃之熱投可得二  
升盡服之溫覆令少汗出身潤卽愈產後  
得依常稍服之以防風氣又消結血  
產書治產後渴蜜不計多少煉過熟水溫調  
服

食療云產後瀉血不止取乾艾葉半兩炙熬  
老牛薑半兩濃煎湯壹服

澹蔡方煎  
濃飲二服便止



妙徐氏胎  
產方同

陳士良云療血渴疾產後渴疾蓮子心生取  
為末以米飲調下三錢服之立愈

千金方治產後遍身如粟粒熱如火者以桃  
人研臍月猪脂調傅上日易

斗門方治產後脫腸不收用油五斤煉熟以  
盆貯候温却令產婦坐油盆中約壹頓飯  
久用皂角炙令脆去鱗皮為末少許吹入  
鼻中令作嚏立差神效

產書云下乳汁煮赤小豆取汁飲即下

經驗後方下妳藥白殭蠶末兩錢酒調下少  
頃以脂麻茶一錢熟投之梳頭數十遍妳  
汁如泉

澹寮方

黑神散此方產後無疾不治蓋主去敗血方

和劑  
局方 川方 蒲黃 黑神散

地黃 蒸曝九遍或二十壹遍如黑角色不  
可經冷水秤壹兩半各蒸取半兩  
當歸 酒浸半月焙 肉桂 去粗皮不見乾薑  
秤壹兩壹分 火一兩壹分

一兩壹分白芍藥兩甘草兩真蒲黃白紙上  
 附子或添用黑豆壹兩川芎兩  
 右十味細末每服三錢匕並用小便調下  
 若胎死腹中四肢冷口出沫爪青黑溫酒  
 調服須臾胎暖自下及衣帶斷者但服此  
 藥逐去血即下若血暈醫者不識呼為暗  
 風服此即愈若口乾痞悶醫者不識呼為  
 心膈不快服此必愈若乍寒乍熱或誤呼  
 為瘧疾服此藥當愈若血崩不止取艾一

團如雞子大濃煎湯調下若嘔逆惡心人  
 參橘皮湯調下若中風牽搐加荆芥末半  
 錢仍煎荆芥湯調下若血渴不止加蒲黃  
 煎葛根湯調下若心腹刺痛加玄胡索末  
 溫酒調下昨有永嘉法曹司馬速坐倉受  
 納閣中分免亟贖黑神散三貼傳歸與服  
 惡血稍多進第二服其血如傾扶策登床  
 耳聞如鼓聲者數百二三婢重手按其頰  
 稍定急服當歸鹿茸二物湯夜以繼日而



鼓聲漸遠半月平復則知黑神散亦未易  
猛進也此盧祖常易簡糾繆中載然愚謂  
產後自不可以易用藥況市中黑神散安  
可不辯其精粗真偽耶

花藥石散主婦人產後敗血不盡血迷血暈  
惡血奔心死胎腹中胎衣不下至死而尚  
心頭煖急以童子小便調壹錢取下惡物  
如雞肝王氏集驗方猪用片終身不患血虛血暈  
集驗方終身不患血風血氣若膈上有血化爲黃水卽

時吐出或從小便出立効

方見大方科折傷門

凡產後暈悶有四種有下血太多虛極暈悶  
宜服羊肉湯兼建中湯有血下少血上逆  
於心亦令運悶如心腹刺痛宜服四物湯  
加桂黑神散芎藭散有體中素多風疾因  
產損傷氣血乘虛而運悶四物湯加防風  
羌活若運悶而熱多者與獨活柴胡湯并  
治風痰藥有心氣將溫過度邪熱上乘於  
心亦令人言語錯亂運悶者宜服鎮心補

心丹生姜生地黃散至寶丹桃奴圓醫說

羊肉湯方見三因方

山蘄散治產後諸疾及血氣作痛蓋此藥大能散堅塊逐惡血

當歸洗過微炒沒藥研別男子亂髮入小藏瓶內燒灰凌

膏花各半紅花子 伏龍肝 乾栢木

松煙墨燒各鯉魚鱗一兩燒灰

爲末每服二錢熱酒調下

當歸建中湯方見三因方

產後下血過多虛極生風者何答曰婦人以榮爲主因產血太多氣無所止唇肉寒冷汗出自暝神昏命在須臾此乃虛極生風也可急服濟危上丹若以風藥治之則誤矣  
濟危上丹方見和劑局方  
婦人病莫大於產蓐倉猝爲庸醫所殺者多矣亦不素講故也舊嘗見杜壬作醫準壹卷記其平生治人用藥之驗其壹記郝質子婦產四日瘕瘕弓角反張壬以爲座病與大紫



豆湯獨活湯而愈政和間妻室纔分免猶在  
幕中忽作此證頭足反接相去幾二尺家人  
驚駭以數婢強拗之不直適記所云而藥囊  
有獨活乃急爲之召醫未至連進三劑遂能  
直醫到卽愈矣更不用大紫豆湯古人處方  
神驗不可不廣告人 二方在千金方醫說  
大紫豆湯治中風頭眩惡風自汗吐冷痰及  
產後中風痲痺背強口噤直視煩熱

羌活 壹兩 大豆 半升 酒 三升

右先以酒浸羌活煎壹二沸別炒大豆極  
焦煙出急投酒中密封候冷去豆每服壹  
二合許得少汗則愈此湯能去風消血姪  
娠折傷胎死腹中服之悉宜

衛生寶鑑

產後扶持榮衛

犀角飲子治產後亡津液虛損時自汗出發  
熱困倦唇口乾燥

犀角 麥門冬 各半 白朮 各半 柴胡 一兩 地骨

皮 枳殼 麸炒○拔 甘草 炒 生地黃 當

歸 揀參 茯苓 去皮 黃芩 黃芪 各七錢

右十三味為粗末每服參錢水一錢半淨

小麥七十粒姜三片煎至七分去粗溫服

食後

牡丹皮散治產後寒熱臍下疼痛煩躁神効

牡丹皮 地骨皮 天台烏藥 海桐皮

青皮 陳皮 各一兩

右為末入研了沒藥二錢半再羅過每服

二錢水壹錢煎至七分如寒多熱服熱多

寒服食前日三服忌生冷硬滑醋物

枳殼丸治產後大小便澁滯

木香 錢叁 枳殼 炒 麻仁 炒 大黃 各壹兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十九溫

水送下食後如飯食不化亦宜服之

湧泉散治婦人因氣妨汁絕少

瞿麥穗 麥門冬 去心 王不留行 緊縮骨

穿山甲 炮黃等分



右五味為末每服壹錢熱酒調下後食猪  
蹄羹少許沒藥用木梳左右乳上梳三十  
來梳壹日三服食前服三次羹湯投三次  
梳乳拔料方徐氏胎產方同 ○經驗良方能下妳乳  
須令乳婦忌食姜椒辛弊飲食王不留行  
瞿麥穗麥門冬去心龍骨各等分 右為細末用  
猪蹄煮汁將汁一椀和前藥調成一椀溫  
酒服服了將梳頭木梳於乳上流下効  
勝金丹治婦人吹妳極有効百齒霜一味今

梳上髮之垢也不以多少用無根水九如  
桐子大每服三九倒流水送下食後病左  
乳左卧右乳右卧溫覆出汗倒流水法取  
水傾屋上流下是拔粹方同

聖濟總錄

治乳汁不時洩蓄積於內遂成癰名妬乳漏  
薦散方

漏蘆壹兩黃芩壹兩去黑心 米粉兩  
右三味搗為細散水調如膏塗於乳上

頤服

八十一

產後惡露不斷

產後惡露不斷者蓋由臟腑宿有冷滯氣不調和既產之後惡露乘虛不能制約淋瀝不斷久不已則經血不榮臍腹堅痛面色萎黃氣斷不足是其證也治法宜溫補之劑

治產後惡露下不絕敗醬飲方

敗醬 當歸切焙 芍藥 芎藭各半兩 竹筴壹兩  
生乾地黄焙乾  
右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至

七分去滓溫服日三

治產後惡露不絕心悶氣短艾葉飲方

艾葉 當歸切焙 人參 地榆 乾薑炮 阿膠炙令燥 生乾地黄焙壹兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎至七分去滓溫服日三

治產後惡露不絕阿膠散方

阿膠炙令燥用 牛角鯁燒灰 龜骨煨各壹兩  
右三味搗羅為散每服二錢匕薄粥飲調



服

治產後虛冷下血晝夜無度及惡露不絕龍  
骨丸方

龍骨細研四兩乾薑炮甘草炙去麤皮桂各二兩

右四味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大  
每服二十九溫酒下早晨日午晚間各壹

治產後惡露過多心悶氣短無力不能食虎  
掌飲方

虎掌焙切當歸焙艾葉微炒各一兩人參半兩地榆

參生乾地黄焙一分

右六味釐搗篩每服三錢匕以生姜三片  
水一盞煎至七分去滓溫服

治產後惡露下多短氣乏力人參飲方

人參半兩當歸功焙膏兩半生乾地黄焙二兩地榆

一兩

右四味釐搗篩每服三錢匕生姜三片水  
一盞同煎至七分去滓溫服

治產後惡露下多心煩氣短減食多倦地榆

飲方

地榆壹兩 當歸切 艾葉 人參各二兩 生乾地

黃焙 桂去麤皮

右六味各搗篩每服三錢匕以水壹盞入生薑三片同煎至七分去滓空心溫服

治產後下血不止桑耳飲方

桑耳微 芍藥 地榆 茜根 牛角燒

阿膠各一兩 艾葉 雞蘇各參 白竜骨二兩

右九味各搗篩每服二錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服早晨日午夜間各壹

治產後血下不止芍藥丸方

芍藥 阿膠各壹兩半 烏賊魚骨去皮甲

常歸切

右四味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大空心以葱湯下三十九日三

治產後血不止兼漏下栢葉湯方

栢葉炙乾 當歸切 禹餘糧燒 酢滓 七漏

右三味各搗篩每服三錢匕水壹盞入薤



飲方

地榆壹兩 當歸切焙 艾葉 人參各二兩 生乾地

黃焙參 桂去麤皮

右六味麤搗篩每服三錢匕以水壹盞入  
生姜三片同煎至七分去滓空心溫服

治產後下血不止桑耳飲方

桑耳微炙 芍藥 地榆 茜根 牛角鯁燒

阿膠各一兩 艾葉 鷄蘇各參分 白竜骨二兩

右九味麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至

七分去滓溫服早晨日午夜間各壹

治產後血下不止芍藥丸方

芍藥 阿膠炙令燥各壹兩半 烏賊魚骨去皮甲

常歸切焙參分

右四味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大空  
心以葱湯下三十九日三

治產後血不止兼漏下栢葉湯方

栢葉炙乾二兩 當歸切焙 禹餘糧燒醋淬七遍

右三味麤搗篩每服三錢匕水壹盞入薤

白二寸細切同煎至七分去滓食前溫服  
日三

治產後血露不斷地黃丸方

生乾地黄焙當歸切阿膠炙令燥黃耆剉各壹兩

艾葉炙叁分生薑壹分切炒

右六味搗羅為末醋煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫酒或米飲下不拘時

治產後惡露不斷秦芎湯方

秦芎去苗土玄參芍藥各一兩艾葉炙白芷

續斷切焙各一兩半當歸切焙各一兩半

右七味麤搗篩每服二錢匕水壹盞半薑三片煎七分去滓溫服不拘時

治產後血露不斷寄生丸方

桑寄生剉附子炮裂去皮臍芍藥各一兩地榆剉白竜骨各壹兩半鷄蘇叁分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸梧桐子大每服三十九溫酒或米飲下不拘時

治產後血傷不止或下血痢蛇黃散方



蛇黃 二枚火服  
醋淬七遍

右膏味擣羅為細散每服三錢匕以米飲  
調下甚者不過再服

產後血氣攻腹痛

婦人產後衝任俱虛氣血離經失於將理氣  
道行澀惡露下少則令人煩懊冒悶臍腹堅  
痛通行敗血升降陰陽則病可愈不治則變  
產後癥瘕羸瘦之病也

治產後血氣不散攻心腹刺痛脹滿氣喘鬼

### 箭羽湯方

鬼箭羽 當歸切炒 白朮切炒 桂去鱗皮 細辛

去背葉 生乾地黄焙膏

右六味麤搗篩每服三錢匕水酒各半盞  
煎七分去滓溫服不拘時候

治產後血氣不利心腹急痛上下攻衝氣逆

### 煩悶黃耆湯方

黃耆剉碎 白朮剉 當歸切炒 甘草炙 人參各壹兩

白羊肉一斤去脂膜切  
碎每服用參兩

右六味除羊肉外搗為麤末每服三錢匕  
先以羊肉三兩切用水三盞煮取壹盞澄  
清去滓沫入前藥并生薑三片同煎七分  
去滓通口服不拘時候

治產後血氣不利或感風冷心腹疴痛肢體  
虛冷胃膈不快乾地黄湯方

生乾地黄焙二兩 生薑去皮切 甘草炙 當歸  
切桂去麤皮 炒各壹兩 右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎取

七分去滓溫服不拘時候

治產後血氣壅滯攻心腹疼痛或拘急脹滿

白朮湯方

白朮切炒 當歸剉炒 桑根白皮剉各壹兩半 大黃剉炒  
香細辛去苗葉 桂去麤皮 各壹兩  
右六味搗篩每服三錢匕水壹盞生薑  
三片煎七分去滓溫服不拘時候

治產後或傷風冷因致血氣不利心腹疼痛  
或寒或熱頭目昏重芎藭湯方



芎藭 判 黃芩 去黑心 防風 去叉各一兩 當歸 切 芍

藥 甘草 炙各壹兩半

右六味麤搗篩每服三錢匕水壹盞生薑三片煎七分去滓溫服不拘時候

治產後因血不快利氣攻心腹痛芍藥湯

方

芍藥 二兩 黃耆 判 白芷 人參 芎藭 當

歸 切炒 生乾地黄 焙 甘草 炙各一兩 白茯苓 去黑皮壹

兩半

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎取七分去滓入酒少許溫服不拘時候

治產後血氣虛冷攻心腹痛地黄芍藥湯方

生乾地黄 焙 芍藥 當歸 判 獨活 去蘆頭 細

辛 去苗葉桂去麤皮 吳茱萸 水浸經宿炒令香 乾薑

炮 甘草 炙各壹兩

右九味麤搗篩每服三錢匕水壹盞煎七分去滓溫服不拘時候

治產後心腹痛血氣不利芎藭前胡湯方

芍藥壹兩前胡叁分黃芩去黑心半兩芍藥壹兩

蒲黃微炒一兩桃仁湯浸去皮尖別研叁分當歸剉炒叁分

桂去麤皮叁分甘草炙剉壹兩大黃剉炒半兩生乾地黃兩

焙二兩

右壹十壹味麤擣篩每服二錢匕水壹盞

生薑三片棗壹枚擘煎七分去滓溫服不

拘時候

治產後血氣攻衝心腹冷痛煩滿不食桔梗

湯方

桔梗炒當歸切劉寄奴去根剉碎桂去麤皮

延胡索 陳橘皮湯浸去白芍藥 白茯苓去黑皮

各三兩

右八味麤擣篩每服三錢匕水壹盞煎七

分去滓溫服不拘時候○永類鈴方治新

產後七八日腹并兩脇痛當歸劉寄奴吉

梗各十分延胡索別為末桂心 陳皮各四兩茯苓

芍藥各捌分右咬咀水二升煮八合調延胡

索末空心服



治產後血氣攻心腹痛芍藥湯方

芍藥二兩 桂皮去麤 甘草炙剉各一兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水煎盡煎七分去滓溫服不拘時候

治產後虛羸面色萎黃惡血不盡臍腹冷痛

琥珀煎方

琥珀研 牛膝酒浸切焙 當歸切焙 防風去桃人皮

尖雙入 萹撥芎藭各六兩 桂去麤皮 乾薑炒研

炮二兩 清酒壹升 生地黃汁參 酥六兩 蜜合

右一十三味以前九味搗羅為散先將地

黃汁煎熟即下蜜酒酥攪候鎔入衆藥末

以柳篋攪不住手候似膏傾出瓷器盛每

服壹匙溫酒調下不拘時

治產後少腹結塊痛不可忍鼈甲當歸散方

鼈甲醋炙去裙襖 當歸切焙 桃人去皮尖 芍藥剉

京三稜炮剉 桂去麤皮 各壹兩

右六味搗羅為散每服五錢匕空心溫酒調下日再服

醫方類聚 卷之...

產後血塊攻築疼痛

產後氣脉不知惡露不盡風冷留滯與正氣相擊故脇腹之間結聚塊痛蓋以新產之後臍腹空虛真氣怯弱寒氣入裏與惡血共相為害其痛若物所築故名築痛也

治產後血塊攻刺腹脇疼痛或衝心煩悶琥珀散方

琥珀細研如粉 鯉魚皮燒灰 赤芍藥 薑黃 蒲黃 牡丹去心 當歸微炙 大黃剉碎微炒 桂皮去蘆 蓬

莪茂煨熟 牛膝去苗酒浸切焙各半兩

右一十一味搗羅為散每服壹錢匕溫酒調下空心夜卧各一

治產後血塊攻築疼痛蓬莪茂散方

蓬莪茂煨熟 桂皮去蘆 乾漆搗碎炒煙出介半兩 吳茱萸湯洗微炒青分

右四味搗羅為散每服二錢匕溫酒調服

治產後血氣血塊時攻心腹疼痛不可忍商陸散方

本草綱目 卷之六 九十一

續後 卷之六 九十一



商陸乾者當歸切炒各一分紫葳凌霄花是也蒲黃各

右四味搗羅為散空腹溫酒調下二錢匕

治後產血氣血塊疔刺痛薑黃散方

薑黃 當歸切蒲黃 桂去麤皮生乾地黄

焙各壹兩

右五味搗羅為散空心溫酒調下二錢匕

日再服

治產後血氣血塊敗血不快攻築疼痛地黄

散方

生地黄八兩生薑四兩

右二味細切同就銀石鍋內慢火炒令半

乾取出同焙燥搗羅為散每服二錢匕溫

酒調下不拘時服

治產後血氣血塊攻築疼痛薑黃散方

薑黃 牡丹皮 牛膝去苗酒浸切焙烏藥剉生

黃地黃焙各壹兩

右五味搗羅為散每服三錢匕溫酒調下

九

九

九

九

治產後血氣血塊血露不快攻築疼痛蓬莪

茂散方

蓬莪炮紫葳微炒木香炮羌活去蘆頭細辛

去苗當歸切芎藭各壹兩

右七味搗羅為散每服三錢匕用溫酒調

下口再服

治產後血氣血塊攻衝心腹痛當歸湯方

當歸切乾漆炒烟透櫻櫚燒灰紅藍花 甘草

炙鯉魚皮燒灰白芍藥 牡丹去心紫葳各半兩

芫花醋浸半日炒乾焦色香墨各一分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕葱白三

寸生薑三片水酒共一盞同煎至七分去

滓稍熱服

治產後血氣血塊攻臍腹痛紫葳湯方

紫葳 當歸切木香炮各半兩沒藥壹分牛膝去苗

酒浸切焙去分

右五味麤搗篩每服二錢匕水酒共壹盞

同煎七分去滓溫服未差再服

蓬莪散

九三



治產後血氣血塊血露不盡攻築刺痛牡丹散方

牡丹去心芍藥 當歸切炒桂皮去麤皮漏蘆去蘆頭

白芷 五靈脂炒陳橘皮湯浸去白微炒芎藭

紅藍花 乾漆炒煙透

右壹十壹味搗羅為散每服二錢匕生薑

溫酒調下

治產後血氣疔痛血塊作梗吳茱萸丸方

吳茱萸微炒木香 當歸微炙各一兩桃人去皮尖雙

人麩炒研壹

研半兩硃砂研分右五味搗羅三味為末入硃砂桃人和勻

鍊蜜為丸如梧桐子大每服二十九椹榔

湯下

治產後虛冷惡血結塊不散生地黃飲方

生地黃汁半盞童子小便半盞生薑一分

右三味一處煎三四沸分作兩服溫溫服

須臾再服惡血下滯氣通立差未效再作

服

治產後血塊攻衝心腹痛薑黃散方

薑黃切碎蒲黃炒枳殼去穢皮

右三味搗羅為散每服二錢匕生地黃白然汁調下日三夜一

治產後餘血不盡結塊上衝心煩腹痛乾地

黃散方

生乾地黄焙芎藭

右二味各等分搗羅為散每服三錢匕以酒水各半盞煎至八分去滓溫服食前

日三

治產後餘血不盡結成癥塊臍腹疔刺疼痛

礪砂散方

礪砂一兩芫花半兩醋醋螭蟲半兩去翅水

蛭半兩琥珀參分乾漆半兩檉碎沙藥參分桂

心半兩麝香研入

右九味搗研羅為細散拌和令勻每服壹錢匕溫酒調下食前

治產後餘血不盡結聚成塊堅硬疼痛腹肋



脹滿烏雞飲方

雌烏雞壹隻去毛 龍甲壹兩塗醋炙 桃人壹兩湯浸去皮尖

雙壹兩 人壹兩 麩壹兩 炒壹兩 微壹兩 黃壹兩 川壹兩 大壹兩 黃壹兩 醋壹兩 炒壹兩 吳壹兩 菜壹兩

更壹兩 偏壹兩 焙壹兩 乾壹兩 微壹兩 炒壹兩 桂壹兩 心壹兩 鬼壹兩 箭壹兩 牛壹兩 膝壹兩 去壹兩 苗壹兩

當壹兩 歸壹兩 微壹兩 炒壹兩 菴壹兩 藺壹兩 子壹兩 甘壹兩 草壹兩 微壹兩 芒壹兩 消壹兩 各壹兩 半壹兩

右壹十二味除雞外籠擣篩和勻以水四

升將雞全煮取汁以瓷器澄令清每服二

錢匕雞清汁壹盞煎至七分去滓溫服不

拘時

治產後血塊攻築心腹痛芎藭散方

芎藭壹兩 當壹兩 歸壹兩 炙壹兩 焙壹兩 令壹兩 碎壹兩 柏壹兩 葉壹兩 炙壹兩 黃壹兩 各壹兩 桂壹兩 去壹兩 麩壹兩

兩壹兩 大壹兩 黃壹兩 炮壹兩 剉壹兩

右五味擣羅為散每服三錢匕煎當歸酒

調下日三夜一

醫方類聚卷之二百三十六

頁六

七