

The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

SPICELMANN, J.R.





JACOB REINBOLD SPIELMANN;

*Phil. et Med. D. facultat. Medic. Argentor. Senior, Acad.
Imperial. N. C. Adjunct; Lector. Reg. Boruss. Succi. Patriot;
Parsif. Medic; Aect. Mogunt. et Palat. Colleg. Reg. Medic.
Hancz. Sodalis; Acad. Reg. Scient. Parsif. Corresp.*

Natus XXI. Marc. M. DCC. XXII.

L. h. 10


ROYAL SOCIETY OF LONDON MEDICAL

PHARMACOPOEA GENERALIS

EDITA

A


D. JACOBO REINBOLDO SPIELMANN.



ARGENTORATI 1783.

Sumptibus JOHANNIS GEORGII TREUTTEL, Bibliopolæ.

CUM APPROBAT. ET PRIVILEGIO REGIS.



P R Æ F A T I O .

Sisto opus, de cuius argumento me aliquid unquam typis evulgaturum esse, ne per somnum quidem cogitasset. Nimiis Medicamentorum collectionibus nos esse obrutos & dolui semper & adhuc doleo. Enimvero casu excitatus, ut præcipuos qui prostant Rei medicamentariæ Indices curatius rimarer, non inutilem prorsus operam navaturus mihi videbar, si quæ hodie in usu sunt medicamenta exacte & dilucide recenserem. *Dispensatoria* certe & *Pharmacopoeas*, quæ extant, ejusmodi laborem flagitare, nemini dubium videri poterit, qui quidem perpenderit, vel certis ea tantum regionibus aut civitatibus esse accommodata, vel insignibus, quibus recentior Medicina splendet, incrementis minus quam par est respondere, vel descriptiones etiam Præparationum continere hiulcas, mancas, imo plane falsas.

E re præterea Medicorum esse, quis non videt? Syllabum proflare, unde Medici, quorumcunque locorum titulos deligant, quos in Officinis asservandos præscribant; quosque Rerumpublicarum Administratores de salute civium solliciti sua auctoritate comprobent ac Pharmaceuticæ penus normam esse jubeant: quod quidem si fiet, non amplius integra edentur volumina, quoties civitatum Antistites Rei

P R Æ F A T I O

Medicamentariæ curam agere instituerint; una aut altera pagella exhibebit indicem omnium medicamentorum, quæ in Pharmacopoliis urbis aut regionis profare jubentur.

Equidem me multa, quæ hodiernus usus nequaquam desiderat, quin inconcinnas etiam compositiones, huic Medicamentorum Catalogo inseruisse lubentissime fateor; sed hæc cavere non potui in opere non Medicis modo exquisite rationalibus, sed illis quoque dicato, qui vel auctoritatibus, vel præjudicatis opinionibus aliisve rationibus ducti a Præceptoribus Auctoribusque accepta remedia missa facere nolunt. Quin imo vulgi quoque desideriiis satisfaciendum esse duxi, qui crebro non tam a Medicis præscripta Medicamenta, quam quæ cæcus rumor utcunque probaverit, ex Pharmacopoliis petere soleat.

Multa interim in hoc opere desiderabuntur remedia, in Practicorum libris commendata, qui vel adhuc dum in plurium manibus versantur; multa quæ in formulis a majoribus ad nos transmissis præscribuntur; quæ tamen cum de die in diem remissius expetantur, omittere non dubitavi. Nec inanem spem esse ducam, fore ut illi quoque, qui Artis nostræ principiis non sunt imbuti, experientia magistra perspecturi sint olim, quæ habemus recentiora, viribus non modo paria, sed uti-

P R Æ F A T I O

que superiora veteranis istis esse. Si qui vero sunt, quos tristes hæ Medicinæ rudioris reliquiæ delectent, illis HORSTII *Pharmacopœa Galeno-Chemica Catholica* Francofurt. 1651. fol. JUNGKEN *Corpus Pharmaceutico-Chymico-Medicum* Francof. 1697. 4^o. & *Pharmacopœa Schræderiana* editio Germanica Norimb. 1746. & 1748. fol. abunde satisficient.

Descriptiones Simplicium non ex libris desumsi, sed ad ipsa specimina concinnavi: in quo cum unice meis sensibus fiderim; characteres, quos trado, ab illis, qui vulgo exhibentur, non raro recedunt. Præparationum nullam admisi, cujus parandi ratio non ipsi mihi experto esset probata.

Simplicium, unde medicamenta desumimus, titulos *Linneanos* adhibui, ut altius progressuri habeant, ubi quicquid ad eorum historiam pertinet invenire possint. Vegetabilium icones ex opere *Blackwelliano*, quod in omnium manibus esse vellem, citavi. Plures imo etiam quandoque meliores potuisssem adducere; nisi id consilium a scopo libri Lectoribus dicati, quorum longe plurimi sumtuosas librorum collectiones facere nequeunt, alienum esse duxissem. Exoticorum, quæ in Horto nostro Academico asservantur, culturam adjeci.

P R Æ F A T I O

Libræ voce cum vage admodum soleant uti; per totum opus non sum usus, sed ejus valorem Unciis expressi.

Consultum imo necessarium etiam duxi, in libro, Pharmacopœorum artem continente, medicamentorum vires summam indicare, generosiorum quoque doses determinare. Licet enim prudentissime legibus cautum sit, ne Praxi Medicæ se immisceant Pharmacopœi; nunquam tamen obtinebitur, quin in casibus, qui leviores esse videntur, illorum opera expectatur; Medicastro- rum præterea pestis in diem latius serpens Formulas quoque morbo curando contrarias imo deleterias in diem gignat. Ipsi quoque Medici interdum aliquid humani pati festinantique eorum calamo errores elabi possunt; itaque ne Officinæ sanitatis morborum imo mortis materiam subministrent; medicamentorum effectus nosse omnino Pharmacopœum oportet, in promptu habere, quæ sanitati vacillanti succurrant, remedia, & sibi quoque cavere, ne sua saltem ex culpa victimarum, quæ Medicastro- rum audacia letho immolat, augeatur numerus, & ipsos insuper Artis magistros, sicubi hallucinati sint, monere.

PP. Calendis Novembris MDCCLXXXII.

SYLLABUS AUCTORUM.

- AGRICOLA Georg. *De ortu & causis Subterraneorum*, Witteberg. 1612. Utor editione *Libris de Re Metallica*, Basil. 1657. fol. adjecta.
- Amstelodamensis Pharmacopœa*, Amstelod. 1639. 12°.
- ANDERNACUS Joh. Gunth. *De Medicina veteri & nova*, Basil. 1571. fol.
- ANDROMACHUS Archiater NERONIS apud GALENUM.
- APONENSIS Petrus obiit prioribus Seculi XIV. annis. *De venenis* 1473 4°. Utor editione Venet. 1565. fol.
- ARBUTHNOT Carol. *Tabulæ antiquorum nummorum, mensurarum, ponderum &c.* per KOENIG Traject. ad Rhen. 1756. 4°.
- Argentoratensis Pharmacopœa* 1725. fol. revisa & ad usum modernum accommodata 1757. fol.
- AUBLET Fufée *Histoire des plantes de la Guiane Françoisse*, Londres 1775. 4°.
- Augustana Pharmacopœa* 1601. fol. renovata & aucta prodiit 1684. fol.
- AUGUSTIS de Quiricus *Lumen Apothecariorum*, Venet. 1517. fol.
- AVICENNA Seculi XI. Auctor *Canon*. Venet. 1488. 4°. Utor editione Venet. 1582. fol.
- Austriaca Provincialis Pharmacopœa*, Viennæ 1774. 8°.
- BACHER apud RICHARD *Recueil d'Observations*.
- BARBETTE Paulus *Praxis* 1665. 8°. Cito *Opera* 1688. 4°.
- BARCHUSEN Joh. Conrad. *Pyrosophia* Lugd. Bat. 1695. 4°. Utor editione multum aucta sub titulo *Elementorum Chæmiæ*, Lugd. Bat. 1718. 4°. divulgata.
- BARTOLETTUS Fabric. *Encyclopedia Hermetico-Dogmatica*, Bononiæ 1619. 4°.
- Bateana Pharmacopœa* curante SHIPTON, Londin. 1688. 8°. Cito editionem Lovanii 1752. 8°. impressam.
- BAUMÉ *Elemens de Pharmacie*, Paris 1767. 8°. Utor editione Paris. 1773. 8°. publicata.

SYLLABUS AUCTORUM.

- BAZINGHEN Abot de *Traité des Monnoies*, Paris 1764. 4°.
- BEGUINUS Joh. *Tyrocinium Chymicum*, Paris. 1608. 12°. Cito editionem a BLASIO adornatam, Amstel. 1669. 12°.
- BENEDICTUS Alexand. *de Re Medica*, Venet. 1535. fol.
- BERCKLEY Georg. *Siris or a chain of physical reflexions and inquiries concerning the virtues of Tharwater*, London 1744. 8°. Utor versione Gallica, Amstelodami 1745. 8° edita.
- Bergamenfis Pharmacopœa* 1581. fol.
- BERGIUS Peter Jonas *Materia Medica*, Stockh. 1778. 8°.
- Berolinenses* vid. *Dispensatorium Brandeburgicum*.
- BIERLING Casp. Theophil. *Adversariorum curiosorum Centuria*, Jenæ 1679. 4°.
- BIRCKMANN apud QUERCETANUM.
- BLACK in *Essais and Observations Physical and literary by a Society in Edinburgh*. Voll. II. 1756. 8°.
- BLACKWELL Elifabeth *Curious Herbal*, London 1739. fol. Cito versionem latinam & germanicam multum correctam & auctam, Norimberg. 1750-1773. 6 Voll. fol.
- BLECHHOLZ apud *Brunsvicenses*.
- BLONDEL in LEMERY *Pharmacopée Universelle*.
- BOECLERUS in *Pharmacopœa Argentoratensi*.
- BOERHAVE Hermann *de Materia Medica*, Lugd. Bat. 1719. 8°. Cito editionem L. B. 1721. 8°.
- BONTIUS Jacob. *Methodus medendicum PISONE de rebus utriusque Indiæ*, Amstelod. 1658. fol.
- Brandeburgicum Dispensatorium*, Berol. 1698. fol. Cito editionem a FAGINO (BUCHNER) illustratam.
- BRASSAVOLA Antonius Musa *Examen omnium Catapotiorum & Pilularum*, Basil. 1543. 4°.
- Examen omnium Electuariorum, Pulverum & Confectionum*, Venet. 1548. 8°.
- Examen omnium Trochiscorum, Unguentorum, Ceratorum, Emplastrorum, Cataplasmatum & Collyriorum*, Venet. 1551. 8°.

SYLLABUS AUCTORUM.

BRASSAVOLÆ *Examen omnium Linctuum, Pulverum, Aquarum, Oleorum*, Venet. 1553. 8°.

De Medicamentis tam simplicibus, quam compositis Catharticis, Tigur. 1555. 8°.

Examen omnium Simplicium, 1556. 12°.

BROSSARD apud MORAND in *Memoires de l'Academie de Chirurgie* T. II.

Brunsvicensē Dispensatorium Pharmaceuticum 1777. 4°.

BUFFON Comes *Histoire naturelle générale & particuliere*, Paris 1749-1782. XXIX. Voll. 4°.

BUSSIUS Georg. in HOFFMANN *Observat. Physico-Chymic.* & apud SCHELHAMMER *de Nitro*, Amstel. 1709. 8°.

CADET in *Academ. Roïale des Sciences*.

CAMERARIUS apud *Wurtembergenses*.

CELSUS Aulus Cornelius Seculo Augusteo floruit. Ejus libri *de Re Medica*, Florentiæ 1478. fol. impressi, crebro recusi, optime editi sunt a KRAUSE, Lips. 1766. 8°.

CHARAS Moyse *Pharmacopée Royale Galenique & Chymique* Paris 1672. 8°. insigniter aucta, Lyon. 1753. 4°.

CLAUDER Gabriel *Methodus balsamandi*, Jenæ 1684. 4°.

CLAVÉ *Cours de Chymie*, Paris 1646. 8°.

CLOS Du apud LEMERY *Pharmacopée*.

Coloniensis Pharmacopœa per HOLZHEMIUM 1627. fol.

CORDI Valerii *Dispensatorium*, Norimb. 1535. Utor editio-
ne, quæ prodiit Norimb. 1592. fol.

CORNACHINUS Marc. Anton. *Methodus, qua omnes corporis humani affectiones curantur*, Florent. 1629. 4°.

COSTÆUS Johannes in editione *Operum MESUE*.

CRAANEN Theodor. apud GRÆBNER *Medicina vetus restituta*, 1695. 4°.

CRATO de Krafftheim Johann. *Consiliorum & Epistolarum Medicinalium* Libri quinque, Francof. 1691-1693.

8°. Sextus & Septimus 1611. 8°. Auctor obiit anno 1585.

CROLLII Oswald *Basilica Chymica*, Francof. 1609. 4°.

DAGUIN in LEMERY *Pharmacopée Universelle*.

SYLLABUS AUCTORUM.

- DAMOCRATES primo seculo floruit. Apud GALENUM.
Danica Pharmacopœa, Hafniæ 1772. 4°.
- DARELIUS apud WALLBAUM.
- DECKER Friderici *Exercitationes practicæ*, Lugd. Batavor.
& Amstelod. 1673. 8°.
- DIGBY Renelmus *Recueil des Remedes & secrets tirés des Me-
moires du Chevalier DIGBY par MALBEC*, Paris 1669. 8°.
- DIOSCORIDES Pedacius Anazarbeus primo seculo floruit.
Libride Materia Medica latine, Colon. 1478. fol. Græce
1495. fuerunt impressi. Cito editionem SARACENI 1598.
Francof. fol.
- DIPPEL Democriti Christiani *Krankheit und Arzney des
menschlichen Lebens*, Franckfurt und Leipzig 1746. 8°.
Latine prodierat Lugduni Batav. 1711. 8°.
- DORNCRELLIUS Tobias *Dispensatorium novum*, Ulyssip. 1600.
4°. Cito editionem, quæ Jenæ 1645. 8°. prodiit.
- DOVER apud *Edinburgenses*.
Dresdensès apud ZWOELFFER.
- DURIET apud WALLBAUM.
- ECHHOLD apud SCHROEDER.
Edinburgensis Collegii Medici Pharmacopœa 1722. 8°. Cito edi-
tiones 1736. & 1747. 8°.
- EISENSCHMID Joh. Caspar *de Ponderibus & Mensuris Vete-
rum*, Argent. 1737. 8°.
- ELLER Joh. Theodor. *nützliche und auferlesene Anmerkun-
gen von Krankheiten und Operationen, welche im Lazareth
der Charité zu Berlin vorgefallen*, Berlin 1730. 8°.
- EMMERICUS apud JUNCKEN.
- FALCK N. D. *Treatise on the medical qualities of Mercury*,
London 1776. 8°.
- FALLOPII Gabriel *Opera*, Francof. ad Mœnum 1584. fol.
- FERNELIUS Johann. *Universa Medicina*, Paris. 1554. fol.
Cito *Opera Parisiis* 1638. 8°. publicata.
- FIORAVENTI *Secreti rationali intorno alla Medicina, Chirur-
gia & Alchymia*, Venetia 1600. 8°.

SYLLABUS AUCTORUM.

- Florentinum Antidotarium ex Italico sermone Latinum factum per CLUSIVM*, Antwerp. 1561. 8°.
- FLORENZOLA in *Pharmacopœa Augustana*.
- FOEUILLET in LEMERY *Pharmacopée*.
- FORDYCE on *putrid and inflammatory Fevers*, London 1773. 8°.
- FORESTUS Peter Libri *Curationum & Observationum Medicinalium*, Lugd. Bat. 1591-1606. 8°. Cito editionem Rothomag. 1653. fol.
- FRACASTORIUS Hieronym. de *Sympathia & Antipathia & de Contagione*, Venet. 1546. 4°. Utor editione Genevæ 1671. 8o. divulgata.
- FULLER Thomas *Pharmacopœa extemporanea*, London. 1705. 8°. Utor editione ibid. 1714. 12°. impressa.
- Pharmacopœa domestica*, London 1733. 12°.
- FUNNIUS in *Actis Societatis Harlemensis* T. II.
- GABRIEL Gabriel in *Quæstione HIERONYMI BONIPERTI de Materiæ imminutione & de totius evacuandæ Materiæ ratione*, Patav. 1550. 4°.
- GALENUS Claudius Seculi II^{di} Auctor ex numerosissimis tractatibus huc pertinent;
- De Alimentorum facultate*, Paris. 1530. 4°.
- De simplicium Medicamentorum Facultate*, Paris. 1520. fol.
- De Compositione Medicamentorum secundum loca*, Parisiis 1530. fol.
- De Compositione Medicamentorum secundum Genera*, Paris. 1530. fol.
- Euporista seu de Medicamentis facile parabilibus*, Paris. 1530. 8°.
- Succedanea sive Substituta*, Paris. 1530. 8°.
- De Theriaca*, Paris. 1534. fol.
- De Ptisana*, Paris. 1536. 4°.
- De Purgantium Medicamentorum facultate*, Paris. 1544. 4°.
- Antidotorum Libri*, Thoruni 1607. 4°.
- Hi Tractatus aliquoties seorsim, crebrius cum reliquis sub titulo *Operum* prodierunt. Utor eorum nona JUNTARUM editione, Venetiis 1623. fol.

SYLLABUS AUCTORUM.

- GALLUS, qui Seculo I. floruisse videtur, apud GALENUM.
- GARZONIUS in *Antidotario Bonariensi*.
- GAUBIUS Hieronym. David *de Methodo concinnandi Formulas*, Leidæ 1738. 8°. Cito editionem Lugd. Bat. 1752. 8°.
- GEBER Seculi VIII. Auctor. Utor editione *Operum*, quæ Gedani 1682. 8°. prodiit.
- GEOFFROY in *Codice Parisino* & in *Tractatu de Materia Medica*, Paris. 1741. 8°.
- GLASER Christoph *Traité de Chymie*, Paris 1667. 8°.
- GLAUBER Joh. Rudolph. circa medium Seculi superioris cœpit *Tractatus Chymicos* edere. Cito *Opera Chymica* idiomate Germanico impressa, Franckfurt am Mayn 1658. 4°. & *Continuationem* ibid. 1659. 4°.
- GMELIN in *Dispensatorio Wurtembergensi*.
- GOULARD *Œuvres de Chirurgie*, Pezenas 1766. 12°. II. Voll.
- GRULING Philipp *Florilegium Hippocraticum Galenico-Chymicum* 1665. 4°. Utor editione Lipsiæ 1680. 4°.
- GUALTERUS in *Codice Parisino*.
- GULDENKLEE Timæi Balthasar *Epistolæ & Consilia*.
- GUNDELSHEIMER in *Dispensatorio Wurtembergensi*.
- HALY Abbas sub finem Seculi X. vixit, *Regalis Dispositio*, Venet. 1492. fol.
- Hamburgenſe Dispensatorium* per KALDE 1716. fol.
- HANCKENIUS apud WALLBAUM.
- HARTMANN Johannes *Praxis Chymiatica a filiis edita*, Lips. 1633. 4°. Utor editione a MAURITIO HOFFMANN illustrata, Lips. 1728. 4°.
- HEISTER Laurent. *Chirurgia Germanice*, Norimb. 1718. 4°. Latine, Lugd. Bat. 1739. 4°. & in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- HELMONTIUS Joh. Baptist. van Anno 1644. obiit. *Opera*, Lugd. Bat. 1648. 4°. Cito editionem, quæ curante VALENTINI Hafniæ 1707. 4°. prodiit.
- Helvetica Pharmacopœa*, Basil. 1771. fol.
- HELVETIUS *Traité des Maladies les plus fréquentes*, Paris 1724. 8°. Est editio tertia.

SYLLABUS AUCTORUM.

HIÆRNE in notis Cl. MURRAY ad opus *Rosenianum*.

HILDANUS Guilielm. Fabricius *Observationes Chirurgicæ* 1598. edi cœptæ. Omnes collectæ occurrunt in *Operibus* a BEYERO editis, Francofurti ad Mœnum 1646. fol.

HIPPOCRATES V^{to} ante C. N. Seculo vixit. Utor ejus *Operibus* Græcæ & Latine per FOESIIUM editis Francof. 1695. fol.

HOFFMANN in JACOBI *Descriptione methodi Mercurium Sublimatum Corrosivum tutius copiosiusque exhibendi*, Monast. Westphal. 1772. 8°.

HOFFMANN Friderici *Observationes Physico-Chymicæ*, Halæ 1722. 4°

Medicina Consultatoria, Halæ 1721-1739. 4°.

videatur POTERIUS.

HOLLANDUS Isaac Seculi XV. Auctor. Ejus Scriptorum crebrius impressorum editione utor sub titulo *Bewährte Chymische Schriften*, Viennæ 1746. 8°. impressa.

HOMBERG in *Académie Royale des Sciences*.

HUXHAM Johann. *Observationes Medicæ & Chymicæ de Antimonio*, *Operum Physico-Medicorum*-a REICHELT editorum Tomo tertio insertæ.

JOUBERT Laurent *Pharmacopœa* per ZANGMEISTER, Lugd. 1579. 8°.

ISENBURG Comes apud WALLBAUM.

JUNCKEN Joh. Helfr. *Corpus Pharmaceutico-Medicum*, Francof. 1697. 4°.

KALDE videatur *Hamburgense Dispensatorium*.

KHUNRAD Conrad *Medulla Destillatoria & Medica*, Lipsiæ 1549. 8°. Utor editione Hamburg. 1605. 4°.

KIEFER in *Pharmacopœa Argentoratensi*.

KLEIN Ludov. Godofred. *Selectus rationalis medicamentorum*, Lipsi. 1756. 8°.

KORNMANN apud SCHULZ in *Prælectionibus in Dispensatorium Brandeburgicum*.

KUNCKEL Johann van Lœwenstern *Laboratorium Chymicum*, Hamburg. 1716. 8°. Utor editione 1738. 8°.

SYLLABUS AUCTORUM.

- KUNCKEL** *Chymische Tractatelein* a BURGGRABE editi, Frankf. und Leipzig 1724. 8°.
- LANFRANCUS** *Practica, quæ dicitur Ars completa totius Chirurgiæ*, Venet. 1490. fol.
- LANGELOT** Joel in *Miscellaneorum Naturæ Curiosorum* Decade prima.
- LANGIUS** Johannes *Epistolæ* Hanov. 1605. 8°. Auctor a. 1565 mortuus est.
- LEIBNITZ** Godofr. Wilhelm. *Protogæa*, Gœting. 1749. 4°.
- LEMERY** Nicolas *Cours de Chymie*, Paris 1676. 8°. Utor editione notis BARON illustrata, Paris. 1756. 4°.
- Pharmacopée universelle*, Paris 1698. 4°.
- LENTILIUS** Rosin. *Miscellanea Practica*, Ulmæ 1698. 4°.
- LEWIS** William *Materia Medica*, London 1761. 4°.
- LIBAVIUS** Andreas *Syntagma Arcanorum Chymicorum*, Francof. 1611-1613. fol.
- Epistolæ Chymicæ*, Francof. 1595-1599. 8°.
- Singularia*, Francof. 1599-1601. 8°.
- LIGER** *sur la Poudre des Chartreux* 1720. Hæc scheda inserta est Dissertationi MILLARS de explorata *Kermes mineralis in medendo efficacia*, Argent. 1752.
- LINNEËUS** Carol. *Systema Naturæ*, Holmiæ 1766-1768. III. T. 8°.
- LOBELIUS** Matthias *Historia Stirpium*, Antwerp. 1676. fol.
- Londinensis Pharmacopœa* 1632. fol. In linguam Gallicam versa & eximie illustrata prodiit Paris. 1764. 4°. II. Voll. Utor editione Londinensi 1746. 8°.
- LOWER** Richard *Descriptio Decocti Avenacei* creberrime excusa. Cito editionem Germanicam Beuthen 1755. 8°, additionibus plurium Medicorum auctam.
- LUDOVICI** Daniel *Pharmacia moderno seculo applicanda*. Utor *Operibus* a MICHAELI editis, Francof. ad Mœnum 1712. 4°.
- LUCE** de in *Recueil Periodique* T. IV.
- LULLIUS** Raymundus Seculo XIII. floruit. *Scripta Chemica*, ejus nomen præ se ferentia medio seculo XVI fuerunt impressa. Utor eis, quas MANGETTUS *Bibliothecæ Chymicæ* inseruit.

SYLLABUS AUCTORUM.

- MACBRIDE David *Experimental Essays*, London 1764. 8°. Cito editionem auctam, London 1767. 8°.
- MACQUER *Dictionnaire de Chymie*, Paris 1778. 4°. 3 Voll.
- MAETS Carol. Ludov. *Chemia rationalis*, auctore P. T. Lugd. Bat. 1687. 4°.
- MAGNUS Auctor Seculi II. apud GALENUM.
- MANARDUS Johann. *Epistolæ*, Paris. 1528. 8°. Utor editione quæ Basileæ 1540. fol. prodiit.
- MANLIUS Johann Jacob. *Luminare majus*, Venet. 1496. fol. Cito editionem Venetam, 1553. fol.
- MASSARIAS Dominic. Vicent. *De ponderibus & mensuris*, Tigur. 1584. 8°.
- MATHIOLUS Petr. Andr. *Commentarii in Dioscoridem*, Venet. 1548. 4°. Italice. Utor editione *Operum* a CASPARE BAUHINO 1598. fol. publicata.
- MAYERNE *Medicamentorum formulæ*, Londin. 1640. fol. Recusæ cum operibus a BROWN Londin. 1703. fol. editis.
- MEAD Richard *Mechanical account of Poisons*, London 1702. 8°. Cito *Opera*, Gœtting. 1748. 8°.
- MEYER Joh. Frider. *Chymische Versuche zur næhern Erkenntnis des ungelœschten Kalcks*, Hannover und Leipzig 1764. 8°.
- MESUE Damascenus Seculo XII. floruisse dicitur. Libri *de Re Medica*, Antwerpia 1479. sunt impressi. Utor *Operibus* a COSTÆO, Venet. 1589. fol. editis.
- MICHAEL Johann. *Opera Medico-Chirurgica*, Norimberg. 1688. 4°.
- MINDERER Raymund *Aloedarium Marocostinum*, August. Vindel. 1616. 8°.
Medicina militaris, seu liber castrensis Euporista ac facile parabilia medicamenta continens, Aug. Vind. 1621. 8°.
- MOEBIUS Godofred. apud HOFFMANN in *Clave Schrœderiana*.
- MOEGLING apud ZELLER & WEISSMANN in *Dissertatione de Docimasia, signis, causis & noxa Vini Lithargyrio mangonifati*, Tubing. 1707. 4°.

PARS I.

)()()(

SYLLABUS AUCTORUM.

- MONTANUS Joh. Baptist. *Explicatio eorum, quæ pertinent tam ad qualitates simplicium medicamentorum, quam ad eorundem compositionem*, Venet. 1555. 8°.
- MONTAGNANA *Antidotarium*, Venet. 1565. fol.
- MORETTE du apud BAUMÉ.
- MORT le Jacob. *Pharmacia Medico-Physica*, Lugd. Bat. 1684. 8°. & in MORLEY *Collectaneis Chymicis*.
- MYNSICHT Adrianus van *Theſaurus & Armamentarium Medico-Chymicum*, Hamburg. 1631. 4°. Utor editione Genev. 1697. 8°.
- MYREPSUS Nicolaus Seculi XIII Auctor. Codex Græcus nunquam impressus est. Vertente FUCHSIO idiomate latino prodiit Bafil. 1549. fol.
- NICOLAUS vid. PRÆPOSITUS & MYREPSUS.
Norimbergense Dispensatorium 1666. fol.
- ORIBASIVS Seculo IV. floruit. Ejus scripta in linguam Latinam versa prodierunt Parif. 1558. 8°. Utor eisdem *Medicæ artis Principibus* ab HENRICO STEPHANO, Parifius 1567. fol. adjunctis.
- Palatinum Dispensatorium*, Manhem. 1764. fol.
- PALMARIUS Jul. *de morbis contagiosis*, Lutet. Parif. 1578. 4°. Cito editionem Francof. 1601. 8°.
- PARACELSVS Philipp. Aureol. Theophrast. Bombast. ab Hohenheim verum nomen fuit HOCHENER; anno 1541. obiit. Opera idiomate Germanico prodierunt, edente HUSER, Bafil. 1588-1590. X. Tomis; Latine autem, Francof. 1603. 4°. Utor editione Genevensi 1658. fol. 3 Voll.
- Parifensis Pharmacopœa* anno 1637. primum prodiit. Cito editionem sub titulo *Codiciſ Medicamentarii* a BOYERO publicatam Parif. 1758. 4°.
- PERARD apud BAUMÉ.
- PISO Guilielm. *de Indiæ utriusque re naturali & medica*, Amstel. 1608. fol.
- PLENCK Joſeph. Jacob. *Pharmacia Chirurgica*, Viennæ 1775. 8°.

SYLLABUS AUCTORUM.

PLUMER in *Essais and Observations by the Society of Edinburgh*.
1732. 8^o.

POMET Pierre *Histoire générale des Drogues*, Paris 1694. fol.
Utor editione Parif. 1735. 4^o. 2 Voll.

PORTLANDIÆ COMES in *CLEPHANE Medical Observations and
Inquirys* T. I.

POTERII Petr. *Insignes Curationes & singulares Observaciones*
Venet. 1615. 8^o.

Pharmacopœa Spagyrica nova & inaudita, Bonon. 1622. 8^o.

Utor *Operibus* curante FR. HOFFMANN editis, Franco-
furti ad Moenum 1698. 4^o.

PRÆPOSITUS Nicolaus Alexandrinus Seculo XIV vi-
xit *Dispensatorium ad Aromatarios*, Venetiis 1471. fol.
Cito editionem Lugd. 1505. 4^o.

Pragensis Dispensatorium, Vetero-Pragæ 1739. fol.

PRINGLE John *Observations on the diseases of the Army*, Lon-
don 1764. 8^o. Est editio quarta.

PYTHAGORAS sexto ante C. N. Seculo vixit; apud GALENUM.

QUERCETANUS du Chefne Joseph. *Antidotaire spagyri-
que*, Lyon 1576. 8^o. Editio auctior prodiit sub titulo *Phar-
macopœa Dogmaticorum restitutæ*, Parif. 1607. 8^o. Cito
editionem Francof. 1615. 4^o.

Ratisbonense Dispensatorium 1727. fol.

REINESIUS Thomas *Chymiatra*, Geræ 1624. 4^o.

RENODÆUS Renoy Johann. *Institutiones Pharmaceuticæ*,
Parif. 1608. Cito editionem Francofurt. 1615. 4^o.

RETZ Andr. Joh. *Schwedische Academie*, 1770. 8^o.

RHAZES seculo X. floruit. *Continens Brixia* 1486. fol. *Libri ad
Mansorem* Venetiis 1497. fol. sunt impressi. Utor *Operi-
bus* Basil. 1544. fol.

RICHARD de Hautefierck *Formulæ medicamentorum noso-
dochiis militaribus adaptatæ*: in *Recueil d'Observations de
Medecine des Hopitaux militaires*, Paris 1766. 4^o.

RIEDLIN in *Dispensatorio Argentoratensi*.

RINGELMANN in *Pharmacopœa Danica*.

SYLLABUS AUCTORUM.

- RIVERIUS Lazarus medio Seculo superiore inclaruit. Cito
Opera Genevæ 1737. fol.
- ROSEEN von Rosenstein Nils *Anweisung zur Kænntnis und
Cur der Kinderkrankheiten*, Holmiæ 1764. Suecice. Utor
editione Germanica egregiis additionibus Illustris MUR-
RAY aucta, Goetting. 1781. 8°.
- Rossica Pharmacopœa*, Petropol. 1778. 4°.
- ROTH Gottfried *Anleitung zur Chymie*, Leipzig 1717. 8°.
Utor editione Frankfurt und Leipzig 1739. 8°. Auctor
obiit anno 1710.
- RUFUS Seculo primo ad finem vergente creditur floruisse. *De
purgantibus*, Paris. 1555. 8°. Utor *Operibus* a CLINCH
editis Londin. 1744. 4°.
- RULAND Martin. *Curationum Empyricarum & Historiarum in
certis locis & notis personis expertarum & rite probatarum
Centuriæ*, Basil. 1578. 16°.
- SAINTYVES *Traité des maladies des yeux*, Paris 1722. 12°. Ci-
to editionem Amsterdam. 1736. 12°.
- SALA Angelus *Traçtatus Chemicos* cœpit edere anno 1608.
Omnes prodierunt collecti Francofurt. 1647. 4°. Utor edi-
tione aucta sub titulo *Collectaneorum Chymicorum opera
& studio J. D. Thom.* Francof. 1693. 4°. impressa.
- SCHMUCKER *vermischte chirurgische Schriften*, Berlin & Stettin
1776. & 1779. 8°.
- SCHROEDER Joh. *Pharmacopœa Medico-Physica*, Ulmæ 1641.
Utor editione Francof. 1668. 4°.
- SCHULZII Joh. Henr. *Prælectiones in Dispensatorium Bran-
deburgicum* 1735. Utor editione Norimb. 1753. 8°.
- SEIGNETTE in *Academie Royale des Sciences* 1731. & *Differ-
tatione* ENCKELMANN *de Sale Alkali Seignette*, Argent.
1756.
- SENNERTUS Daniel *Practica Medicinæ* 1628-1635. 4°.
- SERAPIO Seculo X. videtur floruisse. *De simplicibus Medicinis
Opus* per BRUNFELS, Argentorat. 1531. fol.
- SLONNE in GAUBII *Methodo conscribendi formulas*.

SYLLABUS AUCTORUM.

- SNELLEN Paul. *Salis communis triumviratus*, Amstel. 1714. 8°.
- STAHL Georg. Ernest. *Opusculum Chymico-Physico-Medicum*, Halæ 1715. 4°. & in *Dispensatorio Brandeburgico*.
- STARCKEY Georg. *Pyrotechnia Anglica*, London 1658. 12°. Utor versione Germanica, Norimb. 1722 impressa.
- STÖERCK Anton. *Libellus, quo demonstratur Colchici Autumnalis radicem non solum tute posse exhiberi hominibus &c.* Vindobon. 1763. 8°.
- STOUGHTON in BAUMÉ *Elémens de Pharmacie. Suecica Pharmacopœa*, Holmiæ 1775. 8°. Editio altera & emendata prodiit 1779. 8°.
- SYDENHAM Thom. *Observationes Medicæ circa morborum constitutiones*, London 1667. 8°.
Dissertatio Epistolaris de Observationibus nuperis circa curationem Variolarum confluentium, nec non de affectione Hysterica, London 1682. 8°.
Progressus integri in omnibus fere morbis curandis, London 1693. 12°.
 Utor *Operibus* Lugd. Bat. 1741. 8°.
- SYLVIUS Jacob. *Methodus medicamenta componendi*, Lutet. 1541. 8°.
De medicamentorum simplicium delectu, præparationibus, Miftionis modo, Paris. 1542. 8°.
 Utor *Operibus Medicis* a MOREAU editis, Colon. Allobrog. 1630. fol.
- SYLVIUS Francisc. de le Boe *Opera*, Amstelod. 1679. 4°. Cito editionem Genevæ 1681. fol.
- TACHENIUS Otto *Hippocrates Chemicus*, Venet. 1666. 8°. Cito editionem Brunsvic. 1668. 12°.
De morborum Principe, Bremæ 1668. 12°. Cito editionem Osnabrug. 1675. 12°.
- THIBAUT Pierre *Cours de Chymie*, Paris 1667. Utor editione Lyon 1672. 8°.
- TILLET in *Académie Royale des Sciences* 1767.
- TRILLER Daniel Wilhelm. *Dispensatorium Pharmaceuticum Universale*, Francof. ad Moen. 1764. 4°.

SYLLABUS AUCTORUM.

- TURNER Daniel *Siphylis a practical Dissertation on the venereal disease*, Lond. 1717. 8°.
- Tunquineses in *Philosoph. Transact.* N°. 474.
- VALENTINUS Basilius. Auctoris seculi XV scripta crebro tam seorsim quam in Theatris & Museis Chymicis collecta sunt impressa. Utor *Chymische Schriften* per PETRÆUM 1740. 8°.
- VARIGNANA Guilielm. *Opera*, Basil. 1545. 4°.
- VICAT Philipp. Rudolph. *Observationes Practicæ*, Bernæ 1780. 8°.
- VERNY F. *Pharmacopée de Bauderon augmentée de remarques*, Lyon 1681. 4°.
- Viennense Austriaco Dispensatorium*, Vindobonæ 1729. fol. reculum 1765.
- VIGO Johannes de *Practica*, Romæ 1514.
- VILLANOVANUS Arnoldus. De Villa nova verum nomen est. BACHUONE Seculo XIV. floruit. *Opera*, Venet. 1505. fol. Utor editione Basil. 1585. fol.
- VITET *Pharmacopée de Lyon* 1778. 4°.
- UTECHT apud ZWINGER in *Dissertat. de Nitro*.
- WALDSCHMID Joh. Jac. *Institutiones Medicinæ rationalis*, Marburg 1688. 8°.
- WALLBAUM Joh. Jul. *Index Pharmacopolii completi*, Leipzig 1767. fol.
- WALLERIUS Joh. Gottschalck *Systema Minerale*, Holm. 1772. 8°. 2 Voll.
- WEBER Joh. Carol. *Anchora Sauciatorum*, Brigæ 1677. 8°.
- WECKER Joh. Jacob. *Antidotarium speciale*, Basil. 1581. 4°.
- Pharmacia in artis formam redacta*, Jenæ 1675. 4°. Utor editione Jenæ 1693. 4°.
- WEDEL Georg. Wolfgang *Pharmacia Acroamatica*, Jenæ 1686. 4°.
- Compendium Chymicæ*, Jenæ 1715. 4°.
- WEISMANN Joh. Frid. in *Academ. Natur. Curios. Novor. AC. T. I.*

SYLLABUS AUCTORUM.

- WEPFER Joh. Jac. *Observationes Medico-Practicae*, Tiguri 1745. 4°. Obiit anno 1695.
- WERLHOFF Paul. Gottlieb in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- WESTENDORF Joh. Christoph. *Dissertatio de optima Acetum concentratum ejusdemque Naphtham conficiendi ratione*, Goetting. 1772. 4°.
- WHYTT Robert *Observations on the nature, causes and cure of those disorders which have been commonly called nervous, hypochondriacal or hysteric*, Edinburgh. 1765. 8°.
- WIDSTOECK in *Stralsundisch Magazin* Vol. I.
- WILDEGANSIUS in *Dispensatorio Brunsvicensi*.
- Wirtembergica Pharmacopœa*, Stuttgart 1740. fol. recentissime recusa 1771. fol.
- WOLFF in QUERCETANI *Pharmacopœa Dogmatica*.
- WOLFF Joh. Philipp. in *Academ. Natur. Curios. Act.* Vol. VII.
- WURZ apud HILDANUM.
- ZELLER apud *Wirtembergenses*.
- ZWOELFFER Joh. *Annotationes in Pharmacopœam Augustanam*, Norimberg. 1667. fol.
- Pharmacopœa Regia*, Norimberg. 1668. fol.





PROLEGOMENA.

§. I.



Pharmacopœa, quam etiam *Pharmaciam* appellare solent, est Ars Medicamenta colligendi, præparandi & dispensandi. Antiquitus per longam seculorum seriem ipsorum Medicorum proprium hoc negotium erat. Qui unice vendendis substantiis, quæ ad restituendam sanitatem conducere putabantur, operam dabant *Seplasiarii*, *Aromatarii*, *Pigmentarii*, *Medicamentarii*, *Unguentarii*, *Myropolæ*, *Pharmacopolæ Circumforanei* nominati, a Medicis æque ac a recentioris ævi *Pharmacopœis* erant sane quam diversissimi. Cum vero tam cognitionum Medico acquirendarum amplitudo, quam medicamentorum copia insigniter crevisset, Medentes etiam accuratius in morbos, quos tractandos susceperant, inquisivissent & tali scrutinio multum temporis dandum esse sensissent,

quin & horum opem crebrius ægrotantes imploravissent; Clinici curam medicamentorum dispensandorum propriis hominibus reliquerunt, qui *Pharmaceutæ*, *Pharmacopolæ* & labente ævo *Apothecarii*, *Confectionarii* &c. dicebantur. Qua temporis periodo Pharmaceutæ proprium artificum genus constituere cœperint, accurate determinari nequit; cum eorum nulla apud Auctores priorum a Christo nato seculorum mentio occurrat. MESUE *Senior* autem, qui sub initio seculi IX vixit, cum Pharmacopœi filius fuisse feratur, probabilem conjecturam suppeditat, Pharmacopœiam tanquam Artem a Clinice distinctam inter Arabes, postquam scilicet una cum reliquis litteris ad Saracenos Medicina quoque transierat, ortam esse. Litteras inde in Europam reduces Pharmacia quoque est secuta, cognitaque mox insigni ejus ad vitam communem utilitate, Rerumpublicarum Proceres hanc artem exercentibus propria jura concesserunt, justos eorum limites constituerunt, legibusque caverunt, ne Arti saluberrimæ spurii impostores maligni se intrudere & maculam adspargere possint.

§. II.

Antiquiores jam Medici circa medicamentorum simplicium delectum erant occupati. MANTIAS, qui proximo ante Christum natum seculo vixit, primus de *compositione Medicamentorum* scripsisse GALENO dicitur, cui & ipsi, in hoc artis genere versatissimo multarum, quibus præci medentes utebantur, compositionum notitiam debemus. MESUE rem pharmaceuticam qualis apud Arabes obtinuerat, nobis reliquit. Post renatas in Europa litteras, crescente in dies Artis nostræ ambitu, copiosa sese exceperunt volumina, quibus Medicamentorum parandorum rationes exponebantur. Hi tractatus *Luminaria*, *Antidotaria*, *Pharmacopœæ*, *Dispensatoria* inscribebantur; & priores quidem horum auctores SALADINUS scilicet, NICOLAUS uterque, & MANLIUS GALENUM & MESUE maximam partem compilarunt. Orta sub initio seculi XVI nova Chemicorum secta cum Medicina in *Galenicam* & *Chemicam*

distingueretur, Pharmacia eandem partitionem subiit; & *Chemicæ* quidem parti illas annumerabant præparaciones, quæ ope Operationum Chemicarum peragerentur, reliquas hætenus usitatas simpliciores *Galenicæ* relinquentes; utramque vero receperunt, quæ exinde prodierunt Pharmacopœæ. Magistratus cum perspicerent, quanti ad salutem communem interesset, ut medicamenta rite pararentur, nec tanti momenti negotium vago singulorum arbitrio committeretur, vel etiam imperitiæ artificum relinqueretur, publica auctoritate non ediderunt solum Præscriptiones Medicamentorum, sed etiam sanxerunt. Inter primos *Florentini, Bergamenses, Norimbergenses, Augustani, Parisini* salubre hoc consilium ceperunt, quos dein longe maxima pars Europæ est secuta, ita ut hodie paucae urbes existant, quæ non *Pharmacopœam* typis evulgaverint; sed plurimæ quoque hujus generis Collectiones a privatis sunt editæ, & prostat jam tanta eorum copia, ut singulas recensere nimis esset prolixitatis; adjudicare autem summæ arrogantia.

§. III.

Præter ea, quæ sunt Viri boni & probi, requiritur non modo ut Pharmacopœus calleat linguas, quibus conscripti sunt libri, unde cognitiones ad artem suam facientes & hauriat & augeat. Latinæ & Gallicæ notitia carere nequit, sed eximii ipsi usus etiam erunt Anglica & Germanica, nec male his Italica quoque jungeretur. Omnibus præterea Scientiis, quibus Chemia nititur, omnino necesse est, ut animum habeat imbutum, Logica nimirum, Physica, & Mathesi. Nec circa delectum Medicamentorum simplicium officiis suis poterit defungi, nisi Historiam Naturalem habuerit perspectam; qui enim ignorat, characteres, unde omnia Corpora naturalia agnoscuntur, nec accurate nosse poterit ista, quæ ad scopos medicatos faciunt. Sed in ipsa Pharmaciæ administratione præterea plura occurrunt, quæ tanquam leviora litteris non consignantur, non pauca etiam, ad quæ rite exsequenda omnino iteratum crebro exercitium requiritur. Itaque prudenter omnino legibus cautum est, ut

juvenes, antequam Pharmacopœorum jura affequantur, tirocinia artis sub ductu probatorum Artificum ponant. Optima ratio bonum Pharmacopœum formandi, ea mihi quidem esse videtur, ut primum in Gymnasio Litteras humaniores tiro & prima Logices æque ac Matheseos principia ediscat. Cursu Gymnasii non abrupto, sed rite emenso, committatur Pharmacopolio probe instructo & in eo saltem per triennium in omnibus, quæ ad Artem faciunt, negotiis sedulo se exerceat, nec labores, quos vel viliores esse putet, infumere detrectet. Omne quod ipsi a laboribus pharmaceuticis superest tempus, repetendis & colendis, quæ in Gymnasio tractaverat, studiis impendat; finito tirocinio in officina quadam multum frequentata per unum aut alterum annum ministrum agat, nec unquam culturam scientiarum, quibus in Gymnasio imbutus erat, negligat; egregie omnino suis rebus ibit consultum, si hoc ministerii tempus in aliquo emporio transiget & tabernas mercatorum, quos Seplasiarios hodie dicimus, sedulo frequentabit. Per idem tempus meliora quæque rerum Pharmaceuticarum Elementa, in quem censum NEUMANNUM maxime atque Clarissimum BEAUMÉ refero, studiose legat ac relegat. Hac methodo praxi Pharmaciæ abunde exercitatus & imbutus, adeat Academiam egregie instructam, Botanicæ ibi ceterisque Historiæ Naturalis partibus, ut & Physicæ & Chemiæ sedulo incubiturus, nec non Lectionum, quibus Materies Medica illustratur & regulæ Methodi Formularum conscribendarum traduntur, assiduus futurus auditor. Hac ratione formatus Pharmacopœus dignitatem Artis suæ tuebitur, publica comoda insigniter promovebit, ad provehendam Medicinam, augendamque Naturæ cognitionem Scientiæque Naturalis ambitum ampliandum haud inanem operam contribuet, una cum Medico salutem civium pariter consulens, Doctoris Medicinæ nequaquam, ut vulgo videtur, famulus, sed frater, collega, cooperatur, amicus.

§. IV.

Pharmacopœa in ampla area, certe in platea latiore ex-

strui debet. Ipsa penetralia luci sint penetrabilia, ita tamen ut ædes a Solis, meridiani inprimis, ardore fatis sint defensæ. Neque minus ex altera parte cavendum, ne humor medicamentis noceat. Omnibus ac singulis Pharmacopœæ receptaculis inscribantur litteris majusculis tituli, unde, quæ continent, appareat; uni receptaculo plura uno corpora non inferantur; diaphragmata confusioni ægre obsistunt; vasa pro variis, quæ includunt, substantiis vel ex ligno tiliaceo, vel figulari opera, vel ex vitro sint parata; metallica ob facile contagium semper sunt suspecta. Proxima Pharmacopœæ sit cella fornicata æstate calori, hieme frigori impenetrabilis, ubi Aquæ, Vina, Succī, Syrupi, Spiritus, Tincturæ, Electuaria &c. asserventur. Nec longe a Pharmacopolio distet Apotheca, sive promus condus, unde scilicet pro re nata promi condita possint. Vicinum pariter sit Laboratorium fornicatum, puteo, caminis & fornacibus instructum; cui quoque contiguam, omnino proficuum, velim esse officinam, in qua Decocta, Unguenta & cetera, quæ Galenica dicuntur, medicamenta parentur. In superna domus contignatione Vegetabilia indigena asservari solent. Capsæ, quibus condantur, sint ex ligno inodoro factæ, operculo tectæ & nomine substantiæ, quam continent, inscriptæ. Ipsa contignatio sit, ut aëri pervia, ita a solis æstu fatis tuta. Mundities denique per omnes domus partes prima sit ac postrema Pharmacopœi cura.

§. V.

Præcipuam supellectilem Chemicam in *Institutionibus Chemiæ* descripsi; reliquam ipse rerum usus ultro poscet. Explicandis vero jam ponderum ac bilancium generibus eo diutius immorandum videtur, quo majori circa eorum usum circumspeditione opus est. Bilancium probitatem perspicimus lancium ad jugum & ponderum in lancibus situm alternando. Quo longius est jugum, eo distinctior ponderum mensura patet. Requiritur bilances variæ librationis: aliæ non nisi aliquot Granorum, aliæ Drachmarum duarum, rursus aliæ Se-

munciarum & Unciarum, item aliæ aliquot Unciarum librandarum; & ita porro, quæ totas libras ponderant, pro harum numero variæ debent esse conformationis. Aquis, Spiritibus, Acetis propriæ mensuræ metallicæ respondent, determinantibus uncis Drachmas, Semuncias, Uncias. Medici Libram in duodecim Uncias, Unciam in octo Drachmas, Drachmam in tres Scrupulos, Scrupulum, Parisini quidem *Græcos* imitantes, in quatuor & viginti, reliquæ vero gentes ad normam *Salernitarum* in viginti Grana dividunt, Granum ejusque partes minime Grano Piperis, ut vulgo solet, sed laminis metallicis accuratissime definitis librandæ sunt. Libræ civili vulgo sedecim Unciæ tribuuntur. Sed ipsa Libra pro variis regionibus in immensum variat. In Germania propria Libra Medica obtinet; ceteræ gentes Libra communi pro ponderandis etiam medicamentis utuntur.

Diversissimarum nostri ævi Librarum rationem ad Libram Parisiensem redactam tam ex Clarissimis Auctoribus ABOT DE BAZINGEN & TILLET quam ex propriis observationibus hic exhibeo.

	<i>Libr. Paris.</i>	<i>Unc.</i>	<i>Dr.</i>	<i>Gr.</i>
Libra Amstelodamensis, quæ per omne Belgium obtinet	I.	---	---	42.
Argentoratensis	---	15.	5.	15.
Berolinensis	---	15.	2.	32.
Bernenfis æquat Parisinam				
Coloniensis	---	15.	2.	13½.
Dantiscana	---	15.	2.	7.
Florentina	---	11.	---	50.
Francofurtana ad Mœnum . .	---	15.	---	10.
Genevensis	I.	---	---	18.
Genuensis	---	10.	5.	60.
Hafniensis	---	15.	3.	20⅔.
Hamburgensis	---	15.	2.	15½.
Holmiensis	---	13.	7.	8.
Lisbonnensis	---	15.	7.	68.

	Libr. Paris.	Unc.	Dr.	Gr.
Libra Londinensis	---	12.	3.	12.
Lugdunensis	---	13.	4.	48.
Madridensis	---	15.	---	16.
Manhemienfis	---	15.	2.	20½.
Maffiliensis	---	13.	7.	62.
Medica in Germania passim ufitata	---	15.	4.	48.
Milanensis	---	9.	3.	---
Monachienfis	---	15.	2.	23.
Neapolitana	---	10.	7.	54.
Romana	---	11.	---	50.
Varfovienfis	I.	10.	4.	24.
Veneta	---	8.	6.	---
Viennensis	I.	2.	2.	32.

Londinensis, Genuensis, Florentina Uncia nec non Neapolitana & Romana duodecimam libræ partem æquat.

In mensurandis fluidis Libram vulgo *Schopinam*, *Seidel*, *Quart*, Angli *Pint* appellant, sed *Quart* Brandeburgensium sex & triginta Uncias, *Pinta* Parisiensium duas libras, *Demi-septier* autem semilibram æquat. *Mensura* quatuor Libris respondet. *Gallon* sive *Congius* octo continet libras; quatuor & viginti mensuræ apud nostrates *Ohmæ* nomine venit; *Muid* Parisiensium ducentis octoginta octo *Pintis* constat.

§. VI.

Antiquitatis quoque ponderum valor, cum multum lucis intelligendis Veterum scriptis subministrat, ex EISENSCHMIDIO & MASSARIO ad Libram Parisinam redactus hic subjungendus videtur.

Romani Libram, quæ ipsis etiam *Pondo* aut *As* audiebat, in duodecim Uncias dividebant. Ponderus Unciarum undecim *Deuncem*, decem *Dextantem*, novem *Dodrantem*, octo *Bessem*, septem *Septuncem*, sex *Semissem*, quinque *Quincuncem*, quatuor *Trientem*, trium *Quadrantem*, duarum *Sextantem*, Unciam unam cum dimidia *Sescuncem* nominabant.

	<i>Libr. Paris.</i>	<i>Unc.</i>	<i>Dr.</i>	<i>Gr.</i>
<i>Apud Romanos.</i>				
Centum p. ponderavit	67.	11.	2.	48.
Libra	—	10.	6.	48.
Uncia	—	—	7.	16.
Duella	—	—	2.	29.
Sicilicus	—	—	1.	58.
Sextula	—	—	1.	14.
Denarius Confularis	—	—	1.	2.
Imperialis five Drachma	—	—	—	65.
Victoriatus	—	—	—	37.
Scriptulum	—	—	—	21.
Obolus	—	—	—	11.
Siliqua	—	—	—	4.

Apud Græcos.

Τάλαντον	54.	2.	5.	24.
μνᾶ, Mina	—	14.	3.	40.
Δραχμή	—	—	1.	11.
ὀβολός	—	—	—	13.
κεράτιον	—	—	—	4.
καλκός	—	—	—	2.
λεπτήν	—	—	—	$\frac{1}{3}$.

Apud Arabes & Græcos Recentiores & Latino-Barbaros.

Alchemion	—	14.	3.	40.
Manes, Ominos	—	10.	6.	28.
Sacrajati	—	2.	6.	41.
Sacros, Auguen, Adar, Affatil	—	—	7.	16.
Nux magna vel Regalis	—	—	3.	44.
Sextarius, Stater	—	—	3.	44.
Nux parva	—	—	2.	50.
Alcovanus	—	—	2.	29.
Aureus, Alcaubolus	—	—	1.	14.
Atogochilos, Holca, Alchi, Darchimi,				

Ologinat,

	<i>Libr.</i>	<i>Unc.</i>	<i>Dr.</i>	<i>Gr.</i>
Ologinat, Nabach, Avellana, Bondacate	—	—	1.	11.
Balanus, Lupinus, Bachilea, Faba Ægyptia vel Syriaca	—	—	—	42.
Faba Alexandrina, Tremessis, Kemeraja	—	—	—	30.
Ganchus, Gormin, Gramma, Harmi, Kermet, Faba Græca	—	—	—	21.
Seminet, Cumulus, Annulus, Onolaf-sent, Onolöflich	—	—	—	11.
Danich	—	—	—	8.
Kirat, Kararit, Autulas, Alkilat	—	—	—	4.
Aquæ frigidæ Mensuræ Romanæ æquant Parisinas sequenti ratione.				
	<i>Libr.</i>	<i>Unc.</i>	<i>Dr.</i>	<i>Gr.</i>
Culeus	1133.	6.	2.	—
Amphora seu Cadus	56.	2.	7.	24.
Urna	28.	1.	3.	48.
Congius	7.	—	2.	66.
Sextarius	1.	1.	7.	44.
Hemina	—	10.	1.	18.
Quartarius	—	5.	—	45.
Acetabulum	—	2.	4.	23.
Cyathus	—	1.	5.	30.
Ligula	—	—	3.	24.

Mensuræ Græcæ.

Μετρητής	84.	4.	3.	—
Χῆς	7.	—	2.	66.
Ξέσης	1.	1.	7.	44.
Κοτύλη	—	8.	7.	58.
Τέτραστον	—	4.	3.	65.
Ὄξύβατον	—	2.	1.	69.
Κύαθ	—	1.	4.	—
Κόγχι	—	—	6.	—
Μύσρον	—	—	3.	—
Χήρη	—	—	2.	—
Κοχλιάριον	—	—	1.	—
PARS I.	B			

Mensuræ Arabum, Medicorum Recentiorum & Latino-Barbarorum.

	Libr.	Unc.	Dr.	Gr.
Missohaos	3.	8.	1.	33.
Aben, Kift, Ejub, Eberia, Mina Romana	1.	6.	—	—
Fiala, Haffitius, Kaffitium	—	10.	1.	18.
Rejelati, Calyx	—	5.	—	44.
Cornufum, Pugillum	—	3.	2.	68.
Anefime, Æfaffe, Kaffuff	—	2.	4.	20.
Conos, Coatus, Alcantus, Almunefi, Cuabus, Briale	—	1.	5.	34.
Bachates parva	—	—	5.	56.
Cochlear maximum	—	—	4.	44.
magnum	—	—	1.	52.
Colanos, Raclanarium	—	—	1.	28.
Cochlear parvum, Flagerina, Cyanes minimum, Fahaliel	—	—	1.	11.
	—	—	—	42.

Noſtro ævo Libram ſigno ꝥ, Unciam ꝥ, Drachmam ꝥ, Scriptulum ſeu Scrupulum ꝥ ſolent denotare, quibus Characteribus, ſignum ꝥ ubi additur, pondus dimidiatum denotat. Characteres id genus Auctorum Veterum invenies collectas apud ARBUTHNOT & EISENSCHMID.

§. VII.

In colligendis Vegetabilibus hæc veniunt notanda. Radices annuæ colligendæ ſunt, quam primum caulem vel folia protruferint, biennes altero a ſatione feminis vere, perennes, ſive vere ſive primo autumno, antequam lignefcant. Folia decerpas efflorefcentium florum, Flores gemmarum vix explicitarum tempore; Fructus, ubi maturuerint. Cortices arborum, ſi qui defiderantur, ſemper Libri, quos *Cortices medianos* dicunt, recipiantur. Multa exſtant Florum genera una cum calycibus in uſum trahenda, quippe his præcipua inhæret virtus; huc præfertim Aromatica ex Didynamia defumta pertinent. Flores & Folia minora una cum cauli-

culis, quibus adhærent, in usum trahantur. *Summitates* dici solent, quæ hunc in modum carpuntur. Collectio Animalium & Mineralium, cum præter ea, quæ vel suis locis dicentur vel omnibus sunt notissima, nil habeat proprii, nullam moram in-jicit. Exsiccatio optime calore centum circa graduum Ther-mometri Farenheitiani aut quadraginta Reaumuriani susci-pitur qualem fornix furni dare solet; huic scopo & plurimis aliis laboribus Pharmaceuticis egregie inservit conclave, quod tali fornici superstructum est. Crassiores Radices, quo melius ex-ficcari queant, in taleolas sunt secandæ. Sereno semper cœlo Plantarum partes sunt colligendæ, nullo rore madidæ. Vege-tabilia culta, cum largius nutrimentum hauriant, præstant syl-vestribus; nec bene Veteres contrarium docuerunt. Aroma-tica & fragrantia eo sunt efficaciora, quo sub calidiore cœlo vegetarunt; frigidius Tetradynamicis magis favet.

§. VIII.

Medicamenta sicca in vasīs ligneis curate tectis asserven-tur. Limatura Martis, ne rubiginem contrahat, Salia in acre humescentia, ne deliquium patiantur, vitris conden-da sunt. Liquores tutissime vitris committuntur. Exulent omnino omnia vasa ex Cupro seu Stanno fabricata; ultimum me-tallum enim in supellectilem efformatum fere Plumbum rece-pit; quod facilis & perniciosi contagii esse constat. Potest tamen usus Stanni concedi asservandis Unguentis, Oleis infusis aliisve remediis, quæ nonnisi extus adhibentur. Mollia & liquida ex Saccharo parata Medicamenta vasīs porcellaneis, vel ubi hæc pretiosiora sint visa, ex Argilla teneriore exquisite paratis, quæ *Fayence* dicunt, aut Argillaceis Plumbo non incrustatis, immit-tuntur. Aromata, & quæ reliqua principia volatilia habent, diu sub forma Pulveris non asservare licet.

§. IX.

Optandum quidem esset, ut Characterum usus ex Medi-cina omnino proscriberetur, cum tamen etiamnum obtineant usitatiores saltem hic profero.

Acetum	+
destillatum	✕
Aër	△
Alumen	○
Amalgama	aaa
Ana	aa
Antimonium	♁
Aqua	▽
fortis	▽
Regis	∇
Arena	∴
Argentum	∩
vivum	♀
Arsenicum	∞
Auripigmentum	∞
Aurum	⊙
Balneum Mariæ	MB
Vaporis	VB
Calx viva	☿
Cancer	♋
Cineres clavellati	☐ ☿
Cinnabaris	♁
Cuprum	♀
Destillare	∩
Dies	♄
Ferrum	♁
Hora	⊗
Ignis	△.
Mensis	☒
Nitrum	⊖
Nox	♀
Oleum	∞
Plumbum	♄
Præcipitatum	☐
Præparatum	☐
Pulvis	♁
Recipe	℞

Retorta \odot
 Sal \ominus
 Ammoniacus \ominus xc
 fixus \ominus v
 volatilis \ominus Δ
 Spiritus \sim
 Vini rectificatus \mathcal{R}
 Stannum \mathcal{Z}
 Sulphur \mathcal{S}
 Tartarus \mathcal{T}
 Terra ∇
 Tinctura \mathbf{R}
 Viride Æris \oplus
 Vitrum \mathcal{X}
 Vitriolum \oplus
 Urina \square

§. X.

Medio ævo compendii causa aliqua Medicamenta ad communes locos ac titulos referre moris erat; en præcipuos!

Flores quatuor Cordiales.

Borraginis, Buglossi, Violarum, Rosarum, ultimi debent omitti, si tres tantum præscribuntur.

Fragmenta quinque Lapidum pretiosorum.

Granati, Hyacinthi, Sapphiri, Smaragdi, Carneoli.

Radices quinque Aperientes.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rufci.

Semina quatuor Frigida.

Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.

Herbæ quinque Emollientes.

Althææ, Malvæ, Mercurialis, Parietariæ, Violaria.

MATERIES PHARMACEUTICA.

ABELMOSCHI SEMINA *Bamiæ Moschataë, Grains de Musc, Bisamsaamen.* Fusca sunt, uniformia, leniter compressa, utrinque sinuata, odore ad Moschum accedente. Desumuntur ab Hibisco Abelmoscho L. Arbore utriusque Indiæ cive. Apud nos in tepidario contra frigus defendenda. *A quibusdam Infusis Nervinis adjicitur, aut ad Suffimigia recipitur.*

ABROTANUM *Aurone, Stabwurç* illud *Maris* epitheto olim a ceteris distinguebant. Asservantur inde cauliculi herbacei, foliis setaceis obfessi, fragrante & forti odore, sapore aromatico, amaricante. *Artemisia Abrotanum* L. BLACKWELL Tab. 555. Frutex in Europa Australi & Oriente sponte crescens apud nos in hortis colitur. LEWIS inde paucissimum Olei odorati obtinuit. *Vires Aromaticas edit; laudatur contra Vermes. Datur in Infuso, quod cum Spiritu Vini paratum, aquoso præstat.*

ABROTANUM FOEMINA, *La Garderobe, Gartencypressen.* Recipiuntur inde cauliculi teneri cum foliis angustis dentatis, albescentes, odore grato, sapore levi, aromatico & amaricante. *Santolina Chamæcyparissus* L. BLACKWELL Tab. 346. Crescit in Europa Australi, apud nos in frigidario asservanda. *Antecedentis vires, sed debiliores habet.*

ABSINTHIUM ALPINUM, *Le Genippi.* Folia sericea, angusta, pinnata, tenuiter divisa, grato aromate instructa. *Artemisia Rupestris* L. Helvetiæ, Sibirix, Oelandiæ civis. *Laudatur contra Febres intermittentes, ad Menses pellendos & Vulnera consolidanda.*

ABSINTHIUM PONTICUM, *petite Absinthe, Rœmischer Wermuth.* Folia alba, pinnatim tenuissime laciniata, non ingrati odoris, leviter amara, evidenter aromatica. *Artemisia Pontica* L. BLACKWELL Tab. 527. Crescit in Europa Orientali & in Palatinatu, in nostris hortis colitur. *Resolvit; Digestionem juvat; contra Vermes facit. Datur in Infuso aquoso.*

ABSINTHIUM VULGARE, *Absynthe, Wermuth.* Folia pinnata, pinnis latiusculis, alba, proprii non admodum grati odoris, saporis nauseosi, amarissimi. *Artemisia Absinthium* L. BLACKWELL Tab. 17. Passim in Europa obvium

it. BAUMÉ ex Foliorum libris viginti quinque, ad decem Dra-
chmas Olei odorati non amari obtinuit. *Resolyendi, Primas vias*
roborandi, Vermes necandi, Putredinem arcendi Scorbutum quoque, Podag-
ram, Hydropem curandi causa exhibetur. Datur sub forma Infusi
Aquosi, Vinosi, Spirituosi, Conservæ, Syrupi: Oleum de-
stillatum rarissime intus datur, Spiritu Vini dissolutum aut Sac-
charo exceptum vices Essentiæ sustinet: Extractum odore caret. Pro
usibus externis Oleum per Infusionem paratum prostat.

ACACIA ÆGYPTIACA. Inde prostat Succus inspissatus
in placentulas coactus rotundas, ex rufo nigricantes, in ore
liquefcentes, sapore adstringente & austero instructus. Obtinetur
ex fructibus immaturis Mimosa Niloticæ BLACKWELL T. 377,
Arboris in desertis Libyæ crescentis, apud nos in tepidario per
hyemem asservandæ. *A Veteribus multum scopo Adstringendi lauda-*
batur. Hodie evilit.

ACACIA NOSTRAS, *Prunier sauvage, Schlehenbaum.*
Inde Corticem, Flores, Fructus recipimus. *Cortex gryseus &*
rufus, adstringens: Flores recentes sunt albi, odore grato,
qui & exsiccatione non totus perit, sapore amaricante: Fru-
ctus sunt Drupæ rotundæ, nigræ, saporis austeri, qui vero, si
pruinæ aliquot expertæ fuerint, multum mitescit. Prunus
spinosa L. BLACKWELL Tab. 494. Crescit in Europa præter
maxime Meridionalem & Septentrionalem, nec non in Pen-
sylvania. Corticem a virtute Diuretica & Febrifuga laudant, Flores ab
Eccoprotica, quæ vero non raro tormina excitat, Fructus autem ab Ad-
stringente, frigore mitigati in modum aliorum fructuum horreorum come-
duntur. Cortices & Fructus cum aqua decoquuntur; hos quoque cum nu-
cleis contusos Vino infundere solent. Florum Manipulum unum cum aqua
aut Sero lactis infundunt aut in Syrupum cogunt. Aqua a Floribus ab-
stracta suave olens ad affectus Pectoris commendatur. Succum ex Bac-
cis frigore non mitigatis expressum & inspissatum primi Arabes
substituerunt Succo Acaciæ Ægyptiæ, a quo etiam non nisi ma-
jore nigredine differt; sed ne hoc ipso quidem ulterius utimur.

ACANTHUS Folia oblonga, lata, utrinque viridia, laciniata
laciniis acutis & dentatis, masticata mucilaginis sensum linguæ si-
stunt. *Acanthus mollis L. BLACKWELL Tab. 89. Italiæ ci-*

vis, nostram hyemem patienter fert. *Medicamentis externis Emollientibus cum successu adjicitur, inconsulte Branca Ursina substitui solet.*

ACER, *Erable, Ahorn.* Variæ ejus species Platanoïdes L. Europæ potissimum Arbor, Rubrum L. & Saccharinum L. Virginie & Pensylvaniæ cives, nostri climatis patientes, dum primo vere terebra inciduntur, succum fundunt instar aquæ limpidum, dulcem & inodorum, qui Sanguinis purificandi gratia ad duas libras de die bibitur; hic succus sub perpetua agitatione inspissatus abit in massam fuscam & dulcem quæ SACCHARUM ACERIS dicitur, ipsique Saccharo substituitur & ad morbos Pectoris magnopere commendatur.

ACETOSA, *Oseille, Sauerampfer.* Radices, Folia & Semina in officinas recipiuntur. *Radices* fibrosæ ex uno capite plures fibras longas & tenues edunt; cortex ex rufo flavescens medullam albidiorum includit; sapore præditæ sunt leviter amaricante, levius adstringente: *Folia* sunt oblonga, sagittata, acidi saporis, qui autem exsiccatione multum immittitur. *Semina* sunt spadicea, triquetra, & linguæ adstringentem sensum imprimunt. **Rumex Acetosa** L. BLACKWELL Tab. 230. Crescit per totam Europam, in hortis culta & major & succulentior redditur. *Radices* Adstringunt & cum Aqua coquantur, quæ inde rubella condit, sed color ab affusis Acidis destruitur. *Folia* Antiscorbutico, Antifebrili & Lithonriptico scopo adhibentur, rarius sub forma Infusi exhibentur, crebrius recentia Jusculis incoquantur. Succus inde expressus ad octo Uncias exhibetur; *Seminum* usus, quæ a virtute Adstringendi commendarunt & sub forma Pulveris propinarunt, eviliit.

ACETOSA ROTUNDI FOLII Folia exhibet sagittata, glauca, præcedentibus magis acida **Rumex scutatus** L. BLACKWELL Tab. 326. Europæ Meridionalis civis. *Folia* medicamento scopo vel præcedentibus merito præscribuntur.

ACETOSELLA *Alleluja, Sauerklee.* Folia habet, quorum tria uni petiolo insident, obcordata, firmula, levi hirsutie notata, sapore acido linguam feriunt, qui sapor autem exsiccatione vix non totus perit. **Oxalis Acetosella** L. Crescit passim per Europam, præter maxime Meridionalem, sed in agro Veronensi adhuc occurrit. *Adhibetur ad Refrigerandum Putredinem*

Putredinem corrigendam, Ventriculum roborandum. Datur sub forma Infusi aquosi, Conservæ, Syrupi, Succii expressi. Ejus Libra una sequi Drachmam circiter *Salis Essentialis* largitur, quod improprie fatis a Gallis *Sel d'Oseille* appellatur & rarissime a Pharmacopœis paratur, sed ex Helvetia, *Silva nigra* & *Martia* accerlitur. Conf. P. II.

ACETUM, *Vinaigre, Effig.* Liquor ex Vino denuo fermentationem suscipiente surgens, proprio non ingrato odore, qui nares evidenter irritat, sapore perinde linguam titillante & acido instructus. Aliud quam ex Vino, quod ab Uvis obtinetur, paratum adhibendum est nullum, illudque ipsum, quo fortius nares & linguam irritat, eo magis probatur, quoque generosius est Vinum, eo præstantius inde surgit Acetum. *Scopo Resolvendi, Putredini resistendi intus datur; Discutiendi & Sphacelum arrendi extus applicatur, nec non Excitandi sine Naribus admoventur.*

ACONITUM, *Napel, Eisenhütlein.* Folia sunt profunde quinquepartita, lobis cuneatis, incis, acute terminatis, lineatis, leviter odorata; recentia aliquanto postquam masticata fuerint, acrimoniam produnt, quæ ab exsiccatis tota abest *Aconitum Napellus L. BLACKWELL Tab. 561.* Passim in montibus crescit, apud nos in hortis colitur. *Veneri Narcotici effectus edit. Succus inspissatus sub nomine EXTRACTI asservatur, tanquam summum remedium a Granis sex ad decem & ultra aliquoties de die Resolvendi ergo in Rheumatismis & Arthritide, nec non in Quartana, laudatur. Dosis sensim sensimque ad Drachmam semis usque evectum fuisse lego.*

ACORUS, videatur CALAMUS.

ACORUS ADULTERINUS, *Pseudacorus, Flambe batarde, Wasserfchwertel.* Radix fibrosa, rugis distincta, extus ferruginea, intus alba, odore & sapore ad Iridem Florentinam accedens, cum quadam adstrictione. *Iris Pseudacorus L. BLACKWELL Tab. 261.* Per omnem Europam occurrit. *Alyum & Urinas ducere dicitur.*

ACMELLA adducitur ad nos sub forma Foliorum diffractorum viridum, multis stipitibus crassiusculis & longis comixtorum. Equidem in illis nullum saporem, nisi levissimum

salini vestigium potui distinguere. An quia effœta est, quæ hodie in tabernis prostat? *Spilanthus Acme* L. BLACKWELL Tab. 518. Crescit in Zeylona & Ternata. Annuæ planta, quæ sub dio in hortis nostris coli potest. *Ineunte hoc seculo ob vires Antinephriticas & Lithonripticas multum cœpit laudari. Dabatur sub forma Infusi Theæformis, hodie fere evuluit.*

ADAMAS, *Diamant.* Gemmarum durissima, fulgidissima & pretiosissima, igni majori exposita tota disparsens. Alumen lapidosum, pellucidissimum, solidissimum, hyalinum L. Reperitur in fodinis vel in arenis Afriæ & in Brasilia. *Nec Medicamentosas, nec Venenatas Vires habet.*

ADIANTHUM ALBUM, videatur RUTA MURARIA.

ADIANTHUM AUREUM, *Perce-mouffe, Golden Witherthron.* Prostat sub forma caulicorum simplicium rubrorum, undique foliolis linearibus, acutis, per exsiccationem contractis, rubiginosis obfessorum, capitulo quadrato, quod calyptra villosa tectum est, coronatis, insipidis. *Polytrichum commune* L. BLACKWELL Tab. 357. Copiose per silvas Europæ crescit. *Humores attenuare dicitur. Datur sub forma Theæformi.*

ADIANTHUM NIGRUM. Folia pinnata, pinnis ordinatim decrefcentibus ut integrum folium triangulum referat, obtusis, inæqualiter ferratis, sapore destituta. *Asplenium Adiantum nigrum* L. BLACKWELL Tab. 220. Passim in Europa crescit præterquam magis Septentrionali. *Viribus cum antecedente convenit.*

ADIANTHUM RUBRUM vel *Trichomanes.* Cauliculi rubri pinnis ovatis & crenatis obfessi, dulciculi. *Asplenium Trichomanes* L. BLACKWELL Tab. 370. Vulgatissima per Europam planta. *Vires antecedentium habet.*

ADHATODA. Folia majora ex ovatis acute terminata, superne viridia, inferne albida, validis nervis percurfa, saporis proprii amaro contigui, odore plane destituta. *Justicia Adhatoda* L. Zeylonæ civis, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. *Utero Purgando dicata a nonnullis dicitur.*

ÆGAGROPILÆ, *Gemsenkugeln.* Pilæ variæ magnitudinis & figuræ, a recrementis variarum plantarum efformatæ,

involucro tenaci & sicco obductis, fuscae vel nigrae, odoris & saporis leviter aromatici cum aliqua adstrictione. Calculi Ægagropilæ L. Reperiuntur in primo & secundo ventriculo Capræ Ruricapræ L. Animalis summis Alpium jugis immorantis. *Tota quantæ inertes.*

ÆS, videatur CUPRUM.

ÆTITES, *Pierre d'Aigle, Adlerstein.* Lapis ex Argilla indurata efformatus, in cujus cavitate alius lapis, *Callimus* dictus, laxè inclusus est, coloris ut plurimum lutei plus minusve fusci, figuræ sive rotundæ sive ovatæ. Ætites Aquilinus embryone libero terrestri L. Passim in Europa reperitur. *Commenta de ejus virtute ad Partum faciente jam diu ad aniles fabulas sunt ablegata.*

AGALLOCHUM, videatur ALOES LIGNUM.

AGARICUS, *Agaric, Lerchenschwamm.* Prostat sub formâ substantiæ fungosæ albæ, non raro in varia tubera divisæ, spongiosæ, quasi farinaceæ, digitos inquinantis, diversæ magnitudinis, levis, amaricantis, acriusculæ, nauseosæ, levissime odoræ. Boletus albus Laricis dictus L. Antequam officinis traditur, cutis tenax & colorata inde aufertur. In Europa Meridionali obtinet & in Oriente. Optimum ex Aleppo adduci contendunt. *Alvum incommode ducit. Sub forma Pulveris, Infusioquo- si exhibetur, aliis medicamentis admiscendus, in substantia ad Drachmam unam, in Infuso ad Unciam semis. In Trochiscos eum ope mucilaginis Tragacanthæ efformandi mos obsolevit.*

AGARICUS MINERALIS, videatur LAC LUNÆ.

AGARICUS PEDIS EQUINI FACIE. Prostat sub forma lamellarum mollissimarum, quæ consistentiam coriaceam mollem habent, colorem fuscum, odorem & saporem nullum. Parantur ex Boletto igniario L. variis arboribus accrescente, cujus exterior epidermis demitur; reliqua substantia mallei ictibus in lamellas, quales descripsi, effingitur. *Ad Sanguinem sistendum partibus cruentatis imponitur.*

AGNUS CASTUS. Recipiuntur inde capsulæ rotundæ, tomentosæ, aliquot feminibus foetæ, levissime odoræ, saporis aromatici. Vitex Agnus castus L. BLACKWELL Tab.

139. Arbor in Europa Meridionali & Carolina spontanea, hyemis nostræ patiens. *Aromatum vires habet, consilio pessimo contra Libidinem præscribitur; Emulsionibus etiam adjicitur.*

AGRIMONIA, *Aigremoine, Odermenning*. Folia longa, impari pinnata, pinnis ovato oblongis, inciso ferratis, inferne alba, odore nullo, sapore leviter adstringente. Agrimonia Eupatoria L. BLACKWELL Tab. 31. Crescit in omni Europa; *leves vires Adstringentes edit; datur sub forma Infusi Theæformis. Recipitur ad Gargarismata & Decocta Vulneraria. Oleum destillatum fundere dicitur.*

ALABASTRUM, *Alabâtre, Alabaster*. Est Lapis durus, qui ad chalybis ictum nullas scintillas emittit, cum acidis non effervescit, polituram admittit & in tenuia fragmenta factus semipellucidus apparet. Gypsum Alabastrum particulis impalpabilibus diaphanum L. Passim in Europa reperitur. *Omni Virtute medicata caret.*

ALBUM GRÆCUM, *Merde des chiens, weißer Hundskoth*. Est Excrementum alvinum Canum, ficcum & album, quod diutius asservatum odorem omnem amittit. *Sordidum Medicamentum hodie exolevit, saltem non nisi externe Resolvendi ergo adhibetur.*

ALCEA, *Alcée, Sigmundwurz*. Folia rotunda, profunde lobata, lobis denuo profunde divisis, scabra, inodora, insipida. Malva Alcea L. Crescit passim per Europam, præterquam magis Septentrionalem. *Emollientibus adscribitur, sub forma Infusi, Cataplasmatibus, Enematis adhibetur.*

ALCES UNGULÆ, *Pieds d'Elan, Elendsklauen* sunt magnæ, coloris gryfei ad nigrum vergentis, cultro rasæ nullum foetorem spargunt. Desumuntur a Cervo Alce L. in Europa Septentrionali, Asia & America occurrente. *Quæ de ejus virtute Antepileptica ferebantur, ad veterum commenta merito referuntur.*

ALCHYMILLA, *Pied de Lyon, Sinau, Frauenmantel*. Folia rotunda, plicata, pubescentia, lobata lobis rotundis & ferratis, adstringente sapore prædita. Alchemilla Vulgaris L. BLACKWELL Tab. 75. *Leniter Adstringendi causa ad Infusa Theæformia & Decocta Vulneraria recipitur.*

ALKANNA, *Orcanette, rothe Ochsenzunge*. Radices fibrosæ, calami anserini crassitiem æquantes, sub cortice purpureo

nigricante, medullam albam includunt, insipidæ. Anchusa tinctoria L. In Gallia Meridionali spontanea, nostras hyemes fert. *Unice ad tingenda quæque Pinguia nec non Spiritum Vini adhibetur.*

ALKANNA ORIENTALIS. Ex capite crasso copiosas lamellas sibi invicem incumbentes, pleniore purpura, quam radices antecedentes saturatas emittit; a Lawsonia inermi L. desumitur, sed rarissime in Pharmacopolia recipitur.

ALKEKENGI, *Halicacabum, Coquerets, Judenkirschen.* Bacca rotundæ, rubræ, pulpam continentes grate vinosam, cui Semina multa ovata, compressa, acriuscula, subamara in hærent. Ex Calice amarissimo illas exenturus caveat, ne istius vel levissimo attactu amaritie inficiantur. *Physalis Alkekengi L. BLACKWELL Tab. 161.* Crescit in Europa, citra magis Septentrionalem. *A vi Diuretica laudantur. Recentes ultro se offerunt comedendas, exsiccatæ decoquantur aqua, vel Succus inde expressus ad Unciam unam exhibetur.*

ALLIARIA, *Alliaire, Lurchel.* Folia cordata, glabra, dentato serrata, odore & sapore Allium referentia. *Erysimum Alliaria L. BLACKWELL Tab. 372.* Passim per Europam crescit. *A vi Diuretica & Antiscorbutica laudatur; jusculis adjicitur aut Succus inde expressus exhibetur. Folia contusa Antiseptico quoque scopo extus applicantur. Folia exsiccando fere inertia reddunt. Oleum destillatum dicitur fundere.*

ALLIUM, *Ail, Knoblauch.* Radix bulbosa est obvelata tunica sicca & alba, multis bulbis minoribus constans, quos *Spicas vel Nucleos, Zehen* appellant, & quidem incurvis, acutis, ad margines angulatis, hinc convexis inde planis, sub cuticula leviter rufescente carnem includentibus albam, proprii nauseosi odoris & saporis acris, quæ comesta animam ad sat longum tempus suo foetore inficit. *Allium sativum L.* Veterum fide ex Africa in Europam illatum hodie ubivis colitur. *Resolvendi causa ad juvandam Digestionem, curandos affectus Pectoris, Podagram & Febres intermittentes, Anthelmintico & Diuretico scopo adhibetur sive crude comedendum, sive Succus inde expressus; illud ad tres spicas, hic ad Unciam unam exhibentur. Extus Bulbi sub cineribus cocti Maturandi aut in pulpam contriti Rubefaciendi ergo applicantur.*

Sex & nonaginta Unciæ largiebantur Olei citrini, in aqua subfidentis, & penetrante suo odore omnia reliqua Olea odorata superantis Drachmam unam.

ALLIUM ASCALONICUM L. *Eschalottes, Schalotten.* Consistit ex Bulbis folitariis, sub tunica rufescente bulbillos continens convexo concavos, priori similes, odore vero & sapore mitiores. *Pakæstinæ civis, in hortis colitur; ad Condimenta maxime recipitur.*

ALLIUM SCORODOPRASUM L. *Rocambole.* Passim in Europa *Sylvestre* crescit, in hortis colitur. Bulbi umbellis innixi, subglobosi, ad latera compressi; tunica, qua sunt vestiti, ad colorem violaceum accedit, cætera cum prioribus fere habent communia. Ab Allio enim vulgari sapore & odore parum, viribus nihil differunt.

ALNUS, *Aunée, Erlen.* Folia nobis largitur rotunda, crenata, inferne albida, insipida. *Betula Alnus L.* Arbor in omnibus Europæ regionibus, Sibiria, Constantinopoli crescit. *Folia incisa & Mammis calida imposita multum ad Lac Discutendum laudantur.*

ALOES, Succus inspissatus, niger, qui in majoribus mafis nobis affertur, odore nauseoso, sapore amaro & acrimoniæ vicino. Inde ab Arabum temporibus tres ejus species in officinis prostant puritatis gradu inter se differentes; purissima est *Succotrina*; ad rubedinem accedit & nitore gaudet, cucurbitis inclusa nobis mitti solet; hanc *Hepatica* excipit, pleniore flavedine tincta; evidenter fordida est *Caballina* nigra, ficior, odorem minus fortem spirans. Ex varia succum ex foliis Aloës perfoliata veræ **L. BLACKWELL** Tab. 229. utriusque Indiæ civis, apud nos per hyemem tepidario fovendæ, expressum inspissandi ratione variæ hæ species oriuntur; *Succotrina*, ex succo defæcato spissitudinem sponte contrahente; *Hepatica*, ex succo pariter quidem defæcato, sed calore inspissato; *Caballina*, ex succo a fæcibus non mundato minusque diligenter cocto surgit. Hæc postrema ex officinis rejicienda. *Ob virtutes Alyum ducendi, Primas vias roborandi, Obstructiones Systematis Venæ Portarum reserandi, Vermes necandi, Putredinem arcendi laudatur. Sed inde Sanguinem, Hemorrhoidalem maxime, exæstuari Veteres jam perspexerunt, &*

hunc effectum a principio ejus resinoso pendere est observatum, quapropter pro usu interno non nisi Extractum aquosum est recipiendum; neque ad illud extrahendum, calor ullus, ne scilicet resinosa partes accrescant, est adhibendus; sed aqua cum Aloë frigide infusa per aliquod tempus est repouenda & depositis demum facibus, inde defusa leni calore evaporanda. Aloës Purgandi quidem scopo ad Drachmas duas, in reliquos usus ad Scrupulum unum præscribitur. Auctores mediæ ævi Aloën Infusis Vegetabilibus aut aqua solverunt & denuo inspissarunt, unde ALOES LOTA, INSUCCATA, ROSATA, VIOLATA extiterunt. Datur sub forma Pilularum, Electuarii, Infusi Spirituosi, Vinosi. Extus ejus Tinctura spirituosæ vel Pulvis recipitur; additur quoque Suppositoriis, Clysmatibus, Unguentis.

ALOES LIGNUM. Hoc nomine ad nos vehuntur frustra lignorum variæ magnitudinis badio aut nigro colore tincta, striis nigricantibus variata, aut refinam nigricantem in sinibus quasi exesis vehentia; his frustis ardentibus refina, qua scætent, fusa suavem odorem spargit, quem autem subsequens ligni accensi odor mox turbat. Nihil certi de arboris genere, nec unde nobis venit, liquet. In Indiæ Orientalis montibus insidere videntur arbores, quæ perinde ac nostræ Pinus ætate refina obducuntur; istarum arborum refina fragrantia sua ceteris præstat: frustra tota refina plena *Calambuc* dicta ad nos non perveniunt; tantum minus resinosa sub Ligni ALOES, AGOLOCHI, AQUILÆ, ASPALATI nomine nostras tabernas ingrediuntur & pro varia quam foveant refinæ ratione distinguuntur. *Olim Nervino scopo ad Pulveres recipiebatur nec non ad Suffimenta, hodie evilit.* Oleum destillatum consistentiæ butyracæ inde obtinebatur.

ALSINE, Morgeline, Hünerdarm, Vogelkraut. Folia parva, ovata, longis petiolis prædita, acute terminata, levissime hirsuta, insipida, inodora. Alfine media L. Vulgatissima per omnem Europam planta. *Vires Emollientes habere dicitur.*

ALTHÆA, Guimauve, Ibisch. Radix fibrosa sub cute leviter flavescens, qua dum exsiccat nudari solet, medullam albam habet subdulcem proprii nec ingrati odoris. Folia sunt cordato-oblonga, acute ferrata, quinqueloba, tomentosa, insipida, inodora. Flores albi monopetali, quinquefidi, inodori & insipidi, calice duplici tomentoso cincti asservantur. *Se-*

mina uniformia, compressa, striata, fusca, odoris & saporis expertia. *Althæa Officinalis* L. BLACKWELL Tab. 60. Crescit in Europa præter magis Septentrionali. *Demulcendi & Emolliendi scopo adhibetur, & cum hæ virtutes a mucilagine pendeant, quæ Radicibus quam reliquis partibus copiosior inhaeret, Radices ad hunc scopum frequentioris sunt usus. Datur sub forma Infusi, Decocti, Syrupi, Trochiscorum; recipitur ad Collutoria, Gargarismata, Cataplasinata.*

ALUMEN, *Alun, Alaun.* Est Sal in amplas massas concretus, crystallis majoribus efformatus, linguam valide adstringens, non nisi larga aquæ copia dissolvendus, Syrupi Violæ colorem non mutans, prunis superimpositus multum intumescens & pelluciditatem exuens. Dimidium ejus ponderis aqua, sextam partem Acidum Vitriolicum & quartam terra Argillæ propria efformat. Inter Europæos primi Itali illud pararunt, qui quidem cum per crystallisationem figuram lapis induere hoc Alumen ipsis videretur, ut a ceteris ejus generibus, quæ omnia hodie eviluerunt, distinguerent, nomen ei a *Rocca sive Rupei* indiderunt. LEIBNITZ *Protog.* 47. hanc denominationem a Rocca Syriæ, unde Alumen parandi trecentis ultra annis in Italiam delata fuit, repetit. Obtinetur ex variis fossilibus, unde post justam pro singulorum natura, præparationem elixivationis & crystallisationis ope elicitur. Purissimum creditur ROMANUM, quod Tolfæ ad centum cellas ex quadam Selenites specie paratur & leni roseo colore gaudet. *Valide Adstringit, quem in finem partibus Sanguinem fundentibus aqua solutum & linteis exceptum applicatur, ad Dentifricia quoque recipitur. Intus ad Hæmorrhagias aut Diarrhæas sistendas octo aut decem ejus Grana pro dosi exhibentur sive sub forma Pulveris sive sub forma Pillularum.*

AMARA DULCIS, *Douce amere, Je længer je lieber.* Recipiuntur Stipites duriusculi, flavidi, subangulares, rugosi, tuberculis hinc inde exasperati, inodori, amari cum præcedente quadam dulcedine. *Solanum Dulcamara* L. BLACKWELL Tab. 34. *Sanguinis Depurandi gratia commendatur. Stipites recentes exsiccatis præferuntur, Drachmæ duæ ad tres pro dosi ex aqua decoquantur.*

AMBRA, *Ambre gris.* Est Bitumen, quod in variæ magnitudinis

gnitudinis frustis ad nos adducitur, intus gryseis, extus nigricante crusta tectis, ex lamellis cum aliqua tenacitate fragilibus formatis, levibus, ad candelam facile liquefcentibus, vix non totis in auras evolantibus. Odor integræ sibi relictae Ambrae non fortis est, sed calori admotæ, aut cum aliis substantiis mixtæ & in pulverem trita fragrantissimus. Ipsa seorsum in pulverem cogi nequit. Ambra Ambrosiaca L. In omni mari, quod Asiam, Africam & Jamaicam alluit, reperitur, sive ipsi innatans, sive rupibus littoris accreta. Ambra Vulgatio L. & omnes ejus varietates arte sunt paratæ. *Ob fragrantem, quem spirat, odorem aliis substantiis adjicitur, quarum magnum volumen exigua ejus portio gratissimo odore imbuat. Ad vim Nervæ excitandam & augendam multum confert; cui vero scopo idoneam dosin ad triginta usque Granorum pondus extendi debere recentiora experimenta docent. Datur cum Saccharo in Pulverem trita aut Alcholle dissoluta & tunc ESSENTIA AMBRÆ dicitur. Adjicitur quoque Asperginibus cosmeticis, Balsamis, Suffimigiis.*

AMBRA LIQUIDA. Est Balsamum Peruviano spissius, fuscum, sapore præditum acri, aromatico, odore fragrante styracino; dicitur obtineri ex inciso cortice Liquidambar Styracifluæ L. Arboris in Virginia, Carolina & Regno Peruviano crescentis; apud nos in frigidario asservandæ. *Olim roborando Ventriculo inungebatur & gratiæ ergo medicamenti internis admiscebatur; hodie ei Styracem solent substituere.*

AMETHYSTUS. Est gemma post Adamantem & Rubinum durissima, coloris pulchre violacei & columbini. A WALLERIO Rubini species habetur. Ex Persia, Arabia, Armenia, India Occidentali ad nos adducitur; reperitur quoque in Gallia, Hungaria, Saxonia. In officinis ipsi sive Crystallum coloratum violaceum WALL. substituunt, quæ est varietas violacea Nitri lapidosi quartzosi octodecaëdri L. *Amethystus Occidentalis* dicti, sive Fluorem spathosum violaceum WALLER. sive Aluminis lapidosi calcareo-spathosi, diaphani, rasilis L. varietatem; passim in montibus Europæ occurrentes. *Omni virtute medicata caret.*

AMIANTHUS, Asbestus, Alumen plumosum. In offic.
PARS I. D

nis fynonyma Lapidem significantia ex fibris parallelis laxius inter se cohærentibus & aliquantum flexilibus constantem, grysei vel viridescentis coloris. Amianthus fragilis fibrosus, fibris separabilibus, rigidis, nitidis, fragilibus L. Passim in montibus Europæ offenditur. *Interdum, consilio non admodum laudando, Irritandi causa Cuti inspergitur.*

AMOMUM, *Pimenta, Piper Jamaicense, Nægelein-Kœpffe.* Fructus variæ magnitudinis, Pisis crebro majores, subrotundi, badii, rugosi, umbilico notati, biloculares, in utroque loculo continent semen fuscum, compressum, rugosum, rotundum, odorem spirant inter Caryophyllos & Cinnamomum medium, saporem acrem emittunt. Myrtus Pimenta L. BLACKWELL Tab. 355. Arbor Jamaicæ propria. Olei in Aqua subfidentis $\frac{1}{2}$ fundere dicitur. Baccæ immaturæ decerpuntur, sole exsiccandæ. *Medias inter Antophyllos & Caryophyllos vires Aromaticas edunt.*

AMOMI SEMEN exiguum est, gryseum, striis eminentibus fulcatum, odoris levioris, saporis aromatici linguam ferientis, non ingrati. Sison Amomum L. BLACKWELL Tab. 442. Crescit in Anglia & Europa calida, nostras hyemes fert. *Laudabatur olim ob vires Carminativas & Diureticas.*

AMMI, *Creticum & Vulgare* prostat. CRETICUM sistit femina exigua, striata, ovata, convexo-plana, sapore amaricante & aromatico prædita; odorem exsiccata nullum habent. Sison Ammi L. Europæ Australis & Orientis civis, planta annua, apud nos sub dio coli potest. VULGARE femina exhibet exigua, fusca, striata, saporis aliquantum aromatici, odoris vero vacua. Desumuntur ab Ammi Majore L. Cum priori non idem tantum solum natale habet, sed eodem etiam modo apud nos colitur. Fundunt hæc femina Oleum destillatum & a virtute Carminativa & Diuretica laudantur.

AMMONIACUM GUMMI. Est succus concretus, qui sub majoribus massis in calore molliusculis ad nos adducitur, ex grumis flavescens constans, quibus ingens granorum numerus lactei coloris, *Ungues* sive *Amygdalas* appellant, inhæret. Quo uberiori horum unguium copia G. Ammoniacum

abundat, eo melioris notæ esse putatur; odor fortis non gratus, sapor amarus & acriusculus. Calore funditur; totum ex aqua, quam lacteam reddit, suspendi patitur; Spiritus Vini ejus dimidium circiter dissolvit. Plantam unde obtineatur, ignoramus; ex deserto Africæ Barca Alexandriam & inde ad nos perducitur. *In Resolvendo præcipua ejus laus ponitur. Datur Menstruis Aquosis dissolutum, aut in formam Pilularum redactum ad Drachmam semis pro dosi; Syrupum quoque inde parant. Extus sub forma Cataplasmatidis aut Emplastri adhibetur.* Si ungues recipiuntur, nulla depuratione opus est; neque Aceto squillitico dissolutum & denuo inspissatum vires edet eo efficaciore.

AMMONIACUS SAL, *Salmiack*. Adducitur ad nos ex Ægypto forma panum rotundorum, convexo-concavorum, vertice crasso & eminente instructorum, a substantia pellucida, salina efformatorum; saporem habent salinum, odorem levissimum. Paratur in Ægypto sublimationis ope ex fuligine, quam excrementa brutorum suppeditant. Paratur quoque Sal Ammoniacus in Germania, Gallia & Anglia, quin etiam nativum montes ignivomi & Calmucorum regio largiuntur; sed ex Ægypto allatus in nostris saltem officinis est usitatissimus. Constitat ex Acido Salis & Alkali volatili, quod inter terendum cum Alkali fixo aut Calce inde secedit, & valide nares ferit. *Incidendi ergo sub forma Pulveris aut Aqua dissolutus ad Drachmam unam aliquoties de die, extus autem sub forma Fomenti contra Gangrænam & Scabiem adhibetur.*

AMYGDALÆ, *Amandes, Mandeln*. Nuclei oblongi, jam ventricosi, jam compressi, partim *dulces*, partim *amari* sub epidermide rubro-brunnea, sicca, scabra, medullam albissimam & firmam continent. *Amaræ* ut plurimum compressæ sunt epidermidis rugosæ, odoris tenuissimi. Sunt qui longas *Jordanicas*, latas *Hispanicas*, parvas *Barbaricas* appellent. Desumuntur ex Amygdalo communi L. BLACKWELL Tab. 105. In Europa temperata & Australi, Oriente & Barbaria obvia est. Ope Infusionis in aqua fervida medulla facile ab epidermide separatur. Oleum inde expressum albissimum, insipidum, non nisi Amygdalas redolet, nucleorum circiter dimidium æquat; frigore

quod thermometrum Reaumurianum ad septimum infra cyphram gradum deprimit, cogitur, parcius illud amaræ largiuntur. *Amygdalæ dulces Nutriunt & Demulcent, sive, ut sunt, comedantur, sive a coquis & cupedinariis varia ratione præparentur. Medici illas sub Emulsionis aut Morsulorum forma præscribunt. Ad medicamenta Cosmetica quoque recipiuntur. Amaræ, quarum amarities, multis animalium generibus perniciofa, Oleo inde expresso neutiquam accrescit; nonnihil acrimoniæ habent. Exigua earum quantitas prioribus non raro gratiæ ergo adjicitur. Emulsionnes inde paratæ multum ad fugandas Febres intermittentes, pistilli vero ope in pastam redactæ ad delendas Vultus maculas laudantur. Residuum ab expressione Olei sub FURFURUM nomine abstergendis sordibus Cutis inservit.*

AMYLUM, Amidon, Stärke. Frustra parva, angularia; friabilia, inter digitos crepula, facillime in pulverem tenerrimum terenda, insipida, inodora, efformata a fecula farinæ aqua macerata. Quævis farina illud largitur, sed vulgo paratur e Tritici speciebus, unde panis coquitur. Palpabili viscedine instructa cum aqua cocta in formam Gelatinæ spissæ glutinantis vertitur. *Demulcendi & Glutinandi ergo tam extus quam intus adhibetur.*

ANACARDIUM OCCIDENTALE, Acajou, Elephantenlaus. Nux reniformis, glabra, fusca, convexo-plana continet sub cute densa, tenaci, quæ quidem in nucibus ad nos translatis ficcissima est, nucleum album, dulcem, pellicula subfusca obductum. *Anacardium Occidentale L. BLACKWELL Tab. 369. Arbor in utraque India crescens. In Indiis cortex rodente succo scatens rejicitur. Nucleus Nutriendi ergo comeditur. Ejus inter nos usus obsolevit.*

ANACARDIUM ORIENTALE. Nux nigra, splendens, utrinque compressa, margine incrassato, pedunculo crasso, rugoso instructa, sub putamine denso, materie nigræ, splendente intus obducto, nucleum album, dulcem includit. Arboris in Suratta crescentis character nos latet. *Ceterum quæ sub antecedente monuimus, hic quoque notanda veniunt.*

ANAGALLIS, Mouron, Gauchheil. Cauliculi cum foliis asservantur, ovato oblongis, integerrimis, acris & amari saporis; *Anagallis arvensis L. BLACKWELL Tab. 43 & 274. Crescit in omni Europa, præter magis septentrionalem. A vi*

Antimelancholica olim laudabatur, hodie Antilyffam celebrant. Sub forma Pulveris ad Scrupulos quatuor de die datur, Vulneri quoque inspergitur.

ANAS, *Canard, Ente.* Anas Boschas L. Vulgaris in cortibus Europæ avis, unde caro mensis imponitur. *Axungia* alba, infipida & inodora scopo Emolliendi per se, sive unguentis *mixta, adhibetur.*

ANCHUSA videatur **BUGLOSSUM.**

ANETHUM, *Anet, Dyll.* Folia duplicato sunt pinnata, pinnis pinnatifidis, laciniis angustissimis, odore gravi, sapore aromatico: *Semina* sunt ovata, fusca, marginata, striata, compressa, una superficie levissime convexa, altera plana, odoris levioris, saporis aromatici. Anethum Graveolens L. BLACKWELL Tab. 545. Planta annua Europæ Meridionalis indigena, in hortis colitur. Seminis Unciæ sedecim, unam Unciam Olei destillati largiuntur. Cl. BAUMÉ ex Herbæ recentis nongentis & sexaginta Unciis sesquiunciam Olei odorati obtinuit. *Vi Carminativa gaudet. Recipitur ad Infusa & Decocta. Aquam inde destillatam & Oleum infusum quoque adhibent.*

ANGELICA. Radices ex crasso capitulo multas fibras emittunt, dimidium circiter pedem longitudine æquantes, calamo anferino angustiores, extus ex cinereo nigricantes, intus albas, subspongiosas. Sapor aromaticus, salinus, cum quadam amaritie, odor proprius, fortis. *Semina* sunt ovata, obtusa, convexo-plana, tribus fulcis eminentibus exarata, marginata; odore radicibus similia, sapore mitiora. Angelica Archangelica L. BLACKWELL Tab. 496. Alpium civis, in nostris hortis colitur, planta biennis. Ex Radicum Libra una CARTHEUSER Drachmam unam Olei obtinuit. *Resolvit Mucosam spissitudinem, Sudorem pellit. Olim ob vim Alexipharmacam laudabatur. Infusum Spirituosum præ aquoso præstare dicitur. Datur sub forma Infusi. Scopo Apophlegmatico. Radix masticatur. Sylvestrem in hortis cultæ multo præstantiorem asserit LINNÆUS. Inconsulto nostræ plantæ substituitur Angelica Sylvestris L. Ubivis fere in locis humidis Europæ obvia.*

ANGLICUM SAL CATHARTICUM *Epsonense*. Natrum fontanum L. Crystalli exiguae ne lineares quidem, ad figuram Parallelogrammi accedunt, in aqua facile solubiles, saporis amari, cui aliquantulum acrimoniae accedit; in aere humescens, superiori seculo ex fonte Angliae Epsonensi obtentum per orbem divendebatur. Hodie ex variis Fontibus foteriis, nec non ex Aqua marina, Salem inde communem excoquendo, solet parari. Constat ex Acido Vitriolico & proprio terrarum Alcalinarum genere, quod hodie Magnesium albam dicunt. Aliquid Salis Ammoniaci fixi ei admixtum esse videtur. Sal Epsonense, quod in Salinis Lotharingicis paratur, est verum Sal mirabile Glauberi, cujus solutio, dum in Crystallum abit, agitatur ut Crystalli exiguae surgant. *Datur ad Unciam semis Incidendi & Urinam ducendi scopo; ad Uncias usque duas Cathartico sine, decuplo & ultra Aquae dissolvitur, & solutio per cyathos exhibetur.*

ANGUILLA, *Anguille, Aal*. Muræna Anguilla L. *Hepatis & Exuviarum* usus exsolevit. Illud in duos lobos, quorum sinister major est, divisum nullius saporis est. Hæ, pisciculosi odoris, superiore parte ex viridi nigrescunt, inferiore ex luteo albescunt. *Axungia* oleum consistentia, odore, sapore unguinosum refert. *Abstergerendi ergo adhibetur.*

ANIME GUMMI, *Courbaril*. In frustis variæ magnitudinis nobis offertur. Lutescit, superficiem habet farinaceam, diffractum eandem splendentem exhibet; odorem suavem spirat; sapor leviter resinosus est; sub dentibus ductile evadit & calore manus; igne funditur & gratum fumum emittit. Alcohole & Oleis dissolvitur. Olei destillati tantillum exhibere dicitur. Ex Hymenæa Courbaril L. Arbore Brasiliensi exstillat. *Ad Suffitus contra morbos Catarrhales recipitur.*

ANISUM, *Anis*. Semina pedunculata, ovata, ventricosa, striata, albida, odore suaveolente, proprio, sapore dulci cum leviori aromate sunt prædita, Pimpinella Anisum L. BLACKWELL Tab. 374. In Ægypto & Syria sponte quidem provenit, sed & apud nos hodie passim in agris colitur. In Hispania collectum ab *Alona* denominatum reliquis magnitudine cedit; aromate præstat. Oleum destillatum citrinum, dulce, semine acrius. Ex feminis Unciis sedecim Drachmæ circiter

duæ Olei obtinentur; illud in aëre temperato in massam albam, lamellosam, splendens cogitur. Magna copia in Thuringia paratur per Germaniam & Belgium inde divendendum. Efficacius Seminis vires a Spiritu Vini quam ab Aqua extrahuntur. *Resolvente, Carminativo, Roborante scopo cibis adjicitur, sub forma Pulveris, Confectionis siccæ, Infusi, Decocti, Aquæ destillatæ, Spiritus abstractitii exhibetur. Oleum destillatum in Elæosaccharum reducere, vel scopo externo Linimentis Carminativis adjicere vulgo mos est.*

ANISUM STELLATUM, *Anis de la Chine, Stern-Anis.* Fructus rugosus, capsulis ad octo usque in orbem compositis, ovatis, fuscis, superne hiantibus constans. Singulæ capsulæ unum semen includunt, ovatum, sub cortice splendens, spadiceo, fragili, nucleum albidum continens; odoris proprii ad præcedens accedentis, saporis dulcis & aromatici. Oleum destillatum fundere dicitur. *Illicium Anisatum L.* Arbor in China & Tartaria crescens. *Vires antecedentis exsequitur. Datur sub forma Infusi, vel Spiritus abstractitii.*

ANSER, *Oie, Gans.* Anas Anser domesticus L. Vulgaris in cortibus avis. Saginati *Hepar* ad insigne volumen excrescit, ob egregiam saporis sui gratiam mensis valde acceptum. *Axungia* quæ alba est, insipida, inodora *Vires emollientes habet.*

ANSERINA, *Argentine, Gänserich.* Folia cum impari pinnata, pinnis ovalibus inciso-ferratis, sensim magnitudine crescentibus, subtus villosa, inodora, levissime adstringentia *Potentilla Anserina L. BLACKWELL Tab. 6.* Passim crescit per Europam. *Adstringentes & Diureticas vires habere dicitur. Datur sub forma Infusi.*

ANTHOPHYLLI, *Meres de Giroffles, Mutternægelein.* Sunt capsulæ ovato-cylindraceæ, utroque extremo angustatæ, inferne exiguo pedunculo instructæ, umbilico quadrifido coronatæ, in cujus medio exiguus stilus eminent; sub cortice fusco & tenero hæret semen nigrum, splendens, sinu longitudinali divisum. Odorem quidem & saporem Caryophyllorum aromaticorum, sed leniorem habent. Sunt fructus *Caryophylli Aromatici L. BLACKWELL Tab. 338.* Sponte cre-

fcit in Nova Guinea; colitur in Amboina & Gallicis Asiæ Insulis. *Caryophyllorum vires quoque, sed multo debiliores habent.*

ANTHORA, *Gifftheil*. Radices nigricantes albam medullam includunt, ex capite rotundo angulato, crasso, subito in caudam gracilem terminantur; sapor lenissime acris, odor nullus. Aconitum Anthora L. BLACKWELL Tab. 562. Alpium civis, nostras hyemes impune fert. *Vis venenis resistens Arabum commento nisa eviluit, aliis innoxia, venenata esse aliis dicitur. Consultius duxerim medicamento nondum satis explorato, prorsus abstinere.*

ANTHOS, videatur ROSMARINUS.

ANTIMONIUM, *Stibium, Antimoine, Spiesglas*. Substantia fossilis, nigro-plumbei coloris, insipida, inodora, ex æquis partibus Sulphuris & proprii Metallii, quod *Regulum* dicunt, constans. Eruitur e terra partibus terrestribus contaminatum & tunc *Minera Antimonii* dicitur. Depuratur ollæ in fundo perforatæ, & prunis cinctæ commissum, unde liquidum migrat in ollam priori suppositam, remanente in ista altera, quicquid ipsi terrestrium particularum adhæserit. *Sanguinem Depurandi gratia, ad morbos Cutaneos & Arthriticos adhibetur. Datur ad Drachmam unam pro dosi sub forma Pulveris, Pilularum, Morsulorum. Recipitur quoque ad Decocta aquosa.*

APALACHINE, *Thée du Paraguay ou de Mississipi*: hoc nomine superioribus annis afferebantur fragmenta foliorum ovatorum, flavicantium, sapore leniter acri instructorum. Decerpi hæc folia dicuntur a Cassine Peragua L. Virginie & Carolinae frutice, apud nos per hyemem in tepidario asservando. Recentia hujus fruticis folia amarissima deprehenduntur. *Vomitum & Alvum ducere, Infusum eorum aquosum apud Americanos crebro in usu esse, ab affectibus Calculosis defendere dicuntur. Hodie eorum usus exsolevit.*

APARINE, *Grateron, Klebkraut*. Asservantur cauliculi cum foliis oblongis, verticillatis, in quolibet verticillo senis & ultra, pilis rigidis obsessi, inodori & insipidi. Galium Aparine L. BLACKWELL Tab. 39. Ubivis in Europa occurrit. *Resolvendi & Aperiendi ergo olim laudabatur, hodie succum inde expressum*

sum in morbis Cutaneis debellandis efficacem se probasse compertum est.

APER, *Sangler*, *Wildschwein*. *Sus scrofa* L. frequens in sylvis occurrit; Caro eximii saporis mensis relinquitur; officinæ inde *Dentes caninos*, *Défenses*, *Fangzähne* recipiunt, in arcum flexos, tribus faciebus longitudinalibus instructos, totos cavos, in animali annosiore flavicantes. *In Pleuritide commendantur & sub forma Pulveris sive Mixtura mediæ exhibentur.*

APIUM, *Ache*, *Eppich*. *Radix* ex capite crassiore aliquot fibras dimittit, sub epidermide flava carnem albam includit, saporis acriusculi ad Pastinacam accedentis, proprium quoque odorem spirat; Radices, a varietate *Celeri* dicta defumtæ, cuticula nigricante tectæ, istis crassiores sunt, sapore etiam & odore gratiores. *Apium Graveolens* L. BLACKWELL Tab. 443. In Europa præter maxime Septentrionalem sponte crescit. Varietas *Apium dulce Celeri* dictum in hortis colitur. *Semina* parva sunt, cinerea, sulcata, odorem minus gratum spirantia, aromatica, amaricantia, aliquid Olei odorati fundere, & Radices ope Alcoholis Saccharum largiri dicuntur. *Radices & folia Celeri ad usus cibarios, Radices Apii Sylvestris Resolvendi, Aperiendi, Urinam ducendi causa, ad Decocta & Infusa recipiuntur.* Apud nos Radices *Celeri*, *Sylvestri* vulgo substituuntur. *Seminum idem, qui obtinuerat, usus exsolevit.*

AQUILEGIA, *Ancoline*, *Agley*. *Flores* quinque petalis planis & totidem cornutis, quæ *Nectaria* dicuntur, efformati, cœrulei, inodori, insipidi. *Semina* ovata, exigua, nigra, nitida, nonnihil medullæ albæ & dulcis includunt; torcular inde Olei viridis $\frac{1}{6}$ circiter exprimit. *Aquilegia Vulgaris* L. BLACKWELL Tab. 409. Passim per Europam, præter maxime Septentrionalem, occurrit. *Laudabatur ob vim Resolvendi, hodie exsolevit.*

ARABICUM GUMMI, *Gomme Senegal*. Advehitur ad nos sub forma frustorum variæ magnitudinis, extus rugosorum, plus minusve luteo vel fusco tinctorum, intus splendentium, fragilium, inodororum, insipidorum. Quo saturioris coloris est, eo habetur vilius. Quod a *Senegal* denominatur, majora & pallidiora frustra sistit, grana inde tota, alba ad cer-

PARS I.

E

ta præparata feligi solent, sordidissima *Gummi Turique aut Turis* constituunt. Conjecturam, quam semper fovi, non unam tantum aut alteram, sed plures *Mimosæ* L. Species hoc Gummi fundere, illustris ADANSON judicio confirmatam video. Nec Spiritu Vini, nec Oleis dissolvitur. Quadruplum Aquæ in consistentiam Syrupi densat; vires Saponis edit, Mercurium ex Aqua suspendit. Nutriendi viribus instructum. Relaxandi & Demulcendi ergo in frequenti usu est; ejus Drachma dimidia sub forma Pulveris vel Linctus exhibetur. Extus Collyriis admiscetur & Ulceribus acri humore madentibus inspergitur.

ARANEA, *Araignée, Spinne*. Aranea Domestica L. ubivis occurrit. A quibusdam in Pulverem redacta laudatur contra Febres. Tela partibus vulneratis imponuntur.

ARBOR VITÆ. Hinc recipimus Folia pinnata, pinnis alternis, non raro uno latere denuo pinnatis, ex squammis ad se invicem appressis efformata, cum splendore viridia, odoris evidenter resinosi ejusdemque saporis, cui pungens aroma & nonnihil amari accedit. *Thuya Occidentalis* L. Canadae & Sibiriae indigena in nostris hortis colitur. Ob vim Resolvendi sub forma Decocti, sive in Unguenti formam redacta folia contra Rheumatismos & Tussim laudantur.

ARDEA, *Heron, Reiger*. Ardea cinerea L. Avis passim in Europa occurrens. *Axungia axungii* quadrupedum paulo mollior, alba, nullo proprio odore distincta. *Podagricis* maxime commendatur.

ARGENTUM, *Argent, Silber*. Metallum album, aqua undecies gravius, inter Aurum & Regulum Antimonii, ratione caloris quo funditur, inter Aurum & Ferrum, ratione firmitatis medium locum tenet; in omnibus Acidis, præter Aquam Regis solubile, nec Nitro, nec Vitro Saturni destructibile. Nonnisi purissimum in officinas recipiendum, quod quidem vel detonatione cum Nitro vel per reductionem Lunæ cornuæ obtinetur. Vires medicatas nullas edit; olim in tenuissima folia dilatatum & cultro in exiguas lamellas dissectum ornatus gratia Pulveribus addebatur, hodie adhuc Pilulis obducitur.

ARGENTUM VIVUM, videatur MERCURIUS.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS, TENUIS LONDIN.

Aristolochie de Vigne, *Osterlucey*. Radices longæ, fibrosæ, digito minimo angustiores, extus rufæ, intus pallidæ; Longis & Rotundis minus acres & minus amaræ. Folia sunt cordata, obtusa, angulis posticis rotundatis, firma, glabra, acriuscula Aristolochia Clematitis L. BLACKWELL Tab. 255. Crescit in Europa temperata. Radices cum Longis & Rotundis sint multo debiliores rarissime in usum trahuntur. Folia Vino macerata tanquam *Vulnerarium Polychrestum* a nostratibus usurpantur.

ARISTOLOCHIA FABACEA, *Hohlwurzel*. Bulbos five Radices exhibet subrotundos, supra & infra compressos, fuscus, five vacuos, five carnem albidam includentes; bulbi vacui solidis majores sunt; odor nullus, sapor eorum amarus est. *Fumaria bulbosa* L. BLACKWELL Tab. 534. Crescit per omnem Europam præter magis Septentrionalem. *Ad Lumbricos necandos & Catamenia pellenda in Infuso Vinoso vel Spirituoso olim adhibebatur.*

ARISTOLOCHIA LONGA, *Aristolochie longue*, *lange Osterlucey*. Radix fibrosa, pollicem circiter crassitie, semipedem longitudine æquans, obtusa, rugosa, extus tenuiter fusca, intus ex luteo albens, odoris teneri, saporis amari, acriusculi, aromatici. *Aristolochia longa* L. BLACKWELL Tab. 257. Europæ Australis civis, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. *Aperiendi; Menses ducendi, morbos Arthriticos sanandi scopo datur sub forma Pulveris, vel Infusi Vinosi. Ulceribus sordidis inspergitur; ejus Decoctum Fistulis injicitur.*

ARISTOLOCHIA ROTUNDA. Radices exhibet ex pluribus tuberibus concretas, rugosas, extus ejusdem cum præcedente, sed magis diluti coloris, intus rufas, sapore istis longe acriores & amariore. *Aristolochia rotunda* L. BLACKWELL Tab. 256. In eadem cum antecedente patria crescit, in frigidariis quoque nostris contra hyemem defendenda. *Cum Longa easdem, sed efficaciores vires habet.*

ARMENIACA, *Morilli*, *Abricots*, *Abricosen*, Nostratibus *Mællelein*. Drupæ plus minusve ovata, variæ magnitudinis, pulpam gerentes flavam, grate olentem & dulcem,

Nucem includentem, cui sub testa ossea *Nucleus* inest globosus, ventricosus, sub tunica flavente medullam albam, grate amaram continens. *Prunus Armeniaca* L. BLACKWELL Tab. 281. In hortis nostris colitur. *Fructus*, ut ceteri horrei omnes vires saponaceas exserunt; *Rob* inde paratum MARMELADA dici solet: Nuclei tam forma, quam sapore ad Amygdalas amaras accedunt.

ARMENIUS LAPIS. Est Minera Cupri, lapidem referens cœruleum, minus durum, cum Acidis effervescentem Cuprum Armenus L. Passim in montibus metallicis reperitur. *Vi Æris, quo scatet, Vomitus valide agit Alyumque ducit, quapropter nunquam in usum trahendus. Pessimo consilio interdum Lapidis Lazuli substituitur.*

ARMORACIA, *Raisfort, Meerrettig*. Radices cylindricæ, in varios ramos diffusæ non raro brachium humanum crassitie æquant, totæ albæ; nares & palatum insigni saporis acumine vellicant, quod quidem exsiccatione & coctione mitigatur; comestæ spiritum odore alliaceo contaminant. Olei odorati in Aqua fundum petentis Grana quindecim ex Libra una Radicum obtineri asseritur. *Cochlearia Armoracia* L. BLACKWELL Tab. 415. Per Europam passim spontanea, apud nos in agris & hortis colitur. *Vires Incidentes, Antiscorbuticas, Antarthriticas, Diureticas Radix edit. In vicem Oleris cum carne coquitur, aut rasa cruda una cum ea comeditur. Datur scopo medicato, cum Vino vel Cerevisia infusa, vel cum aqua cocta, vel in Syrupum redacta, ejus Succus unum aut duo cochlearia propinquantur. Epispastico scopo Uncia semis Cuti imponitur.*

ARNICA, *Betoine des Montagnes, Wohlverley*. Radices fibrosæ gravi nares irritantes odore, sapore lenissime amaricante, acri instructæ, fuscæ, striatæ, calamum anserinum crassæ, intus albæ. *Folia* ovato-oblonga, utrinque tomentosa, sapore dulciusculo, cui nonnihil salini & levissime amari accedit. *Flores* asservantur e calyce evulsi, flavi, amari cum insigni, acrimonia. *Arnica montana* L. In montibus altioribus passim per Europam crescit, difficilius in hortis colitur. *Ad Resolvendum in Sugillationibus ab injuriis externis, mor-*

bis Mucosis, Obstructionibus Viscerum Abdominalium, Paralyfi &c. Herba & Flores exhibentur. Sed has Plantæ partes, & Flores quidem validius etiam quam Herbam, Nauseam, Vomitum & Cardialgiam excitasse non raro observatum est; quapropter Herba & Flores sub medicationis initium ad pares partes misceri & cum tribus Unciis Aquæ non nisi unica hujus miscelæ Drachma propinari solent, ita ut sensim ratio Herbae imminuatur, ac soli denique Flores exhibeantur eadem Dosi ternis vel quaternis horis repetenda. Radices recentissime a virtute Roborante; & perinde ac tota planta a vi Antiseptica laudari cæperunt in Diarrhæis & Dysenteriis. Dantur sub forma Pulveris ad Scrupulum unum vel Drachmam semis aliquoties de die.

ARSENICUM ALBUM. Substantia salino-metallica, manifestum Acidum vehens, si ab omni, quod ipsi accrescere solet, heterogeneo fuerit depurata, alba evadit, iuxta vero ratione fusa in Semimetallum nigricans abit, volatilis, prunis superimposita Allium spirat, linguæ levem saporem imprimit. Ex proprio eam Acido & Principio inflammabili constare recentissima experimenta evincere videntur. Obtinetur ex Mineris varii generis, passim in Metallifodinis obviis. Forma alba splendens, sub qua in officinis prostat, obtinetur, dum Alkali fixo junctum sublimatur. *Ejus Dosis quantumvis exigua vel ore haustam, vel extus applicatam vehementissima symptomata excitasse, imo homines necesse crebrius iusto est observatum, & quanquam sunt, qui illud ad varium morbi genus commendent, tamen cum sit Venenum deterrimum, non nisi cum circumspectione sollicitissima a Pharmacopolis vendendum censeo.*

ARSENICUM FLAVUM. Est Arsenicum, cui subdecuplum circiter Sulphuris mediante sublimatione junctum est; ejus facies ab antecedente, non nisi colore differt; quod natura passim & præcipue in Hungaria largitur, **AURIPIGMENTUM**, *Orpiment, Operment* Pyrites Auripigmentum L. dicitur. Ceterum tam artificiale, quam Nativum, quo magis splendet, eo melius putatur. Pictores sub nomine *Kœnigsgelb* in usu habent. *Licet Arsenicum Sulphure cicurari facile largiar, nulli tamen unquam Auctor sim, ut Arsenicum Sulphuri unitum ad usus medicatos adhibeat.*

ARSENICUM RUBRUM, Realgar, Sandaraque, Ru-

bis Arsenical. Partim a Natura subministratur, Arsenicum Sandaraca L. passim in Metallifodinis obvium, partim arte paratur, unam Sulphuris partem cum quinque partibus Arsenici fundendo, unde massa rubra vitriformis surgit. *Nec hoc ad usus medicatos recipiendum, sed Picloribus relinquendum est.*

ARTEMISIA, *Armoise, Beyfus.* Folia inde recipiuntur pinnatifida, pinnis latiusculis dentatis instructa, subtus tomentosa, aromatici & amaricantis saporis. Artemisia Vulgaris L. BLACKWELL Tab. 431. Vulgaris per Europam & Orientem planta. *Laudatur maxime ad morbos Uteri. Datur sub forma Infusi aut Syrupi; ad Balnea quoque & Pediluvia recipitur. Ex summitatibus Artemisiæ exsiccatis, contusis & usque tritis, quoad cortex externus decidat, fibræ internæ lanuginosæ remaneant, quas postea carminant, Japonenses & Chineses inde substantiam parant tomentosam, gryseam, levem, quæ MOXA dicta, ignem facillime recipit, sine flamma gliscentem, donec tota in favillam abierit. Convolvunt Moxam in bacilliformam crassitie calamum anserinum, longitudine aliquot pollices æquantem, hunc bacillum membro Arthritide aut Rheumatismo laboranti imponunt & scintilla accensum relinquunt in favillam redigendum. Huic vero scopo Gossypium Moxæ optime posse substitui, compertum est.*

ARUM, *Aron.* Radix tuberosa, unde epidermidem folent auferre, albissima, ovi columbini magnitudinem æquans, farinosa, friabilis; acerrimus, qui Radici recenti inest, sapor exsiccatione multum mitigatur. Arum maculatum L. BLACKWELL Tab. 228. In Europa temperata copiose provenit. A variis gentibus tam in cibum recipitur, quam loco Saponis ad mundanda lintea adhibetur. Ejus Pulvis cum Aqua coctus in spissam mucilaginem vix acrem convertitur. *A Medicis cum summo successu ad attenuandum Mucum recipitur. Datur ad Drachmam dimidiam pro dosi. Superflua est ejus sive cum Aceto, sive cum Vino Præparatio & omnino Pulvis Fæculis præstat.*

ARUNDO, *Roseau, Rohr.* Exhibet Radices prælongas, geniculatas, ex flavo albas, sapore dulci præditas. Arundo Phragmites L. Per omnem Europam obvia. *A vi Demulcen-*

te & Aperiente Radices olim laudabantur; in quarum locum Radices Graminis successerunt.

ASARUM, *Cabaret, Haselwurzel.* Radix ex capite, quod parvum est, aliquot fibrillas emittit, extus gryseo-brunea, intus alba, odore forti ad Valerianam accedente, sapore acri, aromatico. *Folia* longius petiolata sunt, reniformia, superne profunde viridia, inferne pubescentia, inodora, lenissime acria. *Asarum Europæum* L. BLACKWELL Tab. 383. Passim in Europa obtinet. *Vomitum excitant & Radix & Folia, illa sub forma Pulveris ad Scrupulos duos, in Infuso ad Sesquidrachmam, horum sub forma Infusi Scrupulus semis exhibetur. Coctione omnem vim Emeticam destrui compertum est. Admiscuntur etiam ad aliquot Grana medicamentis Errhinis, in quibus Radicem Foliis etiam validiorem esse contendunt.*

ASCIA, *Ombre, Asche.* Salmo Thymallus L. Fluvii Europæ inhabitat. *Caro* exquisita, mensis imponitur. *Axungia*, quæ consistentiam Olei unguinosi refert, colorem ex flavo rufum, odorem tenuem, saporem nullum habet. *Absurgendi scopo ad Ulcuscula Oculorum & Aurium adhibetur.*

ASPALATUM, videatur ALOES LIGNUM.

ASPARAGUS, *Asperge, Spargel.* Turiones in usus cibarios cedunt. *Radices* ex capite crassiore multas fibras longas dimittunt, cinerascens, striis longitudinalibus notatas, sub cortice paululum lutescente medullam albam includentes, dulcescente sapore præditas. *Asparagus Officinalis* L. BLACKWELL Tab. 332. Per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, sponte quidem crescit, sed nonnisi in terra multum stercoreata cultus in usum trahitur. *Radices a vi Aperiente laudantur, & cum aqua decoquantur, cui evidenter nonnihil acrimonie affricant.*

ASPHALTUM, *Bitumen Judaicum.* Est Bitumen gravi odore nares feriens, sapore levissime resinoso instructum, colore nigro, Picem referente, fractura splendens. *Bitumen Asphaltum* L. Olim ex Judææ Mari mortuo extrahebatur, unde ei nomen mansit. Hodie passim per Orbem invenitur. *Extus Vulnerario vel Discutiendi scopo sub forma Emplastri, Unguenti, Suffitus adhibetur.*

ASPHODELUS, *Goldwurz*. Radix flava ex multis squamis composita, odore vacua, sapore evidenter mucilaginoso. *Lilium Martagon* L. In omni Europa, præter maxime Septentrionalem, offenditur. *Maturandi gratia Abscessibus imponitur.*

ASPLENIUM, videatur **CETERACH**.

ASSA DULCIS videatur **BENZOES**.

ASSA FOETIDA, *Teufelsdreck*. Succus concretus, qui ad nos pervehitur in grumis variæ magnitudinis, fuscis, flavo dilutis, moleculis albis, aliquantum pellucidis distinctis, admodum tenacibus, cum quadam acrimonia amariusculis, odorem virosum, alliaceum egregie spirantibus, in Oleis expressis ex parte, in odoratis nequaquam solvendis, ex Aqua suspendendis. Creberime hi grumi massis resinosis, nigricantibus, magnis, aridis inhærent, quæ tum massæ dicuntur *Assa foetida in sorten*. Obtinetur ex incisa Radice Ferulæ *Assæ foetidæ* L. Persiæ civis. Olei odorati trigessimam secundam sui ponderis partem fundere est observata. *Et Anodynas & Resolventes vires edit; contra Tussim convulsivam, morbos Hystericos, Vermes, Tympanitidem, Febres inveteratas, Cariem laudatur. Datur ad Scrupulos duos pro dosi in Pilulas redacta. Extus ad Suffitus & Clysmata nec non ad Emplastra adhibetur.*

ASTRANTIA, *Autruche noire, Schwarze Meisterwurz*. Radix extus nigra, intus alba, fibrosa, levem modo acrimoniam linguæ impressit, illa certe, quæ in nostris hortis adolevit. *Astrantia major* L. **BLACKWELL** Tab. 470. *Alpium civis, nostras hyemes impune fert. Alyum ducere dicitur; hominibus non exhibetur, Veterinariis interdum in usum venit.*

ATRACTYLIS, *Spindel, wilde Cardebenediçten*. Folia fistit ovato-oblonga, laciniis acutis in spinas terminatis, pinatifida. *Carthamus lanatus* L. **BLACKWELL** Tab. 468. *Planta annua Europæ Meridionalis indigena. A quibusdam olim scopo Aperiendi sub forma Infusi adhibebatur.*

ATRIPLEX, *Arroche, bonne ou belle Dame, Milten, Melten*. Folia triangularia, velut farina conspersa, mollia, pro varia varietate mox rubra, mox alba. *Atriplex hortensis* L. **BLACKWELL**. Tab. 99. *Asiæ Septentrionalis civis passim in hortis*

hortis colitur: apud nos mense Octobri feritur, ut in culinis, quoad folia Betæ adoleverint, horum vicem sustineat. *Ob vires Emollientes a quibusdam laudatur.*

ATRIPLEX FOETIDA, *Arroche foetide, Hundsmelten.* Folia ovata, angulata, exigua, pollice conspersa, nauseosum, pisculentum odorem spirantia, insipida. *Chenopodium Vulvaria* L. BLACKWELL Tab. 100. Passim in Europa offenditur. *A nonnullis ad morbos Uterinos sub forma vel Infusi vel Balnei commendatur.*

ATRIPLEX SYLVESTRIS, *Arroche sauvage, wilde Melten.* Recipiuntur Folia ovato-oblonga, utrinque attenuata, dentata, subtus candicantia, insipida & inodora. *Chenopodium rubrum* L. Ubique in cultis Europæ provenit. *A vi Emolliente passim laudatur.*

AVELLANA, *Noisette, Haselnufs.* Nuces mox ovatæ, mox oblongæ, spadiceæ, rubræ, flavicantes, sub testa fragili umbilico notata nucleum album continent, pellicula sive alba, sive rubra tectum, suavissimum & proprii odoris, nec diversi saporis. *Lignum Coryli* nomine notum albidum est & leve, odoris & saporis expers. *Corylus Avellana* L. BLACKWELL Tab. 293. Passim in Europa sponte crescit, plura ejus genera in hortis colimus. Avellanæ sui ponderis dimidium Olei Unguinosi fundunt, quod ipsas redolet, cæterum Amygdalino simillimum est. Mensis apponuntur, & ne recentibus deficientibus prorsus destituamur Avellanis, nostræ tabernæ aservant nuces istius generis, quod in Abbellino Regni Neapolitani agro colligitur; nobis *Rœmische Haselnuffen* dictæ, saporis gratia recentibus haud impares. *Adjiciuntur Avellanæ Emulsionibus & Morfulis tam ob gratiam, quam propter aliquantam vim Adstringentem, qua prædite virtutem Amygdalarum Relaxantem temperare creduntur. Ligni usus & Olei Empyreumatici, destillatione inde obtinendi, quod OLEUM HERACLINUM appellabatur, evuluit; illud enim omnino iners est, hoc præ aliis Oleis Empyreumaticis nihil proprii habet.*

AVENA, *Avoine, Habern.* Semina strigosa, utrinque acuta, convexo-plana, cortice gryseo, nigro, flavicante, albo vestita, sulco notata, medullam albam & dulcem exhibentia. *Avena sativa* L. BLACKWELL Tab. 422. Colitur in agris. Amyli cinerei, bene glutinantis dimidium sui ponderis

& eandem rationem Mucilaginis albæ & pellucidæ Avenam largiri est observatum. Panis inde conficitur niger & amarus; amara quoque Cerevisia. Avena in ptisanam redacta *Gruatum* dicitur, quod ex Jure coctum *suavissimum edulium, nutriens, digestu facile Refrigerans; Demulcendi, Refrigerandi, Putredinem arcendi ergo ex Aqua coquitur.*

AURANTIA, *Oranges, Pomeranzen.* Folia ovato-oblonga, firma, petiolo cordiformi sustentata, sapore aromatico amaricante & odore fragrante prædita. Flores a voce Italica *Nansa*, quæ Aquam fragrantem denotat, *Flores Naphæ* dicti, albi sunt, pentapetali, gratissimum odorem spirant, qui exsiccatione una cum albedine imminuitur, sapor amarus est, paululo aromatis mixtus. *Poma* magnitudine admodum inter se diversa, ut plurimum rotunda, parvo umbilico notata, in superficie lævi interdum punctis aut rugis exasperata, flava, pulpam includunt sive flavicantem, sive rubram, grate olentem, partim dulcem, partim amaram, vinosam, continentem *Semina* subovata, basi oblique truncata, striata, lenissime odora, amara. *Cortex* pomorum dulcis vel amarus, est fragrans, aromaticus. In officinis Cortices nonnisi amari exsiccati asservantur, quos substantia, quæ ipsis intus adhæret albescente & fungosa privatos *Flavedinem Aurantium* quidam etiam *Cortices Curassavenses* appellant. *Aurantia immatura* viridia sunt, maturis fragrantiora, eminentiore acrimonia distincta, a quibusdam *Curassavica* dicta, sed minus congrue, cum propria Malorum varietas in Americæ Insula Curassao crescat, quæ longe fragrantissima esse asseritur. Citrus Aurantium L. BLACKWELL Tab. 349. Asiæ indigena Arbor, hodie per Americam & Europam Australem copiose in hortis colitur, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defendenda. Flores & Folia Destillatione, Cortices recentes Expressione *Oleum* largiuntur *odoratum* quod *Quintam Essentiam* dicunt; sed propria fragrantia se commendat id, quod Varietas, *Bergamotta* dicta, exhibet. *Oleum rubrum* fragrantissimum, quod ex Floribus obtinetur *Oleum Neroli* appellatur, cui vulgo *Oleum Behen* cum Floribus *Naphæ* infusum solent substituere. *Folia exsiccata sub*

forma Pulveris contra Epilepsiam dantur. Flores recentes Analeptici sunt. Ope Sacchari in Confectionem siccam redacti, mensis secundis apponuntur. Syrupus inde paratus, tanquam blandimentum gustus, medicamentis adjicitur. Ad eundem scopum & insuper ad usus Cosmeticos Aqua Naphæ aque ac Oleum Neroli adhibetur. Pulpa Aurantium dulcium Refrigerandi ergo assumitur, Scorbuticis & Febri decumbentibus egregie conducit; Pulpa Aurantium amarorum quibusdam cibus adjicitur. Aurantia immatura præcipue paranda vel cum Vino Hispanico vel cum Spiritu Vini ESSENTIÆ egregie Stomachicæ & Carminativæ inservit. Ad scopos eosdem recipiuntur Cortices, qui vel sub Conditi sicci forma, quod ex Italia obtinemus, tam comeduntur, quam ad Morfulos recipiuntur, vel tanquam Conditum liquidum Electuaria ingrediuntur, vel Infusis vel Decoctis aquosis aque ac vinosis adjiciuntur, vel Aqua inde aut Spiritus Vini abstrahitur.

AURICULA JUDÆ, *Fungi Sambuci, Oreilles de Judas, Holderschwammchen.* Fungi membranacei, sessiles, explanati, superficie superne minutissime tomentosa, inferne glabra, in sulcos elevata & in sinus his respondentes depressa, nigricante, insipidi, inodori. **Peziza Auricula** L. BLACKWELL Tab. 334. *Nonnisi extus Discutiendi ergo ad morbos Faucium sub forma Gargarismatis adhibetur, aut Oculis inflammatis, aqua emollita, imponitur.*

AURICULA MURIS, *Pes Cati, Pilosella, Hispidula, Pied de Chat, Katzendæplein.* Folia ex angustiore origine in finem obtusum & ellipticum exeuntia, superne viridia, inferne tomentosa, odore nullo, sapore levissime adstringente instructa. Flores tubulosi, calice rotundo, sicco, roseo comprehensi, odoris & saporis expertes. **Gnaphalium dioicum** L. Per omnem Europam obvium. *Leniter Adstringit; Infusis Pectoralibus adjicitur; Syrupus inde paratur. Flores præ Herba in frequentiori usu sunt.*

AURIPIGMENTUM videatur **ARSENICUM FLAVUM**.

AURUM, *Or, Gold.* Metallum aqua vigecuplo fere gravius, medio inter Argentum & Æs gradu ignis funditur & dum fluit smaragdino colore fulget; ratione firmitatis medium inter Argentum & Ferrum gradum tenet, amplissimam distensionem patitur, nonnisi Aqua Regis & Hepate Sulphuris dissolvitur; Sulphuri, Vitro Saturni, Nitro nullæ sunt in illud

vires. Reperitur Nativum sub varia figura, interdum moleculis divisum adeo minutis, ut omnem visus aciem fugiat. Passim in Montibus & Fluviis Europæ offenditur. *Quæ respectu usus medicati de Argento dicta sunt, huc quoque pertinent.*

AZEDARACH. Folia pinnata, pinnis petiolatis ovato-oblongis, irregulariter dentatis, acutis, inodora, amara. *Melia Azedarach L. Europæ Meridionalis & Syriæ indigena, cum Aqua decocta Vias Urinarias & Uterum evacuare, nec non Pediculos necare dicuntur; vulgo habetur venenata, quod vero ipso effectu nondum satis compertum videtur.*

BALAUSTIA videatur **GRANATUM.**

BALLOTTA, *Marrubium nigrum, Marrube noir, schwarzer Andorn.* Folia cordata, petiolata, albida, minus grato odore æque ac sapore, qui levissime linguam ferit, instructa. *Bal-lotta nigra L. BLACKWELL Tab. 136. Vulgaris Europæ planta. Cum aqua infusa contra morbos Hystericos a nonnullis laudatur.*

BALSAMITA, *Costus hortensis, Coq, Frauenmünz.* Folia ovata, obtusa, obtuse ferrata, albida, proprium ad Mentham accedentem odorem spirant, saporem amaricantem evidenter aromaticum emittunt. *Tanacetum Balsamita L. BLACKWELL Tab. 98. Europæ Australis civis, nostri climatis patiens. A vi Stomachica & Emenagoga laudatur.*

BARBA CAPRÆ, *Ulmaria, Reine des Prés, Geisbart.* Radix fibrosa, aliquot modo pollices longa, digitum minimum crassa, fusca, intus alba, undique fibrillas emittit, odorem, si diffringitur, proprium non ingratum spirat, sapore adstringit. *Folia sunt pinnata, pinnis ovato-oblongis, inferne albicantibus, inciso-dentatis, progrediendo crescentibus, pinnis majoribus minuta interposita sunt; odore carent, sapore levissime adstringunt. Spiræa Ulmaria L. BLACKWELL Tab. 465. Crescit promiscue per Europam. Radices ad Decocta, Folia ad Infusa Adstringendi scopo adhibentur.*

BARBAREA, *Herbe de St. Barbe, wilder Kressen.* Folia lyrata, laciniis denticulatis, summa magis ovata, obtusa, profunde dentata, odore levi, sapore Nasturtino instructa. *Erysimum Barbarea L. Per omnem Europam vulgaris. A*

quibusdam mensis imponitur. *Ejus Succus expressus, aut Juscula inde parata Antiscorbuticos edunt effectus.*

BARDANA, *Glouteron, Kletten.* Radix fibrosa, fusiformis, crassa, foris nigricans, intus alba, subdulcis. *Folia* cordata sunt, superne obscure viridia, rugosa, subtus tomentosa, crenata, leniter adstringunt. *Arctium Lappa* L. BLACKWELL Tab. 117. Ubivis in Europa, in America Septentrionali quoque progignitur. *Radices Resolvendi ergo copiose in Decodis usurpantur; Folia ad eundem scopum extus adhibentur, Ulceribus quoque imponuntur.*

BASILICUM, *Basilic.* *Folia* subsucculenta, ovata, acuta, glabra, integerrima, fragrantem odorem spirantia, grato & aromatico sapore instructa. *Semina* sunt exigua, oblonga, nigra, insipida & inodora. *Ocymum Basilicum* L. BLACKWELL Tab. 104. Indiæ indigena, annua planta copiose in hortis nostris colitur. *Oleum* fragrans abunde fundere observatum est. *Ad cibos condiendos adhibetur. Rarius Infusis Nervinis aut Pulveribus sternutatoriis adjicitur. Semina sunt inertia.*

BDELLIUM. Affertur ad nos sub forma massarum majuscularum ex rubro fuscarum, earum portiones selectæ, a foridibus purgatæ fere pellucet, inter dentes friabiles sunt, eisque levissime adhærent, odor tenuis, sapor evidenter amarus est. *Bdellium* igne non funditur, fumum emittit suaveolentem, Alcohol æque ac aqua ingens ejus portio dissolvitur, ab Oleis intactum relinquitur. Ex Arabia & India venit, sed plantæ genus quod ipsum fundit, ignoratur. *Resolvendi ergo tam in us quam extus adhibetur; ejus accensi fumus Hæmorrhoidibus mederi prædicatur.*

BECCABUNGA, *Bachbungen.* Caules teretes succulenti, foliis vestiti succulentis, ovato-oblongis, obtusis, ferratis, dilute viridibus, glabris, saporem levissime acrem cum quadam adstrictione continent. *Veronica Beccabunga* L. BLACKWELL Tab. 48. Passim in Europa obvia. *Contra Scorbutum præcipue commendatur, recipitur ad Juscula, Succus inde expressus ad quatuor Uncias usque propinatur.*

BEHEN ALBUM. Radix fibrosa, longa, albida, levi

odore & sapore acriusculo prædita. *Centaurea Behen* L. *Asiæ Septentrionalis civis. Ab Arabibus ob vires Cordiales laudata omnino exsolevit.*

BEHEN NUCES, *Balani Myrepfici*. Nuces triquetrae, *Avellanæ* magnitudinem æquantes, sub cortice albido & fragili Nucleum pinguem, amarum, pellicula nivea & fungosa tectum includunt. *Guilandina Mohringa* L. **BLACKWELL** Tab. 386. *Arbor Indiæ progenies. Vim Purgandi & Viscera subvertendi habere dicitur, quæ posterior earum usum antiquavit.* Frequentius usurpatur **OLEUM** inde expressum, sextam circiter earum ponderis partem æquans, limpidum, omnis odoris & saporis perinde expers, aëre temperato spissescit, tarde rancescit. *Præcipuus ejus usus est apud Unguentarios, qui hujus virtute odores ex Vegetabilibus fragrantibus extrahunt.*

BEHEN RUBRUM. Radix ad nos peregre affertur sub forma taleolarum rugosarum, profunde rubrarum, sapore adstringente, odore nullo præditarum. *Statice Limonium* L. **BLACKWELL** Tab. 481. *Syriæ civis, hyemes nostras fert. A vi Adstringente laudatur; Arabibus multum celebrata exsolevit.*

BELEMNITES, *Lapis Lyncis, Alpschos*. Lapis, qui ex basi lata, sensim in verticem acutum exit, intus aliquanta altitudine tenus cavo conoideo exsculptus est, omnis reliqua substantia interna splendet, striis ab axi ad peripheriam porrectis efformata, color falernus magis minusve dilutus, multum etiam variat longitudine & crassitie; fricatus cornu odorem refert. *Helmintholithus Belemnites* L. Copiose per omnem Europam occurrit; vulgatissimum *Asiæ* petrefactum. *Omnes quæ ipsi adscribuntur vires anilibus fabulis, Signaturæ commentis debentur.*

BELLADONNA. *Folia* ovata, oblonga, integerrima, odoris nullius, saporis subadstringentis, leviter acris. *Atropa Belladonna* L. *Baccæ Ceraforum* speciem referentes purpureo & fatuo succo turgent. **BLACKWELL** Tab. 564. Copiose occurrit per Europam, præter magis Septentrionalem. *Innumeræ Observationes de deleterio omnium plantæ partium effectu exstant, quibus constat, minusculam earum dosin Sensus internos turbavisse, Convulsionibus & Sopore homines occidisse. Neque tamen defuerunt, qui baccas intus darent, sed harum usus hodie evuluit. Folia nostra ætate crebrius contra Can-*

crum usurpabantur, sub forma Infusi, a paucis Granis incipiendo; sensim major eorum numerus adhibetur, minuendus tamen simulac Caput gravari inde aut Vertiginem excitari sentiat æger. Extus Mammis scirrhis imponebantur.

BELLIS MAJOR, *Bellis pratensis, Grande Marguerite, Gensblumen.* Folia oblonga, obtusa, profunde dentata, infida. *Chrysanthemum Leucanthemum* L. BLACKWELL Tab. 42. Passim per Europam obvia planta. *Olim a vi Diuretica & Antiphthysica laudabatur; sub forma Infusi exhibenda.*

BELLIS MINOR, *petite Marguerite, Maaslieben, Zeitlofen.* Folia parva obtusa, levissime dentata, longis petiolis instructa, levissime acria. Flores radiati, radio albo, calyce hemispharico imbricato sustentati, odore carent, saporem habent lenissimum. *Bellis minor* L. BLACKWELL Tab. 200. Invenitur ubivis. *Laudatur contra morbos Pectoris. Folia sub forma Acetarii exhibentur, Flores in Infuso, Conserva, Syrupo.*

BENGALENSIS NUX, videatur MYROBALANI.

BENZOES, *Assa dulcis, Benjoin.* Magnæ ejus massæ ad nos perferuntur, quarum superficies texto junceo, quo involutæ erant, signata est, conflatæ sunt ex laminis rubro-fuscis, quibus grana variæ magnitudinis, *Ungues vel Amygdalæ* dicta, inhærent, fragiles & friabiles; odorem gratum spirant, sapore præditæ balsamico & dulci; quo sunt massæ pellucidiores unguibusque fertiores, eo Benzoë putatur præstantior. *Croton Benzoë* L. Arbor Indiæ indigena. Benzoë calore liquatur & gratum fumum emittit; nec Aqua nec Oleis dissolvitur; nec si aqua inde abstrahitur, ullum Oleum destillatum fundit. In Spiritu Vini dissoluta *Tincturam Benzoës* constituit, quæ Aquæ instillata *Lac Virginum* efformat *usibus Cosmeticis inserviens. Rarissime intus scopo Balsamico exhibetur, extus ad Suffimigia recipitur.*

BERBERIS, *Epine Vinette, Saurauch.* Radices fibrosæ ad insignem omnino magnitudinem excrescunt, sub cortice rugoso & fusco carnem croceam intense amaram includunt. *Baccæ* cylindricæ, umbilicatæ, sub epidermide translucente pulpani includunt scatentem late rubro succo intense acido, qui non nisi post aliquot pruinas, quibus circumfusæ baccæ sensim sensimque rugosæ fiunt & nigriores mitescit, & pala-

to gratus evadit, *Semina* rugosa sunt, subteretia, apice obtusa, styptico sapore imbuta; *Berberis Vulgaris* L. BLACKWELL Tab. 165. In omni Europa, Oriente quoque & America crescit. *Radix Purgantes vires edere dicitur & ad Aperiendas Hepatis Obstructiones laudatur, sub forma Decocti exhibenda. Baccæ ob vim Refrigerantem, Antiphlogisticam & Antisepticam commendantur. Succus sanis æque ac ægrotis sub forma Gelati, Conditi, Syrupi, Rotularum propinatur.*

BETA, *Poirée, Mangold.* Folia subsucculenta, magnis & latis petiolis innexa, ovata, obtusa, ad marginem plicata, subbullata vel pallida vel rubra vel crocea, sapore subdulci instructa; *Beta Vulgaris Cicla, rubra, lutea* L. In Europa Occidentali & Meridionali crescit; apud nos copiose in hortis colitur; *Folia Radicalia in usum culinarum recipiuntur, Medicinæ rarissime inserviunt, imponuntur cuti, cui Epidermis fuerit ablata.* Varietas, quæ est *Beta rubra radice Rapæ* L. BLACKWELL Tab. 235. quæque in hortis colitur, subministrat Radicem, ex crasso capite subito in caudam gracilem exeuntem, totam purpuream; exstat ejus Varietas flava, levis odoris & saporis dulcis; Extractum ista aquosum, rubrum, intense dulce, Spiritus Vini ope autem Saccharum exhibere dicitur, *Aceto condita cum Carne comeditur, Succus inde expressus scopo Errhino adhiberi solet.*

BETONICA, *Betoine, Betonien.* Folia cordato-oblonga, obtusa, profunde crenata, rugosa, insipida; *Flores* labiati, purpurei & inodori. *Betonica Officinalis* L. BLACKWELL Tab. 46. Copiose per Europam offenditur. *Vires Cephalicæ, quas olim huic plantæ adscripserunt cum experientia non sint probatæ, usus ejus medicatus fere eviliuit; Errhino scopo Pulvis præscribitur.*

BETULA, *Bouleau, Birke.* In usum trahitur Succus, qui ex trunco, primo vere ante frondescentiam terebra efforato, stillat, limpidus, leviter dulcescens. *Betula alba* L. BLACKWELL Tab. 24. *Betulæ Succum* multo minus mellaginis evaporationis ope edere, quam Succum Aceris, observatum est. *Datur per aliquot continuas Septimanas ad Uncias viginti quatuor de die Sanguinem Depurandi, & Vermes expellendi causa. Oleum Emphyreumaticum,*

Empyreumaticum ex cortice paratum *Lithuanicum* vel *Russicum* dicitur, præ aliis hujus tribus Oleis nihil proprii in Medicina præstare videtur.

BEZETTA. Hoc nomine veniunt lintea cannabina rubra seu cœrulea, quibus ad infucanda Gelata, Trochiscos &c. utuntur; priora ope Coccionellæ in Turcia parari dicuntur, posteriora in Gallia Australi tinguntur Heliotropii succo, ope Alkali volatilii ex Urina, exaltato.

BEZOAR DE COROMANDEL. Lapides variæ magnitudinis, partim rotundi, partim oblongi, læves, cum quodam splendore; inveniuntur, qui utrimque compressi sunt, ex albo-grysei, evidenter ex stratis efformati, inodori, insipidi. Desumi dicuntur ex Trichecho Manato L. *Eadem quæ de reliquis prædicantur, huic quoque tribuuntur vires.*

BEZOAR OCCIDENTALIS. Calculus Bezoar L. Dicuntur Calculi, qui sub diversissimis figuris & variante multum magnitudine occurrunt, evidenter ex squamis efformati, non splendentes, nec cum Acidis effervescentes, coloris cinerei, cui interdum aliquid nigri accedit, insipidi & inodori. Ex variis Animalibus desumuntur & ex America adduci dicuntur.

BEZOAR ORIENTALIS. Calculus Bezoar L. Variam tam figuram quam magnitudinem habet, & hujus quidem diversus gradus diversum etiam ipsius pretium constituit; superficiem ostendit lævem, politam, splendens, color cum virore mistus nigricat, effingitur ex stratis sibi invicem incumbentibus, quorum intimum cavitatem sistit interdum vacuam, interdum variam substantiam heterogeneam condensam; cum Acidis non effervescit, odoris ac saporis perinde expers est. Desumitur ex Capra Bezoardica L. in Persia occurrente. Lapides hos prorsus inertes esse ratio pariter ac experientia evincunt. Plures factitii prostare dicuntur; sed certum characterem, unde genuini ab his distinguantur, nullum habemus.

BISMUTHUM, Wismuthum, Marcasita. Est Semimetallum Plumbo albius, ex tesserulis majoribus efformatum, facile in pulverem terendum, præ omnibus reliquis corporibus

metallicis minore igne fluens, in Acidis Vitrioli, Nitri & Salis dissolubile, igne in vitrum flavum fundendum. Sive Nativum five sub forma Glebæ metallicæ passim per Europam reperitur. *De ejus in Corpus humanum efficientia plane nihil liquet.*

BISTORTA, *Schlangen*, *Natterwurz*. Radices subcylindræ, incurvæ, interdum aliquoties flexæ, pollicem crassæ, extus profundius rubræ, intus pallidæ, transversim rugosæ, saporis multum adstringentis. Polygonum Bistorta L. BLACKWELL Tab. 254. Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem. *Ad Decocta Adstringentia tam interna, quam externa recipitur.*

BLATTA BYZANTINA. Operculum esse dicunt Muricis ramosi L. qui in Sinu Persico & Jamaica obtinet. *A fragrantia laudatur. Sed ejus usus proprus exsolevit.*

BOLETUS CERVINUS, *Hirschbrunst*. Est Tuberis genus, ad magnitudinem Juglandis usque excrescens, multis figuris ludens; exsiccatum, prouti in officinis prostat, sub cute ficca, tenaci, flavicante, copiosissimum pulverem nigrum includit, saporis & odoris expers. Lycoperdon Cervinum L. Passim per Europam obvium. Nec ex liquore genitali Cervorum gignitur, nec vires Aphrodisiacas habet. *Effectus Bovistæ edit.*

BOLUS ALBA. Argilla bolus alba L. Est Argilla alba, quæ in nostris officinis sub forma frustorum aliquot pollices longorum minus vero latorum & crassorum prostat, manifeste admodum pinguis. Passim reperitur.

BOLUS ARMENA. Bolus Orientalis, Argilla Lemnia L. pallide rubrum colorem habet, tactu pinguis & glabra. Diversissimas terras hodie hoc nomine venire rectissime LUDWIG monet. Ex variis Europæ locis adducitur.

BOLUS RUBRA. Sub frustis Bolo albæ similibus, magis siticulis, pinguibus & rubris prostat. Bolus Argilla rubra L. Ex Germania nobis affertur. *Inefficacem ad scopos medicatos omnem Argillam esse hodie satis superque compertum est.*

BOMBAX, *Cotton*, *Baumwoll*. Semina angulata, ovata, tomentosa, viridescencia, sub cortice fragili nucleum album includunt, inodora, levissime dulcia. Gossypium her-

baceum L. Indiæ indigenum in Europa maxime Meridionali colitur. Apud nos semper in vaporario retinendum, siquidem fructum inde expectamus. *Emolliendi & Demulcendi ergo olim adhibebatur.*

BONUS HENRICUS. Folia superne glabra, subtus glauca quasi pulvere conspersa, triangulari-hastata, inodora, insipida. *Chenopodium Bonus Henricus L. Vulgatissima per Europam planta. Interdum ad Cataplasmata Emollientia recipitur.*

BORAX. Sal, qui ex India sub forma Crystallorum variæ magnitudinis ad nos advehitur, virescentium, creberrime cortice albo pulverulento obductarum, tactu pinguiuscularum, saporem lixiviosum linguæ imprimunt, & talis *Tincal, Tincar, Borax crudus, Borax Tincal L.* dicitur. Qui, cum nonnisi depuratus in usum trahatur, & olim Venetiis depuraretur, hodie adhuc *Borax Venetus* appellatur, quamvis maxima jam ejus quantitas, quæ quidem nostras officinas ingreditur, in Belgio depuretur. Formatur in Crystallos majores, multilateras, pellucas, quæ difficillime aqua dissolvuntur; prunis superimpositæ spumant, in vitrum spurium abeunt, fossilium fusionem promovent, Syrupum Violarum viridi colore tingunt, cum Acidis non effervescent. Constat ex proprio Acido & Alkali fossili. In Borace crudo Illustris CADET Æs detexit. *Incidentes & Abstergentes effectus edit, sed rarissime ad hos scopos adhibetur; ad Cosmetica quoque recipitur.*

BORAGO, Bourrache, Boretsch. Folia nullis petiolis sustentata, ovato-oblonga, obtusa, hirsutæ scabra, rugosa, inodora, sapore levissime salino linguam ferientia. *Flores plano-patentes, cœrulei, quinquefidi, rotati, inodori, subdulces; asservantur calycibus evulsi. Borago officinalis L. BLACKWELL Tab. 36. Orientis & Europæ calidæ civis, in nostris hortis sponte disseminata luxuriat. Nitrum quod ex Foliis magni Viri obtinuerunt, ipsis non proprium est. Folia ad Juscula Refrigerantia recipiuntur. Flores aspectus blandimenta tam Acetariis; quam Speciebus pro Infusis & Decoctis adjici solent.*

BOS, Bœuf, Ochs. Taurus castratus. Inde recipitur *Se-*

bum Suif, Unschlitt, quod est Adeps ad renes maxime hærens, album, solidum, nauseoso odore instructum. *Vires Oleorum unguinosorum exserit.* Adhibent quoque in Ollibus cylindraceis contentam *Medullam*, consistentia sua Sebo proximam, albam, rubore suffusam, inodoram, grati saporis. *Ad Roborandum efficax habetur. Caro culinis relinquitur.*

BOTRYS, *Traubenkraut, Ambroisie.* *Folia* petiolata, oblonga, obtusa, profunde & irregulariter sinuata, laciniis alternis, dentatis, odore fragranti, balsamico, sapore linguam feriente, aromatico prædita. *Chenopodium Botrys* L. BLACKWELL Tab. 314. Europæ calidæ indigena, annua planta optime in nostris hortis coli potest. Oleum destillatum sebaceum fundere dicitur. *Folia Resolvendi & Vermes arcendi causa sub forma Infusi exhibentur.*

BOTRYS MEXICANA, *Thea Silesiaca Romana, Thée du Mexique.* *Folia* lanceolata sunt, dentata, prioribus fragrantiora, fortiore etiam sapore linguam ferientia. *Chenopodium Ambrosioides* L. In Mexico & Europa calidiore crescit, planta annua in nostris hortis coli potest. *Præcedente omnino præstantior, eadem ratione usurpatur.*

BOVISTA, *Crepitus Lupi, Vesse de Loup, Bovist.* Est substantia laxa, levissima, spongiosa, ferruginea, odore nullo, sapore adstringente instructa, contenta in *Lycoperdo Bovista* L. Per omnem Europam obtinente. *Ad sistendas Hæmorrhagias in modum Agarici Pedis Equini facie adhibetur.*

BRASSICA, *Choux, Kraut, Kohl.* Brassicæ Oleracæ L. plurimarum, quæ in hortis & campis nostris coluntur, varietatum, quæ omnes aquam quidem cum qua coquantur foetido odore inficientes, sed dulci suo sapore palato gratæ, idoque mensis frequentissime imponuntur, nonnisi duæ hujus loci sunt, *Alba* nimirum & *Rubra.* *Folia Albæ* obovata, glauca, pro ista unde defumuntur varietate, tam magnitudine, quam nervorum crassitie diversa, ante caulescentiam recipienda. *Imponuntur Cuti, cui Epidermidem Vesicantia demserint: Sale condita & fermentata edulii genus inter lautitias etiam referendum, & remedium constituunt ad arcendum æque ac curandum scorbutum*

egregie efficax. Folia *Rubræ* petiolata sunt, subrotunda, rubra, rore cœrulescente perfusa, denticulata, sapore a vi adstringente nonnihil mutuante. *Ex Jure coquantur, aut in Syrupum rediguntur contra morbos Pectoris.*

BRANCA URSINA, *Branche Ursine, Bærenklau.* Folia magna, pinnata pinnis lobatis, hirsuta, insipida & inodora. *Heracleum Sphondylium* L. BLACKWELL Tab. 540. Crescit in omni Europa. Per errorem pro *Acantho* habita, ad medicamenta *Emollientia* recipitur. Russi inde Spiritum ardentem parare dicuntur.

BRITANNICA, *wilde Rhabarber, Patience d'eau.* Radix fibrosa, magna, extus fusca, intus crocea, proprii, sed hebetis odoris, saporis contra acris, amari, adstringentis. *Rumex Aquaticus* L. Passim in Aquis Europæ reperitur. *Resolvit, Roborat, leniter Alyum ducit, Obstructiones reserat, Sanguinem purificat.* Datur ad *Drachmas duas aqua decocta.* *Ejus Decocto quoque Ulcera scorbutica Cacoëthea lavant.*

BRUNELLA, *Bonette.* Folia petiolata, ovato-oblonga, acute terminata, ferrata, exigue hirsuta, sapore subsalino instructa. *Prunella Vulgaris* L. BLACKWELL Tab. 24. Crescit ubique per Europam. *Roborandi & Incidendi gratia ad Gargarismata* recipitur.

BRUSCUS, videatur RUSCUS.

BRYONIA, *Coulevrée, Zaurube.* Radix fusiformis, valde crassa, extus flavicans, intus alba, striis longitudinalibus & circularibus, aspera, exsiccatur secta in taleolas, utraque sua superficie striis eminentibus ex medulla tanquam centro ad peripheriam ductis & variis circulis sectis distinctas, laxas, fungosas, intense nec sine quadam acrimonia amaras. *Bryonia alba* L. BLACKWELL Tab. 37. *Vulgaris Europæ Radix valide Alyum ducit & olim, quando valida Purgantia indicari credebant, ad Drachmam semis in substantia, ad Drachmam unam in Infuso aquoso dabatur; hodie rarissime adhibetur.* Radix recens comminuta & in Aqua frigida agitata in *Amylum album*, cum aqua concrefcens, glutinans evadit; ad id accedunt *Fæculæ*, quæ bene elotæ *Alyum ducendi virtute destituta* perhibentur. *Radicem recentem in taleolas sectam, tufam, cruribus œdematosis impositam, repetitis duodenis horis vicibus large aquas elicuisse, observarunt Auctores.*

BUFO, *Crapaud*, *Kræte*. Rana Bufo L. Vulgare per Europam Amphibium, pedes posticos minores & post oculos duplex tuberum genus habet. *Non est venenatus, exsiccatu horrorem excitando Hæmorrhagias fistit; in cineres redactus aliis cineribus non præstat. A medicina omnino exfulat.*

BUFONITES, *Crapaudines*, *Krætenstein*. Sunt Lapides rotundi, Avellanam magnitudine fere æquantes, convexo-plani, sive sub basi excavati, castanei ut plurimum coloris plus minusve diluti, insipidi, inodori. *Ichtyolithus Bufonites* L. Est Dens molaris cujusdam piscis marini, qui Anarchichas L. esse creditur. Reperitur per terram dispersus. *Iners lapis ab usu medicato remotus.*

BUGLOSSUM, *Ochsenzunge*. *Folia* oblonga, angusta, in acutum mucronem exeuntia, hirsuta, insipida, inodora; *Flores* infundibuliformes, quinquefidi, cœrulei, insipidi & inodori. *Anchusa officinalis* L. BLACKWELL Tab. 500. Passim in Europa obvia. *Vires Boraginis ipsi adscribuntur.*

BUGULA, *Consolida media*, *Bugle*, *Golden Gonsel*. *Folia* ovato-oblonga, petiolata, obtusa, dentata, amara, aliquantulum hirsuta. *Ajuga reptans* L. BLACKWELL Tab. 64. Offenditur per omnem Europam, præter magis Septentrionalem. *Recipitur interdum ad Gargarismata Roborantia.*

BURSA PASTORIS, *le Tabouret*, *Täschelkraut*. *Folia* ovato-obtusa, integra, dentata, pinnatifida, lyrata, glabra, vix umbram acrimoniæ referentia, inodora. *Thlaspi Bursa Pastoris* L. BLACKWELL Tab. 5. *Refrigerandi & Adstringendi scopo olim laudata hodie eviluit.*

BUTYRUM, *Beurre*, *Butter*. Est Lactis pinguedinis strenue agitatae coagulum; consistentiam habet spissioris Unguenti, colorem flavicantem, odorem proprium, saporem mitem. Coctione non a partibus solum Lactis caseosis & serosis adherescentibus purgatur, sed flavius, etiam spissius & grumosum, proprii præterea odoris & saporis efficitur. *Butyrum integrum creberrime mensis imponitur. In morbis medendis vices Oleorum unguinosorum sustinet; extus æque ac intus adhibetur. Coctione nonnihil acrimoniæ & Abstergentes vires induit.*

BUXUS, *Buis*, *Buchs*. Lignum solidum, duriusculum, pallide flavum, cortice cinereo, rugoso vestitum, inodorum, adstringens. *Buxus Sempervirens* L. BLACKWELL Tab. 196. Europæ Meridionalis indigena arbor sine negotio in nostris hortis colitur. *Recipiebatur ad Decocta Sudorifera*.

CAAPEBA, *Liane à Serpent*. *Radix* digitum crassa, fibrosa, paululum intorta, striata, valde dura, exiguis tuberculis obfessa, intus quam extus nigrior, saporis subaromatici, salinum referentis, cum aliquali amaritie. *Cissampelos Caapeba* L. Frutex Americæ Meridionalis & Brasiliæ proprius. *Aqua decocta contra morsus Serpentum & morbos malignos a quibusdam commendatur*.

CABBAGE BARCK. Hoc nomine Angli asservant Cortices aliquot pollices plus minusve longos, convolutos, non crassos, colore extus cinamomeo, intus cinereo tinctos, interdum extus epidermide ex nigro cinerea instructos, inodoros, levissime linguam adstringentes. *Geoffræa inermis* L. WRIGHT Phil. Trans. LXVII. p. 507. Jamaicae arbor. *Maxime contra Vermes laudatur, quibus se viribus etiam in Europa probavit. Datur ejus Decoctum ad Uncias duas, Extractum ad Grana tria, Pulvis ad Semidrachmam. Dosis excedens modum Nauseam & Vomitus excitat.*

CACAO. Nuclei ovato-oblongi, Amygdalarum fere magnitudinis, sub cuticula rufescente, non raro punctis albis distinctæ, includunt medullam siccam, pinguem, in plures lobos divisam, extus fulvam, intus fuscam, odore proprio, leni, sapore, grato, subacerbo, aliquantulum etiam amaro; optimi nuclei ex Nicuragua, Mexicani regni regione, ad nos transvehuntur, magnitudinæ & miculis albis cuticulæ inspersis, suaviore etiam sapore & largiore sua pinguedine præstantiores. *Theobroma Cacao* L. BLACKWELL Tab. 373. Americæ Meridionalis indigena arbor. Nutritii nuclei, quorum usus circa medium seculi superioris in Europa innotuit, nunquam ut sunt, seorsum præscribuntur. Scite tostæ & calido prelo expressæ Olei albissimi, grate olentis, spissi tertiam fere sui ponderis partem largiuntur, quod *Butyrum* dicitur.

CAFFE. *Semina* ovalia, variæ magnitudinis, utrinque

obtusa, convexo-plana, in facie plana fulco longitudinali notata, glabra, colore inter album & flavum medio, viriditatis etiam subinde nonnihil admittente, odoris exigui, saporis subadstringentis, leniter acerbi. *Coffea Arabica* L. BLACKWELL Tab. 337. Arabiae felicitis propria arbor, hodie in Asiam, Americam Meridionalem, & Insulas Africae Meridionales translata, in his regionibus quoque uberrime provenit, apud nos semper in caldario asservanda. Semina in Arabia lecta reliquis omnibus praestant, sed Americana in ipsam Arabiam vehi & Arabicis immisceri Itineratores testantur, in Arabia lecta parvitate sua & albidiore, eminentiore viriditate misto, colore distinguuntur; Arabicis proxima sunt, quae Borbonica, Africae Insula largitur. Hi nuclei, quorum usus medio fere superioris seculi in Europa invaluit, nullum Oleum unguinosum largiuntur, nec nisi tostis in usum trahuntur, eorum saporis suavitas maxime a justo tostionis in vasis clausis instituendae & usque dum brunei evaserint, continuandae modo pendet; Tostorum & comminutorum Uncia semis cum aquae Unciis duabus unica modo ebullitione coquenda, & decoctum per filtrum trajiciendum est, quod quidem brunum, grato omnino odore & sapore amaricante exquisitissimo instructum, hauritur ut plurimum Saccharo edulcoratum. *Neutiquam Sanguinem spissat, egregie Digestionem promovet, & noxas ab ea turbata oriundas praecavet & corrigit; incommoda, quae inde nata observasse sibi nonnulli visi sunt, abusui aut idiosyncrasiae debentur.* Succedanea, quae ipsi substituere conabantur, nulla votis responderunt.

CAJEPUT OLEUM. Est tenerum, album, cum quodam viroris vestigio, odore proprio perquam fragrante, sapore multum aromatico, momento contactus linguae frigoris sensum imprimente praeditum. Dicitur esse Oleum odoratum foliorum *Melaleucæ Leucodendrae* L. Indiae Arboris, simillimum huic Oleum ex *Cardamomo majore*, Destillationis cum aqua ope, obtinetur. *Multum ob virtutem vehementiores Nervorum motus sistentem laudatur; ejus Guttæ sex aut octo frusto Sacchari Canariensis instillatae pro Dosi dantur.*

CALAMINARIS LAPIS, *Calaminajre, Galmey*. Est lapis

pis variæ duritiæ, ad Chalybis ictum scintillas emittens, varii quoque coloris, creberrime flavicantis, Æs secum fufum, aureo colore tingens. Zincum Calaminaris L. Passim ex collibus Europæ eruitur. *In pulverem redactus ad Aspergines aut Unguenta Exsiccantia recipitur aut ad Collyria.*

CALAMUS AROMATICUS, *Acorus verus, Calmus.* Radix cylindrica, compressa, geniculata, lineis longitudinalibus & transversis notata, extus ex flavo rubens, intus alba, fungosa, odore grato, aromatico, sapore amaro, linguam feriente prædita. Acorus Calamus L. BLACKWELL Tab. 466. Passim in Europa, præter maxime Septentrionalem & calidam obvius. Olei destillati paululum largiri dicitur.

ACORUS INDICUS VEL ASIATICUS. Acorus Calamus verus L. Indiæ civis, nostras hyemes facillime fert; ejus in nostro horto culti Radices prioribus magnitudine minores, uno latere convexæ, colore gryseæ, carne solidiores, odore fortiores sunt. *Resolvendi & Ventriculum Roborandi ergo ad Infusa recipitur, Confectio ejus ad aliquot Drachmas pro dōst comeditur.*

CALAMINTHA, *Calament, Bergmünze.* Folia petiolata, ex ovatis oblonga, hirsuta, crenata, paulum odorata & aromatica. Melissa Calamintha L. BLACKWELL Tab. 166. Angliæ, Helvetiæ, Europæ Meridionalis civis, nostras hyemes fert. Præstat hac Melissa Nepeta L. cujus folia prioribus minora, magis ovata, enitentiore odore & sapore instructa. Iisdem cum priore locis vegetat. *Calaminthæ usum Melissa & Mentha suppresserunt.*

CALCARIUS, *Calcaire, Kalkstein.* Est Lapis, durus quidem, sed ex Chalybe nullas scintillas eliciens, varie coloratus, in Acidis cum effervescentia dissolubilis, igne duritiem exuens, causticus evadens, cum aqua multum incalescens, in aëre dilabens, cum aqua & sabulo in durissimum cæmentum concrefcens; igne causticus redditus *Calx viva, Chaux vive, ungelœschter Kalk,* & hac dilapsa, *Calx extincta* dicitur. Marmorude L. Copiosissimus ejus est proventus; integros

montes & montium catenas efformans. *Calcarius ad usus medicatos non recipitur; Calx viva intus si adhiberetur Veneni effectus ederet; extus Depilatorio scopo adhibetur.*

CALCITRAPPA, *Chausse Trappe*. Radices cylindroidæ, digitum crassæ, sub cortice gryseo substantiam albam includunt, odoris vacuum, saporis levissimi, *Centaurea Calcitrappa* L. Europæ calidæ & temperatæ civis. *Corticis Drachmam Vino infusam, & per plures menses sumtam egregie Nephriticis opitulari asserebatur.*

CALENDULA, *Soucy, Ringelblumen*. Flores asservantur ex calice evulsi, lutei, ligulati, exsiccatione omnem odorem & saporem amittentes, aquam, cui infunduntur, amaram reddentes. *Calendula officinalis* L. Europæ Meridionalis indigena, in nostris hortis colitur. Cum hi Flores exsiccatione omni odore priventur, hinc frustra inde *Vires Alexiteriæ expectantur. Aperiendi scopo cum aqua infunduntur.*

CAMPECHIANUM LIGNUM. Adducitur ad nos in magnis frustis, sub quorum superficie cœrulescente, color sanguineus, odor nullus, sapor adstringens est. *Hæmatoxylum Campechianum* L. **BLACKWELL** Tab. 493. Americæ Meridionalis indigena arbor, apud nos semper in caldario asservanda, Arti tinctoriæ præcipue inservit. *Extractum aquosum inde paratum ad Drachmam semis, Decoctum cum aqua ad Unciam semis exhibetur.*

CAMPHORA. Sub forma placentarum majorum, rotundarum, convexo-planarum, superne foratarum, crystallina albedine conspicuarum, leviter flexibilium, fragiliuscularum prostat; odorem habet proprium, Cerebrum obnubilantem, saporem linguam afficientem, levissime amarum, evidentissimo frigoris sensu, aquæ immersa odorem & saporem suum impertit, supra aquam ardet, in Alcohole æque ac in Oleis dissolvitur, flammam capit & in Flores albos vertitur. Obtinetur ratione, quam in *Institutionibus Chemiæ* dixi, ex *Camphora* cruda, sub forma granulorum flavicantium ex *Lauri Camphoræ* L. **BLACKWELL** Tab. 347. Japoniæ arboris, apud nos in tepidario per hyemem asservandæ, foliis & ramis ex aqua

coctis surgentium, stramineo lebetis operculo accrescentium. Camphoræ ex aliis Vegetabilibus obtinendæ vix officinas Pharmaceuticas ingrediuntur. *Intus Sopiendi ergo ad Drachmam semis, Antiseptico sine ad Scrupulum unum; in morbis Inflammatoriis ad Grana tria pro dosi, saponi cuidam juncta, sub forma Pulveris, Pilularum, Emulsionis, Julapii exhibetur; extus Fomentationibus, Epithematibus siccis, Cataplasmatibus &c. immiscetur.*

CAMPHORATA. Caules albidi, fasciculis foliorum minorum, albidorum, aciculas referentium, obfessi, quorum ego in nostris quidem hortis neque odorem, neque saporem ullum detegere potui. Camphorosma Monspeliaca L. Europæ Meridionalis & Tartariæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defenditur. *Resolvendi gratia ex aqua coquitur, Asthmaticis nec non Hydropicis a nonnullis exhibetur.*

CANADENSE BALSAMUM. Spissum est, adeo ut in aëre temperato non diffuat, tenax, in modum vitri pellucens nonnihil flavedinis subostendens, odore levi, resinoso, sapore amaricante, acriusculo instructum. Obtinetur ex Pinu Balsamea L. Canadæ arbore, nostræ hyemis patientissima. *Scopo Abstergendi & Consolidandi, nec non ad fines Antinephriticos ejus Drachma semis saponis soluta, sive in Pilulas recepta exhibetur.*

CANCROCORUM CHELÆ. Varia earum magnitudo est, basis quadrangula, eburnea quasi, cujus unum latus in tres quasi appendices diductum, contrahitur in modum conii leviter incurvati, inferne flavicantis, superne nigri; ad latus externum occurrunt tubercula exoleta; intus chelæ penitus cavæ, albæ, inodoræ & insipidæ sunt. Desumuntur a Cancro Pagiuro L. Oceani cive. *Virtutes Alexipharmacæ olim illis ad Drachmam semis sub forma Pulveris exhibendis adscriptas, recentior ætas abrogavit.*

CANCROCORUM OCULI SIVE LAPIDES, Yeux d'Ecrevisse, Krebsaugen. Calculi Oculi Cancro L. Substantiæ rotundæ, convexo-concavæ, recens quidem natæ cœrulescentes, deinde albæ, ex lamellis sibi arcte incumbentibus compositæ, hærent inter utramque Ventriculi tunicam Cancro Astaci L. vulgatissimi aquarum dulcium insecti, Augusto

menſe, quo novum ſibi thoracem ſtruit, proprio odore & ſapore inſtructi. Copioſiſſimi in Ruſſia ad confinia Tartariæ ex infectis piſtillo contuſis colliguntur. *Vires præter Abſorbentes nullas habent, in modum aliorum terreorum uſurpantur.* Caro Cancri Aſtaci evidenter quidem nutrit, ſed nonnihil acrimoniæ, quod ipſi in eſt, non modo faucibus interdum moleſtum, ſed quandoque etiam varios morbos excitaffe obſervatum eſt. Nunquam niſi cocta in uſum recipitur. Medici illam *Juribus Nutrientibus & Demulcentibus incoquant.*

CANELLA ALBA. Cortex craſſiuſculus, in tubum convolutus, fragilis, extus ſtriis tranſverſis notatus, flavicans, intus albus, aromatico odore, ſapore acriuſculo, amaricante inſtructus. Winterania Canella L. BLACKWELL Tab. 206. Oleum odoratum fundere dicitur. *Scopo Roborandi & Reſolvendi datur.*

CANELLÆ CLAVELLI videatur **CINAMOMUM.**

CANIS, *Chien, Hund.* Canis Familiaris L. Vulgatiffimum animal. *Stercus* quod nobis exhibet, vide ſub **ALBUM GRÆCUM.** *Axungia* alba, Unguenti tenuioris conſiſtencia pollens *Pectoralibus* adſcribitur, intus & extus adhibetur. *Catelli ob vires Nervinas, quas vero nemo adhuc ſatis firmis rationibus ſuperſtruxit, cum Oleo Olivarum coquantur.* *Hepar Canis rabidi contra Rabiem caninam ſuſpectum mihi medicamentum eſſe videtur.*

CANNABIS; *Chanvre, Hanf.* *Fila* in quæ Cortex ſcite præparatus ducitur, *ſive Emolliendi Scopo, ſive vehiculi loco extus adhibentur.* *Semina* ovata, utrinque leviffime compreſſa, uno margine acutiore, ſub cortice lævi, nitente, cinereo, ſpadiceo, fragili, album & dulcem nucleum includunt, tenera membrana involutum. *Cannabis fativa* L. BLACKWELL Tab. 322. Indiæ indigena, hodie per omnem Europam colitur. Semen tertiam circiter ſui ponderis partem Olei viridis decimo quarto demum gradu ſub cyphra conſiſtentis, largitur. Exſiccatione odorem Cerebrum inebriantem perdit, *vires Emollientes edit, ad Emulſiones olim recipiebatur.*

CANTHARIDES, *Spaniſche Mucken oder Fliegen.* Inſecta corpore oblongo, toto viridi, aureo, elythis viridibus,

flexilibus, multis striis distinctis & alis fuscis; tria circiter grana pondere æquant, tenuis eorum & nauseosus odor est. *Meloë Vesicatorius* L. per omnem Europam, præter maxime Septentrionalem, occurrit. Hæc infecta ab arboribus, quibus insident, decussa exsiccata nostras officinas intrant. *Adufus Diureticos intus exhibendi a multis & gravibus Auctõribus fuerunt laudati. Eorum dosis ultra octo Grana non extendenda, & caute ita dividenda, ut quovis quadrihorio unum modo Granum exhibeatur; dosis enim, si vel tantillum excedit gravissimos in viis Urinariis Spasmos excitat, justo major contra quantitas omnes effectus Veneni roãentis edit; extus scopo Vesicas excitandi in frequentissimo usu sunt; optime in Emplastrum recepta adhibentur, in quo dosis non ultra dimidiam Drachmam extendenda.*

CAPILLUS VENERIS, *Capillaire, Frauenhaar*. *Monspeliensem & Canadensem* asservamus; *Monspelienfis* habet cauliculos nigricantes, glabros, lucidos, ramosos, vestitos foliis alternis, petiolatis, cuneiformibus, incis, apice crenatis, in margine reflexo maculis notatis, inodoros, saporis dulciusculi, leviter adstringentis; *Adiantum Capillus Veneris* L. BLACKWELL Tab. 367. *Galliæ Meridionalis, Helvetiæ, Angliæ civis. Canadensis* a priori cauliculis magis rufescentibus, lucidioribus, foliis latioribus, trapezoideis, margine inferiore integerrimo, superiore crenis majoribus crenato & sapore magis grato differt. *Adiantum pedatum* L. Crescit in Canada & Virginia. *Scopo Pectorali ad Infusa recipitur; sub forma Syrupi exhibetur.*

CAPO, *Chapon, Capaun*. Gallus gallinaceus castratus, exquisitus cibus mensis imponitur, *ad Juscula nutrientia recipitur. Axungia alba* est, Unguenti formam habet. *Emolliendi scopo extus adhibetur.*

CAPPARIS, *Caprier, Capres*. *Gemmæ Florum, Aceto conditæ ad usus cibarios, Cortex Radicis ad medicatos usus adhibetur. Gemmæ virides* sunt, pedunculo instructæ, angulares, variæ magnitudinis, constant ex aliquot petalis, quæ rudimenta Antherarum includunt: *Cubebis non majores, læte*

virides & pedunculis instructæ reliquis præferuntur: sapore proprio, leviter amaricante, dignoscuntur. *Cortices* variæ longitudinis & crassitiei advehuntur, striis longitudinalibus & transversalibus notati, cinereo-flavicantes, inodori, leviter amari, aliquantulum etiam acres. Capparis spinosa L. BLACKWELL Tab. 417. Asiæ, Africæ, Europæ Australis indigena, Tolosæ colitur, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. *Gemmæ condimenti loco carni adjiciuntur; Radices Decoctis Aperientibus.*

CAPRIFOLIUM, *Chevrefeuille, Hahnenfüslein.* Folia glauca, longe ovata, obtuse acuminata, subadstringentia; Flores tubo longo in duo labia finduntur, quorum superius latum, reflexum, quadrifidum, inferius angustius & simplex est, gratissimus recentium odor exsiccatione perit, albidum cum admista rubedine, Stipites teretes sunt, epidermide cinerea flavedine suffusa, vestiti, sapore imbuti dulciusculo cum quadam amaritie eo evidentiore, quo stipites sunt crassiores Lonicera Periclymenum L. BLACKWELL Tab. 25. Ubivis nascitur. Folia a vi Roborante & Abstergente, a quibusdam laudantur, & ad Gargarismata recipiuntur. Flores & stipites a nonnullis Sanguinem Depurandi & Urinam ciendi causa sub forma Infusi exhibentur.

CARANNÆ GUMMI. Advehitur ad nos ex America Meridionali, in magnis massis ex viridi nigricantibus, quibus extus residua adhærent involucri juncei, quo, dum adhuc molles erant, involvebantur massæ; sapore subresinosæ sunt, odorem spirant admodum tenuem, accensæ fumum emittunt haud ingratis olemtem, igne funduntur, copiosius eas Alcohol, quam aqua dissolvit, ab Oleis, quoad partem modo: Oleum destillatum fundit. *Olim externo scopo Resolvendi & Roborandi adhibebatur.* Plantæ, unde Caranna obtinetur, character ignoratur.

CARDAMINE, *Cresson des prés, Wiesenkresse.* Florum petala obtusa, oblongo-ovata, angustis unguibus terminata, mox alba, mox venis purpureis picta, inodora, levissime acria. Cardamine pratensis L. BLACKWELL Tab. 227. Communis per Europam planta. *Laudantur contra morbos Convulsivos ad Drachmam unam aliquoties de die data.*

CARDAMOMUM, Est Folliculus ficcus, ventricosus, trifido septo distinctus, feminibus angulatis. Plures ejus species in tabernis servantur. Hic modo eas, quæ sub majoris, mediæ & minoris nominibus hodie prostant, recenseo. *Majus* BLACKWELL Tab. 385. & 584. distinguunt Folliculi aliquot pollices longi, turbinati, superne apertura lacera hiantes, cinereo-rufi, striati, Semina includentes Coriandro vix cedentia, sub cute cinereo-ferruginea medullam albam continentia, sapore acri Camphoræ affini instructa. Ex Asia & Africa nobis adducitur, plantam unde colligitur, ignoramus. Edit $\frac{1}{4}$ circiter Olei destillati, quod *Oleo Cajeput* substituitur. *Medium*, quod *Zeylanicum* quoque appellant, sistit Folliculos triquetros, unciales, gryseo-fuscos, apice acuto instructos & feminibus badiis, rugosis, angulosis, odoris suavis, saporis amariuscule, minus quam in reliquis aromatici, largitur $\frac{1}{15}$ Olei odorati, spissiuscule, dulciuscule. Ex Ægypto, India, Persia & Java ad nos transfertur. Hujus quoque fructus plantam perinde nescimus. *Minus* sive *Malabaricum* Folliculos semiunciales circiter habet, triangulares, subflavos, levissime striatos, in apice papilla coronatos; semina sunt rugosa, subrufa, sapor & odor Camphoræ propinquus; est fructus Amomi Cardamomi L. BLACKWELL Tab. 584. & 585. Indiæ civis, Olei odorati pellicidi $\frac{1}{2}$ fundit. Extracta aquosa ex duobus posterioribus parata plane inertia sunt. *Ad Ventriculum Roborandum Infusis Vinosis aut Spirituosis immiscentur, recipiuntur quoque in Trageas, Morsulos &c. Extus Epithematibus Roborantibus adjiciuntur.*

CARDIACA, *Agricome, Herzgespann.* Folia cuneiformia, tribus lobis angustis & inæqualibus terminata, rugosa, petiolata, inodora, amara. Leonurus Cardiaca L. BLACKWELL Tab. 171. Passim per Europam & Virginiam crescit. *Visceribus Abdominalibus obstructis medetur. Vulgo sub forma Unguenti adhibetur.*

CARDUUS BENEDICTUS, *Chardon benit, Cardenbenedicten.* Folia oblonga, magnis sinibus runcinata, hispido-scabra, rigide ciliata, intense amara; Semina majuscula, ventricosa, striata, flavescencia, pappo rigido coronata, medul-

lam albam & dulcem includentia. Centaurea Carduus benedictus L. BLACKWELL Tab. 476. Europæ calidæ & Orientis propria, copiose apud nos etiam in agris colitur. *Folia sub forma Infusi Aquosi aut Vinosi vel Extracti Aquosi Ventriculi Roborandi & Aperiendorum Viscerum gratia exhibentur. Semina præ aliis Seminibus dulcibus nil proprii habent.*

CARDUUS MARIÆ, *Chardon Marie, Mariendistel. Folia* ovali-lanceolata, magna & lata, profundis & magnis sinibus laciniata, margine ciliato, spinoso, reti albo picta, sapore salino, cui levissima amarities accedit, instructa. *Semina* cylindroidea, obtusa, utrinque paululum compressa, sub cortice fusco & splendente medullam albam includunt. *Carduus Marianus* L. BLACKWELL Tab. 79. Europæ temperatæ civis. *Eodem modo, quo antecédens olim in usu erat.*

CARDUUS TOMENTOSUS, *Chardon sauvage, breite Wegdistel. Caulis* erectus, altus, crassus, tomentosus, alatus, *Foliis* decurrentibus, ovato-oblongis, dentatis, dentibus spinas emittentibus, tomentosus vestitus. *Non oportum Acanthium* L. Passim per Europam obvium. Succi inde expressi externus usus *multum ad Ulcera cancrofa sananda laudatur.*

CARICÆ, *Figes, Feigen.* Sunt Ficus exsiccata, variæ magnitudinis, partim rotundæ, partim turbinatæ, umbilicatæ, in pulpa cute tecta flavicante, abscondunt grana, quæ Flores potius & Semina esse Recentiores docuerunt; mellem dulcedinem habent. Caricæ magnæ & rotundæ a *Smyrna* denominantur, magnæ & turbinatæ a *Genua*, parvæ rotundæ, utrinque compressæ a *Massilia*; ultimæ dulcedine sua priores vincunt, sed illis citius corrumpuntur. Caricæ sicciore pulvere albo obfessæ, nigricantes, acidæ aut austeræ rejiciendæ sunt. *Ficus Carica* L. BLACKWELL Tab. 125. Europæ Australis indigena arbor, apud nos per hyemem stramine a frigoris injuria defenditur. *Comeduntur crudæ Nutrimenti loco, coquantur ex aqua in Pectoris medelam; sive inversæ sive sub cineribus coctæ Abscessibus aperiendis imponuntur.*

CARLINA, CARDOPATIUM, *Ebertswurzel. Radix* fibrosa, aliquot pollices longa, extus fusca, intus ex albo-flava, odore

odore proprio, nauseoso, sapore acri, valde amaro gaudet. *Carlina Aco ualis* L. BLACKWELL Tab. 532. Crescit in Europa temperata. Oleum destillatum fundere dicitur. *Olim a virtute Alexipharmaca laudata, hodie Mulo-Medicis relinquitur.*

CARNEOLUS, *Sardus, Cornaline, Carneol.* Est *Silex* variæ magnitudinis, semipellucidus, colore rubro, plus minusve diluto splendens, qui vero igni admotus, perit. *Silex Carneolus* L. Passim in Europa occurrit sub terra dispersus. *Iners lapis hodie exsolevit.*

CARPATICUM BALSAMUM vid. **TEREBINTHINA.**

CARPIO, *Carpe.* *Cyprinus Carpio* L. Piscis apud nos admodum frequens culinis relinquitur. *Lapides Carpionum* sunt cartilaginee consistentia & colore cornua referentes, facies earum altera linea longitudinali divisa est & duabus facieculis distinguitur; sitæ sunt inter palatum & primam vertebram. *Proprias aquibusdam istis adscriptas vires experientia non confirmavit.*

CARTHAMUS, *Safran batard, Saflor.* Flores ex calice defuncti asservantur, tubulosi, rufi, limbo profunde quinquefido, odorem nullum, saporem levissime salinum habent. *Semina* alba, quatuor angulis notata, oblonga, altero extremo crassiora, nitida, includunt nucleum dulcem, nec nauseosum, nec acrem. *Carthamus Tinctorius* L. Planta annua, Ægypti & Indiæ indigena, passim per Europam colitur. *Flores usibus tinctoriis inserviunt. Semina Purgantibus a Veteribus erant adscripta, & ad Unciam unam sub forma Emulsionis data; infidum medicamentum eviluit.*

CARVI, *Mattenkümmel.* *Semina* incurva, convexo-concava, oblonga, striata, subnigricantia, odore & sapore aromatico, grato instructa. *Carum Carvi* L. BLACKWELL Tab. 529. Crescit per omnem Europam. Fundit Olei odorati flavicantis, acris $\frac{1}{8}$. *A virtute Carminativa maxime laudatur, cibus, Infusis, Jusculis, Clysmatibus adjicitur. Discutiendi scopo Epithematibus quoque immiscetur.*

CARYOPHYLLATA, *Benoite, Benedicthenwurzel.* *Radix* ex capite crassiusculo fibras emittit capillares, extus rufas, intus albas, *Caryophyllos* redolentes, sapore adstringente palatum

PARS I

I

afficientes. *Geum Urbanum* L. BLACKWELL Tab. 253. Provenit per omnem Europam. Oleum destillatum, album, spissum, fragrans largiri dicitur. *Ad Decocta Adstringentia adhibetur, recentissime contra Febres laudata.*

CARYOPHYLLI, *Cloux de Girofle, Nægelein*. Sunt Germina immatura Antophyllorum, aliquot pollices longa, leviter angularia, inferne obtusa, superne in quatuor lacinias æquales, quibus creberrime globus ex quatuor petalis constans, floris elementum infidet, divisa, rugosa, rubiginoso colore tincta, odor illis proprius, fragrans est, sapor evidenter linguam urens. Varietas angulis extantioribus distincta *Caryophyllorum Regionum* nomine venit. Carpuntur hæc germina mensibus Octobri & Novembri, per aliquot dies fumo exponuntur & dein Sole exsiccantur; Olei limpidissimi ipsis Caryophyllis minus acris, in aqua fundum petentis $\frac{1}{4}$ circiter fundunt. *Cibis, Trageis, Morfulis, Infusis Digestionem promovendi ergo adjiciuntur, sed cum Humores valde commoveant, exiguæ modo eorum doses recipi debent. Recipiuntur quoque ad Epithemata Roborantia. Oleum gratiæ ergo Medicamentis immiscetur, nec non scopo Nervino Balsama ingreditur. Ossibus quoque cariosis, cum succu applicatur.*

CASCARILLA, *Chacrille, Cortices* in semitubum convoluti, aliquot pollices longi, lineam crassi, extus rugosi, cinerei, intus nigri, odore proprio aromatico, sapore amaricante, acriusculo, aromatico instructi, accensi fumum naribus non ingratum emittentes. *Croton Cascarilla* L. BLACKWELL Tab. 578. Americæ Meridionalis & Virginæ arbor. Cortices Olei destillati $\frac{1}{7}$ circiter fundunt. *Vires Roborantes edit; sub forma Pulveris, Infusi, Extracti exhibetur; Extractum spirituosum aquoso præstare videtur.*

CASSAVA videatur MANIHOT.

CASEUS, *Fromage, Kæs*. Pars Lactis tenax, proprio odore & sapore salino instructa, animali natura gaudens. Ex integro lacte paratus, butyro scatet, unde pinguis est, ex lacte ebutyrato, qui surgit, macer est. Differt quoque pro vario lacte & pro vario animali ex cujus lacte secessit; *Vaccinus O-*

villo minus, Afinino & Caprillo magis tenax est. *Digestu difficilis, extus Resolvendi & Glutinandi ergo adhibetur.*

CASSIA CARYOPHYLLATA, *Canelle giroflée, Nægelein-Rinde.* Cortices aliquot pollices longi, tenues, semiconvoluti, intus fere nigri, extus dilutiores, creberrime Lichene obfessi, odore & sapore Caryophyllos referentes, utroque tamen remissiore. *Myrtus Caryophyllata* L. Arbor Indiæ indigena. Oleum destillatum fundere, observata est. *Caryophyllorum vires, sed debiliores edit.*

CASSIA FISTULA, *Casse en batons.* Legumina cylindroidæ pedem & ultra longitudine, crassitie pollicem æquantia, mox rectissima, mox incurvata, tubere subrotundo terminata, lignosa, fragilia, ex spadiceo nigra, futura longitudinali, circulis non eminentibus distincta, quibus intus respondent septa transversalia, rigidiuscula, inter quæ pulpa nigra, dulcis obtinet, feminibus subrotundis, duris, fulvis, nitidis foeta. Rejiciuntur legumina evidentioribus rugis obfessa, quorum pulpa alienum saporem habet, aut adeo parca est, ut femina, concusso legumine, sonum edant. Cassia Fistula L. BLACKWELL Tab. 381. Ex India Orientali & aliis Asiæ calidioris regionibus in Americæ Insulas, Martinicam, Dominicam &c. translata & ibi culta præstantiora, quam in patrio solo legumina largitur. In nostris hortis perpetuo in vaporario aservanda. Legumina recentia, in conclavi clauso in acervum collecta, adpersa aqua sudare cogunt, inde illis nigredo surgit. Pulpæ $\frac{1}{4}$ continere dicuntur. *Eccoprotico & Diuretico scopo exhibentur. Leguminum Unciæ quatuor interdum ex aqua coquantur & Alyum Ducendi scopo dantur, sed consilio minus laudando; optimum est Pulpam cultro ligneo, ipso usus tempore inde separatam, ad Unciam dimidiam pro Alvo ducenda, ad Sesquiunciam vel duas Uncias Purgandi sine exhibere. Neutiquam Urina eorum, qui eam assumerunt, inde tingitur, ut vulgo solent perhibere.*

CASSIA LIGNEA, *Mutterzimmet.* Cortices pollicem circiter latitudine, lineam crassitie æquant, mox plani, mox in semitubos convoluti, colore obscuriore Cinnamomeo, simili etiam odore & sapore, vero Cinnamomo multum inferioribus

instructi, masticati evidente viscedinis sensu, linguam afficiunt. Varii adhuc alii Cortices colore, odore, sapore ad Cinnamomum accedentes hoc nomine veniunt. Laurum Cassiam Indiæ arborem LINNÆUS adducit. Laurum Malabaram BURMANN. Cl. BERGIUS. Laurus Indica L. Virginiæ arbor, apud nos in tepidario per hyemem asservanda, odore & sapore hanc Cassiam refert. Cortices variarum Lauri specierum ad Cinnamomum accedentes Cassiæ lignæ substitui videntur. Substituuntur, sed minus bene, Cinnamomo.

CASSUMINAR, *Casumunar*, Dicitur Radix, quæ in taleolas longitudinales & transversas secta ex India Orientali advehitur, extus annulis eminentibus notata, gryseo-fusca, intus flava, dura & tenax, odore & sapore ad Zedoariam accedens, qua tamen evidentioram amaritiam linguæ imprimit. $\frac{1}{85}$ Olei odorati fundere dicitur. *Nervino & Stomachico scopo in Anglia primis hujus Seculi lustris usurpari cepit. Dabatur sub forma Pulveris ad Grana quindecim, in Infuso autem ad Drachmam unam. Evilescere videtur. Zedoaria ei substitui potest.*

CASTANEA, *Chataigne, Castanie, Keste*. Nux ovata, plus minusve triangularis, convexo-plana, umbilico notata, inferne in exiguum mucronem tomentosum producta, badia, splendens, sub cortice tenaci, intus tomentoso includit *Nucleum*, cuticula striata & fulvatectum, album, longitudinalibus fulcis striatum, odore proprio, levi, non ingrato, & sapore dulci instructum. Fagus Castanea L. BLACKWELL Tab. 330. Crescit in Europa temperata. Inoculatione *Sativa* reddita Nuces majores & suaviores, *Marones* dictas, largitur. *Flatulentæ insuetis, torculari pressæ nullum Oleum, sed Liquorem fundunt, qui Fermentationem vinosam subit. Aqua coctæ vel assatæ in cibum recipiuntur.*

CASTOREI AXUNGIA. Improperie ita denominatum est Sebum, quod consistentiam Unguenti habet, flavum, odorem Castorei, sed minus fortem spirans; desumitur ex Glandulis conglomeratis, sub Folliculis statim dicendis, ad utrumque Urethræ latus hærentibus. Castoris Fibri L. Quadrupedis in

Europa & America Septentrionali occurrentis. *Recipitur ad Unguenta Nervina.*

CASTOREUM, *Bibergeyl.* Duo *Folliculi* inferne contigui, dein divergentes, progrediendo magis ventricosi, efformati e membrana coriacea, includentes substantiam nigricantem, tenacem, proprio, Cerebrum gravante, odore & sapore amaricante præditam, inflammabilem, multis cellulis membranaceis distinctam. *Folliculi* majores, ventricosi, substantiam siccam quidem, sed non aridam continent, fortissimum odorem spirantes, reliquis præferendi; denominantur isti a *Russia*, *Borussia*, aut *Dantisco*. *Canadense*, quod etiam *Anglicum* appellant, folliculis minoribus substantiam aridam includens & minus odorem, rejiciendum. Ad usus medicatos substantia nonnisi seorsum a folliculis separata recipienda est. Oleum destillatum fundere dicitur. Hi *Folliculi* ad utrumque *Urethræ* animalis modo dicti latus prope *Præputium* hærent & proprio orificio in illam patent. Ex animali exenti infumatione contra corruptionem defenduntur. *Contra morbos Spasmodicos, sub forma Pulveris aut Pilularum intus ad Scrupulum semis & ultra datur. Extus Unguentis, Epithematibus, Clysmatibus admiscetur; admovetur quoque tanquam Odoramentum Hystericarum naribus.*

CATAGAMBAR, videatur CATECHU.

CATAPUTIA MAJOR, *Palme Christi, Ricini Semina, Semence de Chasse-taupe, Purgirkærner.* Sunt *Semina* ovata, utrinque compressa, hilo prominente terminata, sub cortice fragili, sicco, nitido, nigro, lineis albis pulchre variegato, sapore acerrimo, continent nucleum album, mitiorem. *Ricinus communis* L. BLACKWELL Tab. 148. Planta annua utriusque *Indiæ* propria, in nostris hortis colitur. *Validioribus Drastrictis hæc Semina omnino sunt annumeranda, eorum dosis ad Grana sex extendi solet, ast vel tantilla nimia est; consultius medicamentum acerrimum nunquam datur.* Oleum unguinosum, flaviusculum, vix acre, ex nucleis, demto prius cortice, prorsus expressum, *Oleum Palmæ* appellatur; in *Colica, Nephritide, Volvulo, Vermibus*

ad unum Cochlear singulis horis exhiberi solet, usque dum Alvum ducere cœperit; infantibus ad unam vel duas Drachmas propinatur.

CATAPUTIA MINOR, *Grains de l'Epurge, Springkærner. Semina parva, ovata, sub cortice sicco, lituris rufis variegato, nucleum continent antecedentibus etiam acriorem. Euphorbia Lathyris L. BLACKWELL Tab. 123. Planta biennis Europæ Australis propria, nostræ hyemis patiens sparsis sponte feminibus in nostris hortis ipsa semet propagat. Ex officinis releganda sunt.*

CATECHU sive JAPONICA TERRA, *Cachou. Substantia sicca, dura, extus rufo-nigricans, intus ex rubro-fusca, duriuscula, sapore adstringens, sensu primum dulci, deinde amaro instructa. Rejicimus frustra arena aut aliis fordibus inquinata, nec non ea quæ ore detenta non tota liquefcunt. Est Succus aut potius Extractum aquosum ex variis Mimosa L. speciebus, quibus forsitan alia Vegetabilia adjiciunt, paratum. Rationes, cur non ex Areca Catechu L. parari credam alio loco exposui. Ex India nobis affertur. Roborandi & Adstringendi ergo Pulveribus, Elechuariis &c. admiscetur; adjicitur quoque Dentifriciis. Adduntur ipsi varia suaveolentia & in variæ figuræ Trochiscos formantur, ad conciliandam animæ gratiam, ore detinendos. Ex Indiis allati *Siri Gata Gamber* appellantur, apud nos parati *Trochiscorum, Muscerdarum Cachou* nomine veniunt. Hoc medicamentum olim cum Argilla miscebant, aqua affusa Solis calori exponebant; oriebatur inde fermentatio; spumam liquori fermentanti supernatantem colligebant & in modulis orbicularibus exsiccabant; oriebantur ita placentulæ variæ magnitudinis, aliquot pollices latæ, extus saturius flavæ, intus pallidiores, sapore amariusculo, subadstringente præditæ, quas *Catagamber* appellabant; & ad eosdem cum terra Catechu usus adhibebant.*

CATUS, *Chat, Katze. Felis Catus L. Quadrupes per omnem Europam frequentissimum; largitur Axungiam infpidam, inodoram, albam, quæ Unguenti consistentiam habet & a reliquis hujus generis pinguedinibus vix differre videtur.*

CAOUTCHOU, *Resina Elastica*. Resina, quæ sub varia figura globorum, lagenarum &c. variis figuris exsculptorum ad nos adducitur, insipida, inodora, fusca, interdum nigra, igne cum elasticitatis jactura liquabilis, accensa minus gratum fumum emittens. Est Succus arboris copiose in America Meridionali crescentis, cujus genus quamvis Monœciæ adscribatur, determinatum tamen adhucdum non est; Succum lacteum incisione ex arbore elicatum singulatim per strata, quorum quodlibet prius fumi ope exsiccandum est, antequam novum quodque applicatur, inducunt modulis ex Argilla confectis: si resina istam quam ipsi dare volunt, crassitiem habet, tunc aquæ ope Argillam inde eluunt, sive si Argilla cocta fuerit, diffringunt & frustra e cavo auferunt. Ob insignem suam elasticitatem ab Americanis ad syringes, lagenas, calceos, ocreas &c. adhibetur. Tanta ejus tenacitas est, ut frustum 12 lineas longum, $5\frac{1}{2}$ latum & $\frac{3}{4}$ crassum, in longitudinem $37\frac{1}{2}$ linearum extendi possit. Nec in Aqua, nec in Spiritu Vini solubile est, in Oleis si dissolvitur, suam elasticitatem perdit, dum autem Æthere Vitrioli dissolvitur, potest in modum Americanis usitatum modulis ex cera obduci, quæ justa crassitie adepta calore aquæ ebullientis inde eliquanda est, & ita inde possunt tubi formari ad usus Chirurgicos apprime facientes.

CENTAURIUM MINUS, *petite Centaurée, Taufendguldenblumen*. Flores rubri, infundibuliformes, quinquefidi, calycibus & extremitatibus sustentati asservantur, inodori, amarissimi. Gentiana Centaureum L. BLACKWELL Tab. 452. Per omnem Europam reperitur. *Dantur sub forma Infusi Aquosi, Vinosi, Spirituosi, Extracti Aquosi, Conservæ vel Syrupi ad roborandum Ventriculum & reserandas Obstructiones Viscerum Abdominalium*. Aquâ inde destillata nauseosum & satis evidentem odorem spirat, acri sapore linguam afficit.

CENTUMNODIA, *Sanguinalis, Renoue, Fraicasse, Weggras*. Cauliculi geniculati, teretes, scabri, instructi *Foliolis* utrinque acuminatis, glabris, integerrimis, subadstringentibus. Polygonum Aviculare L. BLACKWELL Tab. 315.

Per omnem Europam vulgare. *Adstringendi scopo olim tam extus quam intus adhibebatur.*

CEPA, *Oignon*, *Zwiebel*. *Radix* bulbosa, mox sphaeroides, mox utrinque compressa, sive alba, sive rubra, subaliquot tunicis ficcis & striatis carnem albam, quæ linguam, nares & oculos valide afficit, includens. Albæ minorem quam rubræ acrimoniam habent. *Folia* viridia sunt, fistulosa, in medio ventricosa, odorem & saporem Radicum habent, sed mitiorem. *Allium Cepa* L. Copiose in agris & hortis colitur. Aqua inde destillata olida est. *Radices & Folia in cibum non tam nutriendi, quam potius condiendi causa recipiuntur. Alba Radices scopo potissimum Pectorali Jusculis incoquantur. Cepæ sub cineribus assatæ Hypogastrio imponuntur pro pellenda Urina. Adhibentur quoque Abscessibus maturandis.*

CEPA OBLONGA, *Ciboule*, *Jacobszwiebel*. Bulbus ovali-oblongus, hinc planus, inde convexus, tunicis albis vestitus, carne alba efformatus, antecedentis odorem & saporem habet, sed mitiorem. *Allium fistulosum* L. Iisdem cum antecedente locis colitur. *Culinis duntaxat relinquitur.*

CEPA SECTILIS, *Schnittlauch*. *Folia* fistulosa, subulata, acuta, striata, odore & sapore proprio antecedentibus vicino instructa. *Allium Schœnoprasum* L. Alpibus proprium copiosissime in hortis colitur. *Ufibus cibariis inservit.*

CERA, *Cire*, *Wachs*, Substantia solida, tenax, calore liquefcens, colore citrino, & proprio odore non ingrato instructa, ab Ape Mellifica L. ex antheris florum collecta, deglutita & e corpore denuo emissa, pro exstruendis favis & claudendis cellulis adhibita. Obtinetur ex favis, melle privatis, dum cum aqua coquantur, calore liquefacta Cera aquæ supernatat; quodque a coctione de favis remanet, torculari committitur, & reliqua Cera inde exprimitur, inhærentes fordes eadem liquefacta ad fundum secedunt & cultri ope a refrigerata auferuntur. Soliditas, color citrinus & odor Ceram commendant. Durius Cerae genus, magisque rufum, plus minus fuscum, proprio nec ingrato odore instructum, ab Apibus ex corticibus variarum arborum desumptum, hæc animalcula ad Alvearium fissuras claudendas & suspendendos favos adhibent.

Propolis,

Propolis, Stopwachs, Bienenwachs dicitur Cera humectata, Solique subjecta colore & odore, privatur, majorem firmitatem acquirit & *Cera alba* appellatur. *Cera Refinarum effectus edit, nec Humores commovet, & intus quoque cum successu exhibetur. Longe plurima Unguenta & Emplastra ingreditur, eisque justam spissitudinem conciliat.* Adjectione Therebinthinæ emollita & vario pigmento tinctæ, variam *Ceram sigillatam* efformat. *Oleum inde destillatum* admodum olidum & acre est. *Laudatur contra Perniones, fissam Epidermidem &c.*

CERASA, Cerises, Kirschen. Sunt fructus variæ magnitudinis, variæ figuræ, varii coloris, parvi *Merises, Waldkirschen*: cordiformes, lateribus compressis, *Bigarraux, Herzkirschen* dicuntur, ad basin concavi, in apice obtuso-rotundati, pulpam plus minusve firmam, varie coloratam, sive dulcem, sive acidam, rarissime amaricantem præbent. *Officulum* includunt magis aut minus rotundum, glabrum, in quo hæret *Nucleus* albus, ovatus, acutus, dulcis. *Prunus Cerasus* L. BLACKWELL Tab. 449. In omni Europa vulgaris; plurimæ varietates in hortis coluntur. Fructus plerarumque varietatum mensis imponuntur. *Officinæ Cerasa austera* L. *Amarellen* recipiunt, in vicis nostratibus copiosa. *Eadem Refrigerandi causa vel exsiccata cum aqua coquantur, vel sub forma Gelati aut Syrupi exhibentur; ex his Cerasis Fermentationis & Destillationis ope paratur Spiritus gratissimus Kirschenwasser.* *Aqua Nucleis abstracta* grate sapit & olet. *Nucleis vires Diureticiæ adscribuntur.*

CERASUS RACEMOSA, Cerisier à grappe, Elfenbaum. *Fructus* vix Piso majores, glabri, nigri, ad basin quam minime excavati, pulpa pauca, nigro-fusca, saporis aciduli, subadstringentis. *Prunus Padus* L. Passim in Europa crescit. In tanta gratorum Cerasorum quantitate vix in usum recipitur. *Lignum* suaveolens tornatorum in usum migrat.

CERASORUM GUMMI. Est Gummi ex variis nostratibus *Pruni* speciebus exsudans, in massas variæ magnitudinis concretum, plus minus fuscum, insipidum, inodorum; ob fordes, si quas habet, in aqua dissolvitur, per linteum dejicitur, & de novo inspissatur. *Gummi Arabici vires habet, sed debiliores.*

CEREFOLIUM, *Cerfeuil*, *Kærbelkraut*. *Folia* læte viridia, duplicato-pinnata, pinnis parvis integris & incisus, exigua spinula terminatis, nervis hinc inde pubescentibus, sustentata petiolis convexo-planis, fulco notatis, odoris & saporis proprii, grati & aromatici. *Scandix Cerefolium* L. BLACKWELL Tab. 236. Planta annua Europæ Australis propria ubique colitur & sponte dispersis Seminibus perpetuatur, nec hyeme læditur. Oleum destillatum fundere dicitur. Succus inspissatus, evidenter salinus, non levem odoris jacturam facit. *Ad omnis generis Obstructiones referandas, Humores spissos attenuandos, Tussis pertinaces, vitia Cutanea sananda, sive Jusculis incoctum, sive Succus inde expressus exhibetur; Succu inspissati Uncia una de die dari solet; Extus cum successu Tumoribus induratis, partibus Sugillatis imponitur; Aqua inde abstracta efficax, Oleum coctum iners est.*

CEREVISIA, *Bierre*, *Bier*. Est liquor vinosus ex Infuso Granorum Cerealiū, germinascere coactorum, quæ *Maltæ* nomine veniunt, decoctione & subsequente fermentatione vinosa confectus; consistentia, colore, sapore, vi inebriandi pro varietate Cerealis unde paratur, exsiccationis *Maltæ*, modi fermentationis, reliquorum præterea additamentorum multum variat. Omnis *Cerevisia* Aquam, Alcohol, partes gummosas & resinosas continet. *Diluendi, Roborandi, Urinam pellendi ergo a Medicis præscribitur, ita tamen, ut Cerevisiam tenuem saturatam nunquam non præferant.*

CERVUS, *Cerf*, *Hirsch*. *Cervus Elaphus* L. Quadrupes copiose per Asiam & Europam occurrit; *Hinnuli, Faon, Hirschkalb* aliquot mensibus non majoris, & anniculi *Subulonis, Daguet, Spieshirsch*, Caro in cibum recipitur. *Cornua* bina basi *Mercin, Geweih* unita, corpore *Perche, Stange* formantur, cujus amplitudo progrediendo crescit & varios ramos *Andouillers, Ende* emittit, quorum basis tumida *Meule, Rose* dicitur; nigricantia sunt, tuberculis, *Pierrures, Perlures, Perlen* obsessa. Radula comminuta moleculas referunt ex albo nigricantes. *Cornu Cervi Raspatum, sive Rasura Cornu Cervi*, interdum etiam rejecto cortice nigricante, quæ huic subest portio

alba in tenuia secamina alba tornari solet *Cornu Cervi Tornatum*, quod cum parte medullari careat, antecedente minus ad scopos medicatos aptum est. *Decoctis Demulcentibus adjicitur, sed diurnam coctionem requirit, Gelatina, cujus siccae $\frac{1}{2}$ circiter largitur, inde parata Jusculis Hediorum & Febre lenta laborantium adjicitur; eadem ad siccitatem usque evaporatur Gelatina Cornu Cervi sicca, ad Pulveres demulcentes recipitur. Typhi, Crües, Kolben.* Cornua tennella, cylindroidea, apice crasso, rotundato instructa, sub cute cralliore, extus tomento & pilis obfessa, substantiam osseam, sanguinolentam, spongiosam includunt; *Nutriminum minus bonum largiuntur.* Aqua inde abstracta iners est. *Medulla* linimenti consistentiam habet, sanguinolenta, præ aliis pinguedinibus vix aliquid proprii habere videtur. *Os de Corde Cervi* planum, album, figura sua irregulare, insipidum est, portio Cordis ad ortum utriusque orificii arteriosi indurata, omnino iners. *Sebum* solidum & album ad fines medicatos relatum ab aliis sebis non differre videtur.

CERUSSA, *Blanc de Plomb, Bleyweis.* Est Plumbum, vapore Aceti in calcem albam versum, sapore adstringens, sub forma tam lamellarum friabilium *Schieferweis* quæ est sincerissima, quam panum conoideorum charta involutorum, prostat; hæc vel *Veneta* vel *Belgica* dicitur, posterior in majores panes coacta, majore terræ inertis copia adulterata est. *Ad Exsiccandum Impetigini, Erysipelati autem Discutiendi ergo inspergitur. Creberrime sub forma Emplastri aut Unguenti adhibetur.*

CETERACH, *Milzkraut.* Folia parva, pinnatifida, pinnis ovatis, obtusis, integris, alternis, confluentibus, tota pagina inferior, maculis ferrugineis obfessa est, insipida, inodora. *Asplenium Ceterach* L. **BLACKWELL** Tab. 216. Europæ Meridionalis civis. *Leniter Adstringit, ejus Infusio aquosa multum ad pellendum Sabulum laudatur.*

CETI, *Baleine, Wallfisch.* **SPERMA**, *Blanc de Baleine, Wallrath.* Substantia alba, pinguis, proprio odore & sapore instructa, e lamellis siccis & splendentibus composita, est Pinguedo in propriis Encephali variorum Ceti generum receptaculis hærens, quæ sive inde defumta, sive ex animalibus putredine resolutis effluxa, frigore deinde in floccos albos densata

Marique innatans collecta, lotionē a sanguine, expressionē per torcular, & Alkali ope a peregrino, quod ipsi adhæret, Oleo purgatur, in frustra difsecatur, Sole & Aëre exsiccat. Sperma Ceti, quod vel levissimum flavedinis sive rancoris vestigium habet, rejiciendum est. Veram pinguedinem cum Alkali Saponem quoque efformare, recentissima experimenta docuerunt. *Vires Demulcentes & Antispasmodicas edit. Datur cum aliquo sapone junctum ad Drachmam unam pro dosi sub forma sive Pulveris sive Linctus; extus Unguentis sive Emplastris ad Fissuras labiorum sanandas aut Lac in Mammis stagnans diluendum admiscetur.*

CHAMÆDRYS, *Germandrée, Gamänderlein.* Folia parva, ovata, inciso-crenata, nitida, brevibus petiolis instructa, inodora, amara. *Teucrium Chamædrys* L. BLACKWELL Tab. 80. Obtinet in Europa temperata & in Oriente. *A vi Resolvente & Aperiente laudatur; Arthriticis maxime commendatur & Febre Intermittente laborantibus. Recipitur ad Infusa.* Extractum cum aqua parandum est.

CHAMÆPITYS, *Ivette, Schlagkrautlein.* Folia hirsuta, oblonga, trifida, odore levissimo, sapore amaro & subaromatico instructa. *Teucrium Chamæpitys* L. BLACKWELL Tab. 528. In iisdem ac præcedens locis, in Asia præterea Africa & America crescit, *ad similes quoque usus adhibetur.*

CHAMOMILLA ROMANA, *Camomille Romaine, Rœmische Camillen.* Flores compositi, calice hæmisphærico, imbricato, tomentoso comprehensi, radiati, ligulatis radiorum floribus albis, linearibus; discus efformatur tubulosis floribus flavis, quinquefidis, paleis distinctis, odorem proprium, non ingratum spirantibus, sapore amaricante, leviter aromatico, linguam afficientibus. *Anthemis nobilis* L. BLACKWELL Tab. 526. Passim crescit in Europa. In Germania Varietas floribus plenis recipitur, quæ vero quo minus odorata & sapida, eo minus etiam efficax est. Cl. BAUMÉ inde Olei cœrulei (michi flavum exhibuerunt) $\frac{1}{4395}$ obtinuit. *Viribus cum sequente equipollens ad internos potissimum usus adhibetur.*

CHAMOMILLA VULGARIS, *Camomille, Camillen.* Flores ab antecedentibus, non nisi disco conoideo, radio de-

flexo, receptaculo nudo, odore minus grato differunt. *Matricaria Chamomilla* L. BLACKWELL Tab. 298. Copiosa per omnem Europam. Olei pulcherrime cærulei $\frac{1}{2000}$ largiuntur. *Ad præcipua Antispasmodica referuntur, intus cum aqua Infusi sive in Pulverem redacti exhibentur. Extus Discutiendi insuper stopo ad Epithemata, Cataplasmata, Balnea, Clysmata recipiuntur. Oleum destillatum ad paucas Guttas intus datur. Oleum coctum Abdomini illinitur, ad Clysmata recipitur; consultius duxerim illud Infusionis ope parare. Utraque Chamomilla Flores COTULÆ FÆTIDÆ, quos Anthemis Cotula L. largitur, ex officinis excludit, nonnisi a Pharmacopœis ignaris interdum Chamomillæ Vulgari substitui solitos.*

CHEIRI, *Girofflé, gelbe Violen oder Nægelein. Flores* petala ex calice exemta, obovata, obtusa, lutea, quæ gratum, quem recentes spargunt odorem exsiccata amittunt, sapore amaricante nonnihil etiam salino instructi sunt. *Cheiranthus Cheiri* L. BLACKWELL Tab. 179. Europæ Australis proprius, apud nos omnino perennat, nec hyeme læditur. *Ob virtutem suam Emenagogam partim ad Infusa Aquosa recipiebantur, partim Succus eorum expressus exhibebatur.*

CHELIDONIUM MAJUS, *Chelidoine, Schœllkraut. Radix* fibrosa, recens tota crocea, succum etiam croceum fundit, exsiccata vero fusca est, saporis acris, odoris nauseosi, medulla grysea, inodora, sapore minime fortis. *Folia* pinnata, pinnis in aliquot lobos ovatos, obtusos discedentibus, supra glauca, infra hirsuta, recentia minus grate olent, succo croceo acriusculoscatent. *Chelidonium majus* L. BLACKWELL Tab. 91. Per omnem Europam vulgare. *Aperiendi scopo Radix recens ad Juscula recipitur, exsiccatæ Pulvis ad Drachmam unam pro dosi datur; eundem in finem Succum ex Foliis expressum ad aliquot Drachmas aliquoties de die propinant.*

CHELIDONIUM MINUS, *petite Eclair, Feigwartzwurz- zel. Radix* ex bulbulis cylindroideis, extus gryseis, intus albis, acriusculis efformata. *Folia* longis petiolis sustentata, reniformia, glaberrima, dentata, levi Nassurtino sapore linguam afficientia. *Ranunculus Ficaria* L. BLACKWELL Tab. 51.

Vulgaris per Europam. *Radices recentes Vesicantem virtutem habere dicuntur. Folia recentia ad Juscula Aperientia recipiuntur; cum Axungia frixa Hæmorrhoidibus applicantur.*

CHERMES GRANA. *Folliculi pisorum magnitudinis, rotundi, unde portio inferior refeſta fuiſſe videtur, ex rubro fulci, ſplendentes, intus grana minima, ſive ſanguinei, ſive flavſcentis coloris, pulverem referentia continent, ſapore amaricante & leviter flavſcente, odore tenui non ingrato imbuti; ſunt exuviæ femellarum Cocci Illicis L. in Quercu Coccigera L. BLACKWELL Tab. 186. Europæ Meridionalis & Archipelagi indigena, apud nos in frigidario contra hyemem defendenda, habitantis, ſuper ſua ova exſiccatarum, Aceto conſperſæ, ne ova, a quibus pigmentum inde parandum pendet, excludantur; Roborandi & leviter Adſtringendi ergo ad Semidrachmam ſub forma Pulveris exhibentur; ſed majoris omnino efficaciæ eſt Succus, qui ex Folliculis recentibus in Aquitania expreſſus, addita pari Sacchari quantitate a corruptione deſenſus, ſub nomine Succi Chermes per orbem divenditur, pulcherrimo colore purpureo nitens, admodum ſuavi odore æque ac ſapore præditus. Ad Unciam ſemis ſive ſeorſum ſive Julapiis, Electuariis &c. admixtus exhibetur.*

CHINÆ CORTEX, *Cortex Peruvianus, Quinquina.* Fruſta ad dimidium vel ultra etiam convoluta, vix digiti longitudinem excedentia, extus ſcabra, bruneo-fulca, intus ferruginea, ſæpe Lichene obſeſſa, odore proprio aromatico, cui aliquid mucidi accedit, ſapore aromatico, amaricante, leviffime ſubadſtringente. *Cinchona officinalis L.* Arbor procerâ, in regni Peruviani præfecturæ Quito montibus copioſa, tractum ultra 50 milliaria extenſum occupans. Cortices inde a Septembri ad Novembrem uſque menſem deglubuntur in libero aëre, ſæpius agitati, exſiccandi. Rejiciendi ſunt Cortices multum amari, aliquid ſtyptici aut viſcidi, linguæ imprimentes, integram lineam craſſi, læves, non convoluti, & ſi franguntur filamentofi. Remediũ *COMITI CINCHON* detectum, primum *CARDINALI DE LUGOS* miſſum, dein a *JESUITIS* medio ſæculi ſuperioris diſpenſatum, inde quoque denominatur. Extra-

Æti aquosi $\frac{3}{8}$, Resinosi $\frac{1}{5}$ inde obtinui. *Princeps remedium contra morbos Periodicos, Gangrænâ, Putredinem, Obstructiones Viscerum, Spinam ventosam. Datur sub forma Pulveris quam subtilissimi.* Sunt qui contendunt, Pulverem ad priores pistilli ictus surgentem minus efficacem esse, sed oculus sane minimam modo differentiam inter portionem pulveris, quæ prima surgit & eam sequentes detegit, nec pulverem a Magnete trahi observare potui. *Dosis est ad Drachmam semis; exhibetur porro Aqua aut Vino Infusus, nec non ejus Decoctum vel Extractum, Pulvis etiam, ope aquæ in Cataplasma redactus, Ventriculoque impositus, quo scopo, duæ Unciæ Infantibus, quinque autem adultis tribui solent; quin & Balneis admixtus, receptusve in Clysmata, salubritatem suam probavit. Nutricibus exhibitus lactantes curat.*

CHINÆ RADIX. Geniculata, nodosa, multis tuberculis obfessa, ponderosa, insipida, inodora, sub cuticula ex bruno rufescente, medullam includit albam, nonnihil etiam rufam, solidiusculam. Rejicimus Radices leviores, quæque rariorem aut spongiosam medullam habent, nec non illas, quæ ex America trajiciuntur, sive nigricantes, sive evidentius rufas; Smilax China L. BLACKWELL Tab. 433. Chinæ, Japoniæ, Persiæ indigena. Aqua cum Radice cocta rubra evadit. *Decoctum ad varii generis Acimoniam Humorum corrigendam adhibetur.*

CHRYSOLITHUS. Veteribus Topasium hoc nomine venisse contenditur. Hodie ita appellatur Gemma ceteris omnibus mollior, ex viridi subflava, in igne colorem amittens, & in vitrum abiens. Borax Gemma nobilis Viridis Chrysolithus L. In India Occidentali, Bohemia, Silesia deprehenditur. *Usus ejus in Medicina evuluit.*

CICERA, Pois Chiches, Kickererbsen. Semina rotunda, Pisum majora, rufa, inferne in acumen producta, hinc inde levissime compressa, sub cortice rufo-fusco absconditam medullam flavicantem, insipidam continent. Cicer Arietinum L. BLACKWELL Tab. 557. Planta annua, Europæ Meridionalis & Syriæ indigena, apud nos in hortis colitur. In regionibus calidioribus, eoque culturæ Pisorum minus amicis, id genus copiose

colitur & in ciborum numero habetur. *Ad Decocta Diuretica recipiuntur. Farina eorum extus ad Epithemata & Cataplasmata Resolyentia & Abstergentia adhibetur.*

CICHORIUM, *Chicorée, Wegweis.* Radices fusiformes, sub cuticula levissime fusca, una cum carne dulci medullam albam & amaram abscondunt. *Folia* petiolis latis sustentata, ex fine angusto dilatantur, laciniis latis progrediendo crescentibus dentata, viridia, utrinque aliquantulum hirsuta, amara. *Cichorium Intybus* L. BLACKWELL Tab. 177. & 183. Vulgaris per Europam planta; quæ in hortis colitur per omnes partes major, foliorum etiam laciniæ minus profundæ evadunt, & non raro purpuram æque ac radix admittunt. *Folia* plantæ in hortis cultæ, terra obruuntur, ut alba fiant & amaritiam deponant, quo factò in *Acetaria* recipiuntur. *Radices & Folia* Humores resolyunt, unde *Aperientes & Refrigerantes* ipsis adscribuntur vires; illarum frequentior, quam horum usus est. *Recentes vel Jusculis* adji-ciuntur, vel *Saccharo* condiuntur; *exsiccatae ad Decocta* recipiuntur, *Extractum earum aquosum* efficax est.

CICUTA, *Ciguë, Schierling.* *Folia* triplicato-pinnata; glabra, saturate viridia, odore foetido, sapore leni instructa. *Conium maculatum* L. BLACKWELL Tab. 451. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Destillata per se planta Spiritum Ammoniacalem fundit. Succus in formam Extracti inspissatus $\frac{7}{8}$ perdit, foetidus est, falsus, nauseosus, humiditatem ex Aëre attrahit, quocirca ad servandam ejus justam consistentiam herba in pulverem redacta temperandus est. *Folia* largiore quantitate comesta Veneni Narcotici effectus edidisse Observatores docent; *Succum inspissatum, qui sub Extracti nomine asservatur, validissimum medicamentum Resolvens esse & desperatissimos morbos curare maximi Viri experti testantur. A medicationis initio quatuor aut sex Grana Extracti bis de die dantur, augetur inde sensim dosis; ad Unciam usque unam unius diei dosin citra ullum incommodum auctam fuisse, relatum lego; dantur quoque Folia sub forma Infusi aquosi. Eadem extus, sub forma Cataplasmatum, cum successu Partibus Induratis imponuntur.*

CICUTA AQUATICA, *Wasserschierling.* Radix magna, crassa,

crassa, flavescens vel virescens, geniculis, quibus intus prominentes circuli respondent, distincta, odore vel sapore Apio propinqua. *Folia* magna, bipinnata pinnis linearibus, ferratis, glabris, minus quam *Radix* odora, sapore etiam inferiora. *Cicuta virofa* L. BLACKWELL Tab. 574. a b c. Crescit passim per Europam. *Præcedente virulentiorē esse asserunt Observatores; exsiccatione fere effortam reddi perhibent.* Non inepte pro Emplastro de *Cicuta* hæc recipi jubetur: *Succum in modum antecedentis ad Drachmas tres usque datum, & Decocti saturati largam quantitatem absque ullo sive bono sive malo effectu fuisse ingestam, a magni nominis Observatore notatum lego.*

CINA, *Santonicum, Semence Contra, Wurmsaamen.* Semina, quæ ex Orientalibus regionibus advehuntur, oblonga, exigua, plus minus flava, intermixtis stipitibus immunda, sapore amaro & nonnihil acri, odore proprio, forti, nauseoso imbuta. Ex *Aleppo* allata optima sunt, hæc excipiunt *Orientalia*, quæ rursus *Indica* post se relinquunt, quibus exigui flosculi non aperti intermixti esse videntur, *Barbara* seu *Africana*, ex cauliculis maxime efformata, sunt vilissima. *Artemisia Contra* L. Persiæ ac Mogolis regno propria. *Vermibus potissimum infesta feruntur. Datur sub forma Pulveris; nauseosi medicamenti vix ultra Scrupulum unum ægroti deglutire solent, quapropter hæc dosis aliquoties de die est repetenda; Infantibus sub forma CONFECTIIONIS SICCÆ exhibetur.*

CINERES CLAVELLATI, *Cendres gravellées, Potasse, Potasche.* Sal in massas variæ magnitudinis inspissatus, ex albo ac cœruleo bicolor, odoris expers, saporis lixiviosi, in Aëre diffuens & si quidem purus est, omnibus Alkali vegetabilis qualitatibus præditus. Paratur ex cineribus arborum maxime atque fruticum, ex quibus aquæ ope extrahitur; aqua eo imprægnata, *Lixivium* dicta, evaporatur ad ficitatem; Sal hac ratione obtentus in fornace reverberatoria calcinatur, neque prius inde, quam penitus ignitus fuerit, desumitur. Cineres clavellati nunquam non Tartaro Vitriolato, Sale communi, sordibus etiam polluti sunt, ab his solutione in aqua frigi-

da purgantur; qui Salem communem habent ad usus Chemicos saltem inepti sunt. *Cineres Clavellati depurati omnes Alkali fixi vegetabilis vires habent.*

CINNABARIS, *Minium Veterum*. Est minera pulcherri-
mo rubro colore splendens, ponderosa, variæ magnitudinis
massas efformans. Hydrargyrum Cinnabaris L. In Pa-
latinatu, Hungaria, Idria, Japonia &c. ex montibus effodi-
tur. Rarissime ad usus medicatos, nec nisi a sordibus, quæ
ipsi fere adhærent, sublimatione purgata recipitur. *Cinnaba-
ris factitia*, cum multo minoris veneat, neque tamen viribus
inferior sit, comode substituitur.

CINNAMOMUM, *Canelle, Zimmet*. *Cortices* convolu-
ti, prælongi, teneri, ex variis laminis tenera charta non cra-
ffioribus constantes, glaberrimi, odore proprio, fragrantissimo,
sapore aromatico, linguam feriente, quadantenus dulci instru-
cti. *Laurus Cinnamomum* L. BLACKWELL Tab. 354.
In Zeylona crescit; Cortex ejus intermedius nostrum aroma
constituit. Eadem arbor in Martinica crescens exhibet Cortices a
Zeilonicis minore longitudine, crassitie majore linea tamen mi-
nore, superficie rugosa, sapore acriore, odore paulo minus
fragrante differentes, quibus nomen *Cinnamomi Indici* dede-
runt. Prostant præterea ab aliquot retro lustris germina fusca,
colore Caryophyllorum aromaticorum profundiore tincta, pe-
dunculo concolori, oblongo, sensim crassiori, gracili, striato
infidentia, rotunda, calice sexfido, laciniis striatis ad germen
adeo reflexis, ut ejus nonnisi apex brevissimo stylo infessus
prostat, odore perfusa & sapore ad Cinnamomum Zeylonicum
accedente, utroque vero paulo remissiore; dicuntur improprie
Flores Cassiæ, nec non *Clavelli Canellæ* ab exactissima figuræ
cum claviculis capitulo rotundatis similitudine, *Grains du Ca-
nellier*. Interdum quoque occurrunt *Nuces Cinnamomi*, fructus
Olivæformes ad Baccas Lauri accedentes, glabri, quasi lævi-
gati; sub cortice fragili, inodoro, primum dulciculo, Cinna-
momum fere resipiente, dein adstringente, nucleum abscon-
dunt superne compressum, sub cuticula ferruginea me-
dullam albissimam, inodoram & insipidam continentem.

Olei destillati exiguam modo quantitatem fundit, magna quippe ejus parte ab aqua non secedente. $\frac{1}{1520}$ inde obtentum fuisse lego: idem ex Zeylona advehitur dilute aureo colore insignitum, suavitatis, virium quoque Cinnamomi egregie confors. Claviculi Oleum fundunt Oleo Cinnamomi haud abfimile, quanquam pauxilla est, quæ inde obtinetur, portio. Aqua Cinnamomi substantiæ, unde destillavit, viribus præ reliquis id genus quibuscunque imprægnata est; Oleo prægnans omnino lacteum colorem habet. *Suavissimum Aroma Nervino & Stomachico scopo ad Infusa, Morsulos, Pulveres &c. recipitur. Elæo-saccharum frequenti in usu est. Oleum Mixturis contractis immiscetur. Dentibus quoque cariosis Gossypio instillatum immittitur.*

CITREUM MALUM, *Medicum Malum, Limon, Citron.* Pomum ovato-oblongum, variæ magnitudinis, variæ figuræ, creberrime superne in papillam eductum, inferne calice notatum, rugosum, sub *Cortice* extus flavo, fragrante, aromatico, levissime amaro, intus coriaceo, albo, vix sapido, qui interna substantia demta, *Flavedo* dicitur, *Pulpam* includit, in officinis *Carnem* dicunt, in plures loculos distinctam, tenuem spargentem odorem, *Succo* turgentem flavicante, varii, pro varietate fructus, saporis, *Semina* insuper continentem subflavida, ovato-gibba, striata, amara, vix odora. Ad usus autem medicatos non nisi acida recipiuntur poma. *Citrus Medica* L. BLACKWELL Tab. 361. Eadem ejus ac Aurantii patria, eadem colendi ratio est, frigoris duntaxat non perinde patiens. *Suavissimi Olei*, quod etiam *Quintam Essentiam* nominare solent, ex centum malorum Corticibus Unciam unam exprimi observatum est. In *Succo*, quem seorsum asservamus, limpido, odoro, acido, leve modo relinquitur flavedinis vestigium. *Cortices* Saccharo in condituram siccam redacti sub nomine *Citronade* per orbem divehi solent. In Corticibus *Vires* agunt *Nervinæ & Stomachicæ*. *Infusis* adjiciuntur; *conditi* seorsum comeduntur. *Electuariis, Morsulis &c. admiscetur, cibis adduntur; Pulpa* Corticibus juncta condimenti loco culinis inservit. *Refrigerandi, sitim Sedandi & Antiscorbutico scopo cum aqua decoqui-*

tur. Succus ad eosdem usus Mixturis, Julapiis &c. immisceri, vel in Rotulas aut Syrupum cogi soeuit. Oleum voluptatis gratia extus æque ac intus usurpatur.

CITRULLUS, *Anguria, Melon d'eau, Wassermelon.* Poma rotunda, non raro caput humanum amplitudine excedentia, viridia, lineis nigris mox latioribus, mox angustioribus distincta, duplici pulpa referta, exteriori altera solidiore, pallida, palato minus grata, altera interiore fere diffuente, sanguinei coloris, dulcissimi saporis, sola in cibum recipienda, odoris Cucumerini; in intima pulpa nidulantur *Semina* mediocris magnitudinis, oblongo-ovata, inferne contracta & marginata, utrinque compressa, sub cortice nigro, fragili, nucleum album, inferne acutissime terminatum, inodorum, dulciculum continentia. Cucurbita Citrullus L. BLACKWELL Tab. 157. In Oriente, Italia Meridionali sponte crescere dicitur; Semina ex Astracan missa reliquis, si planta propter fructum colitur, præferuntur; apud nos nonnisi in fimetis sub campanis adolefcunt, multoque difficiliter, quam Melones, ad justam maturitatem perveniunt. *Dulcissima pulpa ad Edulia Refrigerantia refertur; Semina inter quatuor frigida majora locum tenent.*

CLEMATIS *Liene, Flammula Jovis, Lienen.* Folia aliquot pinnarum paribus pinnata, pinnæ majusculæ, petiolatæ, ovato-oblongæ, inter masticandum acrimonia quidem, sed modice linguam afficiunt; exsiccatu omnem fere acrimoniam exuunt. Clematis Recta L. In Europa Meridionali & Orientali, nec non in Asia Septentrionali habitat, nostras hyemes patientissime fert. *Folia recentia, Cuti imposita Rubefacientes imo Vesicantes effectus edere jam a longo retro tempore experimenta docuerunt. Sanguinis Depurandi causa foliorum exsiccatum semuncia cum duodecim Libris aquæ infunditur & partitis vicibus quotidie hauritur; Pulvis Ulceribus sordidis & Carni fungosa inspersus salubritatem suam probavit expertis.*

COBALTUM. Hoc nomine minime proprio passim in Pharmacopoliis prostat Minera Arsenici arida, striata, nigra. Arsenicum porosum L. haud infrequenter in montibus

delitescens. *Ad necandas muscas inconsulto adhibetur. Ab usu omnino arcendum.*

COCCIONELLA, *Cochenille*. Infecta duas circiter lineas longa, utrinque rugosa, coloris intus punicei, extus atro-rufi, odoris vacua, saporis leniter adstringentis, nonnihil etiam nauseosi, & empyreuma respicientis. *Coccus Cacti L.* In regno Mexicano, Carolina & Georgia patriam sedem habet, ad Antequara Provinciæ Guaratæ urbem super variis *Opuntia* speciebus colitur; infecta, sive aqua ebulliente, sive calentibus laminis ferreis, enecata nobis mittuntur. Colore purpureo perfusa, qui Acido affuso exaltatur, Alkali profundior redditur, Coccionella Tinctoribus potissimum inservit, *Urinam propellere dicitur; præcipue ad infucanda medicamenta adhibetur.*

COCCOGNIDIUM nequaquam *Granum Cnidium Veterum. Semence de Laureole, Seidelbastsaamen.* Semina rotunda, Pisi magnitudinem fere æquant, in brevem apicem exeuntia; sub cortice fusco, fragili, striato, nucleum oleosum, acerrimum includunt. *Daphne Mezereum L. BLACKWELL Tab. 582.* Frutex per omnem Europam præter maxime Meridionalem obvius. *Horum Granorum dosin admodum exiguam primas Vias vehementer irritasse, imo excitata Inflammatione mortem intulisse referunt Experti; quocirca ab eorum usu abstinere cauti.*

COCCULI. Nuces subrotundæ, magnitudine Pisi majora referentes, gryfæ, rugosæ, non raro pedunculo sustentatæ, sub Cortice tenaci nucleum reniformem, amarissimum & fervido sapore linguam afficientem includunt. *Menispermum Cocculus L. BLACKWELL Tab. 389.* Frutex in India Orientali crescens. *Ad usus internos nunquam adhibentur, inescandis piscibus inserviunt, qui inde vertigine corripiti adeo, ut aquæ supernatantes manibus capi possint, dicuntur; Pulvis locis Pediculosis inspergitur.*

COCHLEARIA, *Herbe aux Cuillerées, Læffelkraut.* Folia magnis petiolis innixa, subrotunda, cordata, angulata, facie prona, leviter depressa, odorem, nisi manibus conterantur, admodum tenuem, exsiccatione una cum sapore amittunt, relicta aliquanta amaritie. Crescit ad littora Maris; in Corsica quoque obvia, apud nos in hortis culta per totum annum recens carpi

potest. Spiritus Vini quam aqua ipsi accommodatior esse, Oleumque destillatum inde obtineri dicitur. *Laudatur ad aperienda Viscera Abdominalia; Antiscorbuticorum princeps habetur. Ad varios usus medicatos partim recentia folia Jusculis infunduntur, partim Succus inde exprimitur, qui etiam ad Gingivas fricandas adhiberi solet.*

COCHLEA, *Limaçon, Schnecke*. Ex numerosa gente inter nos recipitur *Helix Pomatia* L. cujus testa subovata est, prior anfractus reliquis multo major, decolor, umbilicata, conoidea. In Europa temperata vulgaris, nimia etiam sui frequentia nostrorum hortorum pestis, mucro privata crebro in cibum recipitur. *Demulcendi ergo ex Jure coquantur Cochlearum ad decem usque cum Unciis duodecim menstrui aquosi. Testæ neque id genus neque ceteræ ullas præter Absorbentes vires habent, vel rarissime in usum trahuntur.*

CODAGAPALA, *Cropal, Profluvii Cortex, Canessi Rinde*. In tubulos, aliquot lineas crassos, convolutus adduci, niger, superficie nigra Lichene tecta, saporis amari & austeri esse dicitur. *Nerium Antidyfentericum* L. Humilis arbor in Malabar & Zeylona crescens. *A Britannis potissimum ad sistendam Diarrhæam laudabatur, a Lichene purgatus & in Pulverem redactus ad Drachmam semis dabatur aliquoties de die. Hoc medicamento, cum plura alia ad eundem scopum facientia habeamus, carere facile possumus.*

COLCHICUM, *Faule Fuden*. Radix bulbosa, subrotunda, uno latere gibba, squamis inde rejiciendis tecta, sub cuticula flava carnem albam includit, odore minus grato nares, & si verno tempore effoditur sapore acri quidem, sed nec rodente, nec inflammante linguam afficit. *Colchicum Autumnale* L. BLACKWELL Tab. 566. Crescit in Europa temperata. *Ventriculi justo vehementius irritamentum esse, imo lethales inde effectus excitatos fuisse Observatores docent. Hodie scopo Diuretico Oxymelli immiscetur.*

COLOCYNTHIS, *Coloquint*. Pulpa cortice nudata, varix magnitudinis, subrotunda, sicca, candida, fungosa, levis, sex loculis distincta, *Semina* concludens ovata, com-

pressa, flavicantia, modice amara, saporem habet amarissimum, acrem, odorem nauseosum. Cucumis Colocynthis L. BLACKWELL Tab. 441. In Archipelago & Oriente crescit; apud nos instar Citrullorum colenda; copiosa mucilagine turget. *Pertinet ad validiora Draastica, gravissima Tormina inde excitata, imo ipsum Sanguinem ex vasis Intestinalibus extortum fuisse, memoriae proditum est. Hanc virulentiam Veteres ope Mucilaginis Tragacanthæ corrigere tentarunt & TROCHISCOS inde, ALHANDAL nominatos, formarunt; sed hæc corrigendi ratio, cum effectu fere prorsus fraudarit Observatores, hodie transit hoc nomen ad Pulpam in tennerrimum pulverem redactam. Pulpa hoc modo parata interne sola datur, sed ad pauca modo Grana Pilulis stimuli loco adjicitur. Semina aqua probe lota Emulsionem præbere, nec amaram, nec purgantem lego. Pulpa scopo Anthelmintico Umbilico imponitur; ad tres Drachmas usque Clysmatibus irritantibus adjicitur. Extractum aquosum Pulpa multo mitius esse, ejusque ad Grana sex usque dosin augeri posse, resinosum vero valde torminosum esse, asseritur.*

COLOMBO RADIX. Taleolæ pollicares, irregulariter rotundæ sive longitudinaliter sectæ, sub cortice rugoso & bruneo medullam flavicantem, levissime striatam, laxiusculam concludunt, odoris fere expertes, gustu amaræ; recenter allatas Cuminum redolere lego. Ex urbe Colombo Insulæ Zeylon advehitur. *Laudatur a vi Antiseptica, & Roborandi ergo in Cholera, Vomitu, Diarrhæa, Dysenteria ad Drachmam unam singulis trihoriiis exhibetur.*

COLOPHONIUM, *Resina nigra, Bray sec, Geigenharz.* Resina solida, splendens, fusco-rufescens, fragilis, fractura plana, nitente, vix odora, insipida. Est residuum a *Terebinthina* destillationi per se subjecta. *In modum Resinæ Vulgaris in Emplastra recipitur, Suffitus ejus Prolapsibus medetur.*

COLUBRINUM LIGNUM, *Bois Couleuvrée, Schlangenholtz.* Frusta dimidium circiter pedem crassa, solida, ponderosa, alba, quadantenus etiam lutescentia, cortice tecta castaneo, rugoso, tuberculis aspero, inodora, intense amara. *Strychnos Colubrina* L. BLACKWELL Tab. 403. Crescit in India. *Sunt, qui inde effectus Narcoticos surrexisse dicant, alii contra Febres & Vermes laudant. Anceps medicamentum merito exsolevit.*

CONCHÆ, *Coquilles, Muscheln*. Sunt domunculæ Testaceorum, quæ aqua penitus ablutæ ad usus medicatos adhibentur, saporis & odoris expertes, Calcarei qualitatibus instructæ; ex omni Vermium testaceorum genere desumi possunt. Apud nos vulgo a Mya Pictorum L. copiosissime fluviis in habitante desumuntur. *Earum Pulvis quippe a CROLLIO tanquam specificum ad Febres intermittentes enixe commendatus, SPECIFICUM ANTIFEBRILE CROLLII cognominatur. Præter Absorbentes nullas vires habent.*

CONSOLIDA MAJOR videatur SYMPHYTUM.

CONSOLIDA MEDIA videatur BUGULA.

CONSOLIDA MINOR videatur BRUNELLA.

CONSOLIDA REGALIS, *Calcatrippa, Pied d'Alouette, Ritterspærlein*. Corolla pentapetala, irregularis, patens, acuta, nectario antice bifido, hispido, in calcar educto instructa, inodora, amara. Delphinium Consolida L. BLACKWELL Tab. 29. *Præter vires cum omnibus amaris communes, nullas proprias habet.*

CONSOLIDA SARACENICA, *Verge d'or, Heidnisch Wundkraut*. Folia ex ovatis oblonga, argute ferrata, acute terminata, leviter aspera, pallidius viridia, gustu leviter adstringentia, nonnihil amara. Solidago Virgaurea L. Ubique in Europa crescit. *Tam intus, quam extus Traumatico scopo assumitur; Infusum ejus vires Antinephriticas edere animadversum est.*

CONTRAJERVA. Est Radix fibrosa, plurimis fibrillis instructa, rugosa, extus fusca, intus pallida, tenui odore, sapore subadstringente, levissime aromatico instructa. Dorstenia Contrajerva L. BLACKWELL Tab. 578. seq. In America Australi crescit. Spiritus Vini magis quam Aqua ad ejus vires recipiendas idoneus est. *Contra morbos Malignos olim magnopere commendabatur.*

CONYZA CÆRULEA, *Blau Dürrewurz, Berufkraut*. Folia lanceolata, hirsuta, integerrima, utrinque villosa, acriscula, inodora. Erigeron Acre L. Passim per Europam invenitur. *Olim in Germania maxime Incidendi scopo ad Infusa Pectoralia recipiebatur.*

CONYZA

CONYZA MEDIA, *Dürrwurzel*. Folia sagittata, cordato-ovata, levissime ferrata, rugosa, tomentosa, levi odore, sapore acrisculo instructa. Inula Dysenterica L. Passim per Europam obvia. Inepte olim Arnicæ substituta, interdum contra Dysenteriam datur.

CONYZA VULGARIS, *Grosse Dürrwurzel*. Folia majora, ovato-lanceolata, paulum acuta, hirsuta, utrinque tomentosa, levissime ferrata, non admodum odora, gustu subaromatica. Conyza squarrosa L. Vulgaris Europæ planta. Ob virtutem Emenagogam a quibusdam laudatur.

COPAIBA BALSAMUM. Limpidissimum est, spissitudinem habet inter Terebinthinam & Olea unguinosa mediam, colorem pallide citrinum, odorem proprium non prorsus ingratum, saporem amarum punctim acutum & linguæ diu inhaerentem. Copaivera L. Brasiliæ, Cajennæ, Carthagenæ civis, ex truncò arboris fauciato Balsamum effluit. Olei odorati non colorati $\frac{1}{5}$ inde obtinui. Circa medicamento hujus, quippe multum calidi usum internum cautissime versandum est. Abstergendi & Consolidandi causa ad Guttas decem in vehiculo saponaceo datur. Solutio ejus in Spiritu Vini Tartarificato sub titulo TINCTURÆ BALSAMI PERUVIANI ALBI prostat; multum exæstuantis medicamentum.

COPAL GUMMI. Frustra variæ magnitudinis, pugnum interdum æquant, pallide lutea, pellucida, dura, inodora, insipida. Color dilutius citrinus, durities, pelluciditas, indissolubilitas in Spiritu Vini sunt indicia bonitatis. Ex regno Mexicano advehitur, origo ejus adhucdum ignoratur. Igne funditur, fufumque Oleis dissolvitur unguinosis, quibus alias nullæ sunt in ipsum vires. Oleis Rorismarini, Lavendulæ, Benzoes, Balsamo Copaibæ, Terebinthinæ dissolvi dicitur, nec non Alchhole, siquidem cum Camphora fuerit tritum. Dissolvitur Alchhole, quod sub digestionem Tincturæ Tartari destillat. Unice ad Vernices adhibetur.

CORALLIA ALBA, *Corailles blancs, weisse Corallen*. Fragmenta prostant in officinis parva, lapidea, subinde ramosa, copiosissimis foraminibus, stellæ figuram referentibus ex-

sculpta, alba, insipida, inodora. Madrepora Oculata L. BLACKWELL Tab. 342. & 343. Magna ejus copia colligitur in Oceano Indico. *Vires præter Absorbentes nullas habet.*

CORALLIA RUBRA, *Corailles rouges, rothe Corallen.* In officinas recipiuntur fragmenta exigua, gracilia, lapidea, creberrime ramosa, integerrima, rubra, odoris æque ac saporis vacua. Isis nobilis L. Maris Mediterranei propria. *Vires cum præcedentibus pares, Roborantes nullas habet.*

CORALLINA, *Mouffe marine, Corallen oder Meermoos.* Fragmenta articulata articulis ovato-subcuneiformibus, pinnatis, duriuscula, friabilia, odore nauseoso, marino; sapore salino instructa. Corallina officinalis L. In Mari Anglico & Mediterraneo obtinetur. *Pulveribus Anthelminticis ad-jicitur.*

CORIANDRUM, *Coriander.* Semina rotunda, umbilicata, striata, cava, flavicantia; recentia Cimices redolent, efficcata proprium & gratum odorem spirant, sapor etiam gratus est & aromaticus. Coriandrum Sativum L. BLACKWELL Tab. 176. Italiae & Palestinæ indigenum, apud nos in agris colitur. Olei destillati $\frac{1}{477}$ fundere dicitur. Ad eliciendas ejus vires Spiritus Vini aptior quam aqua est. *Formidine mali liberimum, cum successu scopo Carminativo usurpatur.*

CORNA, *Cornouilles, Cornel oder welsche Kirschen.* Fructus umbilicati, figura Olivas referentes, magnitudine Cerasa, rubri, sub tenui cuticula carnem continent dulcem, paululum etiam adstringentem, in qua reconditum durissimum officulum, drupam fere æquat, duosque nucleos exiguos concludit. Cornus Mas L. BLACKWELL Tab. 121. Copiosa arbor in Europa temperata. *Vires ei fructibus horæis communes sunt, aliquatenus etiam Adstringentes. Rob inde paratum proflare solet.*

CORONOPUS, *Corne de Cerf, Kræhensfus.* Folia nervolato crenata, pinnatifida, pinnis cuneiformibus, progrediendo majoribus, jam integris, jam incis, gustu acriuscula. Cochlearia Coronopus L. BLACKWELL Tab. 120. Europæ haud infrequens planta. Huic potius, quam insipidæ *Plantaginis* speciei *Vires Diuretica* adscribenda sunt.

COSTUS. Radicis Cortex aliquot pollices longus, interdum etiam sesquipedalis, dimidium circiter pollicem crassus, extus flavicans, medulla laxa profundius tincta fartus, convolutus, Violas redolens, sapore evidenter amarus & acer. Costus Arabicus L. BLACKWELL Tab. 394. Crescit in utraque India. *Stomachicis, Becchicis, Diureticis adscribitur. Infusum Spirituosum aquoso efficacius est.* Costi in amarum & dulcem distinctio nulla est.

CRANIUM HUMANUM. Medicamentum nonnisi animalibus fabulis & absurdissima superstitione nixum, jure eviluit. Asservabantur hoc nomine Ossa Parietalia.

CRASSULA, Telephium, Orpin, Reprise, fette Henne. Folia sessilia, ovata, obtusa, plana, crassa, dentata, glaucoviridia, subdulcia. Sedum Telephium album L. Passim in Europa occurrit. *Succus inde expressus Refrigerandi & Demulcendi scopo ad aliquot Uncias pro dosi datur.*

CRETA, Craie, Kreide. Massæ variæ magnitudinis, partim molliores, partim duriores, siticulosæ, cum Acidis effervescentes, digitos maculantes, ad ducendas lineas aptæ, igne in calcem abeuntes. Calx Creta L. Maximam ejus copiam Europa suppeditat, sive per strata collocatam, sive dispersam. *Ad Absorbendum intus valet; ad Exsiccandum extus Impetigini inspergitur.*

CREPITUS LUPI videatur **BOVISTA.**

CRITHMUM, Bacile, Fenouil de Mer, Meerfenchel. Folia, pinnis pinnata integris, trifidis, oblongis, crassiusculis, subacria. Crithmum maritimum L. Ad Maris littora crescit, apud nos in frigidario ab injuria hyemis defenditur. *Ad excitandam esuriem sub forma Acetarii comeditur; propter vires etiam Aperientes celebratur.*

CROCUS, Saffran. Stigmata fulva, filiformia, inferne angustata, odore proprio, forti, Cerebrum gravante, sapore aromatico, amaro instructa, aliquantum etiam tenacia. Rejiuntur, quæ digitos pressa non polluant, levem admodum aut peregrinum odorem spirant, quæque filamentis albis aut luteis intermixtis distincta sunt. Crocus fativus officinalis L. Crescit in Europa calida, nostræ hyemis patienti-

tissima. Passim per Europam colitur. Optimus est ab *Oriente* five *Austria* denominatus, cui tamen *Vastiniensis* nequiquam cedit; *Maglianensis* in Pulverem redactus præ reliquis uberius tingit. Olei destillati paucillum fundere dicitur. *Humores valide attenuat, ad remedia Becchica & Emenagoga recipitur; Putredini resistit. largius sumtus Affectus soporosos excitat. Datur ad Grana decem sub forma Pulveris in quem ut possit conteri, clibano prius exsiccandus est. Extus Resolvendi & Sopiendi causa ad Cataplasmata, Epithemata &c. recipitur. Miror de medicamento parva dosi efficaci Extractum parari.*

CRUCIATA, *Croisette, gelb Kreutzkraut. Folia ovata, sessilia, acutiuscula, hirsuta, cauli tetragono, hirsuto infidentia, sapore quam minime amaricantia. Valantia Cruciatæ L. BLACKWELL Tab. 76. Olim ejus tam internus, quam externus contra Hernias usus erat.*

CRYSTALLUS MONTANA. Prostant in officinis Fragmenta pellucida, alba, durissima, angulata, limæ vim omnem repellentia, nec aqua, nec acidis, nec igne fundenda, insipida, inodora. Nitrum Crystallus montana L. Reperitur in montibus. *Omnis virtutis medicinalis expertus est.*

CUBEBÆ. Capsulæ rotundæ, pedunculatæ, Piperi circiter figura & magnitudine assimiles, rugosæ, granum ex rufo nigrum, intus album, odore proprio fragrans, sapore acre, aromaticum continent. Majores, nucleo ventricoso foetæ, ceteris præferuntur. Planta unde colliguntur in *Pharmacopœa Suecica* sarmentosa esse dicitur & Piperis caudati nomine venit. In Asia Meridionali provenit. Exiguam quantitatem Olei Essentialis mitis fundere dicuntur. *Ratione virium mitiores, ceterum Piperi rotundo equiparabiles sunt. Utrum Aqua an Spiritu Vini extrahantur, nihil interest.*

CUCUMIS, *Concombre, Cucumer. Fructus, antequam ad plenam maturitatem pervenerit, recipitur oblongus, plus minus cylindræus, frequenter incurvus, imparibus tuberculis obfessus, colore in tempore viridis, quo vero propius ad maturitatem accedit, eo magis pro plantæ, unde defumitur, varietate vel flavescit, vel albescit. Pulpa quam maxime succo-*

fa, proprio odore, dulciculo sapore prædita, *Semina* completitur parva, compressa, utroque apice obtusa, alterutro tamen emarginata, sub cortice flavicante medullam albam & dulcem includentia. *Cucumis Sativus* L. BLACKWELL Tab. 4. Constantinopoli & in Ægypto spontaneus, apud nos sub diu per plures varietates colitur; *Citrullis viribus par, præcipue sub forma Acetarii assumitur, cui scopo, qui succum inde ante exprimunt, incongrue agunt. In vi Aperiente laus ejus ponitur egregia. Fructus tenelli Aceto & Sale conditi CORNICHONS cum carne comeduntur, ex condimentis maxime dijudicandi. Semina quatuor frigidis majoribus adjiciuntur.*

CUCUMIS ASININUS, *Concombre sauvage, Eselskürbis.* Radix crassa, fibrosa, alba, inodora, insigniter amara. *Momordica Elaterium* L. BLACKWELL Tab. 108. Europæ Australis civis, in hortis nostris sponte sparsis feminibus propagatur. *Medicamentum a Veteribus pro valde Draastico habitum ad Scrupulum usque datum, extus quoque Discutiendi scopo in usum tractum, nostro ævo ab usu medicato summo jure fere removetur.*

CUCURBITA, *Courge, Kürbis, Pfaffenhütlein.* Fructus variæ magnitudinis, subrotundus, apice depressus, tuberculis notatus, flavus, *Pulpam* præbet siccescentem, flavescentem, fere inspidam, *Semina* continentem majora, utrinque plana, ovata, margine tumido cincta, conclusus *Nucleus* dulcis est & albus. *Cucurbita Melopepo* L. Apud nos in agris colitur. *Ab infima plebe in cibum recipitur. Semina quatuor frigidis majoribus adduntur.*

CULILAWAN CORTEX. Frustra lineam circiter crassa, sesquipollicem lata, plana, interdum concava, colore cinnamomeo perfusa, tenera & rugosa epidermide tecta, texturæ laxioris, odore fragranti, Caryophyllos referente, simili sapore, sed mitiore prædita. *Laurus Culilaban* L. Arbor Indiæ Orientalis. Exiguam portionem Olei limpidi, quod L. *Safsafras* & Caryophyllos sapit, fundere dicitur. *Medias inter Castiam ligneam & Caryophyllatam vires possidere videtur.*

CUMINUM, *Rœmischer Kümmel.* Hodiernum evidenter ab eo, quo Veteres utebantur, differt. *Semina* majuscula, ovato-

oblonga, striata, ex gryseo-flavescentia, odore & sapore aromatica, non admodum grata. *Cuminum Cyminum* L. Ægypti & Palæstinæ indigenum, in Sicilia & Melito colitur. Olei odorati $\frac{1}{3}$ largiri dicitur. *Rarius intus scopo Carminativo datur; Extus ad Discutiendum sub forma Epithematis adhibetur.*

CUPRESSUS, *Cyprès*. *Lignum* sub cortice ferrugineo ex albo flavicat, absque ullo odore, saporem levissimum habet; *Folia* sunt pinnata pinnis imbricatis, viridia, gustu adstringentia, odoratu resinosa; *Nuces*, Veteribus *Galbuli*, sunt Coni subrotundi, dimissis feminibus, ex squamis constantes clavos referentibus, uni communi axi affixis, superne gryseis, inferne rufis, sapore sunt adstringentes, nec non aliquatenus resinosi & salini. *Cupressus sempervirens* L. Græciæ & Asiæ indigena arbor, nostræ hyemis patiens est. *Omnes Cupressi partes, & præ ceteris Nuces, vires Adstringentes habent; hæ ad Drachmam dimidiam intus olim dabantur.*

CUPRUM, *Æs*, *Cuivre*, *Kupfer*. Metallum rubrum, odore proprio, sapore nauseoso instructum, post Ferrum difficillime funditur & fluens pulcherrimis micat coloribus, tardius exurit, quam cetera, quæ ignobilia dicuntur, metalla, mediæ inter Aurum & Ferrum firmitatis, malleabilitate Argento suppar, novies fere aqua gravius est. Sive Nativum, sive sub forma variarum Minerarum Natura subministrat; menstruis quibuscunque solubile, aëre in viridem calcem vertitur. *Tam extus quam intus effectus Rodentes edit, quapropter ab usu ejus medicato usquequaque abstinendum, quin & instrumenta inde parata, cum fere nunquam satis cautus eorum sit usus, a culinibus æque ac pharmacopoliis, me quidem iudice, tutius prohibentur.*

CURCUMA, *Terra merita*. Radix tuberosa, geniculata geniculis cylindraceis vel subrotundis, rugosis, extus pallidoribus, intus splendentibus, rufo-croceis, odoris levissimi, saporis aromatici. *Curcuma longa* L. BLACKWELL Tab. 396. Crescit & colitur in omni India aquosa; apud nos semper in vaporario asservanda. Olei odorati aliquantulum fundere dicitur. *Primas vias Roborat, Obstructiones Abdominales tollit. Datur ad Scrupulos duos sub forma Pulveris, ad Drachmas duas cum aqua infusa.*

CUSCUTA, *Epithymum*, *Flachsseide*, *Goutte de lin*. Filamenta longa, tenerrima, multis tuberculis obfessa, sapore vix dum acriusculo prædita. *Cuscuta Europæa* L. Parasitica planta, variis Vegetabilibus, apud nos præcipue *Euphorbiis*, innascitur. *Olim Purgantibus adscripta hodie usu fere destituta.*

CYANUS, *Bluet*, *Kornblume*. Flores asservantur e calyce evulsi, tubulosi, profunde quinquefidi & ultra, cærulei, inodori, insipidi quidem, aquam vero, qua cum infunduntur, amaram reddentes. *Centaurea Cyanus* L. BLACKWELL Tab. 270. Crescit per totam Europam. *Olim Resolvente & Diuretico scopo ad Infusiones adhibebantur. Aqua inde destillata utique iners ad Collyria recipitur.*

CYCLAMEN, *Artanita*, *Pain de pourceau*, *Schweinbrod*. Radix tuberosa, leviter depressa, subrotunda, forinsecus nigricans, intus candida, inodora, sapore recens quidem acris, subacerba, exsiccata vero fere penitus insipida est. *Cyclamen Europæum* L. BLACKWELL Tab. 147. Europæ Orientalis & Meridionalis solum natale habet, nostras hyemes innoxias experitur. *Viribus Purgans vulgo habetur, olim ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Unciam semis in Infuso exhibebatur.*

CYDONIA, *Coings*, *Quitten*. Poma variæ magnitudinis, qua rotunda a *Malis*, qua turbinata a *Pyris* denominata, umbilico eminenter angulato insignita, epidermide aurea, tomento obfessa, carnem complectuntur firmam, lutescentem, quinquelocularem, fragrantem, evidenter adstringentem, acidam, *Semina* continentem ovata, muco obducta, corticis spadicei, medullæ albæ, saporis fatui. *Pyrus Cydonia* L. BLACKWELL Tab. 137. Arbor ex Creta in Italiam advena, passim in Europa & sponte & cultura provenit. Pomum recens nimis acerbum varia ratione conditur Saccharo, in taleolas dissectum & exsiccatum mitescit & ad Decocta adhibetur; *Roborantes & Adstringentes vires edit. Semina in aqua contusa in Mucilaginem formantur, quæ intus quidem ad Os, Fauces, Ventriculum &c. Refrigerandi & Demulcendi ergo extus vero ad Ambusta, Fissuras; Ophthalmiam sanandam conducit. Drachma una Seminum, sex aquæ Uncias ad consistentiam Mucilaginis exspissat.*

CYMBALARIA, *Linire des Montagnes*, *Cymbelkraut*. Folia reniformia, longius petiolata, succulenta, superne atroviridia, inferne interdum purpurascens, inodora, levissime falsa. Antirrhinum Cymbalaria L. Vulgatissima per Europam temperatam planta. *In Aperiendo vis ejus hinc & inde laudatur, tam cum Jusculis recens coquitur, quam Succus ejus expressus exhibetur.*

CYNOGLOSSUM, *Langue de Chien*, *Hundszunge*. Radix oblonga, crassiuscula, extus ex atro-rubens, intus alba, odoris, recens minus grati, exsiccata prorsus vacua, gustu fatua. Folia sunt oblonga, acuminata, utrinque alba, nec odora, nec sapida. Cynoglossum officinale L. BLACKWELL Tab. 249. Crescit, qua late patet Europa. *Planta ab omni retro tempore innoxia habita, superiori demum seculo, incerta observationum auctoritate in suspicionem adducta, experientia tandem magnorum Virorum noxæ omnino exempta est. A vi Relaxante laudatur, hodie rarius usurpatur.*

CYNOSBAMOS, *Gratte-cul*, *Hagenbutte*, *Butte*. Fructus ovalis, coronatus calycis laciniis, lævis, nitidus, ruber, intus flavescens, tenui odore, sapore grato paulum vinoso instructus, Semina subovata, pilis rigidiusculis inhærentia continet; asservatur in longitudinem dissectus, a pilis æque ac femine penitus purgatus. Rosa Canina L. BLACKWELL Tab. 8. Non modo per totam Europam, sed etiam in Asia & America offenditur. *Comeduntur hi fructus in Rob redacti, adhibentur cum aqua decocti, Scopo Roborandi & Urinam pellendi.*

CYNOSBATI FUNGUS, *Bedeguar*, *Schafkunz*. Est ex crescentia Rosæ fruticis, quæ variam magnitudinem habet, subrotunda, rubra, spongiosa, fibris pulchre & varie flexis cincta, intus cava, odoris nullius, saporis leniter adstringentis; formatur a Cynipe Rosæ L. *Adstringentes vires habere dicitur, alias etiam Vulgus ipsi affingit.*

CYPERUS LONGUS, *Souchet long*. Radix duriuscula, calamo anserino crassior, geniculata, circulis & nodulis notata, extus rufa, intus pellucidior, suaviter odora, gustu aromatica. Cyperus longus L. Galliæ Meridionalis & Italiæ civis,

civis, nostras hyemes fert. *Propter vim Roborantem & Diureticam olim celebrabatur.*

CYPERUS ROTUNDUS, *Souchet rond.* Radices tuberosæ, ovatæ, Olivarum magnitudinis, extus pallide rufæ, odorem præcedentibus debiliorem, saporem aromaticum eminentiorem habet. *Cyperus rotundus* L. Crescit in India, Syria, Ægypto. Hanc præcipue Veteres in usum trahebant; *Eædem ipsi, ac præcedenti adscribuntur vires.*

DACTYLI, *Dattes, Datteln.* *Fructus* cylindroidei, pollicares, superne pulvinati, umbilico cartilagineo notati, rufi, rugosi; *Pulpa* cuticula tenerrima obducta, viscidula, ex rufo-flavescentes, sapore dulcissima, lenissime etiam adstringens est; sub tunica alba, splendente, ex pluribus lamellis constante, ossiculum absconsum est convexo-planum, oblongum, albidum, in facie plana sulco notatum, intus plumbeo-violaceum, adstringens. Rejiciuntur Dactyli profundius sulcati, albidi, molliores, nec non aridi, flaccidi, quique concussu sonant. *Phœnix Dactilifera* L. **BLACKWELL** Tab. 202. In Asia, Africa & America sponte, in Hispania, Lusitania & Italia Meridionali cultura crescit; fructus in his regionibus etiam ematurescunt, Orientalibus autem utique postponuntur; apud nos semper in caldario asservari debet. *Mensis secundis apponi solent; Decoctis Pectoralibus adjiciuntur, ceterorum Demulcentium relaxationis nimie temperamentum.*

DAUCUS CRETICUS, Semina cylindræa, villosa, aliquid odora, sapore aromatica. *Athamanta Cretensis* L. **BLACKWELL** Tab. 471. Helvetiæ, Galliæ Meridionalis, Austriæ progenies. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Recipitur ad Infusa Carminativa & Diuretica.*

DAUCUS VULGARIS, *Carottes, Vogelneß, Mæhren, gelbe Ruben.* Radices fusiformes, pro hortensi, unde defumuntur, varietate lutæ, albæ, rubræ, proprium aromaticum odorem, saporem habent admodum dulcem. *Semina* ovalia, convexo-plana, altera facie striis pilisque rigidis obfessa, aromati saporis sunt, aliquantum etiam amari. *Daucus Carota* L. Crescit qua patet Europa. Copiose in hortis colitur.

Radices a varietate sativa, Semina a sylvestri defumuntur. Radices tanquam olus, in culinas recipiuntur, recentes rasas vel cum aqua in Cataplasma coctas, egregie contra Ulcera Cancrofa facere Recentiorum Observationes adstruunt. Seminum vis medica cum præcedentibus æquiparatur.

DENTALIA. Sunt Conchylia profundius striata, quæ canales cylindroideos referunt, alba, insipida, inodora, utrinque aperta, leviter arcuata. Dentalium Elephantinum L. In Oceano Indico & Europæo occurrit. Intus Adstringendi, extus Exsiccandi ergo olim adhibebantur.

DENTARIA MAJOR, *Schuppenwurzel.* Est Radix longa, squamis sibi invicem incumbentibus efformata, ferruginea. Lathræa squamaria L. BLACKWELL Tab. 130. Vix ultra Alfatiam in regiones calidiores escendit. A paucis & quidem sine ulla observatione contra Epilepsiam est laudata.

DENTARIA MINOR, *Zahnwurzel.* Radix cylindroidea, ad angulos rectos ramosa, alba, e squamis geniculata, saporis acris, minus grati. Dentaria Pentaphylla L. In altioribus montibus Europæ temperatæ occurrit. Pulverata tanquam Roborans, ad Vulnera interna & Hernias sanandas dabatur, non admodum, ut mihi quidem videtur, congruenter.

DENTELLARIA, *Bleywurzel.* Radix cylindræa, ramosa, saporis fervidi. Folia lanceolata, amplexicaulia, scabra, acerrima. Plumbago Europæa L. Crescit in Europa calida. Apophlegmatizandi ergo quidam Radicibus in locum Radicis Pyrethri usi sunt. Folia Cutim exulcerare observata sunt. Oleo cum eis infuso partes Cancrosas extirpatas esse, lego.

DICTAMNUS ALBUS. Radices albæ, oblongæ, fere calamum crassæ, intus spongiosi quid, odorem nullum habent; aquam, cum qua infunduntur, amaram reddunt. Dictamnus albus L. BLACKWELL Tab. 75. Europæ temperatæ civis; Pulveris Drachma semis Anthelmintico & Emenagogo scopo commendatur.

DICTAMNUS CRETICUS. Folia orbiculata, utrimque multo tomento obfessa, odorem jam in recentibus levem, saporis aromaticum, neque vero acrem habent. Origanum Dictamnus L. BLACKWELL Tab. 462. Suffrutex Europæ ma-

gis Meridionali proprius, hyeme apud nos in frigidario affer-
vatur. Oleum destillatum fundere dicitur. *Maxime ad morbos U-*
terinos olim commendabatur.

DIGITALIS, *Doitier, Fingerhut.* Folia ovato-oblonga,
rugosa, crenata, leniter pubescentia, amara cum levi acrimo-
nia. Digitalis purpurea L. BLACKWELL Tab. 16. Crescit
in Europa temperata, non ultra Hassiam videtur ascendere.
Emetica est & Hydropicis laudatur. Foliorum recentium Unciæ qua-
tuor in triginta & duabus Unciis aquæ ad sedecim residuas Un-
cias coquuntur & Decocti aliquot Cochlearia exhibentur. Butyro
recepta contra Scrophulas extus adhibetur.

DIPSACUS, *Chardon à Foulon, Karten oder Bubendi-*
stel. Radix fibrosa, alba, valde amara. Dipsacus Fullo-
num L. BLACKWELL Tab. 50. Crescit in Europa temperata.
Nonnullos eam contra Obstructiones Abdominales Decoctis admiscuisse lego.

DORONICUM, *Gemsenwurzel.* Radicis tuberosa, articu-
lata, articuli prostant, rotundi, in angustum finem termi-
nati, extus flavicantes, intus albi, inodori, sapore dulcius-
culi, subaromatici. Doronicum Pardalianches L.
BLACKWELL Tab. 239. Altiorum montium civis. *Nec venenata*
esse, nec proprias vires medicatas habere observata est.

DRACONIS SANGUIS. Resina, quæ in varia magnitu-
dinis massis ad nos pervehitur, nigro-rubicunda, moleculis,
quandoque splendidis distincta, fragilis, fractura mox nitida,
mox contra; quæ ad nos perveniunt massulæ foliis arundina-
ceis obvolutæ, plurimam partem concatenatæ, nec non ma-
jores etiam solitariae exquisiti coloris melioris notæ esse judi-
cantur; prostant vero etiam, quanquam rarius frustra Cinnaba-
rino colore conspicua. Varium Arborum genus hanc resinam
largitur, illa obducti sunt Calami Rotang L. Indiæ Ori-
entalis fruticis fructus; exsudat ex truncis Dracænæ Draco-
nis L. BLACKWELL Tab. 358. cum priori conterraneæ & Pte-
rocarpi Draconis L. Americæ Meridionalis civis. Sanguis
Draconis nullum odorem spirat, sapor levissime resinofus est;
flamma quam concipit, non ingratum fumum emittit; liqua-
tionem admittit. *Ab Adstringente virtute laudatur. Adhibetur ad*
Dentifricia

DRACUNCULUS, *Estragon*, *Dragun*, *Kayserfsalat*. Folia integerrima, angusta, lanceolata, atroviridia, odoratu pergrata, gustu aromatica, leniter linguam pungentia. Artemisia Dracunculus L. BLACKWELL Tab. 116. Asiæ Septentrionalis civis, apud nos copiose in hortis colitur. *Tam in Palati gratiam, quam ad juvandam Digestionem Embammatibus & Acetariis adjicitur. Multo in usu est Acetum cum his foliis infusum.*

DULCAMARA videatur **AMARA DULCIS**.

EBENUM LIGNUM. Est ponderosum, nigrum, splens, saporis acriusculi. Ex India advehitur, ex meditullio trunci defumi dicitur Arboris cujus character nos adhucdum latet. *Usus præcipuus Mechanicus est. Vires Ligni Guajaci olim ei tribuebantur.*

EBULUS, *Yeble*, *Attich*. Radix est alba, fibrosa, amaricans, nauseosa. Folia magna, pinnata cum impari, ferrata, minus grate odora, amara, nauseosa, Flores assumuntur corymbis infidentes pentapetali; odor eorum Floribus Sambuci finitimus, sed minus gratus est; Baccæ rotundæ sunt, umbilicatæ, saporis dulciusculi, nonnihil amaricantis. Sambucus Ebulus L. BLACKWELL Tab. 488. Crescit per totam Europam. *Radicibus vis Emetica & Hydragoga a quibusdam tribuitur. Unciæ duæ pro dosi aqua infunduntur, sive Succi inde expressi Uncia una exhibetur. Folia Œdematibus aut Erysipelati imponuntur. Floribus his Sambuci flores præferuntur, ex Baccis ROB paratur, quod scopo Resolvendi, Sudorem aut Urinam pellendi ad Unciam semis exhibetur.*

EBUR, *Ivoire*, *Elfenbein*. Dentes lanarii, variæ magnitudinis, quinque pedes & ultra longi, albissimi, senio lutescentes, resimi, basi latissimi & cavitate conoidea non raro pedali excavati & striati. Elephas maximus L. Africam & Asiam Meridionalem inhabitat. *Rasura* frustulis mollioribus & Cornu Cervi albidioribus efformatur, $\frac{1}{2}$ Gelatinæ siccæ largitur, ut plurimum *Rasuræ Cornu Cervi* adjicitur ad augendam Gelatinæ albedinem. *Ebur ustum*, quod perperam *Spodium* dicitur, album quidem vires Cornu Cervi usti exserit; nigrum vero artibus Mechanicis materiam subministrat.

EBUR FOSSILE L. improprie *Unicornu fossile*, *Zoolithus Ebur fossile L.* Occurrunt non raro integri dentes, plerumque eorum frusta majora vel minora, ut plurimum extus nigro aut gryseo cortice obducta, substantia fragili, albissima, cum Acidis effervescente efformata, in quam Os aëre, aqua &c. fuit redactum. *Cum Ebore usto collatum nihil proprii habet.*

ELATINE, Velotte, Ehrenpreisweiblein. Folia brevissime petiolata, orbiculata, ovata, acutiuscula, pubescentia, subadstringentia, amaricantia. *Antirrhinum spurium L.* Crescit in Europa temperata. *Succus inde expressus Ulceribus sordidis & cancrofis salubris perhibetur.*

ELEMI GUMMI. Resina quæ in magnis frustis flavis, suffuso vestigio viroris, inter digitos lentescens, odore proprio ad Fœniculum accedente, sapore amaricante instructis ad nos transvehitur; præter ficiorem foliis arundinaceis involutam, qualis vulgo afferebatur, prostat & mollior, quæ in cistis missa hodie priori præferri solet. *Amyris Elemifera L.* Americæ Meridionalis Arbor. Ignè liquefit. Oleis ejus aliquantula tantum pars dissolvitur. $\frac{1}{18}$ Olei odorati fundere dicitur. *Adhibetur ad consolidanda Vulnera.*

ENTALIA. Conchyliarum recta, lævia, penitus cava, utrinque pervia, albissima. *Dentalium Entalis L.* Eandem cum Dentalis patriam habent & ad eosdem scopos adhibentur.

ENDIVIA, Intybus, Scariola, Chicorée, Endivien. Folia inferne angustata, pro varietatum discrimine mox lata & sinuata, mox angusta, laciniis acutis laciniata, lacteo succo turgent, amara; *Semina* cylindracea flavicant, angulis quatuor eminentibus notata, paucissimam medullam levissime salinam includunt. *Cichorium Endivia L.* BLACKWELL Tab. 378. In Palæstina sponte crescere dicitur, copiose apud nos in hortis colitur. *Vires Cichorii exaquat. Folia, cum sint succosiora, efficaciora etiam esse videntur; colligata aut terra tecta cum virore amaritiam deponunt & in usus culinarios recipiuntur. Seminum, quatuor frigidis minoribus adscriptorum, usus abolevit.*

ENULA, Helenium, Aunée, Alant. Radix crassa, mul-

tifida, extus fusca, exsiccata grysea, intus alba, odore haud ingrata, sapore acris, amaricans. *Inula Helenium* L. BLACKWELL Tab. 437. Crescit in Europa temperata. Pauxillum Olei odorati spissi fundere dicitur. *Humores attenuat, Solida ad Excretionem stimulat. Datur cum Aqua infusa. Extus contra Scabiem laudatur.*

EPITHYMIUM videatur CUSCUTA.

EQUISETUM, *Prêle, Queue de Cheval, Katzenwadel.* Cauliculi virides, nodis distincti, ex quibus prodeunt setæ prælongæ, fragiles, mediocriter adstringentes & leviter salini. *Equisetum arvense* L. BLACKWELL Tab. 217. Crescit per totam Europam. *Viribus Adstringendi & Urinam pellendi prædita olim credebatur.*

ERICA, *Bruyere, Heide.* Cauliculi dense obfiti *Foliolis* sagittatis, crassiusculis, subulatis, læte viridibus, & *Floribus* alaribus, quadrifidis, partim rubris, partim albis, sapore evidenter adstringente. *Erica vulgaris* L. Obtinet per totam Europam. *Cum aqua infusæ quidam Calculi conterendi propellendique virtutem tribuerunt.*

ERINACEUS, *Herison, Igel.* Animal quadrupes, toto corpore, præter ventrem pilosum pedesque, aculeis ex fusco & albido variegatis obfessum. *Erinaceus Europæus* L. Totam Europam, citra maxime Septentrionalem inhabitat. *Combustus satis absurde lectum commingentibus exhibetur.*

ERUCA, *Roquette, weisser Senf.* Semina minuta, rotunda, leviter flavicantia, proprio odore, acriore sapore instructa. *Sinapi alba* L. In Italia, Gallia, Anglia & Belgio sponte crescit. *Seminis Sinapeos vim exferit, sed mitiorem.*

ERYNGIUM, *Chardon roland, Mannstreu.* Radix fibrosa, pollicem circiter crassa, extus nigra, intus alba, striis transversalibus notata, dulcicula. *Eryngium Campestre* L. BLACKWELL Tab. 297. Crescit in omni Europa. In vasa Renalia & Spermatica agere creditur; quinque Aperientibus minoribus adscribitur. Saccharo quoque condita prostat. *Maritimi* L. ad littora Maris crescentis & nostrorum hyemum patientis Radices cum præcedentibus conveniunt.

ERYSIMUM, *Velar, Wegsenf.* Folia longa, laciniato-pinnata, lacinia terminali majore trifida, omnibus dentatis, scabra, odoris expers, sapore nasturtino non acri instructa. *Erysimum Officinale* L. BLACKWELL Tab. 28. Frequens Europæ planta. *Sub forma Infusi Aquosi sumtum viarum Aërearum Mucum dissolvere credebatur.*

ESULA, *Wolfsmilch.* Radices fusiformes; albæ; Folia pro varietate Specierum varie formata; Succum lacti colore & spissitudine similem vehunt acerrimum; Euphorbiæ L. species nonnisi ab Empyricis adhibentur, noxas eas ingessisse gravissimas Observatores fide digni adstruunt; a medicamento sane quam acerrimo, primas vias facillime inflammato profus abstinendum est. *Radices & Folia exsiccata ad Grana quadraginta sine incommodo dari posse, nuper traditum est.*

EUPATORIUM, *Eupatoire, Kunigundenkraut.* Folia, cum Floribus recipi solita, oblonga sunt, acuminata, dentata, ferrata, odora, amara, Flores tubulosi, rufescentes, parvi, Semini papposo infident. *Eupatorium Cannabinum* L. BLACKWELL Tab. 110. Crescit per totam Europam. *Viscera aperire & Urinam ducere dicitur. Sumitur ejus Infusum aquosum. Extus partibus Edematosis imponitur.*

EUPHORBIIUM. Gummi Resina formam refert granorum variæ magnitudinis, subrotundorum, angularium, rufiflavescens, sapore acerrimorum; hæc grana accensa non ingratum odorem spargunt. Est lacruma Euphorbiæ Officinarum L. BLACKWELL Tab. 340. Africæ civis; apud nos per hyemem in caldario asservandæ. Gummofum & Resinosum principium æquabiliter vehere & in Resinoso maxime virulentia hæreere dicitur. *Cum gravissima mala inde excitata fuisse Observatores testentur, nunquam intus dandum, licet a quibusdam ad Granorum trium dosin commendetur. Extus cum successu Ossibus cariosis inspergitur; Rubefacientibus aut Sternutatoriis inconsulto adjicitur.*

EUPHRASIA, *Eufraise, Augentrost.* Asservantur Cauliculi pubescentes, amaricantes, subadstringentes, obfessi, Fo-

liis ovatis, obtusis, ferratis, dentatis, viridibus, rugosis; Floribus axillaribus, personatis, albis, ex luteo & cæruleo variegatis. Euphrasia Officinalis L. BLACKWELL Tab. 427. Vulgaris per Europam. Infusum aquosum ad reserandas Obstructiones Abdominales laudatur. Cum Musto fermentata aut Pani incocta, aut Succus ejus expressus, Oculis instillatus, multum olim ad roborandum Visum commendabatur.

FABA, *Fève des Marais, welsche Bohne, Saubohne. Flores papilionacei, vexillo longiore, albo, striis rubris picto, alis macula nigra notatis instructi, odorem recentes fortem spirant, eumque suavissimum, exsiccati nullum. Semina pro Varietatis diversitate diversæ magnitudinis, reniformia, ovata, jam utrinque compressa, jam ventricosa, alba, flava, gilva, medullam albam includunt subdulcem. Vicia Faba L. BLACKWELL Tab. 19. Ægypti indigena, apud nos copiosissime in agris feritur. Cortice privata Semina tenella frequentius, quam matura & exsiccata, mensis apponuntur; Farina, in quatuor Farinarum Resolventium numero habita, ad Epithemata nec non ad usus Cosmeticos recipitur. Flores exsiccati omnino inertes sunt, perinde ac Aqua inde destillata.*

FABA CRASSA, *Telephium, Orpin, fette Henne. Folia carnosa, sessilia, plana, ovata, irregulariter ferrata, inodora, insipida. Sedum Telephium album L. Admodum frequens Europæ planta. Non nisi recens adhibenda. Tanquam Refrigerans & Antiscorbuticum remedium intus datur; extus Clavis pedum imponitur.*

FABA SANCTI IGNA'TII. Semen Avellana majus, angulatum, durissimum quasi corneum, extus gryseum, intus splendens, amarissimum. *Pharmacopœa Suecica ut & Celeb. BERGIUS, nescio qua auctoritate nixi, a quadam Strychni specie, Insularum Philippinarum Arbore, Semen hoc suppeditari afferunt. In Febris intercurrentibus ad Grana duodecim pro dosi data laudatur, interim tamen Vomitus, Convulsiones, Tremores inde excitos esse observatum est, quapropter ejus exsolevit usus.*

FAGOPYRUM, *Bled noir ou Sarrasin, Buchweizen, Heidenkorn. Semina ovata, trigona, glabra, sub cortice trigono, albissimam & insipidam farinam includentia, Polygonum Fagopyrum L. Orientis indigenum, hodie passim in Europa*

pa colitur. *Hordei loco in cibum recipitur; apud nos epulis excluditur, a quibusdam faginandis avibus adhibetur.*

FAGUS, *Hêtre, Buchen.* Fructus sub tegmine echinato *Nuces* includit, ex rotundo triquetras, quæ sub cortice badio coriaceo nucleum album compactum, cum aliquanta adstrictione dulcem includunt. *Fagus Castanea L.* Per Europam, præter maxime Septentrionalem, frequentissima arbor. *Nuces interdum in cibum recipiuntur, at largius comestas Cerebrum turbare, imo Hydrophobiam excitare, sunt qui affirmant. Oleum inde expressum in cibum recipitur, annotinum minus quam recens Ventriculum gravare perhibetur.*

FARFARA, *Tussilago, Pas d'ane, Roshub.* Radices tenues, fibrosæ, albidæ, inodoræ; *Folia* subrotundo-cordata, magna, petiolata, angulata, dentata, superne viridia, inferne tomentosa, saporis leviter adstringentis; *Flores* tubulosi, lutei, calice multifido comprehensi, leviter odori, subdulces. *Tussilago Farfara L. BLACKWELL Tab. 204.* Ubique in Europa invenitur. *A vi Emolliente & Relaxante laudatur. Radices rarius, Flores creberrime ad Infusa Pectoralia recipiuntur. Folia a quibusdam eodem modo usurpantur, interdum quoque extus applicantur.*

FEL VITRI, *Anatron, Fiel de Verre, Glasgall.* Panes seu massæ sunt coloris albi aut grysei & saporis salini; insignis earum durities est; in aëre humescunt, Syrupum Violarum viridi colore tingunt, fusionem Metallorum & Terrarum juvant. Formantur ex spuma quæ apud Vitriarios Frittæ fluenti supernatat & inde aufertur; constant ex Sale Alkali & Terra vitrescente, aliisque præterea, quæ ad Frittam recipi solent, Salibus; unde patet, pro varia Officina vitraria, unde desumitur, omnino diversum esse. *Incidendi quidem & Alyum ducendi causa a quibusdam laudabatur; sed quis est, qui medicamento tam dubio uti velit?*

FERRUM, *Fer, Eisen.* Metallum ignobile, aqua octuplo gravius, reliquis difficilius fundendum, magis etiam elasticum, mediæ inter Aurum & Cuprum firmitatis, scite cusum

malleabile evadit & in tenerrima fila extendi potest, ignitum scintillas vomit & in scoriam nigram abit, ope Salis cujuscunque, ipsius etiam Aquæ solubile, quapropter in aëre rubiginem contrahit, attrahitur a Magnete, cum liquoribus adstringentibus nigrescit, majori principii inflammabilis ratione ditatum in *Chalybem* vertitur. Uberius, quam cetera omnia metalla, Natura hoc sub forma diversissimarum glebarum progignit *Tonicorum Princeps*; ejus *Linatura*, ope *Magnetis* ab omni heterogeneo accuratissime segregata, sub forma *Alcoholis* ad Grana viginti usque exhibetur; cum *Vino* quoque infunditur.

FILIPENDULA, *Saxifraga rubra*, rother *Steinbrech*. Radix fibrosa, plures fibrillas emittens, quarum extremitatibus noduli sive tubera adhærescunt ovata, magnitudine imparia, ex rubro nigra, intus alba, odoratu grata, gustu leviter aromatica & amaricantia; Autumno effodienda est. Spiræa *Filipendula* L. BLACKWELL Tab. 467. Crescit in omni Europa. Recipiebatur ad *Decocta* *Roborantia* & *Diuretica*.

FILIX, *Fougere*, *Farren*. Radices fibrosæ, crassæ, flavæ, amaricantes, mucosæ, nauseosæ. Pteris *Aquilina* L. BLACKWELL Tab. 325. Copiosa per Europam. Ab omni tempore tanquam egregium *Teniæ* remedium laudatæ; *Drachmæ* earum tres vel quatuor cum *Melle* dabantur. Non raro recipiuntur Radices *Polypodii* *Filicis Maris* L. BLACKWELL Tab. 323. quæ fibrosæ sunt, extus nigra, intus rufa, sapore adstringentes.

FOENICULUM, *Fenouil*, *Fenchel*. Radix fusiformis, alba, cum aromate dulcis, odorem spargit proprium, fragrantem. *Folia* longa, multiplicato-pinnata, laciniis filiformibus, odore & sapore *Seminum*, debiliora duntaxat. *Semina* oblonga, convexo-plana, striata, odoratu fragrantia, gustu aromatica, dulcicula. *Anethum Fœniculum* L. BLACKWELL Tab. 288. In Europa calida nec non in Anglia sponte crescit. Copiose in nostris regionibus colitur. *Semina* Olei odorati, quod in aëre temperato coagulatur, $\frac{1}{27}$ largiuntur. Radices ad *Infusa* *Diuretica* recipiuntur. *Folia* ad usus culinarios mul-

to frequentius, quam ad medicatos recipiuntur. Semina intus scopo Carminatio, in Decoctis potissimum, rarius sub forma Pulveris exhibentur. Extus Discutiendi causa Oculis applicantur. Eosdem in fines Aqua destillata efficax ad Potiones Pectorales recipitur.

FOENICULUM DULCE, *Italicum*. Semina prioribus majora & crassiora, omnino dulciora, albida. Planta, unde defumuntur, Varietas prioris esse dicitur; sed in nostro horto constanter habitum minorem servat, & Semina, qualia dixi, producit. *Præcedenti cum suavitate multo antecellat, merito præferendum videtur.*

FOENUGRÆCUM. Semina oblonga, irregulariter quadrata, glabra, flava, sulco obliquo in margine notata, odoris nauseosi, saporis amari. Trigonella Fœnugræcum L. BLACKWELL Tab. 384. Galliæ Meridionalis domestica planta apud nos copiose in agris colitur. Mucilaginis fere $\frac{1}{4}$ vehit. *Internus ejus usus nullus est, extus tanquam Resolvens & Maturans ad Epithemata & Cataplasmata recipitur.*

FORMICA, *Fourmi, Ameise*. Insectum parvum, oblongum, senipes, totum exiguis pilis obfessum, acidulum odorem spirat, cui fere sapor respondet; ejus larva cylindroidea, alba, vulgo *Ovum* dicitur. Formica rufa L. reliquis præstantior, in Europæ sylvis frequentissime occurrit. Oleum tam unguinosum, quam odoratum inde obtinetur. *Acervi Formicarum sive sub forma Epithematis, sive ex Aqua cocti ad Irritandum membris Paralyticis admoventur; Spiritus Vini a Formicis abstractus Rheumatismis applicatur.*

FRAGARIA, *Fraiser, Erdbeerenkraut*. Radices tenues, repentes, plures fibrillas capillares emittentes, sub cortice fusco-rufescente substantiam albam includunt, evidenter adstringentes. *Folia* longius petiolata, ternata, ex ovatis oblonga, serrata, hirsuta, adstringentia. *Baccæ, Fraises, Erdbeeren* sive ovatæ, sive ovato-rotundæ, diversæ pro Varietate, unde defumuntur, magnitudinis, coloris mox albi, mox rubri & in rubro rursus varii; sunt receptacula carnosæ, extus tota foveolis exsculpta, singulatim semen continentibus, intus albida, odorem proprium, gratum, saporem dulcem habent ac

vinosum. *Fragaria vesca* L. BLACKWELL Tab. 77. Vulgaris per Europam, Americæ quoque indigena. *Chiloensis* quoque nostras hyemes citra noxam fert. Aquam Radices rubedine, Folia quoque, sed levius inficiunt. *Aperiendi & Adstringendi scopo utraque cum Aqua infusa aut decocta adhibentur; Folia Ulceribus Pedum salubriter applicari experimentis compertum est. Fraga ad Refrigerandum, Viscera abdominalia aperienda, Renes depurandos comeduntur. Aqua inde destillata & sapida & odora evadit.*

FRANGULA, *Bourgène, Zapfenholz, Faulbaum.* Cortices mediani, sive libri tenaces, flavicantes, leviter austeri, aliquantillum etiam amari. *Rhamnus Frangula* L. BLACKWELL Tab. 152. In Europa ubique locorum obvia. Cortices recentes ad duas Drachmas cum aqua infusi Vomitum & Seccessus Alvinos excitare dicuntur; exsiccatorum laus in Resolvendo & ducenda Urina ponitur; accipiuntur quoque ad Balnea & Unguenta contra Scabiem.

FRAXINUS, *Frêne, Eschenbaum.* Cortex grysei, cum fusco mixti coloris, punctis conspersus pallidioribus, amarus, subadstringens. Semen, quod etiam *Lingua Avis* dicitur, oblongum est, compressum, fuscum, tenax, cortice obvolutum longiore, sicco, dilutius fusco; progrediendo dilatato & obtuse terminato; sapor nonnihil acris adstringit. *Fraxinus excelsior* L. BLACKWELL Tab. 328. Obtinet in omni Europa. Cortices sunt, qui ad Viscera Abdominalia aperienda & Sanguinem depurandum commendent. Semen olim Diureticis, Lithonripticis, Aphrodisiacis annumerabatur.

FULIGO, *Suie, Rus.* Substantia ficca, nigra, ex substantiis vegetabilibus & animalibus accensis sublimata & ad solidos, quibus accrescunt, parietes collecta. *Splendens, Ofen- vel Spiegelrus* obtinetur ex caminis, qui fumum omnis generis lignorum suscipiunt, cujus partes oleosæ, salinæ & terrestres refrigeratæ camino se agglutinant, & in frustra excrescunt fragilia, splendentia, nigerrima, empyreuma olentia, gustu amara & acriuscula. Pro substantiarum sub caminis combustarum diversitate diversas quidem admittit formas, constanter tamen Salem Ammoniacalem, Oleum adustum, partes

terrestres, gummofas & resinofas vehit. *Hæc fuligo ad usus medicatos recepta ob virtutem Resolventem, Sudoriferam datur ad Drachmam semis pro dosi. Fuligo Tædæ, Noir de Fumée, Kienrus pulveris tenerrimi, levissimi, nigerrimi speciem præbet, cujus odor levis minus ingratus est, quam splendentis, sapor paululum salinus; obtinetur ex ramentorum Pineorum sive rejectamentorum depuratæ Refinæ Vulgaris fumo in peculiare conclave corrivato, ubi a sacco linteo, cui accrescit, fuligo de cussa asservatur; hanc ad tinctorios potissimum usus adhibent.*

FUMARIA, *Fume-terre, Taubenkropf. Cauliculi succulenti, teneri, ramosi, quadrangulares, quibus insident tam Folia longis petiolis innixa, glauca, duplicato-pinnata, lobato-incisa, lobis cuneiformibus, quam Flores irregulariter quadrifidi, oblongi, calcarati, rubri; utraque una cum cauliculis evidenter amara. Fumaria officinalis L. BLACKWELL Tab. 237. Crescit qua late patet Europa. Ad reseranda Viscera Abdominalia, curandum Scorbutum, depurandum Sanguinem vel unus ejus Manipulus cum jusculis incoquitur, vel Succus ejus expressus ad Uncias quatuor propinatur. Aqua inde destillata tam iners est, quam efficax Extractum.*

FURFURES, *Sons, Kleyen. Pelliculæ badiæ, ficcæ, tactu asperiusculæ, proprio odore, sapore adstringente præditæ, sunt granorum Cerealium cuticulæ, a substantia, quam continent, farinacea molarium tritura avulsæ & comminutæ, unde ipsis residuum quid nunquam non adhæret. Furfures Tricoli substantiam glutinosam continent, utpote qua hoc Cereale ab omnibus reliquis discriminatur. Decoctum Furfurum Abstergendi scopo intus datur, extus ad Clysmata recipitur.*

GALANGA MAJOR. Radices intortæ, variis ramis & tuberculis notatæ, circulis eminentibus undique cinctæ, extus rusæ, intus pallidiores, aliquot pollices longæ, unum circiter crassæ, odoris aromatici, Camphoræ vicini, saporis pariter aromatici. **MINOR** a magnitudine & crassitie ita cognominata, saporis tamen aromate Majore superior est. *Maranta Galanga L. Major Indiæ indigena; Minor ex China in Indiam*

transplantata ibidem colitur. Pauxillum Olei odorati largiri dicitur. *Ventriculi Roborandi scopo ad Infusa recipitur.*

GALBANUM. Lacruma quæ nobis mittitur sub forma Granorum magnitudine impari, Avellanam fere æquantium; saporrem habent amaricantem, acriusculum, odorem proprium, gravem. Prostat etiam *Galbanum in massis, en Pains*, frustis magnis, tenacibus, minoris quam prius pretii; plures ejus varietates Seplasiarii vendunt, ejus præstantia ex pluribus numero lacrumis sive Unguibus, coloreque minus fulco judicatur. *Galbanum liquidum ex Persia*, multa face nigricante sordidatum, spissitudinem habet Terebinthinæ, odorem Resinæ, nequaquam Galbani. Bubon Galbanum L. Africæ indigenum, apud nos per hyemem in tepidario asservandum. Igne illiquabile; ex aqua suspenditur; Spiritu Vini utique, Oleis neutiquam dissolvi, aliquantulum Olei odorati fundere fertur. *Adversus Obstructiones Abdominales intus adhibetur; extus tanquam validissimum Resolvens Tumoribus induratis imponitur.*

GALDA GUMMI. Sub forma frustorum majorum, durorum, extus nigricantium, intus alborum ex India veniebat, odore & sapore leviter ad Gummi Elemi accedit; inter dentes lentescit, flamma adnotum fluit & ardens odorem haud ingratum emittit. Vera Resina *ob vim Roborandi ad Emplastrum & Unguenta recipiebatur.*

GALEGA, Geisrauten. Folia foliolis oblongis pinnata, angusta, saporis odorisque vacua. Galega officinalis L. BLACKWELL Tab. 92. Europæ calidæ civis, nostras hyemes experitur innocuas. *Ab effectu salubri, quem Londinensibus Peste laborantibus præstitisse memoriæ proditum est, virtus illi Alexipharmaca tribuebatur. Aqua inde destillata plane iners est.*

GALEOPSIS, Urtica mortua, Ortiéblanche, taube Nessel. Flores labiati, labio superiore villosi, albi, inodori, insipidi, Folia ex ovatis acute-ferrata, rugosa, scabra, odore levi, minus grato imbuta, sapore casta. Lamium album L. BLACKWELL Tab. 33. Vulgaris per Europam. *Ob virtutes Diureticas, Emenagogas & Lochia promoturas sub forma Infusi exhibentur.*

GALLÆ, Noix de Galle, Gallepfel. Excrescentiæ ro-

tundæ, tuberculis obsessæ, ut plurimum foratæ, extus pro diversa varietate diverse coloratæ, flavus color præstantiæ indicium est; a gryseo ad nigrum declinantes *Cæruleæ* dicuntur, intus substantiam densam, solidam, fuscam vel nigram includunt, sapore adstringentem & acerbam. Sunt excrescentiæ variarum *Quercus* L. specierum, ex vulnere a *Cynipe Quercus* L. illato natæ; Orientales, Aleppenses præsertim & Turcicæ, reliquis præferuntur. *Intus nunquam dantur, extus interdum Decoctis Stypticis admiscentur.*

GALLINA, Poule, Henne. Avis notissima *Phasiani Galli* L. Femella. *Caro* diversimode in culinis paratur. *Axungia* alba, inodora, insipida *reliquarum Axungiarum vires habet. Ovarum Albumen, Blanc d'œuf, Eyerweis* consistentiam tenuioris Gelatinæ habet, certo coloris gradu, nec non Spiritus Vini aut Acidorum affusione, in substantiam ficcam & tremulam vertitur; ad varios labores pharmaceuticos recipitur, *intus ad Demulcendum, Relaxandum, Lubricandum datur. Testæ, Coques d'œuf, Eyerfchaalen Absorbendi scopo exhibentur, in tenerrimum pollicem contritæ a quibusdam Alkali de Rocou dicuntur; Vitellus* tenue & viscidum oleum refert, flavus, proprio odore & sapore oleoso instructus, calore indurefcens, multo oleo unguinoso turgens, quod quidem spissum est & flavum; Vitellus verus sapor est & hoc scopo pro Resinosi ex aqua suspendendis creberrime usurpatur, aqua dissolutus *Eau de Poule, Blæselwafser* egregium contra *Tussim* medicamentum. *Ventriculi, Gofiers, Hünermæglein*, quo nomine insigniuntur membranæ interiores Ventriculi hujus gentis, rugosæ, exsiccatione fragiles, albescentes, fere insipidæ, levi acido foetæ, quo Lac coire cogunt; *ad primas vias Roborandas infantibus dantur.*

GALLIUM, Caille de lait, Bettstroh. *Caules* tenues, tetragoni, infessi *Foliis* verticillatis, angustis, linearibus, viridibus, modice splendentibus, terminati panicula *Florum* luteorum, quadrifidorum, exiguorum. Odor recentium admodum fragrans, sub exsiccatione non parum minuitur, sapor herbaceus est. *Gallium verum* L. Magna copia per Europam exstat. *Remedium Roborans & Adstringens habitum ad Infusa Vulneraria recipiebatur.*

GENISTA, *Genêt, Pfrimmen, Flores papilionacei, lutei, evidenter amari, &, cum exsiccati fuerint, inodori sunt, Semina cylindroidea, splendentia, flava, medullam continent dulcem, concolorem. Spartium Scoparia L. BLACKWELL. Tab. 244. Per longe maximam Europæ partem crescit. Sunt, qui Flores majores & fragrantiores a Spartio Junceo L. Europæ calidæ proprio, nostrarum hyemum patiente defumant; alii eosdem a Genista Tinctoria L. per universam Europam vulgari, minores & ne recentes quidem ullum odorem spargentes petunt. Flores Diuretico scopo cum aqua infunduntur. Semina Emetica putantur, nescio an recte. Cinis & Sal aliis præstare minime videntur.*

GENTIANA ALBA, *Cervaria alba, grosse weisse Hirschwurzel. Radix magna, crassa, fibrosa, albicans, intus alba, rugis circularibus distincta, resinosa, odorifera, aromatica, amaricans. Laferpitium latifolium L. Altiorum montium progenies, passim per Europam occurrit. Stomachico & Alexipharmaco scopo a rusticis ad Infusa recipitur. Veterinariis maxime in usu est.*

GENTIANA LUTEA, *Gentienne, Enzian. Radix fibrosa, magna, rugosa, fungosa, in plures fibras digitum crassas secedens, extus fusca, intus flava, amarissima. Gentiana lutea L. Passim in montibus Europæ obvia. Tanquam Roborans, Obstructiones Abdominales reserans, tam in Infusis, quam sub forma Extracti exhibetur. Extus ad dilatanda Vulnera & Ulcera adhibetur.*

GENTIANA NIGRA, *Cervaria nigra, Persil des Montagnes, schwarze Hirschwurzel. Radix crassa, prælonga, extus fusca, annulis distincta, intus alba, resinosa, odoris grati & fortis, saporis acris, aromatici. Athamanta Cervaria L. Passim in montibus Europæ crescit. A quibusdam adversus Febres Intermittentes, Podagram &c. commendatur. Veterinariorum etiam usibus servit.*

GENTIANA RUBRA. Radix a Radice Gentianæ luteæ nisi colore magis pallido fere nihil differt, quocirca etiam sibi
invicem

invicem substituuntur. *Gentiana purpurea* L. Passim in montibus Europæ crescit. In eodem numero habendæ Radices *Gentianæ Cruciatæ* L. vulgaris per Europam plantæ, minores quidem, angustiores, pallidiores, cetera prioribus pares.

GENTIANELLA, *hoher Himmelfengel*. Folia sessilia, ovata, acuminata, integerrima, longitudinaliter tribus nervis notata, amarissima. *Gentiana Amarella* L. Per omnem Europam occurrit. *Compar ejus cum modo dictis Radicibus usus est.*

GERANIUM, *Bec de Gruë*, *Storchenschnabel*. Amplissimi generis plures species a vi Adstringente laudantur. Intus Folia sub forma Infusi exhibent, extus sub forma Epithematis applicant, ut *Cicutarium* L. *Columbinum* L. *Sanguineum* L. præstantissimum omnium *Robertianum* L. habetur, cujus Folia tripartitim divisa, pinnis pinnatim laciniatis, petiolis teretibus insident, utrinque pilis obsessa, creberrime rubedine tincta, foetentem cornu ambusti odorem spirantia, leviter adstringentia.

GINSENG. Radices digitum circiter crassæ, vix incurvæ, albæ, lineis longitudinalibus & transversis rugosæ, inferne bifidæ, intus albæ & spongiosæ, sapore acriusculo, leviter dulcescente & aromatico instructæ. *Panax quinquefolium* L. **BLACKWELL** Tab. 513. *Americæ Septentrionalis civis. Eisdem cum Radicibus Ninsi vires habere dicuntur & cum minoris veniant ad Drachmam dimidiam Pulveribus Analepticis adjici suserunt.*

GLACIES MARIÆ, *Selenites*, *Lapis Specularis*, *Frauenis*. Est Species Gypsi pellucens, in lamellas divisibilis, quæ rhomboidalem figuram constanter servant. *Natrum Selenites* L. In montibus passim offenditur. *Absorbentibus & contra Strumas facientibus medicamentis, substantia omnino iners, inconsulto adscripta fuit.*

GLYCYRRHIZA, *Liquiritia*, *Reglisse*, *Süsholz*, *Lakri-zenholz*. Radices oblongæ, samentosæ, ad pollicarem usque crassitiem excrescunt, extra ferrugineæ, intra brunæ, leviter odoratæ, sapore dulces, cum quadam amaritudine; *Hispanicæ*, quæ nobis exsiccata mittuntur, extus gryseæ, intus spissius luteæ, ob eminentem dulcedinem ceteris

præferuntur. *Succus* optimus ex Hispania petitur, in Catalonia præcipue paratur; verum Extractum, quod ex Radicibus exsiccatis, aqua coctis, expressis & ad consistentiam mollem Extracti excoctis paratur, prostat sub forma massarum oblongarum, quæ sex circiter pollices longæ, unum crassæ, una facie planæ; altera convexæ, ubi diffractæ fuerint, splendentes, nigræ, multum dulces, foliis Laurinis obvolutæ nobis mittuntur: massæ aridæ, quæque non totæ in ore liquefcunt, rejiciendæ. *Glycyrrhiza glabra* L. BLACKWELL Tab. 495. Europæ Meridionalis propria, nostras hyemes citra noxam fert. In Anglia, Germania & Lotharingia copiose colitur. *Sitim Sedandi, Demulcendi, Resolvendi ergo Decoctis adjicitur; sed adhibenda cautio est, ne vel paululo ulterius quam oportet continuata coctione amarescat; extus Erysipelati Pulvis ejus inspergitur. Succus sive per se, sive Aqua solutus, sive in Trochiscos formatus scopo Becchico exhibetur.*

GOSSYPIUM videatur BOMBAX.

GRAMEN, *Chiendent, Zweckken*. Radices prælongæ, geniculatæ, teretes, flavescentes, leviter odoratæ, dulces. *Triticum repens* L. Nimis frequens agrorum pestis. *Resolvendi ergo immiscetur Decoctis; Vulgatissimum apud nos ingrediens Decoctorum pro Potu communi.*

GRANATUM, *Malum Punicum*. Pomum variæ magnitudinis, rotundum, umbilico quinquefido coronatum, sub *Cortice* coriaceo, firmo, crasso, leviter rugoso, suffusa rubedine flavicante *Pulpam* complectitur rubram, multilocularem, fragrantem, gustatu dulcem & vinosam, *Semina* continentem oblonga, acuminata, propria membrana *Cico* obvoluta, sub cortice duro medullam albam, amaricantem includentia. *Cortex Pfydium* vel *Malicorium* denominatus, exsiccatus, extus purpureus est, intus luteus, rugosus, linguam valide adstringens. *Flores*, qui *Balaustiorum* nomine veniunt, nec nisi pleni in officinis asservantur, in calice quinquefido, coriaceo, plura petala congesta, ruberrima, inodora, sapore adstringente prædita includunt. *Punica Granatum* L. BLACK-

WELL Tab. 97. Europæ calidæ & Orientis arbor, apud nos hyeme in frigidario asservanda. *Pulpa Refrigerans & Roborans vel comeditur, vel in Syrupum convertitur. Flores tam intus, quam extus Adstringendi gratia exhibentur. Cortices nonnisi extus, ubi valida Adstrictione opus est, applicantur.*

GRANATUS. Lapis pellucens, Cryſtallum polyedram referens, colore profundius rubro tinctus, limæ cedens, cultro resistens, igne in vitrum fundendus. Borax Granatus L. In Oriente & in Europa offenditur; in montibus etiam lapidibus aliis innatus reperitur; Ferrum alia quoque non raro metalla vehit; eidem præter Siliceam, Calcaream quoque & Aluminosam terram inhærere observatum est. *Iners Lapis Gemmariis relinquendus.*

GRATIOLA, *Gottesgnaden-Kräutlein*. Folia glabra, sessilia, lanceolata, versus apicem serrata, insigniter amara. Gratiola Officinalis L. BLACKWELL Tab. 411. Crescit in Europa temperata. *Communi Auctorum consensu Purgantibus Draſticis adscripta recentissime ad Drachmas tres in Infuso, ad Drachmam semis in substantia celebrari cœpit. Extus cum successu Resolvendi ergo exhibitam fuisse lego.*

GUAJACUM, *Lignum sanctum, Franzosenholz*. Lignum ponderosum, valde durum, ex viridi nigricans, alburno flavicante tectum, obductum *Cortice*, in varias squamas diviso, coloris buxei, odoris levissimi, saporis amariusculi, evidenter acris. *Gummi* in majoribus fructis ad nos pervenit, efformatum ex granis flavo-fulcis, inter dentes tenacibus, ad ignem liqueſcentibus, odorem insuavem emittentibus, sapore amaricante instructis, variis fordibus inquinatis. Guajacum officinale L. BLACKWELL Tab. 350. Americæ Meridionalis civis. E ligno Extracti aquosi odore & sapore Balsamum Peruvianum referentis $\frac{1}{16}$ obtinui. *Gummi* improprie ita appellatur, cum sit vera Resina; ejus solutionis in Spiritu Vini aliquid instillatur Spiritui Nitri, unde si color cæruleus surgit, Resinam sinceram esse concludunt; *cum aqua diu coctum Lignum una cum Cortice Sanguinem Depurantes & Balsamicas vires exserit, quibus haud absimiles Gummi quoque adscribuntur, quod quidem hodie Arthriticis magnopere commendatur.*

GUTTÆ GUMMI. Est Succus concretus, cujus magnæ advehuntur massæ nitidæ, fragiles, croceo-rubræ, inodoræ, sapore leviter resinosa & dentium judicio aliquantum etiam tenaces. Cambogia Gutta L. BLACKWELL Tab. 392. Arbor Indiæ indigena. Neutiquam igne funditur, tam in Aqua, quam in Spiritu Vini suspendi se patitur; ab Oleis unguinosi non dissolvi traditur. *Ad Grana decem exhibitum sursum aque ac deorsum enixe Purgat, minori dosi datum valide Humores Resolvit & scopo Diuretico exhibetur; contra Teniam quoque laudatur.*

HÆMATITES, *Blutstein, Glaskopf.* Est Minera Ferri ponderosa, ad lapidis similitudinem figurata, colore, inde a rubro per gradus ad nigricantem usque descendens, varie etiam figurata, textura ut plurimum convergentibus striis striata, sapore adstringens. Ferrum Hæmatites L. Passim per Europam in montibus occurrit. *Adstringendi ergo ad Scrupulum unum præscribitur.*

HEDERA ARBOREA, *Lierre, Epheu.* Folia petiolata sunt, coriacea, pro varia ætate sive integra, sive lobata, supra lucida, infra pallidiora, sapore adstringente prædita; *Baccæ* nigrae, rotundæ, umbilicatæ, stylum ex medio umbilico exferentia, gustu statim quidem fatua, subsequente dein amaricante & acri sapore. *Gummi* prostat sub forma frustorum majorum, viridescentium, fragilium, ex granis semipellucidis Granatis fere concoloribus formatorum, variis sordibus intermixtis pollutorum, odoris leviter resinosi, saporis subaromatici: possideo frustra quæ quinque librarum pondus æquant. *Hedera Helix* L. BLACKWELL Tab. 188. Offenditur ubique. Europæ calidæ Frutices subinde Gummi fundunt, cujus longe maximam quantitatem ex Oriente accipimus, Oleis non solubile, ejusque potissimam partem Resinam esse asserunt Observatores. *Folia ad Deligandos præcipue Fonticulos adhibentur, Pulvis eorum contra Atrophiam Infantum laudatur; de Baccarum virtute, quam Catharticam esse nonnulli putant, plane nihil certi constant; Gummi medicamentorum Resolventium numero habetur, extus applicato virtus Depilatoria tribuitur.*

HEDERA TERRESTRIS, *Tarrette, Gundelreb.* Folia petiolata, reniformia, crenata, rugosa, levissime hirsuta, ex-

ficcata inodora, saporem proprium leniter aromaticum exhibent. *Glechoma hederacea* L. BLACKWELL Tab. 225. Vulgaris per Europam planta. *Ad Infusa Roborantia & Resolventia recipitur.*

HELIANTHEMUM, *Sonnengunfel*. Folia lineari-lanceolata, margine ut plurimum reflexo, obtusiuscula, hirsuta, gustatu paululum adstringentia. Cistus *Helianthemum* L. Frequentissime per Europam obvia.

HELIOTROPIUM, *Tournefol*, *Lacmus*. Massulæ pollicares, tetragonæ, siccæ, insigniter violaceæ, odoris, dum recentes sunt, Violæ, annosiorum mucorem referentis, saporis acris. Confici dicitur ex *Lichene Parella* L. Rupibus Maris Mediterranei adhærescente, sive ex *Lichene Roccella* L. Archipelagi & Insularum Canariensium cive, Calce viva cum Urina per aliquot septimanas scite digesta, Succoque deinceps, quem *Croton Tinctorium* L. largitur, affuso. Cum colorem sistat minime constantem ad artem baphicam minus apte adhibetur; aqua inde tincta levissimo quoque affuso Acido rubescit, Alkali contra non mutat colorem. *Curandis morbis non adhibetur.*

HELLEBORUS ALBUS, *weise Nieszwurzel*. Radices fibrosæ, cylindroidæ, tuberculis obsessæ, reliquiis fibrarum, quas recentes emiserant, extus gryseæ, intus albissimæ, sapore salino, acri, nonnihil amaro, odore levi, ingrato insignitæ. *Veratrum album* L. BLACKWELL Tab. 74. Crescit in altioribus Europæ montibus. *Vehementissimum Drastrictum quam maxime lugubres effectus edidisse Observatores fide digni testantur; ad Drachmam dimidiam in Infuso datum, sunt qui commendent, attamen hominibus intus nequaquam dandum censeo, nec tuto ad Pulveres sternutatorios recipitur.*

HELLEBORUS FOETIDUS, *Hellebore batard*, *Groß Lauskraut*. Radices fibrosæ, fuscæ, digitum circiter crassæ, intus albæ, inodoræ, dulciusculæ; Folia in novem ut plurimum lacinias profunde oblongas, irregulariter dentatas divisa, foetida, amara. *Helleborus foetidus* L. BLACKWELL Tab. 57. Crescit in Europa temperata. Helleboro nigro fuerunt,

qui eum substituerent, quanquam violentius eum agere vulgo contendunt. *Folia ad Drachmam unam pro dosi adhibentur.*

HELLEBORUS NIGER, *schwarze Nieswurzel*. Radices inodoræ, subacerbi saporis, ex crasso capitulo innumeras fibrillas emittunt, aliquot pollices longas, extus nigræ, intus albæ. *Helleborus niger* L. *BLACKWELL* Tab. 506. Alpium calidioris Europæ. Nostras hyemes facillime fert. Aqua inde destillata acris perhibetur & purgans; Extracti Aquosi sicci quartam sui ponderis partem largitur. Has Radices quo calidiore sub cœlo adoleverint eo esse efficaciores observarunt Autores. *Stimuli instar Purgantibus aut Resolventibus adjiciuntur; Dosis earum qua Infusi ad Drachmas tres, qua Extracti, Purgandi scopo, ad Drachmam semis præscribi solet.* In Germania Septentrionali loco harum Radices Adonidis Vernalis L. recipi dicuntur.

HELENÆ S. RADIX. Radices rotundæ, leviter angulatae, gryseo-nigricantes, striatæ, Avellanam majorem æquant, duræ, intus lutescentes, Cardamomum fere olent ac sapiunt, in medio perforatæ & filo appensæ ad nos transmittuntur ex Florida. *Ad Ventriculum Roborandum & Urinam pellendam efficaces feruntur; a quadam Cyperi specie suppeditari dicuntur.*

HELMINTHOCHORTON, *Lemithochorton, Melitocortum, Coralline de Corse ou de Malte*. Substantia ex valde tenuibus fibris sibi invicem intextis constans, rufa, odoris marini nauseosi, saporis salini, inter dentes non stridula, sed lente scens. In Mari quod Corsicam alluit colligitur; *Conservæ* species esse videtur, a Botanicis, quibus ejus in ipso natali loco examinandi potestas est, determinanda. Inhærescentibus fordibus aqua elutis depuratum cum Acidis non effervescit, aqua infusum rubedinem exuit & cito putrescit, multum mucilaginis aquæ, in qua agitur, impertit, paucillum admodum Resinæ vehit & fere tantundem Salis communis, Salis mirabilis Glauberi, Selenitis atque Alkali fossilis. *Usus ejus pluribus abhinc seculis in Corsica scopo Anthelmintico celebratus, paucis demum retro annis in Gallia etiam comprobatus invaluit. Datur ad Drachmam unam pro dosi in substantia, cum Aqua etiam tam Infusum, quam Decoctum efficaciam servat.*

HEPATICA ALBA, *Herzblümlein*. Folia cordata, obtusa, crassiuscula, leviter amaricantia. *Parnassia palustris* L. Vulgaris per Europam planta. *Sunt, qui vim ei Subadstringente m-
tribuant.*

HEPATICA FONTANA, *Hepatique d'eau, Steinleberkraut*. Folia subrotunda, lobata, superne ex obscuro viridia, splendens, areolis distincta, inferne fusca, radículas emittentia, insipida & inodora. *Marchantia Polymorpha* L. Univerſæ Europæ. *Aperiendi scopo sub Infusi forma quandoque recipitur.*

HEPATICA NOBILIS, *Leberkraut*. Folia petiolata, in tres lobos obtusos divisa, cum petiolo pilosa, insipida, inodora. A nemone *Hepatica* L. BLACKWELL Tab. 207. Vulgaris per Europam. *Aperiens esse putatur.*

HEPATICA STELLATA, *Matrisylva, Muguet des Bois, Waldmeister*. Folia oblonga, angusta, ciliata, obtusa, leviter salina, grate olentia. *Asperula odorata* L. BLACKWELL Tab. 60. In Europa, præter maxime Septentrionalem, ubique obvia. *Aperiendi ergo Vino infundi subinde solet.*

HERMODACTYLI. Radices ad figuram triangularem accedentes, ad margines contractæ, una facie plana & sulco longitudinali notata, altera convexa, extus flavicantes, intus albæ, friabiles, odoris & saporis expertes. *Colchicum Illyricum* GRONOV. Syriæ. *Alvi ducendæ gratia olim ad aliquot Drachmas in substantia, ad Drachmas sex in Infuso adhibebantur.*

HERNIARIA, *Tourquette, Herniole, Bruch- vel Harnkrautel*. Cauliculi teretes, *Foliolis ovato-acuminatis & glomerulis Florum* lateralium obſeſſi, inodori, levissimo salino sapore imbuti. *Herniaria hirsuta & glabra* L. BLACKWELL Tab. 320. Per omnem Europam obtinet. *Herniosis & Calculosis conducere fertur.*

HIPPOCASTANUM, *Maronnier, wilder vel Roscastanienbaum*. Cortex ex gryſeo-nigricans, intus ferrugineus, sapore admodum adstringens & amarus. *Æsculus Hippocastanum* L. Asiæ Septentrionalis arbor, hodie copiosissime

per omnem Europam colitur. *Fuerunt qui eum Cortici Chinæ substituerent.*

HIPPOPOTAMI DENS, *Dent du Cheval marin*, *Walrosszahn*. A basi ad apicem usque incurvus, magis magisque angustatus, lineis longitudinalibus parallelis, quas ad basin fecant circulares, insignis, apex albilimus conum vertice aduncum refert. Est Laniarius Hippopotami Amphibii L. Ad fluvios Africae & Asiae degentis quadrupedis. *Ad sistendos Spasmos & Hæmorrhagias celebrabatur.*

HIRCUS, *Bouc*, *Bock*. Capra Hircus L. Notissimum per Europam animal. *Sanguis inspissatus nigricat, empyreuma olet & sapit, olim sub forma Pulveris in Casu ab alto, nec non Sudorem excitandi ergo exhibebatur. Sevum ad colorem cærulescen-tem vergens, Bovino mollius est; in effectu medicato haud differt.*

HIRUNDINARIA, *Vincetoxicum*, *Dompte-Venin*, *Schwalbenwurzel*. Radices albæ, odoris proprii, eminentis, saporis acriusculi, subamari, ex uno capite crassiusculæ, dimittunt fibras longas, multum flexiles & varie tortas. Aesclepias Vincetoxicum L. Crescit in omni Europa, præter magis Septentrionalem, Angliam & Belgium. *Interdum sub forma Pulveris exhibetur; creberrime Decoctis tanquam Resolvens Excretionesque aquosas promovens additur.*

HIRUNDO, *Hirondelle*, *Schwalbe*. Hirundo Rustica L. Avis migratoria, Martis mense advenire, Augusto discedere solita. *A nostratibus mensis non admittitur. Pulli in olla tecta in Pulverem nigrum combusti olim contra Epilepsiam laudabantur; Nidus ex luto præcipue structus sub forma Cataplasmatitis contra Anginam laudatur.*

HIRUDO, *Sangsuë*, *Blutigel vel Egel*. Hirudo medicinalis L. Vermis oblongus, planus, ex viridi-nigricans, superne lineis transversis nigricantibus distinctus, inferne flavus. Verno & æstivo tempore colligitur, in aqua asservatur. *Chirurgicæ arti servitura.*

HORDEUM, *Orge*, *Gerste*. Semina ovali-oblonga, utrinque acute angulata, facie convexa fulco notata, sub cuticula pallide flava, farinacea, alba, dulcia sunt. **Hordeum**

deum vulgare L. BLACKWELL Tab. 423. Hexastychum L. & Distychum L. promiscue apud nos coluntur. Hordeum cuticula privatum, Veterum *Ptisana*, hodie *Decortictum*, integrum contra *Crudum* appellatur: Farina Hordei $\frac{3}{4}$ Mucilaginis largitur. *Præter vires Nutrientes, Refrigerantes quoque, Demulcentes, Resolventes habet. Panis ejus coctus albus est, diu viscedinis tenax, sed gravis.*

HORMINUM, *Gallitrichum, Orvale, Toutedbonne, Scharlachkraut.* Folia magna, cordato-oblonga, rugosa, villosa, ferrata, forti nec ingrato odore, sapore amaricante, linguam pungente prædita. *Salvia Sclarea* L. Planta biennis Europæ calidæ & Asiæ, nostræ hyemis admodum patiens. *Scopo Roborandi & Spasmos sistendi subinde adhibetur.* Hac herba ad suavem Cerevisiæ & Vino conciliandum odorem vulgo utuntur; sed sunt Auctores, qui inde Inebriandi Capitisque dolores excitandi vi id genus poculenta infici contendunt. Certe ejusmodi effectus ab inerti *Salvia pratensi* L. metuere, ineptius videtur. Quin *Salviam Sclaream*, etiam *Salviæ Hormino* L. evidenter quippe debiliori præferendam esse puto.

HYACINTHUS, *Jacinte.* Est Gemma limæ pariter ac igni resistens; colore rubro, submissa flavedine, distincta & hic *Orientalis* dicitur; qui in Officinas recipitur *Occidentalis* colore quidem priori proximus, sed & aliquanto levior & mollior est; Igne etiam funditur. Nitrum fluor purpureo-fulvum L. passim in Europæ montibus occurrit. Ex Terra Silicea, Calcarea, Aluminosa & Croco Martis compositus esse fertur. *Olim in Roborantium numero habebatur.*

HYOSCYAMUS, *Jusquiame, Bilsam.* Folia amplexicaulia, magnis sinibus excisa, tomentosa, odore narcotica, sapore fatua; *Semina* parva, rotunda, cinerea, inodora. *Hyoscyamus niger* L. BLACKWELL Tab. 550. Ubique locorum in Europa progignitur. *Semina Olei unguinosi $\frac{1}{2}$ circiter fundunt. Hyoscyamum per omnes sui partes, vel exigua dosi, tristissimos effectus Narcoticos edidisse Observatores monent. Folia extus feliciter Tumoribus induratis, sub forma Cataplasmatum, applicantur. Succus inspissatus.*

tus nomine Extracti datur ad sopiendos motus Nervorum excedentes; a Granouno fuisse, qui, sensim augendo dosin, ad Drachmam semis usque processerint, relatum lego.

HYPERICUM, *Millepertuis, Johannis-Kraut.* Summitates ramis angulatis, glabris, punctis nigricantibus passim distinctis, *Folia* gerunt sessilia, ovata, obtusa, integerrima, punctis pellucetibus insignita, junctosque his *Flores* quinquepetalos, flavos, fasciculatim positos, calycibus glabris sustentatos, odore & sapore exiguis. *Hypericum perforatum* L. BLACKWELL Tab. 15. Vulgaris Europæ planta. Scite quoque *Hypericum quadrangulum* L. in usus medicatos recipitur magis resinofum. Omnibus menstruis colorem rubrum *Hypericum* affricat. *Scopo Balsamico olim Summitates ad Infusa interna recipiebantur; hodie Oleum cum eis infusum extus applicatur.*

HYPOCYSTIDIS SUCCUS. Massa nigra, solida, difficulter diffringenda, saporis aciduli & acerbi; exprimitur ex *Baccis Cytini Hypocistidis* L. Europæ calidæ progeniei. Sole inspissatur. In Aqua æque ac Spiritu Vini solubilis est. *Olim ad eosdem ac Succus Acaciæ usus adhibebatur.*

HYSSOPUS, *Isop.* *Folia* oblonga, acuta, viridia, proprio & fragrante odore similitque sapore, amaricante præterea & aromatico prædita. *Hyssopus officinalis* L. BLACKWELL Tab. 296. In Europa calida sponte crescit, nostrarum hyemum patiens est. Olei odorati $\frac{1}{48}$ fundere dicitur. *Datur sub forma Infusi, vel Syrupi, vel Aquæ destillatæ Muci Pulmonalis Incidendi causa. Extus Sugillatis sub forma Epithematis aut Fotus applicatur.*

HYSTRICIS LAPIS, *Porcinus, Pedro del Porco.* Malacensis & Zeylanicus exstat, prior etiam simpliciter *Lapis Malacensis* dictus, posteriore multo majoris venit; Ovi columbini circiter magnitudinem habet, utrinque compressus, cornei suffusa rubedine coloris, lævis, splendens, aquam affricatu suo, Saponis instar, viscidulam reddit. *Zeylanicus* nigricans Ovi gallinacei magnitudinem fere æquat, formamque Succu inspissati refert. Uterque amarissimus aquam etiam, cui

immergitur suo sapore imbuat. Erinacei Malacensis L. Asia Meridionalis Quadrupedis Calculi fellei esse dicuntur. *Celebratam virium hujus Lapidis in morbos Malignos efficaciam, cujus famam enorme, quo venduntur, pretium secundaverat, experientia non confirmavit.*

JACEA, *Pensée, Dreyfaltigkeit*. Folia petiolata, ovato-lanceolata, profundioribus dentibus notata, inodora sunt, sapore glutinoso palatum afficiunt. Viola tricolor L. BLACKWELL Tab. 44. Occurrit per omnem Europam. *Foliorum recentium Infuso Cathartice vires inesse dicuntur, quem in finem Unciæ quatuor pro dosi præscribi solent. Folia exsiccata gratum Fæni odorem spirantia, cum Lactæ cocta & per aliquot septimanas infantibus exhibita Crustam lacteam curare Observationes testantur.*

JACOBÆA. Folia amplexicaulia, ovato-oblonga, ad nervum usque pinnis denuo pinnatis pinnatifida, læte viridia, subadstringentia. Senecio Jacobæa L. Vulgaris per Europam. *Roborandi scopo interne, Traumatico externe, hinc & inde olim commendabatur.*

JALAPPA. Taleolæ mox rotundæ, mox oblongæ, cortice nigricante, rugoso, substantiam cingunt gryseam, nigris striis variegatam; odorem habent proprium, nauseosum, similemque saporem eminentis insuper acrimoniæ. Quo sunt graviores, quoque pluribus striis nigris interstinctæ, eo habentur meliores. Ab aliquot retro annis integræ mittuntur radices, pugnum æquantes, rotundæ, superne leviter compressæ, inferne tubere, tanquam pedunculo, suffultæ. Non a Mirabili L. sed a Convolvulo Jalappa L. planta Mexicana, apud nos per hyemem in caldario asservanda, desumitur. *Ad Scrupulos duos sub forma Pulveris data, non sine irritatione Alvum ducit, quem verò effectum cum unice vi Resinæ edat, cujus in quibusque taleolis non eadem ratio obtinet, consultius omnino est, Resinam quam Radices exhibere.*

JASMINUM. Flores ex longo tubo quinquefidi, albi, interdum roseo-variegati, fragrantissimi, insipidi. Jasminum officinale L. Indiæ proprium, copiose in hortis Europæis colitur; a nostra hyeme in frigidario tuetur. *Flores recentes Fra-*

*grantium effectus edunt. Oleum destillatum dare recusant, Oleum Behen cum eis infusum Olei Jasmini nomine in officinis pro-
stat, ad usus Cosmeticos ob gratum, quem large spargit, odorem
aptatum.*

ICHTHYOCOLLA, *Colle des poissons, Hausblase.* Massa cylindroidæ; in spiras convolutæ, manifeste ex laminis ef-
formata, digitum circiter crassæ, insigniter tenaces, inodo-
ræ & insipidæ. Quo magis flavæ aut brunæ, eo sunt deterio-
res. Paratur ex Vesicis quarumvis *Acipenseris* L. specierum,
unde tunicæ internæ desumuntur argenteo splendore nitentes,
quarum plures preli ope una comprimuntur, convolvuntur,
& filis suspensæ exsiccantur; Aqua penitus dissolvitur, quam
quidem viscedine imprægnant, adeo ut ad glutinanda vitrea
& porcellanea vasa adhiberi possit, Vina etiam turbida clarifi-
cat, nec non ad alias artes adhibetur. *Cum Aqua in Gelati-
nam redacta Demulcendi & Relaxandi scopo jusculis immittitur,
Clysmatibus adjicitur.*

IMPERATORIA, *Ostrutium, Meisterwurzel.* Radix ali-
quot pollices longa, compressa, rugosa, annulis transversis
velut in articulos distincta, extus cinereo-fusca, intus alba,
odoris proprii ad Angelicam accedentis, saporis acris, amari,
aromatici. *Imperatoria Ostrutium* L. BLACKWELL Tab.
279. Montana Europæ planta, sed in hortis etiam cultu faci-
lis. *Valide tam humores Resolvit, quam solida Stimulat, ad Infusæ
quandoque recipitur.*

INDI FOLIA seu *Malabatri.* Magna sunt, petiolata,
ovato-lanceolata, tribus nervis ad basin coëuntibus interfecta,
ex viridi flavescentia, odorem spirantia levem, sapore subaro-
matico Caryophyllos referentia, mucilaginoso. *Laurus Cas-
sia.* Arbor Indiæ. Rarissime hodie usurpantur.

INDIGO. Massæ pulcherrimæ, variæ tam figuræ quam ma-
gnitudinis, cæruleæ, insipidæ & inodoræ, diffractæ Cupri
rubedinem splendore referunt. Est Fæcula variarum *Indi-
goferæ* maxime *Tinctoriæ* L. specierum, quæ ex Asia in
Americam translata, ibidem jam copiosissime coluntur; opti-
mus a *Quatimalo* adducitur, quem *Dominicensis* sequitur, *Ca-*

rolinensem post se relinquens. Pulchritudo Fæculæ a justo putredinis gradu pendet. Color cæruleus neque Acidis additis rubescit, neque Alcalinis viridescit. *In arte baphica creberrimus ejus usus, in Pharmacopoliis vero propter colorem rarissimus, cetera nullus est.*

IPECACUANHA. Radix aliquot pollices longa, vix linea crassior, varie flexa, rugis circularibus eminentibus distincta, extus ex nigricante grysea, intus albissima, odore tenuis, nauseosa, sapore subfalina. An ex quadam Violæ L. Euphorbiæ L. Loniceræ L. specie desumatur, in dubio adhuc relinquitur. Mittitur nobis ex Brasilia. *Emetico scopo ad Scrupulum unum datur; minores etiam doses efficaciam præstant; ad tertiam Grani partem singulis trihoriis data Hæmorrhagias Uteri curat. Specificis Antidysentericis adscribitur. Grysea, quæ & major & crassior & mitior esse & ex regno Peruviano mitti dicitur & Alba Cayennæ, plane iners, apud nos saltem non adhibentur.*

IRIS FLORENTINA, Violenzurzel. Radices varia crassitie & longitudine, cuticula externa ablata, albæ sunt, intus leviter flavescens, parum compressæ, hinc inde tuberculis notatæ, odore fragrantæ, Violas referentes, sapore acres, amaricantes. Iris Florentina L. BLACKWELL Tab. 414. Crescit in Italia; nostras hyemes innocua fert. Radices longiores & rectæ sub nomine LONGARUM seorsim asservari solent; *ad morbos a Muco oriundos cum successu adhibentur. Extus ad Dentifricia, Epithemata Resolventia, usus Cosmeticos, tornatos quoque inde globulos Fonticulis inserunt. Longæ infantibus dentientibus admordendæ præbentur.*

IRIS NOSTRAS. Radix fibrosa, crassa, rugosa, flavicans, intus alba, leviter amara, subsequente sapore Violas referente. Iris Germanica L. BLACKWELL Tab. 69. Europæ temperatæ; *Vires Purgantes & Diureticas habere dicitur. Quod Cl. MONTET animadvertit, eam cuticula scilicet externâ ablata, & calore satis valido exsiccatam priori simillimam evasisse, ego quoque observavi, sed odor elapsis demum aliquot annis omnem suavitatem assequitur.*

JUBABÆ CORTEX. In frustis aliquot pollices longis, impariter crassis, una facie concavis ad nos ex India transvehatur, sulcis longitudinalibus rugosus, ferrugineus, intus pallidior, odore & sapore Vanigliæ proximus, sed debilior, levissime amaricans. *A virtute Nervina laudabatur & Vanigliæ substituebatur.*

JUDAICUS LAPIS. Olivæformis est, albus, totus striis longitudinalibus notatus, petiolo instructus, intus ex lamellis subpellucidis efformatus, inodorus, insipidus, in Acidis cum effervescentia penitus dissolubilis. Helminthus Judaicus L. Aculeus Echinorum in lapidem conversus, passim per Europam occurrit. *Calculum comminuere quondam putabatur.*

JUGLANS NUX, *Nux Persica vel Regia, Noix, Nuss.* Putamen subrotundum, apice prominente instructum, viride, tenax, digitos nigro colore inficiens, odorem non admodum gratum, saporem habet adstringentem, amarum; *Officulum* durum est, albicans, rugosum; *Nucleus* albus, quadrilobus, lobis anfractuosis, gibbosis, dulcibus, septo interstinctus, cuticula tectus flava, adstringente, nonnihil etiam acri. **Juglans Regia L.** BLACKWELL Tab. 247. Syriæ & Persiæ. Copiosissimus ejus per Europam temperatam proventus est. Exsiccatae Nuces Juglandes dimidium sui ponderis Olei fundunt flavicantis, dulcis, suavissimi, frigore non spissescantis, ad usus pictorios aptissimi. *Putamen Saccharo conditum Stomachico scopo, ejusdem Extractum aquosum Anthelminthico laudatur. Nuclei in cibum recipiuntur & contra Vermes commendantur.*

JUJUBÆ, *Jujubes, Brustbeeren.* Drupæ ventricosæ, cylindroidæ, utrinque pulvinatæ, sub cuticula sicca, præ laxitate rugosa, rubra, *Pulpam* vehunt flavam, dulcem, spongiosam, *Nucem* complectentem utrinque acutissimam, & sub hujus officulo ventricoso *Nucleum*, qui sub cuticula rubra, medullam albam continet. **Rhamnus Ziziphus L.** BLACKWELL Tab. 569. Copiosa in Europa Meridionali, in nostris regionibus a rigore hyemis in frigidario defendenda. *Recipiuntur Drupæ ad Decoctione Pefforalia.*

JUNIPERUS, *Genèvre, Wachholder.* Lignum prostat in

minora frustra sectum, album, cortice tectum extus gryseo, intus ferrugineo; odorem spargit aromaticum & fragrantem, similem etiam accensum emittit fumum; sapor leviter aromaticus est. *Baccæ*, quæ non nisi biennes colliguntur & Pifa tam magnitudine quam figura æquant, nigro-cæruleæ sunt, superne exiguo umbilico notatæ, pulpa earum dulcis, viscida, ferruginea, aromatica, grate odorata, tria femina concludit. *Gummi*, quod etiam *Sandaracæ Gummi* appellant, Mastiches grana tam figura, quam colore refert, inodorum, dentibusque submissum minime tenax, sed friabile deprehenditur. *Juniperus communis* L. BLACKWELL Tab. 187. Vulgaris per Europam Arbuscula. *Baccæ Olei* odorati $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$ fundunt, multum calidi, quapropter internus ejus usus rarissimus est. *Extus Roborandi & Resolvendi ergo adhibetur*. In Europa Meridionali species, modo dicta, Gummi fundit, quod in Africa quoque aliæ Juniperi species faciunt, igne mollescit, sed fundi recusat, in Spiritu utique Vini, in Aqua nequaquam solubile est, in Oleis etiam dissolvi negant Observatores. *Lignum aqua decoctum Sanguinem egregie Depurare, Excretionesque aquosas promovere Observatores testantur; Suffitum ejus ad purificandum aërem aque ac discutiendos Rheumatismos & Œdemata adhibent. Baccæ laudantur ad aperienda Viscera Abdominalia & augendas Excretiones aquosas, adhibentur vel sub forma Decocti, vel cum aqua ad consistentiam usque Mellis coctæ, sub titulo ROB. Extus ad Suffitus & Frontalia recipiuntur. Gummi vel potius Refina Suffitibus Discutientibus adjicitur, ad Vernices maxime adhibetur.*

KIKEKUNEMALO GUMMI. Frustra variæ magnitudinis flavicantia, semipellucida, extus tenuissima, nigricante crusta obducta, odorem gratum spirantia, simili sapore resinoso prædita, inter dentes lentescencia, calore liquabilia, inflammabilia, accensaque fumum emittentia suave & fortiter olentem. Olei odorati albicantis, leniter acris $\frac{1}{3\frac{1}{2}}$ fundere dicuntur. *Suffitus eorum laudabatur contra Rheumatismos & Erysipelas. Alcohol dissolutum Kikekunemalo egregium Vernicem constituit.*

KINO. Gummi rubrum, adstringens Gambiense. Prostat

in frustis variæ magnitudinis, ad Juglandis usque volumen sese extendentibus, splendentibus, ex rufo-nigricantibus, extus nubecula ferruginei coloris obductis, odore vacuis, sapore fortiter adstringentibus, forma exsiccata inspissatione massas referentibus, in aqua pene omnino diffluentibus. Ex regione Africæ, fluvio Gambiæ adjacente, quatuor abhinc lustris ad nos pervehi cœpit. *Laus ejus in Diarrhœa Chronica, Fluore albo, nimio Mensium fluxu &c. sanando ponitur.*

LABLAB. Est Semen ovatum, nigrum, hilo albo eminente, semilunari notatum, odore, sapore, viribus cum *Phaseolo vulgari* convenit. Desumitur a Dolicho Lablab L. Ægypti progenie, passim in nostratibus quoque hortis adulescente.

LAC, Lait, Milch. Liquor ex mammis animalium emulsus, vix odoratus, dulcis sapore, spissiusculus, albus, sponte in *Cremorem, Serum & Caseum* secedens, qui secessus calore adjectisque Salibus acceleratur, Saccharo contra aut bullitu cavetur. Differt inter semet Lac pro vario animalis, unde desumitur, genere; Vaccinum ego vidi ubertate feri vincere Humanum & Caprinum, cedere Cremoris & Casei copia Ovillo ac Caprino; Ovillum vero superare reliqua omnia Cremoris abundantia. Sed in eodem etiam genere Lac pro singulorum Animalium ætate, vitæ genere, pabulo; distantia a partu, tempore, quo emulgentur &c. differt. Lac leni calore in pulverem redactum *Franchipane* dicitur, cui, si aquam superfuderis, obtinebis *Serum Lactis dulce HOFFMANNI. Nutriendi, Demulcendi, Relaxandi ergo adhibetur.* Lac quod cærulescit aut flavescit, alienum odorem aut saporem prodit, cujusque gutta ungui instillata diffluit, rejiciendum est.

LAC LUNÆ, Agaricus mineralis. Terra calcarea, alba, tenera, spongiosa, digitos fœdans, in qua agitatur aqua, diutius suspensa hærens, lacteo eam colore inficiens, inodora, insipida. Calx Gur L. Fissuris montium crebro in modum spongiæ adhærescit. *Absurde satis Lac augere credebatur.*

LACCA. Resina ex ramulis sub forma granulorum suspensa, dense rubra, non sine flavedinis vestigio, manifeste
ex

ex cellulis sibi invicem agglutinatis efformata, inodora, sapore levissime amara, a quodam Insecto efficta, quod Formicis vulgo adnumerant & ramulis Croton lacciferi L. Indiæ Orientalis, Bengalæ & Pegu Arboris; & hæc quidem *Lacca in baculis* appellatur: inter dentes lentescit, flammam concipit, inflammataque suavem odorem spargit, aquam tingit, qua tamen non dissolvitur, nec Oleis dissolubilis esse dicitur. *Lacca in granis* ab ista in baculis eo tantum differre dicitur, quod hæc de baculis abrafa, aqua calida digesta, & denuo exsiccata est; irregularis figuræ & læte rubra, fusioni resistit; *Lacca in tabulis* in frustis variæ magnitudinis, minus quam antecedentes rubris prostat; ex *Lacca in baculis* parari dicitur, postquam ea ad usus baphicos fuerit adhibita, fusa. *Rarissime intus scopo Adstringendi datur; extus ad Dentifricia adhibetur. Lacca in tabulis unice ad Ceram sigillatoriam recipitur.*

LACERTA, *Lezard, Eidexe.* Lacerta Agilis L. Per omnem Europam occurrit. Amphibium quadrupes, caudatum, squamosum, olivaceo colore nitens. *Vulnerariæ vires ei vulgo tribuuntur. Adhibetur Oleum unguinosum cum ea infusum.*

LACRYMA JOB. Semen nitidum, inverse turbinatum, sub cortice duriore, cinerascens includit nucleum membrana tectum, rotundum, rufescentem, infipidum, inodorum. Coix Lacryma Job L. Indiæ planta, apud nos non perennat. *A quibusdam ob virtutem Diureticam commendabatur.*

LACTUCA, *Laituë, Salat.* Folia tenella, colore, magnitudine, figura, crassitie &c. multum inter se diversa, ad usus cibarios ante plantæ caulescentiam recipienda. *Semina* oblonga sunt, utrinque acuta, sub cuticula leviter flavescens seu nigricans, paululum medullam albam & dulcem includunt. *Lactuca fativa* L. BLACKWELL Tab. 88. Innumerae varietates in hortis coluntur, quæ in duo genera discedunt; unum earum, quarum folia interna, exterioribus teneriora in caput rotundum coeunt, *Laituë pommée, Kopffalat*, alterum foliorum in meditullio arctius compactorum, oblongorum, *Chi-*

con, Rœmischer vel welscher Salat. Folia recentia inter cibaria referuntur, scopo medicato ad Decocta Aperientia recipiuntur. Semen quatuor frigidis minoribus olim adnumeratum exsolevit.

LACTUCA VIROSA, Sylvestris. Folia hastata, laciniis ferratis sinuato-laciniata, duriuscula, glauca, costa dorsali aculeata, odorem virosum, saporem acrem amarumque exhibentia. *Lactuca Scariola & Lactuca virosa L. Vulgares per Europam plantæ. Succus lacteus, quem fundunt plantæ, exsiccatu Opio simillimus habetur; eundem ante inspissationem probe clarificatum ad aliquot Drachmas per diem partita dosi datum Hydropicorum aquas evacuisse, quin imo ipsum morbum curasse recentissime narratur.*

LADANUM GUMMI. Refina nigra, leviter odora, insipida, friabilis, manuum fotu emollitur, igne non funditur, accensa fumum proprii non ingrati odoris emittit. Quod vulgo in officinis prostat ex Creta advectum, in placentulas tortum, multa arena nigra inquinatum, *en Tortis* dicitur; *Canadense Liquidum* dictum, massis in modum Extracti mollibus constat; *Hispanicum* sub forma bacillorum Succi Liquiritiæ similium accipimus; *Barbaricum* massas sistit Hispanico & Cretico molliores; recensetur præterea adhuc *Cretica* species, quæ in majoribus massis Emplastri fere molliem, colorem ex rufo-nigricantem, odorem ceteris fere fragrantiozem habentibus, vesicis involuta nobis transmitti & *Ladanum en masses* appellari dicitur. *Creticum* Cistus *Cretica L.* exsudat, Archipelagi indigena, apud nos per hyemem in frigidario asservanda. Nec in Aqua, nec in Oleis dissolubile fertur. Oleum odoratum fundere dicitur. *Hodie vix ad alios usus, quam ad Suffitus recipitur.*

LAMIUM videatur **GALEOPSIS.**

LAPATHUM, Patience, Grindwurz. Radices fibrosæ, pollicem circiter crassæ, extus nigrae, intus lutescentes, inodoræ, gustu acriusculæ, paululum etiam adstringentes, subamaræ. *Semina* sunt triquetra, valvulis dentatis, singulis graniferis, rufescentia, austera. *Rumex acutus L. Vulgaris* per Europam planta. *Radices Aperiendi, nec non Sanguinem Depurandi*

gratia in Decocta recipiuntur. Extus ad Lotiones & Balnea contra Scabiem adhibentur. Semina olim ob Adstringentem & Alexipharmacam virtutem a nonnullis laudabantur.

LAVENDULA, *Spica*, *Spica Nardi*. *Folia* solidiuscula, obtusa, incana, pergrati odoris, saporis aromatici. *Flores* asservantur calice irregulariter quadrifido, tomentoso inclusi, cærulei, bilabiati, parvi, suavissime odorati & aromatici. *Lavendula Spica* L. BLACKWELL Tab. 294. Europæ calidæ; nostras hyemes innoxias fert. Ex nostratibus floribus $\frac{1}{256}$ Olei odorati obtinui. *Oleum* fragrantissimum & optimus *Spiritus abstractitius* ex Gallia Meridionali sub nomine *Eau de Lavande* nobis mittitur. *Oleum-spicæ*, quo ad Encausticam & Vernices utuntur, est *Oleum Terebinthinæ*, cui paucillum Olei *Lavendulæ* adjectum est. *Lavendula extus Nervino scopo nec non ad Discutiendum adhibetur.*

LAUROCERASUS. *Folia* breviter petiolata, firma, ovali-oblonga, utrinque viridia, superne lucida, inodora, amaricantia, sapore Nucleos Persicorum referentia. *Prunus Laurocerasus* L. Ex Trapezunte in Europam translata, frequenter in hortis colitur, nobis per hyemem in frigidario asservanda. *Oleum* odoratum fundere hæc folia dicuntur; menstrua aquosa æque ac spirituosæ cum eis infusa gratissimo, quem a Nucleis denominant, sapore inde imbuuntur. *Aquam inde destillatam tam brutis, quam hominibus venenatam esse, testantur Observatores; eandem ad Guttas sexaginta aliquoties de die datam potentissimum Viscidi tenacis resolvendi remedium esse; Foliorum Infusum in Obstructionibus Hepatis; eadem cum farina in Cataplasma redacta in Tumoribus scirrhis egregios effectus edere Recentioris Medici Angli observatio est.*

LAURUS, *Laurier*, *Lorber*. *Folia* petiolata, ovato-lanceolata, acuta, firma, multis nervis notata, proprium odorem gratum spirantia, simili sapore multum aromatico, amaricante prædita. *Baccæ* ovatæ, nigræ, exiguo acumine notatæ, levissime rugosæ, sub cuticula tenera & fragili nucleum continent colore Castaneis fere similem, bipartitum, odore laurino, non admodum grato, sapore acri, aromatico, amaro, nauseoso imbutum. *Laurus Nobilis* L. BLACKWELL

Tab. 175. Europæ calidæ propria arbor, nobis in frigidario a nostræ hyemis rigore defendenda. Folia Oleum stillatitium exhibere dicuntur; ex Baccis Olei unguinosi, viridis, nauseosi, amari consistentiam Unguenti odoremque baccarum habentis $\frac{1}{16}$ obtinui. *Foliorum hodie crebrior in culinis, quam in Medicina usus est. Baccæ Roborant & in Renes æque ac Uterum agere dicuntur, sed Sanguinem nimis exæstantes nunquam intus dandæ, ne vendendæ quidem promiscue sunt a Pharmacopolis, ob vehementem, qua in Uterum agunt, virtutem. Externus earum usus in Abstergendo versatur. Oleum earundem unguinosum ex Italia nobis mitti solet, a vi Resolvente potissimum commendabile.*

LAZULUS. Lapis pulcherrime cæruleus, polituram admittit, ad Chalybis ictus nullas scintillas emittit, fortiore igne funditur, maculis interdum Pyritaceis conspersus est, Spiritibus acidis in gelatinam liquatur; colorem a Ferro, quod vehit, habet. Cuprum Lazulus L. Absurdissima denominatio, cum in eo ne vestigium quidem Æris extet. Zeolithis adscribendus. Venit ex Oriente. In officinis, more quam maxime reprehendendo *Lapis Armenus* ipsi non raro substituitur. *Cordiales habere vires olim putabatur. In tenerrimum pollen tritus Ultramarinum constituit.*

LEMNIA TERRA. Argilla in bacillos eformata, cum admixta rubedine flavicans, insipida, inodora, superficies pulverulenta digitos tingit, dorso per inæqualia intervalla varia signa impressa sunt. Aliæ quoque Argillæ hodie sub hoc nomine prostant. Argilla Lemnia L. Ex Turcia venire dicitur. *Mirandum profecto est, inertem hanc terram, quæ adscriptas sibi virtutes soli superstitioni debebat, Veterum tamen auctoritate per tot Secula in celebritate versari potuisse.*

LENS, Lentille, Linse. Semen rotundum, utrinque convexum, margine acuto cinctum, cineracei coloris, qui vero coctione, cum medulla exigui odoris, leguminosi saporis, fuscus evadit. Ervum Lens L. Europæ Meridionalis proprium; passim in agris colitur. Extracti Gummosi $\frac{1}{4}$ largitur. *Recipiuntur Lentæ in cibum. Olim earum Decoctum Variolis laborantibus salubre ferebatur.*

LENS PALUSTRIS, *Wasserlinsen*. Folia parva, ovata, in cæspites cohærentia, succulenta, insipida, inodora, singula inferne filamentum emittunt. **Lemna minor** L. **BLACKWELL** Tab. 380. Passim per Europam occurrit. *Refrigerandis partibus Inflammatis sive per se, sive ex Lacte cocta imponitur.*

LENTISCUS videatur **MASTYX**.

LEPIDIUM, *Passerage, Pfefferkraut*. Folia ovato-lanceolata, serrata, Nasturtini tam odoris, quam saporis, & hujus quidem fatis evidenter linguam ferientis. **Lepidium latifolium** L. Gallix & Angliæ indigena, hortisque nostris, in quos recepta est, improbo suo reptatu incommoda planta. *Condimenti loco cum Carne comeditur; a quibusdam contra Scorbutum, Sanguinis impuritates &c. commendatur.*

LEPUS, *Lievre, Haas*. **Lepus timidus** L. Notissimum per universam Europam & justo frequentius Quadrupes; nondum anniculus, & in locis præsertim montanis degens, ad cibum optimus est. *Astragali, Talons, Haasensprung*, qui *Talorum* nomine veniunt, sunt ossa oblonga, albida, uno extremo ginglymoideo; altero obtuso, corpore inter utrumque contracto. *Laudabantur ob vires Diureticas; Axungia* Linimenti consistentiam, odorem habet injucundum. *In Resolvendo laudatur. Pili bruni & molles olim ad Unguenta Hæmorrhagias sistencia recipiebantur.* **Lepus** in olla tecta in carbonem conversus, sive *Ustus*, *Lithonriptico scopo exhibebatur.*

LEVISTICUM, *Levêche, Liebstœckel*. *Radices* fibrosæ, flavæ, intus albæ, sapore proprio, non ingrato, acri, aromatico, dulciculo etiam, odore fragrante, non nauseoso, aromatico instructæ. *Folia* petiolata, duplicato-ternata, foliolis majusculis, cuneiformibus lobatis, superne incisus, odorem & saporem *Radicum*, utrumque tamen remissiolem habent. *Semina* ovalia, majuscula, tuberculo pyramidali terminata, alata, flava, tam sapore quam odore *Radices & Folia* superant. **Ligusticum Levisticum** L. **BLACKWELL** Tab. 275. In Alpibus Italiæ sponte, in hortis nostris culta crescit. *Oleum* odoratum fundere fertur. *Angelica vires, sed mitiores habet; contra Uteri morbos maximopere commendatur.*

LICHEN ISLANDICUS, *Purgiermoos*. Ex foliis efformatur suberectis, coriaceis, flexilibus, versus basin latioribus, intus fuscis, extus albis, laciniatis laciniis latiusculis, denuo laciniatis, ciliatis, exiguis lacunis adspersis, inodoris, amaricantibus. Lichen Islandicus L. Passim Europæ faxis accrescit. Cum aqua Gelatinam rubicundam formare, *exsiccat*, in pulverem redactus & Lacte elixatus in alimentorum locum subire; lenissime Alyum ducere Aqua cum eo decocta, aut pulmentum cum Lacte inde paratum Phthificis conducere fertur.

LIGUSTRUM, *Træfne*, *Hartriegel*, *Dintenbeerlein*. Folia ovato-lanceolata, integerrima, superne læte, inferne pallide viridia, leviter adstringentia & amaricantia. Flores infundibuliformes, recentes albi & fragrantés, exsiccati vero flavi, inodori. Ligustrum Vulgare L. BLACKWELL Tab. 140. Ubicunque Europæ, citra maxime Septentrionalem, domestica planta. Tam Folia quam Flores ad Gargarismata interdum recipiuntur. Iners omnino est Aqua inde destillata.

LILIUM ALBUM, *Lis*, *Lilie*. Radicum exsiccatarum squamæ, inter se separatæ, plus minus flexæ, duriusculæ, fragiles, carneo colore, insipidæ, inodoræ. Florum petala aservantur alba, membranacea, saporis & odoris vacua, odor enim & sapor una cum pulpa exsiccatione perit. Lilium candidum L. BLACKWELL Tab. II. Orientis progenies, copiose in hortis nostris colitur. Radices creberrime extus scopo Emolliendi & Suppurandi adhibentur; Flores recentes fragrantium effectus edunt, exsiccati plane inertes sunt; neque proprii quid habent Aqua inde destillata, vel Oleum cum eis infusum.

LILIUM CONVALLIUM, *Muguet*, *Mayenblümlein*. Flores campanulati, sexfidi, albi, amaricantes, dumque recentes sunt, suavissime olentes, exsiccati inodori. Baccæ rotundæ, rubræ, pulpa rubro-flava, plura semina vehenter fertæ, inodoræ, amaræ. Convallaria Majalis L. BLACKWELL Tab. 70. Crescit qua patet Europa. Flores recentes fragrantia sua Refocillant, exsiccati ad Pulveres Sternutatorios recipiuntur; Bac-

cas in Pulverem redactas Epilepticis salubriter datas fuisse relatum legimus. Aqua inde destillata & Spiritus abstractitius inertes sunt.

LIMAX, *Limaçon rouge, rothe Schnecke.* Est Vermis nudus, oblongus, crassiusculus, tentaculis instructus. *Limax subrufus* L. Frequens per Europam. *Visceribus exentis ad Juscula Antihectica recipitur.*

LIMON videatur **CITRUS**.

LINARIA, *Linaire, Harnkraut.* Folia angusta, oblonga, acuta, exigue amara, post exsiccationem inodora. Antirrhinum *Linaria* L. **BLACKWELL** Tab. 115. Vulgaris per Europam. *Hæmorrhoidibus applicatur sive ex Lacte cocta, sive in Unguentum recepta.*

LINUM, *Lin, Flachs.* Semina ovato-oblonga sunt, compressa, uno extremo acuta, cortice lævia, splendens, ex fulvo-albicantia, nucleum album & dulcem comprehendunt. *Linum Usitatissimum* L. **BLACKWELL** Tab. 160. Europæ Australis domesticum, passim per agros cultum. Semen Olei unguinosi circiter $\frac{1}{3}$, Mucilaginis ultra $\frac{1}{7}$ largitur; & ad hanc quidem extrahendam cum Aqua fervida Semen infundendum est. *Cum fervida infusum adversus Renum Dolores intus; ad Clysmata & Cataplasmata sopientia extus adhibetur. Olei inde expressi, flavi, insuavis internus usus contra Volvulum, Pleuritidem, Colicam præscribitur; sub forma Clysmatis injectum principem inter Medicamenta Anticolica & obstructam Alvum referantia locum tenet.*

LINUM CATHARTICUM. Caules filiformes, teretes, foliis ovatis, parvis, subacutis obfessi, inodori, amaricantes, levissime falsi. *Linum Catharticum* L. **BLACKWELL** Tab. 368. Vulgaris per Europam planta. *Cum aqua infusum aut sub forma Pulveris haustum Alvum ducere fertur.*

LITHARGYRIUM, *Litharge, Silberglätte.* Substantia friabilis, ex squamis plus minus rufescentibus aut flavicantibus, non raro splendentibus composita, sapore adstringens. Oritur ex Plumbo, Metalla nobilia in cineritio majore depurante; itaque vitrum Saturni est, Ære aliisque metallis ignobilioribus contemperatum. In *Lithargyrium Auri & Argenti* distinctio abscondita est. *Ad Unguenta & Emplastra recipitur.*

LOOK GUMMI. *Succinum Indiæ Occidentalis.* In fru-

stis permagnis nobis mittitur flavicantibus, pellucidis, tenues sed suaveolentibus, inter dentes lentescantibus, ad flammam fluentibus, flammam concipientibus, olidum fumum emittentibus, in Alcohole non dissolubilibus. Advehitur ex Africa. *Instar aliarum Resinarum adversus Odontalgiam & Cephalalgiam Temporibus imponebatur.* Non raro isti, quod *Gummi Copal* nomine venit, substituitur.

LOPEZIA. Radix cujus variæ crassitie frustra in Europam mittuntur, quale ego possideo B. GAUBII amicitia debetum, sesqui pollicem fere crassum, leve, album, solidum, cortice flavicante, rugoso, laxo, tactu fere tomentoso tectum. Radix nec odora, nec sapida, Cortex tenuiter amarus est. *REDDI Experiment. circa varias Res Natural.* Amstel. 1681. p. 138. Radicis, a JOHANNE LOPET in littore Africae repertæ, & ab eodem denominatæ, mentionem facit; diu neglectam GAUBIUS denovo in usum traxit & eam *sive in Decocto sive sub forma Pulveris ad Drachmam semis aliquoties de die datam in vario Alvi fluxus genere, Diarrhoea maxime colliquativa egregie conducere tam sua quam aliorum experientia confirmavit.* Enorme, quo Amstelodami venditur, pretium inhibuisse videtur ulteriora ejus tentamenta. Venit nobis ex Goa.

LUCIUS, Brochet, Hecht. Aquas dulces inhabitans Piscis. Efox Lucius L. digestu facilis. *Axungia Asciae Axungiae* fatis similis. *Fel* Humor liquidus, ex flavo viridis, amarissimi saporis, *contra Corneae vitia Abstergendi ergo usurpatur.* *Mandibula* inferior, antice sursum flexa, dentibus anterioribus parvis, posterioribus majoribus instructa, flavicans, insipida, inodora, *olim Pleuriticis commendabatur.*

LUMBRICUS TERRESTRIS, Ver de Terre, Regenwurm. Vermis calami anserini fere crassitie, coloris dilute rubicundi, odoris tenuis, ad mucidum vergentis, saporis expers. Lumbricus terrestris L. Ubivis obvius. Gelatinæ siccae $\frac{1}{2}$ inde obtinui. *Contra Arthritidem Succu expressi Uncia una pro dosi, aut exsiccatorem Pulveris Drachma semis exhibetur.*

LUNARIA RACEMOSA, Lunaire, kleine Mondraute. Folia crassiuscula, pinnis lunatis pinnatifida, inodora, sapore adstringente

adstringente prædita. *Osmunda Lunaria* L. BLACKWELL Tab. 420. Passim per Europam invenitur. *Plurimæ de ea circumferuntur fabellæ. Adstringendi scopo subinde adhibebatur.*

LUPINUS, *Lupin, Feigbohne*. Semen compressum, rotundum, margine leviter angulato, sub cortice albo medullam albam & amaram includit. *Lupinus albus* L. BLACKWELL Tab. 282. In hortis colitur. *Crebris in Aqua lotionibus amaritie demta, per Europam Meridionalem in cibum recipitur; apud nos Farina ejus Resolvendi & Abstergendi scopo extus adhibetur.*

LUPULUS, *Houblon, Hopfen*. Turiones sunt parvi, graciles, angulosi, exiguis nodulis distincti, extus subrufi, intus albi, gustu subamari, evidenter aromatici. *Strobili seu Flores* feminini sunt Amenta e squamis ovatis, ficcis, flavicantibus, laxis, extus leviter pubescentibus, intus glabris, uni communi axi affixis efformati; odorem aromaticum spirant, similemque produnt saporem amaritie submixtum. *Humulus Lupulus* L. BLACKWELL Tab. 536. Per omnem Europam crescit; cultura strobilorum non magnitudo modo, sed sapor etiam & odoraugentur. Turiones Extracti aquosi saporis salini $\frac{1}{5}$ largiuntur, Decoctum eorum rubrum est. *Primo vere exquisitum Olus præbent & ad Juscula aperientia recipiuntur, Strobilorum præcipuus ad Cerevisiam usus est. Laudantur ob vim Roborantem, Aperientem & Diureticam.*

LUPUS, *Loup, Wolf*. Animal quadrupes Cani simillimum, a quo sola vita sylvestri differre videtur. *Canis Lupus* L. Per omnem Europam occurrit; ejus *Hepar minus densum & rubrum Vino coctum, exsiccatum & in Pulverem redactum contra Hydropem & Hydrophobiam commendatur: Axungia nihil proprii habet.*

LYCOPODIUM, *Pied de Loup, Bærapp*. Semen Pollen Antherarum, tenuitate sua tactum fere fugiens, flavum, inodorum, linguam leviter adstringens, candelæ lumini incussum fulguris instar accenditur. Destillatione principia Cerae edere dicitur. *Lycopodium Clavatum* L. BLACKWELL Tab. 535. Passim per Europam crescit. *Internum ejus usum scopo Diuretico, sunt qui laudent; extus Intertrigini aspergitur.*

LYSIMACHIA, *Corneille, Perce-boffe, gelber Weiderich*. Folia ovato-lanceolata, margine ferrata, utrinque molliufcula, viridia, sapore linguam adstringentia. *Lysimachia vulgaris* L. BLACKWELL Tab. 278. Totius Europæ. *Tanquam Adstringens & Vulnerarium olim laudabatur, ad Gargarismata quoque recipiebatur.*

MACIS, *Fleur de Muscade, Muscatenblüthe*. Substantia membranaceo-pulposa, pinguiufcula, ex laminis angustioribus retis inflexis efformata, coloris, dum recens est, chermesini, exsiccata lutescentis, incumbit Nuci Moschatæ. Aqua marina conspersa, faccisque, aëre excluso atque prohibito, arctissime inclusa mittitur nobis ex Insulis Moluccis. Olei unguinosi, brunii, spissi, odoratissimi $\frac{1}{5}$; Olei destillati $\frac{1}{4}$ largitur. *Primarum viarum Roborandarum gratia tam cibus quam medicamentis adhibetur, Anodynæ inde sperantur vires.*

MAGNES, *Aimant, Magnet*. Est Lapis grysei plus minus lutescentis coloris, Ferrum dum funditur dimittit, integer illud attrahit & ad Polos Mundi vim suam dirigit. Ferrum Magnes L. Passim in Ferrifodinis Europæ offenditur. *Olim satis absurde ad extrahendum e Vulneribus Ferrum adhibebatur; hodie adversus Odontalgiam & affectus Spasmodicos extus applicatus laudatur.*

MAJORANA, *Marjolaine*. Folia crassiuscula, ovata, albida, obtusa, proprio fragrante odore & sapore aromatico, subamaricante instructa. *Origanum Majorana* L. BLACKWELL Tab. 319. Europæ calidioris domestica, in nostris hortis copiose colitur. Olei odorati $\frac{1}{4}$ largitur. *Interdum ad condiendos cibos adhibetur. Extus ad Medicamenta Nervina, Discutientia & Sternutatoria recipitur.*

MALACENSIS LAPIS videatur **LAPIS HYSTRICIS**.

MALTA, *Drêche, Malz*. Est Hordeum aqua madefactum, ad germinandum in acervos congestum & deinceps solerter exsiccatum; colore ad brunum accedit, odorem non admodum gratum, saporem dulcem habet. *In aquæ ebullientis triplo per aliquot horas maceratum omnium saluberrimum Scorbuticis, nec non Sanguinis acrimonia laborantibus remedium esse asseritur, quem in finem tres ad quatuor usque libræ Infusi ægrotis quotidie propinantur.*

MALVA, *Mauve, Pappel*. Radices fibrosæ, albæ, digito non crassiores, dulces. *Folia* cordata, orbiculata, petiolata, pubescentia, lobata, insipida, inodora. *Flores* asservantur duplici calyce, exteriori trifido, interiori quinquefido sustentati, pallide rubri, odoris pariter ac saporis expertes. *Semina* parva sunt, reniformia, grysea, sapore mucilaginoso. *Malva Rotundifolia* L. BLACKWELL Tab. 22. Vulgaris per omnem Europam. In *Emollientium numero* habetur; vulgo *Althæam* ei præferunt.

MALVA ARBOREA, *Rose tremiere, Erndtrose*. Flores profunde quinquefidi, creberrime pleni, nigricantes, duplici calyce tomentoso sustentati, odore vacui, sapore adstringentes. *Alcea Rosea* L. BLACKWELL Tab. 54. Orientis indigena, copiose in hortis Europæis colitur. *Recipitur maxime ad Gargarismata Roborantia*.

MANATI LAPIS. Varia magnitudine ad nos pervehitur. Est Dens oblongus, latus, utrinque convexus, superne variis rugis & tuberculis insignitus; minores autem profus læves sunt, lævi & longitudinali finu distinctus, inferne cavitate magna conspicuus, uno latere inferne introrsum flexo, crassissimo, altero admodum tenui, in duo minoratubera distincto; majores lutei, minores albi, intus promiscue albilimi, omnes insipidi sunt. Est Dens molaris *Trichechi Manati* L. in Oceano Africam & Americam alluente degentis. Iners omnino os olim ad cohibendas *Hæmorrhagias* efficax ferebatur.

MANDRAGORÆ RADICES, *Alraun*. Asservantur Cortices Radicum tenaces, extus grysei, intus pallidiores, striati, inodori, levissimo sapore salino imbuti. *Atropa Mandragora* L. BLACKWELL Tab. 346. Europæ calidioris planta nostras hyemes innocua fert. Mitius agere Cortex videtur, quam Radix; huic vel ad pauca Grana absorptæ vires *Narcoticæ* tribuntur; extus sub forma *Cataplasmatis Glandulis induratis* imponitur.

MANNA. Succus inspissatus ex albo levissime lutescens, proprio, admodum dulci sapore, exiguo odore, in frustis variæ figuræ & magnitudinis ad nos transmittitur. Ex variis

Fraxini L. generibus, in Italia crescentibus, summa æstate exsudatur; Sole exsiccatu inde deraditur. *Canellata longa* Paris. frustis purissimis efformatur, aliquot pollices longis, unum circiter latis, una facie concavis; obtinetur frustis a cortice trunci excisis, loca vulnerata succo redintegrante. *Manna vulgaris Granulata* Paris. tam figura, quam magnitudine variat; truncus eam sponte æque, ac vulneratus exsudat; frusta inde majora quæque, albidiora & ficciora Seplasiarii feligunt & *Electæ* nomine vendunt. Mannæ, pro soli natalis diversitate; diversi sunt bonitatis gradus. Optima habetur, quæ ad Giraci, Calabriae ulterioris urbem, colligitur; hanc sequitur, quæ nobis ex Siciliae urbe Capachi venit, in commercio *Siciliensis* dicta; quæ rursus, quam *Calabrinam* vulgo nominant, antecellit, reliquæ apud nos in usu non sunt. *Manna Crassa, Spissa & Sordida* Paris. multum colorata, humida, sordibus inquinata, creberrime adulterata, omnino ex Pharmacopoliis eliminanda. Solvitur Manna in Aqua æque ac Spiritu Vini, neutiquam in Oleis. Frigida ejus solutio nauseam minus movet, quam quæ calida exhibetur. *Aptissimum ad Alvi ductionem, quippe omni ætati convenientissimum & in omnibus morbis tutissimum medicamentum; recto quoque consilio Enematibus immiscetur. Dosis est ad Uncias duas & ultra.*

MARGARITÆ, *Perles, Perlen*. Calculi Margaritæ L. Sunt corpuscula plus minus rotunda, candicantia, ex squamis sibi invicem incumbentibus efformata, diaphana & hæc quidem *Margaritæ Orientales* dicuntur, quarum non nisi minimæ *Textiles, Saat-vel Lothperlen, Perles à Ponce; Semence des Perles* nominatæ, in Pharmacopolia recipiuntur. *Occidentales* minus splendent, colorem lacteum, superficiemque ut plurimum in tubercula erectam habent. Priores capiuntur ex Mytilo Margaritifero L. Sinus Persici & Maris Australis Conchylio. Posteriores Mya Margaritifera L. potissimum largitur, variorum Europæ fluviorum alumna. Quod Oculi Cancrærum, id Margaritæ in conchis, eademque ab utrisque expectandæ sunt vires.

MARRUBIUM, *Andorn, πικέρσιον*. Folia subrotunda, cre-

nata, rugosa, pubescentia, levissime odora, sapore amaro, cui aliquid salini accedit imbuta. Marrubium vulgare L. BLACKWELL Tab. 479. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Ejus Infusum Sanguinem e Vena emissum & rubicundiolem & fluidiolem reddidisse lego. *Resolvendi ergo usurpatur.*

MARUM. *Folia* parva, acuta, crassiuscula, leviter pubescentia, odore proprio aromatico, sapore imbuta amaricante, evidenter linguam feriente. Teucrium Marum L. Europæ calidioris indigenum, nobis per hyemem in frigidario asservandum, semper a felibus defendendum. Oleum destillatum valde pungens fundere dicitur. *Intus, sub forma Pulveris, Viribus Cephalicis efficax perhibetur; extus Pulveribus Sternutatoriis admiscetur.*

MASSOY CORTEX. Tenuis est, fere planus, coloris Cinnamomei obscurioris, cortice gryseo, striato tectus, sua veolens, saporem habens dulcem, grato aromate Cinnamomum referente suffusum. Ex India olim advectus *Roborantibus annumerabatur.*

MASTYX. Refina ad nos pervehitur sub forma granorum majusculorum, maximo tamen Avellanæ magnitudinem nunquam æquante, fragilis, ex fractura splendens & lævis, inter dentes tenax, instar Ceræ flexilis, odore proprio, grato, similique sapore, nonnihil adstringente perfusa. Massæ ex his granis, mediante alia quadam Refina conglutinatis ortæ, albidæ *Mastyx in sorten* dicuntur. Profluit Mastyx ex Pistacia Lentisco L. BLACKWELL Tab. 195. Europæ Meridionalis, Archipelagi & Syriæ arbore, apud nos in frigidario per hyemem asservanda, quæ in tractu meridionali Insulæ Chio Augusto & Septembri mensibus hunc in finem incidi solet. Eiusdem arboris *Lignum* quoque sub nomine *Lentiscini* occurrit ponderosum, ex pallido-flavescentem, cortice paululum rugoso, levissime rufescente tectum, odoris & saporis expers. Mastyches grana aliquantulum Olei odorati fundere dicuntur, & in expressis Oleis indissolubilia habentur, Aqua non dissolvuntur, igne liquantur, accensa jucunde olent. *Intus ad Scrupulum unum pro*

doſi roborandis Primis viis adhibentur. Extus firmandis Dentibus conducunt Dentifriciis admixta. Suffitus eorum, tanquam Roborans, in Catarrhis & Prolapſibus Ani laudatur. Ligno quoque Lentifci olim ad Roborandum utebantur.

MATER PERLARUM, *Nacre des Perles, Perlenmutter*. Eſt Teſta Conchæ, variæ magnitudinis, orbicularis, lamellis dentatis imbricata, extus gryſea ad flavedinem vergens, intus argenteo candore ſplendens; Margaritas Orientales nobis exhibet. *Ceteris Teſtis viribus medicatis non præſtat.*

MATRICARIA, *Matricaire, Metram*. Folia petiolata, pinnis ovatis, incifo-ferratis, albidis pinnatifida, odorem exſiccata nullum, ſaporem leviter amarum habent. *Matricaria Parthenium* L. BLACKWELL Tab. 192. In Europa, citra magis Septentrionalem, ubi viſa indigena. Oleum deſtillatum fundere dicunt. *Morbis Uteri dicata.*

MATRISYLVA, videatur **HEPATICAE STELLATA**.

MECCÆ BALSAMUM, *Opobalfamum*. Refina liquida, Terebinthina quidem fluentior, ceteris vero Balfamis liquidis ſpiſſior, coloris citrini, ad rubrum vergentis, odoris fragrantis, Citro proximi, ſaporis amaricantis, leniter linguam pungentis. *Amyris Opobalfamum* L. Arbor Arabiæ Petrææ. In Alcholle & Oleis diſſolubile deprehenſum eſt. Nullum certum extare genuitatis ejus indicium alibi notavi. *Miræ vires, quas de eodem in vulgus ſparſit rumor, ſide ſunt deſtituta, quominus, quam reliqua Balfama exotica, humores exæſtuat, eo ad consolidanda Ulcera interna aptius merito habetur.* Ejuſdem arboris exiguæ etiam virgulæ **XYLOBALSAMI** nomine ſervantur, cortice rugoſo, cinereo obductæ, inſipidæ, inodoræ, gratum vero odorem, ſimulac accenduntur, ſpirantes. **CARPOBALSAMUM** ejusdem arboris fructus exſiccati ſunt, capſulæ ſubrotundæ, Piſis minores, rugoſæ, quatuor lineis eminentibus inſignitæ, ſuperne exiguo ſtylo notatæ, ex cinereo-rufescentes, inodoræ, levi ſapore balfamico ſuffuſæ, nucleum album includentes. Utrorumque uſus medicatus exolevit.

MECHOACANNA. Taleolæ forma Jalappæis ſimiles, ambitu majores, inodoræ, dulciculi ſaporis, ſub gryſeo cor-

tice substantiam recondunt albam, solidam, friabilem, non fungosam, circulis distinctam. *Convolvulus Mechoacanna* L. BLACKWELL Tab. 571. Americae Meridionalis civis. Resinae aliquantillum vehere dicitur. *Vires quidem Catharticas, sed valde debiles edit. Ad aliquot Drachmas ejus Dosis extendi potest.*

MEDULLA SAXORUM, *Steinmark*. Argilla mollis, contactu saponis instar lubrica, cum aqua agitata exspumans, linguae leviter adhærens, grysea, flava, rufescens. *Talcum Lithomarga* L. In rimis montium delitescit. *Adstringendi ergo olim usurpabatur.*

MEL, *Miel*, *Honig*. Substantia mollis, spissa, alias alba, alias ex badio-flavescens, dulcis, odoris proprii, plantarum subinde, unde haustum erat, participis. Ab *Ape Melifica* L. ex nectariis florum conquiritur, deglutitur, vomitur, in favorum cellulas reconditur; unde favis diffractis, quod ad lenem calorem defluit *Virgineum* dicitur; pertinacius cellulis inhærens, quod torculari deinde exprimitur, bonitate inferius est. Quo pallidius est atque granosius, eo melius judicatur. Narbonense ad vicum, Narbonæ proximum, *Courbiere* collectum albidissimum, granosissimum, Rosmarinum olens, omnium princeps habetur. *Resolvendi, Aperiendi, Demulcendi viribus intus pollet, extus ad aperiendos Abscessus, abstergenda Ulcera, aperiendam Alyum adhibetur.* Aqua inde destillata vix proprii quid habere videtur.

MELILOTUS. Summitates angulares *Foliis* obseffæ ternatis, ovali-oblongis, truncatis, ferratis & racemis *Florum* papilionaceorum, exiguo calyce sustentatorum, flavorum, odoris fortis, injucundi, saporis amaricantis. *Trifolium Melilotus officinalis* L. BLACKWELL Tab. 80. Ubique locorum per Europam crescit. *Discutiendi Doloresque sedandi scopo extus adhibentur.*

MELILOTUS CÆRULEA, *Trefle musqué*, *Beaumier*, *Siebengezeit*. Flores papilionacei, parvi, calyce sustentati, pallide cærulei, odoratu valde balsamici. *Trifolium Melilotus cærulea* L. BLACKWELL Tab. 284. Patria incerta,

annua planta in hortis colitur. *Vires Diureticas, Emenagogas imo Alexipharmacas habere fertur. Adhibetur ad Caseum rasilem Glaronensium.*

MELISSA. Folia petiolata, cordata, rugosa, leviter hirsuta, odorem gratum Citri, similemque saporem habent. Melissa officinalis L. BLACKWELL Tab. 27. Europæ Meridionalis herba, in nostris hortis colitur. Oleum odoratum fundere; *contra affectus Capitis pollere dicitur; extus ad Epithemata Roborantia & Discutientia recipitur.*

MELISSA CANARIENSIS. Folia ternata, duobus inferioribus minoribus, oblonga, acuta, serrata, rugosa, hirsuta, Camphoram redolentia, gustu aromatica, leviter amaricantia. Dracocephalum Canariense L. In Insulis Canariis & in America sponte crescere dicunt, a nostratis hyemis rigore in frigidario tuetur. *Efficax omnino esse videtur, sed nullæ de ejus effectibus observationes exstant.*

MELISSA TURCICA, *Moldavica*. Folia oblonga, obtusa, dentata, angusta; proprio odore & sapore forti, sed prioribus minus grato. Dracocephalum Moldavica L. BLACKWELL Tab. 51. Moldaviæ domestica, annua planta in nostris hortis colitur. *Sunt, qui eam Melissa officinali substituant.*

MELISSOPHYLLUM, *Lamium Plinii male, Melisse de Montagnes, Grieskraut*. Folia petiolata, ex ovatis acuta, hirsuta, odore proprio aromatico, non ingrato, similique sapore. Melitis Melissophyllum L. Ubique locorum Europæ, præter maxime Septentrionalem, obvia. *Viribus a reliquis plantis aromaticis minime differt; ad purgandos a muco & sabulo Renes, nec non ad pellendos Menses salubriter adhibetur.*

MELITENSIS FUNGUS. Scapus exficcat, varie flexus, radicis speciem præ se fert, profunde striatus, extus nigricans, intus ex luteo-rufescens, odoris vacuus, saporis falsi, levissime adstringentis. Cynomorium Coccineum L. Parasitica planta radicibus variarum arborum Italiæ, Mauritanie &c. innascens. *Ad sistendas Hæmorrhagias ad Drachmam unam pro dosi commendatur. Cruentatis Gingivis sub forma Dentrificii atteritur.*

MELO. *Fructus* variæ magnitudinis, interdum vix pugnium

gnum, interdum majores etiam Cucurbitas æquans, viridis, mox rotundus, mox oblongus, alias glaber, alias fibris albis eminentibus in modum retis obductus, tuberculis etiam quandoque, obfessus quod ubi accidit, a *Cantaloupa* denominatur; sub cortice nunc crassiore, nunc teneriore pulpam includit, five viridem, five rubram, five flavescentem, plus minus suaveolentem, subinde aromaticam, semper vinosam & dulcem, cui *Semina* inhærent minora, ovata, compressa, ex albo-flavicantia, inferne marginata & angustata, sub cortice duriusculo nucleum album continentia. Cucumis Melo L. BLACKWELL Tab. 320. Ex Oriente ad nos transmissa copiose colitur; nostratibus fimetorum calore maturatio fructus acceleranda est. *Pulpa Refrigerandi ergo comeditur. Semina quatuor Frigidis majoribus accensentur.*

MENTHA BALSAMINA, *Münzbalsam*. Folia ovata, acutiuscula, petiolata, ferrata, glabra, odore Mentharum proprio, jucundiore aromate suffuso, similique sapore. *Mentha Gentilis* L. Europæ Australis planta, nostræ hyemis facile patiens. Olei odorati pauxillum fundere lego. Omnes Menthæ promiscue *viribus Stomachicis eximie pollent & Vomitum sistunt. Hæc nostra Species commode sub forma Infusi dari potest.*

MENTHA CRISPA. Folia cordata, rugosa, subtus leviter pubescentia, margine dentata & plicata, odore menthaceo gravi, minus grato, sapore aromatico, amaro. *Mentha Crispa* L. BLACKWELL Tab. 290. 2. Sibiria indigena, in hortis nostris colitur. Olei odorati $\frac{1}{4}$ largitur. *Aqua inde abstracta intus datur; ipsa per se sub forma Epithematis Carminativo & Antemetico scopo Abdomini, Mammis vero ad Lac discutiendum imponitur.*

MENTHA PIPERITIS. Folia ovato-oblonga, acuta, viridia, ferrata, odore & sapore Piperi supparia. *Mentha Piperitis* L. BLACKWELL Tab. 291. Angliæ propria, optime in nostris hortis vegetat. Oleum inde destillatum, quod ex foliis exsiccatis melius, quam ex recentibus paratur, fervidissimo sapore linguam non sine sensu frigoris ferit. Hujus Olei & Aquæ

stillatitiæ ope *Rotulæ* parantur gratissimæ. Hæc Species omnes reliquas efficacia vincere videtur.

MENTHA RUBRA VEL AQUATICA. Folia ex ovatis acuminata, glabra, majuscula, ferrata, odori & saporis evidens gratum aroma suffundunt. *Mentha Aquatica* L. BLACKWELL Tab. 32. Copiose per Europam crescit. *Ad Balsaminæ vires accedit.*

MENTHASTRUM, *Mentha longifolia.* Folia lanceolata, acuta, tomentosa, acute ferrata, saporem & odorem *Crispæ* referunt, suavitate etiam superant. *Mentha sylvestris* L. BLACKWELL Tab. 290. 1. Europæ temperatæ planta. *Rarissime in officinas admittitur.*

MERCURIALIS, *Bingelkraut.* Folia ovata, acuta, petiolata, ferrata, insipida, inodora. *Mercurialis annua* L. BLACKWELL Tab. 162. Vulgaris per Europam temperatam. *Emollientibus quondam adnumerabatur.*

MERCURIUS, *Argentum vivum, Hydrargyrum, Quecksilber.* Est Substantia fluida, quindecies aqua gravior, calore minore etiam quam quo aqua ebullit, volatilis, frigore valde intenso in massam solidam, solo calore in pulverem rubrum convertitur, plurima corpora metallica dissolvit, vi omnium fere menstruorum dissolvenda. Invenitur sive natus, *Mercurius Virgineus,* sive Sulphure in Cinnabarim versus, in quem ubi vertitur, pro variis, quibus inhæret terris, varias *Mine-ras* efformat. Reperitur in variis Europæ montibus. Cuticula tectus, aut cujus globuli filum quasi trahunt, pejoris notæ judicatur. Depurandi ratio, quæ Destillatione fit, optima est. Trituratione cum solidis vel unguinosis globularem formam deponit, & substantiis, cum quibus teritur, colorem nigrum affricat. *Potentissimum Resolvens, certissimumque morborum Venereorum remedium, utpote quod vel minutissimis vasculis, quæ cetera medicamentæ adire non possunt, sese insinuat. Tam intus quam extus adhibetur.*

MESPILL, *Nefles, Mespeln.* Fructus turbinato-rotundi, colore rubiginoso tincti, umbilico quinquefido coronati, villo obfessi, recentes quidem quam maxime austeri, ab arbore decerpti lento gradu mitescentes, & saporem nanciscentes vi-

nosum, gratum, evidenter adstringentem. Exsiccati fuscifunt, valide etiam adstringentes. Mespilus Germanica L. BLACKWELL Tab. 154. Europæ temperatæ propria. *Exsiccati fructus subinde ad medicamenta Adstringentia accipiuntur.*

METALISTÆ RADIX. Prostat sub forma frustorum variæ magnitudinis ac figuræ, mox rotundis taleolis Mechoacannæ similia, mox secundum longitudinem secta; sectio transversalis circulos, longitudinalis fibras refert; extus striis crassiusculis notata, grysea, intus pallidior est; odoris expers, saporis levissime falsi. Ex America advehebatur, & *Mechoacannæ analogæ esse credebatur.*

MEUM, Bärwurz. Radix fusiformis, aliquot pollices longa, calamum crassa, rugosa, extus ex gryseo-fusca, intus alba; odore proprio, sapore aromatico, protinus dulci, postmodum falso. Athamanta Meum L. BLACKWELL Tab. 525. Europæ temperatæ. *Virtutis Diuretica, Emenagogæ & Resolventis laudem habet.*

MEZERÆUM, Thymelæa, Laureola, Bois gentil, Bois de Garou, Saint bois, Seidelbast. Cortex mollis, tenax, rufescens, inodorus, saporis acerrimi. Desumitur a Frutice *Grana Coccognidii* exhibente. *Validissimum Drastrictum nunquam intus dandum; extus applicatur ut Fonticuli vices expleat.*

MILIUM SOLIS, Lithospermum, Gremil, Herbe aux Perles, Meerhirse. Semina rotunda, inferne contracta, alba, nitida, sub cortice duriusculo medullam includunt fuscam, odoris & saporis expertem, cum Acidis effervescentem. Lithospermum officinale L. Vulgare per Europam. *Olim scopo Lithonriptico adhibebatur. Syrupus inde paratus ab AMBROSIO denominabatur & Dysentericæ mederi putabatur.*

MILLEFOLIUM, Schaafgarben. Folia longa, leviter pubescentia, pinnata, pinnulis obovatis denuo aliquoties pinnatis, tenuis aromati odoris, saporis amaricantis, levissime falsi. Achillea Millefolium L. BLACKWELL Tab. 18. Per omnem Europam obvium. Oleum inde destillatum semper, ego flavum, nunquam cæruleum obtinui. *Commendabatur ad referandas Obstructiones Abdominales, extus Vulnerario scopo*

adhibetur. Achillea Nobilis L. Camphoram redolens, eminentius aromatica utique præferenda videtur.

MILLEPEDES, *Cloportes*, *Maueresel*, *Kelleresel*. Insecta superne ex cineritio-nigricantia, inferne albida, corpore ex circellis composito, & cute duriuscula tecto, sapore leniter falso; nigri, majores, corpus in globulum contrahentes reliquis præferendi. Oniscus Afellus L. Per omnem Europam occurrit, in regionibus calidioribus major est & nigricantior. Exsiccati Gelatinæ multum nauseosæ $\frac{1}{8}$ largiuntur. *Aperiendi*, *Sanguinem Depurandi*, *Urinam expellendi causa centum & ultra pro dosi recentium contritorum cum jusculo mistus Succus propinatur.* *Conservam* inde parandi labor, cum recentes per totum annum haberi possint, superfluus est.

MINIUM. *Menning* neutiquam Veterum, Calx Plumbi est in peculiaribus Angliæ, Belgii & Germaniæ officinis in colorem læte rubrum calcinata. *Recipitur ad Unguenta & Emplastra.*

MOMORDICA, *Pomum Hierosolymitanum*, *Pomme de Merocilles*, *Balsamapfel*. Pomum in medio ventricosum, utrinque contractum, pulchra rubedine tinctum, pluribus tuberculis notatum, multis feminibus turgens, insipidum, inodorum. Momordica Balsamina L. BLACKWELL Tab. 539. Indiæ indigena annua planta, apud nos in hortis colitur. *Oleum unguinosum cum his fructibus infusum ad usus Vulnerarios quondam commendabatur.*

MORINGA. Radix semipedem circiter longa, pollicem crassa, sub cortice crasso striis longitudinalibus notato, ex gryseo-lutescente, substantiam includit lignosam, pallidiorem, tenuissime extus striatam, valde duram, intus non sine splendore lævem, inodoram, sapore falso magis quam aromatico linguam ferientem. Num est Radix Arboris Nuces Behen præbentis? Ex India Orientali olim advecta *contra Venena, Vermes & morbos Cutaneos efficacia ejus laudabatur.*

MORUS, *Meurier*, *Maulbeere*. Radices habet fibrosas, flavas, inodoras, sapore dulci potius, quam amaro præditas; *Baccas* lucidiusculas, sanguineo-nigricantes, ex acinis obova-

tis compositas, saporis proprii, vinosi. *Morus nigra* L. BLACKWELL Tab. 126. Italiæ indigena esse dicitur, copiose in nostratibus hortis colitur. *Radicum Decoctum* egregiæ contra *Taniam* efficaciam esse fertur. *Baccæ Refrigerandi gratia* comeduntur. *Rob & Syrupus inde parati ad morbos Faucium adhiberi solent.*

MOSCHATA NUX, *Noix Muscat, Muscatennusse*. Noces olivares, oblongas *Mares*, una vero facie planas *Mutter-muscatnusse* vulgo appellant, extus gryseæ sunt, fulcis in retis speciem flexis insignitæ, duriusculæ, fragiles, fractura fusca & nitidæ, intus lineis rubris variegatæ, odoris proprii, grati, saporis aromatici, pinguiusculi potius, quam acuti. Arboris Moluccarum Bandæ maxime cultæ character nondum omnino determinatus est. Olei unguinosi $\frac{1}{3}$, Olei odorati $\frac{1}{12}$ fundunt. Noces Sole siccantur, fumo & aqua Calcis vivæ a corruptione defenduntur. *Vi Roborante & Anodyna pollent.* *Oleum expressum* Sebi consistentiam, colorem flavum, Nucum odorem, saporem etiam pinguiorem habet, & ad eosdem ac Noces usus, sed minori dosi, adhibetur, frequentius quoque extus applicatur; quod sub forma parallelipedorum in commercio profat mangonii suspectum est. Integræ Drupæ in India conditæ nobis sub *Nucum Indicarum conditarum* nomine mittuntur, & sive per se, sive in *Electuaria vel Morsulos receptæ Roborandi* ergo exhibentur.

MOSCHUS, *Musc, Bisam*. Pulveris speciem refert ex parvis granulis constantem, ferruginei coloris & inflammabilis est, sapore amaro, odore proprio & quidem fortissimo; substantiis, quas perpetrat, pertinacissime inhærente, Vesiculis inclusus ad nos pervehitur, pilis rigidis obsessis, albæ a *Russia*, badix a *China & Tunquin* denominantur. Moschus est substantia sebacea ex sacco desumpta, Umbilico Moschi Moschiferi L. in Tartaria, Sibiria & China degentis adhærente. *Contra Convulsiones, Deliria, Hydrophobiam vel ultra Scrupulum pro dosi datus multum laudatur.* Minima ejus quantitas ingens aliarum substantiarum volumen suo odore imbuat. Feminae hystericæ, nec non Hypochondriaci inde læduntur.

MUMIÆ. Prostant hoc nomine hodie in officinis partes

humanæ, Bitumine conditæ & exsiccata, nigræ, bitumen sapientes & redolentes; *sordido nauseoso imo suspecto medicamento quod Balsamico & Adstringente scopo nonnulli adhibent, merito abstinetur.*

MUNGOS. Radices sunt parvæ, minimum digitum circiter crassæ, varie inflexæ, striatæ, extus lutescentes, intus albæ, sapore statim leviter salso, dein amaro. *Ophiorrhiza Mungos L. Indiæ indigena. Contra morsus Animalium venenatorum & morbos Malignos laudatur, ejus efficacia.*

MUS MARINUS. Folliculus compressus, cujus duo parietes parum a se invicem distant, ovato-oblongus, rectangulus, utroque margine crassiore & longius producto, unde ad utrumque extremum duo quasi cornua angusta, leviter compressa prominent, extus niger, intus flavicans, insipidus, inodorus; Ova esse creduntur *Rajæ* piscis, quæ exclusis pullis e Mari ad Littus projici & in Belgio maxime reperiri dicuntur. *Eorum suffitu Hæmorrhoides cæcæ dolentes leniri credebantur.*

MUS MONTANUS, *Marmotte, Murmelthier.* Animal quadrupes, gryseum, pedibus flavescens, cauda abbreviata. *Mus Marmotta L. Alpes Europæ Meridionalis inhabitat; officinis Axungiam subministrat, consistentia, colore, virtute reliquis æquiparandam.*

MUSCUS ALBUS QUERNUS. Efformatur filis aphyllis, ramosis, varie contortis, gryseis & per senium crusta alba obductis. *Lichen plicatus L. Ab arboribus pendere solet. Adstringentes ei vires tribuuntur; Tussi laborantibus præcipue commendatur.*

MUSCUS ARBOREUS, *Muscus Acaciæ, weisses Lungenkraut.* Folia refert in multas lacinias secta, superne e cinereo-glaucâ, inferne lanuginosa, inodora, insipida. *Lichen Prunastri L. Arboribus accrescit, maxime Pruno sylvestri. Ad eosdem ac antecedens usus recipitur.*

MUSCUS CUMATILIS. Foliis sibi invicem incumben-
tibus latioribus efformatur, minus coriaceis, superne glabris, læte viridibus, inferne villosis, ex fusco-nigricantibus. Teter & mephiticus esse dicitur. *Lichen Aphtosus L. Muscis*

innascitur, rarius observatus. In Suecia contra *Aphthas* infantum usurpatur; ejus *Decoctum Vermes* per *Vomitum* expulisse observatum est.

MUSCUS ERECTUS. Caules vix spitamæi, foliolis lineari-lanceolatis, acutis, glabris, patentibus imbricati, ex luteo-virentes, insipidi, inodori. *Lycopodium Selago* L. Passim per Europam occurrit. Valide *Alvum* ducere & *Menses* pellere dicitur.

MUSCUS ISLANDICUS, videatur **LICHEN.**

MUSCUS PYXIDATUS. Folia parva, irregulariter laciniata, tubulos emittunt variæ magnitudinis, conoideos, margine superiore dilatato plus minus excavato, mox simplices, mox ramosos, varie coloratos. *Lichen pyxidatus* L. Terræ, faxis & truncis arborum accrescit; *Tussientibus* laudatur.

MUSCUS TERRESTRIS. Effingitur foliis coriaceis, latiusculis, sinuato-laciniatis, marginibus deorsum flexis, cinereo-glaucis, interdum obscure virentibus, inferne incanis, odore mucido, sapore nauseose fatuo imbutis. *Lichen Caninus* L. In terra muscis instratus occurrit. *Ob virtutem Antilyssam* commendatur.

MUSTELA PISCIS. *Lott, Aalraupe, Ruffolke.* *Gadus Lotta* L. *Vulgaris* Europæ piscis; ejus *Spina* omni carne nudata, exsiccata & in pulverem redacta *Epilepticis* salutaris fertur.

MYROBALANI. Fructus carnosus, exsiccati, nucem includentes, inodori, sapore adstringentes. Quinque eorum genera in officinis prostant; *Citrinæ* BLACKWELL Tab. 401. f. 3. turbinatæ sunt, pollice longiores, ad colorem nigricantem vergentes, utrinque obtusæ, striatæ, tenaces, amaræ, austeræ, sub officulo scabro, anguloso, obtuso nucleum corneum includunt; *Chebulæ* BLACKWELL Tab. 401. f. 2. prioribus similes, majores tamen & magis fuscæ; *Belliricæ* BLACKWELL Tab. 401. f. 1. Nucem *Moschatani* referunt, pedunculo instructæ, prioribus pallidiores; *Indæ* BLACKWELL Tab. 401. f. 4. ex ovatis oblongæ sunt, rugosæ, non striatæ, foris nigrae, intus substantia quasi picea refertæ; *Emblicæ* tribus prioribus minores, proximis majores, sphericæ figuræ, in sex angulos diductæ, nigricantes. Quatuor priores arboris cujus character nos ad-

hucdum latet, fructus pro cuiusque maturitatis diversitate inter se differre contendunt; postremas subministrat Phyllanthus Emblica L. Javæ, Malaccæ, Macassar civis. *Adstringentibus viribus pollent, olim Purgantibus Corrighendi scopo adjiciebantur.*

MYRRHA. Succus concretus, quem in frustis variæ magnitudinis, Juglandi interdum proximæ, accipimus. Grana sunt subdiaphana, rufa, diffracta maculas produnt albas, quas *Ungues* dicunt, proprii, gravis odoris, saporis subacris, aromatici, amarissimi. Rejicienda *in sorten* dicta frustra, quæ arida, fordida sunt & ad nigredinem vergunt. Ex Abyssinia & Arabia nobis venit, ex fauciatâ arbore, cujus characterem ignoramus, obtinetur. Calore non funditur, ex aqua se suspendi patitur, Alcohol eam ex parte dissolvit, Oleis vero indissolubilis est. Ex sedecim ejus Unciis Aquam stillatitiam obtinui, perodoram, perinde sapidam, cum aliquot Olei butyracei guttis, aquæ innantibus. *Resolvit, Abstergit, Roborat, Putredini resistit. Partem ejus resinofam humores multum exæstuarè testantur Observatores. Datur intus Pilularum forma ad Scrupulum unum. Extus Abstergens, Putredinem arcens, Dentes mundans & firmans est.*

MYRTILLI, *Airelles, Heidelbeeren.* *Baccæ* globosæ, cæruleo-nigricantes, labia atque palatum colore suo inficientes, umbilicatæ, polyspermæ, dulces, subadstringentes. *Vaccinium Myrtillus* L. BLACKWELL Tab. 463. Crescit per omnem Europam. *Refrigerandi aque ac Adstringendi gratia comeduntur.*

MYRTUS. *Folia* ovato-acuta, firma, læte viridia, proprii, aromatici, gratissimi odoris, saporis perinde aromatici, suffusa acrimonia evidenter etiam adstringentis; *Baccæ* oblongo-ovatæ sunt, umbilico stiloque ex ejus medio eminente notatæ, nigræ, inodoræ, leviter adstringentes. *Myrtus communis* L. BLACKWELL Tab. 114. Europæ calidæ & Asiæ progenies, nobis per hyemem in frigidario asservanda. *Baccæ ob Roborantem, Folia ob Aromaticam insuper virtutem celebrantur.*

MYRTUS BRABANTICA, *Piment Royal, Post, Porst.* *Folia* ovato-oblonga, inferne contracta, integerrima, sapore adstringente.

adstringente. *Myrica Gale* L. Europæ frigidæ & Canadæ indigena. *Admiscetur subinde Unguentis contra Scabiem.*

NAPUS, *Navet, Steck-vel Stuckelruben.* Radices alias fusiformes, alias cylindraceæ, variæ magnitudinis, sub cuticula vel flavescente, vel nigricante, carnem albam, Rapas olemtem, dulcem cum quodam acredinis vestigio continent. *Semen, Colsat, Rubsaamen, Rebs, Lewat*, rotundum, sub cortice modo fusco, modo rufo, nucleum album abscondit, multo oleo turgidum, inodorum, insipidum. *Brassica Napus* L. BLACKWELL Tab. 224. & 410. ad littora Maris Europæ minus calidæ indigena. Radices a varietatibus hortensibus desuntæ mensis apponuntur & *Juribus Pectoralibus adjiciuntur.* Semen vero a Napo sylvestri in nostratibus agris copiosissime culto desumitur; *olim contra Venena commendabatur; hodie neglecto fere ejus usu medicato Oleum inde exprimitur, lucernis præcipue inserviturum.*

NASTURTIUM AQUATICUM, *Cresson d'eau, Brunnkressen.* Cauliculi cavi, fulcati, succulenti, quibus adhærent *Folia* impari pinnata, pinnis rotundis, leviter incis; sapor acris, amaricans, odor proprius est. *Sifymbrium Nasturtium aquaticum* L. BLACKWELL Tab. 260. Crescit per omnem Europam. Tanquam condimentum cibus adjicitur; *Resolvens & Antiscorbuticum remedium semper recens adhibendum.* In Suecia sunt, qui *Cardaminem pratensem* loco *Nasturtii aquatici* in usum trahant.

NASTURTIUM HORTENSE, *Cresson, Kressen.* *Folia* angusta, pinnatim laciniata, laciniis dentatis, pallide viridia, saporem habent acriusculum, nonnihil etiam amarum, odorem proprium, nares irritantem. *Semina* ovata sunt, glabra, rufa, sapore oleoso leviter acria. *Lepidium sativum* L. BLACKWELL Tab. 23. Ad Wolgam sponte crescere fertur; annua planta copiose in nostris hortis colitur. *Ad Acetaria recipitur, contra Scorbutum & Sanguinis impuritates efficax habetur. Semen olim ad Excretiones aquosas promovendas usurpari solebat.*

NASTURTIUM INDICUM, *Capucine, Capucinerlein.* *Gemmæ florum* rotundæ sunt, virides, sapore leviter aroma-

ticæ, odore fructus Rubi Idæi referentes. *Flores* ex fundo conoideo in cornu porrecto, cuculli similitudinem efformant, in quinque petala exeunt, ciliata, obtusa, rotundata, colorem aurantium, odorem proprium fortem, saporem habent acriusculum. *Tropæolum majus* L. Americæ Meridionalis indigenum. Annua planta, copiose in nostris hortis colitur. *Gemmæ Aceto condiuntur & cum carne comeduntur, Caparide omnino gratiores; Flores ad Acetaria recipiuntur. Ad Sanguinem Depurandum commendantur.*

NASTURTIUM PETRÆUM, *Cresson de Roche, Steinkressen.* Cauliculi succulenti, superne divisi, teneri, *Foliis* obfessi reniformibus, hirsutis, exiguis petiolis suffultis, sapor leviter acris & subadstringens est. *Chrysofplenium alternifolium* L. Crescit per omnem Europam. Destillatione principia inde Alcalinâ eliciuntur. Salem quoque emittit Essentialem. *Resolyendi scopo celebratum, haud ita pridem nostrates Asthmaticis & Tussientibus exhibere solebant.*

NASTURTIUM SYLVESTRE, *Cresson sauvage, Feldkressen.* Folia longa, laciniis angustis pinnata, ejusdem fere ac præcedens saporis. *Cochlearia Coronopus* L. **BLACKWELL** Tab. 120. Vulgaris per Europam. *Præcedentis vires habere videtur; olim ad Acetaria recipiebatur.*

NEPETA, *Herbe aux Chats, Katzenkraut.* Folia cordata, tomento obfessa, profundius crenata, proprio odore minus grato, sapore aromatico imbuta. *Nepeta Cataria* L. **BLACKWELL** Tab. 455. Crescit in omni Europa, præter maxime Septentrionalem. Aliquantulum Olei odorati fundere dicitur. *Commendabatur olim contra morbos Uterinos.*

NEPHRITICUS LAPIS. Est Lapis viridescens, durus, ad Chalybis ictum scintillans, tactu pinguis, substantiæ granulosa speciem referens, subdiaphanus. *Jaspis Lapis Nephriticus* WALLER. Species obscure viridescens, ex America allata *Lapis Amazonum* dicitur & in *Amuleti vicem gestatus Epilepticis salutaris fertur.* In Officinis ut plurimum prostat, Lapis magnus, squamis ex nigro-virescentibus, subdiaphanis constans, nonnullo pinguedinis sensu contrectantem afficiens,

tornum admittens. Talcum Nephriticum L. Passim in Europa offenditur. Ferri & Cupri vestigia vehere, Magnesium continere, Salem Ammoniacalem & Oleum empyreumaticum fundere dicitur. *Usus ejus exsolevit.*

NEPHRITICUM LIGNUM. In majoribus frustis ad nos transvehitur, compactum, durum, ponderosum, extus dilute fuscum, in medietate spadiceo-fuscum, odoris expers, sapore leviter adstringens. Ab arbore unde *Nuces Behen* obtinentur, subministrari dicitur; nobis ex America mittitur. Ejus Tinctura aquosa opalini coloris, luci exposita aurea, sub umbra cærulea est. *Olim a virtute Antinephritica laudem habebat.*

NICOTIANA, Tabac. Folia magna peculiari exsiccationis modo penitus flavescunt, ovali-lanceolata, proprii odoris, solerti exsiccatione multo etiam acutioris, saporis admodum acris. *Nicotiana Tabacum* L. BLACKWELL Tab. 164. Americæ Meridionalis domestica, annua planta, uberrima hodie ejus per Europam cultura est, quæ Sec. XVI. ad finem vergente, ibidem invalescere cœpit. Principia fundit Alcalina *Valide Resolvit & Stimulat, adeo ut Vomitus etiam excitet. Tanquam Apophlegmatizans creberrimi usus est; Clysmatibus quoque adjicitur. Syrupus inde paratus Asthmaticis laudatur.*

NIGELLA, Nielle, schwarzer Kümmel. Semina parva, angulata, acuta, nigra, scabriuscula, intus viridescunt, odorem aromaticum spirant, sapore linguam pungunt. *Nigella fativa* L. BLACKWELL Tab. 558. Europæ Meridionalis & Orientis indigena planta, in hortis colitur. Oleum unguinosum & destillatum largiri dicuntur. *Ad condiendos cibos Aromatum loco recipitur; Aqua cum eis agitata scopo Errhino adhibetur.*

NIL, Nihilum, Pompholyx. Levis, vix cohærens substantia, alba, insipida, inodora, fornacibus, in quibus Aurichalcum vel paratur, vel funditur, adhærescens. Est verus Flos Zinci, creberrime Marga quadam aut Gypso adulterari solet; *recipitur maxime ad medicamenta Ophthalmica externa.*

NINZIN. Radix calamo angustior, inferne bifurcata, leviter rugosa, cornu tam colore, quam pelluciditate referens, inodora, subdulcicula. *Sium Ninsi* L. BLACKWELL Tab.

§14. In China Septentrionali & Japan crescit. Ob similitudinem, quam cum hominis figura habere dicebatur, *medicamentorum Analepticorum princeps esse credebatur & maximi vendebatur; sed pro merito suo exsolevit.*

NITRUM, *Salpeter*. Sal in crystallos prismaticas excrefcens, cum substantiis inflammabilibus detonans, dum aqua solvitur frigus gignens, frigidi pariter ac amari sensu linguam afficiens. Nitrum nativum L. Magna ejus copia nobis ex Oriente venit; in Europa ex propriis terris peculiari ratione excoquitur: terræ sub forma Stalactitæ adhærens *Apho-nitrum* dicitur; ubi vero tanquam tomentum efflorescit *Halonitrum*, *Salpêtre de Houffage* appellatur; ubi denique solo sapore & detonatione sui præsentiam declarat *Nitri Embryonati* nomine venit. Constat ex proprio Acido & Alkali Vegetabili. Nonnisi Depuratum ad usus medicatos recipiendum. *Sanguinis Æstum temperat, Spissitudinem phlogisticam Resolvit, Putredinem arceat.*

NUMMULARIA. *Folia* ovato-orbiculata, petiolata, inodora, leniter adstringentia. *Lysimachia Nummularia* L. Ubivis locorum per Europam obvia. *Ob vim Adstringentem laudata tam intus quam extus usurpabatur.*

NYMPHÆA, *Nenufar, Seeblume*. *Radices* brachium & ultra crassæ, fungosæ, extus fuscæ, tomentosæ, mammillis infessæ, intus albæ, leviter amaræ. *Flores* exhibent petala alba, oblonga, insipida, inodora. *Nymphæa alba* L. BLACKWELL Tab. 498. & 499. Passim per Europam usquequaque obvia. *Radices Demulcent & Adstringunt. Flores exsiccati inertes sunt.*

OCHRA. Terra est pulverem sive luteum, sive rufum sistens; color calcinatione intenditur. *Ochra Ferri & Martis* L. Subfidit in Aquis Martialibus, verus *Crocus Martis*. *Creberrime Picloribus inservit. A Medicis interdum ob vim Roborandi tam intus quam extus adhibetur.*

OLAMPI GUMMI. Prostat in frustis minoribus, extus gryseis, intus splendidis, subdiaphanis, fuscis; friabile est, tritu dentium non lentescit, insipidum, inodorum, aqua non solubile, calore non liquandum, flammæ admotum ardet, suavem-

que odorem resinofum fpirat. Ex America advehi fama est. *Incongrue Gummi Arabico æquiparatur.*

OLIBANUM, *Thus, Encens, Weihrauch.* Advehitur in granis variæ magnitudinis, maximis Nucem Juglandem fere æquantibus, fubmixta rubedine flavicantibus, fubdiaphanis, fragilibus; odor eorum proprius, accenforum etiam quam maxime fragrans, fapor tenuis eft; Succum effe concretum quadam *Juniperi* fpecie exfundantem, veri quam fimillimum videtur; iftius vero *Juniperi*, unde obtinetur, adhucdum incerta fpecies eft. In Arabia collectum, Meccam veftum, Cairum inde defertur. Ex aqua fe fufpendi patitur, Spiritum Vini fubit; Oleis nequaquam folubile fertur. Igne non funditur. *Olim Roborandi ergo intus dabatur, hodie ad Emplafta Refolventia & ad Suffitus Difcutientes adhibetur.*

OLIBANUM SYLVESTRE, videatur PINI RESINA.

OLIVA. *Drupa* ovata, variæ magnitudinis, carnofa, viridis, faporis proprii, adftringentis, amaricantis; immaturis propria, infignis amarities Lixivio cinerum adimitur, qua ademta aqua falfa & aromatibus condiri folent. Includit officulum oblongum, duriffimum, rugofum, cinerafcens, nucleum continens parvum, dulcem. Olea Europæa L. BLACKWELL Tab. 199. Europæ calidæ indigena, apud nos in frigidario ab hyeme defendenda. *Olivæ conditæ, ut funt, comeduntur, Embammatibusque Roborandi & Appetitum excitandi gratia adjiciuntur. Oleum inde expreffum colore feffe probat fubflavo, odore leviffimo, fapore mitiffimo, & quod thermometro paulum infra gradum aëris temperati defcendente protinus fpiffefcat. Optimum eft, quod nobis ex Gallo Provincia venit. Viribus Oleorum unguinoforum pollet.*

OLSNITIUM. Radix fibrofa, albefcens, faporis acris, fubjuncta amaritie aromatici, odoris proprii, aromatici. *Selinum Sylvestre* L. BLACKWELL Tab. 556. Europæ temperatæ. *Incidens, Refolvens, Alexipharmaca virtus ei hinc inde tribuitur.*

ONONIS, *Arrêt de bœuf, Hauhechel.* Radix longa, calamum circiter craffa, extus fulca, intus alba, tenax, fapo-

ris acriusculi. *Ononis spinosa* L. BLACKWELL Tab. 301. Crescit per omnem Europam. *Ad scopos Diureticos adhibetur; nuperrime sub forma Pulveris bis interdiu sumtam Sarcocelen curasse observatum est.*

OPHIOGLOSSUM, *Langue de Serpent*, *Natterzünglein*. Cauliculus ad aliquam altitudinem surrectus, folium ovato-oblongum, subcarnosum, spicam inde angustioremmittit, pectinatam, rubentem; sapor subadstringens, glutinosus est. *Ophioglossum Vulgatum* L. BLACKWELL Tab. 416. Passim per Europam obviam planta. *Olim intus æque ac extus tam Adstringendi quam Consolidandi gratia in usu erat.*

OPIUM. Succus inspissatus in panes coactus, ambitu pugnatum circiter æquantes, superficie variis quisquiliis inquinata nobis ex Natolia, Persia & Ægypto venit, extus fuscus, intus nigricans, odore viroso, Papaveraceo, sapore acri & amaricante. Paratur ex inspissato Decocto Capiti Papaveris Somniferi L. BLACKWELL Tab. 482. & 483. Orientis indigenæ annuæ plantæ, hodie passim per Europam cultæ: Aquam & Spiritum Vini aliquantulam ejus partem intactam relinquere, odore & sapore ejus eadem liquida inde abstrahenda imbui, ejus vim tostione & coctione multum debilitari, Extractum ejus spirituosum fortius quam aquosum agere, Sanguinem denique eo attenuari Observatores sunt experti. *Sensus Opio obtundi, motumque Muscularem imminui abunde compertum est. Quocirca, quamvis recta ratione & justa dosi datum, pro Anodynorum & Antispasmodicorum principe merito habeatur; ab ejus tamen usu caute abstinebunt, quorumcunque vel motus Sanguinis præter modum auctus, vel debilia Solida sunt, vel quibus evidens stimulus Spasmos aut Dolores excitat. Nostratibus ejus Dosis vix ultra unum Granum extendere licet. Externum Opii usum nunquam periculo carere, egregius Auctor evicit.*

OPOPANAX. Succus concretus in granis nobis mittitur magnitudine vix Nucem Juglandem æquantibus; extus ex rufo-lutescentibus, intus albidis, odoris balsamici, non ingrati, saporis amari, proprii, nauseosi; massæ majores, quarum grana substantia quadam granulosa & variis fordibus inqui-

nata conglutinantur, deterioris notæ sunt. Affertur ex Asia. Ex *Pastinacæ Opopanacis* L. Europæ calidæ plantæ, nostræ hyemis vim citra noxam sustinentis, vulnerato caule effluere dicitur. Ex aqua se patitur suspendi, Oleis insolubile fertur. *Resolvendi gratia tam extus quam intus adhibetur.*

OREOSELINUM, *Persil des Montagnes, Grundheil*. Radix fibrosa, longa, crassa, rugis transversalibus notata, flavicans, intus alba, validum odorem aromaticum spirans, sapore linguamevidenter pungens. *Athamanta Oreoselinum* L. Per montes Europæ usquequaque obvia. *Virtutis Resolyentis, Sudorifera, Diureticæ nomine a nonnullis laudatur.*

ORIGANUM CRETICUM. Spicæ imbricatæ, prismaticæ, luteæ, bracteis longis, cuneiformibus distinctæ, admodum aromati odoris & grato sapore linguam ferientes. *Origanum Creticum* L. Orientis & Europæ Australis indigenum. Oleum sanguinei coloris, acutissimi saporis fundere fertur. In quibusdam regionibus condimenti loco cibus adjicitur. *Rarissime intus, extus Discutiendi & Roborandi causa adhibetur.*

ORIGANUM HISPANICUM. Spicæ vel potius Capitula ovata, acuta, hirsuta, sapore & odore Saturejam referentia. *Origanum Marum* L. Archipelagi. *Rarissime usurpatur.*

ORIGANUM VULGARE, *Wohlgemuth*. Summitates quadrangulæ, ramosæ, *Foliis* obfessæ sessilibus, ovatis, integerrimis, subtus levissime pubescentibus & *Spicis* paniculatis terminatæ, subrotundis, bracteis cuneiformibus, acutiusculis, purpureis distinctis, inter quas *Flores* labiati ex albido purpurascens hærent; odor proprius, fragrans, sapor aromaticus. *Origanum Vulgare* L. BLACKWELL Tab. 280. Crescit per omnem Europam. Olei odorati exiguam partem fundit. *Priorum viribus pollet.*

ORLEANA, *Rocou*. Venit nobis in massis majoribus, foliis longis, latis, nervosis involutis, quarum substantia mollis, humida est, digitis adhærescens, sanguineo colore nitens, odorem spirans admodum foetidum, submucidum, sapore leviter falso imbuta. Est *Fæcula succi Seminum Bixæ Orleanæ* L. Americæ calidioris fruticis, ubi in *Refrigerantium & Adstringentium numero habetur; apud nos ad Tinctorios usus recipitur.*

OROBUS, *Ervum*. Semina rotunda, levissime compressa, sub cortice fusco medullam albam, insipidam, inodoram continent. *Ervum Ervilia* L. Europæ Meridionalis & Orientis annua planta, nostræ quoque regionis culturam admittit: *Farina quatuor Resolventibus adnumeratur; Internum ejus usum sunt, qui non hominibus solum, sed equis, quin & Gallinacæ damnosum esse contendunt.*

ORYZA, *Ris, Reis*. Semina decorticata, oblonga, ventricosa, utrinque compressa, concava, subdiaphana, albissima, striis distincta, friabilia, insipida, inodora. *Oryza sativa* L. Asiæ & Americæ indigena, in America, Italia & Hispania copiose colitur. Annua planta apud nos, feminum ad maturitatem promovendorum causa, in vaporario servanda. *Hispanica* rubet, *Carolinensis* Europæam albedine, magnitudine, pelluciditate vincit. Mucilaginis siccæ $\frac{1}{2}$ largitur. *Vulgatissimus Orientis cibus, nostris quoque mensis copiose apponitur. Demulcendi ergo agrotis datur, contra Alvi fluxus efficax celebratur.*

OSMUNDA, videatur **LUNARIA**.

OSTEOCOLLA. Concrementa calcarea, alba, figura oblonga, superficie aspera. Sunt vel Stalactites vulgari ratione orti & tales ut plurimum in Officinis prostant, vel stipites arborum carie exesi, terra calcarea & sabulo facti, vel incrustationes Vegetabilium calcareæ, destructo Vegetabili superstites. Passim per Europam reperitur. *Ossa consolidandi vires eis adscriptæ dudum explosæ sunt.*

OSTRUTIUM, videatur **IMPERATORIA**.

OVUM, videatur **GALLINA**.

OXYACANTHA, *Epine blanche, Weisdornen*. Flores albi, pentapetali, petalis rotundis, leviter ferratis, fragrantibus. *Fructus* bacca sunt ex elliptico subrotundæ, umbilicatæ, singulæ ad quaterna usque femina fertiles, rubræ, insipidæ, inodoræ. *Cratægus Oxycantha* L. **BLACKWELL** Tab. 149. Copiosus ejus per Europam proventus est. *Flores Floribus Acaciæ, quamvis gratia inferiores, substitui solent. Fructus, Acaciis utique inertiores, leviter adstringunt.*

OXYCOCCUS, *Canneberge, Moosbeeren, Kesselbeeren.*
Baccæ

Baccæ rubræ, globosæ, umbilicatæ, succo rubro turgentes, inodoræ, gustu, si quidem glaciæ adustæ fuerint, acidulæ. Vaccinium Oxycoccus L. Europæ temperatæ & frigidæ planta, in hortis coli ægre patitur. *Fructus Refrigerandi scopo ægrotantibus præbentur; Scorbuto quoque adversari dicuntur. Succus baccarum æquis partibus cum Melle mixtus in Suecia officinalis est & Febricitantibus laudatur.*

PANIS, *Pain, Brod.* Sub crusta varii coloris, odoris, saporis, duriuscula, friabili continet substantiam mollem, multis foraminibus hiulcam, pro Farinæ, unde conficitur, varietate, varia albedine instructam, quæ *Mica* dicitur. Albedine, levitate, numero foraminum probatur. Est Farina iusta Fermentatione viscido exuta, unde Pani præter farinam ex vario tam fermentationis, quam coctionis, quam expertus est modo, novæ nascuntur diversitates. *Crusta scopo Roborandi ex Jure coquitur. Mica vires Emollientes edit.*

PÆONIA, *Pivoine, Gichtrose.* Radix tuberosa, sub cuticula ferruginei coloris, qua Radix ad usus medicatos recipienda nudari debet, candida est, odoris gravis, saporis leviter adstringentis, nauseosi. *Florum* petala asservantur profunde rubra, odorem exsiccata exiguum, saporem nullum habent. *Semina* sunt ovata, nigra, medullam habent duriusculam, albam, dulcem. Pæonia officinalis L. BLACKWELL Tab. 65. & 245. In Europa calidiore sponte crescit, nostras hyemes optime fert. *Vires Antispasmodicas edere dicitur.*

PALMÆ OLEUM. Albissimum est, inodorum, insipidum, in nostro aëre semper spissioris Unguenti consistentiam habet. Recens aurantium colorem habere, suavissimum Iridis odorem spirare, obtineri coctione fructus *Palmarum* fertur, in America calidiore crescentium, quarum vero genus, quale sit, adhuc in dubio ponitur. *Præ reliquis Oleis unguinosi nihil eximii præstare videtur.*

PAPAVÉR ALBUM vel NIGRUM, *Pavot, Magsaamen.* *Capsulæ* seu *Capita* majuscula sunt, rotunda, operculo rotundo, striato tecta, sub quo orificium capsulæ hiat, odorem recentes valde virosam, exsiccata exiguum spirant. *Semina*

minuta sunt, rotunda, dulcia, sive albissima, sive nigra, vel potius cæruleſcentia. Capita largiuntur *Opium* ſuo loco dictum. *Capita exſiccata aliquantum Sopientium edunt effectum, quo ſcopo unum Caput pro doſi ex aqua coquitur, ſive Syrupus ex eorum Decocto paratus exhibitur. Semina plane nihil præ aliis ſeminibus oleoſis proprii habet. Oleum inde expreſſum Gallorum Huile d' Oeillet, ne acerrimo quidem noſtræ regionis frigore denſatur. Piſtoribus frequentiffimus ejus uſus eſt; ad lucernarum lumina nutrienda adhibetur, frigide expreſſum non raro ad Acetaria quoque recipitur.*

PAPAVER RHOEAS vel **ERRATICUM**, *Coquelicot, Klapperroſen. Flores* ex calyce evulſi, petala rubra ſunt, rotundata, odore levi, non admodum grato, ſapore dulciusculo perſuſa. *Papaver Rhoëas* L. **BLACKWELL** Tab. 2. Vel nimis frequenter in agris per Europam offenditur. Aquam hi flores, diutius immerſi, mucilaginoſam reddunt. *Demulcendi & Relaxandi ſine ſub forma ſive Infuſi, ſive Syrupi exhibitur. Extractum e Capitibus aquoſum quidam a Granis ſex ad octodecim uſque Sopiendi ergo adhibent & Opio præferunt.*

PARADISI GRANA, *Malaguëtte, Maniguette, Paradieskærner. Semina* parva, angulata, badia, intus alba, odore aromatico, minus forti, ſapore fervido imbuta. *A m o m u m Grana Paradisi* L. Copioſe in Africa Occidentali occurrit. Pauxillum Olei oderati, ſuaveolentis fundunt. *Efficacia virium ad Piper accedunt.*

PAREIRA BRAVA. Radix magna, brachium interdum & ultra craſſa, ſub cortice rugoſo, dilute fulco ſubſtantiam lignoſam, luteſcentem, inodoram & amaram condit. *Ciſſampelos Pareira* L. In America calida creſcit. Anno 1688. Pariſios allata in uſum trahi cœpit. *Reſolventibus & Diureticis viribus pollet. Drachma ejus una cum octo Unciis Aquæ ad remanentes ſex Uncias cocta datur pro doſi.*

PARIETARIA, *Caffepierre, Glaskraut, Tag-und Nacht-Kraut. Folia* ovato-acuta, petiolata, ſupra ſaturate viridia, rugoſa, pilis ſparſa, ſapore leviffime adſtringente prædita. *Parietaria Officinalis* L. Creſcit in Europa temperata,

parcius jam in Alsatia & Palatinatu occurrit. *Cum in ruderatis crescat, fuerunt qui Calculum ea imminui crederent.*

PARIS, *Raisin de Renard, Wolfsbeere, Einbeere.* Folia ovato-acuta, obscure viridia, inodora, fatua, nauseosa, *Baccæ nigræ, globosæ, tetragonæ, apice depressæ, fatuæ.* Paris quadrifolia L. BLACKWELL Tab. 286. Crescit in omni Europa. Plantæ nonnullis suspectæ *Folia siccata non modo non nocuisse, sed ad Scrupulum unum pueris in Convulsionibus data saluberrimos edidisse effectus gravissimi Auctores testantur. Baccæ Maniacis ad Drachmam unam pro dosi commendantur.*

PASSULÆ MAJORES, *Raisins secs, Zibeben, Meertrauben.* Baccæ Uvarum exsiccata, ovata, rugosæ, ex flavo in brunum vergentes, splendentes, pulpam dulcissimam & plura semina continent. Quatuor eorum genera in nostris tabernis prostant, *Damascenæ, sive Smyrnenses,* maximæ ad parvi Pruni magnitudinem accedentes, compressæ, fulvæ, haud adeo ut reliquæ exquisiti saporis; *Raisins aux Kubis* ventricosæ sunt, antecedentibus paululo minores; *Calabrinæ* ventricosæ racemis adhuc adhærentes & filo colligatæ; *Vulgares* solutæ & minores ex Gallia Meridionali quoque advehuntur. Sunt multifariarum varietatum *Vitis Viniferæ* L. baccæ Lixivio Alcalino interdum etiam aliquantulo Salis & Olei misto maceratæ & deinceps super stramenta Sole siccata.

PASSULÆ MINORES, *Raisins de Corinthe, Corinthen, Rosinlein.* Baccæ exiguæ sunt Ribesiis minores, rotundæ, ex purpureo nigricantes, rugosæ, dulcissimæ, subacidæ, in matricatis lingua nulla semina sentit. Desumuntur a *Viti vinifera Apyrena* L. quæ in pluribus Archipelagi Insulis copiose colitur; acini affatim maturi Aëre & Sole exsiccati peculiaribus cellis inferuntur, mercantibus tradendi. *Passulas Nutrientes, Saponacæ & Demulcentes vires commendant.*

PASTINACA, *Panais, Pestnagel.* Radix fusiformis, alba, rugis transversalibus rugosa, carne laxiore, proprio odore, sapore dulci, nonnihil aromatico perfusa. *Semina ovalia sunt, compresso-plana, marginata, striata, flavicantia, odorem radice spirant aromaticum, linguam evidenter pungent.*

tem saporem habent. *Pastinaca sativa* L. BLACKWELL Tab. 379. Crescit passim per Europam. Aliquid Olei odorati, nec non Sacchari largiri dicitur. *Viribus ad Daucum accedit.*

PATIENTIA, *Butterweckel*. Radix fusiformis, extus ex rufo-lutescens, intus totalutea, saporis amaricantis, adstringentis, acris. *Rumex Patientia* L. BLACKWELL Tab. 489. Italiae indigena, nostratum hyemum patientissima. *Efficacia viriam Lapatho acuto proxima est.*

PENTAPHYLLUM, *fünf Finger Kraut*. Radicum non nisi cortex vulgo recipitur, qui rufus & sapore evidenter adstringens est. *Folia* in quinque, interdum septem lacinias inæquales, ferratas divisa, levi modo sapore linguam stringunt. *Potentilla Reptans* L. Per omnem Europam vulgaris. *Olim Adstringendi scopo adhibebatur.*

PERCARUM LAPIDES, *Pierres de Perches*, *Bersing* vel *Kaulparsstein*, sunt exigui, elliptici, albi, semipellucidi, superne duplici linea longitudinali notati, duri, insipidi, cum Acidis effervescent; bini in Perca fluviatili L. ad Oflis Occipitalis inferiorem, Vertebris vicinam partem hærent. *Vires Absorbentes possident.*

PERFOLIATA, *Percefeuille*, *Durchwachs*. *Folia* ovato-oblonga, obtuse terminata, glabra, saporis & odoris expertia. *Semina* exigua sunt, nigra, duriuscula, inodora, sapore adstringentia, austera. *Bupleurum Rotundifolium* L. In Europa temperata crescit. *A quibusdam ad Hernias commendabatur.*

PERSICA, *Pêche*, *Pfersich*. Flores pentapetali, petalis rotundatis, roseis, calyce quinquefido, viridi comprehensi, suaves odore, sapore amaricantes. *Fructuum* innumeræ varietates prostant, magnitudine, figura magis minusve ovata, colore, glabritie &c. a se invicem diversæ; omnium promiscue suavis odor est, sapor dulcis, vinosus, utroque pro generis diversitate nonnisi gradu differente. *Officulum* ovatum, rufescens, ventricosum, profunde sulcatum continet *Nucleum* ovatum, compressum, sub cuticula fusca medullam continentem albam, grate olentem, amaricantem. *Amygdalus Persica* L. BLACKWELL Tab. 101. Americae & Asiae indigena arbor, longe plu-

rimas varietates produxit, quarum quædam apud nos sylvestres sunt, pleræque in hortis coluntur. *Flores Alvi ducendæ gratia præscribuntur. Fructus in cibum recipiuntur, Nuclei Amygdalis amaris saporis gratia sunt præferendi, viribus æquiparandi.*

PERSICARIA ACIDA, *Saamkraut, Sommerlock*. Folia petiolata, ovato-lanceolata, coriacea, levissime ferrata, evidenter acida. *Polygonum Amphibium* L. Ubivis per Europam obvium. *Fuerunt qui vim ei Lithontripticam tribuerent.*

PERSICARIA ACRIS, *Hydropiper, Curage, Poivre Aquatique, Wasserpfeffer, Muckenkraut*. Folia petiolata, lanceolata, mucronata, interdum rubro interdum flavo colore tincta, sapore acri perfusa. *Polygonum Hydropiper* L. BLACKWELL Tab. 119. Copiose per Europam crescit. *Extus ad Œdemata Discutienda laudatur.*

PERSICARIA MITIS, *Parietaire, Fløehkraut*. Folia petiolata, obtuse terminata, non raro macula nigra notata, aliquantulum hirsuta, saporis levissime aciduli & acriusculi. *Polygonum Persicaria* L. BLACKWELL Tab. 118. Vulgare per Europam. *Extus contra Gangrænam commendatur.*

PERUVIANUM BALSAMUM. Balsamo de Copaiba spissius, odorem habet fragrantem, saporem leniter acrem, colorem ex purpureo-nigricantem. Ex America calida nobis venit; Arboris, unde colligitur, character adhuc dum latet; obtineri dicitur e virgulis arboris cum Aqua coctis; illud vero, quod arbor sponte fundit, album, nigroque multo præstantius esse perhibent. Oleum odoratum, Benzoën redolens, fundit, Floresque, dum destillatur, exhibet Benzoinis satis similes; Oleis non dissolvitur, cum Oleo unguinoso digestum spissum Resinæ ductilis consistentiam induit. *Intus æque ac extus ad Consolidanda Vulnere & Ulcera adhibetur, læsis quoque Tendinibus & Membranis salutariter applicatur.*

PERUVIANUM BALSAMUM SICCCUM vel *Opopal-samum siccum*. Sub specie Resinæ ex purpureo-flavicantis, Benzoën evidenter redolentis, in Cucurbitulis, fungosa quadam substantia obturatis, ad nos pervehitur. *Intus ob vires Balsamicas adhibetur.*

PETASITES, *Pestilenzwurzel*. Radix fibrosa, digitum crassa, extus fusca, intus alba, odorem exsiccata admodum tenuem, saporem acriusculum, amaricantem habet. Tussilago Petasites L. BLACKWELL Tab. 222. Totius Europæ domestica. Olei quid odorati fundere, *Putredini resistere fertur*.

PETROLEUM, *Steinöl*. Oleum ex terræ visceribus profluens, empyreuma olens, gustu acre; *Nigrum* reliquis spissius est & gravius olens; *Rubri* tenuior fluiditas, color magis minusve dilutus, odor & sapor penetrantior est; *Album* pelluciditatem aquæ æmulatur, fortiorem reliquis, sed minus nauseosum odorem spirat; hoc proprie *Naphta* dicitur; priora passim in Europa ceterisque Orbis partibus reperiuntur; posterius in Oriente maxime, cujus quidem in locum Officinæ ut plurimum dilutius Rubrum usurpare solent. *Viribus Petroleum ab Asphalto fere nihil differt, specificè contra Taniam commendatur*.

PETROSELINUM, *Perfil*, *Peterfilien*, *Peterlein*. Radix fusiformis, sub cuticula flavicante, rugis annularibus notata, carnem includit albam, proprium odorem spargentem, sapore dulcem, leniter aromaticam. *Folia* petiolis sulcatis insident, pinnulis ternatis, integris & incisus duplicato-pinnata, odorem æque ac saporem aromaticum habent; *Semina* sunt convexo-plana, oblonga, profundius striata, saporis aromatici, non admodum grati. *Apium Petroselinum* L. BLACKWELL Tab. 172. In Sardinia sponte crescere dicitur, ubique in hortis colitur. Oleum odoratum Radices & Folia parcissime, Semina largius fundere ferunt. *Radices tanquam Oulus eduntur, Foliis cibi condiuntur; extus eadem ad Lac discutiendum applicantur, omnibus Petroselini partibus vis Diuretica tribuitur*.

PETROSELINUM MACEDONICUM. Semen oblongum, utrinque acutum, striatum, villosum, leviter odorem, evidenter aromaticum. *Bubon Macedonicum* L. BLACKWELL Tab. 382. Orientis indigena, biennis planta, nostratium hyemum patiens. *Ob vim Carminativam & Diureticam olim celebrabatur*.

PEUCEDANUM, *Queue de Pourceau*, *Haarstrang*. Radices fibrosæ, extus fuscæ, intus albæ, proprium odorem,

non nauseosum, saporem dulciculum, leviter aromaticum habent. Peucedanum Officinale L. Europæ temperatæ indigenum. *Viribus Aperientibus pollet, Alyum leniter laxare asseritur.*

PELLANDRIUM, *Ciguë des Marais, Wasserfchierling*. Semen ovali-oblongum, striatum, ex viridi-purpurascens, odoris aromatici, saporis acriusculi. **Pellandrium Aquaticum** L. Passim per Europam crescit. Oleum odoratum fundere dicitur. *Ad sananda Ulcera externa & interna & contra Febrem intermittentem a nonnullis commendatur.*

PHU, *grande Valeriane, Katzenwurzel*. Radix cinerea, oblonga, digitum circiter crassa, annulatim rugosa, in omnem longitudinem fibræ dimittit longitudinales, descendentes, se ipsa longiores & pallidiores, odorem proprium, fortem, minus gratum spirat, sapore falso, amaricante, linguam leviter pungit. **Valeriana Phu** L. **BLACKWELL** Tab. 250. Crescit in Europa temperata. *Viribus efficacius etiam quam Valeriana officinalis agere videtur.*

PHYTOLACCA. Folia majora, ovata, integerrima, utrinque viridia, sapore leviter acri instructa. **Phytolacca Decandra** L. In Virginia, Italia & Helvetia sponte crescit, nostræ hyemis patientissima. *Fuerunt, qui ejus contra Cancrum efficaciam laudarent.*

PICHURIM FABÆ. Nucleus ovato-oblongus, utrinque obtusus, sesquipollicem circiter longus, octo lineas latus & aliquot crassus, superne convexus, inferne concavus, sub epidermide nigricante medullam ferruginei coloris includit, grate aromaticum spirat odorem, suavique sapore linguam pungit. Suspicio est, a quadam *Lauri* specie in Paraguay crescente eam decerpi. Olei expressi, fragrantissimi $\frac{1}{3}$ circiter fundere fertur. A quinque fere retro lustris in Suecia exorsus ejus usus, multum deinceps laudatus est *in sistendo Alyi fluxu. Datur ad Drachmam semis.*

PILA MARINA, *Meerballen*. Substantia levis, rotunda, ex recrementis radicum conglomeratis efformata, odoris & saporis expers. Formatur ex dissolutis & agitatione Maris conglomeratis tuberibus **Radicum Zosteræ marinæ** L. quæ in

Oceano & Mari Balthico reperitur. Liquorem Urinosum fundit. *Usta contra Strumas commendatur.*

PILOSELLA videatur **AURICULA MURIS**.

PIMPINELLA ALBA, *Bouquetine*. Radices cylindraceæ, digitum circiter crassæ, rugosæ, odoris levis, saporis evidentè acris ad Saponem accedentis. *Pimpinella Saxifraga* L. BLACKWELL Tab. 472. Oleum fundere dicitur acerrimum. Passim in Europa crescit. *Multum laudis in virtute ejus Resolyente & Aperiente ponitur, maxime contra morbos Mucosos. Datur ad Drachmam dimidiam in substantia, ad Sesquidrachmam in Infuso.*

PIMPINELLA NIGRA. Radix cylindrica esse fertur, digitum crassa, apice ramosa, sub cuticula fusco-nigra, medullam continere cæruleam grati odoris, saporis dulcescentis, mite aromatici. *Pimpinella magna* L. Marchiæ propria, in quibusdam etiam Europæ temperatæ Floris occurrit. Oleum eam fundere sapphirinum dicunt, & cæruleo colore tingere tam Aquam, quam Spiritum Vini inde abstrahendum. *Egregium Resolvens, contra Calculum etiam Remedium habetur.*

PIMPINELLA RUBRA, vel **ITALICA**, *Sanguisorba*, *Pimpernelle*. Folia pinnata, nervo hirsuto instructa, foliolis breviter petiolatis, ovatis, obtusis, profunde crenatis, subtus glaucis, levissimo sapore & odore imbutis. Poterium Sanguisorba L. BLACKWELL Tab. 413. *Ad Acetaria recipitur & a Medicis scopo Tonico recens præscribitur.*

PINEÆ, *Pignons*, *Pinien*. Nuclei parvi, oblongi, ventricosi, utrinque obtusi, albissimi, tunica rufescente, gracili, sicca vestiti, sapore perfusi dulci, aliquatenus proprio, neque admodum grato; vel levissima flavedine tincti rejiciendi sunt. *Pinus Pineæ* L. BLACKWELL Tab. 189. In Europa calida crescit, apud nos in frigidario per hyemem custodienda. Pineæ ultra tertiam sui ponderis partem Olei odorati fundunt. *Nostrates eas fere non nisi ad Resinosam in Pulverem aut Emulsionem redigenda adhibere solent.*

PINI RESINA, *Poix Resine*. In frustis variæ magnitudinis existat, quæ flava sunt, nitida, facie vitrea, subdiaphana, odoris non ingrati, nec fumus accensorum nauseosus est. Mi-

nora

nora hujus Resinæ frusta, a Formicis in suas penus coacervari solita, *Olibani sylvestris* nomine veniunt. Ex annosiore quaque Pinu sylvestri L. passim per Europam obvia arbore sponte effluit. *Recipitur ad Emplastra & Unguenta Roborantia & Maturantia.*

PINI STROBILI. Sunt tenellæ ramorum propagines terminales, cylindroidæ, extus rufæ, intus virides, squamis subdiaphanis, ciliatis imbricatæ, odoris balsamici, ejusdemque & amariusculi insuper saporis. Desumuntur a Pinu sylvestri L. *Eorum Uncia una cum Aquæ Unciis triginta sex, per viginti quatuor horas infusa, Scorbüticis magnopere commendatur. Recentes exsiccatis multo præstantiores sunt.*

PIPER ALBUM, *Poivre blanc, weisser Pfeffer.* Semina parva, rotunda, lævia, alba, odoris proprii fortis, saporis aromatici, linguam urentis. Sunt Semina matura Piperis nigri L. **BLACKWELL** Tab. 348. Infularum Asiaticarum fruticis, cuticula externa nudata. Olei mitis $\frac{1}{64}$ fundunt. Ejus Extractum tam aquosum, quam spirituosum acerrimum esse dicitur. *Multum calefacit, cibus condimenti loco adjicitur, valide Resolvit & contra morbos Frigidos adhibitum admodum efficax habetur. Cavendum vero, ne dosis ultra Scrupulum dimidium extendatur. Extus Apophlegmatizandi scopo adhibetur.*

PIPER JAMAICENSE, videatur **AMOMUM.**

PIPER INDICUM vel **HISPANICUM.** Capsulæ variæ tam figuræ, quam magnitudinis, coloris etiam, quanquam ut plurimum rubræ sunt, nitidiusculæ; calyce sustentantur viridi, quinquefido, sub cute subcarnosa, pulpam includunt flavicantem, siccam, Semina alba, subrotunda, compressa continentem, odor nullus, sapor acerrimus est, linguam urens, aromatis expers. Capsicum annuum L. **BLACKWELL** Tab. 129. Americæ indigenum in hortis colitur. Infusum aquosum Vitrioli & Alcoholis ope in gelatinam cogi fertur. *Americanis acceptissimum condimentum, ad Grana sex pro dosi datum Febres pertinaces curasse observatum est. Apud nos non nisi ab Cœnopolis ad acuenda vilioris notæ Aceta adhiberi solet.*

PARS I.

Y

PIPER LONGUM, *Amentum* cylindraceum, aliquot pollices longum, totum seminibus protuberantibus quasi totidem squamis prorsus obfessum, odorem, saporem, vires etiam Piperis albi refert, quo tamen mitius est. Piper longum L. BLACKWELL Tab. 356. Eandem cum *Pipere albo* patriam habet.

PIPER NIGRUM. Est Piper album, immaturum, cuticula sua adhuc contectum, nigrum, rugosum, intus album, odore *Pipere albo* fortius, sapore etiam ardentius.

PISTACIÆ NUCES, *Pistaches*. Nuclei oblongi, obsolete trigoni, sub cuticula rufescente, medullam viridem, dulcem & suavem includunt. Pistacia Vera L. BLACKWELL Tab. 461. Arbor Asiæ indigena, in Europa calida copiose colitur; apud nos in frigidario contra hyemem defendenda. *In blandimentum gustus Bellariis & Morfulis immiscetur.*

PIX BURGUNDICA, videatur RESINA.

PIX NAVALIS, *Goudron, Theer, Schiffdœrr*. Est Oleum empyreumaticum, spissiusculum, consistentiæ Mellis, nigro-rubicundum, odorem spirans balsamicum, empyreumatico junctum, sapore perfusum amaricante. Obtinetur ex lignosis partibus *Pinus Sylvestris* L. Arboris supra dictæ, ope distillationis per descensum. Probitas ejus ex aqua ei affusa dijudicatur, siquidem non albido eam, sed rufo-rosaceo colore imbuat. *Propter Balsamicoseffectus Phthificis eam Veteres commendare solebant. Ejus Infusum recentioribus temporibus morbis Malignis, Scabie &c. laborantibus enixe commendabatur, videatur P. II.*

PIX NIGRA, *Poix, Pech*. Est nigra, atra, lucida, in calore tenax, digitis fortissime adhærescens, fragilis, fractura vitriformis, odore & sapore Pici navali multum cedens, ex qua sub perpetua agitatione ad siccitatem cocta paratur. *Tenacitatis gratia Emplastris additur; contra Clavos pedum & Malum Ischiadicum efficax fertur. Eviluit crudelis Dropacismus.*

PLANTAGO, *Plantain, Wegerich*. Radices rufæ, ex capite parvo quam plurimas fibrillas albas protrudunt, inodora, sapore falso, in fatue-dulcem se resolvente. *Folia* alias lata, ovata, magnis petiolis instructa, glabra, septem nervis

percurfa, faporis & odoris fere vacua; alias angufta funt, lanceolata, quinquenervia, perinde infipida. *Semina* exigua, rubra, lævia, inodora, faporis mucilaginosi. *Plantago Major* L. BLACKWELL Tab. 35. & *Lanceolata* L. BLACKWELL Tab. 14. *Crescunt ubique per Europam. Succus ex Foliis expreffus eminenter falſus eſt. Radicum contra Febres; Foliorum in Decoctionis Vulnerariis uſus ſalutaris habetur; eadem recentia Inſectorum puncturis cum ſucceſſu imponuntur.*

PLUMBUM, *Plomb, Bley*. Metallum albidum, ad nigredinem vergens, minimæ firmitatis, omnium molliffimum, præter Mercurium graviffimum, paulo majorem, quam Stannum, calorem ad fui fuſionem exigit, Aqua, Acidis, Alcalibus, Oleis perinde diſſolubile. Exhibetur a Natura ſub forma variarum glebarum, paſſim in Europa occurrentium. *Intus cum pernicioſiſſima excitet ſymptomata nunquam dandum; extus ad Siccandum & Diſcutiendum haud fruſtra adhibetur.*

POLIUM CRETICUM, *Cretiſcher Poley*. *Cauliculi* tetragoni, tomentofi, *Foliolis* obſeſſi linearibus, ſuperne crenatis, albidis, calycibus terminati parvis, tomentofis, parum odoris; ſaporem habent pungentem & amaricantem, odorem fragrantem. *Teucrium Creticum* L. Archipelagi. *Quod ſubſequitur Polium, cum in noſtris ſaltem officinis plus aromatis habeat, hujus uſum fere abrogavit.*

POLIUM MONTANUM. *Cauliculi* *Foliis* oblongis, craſſis & *Capitulis* obſeſſi *florigeris*, utriſque tomentofis; odorem habent fragrantem, ſaporem amarum & pungentem. *Teucrium Polium* L. BLACKWELL Tab. 456. *Creſcit in Europa temperata. Olim ad Viſcera referanda, Urinam & Menſtrua pellenda adhibebatur.*

POLYGALA, *Kreuzblume*. Radices fibroſæ, tres fere pollices longæ, graciles, ex capite craſſiuſculo ſenſim filiformes, colore extus pallide luteo, intus albiffimo, exſiccatae admodum duræ ſunt, nullum odorem, ſaporem habent leviffime falſum. *Polygala amara* L. *Creſcit in Europa temperata. In Phthiſi eam Recentiorum Medicorum nonnulli commendant, vel ad dimidiam Drachmam bis de die ſub forma Pulveris, vel ejus*

Decoctum scilicet Uncias duas cum Aquæ duabus libris ad unius libræ consumptionem coctas subinde per diem exhibendas.

POLYPODIUM, *Engelsius*. Radices admodum longæ, anserinum fere calamum crassiæ, eminentibus tuberculis, velut articulis divisæ; sub cortice rufo medullam includunt flavam, virefcentem, odorem muscosum, saporem cum adstrictione dulcem. *Polypodium Vulgare* L. **BLACKWELL** Tab. 215. Crescit per omnem Europam. Radices inter coquendum amarescunt. *Infusum aquosum ad Resolvendum, Viscera Abdominalia reseranda, nec non ad scopum Eccopropticum valet.*

POMA, *Æpfel*. Fructus innumerabilium pene varietatum; jam enim differunt figura, quæ tamen ut plurimum ovali-subrotunda deprehenditur; jam colore; jam sapore acerbo, acido, dulci, vinoso; jam magnitudine; jam maturandi celeritate, qua quidem dulcia omnino vinosis præstare compertum est; ad basin concava, umbilico depresso notata sunt; pulpa quinquelocularis, odor fragrans est & plura Semina continet. *Pyrus Malum* L. *Viribus saponaceis pollent; dulcia Demulcent, in morbis Pectoris potissimum proficue adhibenda; vinosa Refrigerant, Humorum Æstum temperant.*

POMPHOLYX, videatur **NIHILUM**.

POPULUS, *Peuplier, Pappel*. Prostant *Oculi* seu Gemmæ ovato-oblongæ, flavo-rubræ, ex squamis variæ magnitudinis sibi invicem incumbentibus imbricatæ, verno tempore succo fœtæ sunt viscido, digitis adhærente, suaveolente, amaro. Ante foliorum evolutionem colligendæ. *Populus nigra* L. **BLACKWELL** Tab. 248. Magna ejus ubique per Europam copia provenit. Expressione Refinam, destillatione cum Aqua aut Spiritu Vini Oleum odoratum fundere dicuntur. *Propter Balsamicas vires a nonnullis adhibiti, hodie maxime ad parandum denominatum inde Unguentum colliguntur. Exsiccati virtute sua penitus destituti deprehenduntur.*

PORCUS, *Porc, Schwein*. *Sus scrofa* L. Animal quadrupes per omnem Europam indigenum. *Axungia, Saindoux* pinguedo mollicula, alba, insipida, inodora, ex Mesenterio hausta. *Reliquarum Axungiarum viribus par ad plura Unguenta recipitur.*

PORRUM, *Porreau, Lauch. Bulbus* conoideus, albus, striatus, tunicis ficcis vestitus, proprium odorem, Cepaceo mitiorem, similemque saporem emittit. *Folia* habet longa, plana, profundius viridia, odoris, saporisque itidem proprii, Cepaceo mitioris, nonnihil dulcis. *Allium Porrum* L. BLACKWELL Tab. 421. Copiose in hortis colitur. *In culinas tanquam olus recipitur. Becchicum, Diureticum, Lithonripticum medicamentum in laude fertur.*

PORTULACA, *Pourpier, Burzel. Folia* carnosa, cuneiformia, nitidiuscula, viridia, punctulis notata, insipida, inodora; *Semina* exigua, nigra, rotunda, rugosa, saporis oleofi. *Portulaca Oleracea* L. In Europa temperata & Oriente copiosa, in hortis colitur. *Aperientia, Refrigerantia, Antiscorbutica Folia, non nisi recentia adhibenda. Semina Refrigerantibus minoribus adnumerabantur.*

PRIMULA VERIS, *Paralysis, Primevere, Schlüsselblumen, Himmelschlüssel.* Flores calyce exempti, infundibuliformes, quinquefidi, limbo concavo, flavi, sapore dulciculi, suaves odore, qui exsiccando minuitur quidem, neutiquam vero tollitur. *Primula Veris officinalis* L. BLACKWELL Tab. 226. Crescit per omnem Europam. *Ad Infusa Cephalica recipiuntur.* Aqua inde destillata, quæ vulgo in officinis prostat, iners est.

PROPOLIS, videatur CERA.

PRUNA, *Prunes, Zwetschen, Pflaumen. Drupæ* variætam magnitudinis, quam figuræ, creberrime quidem ovatæ, varii etiam coloris, ut plurimum tamen cæruleæ, sub cute nitida pulpam habent frequentissime flavescentem, odoratam, dulcem, pro varietate diversa aquosam, quæ officulum includit scabrum mox oblongum, compressum, mox ovatum, *Nucleum* continens dulcem, suavem, vix amariuscolum. *Prunus domestica* L. BLACKWELL Tab. 494. Europæ Australis indigenæ arboris, nostrates plurimas Varietates in hortis colunt. *Vires saponaceas & Antiputridas cum reliquis Fructibus horæis communes habent; exsiccatæ & cum Aqua decoctæ solvendæ Alyo inserviunt.*

PSYLLIUM, *Herbe aux puces, Fløehsaamen.* *Semina* ovali-oblonga, convexo-concava, nigra, nitida, sub dentibus

lentescentia, insipida, inodora. *Plantago Pfyllum* L. BLACKWELL Tab. 412. Europæ Australis domestica, nostræ hyemis patiens. Mucilaginis $\frac{1}{8}$ largitur. *Mucilago inde parata interdum intus Demulcendi scopo, extus contra Ophthalmiam adhibetur.*

PTARMICA, *Herbe à éternuer, wilder Bertram.* Radix fibrosa, alba, leviter geniculata, inter masticandum primum insipida, dein evidenter acris deprehenditur. *Achillea Ptarmica* L. BLACKWELL Tab. 276. Passim per Europam obvia. *Apophlegmatizandi scopo sunt, qui eam Radicibus Pyrethri substituunt.*

PULEGIUM, *Puliot, Poley.* Cauliculi tetragoni, pubescentes, *Foliis* obseffi petiolatis, ovatis, obtusis, crenatis, albidis & verticillis calycum quinquefidorum, pubescentium, Flores labiatos continentium; odor ut & sapor proprius, aromaticus est. *Mentha Pulegium* L. BLACKWELL Tab. 302. Crescit in Europa temperata. Olei odorati $\frac{1}{320}$ fundit. *Ad morbos Uterinos maxime adhibetur.*

PULMONARIA ARBOREA, *Pulmonaire de Chêne, Lungenmoos.* Lichen e latis, laciniatis, coriaceis foliis efformatus, alternis eminentiis, vesicis similibus, & lacunis distinctus, flavicans, inferne tomentosus, inodorus, saporis falsi, levissima amaritie submixta. *Lichen Pulmonarius* L. BLACKWELL Tab. 335. Per omnem Europam truncis arborum ad crescere solet. *In Resolvendo efficax morbis Pulmonum & Laterum laborantibus laudatur.*

PULMONARIA MACULOSA, *Pulmonaire, gefleckt Lungenkraut.* Folia ex ovatis lanceolata, ciliata, hirsuta, maculis albis notata, subtus albicantia. *Pulmonaria officinalis* L. BLACKWELL Tab. 376. Vulgaris per Europam planta. *A nonnullis Hæmoptoicis & Phthificis commendabatur.*

PULSATILLA, *Coquelourde, Kuchenschell.* Folia petiolata, pinnis linearibus & acutis bipinnata, subtus hirsuta, odore levi, sapore primum levi, dein multum acri. *Anemone pratensis* L. Passim per Europam obvia. Aquam destillatam valde acrem, nonnihil Camphoræ emittentem, fundere dicitur. *Succus inspissatus sub Extracti nomine ad Scrupulum semis exhibetur. Variis Oculorum morbis medelam attulisse Illustris STÆRC observavit.*

PUMEX, *Pierre Ponce*, *Bimsenstein*. Lapis variæ magnitudinis, aqua levior, multis foraminibus excavatus, non admodum durus, friabilis, saporis & odoris per se expers, si quid habet, mari debet, cui innataverat. *Pumex Vulcani* L. Montium Ignivomorum partus, ad eorum tam adhuc dum ardentium, quam dudum extinctorum oras invenitur, Mari etiam illis vicino haud raro innatat. *Ad Dentifricia adhibetur.*

PYRETHRUM, *Bertram*. Radices aliquot pollices longæ, calamum anserinum circiter crassæ, cylindraceæ, fibras capillares emittentes, gryseæ, intus albæ, odoris expertes, sapore acres, linguam urentes. *Anthemis Pyrethrum* L. BLACKWELL Tab. 390. Europæ Meridionalis & Africæ Orientalis propria; in Thuringia & ad Magdeburgum colitur. *Apo-phlegmatizandi scopo adhibetur.*

PYROLA, *Wintergrün*. Folia rotunda, petiolata, minutim ferrata, superne saturate viridia, subtus pallidiora, saporis adstringentis. *Pyrola Rotundifolia* L. In omni Europa crescit. *Tam intus ad Roborandum & Adstringendum, quam extus ad Iniectiones & Gargarismata recipitur.*

PYRUS, *Poire*, *Birne*. Fructus turbinati, umbilicati, quinqueloculares, magnitudine, colore, sapore, qui tamen in omnibus plus minusve adstringit, tempestivitate etiam maturescendi plurimum variantes; Semina continentes ovato-oblonga, nigricantia, dulcia. Fragrantia præcoces reliquos antecellunt. *Pyrus communis* L. BLACKWELL Tab. 453. Innumeræ varietates in hortis coluntur. *Fructuum horæorum viribus pollent; ad solvendum Calculum & Aperiendam Alvum apti prædicantur.* Varietates acerbiores coctione cum aqua mitigantur.

QUASSIA. Lignum solidum, leviusculum, cortice ex gryseo albo, intus abescente tectum, flavicans, in tenues lamellas secedens, inodorum, amarissimum. *Quassia amara* L. Surinami indigena. Extracti aquosi amarissimi $\frac{1}{8}$, Spirituosi $\frac{1}{24}$ largitur. A quinque retro lustris in Europa ad Rem medicamentariam admitti cœpit. *Roborando Ventriculo, Arthritidi Febribusque Intermittentibus sanandis commendatur. Drachma ejus una*

cum duodecim Aquæ Unciis infunditur. Aptissime sub forma Extracti datur.

QUERCUS, *Chêne, Eiche.* Corticem habet crassum, extra cinereum, intra ferrugineum, acerbum, stypticum. *Folia* cuneiformia, oblonga, firmula, laciniis pinnatis sinuata, adstringentia; *Glandes* calyce sustentatæ sunt, *Cupula* dicto, cinerascens, integerrimo; dura, extus rugosa, intus lævissima, sub officulo lævi, nitido, flavicante, ovali-oblongo, fragili includunt *Nucleum* solidum, tunica vestitum, intense amarum & stypticum. *Quercus Robur* L. BLACKWELL Tab. 487. *Vulgaris* per Europam arbor. *Extus Adstringendi ergo adhibentur quæque Quercus partes; Glandes tostæ, eum aqua decoctæ a quibusdam nuper contra Atrophiam laudabantur.*

QUERCUS MARINA. Cartilagineus Fucus, cujus Caulis planiusculus, aliquot mox pollices, mox pedes longus, in plures diffunditur ramos bifurcos, in folia disperfos latius usque procrecendo extensa & in apicem bilobum, trilobumve euntia, pluribus in utraque superficie vesiculis & fibris rugosa. Color ex nigro flavicat. *Fucus vesiculosus* L. Ad littora Maris copiose occurrit. In cineres nigros combustus nomine *Æthiops Vegetabilis* ad obstructions Glandularum aperiendas & ad Sanguinem depurandum adhibetur, iisdem etiam usibus extractus inde *Sal Alcalinus* destinatur.

RACKASIRA BALSAMUM. Resina ficca, subdiaphana, rubro-brunea, inter digitos ductilis, inter mandendum tenax, dentibus adhærescens, odoris non ingratis balsamici, similis saporis, resinosi, amaricantis; Cucurbitis inclusa ex India nobis apportatur. Calore funditur, accensum suavem spirat & fortem odorem. *Fuerunt, qui contra Gonorrhœam & Ulcera viarum Urinariarum ejus virtutem laudarent.*

RANA, *Grenouille, Frosch.* *Rana Esculenta* L. Amphibium quadrupes notissimum, ad aquas & paludes copiose degens. Femora in cibum recipiuntur. *Cum Jure decoctæ Demulcendi aque ac Relaxandi scopo exhibentur.*

RANARUM SPERMA, *Frais de Grenouilles, Frosch-laiche.* Substantia alba, viscida, Albumini ovorum similis, germina

mina novorum animalium sub forma corpusculorum rotundorum & nigrorum vehens, verno tempore stagnis ac paludibus innatans, e varii generis Ranisenixa. *Extus Demulcendi & Refrigerandi scopo a quibusdam commendatur.* Aqua inde destillata PARACELSO *Sperniola* dicta omnino iners est.

RANUNCULUS, *Ankenblümlein, Hünenfus.* Variæ Ranunculorum species Flores habent sapore peracres, cutemque, cui applicantur, in vesicam elevantes; nostrates vulgo Ranunculum acrem L. recipiunt; eundem effectum edunt Aquatilis L. Lanuginosus L. Bulbosus L. Sceletatus L. Arvensis L. Flammula L. Lingua L. Huc etiam Anemonem sylvestrem L. sub nomine *Ranunculi albi* nonnulli referunt. Aquam ab his plantis abstractam acrem esse contendunt & nauseosam. *Brachio aut Carpo imponuntur ad fugandas Febres Intermittentes.*

RAPA, *Rave, Navet, Navau, Rübe.* Radices alias rotundæ, alias cylindroidæ, varii tam coloris, quam magnitudinis, odoris proprii, saporis in junioribus amari, in adultis dulcissimi. *Brassica Rapa* L. BLACKWELL Tab. 231. Planta Anglica & Belgica. Plures ejus varietates in hortis & agris coluntur. *Mensis apponuntur. Resolvendi sine intus dantur ex Jure coctæ. Extus gelu constrictæ Perniones sanant.*

RAPHANUS, *Radis, Rettich.* Radices figura, magnitudine, colore, saporis acumine multum variantes, odore proprio, sapore acri perfusæ. *Raphanus sativus* L. BLACKWELL Tab. 81. In China sponte nasci dicitur, apud nos plurimæ ejus varietates copiose coluntur. *Condimenti loco esitatur. Resolvendi, Urinam ducendi, Scorbutum pellendi gratia Succus inde expressus exhibetur.*

RAPHANUS RUSTICANUS, videatur ARMORACIA.

RAPUNCULUS, *Raiponse, Rapunzel.* Hoc nomine nostrates verno tempore tenellas plantas *Phyteumatis Orbicularis & Spicati* L. vel *Oenotheræ biennis* L. incibum recipere solent. Sunt qui scopo medicato *Campanulæ Rapunculi* L. haud infrequentis Europæ plantæ Radi-

ces adhibeant fibrosas, albas, dulces; *ejusque virtutem Resolventem laudent.*

REGULUS, *Roitelet, Zaunkœnig*. Avicula corpore gryfea, rostro subulato alisque instructa, fuscis fasciis distinctis, subinde etiam albis maculis notatis. Motacilla Troglydytes L. Vulgaris per Europam avis. *In olla combustæ Pulvis olim Calculo mederi credebatur.*

RESINA, *Poix de Bourgogne, Harz*. In magnis frustis prostat, solida, sicca, nitidiuscula, fragilis, inter tractantes digitos plastica, iisque adhærens, odorata amariuscule, calore liquefscens, ignem concipiens, accensa fumum gravem emittens. Ex Pino Abiete L. vulgari per Europam arbore, cui detracto cortice, per æstatem, exsudata adhæret, inde de-rasa in lebetæ aqua pleno liquatur & crasso linteo percolata depuratur. Solet etiam, antequam mercaturæ amandetur, Vesicæ immitti & aquæ ministerio *Oleum* inde destillari flavum, odore minus gratum & vehemens, sapore linguam pungens, **TEMPLINUM SCHROEDERI**, *Tannzapfenöl* nominant. Idem *Oleum* quandoque ex Pinus Sylvestris L. ramis tenellis aut conis viridibus destillatione cum aqua paratur. *Resina Emplastris solidandis & tenacitate perfundendis additur; suppurandi quoque & Putredinem arcendi sine adhibetur. Oleum Templinum BALSAMO HUNGARICO aut CARPATHICO multum olim ad sananda Vulnèra, Ulcèra, Rheumatismos, &c. laudato substituitur; pro Oleo etiam Terebinthinæ non raro venditur.*

RHABARBARUM, *Rheum, Rubarbe*. Radix cujus magna frusta ad nos pervehuntur, subrotunda, in medio ut plurimum perforata, cuticula exteriorè nudata, extus flava, rubellula, intus albo & roseo variegata, odoris proprii, minus grati, saporis amari, acrimonia submissi. Minoris æstimanda frusta leviora, digitos tingentia interiorè rubedine magis ad nigredinem vergente. Desumi videtur a variis *Rhei* speciebus in China & regione Tangutica inter 26 & 36 gradum latitudinis Borealis crescentibus. *Rheum palmatum* L. sub cœlo Europæo optime vegetans, optimo quod nobis affertur *Rhabarbaro* satis similes Radices exhibet, siquidem per decennium cultum fuerit. *Rhabarbarum Moscoviticum* præstantissimum

est, aliud enim, nisi a publice ad id negotium constituto delegato, Jæchtæ habitante, delectum & comprobatum, per totam Russiam dividere non licet. Æquas Extracti Aquosi & Resinosi partes vehit. *Vi principii volatilis, quo scatet, Alvum ducit, quam ob causam ab omni Præparato, coctionis ope inde obtento, vis Laxans abest. Primas vias Roborat, Obstructionibus Hepatis medetur, Renibus quoque prodest. Datur ad Drachmam unam sub forma Pulveris, ad Drachmas duas in Infuso.*

RHABARBARUM MONACHORUM. Radix fibrosa, crassa, rugosa, extus ex fusco-lutescens, intus flava, odoris levis, minus grati, neutiquam Rhabarbarini, saporis amaricantis cum aliquantula adstrictione subacris. Rumex Alpinus L. Crescit in Europa temperata. *Rhabarbaro, utique multo inferius, minus apte substituitur.*

RHAPONTICUM MOSCOVITICUM. Radix, cujus magna nobis mittantur frustra oblonga, ex albo leviter flavicantia, intus striis purpureis variegata, odore tenui, sapore amaro & cum quadam acrimonia adstringente. GMELIN a Rumice obtusifolio L. Europæ temperatæ civi, Cl. PALLAS autem a Rheo Undulato L. Chinæ & Sibirix indigeno, nostras hyemes optime ferente, desumi contendunt. *Rhabarbari veri viribus pollere dicitur, dummodo majori dosi sumatur.*

RHAPONTICUM VULGARE. Radices cylindraceæ, lutescentes, intus rubro-variegatæ, odore & sapore præcedentes referunt. Desumuntur vel a Rheo Rhapontico L. BLACKWELL Tab. 262. Thracix, in Europa culto; vel a Centaureo Centaurio L. BLACKWELL Tab. 93. Tartariæ, Italiæ &c. indigeno. *Priori viribus cedit.*

RHINOCEROS, Nashorn. Cornu ejus conoideum est, pedem circiter longum, uno latere leviter arcuatum, basis ovata, diametro longitudinali semipedem, transversa quatuor pollices æquans, intus concava, conoidea, spongiosa, nigricans, extus nigro-fusca, rugosa, in corpus contrahitur læve, splendens, fuscum, in facie arcuata striis longitudinalibus sulcatum; apex obtusus est; odore & sapore caret. Rhinoceros

Unicornis L. Africæ & Indiæ Quadrupes. *Indi hoc Cornu Venenis resistere putant.*

RHODIA RADIX. Tuberosa est, crassa, extus flavicans, intus alba, cicatricibus obfessa, recens leviter exsiccata, evidenter Rosas redolet, amara. Rhodiola Rosea L. Habitat in Alpibus Europæ, optime in hortis coli potest. Olei Oleo L. Rhodii similis $\frac{1}{128}$ fundere dicitur. *A quibusdam Adstringentibus adnumerabatur.*

RHODIUM LIGNUM. Frusta impari magnitudine, & crassitie, ramosa, varie torta, dura, sub cortice gryseo, non raro rugoso, substantiam lignosam, albam, rubris flavisque striis notatam includunt; fricata roseum odorem edunt, sapor levissime amarus est. Genista Canariensis L. Insularum Canariensium indigena arbor. Quale vulgo in officinis prostat, minimum Olei odorati largitur. *Lignum ad Suffitus recipitur, Oleum odoris adjicitur, vulgo apud Sepalsarios prostant multo Oleo unguinoso adulteratum est.*

RIBES NIGRUM, *Grossularia nigra, Chassis, schwarze Johannis-trauben vel Beeren.* Folia subcordata, triloba, ferrata, odore ad Rutam accedente, sapore leniter adstringente. Baccæ globosæ, nigræ, umbilicatæ, succo purpureo turgentes, polypyrenæ, Cimices redolentes, ex dulci aciduli saporis. Ribes nigrum L. BLACKWELL Tab. 285. Passim per omnem Europam occurrit. *Folia ad Sanguinem Depurandum & Diuresin promovendam, Baccæ contra Rentum vitia valere dicuntur.*

RIBES RUBRUM, *Grosselles.* Baccæ rotundæ, nitentes, umbilicatæ, partim rubræ, partim albæ, sapore vinoso, acido, odore levi imbutæ, polypyrenæ. Ribes rubrum L. BLACKWELL Tab. 285. Passim per Europam obvium. *Refrigerandi gratia adhibentur.*

RORELLA, *Ros Solis, Herbe de la Goutte, Sonnenthaul.* Folia exsiccata, parva, rotunda, hirsuta, rubra, margine fimbriato cincta, longioribus petiolis hirsutis innixa, sapore acri & adstringente prædita. Drosera Rotundifolia L. BLACKWELL Tab. 432. Occurrit in omni Europa. A tribu Paracelsi-

stica magni facta, hodie eviluit. *Recentem Cuti impostam Vesicas inducere observatum est.*

ROSA ALBA. *Florum petala majuscula, obovata, alba, levius odorata, dulciuscula. Rosa alba L. BLACKWELL Tab. 73. Colitur in hortis; præstant omnino Spinosissima L. copiose sub nostro cælo crescens & Sempervirens L. apud nos contra hyemis injurias defendenda, minoribus petalis, sed multo fragrantioribus instructa. Extus contra morbos Oculorum adhibentur.*

ROSA PALLIDA, *Rose de Damas, leibfarbige Rose. Petala obovata, majuscula, dilutius rubra, quem proprie roseum colorem dicunt, fragrantia, dulciuscula. Desumuntur a variis Rosæ speciebus, in nostris hortis cultis; maxime a Centifolia L. Damascena BLACKWELL Tab. 82. Sunt qui Rosæ etiam Caninæ L. petala recipiant. Pauxillum Olei pellucidi, aëre temperato consistentis fundunt. Ob fragrantiam scopo Analeptico inserviunt; Eccoproticos quoque edunt effectus.*

ROSA RUBRA, *Rose de Provins, Effigrose. Petala, antequam sese explicuerint, resectis unguibus flavicantibus recipiuntur profundius rubra, præcedentibus minus fragrantia, sapore adstringente prædita. Rosa Gallica L. patientissime nostras hyemes ferens, cui creberrime, in Germania maxime, Rosam sativam rubram C. B. minus saturati coloris, substituere solent. Roborandi & Adstringendi causa tam extus quam intus adhibentur.*

ROSMARINUS, *Anthos, Romarin. Folia linearia, obtusa, rugosa, supra viridia, subtus alba, proprio, fragrante odore, sapore aromatico perfusa. Flores ringentes, calyce bilabiato sustentati, dilute violacei, sapore & odore Foliis multo inferiores. Rosmarinus officinalis L. BLACKWELL Tab. 159. Europæ calidæ indigenus frutex, apud nos contra hyemis rigores defendendus. Olei odorati $\frac{1}{200}$ exhibet. Olim Cephalico scopo intus dabatur, hodie Roborandi & Discutiendi sine extus applicatur. Oleum distillatum, nimii ad internum usum caloris, modo ad externum adhibetur. Spiritus Vini inde abstractus, cui AQUÆ REGINÆ HUNGARIÆ nomen est, itidem extus ad Refocillandum, Roborandum, Discutiendum usurpatur.*

ROSMARINUM SYLVESTRE, *Romarin de Boheme*, *Post-Wanzen* - vel *Mottenkraut*. Folia linearia, obtusa, ad marginem revoluta, supra luteo-viridia, nitidiuscula, subtus tomentoso-ferruginea, odore graveolentia, aromatica, sapore amara. Ledum palustre L. Europæ Septentrionalis indigenum & officinale. *Laudatur Infusum ejus aquosum ad pessimæ Scabiei species, nec non Tussim ferinam sanandam.*

RUBIA TINCTORUM, *Garance*, *Færberroethe*. Radix fibras calamum circiter crassas dimittens, geniculata, tota rubra, leviter odorata, amaricans, subadstringens. **Rubia Tinctorum** L. **BLACKWELL** Tab. 326. Europæ temperatæ propria, passim in agris colitur. Extracti aquosi acidulo sapore instructi $\frac{2}{3}$, resinosi, austeri $\frac{3}{4}$ circiter largitur. *In quinque Radicum aperientium numero habetur. Rachiticis, Ictericis, Scabiosis commendatur.*

RUBINUS, *Rubis*. Gemma Adamantem pondere superans, duritie subsequens, colore rubro fulgens. Alumen Gemma pretiosa Rubinus L. Ex Ava, Pegu & Brasilia advehitur, in Hungaria & Germania quoque offendi dicitur. *Cordiales olim ei, Bezoardicæ &c. affingebantur vires.*

RUBRICA FABRILIS, *Crayon rouge*, *Rœthel*. Est Lapis calcareus, molliusculus, fissilis, digitos tingens, odoris nullius, saporis adstringentis. Talcum rubrum L. Passim in Europa reperitur. *Vera minera Ferri, Hæmatitæ viribus polle-re videtur.*

RUBIMORA, *Meures de Renard*, *Brombeeren*. Folia ternata & quinata, ultimo impari, non raro lobato, omnia ovato-lanceolata, serrata, subtus tomentosa, subadstringentia; *Baccæ Moris* fatis similes, colore nigro, sapore aquoso, viscidulo, odore nullo. **Rubus fruticosus** L. **BLACKWELL** Tab. 45. In Europa ubique crescit. *Sunt, qui Folia ad Gargarismata adhibeant; Baccæ ob vim Refrigerantem laudantur.*

RUBUS IDÆUS, *Framboise*, *Himbeere*. Baccæ rubræ, subinde etiam albæ, rotundæ, villo obfessæ, ad basin concavæ, quarum receptaculo conoideo acini adhærent succulenti, monospermi, stylo setaceo coronati, proprium, suavissimum odorem, saporem habent vinosum, dulcem. Ru-

bus Idæus L. BLACKWELL Tab. 289. Copiosus ejus per Europam proventus est. *Ad Analepticum, nec non Refrigerandi & Putredinem arcendi finem Succus in Syrupum, Rotulas, Gelatum conversus exhibetur.* Aqua inde destillata gratum odorem spirat.

RUSCUS, *Bruscus, petit houx, Mausdorn.* Radix fibrosa, cylindracea, calamus crassa, plurimas fibrillas dimittens, alba, cum lenissima acrimonia primo gustu dulcis, dein amara. Ruscus Aculeatus L. BLACKWELL Tab. 155. Europæa Meridionalis, nostræ hyemis apprime patiens. *Vis ejus Resolvens & Diuretica laudatur; quinque Radicibus Aperientibus majoribus adnumeratur.*

RUTA, *Ruë, Raute.* Folia aliquot pinnulis rotundis, glaucis pinnata, odore proprio, forti & gravi, sapore acri & amaro, utroque exsiccatione mitescente. *Semina exigua sunt, angularia, nigra, sapore & odore ad Folia accedunt.* Ruta graveolens L. BLACKWELL Tab. 7. Europæ calidæ propria, nostras hyemes innocua fert. Olei odorati $\frac{1}{5\frac{1}{2}}$ fundit. *Resolvens, Venenis resistens, Urinam pellens internum olim remedium habebatur; externus ejus usus in Ulceribus abstergendis, Rubefaciendo, Malignitatem Aëris corrigendo versatur. Oleum destillatum Balsamis Cephalicis immiscetur.*

RUTA MURARIA, *Adiantum album, Sauvevie, Maurauten.* Cauliculi teneri, teretes, herbacei, albidi, superne ramosi, tribus vestiti foliolis, parvis, cuneiformibus, crenulatis, odoris nullius, saporis levissime adstringentis. Asplenium Ruta Muraria L. BLACKWELL Tab. 219. Crescit passim per Europam. *Reliquis Adiantis viribus æquiparanda.*

SABADILLI SEMEN, *Mexicanischer Laus-Saamen.* Capsulæ ternatæ, oblongæ, æquales, flavicantes, latere interiore dehiscentes, triloculares, Semina continent oblonga, acuta, nigra, amaro & fervido sapore linguam ferientia. Veratrum Sabadilla RETZ. Mexicana planta. Hoc seculo demum in Europa innotuit. *Extus contra Pediculos adhibetur. Contra Affectus Nephriticos & Teniam ad Drachmam unam usque pro dosi datum fuisse lego.*

SABINA, *Sevenbaum.* Folia longa, ex foliolis linearibus, ace-

roſis, imbricatis efformata, odore gravi, forti, ſapore amaricante & acri. Juniperus Sabina L. BLACKWELL Tab. 214. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, noſtras hyemes citra noxam fert. Olei odorati circiter $\frac{1}{6}$ fundere dicitur. *Validiſſime Sanguinem Uterinum maxime commovet, quapropter nunquam intus danda. Extus Porrſ Venereis, Oſſibus cariſis, Fungis Dura matris inſpergitur.*

SACCHARUM, *Sucre, Zucker.* Sal eſſentialis, dulcis, in aqua facillime ſolubilis, ſub varia forma apud nos proſtat; qui pulverem fuſcum, humeſcentem refert, alieno, minus grato ſapore, *Saccharum Thomæum* nuncupatur, *nec niſi ad uſus Eccoproticos adhibetur*; ficcum & albidius *Caffonade* dicitur. Iteratis depurationibus in cohærentes panes conoideos ex granis formatos redactum Saccharum pro diverſa ſoliditate, albedine, granorum ſplendore differt. Belgæ ut & Germani in *Miſcellaneum*, cui *Farinoſo* etiam noſtro idiomate, *Lumpenzucker* nomen eſt, *Meliſſæum* ſive *Melis*, *Melis parvum*, *Raſinatum*, *Boyerbrod*, *Canarienſe* denique Saccharum diſtinguunt. Ad ſingulas Sacchari depurationes, *Raſinationes* dicunt, liquor deſluit Syrupi conſiſtentia, plus minus badius, fordidus, alienum ſpirans odorem *Saccharum liquidum*, *Syrupus Saccharinus*, *Syrop* dictus. Obtinetur Saccharum ex ſucco Sacchari Officinarum L. ſub Tropicis ſponte creſcentis, recentiori ævo in America quoque calidiore, Sicilia, Hiſpania copioſe culti, apud nos in tepidario aſſervandi. *Alimentario, Reſolvente, Demulcente, Antiſeptico, Relaxante ſcopo ſub multiplici forma intus adhibetur; extus ad Abſtergentia & Diſcutientia refertur. Plurimarum Formularum Baſis eſt, Conſtituens & Corrigenſ.*

SAGAPENUM, *Gomme Seraphique, Serapin Gummi.* Succus concretus in granis minoribus ad nos pervenit, ex rubro-flaveſcentibus, ſemipellucidis, cornu referentibus, odore naſeoſo, gravi, ſapore ſaſtidioſo & amaro, cui alliacei quid ſubmiſtum eſt. Maſſæ majores, pannis cæruleis involutæ, profundius fuſcæ, ſordibus inquinatæ *in ſorten* dicuntur. Sagapenum ex Alexandria venire conſtat, cui vero plantæ acceptum illud ſit referendum ignoratur, ad Umbelliferas eam pertinere valde

valde verosimile est. In aqua, maximam partem solubilis est, Alcohol quoque ejus portionem recipit, igne non liquabilis, accensum nauseosum odorem spirans, aliquantum Olei odorati fundere dicitur. *Intus ad Resolvendum & Viscera Reseranda commendatur, extus Resolvendi scopo applicatur.*

SAGO, *Sagu*. Grana, granis Hordei mundati similia, non raro angulosa, extus ex albo flavicant, medullam albissimam includunt, sapore & odore carent, coctione intumescunt, aquam, cum qua coquuntur, viscidam reddunt, & diutius cocta penitus in aqua dissolvuntur, eique spissæ gelatinæ formam induunt. Paratur Sago ex varii generis *Palmis*, quorum nondum satis determinatus character est; in Insulis Moluccis & Australibus, nec non a Borneo ad Siam usque copiose crescunt. Ex caudice Palmæ medullam aqua eluunt, in pastam efformant, inter lapides foraminibus exsculptos in modum panis coquunt, unde ei forma manet, sub qua ad nos vehitur. Sub initium hujus seculi ab Anglis hæc grana ab octo retro lustris a Gallis & Germanis in usum cibarium & medicamentosum recipi cœperunt. *Phthisicis præcipue laudantur.*

SAL COMMUNE, *Sal Panis, Küchensalz*. Sal medius in crystallos cubicas concrefcens, proprii saporis, prunis superpersus decrepitans, ex proprio Acido & Alkali fossili constans. Muria L. Pro tripartito, quod ipsa Natura largitur, genere, solet distingui. SAL FOSSILE, eo quod ut plurimum pellucens obtinetur, *Sal Gemmæ* dicitur. Muria montana L. *Sel Gemme, Stein- vel Bergsalz* in frustis variæ magnitudinis, interdum permagnis per universum orbem ex montium visceribus effoditur; a sordibus, si quas habet, aut qualicumque colore prius depurandum est, quam in usum trahatur. SAL FONTANUM, Muria fontana L. quod proprie *Commune* appellant, ex peculiaribus fontibus, quos Salinas dicunt, solerti evaporatione obtinetur, & ab heterogeneis, quibus mixtum esse solet, salibus purgatur. SAL MARINUS, Muria marina L. ex omni, quod Globum nostrum ambit, Mari, & quidem in regionibus calidioribus naturali, quæ per Aërem & Solem fit, evaporatione, in frigidioribus vero eodem modo, quo Sal

fontanus ex Salinis, obtinetur. Cum diversa sit ratio, qua Sal communis acidum vehere videtur, diversam quoque acrimonia rationem esse oportet. Sal marinus omnes reliquos acrimonia superat, quanquam hic ipse pro vario Mari, unde gignitur, differt. Salis communis probitas ex albedine, omnis peregrini saporis privatione & quod in aëre non humescat, dignoscitur. *Humores incidit, Fibras stimulat, Putredini, sufficiente quantitate receptus, resistit tam extus, quam intus.*

SALEP RADICES. Ovatae sunt, undique laeves, ventricosae, cornu instar subdiaphanae & tenaces, insipidae, inodorae. Ex Turcia afferuntur; in nostris quoque regionibus optime parantur, siquidem de *Orchide* aut *Satyrio* bulbis indivisis constante, adempta exteriori cuticula, sumuntur bulbi, frigida infunduntur, ex filis deinde suspenduntur & exsiccantur. *Phthificis & Dysentericis hæc radix, sive sub forma Pulveris, sive eodem pulvere cum menstruo aquoso, substrenua, ope virgulæ, agitatione in gelatinam cocto, Jure aut Lacte diluendam commendatur.*

SALICARIA, Salicaire, Weiderich. Folia lanceolata, acuta, supra glabra, infra levissime tomentosa, inodora, insipida. *Lythrum Salicaria* L. Passim per Europam obvium. *Ad Alvi fluxus chronicos moderandos laudatur.*

SALIX, Saule, Weiden. Cortex ramorum juniorum, colore viridis & splendens, odore gratus, sapore balsamicus, amaricans. *Salix pentandra* L. Vulgaris per Europam arbor. *Corticem Salicis quidam Cortici Peruviano ad curandas Febres intermittentes substituere conati sunt.*

SALVIA, Sauge, Salbey. Folia ovato-oblonga, obtusa, rugosa, utrinque tomentosa, crenata, proprio aromatico odore, sapore linguam pungente, amaricante; *Flores* majores, labiati, labio superiore fornicato, cærulei, sapore & odore multo foliis inferiores sunt. *Salvia officinalis* L. **BLACKWELL** Tab. 71. Europæ calidæ indigena, nostras hyemes impunis fert. Pauxillulum Olei odorati fundit. Condimenti loco non raro recipitur; *viribus cum reliquis Vegetabilibus aromaticis æquipollet, in morbis Pectoris maxime usurpatur.*

SAMBUCUS, Sureau, Holder. Cortex intermedius, sive

Liber extus viridis, intus albus, adstringens & austeriusculus; *Folia* pinnata sunt cum impari, pinnæ acutæ, glaucæ, ferratæ, saporis herbacei; *Flores* cymosi, parvo calyce sustentati, quinquefidi, albi, suaviodore & levi sapore perfusi; *Baccæ* in officinis *Grana Actes* nuncupatæ, rotundæ sunt, umbilicata, nigræ, pulpam condunt purpuream, saporis dulciusculi. *Sambucus nigra* L. BLACKWELL Tab. 151. Crescit in omni Europa. Flores abstrahenda a se Aquam & Spiritum Vini fragrante odore imbuunt, paucillum etiam Olei odorati butyracei fundere dicuntur. *Cortex* subinde Cathartico scopo ad Unciam unam usurpatur. *Foliorum* extus contra *Hæmorrhoides* & *Erysipelas* efficacia laudatur. *Flores* sub forma *Infusi* ad pellendum Sudorem, tanquam *Epithema Discutiendi* scopo adhibentur; *Baccas* nullo earum merito, sunt, qui contra *Dysenteriam* commendent.

SANDARACA GUMMI, videatur JUNIPERUS.

SANICULA. *Radix* tenuis, fibrosa, grysea, amaricans. *Folia* reniformia, duriuscula, irregulariter lobata, lobis subrotundis ferrata, inferne pallida, saporis leviter adstringentis, nonnihil etiam falsi. *Sanicula Europæa* L. BLACKWELL Tab. 63. Admodum frequens Europæa planta. *Intus æque ac extus* adhibita contra *Hæmorrhagias* magnopere commendabatur.

SANLAY a SEBA dicta. Est *Radix Calami Acori veri* sub CALAMO AROMATICO recensita, ex China in taleolas tenues secta & ad nos missa.

SANTALUM ALBUM. Magna & crassa frusta alba, pallida, ponderosa, saporis & odoris expertia; *Alburnum Santali albi* L. Arboris in India crescentis, esse dicitur. *Plane iners.*

SANTALUM CITRINUM. Frusta magna & crassa, coloris pallide flavicantis, fricata fragrantem spirant odorem, saporem lingua vix percipit, Arboris præcedentis Medullam esse asserunt. *Oleum* destillatum egregie fragrans fundere dicitur. *Ob Analepticas virtutes olim* laudabatur, quæ vero, prout in nostris certe tabernis illud prostat, valde exigua deprehenduntur.

SANTALUM RUBRUM. In frustis nobis mittitur multo, quam præcedentia, majoribus & crassioribus, extus obscu-

riore, intus sanguineo rubore tinctum; cortice caret, fibræ ejus evidenter crispæ sunt. Arboris cujusdam, ignoti adhuc characteris, ex Coromandel & Africæ regionibus Orientalibus venientis medulla esse fertur. *Eviluerunt ejus Hepatica & Refrigerantes vires, quin & ad coloranda medicamenta rarius hodie adhibetur.*

SAPONARIA, *Seifenkraut*. Radix fibrosa, calamo anserino crassior, sub cuticula flavescente medullam albam & dulcem condit. *Folia* ovato-lanceolata, glabra, neque odorata, neque sapida sunt. Saponaria officinalis L. BLACKWELL Tab. 113. In omni Europa invenitur. Lintea Saponis vice hac planta abstergi jam diu observatum est, qua quidem virtute Foliis Radices præstare, recentiora experimenta docuerunt. *Ob vires Resolventes a Recentioribus multum laudatur sub forma sive Infusi, sive Extracti data.*

SAPPHIRUS. Gemma duritie Rubinum subsequens, coloris cærulei. Alumen gemma pretiosa cæruleum L. In iisdem ac Rubinus locis occurrit; Muria Chrysolampis L. cærulea, passim in fodinis Europæ obvia, non raro ei substituitur. *Vanum est quicquid de viribus ejus Medicatis jactatur.*

SARCOCOLLA. Grana variæ magnitudinis, maximæ Nucem Juglandem æquant, rugosa, flavicantia, cum rubedinis vestigio, odorem nullum, saporem ex dulci nauseose amaricantem, acriusculum habent. Obtineri ea ex Penæa Sarcocolla L. Æthiopiæ frutice ferunt. Accensa gratum odorem spirant, in Aqua penitus, in Alcohole aliquatenus dissolubilia sunt. *Resolvendi & Abstergendi scopo olim usurpabatur.*

SARSAPARILLA. Radices interdum bipedales, flexiles, quapropter in gyrum crebro flexæ deprehenduntur, impariter interdum ad calamum usque anserinum crassæ, multas fibrillas teneras emittunt, quas autem inde recidi oportet, sub cortice ex rubicundo cinerascens, medullam continent farinaceam, albissimam, fissilem, odore & sapore carent. Advehuntur corbibus compactæ, ex radicum serpentium genere quodam, ipsis parum dissimili, confectis. Radices graciles, extus nigrae, quæque facillime findi recusant, rejiciendæ. Smilax

Sarfaparilla L. BLACKWELL Tab. 339. Americæ calidioris, nobis in frigidario per hyemem fervanda. Aqua cum Sarfaparilla cocta rubra & sapida evadit. *Ab omni tempore & vel per recentissima experimenta multum contra morbos Venereos laudatur.*

SASSAFRAS LIGNUM. *Frustra magna & ramosa, levia, sub Cortice ferrugineo, spongioso, rugoso Lignum continent pallidius, minus durum, cujus transversim secati fibræ facillime a semet ipsæ discedunt; odor fortis, non ingratus ad Fœniculum accedit, sapor aromaticus est. Cortex sapore æque ac odore Ligno præstat.* Laurus Sassafras L. Americæ Septentrionalis propria; arbores juniores in nostra plaga contra hyemis injurias defendendæ sunt. Olei odorati $\frac{1}{200}$ fundit. *Contra morbos Catarrhales, Rheumaticos, Cutaneos & Venereos Cortex ad Scrupulos duos, Lignum ad Sesquidrachmam datur in Infuso.*

SATUREJA, Sariette, Bohnenkraut. *Caules multum ramosi, diffusi, albidi, Foliis vestiti parvis, lanceolatis & Florum ringentium verticillis, odorem habent gratum, aromaticum, saporem linguam pungentem. Satureja hortensis L. BLACKWELL Tab. 419. Europæ calidæ propria planta, apud nos copiose in hortis colitur. Olei odorati paucillum fundit. Vires plantarum aromaticarum exserit, rarius ad usus medicatos, crebrius ad culinarios adhibetur.*

SATYRIUM, Stendelwurzel. Radices sphæroideæ sunt, cinerascens, rugosæ, insipidæ & inodoræ. Desumuntur ab omnibus Orchidibus & Satyrii speciebus, quarum bulbi indivisi sunt. Ex quo *adscriptas ipsis vires Aphrodisiacas experientia non confirmavit, evilerunt eo etiam magis, quod Radices Salep ipsis omnino præstant.*

SAXIFRAGA ALBA, Bulbilli exigui, rotundi, involucri rufo, piloso tecti, aliquantulum carnis albæ, primum insipidæ, dein amaricantis exhibentes. Saxifraga granulata L. BLACKWELL Tab. 56. Crescit per omnem Europam. *Vires Lithonripticas his Radicibus adscriptas experientia non confirmavit.*

SCABIOSA. *Folia ex ovatis-oblonga, hirsuta, inodora, levissime amaricantia. Flores asservantur ex calyce evulsi tubulosi, cærulescentes, insipidi, inodori. Scabiosa arven-*

sis L. BLACKWELL Tab. 185. Vulgaris per Europam. *A virtute Becchica & Vulneraria laudatur.*

SCAMMONEUM. *Succus concretus* in majoribus frustis ad nos vectus, ex gryseo-nigricans est, in pulverem gryseum, cui *Diagyrii* nomen, redigi patiens, odoris proprii, nauseosi, saporis evidenter acris. *Aleppense* ad Marasch, quatuor dierum itinere ab Aleppo distans, collectum levius, magis gryseum, ex *Convulvuli Scammoneæ* L. Asiæ Occidentalis, apud nos per hyemem in tepidario asservandi radicibus fauciatis obtinetur; *Smyrnaeum* ex Galatia & Cappadocia Smyrnam translatum, vilius est; vilissimum *Antiochenum* nigerrimum, multis foraminibus exesum, empyreuma redolens; duo posteriora ex variis *Convulvuli* speciebus parari dicuntur. Tam Aqua, quam Spiritus Vini ejus aliquantulam partem dissolvunt. *Validioribus Catharticis adnumerandum ad Grana decem vel quindecim exhibetur.*

SCARABÆUS MAJALIS, *Hanneton, Maikæfer*. Insectum pedibus instructum, alas tegmine duriusculo tectas, scutatas habet, thorace villoso instructum. *Scarabæus Melolontha* L. vel nimis frequenter occurrit. *A quibusdam contra Hydrophobiam commendatur.*

SCHOENANTHUM, *Kameelheu*. Culmi teretes, spithamæi, flavi, superne angustati & in ramos parallelos capillares diffusi, includentes substantiam fungosam, obvoluti aliquot foliis vaginantibus, glabris, margine scabriusculis, odoris proprii, aromatici, saporis amaricantis, linguam ferientis. *Andropogon Schoenanthum* L. Indiæ Orientalis & Arabiæ indigenum. Aliquantillum Olei odorati fundere dicitur. *Ob vires Aromaticas olim in usum trahebatur.*

SCILLA, *Squilla, Meerzwiebel*. Radix bulbosa, amplitudine non raro aliquot pugnos æquans, ex basi angustiore, rotunda, fibrillas dimittente, protinus in corpus amplum & ventricosum distenditur, quod superne in formam conoideam contractum, extus tunicis vestitur membranaceis, ficcis, aridis rufis; bulbi caro constat squamis albidis, levi rubedine suffusis, apprime amaris, non admodum acribus, in medullis minus amaris. *Scilla maritima* L. Europæ calidæ &

Orientis propria, in nostris hortis si colitur, contra hyemis rigorem est defendenda. *Ob vim Resolventem & Diureticam ab omni ætate fuit laudata; recens pulverisata illi, quæ sub nomine præparatæ asservatur, præferenda videtur. Datur ad Scrupulum semis pro dosi.*

SCINCUS, *Stincus*. Animal quatuor pedibus tetradactylis instructum, sex pollices circiter longum, linea longitudinali abdomen, visceribus exemptis, apertum ostendit; cutis squamosa est, argentea, cum vestigio flavedinis, dorsum, fasciis cæruleis transversis notatum, spina eminens distinguit, cauda ad latera contracta brevis, caput trunco continuatum est; odore caret, saporem salsum habet. *Lacerta Scincus L. In Ægypto & Arabia petræa occurrit. A vi Aphrodisiaca commendabatur.*

SCLAREA, videatur **HORMINUM**.

SCOLOPENDRIUM, *Lingua Cervina*. Folia oblonga, ad finem paulatim magis dilatata, integerrima, firma, inodora, linguam leviter adstringentia. *Asplenium Scolopendrium L. BLACKWELL Tab. 138. Europæ temperatæ. Scopis Adstringendi & Roborandi usurpabatur.*

SCORDIUM, *Chamaras, Lachen- Knoblauch*. Folia ovato-oblonga, crenata, hirsuta, odoris proprii, Allio vicini, saporis amari, acriusculi. *Teucrium Scordium L. Passim per Europam obvium. Ob virtutem potissimum Antisepticam laudatur, quo quidem scopo tam extus, quam intus adhibetur; datur insuper interne ad reseranda Viscera, promovendasque Excretiones aquosas.*

SCORPIUS. Hoc nomine quæ nobis veniunt animalcula juniora Oleo condita, vix aliquot lineas æquantia, colore bruno, antennis in chelas terminatis & cauda instructa sunt, cujus ultimus articulus in aculeum arcuatum abit. *Scorpius Europæus L. Oleum, in quo Scorpiones infusi erant, propria vi contra Ictum animalium venenatorum pollere creditur.*

SCORZONERA. Radices longæ, fibrosæ, pollicaris circiter crassitie, sub cuticula nigra carnem albam, dulcem, lacte madentem includunt. Demta cuticula in officinis asservantur extus rubræ, intus albæ, dulces. *Scorzonera Hispanica L. BLACKWELL Tab. 406. Europæ calidæ civis, nostra*

tis hyemis patientissima. *Primo aut secundo a satione anno Radices in usum cibarium, trimæ vel quadrimæ propter indolem suam saponaceam in officinas recipiuntur.*

SCROPHULARIA, *Braunwurz*. *Radices* ex tuberculis ovatis, nodulis obfessis, fibrillas albidas emittentibus constant, extus gryseæ, intus albidæ sunt, odorem spargunt levissimum, nauseosum, saporem edunt acriusculum, leviter amarum. *Foliorum* petiolatorum, ovatorum, ferratorum, gravis odor, sapor amariuscule est. *Scrophularia nodosa* L. BLACKWELL Tab. 87. Crescit per omnem Europam. *Radices æque ac Folia contra Scrophulas & Hæmorrhoides cæcas commendabantur.*

SEBESTEN, *schwarze Brustbeeren*. Fructus parvis Prunis similes, ovati, utrinque acuti, nigricantes, rugosi, calyce sustentati sicco, flavicante, repando, pulpa fusca & dulci officulum recondunt ovatum, prædurum, nucleo dulci foetum. Macri, calyce orbati, alieno sapore contaminati, rejiciendi sunt. *Cordia Myxa* L. Ægypti & Indiæ arbor, apud nos in caldario servanda. *Ob vires Demulcentes olim ad Decocta Pectoralia recipiebantur.*

SECALE, *Seigle, Roggen*. Grana strigosa, inferne acuta, superne aliquantum obtusa, sulco longitudinali notata, sub cuticula flavicante, ad nigrum vergente farinam albissimam includunt. *Secale Cereale* L. BLACKWELL Tab. 424. Mucilaginis viscidæ ponderis sui dimidium vehit. *Farina Secalis cum Cerevisiæ face in pastam redacta & Collo imposita Asperitati Faucium & Anginæ mederi fertur.*

SEDLICENSIS SAL. Crystalli exiguæ, cuspides referentes, facillime in aqua dissolubiles, nullam ab aëre mutationem patientes, evidenter amaræ, ex Acido Vitriolico Magnesia saturato, natæ. Obtinetur evaporationis ope ex variis, in quodam Bohemiæ vico scaturientibus fontibus. *Frequentissimus ejus in ducenda Alvo usus est, quo scopo ejus Uncia aut Sesquiuncia in duodecim Aquæ Unciis dissolvitur.*

SEDUM MINUS, *Tripe Madame, Katzentrauben*. *Cauliculi* teretes, undique versum imbricati, *Foliolis* teretibus, ovatis, obtusis, convexo-gibbis, acris saporis, odoris expectes,

tes. *Sedum acre* L. BLACKWELL Tab. 232. Vulgare per omnem Europam. *Intus ad unum aut alterum cochlear sumtum Vomitus & secessus Alvinos excitat. Extus Clavos pedum consumit, Cancro & Ulceribus fungosis medelam attulisse relatum legitur.*

SEIDSCHUZENSIS SAL. Sedlizenfi adeo similis, ut unus ab altero distingui vix possit. Obtinetur evaporationis ope ex fontibus cognominibus, non longe a Sedlizio distantibus; Magnesiæ $\frac{1}{24}$ plus quam Sedlizenfis vehit; *ceterum eadem utriusque tam virium, quam dosis ratio est.*

SELENITES, videatur GLACIES MARIÆ.

SEMPERVIVUM, *Joubarbe, Hauswurzel*. Folia ex ovato oblonga, crassa, ciliata, convexo-concava, saporis subacerbi. *Sempervivum tetorum* L. BLACKWELL Tab. 366. Totius Europæ domesticum. *Intus Resolventibus & Detergentibus viribus pollet. Extus earundem laudem habet, Clavis pedum etiam salubriter imponitur.*

SENECIO, *Senecyon, Kreuzelkraut*. Folia oblonga, femipinnata, pinnis ferratis & latis, insipida. *Senecio Vulgaris* L. BLACKWELL Tab. 132. Copiosissime per Europam crescit. *Resolvendis Tumoribus imponitur.*

SENECKA. Radix fibrosa, calamum anserinum circiter crassa, ex capite crassiore fibras dimittit, aliquot nodis distinctas, medullam continet, sub cortice ex cinereo flavo, albam, saporem habet Pimpinellæ albæ vicinum, sed acriorem. *Polygala Senega* L. Americæ Septentrionalis. *Sanguinem Pleuriticum, nec non spissitudinem Arthriticam resolvit. Uncia ejus una cum Aquæ viginti quatuor Unciis ad duodecim residuas coquitur, cochlearim exhibetur.*

SENNA. *Foliola* ovato-lanceolata, medio nervo percursa, acuta, viridia cum suffuso flavo, proprii odoris, nauseosi, saporis amari, quadantenus acris. *Folliculi Legumina* ovata, utrinque compressa, viridia, seminibus oblongis foeta, odoris vacua, sapore falso Foliis quodammodo comparando. *Cassia Senna* L. Ægypti indigena. Non nisi *Alexandrina* folia & Legumina, in commercio de la Palte dicta, recipienda sunt. Folia *Tripolitana* majora & obtusa, *Italica* obtusa & magnis venis perfusa, *Mochana* angustiora, longiora, acutiora, suo

quæque odore Alexandrinis cedunt. Folliculi *Tripolitani* minores sunt, minus virides, nigro & rufo maculati. Folia Oleum odoratum fundere dicuntur. *Tam Folia, quam Folliculi ad Unciam semis Alvum quidem ducunt, irritant tamen; coqui recusant; nec Infusum eorum valde exprimendum est.*

SEPIÆ OS, *Os de Séche, weis Fischbein.* Testa a squamis coalitis orta, oblonga, utrinque angustata, albissima, dura, linguam salis sensu afficiens, cujus faciei concavæ substantia alba inhæret pulverulenta, laxa, insipida. Sepia officinalis L. In Oceano & Mari Mediterraneo occurrit. *Adstringentes ipsi tribuuntur vires, substantia laxa ad Dentifricia recipitur.*

SERICUM, *Soie, Seide.* Fila firma, tenacia, alba vel flava, flexibilia, inodora & insipida, folliculum tegentia ovatum, in cujus cavitate Nympha delitescit Phalenæ Bombycis Mori L. Persiæ indigenæ, & hodie passim in Europa cultæ. Multum Salis volatilis largitur. *Scopo Cephalico & Cordiali olim laudabatur.*

SERPENS, *Serpent, Schlange.* Exuvium Serpentis, tenax, inodorum, insipidum, pro vario unde desumitur genere varie coloratum, & maculatum, apud nos a Colubro Natrice L. vulgo desumitur. *Axungia* Piscium axungiae similis. *Lapidis* nomine hodie venit substantia nigra, in medio macula alba notata, ad margines attenuata, bibula, linguæ adhærens, insipida, ex Cornu Cervino usto parata. *Exuvia ad opitulandum Partum Ventri & Lumbis alligabantur; ad incrementum Pilorum accelerandum adhibebantur; intus scopo Diuretico inserviebant; viribus quoque Axungia cum Adipe Piscium æquipollet; Lapis Vulneribus venenatis imponi solebat.*

SERPENTARIA VIRGINIANA. Radix ex tenui capite plures fibrillas, aliquot pollices longas, emittit, ferruginea, intus albida, Camphoram evidentem olens, sapore acriuscula & amaricans. *Aristolochia Serpentaria* L. Crescit in Virginia & Carolina. Aliquantum Olei odorati fundere dicitur. In penum medicamentariam Europæorum exeunte demum superiore seculo admissa est. *Virium Alexipharmicarum, Anodynium, Antisepticarum laudem habet. Datur in Pulvere ad Scrupulum unum, in Infuso ad Drachmam unam.*

SERPYLLUM, *Serpolet, Quendel*. *Cauliculi teneri, teretes, albidi, Foliis vestiti parvis, ovatis, obtusis, odore perfusi aromatico, proprio sapore qui linguam pungit. Thymus Serpillum L. BLACKWELL Tab. 418. Crescit per omnem Europam. Per paulum Olei odorati fundere dicitur. Menses & Urinam promovere, Cephalalgiam ex crapula ortam pellere dicitur; extus ad Discutiendum & Roborandum adhibetur.*

SESAMUM. Semina exigua, ovata, albida, dulcia, Oleo turgida. *Sesamum Orientale L. In Oriente & Corsica crescit. Annuæ plantæ nostræ plagæ culturam patitur. Vim Relaxantem ei nonnulli tribuunt.*

SESELI CRETICUM seu *Montanum, Bergkummel*. Semina parva, utrinque obtusa, convexo-concava, tribus lineis eminentibus notata, rufa, vix odora, saporis leviter aromatici. *Tordylium Officinale L. Europæ calidæ plantæ annuæ, in nostris hortis coli patiens.*

SESELI MASSILIENSE. Priori simile, magis gryseum & odoratum. *Laserpitium Siler L. BLACKWELL Tab. 426. Orientis & Europæ calidæ. Utrumque Seseli Resolvendi & Urinam Ducendi scopo adhibebatur. Varia Semina aromatica plantarum umbelliferarum hoc nomine passim in officinis occurrunt.*

SIDERITIS, *Crapaudine, Glied- vel Beruf- vel Beschrey-Kraut*. Folia oblonga, obtusa, ferrata, scabra, hirsuta, odore tenui, sapore adstringente prædita. *Stachys recta L. Passim in Europa obvia. Vis ei Vulneraria tribuitur, ad Balnea contra Rhachitidem recipitur.*

SIGILLUM SALOMONIS, *Weiswurzel*. Radix cylindrica, crassitie calami anserini, striis eminentibus rugosa, extus flavicans, intus alba, levem spirat odorem, saporem prodit dulcem. *Convallaria Polygonatum L. BLACKWELL Tab. 251. Vulgaris per Europam. Mucilaginis ultra dimidium sui ponderis largitur. Contra Hemorrhagias & Hæmorrhoides efficax prædicatur.*

SILER MONTANUM. Semen, quod sub **SESELI MASSILIENSIS** titulo descripsi, hoc nomine subinde prostat.

SILEX, *Caillou, Kieselstein*. Lapis rotundus, durus,

ad Chalybis ictum scintillas evomens, fractura in frustula lævia, quasi vitrea, convexo-concava dilabens, varie coloratus, citra fusionem nullo menstruo solubilis, insipidus, inodorus. Silex Pyromachus L. In fluviorum alveis & ad ripas offenditur. *Iners omnino Lapis olim Lithonripticis adscribebatur.*

SILIQUA DULCIS, *Carobe, Carouge, Johannesbrod.* Fructus oblongus, utrinque compressus, plus minus incurvus, fusco-bruneus, nitidus, rugosus, intus multis septis distinctus, pulpam continentibus, siccam, rufam, dulcem, femina foventem subrotunda, splendentia, fusca, nucleum album includentia. Macræ, quæque concussæ crepitant, rejiciendæ sunt. *Ceratonia Siliqua L. BLACKWELL Tab. 209.* Vulgatissima Europæ calidæ & Orientis arbor, apud nos contra hyemis rigorem est defendenda. *Decoctis Pectoralibus adjicitur.*

SIMAROUBA. Cortex non crassus, cujus frusta pede longiora, aliquot pollices lata, laciniata ad nos adferuntur, fractu pertinax, extus levissime rugosus, cinereus, intus pallidior, per se in pulverem redigi impatiens, inodorus, amarissimus. Pro *Quassia dioica* hanc arborem habet *Pharmacop. Suec. Clar.* AUBLET contra monœciam esse observavit; in Insulis Americæ calidæ crescit. *Prioribus hujus Seculi annis primum a Gallis contra Dysenteriam usurpatus est hic Cortex. Datur ad Scrupulos duos pro dosi ex Aqua decoctus.*

SINAPI, *Moutarde, Senf.* Semina parva, rotunda, rubicundo-brunea, sapore admodum acri statim linguam & in pulverem redacta trans palatum nares quoque irritantia. *Sinapis nigra L.* Passim in Europa obvia, apud nos copiose in agris colitur. Oleum unguinosum mite, odoratum acerrimum fundere dicuntur. *Ad condimenta hæc Semina recipiuntur, Medicis Resolventium, Diureticorum, Antiscorbuticorum nomine commendantur. In Cataplasma redacta extus ad Rubefaciendum adhibentur.*

SMARAGDUS, *Emeraude.* Gemma reliquis mollior, viridis, igne colorem non mutans, variæ, angularis figuræ. *Borax Gemma nobilis viridis L.* Ex India potissimum & quidem pretiosior nobis venit, in Bohemia & Gallia quoque obti-

netur. Fluorem ei viridem five Muriam lucidam L. passim ex Europæ fodinis effossam plerumque substituere solent. *Gemmis affictæ olim vires medicæ Smaragdo etiam affingebantur.*

SMIRIS, *Emery, Schmirgel*. Minera Ferri ponderosa, lapidem durissimum, nigro-gryseum referens, in pulverem trita ad rufum vergens. Ferrum Smiris L. Hinc inde in metalli fodinis reperitur. *Multifarius ejus in variis artibus usus est. Olim ad Dentifricia recipiebatur.*

SODA, *Alumen Catinum, Soude*. Massa terreo-salina, in prægrandes glebas efformata, perdura, gryseo-nigricans, cærulescens, plurimis foraminibus pertusa, odoris non ingrati, saporis falsi, lixiviosi. Orientalis, multum laudata, *Rochetta Alexandrina* dicitur, ex Occidentalibus *Alonensis* præcipue commendatur. Paratur ex variis Salsolæ L. Salicorniæ L. & Mesembryanthemi L. ad Mare crescentibus speciebus. In Aëre humescens, soluta foetens, crusta viridi obducta, minoribus foraminibus pertusa, rejicienda est. *Sal inde paratus vires Alcalium æquat.*

SOLANUM, *Morelle, Nachtschatten*. Folia rhomboidea, dentato-angulata, odoris & saporis expertia. Solanum nigrum L. BLACKWELL Tab. 107. Passim per Europam obvium. *Inconsulto venenis narcoticis adscripta; extus Discutiendi scopo in usum trahuntur.*

SOLDANELLA, *Chou marin, Meerkohl*. Folia longius petiolata, reniformi-cordata, obtusa cum parvo mucrone, crassiuscula, inodora, amaricantia, acria. Convolvulus Soldanella L. Ad Oceani Europæi littora minus frigida crescit. *Valide & cum irritatione purgat. Datur in substantia ad Drachmam dimidiam, in Infuso ad Drachmas duas.*

SONCHUS, *Laitron, Sau- vel Gænsdistel*. Folia longa, glauca, semipinnata, pinnis serratis, odora, Papaveri propinqua, sapore amara. Sonchus Oleraceus L. BLACKWELL Tab. 130. Crescit ubique. *A quibusdam Cichorio substituitur.*

SOPHIA CHIRURGORUM, *Besenkraut*. Folia magna, circumscriptione triangulari, aliquoties pinnata, pinnis ordinatim decreescentibus, ultimis pinnulis linearibus, angustissimis,

mollia, levissimi odoris, saporis acriusculi. *Semina minima, ovata, rufa, acia. Sifimbrium Sophia L. BLACKWELL Tab. 440. Passim per Europam occurrit. Vires Incidentes ei tribuuntur. Semina olim Adstringendi, Urinam ducendi, Vermibus medendi scopo laudabantur.*

SORBUS AUCUPARIA, *Sorbier, Vogelbeerenbaum.* Baccæ rotundæ, umbilicatæ, rubræ, inodoræ, acido-acerbæ. *Sorbus Aucuparia L. Frequens per Europam arbor. Dicuntur Stranguriæ mederi, Calculo Renali obfistere.*

SPECULARIS LAPIS, videatur **GLACIES MARIÆ.**

SPICA CELTICA. Radix parva, foliis exiguis squamarum instar vestita, nervos quoque foliorum marcidorum emittens, odore aromatico proprio, sapore amaro, falso, aromatico perfusa. *Valeriana Celtica L. Alpibus Europæ calidæ propria planta. Olim scopo Diuretico laudabatur; hodie in Orientem mittitur, ad usus Cosmeticos adhibenda.*

SPICA INDICA, *Marien-Magdalenen-Blume.* Radicis exiguum capitulum ferrugineum, pluribus foliorum marcidorum nervis sibi invicem incumbentibus & convolutis instructum, odore proprio forti, cui nonnihil mucidi inesse videtur, sapore leviter amaro perfusum. *Andropogon Nardus L. Indiæ & Syriæ Gramen. A quibusdam Spica Nardi dicitur, qua voce alii utramque Spicam, alii Lavendulam supra memoratam indicant. Præter odorem rarissimus ejus usus est.*

SPIGELIA. Folia dicuntur ovato-oblonga esse, acuta, supra viridia, infra glauca, odore & sapore putridum referentia. *Spigelia Marilandica L. Americæ Septentrionalis propria planta. Haud ita pridem in Europam allata, contra Vermes, præcipue ab Anglis, maximopere commendatur. Adultis duæ pro dosi Drachmæ bis de die dantur; justo majore quantitate data Soporosos edidisse effectus compertum est. Ipsi debiliorem esse Spigeliam Anthelmiam L. Americæ calidæ, annuam plantam, apud nos Semina maturantem asserunt, cujus Folia ovato-acuta, hirsuta, fatui saporis sunt.*

SPINA CERVINA, *Nerprun, Kreuzbeerlein.* Baccæ rotundæ, Pifa majora magnitudine æquantes, puncto eminenti-

te umbilicatæ, nitidæ, succo lurido turgidæ, ad nigredinem cum vestigio viroris vergente, acriusculæ, cum quadam adstrictione nauseosæ. Rhamnus Catharticus L. BLACKWELL Tab. 135. Vulgaris per Europam arbor. Ex Succo Alumine mixto oritur pigmentum, *Verd de Vessie*, *Saftgrün* appellatum. *Baccas ad Drachmas duas datas, Alvim ducere ferunt, frequentissime parand. Syrupo Domestico inserviunt.*

SPONGIA, *Eponge*, *Schwamm*. Substantia fibrosa, subglobosa, lobata, fulci plus minus diluti coloris, odoris proprii minus grati, nullius saporis, multis foraminibus varix magnitudinis hiulca, quibus liquorem sorbens turget. Spongia officinalis L. Copiose in Mari Mediterræneo & Rubro invenitur. Spongiæ quo molliores sunt, quo minoribus poris quoque dilutiore colore præditæ, eo meliores sunt & *Eponges fines*, *Badschwamm* appellantur; majoribus contra foraminibus pertusæ, minus sequaces *Rosfchwamm* earumque frustra minora *Fragmenta Spongiarum* dicuntur. *Combusta intus contra Strumas exhibentur; integræ extus ad Hamorrhagias sistendas usurpantur.*

SPONGIARUM LAPIDES. Lithophyta membranas lapideas, fragiles, diversissime figuratas, cellulares referunt, manifesta, quod aliis substantiis adhæserint, signa præ se ferunt, odorem Maris spirant. Cellepora Spongites L. Testis & rupibus adcreta in Mari Mediterraneo reperitur. *Usti medicamentis contra Strumas admiscuntur.*

STANNUM, *Etain*, *Zinn*. Metallum omnium levissimum & minore, quam reliqua, calore liquabile, albedine & firmitate Plumbum superans, in omnibus Acidis nec non Alcalibus solubile. Nativum rarius existit, sub variarum glebarum forma in Anglia maxime & Germania offenditur. *Scopo Anthelmintico ejus Rasuram vel ultra Semiunciam pro dosi sunt qui laudent; qui vero hoc medicamento recte uti volent, caute circumspiciant, ne Plumbo aut alio Metallo noxio sit mangonifatum.*

STAPHIS AGRIA. Semina subrotunda, angulata, inferne latiora, superne contracta, in facie plana linea longitudinali distincta, sub cortice nigro, rugoso nucleum oleosum, albidum, amarum, acerrimum condunt. Delphinium Sta-

phis agria L. BLACKWELL Tab. 265. Planta biennis Europæ calidæ, apud nos in tepidario ab hyemis rigore tuenda. *Acerimum medicamentum nunquam intus dandum, contra Pediculos usurpatur.*

STOECHAS ARABICA. Spicæ cylindraceæ, multis calicibus sibi arctissime incumbentibus Floresque marcidos emitentibus efformatæ, colore cinereo, odore levi, sapore aromatico ad *Lavendulam* accedente, sed minus grato. *Lavendula Stœchas* L. BLACKWELL Tab. 241. Orientis & Europæ Meridionalis propria, in tepidario contra nostras hyemes defendenda. Olei odorati uberem copiam fundere dicitur. *Rarissime in usum trahitur, Lavendula Spica vicem ejus sustinente.*

STOECHAS CITRINA, *Immortelles jaunes, Rheinblumen.* Flores tubulosi, lutei, calyce sustentati luteo, ex squamis constante ficcis, lanceolatis, imbricatis, insipidi, inodori. *Gnaphalium Arenarium* L. Passim per Europam obvium. *Lenes vires Adstringentes edere dicitur.*

STORAX CALAMITA. Succus concretus, sive sub forma massarum variæ magnitudinis, ex badio rufarum, tenacium, pinguiuscularum, proprii, suavis admodum odoris, acriusculi saporis, quæ quidem in *Granis* dicitur; sive in prægrandibus massis prostat, facci, in quo præli pressionem passæ erant, manifesta vestigia gerentibus, sabulo & lapillis inquinatis, friabilibus, odore & sapore antecedentibus similibus; hæ quo aridiores, eo viliores sunt. *Styrax officinalis* L. Orientis & Europæ calidæ propria arbor, apud nos per hyemem in tepidario asservanda. In Gallia & Italia aliquantum Resinæ inde obtinetur. Oleum odoratum & Salem Essentialem emittere dicitur. Spiritu Vini vix non tota solvitur, Oleis nequaquam. *Olim scopo Becchico intus dabatur, hodie Suffitibus potissimum inservit.*

STORAX LIQUIDA. Resina quæ consistentiam Unguenti spissioris habet, grysea, fæculenta, sordida, antecedentis odorem spirans. *Liquida mbar styraciflua* L. BLACKWELL Tab. 485. Virginæ civis, nostras hyemes impune fert. Quæ in officinis prostat Resina, haud obscure mangonium prodit. *Ad consolidanda Vulnera adhibetur.*

STRAMONIUM,

STRAMONIUM, *Pomme épineuse*, *Stechapfel*. Folia magna, viridia, ovato-acuta, angulosa, in lacinias latas divisa, odore virulenta, sapore nauseosa. *Datura Stramonium* L. BLACKWELL Tab. 313. Americanæ originis planta, justo frequentius hodie in Europa occurrit. *Omnibus hujus plantæ partibus Narcoticas vires inesse experientia edocuit. Succum inspissatum ad sex Grana bis de die datum Convulsiones & Maniam curasse observatum est.*

STRUTHIONIS OVA, *Œufs d'Autruche*, *Strausseneyer*. Testæ albæ, præmagnæ Ovorum Struthionis Cameli L. Asiæ & Africæ avis. *A quibusdam scopo Lithonriptico laudabantur.*

SUBER, *Liege*, *Kork*-vel *Pantoffelholz*. Cortex planus, crassiusculus, levis, coriaceus, firmus & compactus, facile scindendus, coloris dilute brunei, insipidus, inodorus. *Quercus Suber* L. BLACKWELL Tab. 193. Europæ calidæ, apud nos contra hyemis injurias defendenda. *Olim Adstringendi causa intus adhibebatur, extus ustum sub forma Unguenti Hæmorrhoidibus applicatur; usus ad Epistomia notissimus, ejusdem carbo in pulverem nigrum contritus Noir d'Espagne sistit.*

SUCCINUM, *Ambre jaune*, *Carabé*, *Agtstein*, *Bernstein*. Bitumen in frustis variæ rotunditatis & magnitudinis existat, plus minus profunde citrinum, pellucidum, grate olens, nullo calore fundi patiens, suavem odorem exhalans; quo minus colorata, quo pellucidiora, quo majora frusta, eo sunt pretiosiora. Quæ inter tornandum decidunt ramenta, **RASURÆ SUCCINI** nomine in officinas recipiuntur. Succinum Electricum L. Copiosissime ad Mare Balthicum, rarius in aliis Europæ regionibus reperitur. *Olim contra affectus Capitis & morbos Catarrhales commendabatur; ejus suffitus Roborandi, Discutiendi, Aërem purgandi gratia adhibetur.*

SUCCISA, *Morsus diaboli*, *Mors du diable*, *Teufelsabbis*. Radix fibrosa, ex parvis capitulis, ad quorum latus germen novi caulis accretum specie morsus quosdam fefellit, fibras emittit capillares, gryseas, ex albo flavescentes, amaras. Scabiosa Succisa L. BLACKWELL Tab. 142. *Superstitione vel ad gravissimos morbos efficax habita, præ ceteris nihil proprii habet.*

SULPHUR, *Soufre*, *Schwefel*. Substantia solida, flava, cum crepitatione fragilis, mediocri calore fundenda, colorem fundendo rufum induens, proprio ingrato odore nares feriens, insipida, ignem concipiens, flamma cærulea & acida ardens, in Oleis & Spiritu Vini, neutiquam in Aqua solubilis. Pyrites L. Occurrit passim per Europam, sive Nativum, sive cum variis metallis in varias mineras conversum, sive Fontibus foteriis immixtum. Constat ex maxima Acidi Vitrioli & minima Principii inflammabilis portione. Nonnisi flavum in cylindros fufum recipi debet, quod quidem *Citrinum dicitur*, aut *Vivum Soufre à Canons*, aut in *Flores* sublimatum. *Intus ad Viscerum Ulcera, ad promovendam Diaphoresin, curandam Scabiem; extus contra morbos Cutaneos adhibetur.*

SUMACH. *Baccæ* exsiccatae, racemo adhærentes, rubrae, multo villo obductæ, *Semina* includentes nigra, subrotunda; acido, admodum adstringente sapore. *Rhus Coriaria* L. BLACKWELL Tab. 486. & 541. Europæ Meridionalis & Orientis propria arbor, nostras hyemes sine noxa fert. *Rami teneiores cum foliis exsiccati in usum Tinctorum asservantur. Bacca exsiccata valide Adstringunt, quo quidem scopo tam intus, quam extus adhibentur.*

SYMPHYTUM, *Consolida major*, *grand Consoude*, *Schwarzwurzel*, *Wallwurzel*. *Radices* fibrosæ, aliquot pollices crassæ, foris nigrae, intus albæ, insipidae, inodoræ. *Folia* ovato-lanceolata, hirsuta, aspera, rugosa, odoris & saporis expertia. *Symphytum officinale* L. BLACKWELL Tab. 252. Crescit passim per Europam. Ego saltem Mucilaginem, ob quam ab Auctoribus Hæmoptoicis, Nephriticis & Dyfentericis commendatur, iteratis quoque experimentis inde non potui obtinere. *Radices exsiccatae mihi semper Extractum aquosum, bruneum & falsum exhibuerunt.*

TACAMAHAHA. Resina, quæ sub varia forma nobis venit, alia in frustis rufo-flavescentibus, nitidis, gratum odorem spirantibus, levi & nauseosi saporis, calore liquefcentibus, quæque accensa minus gratum spargunt odorem; eadem in massas quoque majores, multis sordibus pollutas coacta pro-

stat, & hæc quidem *en Masses*, *in Sorten* dici solet; alia priori quidem similis, sed pallidior, viridescens, Cucurbitis dimidiatis inclusa, cui *en Coques* nomen tributum; occurrit etiam *Tacamahaca viridis* parvis frustis efformata, tota viridis, inodora, sapore multum nauseosa, igni admota fluens, accensa minus gratum fumum emittens. Nondum de arbore has Resinas fundente constat. Priorem a Populo balsamifera L. Sibiriae & Americae Meridionalis arbore, nostram hyemem patienter ferente, alteram a Fagara octandra L. Americae Meridionalis obtineri ferunt. *Extus debili Ventriculo sub forma Emplastri applicatur, Suffitus ejus ad Roborandum & Discutiendum adhibetur.*

TAFFIA, *Rum.* Spiritus inflammabilis, flavicans, præter saporem & odorem Spiritibus per fermentationem paratis communes & quidem multum eminentes, nullis propriis instructus. Ex Insula Francica & Madagascar adfertur, ubi ex succo *Sacchari officinarum*, justam fermentationem vinosam passo, paratur. Ex ejus Unciis viginti sex Spiritus rectificati Uncias septendecim, & ex his Alcoholis octo obtinui. Qui post rectificationem remanet Liquor turbidus, non male olens, dulciusculus est. Spiritus, qui in Americae officinis Saccharinis ex Syrupo Saccharino paratur, empyreuma habet & acrimoniam, eum ibi proprie *Taffia* dicunt, probe a priori, quem *Rum* appellant, distinguendum. *Præter vires Spiritui Vini proprias Medicis ob virtutem Antarthriticam commendatur.*

TALCUM. Squamis efformatur, actu pinguibus, nitidis, cohærendo invicem in massas majores, minoresve excrementibus, fragilibus, subpellucidis, albicantibus, virescentibus, insipidis, inodoris. Mica Talcosa L. In Suecia & Regno Neapolitano nascitur. *Olim ad usus Cosméticos commendabatur, Oleum inde parandum ad somnia Alchymicorum ablegandum.*

TALPA, *Taupe*, *Maulwurf*. Animal quadrupes, gryfeum, terram fodiens. Talpa Europæa L. nimis frequens in arvis, *combusta intus contra Arthritidem dabatur, extus Fistulis & Strumis applicabatur.*

TAMARINDI. Pulpa nigra, levi odore, sapore acido in-

structa, cui varia filamenta & semina majuscula, ex rotundo angulata, spadicea immixta sunt: exsucca & carne Prunorum adulterata rejicitur. *Tamarindus Indica* L. BLACKWELL Tab. 201. Arbor Indiæ, Ægypti & Arabiæ, in America hodie frequenter culta, apud nos in caldario sustentanda. *Filamentis & Seminibus cribri ope*, per quod transprimitur, purgata egregium *Eccoproticum* est in *Febribus acutis*, *Biliofis*, *putridis*.

TAMARISCUS, *Tamaris*. Cortices tenues, angusti, extus rufi, intus albi, sapore amaricantes & adstringentes. *Tamarix Germanica* L. BLACKWELL Tab. 331. f. 2. Frutex Europæ temperatæ. *Ad Decodâ Aperientia recipitur*.

TANACETUM, *Tanais*, *Rheinfarn*. *Folia* longa, viridia, punctata, pinnata, pinnis incisif, ferratis; *Flores* tubulosi, flavi, calice hemisphærico imbricato sustentati; *Semina* cylindroidea, parva, angulata, utrinque truncata: omnes *Tanaceti* partes odorem proprium, fortem, minus gratum habent, saporem aromaticum, amaricantem. *Tanacetum vulgare* L. BLACKWELL Tab. 464. Passim per Europam occurrit. *Oleum* odoratum, flavum, acre & amarum fundit. *Contra Vermes*, ad morbos *Uteri & Arthritidem* commendatur.

TARAXACUM, *Dens Leonis*, *Pisse-en-Lit*, *Pfaffenrœhrlein*, *Seichblumen*. *Radices* sub cortice nigricante medullam albam & dulcem includunt; *Folia* sunt runcinato-pinnatifida, pinnis triangularibus dentatis, leviter amara; *Cauliculi* non nisi recentes recipiendi, glabri sunt, cavi, teneri, lacte amaricante turgidi. *Leontodon Taraxacum* L. BLACKWELL Tab. 1. Vulgatissima per Europam planta. *Multum ad referendas Obstructiones Hepatis* laudatur. *Folia tenella primo vere tanquam olus eduntur*.

TARTARUS, *Tartre*, *Weinstein*. Sal essentialis ex succo Uvarum & Vino secedens; odore levi, sapore acido imbutus, ex Vino albo gryseus, ex rubro ruber evadit, multam aquam, eamque ferventem, ad sui solutionem exigit, præter Acidum oleosâ quoque partes vehit & calcareas. *Monspeli* aut *Venetiis* depuratus vulgo sub nomine **CRYSTALLORUM TARTARI** venit. *Sordibus putridis Primarum Viarum*, aut morbis *Biliofis* labo-

rantibus, nec non Hydropicis exhibetur; datur quoque Cathartico scopo.

TAURUS, *Taureau, Stier.* **Bos Taurus L.** Quadrupes notissimum, cicur per omnem Europam occurrit, asservatur *Fel* ejus sive *Bilis* inspissata; virescens, amarissima, *extus ad Abstergendum, intus autem sub inertia Bilis ad aliquot Grana pro do-* si exhibetur.

TAXUS, *Blaireau, Dachs.* Animal quadrupes, supra cinereum, infra nigrum, linea longitudinali nigra, trans aures & oculos ducta notatum. **Ursus Meles L.** Per omnem Europam indigena. *Axungia ejus reliquorum quadrupedum Axungia colore, consistentia, viribus similis est.*

TEREBINTHINA. Balsamum tenax, ceteris Resinis liquidis spissius, varii, pro arboris unde obtinetur diversitate, odoris, saporis amaricantis & resinosi, pellucens, magis minusve dilute flavum, uberem Olei admodum odorati, olidi & acris copiam fundit, cum Aqua cocta solidescit. **ARGENTORATENSIS** reliquis, si *Chiam* exceperis, spissior, flava, abiegnum odorem spirans, colligitur ex vesiculis epidermidis **Pinus Piceæ L.** Europæ temperatæ arboris. **CHIA** vel **CYPRIA** proxime ad consistentiam siccam accedit, alba cum vestigio flavedinis, suaveolens, nec amara, nec acris, destillat ex vulnerata Pistacia Terebintho **L. BLACKWELL** Tab. 478. Europæ Australis, Asiæ & Africæ indigena, apud nos in frigidario contra hyemem defendenda. **COMMUNIS** sequente spissior, turbida, rufi fere coloris, odoris minus grati, tædæ haud abfimilis; obtinetur ex fauciata **Pinu Sylvestri L.** Non raro ipsi substituitur spuma, quæ Resinæ inter depurandum supernatat, in lebete cocta & Oleo Templino permixta. **VENETA** reliquis omnibus liquidior, pallide lutea, levius & minus grate odorata, amaricans, profluit ex fauciata **Pinu Larice L. BLACKWELL** Tab. 477, in altioribus Europæ temperatæ montibus crescente. *Reliquarum Resinarum vires exserit, exoticis mitior. Ad Abstergendum & Consolidandum tam intus quam extus exhibetur; Diuretico quoque scopo datur. Oleum Aquæ ope inde destillatum, cum totum pelluceat, Spiritus nomine venire solet, cum Sanguinem multum exæstuet & validissime in Renes*

agat, nunquam intus dandum est; extus potenter Resolvit, partes Membranaceas Roborat, Vulneratos Nervos & Tendines Consolidat, Putredinem arcet, Hæmorrhagias sistit.

TERRÆ SIGILLATÆ. Argillæ varii coloris, in massas variæ figuræ ut plurimum rotundæ vel cylindraceæ effictæ, variisque figillis notatæ. Denominantur vel a patria, vel a colore, vel a sigillo. *Inertes omnino terre pene in universum evolverunt.*

TESTUDO, Tortue, Schildkræte. Amphibium quadrupes, carne molli, capite & pedibus verrucis obsessis, testa tegitur dura, variis maculis distincta. Testudo orbicularis L. In Gallia Meridionali & Italia occurrit. *Capite & Pedibus rejectis ex Aqua coquitur. Phthysicis maxime, nec non Humoribus acribus Demulcendis a nonnullis magnopere commendata.*

TERTIANARIA, Toque, Fieberkraut. Folia petiolata, cordato-lanceolata, obtusiuscula, dentata, leviter rugosa, odoris minus grati, saporis amari. Scutellaria galericulata L. Crescit per omnem Europam. *A quibusdam contra Febres Intermitientes commendabatur.*

THALICTRUM FLAVUM, gelbe Wiesenraute. Radices extus fuscæ, rugis transversis distinctæ, intus luteæ, sapore leviter amaricantes. Thalictrum flavum L. Passim per Europam obvium. *Contra Icterus ei tribuuntur vires.*

THEA BOHEA. Folia paulum contorta, siccissima, ut plurimum diffracta, ad colorem nigrum vergunt, gratissimum odorem Rosis vicinum spargunt, amariuscule sapiunt. Thea Bohea L. BLACKWELL Tab. 352. Chinæ, Siam, Japoniæ indigena arbuscula, nobis per hyemem in caldario fervanda. Plures ejus, quæ prostant, varietates vel variæ folia colligendi rationi, vel mangonio originem debent. *Minori dosi quam sequens recipitur, validius quoque Adstringit.*

THEA VIRIDIS. Folia viridia, contorta, pro diversa varietate, variæ magnitudinis; quin suavitas etiam odoris ad Violas accedentis in diversis evidenter diversa est, sapor aliquid acerbi habet. Thea viridis L. Chinæ arbuscula, nobis ab hyeme in frigidario tuenda. Innumeræ ejus varietates tam a colligendi modo, quam a mangonio pendent. Circa medium

superioris seculi Thea in Europa usurpari cœpit. Ratio, qua ab Europæis assumitur, evincere videtur, Infusi ejus effectus Aquæ calidæ potius quam foliis esse adscribendos.

THLASPI, *Baurense*. Siliculæ orbiculatæ, late marginatæ, compressæ, apice bifidæ, seminibus ovatis, obtusis, rubicundis, bruneis fætæ, fortis, nauseosi, alliacei odoris, sapore acres. *Thlaspi arvense* L. BLACKWELL Tab. 68. Vulgare per Europam. *Urinam & Menses movere, Abscessus internos aperire quibusdam dicitur. Tota planta efficax contra Curculiones & Cimices habetur.*

THYMIAMATIS CORTEX, *Thuris Cortex, Thus Judæorum*. Frusta ex squamis ligneis, sibi irregulariter incumbentibus & substantia pulverulenta, resinosa, quasi conglutinata, ex fusco rufescentia, odore fragrante, sapore leviter aromatico, vix amaricante instructa, accensa gratissimum odorem spirant, usta in carbonem & cinerem redigi patiuntur. Ex India nobis veniunt; a qua arbore desumantur, nescimus. *Tantum ad Suffitus adhibentur.*

THYMUS CRETICUS. *Folia* habet lanceolata, basi latiora, ad marginem levissime ciliata; *Spicas* subrotundas, obtusas, bracteis majoribus, imbricatis, albidis, ciliatis distinctas, *Floribus* ornatas labiatis, violaceis, odore fragrans, sapore aromaticus. *Satureja Capitata* L. Europæ calidæ & Orientis, apud nos per hyemem in frigidario asservanda.

THYMUS VULGARIS, *Thym, Thymian*. *Cauliculiramosi*, lignosi, obsolete tetragoni, pubescentes; *Foliolis* petiolatis, ovali-oblongis, albidis, *Floribus* labiatis, exiguis, verticillatis, odore grato, sapore linguam pungente præditi. *Thymus vulgaris* L. Europæ calidæ & Orientis, nostratis hyemis patientissima planta. *Oleum* inde odoratum, quin etiam *Camphora* obtenta est. *Vires habet cum reliquis plantis aromaticis communes; condimenti loco in culinas recipitur.*

TIGLIA GRANA, *Pineæ purgantes, Pignons d'Inde*. *Cataputia* majore minora, obtuse triangularia, una facie plana, sub cortice nigro, flavo-rufescente nucleum includunt albidum, pinguem, tenerrima cuticula tectum, ejusdem ac *Cataputia*

acrimonie. Croton Tiglium L. Indiæ propria arbor, nobis nonnisi in tepidario servanda. Oleum fundere dicitur unguinosum, acerrimum, aliquot solummodo guttis Alvum ducere valens. *Vires cum Cataputia eadem.*

TILIA, *Tilleul, Linden.* Flores albi, calyce quinquefido & quinque petalis ornati, pedunculis sustentantur ex peculiari foliorum genere oblongo, albido-virente, obtuso, integerrimo protrulis; recentes fragrantissimi; exsiccati, inodori, insipidi sunt. Tilia Europæa L. BLACKWELL Tab. 469. Vulgaris per Europam arbor. *Florum recentium laus in vi Nervina ponitur; exsiccorum vis omnino nulla est.*

TOLUTANUM BALSAMUM, *Beaume de Carthage,* Balsamum Balsamo de Mecca vix spissius, aurei coloris, odoris grati, saporis Balsamo de Mecca paulo acrioris. Prostat quoque siccum testis cucurbitaceis inclusum. Tolvifera Balsamum L. Crescit ad urbem Tolu in præfectura Carthagenensi. Oleum odoratum & Flores fundere dicitur. *Vires Balsami de Mecca inde expectantur.*

TOPASIVS. Gemma flavo colore splendens, Adamante, Rubino & Saphiro mollior, in igne colorem amittit & in lamellas secedit, varie figurata reperitur. Borax Gemma flava Topasius L. In Oriente, Brasilia & Saxonia nascitur. Fluor ei vulgo spathosus flavus WALLER. Muria lucida flava L. pallim in Europa obvia, substitui solet. *Sunt, qui vires ei Cephalicas & Cordiales tribuant.*

TORMENTILLA. Radices nodosæ, quasi tuberosæ, circum undique plurimas fibrillas emittentes, extus ferruginæ, intus pallide rubræ, inodoræ, adstringentes. Tormentilla erecta L. Crescit ubique per Europam. *Ad Decocta Adstringentia tam interne, quam externe adhibetur.*

TRAGACANTHA. Gummi album, fragile, sub dentibus lentescens, inodorum, insipidum, formam mox vermium, mox filorum in se revolutorum, mox granorum refert. Quæ in Sorten dicuntur Frustra colorata, sordibus inquinata, quæque ipse, sub nomine Gummi de Bassora, aliquando accepi, rejicienda sunt. Sponte effluit ex Astragalo Tragacantha L. Orientis

Orientis & Europæ Australis frutice, apud nos per hyemem in frigidario asservando. Difficulter ignem capit, ardens foetentem fumum evomit, pars ejus exigua magnam aquæ copiam in mucilaginem vertit. *Tanquam Demulcens & Relaxans præscribitur; Mucilago inde parata est commune constituens plurimorum Trochiscorum.*

TRAGOPOGON, *Barbe de Bouc, Bocksbart.* Radix fusiformis, sub cuticula flava albam & dulcem carnem includit Tragopogon pratense L. Vulgaris per Europam planta. *Scopo Aperiendi a quibusdam exhibetur.*

TRIBULI AQUATICI, *Chataignes d'eau, Wassernusse.* Nuces Castaneis minores, quatuor alis acutis instructæ, sub cortice nigro, duro includunt Nucleum cordiformem, album & dulcem. Trapa natans L. Passim per Europam & Asiam occurrit. *Viribus cum Castaneis equipollere videntur.*

TRICHOMANES, vide ADIANTHUM RUBRUM.

TRIFOLIUM, *Trefle, Klee.* Flores papilionacei, albi, calyce quinquefido sustentati, levissime odorati, insipidi. Trifolium repens L. Vulgare per Europam. *A nonnullis contra Fluorem album ejus Infusum commendatur.*

TRIFOLIUM FIBRINUM, *Trifolium Aquaticum, Menyanthe, Biberklee.* Folia petiolata, ternata, foliolis majusculis, ovatis, firmulis, inodoris, intense amaris. Menyanthes trifoliata L. BLACKWELL Tab. 474. Passim per Europam offenditur. Oleum odoratum largiri dicitur. *Contra Scorbutum, Obstructiones Abdominales & Arthritidem efficax habetur.*

TRIPOLITANA TERRA, *Tripoli, Trippel.* Terra arida, sicca, albida & flavicans, in tenerrimum pulverem conteri patiens, aspera & scabra, siticulosa, contactu inquinans, cum Acidis non effervescentes, igne indurescens, inodora, insipida. Argilla Tripolitana L. Passim in Europa reperitur. *A quibusdam Intertrigini inspergitur, poliendis potissimum Metallis inservit.*

TUNICA, *Æillet, Grasblume, Nelke.* Florum petala, calyce exempta, unguibusque recisis, obovata, rotundata, serrata, saturate rubra, gratissimum, Caryophyllis aromaticis

proximum odorem spirantia, gustu dulcia. *Dianthus Caryophyllus* L. BLACKWELL Tab. 85. In Europa Meridionali & Archipelago spontaneus, apud nos in hortis copiose colitur. *Recentes Flores Analepticas vires habent, exsiccati leniter Adstringere creduntur.*

TURPETHUM. *Cortices* longitudine fere digitum, crassitie lineam æquantes, striis longitudinalibus, nigris, resinosis notati, extus cinereo-fusci, intus magis albicantes, inodori, insipidi. Interdum prostant *Radices* ex capite ad quatuor pollices crasso in corpus cylindroideum excrecentes, rugis longitudinalibus notatæ, hinc inde rimis fissæ. *Convolvulus Turpethum* L. Crescit in India. *Olim scopo Cathartico in substantia ad Drachmam unam, in Infuso ad Unciam dimidiam dabatur.*

TUSSILAGO, videatur FARFARA.

TUTIA. Substantia laminarum instar formata, friabilis, grysea, fornacum, in quibus Zinci minera funditur, lateribus adhærens, insipida & inodora. Est ipsum Zincum, sed exustum variisque sordibus pollutum. *Tanquam Exsiccans ad Intertriginem, tanquam Discutiens ad morbos Oculorum adhibetur.*

VALERIANA, Baldrian. Radix ex capite brevi, crassiusculo, cavitatem unde caulis prodierat fervante, innumeras fibras filiformes circum undique emittens, extus fusca, intus alba, odorem fortem, Nardi similem spirat, saporem exhibet falsum. *Valeriana officinalis* L. BLACKWELL Tab. 271. Passim per Europam crescit. *Laudatur a virtute nimiam Nervorum Irritabilitatem corrigendi, Vermes fugandi, Oculos roborandi. Datur sub forma Pulveris ad Drachmam unam pro dosi.*

VANILLA. Siliqua dimidio pede longior, dimidium fere pollicem lata, utroque extremo producto & obtuso, compressa, striis longiusculis notata, uno margine acuta, altero crassiuscula, tenax, quodam quasi oleari splendore nitens, fusca, pulpam granulofam, nigram includens, odoris suavitate Flores Perlicorum superans, sapore aromatica. *Epidendron Vanilla* L. Americæ calidæ proprius frutex. Exsiccatione demum odorata evadit, & exsiccata, ut ætatem ferat, Oleo inungitur.

Ad Capitis æque ac Primarum viarum robur restituendum adhibetur. Præcipue Chocolatæ conficiendæ & condiendis Lacticiiniis infervit.

VERBASCUM, *Bouillon blanc*, *Wollkraut*. Folia longa, & lata, decurrentia, crenata, utrinque tomento obfessa, leniter adstringentia; Flores rotati, quinquefidi, levi tomento obfessi, flavi, odore perfusi leni & suavi, sapore dulces. Verbascum Thapsus L. BLACKWELL Tab. 502. Europæa planta, sponte ubique locorum crescit. Flores Oleum odoratum fundunt, succus eorum Saccharum largitur. Folia Emolliendi scopo subinde usurpantur. *Florum Infusum dilutum salubriter contra Pectoris affectus præscribitur, iidem ad Clysmata Emollientia & Anodyna recipiuntur.*

VERBENA, *Verveine*, *Eisenkraut*. Folia longiuscula, laciniata, laciniis denuo laciniatis, amara. Verbena officinalis L. BLACKWELL Tab. 41. Crescit in omni Europa. *Quæ de Verbena Veterum traduntur virtutes, aliarum plantarum laudes sunt, ad poëticas fabulas, unde natæ, relegandæ.*

VERONICA, *Veronique*, *Ehrenpreis*. Folia ovata, obtusa, subtiliter hirsuta, crenata, suffuso aromate suave amara, leniter adstringentia. Veronica officinalis L. BLACKWELL Tab. 143. Destillatione Spiritum Urinosum fundere dicitur. *Ad Infusa Pectoralia creberrime recipitur.*

VICTORIALIS LONGA, *Allermannsharnisch*. Bulbus quatuor fere pollicum longitudinem æquans, oblongus, superne paulum contractus, insipidus & inodorus, sub involucri gryseo, reticulari, fibroso, fisco, carnem condit siccatum effœtam. Allium Victoralis L. In Europa temperata provenit. *Ad ridiculos usus olim adhibebatur.*

VICTORIALIS ROTUNDA, *runde Siegwurzel*, *Acker schwerdel*. Bulbilli duo eodem ac præcedens involucri tecti, uterque albus, alter alteri insidens, alter ventricosus, inferior minus orbiculatus est, utrinque compressus, radicis exsiccatæ sapor dulcis. Gladiolus communis L. Europæ calidæ, nostras hyemes optime fert. *Ad eosdem cum antecedente usus a pinguis ingenii hominibus adhibebatur.*

VINCA PER VINCA, *Pervenche*, *Ingrün*, *Singrün*.

Folia ex ovatis oblonga, acuta, duriuscula, inodora, amariuscula. Vinca minor L. BLACKWELL Tab. 59. Passim per Europam crescit. *Immiscetur Infusis Pectoralibus.*

VINCETOXICUM, videatur HIRUNDINARIA.

VINUM. Liquor fermentatione ex fructuum horæorum, maxime Uvarum, succo obtentus, destillatione Spiritum inflammabilem fundens, coloris sive albi, sive rubri, in utroque diversorum etiam graduum, quanquam omne Vinum, quod rubrum non est, vulgo *album* dicitur; proprii ac jucundi pro innumeris varietatibus plurimum variantis odoris æque ac saporis. Sunt quæ Saccharina dulcedine palatum afficiunt Vina, & hæc quidem ut plurimum spissiusculam consistentiam habent. Vina, quæ ex alio, quam Uvarum succo parantur, quæ acida sunt, acerba, turbida, mangonio adulterata, a scopo medicato arcenda sunt: patria omnino differunt; sed hic plurimæ omnino fraudes obtinent & a certioribus, quæ usus subministrat indiciis, potius quam a fide cœnopolarum standum est. Vinis rubris semper aliquid adstringentis inest; alba, si a Gallicis discefferis, nunquam non aliquantulo Acidi linguam afficiunt. Vina Saccharina Dulcedine plena ex Orientis regionibus ex Europa etiam Orientali, Occidentali & Meridionali nobis missa, vel ex Uvis passis, vel ex musto, varia ratione aliquanta aquæ parte privato, parata, reliquis fortius Caput petunt, non tam ob largius Alcohol, quam ob resinosas, quibus abundant, partes. Vehit Vinum Aquam, Alcohol, Mucilaginem & Tartarum. Coctione semper acescit. *Sitim sedat, motum Spirituum & omnium Humorum intendit, fibras Primarum viarum roborat, Putredinem arcet, Excretiones aquosas promovet, extus Refocillat, Roborat, Discutit.*

VIOLA, *Violette, Viole.* Folia, quæ *Violaria* dicuntur, sunt cordata, glabra, obtusa, inodora, insipida; Flores pentapetali, irregulares, in cornu formam curvati, cærulei, suavissimo odore, sapore dulci; *Semina* parva, rotunda, glabra, alba. Viola odorata L. BLACKWELL Tab. 55. Crescit passim per Europam. *Folia olim Emollientibus adnumerabantur, Flores ad Demulcendum & ad Alyum leniter ducendam præscribuntur. Semina Diuretica habentur.*

VIPERA. Serpens est, pollicem circiter crassa & sesquipedem longa, cervice parva, capite compresso, in dorso flavescente, squamis instructa rhomboideis, gryseo-nigris in catenæ modum connexis, lateribus albis, ventre toto scutis transversalibus notato, cauda terete, conica, acute terminata, odore proprio, sapore nullo. Coluber Berus L. Nobis ex Helvetiâ & Comitatu Burgundiæ accersitur. Diversis in locis diversæ Colubri species adhibentur. Animal, cujus ictus pessimum venenum venis instillat. *Jusculum, ex Vipera recente, demto capite & cauda, cum menstruo aquoso puratum, multum contra morbos Cutaneos commendatur. Vipera exsiccata vix aliquid proprii polliceri videntur. Axungia consistentiam Olei unguinosi & spissiusculi, colorem flavum, odorem levem, saporem nullum habet. Commendatur ad Abstergenda Corneæ Ulcera.*

VIRGA AUREA, vid. CONSOLIDA SARRACENICA.

VIRIDE ÆRIS, *Ærugo, Verd de Gris, Grünspan.* Adfertur nobis in panibus majoribus viridibus, nauseosum & vehementem Æris odorem spirantibus, acri sapore imbutis. Deriditur laminis Cupri, sub fermentatione acetosa corrosis; optimum Monspelii conficitur, Gratianopoli quoque & in Angliâ præparari lego. *Intus nunquam dandum, extus a quibusdam Septico scopo Unguentis adjicitur.*

VISCUM, *Glu, Vogelleim.* Massa spissæ Unguenti consistentiæ, ex flavo viridescens, tenacissima, minus grati, resinosi odoris, perinde ac saporis, difficulter flammam capit, in Alcohole & Oleis solubilis, nequaquam in Aqua. Conficitur ex Illicis Aquifolii L. BLACKWELL Tab. 205. vulgaris per Europam arboris, interno cortice, tundendo in pastam redacta, unde dein resoluta putredine filamenta, affusa aqua, separantur. *Olim scopo Rubefaciendi usurpabatur.*

VISCUM, *Gui, Mispel.* Surculi lignei, mox recti, mox incurvi, ramosi, sub cortice fusco & rugoso lignum ex rufo-flavescens, leviter adstringens continentis. Viscum album L. BLACKWELL Tab. 184. Parasiticus frutex, qui variis per Europam arboribus innascitur, de Quercubus sumtus reliquis præfertur. *Magna ejus laus est in medenda Epilepsia.*

VITIS, *Vigne*, *Rebstock*. Folia quinqueloba, lobis inciso-dentatis, infra pallida, leviter odora, saporis aciduli, non ingrati. Fructus immaturi, *Verjus* dicti, acido & adstringente turgent succo, cui *Omphacio* aut *Agrestæ* nomen est. Ad condimenta ciborum recipitur; *scopo Refrigerandi usurpatur*. Vitis vinifera L. BLACKWELL Tab. 153. Colitur per totum orbem temperatum. *Roborandi causa Balneis adjiciuntur folia*. Succus ex Uvis expressus, *Mustum*, *Mout*, *Most* dictus, turbidus est, viscidus, dulcis, proprii odoris, coctione spissitudinem & aciditatem nanciscitur; ad dimidias coctum Mustum *Raisiné*, *Sapa*, *Weinmus*, ad trientem si evaporarit *Defrutum* appellatur; *interdum condimenti loco cibus adjicitur*. Uvarum presarum *Vinacea*, *Marc*, *Trabern* cum & Vinum & adstringentes Uvarum pelliculas contineant, *ad Roborandum Balneis adjiciuntur*. Circa Uvas conferantur Passulæ.

* VITIS IDÆA, videantur MYRTILLI.

VITRIOLUM ALBUM, *Galitzenstein*. In majoribus exiguarum crystallorum concretarum massis, Saccharo in panes formato similibus prostat, sapor nauseosus adstringens est. Vitriolum album L. Paratur Goslariæ ex glebis ustulatis, aqua lixivatis; Sal, ne in majores crystallos concresecat, fusus, donec refrigererit, agitur. Præter Zincum & Plumbum Æs quoque vehit; *quapropter internum ejus usum, quamvis sint, qui ad viginti quinque grana Vomitorio scopo laudent, nullatenus tamen equidem commendare ausim. Aqua dissolutum Ophthalmiæ medetur.*

VITRIOLUM CÆRULEUM vel *de Cypro*. Pulcherrimas crystallos cæruleas refert, valde nauseoso sapore linguam afficit, imo evidenter rodit. Vitriolum Cyprinum L. Passim per Europam, sive ex Gleba Cupri pyritosa, sive Æs cum Sulphure calcinando paratur. *Vi corrosiva reliqua Vitrioli genera superat, nec nisi ad usus externos recipitur*. Calcinatum PULVIS SYMPATHETICUS est. *Quondam egregie a quibusdam celebratus, hodie merito rejectus.*

VITRIOLUM VIRIDE vel *vulgare*. Crystalli virides, proprii, sed non fortis odoris, gustu falsæ & adstringentes, in aëre aut calore in pulverem ferrugineum dilabentes. Ex-

fistit vel Nativum vel in Crystallos concretum, Vitriolum Martis L. vel tomenti aut pulveris instar ex terra lapidibusve efflorescens, varie coloratum Vitriolum Atramentarium L. rufum CHALCITIS nominatur, cinereum SORY, nigrum MELANTERIA, flavum MISY; denique ex resoluto etiam Pyrita Ferri L. arte paratur. Rarissime purum tabernas intrat, vix non semper Ære plus minus inquinatum. Minus bene a patria distingui in *Inst. Mat. Med.* p. 447. monui. Ad usus internos nunquam, nisi prius cum Ferro coctum, eoque ab omni labe Cuprea purgatum, quod cum *Vitriolo Martis* P. II. definiendo, unum idemque est; *extus ad Medicamenta Adstringentia adhibetur.*

VITRUM, *Verre, Glas.* Substantia pellucida, rigida, inodora, insipida, vulgo ex terris vitrescentibus & Sale Alkali fixo fusionis ope confecta, frangendo in frustra scindentia dilabens. Quædam Vitra Arsenicum, quædam Plumbum recipiunt, utraque humano corpori, utcunque demum applicentur, periculum afferunt. *Vitrum in frustis deglutitum, ad Primas vias venenorum mechanicorum tragœdiam utique aget; in tenerrimum pulverem redactum plebecula Umbilico Infantum imponere solet scopo Anthelmintico.*

ULMARIA, videatur BARBA CAPRÆ.

UMBILICUS MARINUS, *Faba marina, Meerbohne, Nabelstein.* Testa rotunda, inferne plana, obscurius colorata, margine rotundato, albo terminata, superne convexa, nitida, rubro-dilute flavicans, fovea notata, cujus margines inæqualis crassitie sunt & in qua tuberculum album, semipellucidum obtinet, insipida, inodora. Est operculum Cochlearum Maris Mediterranei. *Absorbens olim & Adstringens habebatur.*

UNICORNU FOSSILE, videatur EBUR FOSSILE.

UNICORNU VERUM, *Licorne, Einhorn.* Dens variæ magnitudinis, vel octo pedes non raro excedentis, ex basi latiuscula longe cylindricus, in fine sensim angustatus, ex fibris spiritaliter intortis efformatus, sub cortice flavicante albissimam substantiam condit. *Monodon Monoceros* L. Ceti species Maris Septentrionalis cujus bini sunt in maxilla superiore ejus-

modi dentes. *Vires Alexipharmicæ & Antispasmodicæ, quibus medio ævo celebrabantur, deinceps experientia iudice his dentibus sunt ademptæ.*

ULMUS, *Orme, Ruffen.* Cortex intermedius, albidus, tenax, odoris expers, saporis levissime amaricantis. *Ulmus campestris L. Arbor per Europam vulgaris. Decocto multum efficacis ad Scabiem inveteratam medendam tribuitur.*

VOMICÆ NUCES, *Kræhenaugen.* Nuclei rotundi, utrinque vel compressi, vel levissime convexo-plani, villosi, gryfeo-albidi, intus cornei, valde tenaces, inodori, amarissimi. *Strychnos Nux Vomica L. BLACKWELL Tab. 395. Indiæ arbor. Vario quadrupedum generi certissimum venenum, hominibus quidem hæc nuces contra Pestem, Dysenteriam, Hydrophobiam &c., ad Scrupulum unum dandæ, magnopere quondam commendabantur, sed usum ejus internum, cum convulsivos motus excitasse, imo necasse homines, Observatores testentur, commendare nollem.*

URSUS, *Ours, Bær.* Animal quadrupes satis notum, victu & vegetabili & animali utens. *Urfa Arctos L. frigidiorum Europam inhabitat. Axungia Porcinæ &c. & colore & consistentia & viribus similis; vulgò ad crinium incrementa laudatur.*

URTICA, *Ortie, Nessel.* Folia petiolata, cordata, serrata, pilis rigidis utrinque obfessa. *Semina ovata, sub cortice fragili, nitente, spadiceo medullam albam, dulcem includunt. Urtica dioica L. Copiosa per Europam. Folia olim Rubefaciendi gratia adhibebantur; Seminibus virtus Diuretica tribuitur.*

UVA URSI, *Boufferole, Steinbeere.* Folia petiolata, ovata, oblonga, obtusa, integerrima, duriuscula, supra viridia, rugosa, subtus pallida, inodora, cum quadam amaritie adstringentia. *Arbutus Uva Ursi L. Fruticulus passim per Europam obvius. Folia dantur sub forma Pulveris ad Drachmam unam, cum aquæ Unciis duodecim decocta ad Drachmas duas contra affectus Nephriticos.*

VULPES, *Renard, Fuchs.* Animal quadrupes, carnivorum proprio foetore notum. *Canis Vulpes L. Orbis antiqui vulgare animal. Pulmones cum trachea exsiccati, nauseosi saporis & odoris, olim ad affectus Pectoris laudabantur.*

VULVARIA, *Arroche puante, kleine Mistmelten.* Folia parva

parva, rhombeo-ovata, acuta, integra vel sinuata, farina quasi conspersa, foetidissimum Urinæ putrescentis odorem, saporem falsum habent. *Chenopodium Vulvaria* L. Passim per Europam crescit. *Hystericarum Umbilico imponitur.*

UVULARIA, *Laurus Alexandrina*, *Zæpfleinkraut*. Folia ovato-oblonga, acuta, petiolata, nitidiuscula, in medio foliolum lanceolatum, acutum, fructificationem tegens emittentia, sapore amaricantia. *Interdum ad Gargarismata adhibetur.*

WINTERANUS CORTEX. Frustra aliquot pollices longa, Canella alba crassiora, convexo-concava, non convoluta, colore cinamomeo, odore grate aromatico, sapore linguam pungente. Arborem, unde defumitur, in freto Magellanico crescentem primus FOTHERGILL in *Medical Observat. by a Society of Physicians* T. V. descripsit. Drymis WINTERI FORSTER *Noy. Aÿ. Upsal.* T. III. p. 182. *Ob virtutem potissimum Antiscorbuticam laudatur; Canella ei alba ut plurimum substituitur.*

XANTHIUM, *petit Glouteron*, *Bettlerlaus*. Folia hirsuta, ovata, inferne angustata, leviter lobata, lobis irregulariter dentatis, amara. *Xanthium Strumarium* L. BLACKWELL Tab. 444. Occurrit per omnem Europam. *Succum ad Sanguinem Depurandum & contra Scrophulas commendant.*

ZEDOARIA, *Zittwer*. Radices tuberosæ, oblongæ, aliquot pollices longæ, minimum digitum crassæ, levibus rugis & tuberculis obfessæ, extus gryseæ, intus rufæ, odore perfusæ proprio, ad Camphoram accedente, sapore acri, amaricante. *Kampferia rotunda* L. BLACKWELL Tab. 399. Crescit in Madagascar & India. *Oleum odoratum spissum largiri dicitur. A vi Roborante & Incidente laudatur.*

ZIBETHUM. Substantia consistentiæ Unguenti, albida, odoris proprii, fortissimi; quo propior bruneo color ejus est, eo vilius habetur. Est Unguen, quod ex propriis receptaculis inter orificia Sexus & Ani Viverræ *Zibethæ* L. Arabiæ & Indiæ Orientalis indigenæ, & *Civette* BUFFON, Guineam inhabitantis, cochlearis ope hauritur. Unguen, quod hodie carissime constat, medicamentis externis odoris gratia immiscebatur, quem exigua ejus portio magno substantiæ,

cui adjicitur, volumini impertit. Nostra ætate hic odor minus, quam olim, naribus acceptus est. Adhibetur adhuc ad capturam piscium.


ZINCUM, *Spicauter*. Semimetallum nec malleabile, nec in pulverem pistillo redigi patiens, diffractum strias vel laminas ostendens, ad cæruleum colorem paululum vergentes; fufum flamma cærulea ardet, in *Flores* albos abiturum. Flavore colore Cuprum tingit, in omnibus Acidis solubile. Obtinetur ex vario glebarum genere, terræ potius, quam mineræ formam habente. Larga ejus copia ex India Orientali mittitur, quædam Goslariæ paratur. *Nonnisi sub forma Mineræ aut Florum ad usus medicatos recipitur.*

ZINZIBER, *Zingiber, Gingembre, Ingber*. Radices tuberofæ, lobatæ, lobis varie figuratis, omnibus rotunde terminatis, intus ex rufo flavæ, extus flavescentes, odoris proprii, saporis insigniter acris & aromatici. Rubræ, quarumque superficiem terra tegit, a vermibus perforatæ rejiciendæ sunt. *A m o m u m Zingiber L. BLACKWELL Tab. 402.* Indiæ Orientalis, unde in Americam fuit delatum, ubi hodie copiose colitur. Apud nos in vaporario asservandum. Oleum odoratum fundere observatum est. Recentes quoque radices in India conditæ asservantur. *Piperis vires, sed mitiores edit: extus ad Apoplegmatisimos recipitur; cum successu Uvulæ a mucro tumentis applicatur; conditum egregie Ventriculo, a causa frigida laboranti, conducit.*



PHARMACOPOEA
GENERALIS

PARS II.



ACETUM.



cetorum genera, quæ in Officinis asservantur, parantur Vegetabilia exsiccata & comminuta octuplo circiter boni Aceti infundendo, & usus tempore tantum inde decantando, quantum in usum recipere lubet. Talium Acetorum vires ex viribus Aceti & Vegetabilium Aceto infusorum compositæ sunt. Ut plurimum extus, sive scopo Analeptico, Naribus admoventur, sive aliis usibus tanquam Fomentationes inserviunt; intus quoque quædam cochleatim exhibentur. Quidam etiam Acetum Vegetabilibus infusum destillare, & destillatum in usum trahere solent. Frequens, qui in Officinis obtinet, Acetorum numerus, ex quo morbi Maligni Exanthematici strages edere cœperunt, obtinuisse videtur. Simplicium Acetorum delectus a Medicis & ab usu recepto pendet.

ACETUM ANTISEPTICUM *Parif.*

vulgo *Vinaigre des quatre Voleurs.*

℞. Herbarum Absynthii Uncias tres,
Rorismarini,
Salviæ,
Menthæ,

Herbæ Rutæ ana Unciam unam semis,
 Florum Lavendulæ Uncias duas,
 Spicarum Allii Drachmas duas,
 Radicum Calami Aromatici,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatæ ana Drachmas duas:

Incisa probe misceantur & infundantur calore justo, in vase clauso per duodecim dies,

Aceti optimi centum octo & viginti Unciis.

Cum forti expressione colatis & filtratis addatur

Camphoræ Spiritu vini solutæ Semuncia.

Affervetur vase probe clauso.

In Peste Massiliensi hoc medicamentum scopo Prophylactico multum celebrabatur, partes corporis aëri expositas eo lavabant, ejus suffitu vestes imbuebant, & conclavia infumabant, intus quoque cochleatim illud assumebant.

ACETUM AROMATICUM *KLEIN.*

℞. Radicum Zedoariæ,
 Galangæ ana Semunciam,
 Herbarum Rorismarini,
 Rutæ,
 Mari veri,
 Florum Lavendulæ ana Drachmas duas,
 Corticum Citri recentium,
 Caryophyllorum Aromaticorum,
 Cubebæ,
 Cardamomi minoris ana Semunciam:
 Comminuta misceantur & immittantur
 Aceti optimi Unciis quadraginta
 Liliorum convallium,
 Tunicæ ana Unciis duabus:
 Afferventur in vase probe clauso.

*Tanquam Odoramentum adhibetur, & Refocillandi ergo Nari-
bus admovetur, Epithematibus Cordis & Pulsuum inspergitur.*

ACETUM BEZOARDICUM *Wirtenbergensium.*

℞. Radicum Angelicæ,
Enulæ,
Imperatoricæ,
Hirundinariæ,
Zedoariæ ana Drachmas sex,
Herbarum Scordii,
Rutæ,
Salviæ ana Unciam unam,
Baccarum Juniperi Unciam semis,
Corticum Citri Drachmas sex:

Minutim incisus affundantur

Aceti optimi Unciæ sex & triginta,

Post digestionem per aliquot dies exprimantur & filtratum
Acetum reponatur ad usum, in vitro probe clauso.

*In morbis Contagiosis, præcipue Peste, tam internum quam
externum hujus medicamenti usum ad Odoratum & Collutionem
oris commendant; ab Uncia dimidia ad integram propinatur.*

ACETUM CAMPHORATUM MAJUS *RICHARD.*

℞. Camphoræ Drachmam unam:
Teratur in mortario lapideo cum
Spiritus vini rectificati Guttis viginti,
Sacchari albi Unciis duabus,

Probe tritis affundantur

Aceti vini optimi Unciæ decem;

Mixta asserventur.

*Medicamenti Antiphlogistici eximii Uncia semis omni triho-
rio præscribitur.*

ACETUM CHALYBEATUM *FULLER.*

℞. Aceti optimi Uncias duodecim,
Limaturæ Chalybis Unciam unam:

Fiat infusio triduana frigida, dein coletur Liquor.
Adhibetur parando Oxymelli Chalybeato.

ACETUM COLCHICUM *STÆRCK.*

℞. Radicis Colchici recentis, Autumno collectæ & in taleolas
 tenues sectæ Uncias duas,
 Aceti optimi Uncias duodecim:
 Macerentur in lagenâ vitrea per quatuordecim dies, sæpius
 liquorem agitando; dein coletur levi expressione Acetum &
 fervetur ad conficiendum Oxymel.

ACETUM CONCENTRATUM *STAHL.*

Hyeme exponatur Acetum frigori glaciali in vase terreo am-
 pliori, relinquatur omnis portio in glaciem versa, quod reman-
 sit & ablata aqua admodum acre evasit, asservetur.

Ad Chemicos potius quam ad Clinicos usus adhibetur.

ACETUM CONCENTRATUM *WESTENDORF.*

℞. Crystallorum Sodæ, quantum volueris, cum Aceti destil-
 lati quantitate sufficiente saturetur; solutio saturata leni
 calore inspissetur, & committatur Retortæ vitreæ, cui ea
 sit amplitudo, ut dimidiam modo ejus partem materia oc-
 cupet; tunc sub perpetua retortæ commotione pedetentim
 instilletur Olei vitrioli ejus ponderis dimidium; applicetur
 celeri manu Excipulum ventricosum, rostro Retortæ vesica
 madida jungendum; leni multum igne instituaturn destilla-
 tio tam diu continuanda, quamdiu aliquid vaporis pro-
 dire oculi discernunt. Residuum iteratis solutionibus &
 filtrationibus depuratum Salem mirabilem Glauberi esse,
 facile patet.

*Acetum concentratum hac ratione paratum priore omnino for-
 tius, reliquis autem, quorum apud Chemicos mentio fit, multo
 & gratius & sincerius.*

*Evicit Clariss. WESTENDORF, hoc Acetum vires omnes
 Vulgaris multo efficacius edere, ob majorem qua gaudet penetrabi-*

litatem, quam ejus odor evidentissime evincit; imo in morbis Putridis etiam illi multum præferendum esse, quia Humoribus dissolutioni quoque medetur. Datur ad Drachmam unam multa aqua dilutum. Eximios effectus Analepticos edit, si Naribus admovetur.

ACETUM DESTILLATUM,
SPIRITUS ACETI Parisiensium.

Acetum immittatur five Retortæ vitreæ five Vesicæ æneæ, nullum enim contagium ab hoc Aceto surgere, evici in *Instit. Chem. Exper.* 55. ubi largior quantitas Aceti destillavit, crebrius liquor prodiens Naribus est examinandus, & quam primum odor empyreumaticus observatur ab ulteriori destillatione est desistendum. Primus, qui obtinetur, liquor, vulgo *Phlegma* dicitur & jubetur rejici; sed ego nunquam evidentiorum inter illum & reliquum differentiam potui observare. Residuum ab hac destillatione Tartarum largiri a Chemicis est annotatum.

Destillatione Acetum & Olei & Acidi portione privatur, hinc ejus vires imminuuntur omnino; adhibetur ad omnes morbos, ad quos Acetum commune laudatur.

ACETUM HYSTERICUM *LUDOVICI.*

℞. Spiritus florum Liliorum convallium Unciam unam,
Olei destillati florum Lavendulæ Drachmas duas,
Aceti Rutæ Unciam unam,
Essentiæ Castorei Drachmam unam.

Misceantur.

Infervit pro Odoramento vel Fotu Carporum & Temporum.

ACETUM ODORATUM *Wirtenbergensium.*

℞. Radicum Cyperi rotundi,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana Unciam semis,
Herbarum Rorismarini,
Salviæ,
Florum Lavendulæ,

Florum Liliorum Convallium recentium,
 Rosarum rubrarum,
 Ligni Rhodii,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum Aromaticorum,
 Corticum Citri recentium ana Drachmas duas:
 Incisis superfundantur
 Aceti optimi Unciæ quatuor & viginti.
 Post triduanam digestionem filtretur.
Usus ejus est externus pro Odoramentis & Epithematibus ad Pul-
sus, reficit atque spirituosus longe præferendum est.

ACETUM SATURNINUM *BASIL. VALENT.**DECOCTUM SATURNINUM KLEINII.*

℞. Lithargyrii subtiliter triti Uncias duodecim,
 Aceti optimi Uncias triginta & sex.
 Coquantur, lento igne, ad dimidiæ partis consumptionem,
 sub continua cum spatula lignea agitatione; liquor filtretur.
Ad Inflammationes, Ulcera maligna exsiccanda & Affluxum
Humorum prohibendum applicari solet, caute tamen adhibendum
est, ne usus ejus externus clanculum interne Phthisin inducat.

ACETUM SCILLITICUM *PYTHAGORÆ.*

℞. Radicis Scillæ preparatæ & minutim incisæ Uncias octo,
 Aceti optimi Uncias nonaginta sex.
 Digerantur leni calore per octiduum, forti expressione cole-
 tur Acetum & dein filtretur.
Hoc Medicamentum adhibetur in Pectoris Infarctu viscido expe-
diendo, Tussi difficili, Asthmate humido; gravitatem Auditus a
Pituita ortam Gargarisatione discutit, a Drachma una ad Unciam
dimidiam exhibeatur. Rarius per se præscribitur, maxime ad-
hibetur ad parandum Oxymel.

ÆRIS FLORES *BASIL. VALENT.*

℞. Viridis Æris, quantum volueris.

Pulverifatum dissolvatur in sextuplo Aceti destillati, dissolutum filtretur, ad cuticulam evaporetur, & reponatur ut in Crystallos concreseat.

Rarus est hujus præparati in Medicina usus, a Pictoribus & Mechanicis frequentius expetitur, usus ejus internus ab HELVETIO juniore aliisque contra Luem præsertim veneream impense commendatus merito penitus rejicitur.

ÆS USTUM *GALENI.*

Æris laminæ stratificentur five cum Sale marino, five cum Sulphure, five, præcipiente *Oribasio*, cum utroque; detineantur in igne fatis valido per duodecim circiter horas, five usque dum laminæ totæ friabiles fiant, quæ deinde in pulverem redigendæ sunt; qui rufescit, si Sal communis fuerit adhibitus, nigrescit autem, si Sulphur receptum fuerit.

Usus externus est in Exsiccandis præsertim Ulceribus; medicamentum evidenter Septicum raro hodie usurpatur.

ÆTHER VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

ÆTHIOPS ANTIMONIALIS *ELLER.*

℞. Antimonii in pollinem triti Partes duas,
Mercurij revificati Partem unam:

Terantur in mortario, quod æneum non sit, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Ad Depurandum Sanguinem plurimum valet.

ÆTHIOPS MARTIALIS *LEMERY.*

Limatura Martis committitur vasi five vitreo five porcellaneo, superfunditur ipsi Aqua, quæ quatuor digitis transversis

super eam emineat, quotidie spatula ferrea agitur, & quando aquæ volumen imminutum observatur, tunc denuo aqua affundenda, ut Ferrum semper illo aquæ volumine tectum sit, quod sub initium laboris erat adhibitum; post elapsam longius temporis intervallum omnem splendorem amittet Limatura & in pulverem nigrum redacta erit, qui exsiccat & supra Porphyritem lævigatus asservari debet.

Magno hic labore obtinetur Ferrum in tenerrimum pulverem redactum, & omnis rubiginis expers; idem medicamentum acquirimus, quando Limaturam Martis supra Porphyritem in pollinem reducimus, eidem deinde aliquot Olei guttas aspergimus & in Crucibulo ignito Oleum deflagrare facimus, hac ratione redditur Ferro principium inflammabile, quod sub Præparatione perdiderat, & pulverem nigerrimum sistit.

Ubi Tónico & Aperiente scopo Ferrum adhibere volumus, Æthiops Martialis omnibus reliquis præparatis palmam omnino præripit. Datur ad Scrupulum unum pro dosi.

ÆTHIOPS MINERALIS MAYERNE.

℞. Argenti vivi revificati Partes duas,
 Florum Sulphuris Partem unam,
 Terantur in mortario lapideo, usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Eximie huic Pulveri Sulphurato Mercuriali adscribuntur vires in Tumoribus Glandularum Colli, Exulcerationibus antiquis Fistulosis, Scabie sicca, Febre quartana, & ubi Vermium suspicio est; infanti tenero ad Grana tria vel quinque, adultiori ad Scrupulum dimidium datur & per plures dies absque metu Salivationis ejus usus continuari potest.

AGARICUS PRÆPARATUS BROSSARD.

Agaricus Quercus a cortice externo & substantia fistulosa separatus & discissus malleo subjiciatur, usque dum ita mollescat, ut in frusta tenuia discerpi queat.

Historiam

Historiam hujus Medicamenti in Inst. Mater. Med. p. 425. dedi & monui, quod illi Fomes vulgaris nullo Lixivio salino imbutus substitui possit.

ALCAHEST GLAUBERI.

Videatur Nitrum Fixum.

ALOES DEPURATA, LOTA GALENI.

EXTRACTUM ALOES AQUOSUM.

Aloës Succotrinæ, q. v. digeratur cum aquæ frigidæ duodecuplo per aliquot dies, liquor decantatus & colatus leni calore in consistentiam Extracti evaporetur.

Si loco aquæ Succum Florum Cordialium recipiuntur, furgit ALOES INSUCCATA, si Infusum Florum Rosarum, ALOES ROSATA, cum Infuso autem Florum Violarum ALOES VIOLATA.

Hoc Medicamentum longe securius, promptius & minori quantitate sumtum Alvum laxat quam integra Aloës, qua quoque præstat, quia liberatum est à resinosa substantia, Hæmorrhoidaliu[m] motuum sæpius causa, qui frequentiore[m] Aloëtico[rum] usum sequuntur. Grana octo sufficiunt pro Alvo stimulanda, pro Laxanda vero vel drachma semis dari potest. Aloës Insuccata, Rosata, Violata jure eviluerunt.

ALUMEN SACCHARINUM BRASSAVOLE.

℞. Aluminis crudi Uncias sex,
Cerussæ Venetæ Drachmas sex,
Vitrioli albi Drachmas tres,
Sacchari albissimi Uneiam unam semis,

Fiat omnium pulvis subtilissimus, qui Albumine ovorum in pastam reducatur, unde parvi coni efformentur, qui exsiccati charta cœrulea obvolvantur.

Usus præcipuus est in Collyriis & Cosmeticis, Detergit & Carnem luxuriantem aufert.

10 ALUMEN. ANTIHECTICUM. ANTIMONIUM.

ALUMEN TINCTUM *MYNSICHTI*,

correctum ab *HELVETIO*.

℞. Aluminis rupei Uncias duas:

Fundantur in vase ferreo & adjiciatur

Pulveris Sanguinis Draconis Uncia una:

Ex massa femi refrigerata formentur celeri manu Pilulæ exiguæ.

In sistendis Hæmorrhagiis eximias vires magni Viri inde experti sunt. Dosis interdum ad dimidiam drachmam usque extenditur.

ALUMEN USTUM *DIOSCORIDIS*.

Alumen vasi terreo amplo immissum committitur fornaci Figuli, dum vasa argillacea coquuntur. Omni aqua crystallisationis hoc modo privatum, in massam levem, spongiosam, friabilem abit.

Ad Dentifricia & Carnem luxuriantem absumendam adhibetur; sed prior usus neutiquam commendandus esse videtur.

ANTIHECTICUM *POTERII*, BEZOARDICUM
feu DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli Antimonii Uncias sex,

Stanni Anglici uncias duas:

Fundantur in Crucibulo, fluentibus adjiciantur per vices

Nitri puri Unciæ quatuor & viginti:

Edulcoretur Calx cum Aquæ quantitate sufficiente.

Olim ad moderandos Hecticorum sudores adhibebatur. Datur ad drachmam semis.

ANTIMONII BUTYRUM, CAUSTICUM ANTIMONIALE
& CINNABARIS *BASILII VALENTINI*.

℞. Mercurii sublimati Uncias quindecim,

Antimonii crudi Uncias sex.

Probe conterantur per plures horas, immittantur dein Retortæ, quæ elapsis aliquot diebus Balneo arenæ committatur,

subministratur calor, prodibit in præpositum Retortæ Excipulum liquor spissior, quem BUTYRUM ANTIMONII appellant, hic cum omnis prodierit, intendatur ignis ad summum usque & sustineatur per aliquot horas; ex refrigerata dein Retorta aufertur CINNABARIS, quæ hac ratione surrexit, illa in pulverem redacta denuo ex Cucurbita sublimetur.

Butyrum a Chirurgis loco Cauterii adhibetur. Cinnabari specifica virtus Antiepileptica & Antispasmodica adscribitur, maxime ab HOFFMANNO Diss. de Cinnabare Antimonii; à vulgari factitia plane non differre ostendi Instit. Chem. Experim. 83. Dosis ad Scrupulum unum extenditur.

ANTIMONII CLYSSUS GLAUBERI.

℞. Nitri Uncias viginti quatuor,
Antimonii Uncias duodecim,
Sulphuris Uncias tres:

Probe misceantur & pulverifentur, eorum Drachmæ circiter duæ ingerantur Retortæ ferreæ tubulatæ in igne aperto candenti, & cui ope Argillæ Excipulum peramplum sit junctum; pulvere ingesto, statim operculum orificio tubi exactissime applicandum est, nec nova portio ingerenda, antequam detonatio tota cessaverit, liquor ex vaporibus sub qualibet detonatione in Excipulum prorumpentibus surrectus asservetur.

In Siti & Calore nimis extinguis laudatur, in Febribus etiam malignis, loco Spiritus Vitrioli, potui ordinario & Julapiis additur. Medicamento minus grato, & quod nequam tanquam purum acidum considerari potest, prudenter hodie Spiritus Vitrioli substituitur.

ANTIMONII HEPAR.

Videatur Crocus Metallorum.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.

PULVIS ANTIMONII ALBUS *BASIL. VALENTINI.*

CALX ANTIMONII LOTA *Suecorum.*

℞. Antimonii crudi partem unam,

Nitri depurati partes duas.

Exacte mixta immittantur per vices Crucibulo candenti, ea lege, ut qualibet vice nonnisi Drachmæ circiter duæ detonent, omnis materies ubi detonavit, spatula ferrea agitetur, & immittatur aquæ; hæc inde defundatur, & nova affundatur usque dum pulvis albus plane fuerit edulcoratus, qui exsiccatu affervetur.

Aqua ad edulcorationem adhibita iusta ratione in cryсталlos coacta *Salem Polychrestum* largitur. Aquæ, in qua candens Antimonium Diaphoreticum fuit extinctum, si adjicitur Acetum, secedit ad fundum pulvis albus, quem MATERIAM PERLATAM KRUGNERI appellare solent. Si tres Nitri partes ad unam Antimonii fuerint receptæ, ex aqua ad edulcorationem adhibita recuperatur Nitrum, quod sub labore non destructum fuit, illud NITRUM ANTIMONIATUM, NITRUM ANODYNUM, ANODYNUM MINERALE appellant.

Antimonio Diaphoretico adscribuntur vires Absorbentes, Alexipharmacæ, Diapnoicæ, Sanguinem depurantes, datur a Granis quindecim ad Drachmam dimidiam in Febribus cujuscunque generis, Conf. Instit. Chem. Exper. 93. NITRUM ANTIMONIATUM omnino Calcem Antimonii vehit; observat Vener. TRILLER illud frequentiori in usu HOFFMANNO fuisse. Fateor me semper malle Nitrum depuratum, quam Antimoniatum, ex quo vel solum Acidum Vegetabile rodentem spiritum expellit, exhibere.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

Antimonium crudum lævigetur supra Porphyritem, immittatur tunc vitro cylindræo, ipsi larga aquæ quantitas adjicitur & cum ea probe agitetur, aqua turbata decantetur, cum residuo pulvere nova Aqua eadem ratione tractetur, pollen in aquis decantatis subsidens, exsiccatum affervetur.

Hac elutriatione & tenerrimum & ab omnibus partibus heterogeneis liberum Antimonium obtinetur.

ANTIQUARTIUM RIVERII.

Videatur Panacea Mercurialis.

APOZEMATA *vide* DECOCTA.

AQUÆ DESTILLATÆ SIMPLICES.

Parantur, dum Vegetabili qualicunque comminuto & Vesicæ immisso adfunditur Aqua ad eminentiam aliquot digitorum, & inde duo trientes destillantur. Circa has Aquas sequentia notanda sunt:

- 1) Minus bene a corporibus inodoris Aqua destillatur, licet enim illa quasdam inde recipiat mucilaginosas aut gelatinosas partes, tamen hæc adeo parvæ sunt, ut nequaquam aliquem effectum edere queant; aqua nil inde acquirit præter saporem & odorem minus gratum, qui autem inde, dum Aëri exponuntur in vasis apertis, mitescunt.
- 2) Vegetabilia, quorum odor exsiccatione perit, omnino recentia debent adhiberi.
- 3) Optimum est in Officinis eas præcipue Aquas simplices destillatas asservari, quæ sub destillatione Oleorum prodierunt; aut a Floribus odoratis, quamvis nullum Oleum largientibus, obtinendas, sed hi semper recentissimi adhibendi sunt.
- 4) Ex tempore quævis Aqua destillata efficax parari potest, quando Aquæ communis destillatæ Unciis duodecim adjicitur Uncia dimidia Spiritus vini, in quo tres vel quatuor Gutte destillati Olei, cujus odorem Aqua habere debet, fuerint dissolutæ.
- 5) Si loco Aquæ, Vinum à Vegetabilibus abstrahitur, liquor AQUA VINOSA dicitur, hic & 4. locum quoque habet, si loco dimidiæ Unciæ Spiritus Vini ejus Unciæ duæ recipiuntur.

AQUA ABSYNTHII COMPOSITA *Edinburg. prior. edit.*

℞. Radicum Calami Aromatici,
Galangæ,
Zedoariæ ana Uncias duas,
Corticum recentium Aurantiorum,
Cinnamomi ana Uncias quatuor,

Herbarum Absynthii vulgaris Uncias sex,
 Menthæ,
 Salviæ ana Uncias duas,
 Cardamomi minoris,
 Nucis Moschatæ ana Unciam unam,
 Macis Unciam femis:

Incisus & contusis affundantur

Spiritus vini trecentæ quinquaginta sex Unciæ:
 Instituatur secundum artem Destillatio.

Minus bene hoc medicamentum Aqua dicitur, cum Spiritibus omnino accensendum sit, nec ab Absynthio debuisset denominari; reliqua enim ingredientia æque ac Absynthium ad ejus efficaciam faciunt. Egregium Stomachicum esse dicitur in Anorexia, Nausea, Vomitu, Bradypepsia, & aliis supini Ventriculi affectibus languidis; egregium etiam Anticolicum & Carminativum esse, imprimis si à causa frigida Colica flatulenta nata fuerit; neque minus foeminis Hystericis prodesse, in pacandis rebellis Uteri turbis, item pallentibus ex Chlorosi puellis, insignem quoque usum Anthelminticum præstare, commode tandem ad morbos serosos, Hydropem, Febres intermittentes, maxime Quartanam posse adhiberi. Dari potest parvum cochlear in vehiculo aquoso.

AQUA ACUSTICA LUDOVICI.

℞. Radicum Levistici,
 Valerianæ,
 Herbæ Rorismarini,
 Florum Lavendulæ ana Unciam femis,
 Baccarum Lauri,
 Castorei,
 Camphoræ ana Drachmas duas,
 Spiritus Juniperi Uncias duodecim:

Incisa, contusa macerentur per quatrimum, tunc addantur

Spiritus Salis Ammoniaci Uncia femis,
 Olei Juniperi Drachma femis:

Omnia probe mixta asserventur usui.

Hujus Spiritus una aut altera gutta Goffypio excepta immittitur Auri, cujus Meatus auditorius obstructus aut Tympanum relaxatum est.

AQUA ALEXITERIA *Londinensium.*

℞. Foliorum Menthæ recentium Uncias duas cum dimidia,
Summitatum Absynthii Pontici recentium,
Radicum Angelicæ recentium ana Uncias duas,
Aquæ uncias septuaginta.

Fiat secundum artem Destillatio.

Pro SPIRITUOSA addantur ante Destillationem

Spiritus vini Unciæ triginta cum duabus.

SPIRITUOSÆ Unciis sedecim si adjiciuntur

Aceti Unciæ duæ,

Surgit AQUA ALEXITERIA SPIRITUOSA cum ACETO.

Scopo Alexipharmaco & Sudorifero hæ Aquæ cochleatim exhibentur.

AQUA ALUMINOSA *FALLOPII.*

℞. Aquarum destillatarum Rosarum,
Scordii ana Uncias duodecim,

Aluminis crudi,
Mercurii sublimati ana Drachmas duas.

Dissolutis per ebullitionem Salibus, filtretur liquor.

Ad Ulcera Cacoëthea & Venerea mundanda adhibetur.

AQUA ALUMINOSA *Parif.*

℞. Aquarum destillatarum Rosarum,
Plantaginis ana Uncias viginti quatuor,

Aluminis Drachmas tres.

Misceantur.

Ad Sanguinem sistendum extus adhibetur.

AQUA ANHALTINA SCHRÆDERI.

- ℞. Ligni Aloës Drachmas tres,
 Croci Orientalis Drachmas duas cum dimidia,
 Caryophyllorum Aromaticorum,
 Nucis Moschatae,
 Cubeborum,
 Cinnamomi ana Drachmas sex,
 Baccarum Lauri,
 Seminis Fœniculi ana Unciam semis,
 Olibani electi Unciam unam:

Incisa, contusa infundantur per aliquot dies, cum
 Spiritus Vini Unciis sexaginta.

Addantur

Terebinthinæ Unciæ sex.

Instituatur Destillatio, Oleo ablato servetur liquor, in quo suspendantur, si placet

Moschi in petia ligati Grana quindecim.

Vulgo huic medicamento insignes adscribuntur vires in Ventriculo roborando, Colica flatulenta & Urina pellenda; sed caute adhibendum est, ne Sanguis inde nimis commoveatur; Externus usus frequentior est, cum Ventriculo applicatum Vomitum sistat, & ad roboranda membra Paralyti debilitata valere, sit observatum. Terebinthinæ Oleum, quo hoc medicamentum scatet, ejus usum internum nimis exæstantem, externum vero nauseosum reddit.

AQUA ANODYNA Prägensium correcta.

- ℞. Spiritus Salis Ammoniaci vinosi Uncias sex,
 Essentiæ Croci Unciam unam,
 Olei destillati Lavendulæ Drachmam semis.

In doloribus Arthriticis & Rheumaticis aliisque ex stagnantibus humoribus viscidis acribusque obortis commodum usum Paregoricum & Anodynum præstare refert & asseverat TRILLERUS; ad-
dens

dens, Dolores externos vel acerrimos inde consopitos fuisse, se aliquoties expertum, lætum adhuc recordari.

AQUA APOPLECTICA LANGII correcta.

℞. Radicum Calami aromatici,
 Ireos,
 Aristolochiæ rotundæ ana Unciam unam semis,
 Herbarum Majoranæ,
 Chamæpityos,
 Rorismarini,
 Florum Primulæ Veris ana Manipulum unum,
 Seminis Sileris montani,
 Fœniculi ana Drachmam unam semis,
 Cubebæ,
 Nucis Moschatæ,
 Caryophyllorum ana Drachmas tres.
 Cinnamomi,
 Ligni Aloës ana Drachmas duas,
 Piperis longi,
 Sagapeni,
 Opoponacis,
 Myrrhæ,
 Gummi Juniperi ana Drachmam unam semis,
 Aquarum florum Paralyseos,
 Tiliæ,
 Salviæ ana Uncias octodecim.

Incisa, contusa stent in Infusione per dies octo, postea Destillentur.

Laudatur ad Prophylaxin Apoplexiæ & curandas Paralytes, in eo certe reliquis Aquis apoplecticis præferenda, quod, cum spirituosa non sit, Sanguinem minus commoveat, minusque adeo morbum, cui arcendo destinatur, provocet. Datur per Cochlearia.

AQUA AROMATICA *Danica.*

℞. Herbæ Menthæ Piperitidis Uncias tres,
 Cinnamomi Uncias duas,
 Flavedinis Corticum Citri Unciam unam,
 Macis Semunciam,
 Seminis Angelicæ Unciam unam,
 Spiritus Vini centum quadraginta quatuor Uncias.
 Infiltuatur Destillatio.

Spiritus hic Aromaticus in Debilitate Primarum viarum exhiberi poterit. Dosis est parvum Cochlear.

AQUA ASTHMATICA *Augustanorum* correctâ à *KLEINIO.*

℞. Radicum Enulæ Uncias duas,
 Ireos Florentinæ Unciam unam cum dimidia,
 Herbarum Hyssopi,
 Rorismarini,
 Mari veri ana Unciam unam,
 Seminum Anisi,
 Fœniculi,
 Cinnamomi ana Unciam semis,
 Cardamomi minoris Drachmas duas,
 Croci Scrupulos duos,
 Spiritus Vini Uncias duodecim,
 Aquæ Hyssopi cohobatae Uncias viginti quatuor.
 Digesta per triduum Destillentur.

Ad Asthma serosum & pituitosum laudatur, senibus maxime commendatur. Datur per Cochlearia.

AQUA BALSAMI EMBRYONUM *Augustanorum* correctâ,
 à *Pharmacopœa Austriaco-Provinciali.*

℞. Radicum Pœoniæ,
 Zedoariæ,
 Zinziberis ana Uncias duas,
 Galangæ Drachmas sex,

Herbarum *Salviæ*,
Melissæ,
Fœniculi,
Menthæ ana *Uncias tres*,
 Florum *Tunicæ*,
Tiliæ ana *Uncias sex*,
Lavendulæ,
Nucis Moschatae ana *Uncias tres*,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Cubebæ,
Granorum Paradisi,
Macis ana *Uncias duas*:

Incisa, contusa infundantur per aliquot dies cum

Spiritus Vini *Unciis quadraginta quatuor*,

Aquæ fontanæ *Unciis ducentis quadraginta*.

Dehinc Destillentur inde *Liquoris Unciæ centum nonaginta duæ*.

Pessime hæc Aqua contra Abortum exhibetur, quippe quem, cum Sanguinem commoveat, promovere potius, quam arcere valebit; scopo Carminativo potius, monentibus TRILLERO & SCHULTZ, ad duo Cochlearia pro dosi datur; extus quoque cum crusta panis calida Abdomini imponitur.

AQUA BENEDICTA *RULANDI*, VINUM ANTIMONIA-
 TUM *HUXHAMI*, ESSENTIA ANTIMONII
Ejusdem, VINUM EMETICUM *vulgo*.

℞. *Vitri Antimonii* *Uncia una*.

Redigatur in pulverem, infundatur frigide per duodecim dies cum *Vini Hispanici* aut *Maderaici* *Unciis viginti quatuor*, agitentur aliquoties de die; *Liquor clarus* filtretur *charta bibula*.

Illustris HUXHAM hoc Præparatum antimoniale reliquis omnibus antepont; ejus Unciam unam aut duas valide Vomitum movere, Drachmas duas aut tres lenem modo Vomitum, subinde

unamque ac alteram Alvi dejectionem, quoque Sudorem excitare, a triginta ad sexaginta vel octoginta Guttulas datum Alterare, Diaphoresin & omnes Se- & Excretiones promovere observat.

AQUA CALCIS.

Calcis vivæ uni parti
affundantur gradatim

Aquæ fontanæ partes decem :

Finita ebullitione, Aqua cum Calce probe agitetur, charta filtretur & in vitro probe clauso asservetur.

Hujus Medicamenti usus plerumque externus est ad Inflammationes, Ambusta, Ulcera & id genus affectiones. Interne in frigidis morbis, Chronicis inprimis, Unciæ quatuor bis de die propinantur, scopo Siccandi & Detergendi: egregias ipsi virtutes Diaphoreticas, Nephriticas, Anthelminticas & potissimum Lithonripticas tribuunt ALSTON in singulari Dissertatione, quem strenue sequitur ROBERTUS WHYTT in propria Dissertatione & alii egregii Medici.

AQUA CALCIS COMPOSITA Londinensium.

℞. Ligni Quajaci Uncias sex,
Corticis Ligni Sassafras Unciam semis,
Radici Liquiritiæ Unciam unam,
Seminis Coriandri Drachmas tres.

Incisa macerentur per biduum cum

Aquæ Calcis vivæ Unciis duabus & septuaginta: colentur.

Ad Acrimonias varias humorum corrigendas adhibetur. Aliquot Cyathi bibantur de die.

AQUA CAPONIS FLORENTINORUM correcta.

Capo evisceratus in frustra dissectus coquatur leni igne cum Aqua, usque dum caro ossa relinquat; Unciis duodecim hujus jusculi, ablata ante omni supernatante pinguedine adjiciantur.

Aquarum Rosarum Unciæ duodecim,
Cinnamomi Unciæ duæ.

Misceantur.

Potentiores sane hæc Aqua vires Analepticas edet, quam Aquæ Caponis destillatæ, quales vulgo in Dispensatoriis præscribuntur. Si quos odor Aquæ Rosarum offenderit, Aquam Rubi Idæi aut aliam odoratam recipiant.

AQUA CARBUNCULI SCHROEDERI correcta.

℞. Herbarum Majoranæ,
Salviæ ana Unciam unam semis,
Rorismarini Unciam unam,
Florum Lavendulæ Uncias quatuor,
Liliorum Convallium,
Rosarum,
Cinnamomi,
Cardamomi minoris ana Unciam unam,
Nucis Moschatæ,
Macis,
Caryophyllorum ana Unciam semis,
Zinziberis,
Galangæ,
Baccarum Juniperi ana Drachmas tres,
Spiritus Vini rectificati Uncias duodecim,
Aquarum Rubi Idæi,
Lavendulæ ana Uncias triginta sex:

Incisa & contusa Infundantur per octiduum; deinde Destillentur ad dimidias. Liquori destillato commisceantur quædam folia Auri.

Extus ad Epithemata Cordis & Pulsuum adhibetur; ad Fœtum roborandum gravidarum Abdomini cum Aqua Balsami Embryonum imponitur. Nomen inde habere dicitur, quod Carbunculos & Bubones Pestilenciales expellat, & retrocessionem eorum inhibeat. Cum Sanguinem exæstuantia in Peste quoque perniciose esse hodie evictum sit, internus hujus Aquæ usus evilit.

AQUA CARMELITARUM, MELISSÆ COMPOSITA
LEMERY correctâ.

- ℞. Summitatum Melissæ recentis Uncias duodecim,
 Flavedinis recentis Corticum Citri Uncias duas,
 Nucum Moschatarum Unciam unam,
 Seminis Coriandri Uncias quatuor,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cinnamomi ana Unciam unam,
 Radicum Angelicæ Unciam semis,
 Spiritus Vini rectificati Uncias sexaginta quatuor.

Incisa, contusa Infundantur per aliquot dies, dein Destillantur leni calore octo & quadraginta Unciæ.

Ejus dosis si quidem intus Roborandi scopo datur, nunquam ultra parvum Cochlear debet extendi; Cephalicæ inde, Analepticæ & Roborantes vires expectantur, sed crebrius externe scopo Excitandi, Roborandi, Discutiendi adhibetur.

AQUA CARMINATIVA *DORNKRELLII.*

- ℞. Florum Chamomillæ Romanæ Uncias octodecim.
 Infundantur in
 Aquæ Chamomillæ Unciis centum quadraginta
 per octiduum; exprimantur forti expressione; Liquori expresso
 addantur:
- Herbarum Absynthii Pontici,
 - Pulegii,
 - Origani,
 - Summitatum Centaurei minoris ana Drachmæ duæ,
 - Seminis Anethi Unciæ duæ,
 - Anifi,
 - Fœniculi ana Uncia una,
 - Carvi Uncia semis,
 - Baccarum Juniperi,
 - Lauri,
 - Calami Aromatici,

Zedoariæ ana Drachmæ duæ,
Cinnamomi Uncia semis.

Incisa & contusa Infundantur in Spiritus Vini centum nonaginta & duabus Unciis; instituaturn Destillatio.

AQUA CARMINATIVA *Regis Borussiæ FRIDERICI I.*

℞. Flavedinis Aurantium Chinenfium recentium,
Citri recentis ana Uncias duas,
Salis Tartari Drachmam unam.

Infundantur cum

Vini Tokaviensis Unciis viginti quatuor
per aliquot dies, deinde Destilletur Spiritus, qui Edulcoretur
Julepi Rosarum. Uncia una.

AQUA CARMINATIVA VULGARIS *Austriacorum.*

℞. Herbarum Absynthii Pontici,
Menthæ crispæ,
Pulegii,
Origani ana Unciam unam semis,
Florum Chamomillæ Romanæ Uncias duodecim,
Corticum Aurantium,
Citri,
Seminum Coriandri,
Carvi ana Unciam unam semis,
Anethi Uncias duas,
Anifi,
Fœniculi ana Unciam unam:

Incisa & contusa Infundantur per duodecim horas in Aquæ fontanæ Unciis centum nonaginta & duabus. Abstrahatur inde medietas.

Harum Aquarum vires nomine patent, cavendum ne Spiritus in Colicis sanguineis exhibeantur; Austriaca per Cyathos hauriri potest.

AQUA CONTRA CARIEM *PLENCK.*

℞. Aquæ Calcis vivæ Uncias duas,
Mercurii in pari sui ponderis parte Aquæ fortis dissoluti
Drachmam unam.

Misceantur.

*Vires ex nomine patent, adhibetur teste Cl. PLENCK etiam
contra Ulcera Phagadenica.*

AQUA CATAPULTARUM.

Videatur Aqua Vulneraria.

AQUA CINNAMOMI CYDONIATA *Hamburgensium.*

℞. Cinnamomi Uncias quatuor.

Infundantur per triduum cum

Succî Cydoniorum Unciis octo & quadraginta.

Abstrahantur Liquoris Unciæ triginta sex.

Si loco Cydoniorum recipitur Aqua Florum Buglossi, surgit
AQUA CINNAMOMI BUGLOSSATA *MYNSICHTI*; si fumuntur Aquæ quatuor Cordiales, Liquor prolectus dicitur
AQUA CINNAMOMI CORDIALIS *Recent.* cum Decocto Hordei obtinetur
AQUA CINNAMOMI HORDEATA *Pharm. Bat.* cum Aqua Ceraforum nigrorum
AQUA CINNAMOMI SINE VINO *Leidens.* cum Aqua fontana
AQUA CINNAMOMI SIMPLEX *Londinens. & Danorum, Vulgaris Austriacorum.*

AQUA CINNAMOMI cum VINO *Coloniensium.*

℞. Cinnamomi crassiuscule contusi Uncias sex,

Vini generosi Uncias octodecim.

Post Digestionem aliquot dierum instituatur Destillatio, quam diu Liquor lactei coloris prodit.

Hæ Aquæ propter gratum præcipue saporem commendabiles, Analepticæ & Stomachicæ sunt, ideo in morbis à causa præsertim frigida oriundis & Debilitatem corporis inducentibus nec non ad fractas Vires erigendas commode exhibentur.

AQUA

AQUA COLONIENSIS.

℞. Spirituum Vini rectificati Uncias septuaginta & duas,
 Rorismarini Uncias octodecim,
 Aquæ Carmelitarum Uncias duodecim,
 Oleorum Bergamotti Unciam unam,
 Citri drachmas duas,
 Neroli,
 Rorismarini ana Drachmam unam,

Probe mixta Destillentur.

Convenit ratione virium cum Aqua Carmelitarum.

AQUA CONFORTATIVA sive PERLATA *Augustanorum.*

℞. Aquarum Ceraforum Uncias novem,
 Tiliæ Uncias tres,
 Cinnamomi Vinosæ Drachmas sex,
 Margaritarum Occidentalium præparatarum Scrupulum
 unum,
 Coralliorum alborum præparatorum Drachmam semis,
 Cornu Cervi usti præparati Scrupulos duos,
 Julepi Rosati sesqui Unciam.

Misceantur.

Infantibus & aliis, qui medicamenta reformidant, solet offerri ab Uncia dimidia ad integram. Julepus demum usus tempore debet adjici.

AQUA CORNU CERVI CITRATA *WALDSCHMIDII*
correcta.

℞. Rasuræ Cornu Cervi Uncias sex,
 Pomorum Citri cum corticibus incisorum Numero quatuor.
 Coquantur cum Aquæ fontanæ Unciis quatuor & quadraginta.
 ad remanentiam quatuor & viginti, filtratis addantur
 Aquarum Rosarum,
 Melissæ,
 Scordii ana Unciæ octodecim.
Analeptica & Alexipharmaca prædicatur.

AQUA DIVINA MIRABILIS *Parisiensium*
correcta à *BEAUMÉ*.

- ℞. Spiritus Vini rectificati Uncias sexaginta & quatuor,
Quintarum Effentiarum Citri,
Bergamotti ana Drachmam unam,
Aquæ Florum Aurantium Uncias octo:
Destilletur Spiritus & probe misceatur cum
Sacchari Unciis triginta & duabus, dissolutis in
Aquæ Unciis centum viginti & octo.
Filtretur per chartam emporeticam.

Aquæ Divinæ denominatio multum ambigui habet, ipsam Phagedænicam quoque hoc nomine comprehendunt, nostra verum Claretum est, quod virtutem Analepticam, Cordiacam, Stomachicam, Carminativam habet. Datur ad Uncias duas.

AQUA EPILEPTICA *LANGII*.

- ℞. Florum Recentium Liliorum Convallium Uncias sex,
Lavendulæ Unciam unam,
Rorismarini,
Stoechadis Arabicæ ana Unciam femis,
Cinnamomi Drachmas sex,
Nucum Moschatarum Unciam femis,
Piperis longi,
Cubearum ana Drachmas duas,
Visci Querni,
Radicum Pæoniæ,
Fraxinellæ ana Unciam femis,
Macerata in Vini generosi Libris octo per triduum, Destillentur
ad dimidias.

Ad Epilepsiam, Vertiginem & Apoplexiam tum arcendas quam pellendas, in ipso paroxysmo, vulgo commendari solet. Quid vero in his morbis hæc Aqua, quippe Aromatica, efficere possit, dijudicatu proclive est.

AQUA FLORUM OMNIUM *Batean.*AQUA FIMI *FULLER.*

℞. Stercoris Vaccini Uncias quinquaginta.

Includantur sacco linteo, qui committatur Vesicæ centum quinquaginta libras Aquæ continenti, Destillatione eliciantur Aquæ Unciæ septuaginta quinque.

Ad Arthritidem, Colicam, Calculum & Urinæ suppressionem laudatur, externe inter Cosmetica numeratur, sed sub hoc florido omnium Florum velamento nihil nisi fatuam fatuorum Aquam latere prudenter monet Ven. TRILLER. Ipsa Vaccarum urina aliquando sub titulo Eau de Millefleurs maximis encomiis celebrabatur.

AQUA FOETIDA *Pragensium.*

℞. Radicum Pœoniæ Unciam semis,
 Dictamni albi Drachmas duas,
 Levistici Unciam semis,
 Zedoariæ Drachmas tres,
 Herbarum Matricariæ,
 Artemisiæ,
 Menthæ ana Manipulum unum,
 Rutæ Manipulos duos,
 Florum Chamomillæ,
 Sambuci,
 Anthos,
 Liliorum Convallium,
 Primulæ veris ana Pugillos duos,
 Seminum Pœoniæ,
 Sileris Montani ana Unciam semis,
 Cinnamomi Drachmas tres,
 Galangæ minoris Uncias tres,
 Cubearum,
 Macis ana Drachmas duas,
 Galbani,

Asæ foetidæ ana Uncias tres,
 Myrrhæ electæ Unciam semis,
 Castorei Moscovitici Uncias duas:

Incisa grosso modo & contusa infundantur in
 Vini albi generosi Unciis centum & viginti,
 Aquæ Matricariæ Unciis viginti quatuor:
 Destillentur lege artis.

TRILLERUS Aquam hanc eximii plane usus esse affirmat in affectibus Hysteriis & quibuscunque similibus, passim tam inquam externe adhiberi ad avertendos aut interrumpendos paroxysmos, conducere etiam in aliis affectibus Tormentos, Colicis ac Flatulentis a Stomacho vel Digestionis vitiis oriundis. Ad semicochlear & ultra propina.

AQUA FORTIS GEBERI.

℞. Nitri depurati Libras tres,

Vitrioli viridis calcinati Libram unam:

In pulverem redacta probe misceantur & Destillentur ex Retorta terrea feu vitrea loricata in excipulum, cui prius Aquæ Libra una semis fuerit immissa.

Nunquam in usus medicatos recipitur; sed aliorum Medicamentorum præparationi inservit.

Pharmacopœa a propriis, quos Laboranten vocant, artificibus fere sibi comparant Aquam fortem. Quæ vero cum & Vitriolico & Salis communis Acido vulgo sit contaminata, instillanda ei est solutio Argenti usque dum amplius non turbetur. Dicitur tunc Aqua fortis Præcipitata & est Acidum Nitri purissimum.

AQUA FORTIS MERCURIALIS PLENCKII.

Videatur Aqua contra Cariem.

AQUA ad GINGIVAS *Parisiensium* correctæ.

℞. Aluminis Rupei Unciam semis,
 Dissolvatur in

Aquæ ebullientis Unciis triginta :

Refrigeratæ solutioni addantur

Oleorum destillatorum Cinnamomi Guttæ sex,
Caryophyllorum Guttæ duæ;

Quintæ Essentiæ Citri Guttæ decem :

Dissolutæ in

Spiritus Vini rectificati Unciis sex,
Aquæ Florum Aurantiorum Uncia una

Filtrentur.

Gingivæ Roborandi ergo hac Aqua colluuntur.

AQUA GRYSEA *G O H L I I.*

℞. Mercurii vivi,

Aquæ Fortis ana Unciam unam :

Dissolutis affundantur

Radiciſ Chelidoniæ majoris Uncia ſemis,

Herbarum Ejusdem,

Solani,

Ariſtolochiæ,

Florum Roſarum pallidarum ana Manipulis unus,

Cum Aqua Unciis centum & viginti ad remanentiam Unciarum nonaginta & ſex decoctæ & colatæ.

Hanc Aquam ad Ulcera Phagedenica & Synoviam curandam facere obſervatur in Act. Med. Berol. D. 1. Vol. 3. p. 86. antequam in uſum trahatur, ſemper eſt agitanda, ut pulvis ad fundum hærens in ipſa ſuspendatur. Hanc Aquam cum Liquore BELLOSTII convenire Cl. KLEIN in Select. Medicaminum p. 14. annotat.

AQUA HIRUNDINUM *Auguſtanorum.*

℞. Pullorum Hirundinum diſſectorum Numero triginta,

Viſci Querni,

Radiciſ Pœoniæ ana Unciam unam ſemis,

Seminis Ejusdem Unciam unam,

Florum Liliorum Convallium recentium Uncias quatuor,

Florum Sambuci Unciam unam semis,
 Aquæ fontanæ Uncias centum & viginti.
 Destillantur ad dimidias.

Vires Analepticæ & Hystericæ huic Aquæ adscribuntur. Ad Drachmas sex præscribi solet. Prudentiores Medici ridiculam fatuam, nulliusque plane pretii & usus esse asserunt.

AQUA HIRUNDINUM cum CASTOREO CULLMANNI.

℞. Pullorum Hirundinum vivorum in partes dissectorum Numero quadraginta,
 Herbæ Rutæ hortensis Uncias duas,
 Castorei optimi Unciam unam,
 Vini albi Uncias nonaginta & sex:

Destillantur ex vesica ad dimidias.

GESNER Epist. L. I. p. 486. huic Aquæ vires Antepilepticæ & Hystericas adscribit. Datur ad Unciam unam.

AQUA HUNGARICA five REGINÆ HUNGARIÆ.

℞. Ramorum Rorismarini cum Foliis & Floribus Uncias quadraginta & octo,
 Spiritus Vini Uncias centum quatuor & quadraginta.

Destillantur usque dum Phlegma apparuerit.

Convenit cum Aqua Carmelitarum; usus externus est ad Decubitum humorum, Contusiones &c.

AQUA LAXATIVA ANGELICA Viennensium, Austriaco-Provinciali correcta.

℞. Cremoris Tartari Drachmas duas:

Dissolvantur in

Aquæ ebullientis Unciis octo:

Dissolutis solvantur

Mannæ electæ Unciæ duæ,

Salis Vegetabilis Drachma una semis,

Succus Pomi Citri unius.

Infundantur fervide in vase clauso super corticibus ejusdem pomi.

Liquor Albumine Ovorum clarificatus filtretur.

Medicamentum eccoproticum una dosi hauriendum.

AQUA LAXATIVA *Viennensium.*

℞. Foliorum Sennæ sine stipitibus Drachmas sex,

Passularum minorum Drachmas tres,

Radicum Polypodii Scrupulos duos,

Seminis Coriandri Drachmam semis,

Cremoris Tartari Drachmam unam:

Incisa & contusa coquantur cum Aquæ fontanæ Unciis decem,

ad remanentiam Unciarum sex, in Colatura dissolvantur

Mannæ Siciliensis Unciæ duæ.

Clarificentur.

Fortius Alvum ducit.

Hæ duæ Aquæ mora corrumpuntur, & non nisi usus tempore parandæ sunt.

AQUA LUCE.

Videatur Spiritus Salis Ammoniaci Succinatus.

AQUA MAGNANIMITATIS *KUNRATH.*

℞. Spirituum Formicarum Uncias sexaginta,

Melissæ Uncias quadraginta octo,

Flavedinis Corticum Citri Unciam semis,

Cinnamomi Drachmas tres,

Caryophyllorum Unciam unam,

Cardamomi,

Cubebæ ana Drachmas tres,

Zedoariæ Unciam unam,

Mastichis,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana Unciam unam semis.

Stent in Digestione per octiduum, postea lege artis Destillentur.

Absurde profecto Magnanimitatis nomen huic Aquæ imponitur, aut inde quod vel Audaciam vel Venerem sit auctura expectatur; Nervinas, Analepticas, Cardiacas, Cephalicas ac Stomachicas videtur polliceri & ad Atrophiam, Arthritidem vagam, dolores Ischiadicos, Spasmos, Paralyfin aliosque id genus affectus laudatur.

AQUA MASTICHINA *Augustanorum* correctâ.

℞. Mastichis electæ Uncias quatuor,
Nucum Moschatarum Unciam unam:

Contulis affundantur

Spiritus Vini rectificati Unciæ duodecim:

Stent in Digestione per triduum, tunc adjiciantur

Aquæ fontanæ Unciæ octo & quadraginta.

Destillentur inde Unciæ triginta sex.

Hæc Aqua vires Stomachum confortantes possidet, & in Singultu, Ciborum fastidio, Flatulentia, Diarrhœa & Vomitu commendatur, Dosis ejus ad Unciam unam ascendit.

AQUA MELLIS ANDERNACI.

℞. Mellis optimi, quantum vis

Ex Cucurbita inde Destilletur Phlegma.

Laudatur ad promovendum incrementum Capillorum.

AQUA MELLIS ODORATA REGIA *Parisiensium*
correctâ à *BEAUMÉ.*

℞. Seminis Coriandri Unciâs octo,

Flavedinis corticum Citri recentium Unciam unam,

Nucum Moschatarum,

Styracis Calamitæ,

Benzoës ana Unciam dimidiam,

Vanigliarum Drachmas tres:

Incisa contusa infundantur per nycthemerum cum

Spiritus Vini rectificati Unciis quadraginta octo:

Fiat

Fiat secundum Artem Destillatio; Spiritui destillato addantur,
si placet, usus tempore

Tincturæ Moschi,

Ambra ana parum,

Analeptico, Cephalico, Nervino, Cardiaco & Paregorico
sine laudatur. Cosmetico scopo præcipue usurpatur.

Egregias hæc Aqua & odore ac sapore perquam grata &
amœna vires exserit *Analepticas, Nervinas, Cephalicas, Car-*
diacas, Stomachicas, Carminativas, Hystericas. Panno aut
pane excepta, *Stomachique regioni extus applicata Anthelminticas*
quoque edere dicitur. *Alvi fluxum blande sistit, Vomitus compe-*
scit, ructuososque Singultus cohibet. TRILLERO Aqua hæc poly-
chresta est. Datur intus ad Unciam semis.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA.

Videatur Aqua Carmelitarum.

AQUA MENTHÆ COMPOSITA *Parisiensium.*

℞. Herbarum recentium Menthæ Uncias viginti quatuor,

Absynthii Uncias tres,

Ocymi,

Pulegii ana Uncias duas,

Rorismarini,

Florum Lavendulæ ana Drachmas duas,

Cinnamomi Unciam semis,

Caryophyllorum,

Seminis Coriandri ana Drachmam unam:

Incisa & contusa infundantur per aliquot dies in

Spiritus Vini rectificati Unciis sedecim,

Aquæ Menthæ Unciis sexaginta.

Destillentur fere ad ficitatem.

AQUA MERCURIALIS videatur MERCURIUS LIQUIDUS.

AQUA MERCURIATA *Augustanorum* correcta.

MERCURIALIS ad usus externos.

℞. Cerussæ Venetæ Unciam unam,

PARS II.

- Lithargyrii Unciam semis,
 Aluminis crudi Drachmas sex,
 Mercurii sublimati,
 Salis Ammoniaci ana Drachmam unam,
 Aquarum fontanæ Uncias duodecim,
 Rosarum Uncias quatuor,
 Aceti Uncias sex:

Lithargyrium & Cerussa coctione cum Aceto solvantur, deinde addantur reliqua & non colata asserventur.

Hæc Aqua prodesse dicitur Cuti deformata, ad Verrucas, Scabiem malignam, Serpiginem, Ficus, Fissuras, Ulcera maligna, vel ubi Mundificandum est, penicillo illita.

AQUA MILLEPEDUM FULLERI.

- ℞. Millepedum vivorum,
 Sacchari albi ana Unciam unam:
 Probe subactis affundantur
 Vini albi Unciæ quatuor:
 Colatura adhibeatur ad usum.

Sanguis inde depuratur, Nervi roborantur, Obstructiones reserantur, Renes & Vesica emundantur, Urina quoque blande movetur.

Hoc Medicamentum cum tempus non ferat, non nisi usus tempore parandum est.

AQUA MULSA HIPPOCRATIS.

- ℞. Mellis optimi Uncias duas,
 Aquæ fontanæ Uncias duodecim:
 Mixta colentur.

Medicamentum egregie Resolvens, Refrigerans, Demulcens maximo in usu erat apud Artis nostræ Parentes.

Portio Mellis pro gustu ægroti potest augeri aut minui: non ultra aliquot dies asservari debet.

AQUA MYRRHÆ Wirtembergensium.

- ℞. Myrrhæ rubræ Uncias octo:
 Digerantur per triduum cum

Aquæ fontanæ duabus & septuaginta Unciis:
Destillentur inde Unciæ quadraginta octo.

*Commendatur in affectibus a vitio Mensum ortis, & morbis
Pectoris atque Ventriculi, datur ad Unciam unam.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA *Danica.*

℞. Aquæ Rosarum Uncias duodecim,
Vitrioli albi Drachmam unam,
Sacchari Saturni Drachmam semis,
Camphoræ, Pineis tritæ, Scrupulum unum:

Misceantur.

Ad Ophthalmiam Discutiendam adhibetur.

AQUA OPHTHALMICA CHARAS.

℞. Sacchari Candi albi Unciam unam,
Radici Ireos Florentinæ Drachmas tres,
Tutiæ præparatæ Drachmas duas,
Sarcocollæ,
Vitrioli albi,
Aloës Succotrinæ ana Drachmam unam,
Caryophyllorum Scrupulum unum,
Aquarum Euphrasæ,
Fœniculi,
Rosarum ana Uncias octo,

Vini Hispanici Uncias viginti quatuor:

Infundantur in Sole æstivo per quindecim dies & agitentur per
vices, liquor clarus in usum recipiatur.

*Linteis excepta & Oculis imposita laudatur ad Lippitudinem &
Ulcuscula Palpebrarum.*

AQUA OPHTHALMICA COERULEA *Danica*, COLLYRIUM COERULEUM *LEMERY*, COLLYRIUM EXSICCANS *Paris*. AQUA OPHTHALMICA SAPPHIRINA *SCHRØDERI* correcta, COLLYRIUM SAPPHIRINUM *RICHARDI*, AQUA COELESTIS *VITET*.

℞. Aquæ Calcis vivæ Uncias duodecim,

Salis Ammoniaci Drachmam unam;
 Florum Viridis Ætis Grana quinque:
 Probe trita. Siltrentur.
*Ad Ulcera Palpebrarum & Corneæ Abstergenda & Solidanda
 adhibetur.*

AQUA OPHTHALMICA D. DAGUIN.

COLLYRIUM COMITIS DU BOURG Argentinenſium.

℞. Tutia præparata,
 Caryophyllorum,
 Sacchari Candi ana Unciam unam,
 Camphoræ Pineis trita,
 Aloës ana Drachmam unam cum dimidia:
 Pulverifata infundantur in ſole per quindecim dies cum
 Vini Hiſpanici Unciis quadraginta octo,
 Aquarum Roſarum albarum Unciis ſex,
 Chelidonii,
 Fœniculi,
 Euphraſiæ,
 Rutæ ana Unciis duabus.

Liquor decantatus recipiatur ad uſum.

*In varii generis Lippitudine, quædam hujus Aquæ guttæ in-
 ſtillantur in Oculum affectum & probe per ipſum diffunduntur.*

AQUA PANIS BIERLING.

℞. Cruſtæ Panis recenter ex clibano extracti & adhuc calentis
 Uncias viginti quatuor,
 Cinnamomi acuti,
 Caryophyllorum,
 Nucum Moſchatarum ana Unciam dimidiam,
 Vini albi generoſi Uncias nonaginta ſex:
 Deſtillentur ad dimidias.

*Aquis Analepticis & Stomachicis accenſetur. Huic Aquæ,
 quæ inſunt Aromata, omnino vires Roborantes conciliabunt.
 nec in totum iners erit vapor ex Pane ipſi immixtus.*

AQUA PESTILENTIALIS *HARTMANNI*.

Videatur Spiritus Vini Camphoratus Crocatus.

AQUA PHAGEDÆNICA *LEMERY*.

LIQUOR MERCURIALIS *Austriaco-Provincialis*.

AQUA DIVINA *FERNELII*.

℞. Mercurii Sublimati Drachmam semis:

Diffolvatur probe terendo cum

Aquæ Calcis vivæ Unciis duodecim:

Hoc Medicamentum, *Exulcerationibus externis, Ulceribusque Venereis adhiberi solitum*, equidem semper magistraliter præscribi, Mercuriique Sublimati portionem, quam morbus postulat, quamque nonnulli ad Drachmam integram usque extendunt, adcuratissime determinari velim.

Formulæ præscriptæ si adjiciuntur Pulveris Aloës sex Drachmæ & Mellis Rosati sesquiuncia, surgit AQUA ALOETICA MERCURIALIS *ZWÆLFFERI*.

AQUA PICEA videatur Infusum Picis.

AQUA *RABELII*, ELIXIR ACIDUM, ANTIPODAGRICUM, ANTINEPHRITICUM *DIPPELII*.

℞. Olei Vitrioli Uncias quatuor,

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias duodecim.

Misceantur lente, & non nisi post octo aut plures à commixtione dies trahatur ad usum.

Adstringendi causa in Hæmorrhagiis adhibetur, nec non scopo Antiseptico in morbis Putridis. Datur ad Guttas octo in sufficiente vehiculi quantitate.

AQUA RAPHANI COMPOSITA *Londinensium*.

℞. Herbæ Cochleariæ recentis Uncias viginti quatuor,

Radiciis Raphani Rusticani recentis,

Corticum Aurantium recentium ana Uncias duodecim,

Nucum Moschatarum Uncias quatuor cum dimidia,

Spiritus Vini Uncias nonaginta sex,
 Aquæ fontanæ Uncias quinquaginta:
 Destillentur ex Vesica Unciæ sex & nonaginta.

Egregium contra Scorbutum medicamentum per Cochlearia exhibetur.

AQUA REGIS.

℞. Spiritus Nitri partes tres,
 Salis partem unam :

Misceantur.

Unice ad dissolvendum Aurum adhibetur.

AQUA SERPYLLI COMPOSITA *MYNSICHTI.*

℞. Radicum Zedoariæ,
 Galangæ ana Drachmam unam,
 Pœoniæ Unciam unam semis,
 Herbarum Serpylli Manipulos sex,
 Fœniculi Manipulos quatuor,
 Verbenæ,
 Melissæ,
 Florum Tiliæ,
 Liliorum Convallium,
 Lavendulæ,
 Rorismarini ana Pugillos duos,
 Cubearum Drachmam unam,
 Cinnamomi Drachmam semis,
 Macis,
 Nucis Moschatæ ana Drachmas duas,
 Visci Querni Unciam unam semis,
 Vini generosi Uncias centum duas & nonaginta.

Fiat secundum artem Destillatio.

Vires habere dicitur Cephalicas, Cardiacas, Stomachicas atque Carminativas, inde dolores Colicos atque Tormina Intestinorum compefcere, Menses quoque atque Partum promovere; Dosis vel ultra duo Cochlearia, urgente necessitate, extendi poterit; non so-

lum autem usui interno , sed & externo , partibus corporis Debilitatis , Sensu Motuque carentibus , aut Sugillatis cum leni frictione adhibetur , nec non membris Atrophicis.

AQUA SINE PARI, EAU SANS PAREILLE.

℞. Aquæ Reginae Hungariæ Uncias octo,
Spiritus Vini rectificati Uncias duas & septuaginta,
Oleorum Citri Unciam dimidiam,
Bergamotte Drachmas duas semis,
Cedrat Drachmas duas,
Mixta destillentur ad remanentiam Unciarum novem.
Ejusdem cum Aqua Carmelitana ac Coloniensi usus est.

AQUA SCLOPETARIA.

Videatur Aqua Vulneraria.

AQUA STIBIATA RICHARDI.

℞. Tartari Emetici Grana quatuor:
Dissolvantur in Aquæ fervidæ Unciis sedecim.
Singulis horis sumantur Unciæ quatuor, donec desideratus effectus sequatur.

AQUA STYPTICA Berolinenstum.

℞. Succorum expressorum Sempervivi majoris,
Sanguiforbæ,
Chærefolii,
Aristolochiæ,
Aceti Vini ana quantum vis.
Destillentur secundum artem.
Adhibetur ad sistendas Hæmorrhagias & sananda Vulnere.

AQUA STYPTICA Danorum.

LIQUOR STYPTICUS WEBERI.

℞. Aluminis rupei,
Vitrioli cœrulei ana Uncias tres:

Mixta diffolvantur coquendo cum
 Aquæ fontanæ Unciis quatuor & viginti:
 Liquori filtrato addantur
 Olei Vitrioli Drachmæ duæ:
 Misceantur.

Spleniolis exceptus Liqueor partibus Cruentatis applicatur.

Huic Analoga sed valentior est AQUA VITRIOLICA COE-
 RULEA *Londinensium*, quæ ex Vitrioli cœrulei partibus tri-
 bus, Aluminis partibus duabus, Aquæ octodecim partibus,
 solutis, & Olei Vitrioli partibus duabus constat.

AQUA THEDIANA.

℞. Aquæ Acetosæ,
 Spirituum Vini ana Uncias triginta sex,
 Vitrioli Uncias decem,
 Sacchari albi Uncias duodecim.
 Mixta filtrentur.

*Cl. PLENCK hanc Aquam in compescendis Hæmorrhagiis, mo-
 deranda nimia Vulnèrum Suppuratione, & consolidandis Vulne-
 ribus; omnibus hucusque laudatis Aquis Vulnerariis palmam præ-
 ripere asserit; ad Vulnèra quoque & Ulcera Vasorum, & Tumores
 Lymphaticos curandos unicum & efficacissimum remedium esse vi-
 deri.*

AQUA THERIACALIS.

Videatur Spiritus Theriacalis.

AQUA THERIACALIS *Londinensium*.

℞. Theriacæ Andromachi Uncias quatuor,
 Vini albi Uncias sexaginta,
 Abstrahantur ex Cucurbita Unciæ triginta.

*Hanc Aquam reliquis Aquis Theriacalibus, quarum quodque
 fere Dispensatorium propriam habet compositionem, præferen-
 dam duco; Alexipharmaca censetur, vim habet Stomachicam &
 Carminativam. Datur Cochleatim.*

AQUA

AQUA AD TORMINA INFANTUM *Argentoratensium.*

℞. Aquarum Menthæ,
 Chamomillæ ana Uncias duas,
 Syrupi Florum Papaveris Rhœados,
 Chamomillæ ana Unciam femis :

Misceantur.

Hæc Aqua Colicæ & Torminibus sedandis, infantum Flatibus dissipandis & fibris Intestinorum relaxandis optime inservit : Coctileatim datur. Sed cum mora corrumpatur, non nisi in ipso usus articulo parandum est hoc Medicamentum.

AQUA TYPHORUM CERVI COMPOSITA.

AQUA TENELLORUM CORNU CERVI *KALDE.*

℞. Radicum Scorzoneræ,
 Zedoariæ ana Unciam unam,
 Cinnamomi Unciam femis,
 Lignorum Santali rubri Drachmam unam femis,
 Aloës,
 Cassiæ lignæ ana Drachmam unam,
 Nucis Moschatæ,
 Macis ana Unciam femis,
 Florum quatuor Cordialium Unciam unam,
 Lavendulæ Unciam femis,
 Typhorum Cornu Cervi Uncias decem :

Incisa & contusa Infundantur in

Vini Malvatici Unciis sexaginta,
 Spiritus Vini Gallici Unciis triginta sex.

Destillentur secundum artem.

Alexipharmacæ & Cordiales vires inde expectantur. Dosis est ad Drachmas duas.

AQUA VEGETO-MINERALIS *GOULARD.*AQUA SATURNINA *Suecorum.*

℞. Extracti Saturni Unciam dimidiam,
 PARS II. F

Aquæ fontanæ destillatæ Uncias viginti quatuor,
Spiritus Vini Uncias duas.

Discutiendis Inflammationibus apprime conducens Medicamentum cum summo successu partibus Sugillatis applicatur, commendatur quoque ad partes Excoriatas.

AQUA VERONICÆ cum VINO *Berolinensium.*

℞. Herbæ Veronicæ florecentis Uncias sex & triginta,
Vini albi Uncias sex & nonaginta.

Destillantur lento igne Unciæ quadraginta octo.

A STAHLIO & ejus affectis Tussi tam Pulmonali quam Hypochondriaca, imprimis senibus Asthmaticis & ad Marasimum pronis adhibenda laudatur; bis vel ter de die ad Unciam unam semis exhibetur.

AQUA VIOLACEA, EAU DE VIOLETTES *BEAUMÉ.*

℞. Radicis Iridis Florentinæ Uncias quatuor,
Spiritus Vini rectificati Uncias duas & triginta.

Infundantur per duas septimanas; Tinctura ita obtenta in usum trahatur.

Non nisi Cosmetico scopo adhibetur.

AQUA VIRIDIS *HARTMANNI.*

℞. Sulphuris vivi,
Aluminis crudi,
Viridis Æris ana Drachmam unam,
Albi Græci,
Summitatum Sabinæ ana Drachmam semis,
Sambuci Drachmam unam,
Florum Hyperici,
Herbarum Rorismarini,
Rutæ,
Plantaginis,
Salviæ,

Herbæ Pulegii ana Pugillos duos:
Incisa & trita coquantur cum

Vini,

Aquæ ana Unciis duodecim:

Ad consumptionem quartæ partis, addantur

Mellis Rosati Drachmæ duæ.

HARTMANN hanc Aquam ad Ulcera fœtida, Venerea maxime nec non ad Scorbutum egregie laudat.

AQUA VITÆ MULIERUM BÆCLERI.

℞. Radicum Ireos Florentinæ,

Zedoariæ,

Calami aromatici ana Drachmas tres,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Granorum Paradisi ana Unciam unam,

Seminis Anifi Uncias sedecim,

Fœniculi,

Papaveris albi,

Cumini ana Unciam semis,

Spiritus Vini Uncias duas & septuaginta.

Stent in Digestione per octiduum, postea secundum artem

Destillantur; Liquori destillato addantur

Sacchari albillimi Unciæ quatuor.

Liquor filtratus fervetur.

TRILLERUS annotat, hoc Medicamentum in plerisque Uteri affectionibus præsentaneum veluti remedium esse, siquidem Caput, Ventriculum & reliqua Viscera corroborando, Suffocationes & Flatus compescat, Catarrhosque tollat; sed prudenter quoque addit, gravidas à largo & frequenti ejus usu arceri debere. Dosis est ad aliquot Drachmas.

AQUA VITÆ SAPONACEA RICHARDI.

ESPRIT DE SAVON.

℞. Saponis Veneti Unciam unam:

Diffolvatur

Spiritus Vini Camphorati Unciis fedecim.
Extus Discutiendi & Resolvendi gratia applicatur.

AQUA VITRIOLICA *Suecorum.*

℞. Vitrioli albi Drachmam unam:
 Dissolvatur

Aquæ fontanæ Unciis duodecim.

Filtrentur.

Discutiendæ Oculorum Inflammationi adhibetur.

AQUA VITRIOLICA COERULEA *Londinensium.*

Videatur Aqua Styptica.

AQUA VULNERARIA, EAU D'ARQUEBUSADE
 LEMERY.

AQUA CATAPULTARUM, AQUA SCLOPETARIA.

℞. Radicum Symphiti,
 Herbarum Ejusdem,
 Artemisiæ,
 Bugulæ ana Manipulos quatuor,
 Betonicæ,
 Saniculæ,
 Buphthalmi,
 Symphiti minoris,
 Scrophulariæ,
 Plantaginis,
 Agrimonæ,
 Verbenæ,
 Absynthii,
 Fœniculi ana Manipulos duos,
 Hyperici,
 Aristolochiæ,
 Telephii,
 Veronicæ,

Herbarum Centaurii minoris,
 Millefolii,
 Nicotianæ,
 Menthæ,

Hyssopi ana Manipulum unum :

Contusa infundantur per triduum in loco calido, cum
 Vini albi centum & quadraginta quatuor Unciis,
 Destillentur secundum artem.

*Absonam hanc compositionem longe à plurimis Dispensatoriis
 receptam, LEMERY non primus præscripsit, sed aliunde accep-
 tam publicavit; quædam Dispensatoria eam mutarunt, quædam
 etiã auxerunt. Laudatur ad Contusiones, Sugillationes, Luxatio-
 nes, Ambusta, Inflammationes, Gangrænã præcavendam;
 præterea ad partes Roborandas.*

AQUA VULNERARIA BAUMÉ.

℞. Foliorum recentium Salviæ,
 Angelicæ,
 Ablynthii,
 Saturejæ,
 Fœniculi,
 Menthæ,
 Hyssopi,
 Melissæ,
 Ocymi,
 Rutæ,
 Thymi,
 Majoranæ,
 Rorismarini,
 Origani,
 Calaminthæ,
 Serpilli,

Florum Lavendulæ ana Uncias quatuor.

Infundantur concisa per nycthemerum cum

Spiritus Vini rectificati Unciis centum octo & viginti :

AQUA. AQUILA.

Destilletur omnis inde Spiritus; (si Aqua loco Spiritus assumitur, fergit AQUA VULNERARIA AQUOSA, si Vinum, VINOSA, si Spiritus Vini à Vegetabilibus non abstrahitur, sed post infusionem decantatus filtratur, obtinetur AQUA VULNERARIA RUBRA.)

Vel tyro Chymiaè perspicit, hac ratione paratam Aquam Vulnerariam reliquis efficaciorẽ esse. Varia morbi, cui applicari debet, natura indicat, Aquosa ne, an Vinosa, an vero Spirituosa recipi debeat.

AQUA VULNERARIA MERCURIALIS PLENCKII.

℞. Aquæ Rosarum Uncias sex,
Solutionis Mercurii dulcis Unciam unam,
Mellis Rosacei Unciam semis.

Misceantur.

Adhibetur ad curanda Ulcera venerea.

AQUA VULNERARIA MINERALIS PLENCKII.

℞. Camphoræ Uncias tres :
Subactis

Spiritus Vini Uncia una

Adjiciantur sensim sensimque

Sacchari Saturni Drachma semis, dissoluti

Aquæ fontanæ Unciis quadraginta quatuor.

Misceantur & usus tempore probe concutiatur Liquor.

Ulcerã antiqua sanare, Cancrum apertum mitigare, & ipsi obicem ponere, linteis tepide applicatam Inflammationes mirifice solvere Clarissimus PLENCK asseverat, haud incongrue AQUA VEGETO - MINERALIS CAMPHORATA denominari posset.

AQUILA ALBA.

Videatur Mercurius dulcis.

ARCANUM. AURUM.

47

ARCANUM CORALLINUM.

Videatur Mercurius Præcipitatus ruber.

ARCANUM DUPLICATUM *BUSSII* sive *Holsteinensium*,
SAL DE DUOBUS *Parisiensium*.

Residuum à Destillatione Aquæ fortis, rite Elixivetur, Lixivium ope affusæ solutionis Salis Tartari tentetur, num rite fit saturatum; si cum hac solutione non effervescit nec turbatur, evaporetur lente ad cuticulam, filtretur, & inde surgentes Crystalli asserventur.

Vires sub Tartaro Vitriolato dicentur.

ARCANUM TARTARI.

Videatur Terra foliata Tartari.

AURUM FULMINANS *BAS. VALENTINI*.

℞. Auri per Antimonium depurati quantum vis:
Dissolvatur

Aquæ Regis quantitate sufficiente; instilletur Alkali sive fixum sive volatile, usque dum omne Aurum ad fundum secesserit, calx probe edulcorata ficcetur in umbra, exsiccata caustissime sine ulla frictione colligatur.

In *Instit. Chem.* monui, ne Ducatorum quidem Aurum, cum semper Cuprum contineat, ad hanc Calcem, si ea scopo medicato applicanda fuerit. recipiendum esse.

Purgantibus stimuli loco ad unum alterumve Granum adjiciatur. Hodie inter Medicos evuluit.

48 AURUM. AXUNGIE. BACILL. BALSAM.

AURUM HORIZONTALIS ZWINGERI.

PANACEA KORNMANNI.

℞. Croci Solis Drachmas duas,
Cinnabaris Antimonii Unciam semis,
Olei destillati Cinnamomi Guttas tres.

Probe inter se invicem terantur.

Vires Analepticae, quæ huic Medicamento adscribuntur, pendunt ab Oleo Cinnamomi.

AURUM POTABILE HELVETII

Videatur Tinctura Auri GEOFFROY.

AXUNGIARUM DEPURATIO.

Cellulosa, quæ Adipem habet, in frusta diffecatur, & cum Aqua tam diu conquassatur, usque dum Aqua ipsi denuo affusa inde defluat prorsus limpida, leni deinde calore liquatur Adeps, ut omnis ex Cellulosa secedat & ipsi limpidus supernatet, eodem quoque calore Aqua, quæ ipsi sub priore labore adhæserat, diffatur; diffatam autem esse una aut altera Adipis gutta carbonibus injecta ac sine strepitu deflagrans indicio est; Adeps depuratus adhuc fluidus committitur ollæ.

BACILLI AD FORNACEM.

Videatur Massa ad Fornacem.

BACILLI DE LIQUIRITIA.

Videatur Liquiritia cocta.

BALSAMA.

Plurima parantur, ubi uni Unciæ, Olei Nucis Moschatae ope Spiritus Vini odore suo privati affunditur Olei qualiscunque odorati Drachma una à quo Oleo odorato deinceps Balsamum denominatur.

BAL-

BALSAMUM ADSTRINGENS *RICHARD.*

℞. Olei Vitrioli Unciam semis :

Affundatur sensim

Olei Terebinthinæ Uncia semis :

Adjiciantur

Spiritus Vini rectificati Unciæ tres.

Hoc medicamentum ad Scrupulos duos usque pro dosi ad sistendam Gonorrhæam adhibetur.

Proxime accedit ad Balsamum Ischæmaticum Brunsvicensium.

BALSAMUM ANODYNUM *Pharmacop. Bateanæ ab Edin-burgenfibus correctum.*

℞. Opii Unciam unam,

Saponis albi Hispanici Uncias quinque,

Spiritus Vini rectificati Uncias viginti quatuor:

Comminuta Digerantur per triduum; in liquore filtrato dein dissolvantur

Camphoræ Unciæ duæ

Olei Stillatitii Rorismarini Semuncia.

Arthriticis & Rheumaticis commendatur.

BALSAMUM APOPLECTICUM *Pharm. Bateanæ correctum.*

℞. Oleorum Nucistæ expressi Ucias tres semis,

Jasinini,

Destillatorum Cinnamomi,

Ligni Rhodii ana Drachmam unam

semis,

Lavendulæ,

Majoranæ,

Caryophyllorum ana Drachmam

unam,

Rutæ,

Succini ana Scrupulum unum,

Balsami Peruviani Scrupulos duos :
 Probe mixtis addantur

Mofchi,
 Ambrae ana Grana sedecim, Spiritu Rosarum trita,
 Spodii nigri preparati quantum satis ad Balsamum nigro
 colore tingendum.

Apoplecticorum Naribus, Vertici, Temporibusque illinitur, potissimum vero ob Odoris commendationem expeti olim solebat.

BALSAMUM AROMATICUM.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM ARCEI.

UNGUENTUM è GUMMI ELEMI *Londinensium.*

℞. Terebinthinæ,
 Gummi Elemi ana Uncias sex,
 Sevi Cervini Uncias novem,
 Olei Hyperici Uncias duas:

Leni igne liquentur & probe agitentur usque dum refrigerint.

Præstans Vulnerarium & Digestivum est, quod in Vulneribus feliciter adhibetur; si Digerendi scopus est, UNGUENTO DIGESTIVO aut BASILICO temperatur. Parum ab hoc Balsamo differt BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

BALSAMUM ARCEI LIQUEFACTUM *PLENCKII.*

℞. Balsami Arcæi,
 Vitellorum Ovorum ana Unciam unam:

Probe subacta diluantur
 Spiritus Vini Unciis octo.

Ad Ulcera & Vulnere sinuosa injicienda adhibetur, si quidem Spirituosa admittant.

BALSAMUM CATHOLICUM.

Videatur Balsamum Commendatoris de Perne.

BALSAMUM CELLENSE.

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM CEPHALICUM *Saxonicum.*

Videatur Balsamum Scherzeri.

BALSAMUM CHALYBEATUM, BEAUMED' AIGUILLES
Parisiensium.

℞. Acuum chalybearum Unciam femis :

Diffolvatur in

Spiritus Nitri fesqui-uncia :

Solutioni addantur

Olei Olivarum Unciæ duæ femis ,

Spiritus Vini rectificati Unciæ duæ :

Leni calore detineantur & agitentur, usque dum probe sint unita.

Laudatur contra dolores Arthriticos & Podagricos.

BALSAMUM AD DENTITIONEM *CHARAS.*

℞. Succi expressi Cancrorum fluviatilium,
Mucilaginis Radicis Althææ ana Uncias duas,
Butyri optimi Uncias tres,
Axungiarum Gallinæ,

Anatis ana Drachmas duas :

Mixta coquantur lento igne ad humiditatis consumtionem. Colaturæ addantur.

Sacchari Candi pulverifati Unciæ quatuor,

Vitellorum ovi N^o unum :

Probe misceantur.

SENTENTIÆ CHARAS, qui hoc medicamento tenellorum Dentienti Gingivulæ illinendo, Dentitionem egregie promoveri experientia doctus docet, plures accedunt.

BALSAMUM FIORAVENTI.

℞. Baccarum recentium Lauri Uncias quatuor,

Gummi Elemi,

Tacamahacæ ana Unciam unam,

Galbani,

Olibani,

Myrrhæ,

Hederæ ana Uncias tres,

Styracis liquidæ Uncias duas,

Ligni Aloës Uncias tres,

Galangæ minoris,

Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucis Moschatae,

Zedoariæ,

Zinziberis,

Dictamni albi,

Aloës Succotrinæ,

Succini ana Unciam unam,

Spiritus Vini rectificati Uncias nonaginta sex:

Digerantur per novem dies, tunc addantur

Terebinthinæ Unciæ sedecim:

Abstrahatur inde Spiritus, quem BALSAMUM FIORAVENTI SPIRITUOSUM appellant.

A Destillatione residuum Retortæ commissum lento igne Destilletur, flavum quod inde elicitur oleum BALSAMUM OLEOSUM; dicitur. Quo obtento augeatur ignis, & quod jam prodit magna nigrum empyreumaticum, sub nomine BALSAMI NIGRI asservetur.

Medicamentum à nugivendolo Alchemico celebratum Medicorum nonnulli receperunt; Balsamum spirituosum, quod quidem BALSAMUM FIORAVENTI simpliciter præscripturis semper est recipiendum, à quibusdam quoque tanquam vires edens Analepticas, Nervinas, Nephriticas, Diureticas, Alexipharmacas, Traumaticas, Antihystericas & Carminativas adeo commenda-

tur, ut in variis morbis à causa præsertim Frigida aut Flatulenta oriundis, opportune adhibitum, insignem usum præstare videatur. Huic admodum analoga AQUA videtur esse ANHALTINA. BALSAMUM OLEOSUM odoratorum, BALSAMUM NIGRUM autem Empyreumaticorum Oleorum vires edet.

BALSAMUM HYSTERICUM *Parisiensium.*

℞. Gummi Asphalti,
 Galbani,
 Ladani ana Drachmam unam,
 Assæ foetidæ Scrupulum unum,
 Aloës Drachmam unam,
 Castorei,
 Opii ana Drachmam semis,
 In mortario calido contundantur in massam, cui addantur
 Oleorum Destillatorum Rutæ,
 Succini ana Guttæ decem,
 Absynthii,
 Sabinæ,
 Tanaceti,
 Petrolei ana Guttæ duodecim,
 Olei expressi Nucis Moschatæ Scrupuli duo:
 Probe misceantur.

Hoc Balsamo motos in Utero fluctus, quosque vulgo Hystericas Passiones aut Suffocationes vocant, turbas placide sedari perhibent. Admouetur Naribus; illinitur Umbilico.

BALSAMUM ISCHÆMATICUM *Brunsvicensium.*

Videatur Balsamum Adstringens.

BALSAMUM LECTORENSE, BEAUME DE LAICTURE DE VINCEGUERE, DE CONDOM à BAUMÉ correctum,

℞. Camphoræ comminutæ,
 Croci pulverisati ana Drachmam unam,

Mofchi,
 Ambræ tritæ ana Drachmam femis:
 Infundantur in vafe claufo per aliquot dies leni calore cum
 Petrolei albi,
 Oleorum Deftillatorum Lavendulæ,
 Terebinthinæ,
 Baccarum Juniperi,
 Caryophyllorum ana Uncia una,
 Macis,
 Nucis Mofchatae ana Drachmis dua-
 bus,
 Benzoës Uncia dimidia.

Ufus tempore decantatur Olei quantum opus est.

*Analepticarum, Nervinarum, & Anodynarum virium no-
 mine hoc Medicamentum, ad corrigendum præterea Aërem mali-
 gnum laudatur.*

BALSAMUM LITHUANICUM.

Videatur Oleum Betulinum.

BALSAMUM LOCATELLI. ITALICUM RUBRUM

Pharmacop. Bateanæ.

℞. Cerae citrinæ Uncias quatuor,

Olei Olivarum Uncias fex,

Vini Malvatici Uncias quinque:

Leni igne ad confumptionem humiditatis coctis colatisque ad-
 dantur

Terebinthinæ optimæ Unciæ fex,

Santali rubri pulverifati Uncia femis:

Agitentur fortiter, fatisque refrigeratis admifceantur

Balfami Peruviani Drachmæ duæ.

*Ad Vulnera, Contufiones, variasque læfiones internas pariter
 ac externas commendatur, interne à Drachmis duabus ad Unciam
 femis propinatur.*

BALSAMUM AD LORICANDUM CADAVER CONDI-
TUM *Parisiensium.*

℞. Balsamorum Peruviani,
de Copaiba,
Styracis liquidæ ana Uncias quatuor & viginti,
Oleorum expressi Nucis Moschatae Uncias octo,
Destillati Lavendulae Uncias duas,
Thymi Unciam semis :

Liquefiant leni igne.

BALSAMUM MERCURIALE *PLENCKII.*

℞. Mercurii vivi Drachmas duas:
Extinguantur probe in
Terebinthinæ Drachma una:
Addantur
Axungia Porci Drachmæ sex,
Balsami Arcei Drachmæ novem,
Mercurii dulcis grana viginti & tria :

Exacte misceantur.

*Clarissimus Auctor hoc Medicamentum ad Ulcera Venerea
consolidanda admodum conducere contendit.*

BALSAMUM NERVINUM *Parisiensium.*

℞. Oleorum Palmae,
Nucis Moschatae,
Medullarum Cervi,
Cruris bovis ana Uncias quatuor,
Axungiarum Hominis,
Taxi,
Viperæ ana Unciam unam:

Leni calore liquatis adjiciantur

Oleorum Destillatorum Lavendulae,
Menthæ,
Rorismarini,
Salviæ,
Thymi,
Caryophyllorum ana Drachma una,
Camphoræ Drachmæ duæ,
Balsami Peruviani ficci Uncia una :

Duo ultima dissoluta in Spiritus vini quantitate sufficiente:
Mixta afferventur.

Inungitur membris Debilitatis & Torpidis.

BALSAMUM ODONTALGICUM *Württembergensium.*

℞. Opii,

Camphoræ ana Scrupulos duos:

Dissolvantur in Spiritus Vini pauxillo:

Addantur

Oleorum Destillatorum Ligni Sancti Drachmæ duæ,
Caryophyllorum Drachma una,
Expressi Nucistæ Drachmæ sex:

Probe misceantur.

Hoc Balsamum vel solum, vel Gossypio exceptum, Dentium-que cavitatibus applicatum probatæ fertur esse efficacæ ad sedandos Dentium dolores vel gravissimos.

BALSAMUM OPHTHALMICUM RUBRUM, *Pharmacop. Danicæ.*

℞. Cerae albæ Drachmas sex:

Leni calore liquatis admisceantur

Butyri recentis optimi Unciæ tres,

Mercurii præcipitati rubri in tenuissimum pulverem triti
Drachmæ duæ & Grana quindecim:

Misceantur exactissime.

Pterygiis & Mactlis Corneæ curandis bis de die unum aut alterum Granum inungitur.

BALSAMUM OPHTHALMICUM, *SAINTRYVES.*

℞. Balsami Ophthalmici rubri Uncias duas,

Camphoræ Scrupulum unum,

Tutiæ Drachmam semis:

Misceantur.

Paribus fere cum antecèdentibus viribus sese commendat, quin, si Ophthalmia accesserit, fertur præferendum.

BAL-

BALSAMUM PECTORALE MEIBOMII.

- ℞. Terebenthinæ optimæ,
 Oleorum Amygdalarum dulcium ana Drachmas octodecim,
 Hyperici Uncias duas,
 Spermatis Ceti Unciam semis,
 Sanguinis Draconis optimi,
 Extracti Opii aquosi,
 Balsami Peruviani ana Drachmas duas,
 Butyri optimi Unciam unam cum semisse:

Misceantur

Hoc remedium Duci incerti nominis Brunsvicensi, in Phthysicos suspicionem vocato, à MEIBOMIO ad decem quindecimve de die in diem Guttas præscriptum eo valuisse; refert SCHULZIUS l. c. p. 50, ut senectutem iste Dux inde affectus sit satis provec̄tam æque ac vegetam.

BALSAMUM COMMENDATORIS DE PERNE.
 CATHOLICUM TRAUMATICUM *Suecorum.*

- ℞. Balsami Indici ficci Unciam unam,
 Styracis electæ Uncias duas,
 Benzoës electæ Uncias tres,
 Olibani electi Unciam semis:

Trita dissolvantur in

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis quindecim:

Filtrata solutio commisceatur cum Tinctura parata ex

- Radiciſ Angelicæ,
 Herbæ Millefolii,
 Aloës Succotrinæ,
 Myrrhæ electæ ana Uncia dimidia,
 Spiritus Vini rectificatissimi Unciis decem.

*POMET qui primus hujus Balsami descriptionem nobis sup-
 peditavit, magnis illud laudibus extulit. In variis morbis, omnis*

PARS II.

H

generis Vulneribus & Ulceribus internus æque ac externus ejus usus magnopere commendatur. Interne autem caute & parce, ne Sanguinem exæstuet, præscribendum videtur. Gutta decem sufficiant.

BALSAMUM SAMARITANUM *SCHRÆDERI.*

℞. Olei Olivarum,
 Vini generosi ana Uncias octo:
 Coquantur ad confumptionem humiditatis.
Traumatico scopo usurpatur.

BALSAMUM SAPONACEUM *Edinburgensium.*
 INFUSUM SAPONACEUM.

UNGUENTUM OPODELDOCH *Suecorum.*

℞. Saponis albi Hispanici Uncias quinque,
 Camphoræ Unciam unam:
 Dissolvantur in
 Spiritus Vini rectificati Unciis viginti quatuor,
 Oleorum destillatorum Rorismarini,
 Origani ana Drachmis duabus.
Laudatur maxime ad resolvendos Tumores Cysticos & affectus Rheumáticos.

BALSAMUM SATURNI *GOULARD UNIVERSALE.*

℞. Cereæ Citrinæ Uncias octo,
 Liqueantur leni igne cum
 Olei Rosarum Unciis octodecim:
 Addantur
 Extracti Saturni Unciæ quatuor,
 Camphoræ tritæ Drachma una:
 Probe misceantur.
Multum contra Impetigines, Ulcera fistulosa, Gangrenæque & Sphaceli formidinem laudatur.

BALSAMUM SCHAUERIANUM *Brunsvicensium.*

℞. Radicum Symphyti Drachmas sex,
 Ostrucii Unciam dimidiam,

Radicum Calami Aromatici Drachmas tres,
 Caryophyllatæ,
 Enulæ ana Drachmam unam,
 Angelicæ Grana quindecim,
 Galangæ Drachmas tres,
 Dictamni Drachmas sex,

Styracis,

Olibani ana Drachmas tres,

Galbani Drachmas novem,

Nucis Moschatæ,

Cubebæ ana Drachmas duas,

Zinziberis,

Cinnamomi ana Drachmas tres,

Caryophyllorum,

Ligni Santali albi ana Drachmas duas,

Cardamomi,

Ligni Aloës ana Drachmam unam,

Gummi Benzoës Drachmas tres,

Mastyches Unciam femis,

Aloës hepaticæ Drachmam unam,

Myrrhæ Drachmam femis,

Terebinthiæ Venetæ Unciam unam femis,

Spiritus Vini rectificati Uncias nonaginta sex.

Destilletur lento igne Spiritus & in eo dissolvantur,

Camphoræ Drachma una,

Olei Destillati Baccarum Lauri Uncia una.

Hoc medicamentum in Germania passim celebratur, satisque frequens ejus, tanquam Vulnerarii polychrestii, usus est. Intus quoque ad modum BALSAMI FIORAVENTI adhibetur.

BALSAMUM SCHERZERIKALDE correctum. AROMATICUM Suecorum.

℞. Olei expressi Nucis Moschatæ Unciam unam femis,

H 2

Oleorum Destillatorum Majoranæ,
 Lavendulæ,
 Rorismarini,
 Succini,
 Serpilli ana Drachmas duas,
 Rutæ,
 Pulegii,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Cardamomi ana Scrupulum unum:

Misceantur.

Hoc medicamentum BALSAMO CELLENSI ET CEPHALICO SAXONICO est analogum; præter odorem satis gratum virtutibus pollet Anticolicis, Carminativis & Stomachicis; hinc in Torminibus ventris, infantum præcipue, Abdomini utiliter illinitur. Quin & adultioribus in affectibus Colicis, Flatulentis, Hystericis, à causa frigida originem ducentibus, interne quoque cum jusculo modica dosi præscribi posse SCHULZIUS Auctor est l. c. p. 52.

BALSAMA SIMPLICIA.

℞. Olei expressi Nucistæ ope Alkoholis omni odore & sapore privati, quod CORPUS PRO BALSAMO appellare solent, partes quinque,
 Olei destillati, unde Balsamum denominatur, partem unam:
 Probe misceantur.

Ufu receptum; quod BALSAMUM CARYOPHYLLORUM Pulvere Caryophyllorum, BALSAMUM CINNAMOMI Bolo Armena, BALSAMUM LAVENDULÆ Cœruleo montano, BALSAMUM MAJORANÆ Herbæ Majoranæ, BALSAMUM RUTÆ Viridi Æris, tingantur.

Balsama simplicia à viribus Oleorum unde denominantur, dijudicanda esse facile patet.

BALSAMA SULPHURIS.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM *Edimburgensium.*

℞. Sulphuris citrini partem unam,

Olei unguinosi, unde denominatur, partes sex:
 In vase terreo amplo, sub perpetua agitatione coquantur, usque dum Sulphur calore liquatum, subiisse oleum pateat ex colore, odore, fatisque magna intumescencia. Oleum quoddam destillatum si recipiendum est, decem ejus adhibentur partes, solutioque fit in Cucurbita vitrea ope Balnei Arenæ.

Ex Oleo quocunque destillato surgit BALSAMUM SULPHURIS ANTIMONIALE *HOFFMANNI*, si quidem isti Oleo admiscueris Hepar Antimonii ex aqua oriundum, cum Reguli Antimonii simplicis Scoriis cocta. Pro BALSAMO SULPHURIS *RULANDI* jam cum quodam Oleo unguinoso paratum recipere, jam eidem insuper octavam Olei Terebinthinæ partem adjicere solent.

Monui in Institution. Chemicæ ad Experimentum XV. prudentiores Medicos à nauseosis his Medicamentis & acribus abstinere. Præcipuæ eorum vires ab Oleo pendent ad eorum præparationem adhibito. Quæ Olea unguinosa receperunt, mitiora quidem sunt Oleorum odoratorum ope paratis, sed ne hæc quidem acritudine carent, quippe Oleum quodque mitissimum alias, ubi sub præparatione incaluerit, evadet acre.

BALSAMUM TRANQUILLANS *Parisiensium.*

℞. Foliorum recentium Strammonei,
 Solani nigri,
 Phytolacæ,
 Belladonnæ,
 Mandragoræ,
 Hyoscyami ana Uncias quatuor:
 Papaveris fativi Uncias octo.
 Perficariæ Unciam unam,

Bufonum viventium N^o. quinque:
 Incisa coquantur cum
 Olei Olivarum Unciis sexaginta,

ad confumtionem humiditatis; Oleo per colum trajecto
Addantur

Summitatum recentium Rorismarini,
Salviæ,
Ruthæ,
Hyssopi,
Lavendulæ,
Thymi,
Majoranæ,
Costi hortensis,
Menthæ;
Hyperici ana Uncia una,
Absynthii Unciæ duæ,

Florum recentium Sambuci Uncia una:

Digerantur in vase clauso leni calore per quatuordecim dies,
colatum Oleum elapsis aliquot diebus à fæcibus, quas depo-
nit, decantetur, & usui fervetur.

*Hoc Oleum, improprie sane Balsamum dictum, exterius fri-
cando, inungendo adhibitum, permulcendis & consopendis sæ-
vis Arthriticorum, Ischiadicorum & Rheumaticorum doloribus
egregie valet.*

BALSAMUM TRAUMATICUM *Edinburgense.*

Videatur Balsamum Commendatoris de Perne.

BALSAMUM TRAUMATICUM *Londinense.*

Videatur Balsamum Commendatoris de Perne.

BALSAMUM VIRIDE DU CLOS, five *Metensium*, five de
FEUILLET.

℞. Viridis Æris Uncias tres,
Vitrioli albi Unciam unam semis:
Pulverifata subigantur in mortario cum
Oleorum Lini,
Olivarum ana Unciis sex,

Olei Laurini Uncia una:

Addantur

Terebinthinæ Unciæ duæ,

Calefiat mortarium, omnia, ut exacte coëant, agitentur, tunc adjiciantur

Aloës pulverifata Drachmæ duæ:

Oleorum destillatorum Juniperi Unciam semis,

Caryophyllorum Drachma una:

Optime mixta asserventur & tempore usus denuo agitentur, ut quæ subsederunt infidentibus remisceantur.

Adhibetur ad Ulcera detergenda & ad consumendam Carnem Fungosam.

BALSAMUM VITÆ FUNNI.

℞. Salis Tartari Unciam unam semis:

Dissolvatur in

Aquæ fontanæ Unciis viginti quatuor:

Addantur

Olei Terebinthinæ Unciæ tres,

Saponis Veneti pulverifati Unciæ duæ:

Probe mixtis adjiciantur

Spiritus Juniperi Unciæ duæ,

Olei Culilabani Unciæ tres:

Misceantur.

Hoc Balsamo membra Arthritica, Rheumatica, Paralytica, & quæ Sugillationes habent, efficacissime fricari Auctor contendit.

BALSAMUM VITÆ HOFFMANNI.

℞. Oleorum destillatorum Lavendulæ,

Majoranæ,

Caryophyllorum,

Cubeborum,

Cardamomi ana Scrupulum unum,

Macis Scrupulos duos,

Cinnamomi Scrupulum unum,

•Oleorum destillatorum Rutæ,
 Succini,
 Balsami Peruviani ana Scrupulum semis,
 Quintæ Essentiæ Citri Scrupulum unum:
 Probe mixtis subigatur
 Ambræ Gryfææ Scrupulus semis :
 Addantur
 Spiritus Vini rectificatissimi Unciæ viginti :
 Solutio rite parata affervetur.

*Hoc Balsamum HOFFMANNUS jam in Notis ad POTERIUM descripserat, cum autem labente tempore questum sibi inde comparare consultum fore crediderit, ejus parandi modum sibi soli notum esse divulgavit, & idem quoque ejus discipulus SCHULZ. l. c. p. 54. tradidit. Adhibetur vero hoc medicamentum extus ad Odo-
 randum & partes debilitatas Roborandas, ad Ventriculi affectus, Nauseam, Ructus, Colicam & Diarrhœam. Interno etiam usui iisdem in morbis ad Guttas usque viginti commendatur.*

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM PLENCKII.

℞. Saponis ficcati & in pulverem triti Uncias sex,
 Salis Tartari Unciam unam semis,
 Olei Terebinthinæ Uncias duodecim :
 Misceantur.

Egregium medicamentum resolvens contra Tumores Cysticos, & alios frigidos, Anchyloses &c. laudatur si duodecuplo Aquæ dilutum sub forma Fomenti vel Stillicidii adhibetur.

BALSAMUM VITÆ TEICHMEIERI.

℞. Quintarum Essentiarum Citri Scrupulos quatuor,
 Bergamottæ Guttas duodecim,
 Oleo.

Oleorum Destillatorum Cinnamomi,
 Menthæ ana Guttas octodecim,
 Cardamomi,
 Caryophyllorum,
 Melissæ Turcicæ,
 Macis,
 Rorismarini,
 Lavendulæ ana Guttas duodecim,
 Rutæ,
 Salviæ ana Guttas quinque,

Dissolvantur in

Spiritus Vini alcalifati loti Unciis sex:

Colorentur

Radiciis Alcannæ sufficiente quantitate:

Filtrato liquori addatur,

Essentiæ Ambraë Drachma semis.

*Ex quo insignis, quem sibi suo BALSAMO VITÆ comparaverat
 HOFFMANNUS, innotuit quæstus, alii quoque Medici, eadem spe
 ducti, ad idem negotium frequentes se applicuerunt. Hinc dis-
 solutis in Alcohole aut Liquore Anodyno fragrantibus Oleis mul-
 ta deinceps atque varia concinnata videmus BALSAMA VITÆ,
 sive quæ Principium Vitæ restaurent medicamina, nomine &
 genera diversa, viribus congrua.*

BALSAMUM VULNERARIUM *Edimburgensium.*

Videatur Balsamum Commendatoris.

BALSAMUM VULNERARIUM *Londinensium.*

Videatur Balsamum Commendatoris.

BALSAMUM VULNERARIUM *MINDERERI.*

Videatur Balsamum Arcæi.

PARS II.

I

BALSAMUM VULNERARIUM STAHLII.

℞. Effentiæ Succini Uncias duas,
 Myrrhæ Unciam unam,
 Olei Terebinthinæ Unciam semis:
 Misceantur & loco calido in vase clauso Digerantur.
Ad Vulnera & Ulcera partium Exsanguium adhibetur.

BEZOARDICUM JOVIALE.

Videatur Antihecticum Poterii.

BEZOARDICUM MARTIALE, PULVIS CACHECTICUS
 LUDOVICI, SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.

℞. Limaturæ Martis Uncias sex,
 Antimonii crudi Uncias sex:
 Mixta fluant in Crucibulo, effundantur, reducantur in pul-
 verem, & detonentur cum
 Nitri crudi Unciis sex & triginta:
 Calx probe edulcorata fervetur usui.
*Huic Calci vires Roborantes, Acidum Absorbentes, & Transpi-
 rationem promoventes adscribuntur. Ad viginti quinque Grana
 adhibetur.*

BEZOARDICUM MINERALE MOEBII.

℞. Mercurii Vitæ partem unam,
 Nitri crudi partes tres:
 Misceantur, Detonentur in Crucibulo candente, committan-
 tur Aquæ, pulvis subsidens bene edulcoratus fervetur.
*Ostendi in Instit. Chem. p. 272 hanc Calcem ab Antimonio
 Diaphoretico nequaquam differre.*

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Bolus Armena pulverifata cum Aqua agitetur; Aqua turbida
 à spisso, quod fundum tenet, leniter defundatur; Aqua denuo
 affun-

affundatur, quæ paulisper agitata priori addatur, atque hic actus usque repetatur dum in Aqua cum Bolo agitata parum vel nihil amplius turbidi appareat; Pulvis ita elutriatus efficcetur.

BOLUS ANTHELMINTICUS PURGANS *NOUFFER.*

℞. Panaceæ Mercurialis,
Diacrydii præparati ana Grana decem,
Gummi Guttæ Grana sex:
Pulverifata redigantur cum
Confectionis de Hyacintho quantitate, quæ sufficiat, in
Bolum.

Specificè ad expellendam è corpore Tæniam laudatur.

BOLI LITHONTRIPTICI ROSÉEN.

℞. Saponis Alicantini Uncias octo,
Testarum Ovorum calcinatarum,
Fructuum Cynosbati ustorum ana Unciam unam,
Salis Tartari Drachmam unam:
Mixta efformentur cum Spiritu Vini in Bolos sexaginta.
Eorum quatuor in diem sumantur.

BOLI IN QUARTANA *RICHARD.*

℞. Corticis Chinæ tenerrime pulverifati Drachmas sex,
Scillæ præparatæ Scrupulos duos,
Kermes mineralis Grana sex,
Spiritus Salis Ammoniaci Drachmam unam,
Conservæ Rosarum quantum fatis:
Misceantur & formentur Boli duodecim.
Quater de die per æqua intervalla singulatim sumantur.

BOLI VERMIFUGI *RICHARD.*

℞. Pulverum Radicum Filicis Unciam semis,
Rhei electi Drachmas duas,

Pulverum Seminis Cinæ Unciam semis,
 Mercurii dulcis Drachmam unam :
 Misceantur & Syrupi Absynthii qua sufficit quantitate cogantur
 in Bolos duodecim.

Per singulos dies tres eorum sumantur.

BUTYRUM CACAO HOMBERGII.

℞. Nuces Cacao :

Torreatur in sartagine ferrea, ut à Cortice possint nudari,
 decorticatæ contundantur in pulverem, qui committatur sacco
 linteo inter prelaminas probe calefactas collocando. Oleum
 inde obtentum leni calore liquatum detineatur, usque dum fæ-
 ces deposuerit, à quibus defusum asservetur.

*Ad usum tam internum quam externum Spermatis Ceti substi-
 tuitur, cui suavitate & gratia præstat.*

BUTYRUM VEL UNGUENTUM MAJORANÆ KALDE.

℞. Herbæ recentis Majoranæ,

Butyri recentis ana partes æquales:

Leni igne coquantur usque dum aliquot guttæ igni instillatæ
 sine strepitu deflagrent, tum linteo commissa subjiciantur prelo.

*In Narium infantum obstructione à Muco viscido oriunda
 expetitur, quo scopo radici & alis Nasi illinitur.*

BUTYRUM RUBRUM.

Videatur Unguentum rubrum Potabile.

BUTYRUM VIRIDE.

Videatur Unguentum Viride Potabile.

CANDELÆ vel CEREOLI CHIRURGICÆ GOULARD.

Ceræ liquatæ

Adjiciatur

Extractum Saturni ;

Massæ liquidæ immittatur tenue linteum, ope Spathæ illa supra hoc extendatur, paratus hac ratione Sparadrapus in linguam latæ baseos & verticis acutissimi dissecetur, mediantibus digitis convolvatur, & inter duos afferes sive lapides politos lævigetur, crassities his cereolis ea detur, quæ cavo Urethræ respondet; varia eorum longitudo est, maxima novem pollices æquat, triplex eorum genus Illustris RICHARD præscribit, primum $\frac{1}{2}$ Extracti Saturni recipit, secundum $\frac{1}{3}$, tertium $\frac{1}{4}$.

Hi Cereoli Oleo illiti inferuntur Urethræ ad illum usque locum ubi angustata est; quæ quidem angustia quo gravior quoque magis callosa est, eo major Extracti Saturni quantitas ad instruendam candelam recipitur; cum sensibiliores per morbum Urethræ rigidiores candelas ægrius admittant, GOULARD ingredientibus recensitis $\frac{1}{2}$ Axungie Vervecinæ & totidem Olei Amygdalarum adjici jubet.

CANDELÆ CHIRURGICÆ MERCURIALES PLENCKII.

℞. Cereæ flavæ Uncias sex;

Liquatis addantur

Extracti Saturni Uncia dimidia,

Mercurii dulcis Drachmæ duæ:

Formentur inde Cereoli ratione modo dicta.

Has Candelas maxime ad revocandam Gonorrhæam suppressam commendant.

CANDELÆ FUMALES JUNCKEN correctæ.

℞. Benzoës electæ Uncias octo,

Styracis Calamitæ Unciam unam femis,

Ladani,

Olibani,

Mastychis,

Caryophyllorum ana Drachmam unam femis,

Carbonum Tiliæ Uncias sex & triginta:

Pulverisata redigantur cum

Mucilaginis Tragacanthæ quantitate sufficiente in massam, ex qua formentur parvi coni, quorum bases in tres pedes figurantur.

Vires ex nomine patent.

CASSIA cum MANNA *RICHARD.*

℞. Medullæ Cassiæ Unciam semis,
Salis vegetabilis Drachmam unam semis,
Mannæ Uncias duas :

Diffolvantur in

Aquæ fontanæ Unciis quinque.

Colatura exhibeatur pro una dosi, tanquam lenè Laxans.

CASSIA PRO CLYSTERIBUS *VAL. CORDI.*

℞. Foliorum Betæ,
Malvæ,
Mercurialis,
Parietariæ,
Violaris,

Florum Violarum ana Manipulum unum.

Incisa coquantur cum

Aquæ Unciis triginta

Ad Uncias viginti, colatura discoquatur cum

Medullæ Cassiæ quantitate sufficiente ad Consistentiam Mellis, cui Uncias duodecim æquanti addantur

Sacchari Thomæi Unciæ octodecim.

Coquantur ad Consistentiam Electuarii.

Movendæ Alvi gratia Clysteribus adjicitur ab Uncia una ad duas.

CASSIA EXTRACTA.

Videatur Pulpa Cassiæ.

CATAPLASMA ANODYNUM. *RICHARD.*

℞. Foliorum Althææ Manipulos quatuor,

Foliorum Papaveris fativi Manipulum unum,
 Hyoscyami Manipulum semis:
 Crasse contusa coquantur cum
 Lactis quantitate sufficiente ad consistentiam Pultis;
 Adjiciantur
 Olei Lini Unciæ duæ,
 Farinæ Seminis Lini Uncia una:
 Misceantur probe.
Vires ex nomine patent.

CATAPLASMA ANTISEPTICUM *PLENCKII.*

℞. Pulveris Antiseptici partes quatuor,
 Spiritus Vini Camphorati partes duas,
 Aceti Vini quantum fatis ad parandum Cataplasma.
Ad Gangrænam humidam & Tabum putridum commendatur.

CATAPLASMA EX BRYONIA *PLENCKII.*

℞. Radicum Bryoniæ Uncias tres,
 Florum Sambuci Unciam unam,
 Herbæ Cicutæ Uncias duas:
 Pulverifata coquantur cum
 Aceti quantitate sufficiente ad consistentiam Pultis, cui ad-
 dantur
 Pulveris Gummi Ammoniaci Uncia semis,
 Salis Ammoniaci Drachmæ duæ.
*Egregium Remedium esse dicitur, ad resolvendos Scirrhos,
 Scrophulas, Strumas induratas & Tumores Articulares com-
 mendabile.*

CATAPLASMA EMOLLIENS *PLENCKII.*

℞. Micæ Panis Siliginei Lacti imbutæ Uncias sex,
 Vitellorum Ovorum Numero tres,
 Pulveris Croci Drachmas duas,
 Farinæ Seminis Lini quantum fatis.

Fiat Cataplasma.

Adhibetur ad emolliendos Tumores inflammatorios nec non ad Suppurationem excitandam.

CATAPLASMA MATURANS *PLENCKII.*

℞. Farinæ Seminis Lini Uncias quatuor,
Gummi Galbani Vitello Ovi soluti Unciam unam,
Pulpæ Ceparum sub cineribus affatarum Drachmas duas,
Fermenti Panis Uncias duas,
Unguenti Basilici Unciam unam,
Olei Liliorum alborum quantum satis :

Fiat Cataplasma.

Vires nomen indicat.

CATAPLASMA MATURANS SAPONACEUM *RICHARD.*

℞. Cataplasmatidis de Mica panis Uncias sedecim.
Saponis rasi Uncias duas :

Probe misceantur.

Cum antecedente collatum minus quidem efficax est, sed minores quoque dolores excitat.

CATAPLASMA DE MICA PANIS *RICHARD.*

℞. Micæ Panis Siliginei Uncias sedecim,
Pulverum Florum Meliloti,
Sambuci ana Drachmas duas,

Coquantur cum

Lactis Unciis octo & quadraginta,

Ad consistentiam Pultis.

Relaxandi & Maturandi scopo adhibetur.

CATAPLASMA POMACEUM *PLENCKII.*

℞. Pulpæ Pomorum Uncias duodecim,
Camphoræ,
Pulveris Croci ana Scrupulum unum:
Misceantur

Médica-

CATAPLASMA. CATHOLICUM. CAUSTICUM. 73

Medicamentum ad omnem Oculorum Inflammationem peridoneum; ad Vulnus Corneæ post Cataractæ operationem deligandum multum laudatur.

CATAPLASMA RESOLVENS *PLENCKII.*

℞. Farinarum Resolventium quantum vis,
Aquæ Vegeto-mineralis octuplum:
Coquantur ad consistentiam Pultis.

Tumores inflammatorios egregie discutere dicitur.

CATAPLASMA RESOLVENS AD SCIRRHOS *PLENCKII.*

℞. Seminis Lini,
Herbæ Cicutæ ana partes æquales;
Crasso modo contusa coquantur in

Lactis octuplo

Ad consistentiam Pultis.

Tumores inflammatorios valide dissolvere dicitur.

CATHOLICUM.

Videatur Electuarium Catholicum.

CAUSTICUM ANTIMONIALE.

Videatur Butyrum Antimonii.

CAUSTICUM COMMUNE *GEBER*, POTENTIALE.

LAPIS CAUSTICUS.

℞. Cinerum Clavellatorum partem unam,
Calcis vivæ partes quatuor :

Coquantur cum

Aquæ vigecuplo

Per aliquot horas: trajiciatur liquor per filtrum, filtratus evaporetur in vase vitreo ad ficitatem, fundatur leni calore & effundatur in modulum, quo ad præparationem Lapidis Infernalis uti solent.

*Infervit ad excitandos Fonticulos & ad auferendas Excrefcen-
tias præternaturales.*

CAUSTICUM LUNARE.

Videatur Lapis Infernalis.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS *Edimburgensium.*
CAUSTICUM POTENTIALIALE, VEL COMMUNE *Suecorum.*

℞. Causticum commune *GEBER.*

Diffolvatur in

Aquæ triplo,

Adjiciatur sensim

Calcis vivæ quantum fatis, ut omnis liquor absorbeatur, &
Pasta surgat in vase obturato asservanda.

Vires nomen indicat.

CERA ARBOREA.

℞. Cerae,

Resinæ ana Uncias sedecim,

Terebinthinæ Uncias sex:

Fundantur leni igne.

Arborum Vulneribus obducitur.

CERA CITRINA.

Videatur Emplastrum Citrinum.

CERA AD CRINES *WALLBAUM.*

℞. Cerae albæ,

Unguenti Pomati ana partes æquales:

Leni calore liquata fundantur in Magdaleones.

Adhibetur ad usus Cosmeticos.

CERA VIRIDIS *KALDE.*

℞. Cerae Citrinæ Uncias tres & triginta,

Resinæ,

Terebinthinæ ana Uncias duodecim:

Mixtis & liquatis adjiciantur

Viridis Æris probe triti Unciæ duæ.

Contra Clavos pedum feliciter adhibetur.

CERATUM COSMETICUM, POMADE EN CREME
BAUMÉ.

℞. Cerae albæ,
Spermatis Ceti ana Unciam dimidiam,
Olei Amygdalarum dulcium Unciam unam:
Leni calore liquata agitentur usque dum refrigerint:
Tunc sensim affundantur
Aquaë Rosarum Drachmæ sex,
Sub perpetua agitatione reliquæ massæ commiscendæ.
Adhibetur Cosmetico scopo ad Cutim mollem reddendam & lævem.

CERATUM DETERGENS *FALCKII.*

℞. Cerae albæ Uncias quatuor,
Olei Olivarum Uncias sex:
Liquefactis admisceantur
Mercurii dulcis Unciæ duæ,
Præcipitati rubri Uncia semis:
Sacchari Saturni Uncia una:
Singula prius in tenerrimum pollinem lævigata,
Olei destillati Lavendulæ Drachma semis:
Effundantur in capsulas chartaceas quadratas, & dum refrigerint in quadrata fecentur.
Ad Ulcera Venerea Detergenda adhibetur.

CERATUM AD LABIA *Argentoratensium* correctum.

℞. Succi Uvarum,
Pomorum ana Uncias duodecim,
Butyri recentis Uncias duas & triginta:
Coquantur lento igne ad consumptionem humiditatis, per linteum trajectis addantur
Cerae albæ Unciæ sedecim,
Spermatis Ceti Uncia una:
Leni calore liquentur, sub perpetua agitatione refrigeratis immisceatur

76 CERATUM. CEREOLI. CERUSSA.

Olei destillati Lavendulæ Drachma una.

Non modo ad Fissuras labiorum & Papillæ cum successu adhibetur, sed egregie quoque contra Impetiginem facit. Quibus in hoc medicamento arridet rubedo, commendanda Radix Alkannæ.

CERATUM REFRIGERANS GALENI AMYGDALINUM
Parisiensium, EMLASTRUM AD FONTICULOS.

℞. Cerae albæ Uncias duas,

Olei Amygdalarum Uncias octo:

Liquentur leni igne, & continuo agitentur, usque dum refrigerent, tunc sensim admisceantur

Aquæ Rosarum Unciæ sex.

Qui in hoc Cerato desideratur color albus, ut obtineatur, OLEO, quod GALENUS præcipit, ROSARUM substituimus OLEUM AMYGDALARUM. Partibus, Inflammatione aut Impetigine laborantibus, pariter ac ab acris Humoribus defendendis inungitur; contra Fissuras quoque cum successu adhibetur, quin & deligandis Fonticulis usum suum præstat.

CERATUM SATURNINUM GOULARD.

℞. Cerae albæ Uncias octo,

Olei Amygdalarum Uncias octodecim :

Leni igne liquatis addantur

Extracti Saturni Unciæ quatuor:

Sub perpetua agitatione refrigeratis admisceatur:

Camphoræ, parum Olei Amygdalarum dissolutæ, Drachma una.

Ad Ulcera Callosa, Fistulosa Scrophulosa & Venerea, nec non ad Impetiginem laudatur.

CEREOLI.

Videantur Candelæ.

CERUSSA ANTIMONII BARCHUSEN.

℞. Reguli Antimonii partem unam,

Nitri partes tres:

Mixta in pulverem redacta Detonentur, Calx edulcorata affer-
vetur.

Plane non differt ab Antimonio Diaphoretico.

CHALYBS PRÆPARATUS.

Limatura Chalybis in mortario ferreo pistilli ferrei ope re-
ducatur in tenerrimum pollinem; per cribrum sericeum traje-
ctus, asservetur in vitro probe clauso.

Vires Æthiopis Martialis exserit.

CHOCOLATA.

℞. Nucum Cacao *Caraques* leviter tostarum Uncias sedecim:

In pulverem redactæ committantur mortario ferreo, pru-
nis super imposito & sub gradu caloris eo, quem manus susti-
neat, agitentur pistillo, usque dum in pastam abierint; ad-
jiciantur sub agitatione, neque remisso calore continuanda:

Pulveris Sacchari Unciæ duodecim:

Ubi nulli ulterius grumuli in Massa observantur,
Addatur

Vanillæ, cum Sacchari Drachmis tribus in pulverem tritæ,
Drachma una.

Exacte mixta Pasta committitur modulis parallelogrammis
ferreis Stanno obductis.

Chocolata, quæ nulla Aromata recipit, *CHOCOLADE DE
SANTÉ* appellatur.

Rarius hodie in Pharmacopoliis Chocolata paratur, quippe,
occupatis in ea conficienda propriis Artificibus, relinquitur pro-
prio pro paranda; Pasta instrumentorum apparatu instructis. Va-
ria his Vanillæ adjiciendæ ratio est. Si Scrupulum unum ad Li-
bram recipiunt, Chocolatam à *UNE VANILLE*, si duos à
DEUX VANILLES &c, denominare solent.

Pastam quoque ex America mittere solent, ast vero, ut-
pote non raro ex minus bonis Nucibus paratæ, præferenda
fere videtur ea quam sibi Artifices ipsi parant.

Vires Chocolatæ tribuuntur Nutrientes, Corroborantes & Demulcentes. Patent hæ vires Chocolatæ ex Nucleis unde conficitur, quippe quibus præter mite Oleum ope Sacchari in Aqua suspendendum, Adstringentis & Aromatici quid inhæret; Uncia una cum menstrui Aquosi Unciis sex pro dosi exhiberi solet.

CINERES.

Videatur Sal per incinerationem paratus.

CINERES CLAVELLATI DEPURATI.

Cineres clavellati dissolvantur aqua frigida, solutio filtrata inspissetur.

Cineres clavellati, cum non solum ab omnibus sordibus sed à Tartaro quoque Vitriolato, qui ipsis crebro immixtus est, liberentur, adhibentur ubicunque indicatio Alkali fixum adhiberi jubet. Cum autem Cineres clavellati non raro Salem communem contineant, ad usus Chemicos ista depuratio non sufficit.

CINNABARIS ANTIMONII.

Videatur Antimonii Cinnabaris.

CINNABARIS CREMOR JUNGKENII.

Cinnabaris supra Porphyriten lævigata coquatur cum Aqua in vase terreo, quæ inde superficiei aquæ supernatant cuticulæ colligantur, exsiccentur & in pulverem terantur.

Obtinetur hac ratione Cinnabaris admodum tenera, illisque maxime commendabilis, qui ex principiis mechanicis, quomodo Sanguinem subire possit, explicare conantur.

CINNABARIS FACTITIA GEBER.

R. Florum Sulphuris partem unam:

Fundantur in vase terreo, & ipsi sub perpetua ope pistilli ferrei agitatione adjiciantur

Mercurii vivi partes septem.

Ubi omnia in pulverem tenerrimum abierint, hic committatur Cucurbitæ & Sublimetur; prima sub Sublimatione si non omnis pulchre splendet & cohæret pulverisata,

Sublimetur denuo; rite Sublimata supra Porphyrigen in tenerimum pulverem trita affervetur.

Neutiquam à Cinnabari reliqua differt.

CINNABARIS NATIVA PRÆPARATA.

Cinnabaris in pulverem trita ex Cucurbita Sublimatur, ut ab omnibus heterogeneis liberetur, Sublimata supra Porphyrigen lavigatur.

De ejus viribus jam sermo fuit.

CLARETA LIQUEURS.

Parantur five ex partibus Vegetabilium cum Vino infufis, quibus Spiritus Vini quarta ratione Vini pars, & tertia Sacchari adjicitur, five ex Succis Fructuum, quibus æquæ partes spiritus Vini & duæ trientes Sacchari commifcentur, five ex Vegetalibus cum Spiritu Vini maceratis, quibus octava pars aquæ ratione Spiritus Vini additur, Spiritus calore Balnei Mariæ inde évocatur & Syrupo, qui Saccharum in pari cum Spiritu ratione habet, commifcetur; five ex partibus anaticis Aquæ deftillatæ odoratæ & Spiritus Vini, quibus mixtis eorum ponderis quarta pars Sacchari & Olei cujusdam deftillati aliquot guttæ adjiciuntur; ita CLARETUM ANISI, CINNAMOMI, MENTHÆ, PIPERIDITIS, quod EAU DE CHASSEURS appellatur &c. parari poffunt.

Claretum quovis modo paratum per Filtrum trajicitur.

Clareta vix scopo medicato exhibentur, potius voluptatis gratia bibuntur: eorum ope Digestio omnino potest juvari, fi Ventriculo cibo repleto committuntur.

Ut plurimum proprium Artificum genus circa eorum præparationem occupatum est; ufitatiffimorum parandi rationem ex Cl. MACHY *Art du Dettillateur Liquorifte* exhibeo.

CLARETUM EAU DIVINE.

Videatur Aqua divina.

CLARETUM BARBADENSE.

R. Flavedinem pomorum Citri Numero fex.

Cinnamomi Uncias duas :

Incisa & contusa infundantur per sex dies cum
Spiritus Vini Unciis ducentis quinquaginta sex, addantur
Aquæ Unciæ triginta duæ :

Ex Vesica inde destillentur Unciæ ducentæ sexaginta qua-
tuor, quibus commisceantur

Aquæ Unciæ sexaginta quatuor ,

Sacchari Unciæ centum viginti octo :

Relinquantur per quatuordecim dies & filtrentur.

Si Unciæ Spiritus modo centum viginti & octo Destillatione
eliciuntur, & Sacchari Unciis octo & quadraginta in Aquæ Un-
ciis centum octo & viginti dissolutis, edulcorantur, Liquor
CREMOR BARBADENSIS dicitur.

CLARETUM CACAO.

℞. Nucum Cacao decorticatarum & tostiarum Uncias sedecim,
Cinnamomi Unciam unam ,

Vanigliæ Drachmas duas ,

Caryophyllorum Drachmam unam ,

Contusa infundantur per octiduum in

Spiritus Vini Unciis centum octo & viginti :

Filtratis addatur

Spiritus paratus ex

Nucum Cacao decorticatarum & tostiarum Unciis duabus
& triginta ,

Cinnamomi Uncia una ,

Contusis per sex dies, infusis cum

Spiritus Vini Unciis centum viginti & octo

& unde Destillationis ope Spiritus Unciæ sexaginta & quatuor
erant elicita :

Adjiciantur Sacchari Unciæ quatuor & sexaginta dissolutæ in
centum viginti & octo Unciis Aquæ ;

Elapsis quatuordecim diebus Liquor filtretur.

CLARETUM CAFFÉE.

Paratur ut antecedens, præterquam quod Nucibus Cacao substituantur Nuges Caffée, & Aromata, Vaniglia excepta, omitantur.

CLARETUM CORONARIUM EAU de *BOUQUET*.

℞. Caryophyllorum Drachmam unam,
Ligni Rhodii Drachmas duas:
Incisa & contusa infundantur per octiduum cum
Spiritus Vini Unciis centum viginti & octo:
Destillando inde elicitis sex & nonaginta Unciis Spiritus addantur
Olei Jasmini Scrupulus unus,
Vanillæ contusæ Scrupulus dimidius,
Radicis Ireos Florentinæ contusæ Drachmæ duæ,
Sacchari Unciæ triginta duæ, in totidem Unciis Aquæ solutæ,
Ambraæ gryseæ, Saccharo tritæ, Granum unum:
Elapsis octo diebus filtrentur.

CLARETUM FLORUM AURANTIORUM, HUILE DE
FLEURS D'ORANGE *dictum*.

℞. Florum Aurantium Uncias sedecim:
Infundantur per mensem cum
Spiritus Vini Unciis sex & quinquaginta:
Coletur liquor valida expressione, adjiciantur
Sacchari Unciæ quadraginta dissolutæ in
Aquæ Unciis octo & viginti:
Elapsis quatuordecim diebus filtretur.

CLARETUM FRUCTUUM.

℞. Ceraforum dulcium maturorum partes triginta,
Ribesiorum partes duodecim,
Ruborum Idæorum partes sex:
Contundantur & infundantur per mensem cum

Spiritus Vini pari quantitate :
 Succo ope preli expressi Unciis quingentis & duodecim
 addantur
 Caryophyllorum contusorum numero quadraginta octo:
 Vanigliæ Siliqua una,
 Sacchari Unciæ nonaginta sex:
 Elapso mense Liquor filtretur.

CLARETUM DE *GARUS*.

Videatur Elixir de Garus.

CLARETUM NUCLEORUM.

℞. Nucleorum Perficorum numero centum:
 Integri infundantur per mensem cum
 Spiritus Vini Unciis duabus & triginta :
 Addantur
 Vanigliæ, Saccharo tritæ, Grana sex,
 Sacchari Unciæ octo,
 Post diem decimum quartum Liquor filtretur.

CLARETUM, HUILE DE VENUS *dictum*.

℞. Seminum Carvi Drachmas decem,
 Dauci Drachmas quinque,
 Macis Scrupulos quinque :
 Contusa infundantur per quadrimum in
 Spiritus Vini trecentis & viginti Unciis :
 Addantur
 Sacchari Unciæ ducentæ & quadraginta,
 Aquæ Unciæ centum & viginti,
 Croci quantum fatis ad colorandum:
 Filtrentur.

CLARETUM EX SEMINIBUS CARMINATIVIS, ROSSO-
 LIS DE SIX GRAINS *Parisiensium*.

℞. Seminum Anifi,

Seminum Anethi,
 Fœniculi,
 Coriandri,
 Carvi,
 Dauci Cretici ana Unciam unam:

Contusa infundantur per mensem cum
 Spiritus Vini Unciis ducentis & triginta:

Addantur
 Sacchari,
 Aquæ ana Unciæ quadraginta:

Filtrentur.

*Hoc Claretum se non tam saporis suavitate, quam virtute Car-
 miuativa commendat.*

CLYSMA CARMINATIVUM *RICHARD.*

℞. Baccarum Juniperi,
 Seminum Anisi,
 Cumini ana Drachmas duas:

Contusa coquantur in Aquæ Unciis sedecim ad remanentiam
 Unciarum duodecim, quibus dissolvatur
 Saponis Veneti Uncia dimidia.

CLYSMA COMMUNE *Londinensium.*

℞. Herbæ Malvæ Unciam unam,
 Florum Chamomillæ,
 Seminis Fœniculi ana Unciam dimidiam:

Incisa & contusa coquantur cum
 Aquæ Unciis duodecim:

Colentur.

Effectus Carminativos edit.

CLYSMA EMOLLIENS *PLENCKIT.*

℞. Lactis Vaccini,
 Olei Lini ana Uncias quatuor:

Misceantur.

*In Tenefmo, Inflammatione Intestinatorum, Uteri ac Vesicæ
sum successu injicitur.*

CLYSMA LENIENS *RICHARD.*

℞. Seminis Lini Unciam dimidiam:
Contusæ & in Aquæ Unciis decem ad Uncias sex decoctæ ad-
dantur
Olei Lini Unciæ duæ.

CLYSMA NUTRIENS *PLENCKII.*

℞. Jusculi Carnis Bovinæ.
Lactis Vaccini ana Uncias tres,
Gelatinæ Cornu Cervi Unciam unam:
Misceantur.
*Injicitur Nutrimenti loco quibus Deglutiendi impedita facul-
tas est.*

CLYSMA OPIATUM *PLENCKII.*

℞. Seminis Lini contusi Unciam unam:
Infundatur per horam cum
Aquæ fervidæ Unciis sex:
Colatura dissolvantur
Extracti Opii Grana duo.
Scopo Anodyno & Antispasmodico injicitur.

CLYSMA SIMPLEX *RICHARD.*

℞. Foliorum Malvæ Manipulum unum:
Incisus coquatur Aquæ Unciis sedecim ad Uncias duodecim:
Colatis dissolvantur
Saponis Veneti Drachmæ duæ.
Adhibetur ad referendam Alvum.

CLYSMA AD SOPOROSOS AFFECTUS *RICHARD.*

℞. Foliorum Sennæ,
Salis communis ana Unciam semis:

Incisa cum Aquæ Unciis fedecim ad Uncias duodecim decoquantur:

Colaturæ addantur

Vini Emetici turbidi Unciæ duæ.

CLYSMA TEREBINTHINATUM *PLENCKII.*

℞. Terebinthinæ Unciam dimidiam:

Dissolvatur Vitello ovi:

Addantur

Decocti Emollientis Unciæ decem,

Olei Lini Uncia una:

Misceantur.

Contra Ascarides & Ulcera Intestinorum injicitur.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM *PLENCKII.*

℞. Aquæ Cochleariæ,

Tincturæ Laccæ ana Uncias duas,

Spiritus Cochleariæ Unciam unam:

Misceantur.

Adhibetur ad Stomacacem & Aphthas Scorbuticas curandas.

COLLUTORIUM GINGIVALE, EAU DE MADAME DE
LA VRILLIERE *BEAUMÉ.*

℞. Herbarum recentium Nasturtii Aquatici Uncias sex,

Cochleariæ Uncias octo,

Flavedinis Corticum Citri Unciam unam semis,

Cinnamomi Uncias duas,

Caryophyllorum Drachmas sex,

Florum Rosarum rubrarum Unciam unam:

Incisa, contusa infundantur per viginti quatuor horas cum

Spiritus Vini rectificati Unciis octo & quadraginta:

Destillentur secundum artem.

Hoc Spiritu æquis partibus Aquæ Cochleariæ mixto Palatum colluitur.

COLLUTORIUM ODONTALGICUM *PLENCKII.*

- ℞. Radicis Pyrethri Drachmas duas,
 Salis Ammoniaci Drachmam unam,
 Extracti Opii Grana duo,
 Aceti,
 Aquæ destillatæ Lavendulæ ana Uncias duas:
 Incisa & trita infundantur calide per aliquot horas:
 Colatura fervetur.

Hujus Collutorii Cochlear unum crebrius de die Ore clauso contentum Odontalgia cariosa & rheumatica remedium esse dicitur haud spernendum.

COLLYRIUM ADSTRINGENS *RICHARD.*

- ℞. Trochiscorum alborum RHASES Drachmam unam,
 Vitrioli albi Drachmam semis,
 Sacchari Saturni Scrupulum semis,
 Aquæ Rosarum Uncias quatuor.
Ad Ophthalmiam humidam & Epiphoram adhibetur.

COLLYRIUM *LANFRANCI.*

- ℞. Auri pigmenti Drachmas duas,
 Viridis Æris Drachmam unam,
 Myrrhæ,
 Aloës ana Scrupulos duos:
 Probe tritis sensim commisceantur
 Vini albi Unciæ sedecim,
 Aquarum Plantaginis,
 Rosarum ana Unciæ tres:
 Misceantur.

Rarissime ad morbos Oculorum adhibetur, Ulcera Oris Venerea una aut altera ejus Gutta haud inepte tinguntur, injiciendo quoque contra Ulcera Venerea aliarum partium adhibetur.

COLLYRIUM RESOLVENS RICHARD.

℞. Sacchari Saturni,
 Salis Ammoniaci depurati ana Grana tria,
 Aquæ fontanæ Uncias duodecim:
 Dissolvantur
Laudatur contra Ophthalmiam Scorbuticam.

COLLYRIUM ROBORANS RICHARD.

℞. Aquæ Rosarum Uncias quatuor,
 Vini Emetici Unciam semis,
 Balsami Fioraventi Drachmas duas:
 Misceantur.
Conducit ad curandam Ophthalmiam serosam.

COLLYRIUM SAPPHYRINUM.

Videatur Aqua Ophthalmica cœrulea.

CONCHÆ CITRATÆ Ratisbonensium.

Conchis bene ablutis & in pulverem redactis affundatur iterum iterumque Succus Citri, usque dum ex affuso nulla amplius surgat effervescentia. Inde nata pasta teratur in pulverem.

Quid vero, quod hæc ratione & Conchæ & Succus Citri redantur inertes? Ego certe, quam ob causam Medicorum nonnulli has Conchas Diureticas esse voluerint, non video?

CONCHÆ PRÆPARATÆ.

Testæ Concharum abluantur primo multum diluto Lixivio vulgari dein aqua simplici, usque dum hæc cum illis aliquantisper agitata non amplius turbetur; Conchæ ablutæ exsiccentur, in pulverem terantur, supra Porphyriten lævigentur aqua. Ex pulpa inde orta, per infundibulum pennæ ope premenda, efformentur pyramidulæ.

CONDITA.

CORTICES aut *RADICES* recentes mundantur, Aqua fontana per biduum macerantur, coquuntur usque dum mollescant, defunditur inde aqua ad usum mox dicendum asservanda; ipsæ denuo aqua abluuntur, utque humor inde secedat super inversum cribrum ponuntur; commixtis deinde vasi figulino superfunditur eorum ponderis Sacchari duplum cum Aqua, in qua fuerant decoctæ, ad leviores consistentiam coctum & despumatum; elapsis aliquot diebus eximuntur Vegetabilia condienda, magis inspissatur Syrupus, & frigidus illis denuo adjicitur, quæ operatio post aliquot dies denuo repetitur.

DRUPÆ immaturæ acu perforatæ, in Aqua frigida, per sex vel octo dies singulos mutanda, macerantur; quo facto ad molliem coquuntur; & cocto Saccharo committuntur.

POMA vix matura, demto cortice & excisis feminibus, absque prævia maceratione ad molliem coquuntur & adjiciuntur Saccharo, antequam istud ad consistentiam pervenerit, ut cum eodem adhuc aliquot ebullitiones sustineant.

BACCÆ committuntur æquis partibus Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti, hoc cum inde diluatur, continuanda est coctio usque dum Saccharo consistentia Tabulandi sit restituta.

In Sacchari coctura parandis Conditis instituenda cavendum, ne ulla resideat spuma neque vas, cui Conditum committitur, nisi elapsis aliquot diebus, tegatur.

Hoc Præparatorum genus, ab Arabibus ad nos perlatum, cum hodie rarius ad usus medicatos recipiatur, Conditum ut plurimum ex Officinis Cupedinariorum petuntur.

CONFECTIO ALKERMES *MESVÆ* correctæ.

℞. Succi pomorum recentiorum Uncias sedecim:
Sacchari albi Uncias triginta,

Disso-

Dissolutis & Clarificatis addantur

Succi granorum Kermes Monspeliensis Unciæ sedecim,

Pulveris Cinnamomi Uncia semis,

Coccionellæ Drachmæ tres,

Foliorum Auri numero quinquaginta:

Agitentur Spatula lignea in vase lapideo ad Auri foliati comminutionem.

Si **COMPLETA** desideratur, addantur

Ambrae gryseæ, Saccharo tritæ, Scrupulus unus,

Mofchi, Saccharo triti, Grana decem.

Ab Arabibus etiam nimis laudatum Medicamentum, scopo Analeptico inservit. Datur ad Drachmam unam. Lapidem Lazuli, cum aliis inertibus, quæ in Veterum occurrunt Compositionibus, expunxi, non quod cum TRILLERO & multis aliis Auctoribus irritationem Primarum Viarum inde metuam, sed quia ejus vires in ea, qua hanc Confectionem ingredi solet, ratione, omnino nullæ sunt, & quia non raro ipsi Lapidem Armenum, veram utique Cupri glebam, solent substituere. Dosis Confectionis Alkermes una Drachma absolvitur.

Completa plane non differt ratione virium à CONFECTIONE ALKERMES REGIA CHARAS.

C O N F E C T I O ANISI LAXATIVA JUNGKEN.

℞. Seminis Anisi probe purgati Uncias tres,

Immittantur Aheno latiori fundo instructo; tepefactis adjiciantur

Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti Unciæ viginti quatuor

Ea lege, ut primum ejus aliquot cochlearia Semini superfundantur, & dein inspergatur Pulvis ex

Resinæ Jalappæ, nucleis Pineis probe tritæ, Drachmis tribus cum dimidia

Pulveris Cinnamomi Drachmis duabus

paratus; agitentur probe usque dum siccæ appareant; denuo

PARS II.

M

aliquot cochlearia adjiciantur & agitentur & hæc repetantur usque dum omne Saccharum adhibitum fuerit.

Hac ratione omnes CONFECTIONES SICCÆ parantur, quæ autem hodie ut plurimum à Cupedinariis petuntur.

Olim Confectio Anisi laxativa multo in usu erat, hodie cum reliquis Purgantibus Resinosi rarius usurpatur. Pueris atque illis qui alia medicamenta Laxantiâ reformidant, inservire potest. Uncia una octo circiter Grana Resinæ habet.

CONFECTIO CINNAMOMI REGIA *MYNSICHTI*,

℞. Chocolatæ Uncias quatuor,
Nucum Indicarum Conditarum Numero tres:

Probe contulis addantur

Confectionis Alkermes Uncia una,

Olei Cinnamomi Drachma femis,

Syrupi Cinnamomi Unciæ sex:

Probe omnia misceantur.

Analepticum gratissimum egregiumquæ Stomachicum hæc Confectio præbet; datur ad Drachmam unam pro Dosi.

CONFECTIO HAMECH *RHAZES* correctâ.

℞. Radicum Polypodii Drachmas octodecim,
Prunorum dulcium,
Passularum ana Uncias octo,
Myrobalanorum citrinarum Uncias sex,
Herbarum Absynthii vulgaris Unciam dimidiam,
Thymi Unciam unam,
Cuscutæ Uncias duas,
Rhabarbari Uncias duas cum dimidia,
Foliorum Sennæ Unciam unam,
Colocynthis à Seminibus purgatæ,
Agarici albi ana Drachmas octodecim,
Florum Rosarum rubrarum,
Seminum Anisi,

Seminum Fœniculi ana Drachmas sex,
 Violarum Uncias duas :

Incisa & contusa macerentur per horas viginti quatuor cum

Seri Lactis Vaccini Ducentis octoginta octo Unciis :

Deinde bulliant per horam; fiat colatura sub valida expressio-
 ne; residuum bulliat cum

Aquæ ducentis & sexaginta Uncis

per semi horam; decoctum fortiter exprimatur & priori adji-
 ciatur; omnis liquor postquam per viginti quatuor horas re-
 positus fuerit, decantetur à fœcibus, quas deposuit, & blando
 calore vaporet ad consumptionem tertiæ partis; ipsi addantur

Sacchari Unciæ octodecim,

Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, in quo dissol-
 vantur

Mannæ Unciæ duæ,

Pulpæ Cassiæ Unciæ quatuor,

Tamarindorum Unciæ quinque:

His refrigeratis, addatur & probe immisceatur Pulvis con-
 stans ex

Diacrydii Uncia una semis,

Myrobalanorum Drachmis octodecim,

Rhabarbari Drachmis tribus,

Seminis Anisi,

Spicæ Nardi ana Drachmis duabus.

*SCHULZ t. c. eam Plantis Pedum impositam ad referendam
 Alvum commendat. Ego inconcinnam compositionem omissem,
 nisi constaret, illam vel hodie adhuc ad Unciam unam usque
 morbis Cutaneis & Venereis laborantibus exhiberi, Clysmati-
 bus quoque ubi Alvus pertinaciter clausa est adhiberi.*

CONFECTIO DE HYACINTHO AVICENNÆ à Parisien-
 sibus correctæ.

℞. Pulveris Croci Unciam semis,

Syrupi Citri è toto Uncias duas & triginta:

Probe mixtis addantur

Lapidum Hyacinthi præparatorum Uncia semis,
 Oculorum Cancrorum præparatorum,
 Pulverum Terræ sigillatæ ana Unciæ tres,
 Cinnamomi Uncia una,
 Dictamni Cretici,
 Santali Citrini ana Drachmæ tres,
 Myrrhæ electæ Drachmæ duæ:

Misceantur.

Huic medicamento olim ob Gemmas, quarum plures recipiebat, vires Cordiales maxime adscribebantur, cum autem Gemmas inertes esse constet, non nisi Lapis Hyacinthi, à quo denominationem accepit, retinetur. Ita correctum in nimis Hæmorrhagiis & aliis Fluxionibus moderandis ad Drachmam integram cum fructu exhibetur.

CONFECTIO DE REBECHA RENODÆI.

Videantur Trochisci Becchici albi.

CONFECTIO UNIVERSALIS.

Videatur Electuarium Catholicum duplicatum.

CONSERVÆ.

Sunt Vegetabilia, quæ non exsiccata, ope Sacchari à corruptione defenduntur, & ita absque ulla principiorum jactura conservantur. Hoc scopo hæ substantiæ ope pistilli lignei in mortario lapideo comminuuntur in pulpam tenerrimam, cui duplum Sacchari adjicitur & tundendo cum eis miscetur exactissime.

Conservæ ex FRUCTIBUS parantur, horum pulpam per cribrum trajiciendo & cum Saccharo miscendo. Medicamenta, quæ ex Vegetabilibus ficcis ope Aquæ & Sacchari parantur, non Conservæ sunt, sed Electuaria. Si Conservarum Unciis duodecim adjiciuntur Drachmæ duæ Spiritus Vitrioli, appellantur VITRIOLATÆ.

CONSERVA. CORALLIA. CORNU. 93

CONSERVA SPAGYRICA *EMMERICI* VISCERALIS *Argentoratensium* correcta.

℞. Salis Abfynthii Uncias tres cum Drachmis sex,
Cinnamomi Drachmas duas,
Macis,
Caryophyllorum,
Zinziberis ana Drachmam unam,
Tartari Vitriolati Unciam unam & Drachmas sex,
Sacchari albi Uncias octo:

In tenuissimum Pulverem redactis addantur
Conservarum Rosarum rubrarum Unciæ sedecim,
Tunicæ Unciæ octo,
Spiritus Vitrioli Drachmæ duæ,
Oleorum destillatorum Anisi,

Citri ana Drachma una,
Fœniculi Drachma semis,
Cinnamomi Scrupulus unus,
Menthæ Guttæ quatuor:

Misceantur optime.

Laudatur ad Viscera roboranda eorumque Obstructiones referandas. Datur ad Drachmam unam.

CORALLIA PRÆPARATA.

Parantur sine prævia ablutione, in modum Concharum.

CORNU CERVI AURATUM *Noricorum*.

℞. Croci Solis *Noricorum* Scrupulos quatuor,
Cornu Cervi philosophice præparati Unciam unam:
Misceantur.

Medicamentum in Variolis, Morbillis, Febrisque malignis Sudoriferum esse & Cordiale præstare dicitur; cum autem

94 CORNU. COSMETICUM. CREMOR.

utrumque ejus ingrediens iners sit, quid inde sit sperandum, facile patet.

CORNU CERVI PHILOSOPHICE SEU SINE IGNE PARATUM *Augustanorum.*

Cornu Cervi apices coquuntur cum Aqua, usque dum mollescant, eximitur inde cultri ope medulla, separatur externus nigricans cortex, siccantur & in Pulverem reducuntur.

Quivis videt Cornu Cervi hac ratione maxima portione suæ Gelatinæ, unde omnis ejus vis medicata pendet, privatam iners omnino evasurum.

CORNU CERVI USTUM *GALENI.*

Cornua Cervina, in frustra dissecta, inter medios carbones candentes detinentur usque dum tota alba evadant, nec in diffractis ulterius aliquid nigri appareat.

Frustra ab inerti terra aliquid medicati expectatur, nec Aqua cum eo cocta plures quam ex Silice recipiet virtutes.

CORNU CERVI USTUM PRÆPARATUM.

Paratur in modum Coralliorum præparatorum.

Ad Polienda Metalla maxime adhibetur.

CORNUUM PRÆPARATIO.

Lima in scobem reducuntur, quæ in tenuissimum Pulverem, per linteum tenue trajiciendum, reducitur.

COSMETICUM CLAVII.

Videatur Magisterium Marcasitæ.

CREMOR TARTARI.

Conficitur ex CrySTALLIS Tartari in Pulverem redigendis.

CROCUS ANTIMONII.

Videatur Crocus Metallorum.

CROCUS MARTIS ADSTRINGENS.

Hoc nomine *Würtembergensibus & Brunsvicensibus* venit Vitriolum ad rubedinem calcinatum; *Parisiensibus & Argentoratensibus* Limatura Martis calcinata.

Ad Usum internum non adhibetur, sed Emplastris Exsiccantibus & Adstringentibus additur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS.

Hoc nomine venit sive secundum ZWOELFFER Ferrum ex Vitriolo dejectum & præcipitatum, quod minus bene calcinari jubent, sive præeunte LEMERY Rubigo Lota.

Calcibus evidenter Adstringentibus minus bene vires Aperientes adscribuntur.

CROCUS MARTIS APERITIVUS ANTIMONIATUS

STAHLII.

Scoriæ Reguli Antimonii Martialis reponantur in cellam usque dum in pulverem dilabantur; hic Pulvis agitetur cum Aqua, quæ inde turbida post aliquam moram defundatur; affundatur pulveri nova Aqua, agitata denuo decantetur & hæc continuentur, usque dum nova affusa Aqua inde ulterius parum aut plane non turbetur; hæ aquæ turbidæ inter se confusæ reponantur in quietem, Pulvis inde secedens Detonetur cum Nitri triplo, & edulcoratus asservetur.

Hoc Medicamentum in Hæmorrhagiis Uteri, Hæmorrhoidum nimio Fluxu, Diarrhæa, Febris intermittentibus, laudabilem & præsentaneam sæpe operam navare STAHLIUS testatur; se ipsum in Lochialibus Puerperarum turbis, Spasticis etiam, nec non in Atrophicis Puerorum affectibus perfræquenter Croco hoc usum esse affirmat, quin ipsi Cortici peruviano longissime præse-

rendum ducit. Ultra Grana sex ejus Dofin non extendendam volunt.

CROCUS METALLORUM *QUERCETANI.*
CROCUS ANTIMONII.

Est Hepar Antimonii Aqua fervida edulcoratum.

Vehemens Emeticum nunquam in substantia præbendum.

Grana tria vel quatuor per noctem in Vini Unciis duabus infusa Vinum virtute Emetica imbuunt. Veterinarii ad Equos Purgandos pro una dofi ad Unciam femis imo ad Drachmas sex devorandum exhibent.

CROCUS SOLIS *Noricorum.*

Rz. Nitri depurati Uncias decem,
Aluminis Uncias octo,
Salis communis Uncias quinque,
Foliorum Auri Unciam femis :

Mixta terantur usque dum Aurum disparuerit ; dissolvantur Aqua fervida ; solutioni adjiciatur Oleum Tartari per deliquium ; Aurum inde dejectum Aqua fervida probe edulcoretur, & dein in Crucibulo calcinetur, usque dum colorem violaceum induerit.

Vires Cordiales & Bezoardicas, quas olim huic Calci affixerunt ; nullas esse, hodie uberrime est evictum.

CRYSTALLI LUNÆ.

Videatur Lapis Infernalis.

CRYSTALLUM MINERALE.

Videatur Lapis Prunellæ.

CRYSTALLUS MONTANA PRÆPARATA.

Fragmenta Crystalli montanæ ignita Aqua extinguantur, reducantur in Pulverem, & tractentur ut sub Coralliis dictum fuit.

CUPRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Specificum Antepilepticum *WEISMANN.*

DECO-

DECOCTUM ALBUM *SYDENHAMI* correctum.

℞. Rafuræ Cornu Cervi,
 Micæ Panis Tritici albissimi ana Unciam semis :
 Coquantur ex
 Aquæ fontanæ Unciis triginta sex,
 Ad residuas Uncias quatuor & viginti:
 Colatura dissolvantur
 Gummi Arabici Drachma una semis,
 Sacchari Drachmæ duæ.
In Febris ad Æstum Sitimque refrenandam laudatur.

DECOCTUM AMARUM *Parisiensium*,

℞. Radicis Gentianæ Drachmas duas :
 Bulliant per horæ semiquadrantem in
 Aquæ communis Unciis octo & quadraginta:
 Tum addantur
 Summitatum Centaurei minoris,
 Herbarum Cardui benedicti,
 Scordii,
 Flavedinis Corticum Citri recentis ana Drachmæ duæ,
 Infundantur in vase tecto usque dum Decoctum frigidum eva-
 ferit, quod deinde decantetur.
*Bibitur per Cyathos pro roborandis Primis Viis & reserandis
 Visceribus Abdominalibus.*

DECOCTUM ANTIPSORICUM *Suecorum*.

℞. Rafuræ Lignorum Guajaci sesqui Unciam,
 Juniperi Unciam unam,
 Radicis Chinæ confissæ Unciam semis :
 Immittantur in
 Aquæ fontanæ Uncias septuaginta duas:
 Addantur
 Argenti vivi,
 Antimonii contusi ana Unciæ sex :

Sacculo linteo inclusa coquantur ad dimidium; sub finem Addatur

Radiciſ Liquiritiæ Uncia femis:

Cum ſemel adhuc ebulliverint, colentur.

Pro Sanguine depurando, in morbis Scabioſis & Venereis conducit.

DECOCTUM ANTISCORBUTICUM *RICHARD.*

℞. Radicum Raphani ruſticiſ Uncias duas:

Coquantur per horæ quadrantem ex

Aquæ Unciis octoginta:

Tunc addantur

Herbarum recentium Beccabungæ,

Nafurtii aquatici,

Cochleariæ,

Acetofæ ana Pugilli duo,

Paululum coquantur, colentur & addantur

Aceti Unciæ quatuor.

Exhibetur per Cyathos.

DECOCTUM ANTIVENEREUM *Ulyſſiponenſe.*

℞. Lignorum Santali albi,

rubri ana Uncias tres,

Rhodii,

Guajaci,

Saffraſ ana Unciam unam,

Radiciſ Sarſaparillæ Uncias tres,

Antimonii Uncias duas,

Corticum Mezeræi Unciam dimidiam:

Incifa & contuſa infundantur per nycthemerum cum

Aquæ fontanæ bullientis Unciis centum & viginti:

Coquantur deinde ad dimidium, ſub finem adjiciatur

Radiciſ Liquiritiæ Uncia dimidia:

Colentur.

Multum tam ad Luem Veneream curandam, quam ad auferenda mala, quæ curam Mercurialem excipere ſolent, laudatur. Ejus Unciæ octodecim ad quadraginta octo uſque de die exhibentur.

DECOCTUM ANTIVENEREUM LAXANS *Parisiensium.*

℞. Rafuræ Ligni Guajaci ,
 Radicum Sarsaparillæ ,
 Chinæ ana Drachmas duas ,
 Antimonii Unciam unam :
 Incifa & contufa coquantur ex
 Aquæ fontanæ Unciis duabus & triginta
 Ad remanentiam Unciarum quatuor & viginti :
 Tum addantur
 Radicum Polypodii Uncia femis ,
 Rhabarbari electi Drachma femis ,
 Liquiritiæ ,
 Foliorum Sennæ fine ftipitibus
 Ligni Saffrafras ana Drachma una ,
 Salis Tartari Grana quatuor ,
 Seminis Coriandri Drachma dimidia :

Incifa & contufa infundantur per noctem , mane femel bul-
 liant & deinde colentur

*Hoc Decoctum ufui Mercurii interponitur, integra Dofis de die
 hauritur, augendæ etiam apud robustiores funt Purgantium rationes.*

DECOCTUM AVENACEUM *LOWERI.*

℞. Avenæ excorticatæ Uncias tres ,
 Ligni Santali rubri incifi Drachmas duas :
 Coquantur cum
 Aquæ fontanæ Unciis duabus & feptuaginta
 Ad trientis confumptionem, Colaturæ addantur
 Nitri depurati Drachmæ duæ ,
 Sacchari albi Uncia una.

Humores diluit, Æftum temperat, pro Potu ordinario affumi poteft.

DECOCTUM CHINÆ RADICIS *Suecorum.*

℞. Radicis Chinæ ,
 Paffularum minorum ana Unciam unam :
 Incifa coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis duabus & septuaginta:
Ad confumptionem quadrantis. Colentur

Ad Sanguinem temperandum aliquot ejus Cyathi hauriuntur de die.

DECOCTUM CITRI *MYNSICHTI.*

℞. Malorum Citri Numero quinque,
In taleolos tenues & rotundos secta coquantur
Aquæ fontanæ Unciis duabus & septuaginta

Ad confumptionem trientis :

Colatura dissolvantur

Sacchari albissimi Unciæ quatuor.

Decoctum gratissimum in omni Febrium genere, nec non in morbis Biliofis pro Potu ordinario bibitur.

Si loco Aquæ Decoctum Hordei aut Cornu Cervi recipitur, fergit DECOCTUM HORDEI aut CORNU CERVI CITRATUM.

DECOCTUM COMMUNE, SIVE PTISANA COMMUNIS

Parisiensium.

℞. Hordei depurati Uncias duas,
Radici Graminis incisæ Unciam unam :

Coquantur ex

Aquæ fontanæ centum octo & viginti Unciis

Ad residuas Uncias sex & nonaginta :

Sub finem cocturæ addatur

Radici Liquiritiæ incisæ Uncia semis :

Coletur.

DECOCTUM DIURETICUM *RICHARD.*

℞. Radicum Petroselini,
Fœniculi ana Unciam unam,

Seminum Dauci sylvestris,

Fructuum Alkekengi ana Unciam semis :

Incisa & contusa coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis sexaginta,

Ad residuas Uncias octo & quadraginta :

Sub finem addantur

Herbæ Parietariæ Manipulus unus,
Passularum majorum incisarum Uncia femis:

Colatura dissolvantur

Nitri depurati Drachmæ duæ.

DECOCTUM FEBRIFUGUM *RICHARD.*

℞. Corticis Chinæ electi Uncias duas:

Coquantur per dimidiam horam cum

Aquæ Unciis sex & nonaginta:

Colatura dissolvatur

Nitri depurati Drachma una.

Quater de die exhibetur Cyathus ad pellendam Febrem.

DECOCTUM SEU APOZEMA FEBRIFUGUM LAXANS

RICHARD.

℞. Corticis Chinæ electi & crasse contusi Uncias duas:

Coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis nonaginta sex,

Ad residuas Uncias quatuor & septuaginta:

Sub finem addantur

Herbarum recentium Cichorii fylvestris,
Endiviæ ana Pugilli duo,

Foliorum Sennæ Uncia dimidia:

Colaturæ adjiciantur

Salis mirabilis Glauberi Uncia femis,

Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro Unciæ duæ.

Priori substituitur, ubi suspicio est, Viscera Abdominalia non omnino esse libera.

DECOCTUM AD FUNGOS ARTICULORUM *HEISTERI.*

℞. Lithargyrii Uncias sex,

Boli Armenæ Unciam unam,

Mastiches,

Myrrhæ ana Unciam dimidiam,

Aceti Uncias quatuor & viginti:

Mixta coquantur leni igne per dimidiam horam.

Applicatur sub forma Fomenti.

DECOCTUM HORDEI CITRATUM.

Videatur Decoctum Citri.

DECOCTUM HORDEI *Suecorum.*

℞. Hordei integri Uncias tres,
 Radicum Graminis concifarum Unciam unam,
 Aquæ fontanæ Uncias centum & viginti:
 Coquantur ad Uncias usque nonaginta sex:
 Colaturæ si addantur Oxymellis simplicis Unciæ quatuor,
 ACIDULATUM dicitur.

*In Febris, Hæmorrhagiis, Fluxibus Alvi, Morbis biliosis
 &c. in Potus ordinarii vicem cum summo successu bibitur.*

DECOCTUM IPECACUANHÆ PISONIS.

℞. Radicis Ipecacuanhæ crasse contusæ Drachmas duas:
 Decoquantur lento igne ex
 Aquæ fontanæ Unciis quatuor
 Ad trientis consumptionem:
 Coletur.

Residuum rursus coquatur ex

Aquæ Unciis quatuor; ut antecedens coletur.

Denuo decoquatur residuum, modo dicta ratione.

Decocta singula dentur pro Dosi Dysentericis tribus diebus continuis.

DECOCTUM LAPATHI *RICHARD.*

℞. Radicum Lapathi acuti Uncias duas,
 Enulæ Campanæ,
 Baccarum Juniperi ana Unciam semis:
 Incisa & contusa coquantur ex
 Aquæ Unciis duabus & septuaginta
 Ad dodrantis evaporationem:
 Sub finem addatur

Herbæ Fumariæ incisæ Manipulus unus :
Colentur.

In morbis Cutaneis ad Sanguinem depurandum per Cyathos exhibetur.

DECOCTUM LIGNORUM *Brunsvicensium.*

℞. Rafuræ Ligni Guajaci
Juniperi,
Radicum Bardanæ ana Unciam unam semis,
Scrophulariæ,
Stipitum Dulcamaræ,
Herbæ Saponariæ cum toto ana Unciam semis:

Incisa coquantur cum

Aquæ fontanæ Unciis centum & quadraginta quatuor ad dimidias:

Sub finem coctionis addantur :

Rafuræ Ligni Saffras Uncia semis,
Radicis Liquiritiæ incisæ,
Seminis Anisi contusi ana Drachmæ duæ. Colentur.

Ad Sanguinem depurandum aliquot Cyathi de die bibuntur.

DECOCTUM PECTORALE *Parisiensium.*

℞. Oryzæ mundatæ Unciam unam:

Coquatur cum

Aquæ fontanæ centum viginti octo Unciis ad crepaturam

Oryzæ:

Cum hoc Decocto infundantur per horæ quadrantem

Radicum Liquiritiæ incisæ,
Althææ incisæ ana Uncia semis,
Herbæ Capillorum Veneris Canadensis conscissæ,
Florum Farfaræ ana Drachmæ duæ,
Papaveris Rhæados incisorum Drachma una.

Liquor decantatus in affectibus Pectoris spasticis ex vasculis infuso Theæ dicatis aliquoties de die hauritur.

DECOCTUM SUDORIFERUM *RICHARD.*

℞. Ligni Guajaci Uncias duas:

Radicum Sarfaparillæ,

Radicum Chinæ ana Unciam semis,
Antimonii crudi Uncias duas:

Incisa & contusa macerentur per nycthemerum in
Aquæ calidæ Unciis sex & nonaginta,
Bulliant in vase obturato horæ unius spatîo, tunc adjiciantur
Rasuræ Ligni Sassafras Uncia una,
Radicum Caryophyllatæ incisarum Uncia semis,
Baccarum Juniperi contusarum Drachmæ duæ:
Bulliant adhuc per horæ quadrantem, deinde colentur.

*In Affectibus Venereis, Catarrhalibus & Cutaneis aliquot
ejus Cyathi hauriuntur.*

Si sub finem coctionis adjicitur Foliorum Sennæ incisorum
Uncia una, surgit DECOCTUM SUDORIFICUM LAXANS.
Ejusdem conferantur Species pro Decoctis.

DENTIUM PRÆPARATIO.

Eodem modo quo Coralliorum præparatio instituitur.

DIACRYDIUM, DACRYDIUM.

Est Scammoneum usui interno adaptatum. Veteres illud
ex Decocto Glycyrrhizæ vel Infuso Rosarum suspendere, ortam
inde Emulsionem ad formam Extracti evaporare, vel in pul-
verem redactum vaporibus Sulphuris exponere soliti, corrigi
his rationibus ejus virulentiam putarunt. Hinc DIACRY-
DIUM GLYZYRHIZATUM, ROSATUM, SULPHURA-
TUM præscripserunt. Verum enim vero omnes has ita dictas
correctiones inanes esse experientia docuit. Itaque hodie sub
nomine DIACRYDII non nisi Scammoneum in pulverem tri-
tum prostat, quod usus tempore cum Nucleis Pineis teritur.

DIACODION *MONTANI.*

Videatur Syrupus Diacodii,

DIACYDONIUM AROMATICUM *MESUE* correctum.

℞. Succi Cydoniorum Uncias centum quadraginta & quatuor,
Sacchari albi Uncias duas & septuaginta:

Coquan-

Coquantur ad consistentiam Syrupi tenuioris, cui Clarificato
& adhuc tepenti adjiciantur

Pulverum Nucum Moschatarum,
Cinnamomi ana Unciæ quatuor,
Caryophyllorum,
Zinziberis,
Galangæ ana Unciæ duæ,
Nardi Celticæ,
Piperis nigri,
Macis,
Zedoariæ,
Cubebæ,
Cardamomi minoris ana Uncia una:

Probe misceantur.

Exhibetur ad roborandum Ventriculum & sistendos Alvi fluxus, nec non Vomitus.

DIACYDONIUM JALAPPINUM.

℞. Diacydonii simplicis Uncias duas & triginta,
Resinæ Jalappæ, Nucleis Pineis tritæ, Uncias duas:
Diu inter se invicem agitentur, ut æqualiter Resina per omne
volumen Diacydonii dispergatur.

*Optime Resina Jalappæ Scammoneo, quod VALERIUS COR-
DUS præscribit, substituitur. Hoc medicamento olim Nostrates
loco Purgantis polychrestæ utebantur; aqua solutum infantibus
æque ac adultis exhibetur.*

Uncia semis Resinæ Grana quindecim vehit.

DIACYDONIUM LUCIDUM JALAPPINUM.

Diacydonii simplicis ad consistentiam cocti & adhuc tepen-
tis Unciis quatuor & sexaginta commiscetur

Resinæ Jalappæ in Spiritus Vini Rectificati Unciis duodecim
dissolutæ Unciæ quatuor:

Effundatur in modulos & refrigeratum committatur scatulis.

Pars II.

O

106 DIACYDONIUM. DIAPHORETICUM.

Olim per se deglutiendum eadem ac antecedens dosi exhibebatur; hodie merito evituit, cum oculis quidem neutiquam autem linguæ gratum sit. Hic quoque melius Resina Jalappæ, quam Scammoneum, quod WELSHIUS præcipit, recipitur.

DIACYDONIUM SIMPLEX LUCIDUM *GALENI* VEL
GELATINA CYDONIORUM.

℞. Cydoniorum, unde linteï ope omne tomentum ablatum fuit, Uncias centum viginti & octo :

Scindantur in taleolas & omnia Semina inde auferantur; coquantur ex Aqua usque dum emollita fuerint, committantur cum Aqua facco, & valde exprimantur;

In Liquore expresso dissolvantur

Sacchari Unciæ sex & nonaginta,
Clarificentur aliquot Albuminibus Ovorum; Liqueor clarificatus leni calore evaporetur, usque dum aliquot ejus Guttæ disco frigido instillatæ in modum Gelatinæ consistant, tunc committatur ollis, non nisi Gelatina refrigerata operiendis.

Et Gustus voluptati & roborando Ventriculo & cohibendis Alvi fluxibus inservit.

DIAPHORETICUM JOVIALE,

Videatur Antihecticum POTERII.

DIAPHORETICUM SEU BEZOARDICUM MARTIALE.

Videatur Bezoardicum Martiale.

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM *PLENCK.*

℞. Terebinthinæ claræ Uncias duas :

Subigantur

Vitelli Ovorum Uncia una :

Addantur

Mellis Unciæ duæ,

Aquæ fontanæ Unciæ quatuor,
Spiritus Vini Unciæ sex:

Misceantur.

Calide injectum in Vulnera profunda, angusta, sinuosa & sclopetaria Suppurationem movet & detergit.

EBUR USTUM ALBUM SEU SPODIUM VALERII CORDI.

Ebur in tenues lamellas dissectum igne aperto calcinetur ad albedinem; Calcinatum reducatur in pulverem super Marmore lævigandum.

Cum Cornu Cervi usto Preparato convenit.

EBUR USTUM NIGRUM.

Fragmentis Eboris repletur olla, quæ operculo, Limi ope, probe tegitur & fornaci figuli per omne tempus, quo vasa Argillacea uruntur, committitur; ustum in modum antecedentis lævigatur.

Artifices eo ad tingendas varias substantias utuntur.

ECLEGMA.

Videatur Loch.

ELÆOSACCHARA.

Parantur cujuscunque Olei destillati Guttas decem cum Uncia una pulveris Sacchari albissimi probe terendo.

Ufus demum tempore parentur.

ELÆOSACCHARA AURANTIORUM VEL CITRI, ESSENTIÆ SICCÆ *Brunsvicensium.*

Optime parantur, dum Poma Aurantium vel Citri Saccharo albissimo affricantur, cui quod inde abhæret madidum abraditur.

Integerrimum, quod horum Pomorum Corticum cellulis continetur, Oleum, cum hac ratione Saccharum subeat, præferenda

hæc operatio priori videtur, cum Destillatio his oleis semper aliquid suavitatis adimat.

ELÆOSACCHARUM MYRRHÆ HOFFMANNI.

R. Extracti Myrrhæ aquosi Drachmam unam,
Pulveris Sacchari albissimi Unciam unam: .
Misceantur probe.

Improprie hoc Medicamentum Elæosaccharum vocari, nemo non videt.

ELATERIUM HIPPOCRATIS.

Cucumeres Afinini, antequam penitus maturuerint, collecti in taleolas scindantur, rejiciantur, quæ ipsis inhærent, Semina, contundantur in mortario lapideo, committantur sacco, valide exprimantur, Succus expressus leni calore usque ad consistentiam Extracti evaporet.

Hoc Medicamentum Humores præcipue Serosos violenter per Alvum educit, in Hydrope aliis Purgantibus ad Grana tria vel quatuor additur. HIPPOCRATEM, GALENUM aliosque Veteres Medicos deficientibus quippe tunc mitioribus Purgantibus frequenter eodem usos esse constat, sed nostra ætate in tanta meliorum & tutiorum Cathartorum copia, anceps hoc & violentum Remedium rarius in usum trahitur.

ELECTUARIUM ANTHELMINTICUM HEISTERI.

R. Mercurii vivi Unciam semis:
Probe teratur cum

Gummi Arabici Uncia una:

Affundendo paulatim Aquam fontanam, usque dum Mucilago surrexerit, in qua nulli ulterius Mercurii globuli appareant, Tunc addantur

Corticis Chinæ tenuissime pulverisati Uncia una,

Syrupi Menthæ quantum satis ad consistentiam Electuarii mollis.

*Exhibetur aliquoties de die Dosis, quæ Avellanam æquat.
Vires ex nomine patent.*

ELECTUARIUM ANTIFEBRILE TRILLERI.

℞. Pulverum Corticis Chinæ optimi Unciam unam,
Florum Chamomillæ vulgaris Drachmas duas,
Nitri depurati,
Diaphoretici Martialis ana Drachmam unam,
Syrupi Corticum Aurantium quantum satis:

Misceantur in Electuarium:

Asseverat TRILLERUS hoc perquam eximium Electuarium Antipyreticum jam per annos plus minus quadraginta semper votis suis & expectationi ita respondisse, ut sexcenti pene agroti omnis generis Febribus Intermittentibus conflictati ipsius singulari virtute pristinæ sanitati integræ & perfectæ tandem sint restituti, sibimet ipsi totique suæ familiæ imo sæpius tenerrimæ ætati adeo feliciter aliquoties obtigisse, ut etiam in Febribus pertinacissimis & justo longiore circuitu inordinate nonnunquam reversis hoc remedium auxilium tulerit præsentissimum & præstantissimum; hinc se ejus laudes singulari Carmine Eucharistico celebrasse, quod exstat in Poematum suorum Physico-Ethicorum T. III. p. 280.

ELECTUARIUM e BACCIS LAURI RHAZES.

℞. Baccarum Lauri Unciam unam semis,
Radiciis Calami Aromatici Drachmas duas,
Herbarum Rutæ,
Menthæ,
Origani,
Seminum Ammeos
Cumini,
Nigellæ,

Seminum Ligustici,
 Carvi,
 Dauci,
 Piperis nigri,
 longi,
 Castorei ana Drachmas duas,
 Sagapeni Unciam semis,
 Opoponacis Drachmas tres:
 Omnia trita excipiantur,
 Mellis despumati Unciis quatuordecim.
Adjicitur Clysmatibus ad Unciam unam pro Dosi.

ELECTUARIUM CATHOLICUM PRÆPOSITI.

℞. Radicis Polypodii Uncias sex:
 Coquantur ex
 Aquæ fontanæ Unciis octo & quadraginta
 Ad consumptionem quartæ partis:
 In Colatura dissolvantur
 Pulparum Cassiæ,
 Tamarindorum ana Unciæ quatuor,
 Sacchari Unciæ octo & quadraginta:
 Coquantur lento igne ad consistentiam Mellis, tum addantur
 sensim
 Pulverum Radicum Polypodii,
 Rhabarbari veri ana Unciæ duæ,
 Liquiritiæ Drachmæ duæ,
 Foliorum Sennæ Unciæ quatuor,
 Florum Violarum,
 Seminis Anisi ana Unciæ duæ:
 Misceantur.
*Blande Alvum laxat ad Unciam unam exhibitum. Admi-
 scetur etiam Clysmatibus.*

ELECTUARIUM CATHOLICUM PRO CLYSTERIBUS
 VERNII correctum.

℞. Radicum Polypodii Uncias sex,

Herbarum Malvæ,
 Mercurialis,
 Parietariæ,
 Violaria ana Manipulos duos:

Incisa coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis centum quadraginta & quatuor,

Ad tertiæ partis consumptionem; Colatura dissolvantur

Mellis Unciæ sex & nonaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, quo dissolvantur,

Pulpæ Prunorum Unciæ quatuor & viginti:

Addantur sensim

Pulverum Radicum Polypodii,

Rhabarbari ana Unciæ quatuor,

Liquiritiæ Uncia semis,

Foliorum Sennæ Unciæ octo,

Florum Violarum Unciæ quatuor,

Seminum Fœniculi,

Quatuor Frigidorum majorum ana Uncia

una,

Anisi Unciæ quatuor:

Misceantur.

Immiscetur ad Uncias duas usque Clysmatibus Laxantibus.

ELECTUARIUM CATHOLICUM DUPLICATUM RHA-
 BARBARO SEU CONFECTIO UNIVERSALIS LE-
 MERY correctâ.

℞. Radicis Polypodii incisæ Uncias octo:

Coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis sex & nonaginta ad dimidiæ partis
 consumptionem:

Colatura Emulgeantur

Seminum quatuor Frigidorum majorum ana Uncia semis,

Violarum Unciæ duæ:

Denuo colatis dissolvantur

Sacchari albi Unciæ octo & quadraginta:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui addantur sensim
 Pulparum Cassiæ,
 Tamarindorum,
 Pulverum Rhabarbari electi,
 Foliorum Sennæ mundatorum ana Unciæ quatuor,
 Seminis Anisi Unciæ duæ,
 Glycyrrhizæ Uncia una:

Probe misceantur.

Scopo Eccoprotico ad Unciam unam pro Dosi exhibetur, commendabatur olim præcipue Fluxibus Alvi laborantibus.

ELECTUARIUM CHALYBEATUM *BARZONI.*

℞. Alcoholis Limaturæ Martis Uncias septem,
 Specierum Aromaticarum Rosatarum,
 Pulverum Cinnamomi,
 Nucum Moschatarum ana Drachmas sex,
 Rhabarbari Unciam semis,
 Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti,
 Mellis despumati ana Uncias duodecim,
 Misceantur.

Hoc Medicamentum ad Mensium retentionem & ad Cachexiam ad Drachmam unam, quæ Martis Granis duodecim constat, præscribitur.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

Videatur Electuarium Gingivale.

ELECTUARIUM DIASATYRIUM *NICOLAI* correctum.

℞. Radicum Satyrii recentium Uncias quatuor:
 Minutim incisæ contundantur cum

Saccha.

Sacchari ad consistentiam Tabulandi cocti Unciis duodecim:
per fetaceum trajectæ probe contundantur cum

Nucis Indicæ conditæ,

Zinziberis conditi,

Pinearum,

Pistaciorum ana Uncia una:

Probe comminutis addantur

Pulverum Caryophyllorum aromaticorum,

Cinnamomi,

Stincorum marinorum ana Uncia semis,

Brodii Zinziberis conditi quantum fatis ad consistentiam
Electuarii.

Analepticas & Roborantes vires huic Electuario nemo denegabit, sed frustra inde expectatur, ut Venerem languentem excitet & Semen augeat.

ELECTUARIUM DIASCORDIUM FRACASTORII.

℞. Radicum Bistortæ,

Tormentillæ,

Gentianæ ana Unciam semis,

Zinziberis Drachmas duas,

Herbarum Dictamni Cretici Unciam semis,

Scordii Unciam unam,

Seminis Acetosæ Drachmam unam semis,

Cinnamomi,

Cassiæ lignæ ana Unciam semis,

Piperis longi Drachmas duas,

Boli Armenæ Unciam unam semis,

Terræ Lemniæ Unciam semis,

Gummi Arabici,

Galbani,

Styracis ana Unciam semis:

Probe pulverifatis & mixtis addantur:

Pars II.

P

Conservæ Rosarum Unciæ duodecim,
 Mellis Unciæ triginta,
 Opii, in Vini Hispanici Unciis tribus soluti, Drachma una
 femis:

Optime omnia misceantur.

*Sudorifera, Alexipharmaca, Anodyna & Styptica virtute
 commendatur, hinc ad Diarrhœam & Dysenteriam quoque si-
 stendam laudatur. Datur ad Drachmas duas vel tres. Uncia
 integra duo circiter Grana Opii vehit.*

ELECTUARIUM DIASCORDIUM *Suecorum* CONFECTIO JAPONICA *vulgo.*

℞. Terræ Japonicæ Uncias tres,
 Herbæ Scordii,
 Fabarum Pechurim,
 Radicis Tormentillæ ana Uncias duas:

Probe pulverifatis addantur

Opii, in Vino Hispanico dissoluti, Drachma una femis,
 Syrupi Rosarum Unciæ viginti octo:

Probe misceantur.

*In sopiendis Alvi fluxibus, antecedente potentius operatur,
 Uncia una tria Grana Opii fere habet.*

ELECTUARIUM DIATRAGACANTHÆ.

℞. Aquarum Pæoniæ Uncias duas;
 Menthæ,
 Melissæ,
 Syrupi Papaveris Rhœados,
 Pulverum Sacchari ana Unciam unam,
 Gummi Tragacanthæ electæ Drahmas duas:

Misceantur.

*Hanc Pulticulam mulierculæ Argentoratenses infantibus pro-
 sopiendis, Torminibus solept exhibere.*

ELECTUARIUM GINGIVALE VEL DENTIFRICIUM.

Argentoratensium.

℞. Lapidis Pumicis præparati,
 Cremoris Tartari ana Unciam semis,
 Aluminis usti Scrupulos quatuor,
 Coralliorum rubrorum præparatorum Drachmas tres,
 Myrrhæ electæ Drachmam unam:

In tenerrimum pulverem tritis commisceatur
 Pulveris Coccionellæ Drachma una, probe trita cum
 Salis Tartari Scrupulo uno:

Omnia excipiantur

Mellis Rosarum Unciis duabus:

Addantur

Quintæ Essentiæ Citri Guttæ decem:

Misceantur.

Vires ex Denominatione patent.

ELECTUARIUM AD GINGIVAS TRILLERI.

℞. Radicum Tormentillæ Drachmam unam semis,
 Caryophyllatæ Drachmam unam,
 Ireos Florentinæ Drachmam semis,

Herbarum Salviæ,

Abrotani,

Rutæ,

Florum Aquilegiæ,

Rosarum rubrarum,

Balaustiorum ana Drachmam unam,

Seminum Cochleariæ,

Aquilegiæ ana Drachmam unam semis,

Mumiæ veræ,

Myrrhæ electæ ana Drachmam unam,

Gummi Mastichis,

Laccæ ana Drachmas duas,

Sanguinis Draconis Drachmam unam femis,
 Aluminis usti Drachmam femis:
 Probe pulverifata excipiantur
 Mellis Rosati quantitate sufficiente.

Testatur Venerandus Auctor, se hoc Electuario Ulotico seu Epulotico sæpius insigni cum successu olim usum esse in Dentibus vacillantibus & malefidis firmandis, Gingivis tabescentibus ac cruentis consolidandis & sanandis, fœdis oris Ulceribus Abstergendis, Halitu denique fœtido corrigendo & purificando.

ELECTUARIUM HAMECH.

Videatur Confectio Hamech.

ELECTUARIUM HIERA PICRA *ANDROMACHI.*

℞. Pulverum Aloës Uncias quatuor,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Spicæ Indicæ,
 Afari,
 Ligni Aloes ana Drachmas sex,
 Mellis Uncias viginti:

Misceantur probe.

Multus est GALENUS circa hoc medicamentum, quod hinc quoque vulgo ab ipso solet denominari, & circa rationem Aloës pro varia indicatione mutandam. Hodie vero ejus usus nullus est, nisi ad Clysteres, quibus ad Drachmas sex commiscetur.

ELECTUARIUM HYDRAGOGUM SEU PURGANS *Austriacorum correctum.*

℞. Rob Ebuli,
 Juniperi ana Uncias duas,
 Syrupi de Spina Cervi Unciam unam,
 Pulverum Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, fefqui drachmam,
 Tartari vitriolati Drachmas sex:

Misceantur exactissime.

Alvum valide ducit, aquas Hydropicorum evocat. Uncia una ad quindecim Grana Resinæ Jalappæ vehit. Uncia semis ad Drachmas sex potest pro dosi dari.

ELECTUARIUM PRO INFANTIBUS *Danorum.*

℞. Magnesiæ albæ Drachmas sex,
Pulverum Seminis Anisi Semunciam,
Crocī Drachmam unam,
Syrupi Cichorei cum Rhabarbaro quantum sufficit pro formando Electuario.

Infantibus ob Tormina ejulantibus exhibetur. Dosis est parvum Cochlear.

ELECTUARIUM JOVIALE AD TAENIAS *Brunsvicensium.*

℞. Stanni purissimi,
Mercurii vivi ana Unciam unam:
Fiat secundum artem Amalgama, cui commisceatur

Concharum præparatarum Uncia una:
Exactissime mixtis addantur
Conservæ Absynthii Unciæ tres,
Syrupi Menthæ quantum fatis formando Electuario.

Vermibus laborantibus bis de die exhibentur, Electuarii Drachmæ duæ,

ELECTUARIUM LENITIVUM SIVE TAMARINDORUM
Austriacorum.

℞. Pulpæ Tamarindorum,
Prunorum ana Uncias octodecim,
Rob Sambuci Uncias duodecim,
Pulveris Foliorum Sennæ Uncias sex,
Cremoris Tartari Uncias quatuor,
Mellis quantum fatis, ut fiat Electuarium.

Omnino præferendum sequenti, cui virtutibus par, sed concinnitate superius est.

ELECTUARIUM LENITIVUM FLORENZOLÆ.

- ℞. Radicum Polypodii Uncias duas,
 Glyzyrrhizæ Unciam semis,
 Herbarum Adianthi nigri,
 Mercurialis ana Unciam unam,
 Florum Violarum Unciam semis,
 Hordei decorticati,
 Passularum minorum ana Uncias duas,
 Jujubarum,
 Sebesteni ana Unciam unam:
 Incisa & contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ Unciis triginta, ad Uncias duodecim re-
 fiduas:
 Colentur & addantur
 Pulpæ Cassiæ,
 Prunorum,
 Tamarindorum,
 Sacchari albi,
 Conservæ Violarum ana Unciæ sex,
 Pulveris Foliorum Sennæ Unciæ tres semis:
 Misceantur exacte.

Refert TRILLERUS, hoc Electuarium, licet rarus ejus hodie, nec nisi in Enematibus usus sit, blande tamen Alvum ducere, Bilem educere, inque affectibus Renum cum successu dari posse.

ELECTUARIUM LENITIVUM CUM SULPHURE AD MORBOS PSORICOS RICHARD.

- ℞. Electuarii Lenitivi Florenzolæ Uncias quatuor,
 Florum Sulphuris Unciam unam:
 Misceantur.

Vires ex nomine patent. Dosis est ad Unciam dimidiam aliquoties interdium iteranda.

ELECTUARIUM SEU PULTICULA DE MANNA *Wur-*
tembergenfium.

℞. Mannæ electæ,
Sacchari albillimi ana Uncias duas:

Diffolvantur in

Aquæ Rosarum Unciis duabus:

Colatis addantur

Pulveris Radicis Iridis Florentinæ Drachma una,

Olei Amygdalarum dulcium Uncia femis:

Probe misceantur.

Alvum leniter lavat. Tenellis & inprimis recens natis ad Me-
conium & humores educendos datur.

ELECTUARIUM MITHRIDATICUM, ANTIDOTUS
MITHRIDATICA *DAMOCRATIS.*

℞. Myrrhæ electæ,

Croci,

Agarici,

Zinziberis,

Cinnamomi,

Nardi Indicæ,

Olibani,

Seminum Thlaspi ana Uncias decem,

Dauci Uncias septem,

Fœniculi,

Anifi,

Petrofelini ana Uncias quinque,

Sefeli,

Hyperici ana Uncias duas femis,

Herbarum Schoenanthi Uncias octo,

Polii,

Scordii ana Uncias septem,

Radicum Costi,

Gentianæ ana Uncias octo,

Calami Aromatici,
 Afari,
 Valerianæ ana Uncias tres,
 Mei Uncias duas semis,

Styracis,
 Piperis longi ana Uncias octo,
 Albi Uncias septem,
 Castorei Uncias duas semis,
 Succorum Acaciæ,
 Hypocistidis,
 Foliorum Malabathri ana Uncias octo,
 Carpobalsami Uncias septem,
 Gummi Arabici,

Opii,
 Cardamomi,
 Florum Rosarum rubrarum ana Uncias quinque,
 Trochiscorum Cypheos Uncias septem :

Probe in pulverem redactis & mixtis admisceantur

Galbani,
 Opoponacis ana Unciæ octo:
 Bdellii Unciæ quinque,
 Sagapeni Unciæ tres,
 Vini Hispanici Unciis octo & quadraginta diluta,

Probe subacta excipiantur

Mellis octingentis & sexaginta Unciis, prius exacte tritis cum
 Opobalsami,
 Terebinthinæ ana Unciis octo:

Omnia misceantur exacte.

Hanc compositionem ex GALENO de Antidotis L. II. C. 2. desumpsi. Absurdissimum medicamentum retinendum est ob auctoritatem, quam ipsi antiquitas conciliavit, ideoque cur mutari debeat, non video.

ELECTUARIUM MUNDIFICANS *WERLHOFFII.*

℞. Radicum Sarsaparillæ Uncias tres,
 Rhabarbari Drachmas duas,
 Ligni Guajaci Unciam unam,
 Corticis Ligni Sassafras Drachmam unam,
 Foliorum Sennæ selectissimorum Unciam unam,
 Seminis Anisi Drachmam unam:
 Probe pulverifata misceantur cum
 Mellis Unciis duodecim.

In varia Humorū acrimonia aliquot ejus Drachmæ aliquoties de die, dari possunt.

ELECTUARIUM PRO PECORIBUS *Danorum.*
 THERIACA DIATESSERON *AVICENNÆ.*

℞. Radicum Gentianæ,
 Aristolochiæ rotundæ,
 Baccarum Lauri,
 Myrrhæ ana Uncias duas:
 In pulverem redactis admisceantur
 Mellis despumati Unciæ quatuor & viginti.
Vires ex nomine patent.

ELECTUARIUM PECTORALE LAXATIVUM *Argentoratens.* correctum.

℞. Loch sani & experti Uncias duas,
 Syrupi Papaveris Rhœados Drachmas sex,
 Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, sesqui drachmam:
 Probe misceantur.

Infantibus affectibus Mucosis laborantibus Purgandi præcipue scopo exhibetur. Drachma una quatuor fere Grana Resinæ Jalappæ vehit.

ELECTUARIUM PHILONIUM ROMANUM *AVICENNÆ.*

℞. Radicum Pyrethri,
 Zedoariæ,

Pars II.

Q

Radicum Doronici,
 Florum Balauftiorum ana Unciam unam,
 Piperis albi,
 Seminis Hyofcyami albi ana Uncias viginti,
 Opii Uncias decem,
 Euphorbii,
 Caltorei,
 Margaritarum ana Unciam unam,
 Croci Uncias quinque:

In pulverem redacta exacte mifceantur cum
 Mellis Unciis trecentis.

APHILONE, Medico Romano, denominatum hoc Medicamentum volunt. Diverfum omnino ab Antidoto cognomine à GALENO de Compos. Medicam. fecundum locos L. IX. cap. 4. prolata, ut reliqua hujus commatis medicamenta Sudorem movet, Dolores fopit, Somnum conciliat. Uncia una fefqui Granum circiter Opii vehit.

ELECTUARIUM PURGANS RICHARD.

℞. Diagrydii Unciam dimidiam,
 Pulveris Radicis Jalappæ Uncias quatuor:
 Probe terantur cum Amygdalarum dulcium N^o. viginti, tunc addantur

Pulverum Foliorum Sennæ Unciæ duæ,
 Seminis Anifi,
 Cremoris Tartari ana Uncia una,
 Pulparum Prunorum Unciæ fedecim,
 Tamarindorum Unciæ octo:

Mifceantur exactiffime.

Ubi valide Purgandum eft, aut aqua Hydropicorum educenda, ad Drachmas fex ufque, quæ Grana circiter quinque Diagrydii & quadraginta quinque Radicis Jalappæ vehunt, in aqua diffolutum exhiberi potefl.

ELECTUARIUM REQUIES *NICOLAI.*

℞. Radicis Mandragoræ,
 Florum Rosarum,
 Violarum,
 Seminum Hyofcyami,
 Papaveris,
 Endiviæ,
 Lactuæ,
 Portulacæ,
 Pfylli,
 Opii,
 Nucum Moschatarum,
 Cinnamomi,
 Zinziberis ana Unciam unam semis,
 Lignorum Santali albi
 Rubri,

Spodii,
 Tragacanthæ ana Drachmas sex,
 Sacchari candi Unciam unam:

Omnia in pulverem redacta excipiantur
 Julepi Rosarum Unciis viginti quatuor.

Idem de hoc ac de Mithridatico judicium ferendum est. Descriptionem ex NICOLAO MYREPSO de Antidotis Sect. I. cap. 205 exhibeo. Pessime mulierculæ hujus generis medicamentis ad conciliandum infantibus Somnum utuntur; nimis crebro lethales & noxii inde excitati effectus fuerunt observati. Uncia una ad undecim Grana Opii habet.

ELECTUARIUM RESUMTIVUM *Wurtembergensum.*

℞. Radicum Glycyrrhizæ,
 Herbarum Hederæ terrestris,
 Veronicæ ana Unciam semis:
 Incisa infundantur in
 Aquæ ferventis Unciis sexaginta:

Macerentur per noctem, mane colentur & in colatura coquantur

Radicum Farfaræ recentium, minutim incifarum,
Passularum minorum ana Unciæ sedecim:

Emollita trajiciantur per fetaceum; cum decocto defuso Emulgeantur

Amygdalarum Unciæ septem:

Emulsione diluatur Pulpa per fetaceum trajecta & addantur
Sacchari albi Unciæ triginta duæ:

Coquantur leni igne ad consistentiam Pulpæ, addantur
Flavedo Citri à tribus pomis recentibus derasa,
Pulverum Cinnamomi Uncia semis,

Caryophyllorum Aromaticorum Drachmæ tres:

Omnia probe misceantur.

Hoc Electuarium Heëticis, Tabidis nec non Tussi acri & sicca laborantibus commendatur. Ejus Uncia semis bis vel ter de die assumitur.

ELECTUARIUM AD STOMACACEN *KLEINII.*

℞. Pulverum Radicis Ireos Florentinæ,
Sanguinis Draconis ana Drachmas tres,
Aluminis crudi Drachmas duas,
Myrrhæ electæ,
Mastychis electæ ana Drachmam unam,
Syrupi Balsamici quantum satis ad Electuarium.

Vires ex nomine patent.

ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

Videatur Electuarium Lenitivum.

ELECTUARIUM THERIACA *ANDROMACHI.*

℞. Radicum Ireos florentinæ,
Liquiritiæ ana Uncias duodecim,
Costi,
Rhapontici,
Pentaphylli ana Uncias sex,
Mei,

Radicum Rhei,
 Gentianæ ana Uncias quatuor,
 Aristolochiæ Uncias duas,
 Herbarum Scordii Uncias duodecim,
 Schoenanthi,
 Marrubii,
 Dictamni Cretici,
 Calaminthæ ana Uncias sex,
 Poli,
 Chamæpiteos,
 Chamædryos ana Uncias quatuor,
 Foliorum Malabathri Uncias quatuor,
 Florum Rosarum rubrarum Uncias duodecim,
 Stœchados Uncias sex,
 Hyperici Uncias quatuor,
 Centaurei minoris Uncias duas,
 Croci Uncias sex,
 Carpobalsami Uncias quatuor,
 Cinnamomi Uncias duodecim,
 Casiæ lignæ,
 Spicæ Indicæ ana Uncias sex,
 Lecticæ Uncias quatuor,
 Piperis longi Uncias viginti quatuor,
 Nigri,
 Zinziberis ana Uncias sex,
 Cardamomi Uncias quatuor,
 Agarici,
 Seminum Napi ana Uncias duodecim,
 Petroselinæ Macedonici Uncias sex,
 Anisi,
 Fœniculi,
 Nasturtii,
 Seseleos,
 Thlaspi,

Seminum Amomi,
 Amīneos ana Uncias quatuor,
 Dauci Uncias duas,
 Opii Uncias viginti quatuor,
 Opobalfami Uncias duodecim,
 Myrrhæ,
 Olibani,
 Terebinthinæ anā Uncias sex,
 Styracis,
 Gummi Arabici,
 Sagapeni anā Uncias quatuor,
 Asphalti,
 Opoponacis,
 Galbani ana Uncias duas,
 Succī Acaciæ,
 Hypocistidis ana Uncias quatuor,
 Castorei Uncias duas,
 Terræ Lemniæ,
 Vitrioli calcinati ana Uncias quatuor,
 Trochifcorum Scillinorum Uncias quadraginta octo,
 Viperinorum;
 Hedycheri ana Uncias viginti quatuor :
 Balsama, Resinæ & Gummi Resinæ subigantur
 Vini generosi quantitate sufficiente,
 Ut in formam pultis abeant :
 Omnia excipiantur
 Mellis optimi Unciis nongentis & sexaginta,

Theriacam aliquam in limine ædis Æsculapii versibus lapidi inscriptam tribus ante æram nostram Seculis jam usitatam refert PLINIUS L. XX. Cap. 24.

Compositionem, quam vulgo solent præscribere, si quidem retinendi mens est, cur à præscriptione quam GALENUS nobis reliquit, recedamus, non perspicio. Itaque secundum hunc Auctorem de THERIACA ad PISONEM Cap. II. eam hic appono.

Si quod aliud hoc certe medicamentum diversissima judicia est expertum; mihi quidem licet inconcinnam omnino hanc compositionem lubentissime largiar, reprehendendi omnino videantur, qui Theriacam tantum non pro medicamento universali & Antidoto Catholica venditant, male quoque me habeat iste fastus, quo variis in locis publica auctoritate preparatur, aut certe preparari jubetur, neutiquam tamen perspicio, cur in illam multi adeo invehant, cum ejus compositio non magis absurda sit, quam innumeræ aliæ, quas à Veteribus accepimus. Roborandi scopo nec non sine Sopiendi tam extus quam intus datur. Uncia una Drachmam unam circiter Opii vehit, quæ ratio in Præscriptionibus, quæ vulgo prostant, multo minor esse solet.

ELIXIRIA.

Canones.

I. Mittamus hyperbolicam, quam Alchymici voci *Elixir* tribuerunt, significationem. Officinæ hac voce denotant medicamentum, quod ut plurimum infusione paratur, eamque extrahendorum quantitatem recipit, aut ea admittit vel ingredientia vel Menstrua, quibus spissior redditur consistentia, quam ea est qua Essentiæ vel Tincturæ gaudent.

II. Ingredientia sicca comminuuntur in crassum pulverem; eis superfunditur Menstruum ad eminentiam unius duorumve digitorum; digestio, quæ, cum Vinum pro Menstruo assumatur, debet esse frigida, per duos vel tres dies continuatur; liquor filtratus affervatur.

III. Pro Menstruo sive Vinum & quidem vel Hungaricum vel Hispanicum sive Spiritus Vini adhibetur, rarissime Aqua.

IV. Infusiones cum Spiritu Vini instituuntur in Cucurbitis Alembico & Excipulo instructis; mane & vespera agitantur; Spiritus qui destillavit, reliquo affunditur.

V. Interdum etiam Solutiones Extractorum Elixiria dicuntur.

ELIXIR ACIDUM *DIPPELII*.

Videatur Aqua Rabelii. Idem dicitur à Brunsvicensibus

ELIXIR ACIDUM HALLERI.

Dum pares ingredientium partes recipiuntur.

ELIXIR ALOES SAPONACEUM *Suecorum*, ELIXIR
PROPRIETATIS *STAHLII*.

℞. Aloes Succotrinæ,
Myrrhæ ana Unciam unam:
In pulverem tenuissimum tritis affundantur
Bilis bovinae recentis Unciæ duæ:
Mixtis exacte & leniter ficcatis denuoque tritis addantur
Terræ foliatæ Tartari Uncia una,
Crocī Uncia dimidia,
Spiritus Vini rectificati Unciæ duodecim:
Digerantur leni calore per biduum & filtrentur.

Egregias vires Resolventes continet. Salutifere dabitur in Obstructionibus abdominalibus, sed ab eodem sibi caveant Hæmorrhoidibus obnoxii. Dosis est ad parvum usque Cochlear.

ELIXIR AMARUM *HIÆRNE*.

℞. Radicum Zedoariæ Drachmam unam,
Rhabarbari Drachmas duas,
Gentianæ Unciam semis,
Crocī orientalis Drachmam semis,
Aloës Hepaticæ Unciam unam,
Myrrhæ Unciam semis,
Agarici Drachmam unam:
Theriacæ *Andromachi* Drachmas duas:
Spiritus Vini Unciis triginta sex,
Incisa infundantur cum
Per aliquot dies in Balneo Mariæ postea filtrentur.
Laudatur maxime contra Taniam.

ELIXIR

ELIXIR ANTHELMINTICUM *Suecorum* ESSENTIA
CATHOLICA PURGANS *ROTHII.*

℞. Radicum Jalappæ Uncias quatuor,
Seminum Carthami Uncias duas,
Scammonei Unciam semis,
Gummi Guttæ Drachmas duas,
Incisis, contulis, in pulverem tritis affundantur,
Spiritus Vini rectificati Unciæ viginti quatuor,
Per quadriduum Digesta fortiter per colum exprimantur, Liquor
deinde filtretur.

*Valide Alvus inde ducitur, cum autem citra Ventris dolores
vires suas exserere vix possit, & periculose semper sint solutiones resi-
narum in Spiritu Vini, eo quod hæ ab humoribus Primarum Viarum
facile dejiciantur & plicis illarum adhærendo Hypercatharses exci-
tent; ego quidem hujus medicamenti usum commendare non au-
deo. Dosis ad Drachmas duas præscribitur.*

ELIXIR ANTHARTHRICTICUM *CARIBÆUM.*

℞. Gummi Guajaci Uncias duas.
Taffia Uncias nonaginta sex,
Digerantur leni calore per octiduum, Liquor filtretur.
*Egregii inde effectus in Arthritide inveterata fuerunt obser-
vati. Omni mane Cochlear unum hauritur.*

ELIXIR ANTICOLICUM CROCATUM.

Videatur Elixir de Garus.

ELIXIR ANTIPODAGRICUM *GULDENKLÉE.*

℞. Radicum Artemisiæ Uncias duas,
Rhapontici Moscovitici,
Aristolochiæ rotundæ ana Unciam unam,
Herbæ Chamædryos,
Florum Centaurii minoris,
Hyperici ana Drachmas quinque,

PARS II.

R

Seminis Petroselini Macedonici Drachmas sex,
Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Vini Tartarifati Unciis viginti quatuor:

Digerantur per aliquot dies, ita obtenta Tinctura filtretur,
& Abstracta inde Libra una Spiritus Vini, concentretur.

ELIXIR ANTISCORBUTICUM AMARUM *Brandeburgensium* correctum.

℞. Radicum Enulæ Drachmas duas,
Filicis Unciam semis,
Herbæ Absynthii Drachmas tres,
Corticum Aurantiorum immaturorum Drachmas duas,
Tamarisci Drachmas sex,

Incisis affundantur:

Succorum expressorum Beccabungæ,
Borraginis,
Buglossi,
Cochleariæ,
Fumariæ,
Nasturtii aquatici ana Drachmæ
duæ,

Spirituum Cochleariæ,

Nasturtii ana Unciæ quatuor,

Digerantur per aliquot dies & exprimantur.

Vires ex nomine patent; Dosis ad sexaginta Guttas extenditur.

ELIXIR ANTIVENEREUM *Viennensium*.

℞. Balsamorum Copaivæ Unciam unam,
Peruviani Unciam semis,
Resinæ Guajaci Drachmas duas,
Olei destillati Ligni Sassafras Drachmam semis,
Salis Tartari Drachmas duas,

Mixta dissolvantur in

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis sex,
Filtrata asserventur.

Hujus Medicamenti usus, in morbis Venereis, si Gonorrhæam excipias, nullus omnino mihi videtur, quin & in ipsa Gonorrhæa nonnisi cautissime erit administrandum, nec dosis ultra triginta Guttas extendenda.

ELIXIR APERITIVUM CLAUDERI.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ ana Uncias duas,
Crocī orientalis Unciam unam,
Grossæ contusis affundantur:
Salis Tartari Unciæ duæ, dissolutæ
Aquarum Florum Sambuci,
Cochleariæ,
Nasturtii ana Unciis decem,
Per duodecim horas Digesta filtrentur.

Contra morbos. Putridos & ad Alvi Mensiumque reserationem laudatur a CLAUDERO, ad Obstructiones quoque Viscerum referandas, Hypochondriacis præterea & Scorbüticis commendari solet.

ELIXIR AURIFICUM ROTROU.

Est Tinctura Antimonii Tartarifata.

ELIXIR BALSAMICUM HOFFMANNI.

℞. Radicis Zedoariæ Drachmas tres,
Herbæ Scordii Manipulos tres,
Florum Centaurii minoris Manipulum unum,
Myrrhæ electæ Unciam semis,
Ligni Aloës Drachmam unam semis,
Corticum Aurantiorum Unciam unam,
Crocī Drachmam unam,
Nucis Moschatæ Drachmas tres,
Succini Drachmas tres:
Incisa, contusa, mixta Digerantur:
Spiritus Vini Tartarifati Unciis quadraginta octo:
Filtratis addantur:
Spiritus Salis Ammoniaci Uncia una,

R. 2

Oleorum Cardamomi,
Caryophyllorum ana Guttæ decem:

Misceatur.

*Laudatur ab egregio Auctore in notis ad POTERII Observ.
Cent. II. cap. 39. ad Lævitatem Intestinorum.*

ELIXIR BALSAMICUM PECTORALE *Pharmacopœæ
Edinburgensis Veteris.*

℞. Balsamorum Tolutani Uncias duas,
Peruviani Unciam unam,
Florum Benzoes,
Crocii Anglici ana Unciam semis,
Spiritus Vini Rectificati Uncias viginti quatuor,
Digerantur per triduum & filtrentur.

*Hoc Elixir tam ad internos quam externos usus commendare
& dosin ad quadraginta Guttas extendere solent.*

ELIXIR BALSAMICUM TEMPERATUM *HOFFMANNI.*

℞. Corticum Aurantium recentium Unciam unam,
Salis Tartari Drachmas duas,
Vini Tockaviensis vel Canariensis Uncias duodecim:

Digerantur per biduum.

Tinctura decantata dissolvantur

Extractorum Gentiana,
Centaurii minoris,
Cardui Benedicti ana Drachmæ duæ:

Filtrentur per filtrum tectum.

*Hujus medicamenti ab hæredibus HOFFMANNI in arcanis
habiti, (teste BUCHNER ad Prælect. SCHULZ in Dispens. Bran-
deb.) diversæ ob id ipsum in Dispensatoriis prostant descriptiones.
Trado hic, quod ipse Auctor in Med. Consult. P. III. Dec. 2. Cas.
IX præscribit, Medicamentum, ad restituendas vires Primarum
viarum commendabile. Ejus Cochlear unum ante vel post pran-
dium dari jubet.*

ELIXIR BALSAMICUM *WERLHOFII.*

℞. Radicum Costi Drachmas duas,

Corticis Chinæ electi Unciam semis,
 Croci orientalis Drachmam unam,
 Corticum Aurantium recentium Unciam semis,
 Myrrhæ electæ Drachmas duas,
 Salis Tartari Unciam semis:

Incisis & contusis affundantur

Vini Canariensis Unciæ duodecim:

Digerantur per triduum, decantetur Tinctura, in qua dissolvantur

Extractorum Cardui benedicti,

Centaurii minoris ana Drachmæ duæ;

Filtrentur per filtrum tectum,

Cum priori tam viribus quam modo utendi convenit.

ELIXIR CITRI PURGANS *Pharmacopœæ Argentoratensis.*
Veteris.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium Unciam unam semis,
 Spiritus Vini rectificati Uncias sex:

Infundantur per horas viginti quatuor,

In Spiritu decantato dissolvatur

Resinæ Jalappæ Uncia una:

Filtrentur.

Hoc Medicamentum improprie sane & ipsum Elixir nuncupatum spe est valde ambigua; quippe ab humoribus Primarum Viarum facile præcipitata inde Resina, plicisque Ventriculi vel Intestinorum adhærescens acerrima Tormenta & vehementem solet excitare Hypercatharsin. Conferantur quæ ad Elixir Anthelminticum sunt annotata. Prudenti igitur consilio in nova Editione est omissum. Interim vulgus vel nimium ei assuetus crebro adhuc eo utitur. Ad Drachmam unam vel Scrupulos quatuor, qualicunque Syrupo edulcoratum, exhibetur. Drachma una continet Resinæ Grana decem.

ELIXIR CITRI SENNERTII.

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium Uncias octodecim,
 Spiritus Vini simplicis Uncias septuaginta duas:

R 3

Per aliquot dies Macerata Destillentur usque dum Phlegma apparuerit, tunc addantur

Succi Citri recentis Unciæ novem,

Sacchari albissimi in Aquæ Rosarum Unciis novem dissoluti
Unciæ quinque:

Filtrentur.

Hoc præparatum nomine tantum Elixir re vera Claretum esse nemo non videt.

ELIXIR DE GARUS.

℞. Caryophyllorum,

Cinnamomi,

Nucum Moschatarum ana Scrupulum unum,

Myrrhæ electæ Unciam dimidiam,

Aloës Hepaticæ Unciam unam,

Spiritus Vini Uncias quadraginta octo,

Aquæ fontanæ Uncias duodecim:

Destillentur inde Unciæ quadraginta octo:

Spiritui destillato addantur:

Syrupi Capillorum Veneris Unciæ quadraginta octo,

Aquæ Florum Aurantium Unciæ quatuor,

Reponantur usque dum Liquor clarus evaserit.

Hoc Claretum juvandæ Digestionis causa ad Cochlear unum pro dosi datur.

ELIXIR JUNIPERINUM SEU MALVATICUM JUNIPERINUM *Argentoratensium.*

℞. Rob Juniperi Uncias quatuor:

Diluantur

Vini Malvatici Unciis duodecim:

Colentur per linteum.

Scopo Carminativo & Diuretico ad Cochlear unum pro dosi exhibetur.

ELIXIR PECTORALE RINGELMANNI vulgo REGIS DANIÆ.

℞. Succi Liquiritiæ Uncias sex:

Diffolvantur in

Aquæ Fœniculi Unciis duodecim:

Filtrentur; & addantur

Spiritus Salis Ammoniaci Anifati Unciæ triginta sex,

*Egregium sane Medicamentum in morbis Pectoris pituitosis,
Datur ad parvum Cochlear pro dosi.*

ELIXIR PECTORALE *WEDELII.*

℞. Radicum Enulæ,

Althææ,

Ireos Florentinæ,

Squillæ præparatæ ana Unciam unam,

Liquiritiæ Unciam dimidiam,

Ligni Santali rubri Unciam unam,

Herbæ Roris Solis Unciam unam semis,

Benzoës Drachmas sex,

Myrrhæ,

Seminis Anifi ana Unciam semis,

Gummi Ammoniaci Drachmas duas,

Croci Drachmas tres:

Incisa, contusa Digerantur cum

Spiritus Vini Unciis quatuor & viginti:

Filtrentur.

*Spirituosa in Pectoris affectibus esse periculosa, cum nostra
ætate nemo sanus dubitet, minime mirum est, hoc Medicamen-
tum Resolvendi gratia creberrime olim adhibitum sensim evi-
lescere.*

ELIXIR POLYCHRESTUM *Halensum.*

℞. Extracti Panchymagogi Unciam unam:

Diffolvatur

Spiritus Vini rectificati Unciis sex,

Vitrioli Drachmis tribus:

Filtrentur.

*Suum Elixir Polychrestum nunquam publici juris fecerunt Ha-
lenses. Quod hic secundum TRILLERUM exhibeo, ad centum*

usque Guttas commendatur scopo Purgandi. Drachma una novem circiter Grana Extracti Panchymagogi continet. Purgantia resinosa in Spiritu Vini dissoluta usque quaque displicent.

ELIXIR PROPRIETATIS ALBUM HELMONTII.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Crocī orientalis ana Unciam unam:

Incisis, contusis affundantur

Aquæ Cinnamomi Unciæ duodecim:

Digerantur calore fortiore per aliquot dies, omnisque dein liquor Destillatione eliciatur.

Hoc Medicamentum ab HELMONTIO Alchemico stylo descriptum. Licet multum ab Auctore suo laudetur, nostris tamen temporibus cum Humores vehementer commoveat, in Febribus, ad quas ejus usus speciatim spectabat, vix adhiberi solet.

ELIXIR PROPRIETATIS SINE ACIDO LE MORT, SIVE DULCE.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Crocī Orientalis ana Unciam unam:

Pulverisata redigantur cum

Olei Tartari per Deliquium quantitate sufficiente in Consistentiam pultis, cui addantur

Spiritus Vini rectificatissimi Unciæ sedecim:

Digerantur per aliquot dies & filtrentur.

Efficax remedium in morbis Ventriculi a causa frigida oriundis, ad Alvim stimulamdam promovendamque Digestionem. Cavendum tamen, ne nimius ejus usus Sanguinem exagitet. Dosis ad Guttas sexaginta exhibetur.

ELIXIR PROPRIETATIS PARACELSI.

ELIXIR ALOETICUM Suecorum.

℞. Aloës Succotrinæ,
Myrrhæ electæ,
Crocī ana Unciam unam:

Affun.

Affundantur in pulverem redactis,
 Spiritus Vitrioli Unciæ duæ,
 Vini rectificati Unciæ quatuordecim,
 Post Digestionem per triduum filtrentur:

*Hoc medicamentum more suo thrafonico describit PARACEL-
 sus Antidox. L. VIII. Menstruum cum reticuerit, varii circa
 illud indicandum varie fuerunt occupati, BOERHAVE Acetum
 præcipit, vulgo solent CROLLIUM sequi, qui Oleum Sulphuris
 & Spiritum Vini præscribit. Qui PARACELSO fidem adhi-
 bent, tantum non miracula inde expectant & immortalitatem. Do-
 leo etiam BOERHAVIUM magnifice nimis de eodem sentire; Ven-
 triculum roborare, Digestionem juvare, Vermes necare, Men-
 ses & Hæmorrhoides movere observatum ferunt, sed probe omni-
 no notandum, ejus usu Sanguinem, illum maxime, qui per vasa
 Hæmorrhoidalia movetur, exagitari.*

ELIXIR PROPRIETATIS RHABARBARINUM *KALDE.*

℞. Aloës Succotrinæ,
 Myrrhæ electæ ana Unciam unam,
 Rhabarbari electi Unciam unam semis,
 Croci,
 Salis Tartari ana Drachmas duas:
 Pulverifata digerantur cum
 Vini Malvatici Unciis duodecim:
 Colentur.

*Scopo Purgandi & Hepar referandi etiam reliquis præferendum
 esse putatur.*

ELIXIR STOMACHICUM SIVE TINCTURA AMARA
Edinburgensium.

℞. Radicis Gentianæ Uncias duas,
 Flavedinis Corticum Aurantium Unciam unam,
 Canellæ albæ Unciam semis,
 Coccionellæ Drachmam semis,
 Incisa, contusa Infundantur per quatrimum cum

Spiritus Vini Unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

Vires ex titulo patent. Ad aliquot parva cochlearia pro dosi datur.

TINCTURA AMARA LONDINENSIVM in eo differt, quod loco Canellæ albæ Cardamomum minus recipiat, & Coccionellam omittat.

ELIXIR STOMACHICUM ROSENSTEIN.

℞. Corticum Aurantium recentium sesqui Unciam:

Contundantur in pulvem, digerantur cum

Vini Hispanici Unciis quatuor & viginti:

Colatura dissolvatur

Extracti Gentianæ Uncia una:

Filtrentur.

Datur Cochlear unum cum Aqua Cinnamomi,

ELIXIR STOMACHICUM STOUTHON.

℞. Radicum Gentianæ Drachmas sex,

Rhabbarbari Semunciam,

Herbarum Absynthii,

Chamædryos,

Flavedinis Corticum Aurantium ana Drachmas sex,

Corticum Cascarillæ,

Aloës Succotrinæ ana Drachmam unam:

Incisa, contusa infundantur in

Spiritus Vini rectificati Unciis viginti & quatuor:

Filtrentur.

Ad Vitia Digestionis, quibus Obstructiones Hepatis junctæ sunt, laudatur. Dosis est ad Guttas viginti.

ELIXIR UTERINUM CROLLII correctum.

℞. Castorei Uncias tres,

Croci Unciam unam,

Herbæ Artemisiæ Uncias sex,

Terræ foliatæ Tartari Unciam dimidiam:

Incisa Digerantur per quatrimum

Spiritus Vini Unciis triginta:

Filtratis addantur

Oleorum Destillatorum Angelicæ,

Anili,

Succini ana Drachma una:

Misceantur optime.

Ad malum Hystericum, Catamenia referanda, Fluorem album curandum olim laudabatur; medicamento multum exstuantē hodie rarius utimur. Dosis est ad Guttas quadraginta.

ELIXIR VISCERALE ROSEEN.

℞. Flavedinis Corticum Aurantium Unciam unam,

Rhabarbari veri Drachmas decem,

Terræ foliatæ Tartari Uncias duas:

Incisa, trita infundantur per quatrimum frigide in vase probe clauso cum

Vini albi generosi Unciis sedecim:

In Colatura dissolvantur:

Extractorum Centaurii minoris Uncia una,

Cascarillæ Uncia semis,

Oleorum Destillatorum Chamomillæ,

Millefolii ana Scrupulus unus:

Filtrentur.

In impedita Digestione & aliis morbis a vitio succorum Chylopoieticorum natis magno cum successu adhibetur. Dosis est Cochlear parvum.

ELIXIR VITÆ MATTHIOLI correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris,

Zinziberis,

Zedoariæ ana Unciam semis,

Calami Aromatici,

Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Herbarum Thymi,
 Serpilli,
 Rorismarini,
 Salviæ,
 Florum Rosarum pallidarum ana Drachmas duas,
 Seminum Anifi,
 Fœniculi ana Drachmam unam,
 Cinnamomi acuti Unciam unam semis,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatae,
 Macis ana Unciam dimidiam,
 Cubeborum,
 Lignorum Santali citrini,
 Aloës,
 Cardamomi minoris ana Drachmas duas,
 Corticum Citri recentium Unciam unam semis :
 Incisa & contusa Digerantur per triduum cum
 Spiritus Vini rectificati Unciis septuaginta duabus :
 Addantur :

Aquæ fontanæ Unciæ viginti duæ :
 Destillentur lento igne Unciæ circiter octoginta.

MATTHIOLI descriptio, quæ occurrit in Comment. in Dioscorid L. V. Cap. 7. in compendium redacta, prouti vulgo in Dispensatoriis legitur, hic exhibetur. Cuilibet patet, Spiritum aromaticum admodum incongrue nomine Elixir insigniri, & hoc medicamentum potius Aquis Cephalicis, quibus sibi superioribus seculis multum placuerant medici homines esse, adscribendum. Sed in ipso quoque suo Elixir laudando nimius est, Thraçonemque agit Auctor l. c. Scopo Roborandi potest ad Cochlear unum exhiberi. Qui potu spirituofo delectantur, blandimentum inde suæ gulæ parare solent. Quantitati hic præscriptæ adjici solet.

Ambre gryseæ,
 Moschi ana Scrupulus unus :
 Quo factò ELIXIRIUM VITÆ MATTHIOLI COMPLETUM
 cognominatur.

ELIXIR VITRIOLI *MYNSICHTI* correctum.

℞. Radicum Galangæ minoris Unciam unam semis,
 Calami Aromatici Unciam unam,
 Herbarum Menthæ crispæ,
 Salvïæ ana Unciam dimidiam,
 Cinnamiomi,
 Caryophyllorum,
 Zinziberis ana Drachmas tres,
 Nucum Moschatarum,
 Cubebæ,
 Corticum Citri ana Drachmas duas:

Incisa, contusa infundantur per octiduum cum

Olei Vitrioli Unciis tribus &

Alcoholis Vini Unciis viginti quatuor:

Liquore colato dissolvantur

Sacchari albißimi Unciæ quatuor:

Filtrentur.

Pessime præeunte MYNSICHTO Dispensatoria vulgo jubent digestionem per aliquod tempus solo Acido Vitriolico institui, quo omnes partes oleosæ penitus comburerentur. TRILLERUS huic medicamento Stomachico egregias tribuit virtutes, Frigidis præsertim Pituitosis & Flatuosis convenire appetitumque excitare docet. Egregius HAEN in Rat. Med. T. XII. Cap. VI §. V. plures profert observationes, quibus hoc medicamentum cum magno successu contra Phthisin Pulmonalem fuisse adhibitum probatur. Dosis est ad Guttas quadraginta.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM *Edinburgensum.*

℞. Spiritus Vini rectificati Uncias duodecim,

Olei Vitrioli Uncias tres:

Misceantur secundum artem, & Digerantur per triduum:

Tunc addantur

Cinnamomi Drachmæ sex,

Zinziberis Uncia semis,
 Herbae Menthae Piperitidis Drachmae duae:
 Digerantur per sex dies & Filtrentur.

*Egregium Medicamentum Stomachicum, quod & in morbis
 Putridis cum successu dari poterit. Dosis est ad guttas duodecim.*

ELIXIR VITRIOLI DULCE *Edinburgensium.*

℞. Cinnamomi Drachmas sex,
 Seminum Cardamomi minoris Unciam unam,
 Angelicae Drachmas tres,
 Piperis longi Drachmas duas,
 Liquoris Anodyni Mineralis HOFFMANNI Uncias quatuor
 & viginti:

Contusa Macerentur per octiduum, dein Filtrentur.

*Stomacho roborando & pellendae inprimis Colicae flatulentae
 egregie inservit; Dosis ad Guttas usque viginti augeri potest.*

EMPLASTRA.

Canones.

I. Emplastrum est medicamentum externum, digitis non
 adhærescens, calore emolliendum & ductile, corporibus, qui-
 bus applicatur, se agglutinans.

II. Ubi vehiculum, cujus ministerio applicatur, eodem
 utrinque illinitur, dicitur *Sparadrapum*, *Tela Emplastica*. In
 formam vero cylindræam ita convolutum Emplastrum ut ejus
 superficies tota lævis, eaque crassitie sit, ut Urethrae immitti
 possit, *Cereolus*, *Candeola*, *Bougie* appellatur.

III. Distinctio inter EEMPLASTRA & CERATA a recentiori-
 bus merito negligitur. Aluta Emplastro obducta Capitiq̄ue im-
 posita *Peau divine* dicitur.

IV. Consistentia spissa Emplastris Refinarum aut Cerae ope
 datur, quæ cum ipsis colliquefiant. Nimia siccitati Terebin-
 thina præcipue cavendum. Quibus applicantur partibus; ut te-
 nacius adhæreant, Pice obtinetur.

V. Resinæ & Gummi Resinæ cum Terebinthina colligantur, Oleis comiscantur, eisque deinde reliqua sicca in pulverem redacta adjiciuntur & continua agitatione commiscantur.

VI. Volatilia non nisi omnibus refrigeratis, admiscenda.

VII. Calces Saturninæ Olei iusta ratione dissolutæ, Emplastri consistentiam induunt. Requirit autem hæc dissolutio majorem paulo calorem, qui quo minus excedat Oleumque amburat, affusa Aquâ impediendum est. Hæc aqua ebullitionis, quæ durante operatione observatur, causa est, illa evaporata ebullitio cessat, tenuioresque vapores exhalant. Quod si acciderit, sedulo cavendum, ne nova aqua affundatur, illa enim ab Oleo fervente in halitus reduceretur, hujusque partem aliquam ex lebetæ non sine magno artificis periculo projiceret; continuatus autem calor, reliquum Oleum nulla aqua temperatum adureret. Itaque per totam operationem pro ea ratione, qua aqua evaporat, nova subinde est adjicienda. Simul atque omnem in auras abiisse ex traditis signis apparet, lebes illico ab igne removendus, refrigeratoque deimuni Oleo nova aqua affundenda est. Ipsa etiam materies inter operationem spatula lignea continuo agitari debet, ne quid Olei lebetis parietibus accrescat, inque fundum ne resideat Calx metallica. In ea ratione, qua Oleum partes metallicas recipit, vapores difficiliter transmittuntur, bullæ surgunt majores, totaque massa valde intumescit.

VIII. Emplastra postquam parata sunt, super affere operam in bacillos formantur, quos *Magdaleones*, ipsum vero hunc laborem *Malaxare* dicunt.

EMPLASTRUM *ABBATIS DE GRACE.*

Videatur Emplastrum album coctum.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *Edinburgensium* POLY- CHRESTUM *Suecorum.*

℞. Emplastri Diachyli simplicis Uncias duodecim,
Picis Burgundicæ Uncias sex,

Colliquefiant.

Ad partes continendas nec non ad levia Vulnera a sordium il-lapſu defendenda adhibetur. Aequat vires EMPLASTRI STI-CTICI PLENCK.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM CELSI.

℞. Ceruffæ Venetæ Uncias quadraginta,
Olei Olivarum Uncias triginta:

Coquantur ſub perpetua, ope ſpatulæ lignæ, agitatione, & crebra aquæ affuſione, uſque dum aliquot guttæ aquæ frigi-dæ inſtillatæ Emplaſtri conſiſtentiam arguant.

Exſiccatur, Refrigeratur, Diſcutitur, ad membra Ambuſta valet, Intertrigines ſanat, Cicatricem inducit. In, Arthritide vero, Eryſipelate, Rheumatismis ne adhibeatur, cautio eſt. Mammis induratis quoque imponitur. Poſteſt ſubſtitui EMPLASTRO ABBATIS DE GRACE.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO Danorum.

℞. Ceræ citrinæ,
Reſinæ Pini,
Terebinthinæ ana Uncias quatuor,
Gummi Ammoniacy Uncias octo:

Colliquentur & per ſtupam colentur.

Variis, quæ apud Auctores proſtant, compoſitionibus hanc, ſcilicet ſimpliciorẽ, præferendam eſſe duxi. Emollit, Diſcutit, Maturat, Reſolvit.

EMPLASTRUM DE AMMONIACO CUM MERCURIO
Londinenſium.

℞. Argenti vivi Uncias tres,
Baſſami Sulphuris Rulandi Drachmam unam:
Terantur probe uſque dum omnes globuli Mercuriales diſpa-ruerint, dein immiſceantur ſenſim ſub perpetua agitatione
Gummi Ammoniacy Unciæ duodecim, liquatæ.
Terebinthinæ Unciis tribus.

In Glandularum indurationibus cum successu adhiberi posse videtur.

EMPLASTRUM ANGLICUM.
EMPLASTRUM ADHÆSIVUM *WIDSTOCK.*

℞. Ichthyocollæ Uncias duas,
Benzoës,
Styracis electæ ana Drachmam unam,
Spiritus Vini rectificatissimi Uncias viginti quatuor,
Immittantur Cucurbitæ & calore detineantur, usque dum omnia fuerint dissoluta solutioque refrigerata consistentiam gelatinæ induat. Oblinatur penicilli ope serico tenso. Antequam prius fuerit exsiccatum non inducatur alterum stratum, eademque sub cautela fiat stratorum iteratio, usque dum requisita crassities surrexerit.

Celebratum hoc Emplastrum sub nominibus THE LADY'S BLACK STICKING PLAISTRE, TAFFETAS D'ANGLETERRE, ENGLISCHER TAFFET in creberrimo usu est ad Solidanda leviora Vulnera.

EMPLASTRUM ANODYNUM IN CANCRO *DECKER.*

℞. Emplastri Diapompholygos Unciam unam,
Fuliginis splendentis Scrupulos quatuor,
Opii pulverisati Drachmam unam,
Salis Volatilis Ammoniaci Scrupulos duos:
Mixta Malaxentur cum
Olei Solani quantitate sufficiente.
Virtutes ex nomine patent.

EMPLASTRUM ANODYNUM *WILDEGANSII.*

℞. Emplastri Saponati,
Ceræ citrinæ ana Uncias quatuor:
Colliquatis & femi refrigeratis addantur
Olei Tartari fœtidi Drachmæ quinque,
Opii in pulverem redacti Uncia femis,
PARS II. T

Camphoræ Drachmæ tres, diffolutæ in
 Olei Seminis Hyofcyami Drachmis quinque:
 Misceantur probe.

Ad morbos Articulares commendatur.

EMPLASTRUM ANTAPOPLECTICUM *Hanckenii.*

℞. Olei Nucum Juglandum Uncias duodecim,
 Terebinthinæ,
 Refinæ communis ana Uncias quatuor,
 Colophonii Uncias duodecim,
 Ceræ Citrinæ Uncias sexaginta quatuor:
 Colliquatis addantur

Pulverum Succini,
 Tacamahacæ,
 Carannæ,
 Sandaracæ ana Uncia una femis,
 Olibani,
 Mastychis,
 Storacis,
 Benzoes ana Uncia una,

Radicum Cyperi rotundi,
 Pyrethri,
 Angelicæ,
 Iridis Florentinæ ana Uncia femis:

Probe mixtis & pene refrigeratis commisceantur

Axungia Castorei,
 Camphoræ ana Drachmæ duæ,
 Oleorum destillatorum Macis,
 Majoranæ,
 Caryophyllorum,
 Ligni Rhodii,
 Lavendulæ ana Scrupuli duo,
 Salviæ,
 Rorismarini,
 Chamomillæ,
 Succini ana Guttæ duodecim:

Mixta efformentur in Emplastrum Vesicæ commissum affer-
vandum.

*Applicatur Capiti rasō tam arcendæ quam curandæ Apoplexiæ
causa.*

EMPLASTRUM ATTRAHENS *Londinensium.*

℞. Resinæ,
Ceræ ana Uncias sedecim,
Sevi Ovilli Uncias octo
Liquefiant & per colum trajiciantur.
Ad Suturas siccas adhibetur.

EMPLASTRUM E BACCIS LAURI *MESUE correctum.*

℞. Ceræ Citrinæ Uncias octo,
Resinæ vulgaris,
Olei Laurini,
Terebinthinæ ana Uncias duas :
Liquatis admisceantur
Pulverum Baccarum Lauri Unciæ quatuor,
Radicum Cyperi rotundi,
Corticis Winterani,
Olibani,
Mastychis,
Myrrhæ ana Uncia una:

Probe misceantur.

*In Hydrope & affectibus a Flatibus ortis Abdomini, in Cepha-
lalgia Capiti imponitur.*

EMPLASTRUM DE BELLADONNA *Brunsvicensium.*

℞. Succi recentis Foliorum Belladonnæ,
Olei Lini ana Uncias novem:
Coquantur ad consumtionem humiditatis, tunc addantur
Ceræ Citrinæ Unciæ sex,
Terebinthinæ Venetæ Drachmæ sex :

Liquatis admisceantur

Pulveris Foliorum Belladonnæ Unciæ duæ.

Testantur Brunsvicenses, hoc Emplastrum egregie Emollire ac Dolores sedare, inprimis ad Mammarum vel Scroti Tumores duros aut Resolvendos aut ad bonam Suppurationem perducendos cum successu in usum tractum fuisse.

EMPLASTRUM DE BETONICA ZWELFFERI.

℞. Cerae flavæ,

Refinæ Pini,

Terebinthinæ ana Uncias duas:

Liquefactis addantur

Pulverum Betonicae,

Mastychis,

Olibani,

Mumiæ ana Uncia una:

Probe misceantur.

Raso Capite imponitur ipsius Vulneribus & Contusionibus, nec non in Cephalalgia & morbis Catarrhalibus, qua efficacia ego non disquiram; id saltem addere non dubito, ad grave Symplicitis Vulnus, cujus S. PAULI in Quadripart. Botanic. p. 223. meminit, sanandum, hoc Emplastrum ne hilum quidem contri-
buisse.

EMPLASTRUM AD BUBONES VENEREOS BOERHAVE.

℞. Florum Sulphuris Uncias duas,

Mercurii vivi Drachmas duas:

Probe terantur usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint, tunc addantur

Sacchari Saturni Drachmæ tres,

Mixta ingerantur sub non intermissa agitatione,

Emplastrorum de Meliloto,

Cumino,

Galbano,

Emplastrorum de Ammoniaco,
Sagapeno ana Unciæ dimidiæ:

Liquando commixtis & femirefrigeratis.

Testatur TRILLERUS se in pluribus ægrotis expertum esse, hujus Emplastri ope Bubones Venereos inveteratos, adeoque tenacissimos potenter fuisse solutos & dissipatos, nec non ingentes Testiculos Venereos detumuisse.

EMPLASTRUM CAMPHORATUM STAHLII.

℞. Olei Olivarum Uncias duodecim,
Minii Uncias octo,

Coquantur ad Consistentiam Emplastri, cui refrigerato addantur

Camphoræ, paululum Olei Olivarum dissolutæ, Unciæ duæ.

Refrigerans, Resolvens atque Anonydina virtus huic Emplastro adscribitur, Ambustis & Excoriatis partibus cum successu imponitur: Optime substituitur EMPLASTRO DOMUS MISERICORDIÆ ET EMPLASTRO DE MINIO.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM, SEU AD FRACTURAS Danorum.

℞. Colophonii Uncias viginti quatuor,
Terebinthinæ Uncias sex:

Liquatis adjiciantur

Pulverum Radicum Bistortæ,

Symphyti,

Tormentillæ ana Unciæ tres:

Probe misceantur.

Compositionem Medicamenti, quod nomini suo minime respondere inter omnes constat, simpliciozem, reliquis in Dispensatoriis passim obviis præferendam esse duxi.

EMPLASTRUM CEPHALICUM Danorum.

℞. Tacamahacæ,
Carannæ,

Styracis Calamitæ,
 Mastichis ana Unciam unam,
 Terebinthinæ Argentoratensis Drachmas duas,
 Leni igne Liquentur, pene refrigeratis addantur
 Opii pulverisati Scrupuli quatuor,
 Balsami Peruviani Semuncia,
 Olei Succini Drachma una:

Misceantur probe.

In Capitis doloribus parti affectæ; in Odontalgia Temporibus applicatur. Substitui potest EMPLASTRO AD DOLORES DENTIUM, ET EMPLASTRO AD TEMPORA.

EMPLASTRUM DE CICUTA CUM GUMMI AMMONIACO *SCHRÆDERI* correctum.

℞. Cerae flavæ Uncias duodecim,
 Olei Hyoscyami Uncias quatuor:
 Colliquatis addantur
 Succu Cicutæ inspissati Unciæ sex,
 Gummi Ammoniaci pulverisati,
 Pulveris Cicutæ ana Unciæ octo:

Probe misceantur.

Ad Scirrhos & præcipue Lienis Hepatisque Tumores enixe commendatur, id quod SCHULZIUS quoque Prælect. in Dispens. Observatione probat. EMPLASTRI SPLENETICI vices supplet; imponitur quoque Carcinomatibus.

EMPLASTRUM CITRINUM *Augustanorum.*

℞. Resinæ Uncias sedecim,
 Cerae Citrinæ,
 Sevi cervini ana Uncias decem,
 Terebinthinæ Uncias tres:

Colliquatis & colatis addantur

Pulveris Curcumæ Drachmæ tres.

Ad Ulcera & Vulnera maturanda valet, imponitur quoque levibus Vulneribus, ab illapsu sordium tuendis. Vices sustinet EMPLASTRI TETRAPHARMACI.

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM *Argentoratensium.*

℞. Emplastri Diachyli Unciam semis,
Picis navalis Unciam unam :

Colliquatis addantur

Pulverum Galbani Unciæ duæ,
Viridis Æris,
Salis Ammoniaci ana Scrupuli duo :

Probe misceantur.

Vires ex nomine patent, vices EMPLASTRI VIRIDIS explet.

EMPLASTRUM COMMUNE *Londinensium.*

Videatur Emplastrum Diachylon.

EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS *Augustanorum.*

℞. Cerae Citrinæ Uncias sex,
Oleorum Mastichis,
Cydoniorum,
Terebinthinæ ana Unciam unam :

Colliquatis addantur

Crustæ Panis tostæ, in pulverem tritæ Unciæ duæ,
Pulverum Tacamahacæ Unciæ una,
Mastichis,
Caryophyllorum,
Nucis Moschatae,
Herbæ Menthæ ana Unciæ semis :

Probe misceantur & Emplastrum asservetur Vesicæ inclusum.

Stomachi roborandi gratia, præcipue in Vomitu, regioni Epigastricæ imponitur.

EMPLASTRUM DE CUMINO *Londinensium.*EMPLASTRUM STOMACHICUM sive E BACCIS
LAURI *Suecorum.*

℞. Cerae citrinæ,
Emplastri Diapalmæ,

Olei Olivarum ana Uncias sex:
 Colliquatis & femirefrigeratis addantur
 Pulveris Seminis Cumini Unciæ sex,
 Baccarum Lauri Unciæ duæ,
 Olei destillati Cumini Drachma una.
 Probe misceantur & Emplastrum asservetur Vesicæ inclusum.
Ad Flatus Discutiendos imponitur Umbilico. Laudatur quoque ad Tumores duriores, Mammarum maxime, Resolvendos.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM *Danorum.*

℞. Lithargyrii Uncias duodecim,
 Olei Olivarum Uncias viginti quatuor:
 Coquantur ad Lithargyrii dissolutionem; tunc addantur
 Cera Citrinæ,
 Terebinthinæ Venetæ,
 Pulveris Olibani ana Unciæ duæ:
 Colliquatis admisceantur
 Colcotharis Vitrioli Unciæ tres.

Hoc Emplastrorum genere Veteres Affluxum Humororum ad partes constringendo Vasa morari & impedire conati sunt, ne vitium cui-dam parti inhærens ulterius se diffundat. Plures horum Emplastrorum descriptiones prostant; hodie rarius in usum trahuntur.

EMPLASTRUM DIABOTANUM *BLONDII.*

℞. Radicum & Foliorum Bardanæ,
 Petasitidis,
 Calendulæ,
 Chamæpiteos,
 Levistici,
 Valerianæ,
 Angelicæ,
 Enulæ,
 Armoraciæ,
 Cucumeris filvestris,
 Scrophulariæ,

Radi-

Radicum & Foliorum Sedi minoris,
 Chelidonii majoris,
 minoris,
 Gratiolæ ana Uncias sex :

Incisa coquantur cum
 Aquæ Unciis mille :

Ad dimidias, colatis cum expreffione addantur
 Succorum Cicutæ,

 Chelidonii majoris,
 Hormini ana Unciæ ſexaginta quatuor,
 Sedi minoris Unciæ ſedecim :

Bulliant paululum colentur & evaporentur ad confiſtentiam
 Extracti, hujus Extracti Unciis ſedecim commiſceantur

 Gummi Galbani,
 Ammoniacy,
 Opoſonacy,
 Sagapeni ana Unciæ quatuor,

In Aceto Scillitico diſſoluta & ad confiſtentiam Extracti evapo-
 rata, probe mixta addantur

 Lithargyrii Unciis triginta duabus,
 Oleorum Olivaram Unciis ſedecim,
 Catellorum,
 E Mucilaginitibus ana Unciis octo :

Secundum artem coctione diſſolutis: adjiciantur deinceps

 Florū Sulphuris,
 Ceræ Citrinæ,
 Storacis liquidæ,
 Picis ana Unciæ ſedecim :

Colliquefactis commiſceantur

 Pulverum Radicum Ireos Florentinæ,
 Cyclaminis,
 Ranunculi,
 Coronæ Imperialis,
 Serpentariæ,
 Hellebori albi ana Drachmæ ſex;
 Sigilli Salomonis,

E M P L A S T R U M.

Pulverum Radicum Ari ana Uncia una,
 Aristolochiæ longæ,
 rotundæ,
 Clematitidis ana Drach-
 mæ duæ,

Afari Unciæ tres :

Probe agitentur, usque dum semirefrigeratæ fuerint; tunc
 adjiciantur

Pulverum Baccarum Lauri,
 Florum Meliloti ana Uncia dimidia,
 Seminum Angelicæ,
 Nasturtii ana Drachmæ sex,
 Cumini Unciæ tres,
 Fimi Columbini Uncia una,
 Gummi Asphalti,
 Olibani,
 Mastichis ana Unciæ octo,
 Tacamahacæ Unciæ duodecim,
 Bdellii,
 Myrrhæ ana Unciæ tres,
 Euphorbii Uncia una :

Agitentur usque dum omnia refriguerint, tunc immisceantur
 adhuc

Camphoræ tritæ Uncia una semis,
 Oleorum destillatorum Caryophyllorum Uncia una,
 Philosophorum Unciæ duæ cum di-
 midia :

Formentur Magdaleones.

*Theriacalis hæc compositio olim magni fiebat in Gallia ad
 Resolvendos Tumores Glandularum & Viscerum, hodie evilescere
 cæpit.*

EMPLASTRUM DIACHALCITEOS.

Videatur Emplastrum Diapalmæ.

EMPLASTRUM DIACHYLON CUM GUMMI *VIGONIS*
correctum.

EMPLASTRUM GUMMOSUM *Suecorum.*

℞. Emplastri Diachyli simplicis Uncias viginti quatuor,
Cerae flavæ Uncias quatuor :

Colliquatis addantur

Terebinthinæ Venetæ,

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Opopanacis,

Sagapeni ana Uncia una :

Semirefrigeratis immisceantur :

Pulveris Croci Drachmæ duæ.

Digerendi & Maturandi scopo frequenter usurpatur.

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX *MESUE.*

℞. Mucilaginum Radicis Althææ,

Seminum Lini,

Fœnugræci ana Uncias duodecim,

Olei Olivarum Uncias triginta sex :

Coquantur ad consumptionem humiditatis, tunc addantur

Lithargyrii Unciæ viginti quatuor :

Coquantur ad consistentiam Emplastri.

Proxime ad EMPLASTRUM ADHÆSIVUM accedit. Londinenses Mucilagines omittendo, quæ utique hic parum efficaces sunt, EMPLASTRUM COMMUNE parant; neque etiam male substituitur EMPLASTRO DE LAPIDE CALAMINARI POMPHILUS dicto.

EMPLASTRUM DIAPALMÆ VEL DIAPHOENICON

GALENI correctum, vel DIACHALCITEOS.

℞. Oleorum Palmarum Uncias sex,

Olivarum Uncias sexaginta sex,

Foliorum Quercus tenellorum Uncias octo :

Coquantur ad confumptionem humiditatis; addantur

Lithargyrii Unciæ quadraginta octo :

Coquantur secundum artem ad consistentiam Emplastri, in
Aqua, præcavendæ adustionis gratia affundenda, dissolvantur
Vitrioli albi Unciæ quatuor.

*Exsiccantes & Discutientes vires edit, Ulceribus imponitur
nec non Vulneribus claudendis.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM *MYNSICHTI.*

Rx. Ceræ flavæ Uncias undecim,
Colophonii Uncias quatuor,
Terebinthinæ Uncias duas:

Colliquatis addantur

Pulverum Succini Unciæ tres,
Gummi Bdellii Unciæ quatuor,
Ammoniaci Unciæ duæ,
Galbani,
Sandaracæ ana Uncia una,
Mastychis,
Olibani ana Uncia femis:

Probe misceantur.

Roborandi & Discutiendi sine adhibetur, maxime contra Oedemata laudatur; Luxatis imponitur.

EMPLASTRUM DIAPOMPHOLYGOS *NICOLAI.*

Rx. Olei Solani Uncias triginta quatuor,
Cerussæ Uncias decem:

Coquantur secundum artem ad solutionem usque Cerussæ tunc
Addantur

Ceræ Unciæ triginta quatuor,
Colliquatis adjiciantur,
Plumbi usti Unciæ sex,
Pulverum Pompholygos,
Olibani ana Unciæ quatuor:

Misceantur agitando.

*Refrigerat, Exsiccat, Discutit, Cicatricem inducit. Potest
EMPLASTRO SATURNINO substitui.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS RULANDI.

℞. Balsami Sulphuris RULANDI Uncias sex,
Cerae citrinæ Uncias duas,
Colophonii Uncias sex,
Colliquatis admisceantur,
Pulveris Myrrhæ Unciæ novem,
*Ad Ulcera mundanda & solidanda, discutiendos Tumores,
Strumas maxime haud vulgariter laudatur; in Fistula Ductus
Salivalis egregias inde vires vidit BUCHNER apud SCHULZ
Prælect. in Dispensf. 190.*

EMPLASTRUM DIVINUM NICOLAI correctum.

℞. Lithargyrii Uncias sedecim,
Olei Olivarum Uncias triginta duas,
Viridis Æris Unciam unam,
Coquantur secundum artem ad Diffolutionem Metallorum,
tunc colliquantur cum
Cerae flavæ Unciis octo;
addantur sub perpetua agitatione
Pulverum Gummi Galbani,
Myrrhæ,
Bdellii ana Unciæ duæ,
Ammoniaci Unciæ tres,
Olibani,
Opoponacis,
Mastichis,
Radicis Aristolochiæ rotundæ ana Uncia una,
Lapidis Magnetis Uncia una semis.

*Valentiores quam DIACHYLON cum GUMMI hoc Empla-
strum edere vires temere creditur. Viride Æris, quod sexa-
gesimam circiter ejus partem constituit, quem effectum edet? &
in Magnete tot Oleis & Resinis obducto, quæ spes est fore, ut*

Tela aut alia frusta Ferri ex Vulneribus extrahat? Non male substituitur EMPLASTRO MANUS DEI & EMPLASTRO OPODELDOCH.

EMPLASTRUM AD DOLORES DENTIIUM.

Videatur Emplastrum Cephalicum.

EMPLASTRUM EPISPASTICUM.

Videatur Emplastrum Vesicatorium.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

Videatur Ceratum Refrigerans GALENI.

EMPLASTRUM FRIGIDUM RIEDLINI.

℞. Cerae Citrinae Uncias duodecim,
 Resinae albæ,
 Sevi Hircini ana Uncias sex,
 Terebinthinæ Venetæ Uncias quinque,
 Emplastri Diachyli Uncias sedecim,
 Oleorum Lini Unciam unam semis,
 Liliorum alborum,
 Lumbricorum terrestrium,
 Chamomillæ ana Unciam dimidiam:

Colliquatis addantur

Pulverum Gummi Myrrhæ,
 Olibani,
 Mastichis,
 Galbani,
 Opoponacis, ana Drachmæ duæ,
 Florum Sambuci,
 Chamomillæ,
 Seminum Anisi,
 Foeniculi,
 Fœnugræci ana Uncia semis,
 Fabarum,

Radicum Altheæ,
 Symphyti ana Drachmæ duæ,
 Curcumæ Drachmæ decem:

Probe agitando misceantur; refrigeratis immisceatur,
 Olei destillati Terebinthinæ Uncia una.

*Expertissimo quondam nostratium Chirurgorum hoc Emplastrum
 Digerendi & Resolvendi scopo frequenti in usu fuit, egregios quo-
 que ejus effectus celebrat VON LINDERN Venus Spiegel C. 12.*

EMPLASTRUM AD FUNGOS ARTICULORUM *KLEIN.*

℞. Picis navalis Uncias tres,
 Cerae,
 Terebinthinæ Venetæ ana Unciam unam:

Colliquatis addantur sub perpetua agitatione

Pulverum Radicis Pyrethri,
 Salis communis decrepitati,
 Gummi Euphorbii ana Unciæ duæ,
 Ammoniacy,
 Galbani,
 Mastychis,
 Olibani ana Uncia una.

Vires ex nomine patent.

EMPLASTRUM AD GANGLIA *Brandeburgensium.*

℞. Gummi Galbani,
 Opoponacis,
 Ammoniacy ana Unciam unam semis:

Diffolvantur liquando

Terebinthinæ Venetæ Uncia una semis:

Addantur deinceps

Pulverum Sagapeni,
 Myrrhæ ana Uncia una semis,
 Sulphuris vivi,
 Vitrioli Romani,
 Salis Ammoniacy ana Drachmæ duæ,
 Euphorbii Drachma una:

Probe agitando misceantur, femirefrigeratis addantur
Olei Laurini,

Spiritus Vini ana Uncia semis:

Continuetur agitatio usque dum omnia refrigerent.

*Testatur BUCHNER apud SCHULZ in Dispens. BASSIUM
observasse, hoc Emplastro Ganglia emolliri, manu Chirurgi
postea eo facilius dissipanda: KLEIN Select. Medicam. p. 77.
vidit Hemicraniam Veneream post Antimonii & Mercurii usum
remanentem, tandem hoc Emplastro Capiti superimposito victam
fuisse atque dispulsam.*

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM
MYNSICHTI.

℞. Emplastrorum de Meliloto,

Diachylis simplicis ana Uncias tres;

Ceræ Citrinæ Uncias duas,

Terebinthinæ Unciam unam,

Pulveris Gummi Galbani Uncias sex:

Colliquata agitentur donec pene refrigerent:

Deinceps addantur

Pulveris Croci Drachmæ sex:

Continuetur agitatio, usque dum omnia in spissitudinem Em-
plastri coagulaverint.

*Tumores duros Resolvit; cum successu imponitur Mammis in-
duratis.*

EMPLASTRUM GRISEUM SEU DE LAPIDE CALAMI-
NARI *WECKER.*

℞. Ceræ Uncias tres,

Sevi Cervini Uncias quatuor,

Terebinthinæ sesquiunciam:

Colliquatis addantur

Pulverum Lapidis Calaminaris,

Lithargyrii ana Sesquiuncia,

Tutiæ,

Pulverum Mastychis, .

Olibani ana Uncia femis:

Agitentur usque dum femirefrigerint, tunc addatur

Camphoræ, pauxillo Olei tritæ, Drachma una,

*Eosdem ac EMPLASTRUM DIAPOMPHOLIGOS mitiores ta-
men effectus edit.*

EMPLASTRUM AD HERNIAS *ZWELFFER.*

℞. Cerae flavæ Uncias quatuor,

Terebinthinæ Uncias sex:

Colliquatis addantur

Pulverum Succi Acaciæ,

Hypocistidis,

Mastychis,

Myrrhæ,

Olibani,

Radici Symphyti ana Unciam unam,

Aluminis crudi,

Sanguinis Draconis ana Drachmas sex,

Nucum Cupressi,

Lapidis Hæmatitis,

Seminis Perfoliatæ,

Vitrioli de Cypro ana Unciam femis:

Probe misceantur.

*Satis hodie est evictum, Annulis contenta Abdominis elabi pas-
sis robur reddi Adstringentibus extus applicatis nequaquam posse.
Prudentes Chirurghi totum negotium Naturæ relinquunt.*

EMPLASTRUM DE HYOSCYAMO *LUDOVICI.*

℞. Olei expressi Hyoscyami Uncias sex,

Succi Hyoscyami Uncias duodecim:

Coquantur ad consumptionem humiditatis; addantur

Cerae Unciæ quatuordecim,

Terebinthinæ Unciæ duæ:

PARS II.

X

Liquatis & femirefrigeratis admisceantur demum

Pulveris Herbæ Hyoscyami Unciæ duæ.

Ad Dolores Rheumaticos & Tumores Glandularum & Viscerum laudatur. LUDOVICI ejus eximium in Hydrocele effectum vidit. TRILLERUS quoque egregium ejus usum contra Perniones, Clavos pedum, & Hæmorrhoides cæcas haud semel est expertus.

EMPLASTRUM INCOGNITUM.

Videatur Emplastrum Santalinum.

EMPLASTRUM ISCHIADICUM *Danorum.*

℞. Refinæ albæ Uncias quatuor,
Terebinthinæ Drachmas sex:

Colliquatis adjiciatur

Pulveris Euphorbii Drachma una semis.

In malo Ischiadico parti affectæ Resolvendi causa imponitur.

EMPLASTRUM AD LUPIAM *Viennensium.*

℞. Refinæ Uncias quatuor,
Terebinthinæ Uncias duas,
Gummi Galbani Unciam unam:

Colliquatis commisceantur

Farinæ Frumenti,

Pulverum Gallarum Turcicarum,

Viridis Æris ana Uncia una:

Misceantur probe.

Testatur Cl. PLENER se hoc Emplastro, singulo octiduo renovato, aliquot Lupias in Genu curasse.

EMPLASTRUM MAGNETICUM *ANGELI SALÆ* correctum.

℞. Gummi Galbani,
Ammoniaci ana Uncias tres,
Ceræ,

Terebinthinæ ana Uncias quinque:

Colliquatis addantur

Gummi Sagapeni,

Magnetis Arsenicalis subtilissime triti ana Unciæ tres,

Colcothar Vitrioli,

Olei destillati Succini ana Uncia una:

Misceantur exacte.

*Maxime laudatur ad curandos Bubones Pestilenciales, sed evi-
dum est, Arsenici usum etiam externum maxime suspectum esse.*

EMPLASTRUM MAMILLARE.

Videatur Emplastrum de Spermate Ceti.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Florum Meliloti Uncias duodecim,

Sevi bovini Uncias sedecim,

Coquantur ad consumptionem humiditatis; colatis addantur

Resinæ albæ Unciæ viginti quatuor,

Ceræ Unciæ duodecim:

Colliquefiant.

*Emplastri de Meliloto ANDROMACHI ex Roborantibus maxime
& Discutientibus compositi mentionem facit GALENUS. Ex il-
lo tempore plurimæ Emplastri a Meliloto denominati compositio-
nes in Dispensatoriis occurrunt. Cum hoc Emplastrum propter
vires Emollientes vulgo commendetur, præscriptionem Parisinam
exhibeo, quæ neque Aromata, neque Gummi ferulacea vehit.
Substitui potest EMPLASTRO MALACTICO.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

Videatur Emplastrum de Ranis cum Mercurio.

EMPLASTRUM DE MINIO VIGONIS correctum

℞. Minii Uncias duodecim,

Olei Rosarum Uncias viginti quatuor:

Coquantur secundum artem ad dissolutionem Minii:

Addantur

Ceræ Unciæ tres :

Colliquatis & semirefrigeratis commisceantur

Camphoræ, cum paululo Olei tritæ, Drachmæ duæ.

Laudatur ad Dissipandas Inflammationes, ideoque Fracturis & Ambustis imponitur, nec non Rheumatismis. Vices exsequitur
EMPLASTRORUM DOMUS MISERICORDIÆ, NORICI, TRIAPHARMACI.

EMPLASTRUM MIRACULOSUM.

Videatur Emplastrum Saponatum Barbette.

EMPLASTRUM DE NICOTIANA *LE MORT.*

℞. Foliorum Nicotianæ Uncias quatuor,

Olei Olivarum Uncias duodecim,

Vini rubri Uncias quinque:

Coquantur ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur:

Ceræ,

Colophonii ana Unciæ duodecim,

Colliquatis & colatis admisceantur demum

Pulverum Gummi Tacamahacæ,

Elemi,

Myrrhæ,

Aloës ana Uncia una,

Olei destillati Tabaci Unciæ duæ:

Misceantur.

Spleniticis commendatur: TRILLERUS Abdomini impositum referare Alvum expertus docet.

EMPLASTRUM NIGRUM *BECHHOLZII.*

℞. Cinerum Clavellatorum Uncias quatuor,

Salis Ammoniaci Unciam unam,

Olei Terebinthinæ Uncias octo:

Digerantur per mensem in Cucurbita:

Tunc addantur

Florum Sulphuris Drachmæ sex :

Digerantur denuo per mensem; dein admisceantur

Ceræ flavæ Unciis duodecim,

Colophonii Unciis quatuor,

Terebinthinæ Drachmis sex,

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Bdellii,

Galbani,

Sagapeni ana Drachmis septem;

Myrrhæ,

Olibani ana Drachmis sex:

Colliquatis & semirefrigeratis adjiciatur tandem,

Camphoræ, pauxillo Olei solutæ, Uncia semis.

Partibus Gangrænosus in Sphacelum properantibus imponitur.

Mortuæ separationem a viva parte felicissime inde secundari asse-
verant.

EMPLASTRUM NORICUM.

Videatur Emplastrum de Minio.

EMPLASTRUM OPODELDOCH *PARACELSI.*

Videatur Emplastrum Divinum.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM *NICOLAI.*

℞. Ceræ Uncias fedecim,

Picis,

Colophonii ana Uncias duodecim,

Terebinthinæ Uncias quatuor :

Colliquatis & colatis addantur

Pulverum Gummi Galbani,

Ammoniaci,

Myrrhæ,

Olibani,

Mastychis ana Unciæ quatuor:

X 3

Agitentur & semirefrigeratis addatur

Pulveris Croci Uncia una.

In Luxationibus vim Resolvendi nec non Paregoricam habet admodum efficacem. SCHULZ l. c. egregium ejus effectum refert.

EMPLASTRUM POLYCHRESTUM *HOFFMANNI.*

Videatur Emplastrum Saponatum *BARBETTE.*

EMPLASTRUM DE RANIS *VIGONIS.*

℞. Olei Olivarum,

Lithargyrii ana Uncias duodecim :

Coquantur secundum artem ad dissolutionem Lithargyrii:

Affundatur durante coctione Decoctum ex

Ranarum viventium Numero decem,

Lumbricorum terrestrium viventium Unciis quatuor,

Herbarum Schœnanthi,

Matricariæ,

Florum Stoechados Arabicæ ana Uncia dimidia,

Radicum Enulæ,

Ebuli ana Unciis tribus,

Vini albi Unciis viginti quatuor,

Aceti Vini Unciis octodecim:

Ad dimidias coctis & colatis; addantur

Terebinthinæ,

Ceræ ana Unciæ duæ:

Colliquatis superingerantur,

Pulveris Olibani Drachmæ sex,

Euphorbii Drachmæ quinque:

Agitatis & semirefrigeratis tandem addantur

Olei Laurini Unciæ duæ,

Styracis liquidæ,

Pulveris Croci ana Uncia semis:

Misceantur.

Commendatur ad Emolliendos Tumores frigidos.

Ejus Unciis duodecim si addideris Unciam unam Mercurii habebis.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

Quod cum summo successu non modo Tumoribus Venereis, sed & quibuscunque Glandulis induratis imponitur. Pro varia indicatione Medici duplum, triplum, imo quadruplum rationis Mercurii hic notati solent recipere. Optime aliis EEMPLASTRIS MERCURIALIBUS substituitur.

EMPLASTRUM SANTALINUM VEL INCOGNITUM
Augustanorum.

℞. Cerae,
Resinae ana Uncias quatuor:
Colliquata colentur, eisque addantur
Pulverum Gummi Olibani,
Mastychis,
Myrrhae,
Aluminis ana Drachma una femis,
Ligni Santali rubri Uncia una femis:

Semirefrigeratis commisceantur
Pulveris Croci Drachmae duae.

Frustra hoc Emplastrum ad referendas Hepatis Obstructiones, contra quas olim commendabatur, adhiberi facile patet. Ad Luxationes & Sugillationes vulgo in usum trahi solet, sed hoc quoque respectu EEMPLASTRUM OXYCROCEUM ipsi merito praefertur.

EMPLASTRUM SAPONATUM BARBETTE VEL TACHE-
NII VEL SATURNINUM DIGBY.

℞. Olei Rosarum Uncias duodecim,
Minii,
Cerussae ana Uncias sex:
Coquantur secundum artem ad consistentiam:
Tunc addantur
Saponis Veneti rasi Unciae quatuor:
Agitentur usque dum pene refrigerint, tunc ipsis adhuc im-
misceatur
Camphorae, paululo Olei dissolutae, Uncia dimidia.

Commendatur ad leniendos Dolores Rheumaticos & Arthriticos, Tumores frigidos quoque Resolvere dicitur. Substituitur EMPLASTRO MIRACULOSO ET POLYCHRESTO HOFFMANNI.

EMPLASTRUM SATURNINUM GOULARD.

℞. Cerae Citrinæ Uncias novem,
 Olei Olivarum Uncias octo:
 Liguatis immisceantur
 Extracti Saturni Uncia semis,
 Camphoræ Grana decem.
Inungitur alutæ, qua Membra Rheumatica involvuntur.

EMPLASTRUM SATURNINUM MYNSICHTI.

Videatur Emplastrum Diapompholygos.

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI MYNSICHTI.

EMPLASTRUM FILII ZACHARIÆ.

℞. Gummi Galbani,
 Terebinthinæ ana Unciam unam:
 Leni igne liquentur & colentur:
 Cum colatis colliquentur
 Cerae albæ Unciæ quatuor,
 Spermatis Ceti Unciæ duæ,
 Olei Amygdalarum dulcium Uncia semis.
*Non modo Mammarum Tumoribus medetur, sed & Contusis
 & Sugillatis salubriter imponi potest.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE RANARUM Noricorum
 correctum.

℞. Olei Spermatis Ranarum Uncias sexaginta,
 Cerussæ Uncias octoginta:
 Coquantur secundum artem, aquam ipsis affundendo, in qua
 dissoluta sint,
 Aluminis Unciæ sex,

Ubi

Ubi ad consistentiam Emplastri coagulaverint, removeantur ab igne & femirefrigeratis commisceantur

Camphoræ, paulo Olei solutæ, Unciæ duæ:

Vires EMPLASTRI ALBI COCTI æquiparat, quin & eodem ad Discutiendas Inflammationes efficacius est.

EMPLASTRUM SPLENITICUM.

Videatur Emplastrum de Cicuta.

EMPLASTRUM STICTICUM *CROLLII* correctum.

℞. Lithargyrii,

Minii,

Oleorum Lini,

Olivarum ana Uncias duodecim:

Coquantur secundum artem ad consistentiam Emplastri;

In aqua, quæ sub coctione adjicitur, dissolvantur

Vitrioli albi Unciæ quatuor:

Coctis colliquantur

Colophonii,

Ceræ ana Unciæ viginti quatuor,

Terebinthinæ Unciæ duodecim,

Colatis addantur

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani,

Bdellii,

Myrrhæ,

Aloes Hepaticæ,

Mumiæ,

Radicis Aristolochiæ longæ,

Sanguinis Draconis,

Lapidis Hæmatitæ ana Unciæ duæ,

Olei Laurini Unciæ duodecim:

Probe misceantur.

Ad Ulcèra vetusta æque ac ad recentia Vulnèra olim adhibebatur, hodie fere obsolescit.

PARS II.

Y

170 E M P L A S T R U M . E M U L S I O N E S .

E M P L A S T R U M S T I C T I C U M P L E N C K

Videatur Emplastrum Adhæsivum.

E M P L A S T R U M D E T A C A M A H A C A S C H R Ø D E R I .
correctum.

℞. Cerae Uncias octo ,
Terebinthinæ Unciam unam :
Colliquatis & femirefrigeratis commisceantur
Pulveris Tacamahacæ Unciæ quatuor ,
Balsami Peruviani ,
Oleorum destillatorum Menthæ ana Drachmæ duæ ;
Caryophyllorum Drachma una.

*In Vomitu , Diarrhœa & Flatibus regioni Epigastricæ im-
ponitur.*

E M P L A S T R U M A D T E M P O R A .

Videatur Emplastrum Cephalicum.

E M P L A S T R U M T R I A P H A R M A C U M M E S U E .

Videatur Emplastrum de Minio.

E M P L A S T R U M V E S I C A T O R I U M H O F F M A N N I .

℞. Emplastri de Meliloto Uncias tres :

Liquatis commisceantur
Pulveris Cantharidum Uncia una femis ,
Camphoræ, paulo, Olei solutæ Drachmæ duæ.

*Ex innumeris, quæ prostant, hujus Emplastri præscriptionibus,
simpliciorum reliquis prætuli. Ubi cum delicatioribus & sensibi-
lioribus res est, ratio Emplastri de Meliloto augetur.*

E M P L A S T R U M V I R I D E O R I B A S I I correctum.

Videatur Emplastrum ad Clavos pedum.

E M U L S I O N E S .

Canones.

I. Nuclei cortice privati contunduntur & agitantur cum aqua,

fenfim fenfimque affundenda ; agitatis demum parata Emul-
fio colando depuratur.

II. Ubi Emulfiones Spuriæ parandæ funt, fubftantia ex aqua
fufpendenda fuo teritur fapone, donec tota fit per iftum
diffufa. Aqua guttatim adjicitur, ufque dum omnem maf-
fam receperit.

III. Emulfiones cum ætatem non ferant, tunc demum paran-
dæ funt, cum in ufum funt recipiendæ.

EMULSIO ARABICA FULLER correctæ.

℞. Amygdalarum dulcium Unciam unam:
Amararum Drachmam unam,
Pulveris Gummi Arabici Unciam femis,
Redigantur in Emulfionem cum
Aquæ Unciis viginti quatuor:
Colaturæ addantur
Syrupi Althææ Unciæ tres.
Commendatur præcipue contra Ardorem Urinæ.

EMULSIO BALSAMICA FULLER correctæ.

℞. Balsami Tolutani Drachmas tres,
de Meccha guttas octo:
Terantur cum
Amygdalarum dulcium excorticatarum Uncia dimidia:
Probe fubaftis adjiciantur
Decocti Hordei Unciæ octodecim,
Sacchari albi Drachmæ fex.
*Obfervat TRILLER hanc Emulfionem apte Phtificis præfcribi,
inde Acre demulceri, Putredinem deleri, Tubercula difcuti.*

EMULSIO CAMPHORATA RICHARD.

Videatur Emulfio fimplex.

EMULSIO NITRATA RICHARD.

Videatur Emulfio fimplex.

EMULSIO SIMPLEX *RICHARD.*

℞. Amygdalarum dulcium Numero sedecim,
 Semen quatuor frigidorum majorum Unciam semis:
 Fiat secundum artem Emulfio cum
 Ptilfanæ communis Unciis octodecim:
 Addatur

Sacchari albi Uncia una.

*Refrigerandi, Demulcendi, Sopiendi scopo exhibetur. Ejus
 Unciis sex si addideris Camphoræ Grana duo, surget EMUL-
 SIO CAMPHORATA, NITRATA autem, Nitri depu-
 rati Granis sex adjectis.*

EMULSIO VIOLATA *MYNSICHTI.*

℞. Amygdalarum dulcium Unciam unam,
 Semen Violarum Drachmas duas,
 Papaveris albi Drachmam unam,
 Aquarum Violarum Uncias sex,
 Nymphææ,
 Lactucæ ana Uncias tres:
 Misceantur & fiat lege artis Emulfio, edulcoranda
 Julepi Violati Uncia una.

*Vi Refrigerante & Sopiante vulgo commendatur, quam quidem
 vim cum reliquis Emulsionibus veris communem habet.*

ENS VENERIS *BOYLE.*

Videantur Flores Salis Ammoniaci Martiales.

ESSENTIÆ.

Canones.

- I. Essentia dicitur Spiritus Vini substantiis Animalibus vel Vegetabilibus digestus atque tinctus.
- II. Patet hinc ad Essentias illas modo substantias recipiendas esse, quarum vis medicata pendet a principiis Spiritu Vini dissolubilibus.
- III. Essentiarum vires compositæ sunt ex Extrahendorum & Spiritus Vini viribus.

- IV. Effentiæ simplices recepto Spiritu abstractio loco Spiritus Vini simplicis ut plurimum evadunt efficaciore.
- V. Ad parandam Effentiam simplicem Extrahendo comminuto cucurbitæque immisso affundatur Spiritus Vini; instituitur per aliquot dies Digestio in Balneo arenæ; mane & vespere agitetur Effentia.
- VI. Herbis triplum, Radicibus & Corticibus quintuplum, Gummi resinis, Resinis, Succis Animalium inspissatis sextuplum Spiritus Vini recipitur.
- VII. Spiritus Vini, quo minus est rectificatus, eo plures recipit partes gummofas.
- VIII. Ope Alkali, Extrahendis adjiciendi, Effentiam obtineri efficaciorum frequens opinio est, quæ maxime circa Effentias ex Animalibus versari solet.
- IX. Effentias, quæ Alkali continent extus ad Vulnere aut Ulcera adhiberi non posse, notum jam est ex Chirurgicis.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA STAHLII.

- ℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,
Helenii ana Unciam unam,
Carlinæ Unciam semis,
Vincetoxici,
Pimpinellæ albæ ana Unciam unam semis,

Herbæ Scordii Uncias sex:

Incisa infundantur per noctem cum

Spiritus Vini rectificati Unciis viginti quatuor:

Filtrentur.

Ille ætate, qua morbos Exanthematicos Calidis tractare mos erat, hæc Effentia in frequenti usu fuit, hodie meliora edocti Medici homines, quæcunque Sanguinem exagitant, in morbis Febrilibus prorsus exulare jubent. In affectibus Catarrhalibus Phlegmaticorum poterit forsitan conducere. Datur ad quadraginta Guttas.

ESSENTIA ALEXIPHARMACA TEMPERATA STAHLII.

- ℞. Effentiarum Vincetoxici,

Essentiarum Pimpinellæ albæ ana Unciam unam,
Scordii Uncias duas :

Misceantur.

Minus quidem quam antecedens exagitat Sanguinem, sed eadem cautio in qualicumque Februm genere adhiberi debet.

ESSENTIA AMARA TRILLERI.

℞. Radicum Gentianæ,
Caryophyllatæ ana Unciam unam,
Corticum Aurantiorum viridium,
Herbarum Absynthii,
Fumariæ,
Cardui benedicti,
Trifolii fibrini,
Millefolii,
Florum Chamomillæ,
Summitatum Centaurii minoris ana Unciam semis :

Incisa Digerantur

Spiritus Vini rectificati Unciis quatuor & viginti :

Filtrentur

Plures Essentias amaras ad imitationem ejus, quæ Halæ præparata, auctoritate Sectæ Stahlianæ in magna fama fuerat, Medici Germani præscripserunt. Earum omnium vices, quæ hic exhibetur, sustinet. Teste Auctore vires habet Stomachicas, Carminativas, Anthelminticas, & in vitii Systematis Biliarii, Chlorosi, Fluore albo, in Febris quoque intermittentibus conducit. Dosis est ad triginta Guttas.

ESSENTIA AMBRÆ HOFFMANNI.

℞. Ambraë Gryseæ,
Salis Alkali ana Drachmas duas :
Probe trita immittantur Cucurbitæ, affundanturque
Spiritus Rosarum Tartarifati Unciæ octo :
Coquantur usque dum Ambra sit dissoluta.

Inter Medicamenta Nervos roborantia ab HOFFMANNO Obs. Chym. 18. L. I. cum laude refertur. Datur ad triginta Guttas.

ESSENTIA AMBRÆ SICCA *Augustanorum* correcta.

℞. Ambræ Gryfæ Drachmam unam,
Sacchari albiſſimi Unciam unam:
Miſceantur terendo in pulverem.

*Medicamentum incongrue Effentia denominatum vires Ambræ
habet. Doſis eſt ad ſeſquidrachmam.*

ESSENTIA ANODYNA *Edinburgenſium.*

℞. Extracti Opii Aquoſi Unciam unam;
Diſſolvatur
Aquæ Cinnamomi Unciis novem:
Filtretur.

Vires Opii habet. Doſis ad Guttas quindecim.

ESSENTIA ANTIMONII *HUXHAMI.*

Videatur Aqua Benedicta.

ESSENTIA BALSAMICA *GMELINI* correcta.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci Vinofi Uncias duodecim,
Oleorum deſtillatorum Cinnamomi,
Nucis Moſchatae ana Scrupulum
unum,
Caryophyllorum Scrupulum dimi-
dium,

Quintæ Effentiæ Corticum Aurantiorum,
Citri ana Drachmas duas:

Miſceantur.

*Hanc ſolutionem, quæ vel ex tempore parari poteſt, longe
prolixiori apparatus, quem Diſpensatorium Wurtembergense
præſcribit, præferendam eſſe duxi. Conducit ad vitia Digestio-
nis, quæ a debilitate vel obſtructione Viſcerum Chylopoietico-
rum oriuntur. Doſis eſt ad triginta Guttas.*

ESSENTIA BEZOARDICA *Halenſium.*

℞. Radicum Angelicæ,
Imperatoricæ,

Radicum Pimpinellæ albæ,
 Carlinæ,
 Helenii,
 Vincetoxici,
 Dictamni albi,
 Contrayervæ,
 Valerianæ ana Unciam unam:

Incisa infundantur per triduum cum
 Spiritus Vini rectificati Unciis viginti:
 Expressa filtrentur.

Quæ de Essentia Alexipharmaca dicta sunt, huc quoque pertinent.

ESSENTIA CALAMI COMPOSITA STAHLII.

℞. Radicis Calami Aromatici,
 Seminis Coriandri ana Uncias duas:
 Incisa & contusa infundantur cum
 Spiritus Vini rectificati Unciis viginti quatuor:
 Filtrentur.

Stomachico & Carminativo Scopo ad Guttas triginta exhibetur.

ESSENTIA CAMPHORÆ QUERCETANI.

Videatur Spiritus Vini Camphoratus.

ESSENTIA CARMINATIVA TRILLERI.

℞. Herbarum Millefolii,
 Menthæ,
 Melissæ,
 Rorismarini,
 Salvix,
 Florum Chamomillæ vulgaris,
 Romanæ ana Unciam semis,
 Flavedinis Corticum Aurantiorum Uncias tres,
 Cardamomi excorticati ana Uncias duas,

Semi-

Seminum Foeniculi Unciam unam,

Carvi,

Cumini ana Unciam semis:

Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Vini Unciis quadraginta octo:

Filtrentur.

Dicit Auctor, hanc Essentiam suavissimam ac jucundissimam eximia virtutis esse in omnibus morbis Ventriculi & Intestinorum a causa præsertim frigida ac Flatibus exitum frustra molientibus obortis. Dosis antecedentium.

ESSENTIA CARMINATIVA *WEDELII.*

℞. Radicum Zedoariæ Uncias quatuor,

Carlinæ,

Calami Aromatici,

Galangæ ana Uncias duas,

Florum Chamomillæ Romanæ,

Seminum Anifi,

Carvi ana Unciam unam,

Caryophyllorum Aromaticorum,

Baccarum Lauri ana Drachmas sex,

Macis Unciam semis,

Corticum Aurantiorum Drachmas duas:

Incisa & contusa infundantur cum

Spiritus Corticum Citri Unciis sex & quinquaginta,

Nitri Unciis tribus:

Filtrentur.

Multum olim inter Germanos celebratum Medicamentum, eo quod Humores valide commovet, nostra ætate obsolescere cœpit. Dosis ad Guttas viginti.

ESSENTIA CASTOREI CARMINATIVA *Helvetica.*

℞. Castorei optimi Uncias duas,

Croci Auftriaci Unciam unam:

Minutim incisa infundantur per viginti quatuor horas cum

PARS II.

Z

Liquoris Anodyni Mineralis Unciis duodecim :
Expressa filtrentur.

*Exhibetur in Vomitu, Colica & Affectibus Hystericis ad Gut-
tas triginta.*

ESSENTIA CATHOLICA PURGANS *ROTHII* potius
Hamburgens.

Videatur Elixir Anthelminticum Suecorum.

ESSENTIA CHINÆ SIVE TINCTURA ALEXIPHARMACA
CORTICIS PERUVIANI *HUXHAMI.*

℞. Corticis Peruviani Uncias duas,
Flavedinis Corticum Aurantium sesquiunciam,
Radici Serpentariæ Virginianæ Drachmas tres,
Crocii optimi Scrupulos quatuor,
Coccionellæ Scrupulos duos,
Spiritus Vini Gallici Uncias viginti:

Incisa infundantur per quatuor dies & dein filtrentur.

*Illustris Auctor in Observat. de Aere & Morbis Epidem.
Mens. Jul. 1740 & in Libro de Febris Cap. 8. hoc Medica-
mentum roborare Fibras atque justam fluidorum constitutionem re-
stituere, neque tamen morbose Humoribus exitum per Cutim inhibere
annotat, testaturque se eo non in Febris solum intermittenti-
bus, lentis & nervosis, sed in putridis quoque pestilentialibus &
petechialibus in eorum præcipue decremento salubriter usum esse.
Dosis est ad Guttas sexaginta ter aut quater de die.*

ESSENTIA DULCIS *Halensum.*

Videatur Tinctura Antimonii Acris.

ESSENTIA FULIGINIS *CLAUDERI.*

℞. Cinerum Clavellatorum depuratorum Uncias sex,
Salis Ammoniaci Unciam unam:

Committantur vitro, affundantur

Aquæ fontanæ Unciæ triginta sex:

Statim probe claudatur vitrum, & aliquoties agitetur, usque
dum Salia sint dissoluta, tunc adjiciantur:

Fuliginis e camino splendentis & pulverifatæ Unciæ duæ:
Vitro denuo probe clauso digerantur per aliquot dies & fil-
trentur.

*Quamvis in omnibus, quas huic Essentiæ adscribit, virtuti-
bus adeo non subscribam Claudero de Balsamat. Cap. 7. ut po-
tius in morbis calidis eam esse nocituram CARTHUSERO Pharma-
cop. p. 341 lubens concedam; attamen cum ejus indoles sit evidenter
saponacea, vires utique Resolventes & Aperientes polliceri, neque
sine successu in Quartana, Ictero &c. adhiberi posse liquido videtur.*

ESSENTIA HYSTERICA *DURIETZ.*

℞. Afæ foetidæ Drachmas duas,
Opii,
Salis Volatilis Cornu Cervi ana Drachmam femis,
Essentiæ Castorei Uncias tres,
Digerantur per aliquot dies & filtrentur.
In Paroxysmis Hystericis ad Guttas viginti datur.

ESSENTIA LIGNORUM *Hamburgenfium.*

℞. Radicum Sarfaparillæ,
Helenii,
Chinæ ana Unciam unam,
Rhabarbari Unciam dimidiam,
Lignorum Quajaci,
Sassafras ana Unciam unam,
Santali rubri Drachmas sex,
Summitatum Fumariæ Unciam unam:
Incisa infundantur per octiduum cum
Spiritus Vini Unciis viginti quatuor:
Filtratis addantur
Spiritus Salis Unciæ tres.
*Medicamenti, quo tanquam Polychresto ad quascunque Humo-
rum corruptiones olim frequentissime utebantur, hanc apponere*

præscriptionem, quam vulgo receptam Michaelianam consultius duxi. Dosis est ad Guttas triginta.

ESSENTIA STOMACHICA POLYCHRESTA
GUNDELSHEIMERI.

℞. Piperis longi,
Nigri,
Albi ana Drachmas duas,
Hispanici Unciam unam:

Contufis affundantur

Liquoris Terræ foliatæ Tartari,

Spiritus Salis Ammoniaci Vinosi ana Unciæ sex:

Digerantur & filtrentur.

Valide omnino Resolvit, in Glutinoso & in Cachexia conducit, sed in Temperie frigida modo locum habet. Datur ad Guttas triginta.

ESSENTIA STOMACHICA AD METHODUM HOFF-
MANNI Argentoratensium.

℞. Radicum Calami Aromatici,
Angelicæ,
Galangæ minoris,
Zedoariæ ana Drahmas tres,
Herbarum Cardui benedicti,
Menthæ,
Millefolii,
Trifolii fibrini,
Summitatum Centaurii minoris,
Florum Chamomillæ Romanæ ana Drachmas duas,
Corticum Cascarillæ Unciam semis,
Aurantiorum,
Citri ana Drachmas duas,
Costi veri Scrupulos quatuor,
Macis,
Nucis Moschatae,

Seminum Anisi,
 Fœniculi ana Drachmam unam,
 Salis Tartari Drachmas sex:
 Incisa, contusa infundantur cum
 Vini Malvatici Unciis quatuor & viginti:
 Filtrentur.

Hæc Essentia minus, quam quæ Spiritum Vini recipiunt, calida ad roborandum Ventriculum frequentius usurpatur. Datur ejus Cochlear parvum pro dosi.

ESSENTIA SUCCINI *HOFMANNI.*

℞. Succini subtilissime triti,
 Salis Tartari ana Uncias duodecim:
 Infundantur per aliquot dies cum
 Spiritus Vini rectificatissimi Unciis viginti quatuor:
 Abstrahatur deinde Spiritus & affundatur
 Succini subtilissime triti Unciis octo cum
 Olei Tartari per Deliquium quantitate sufficiente; in pastam
 tritis & exsiccatis
 Per octiduum calore Balnei digesta filtrentur.
Nervina & Anticatarrhalis esse censetur.
Dosis est ad Guttas viginti.

ESSENTIA TRAUMATICA *WEDELII.*

℞. Radicis Tormentillæ Unciam semis,
 Florum Rosarum rubrarum
 Hyperici ana Drachmas duas,
 Ligni Santali rubri,
 Mumie,
 Sanguinis Draconis ana Unciam unam,
 Terræ Japonicæ,
 Myrrhæ rubræ ana Unciam semis,
 Nucistæ Drachmam unam:
 Incisa infundantur cum

Spiritus Vini Tartarifati Unciis viginti:
Filtrentur.

Laudatur ad sistendas Hæmorrhagias; quo merito? Medicis intelligentibus facile patebit. Funestos inde effectus vidit & affert TRILLERUS.

EXTRACTA.

Canones.

- I. In partibus ne Resinosis an Gummosis hæreat virtus, quam de substantia Extrahenda desiderant, Medicorum est nosse, & pro hac ratione Menstruum determinare.
- II. Aqua quidem Resinas dissolvere nequit, sed partes Resinosæ Gummosis ut plurimum adeo arcte immixtæ esse solent, atque implicitæ, ut cum his ipsam aquam fubeant.
- III. Extractum Gummosum a Resina liberum qui habere cupiunt aquam quæ Extractionem peregit, per aliquod tempus coquant, frigidam ipsi adjiciant, & aliquantisper in quiete relinquunt, ita maxima saltem Resinæ portio ad fundum secedit, unde dein decantatur liquor partibus Gummosis foetus.
- IV. Liquor, qui Extractionem peregit, citra ebullitionem ad consistentiam Syrupi tenuioris est perducendus, dein super discos effundendus, & justo calore evaporandus.
- V. Vulgaris Extracta mollia parandi ratio ea est, qua ipsis semper Empyreuma affricatur.
- VI. Vinum parandis Extractis, quibus quippe varia suorum principiorum nunquam non immiscet, minus idoneum est.
- VII. In Vasis metallicis Extracta, quippe acido nunquam non imprægnata pessime asservantur.
- VIII. Plurima Extracta cum humiditatem ex aëre attrahant, in vasis probe clausis condenda sunt.
- IX. Omnes Succis inspissati substantiæ unde parantur, vires proprias habent, sed & hic probe cavendum ne adurantur.
- X. Succis inspissati CUCUTÆ, ACONITI, CHELIDONII MAJORIS, COCHLEARIÆ, HYOSCYAMI, NICOTIANÆ, STRAMONII, BELLADONNÆ ET TARAXACI sub nomine Extractorum prostant.

EXTRACTUM CATHOLICUM *PARACELSI sive RUDII.*

℞. Radicum Hellebori nigri,
 Agarici optimi,
 Scammonei ana Unciam unam,
 Pulpæ Colocynthis Unciam unam semis,
 Aloës optimæ Uncias duas,
 Spiritus Vini Uncias triginta:

Infundantur per aliquot dies, deinde exprimantur & colentur, Abstrahatur postea Spiritus Vini.

Refert WEPFER Observat. Medic. Pract. Obs. 46. EUSTACHIUM RUDIUM Medicum Italum hoc Extractum enixe commendasse & pro suo venditasse. Omnia Medicamenta Veterum Catholica cum Viscera Abdominalia admodum conturbent, rarissime hodie usurpantur.

Dosis est ad Grana decem.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI *BACHERI.*

Radices Hellebori nigri tenuissime comminutæ vasi terreo vitreato committuntur, irroratæ Spiritu Vini alcalifato per duodecim horas relinquuntur, quo temporis intervallo aliquoties agitatæ iterum irrorantur, Vino deinde Rhenano bonæ notæ ad eminentiam sex digitorum illis affuso digeruntur per biduum & cum Radices Vinum imbiberint, novum adjicitur, ita ut semper ea, quæ dicta est, Menstrui ratio obtineat; crebro quoque spatulæ ligneæ ope Radices cum Vino commiscuntur; tum coquuntur per dimidiam horam valideque exprimuntur; residuis Radicibus tantundem Vini affunditur, & reliqua omnia, ut antea facta sunt, eadem methodo iterantur. Jam ambobus liquoribus expressis & colatis ferventis Aquæ duplum adjicitur, evaporatioque instituitur usque ad consistentiam Syrupi; addita postmodum Spiritus Vini nona parte evaporatio continuatur, usque dum Terebinthinæ consistentia surrexerit.

Hoc Extractum Pilularum Tonicarum infra describendarum basin constituit, utrum vero illud, quod vulgari ratione paratur, reapse superet nec ne, experientia iudice sed caute & prudenter in-

stituta decernendum est. Præparatio ipsa varia videtur habere superflua, sed circa Medicamenti novi & tantopere laudati dosin quidquam mutare nolui.

EXTRACTUM LIQUIRITIÆ GUMMOSUM *Argentorat.*
 GELATINA LIQUIRITIÆ, SACCHARUM GLY-
 CYRRHIZATUM *Helvetorum*, REGLISSE
 ROYALE, LIQUIRITIA LUCIDA *Da-*
norum, GLUTEN PECTORALE.

R. Radicis Liquiritiæ rasæ & contusæ Unciam unam:
 Infundantur per viginti quatuor horas in aquæ calidæ Unciis
 centum & viginti:

In colatura dissolvantur

Gummi Arabici albissimi Unciæ sexaginta,

Sacchari Canariensis Unciæ quadraginta:

Dissoluta colentur & brevi coctione in consistentiam Gelatinæ
 reducantur; tunc effundatur liquor in exiguæ altitudinis mo-
 dulos metallicos pauxillo Olei Amygdalarum illitos, lenique
 fornacis calore exliccetur.

*Suave æque ac efficax remedium ad sistendam Tussim ab Irrita-
 tione ortam. Ejus frustum, Drachmam circiter æquans, ore liquatur.*

EXTRACTUM MAROCOSTINUM.

R. Aloës Succotrinæ Uncias duodecim;

Dissolvantur

Succorum Absynthii,

Apii,

Fœniculi ana Unciis tribus,

Cichorei,

Fumariæ,

Pimpinellæ ana Unciis octo,

Rosarum,

Citri ana Unciis viginti:

Solutio clara decantetur & ad consistentiam Mellis evapore-
 tur, tunc addantur:

Extracto-

Extractorum Rhabarbari Drachmæ sex,
 Croci Drachma semis,
 Gummi Ammoniaci pulverifati Uncia una semis,
 Aceti Scillitici Unciæ quatuor:

Evaporent ad consistentiam Extracti, cui exacte immisceantur
 Pulverum Mari veri Uncia semis,
 Costi veri Drachmæ sex.

*Vulgo tanquam basis Pilularum præscribitur. Ejus Dosis ad
 Grana viginti & ultra determinatur.*

EXTRACTUM OPII.

Opium dissolvitur aqua, colatur & leni calore ad consistentiam
 Extracti evaporatur.

EXTRACTUM OPII CYDONIATUM *LANGELOTTI.*

R. Opii optimi Uncias duodecim:

Solvantur

Succi Cydoniorum,
 Aquæ fontanæ ana Unciis sexaginta:

Stent in loco temperato per aliquot dies, tunc colentur:

Colaturæ addantur

Sacchari albi Unciæ quatuor:

Omnis massa relinquatur Fermentationi; quæ per plures men-
 ses durare solet, quo temporis intervallo baculo ligneo sæpius
 est agitanda, donec omnis motus intestinalis cessaverit; traji-
 ciatur postea liquor per pannum & evaporetur ad consistentiam
 Extracti.

*Opium Fermentatione vi nocendi privari, medendi contra au-
 geri putarunt varii Auctores, atque hoc Extractum reliquis om-
 nibus Opium adhibendi rationibus anteposuerunt; sed in ipso
 hoc Extracto vim Opii esse imminutam, neque maximo labore
 quicquam eo obtineri, præterquam quod grandior ejus dosis sit
 exhibenda, siquidem medicatas inde cupiamus experiri vires,
 evicit Illustris TRALLES Usus Opii Sect. I. Cap. VII. §. 14.*

EXTRACTUM PANCHYMAGOGUM *Augustanorum.*

R. Scammonei Unciam unam,

Pars II.

A a

Seminis Ebuli Drachmas sex,
 Colocyntidis Drachmas decem,
 Agarici Drachmas septem,
 Turpethi albi Drachmas quinque,
 Spiritus Vini Uncias triginta:
 Digerantur per aliquot dies; addatur deinceps Infusum ex
 Rhabarbari Drachmis sex,
 Hermodactylorum Drachmis quinque,
 Hellebori nigri Uncia semis,
 Foliorum Sennæ Unciis duabus,
 Aloës Succotrinæ Unciis tribus, cum
 Aquæ fontanæ Unciis viginti quatuor maceratis & expressis:
 Abstrahatur Spiritus Vini, residuum ad consistentiam Extracti
 evaporetur.

*Inconcinnam compositionem Medicamenti valde irritantis ideo
 apposui, quia haud pauci Medicorum illud adhuc in Pilulas re-
 cipere solent. Dosis ad Grana quindecim.*

EXTRACTUM RUDI.

Videatur Extractum Catholicum.

EXTRACTUM SATURNI GOULARD.

℞. Minii Uncias quinque,

Aceti Uncias nonaginta:

Coquantur sub perpetua agitatione per horam in vase terreo:
 Liquor ad Mellis consistentiam redactus, decantatus asservetur.

*Hoc Extractum omnium egregii Chirurgi remediorum, suis lo-
 cis descriptorum basin constituit.*

Lithargyrio vix non semper Ære inquinato, Minium substi-
 tuo, nec majorem Aceti rationem recipio, quam quæ ab Ace-
 to potest dissolvi.

FARINÆ EMOLLIENTES PLENCK.

℞. Farinarum, Seminum Lini,

Fœnugræci ana partes æquales.

Epithematis vel Cataplasmatibus forma applicantur.

FARINÆ RESOLVENTES PLENCK.

℞. Farinarum Fabarum,

Farinarum Hordei,
Tritici,
Secalis ana partes æquales.

Applicantur ut antecedentes.

FEBRIFUGUM CRANII.

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

FECULA LIBAVII.

Radix recens contunditur cum modica Aquæ portione, prelo inde exprimitur Succus, id quod ex isto ad fundum residet colligitur & probe Aqua ablutum edulcoratur.

Hac ratione cum sive pars amylacea Radicis obtineatur, quæ undecunque colligatur semper eadem est; sive si ista carent Radices nonnisi partes terrestres Feculam efformant, hinc Feculæ eviluerunt.

FLORES ANTIMONII BASIL. VALENTINI.

℞. Reguli Antimonii Uncias octo,
Salis Ammoniaci Uncias sedecim:
Trita sublimentur ex Retorta excipulo instructa; colligantur Flores.

Validissimum hoc Drasticum hodie usu suo fere plane destitutum videmus.

FLORES BENZOES SCHRÆDER.

Benzoës optime pulverifata committatur Cucurbitæ, cujus collum ampliori orificio gaudet; immittatur Balneo arenæ; lenis subministretur calor; orificio cucurbitæ imponatur cucullus chartaceus, cui Flores accrescant; refertus Floribus removeatur, Flores inde decutiantur; imponatur denuo cucullus & hæc repetantur, usque dum Flores appareant tincti, tunc enim ab ulteriore labore est desistendum.

Hi Flores ob virtutem Incidentem ad affectus Pulmonum commendari solent. Dantur ad Grana octo.

FLORES SALIS AMMONIACI MARTIALES *ISAACI
HOLLANDI.*

SAL AMMONIACUM MARTIALE *Suecorum.*

℞. Salis Ammoniaci Ūncias fedecim:

Limaturæ Martis Ūnciam unam semis:

Probe mixta committantur Retortæ, & hæc Balneo arenæ; subministratur ignis, & Flores eo magis colorati surgent, quo sunt inferiores; refrigerato vase omnes defumantur, cum residuo terantur, & denuo sublimentur. Liquor penetrantissimus, qui sub hoc labore obtinetur, seorsim allervandus est. Residuum per deliquium liquatum OLEI seu LIXIVII MARTIS *Londinensium* nomine vulgo venit.

Hi Flores cum sint ipse Sal Ammoniacus aliqua Ferri portione imbutus; vires Aperientes omnino possident, & in Obstructionibus Viscerum Abdominalium morbisque inde oriundis cum successu exhibentur. Hinc maxime iis, qui Febri laborant, commendantur; nec audiendi sunt, qui præeunte MAURITIO HOFFMANNO Prol. 43. §. 9. aliquid Narcotici iis inesse suspicantur. Dosis est ad Drachmam semis. Spiritus urinosus, qui sub hoc labore obtinetur, respectu virtutis medicatæ cum Spiritu Salis Ammoniaci Calce viva parati convenit. Oleo Martis vix utuntur Medentes, cum medicamentum sit rodens.

FLORES SULPHURIS *GEBER.*

Obtinentur pulverem Sulphuris in cucurbita Alembico tecta, Balneoque arenæ commissa sub calore urgendo, ita moderato ne Sulphur fluat.

Hic autem labor cum sit admodum tædiosus, Floresque id genus in propriis hominum huic negotio destinatorum officinis magna copia parentur, Pharmacopæi inde sibi eos comparare ut plurimum consultius ducunt.

Vires in Materia Medica recensentur.

FLORES VIRIDIS ÆRIS.

Viride Æris digeratur Aceto, Acetum probe tinctum filtre:

tur, leni igne evaporetur ad cuticulam, & crySTALLIFICATIONI relinquitur.

Pictoribus potius quam Medicis hæ Crystalli, improprie sane Flores dictæ, inserviunt.

FLORES ZINCI GLAUBERI.

Zincum committatur Crucibulo, fundatur, fufum stylo agitetur, flamma viridi ardebit, & sub forma Florum tam parietibus Crucibuli, quam operculo five metallico five lapideo, Crucibulo imposito, accrescet. Hi Flores collecti asservantur.

GLAUBER in Philosoph. Ofen. P. I. C. 38. hos Flores describit eorumque extus adhibitorum vires Exsiccentes in Ophthalmia quoque efficaces laudat, Ophtalmicas BARBETTE Prax. Cap. 4. & DECKER in Notis, iterata sæpius experientia nixi commendat. Quin etiam intus assumptos ad Grana duodecim Sudorem, interdum quoque Vomitum & Alvum movere GLAUBER aliique post eum asseverant, nescio, qua experientia rationeve ducti. Illustri GAUB in Advers. HART in Dissert. de Zinco; DUNCAN in Medical. Comment. by a Society in Edinburg. passim exempla proferunt Epilepsiæ aliquot Granis pro Dosi datis felicissime fugatæ.

FOMENTATIO FRIGIDA SCHMUCKER.

℞. Aquæ fontanæ Uncias centum & viginti,
Aceti optimi Uncias duodecim,
Nitri depurati Unciam semis,
Salis Ammoniacy Uncias duas:

Misceantur.

Clarissimus Auctor hoc Fomento frigide applicato cum summa efficacia usus est ad Vulnere Capitis cum Cerebri commotione Humorumque effusione juncta. Cl. PLENCK illud ad Hernias quoque incarceratas laudat.

FOMENTUM ANODYNUM RICHARD.

℞. Foliorum Althææ Manipulos quatuor,
Papaveris hortenfis Manipulum unum,
Hyoscyami Pugillos duos:

Incisa coquantur cum

Aquæ fontanæ Unciis quadraginta octo, ad Uncias quadraginta residuas:

Liquor expressus fervetur.

FOMENTUM AD ERYSIPELAS *RICHARD.*

℞. Florum Sambuci Manipulum unum:

Infundantur cum

Aquæ fontanæ Unciis sedecim per noctem:

Colatura dissolvantur

Spiritus Vini Camphorati Uncia una,

Sacchari Saturni Drachma una.

Ante applicationem probe concutiendum est.

FOTUS AD GANGRÆNAM *RICHARD.*

℞. Corticis Chinæ grosse contusi Unciam unam:

Coquatur ex

Aquæ fontanæ Unciis quadraginta octo,

Ad Uncias triginta duas residuas:

Addantur

Florum Chamomillæ Romanæ,

Tanacetana Uncia semis:

Post aliquot ebullitiones coletur liquor;

Addantur

Spiritus Vini Camphorati Unciæ duæ,

Salis Uncia una:

Misceantur.

GARGARISMA ACETOSUM *PLENCKII.*

℞. Aquæ fontanæ Uncias duodecim,

Aceti Rosarum Uncias duas,

Mellis Rosacei Unciam unam:

Misceantur.

In Anginæ Inflammatoriæ adhibetur.

GARGARISMA ADSTRINGENS *RICHARD.*

℞. Corticum Granatorum Unciam unam,

Florum Balauftiorum Unciam femis:

Incifa coquantur per dimidiam horam in

Aquæ fontanæ quantitate fufficienti ad refiduum Unciarum
fedecim:

Colatura diffolvantur

Aluminis Drachma femis,

Syrupi de Rofis ficcis Uncia una.

Cruentationibus Oris opponitur.

GARGARISMA ANTISCORBUTICUM *RICHARD.*

℞. Decocti Antifcorbutici Uncias fedecim,

Spiritus Cochleariæ Unciam unam,

Salis Drachmas duas,

Oxymellis Simplicis Uncias duas:

Mifceantur.

GARGARISMA DETERGENS *RICHARD.*

℞. Hordei integri Unciam unam:

Coquatur in

Aquæ fontanæ Unciis duabus & triginta ad refiduum Un-
ciarum fedecim:

Addantur

Foliorum Agrimonix,

Rubi ana Pugilli duo:

Post aliquot ebullitiones colentur & in colatura diffolvantur

Mellis Rofati Uncia una,

Nitri depurati Drachma una.

Adhibetur Ulceribus Faucium apertis.

GARGARISMA EMOLLIENS *RICHARD.*

℞. Radicis Althææ Unciam unam,

Caricarum Unciam femis:

Incifa coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis viginti quatuor ad refiduum Uncia-
rum fedecim:

Colatura diffolvatur

Oxymellis simplicis Uncia una.
Ad Oris & Faucium Abscessus adhibetur.

GARGARISMA MERCURIALE *PLENCK.*

℞. Mercurii vivi Drachmam dimidiam,
 Gummi Arabici Drachmas tres,
 Syrupi Diacodij Unciam femis,
 Mercurii dulcis grana sex:
 Probe terendo subactis addantur
 Herbæ Flammulæ Iovis Uncia femis, cum Aquæ Unciis
 viginti sex paululum decoctæ,
 Mellis Rosacei Uncia una,
 Essentiæ Myrrhæ Drachma una.
*Ulcerâ Faucium Venerea sanat, in Ozena Venerea saluberrime
 Naribus injicitur.*

GARGARISMA AD PITUITAM *KLEINII.*

℞. Aquarum Radicis Angelicæ,
 Hyssopi ana Uncias sex,
 Spirituum Cochleariæ Unciam femis,
 Salis Ammoniaci Scrupulos quatuor,
 Pulveris Seminis Sinapeos Drachmam unam,
 Mellis Rosacei Uncias quatuor:
 Misceantur.

GARGARISMA CUM SPIRITU SALIS AMMONIACI
PLENCKII.

℞. Radicum Althææ,
 Caricarum ana Drachmas sex:
 Incisa coquantur cum
 Lactis Vaccini Unciis fedecim ad Uncias duodecim residuas:
 Colaturæ addatur
 Spiritus Salis Ammoniaci Uncia femis.
*Anginas Inflammatorias, quas Gargarisma Acetosum non
 Resolvit, huic cedere Illustris PRINGLE observavit.*

GELATINÆ

Canones.

- I. Quando partes animales aqua coquuntur, Decoctum proprie Juris nomine venit.
- II. Ab hoc vero jure si jam maxima pars aquæ ad decoctionem adhibitæ erit evaporata, tunc partes ex animali extractæ, cessante calore, in consistentiam spissam & tremulam digitis non adhærentem coeunt, & GELATINÆ nomen acquirunt.
- III. Hæc rursus Gelatina si sub continua agitatione penitus erit exsiccata GLUTEN sive GELATINA SICCA dicitur.
- IV. Gelatinæ animales cum ætatem non ferant, usus demum tempore parari debent.
- V. Nostra ætate plura Rob genera, quæ consistentiam tremulam & pelluentem induunt, GELATINÆ, GELATA, GELEES appellantur.

GELATINA ANALEPTICA *Helvetorum.*

- ℞. Rasuræ Cornu Cervi Uncias quatuor,
Eboris Uncias duas,
Femorum Gallinæ annosæ contusorum N^o. tria,
Carnis Bovinæ, ex Femore desumptæ, Uncias viginti quatuor,
Aquæ fontanæ Uncias centum & viginti:
Coquantur lento igne ad residuum Unciarum triginta:
Tunc adjiciantur
Cinnamomi acuti Drachma una,
Caryophyllorum Aromaticorum Scrupulus unus,
Pomi Citri dimidium:
Coquantur adhuc per quadrantem horæ, tentetur liquor, num refrigeratus in Gelatinam concreverit:
Tunc addantur
Sacchari albi Unciæ quatuor:
Clarificentur Albumine Ovi.
Hæc Gelatina ad Cochlear unum datur Tabidis & a morbis revallescentibus.

PARS II.

B b

GELATINA CORNU CERVI AMYGDALATA *KLEIN.*

℞. Rafuræ Cornu Cervi Uncias octo,
Aquæ fontanæ Uncias centum:

Coquantur lento igne usque dum ex parva decocti portione refrigerata consistentiam Gelatinæ surrexisse appareat, tum coletur liquor, & cum eodem fervido Emulgeantur secundum artem

Amygdalarum dulcium excorticatarum Unciæ quatuor:
Emulfioni colatæ addantur

Pulveris Sacchari albissimi Unciæ sex:
Refrigerata trahatur in usum.

Demulcendi, Refrigerandi, Nutriendi gratia ejus Cochlear unum in Unciis quatuor Juris Carnium diluitur. Eadem Flavædinis Citri recentis & Aquæ Florum Naphæ modica portione addita, gratum edulii genus paratur, quod BLANC MANGER appellare solent.

GELATINA CORNU CERVI CITRATA *KLEIN.*

℞. Rafuræ Cornu Cervi Uncias sex,
Aquæ fontanæ Uncias septuaginta duas:

Decoquantur ad residuum Unciarum quadraginta octo:
Tunc addantur

Vini albi generosi Unciæ quatuor,
Coquantur ad consistentiam Gelatinæ, cui ope Albuminis Ovi clarificatæ adjiciantur

Succi Citri Uncia una:
Syrupi Citri ex toto Unciæ duæ.

Tabidis nec non Acrimonia laborantibus cum successu præscribitur.

GELATINÆ FRUCTUUM.

℞. Succi ex fructu aqua fuffuso expressi & per Manicam colati,

Sacchari albissimi ad consistentiam Tabulandi cocti ana Uncias sedecim:

Coquantur leni igne ad consistentiam Gelatinæ, fervens adhuc trajiciatur per pannum laneum; reponatur in ollis leviter tectis, elapsis demum aliquot diebus curatius obturandis.

GELATUM.

Videatur Rob.

GILLA THEOPHRASTI.

Est Vitriolum album solutione & filtratione depuratum.

A Medicamento Æneis & Plumbeis principiis instructo, & cujus infida prorsus operatio est prudenti sane consilio Medici abstinent.

GLOBULI CARMINATIVI UTECHTI.

℞. Saponis Veneti Uncias quatuor,
Fellis Tauri Unciam unam semis,
Nitri crudi Unciam semis,
Sacchari Thomæi Uncias duas:
Misceantur & formentur in Globulos diversæ magnitudinis.

GLOBUS AD ERYSIPELAS PLENCKII.

℞. Terræ figillatæ albæ Uncias duas,
Ceruffæ,
Cretæ ana Unciam unam,
Pulverifata
Spiritus Vini Camphorati quantum fatis
Formentur in Globum.
Chartæ cærulea hoc Globo illita, imponitur Erysipelati.

GLOBULI MARTIALES.

TARTARUS MARTIALIS Suecorum.

℞. Limaturæ Martis subtilissime tritæ Uncias sex,
Tartari albi pulverifati Uncias duodecim:
Coquantur cum
Aquæ Unciis octoginta ad siccitatem:
Hic Pulvis cum

Spiritus Vini idonea quantitate formetur in globos, qui ovi Columbini fere figuram & magnitudinem habeant.

Suspenduntur ex Spiritu Vini vel Aqua usque dum horum Merstruorum color sit probe saturatus, tunc splendorum ope Vulneribus applicantur, vel intus quoque, ubi indicatio usum Marzialium suadet, exhibentur.

GLOBULI MOSCHATI.

℞. Sacchari albissimi Uncias duodecim,
Amyli albi Unciam semis,
Radicum Ireos Florentinæ Drachmas duas:
Pulverifata redigantur cum
Mucilaginis Tragacanthæ quantitate sufficiente
In globos variæ magnitudinis.

Tanquam Suppositoria exhibentur. Ceterum Medicamento, Ano destinato odoramenta adjicere, absurdum mihi videbatur, ideoque Moschum & Zibethum omisi.

GLUTEN PECTORALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

GUTTÆ ANGLICÆ CEPHALICÆ.

℞. Spiritus Serici Uncias quatuor,
Olei destillati Lavendulæ Drachmam unam,
Spiritus Vini Unciam unam:
Per aliquot dies digesta Destillentur usque dum guttæ Olei appareant.

Quod CAROLUS SECUNDUS Rex Angliæ a quodam Chemico emit Medicamentum, LISTER TOURNEFORTIO communicavit. Oleum Spiritui Serici adjiciendum proprie Cinnamomi non Lavendulæ est: Laudatur contra Affectus soporosos & Deliquia animi, tam intus ad Guttas quadraginta dandum, quam Naribus admovendum.

GUTTÆ GENERALIS DE LA MOTTE.

℞. Auri fulminantis Drachmam unam:

Diffolvatur

Spiritus Nitri Unciis duabus :

Addantur

Spiritus Vini rectificatissimi Unciæ duæ & triginta :

Digerantur per mensem

Cordiales & Cephalicæ huic Medicamento adscribuntur Vires.

GUTTÆ GENERALIS DE LA MOTTE ALBÆ.

Sunt Spiritus Nitri Dulcis.

HEPAR ANTIMONII *BASIL. VALENTINI.*

CROCUS ANTIMONII *Londinensium.*

℞. Antimonii crudi Uncias decem,

Salis Tartari Uncias triginta :

Mixta fundantur in Crucibulo.

Huic Medicamento, cum debeat esse Antimonium per Alkali reclusum, Antimonium calcinatum & per se fusum, ut BEAUME Chymie. II. pag. 323. placet, pessime substitui, patet. Medici eo tanquam insigni drastico, nisi ad parandum Crocum Metallorum, non utuntur. Mulomedicis in usu est.

HYDROMEL PRO POTU *RICHARD.*

℞. Ptisanæ communis Uncias quadraginta octo,

Mellis optimi Uncias tres :

Misceantur.

In affectibus Peſtoris ad potum ordinarium præscribitur.

INFUSUM AMARUM *RICHARD.*

℞. Herbarum Cardui benedicti,

Chamædryos,

Chamæpityos ana Unciam femis.

Florum Centaurii minoris,

Hyperici,

Lupuli ana Drachmas duas :

B b 3

Incifa infundantur per horam in

Aquæ bullientis Unciis quinquaginta sex:
Colatura trahatur in ufum.

Roborandis Primis viis Unciæ ſex adhibentur pro Doſi.
Si adjeceris Spiritus Vitrioli Drachmas quinque, habebis
ACIDULATUM.

INFUSUM ANGELICUM.

Videatur Aqua laxativa Angelica.

INFUSUM LAXATIVUM.

Videatur Aqua laxativa *Viennenfium*.

INFUSUM MALTI MACBRIDE.

℞. Malti craſſo modo comminuti Uncias duodecim:
Infundantur per ſex horas cum
Aquæ ebullientis Unciis ſex & triginta:
Colentur.

*Scorbuticis & morbis Putridis laborantibus datur ad Uncias
quadraginta octo de die.*

INFUSUM VEL AQUA PICIS BERCKLEY.

℞. Picis liquidæ Uncias duodecim,
Aquæ communis Uncias quadraginta octo:
Crebro agitentur bacillo ligneo; Aqua decantata trahatur in
ufum:
Conferantur ad Picem dicta P. I.

INJECTIO AURICULARIS DETERGENS PLENCKII.

℞. Herbæ Rutæ Manipulum unum,
Aquæ fontanæ Uncias ſex:
Infundantur per noctem, colaturæ addantur
Effentiæ Myrrhæ Drachma ſemis,
Mellis Roſacei Drachmæ ſex:
Miſceantur.

In Ulceribus Meatus Auditorii Saniem fundentibus hujus Liquoris tepidi bis quotidie, quantum cavum Auriculare capere potest, injicitur & per aliquot minuta custoditur.

INJECTIO BALSAMICA *PLENCKII.*

℞. Balsami Copaivæ Unciam dimidiam:

Solvatur Vitello ovorum.

Solutioni addantur:

Aquæ Calcis Unciæ sex,

Mellis Rosacei Unciæ tres:

Misceantur probe.

Ad claudenda Ulcera sinuosa injicitur.

INJECTIO DETERGENS *PLENCKII.*

℞. Aquæ Calcis Uncias duodecim,

Unguenti Ægyptiaci Unciam unam:

Misceantur.

Ulceribus fistulosis detergendis injicitur.

INJECTIO MERCURIALIS *PLENCKII.*

℞. Mercurii vivi Drachmam unam,

Gummi Arabici Drachmas tres,

Syrupi Diacodii Unciam semis:

Probe tritis addantur

Aquæ fontanæ Unciæ duodecim,

Rutæ Unciæ duæ:

Misceantur.

Adhibetur contra Gonorrhœam & Fluorem album habituales.

JULEPUS ACIDULATUS *RICHARD.*

℞. Ptisanæ communis Uncias quatuor & viginti,

Spiritus Nitri dulcis Scrupulum unum,

Syrupi Limonum Uncias duas:

Misceantur.

In omni genere Februm cum fructu exhibetur.

JULEPUS ROSARUM *MESUE* JULAPIUM REGIUM
SYRUPUS REGIUS *VEL ALEXANDRINUS.*

Rx. Sacchari albissimi Uncias triginta :

Diffolvantur

Aquæ Rosarum Unciis viginti :

Colatura fervetur.

Edulcorandis variis Potionum generibus adhibetur.

JULEPUS VIOLARUM *MESUE.*

Paratur ut antecedens, substituendo Aquæ Rosarum, Aquam Violarum.

Exsolevit.

KERMES MINERALE *LIGER* PULVIS CARTHUSIA-
NORUM, SULPHUR ANTIMONII TARTARI-
SATUM *Austriacorum.*

Rx. Antimonii crasse contusi Uncias triginta duas,

Nitri fixi Uncias octo,

Aquæ quantum fatis.

Bulliant per quatuor horas, fervidus liquor filtretur; ex refrigerato qui secesserit Pulvis probe edulcoretur.

Si liquor defusus residuo Antimonio denuo affunditur, & ratione indicata tractatur, denuo Kermes obtinetur; idem labor vel creberrime repetitus nunquam non hoc Medicamentum largietur.

Ex Experimentis GEOFFROY patet in una Kermes Drachma contineri ad septendecim Grana Reguli, quatuordecim Grana Alcali, unum & quadraginta Grana Sulphuris. Ad dimidium unum, sesquigranum usque adhibetur; pertinet maxime ad spissitudinem Mucosam & Phlogisticam Resolventia Medicamenta. Majori dosi datum Vomitus, Nauseas, Seccessus alvi efficit.

LAC SULPHURIS *Augustanorum.*

SULPHUR PRÆCIPITATUM *Suecorum.*

Rx. Cinerum Clavellatorum Uncias sedecim,

Calcis vivæ Uncias viginti duas,

Aquæ fontanæ Uncias ducentas:

Calce

Calce dilapsa coquantur paululum, colentur per pannum lineum; massa in panno remanens adhuc bis cum nova aqua coquatur, & coletur; omnes liquores colati evaporatione reducantur ad Uncias triginta; his in fervente lebetè bullientibus sensim adjiciantur

Florum Sulphuris Unciæ decem:

Bulliant per dimidiam horam; solutio evaporata & aliquot libris Aquæ diluta præcipitetur

Spiritus Vitrioli quantum fatis,

Pulvis præcipitatus edulcoretur.

Hoc Præparatum, cum sit Sulphur ad ultimam tenuitatem redactum ad usum internum Floribus Sulphuris videtur esse præferendum.

LAC VIRGINIS.

Aquæ instillentur aliquot Guttæ Tincturæ Benzoës.

LAPIS CAUSTICUS, CAUTERIUM POTENTIALE

JUNCKEN.

℞. Calcis vivæ Uncias duodecim,

Salis Tartari Uncias quatuor,

Coquantur cum

Aquæ Unciis centum ad residuum Unciarum quinquaginta; Colatura evaporetur ad siccitatem usque, liquetur calore & effundatur in modulum lapideum.

Olim ad inurendos Fonticulos usurpabatur, hodie raro in usum trahitur.

LAPIS DIVINUS VEL OPHTHALMICUS *St. YVES.*

℞. Aluminis crudi,

Vitrioli cœrulei,

Nitri ana Uncias quatuor:

Contusa liquentur, liquatis addatur

Camphoræ tritæ Drachma semis:

Mox effundatur super tabulam lapideam, & dum adhuc mol-
lis erit, diffecetur in parva quadrata.

*Adhibetur ad Collyria contra Ophthalmias; ejus Drachma
una in Aquæ Unciis octo dissoluta constituit Collyrium HEL-
PETII.*

LAPIS INFERNALIS *Angeli Salæ.*
CAUSTICUM LUNARE *Londinensium.*

℞. Argenti purissimi Unciam unam,
Aquæ fortis Uncias duas:

Dissolvatur leni calore; in frigore ubi solutio in Crystallos con-
creverit hæ a LUNA denominantur; denuo calore liquetur;
omnis solutio in vase vitreo ad ficcitatem reducatur; commit-
tatur sal exsiccatu Crucibulo, & quam primum fluxerit, ef-
fundatur in modulum Oleo prius inunctum.

Ne Argentum quidem cupellatum gaudet ea puritate
quam hoc Preparatum requirit, quod ab omni labe Venerea
immune, nigerrimum esse & in Aere ficcitatem suam penitissi-
me fervare debet.

*Usurpatur tanquam Causticum polychrestum, ubicunque Carnes
absumentæ sunt; Causticum medicamentum nunquam intus exhibi-
bendum est.*

LAPIS MARTIALIS.

Videantur Globuli Martiales.

LAPIS MEDICAMENTOSUS *CROLLII* correctus.

℞. Colcotharis,
Aluminis ana Uncias duodecim,
Nitri crudi,
Salis communis,
Tartari ana Uncias tres,
Aceti vulgaris Uncias centum:
Coquantur per dimidiam horam:
Tunc addantur

Cerussæ Venetæ Unciæ octo,

Boli Armenæ pulverifatæ Unciæ quatuor :

Sub non intermissâ agitatione instituat^r evaporatio ad siccitatem usque.

Laudatur ad Ulcera sordida & Fistulas abstergendas & consolidandas, quem in finem duodecuplo aquæ dissolvitur, filtratur & parti affectæ tam ope linteorum imponitur, quam per syringam injicitur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS GEOFFROY.

℞. Limaturæ Ferri,

Lapidis Hæmatitis pulverisati ana Uncias tres,

Cremoris Tartari Uncias sex :

Redigantur cum

Spiritus Vini quantum satis,

in pastam, quæ exsiccata denuo ope Spiritus Vini in consistentiam mollem reducatur, operatioque aliquoties repetatur; postrema pasta exsiccata reducatur in pulverem, eique addantur

Pulverum Mastichis,

Croci ana Uncia dimidia,

Aloës,

Myrrhæ ana Uncia una,

Vini albi Unciæ quadraginta quatuor :

Stent per aliquot dies in digestionem, tunc evaporentur ad siccitatem & Spiritus Vini ope reducantur in globos.

Efficacior est priore.

LAPIDUM PRÆPARATIO VALERII CORDI.

Videatur Crystallus montana præparata.

LAPIS SEU SAL PRUNELLÆ HARTMANNI.

CRYSTALLUM MINERALE.

℞. Nitri depurati Uncias octodecim :

In Crucibulo fluentibus per vices ingeratur

Florum Sulphuris Uncia semis :

Massa fluens effundatur super lapidem.

LAUDANUM. LILIUM. LIQUIRITIA.

Adhibetur ad Gargarismata, sed Nitrum depuratum nullo peregrino Acido inquinatum huic profecto præferendum est.

LAUDANUM LIQUIDUM SYDENHAMI.

TINCTURA THEBAICA Londinensium.

℞. Opii Uncias duas,
Crocii Unciam unam,
Cinnamomi,
Caryophyllorum ana Drachmam unam:

Incisa infundantur per triduum cum

Vini Hispanici Unciis duodecim:

Filtrentur.

Qualibet Drachma habet Scrupulum dimidium Opii. Ob magnam Auctoris famam vel hodie adhuc creberrime usurpatur, licet evictum sit, Opio minus congrue calida adjici. Datur ad Guttas quindecim.

LAUDANUM OPIATUM.

Variis quæ de eo prostant compositionibus, Extractum Opii Aquosum merito præfertur.

LILIUM PARACELSI.

Videatur Tinctura Metallorum.

LIMATURA MARTIS ALCOHOL.

Videatur Chalybs præparatus.

LIQUIRITIA COCTA ALBA Würtembergensium.

BACULI PECTORALES SCHRÆDERI correcti.

℞. Gummi Arabici,
Specierum Diaireos,
Diatragacanthæ ana Unciam semis,
Radicum Liquiritiæ,
Amyli ana Unciam unam,
Sacchari albi Uncias duas & triginta:

Omnia in tenuem pulverem trita excipiantur

Mucilaginis Tragacanthæ sufficiente copia, ut possint formari bacilli:

Lingebantur olim a Tussientibus, hodie fere obsoleverunt.

LIQUIRITIA. LIMONADA. LINIMENTUM. 207

LIQUIRITIA COCTA CITRINA, LIQUIRITIA TOR-
NATA Th. *HOFFMANN*.

℞. Radicis Liquiritiæ Unciam unam,
Ireos Florentinæ,
Amyli albi ana Unciam femis,
Crocī Scrupulum unum,
Sacchari albiffimi Uncias duodecim:
Omnia tenerrime pulverifata reducantur cum
Mucilaginis Tragacanthæ idoneo quanto
in Maffam; unde formentur Bacilli.
Conveniunt virtute fua cum antecedentibus.

LIMONADA MINERALIS.

Videatur Ptifana acidulata.

LIMONADA SICCA *BEAUMÉ*.

Est Pulvis refrigerans Suecorum, ad quem Sal Acetofellæ loco
Salis Effentialis Tartari recipitur.

LINIMENTUM ALBUM.

Videatur Linimentum Cereum.

LINIMENTUM ALCALINUM *PLENCKII*.

℞. Lixivii Saponariorum Uncias duas,
Olei Olivarum Uncias quatuor,
Vitellorum Ovorum Numero duo:
Mifceantur, ufque dum coeant.
*Cl. Auctor affeberat Rhagades manuum hoc Linimento fuiſſe
curatas.*

LINIMENTUM ANTIPLEURITICUM *RICHARD*.

℞. Saponis Veneti Uncias duas,
Olei Laurini Unciam unam:
Liquefiant leni calore; refrigeratis admifceantur

Balsami Tranquillantis Uncia una,
 Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva Drachmæ duæ.
Vires ex nomine patent.

LINIMENTUM CEREUM *Edinburgensium.*
 LINIMENTUM ALBUM *Londinensium.*

℞. Olei Olivarum Uncias tres,
 Spermatis Ceti Drachmas tres,
 Cereæ albæ Drachmas duas:
 Leni igne liquefacta perpetuo agitentur, donec penitus refrigerentur.

Ad Fissuras Labiorum & Papillarum nec non ad Excoriationes usurpatur.

LINIMENTUM VOLATILE *PLENCK.*

℞. Olei Amygdalarum dulcium Unciam unam,
 Spiritus Salis Ammoniaci Drachmas duas:
 Agitentur in Phiala, usque dum coierint.

Collo inungitur in Angina, ad ictus quoque Serpentum cum successu applicatur.

LIQUOR ANODYNUS MINERALIS *HOFFMANNI.*
 SPIRITUS VINOSUS VITRIOLICUS *Rofforum.*
 SPIRITUS AETHEREUS VITRIOLATUS *Suecorum.*

℞. Spiritus Vini rectificatissimi Uncias triginta duas:
 Committantur Cucurbitæ; affundantur per vices
 Olei Vitrioli Unciæ sedecim:

Immittatur Cucurbita in Balneum Arenæ, imponatur ei Alembicus, & jungatur vas recipiens; ambo ope Vesicæ coërendenda; subministretur lenis admodum ignis, usque dum liquori destillanti alius liquor ejusdem cum ipso pelluciditatis supernatare videatur, qui inde infundibuli ope separandus est, & sub nomine ÆTHERIS sive NAPHTHÆ VITRIOLI asservandus. Residuum largiori aquæ quantitate diluatur, filtretur, libero aëri exponatur, & justa rectificatione in Oleum Vitrioli concentretur.

Liquor valde levis motum Fluidi nervei compefcit; in omni Dolorum, Spasmodum, Convulfionum genere cum Succellu adhibetur. Datur ad Guttas quindecim, Æther vero, eodem ad huc validior, ad Guttas decem.

LIQUOR ANODYNUS TOPICUS TRILLER.

℞. Aquæ Anhaltinæ Uncias duas,
Spiritus Salis Ammoniaci,
Effentiarum Croci,
Castorei ana Drachmas duas,
Olei defillati Nuciftæ Guttas triginta:
Mifceantur.

LIQUOR ANODYNUS TOPICUS ALTER EJUSDEM.

℞. Aquæ Anhaltinæ Uncias quinque,
Effentiarum Succini,
Castorei ana Drachmas tres,
Anodynæ Drachmas duas,
Spirituum Lumbricorum,
Formicarum ana Drachmam unam:
Mifceantur.

Dicit Venerandus Auñtor, utrumque liquorem velut incantamentum, fi quidem alterutro leniter tepelactio partes dolentes fovellantur, faviffimos fopire Dolores Rheumaticos, Arthriticos, Ifchiadicos, monetque cum priore liquore fcilicet mitiore antea periculum eflè faciendum, quam alter adhibeatur; in Podagra vero hos liquores adhibere fe aufum non eflè fatetur.

LIQUOR ANODYNUS VOLATILIS VICAT.

℞. Spiritus Vini Unciam unam,
Salis Ammoniaci vinofi Unciam femis,
Opii Scrupulos duos,
Camphoræ Scrupulum unum:
Mixta digerantur frigide per tres dies, Phialam fæpe agitando,
Colentur.

Traditur miræ virtutis ad sopiendos Capitis vel Dentium dolores esse, dum Gutta quatuor vel quinque vola manus exceptæ naribus attrahuntur. Aliquot Gutta Gossypio instillato committuntur quoque Denti Carioso.

LIQUOR ANTIPODAGRICUS *Hoffmanni.*

℞. Spiritus Sulphuris volatilis *Begvini* Unciam unam,
Camphoræ, Pineis tritæ, Drachmam unam,
Misceantur.

Commendatur ab egregio Auctore Observ. Physf. Chym. L. II. Obs. 31. ad laborantium pedes crebrius eo inungendos.

LIQUOR APERITIVUS *Argentoratensium.*

LIQUOR SALINUS LAXATIVUS *Würtembergensium.*

℞. Salis Epsomensis,
Tartari solubilis ana Unciam unam,
Vitriolati Unciam semis:

Dissolvantur

Aquæ fervidæ Unciis decem:

Filtrentur.

Incidendi, Aperiendi, Urinam ducendi causa aliquoties de die ad cyathum datur. Optime substituitur LIQUORI APERITIVO HOFFMANNI.

LIQUOR CORNU CERVI SUCCINATUS *Michaelis.*

℞. Spiritus Cornu Cervi rectificati, quantum lubet:
Saturetur

Salis Succini albi quanto sufficiente:

Filtretur Liquor.

Propter Vires Antispasmodicas & Diaphoreticas laudatur, Datur ad Guttas triginta.

LIQUOR DIGESTIVUS *Suecorum.*

Sali Tartari depurato instilletur

Aceti

- Aceti Vini quantum satis ad saturationem :
Liquor filtretur.

Medicamentum hoc pretiosiori Liquori Terræ foliatæ Tartari utique erit præferendum ; plures enim partes Oleosas habet, ideoque magis Saponaceum est.

Datur ad parvum Cochlear pro Dosi.

LIQUOR LITHONTRIPTICUS JURIN.

Videatur Lixivium Causticum.

LIQUOR MENINGUM SCHMUCKER.

℞. Aquæ Vulnerariæ Uncias duas,
Balsami Commendatoris Drachmas duas,
Mellis Rosarum Unciam semis :

Misceantur.

Celeberrimum Auctorem hunc Liquorem ope plumaceolorum ad Vulnura Duræ Matris & Cerebri adhibere testatur Clarissimus PLENCK.

LIQUOR NITRI FIXI.

Videatur Nitrum fixum.

LIQUOR PROBATORIUS MÆGLINGII.

℞. Calcis vivæ Unciam unam,
Auripigmenti Unciam semis,
Aquæ fontanæ Uncias sex :

Coquantur ad dissolutionem Auripigmenti ; filtretur Solutio.

Hic Liquor, nigredine, quam Plumbo mangonifato Vino affusus affricat, hoc ipso signo mangonium patetfacit.

LIQUOR SIPHYLITICUS TURNERI.
MIXTURA MINERALIS Suecorum.

℞. Mercurii Sublimati Grana duodecim :
Dissolvantur

Spiritus Vini Unciis viginti quatuor :

Misceantur.

PARS II.

D d

Medicamentum ex Sibiria in Europam allatum VAN SWIETEN potissimum auctoritate frequentius in usum tractum, hodie tanquam polychrestum contra contagium Venereum usurpatur. Illustris RICHARD quatuor Granis Camphoræ & una Syrupi Papaveris Rhæados Uncia adjecta nomen ei LIQUORIS SIPHYLITICI sive CONTRA LUEM VENEREAM imponit. Apud nos & quidem non sine fontica causa Spiritui Vini Aquam substituunt. Dosis est ad Cochlear unum.

LIQUOR SPLENETICUS EX TARTARO SCHRÆDERI
correctus.

℞. Tartari crudi,

Nitri crudi ana Uncias duodecim :

Mixta detonentur in Crucibulo, deinde dissolvantur

Aquæ fontanæ Unciis triginta sex :

Solutione fervente dissolvantur

Pulveris Tartari crudi Unciæ duodecim :

Liquor filtratus fervetur.

Medicamentum Tartaro Solubili analogum, aliquoties de die ad duas Drachmas, dum Viscera abdominalia referenda sunt, exhibetur.

LIQUOR STYPTICUS WEBERI.

℞. Vitrioli Hungarici,

Aluminis crudi ana Uncias sex,

Aquæ fontanæ Uncias quadraginta octo :

Solutioni filtratæ addantur

Olei Vitrioli Unciæ quatuor.

Linteis quintuplicatis exceptus vasis Sanguinem fundentibus applicatur.

LIQUOR TERRÆ FOLIATÆ TARTARI.

Videatur Terra foliata Tartari.

LIQUOR VEGETO-MINERALIS RICHARD.

Est Aqua Vegeto-Mineralis GOULARD, omisso Spiritu Vini.

LITHONTRIPTICUM *TULPII*.

℞. Pulveris Cantharidum,
 Cardamomorum minorum excorticatorum ana Drachmam
 unam,
 Spiritus Vini rectificati Unciam unam,
 Nitri Unciam semis:

Infundantur frigide in vase leviter tecto per sex dies, quibus dilapsis filtrentur.

*Hoc Medicamentum magnæ olim famæ HOMBERG publicavit. Dantur ejus Gutte quindecim mane in cyatho aquæ, una post assumptum jusculum hora, ususque Medicamenti per quadri-
 duum continuatur.*

LIXIVIUM CAUSTICUM, LIXIVIUM SAPONARIORUM.

Est Causticum potentiale non inspissatum.

Ad usus externos adhibetur. Ejus Scrupulus unus sufficienti aquæ quantitate dilutus & ter interdium sumtus constituit LIQUOREM LITHONTRIPTICUM JURIN, quem in Calculo viarum Urinariarum egregium se præstasse attestatur in Practical Essays on Medical Subjects. p. 57.

LOCH ALBUM *GEOFFROY*.

℞. Radicis Liquiritiæ minutim incisæ Scrupulum unum,

Aquæ fontanæ Uncias quatuor:

Infundantur per horæ intervallum:

Colatura emulgeantur

Amygdalæ dulces Numero viginti:

Denuo colatis addantur

Pulveris Gummi Tragacanthæ Grana sedecim:

Probe commixtis ingerantur sensim sub perpetua agitatione

Syruporum Papaveris albi,

Althææ ana Uncia semis,

Olei Amygdalarum dulcium Uncia una:

Omnibus optime commixtis adjiciantur

Aquæ Florum Aurantiorum Drachmæ duæ:

Misceantur.

Gratum hoc Eclegma in morbis Pētoris Relaxandi & Demulcendi causa cum successu adhibetur.

LOCH AD ASTHMA *MANLIJ.*

- ℞. Radicum Scillæ præparatarum Unciam semis,
Iridis Florentinæ Drachmas duas,
Herbarum Marrubii,
Hyssopi ana Drachmam unam,
Myrrhæ,
Crocī ana Drachmam semis:
Pulverifata excipiantur
Mellis despumati Unciis sex:
Misceantur.

In affectibus Pētoris mucosis resolvendi gratia præscribitur, & exhibetur ad parvum Cochlear pro Dosi.

LOCH BALSAMICUM *RICHARD.*

Videatur Loch Leniens.

LOCH DE FARFARA *VALERII CORDI.*

- ℞. Radices Farfaræ recentes:
Coquantur ad mollitiem, & exprimatur Pulpa per cribrum;
Pulpæ addatur
Mellis crudi duplum:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
Demulcendi ergo Tussientibus exhibetur.

LOCH JAPONICUM *FULLER.*

- ℞. Terræ Japonicæ Drachmas duas,
Albuminis Ovi conquassati Drachmas sex,
Syrupi de Symphyto Unciam unam:
Misceantur.
Hæmopticis præcipue commendatur.

LOCH LENIENS *RICHARD.*

- ℞. Pulveris Gummi Tragacanthæ Grana sedecim:

Redigantur cum Ptisanæ pectoralis Uncia semis in Mucilaginem, cui sensim sub perpetua agitatione adjiciantur

Olei Amygdalarum dulcium,
Syrupi Althææ ana Uncia una:

Probe mixta diluantur

Ptisanæ pectoralis Unciis tribus cum semisse.

Viribus cum Loch albo convenit, Dyssentericis laudatur.

Abstergendi autem consilio adjicitur

Terebinthinæ Venetæ, Vitello Ovi dissolutæ, Scrupulus unus,
Diciturque jam LOCH BALSAMICUM.

LOCH DE PULMONE VULPIS *MESUE*.

℞. Pulverum Pulmonum Vulpis,
Succi Liquiritiæ,
Herbæ Capillorum Veneris,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana Unciam unam,
Sacchari clarificati Uncias quindecim:

Misceantur.

Hoc inconcinno prorsus Medicamento Tussientibus & Phtificis vulgo etiamnum exhiberi solito, Medicorum prudentiores non amplius utuntur.

LOCH SANUM ET EXPERTUM *MESUE* correctum.

℞. Radicis Liquiritiæ,
Herbarum Hyssopi,
Capillorum Veneris,
Calaminthæ montanæ ana Unciam semis,
Seminum Anisi,
Fœniculi ana Drachmas duas:

Incisa & contusa coquantur paululum cum

Aquæ fontanæ Unciis viginti quatuor:

Decocto colato emulgeantur,

Amygdalarum excorticatarum,

Pinearum mundatarum,

Seminis Papaveris albi ana Uncia una:
 Colaturæ addantur
 Pulverum Liquiritiæ,
 Gummi Tragacanthæ albæ,
 Arabici,
 Amyli,
 Ireos Florentinæ ana Drachmæ sex,
 Sacchari albi Unciæ quadraginta,
 Aquæ Cinnamomi Unciæ duæ:
 Misceantur.

*Ad Relaxandas Striçturas & Demulcendam Acrimoniam Tussi
 sicca laborantibus commendatur.*

LOCH SAPONATUM *Pharmacopœæ Edinburgensis
 Veteris.*

℞. Saponis officinalis Drachmam unam,
 Olei Amygdalarum Unciam unam,
 Syrupi Capillorum Veneris Unciam unam semis:
 Misceantur exacte.

Illustris RICHARD Syrupo Capillorum Uncias Mellis duas
 substituit.

*In Asthmate & Tussi quoque Hypochondriaca, nec non in affec-
 tibus Renum exhibetur.*

LOTUS SIVE LITUS AD HAEMORRHOIDES RICHARD.

℞. Unguenti Populei Unciam unam,
 Balsami Tranquillantis Unciam semis,
 Olei Ovorum Drachmas duas:
 Misceantur.

Vires nomen indicat.

LOTUS AD RHEUMATISMUM RICHARD.

℞. Spiritus Vini Camphorati Uncias sex,
 Salis,
 Olei Terebinthinæ ana Unciam unam:
 Misceantur.

Vires ex nomine patent.

LOTUS SAPONACEUS *PLENCKII.*

℞. Aquæ fontanæ destillatæ Uncias duodecim,
Balsami Vitæ externi Drachmam unam:
Misceantur.

De Viribus mentio jam facta est sub Balsamo Vitæ.

LOTUS AD TINEAM *FULLER.*

℞. Calcis vivæ Uncias duodecim,
Picis navalis Uncias octo,
Aquæ fontanæ Uncias septuaginta & duas:
Coquantur ad dimidias, dein colentur.

Capiti Tineoso lavando commendatur.

MAGISTERIUM MARCASITÆ *THIBAUT COSMETI-*
CUM CLAVII.

℞. Bismuthi Unciam unam:
Per vices injiciatur
Spiritus Nitri Unciis duabus:
Solutio clara infilletur guttatim
Aquæ Unciis quadraginta octo:
Calx albissimaedulcoretur.

Cosmeticos ad usus exhibent, sed Cutim fœdare observatum est.

MAGISTERIUM SATURNI *CROLLII.*

℞. Aceti Lithargyrii quantum lubet; Plumbum inde præci-
pitetur ope
Salis communis aqua diffoluti:
Edulcoratum fervetur.

*Usui Cosmetico perinde ac antecedens inservit, sed Cutim etiam
& quidem citius fœdat; sanitati quoque perniciosus est ejus usus;
dolendum sane ipsos Medicos eo imprudentiæ prolabi, ut illud
ad usus internos commendare non dubitent.*

MAGISTERIUM SULPHURIS.

Videatur Lac Sulphuris.

MAGNES ARSENICALIS *HARTMANN.*

℞. Arsenici albi,

Antimonii crudi,
Sulphuris flavi ana partes æquales:
Pulverifata fundantur in Retorta vitrea.

Venenum hoc remedio ad instar Magnetis Ferrum trahentis ex Bubonibus Pestifentialibus extrahi olim credebant. Arsenicalia ut ad alios morbos ita ad Pestem pessime adhiberi hodie est evictum.

MAGNESIA ALBA BLACK.

℞. Salis Epsomensis Uncias sexaginta quatuor:
Dissolvantur

Aquæ fontanæ Unciis centum viginti octo:
Affundatur

Cinerum Clavellatorum depuratorum in duplo Aquæ dissolutorum, quantum requiritur, ut omnis inde terra dejiciatur; tunc affundantur

Aquæ ebullientis Unciæ quingentæ:
Terra optime edulcorata fervetur, quæ si calcinata desideratur, in Crucibulo candente servanda est rubens per duas horas.

Medicamentum, in Italia primum celebratum, dein, ad modum a SLEVOGT traditum, semper ex Lixivio Nitri paratum, semper Calce erat inquinatum. Cl. BLACK præeunte illud jam purum obtinemus.

Reliquis Absorbentibus omnino præstat; minus enim Venter gravat, præsertim si calcinata exhibetur, cum Acido Primarum Viarum in Salem medium abit mite Catharticum, & Humores adeo non ad Putredinem, ut reliqua Absorbentia, disponit, ut potius evidenter viribus Antisepticis sit instructa.

Dosis est ad Drachmam unam usque.

MANNA LIQUIDA KIEFER,

℞. Cremoris Tartari Drachmas duas:
Dissolvantur

Aquæ bullientis Unciis quinque:
Addantur

Mannæ Siciliensis Unciæ duæ :
Facta dissolutione colentur.

Unâ hauritur.

MANNA TABULATA VEL TARTARISATA *SCHRØDERI.*

℞. Mannæ Siciliensis Uncias quatuor,
Cremoris Tartari Unciam semis:

Coquantur cum

Aquæ Unciis decem,

Ad consistentiam & lege artis in formam Morfulorum redigantur.

Scopo Eccoprotico exhibentur.

MASSA AD FORNACEM *Argentoratensium.*

℞. Pulverum Gummi Benzoes electi,
Storacis Calamitæ ana Uncias quatuor,
Ladani Unciam unam,

Oleorum destillatorum Cinnamomi Guttas decem,
Ligni Rhodii Guttas viginti,

Balsami Peruviani Drachmas tres:

Subigantur in mortario calido, ut in unam massam coeant, quæ in bacillos panno laneo lævigandos cogenda est.

Affricatur fornaci, ut conclavis Aerem odoris suavitate perfundat.

MATERIA PERLATA.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

MEL ANTHOSATUM *MESUE.*

℞. Herbæ Rorismarini Uncias octo,

Mellis despumati Uncias viginti quatuor:

Digerantur in vase clauso per aliquot dies, deinde colentur.

Ad Enemata recipitur.

MEL DESPUMATUM *CELSI.*

℞. Mellis Uncias quadraginta octo,

Pars II.

E e

Aquæ fontanæ Uncias duodecim :
 Bulliant per quadrantem horæ, spuma & cochlearis & coli
 ope inde auferatur.

MEL MERCURIALE *Coloniensium.*

℞. Succī Herbæ Mercurialis Uncias triginta sex,
 Mellis crudi Uncias viginti quatuor :
 Coquantur ad consistentiam Mellis.

Alvi Emolliendæ gratia Clysmatibus adjicitur.

MEL ROSARUM *ORIBASII.*

℞. Florum Rosarum rubrarum,
 Aquæ fontanæ ferventis ana Uncias septuaginta duas :
 Digerantur per viginti quatuor horas, exprimantur & colentur :
 Addantur

Mellis crudi Unciæ nonaginta sex :
 Coquantur ad consistentiam Mellis & tunc colentur.
Ad Ulcera Oris Abstergenda frequentissimo in usu est.

MERCURIUS DIAPHORETICUS *KLEINII.*

Videatur Pulvis Alterans PLUMMER.

MERCURIUS DULCIS.

℞. Mercurii Sublimati Uncias triginta duas,
 Vivi Uncias viginti quatuor :

Per plures horas, donec omnes globuli Mercuriales dispa-
 ruerint, exactissime trita, committantur Cucurbitæ, & Balnei
 arenæ ope sublimentur; diffracta Cucurbita, rejiciatur substan-
 tia laxa, quæ superiora colli Cucurbitæ occupat, Sublima-
 tum superiori Cucurbitæ orificio adhærens, si nondum satis
 compactum fuerit, teratur in pulverem & denuo sublimentur;
 quod, si laminæ ferreæ madefactæ affricatum nullam maculam
 nigram relinquit, Aquæ contra Calcis immissum nigrum eva-
 dit, indicio est, Mercurium rite dulcificatum esse.

*Egregium Medicamentum, quod in omnibus morbis a Spissi-
 tudine Humorū tenuiorum oriundis, cum successu datur, Ca-*

tharticos quoque effectus edit, secure infantibus quoque potest exhiberi, & vanus est omnino eorum metus, qui, ubi Acrimonia in Primis Viis obtinet, noxas inde metuunt. Datur Scopo Cathartico ad quindecim Grana pro Dosi.

MERCURIUS GUMMOSUS *PLENCK.*

℞. Mercurii revificati Drachmam unam,
Pulveris Gummi Arabici Drachmas tres:
Terantur probe, donec omnes globuli Mercuriales disparuerint;
Tunc addatur
Syrupi Diacodii Uncia semis:
Misceantur.

Hoc Medicamento Unciis octo Aquæ diluto & ad aliquot Cochlearia interdiu dato Clarissimus Auctor vidit morbos Venereos felicissime fugari. Extus quoque eodem ad Lotiones utitur.

MERCURIUS LIQUIDUS.

AQUA MERCURIALIS *CHARRAS.*

℞. Mercurii revificati Unciam unam;
Dissolvatur

Spiritus Nitri Uncia una semis:

Solutioni adjiciantur

Aquæ fontanæ Unciæ triginta.

Guttatim exhibebatur; in ejus locum LIQUOR SIPHYLITICUS successit.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS *HARTMANN.*MERCURIUS COSMETICUS *Suecorum.*

℞. Mercurii vivi Uncias quatuor:
Dissolvantur

Spiritus Nitri Unciis sex:

Solutio præcipitetur

Salis communis, in aqua dissoluti, quantitate sufficiente:

Mox defundatur liquor & Mercurius præcipitatus edulcoretur.

Externe ad Ulcera Venerea adhibetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

Videatur Turpethum minerale.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER. *BASIL.
VALENTINI.*

℞. Mercurii vivi Uncias sex:
Dissolvantur

Spiritus Nitri Unciis duodecim:

Abstrahatur Acidum a Mercurio ex Retorta; pulvis qui remanet ruber Calcinetur in patella terrea, usque dum ruberrimus evaserit; qui si cum pari pondere Salis Tartari teritur, & super edulcoratum aliquoties Spiritus Vini deflagratur, *ARCANI CORALLINI, LIBAVII, MERCURII CORALLINI Londinensium* nomine venit.

A Medicamenti rodentis usu interno omnino abstinendum. Externe ad Unguenta mundantia adhibetur. Arcanum Corallinum mitius quidem est, quam Mercurius præcipitatus ruber, sed ne ipsum quidem tuto intus datur.

MERCURIUS SACCHARATUS *WEDELI.*

℞. Mercurii rectificati Unciam unam,
Sacchari albissimi Uncias duas:

Probe terantur in mortario lapideo usque dum omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Contra Vermes, Obstructiones Glandularum Mesaraicarum aliosque morbos, ubi Mercurii usus indicatur, cum successu exhibetur.

Dosis est Drachma una aliquoties de die sumta.

MERCURIUS SUBLIMATUS *RHASES.*MERCURIUS CORROSIVUS ALBUS *Suecorum.*

℞. Mercurii vivi Uncias sedecim:
Dissolvantur

Spiritus Nitri Unciis viginti quatuor:

Abstrahatur inde Acidum, Sali residuo commisceantur
Vitrioli ad albedinem calcinati,
Salis communis ana Unciæ octo:

Sublimentur ex Cucurbita vitrea.

*Validissimum Medicamentum rodens neque extus neque in-
tus nisi larga liquoris diluentis quantitate mitigatum est adhi-
bendum.*

MERCURIUS VITÆ PARACELSI.
PULVIS ALGAROTI.

℞. Butyri Antimonii quantum lubet:

Instilletur largæ quantitati aquæ, & pulvis præcipitatus probe
edulcoretur.

*Validissimum Drastrictum ad aliquot modo Grana datum for-
tissime Primas Vias exagitat; ideoque hodie non amplius usurpa-
tur.*

MIVA CYDONIORUM MESUE.

℞. Succi Cydoniorum per subsidentiam depurati Uncias cen-
tum & viginti,

Sacchari albi Uncias quadraginta:

Coquantur ad consistentiam Rob.

Datur roborandi Ventriculi causa.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.
CONDITUM DE CYDONIIS MESUE.

Ex Miva Cydoniorum suspendatur facculus, cui immittantur

Pulverum Cinnamomi acuti,

Cardamomi ana Drachma una semis,

Croci,

Caryophyllorum,

Zinziberis,

Mastichis,

Macis ana Scrupulus unus:

Probe misceantur.

Ad sistendos Vomitus & Alvi fluxus adhibetur.

MIXTURA ASTHMATICA TRILLERI.

- ℞. Aquarum Tussilaginis,
 Pulmonariæ,
 Hyssopi,
 Veronicæ,
 Fœniculi ana Unciam unam,
 Elixir Pectoralis WEDELII Drachmas duas,
 Essentiarum Pimpinellæ,
 Liquiritiæ ana Drachmam unam,
 Extractorum Cascarillæ,
 Enulæ ana Scrupulum unum,
 Syrupi Althææ Fernelii Unciam unam,
 Oxymellis Scillitici Unciam semis :

Misceantur.

Testatur Venerandus Auctor, in Tussi ferina, Asthmate & Catarrho suffocativo sibi sæpe præstantissimo auxilio hoc Medicamentum fuisse.

MIXTURA SIMPLEX, AQUA VEL SPIRITUS DE
 TRIBUS SCHRÆDERI.

MIXTURA DIATRION Suecorum.

- ℞. Spiritus Tartari Uncias sex,
 Vitrioli Uncias duas,
 Aquæ Theriacalis Camphoratæ Uncias decem :

Misceantur.

Diaphoresin excitat, Putredinem arcendi causa olim contra Febres continuas in frequenti usu erat. Dosis Drachma una.

MIXTURA SALINA VOLATILIS Suecorum.

Videatur Spiritus Mindereri.

MIXTURA TONICO NERVINA STAHLII.

- ℞. Spiritus Cornu Cervi Unciam unam,

Tincturæ Antimonii acris Uncias duas:

Misceantur.

Auctor omnesque ejus affectæ hoc Medicamentum ad referandas Viscerum Abdominalium Obstructiones & restituendum ipsis Tonum adhibuerunt.

Dosis est ad Guttas quinquaginta.

MORSULI.

- I. Sacchari albissimi Unciæ sedecim dissolvantur Aquæ Unciis quatuor; coquantur donec particula solutionis vel spatula excepta inde defluendo filum trahat, aut vi quadam per aerem trajecta floccos formet. Hoc *CONSISTENTIAM TABULANDI* dicunt:
- II. Saccharum ad consistentiam Tabulandi coctum ab igne remotum agitetur usque dum ad parietum vasis consistere cœpit:
- III. Adjiciantur, Condita quidem aut Nuces in tenuia ramenta dissecta, Aromata vero in crassum, reliqua in tenuissimum pulverem redacta, Olea denique destillata addantur:
- IV. Effundatur massa in modulum ex tribus lignis aqua madefactis, ita confectum, ut eorum unum basin, duo reliqua latera efforment. Cultri denique ope dum adhuc calet in rectangula dissectetur.

MORSULI ANTIMONIALES *KUNDEL.*

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum & secundum longitudinem dissectarum Unciam unam,

Pulverum grossorum Cinnamomi Drachmas duas,
Cardanomi minoris Drachmam semis,

Pulveris tenerrimi Antimonii crudi Drachmas sex:

Commisceantur cum

Sacchari albi in Aqua Rosarum soluti & ad consistentiam Tabulandi cocti Unciis septem;

Fiant Morsuli.

Contra Acrimonias & Spissitudinem Lymphæ & affectus Rheumaticos nec non Arthriticos cum successu exhibetur.

MORSULI AROMATICI *Suecorum.*

Videantur Morfuli Imperatoris.

MORSULI CITRI *JUNGKENII* correcti.

℞. Carnis Citri Conditæ incisæ,
Flavedinis Corticis Citri recentis ana Unciam unam,
Quintæ Essentiæ Citri Scrupulum unum,
Succi Citri Unciam unam:

Immisceantur

Sacchari Canariensis Unciis fedecim in Aqua solutis ad consistentiam Tabulandi spissiore coctis & sub perpetua agitatione semirefrigeratis:

Conficiantur secundum artem Morfuli.

Ad Gustum delectandum, Sitim fallendam Viresque refocilandas adhibentur.

MORSULI IMPERATORIS *Hamburgensum.*

℞. Conditorum Corticis Aurantium,
Citri,
Carnis Citri ana Unciam unam,
Amygdalarum dulcium cuticula privatarum Unciam unam
femis:

Incidantur secundum longitudinem & addatur

Specierum Imperatoris Uncia una:

Commisceantur cum

Sacchari Unciis fedecim in Aqua Rosarum solutis & ad consistentiam Tabulandi coctis, sub perpetua agitatione semirefrigeratis

Fiant lege artis Morfuli.

Ventriculi roborandi causa dantur.

MORSULI PURGANTES *Württembergensum.*

℞. Resinæ Jalappæ Drachmam unam,
Amygdalarum pellicula privatarum Draohmas tres:
Probe tritis immisceantur

Saccha-

MORSULI. MUCILAGINES. 225

Sacchari in Aqua Rosarum soluti & ad consistentiam Tabulandi cocti Unciæ septem semis:

Fiant lege Artis Morsuli.

Purgandi scopo dantur, Uncia Morsulorum Grana circiter octo Resinæ continet.

MORSULI AD SCABIEM *Pharmacopœæ Helveticæ.*

℞. Florum Sulphuris Unciam unam,
Pulveris Antimonii,
Specierum Imperatoris ana Drachmas duas,
Amygdalarum dulcium excorticatarum, secundum longitudinem sectarum Unciam unam,

Sacchari albissimi Aqua Naphæ dissoluti, ad consistentiam Tabulandi cocti & sub perpetua agitatione refrigerati Uncias octo:

In momento effusionis addantur

Quintæ Essentiæ Citri Guttæ decem:

Fiant lege artis Morsuli.

Vires ex nomine patent, ter de die Uncia semis assumitur.

MORSULI CONTRA VERMES *Württembergensium.*

℞. Pulverum Seminis Cinæ,
Musci Corallini ana Unciam semis,
Cinnamomi Drachmas duas,
Æthiopsis mineralis Drachmas tres,
Resinæ Jalappæ, Pineis exactissime tritæ, Scrupulos duos:
Commisceantur cum

Sacchari albi, Aqua Rosarum soluti & ad consistentiam Tabulandi cocti, Unciis septem:

Fiant lege Artis Morsuli.

Vires ex nomine patent; Uncia una quinque circiter Grana Resinæ vehit.

MUCILAGINES.

Parantur, dum Gummi pulverifata & Semina mucilagine foeta

PARS II.

F f

contusa cum iusta aquæ quantitate in mortario lapideo teruntur, usque dum aqua evidentem spissitudinem ad consistentiam Gelatarum accedentem induat. Radices autem cum Aqua coquantur, donec iustam viscedinem acquisiverint. Mucilagines ita paratæ per colum premantur.

NAPHTA NITRI.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.

NAPHTA SALIS COMMUNIS.

Videatur Spiritus Salis dulcis.

NAPHTA VITRIOLI.

Videatur Liquor Anodynus.

NITRUM ANTIMONIATUM.

Videatur Antimonium Diaphoreticum.

NITRUM DEPURATUM.

R. Nitri crudi quantum lubet:

Diffolvatur in

Aquæ quadruplo:

Filtratum evaporetur ad cuticulam & reponatur in loco temperato, usque dum Crytalli surgant, residuus liquor denuo paulum evaporetur & in Crytalloſ cogatur; idem labor repetatur, quamdiu pulchræ Crytalli prismaticæ surgunt.

Nitrum non nisi hac ratione depuratum ad usus internos adhiberi debet.

NITRUM FIXUM GLAUBERI.

R. Nitri depurati quantum placet:

Fundatur in Crucibulo, fluenti ingeratur per vices Pulvis Carbonum, neque ante novus ingeratur, quam prior totus deflagaverit; Pulvere Carbonum Crucibulo injecto non amplius Detonante, tota massa probe agitetur, & per horæ quadrantem

adhuc Calcinetur, refrigerata deinde dissolvatur aqua, trahatur per Filtrum, inspissetur.

Hic Sal aeri expositus deliquium patitur & tunc LIQUOR NITRI FIXI sive ALCAHEST GLAUBERI audit.

Nitrum Fixum cum sit ipsissimum Alkali vegetabile, easdem ac Sal Tartari & in Liquorem resolutum Olei Tartari per deliquium vires habet.

NITRUM TABULATUM.

Est Lapis Prunellæ, qui fusus tubi exiguo foramine terminati ope, in exiguas Tabulas cogitur.

OCULI CANCRORUM CITRATI.

Parantur ut CONCHÆ CITRATÆ.

Idem de utrisque etiam iudicium esto.

OCULI CANCRORUM PRÆPARATI.

Oculi Cancri Aqua loti rediguntur in mortario ope pistilli in pulverem tenerrimum; supra Porphyritem, affusa, aqua usque terendum, dum in pollinem abierit, qui inter digitos tritus omnis asperitatis expers sentiat; pasta per infundibulum in parvas pyramides exprimitur.

OFFA ALBA HELMONTII.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari Uncias quatuor: Instilletur ipsi

Alcoholis Vini quantum fatis, ut Coagulum album oriatur.

Ad referandas Obstructiones laudatur. Ejus Scrupulus unus cyatho aquæ dilutus exhibetur.

OLEA COCTA SIMPLICIA.

Vegetabile vel Animal recens comminutum cum Olei Olivæ æquis partibus coquitur, usque dum gutta Olei igni instillata non amplius crepitet, sed tacite flammescat, id quod *ad*

confumptionem humiditatis coqui dicere solent; tunc demum Oleum preli ope exprimitur & per subfidentiam depuratur.

OLEA DESTILLATA.

Partes Vegetabilium indigenorum recentes comminutæ, quibus suboctuplum circiter Salis communis adjicitur, infunduntur cum Aquæ fere sextuplo per quatuor dies; Floribus brevius etiam tempus sufficit. Vegetabilia exsiccata per octiduum, Ligna & Cortices duriores adhuc diutius infunduntur. Instituitur deinceps Destillatio ex Vesica ea lege ut statim sub initio validior ignis adhibeatur; continuatur tamdiu Destillatio quoad usque lacteo tincta calore aqua destillat; ab aqua destillata gossypii aut infundibuli ope oleum auferitur; residuo vegetabili aqua denuo affunditur, eademque operatio bis vel ter iteratur. Balsama & Resinæ vel sine prævia infusione Destillantur.

OLEA EXPRESSA.

Nuclei annotini contunduntur & committuntur sacco, qui inter laminas ferreas torcularis ponitur, adigitur torcular; quando nullum ulterius Oleum effluit, residuum ex sacco eximitur, denuo in pulverem reducitur, torcularique submittitur: Oleum per aliquod tempus quieti relictum a facibus, quas deposuit, defunditur.

Semina duriore cortice instructa, antequam torculari submittantur, prius vaporibus aquæ ebullientis sunt exponenda. Nuclei qui oleum in temperato aere solidescens vehunt, inter laminas calefactas sunt collocandi. Noces Cacao etiam antequam sacco committuntur, calore non admodum leni calefieri oportet. Id genus Olea, ut facies deponere possint, etiam post expressionem per aliquod tempus caloris ope conservari debent fluida.

Olea fragrantia **CORTICUM AURANTIORUM, CITRI, FLORUM AURANTIORUM**, quod a **NEROLI** denominatur, **JASMINI, LAVENDULÆ** sub nomine **QUINTÆ ESSENTIÆ** optime ex Gallia Meridionali aut Italia accersuntur.

OLEA INFUSA.

Parti Vegetabili vel Animali affunditur Olei Olivarum duplum; instituitur Infusio loco calido in vase clauso; exprimitur Oleum ope torcularis & depuratur per subsidentiam.

OLEUM ACUSTICUM *WEPFERI.*

℞. Ceparum minutim concifarum Unciam unam,
 Millepedum vivorum Numero sexaginta,
 Fellis Tauri Drachmas duas,
 Olei Amygdalarum amararum Unciam unam:
 In vase vireo bene clauso macerentur per biduum; tunc semel
 ebulliant: forti expressione obtento Oleo addantur
 Oleorum destillatorum Rutæ,
 Majoranæ,
 Rorismarini ana Guttæ tres:

Misceantur.

Guttæ sex hujus Olei gossypio exceptæ immittuntur Auri a causa serosa viscida afflictæ.

OLEUM ANIMALE *DIPPELII.*

℞. Olei Cornu Cervi, quantum lubet:
 Committatur Retortæ adhibita cautione, ne quid sive rostro sive hemisphærii fornici accrescat, subministretur ignis lenis; Oleum instar aquæ pellucidum destillans, quoties ejus Drachma una circiter destillaverit, committatur ad summam plenitudinem vitro subere statim claudendo ac pice aut Cera sigillata probe obducendo. Simul ac vel vestigium coloris flavi in Oleo destillante apparet, ab ulteriori Destillatione est desistendum.

Hac ratione omnia Olea Empyreumatica possunt rectificari.

Specificum Medicamentum Antepilepticum, cujus egregiam virtutem crebra experientia confirmavit.

Datur ad Guttas quindecim pro dosi.

OLEUM BEZOARDIGUM *W EDELII.*
OLEUM CAMPHORATUM *Suecorum.*

℞. Camphoræ Drachmas duas :

Diffolvantur

Olei Amygdalarum dulcium Radicibus, Alkannæ tincti, Un-
cia una :

Addatur

Quintæ Essentiæ Citri Scrupulus dimidius :

Misceantur.

*Ad morbos Inflammatorios & Malignos laudatur, olim, in Ger-
mania præsertim, multum celebrabatur. Ad Fissuras Labiorum in
Febribus ardentibus, quin & ad necanda, quæ Meatum Audito-
rium subierunt, Insecta adhibetur.*

Dosis intus ad Guttas decem.

OLEUM CAMPHORÆ *LEMERY.*

℞. Camphoræ Uncias duas :

Immittantur

Spiritus Nitri Unciis tribus :

Hac ratione in Oleum versa Camphora separetur ab Acido.

Ad Sarcomata fungosa & Ulcerum callosos margines adhibetur.

OLEUM CAPPARUM *MANLII.*

℞. Corticum Radicum Capparum Unciam unam,

Tamarisci,

Cyperiana Drachmas duas,

Herbarum Ceterach,

Rutæ ana Drachmam unam,

Seminis Agni casti Drachmas duas :

Incisa, contusa infundantur cum

Vini albi Unciis sex, per biduum :

Tunc addantur

Olei Olivarum Unciæ duodecim :

Coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & de-
purentur per subsidentiam.

Laudatur contra Obstructiones Lienis.

OLEUM CARMINATIVUM *Danorum.*

℞. Oleorum destillatorum Chamomillæ,
 Menthæ ana Uncias duas,
 Carvi,
 Cumini,
 Fœniculi ana Drachmam semis:

Misceantur.

Umbilico illinitur, Clysmatibus immiscetur, intus quoque ad sex vel octo Guttas cum Saccharo aut Vitello ovi exhibetur.

OLEUM CARMINATIVUM *Wurtembergensium.*

℞. Herbarum recentium Anethi,
 Menthæ,
 Absynthii,
 Pulegii,
 Florum Chamomillæ vulgaris ana Uncias quatuor:

Incisa coquantur cum

Olei Olivarum Unciis viginti quatuor, ad consumptionem humiditatis:

Expressis addantur

Olei Laurini Unciæ tres:

Depurentur per subsidentiam.

Vires ex nomine patent. Præcipue laudatur Abdomini tenellorum Torminibus laborantium, inungendo.

OLEUM CATELLORUM *Parisiensium.*

℞. Catellorum recens natorum incisorum Numero tres:

Coquantur cum

Olei Olivarum Unciis quadraginta octo, ad consumptionem humiditatis:

Colato addantur

Herbarum Origani,

Serpylli,

Pulegii,

Hyperici,

Majoranæ ana Unciæ duæ:

Insolentur per quindecim ies, exprimantur & depurentur.

Hoc Oleum in membris Contractis curandis & Rheumatismo pellendo multis laudibus celebratur, quæ, si vel maximæ ei debentur, certe Catellis omnium minime referendæ erunt acceptæ.

OLEUM COLOCYNTHIDIS GRULINGII correctum.

R. Herbarum Absynthii,
 Rutæ ana Uncias quatuor,
 Pulpæ Colocynthidis Uncias duas,
 Radicis Hellebori nigri Unciam unam:
 Incisa & contusa coquantur cum
 Olei Olivarum Unciis quadraginta octo,
 Vini albi Unciis sex,
 Fellis bubuli Unciis sedecim:
 Ad consumptionem humiditatis:
 Exprimantur & per subsidentiam depurentur.
Anthelmintico scopo Alvi que ducendæ causa Abdomini illinitur.

OLEUM HYPERICI MANLII.

R. Florum Hyperici cum calicibus Uncias triginta sex,
 Vini albi Uncias sex,
 Olei Olivarum Uncias triginta sex:
 Coquantur ad consumptionem humiditatis;
 Expresso addantur
 Terebinthinæ Venetæ Unciæ duodecim,
 Croci, minutim concisi, Drachmæ duæ:
 Elapsis viginti quatuor horis coletur.
Creberrimo in usu est ad Vulnera claudenda.

OLEUM MUCAGINUM Amstelodamensium.

R. Radicum Althææ recentium, Uncias duas cum dimidia,
 Scillæ recentium Unciam semis,
 Seminum Lini,
 Fœnugræci ana Uncias duas:
 Extrahatur inde, ope coctionis cum aquæ quantitate sufficiente,
 Mucilago, cui addantur

Oleo-

Oleorum infusorum Anethi,
Chamomillæ,

Liliorum alborum ana Unciæ sedecim,
Coquantur ad consumptionem humiditatis; Colentur.
Emolliendi scopo adhibetur.

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM *COSTÆI.*

Albumina ovorum, aqua ebulliente indurata, diffecantur secundum longitudinem; unius cavum repletur Pulvere Myrrhæ, huic alterum superimponitur, ambo hemisphæria fili ope continentur & suspenduntur eo consilio, ut in vas ipsis suppositum destillet Myrrha Albumine dissoluta.

Laudatur tanquam Medicamentum balsamicum ad Fissuras Cutis. Cum vero valde proclive sit ad putredinem, consultius est, ipso usus tempore, Myrrham in Albumine dissolvere.

OLEUM PHILOSOPHORUM *MESUE.*

Hoc nomine qualecunque Oleum unguinosum per se destillatum potest exhiberi.

Resolvendi ergo adhibetur. Ejus inunctione Tympaniticum fere conclamatum perfecte curatum recenset SPINDLER Obs. Med. N. 53.

OLEUM SCARABÆORUM *Parisiensium.*

℞. Scarabæorum fimariorum Uncias octo:
Contusi infundantur cum

Olei Laurini Unciis sedecim:

Coquantur ad exhalationem humiditatis, colentur & deperentur per subsidentiam.

Laudatur Resolvendi & Nervos roborandi sine.

OLEUM *SLOTANI.*

℞. Olei Olivarum Uncias septuaginta duas,
Catellorum Numero duos,
Ranarum Numero duodecim,

PARS II.

G g

Lumbricorum terrestrium Uncias fedecim,
 Aquæ Juniperi Uncias triginta sex:
 Incisa coquantur ad confumptionem humiditatis:
 Expreffis addantur

Axungiarum Humanæ,
 Muris Alpini,

Oleorum Scorpionum,

Amygdalarum amararum ana Unciæ fex,

Oculorum Populi recentium Unciæ triginta fex,

Florum recentium Primulæ Veris,

Tuffilaginis,

Betonicæ,

Geniftæ,

Chamomillæ Romanæ,

Violarum,

Liliorum Convallium,

Lavendulæ,

Sambuci,

Anethi,

Salviæ,

Cheiri,

Rutæ,

Thymi,

Rorismarini,

Centaurei minoris,

Origani,

Tanaceti,

Liguftri,

Agrimoniæ,

Pulegii,

Meliloti,

Verbafci,

Abfynthii,

Rofarum Damafcenarum ana Manipu-
 lus unus,

Hyperici Manipuli quatuor:

Infolentur per totam æstatem; tunc coquantur per aliquot horas, exprimantur; Oleum depuretur per sublidentiam.

Hildanus Oper. 657. hoc Oleum tanquam egregium Medicamentum contra omnes affectus Nervorum frigidos maxime, nec non ad alios graves morbos commendat. An vero inconcinna hæc, imo monstruosa compositio promissis respondeat? doceat experientia.

OLEUM STOMACHICUM ZWÆLFERI.

℞. Olei infusi Absynthii Uncias duodecim,

Mastychis electæ Unciam unam:

Diffolutis addantur

Oleorum destillatorum Absynthii,
Caryophyllorum,
Ligni Rhodii, ana Drachma femis,
Nucis Moschatæ,
Macis ana Scrupuli duo:

Misceantur.

Inungitur Regioni Epigastricæ.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.
LIXIVIUM TARTARI *Londinensium.*

Salis Tartari quantum lubet in patina vitrea leviter tecta exponitur aëri, liquor in quem resolvitur, per filtrum trajicietur.

Ejus aliquot Gutte multa aqua dilutæ dantur in Acrimonia acida nec non ad referandas Obstructiones abdominales.

OLEUM VITRIOLI *BASIL. VALENTINI.*

Vitriolum viride ad albedinem calcinatum immittitur Retortæ terreæ, cui fornaci reverberatoriæ commissæ jungitur Argillæ ope excipulum vitreum; accenditur ignis, per gradus ad summum usque augendus & usque continuandus, donec excessante, quæ semper in excipulo conspicitur, nebula, nullos ulterius prodire vapores appareat; tunc omnibus refrigeratis, excipulum a Retorta solvitur; liquor obtentus dento ex Retorta vitrea destillatur; SPIRITUS SULPHURIS qui prior

destillat, seorsim asservatur; remanens autem in Retorta ACIDUM VITRIOLI CONCENTRATUM vasi vitreo, probe claudendo committitur.

Acidum fortissimum interdum a Chirurgis Sanguini sistendo adhibetur; intus non nisi magna aquæ quantitate dilutum, usurpari potest.

Rarissime a Pharmacopolis paratur, sed ab artificibus propriis arcessitur. Probatum pondere, incalescentia cum aqua, nec non pennæ sive lintei ipsi immixti subita corrosione.

OPIATA ADSTRINGENS RICHARD.

℞. Corticum Cascarillæ Unciam unam,
Granatorum Unciam semis,
Terræ Japonicæ Unciam unam,
Nucum Cupressi Unciam semis,
Rob Juniperi Uncias quatuor:
Pulverifata Misceantur.

Vires ex nomine patent; datur ad Avellanæ magnitudinem.

OPIATA DETERSIVA RICHARD.

℞. Pulverum Myrrhæ electæ,
Olibani electi ana Unciam semis,
Spermatis Ceti Drachmas duas:
Vitello ovi probe subactis addantur
Mellis optimi Unciæ sex,
Pulveris Radicis Liquiritiæ quantum fatis:
Misceantur.

Exhibetur Phthificis.

OPIATA DYSENTERICA RICHARD.

℞. Boli Armenæ Uncias tres,
Pulveris Gummi Arabici Unciam semis,
Theriacæ Andromachi,
Diascordii Fracastorii ana Uncias duas:
Misceantur.

His si adjiciuntur

Balsami Locatelli Unciæ duæ,

OPIATA. OXYCRATUM. OXYMEL. 237

Surgit OPIATA DYSENTERICA BALSAMICA
RICHARD.

*Prior ad sistendam simplicem Dysenteriam, hæc ad ulceratam
adhibetur.*

OPIATA FEBRIFUGA PURGANS RICHARD.

℞. Pulverum Corticis Chinæ Uncias quatuor,
Radicum Jalappæ,
Nitri depurati ana Drachmas tres,
Conservæ Rosarum rubrarum Uncias duas,
Syrupi Cichorii cum Rhabarbaro quantum fatis:
Misceantur.

Leniter alvum ducit.

*Ubi Radix Jalappæ omittitur, surgit OPIATA FEBRIFUGA
SIMPLEX RICHARD.*

OXYCRATUM GALENI.

℞. Aceti fortis,
Aquæ fontanæ ana partes æquales:

Misceantur.

Ad Inflammationes & Sugillationes dissipandas adhibetur.

OXYMEL CHALYBEATUM FULLER.

℞. Aceti chalybeati,
Mellis crudi ana partes æquales:
Coquantur ad consistentiam Syrupi & colentur.
Laudatur Resolvendi scopo.

OXYMEL COLCHICUM STÆRCK.

℞. Aceti Colchici Uncias fedecim,
Mellis optimi Uncias triginta duas:
Leni igne coquantur ad consistentiam Mellis.
*Scopo Resolvendi & Urinam ducendi ad aliquot Drachmas pro
dosi, aliquoties de die exhibetur.*

OXYMEL PECTORALE Danorum.

℞. Radicum Helenii. Unciam unam,

238 OXYMEL OXY SACCHARUM.

Radicum Iridis Florentinæ Unciam semis:
Incisæ coquantur ex
Aquæ fontanæ Unciis triginta sex, ad residuum Unciarum
viginti quatuor:
Colaturæ, subfidentia depuratæ, addantur
Mellis optimi Unciæ sedecim,
Gummi Ammoniaci in octuplo Aceti soluti Uncia una:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
Cochleatim exhibetur Tussientibus & Asthmaticis.

OXYMEL SCILLITICUM PRÆPOSITI.

℞. Mellis optimi Uncias triginta duas,
Aceti Scillitici Uncias sedecim:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
*Egregium Medicamentum ad Resolvendum Mucum. Asthmaticis
morbisque Pituitosis laborantibus cum successu cochleatim exhi-
betur.*

OXYMEL SIMPLEX HIPPOCRATIS.

℞. Mellis optimi Uncias duodecim,
Aceti Vini Uncias sex:
Coquantur ad consistentiam Mellis.
*Valide Resolvit, in Febribus præcipue Inflammatoriis salubri-
ter datur, ad Gargarismata quoque recipitur.*

OXYSACCHARUM EMETICUM SCHRÆDER.

℞. Pulveris Vitri Antimonii Unciam unam,
Aceti Vini Uncias duodecim:
Infundantur per viginti horas: liquori filtrato addantur
Sacchari albi Unciæ octo:
Coquantur ad consistentiam Syrupi.
Datur ad Unciam unam pro dosi.

PANACEA HOLSATICA

Videatur ARCANUM DUPLICATUM.

PANACEA MERCURIALIS *LEMERY.*
 ANTIQUARTIUM *RIVERII.*
 CALOMELAS.

Est Mercurius dulcis septies vel pluries sublimatus, quem quidem cum Spiritu Vini adhuc digeri jubent.

Sunt qui contendant, iteratis Sublimationibus Mercurium dulcem vi Alvum ducendi privari, aptioremque reddi ad excitandum Ptyalismum.

PANES SACCHARATI PURGANTES.

℞. Farinæ Triticæ,
 Pulveris Sacchari albi ana Uncias quatuor,
 Vitellorum Ovorum Nro tres :

Probe agitentur dein distribuantur in orbiculos, quibus singulis determinatum Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, pondus adjicitur; Coquantur dein modo apud dulciarios usitato.

Exhibentur Pueris.

PASSULÆ ET PRUNA LAXATIVA *Bergamensium.*

℞. Foliorum Sennæ Uncias quatuor,
 Cinnamomi Drachmas duas,
 Zinziberis albi Drachmam unam semis :

Incisa infundantur per biduum cum
 Aquæ ferventis Unciis decem :

Colatura dissolvantur
 Sacchari albi Unciæ duodecim :

Post unicam ebullitionem denuo coletur liquor & superfundatur

Passularum minorum vel Prunorum Damascenorum cum aqua ad mollitiem coctorum Unciis duodecim.

Quibus Alvus tarda est ad Unciam unam comedenda præbentur.

PASTA ALTHÆÆ *Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ incisarum Uncias quatuor,
 Coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis sexaginta quatuor per octavam horæ partem:

Colaturæ addantur:

Gummi Arabici albissimi contusi Unciæ duæ & triginta:
Hoc dissoluto adjiciantur

Sacchari albi Unciæ duæ & triginta:
Coletur liquor & evaporetur sub continua agitatione ad consistentiam spissi Syrupi;

Tunc addantur

Albuminum Ovorum N^o sex cum Aquæ Naphæ Unciis quatuor conquassatorum:
Evaporentur sub perpetua & valida agitatione, donec in massam abierint, quæ dorso manus applicata eidem non adhæreat; tunc effundantur super laminam metallicam, Amylo confersam.

Tussientibus in ore liquanda exhibetur, ut acre vias aereas irritans demulceat.

PASTA AMYGDALATA COSMETICA.

℞. Farinæ Fabarum Uncias sedecim,
Oryzæ,
Amygdalarum excorticatarum ana Uncias octo,
Myrrhæ electæ Uncias duas,
Camphoræ sesqui Unciam,
Saponis Veneti Uncias viginti:
Reducantur in Pulverem tenerimum.
Ad scopos Cosmeticos adhibetur.

PASTA DEPILATORIA *PLENCK.*

℞. Calcis vivæ Uncias sedecim,
Amyli Uncias decem,
Auripigmenti Unciam unam:
In pulverem tritis affundatur sensim
Aquæ quantum fatis:

PASTA. PASTILLI.

241

ad consistentiam Pastæ

Inunguntur hac Pasta loca pilosa, & dum coeperit siccescere, pars aqua illico est abluenda.

PASTA LIQUIRITIÆ FUSCA *Parisiensium.*

SUC DE REGLISE DE BLOIS.

℞. Gummi Arabici electi Uncias triginta duas:

Diffolvantur

Aquæ fontanæ quanto sufficiente:

Colatura diffolvantur

Succi Liquiritiæ Unciæ novem,

Sacchari albi Unciæ sedecim:

Evaporentur lento igne ad consistentiam Syrupi spissioris;

Tunc addantur

Pulverum Radicum Enulæ,

Ireos Florentinæ ana Uncia semis:

Continuetur evaporatio, usque dum massa refrigerata digitis non adhæreat, tunc addantur

Olei destillati Anisi Scrupuli duo:

Effundatur Pasta super marmor Oleo Amygdalarum dulcium inunctum, extendatur ope cylindri lignei eodem Oleo inuncti, tunc in parva quadrata dissecetur.

Usurpatur ut Pasta Althææ, cui siquidem Tussis à Mucosissimo originem trahit, etiam præferenda videtur.

PASTA AD NÆVOS *PLENCK.*

℞. Saponis Veneti,

Calcis Vivæ ana partes æquales;

Terantur in pastam.

Suadet Auctor vicinas partes Emplastro quodam adhæsivo, foramine Nævum transmittente perforato, defendere, & Nævo hanc pastam imponere: asserit intra duodecim horas Nævum in Escharum transiturum & succedente Suppuratione secessurum.

PASTILLI MERCURIALES *Parisiensium.*

℞. Cinnabaris factitiæ lævigatæ Drachmas duas,

PARS II.

CIVIL H. h.

Succini præparati Drachmam unam :
 Mixta formentur cum Mucilaginis Tragacanthæ idoneo quan-
 to in Pastillos.

Adhibentur pro Fumigatione Mercuriali.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ BATEI.

℞. Æthiopis mineralis Unciam unam,
 Pulverum Reguli Antimonii Medicinalis,
 Gummi Guajaci ana Unciam semis,
 Extracti Sarfaparillæ Unciam unam :
 Misceantur & formentur in Massam Pilularum.

*Resolvendi & Sanguinem depurandi ergo adhibentur, Scabiosis,
 Hydropicis, Ulceribus malignis laborantibus laudantur; Dan-
 tur ad Semidrachmam.*

PILULÆ ALUMINOSÆ RICHARD.

Videatur Alumen tinctum.

PILULÆ DE AMMONIACO QUERCETANI.

℞. Extracti Aloes aquosi Uncias duas,
 Pulverum Gummi Ammoniacy Unciam unam semis,
 Myrrhæ,
 Mastichis,
 Benzoes,
 Rhabarbari ana Drachmas duas,
 Croci Scrupulos duos,
 Salis Absynthii Drachmam unam :

Misceantur in Massam Pilularum.

*Resolvendi sine Hypochondriacis, Asthmaticis, Quartana-
 riis &c. commendantur. Dantur ad Drachmam dimidiam.*

PILULÆ ANGELICÆ Augustanorum.

℞. Aloes Succotrinæ Uncias duodecim :
 Dissolvantur

Succorum Cichorei,
 Endiviæ,

Suecorum Fumariæ,
Rosarum Damascenarum ana Unciis duodecim;
Colatura depuretur per subsidentiam & evaporetur ad consistentiam Syrupi; addantur

Pulverum Rhabarbari Uncia una,
Agarici Uncia semis,
Cinnamomi Drachmæ duæ:

Misceantur in Massam.

Leniter alvum ducunt, & Obstructiones Viscerum abdominalium oppugnant. Dantur ad Drachmam semis.

PILULÆ ANTHELMINTICÆ HOFFMANNI.

℞. Pulverum Gummi Sagapeni,
Asæ foetidæ,
Rhabarbari electi,
Mercurii dulcis ana Drachmam unam:

Misceantur & fiant cum

Essentiæ Gentianæ quantitate sufficiente, Pilulæ Grani unius ponderis.

Vires ex nomine patent.

PILULÆ ANTIMONIALES KLEINII.

℞. Pulveris Antimonii Unciam unam,
Gummi Guajaci Drachmas duas,
Extracti Fumariæ Unciam semis;

Misceantur & redigantur secundum artem in Massam.

Sanguinem depurandi ergo cum successu dantur aliquoties de die ad Drachmam semis.

PILULÆ APERIENTES STAHLII.

℞. Extractorum Aloes Gummosi Unciam unam,
Panchymagogi Unciam semis,
Alcohol Limaturæ Martis Drachmas duas:

Misceantur.

Quibus segnior Alvus est, commendantur ad quindecim Grana.

PILULÆ BALSAMICÆ WOLFII.

℞. Rasuræ Saponis officinalis Unciam unam ,
 Terebinthinæ coctæ Unciam semis ,
 Resinæ Jalappæ præparatæ ,
 Extractorum Aloes aquosi ,
 Centaurii minoris ,
 Gentianæ ana Drachmas tres :

Misceantur, & fiant Pilulæ Granorum duorum ponderis.

Abstergunt, Resolvunt, Alvum ducunt. Dosis ad quadraginta usque potest extendi.

PILULÆ BALSAMICÆ MORTONI.

℞. Pulverum Millepedum Drachmas tres ,
 Gummi Ammoniacy ,
 Florum Benzoes ana Drachmam unam ,
 Extracti Croci ,
 Balsamorum Peruviani ana Scrupulum semis ,
 Sulphuris Anisati quantitatem sufficientem :

Fiat Massa Pilularum.

In metu Tuberculorum Pulmonis dantur ad Scrupulum dimidium.

PILULÆ CÆRULEÆ Edinburgensium.

Videatur Specificum Antepilepticum WEISMANN.

PILULÆ CATARRHALES Danorum.

℞. Extracti Panchymagogi Unciam unam ,
 Mercurii dulcis Unciam semis ,
 Resinæ Jalappæ, Pineis tritæ, Drachmam unam ,
 Quintæ Essentiæ Corticum Aurantium Guttas triginta :

Misceantur in Massam

Ad edacendum & attenuandum Serum exhibentur. Dantur ad Scrupulum unum pro dosi.

PILULÆ CEPHALICÆ Danorum.

℞. Massæ Pilularis de Succino ,

Extractorum Rhabarbari,
Panchymagogi,
Refinæ Jalappæ, Pineis tritæ, ana Unciam femis:

Misceantur in Massam.

Evacuandi ergo dantur in affectibus Capitis serosis. Dosis est ad Drachmam semis.

PILULÆ COCHIÆ RHASIS.

℞. Specierum pro Hiera picra Drachmas decem,
Pulverum Trochiscorum Alhandal Scrupulos decem,
Diagrydii Drachmas duas femis,
Stœchadis Arabicæ,
Radicum Turbith ana Drachmas quinque,

Syrupi Stœchados quantum fatis:

Misceantur & formentur in Massam.

Ad Caput Pituita evacuandum olim adhibebantur. Dantur ad Drachmam semis vel Scrupulos duos.

PILULÆ COMMUNES.

Videantur Pilulæ RUFÆ.

PILULÆ DE CYNOGLOSSO MANARDI.
CATAPOTIA AD CATARRHOS MESUÆ.

℞. Pulverum Radicis Cynoglossi,
Seminis Hyoscyami,
Opii depurati ana Unciam femis,
Myrrhæ electæ Drachmas sex,
Olibani Drachmas quinque,
Styracis Calamitæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi ana Drachmas duas,
Crocii sesqui Drachmam:

Misceantur & fiat cum Syrupi Violarum idoneo quanto Massa.

Olim a Stahlianis maxime Sopiendi scopo ad Grana quinque usque pro Dosi dabantur. Drachma una de Opio & de Semine Hyoscyami Grana octo continet.

PILULÆ DEPURANTES RICHARD.

℞. Sulphuris Aurati Antimonii,
 Mercurii dulcis ana Drachmas duas,
 Gummi Guajaci Unciam femis:
 Pulverifatis addatur
 Balsami Copaibæ Drachma una:
 Misceantur & formentur in Massam.
*Depurandis Humoribus dantur ad Scrupulum femis aliquoties
 de die.*

PILULÆ FOETIDÆ WHYTT.

℞. Asæ foetidæ Drachmas tres.
 Aloes,
 Vitrioli Martis ana Drachmam unam:
 Misceantur, Fiat Massa Pilularum.
*Hujus Scrupuli duo aliquoties de die Hypochondriacis & Hy-
 stericis dantur.*

PILULÆ HYDRAGOGÆ HELVETII.

℞. Granorum Tigliorum,
 Gummi Guttæ,
 Diagyrdii Sulphurati ana Unciam femis,
 Radicum Jalappæ,
 Rhabarbari ana Drachmas duas,
 Macis Drachmam unam,
 Rob Sambuci Unciam femis,
 Misceantur in Massam Pilularum.
*Valide Evacuant. Drachma una Granorum Tigliæ Gummi
 Guttæ & Diagyrdii de singulis undecim circa Grana continet;
 quapropter Dosis ad Scrupulum unum est limitanda.*

PILULÆ HYDROPICÆ BONTII.

℞. Aloes Succotrinæ Drachmas quinque,
 Gummi Guttæ,
 Ammoniaci ana Drachmas tres:

In pulverem redacta formentur in Massam.

Hydropicis resolvendi causa ad Grana quindecim, evacuandi autem sine ad Drachmam semis dantur.

PILULÆ HYDROPICÆ *RICHARD.*

℞. Aloes Succotrinæ Unciam semis,
Gummi Ammoniaci Drachmas duas:

Guttæ,

Diagrydii,

Arcani duplicati ana Drachmas tres,

Pulverifata reducantur cum

Oxymellis Scillitici quantitate sufficiente in Massam Pilularem.

Prioribus validiores dantur eadem dosi.

PILULÆ HYSTERICÆ *Parisiensium.*

℞. Gummi Opoponacis Unciam unam,
Ammoniaci,

Galbani,

Sagapeni ana Unciam semis,

Myrrhæ Drachmas duas,

Asæ foetidæ,

Castorei Ruffici ana Drachmas tres:

In pulverem redactis immisceatur

Olei destillati Succini Scrupulus unus,

Mithridatii quantitate sufficiente: Fiat Massa pilularis.

Scopo aperiendi adhibentur; Hystericis præcipue commendantur; dosi est ad Drachmam semis.

PILULÆ MAJORES *HOFFMANNI.*

℞. Mercurii sublimati Drachmam unam:

Diffolvatur

Aquæ destillatæ quanto sufficiente:

Hac solutione imbuantur

Micæ Panis Drachmæ novem:
Fiant Pilulæ Grani unius pondere.

Liquoris Siphylitici vires habent, eo commendabiles, quod nullo sapore metallico molestæ sunt, & cum sensim modo in Ventriculo solvantur, nulla inde irritatio metuenda. Quatuor aut quinque Pilulæ exhibentur ter de die.

PILULÆ MARTIALES SYDENHAMI.

℞. Alcohol Limaturæ Martis Uncias duas,
Extracti Absynthii quantum satis ad formandam Massam Pilularem.

Hypochondriacis & Hystericis conducunt. Auctor illas in Dissertatione Epistolari describit. Dantur bis de die ad Scrupulum unum pro dosi.

PILULÆ MASTICHINÆ PETRI APONENSIS.

℞. Aloes electæ Drachmas decem,
Mastychis electæ Unciam semis,
Agarici optimi Drachmas tres:
Reducantur in Massam Pilularem.

Ventriculo roborando inserviunt; dantur ad Drachmam semis.

PILULÆ MERCURIALES BARBAROSSÆ à LEMERY
correctæ.

℞. Hydrargyri Drachmas sex:
Extinguantur
Terebinthinæ quantitate sufficiente:
Addantur

Pulverum Aloes Drachmæ sex,
Agarici albi Uncia semis,
Rhabarbari electi Drachma una:
Misceantur & formentur in Massam Pilularem.

In morbis Venereis & Lymphæ exhibentur ad Drachmam unam pro dosi.

PILULÆ MERCURIALES *BELLOSTE A BAUMÉ* correctæ.

℞. Mercurii vivi e Cinnabari revificati Unciam unam,
 Cremoris Tartari Unciam semis:
 Triturentur usque dum globuli Mercuriales disparuerint:
 Tunc addantur

Diagrydii,
 Pulveris Jalappæ ana Uncia una:

Mixta formentur cum Syrupi Capillorum Veneris quantitate sufficiente in Massam pilularem.

Viribus cum prioribus conveniunt, dantur ad Drachmam semis.

PILULÆ CONTRA OBSTRUCTIONES *STAHLII*.

℞. Extractorum Panchymagogi Drachmam unam,
 Aloes gummosi Drachmas duas,
 Alcohol Limaturæ Martis Drachmam semis:

Mixta formentur in Massam Pilularem.

Frequenti olim in usu apud Germanos maxime fuerunt in reserandis Visceribus Abdominalibus. Dosis est ad Grana decem, per plures dies continuanda.

PILULÆ OPHTHALMICÆ *SCHMUCKER*.

℞. Gummi Galbani,
 Sagapeni,
 Saponis officinalis ana Drachmam unam,
 Pulveris Rhei electi Drachmam unam semis,
 Succu Liquiritiæ Drachmam unam,
 Tartari Emetici Grana sedecim:

Misceantur & formentur Pilulæ Grani unius ponderis.

Mane & vesperi sumantur quindecim Pilulæ per sex septimanas contra Suffusionem.

PILULÆ *PLUMERII*.

℞. Mercurii dulcis,
 Sulphuris Aurati Antimonii ana Drachmas sex,
 Extracti Gentianæ Unciam semis:

Pars II.

I i

Probe mixta formentur in Massam Pilularem.

Multum celebrantur in Morbis Venereis & Lymphæ. Dantur ad Drachmam dimidiam vel Scrupulos duos pro dosi.

PILULÆ POLYCHRESTÆ BALSAMICÆ ad mentem
BECHERI ET STAHLII.

℞. Extractorum Aloes,
Myrrhæ aqua frigida paratorum ana Uncias
duas,
Absynthii Unciam unam semis,
Centaurii minoris Unciam unam,
Cardui benedicti Unciam unam semis,
Fumariæ Unciam unam,
Cochleariæ Unciam unam semis,
Rhabarbari, -

Terebinthinæ Venetæ ana Unciam unam:

Misceantur in Massam Pilularem.

Non levem quæstum cum his Pilulis varii Germaniæ Medici fecerunt. Adreferendas Viscerum Abdominalium obstructiones, ut & Mensium præcipue commendantur. Dantur ad Drachmam semis.

PILULÆ POLYCHRESTÆ STARCKEY.

℞. Saponis Chemici cum Oleo Terebinthinæ parati Uncias
quatuor,
Extracti Opii aquosi Unciam unam,
Pulveris Radicis Hellebori albi Uncias duas:
Probe mixta formentur in Massam Pilularem.

Medicamentum inconcinnum, Alchemicis commentis superstructum omnino a re Medicamentaria removendum videtur; quo vero qui uti voluerit, non ultra tria Grana dosin extendat.

PILULÆ RESOLVENTES DARELII.

℞. Saponis officinalis Uncias duas cum semisse,
Pulveris Gummi Ammoniaci,

Pulverum Tartari Vitriolati,
Bilis bovinæ inspissatæ,
Rhabarbari,

Extracti Absynthii ana Drachmas sex:

Misceantur cum Syrupi Absynthii quanto convenienti in Massam Pilularem.

Inimicæ maxime feruntur Ictero; dosi exhibentur eadem, quæ SAPONATÆ, quarum superant etiam efficaciam.

PILULAE RUFÆ correctæ.

℞. Extractorum Aloes gummosi Unciam unam,
Myrrhæ gummosi Unciam semis,

Pulveris Croci Drachmas duas:

Misceantur cum Succo Limonum quanto conveniente in Massam Pilularum.

Ad referandas Obstructiones Abdominales faciunt; laudantur quoque adversus Pestem. Dosis ad Drachmam semis excurrit.

PILULAE SAPONATAE KLEINII.

℞. Saponis officinalis Unciam unam,
Gummi Ammoniaci depurati,
Extracti Centaurii minoris ana Unciam semis:
Olei destillati Succini Guttas decem:

Misceantur in Massam.

Aperiendi scopo ad Drachmam semis aliquoties de die dantur.

PILULAE SCILLITICAE *Edinburgensium.*

℞. Scillæ præparatæ,
Gummi Ammoniaci depurati ana Unciam semis,

Reducantur in pulverem; addantur

Millepedum præparatorum Uncia semis,

Saponis officinalis Uncia una:

Reducantur cum Oxymellis Scillitici idoneo quanto in Massam Pilularum.

Egregie resolvunt & aperiunt: in Obstructionibus Viscerum Abdominalium, & mucosis Pectoris morbis; ter de die ad Scrupulum unum exhibentur.

PILULAE DE STYRACE *SCHRÆDERI* correctæ.

℞. Styracis Calamitæ Unciam femis,
 Succi Liquiritiæ Draohmas tres,
 Olibani,
 Benzoes,
 Mastichis,
 Extracti Opii aquosi ana Drachmas duas,
 Croci Orientalis Drachmam unam:
 Pulverifata reducantur, cum Essentiæ Succini quanto conveniente in Massam pilularem.

Drachma una septem cum dimidio grana Opii continet. Dantur Tussientibus sopiendis ad Grana duodecim.

PILULAE DE SUCCINO *CRATONIS*.

℞. Succini præparati Unciam unam femis,
 Pulverum Mastichis Unciam unam,
 Agarici optimi Drachmas sex,
 Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ Drachmas
 duas,

Aloes Succotrinæ Uncias duas femis:

Misceantur & formentur cum Essentia Succini in Massam.

Olim frequens earum usus erat in Affectibus Capitis atque Catarrhis. Ad Drachmam femis pro Dosi dabantur.

PILULAE TARTAREAE *SCHRÆDERI*.

℞. Aloes Succotrinæ Unciam unam,
 Gummi Ammoniaci Drachmas tres,
 Vitrioli Martis,
 Extractorum Croci ana Drachmam unam,
 Gentianæ Drachmam unam femis;
 Terræ foliatæ Tartari Drachmas duas:

Mixta reducantur secundum artem cum Tinctura Tartari in Massam pilularem.

Hæc Pilularum Tartarearum compositio reliquis quorumcunque Auctorum omnino præferenda est. Resolvit & roborat, quapropter aperiendi causa in morbis ab obstructis Visceribus Abdominalibus oriundis ad Drachmam semis pro dosi datur.

PILULAE DE TEREBINTHINA RICHARD.

℞. Boli Armenæ præparatæ,
Ossis Sepiæ ana Unciam semis,
Succini præparati,
Mastyches ana Drachmas duas,
Rhei electi Drachmam unam,
Terebinthinæ coctæ Unciam unam & semis:

Reducantur in pulverem & cum Syrupo Balsamico formentur in Massam Pilularum.

Ad sistendam Gonorrhæam Scrupulus unus ter de die exhibetur.

PILULAE TONICAE BACHER.

℞. Extracti Hellebori nigri vinosi,
Myrrhæ aquosi ana Unciam unam,
Pulveris Cardui benedicti Drachmas tres & Scrupulum
unum:

Misceantur & inde formentur Pilulæ Grani dimidii ponderis.

Hydropicis multum laudantur, dantur ad decem ter de die, quæ vero dosis pro ratione effectus augeri minui potest.

PILULAE CONTRA VARIOLAS ROSEN.

℞. Pulverum Gummi Guajaci Grana sedecim,
Mercurii dulcis Grana duodecim,
Camphoræ, Pineis tritæ, Grana octo,
Extracti Aloes Grana duodecim:

Misceantur in Massam pilularem.

Dantur tam prophylactico scopo quam corporis ad Inoculationem præparandi gratia. Dosis pro ratione ætatis augetur, ad-

dita juxta Resinæ Jalappæ portione ad scopum quoque Catharticum aptatur.

PLUMBUM USTUM *CELSI.*

Plumbum in patina terrea liquatum agitatur usque dum in calcem gryseam abierit.

Vires adstringentes & exsiccantes exserit; ad usus potissimum externos adhibetur.

POSCA *GALENI.*

℞. Aquæ partes duas,

Vini partes tres:

Paulum coquantur.

In morbis Malignis vires roborantes putredinique resistentes prodit.

POTIO ADSTRINGENS *RICHARD.*

℞. Succi Hypocistidis Drachmam unam,

Sanguinis Draconis,

Aluminis ana Drachmam femis:

Pulverifatis adjiciantur

Ptifanæ adstringentis Unciæ quatuor,

Syrupi de Myrtho Uncia una:

Misceantur.

Vires nomen indicat.

POTIO AMMONIACA *RICHARD.*

℞. Gummi Ammoniacy Drachmas duas:

Diffolvantur in

Oxymellis Scillitici Uncia una femis,

Ptifanæ communis Unciis duodecim:

Misceantur.

Dantur Asthmaticis ad Cochlearia duo alternis horis.

POTIO ANTISEPTICA *RICHARD.*

℞. Corticis Chinæ,

Radiciſ Serpentariæ Virginianæ ana Drachmas tres:
 Incidantur & coquantur cum
 Aquæ Unciis ſedecim ad octo reſiduas Uncias:
 Sub finem addatur
 Florum Chamomillæ Romanæ Drachma una:
 Colaturæ addantur
 Spiritus Nitri dulciſ Drachma ſemis,
 Aquæ Cinnamomi vinoſæ,
 Syrupi Limonum ana Uncia. una:
 Miſceantur.

Exhibetur in morbis Malignis per cyathos.

POTIO AD ASTHMA FULLER.

℞. Millepedum vivorum centum & viginti:
 Contuſis ſenſim affundantur
 Aquæ Pulegii Unciæ octo:
 In liquore fortiter expreſſo diſſolvantur
 Pulveris Gummi Ammoniacy Drachmæ tres,
 Spiritus Salis Ammoniacy Drachmæ duæ,
 Syrupi Baſſamici Uncia una.
*Egregium proſuſ Medicamentum ad Aſthma pituitoſum &
 flatulentum, aliquoties de die cochleatim exhibendum.*

POTIO CONFORTANS ACIDULATA RICHARD.

℞. Confectionum de Hyacintho,
 Alkermes ana Drachmam unam,
 Liquoris Anodyni mineraliſ HOFFMANNI Scrupulos duos,
 Syrupi Acetoſitatis Citri Unciam ſemis,
 Vini rubri,
 Aquæ communis ana Uncias duas:
 Miſceantur.
In morbis Malignis exhibetur cochleatim.

POTIO CRETACEA Edinburgenſium.

℞. Cretæ præparatæ,

Pulverum Gummi Arabici ana Unciam unam,
 Sacchari Unciam semis,
 Aquæ fontanæ Uncias viginti quatuor,
 Spiritus Nucis Moschatæ Uncias duas:

Misceantur.

Dantur per Cyathos contra Sodom.

POTIO OLEOSA RICHARD.

℞. Olei Amygdalarum dulcium,
 Syrupi Althææ ana Unciam unam,
 Ptisanæ pectoralis Uncias tres:

Misceantur.

Relaxandi, demulcendi, nec non Antispasmodico scopo exhibetur. In finem diureticum adduntur

Nitri depurati Grana octo,
 Spiritus Nitri dulcis Guttæ duodecimi.

POTIO SISTENS RICHARD.

℞. Confectionis de Hyacintho Drachmas tres,
 Syrupi Cydoniorum Unciam unam,
 Decocti Corticum Aurantium Uncias quatuor:

Misceantur.

Fluxibus Alvi laborantibus cochleatim præbetur.

PRAEPARATA

Dicuntur Lapidēs Terræ Oſſave in pulverem redacta, ſuper inarmore, vel quod utique melius eſt, ſuper porphyrite ope aquæ in Maſſam coacta, in qua nec oculis nec digitis ſenſibilis ulla relinquatur aſperitas; ope anſerini denique calami per infundibulum in exiguas pyramides efformata & exſiccata.

PTISANA

Veteribus Medicis dicebatur Decoctum Hordei mundati, hodie pro Decocto, quod potus ordinarii vicem ſuſtineat, uſurpatur.

PTISANA ACIDULATA SEU LIMONADA MINERALIS
RICHARD.

℞. Ptisanæ communis Uncias quatuor & sexaginta,
Spiritus Vitrioli quantum satis ad gratam aciditatem,
Quintæ Essentiæ Citri Guttas quatuor,
Pulveris Sacchari Uncias duas:

Misceantur.

Fallendæ siti, in morbis præcipue Biliofis inservit.

PTISANA ADSTRINGENS RICHARD.

℞. Radicis Tormentillæ Drachmas sex:
Coquantur per dimidiam horam cum
Aquæ fontanæ centum & quadraginta quatuor Unciis:
Sub finem addantur
Radicum Consolidæ majoris Drachmæ sex,
Glycyrrhizæ Uncia semis:

Colentur.

Nomen ab ipsa virtute desumptum.

PTISANA COMMUNIS RICHARD.

℞. Hordei integri Unciam unam,
Radicis Graminis incisæ Unciam semis:
Coquantur per dimidiam horam cum
Aquæ fontanæ Unciis quatuor & sexaginta:
Sub finem addantur
Radicis Liquiritiæ Drachmæ duæ:

Colentur.

Huic Ptisanæ si adjicitur

Nitri depurati Drachma semis,
Evadit PTISANA NITRATA RICHARD.

PTISANA PECTORALIS RICHARD.

℞. Radicum Althææ Unciam semis,
Liquiritiæ Drachmas tres,

Caricarum pinguium Drachmas duas,
 Florum Papaveris Rhœados Scrupulum unum:
 Incisa coquantur paululum cum
 Aquæ fontanæ Unciis quatuor & sexaginta.

PULPAE

Parantur ex Radicibus aut Fructibus siccis, quæ cum aqua coquantur, usque dum mollescant, dein cribro imponuntur & ope spatulæ lignæ, per ejus foramina Pulpa transprimitur. Radices bulbosæ & Fructus carnosii sine prævia cum aqua coctione in mortario lapideo aut ligneo contunduntur & deinde per cribrum trajiciuntur.

PULPA CASSIÆ VALERII CORDI.

Ex siliquis Cassiæ Fistulæ instrumenti lignei ope ipso usus tempore optime separatur, per cribrum trajecta a feminibus aliisque quæ ipsi adhærent, quisquiliis commode purgatur. In Officinis, quæ prostat, dicta quidem ratione ex siliquis separatur, sed ut tota obtineatur, siliquas præterea cum aqua eluunt aquæ deinde Pulpæ additæ & mixtim per cribrum coactæ quartam Sacchari partem adjiciunt & cuncta coquunt, usque dum consistentia Electuarii surgat.

Datur ad Uncias duas & ultra scopo Cathartico.

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS *Viennensium.*

℞. Herbarum quinque Emollientium Uncias tres,
 Florum Chamomillæ Unciam unam:

Incisa coquantur paululum cum

Aquæ fontanæ Unciis triginta sex:

Decocto eluatur Pulpa siliquarum Cassiæ; Liqueor colatus evaporetur ad consistentiam Electuarii, cujus uni parti immisceatur

Sacchari Thomæi pars una semis.

Aliquot Unciæ dissolvuntur in aqua pro uno Clystere.

PULPA TAMARINDORUM.

Paratur ex Tamarindis ratione sub PULPA CASSIAE indicata.

PULTICULA DE MANNA.

Videatur Electuarium de Manna.

PULTICULA SAPONACEA.

℞. Saponis Officinalis Drachmam semis :

Dissolvatur

Aquæ Menthæ Drachmis tribus :

Addantur

Vitelli Ovi Drachma una,

Magnesiæ albæ Scrupuli duo,

Pulveris Rhabarbari Scrupulus unus,

Syruporum Althææ FERNELII,

Chamomillæ ana Drachmæ duæ :

Misceantur.

Cum successu contra Tormina Infantum adhibetur.

PULVERES.

Canones.

- I. Parantur substantias solidas in mortario pistilli ope tundendo & triturando, partes in justam tenuitatem redactæ a reliquis ope cribri sericei segregantur.
- II. Tenaciores Vegetabilium & Animantium partes, ut friabiles evadant, prius calori sunt exponendæ; quin etiam instrumentis scindentibus, secantibus &c. comminui solent, ante quam ictibus pistilli exponantur.
- III. Mortaria & pistilla metallica facile labem aliquam Pulveribus affricant.
- IV. Duriores lapides, ut in pulverem comminui possint, ignitione & subsequente extinctione efficitur.

- V. Sicca nec tenacia, ubi in tenerrimum pulverem pistilli & mortarii ope fuerint comminuta, in pastam insuper aquæ ope super Porphyrite rediguntur & teruntur, usque dum nec oculis conspicua nec digitorum apicibus sensibilis ulla amplius asperitas remaneat; quo facto per infundibulum in parvas pyramides transmittuntur, & *Præparatorum* nomine insigniuntur.
- VI. Quodsi vero acria in pulverem sunt redigenda, mortarium aut cribrum operculo ligneo aut coriaceo exacte tegendum est, ne pulvere in auras disperso lædatur operator.
- VII. Aliquanto majori vegetabilis in pulverem comminuendi quantitati subinde aliquot aquæ guttæ sunt affundendæ, quibus nimia pulveris disturbatio caveatur.
- VIII. Majori parte per cribrum transmissa, quæ remanent fragmina tanquam rejectamenta relinquuntur.
- IX. Corticum, Lignorum, Radicum resina turgentium, qui posterius obtinentur pulveres prioribus sunt efficaciores; reliquis omnino virtute præstant. Peracta igitur pulverificatione omnes demum pulveres successive obtenti quam curatissime misceri debent.
- X. Nuclei, nisi ipsis sicca adjiciantur, in pulverem redigi nequeunt.
- XI. Resinæ & Gummi Resinæ non nisi hyeme in pulverem teri possunt; paucæ earum portiones, in compositiones magistrales recipiendæ, ope Sacchari aut Nucleorum in formam pulveris coguntur.
- XII. Omnia mollia & liquida, si quidem ipsis iusta siccorum ratio adjicitur, in pulveres possunt recipi.
- XIII. Pulveres, qui ab aëre læduntur, in vitris probe obturatis asservari debent.

PULVIS ABSORBENS *WEDÉLII.*

- ℞. Vitrioli Martis Drachmas sex,
Concharum præparatarum Uncias duas semis,

Coralliorum rubrorum,
 Antimonii Diaphoretici,
 Cinnabaris factitiæ ana Drachmas decem,
 Extracti Opii aquosi,
 Olei destillati Caryophyllorum ana Drachmam unam.

Misceantur. Fiat Pulvis.

*Acrimoniam acidam tollit, ejus causas profligat, Dolores
 & alia symptomata inde orta curat. Dosis est ad Drachmam semis.*

PULVIS ALTERANS *PLUMMER* SIVE *Edinburgenfium*.

℞. Panacæ Mercurialis,

Sulphuris Aurati Antimonii *MEUDERI* ana partes æquales:

Misceantur triturando exactissime per quadrantem horæ.

*Ad curandos morbos Cutaneos egregie conducit, quin cum
 successu etiam contra Miasma venereum exhibetur. Dosis est ad
 Grana octo bis de die. Camphora si additur, surgit MERCURIUS
 DIAPHORETICUS KLEIN.*

PULVIS ANODYNUS *DOVERI*.

℞. Nitri,

Tartari Vitriolati ana Uncias duas:

Injiciantur in crucibulum candens ibique relinquuntur, do-
 nec omnis scintillatio cessaverit; fat refrigeratus redigatur in
 pulverem, cui addantur

Pulverum Opii,

Liquiritiæ,

Ipecacuannæ ana Uncia una:

Misceantur exacte.

*Ad sistendos Alvi fluxus & Hæmorrhagias ad Drachmam
 unam exhibetur.*

PULVIS ANTARTHRITICUS PURGANS *PERARD*.

℞. Seminum Carduibenedicti,

Carthami,

Diagrydii,

Radicum Salfaparillæ

Chinæ,

Ligni Quajaci ana Unciam semis,

Cryſtallorum Tartari,

Foliorum Sennæ ſine ſtipitibus ana Unciam unam,

Cinnamomi Drachmas duas:

Reducantur in Pulverem & miſceantur.

Materiem Podagricam evacuare putatur, ſi ſingulis menſibus verſus Novilunium ejus Drachma una aſſumatur.

PULVIS ANTARTHRITICUS DUCIS PORTLANDIÆ ſive MIRANDOLÆ, ARTHRITICUS AMARUS Pariſienſ.

℞. Radicum Ariſtolochiæ rotundæ,

Gentianæ,

Summitatum Chamædryſ,

Chamæpytis,

Centaurii minoris ana partes æquales:

Mixta redigantur in Pulverem.

Medicamentum jam ſub initio ſuperioris ſeculi uſitatum majorem in modum in morbis Rheumaticis & Arthriticis, in Podagra maxime laudatur. Ejus Drachma una quotidie mane exhibetur.

RHEDINGIUS & WIRSSUNG Radicem Rhabarbari Monachorum addunt. CRATO formulæ præſcriptæ duplum Ligni Quajaci adjicit.

PULVIS ANTHELMINTICUS GEOFFROY.

℞. Pulverum Corallinæ,

Corticis Mori ana Drachmam unam,

Radicum Rhabarbari electi,

Filicis,

Summitatum Tanaceti ana Drachmam ſemis,

Æthiopiſ mineralis Drachmas duas:

Probe miſceantur.

Datur ad Drachmam unam aliquoties de die.

PULVIS ANTIFEBRILIS TRILLER.

℞. Corticis Chinæ Unciam ſemis,

Lapidum Cancrorum citratorum Drachmas duas,
 Concharum præparatarum Drachmam unam,
 Diaphoretici Martialis,
 Nitri depurati ana Drachmam semis:

Misceantur; fiat Pulvis.

TRILLER hunc Pulverem in omnis generis Febribus Intermit-
tentibus Medicis commendat, ejusque usum innumeris fere ægro-
tis saluberrimum, nec nisi in uno vel altero fallacem expertum
esse asseverat. Datur ad Drachmam unam pro Dosi.

PULVIS ANTIHECTICUS *FORDYCE.*

℞. Salis Polychresti Scrupulum semis,
 Rhabarbari veri Grana sex;

Misceantur; Fiat Pulvis.

Hunc Pulverem per quatuordecim dies usurpatum egregios in
curanda Hæctica & Rachitide effectus edidisse, Auctor ipse ex-
pertus testatur.

PULVIS ANTILYSSUS *COMITIS ISENBURG.*

℞. Cornu Cervi usti præparati Unciam unam,
 Coralliorum rubrorum præparatorum Drachmas duas,
 Margaritarum Occidentalium præparatarum Drachmam
 unam,

Succini albi præparati Drachmam semis,
 Foliorum Auri N^o. quinque,
 Argenti N^o. duo:

Misceantur.

PULVIS ANTILYSSUS *MEAD.*

℞. Lichenis cinerei terrestris Uncias duas,
 Piperis nigri Unciam unam:

Misceantur & redigantur in Pulverem.

Datur ad Scrupulos quatuor.

PULVIS ANTILYSSUS *PALMARIi* sive *JACOBI SYLVANI*
DOMINI DE PYROU.

℞. Herbarum Rutæ,

Herbarum Verbenæ,
 Salviæ,
 Plantaginis,
 Polypodii,
 Absynthii,
 Menthæ,
 Artemisiæ,
 Melissophylli,
 Betonicæ,

Summitatum Hyperici,

Centaurii minoris ana partes æquales:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

Multum imo nimium celebratus hic Pulvis quotidie ad Drachmam dimidiam exhiberi jubetur.

PULVIS ANTILYSSUS *Tunquinenfium.*

℞. Moschi optimi Grana sedecim,
 Cinnabaris præparatæ Grana duo & triginta:
 Misceantur; Fiat Pulvis subtilissimus.

Datur pro dosi, a Cane rabido morsis, una, alternis etiam horis repetenda; in Morbis Exanthematicis, Variolis maxime ad Scrupulum unum; Maniacis ad Scrupulos duos cum dimidio; ad Grana duodecim in Singultu, qui Febris inflammatoriis accedit.

Cum hodie inter omnes constet, tantopere a multis celebrata Specifica contra Morsum Canis rabidi, quam exiguæ sint efficacix, plura congerere nolui.

PULVIS ANTISEPTICUS *PLENCK.*

℞. Pulverum Corticis Peruviani,
 Rutæ ana Uncias duas,
 Camphoræ, Spiritu Vini tritæ, Uncias tres:
 Misceantur.

Inspergitur partibus Gangrænosis.

PUL

PULVIS ANTISPASMODICUS *ROSENSTEINII*.
 SEDATIVUS *Suecorum*.

℞. Opii depurati Scrupulum semis,
 Nitri depurati Scrupulos quinque,
 Sacchari albillimi Unciam unam:
 Misceantur & redigantur in Pulverem.

PULVIS ANTISPASMODICUS *STAHLII*.

℞. Nitri depurati,
 Tartari Vitriolati ana Uncias duas,
 Cinnabaris rectificatæ Drachmam unam semis:
 Misceantur & cogantur in Pulverem tenerrimum.
Propter virtutem Sanguinis æstum temperandi Spasmosque st-
stendi magnopere commendatur. Datur ad Drachmam semis.

PULVIS ARI COMPOSITUS.

Videatur Pulvis Stomachicus *BIRCKMANNI*.

PULVIS AURATUS *Dresdensis sive Germanorum*.

Videatur Pulvis Cordialis *Cellensis*.

PULVIS BEZOARDICUS ANGLICUS SEU *COMITISSÆ*
 DE *KENT*, SEU *GASCONII*.

℞. Apicum nigrorum Chelarum Cancrorum marinorum Un-
 cias duas,
 Margaritarum præparatarum,
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Oculorum Cancrorum citratorum,
 Cornu Cervi ussi ana Unciam unam,
 Lapidis Bezoar Orientalis,
 Terræ Lemniæ ana Unciam semis,
 Cerussæ Antimonii Uncias duas,
 Ambre gryseæ parum Sacchari tritæ Drachmam unam
 femis:

Misceantur & reducantur in Pollinem.

PARS II.

L 1

Gasconium quendam hunc Pulverem Episcopo Vigoniæ tercentum libris Anglicis vendidisse tradunt. Seculi quo primum usurpabatur, genium spirat.

PULVIS BEZOARDICUS LUDOVICI.

℞. Cornu Cervi sine igne præparati Uncias tres,
Terræ figillatæ albæ,
Unicornu fossilis ana Unciam unam semis:
Misceantur; Fiat Pulvis.

Hoc pulvere vulgus in morbis Exanthematicis utitur. Cum hodie ex saniore Praxi Pulveres Bezoardici exulare jubeantur, plures colligere nolui.

PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ Martis Unciam unam,
Radicum Ari,
Coralliorum rubrorum præparatorum,
Matris Perlarum præparatæ ana Drachmas duas,
Cornu Cervi sine igne præparati,
Succini præparati,
Cinnamomi ana Scrupulos quatuor,
Ambra gryfæ Drachmam unam semis,
Sacchari albi ad pondus omnium:
Misceantur, Fiat Pulvis.

*Hunc Pulverem, quem Auctor in Pharmacop. Dogmat. restituit. L. I. Cap. 15. describit, post usum Incidentium & Resolventium per quindecim continuos dies adhiberi jubet. Dosis est ad quatuor Scrupulos: INCOMPLETUS, id est, omis-
sa Ambra vulgo prostat.*

PULVIS CARMINATIVUS MYNSICHTI.

℞. Seminum Cumini,
Carvi,
Anisi ana Uncias tres,
Radicum Zinziberis Drachmas sex;

Macis Drachmas tres,
 Croci Drachmam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis.
Drachma una ad pellendos Flatus adhibetur.

PULVIS CONTRA CASUM *Augustanorum.*

℞. Terræ sigillatæ,
 Sanguinis Draconis,
 Mumie ana Unciam semis,
 Spermatis Ceti Drachmas duas,
 Rhabarbari Drachmam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis.
*Medicamentum minime ad scopum faciens quibusdam in locis
 in gratiam vulgi asservatur, qui illud lapsis ad Scrupulos duos
 exhibet.*

PULVIS CARTHUSIANORUM.

Videatur Kermes Minerale.

PULVIS E CERUSSA *Londinensium.*

℞. Cerussæ Venetæ Uncias quinque,
 Gummi Sarcocollæ Unciam unam semis,
 Tragacanthæ Unciam semis:
 Misceantur, Fiat Pulvis.
Ad siccanda Ulcera & curandum Erysipelas extus adhibetur.

PULVIS COMITIS DE *WARWICK.*

Videatur Pulvis *CORNACHINI.*

PULVIS *COMITISSÆ DE KENT.*

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

PULVIS AD CONDIENDUM COR *Parisiensium.*

℞. Cinnamomi,
 Myrrhæ ana Uncias octo;

Aloes,
 Ladani,
 Benzoes,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatae ana Uncias quatuor:
 Misceantur; Fiat Pulvis subtilissimus.

PULVIS AD CONDIENDA INTRANEA ET CAVITATES
 IMPLENDAS *Parisiensium.*

℞. Myrrhæ,
 Aloes ana Uncias ducentas sex & quinquaginta,
 Bituminis Judaici Uncias centum & sexaginta,
 Salis marini decrepitati Uncias sex & nonaginta,
 Radicum Angelicæ,
 Imperatoriæ,
 Acori,
 Afari,
 Iridis Florentinæ,
 Zinziberis ana Uncias octo & quadraginta,
 Lignorum Sassafras,
 Santali citrini,
 Juniperi,
 Rhodii,
 Abietis ana Uncias triginta & duas,
 Summitatum Lavendulæ,
 Sabinæ,
 Menthæ,
 Thymi,
 Rorismarini,
 Salviæ,
 Stoechados,
 Absynthii ana Uncias sedecim:
 Misceantur; Fiat Pulvis.

PULVIS AD CONDIENDAS ET INFARCIENDAS CARNES
Parisiensium.

℞. Cinnamomi,

Corticis Winterani,
 Caffiæ Caryophyllatæ,
 Costi,
 Amomi,
 Piperis nigri,
 Radicum Enulæ,
 Iridis Florentinæ,
 Cyperi longi,
 Calami aromatici,
 Caryophyllorum,
 Nucis Moschatæ ana Uncias octo,
 Myrrhæ,
 Aloes ana Uncias octo & quadraginta,
 Bituminis Judaici,
 Benzoes,
 Tacamahacæ,
 Ladani,
 Olibani ana Uncias duas & triginta,
 Foliorum Lauri,
 Majoranæ,
 Thymi ana Uncias sedecim,
 Florum Lavendulæ Uncias duas & triginta,
 Misceantur; Fiat Pulvis tenuis.

PULVIS CONTENT *dictus.*

℞. Sacchari Canariensis Uncias duodecim,
 Oryzæ Uncias octo,
 Cinnamomi Unciam unam femis,
 Caryophyllorum Drachmam femis,
 Vanigliæ Drachmam unam femis:
 Redigantur in pulverem & Misceantur.
Substituatur Chocoladæ.

PULVIS CORDIALIS *Cellensis.*

℞. Sacchari finissimi, in tenerrimum pulverem redacti, Uncias
 duas,

Cinnabaris præparatæ Drachmas sex,
 Olei destillati Cinnamomi veri Scrupulos duos:
 Misceantur exacte.

Vires Cardiacas & Nervinas edit. Datur ad Scrupulum unum.

PULVIS CORNACHINI SEU COMITIS DE WARNICK.
 SEU CERBERUS TRICEPS.

℞. Diagrydii,
 Antimonii Diaphoretici,
 Cremoris Tartari ana partes æquales:
 Misceantur exactissime.

Pulvis qui per multam annorum seriem tanquam Purgans polychrestum in frequenti usu fuit, nostra ætate, cum parcius Resinosis utamur, minus crebro usurpatur. Dosis ad Drachmam semis.

PULVIS COSMETICUS AD MANUS *Viennensium*
PATE D'AMANDES.

℞. Amygdalarum excorticatarum Uncias duodecim;
 Spermatis Ceti Unciam semis:
 Probe tritis admisceantur
 Pulverum Oryzæ,
 Iridis Florentinæ ana Unciæ duæ,
 Benzoes,
 Salis Tartari ana Uncia semis,
 Oleorum destillatorum Ligni Rhodii,
 Lavendulæ,
 Caryophyllorum ana Guttæ quindecim:

Misceantur probe.

PULVIS DENTIFRICIUS *Brunsvicensium.*

℞. Lapidis Pūmicis Uncias duas,
 Offum Sepiæ Medullæ Unciam unam,
 Cremoris Tartari,
 Radicis Ireos Florentinæ ana Unciam semis;

Olei destillati Caryophyllorum Guttas quatuor :
Misceantur, Fiat Pulvis tenerrimus.

PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS *Noricorum.*

℞. Radicum Pæoniæ exteriori cuticula privatorum, Uncias
tres,

Visci Querni,
Rasurarum Eboris,
Ungularum Alcis,
Cornu Cervi,

Eboris usti,
Coralliorum alborum,
rubrorum,

Margaritarum ana Drachmas sex :

Misceantur; Fiat Pulvis, cui addantur

Foliorum Auri, in exiguas moleculas dissectorum, numero
viginti.

Vulgatissimo in usu est hic Pulvis in omnibus morbis Spasmodicis tam arcendis quam curandis.

Plures congerere Pulveres Epilepticos hac ætate, qua Specificorum Antepilepticorum auctoritas tantopere cecidit, supervacaneum duxi.

PULVIS ERYSIPELATODES *MYNSICHTI.*

℞. Farinæ volatilis e molendinis Uncias sex,

Plumbi usti,
Boli rubræ ana Uncias duas,
Mastyches electæ,
Olibani,

Cerussæ ana Unciam unam :

Misceantur, Fiat Pulvis subtilissimus.

Inspergitur parti affectæ & charta cœrulea retinetur.

PULVIS FUMALIS *Brunsvicensium.*

℞. Mastyches,

Olibani ana Uncias quatuordecim,
 Succini citrini Uncias octo,
 Ladani Uncias tres semis,
 Sandaracæ,
 Styracis Calamitæ,
 Benzoës ana Uncias septem,
 Lignorum Santali citrini,
 Rhodii,
 Cassiæ Caryophyllatæ ana Uncias duas semis,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Lavendulæ ana Uncias quatuor,
 Corticis Cascarillæ Uncias duas:
 Misceantur: Fiat Pulvis crassus.

Ejus suffitus tam odoris gratia, quam ad discutiendos Rheumatismos & Catarrhos adhibetur.

PULVIS GASCONII.

Videatur Pulvis Bezoardicus Anglicus.

PULVIS DE GUTTETA.

℞. Visci Querni,
 Radicum Dictamni albi,
 Pæoniæ,
 Seminum Pæoniæ ana Unciam unam,
 Atriplicis,
 Coralliorum rubrorum præparatorum ana Unciam semis,
 Ungularum Alcis Unciam unam:
 Misceantur; Fiat Pulvis subtilis.

Hic Pulvis eandem, quam Epilepticus Marchionis in Germania habuit, in Gallia nactus est famam.

PULVIS HALY CONTRA PHTHISIN.

℞. Seminum Papaveris albi Drachmas decem,
 Portulacæ,
 Cicerum,

Malva

Malvæ ana Unciam semis,
 Cucurbitæ,
 Cucumeris,
 Citrulli,
 Cydoniorum ana Drachmas septem,

Amyli Drachmas sex semis,
 Gummi Arabici,
 Tragacanthæ,
 Cornu cervi usti,
 Succi Liquiritiæ,
 Eboris usti ana Drachmas tres:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Inconcinnam hanc, ac mentione vix dignam compositionem eo tantum apposui, quod a nonnullis adhuc usurpatur. Certe scopo accomodatius Semina sub forma Emulsionis, reliqua Pulveris nomine adhibentur.

PULVIS HEPATICUS RUBER *Dresdensis.*

℞. Cremoris Tartari Uncias quatuor,
 Sandali rubri,
 Rosarum rubrarum ana Unciam semis:

Misceantur: Fiat Pulvis irrorandus
 Spiritus Vitrioli Drachmis duabus.

Olim ejus usus in æstu Sanguinis compescendo & Appetitu excitando admodum frequens fuit.

PULVIS INCRASSANS *FULLER.*

℞. Radicis Althææ,
 Gummi Arabici,
 Sanguinis Draconis,
 Glycyrrhizæ ana partes æquales:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Contra Hæmoptysin, Tussim acrem & Ardorem Urinæ exhibetur ad Drachmam semis.

PULVIS PRO INFANTIBUS *ROSÉEN.*

- ℞. Magnesiæ Unciam femis,
 Pulverum Seminis Cumini Drachmas tres,
 Radicis Ireos Drachmas duas,
 Croci Drachmam femis:

Misceantur.

Contra Infantum Tormina datur.

PULVIS INFANTUM *Danorum.*

Videatur Pulvis Puerorum Citrinus.

PULVIS MANUALIS *Brunsvicensium.*

- ℞. Amygdalarum amararum excorticatarum Uncias duodecim,
 Farinæ Oryzæ Uncias septem cum dimidia,
 Fabarum Uncias sex,
 Radicis Ireos Florentinæ,
 Cretæ albæ ana Unciam femis,
 Salis Tartari Drachmas duas,
 Olei Jasmini Drachmam unam,
 Ligni Rhodii Guttas decem:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Ad usus Cosméticos adhibetur.

PULVIS MASTICATORIUS *WEPFFER.*

- ℞. Radicum Imperatoriæ,
 Corticum Sambuci ana Unciam femis,
 Foliorum Lauri Drachmam unam femis,
 Seminum Sinapi,
 Staphidis agriæ ana Drachmam unam,
 Caryophyllorum Aromaticorum Scrupulos quatuor,
 Myrrhæ electæ Drachmas sex:

Misceantur: Fiat Pulvis crassus.

Scrupulus unus linteo obvolutus per aliquot horæ minuta masticatur in Capitis morbis serosis, Paralyfi linguæ, Aphonia &c.

PULVIS PANNONICUS RUBER *Augustanorum.*

- ℞. Boli Armenæ Uncias tres,
 Terræ.Lemniæ Uncias duas,
 Coralliorum alborum Drachmas sex,
 rubrorum Unciam semis,
 Margaritarum Drachmas quinque,
 Lapidum Hyacinthi,
 Smaragdi,
 Rubini,
 Sapphiri,
 Cornu Cervi sine igne præparati ana Unciam semis,
 Rafuræ Eboris Drachmas tres,
 Eboris ad albedinem calcinati Drachmas quinque,
 Cinnamomi Drachmas duas,
 Caryophyllorum,
 Croci ana Drachmam unam,
 Seminis Acetofæ,
 Sandali rubri ana Drachmas duas,
 albi,

Corticum Citri ana Drachmam unam semis:

Misceantur: Fiat Pulvis tenerrimus, cui admisceantur
 Foliorum Auri, in exiguas moleculas cultro difsecandorum,
 Numero viginti quatuor.

Ineptum hoc Medicamentum, creberrime olim apud Germanos in morbis Exanthematicis usurpatum, haud immerito exolevit.

PULVIS AD PALPITATIONEM CORDIS.

Videatur Pulvis Cordialis Cellensis.

PULVIS PECTORALIS *Danorum.*

- ℞. Radicum Ireos Florentinæ,
 Liquiritiæ ana Drachmas sex,
 Florum Sulphuris Unciam semis,

Florum Benzoes Drachmam unam ,
 Sacchari Candi albi Uncias duas,
 Oleorum destillatorum Anifi,

Fœniculi ana Guttas decem:

Misceantur : Fiat Pulvis.

Resolvendi ergo in morbis Pectoris pituitosis adhibetur.

PULVIS PUERORUM CITRINUS *Danorum*
 INFANTUM *Eorundem.*

℞. Magnesiæ albæ Drachmas sex,
 Radicis Ireos Florentinæ,
 Seminis Anifi,
 Sacchari albi ana Drachmas duas,
 Croci Drachmam unam:

Misceantur : Fiat Pulvis.

Ad Tormina infantum sedanda præscribitur.

PULVIS PUERORUM EVACUANS *Berolinensium.*

℞. Resinæ Jalappæ Drachmas tres:
 Terantur in pulverem tenerrimum cum
 Amygdalarum sesqui Drachma:
 Addantur

Mercurii dulcis Uncia una,
 Cinnabaris optimæ Drachma una,
 Sacchari albillimi Uncia una semis :

Misceantur : Fiat Pulvis.

Drachma una sex circiter Grana Resinæ & viginti Grana Mercurii dulcis vehit. Scopo Anthelmintico & Sanguinem depurandi ergo exhibetur.

PULVIS CONTRA QUARTANAM *Hoffmanni.*

℞. Pulveris Corticis Peruviani Drachmas tres,
 Reguli Antimonii medicinalis Drachmas duas,
 Mercurii dulcis,
 Croci Martis aperitivi *STÄHLII.*

Arcani duplicati ana Drachmam unam,

Olei destillati Menthæ Guttas tres :

Misceantur: Fiat Pulvis.

Egregii usus esse in Quartana, quæ altis in Viscerum penetrabilibus egit radices, testatur Auctor in Med. Rat. system. Datur ad Drachmam semis.

PULVIS REFRIGERANS *Suecorum.*

℞. Salis essentialis Tartari Unciam semis,

Sacchari albissimi Uncias sex,

Quintæ Essentiæ Citri Guttas sex:

Mixta redigantur in Pulverem.

Hujus Pulveris una Uncia duodecim libris aquæ dissolvenda LIMONADA ex tempore paratur.

PULVIS RESOLVENS *STAHLII.*

℞. Concharum præparatarum,

Antimonii Diaphoretici,

Nitri depurati ana partes æquales :

Misceantur: Fiat Pulvis.

Spiffitudini humorum adversatur. Maximus ejus usus est in Febris

PULVIS SCILLÆ COMPOSITUS *STAHLII.*

℞. Pulverum Radicis Scillæ præparatæ Uncias duodecim,

Vincetoxici Uncias quatuor:

Misceantur.

Egregium Medicamentum Resolvens in morbis præcipue Asthmaticis ad Scrupulum unum pro Dosi exhibetur.

PULVIS SEDATIVUS *Suecorum.*

Videatur Pulvis Antispasmodicus *ROSENSTEINII.*

PULVIS STERNUTATORIUS *Noricorum.*

℞. Herbæ Pulegii,

Herbarum Majoranæ,
 Rorismarini,
 Salviæ ana Unciam unam femis,
 Nicotianæ,
 Radicis Ellebori albi,
 Seminis Nigellæ ana Unciam unam,
 Moschi Grana quinque:
 Misceantur; redigantur in Pulverem.
Virtus ex nomine cognoscitur.

PULVIS STERNUTATORIUS *Parisiensium.*

℞. Herbarum Majoranæ,
 Betonicæ ana Unciam unam,
 Afari Unciam dimidiam,
 Florum Lili Convallium Unciam unam:
 Misceantur: Fiat Pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS *TRILLERI.*

℞. Herbarum Majoranæ,
 Betonicæ,
 Pulegii,
 Basilici,
 Mari veri ana Drachmas duas,
 Afari Drachmam unam,
 Florum Lili Convallium,
 Tunicæ,
 Lavendulæ,
 Anthos,
 Rosarum rubrarum ana Drachmam unam,
 Castorei optimi Drachmas tres,
 Sacchari Canariensis Unciam unam:
 Misceantur: Fiat Pulvis subtilissimus.

Venerandus Auctor quadraginta annorum experientia nixus hunc pulverem ad Caput roborandum, Sensus acuendos, Memoriam firmandam, Vertiginem profligandam, Dolores capitis mitigandos & sedandos insultus Hystericos maximopere commendat.

PULVIS STOMACHICUS *BIRCKMANNI.*

℞. Radicum Ari Uncias duas,
 Calami aromatici,
 Pimpinellæ ana Unciam unam,
 Oculorum Cancrorum Unciam semis,
 Cinnamomi Drachmas tres,
 Salis Tartari Drachmas duas:

Misceantur: Fiat Pulvis.

Cum Saccharo si desideratur, Saccharum ad pondus omnium adjicitur.

Egregium Medicamentum Incidens, non solum in turbata Digestione, sed in aliis quoque morbis Viscido oriundis cum successu datur.

PULVIS AD STRUMAS *VILLANOVANI.*

℞. Spongiarum marinarum combustarum,
 Pilarum marinarum,
 Ollis Sepiæ,
 Piperis longi,
 nigri,
 Zinziberis,
 Cinnamomi,
 Salis Gemmæ,
 Radicum Pyrethri,
 Fructuum Cupressi,
 Gallarum,
 Spongiarum Rosarum ana Uncias duas:

Misceantur; Fiat Pulvis, cui, Sacchari si quid desideratur, Unciæ sex adjiciantur.

Experientia docuit, hunc pulverem Struma laborantibus efficaciter exhiberi. Datur ejus Drachma una mane & ante somnum nocturnum.

PULVIS TEMPERANS *RICHARD.*

Videatur Pulvis Antispasmodicus *STAHLII.*

PULVIS TEMPERANS UNZERI.

- ℞. Tartari Vitriolati,
 Nitri depurati,
 Lapidum Cancrorum præparatorum ana partes æquales.
 Reducantur in Pulverem & misceantur.
Contra Orgasnum Sanguinis & Acrimoniam acidam facit.

PULVIS AD TORMINA INFANTUM ROSÉEN.

- ℞. Saponis officinalis Drachmam unam,
 Lapidum Cancrorum Unciam femis,
 Rhabarbari Drachmam femis,
 Seminum Anifi,
 Cumini ana Scrupulum unum,
 Croci Grana quatuor,
 Sacchari albi Drachmas tres:
 Misceantur; Fiat Pulvis.

PULVIS CONTRA VERMES FULLER.

- ℞. Corallinæ in pulverem redactæ Unciam dimidiam,
 Æthiopsis mineralis Drachmas duas,
 Olei destillati Absynthii Scrupulum dimidium:
 Misceantur.

Ex immensa farragine Pulverum contra Vermes in Dispensatoriis diversantium hunc tanquam efficaciorum selegimus, & ut tutius infantibus adhiberi possit, Olei omissionem suademus; mane & vespera per aliquot dies, quantum cultri cuspidem capi potest, infantibus propinetur.

PULVIS CONTRA VERMES PURGANS FULLER.

- ℞. Scammonei, Pineis triti, Grana sex,
 Pulveris Rhabarbari Grana quatuor,
 Mercurii dulcis Grana quinque:
 Misceantur.

Hæc dosis est pro puero sexenni.

REGLISSE ROYALE.

Videatur Extractum Liquiritiæ gummosum.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS *BASIL. VALENT.*

℞. Clavorum Ferri Uncias duodecim :

In Crucibulo probe ignitis addantur

Antimonii crudi Unciæ sedecim :

Valido igne fundantur, ut penitus fluant ; dein adjiciantur

Cinerum clavellatorum Unciæ duæ :

Effundantur in Conum fusorium Sebo illitum, & posteaquam refrixerint, mallei ictu Regulus a scoria separetur.

Quamvis Sulphur Ferrum in scoriam vertat, hujus tamen quantulacunque portio metallo Antimonii nunquam non manet immixta. Quapropter hic Regulus, cum semper Ferro plus minusve sit adulteratus, ad labores, qui purum Regulum requirunt, recipi nequit.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS *MÆTS.*

℞. Antimonii Uncias decem,

Salis Alkali Uncias duas :

Mixta fundantur, fusa effundantur, & scoria hac ratione orta contundatur in pulverem.

Scopo Resolvendi laudatur in Febribus acutis, Arthritide, Hydropse. Exhibetur ad Drachmam semis.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX *BASIL. VALENT.*

℞. Antimonii Uncias sedecim,

Tartari crudi Uncias decem,

Nitri Uncias quinque :

Mixta successive detonentur ; fundantur ; effundantur in conum fusorium ; mallei ictu Regulus a scoria separetur, quæ tanquam *HEPAR ANTIMONII* asservari potest.

Regulus Antimonii, cum eximie drasticus sit, nunquam intus datur, paratur in officinis ad alia præparata inde conficienda.

RESINA JALAPPÆ *Augustanorum.*

R. Radicum Jalappæ crasse contusarum, quantum lubet :
Affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus ad eminentiam quatuor digitorum; digerantur calore justo per biduum; Spiritus tinctus defundatur; affundatur novus, qui denuo digestus & tinctus priori adjiciatur; quo labore ter iterato ultima tinctura una cum Radicibus sacco commissa exprimatur torculari. Univerſa deinde tinctura immittatur Cucurbitæ, Spiritusque dodrans deſtillationis ope in eam eliciatur; reſiduum catino committatur; jam, ut ſecedat Reſina, aqua affundatur, factaque ſecefione defundatur, nova rurfus Reſinæ affuſa, accedat calor, fiat utriuſque agitatio; atque hic alternus tinctam defundendi & puram aquam affundendi continuetur labor, donec aqua cum Reſina agitata turbari deſinat. Tunc demum Reſina dum calet, in bacillos tortos efformetur.

Hoc Medicamentum cum Primas vias irritando vires Catharticas edat, per longum temporis intervallum tanquam Purgans polychreſtum uſurpabatur. Noxæ, quas ejus uſui tribuerunt Obſervatores, abuſui potius ſunt adſcribendæ. Non niſi Saponi cuidam junctum exhiberi debet; ita demum ab Humoribus Primarum viarum excipi, & e corpore eliminari poterit. Doſis pro adultis ad grana uſque quindecim augeri poteſt. Infantibus ad octavum uſque annum tot Reſinæ dantur grana, quot annorum eſt ætas.

RESINA JALAPPÆ PRÆPARATA *STAHLII.*

R. Reſinæ Jalappæ,
Amygdalarum dulcium ana partes æquales :
Mixta terantur in pulverem tenerriſimum.

Hac ratione præparata Reſina citra torminum aut Hypercathariſis metum exhiberi poterit.

Ea ratione, qua ex Radicibus Jalappæ paratur Reſina, ex aliis quoque ſubſtantiis obtinetur, ut *RESINA SCAMMONEI, LIGNI GUAJACI &c.*

ROOB ARABUM, GELATUM, SIVE GELATINA

Recentiorum.

Manibus exprimatur ex Fructibus linteo involutis Succus; turbidus si fuerit sive per subsidentiam depuretur, sive Albumine ovorum clarificetur, quo facto dissolvatur in succo

Sacchari albissimi dodrans:

Coquatur ad consistentiam tenuioris Gelatinæ; immittatur ollæ, exhalato demum omni calore, obturandæ.

Ex fructibus Cynosbati, unde semina fuerunt ablata, Pulpa per cribrum exprimitur.

Ob vim saponaceam omnino, ut plurimum etiam voluptatis causa commendatur.

ROOB NUCUM MESUE, DIACARYON.

Paratur ex Succo putaminum Nucum immaturarum cum æquis Mellis partibus ad justam consistentiam cocto.

Hoc extus unice adhibetur ad Ulcera Oris, Gargarismatibus quoque admiscetur.

ROTULÆ VEL TABULÆ.

Canones.

- I. Tabularum, quæ ex Succis desiderantur, parandarum modus optimus is esse videtur, cum succi quantitas, Saccharo calefacto, adjicitur ea, quæ ad obtinendam consistentiam tenuioris Electuarii requiritur. Drachmæ decem Succii sufficiunt ut plurimum ad octo Sacchari Uncias. Miscela dein spatulæ ope super laminam ferream per exiguas portiones ita effunditur, ut Rotularum formam Guttæ induant.
- II. Ex Pulveribus parantur Rotulæ, dum Saccharo ad consistentiam tabulandi cocto Pulvis celeri manu admiscetur; ad unam Sacchari Unciam Drachma Pulveris una recipi potest.
- III. Volatilia, Rotulis si immiscenda sunt, ipso demum materiei in Rotulas efformandæ momento immisceantur.
- IV. Mos Rotulas Oleo inungendi, vel Auri Argentive folia ipsis imprimendi, exfolevit.

ROTULÆ MANUS CHRISTI *Bergamensium.*

℞. Sacchari albissimi quantum vis:

Calefacto addatur

Aquæ Rosarum quantum fatis:

Fiant lege artis Rotulæ.

Quæ infantibus dulcedinis causa exhibentur.

ROTULÆ EX SUCCO ET ELÆOSACCHARO CITRI
Argentoratensium.

℞. Sacchari albissimi Uncias sedecim :

Calefactis adjiciantur.

Succi Citri Unciæ duæ cum semisse:

Probe mixtis addantur

Elæosacchari Citri Unciæ quatuor :

Fiant lege artis Rotulæ.

Gratum fallendæ sitis remedium.

ROTULÆ CONTRA VERMES *LENTILII.*

℞. Sacchari, cum succo Berberum ad consistentiam redacti, Un-
ciis quatuor

Adjiciantur

Mercurii dulcis Drachmæ duæ:

Probe mixta effundantur in Rotulas.

*Ex copiosis Præscriptionibus hanc tam suavitate quam virtute
reliquas superantem selegi.*

SACCHARUM GLYCYRRHIZATUM *Helvetorum.*

Videatur Extractum Liquiritiæ Gummosum.

SACCHARUM CANDUM.

Diffolvatur Saccharum in aqua; evaporetur ad consistentiam Syrupi, & asserventur, quæ inde oriuntur, Crystalli. Saccharum quo fuerit depuratus, eo candidius evadet Saccharum Candum. *RUBRUM* surgit ex Saccharo Thomæo.

A conditoribus parari dudum consuevit.

SACCHARUM HORDEATUM.

R. Hordei Uncias octo:

Coquantur cum

Aquæ fontanæ Unciis centum per horæ spatium,

Decocto, colato addantur

Sacchari Unciæ sedecim:

Coquantur donec a spatula defluens filum sponte rumpatur, effundatur dein in tabulam marmoream Oleo Amygdalarum leviter unctam; massa adhuc calens scindatur, & torqueatur in bacillos.

Hordeum, cum pelluciditati officiat, vulgo omitti solet.

SACCHARUM LACTIS *BARTOLETI.*

Lactis Vaccini plures libræ

Relinquantur in loco calido; donec in suas partes fecerit Lac. Serum tam a Cremore, quam a Caseo separetur; filtratum coquatur in vase terreo ad decimam circiter partem residuam; denuo filtratum reponatur ad crystallifandum; Crystalli ab ortu flavæ iteratis in aqua dissolutionibus, filtrationibus, crystallifationibus reddantur albissimæ.

Hodie rarius in Pharmacopoliis, frequentius in montibus, a rusticis operas lactarias exercentibus paratur; inde ipsas officinas intrat.

Demulcendi & Relaxandi vim habet.

SACCHARUM PENIDIUM DE *AUGUSTIS.*

Saccharum coquatur cum Aqua ad consistentiam tabulandi; semirefrigeratum suspendatur ex unco & trahatur perpetuo, quoad albissimum omnisque pelluciditatis expertus evaserit; tunc torqueatur in bacillos.

Hoc quoque vulgo a Conditoribus paratur.

SACCHARUM ROSATUM *MESUE.*

Est Conserva Rosarum rubrarum, quodsi ficcum deside-

ratur, recipi solet CONSERVA ROSARUM SOLIDA LEMERY, quæ quidem paratur Unciis sedecim Sacchari ad consistentiam tabulandi coquendis Pulveris Florum Rosarum rubrarum. Uncia una adjicienda; ex qua miltura Rotulæ efformantur.

SACCHARUM SATURNI HOLLANDI.

SAL SATURNI Suecorum.

Cerussa vel Minium infundatur cum Aceto destillato per aliquot dies in vase clauso; Acetum filtratum leni calore ad cuticulam evaporetur; id in locum temperatum repositum in Crystallos concrefcet.

Quamvis a quibusdam ad usus internos commendetur, prudentiores tamen a medicamento maxime ancipiti abstinent. In Aqua solutum vires Aceti Saturni habet, & ad usus externos potest adhiberi.

Rarissime a Pharmacopolis paratur.

SAL ACETI ESSENTIALE BATEI.

Residuum Aceti destillati aqua solutum & filtratum evaporatur ad cuticulam, & ut in Crystallos concrefcet, reponitur.

Cum hac ratione nil nisi Tartarus oriatur, hæc præparatio prorsus est superflua, una cum illa quæ præparari jubetur.

SAL ACETI FIXUM BATEI.

Quod est ipse Sal Tartari.

SAL ACETI VOLATILE BEAUMÉ.

Exiguæ cryftalli Tartari Vitriolati committantur vasi vitreo, irrorentur Aceto concentrato, & vitrum epistomio vitreo exactissime claudatur.

Excitandi ergo naribus Syncopticorum admovetur.

SAL ACETOSELLÆ ANGELI SALÆ.

Exprimatur fuccus ex largiori copia Herbæ Acetosellæ; clarificetur Albumine Ovi; evaporetur ad quartam partem resi-

duam; reponatur in loco frigido; colligantur cryftalli; liquor refiduus denuo paulum evaporetur, & fic iteretur operatio, ufque dum reliquus fuccus nullas ulterius cryftallos fiftat; Cryftalli omnes iteratis in aqua folutionibus & filtrationibus reddantur albiffimæ.

A quibusdam in vitiis Digestionis aliis medicamentis Stomachicis admifceri folet. Vires ejus medicatæ cum viribus Cryftallorum Tartari convenire videntur.

SAL ALCALI MINERALIS

SAL ALCALI SEIGNETTE.

℞. Sodæ Hispanicæ quantum lubet:

Elixivetur cum aquæ ebullientis quanto fufficiente:

Lixivium fecundum artem reducatur in Cryftallos.

Eafdem vires medicatas edit ac Sal Alkali Vegetabilis.

SAL CAUSTICUS.

Videatur Lapis Causticus.

SAL CORNU CERVI SCHRÆDER.

Cornu Cervi in minores partes diffractum aut lima comminutum immittatur Retortæ terreæ & adhibeatur ignis apertus; ita obtinentur Spiritus & Oleum; lateribus autem excipuli accrefcit Sal, qui oleo miftus, diffolvatur in aqua, filtretur & aqua inde leni calore evaporetur.

Humores attenuat, Sudorem & Urinam movet, Sanguinem concitat; in ufum tamen, nifi fit albiffimus, minus faufto omine trahitur. Datur ad Scrupulum femis.

Hunc in modum omnia Salia Volatilia ex partibus Animalium parantur.

SAL DIGESTIVUS VEL FEBRIFUGUS SYLVII.

SPIRITUS SALIS MARINI COAGULATUS Londinenfium.

Eft Sal, qui remanet a deftillatione Spiritus Salis Ammonia-

ci cum Sale Tartari, dissolutione in aqua facta & iusta evaporatione coactus in crystallos.

SAL DE DUOBUS.

Videatur Arcanum Duplicatum.

SAL PER INCINERATIONEM PARATUS TACHENII.

Vegetabili sicco applicatur ignis; dum ardet, probe cavetur, ne flamma furgat, suffocanda, si surrexerit, vel adimoto operculo, vel ipsius vegetabilis additamento; cineres hac ratione nati per cribrum transmittuntur; remanentes carbones denuo igniuntur, & inde orti cineres prioribus adjiciuntur. Jam vero frigida ipsis affunditur, cum cineribus crebro per vices agitata; defunditur dein Lixivium; cineres cum nova aqua agitantur, idque continuatur, donec recens affusa aqua nullum amplius inde saporem contrahit; omne hac ratione obtentum Lixivium in vase vitreo leni igne ad siccitatem evaporatur; Sal ita paratus calcinatur, usque dum albus evadat, in vase probe clauso asservandus.

Cum Medicorum nonnulli inepte sane Sulphur super cineribus deflagrari jusserint, Salem inde Alcalinum in Tartari Vitriolati speciem mutarint, eoque in morem venerit, ut Salaria Alcalia sub crystallorum forma in officinis asservarentur, vulgo jam his salibus *ARCANUM DUPLICATUM* solent substituere. Quapropter Medicis Salem Alcalinum præscripturis ut Salem Tartari jubeant recipere, suadendum videtur.

Ridendi sunt, quotquot de Sale ex planta combusta obtento integras plantæ vires específicas expectant.

SAL MARTIS.

Videatur Vitriolum Martis.

SAL MERCURIALIS ACETOSUS VITÆ.

☿. Mercurii per Alkali fixum ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati Uncias duas,
Aceti

Aceti destillati Uncias centum octo & viginti:

Digerantur per triduum in Balneo Mariæ; agitentur crebro; tunc reponantur in locum frigidum & surgentes inde cryſtalli aſſerventur.

Hic Sal in Trochiſcos redactus vices PASTILLORUM SIPHYLITICORUM KEYSER commode exſecuturus eſſe videtur.

SAL MERCURIALIS TARTARISATUS *VITET.*

℞. Mercurii Alkali fixo ex Acido Nitri præcipitati & probe edulcorati Uncias duas,

Cremeris Tartari Uncias quatuor:

Triturentur per quatuor horas in mortario lapideo, dein coquantur cum

Aquæ fontanæ Unciis octo & quadraginta:

Evaporentur ad lenem cuticulam & hac ratione obtentæ cryſtalli ſerventur.

Ambo hæc Salia ſcopo Antiſiphylitico ad decem. uſque Grana pro doſi ſive aqua ſoluta, ſive Syrupo quodam recepta exhibentur: Vomitum, interdum Ptyaliſmum excitaffe obſervatum eſt.

SAL MIRABILIS *GLAUBERI.* SODA VITRIOLATA *Rofforum.*

Eſt Reſiduum a deſtillatione Spiritus Salis aqua ſolutum & in cryſtallos coactum.

Ex quo conſtat, plurimas Aquas, quibus Sal communis excoquitur, Salem velliſſi ſaltem analogum largiri, quidquid ejus in officinis proſtat indidem excitur. A plerisque Salinis perinde ac ab Aqua marina Sal mirabilis Magnesia prægnans obtineri poteſt. Salinæ Lotharingicæ puriſſimum ſuppeditant.

Ad aliquot Drachmas datus egregie incidit; ad Unciam unam aut duas datus Alvum movet, ſed tanta doſi ubi exhibetur, larga aquæ copia diluendus eſt.

SAL POLYCHRESTUS *GLASERI*.

℞. Nitri depurati,

Florum Sulphuris ana partes æquales:

Probe mixta ingerantur per vices in crucibulum candens; nova portio, nisi priore detonata, non ingeratur; omnis massa postquam penitus detonaverit, valido igne delineatur, & crebrius ne Sulphur remaneat non destructum agitetur, dissolvatur deinde, filtretur & in Crystallos reducatur.

Sal hic minus apte a LEMERY denominatus, ratione virium medicatarum Tartaro Vitriolato est simillimus.

SAL POLYCHRESTUS *SEIGNETTE*.SODA TARTARISATA VEL ALCALI MINERALE TARTARISATUM *Suecorum*.

CrySTALLIS Tartari in aqua dissolutis & bullientibus affundatur Lixivium Sodæ aqua frigida factum, usque dum nulla ab affuso furgat amplius effervescentia; Liquor saturatus & filtratus cogatur in crystallos.

Sali Vegetabili analogus Sal, gustui vero gratior, scopo Alvim ducendi ad sesqui unciam usque exhibetur.

SAL SEDATIVUS *HOMBERGII*.SAL ACIDUM BORACIS *Suecorum*.

Boraci in larga aquæ quantitate dissoluto adjiciatur Spiritus Vitrioli, donec Liquor Syrupum Violarum rubro colore infece-rit; evaporet, usque dum spicula salina in eodem natate observentur; reponatur tunc in locum frigidum, & colligantur crystallos; evaporatione repetita adhuc aliquid Salis Sedativi, tandem Sal mirabilis *GLAUBERI* obtinetur.

Sali, à BECCHERO primum annotato, ab HOMBERGIO ad usus medicatos applicato, communi Medicorum consensu vires Anodynæ tribuuntur; quas tamen ego ab istis, quippe erronea veterum Chymicorum theoria deceptis, affictas potius huic sali, quam ab ipsa experientia assertas crediderim.

SAL SEDATIVUS MERCURIALIS DE MORVEAU.

Solutioni Mercurii vivi in Acido Nitri dissolutæ, multa aqua dilutæ & filtratæ adjicitur Solutio Boracis, donec nihil ulterius inde præcipitetur; pulvis flavus, qui ad fundum secesserit, probe edulcoretur.

Ejus Solutio in aqua, cum incommoda unguinosorum non edot; commendatur ad Frictiones; datur quoque interne ad Grana duo pro dosi, quotidie augenda. Conferatur Journal de Physique T. IX. p. 348.

SAL SUCCINI AGRICOLÆ.

Rasura Succini committitur Retortæ vitreæ, cujus non ultra dodrantem repleat; applicetur excipulum; instituatur destillatio ex Balneo Arenæ; obtinetur ita Spiritus & Oleum; parietibus autem excipuli & rostro Retortæ adhærebit Sal; Oleum aqua diluatur, filtretur, & ab Oleo separata aqua lenissimo calore destilletur, unde denuo aliquid Salis obtinebitur.

Hic Sal larga copia in Borussia paratur. Ab Oleo ipsi adhærente penitillime depuratur, dum aqua dissolvitur, filtratur, & ut in crystallos abire possit, lenta inde evaporatione aqua dispergitur.

Hunc Salem Diureticorum & Antihystericorum principem appellat BOERHAVE; Incidendo & Resolvendo agere videtur; quo magis Oleo est imprægnatus, eo efficacius solida commovet. Datur ad Scrupulum dimidium pro Dosi.

SAL TARTARI LULLII.

Sive Residuum a destillatione Tartari, sive Tartarus ipse, in fornace Figuli calcinatus, ope aquæ elixivatur, Lixivium filtratum vel cauto calore in crystallos cogitur, vel inspissatur & in vasis probe clausis asservatur.

Easdem cum Salibus per incinerationem paratis vires habet; Acrimoniam acidam corrigit; Viscidum resolvit; Obstrueta reserat, Drastica cicurat. Datur ad Scrupulum unum multa aqua dilutum.

SAL TARTARI ESSENTIALIS *RETZII.*
 ACIDUM TARTARI CRYSTALLISATUM *Rofforum.*

Creta in pulverem trita coquatur per femi horam cum largâ aquæ quantitate, agiteturque crebro spatula; continuetur ebullitio, Cremor Tartari per vices adjiciatur, donec profus cessaverit effervescentia; refrigeratus liquor decantetur caute; residuo sedimento nova aqua affundatur, agitetur, & una cum residuo priori adjiciatur. Hæ aquæ rite evaporatæ largiuntur *TARTARUM SOLUBILEM.* Sedimento eluto & vitro commisso affundatur sensim Spiritus Vitrioli, usque dum novus adjectus nullam ulterius excitet effervescentiam; detineatur mixtura in calore, agitetur sæpius per diem; decantetur liquor, residuumedulcoretur; priori liquori adjiciatur aqua; omnis humor leni calore evaporetur ad justum terminum, & crystalli inde oriundæ asserventur.

Acidum Tartari hac ratione multis partibus oleosis privatum in frigida evadit solubile, linguamque ferit aciditate vividiore, quapropter ad usus medicatos præ Cremore commendandum videtur.

SAL VOLATILE ANGLICUM SICCCUM *Württembergensium.*

℞. Salis Tartari Drachmas sex,
 Ammoniacy Drachmas duas:

Conterantur & cito includantur vitro epistomio exactissime obturando.

Olei cujuscunque odorati fragrantis admiscere aliquot Guttas cui libuerit, licebit.

In animæ Deliquiis excitandi ergo Naribus admovetur.

SAL VOLATILE OLEOSUM *Brandeburgensium.*

℞. Oleorum destillatorum Anisi,
 Caryophyllorum,
 Cinnamomi ana Drachmam semis,
 Macis Scrupulum unum,
 Zedoariæ,
 Succini ana Scrupulum semis:

Mixta digerantur in Cucurbita per triduum cum
 Salis Tartari Unciis sex,
 Spiritus Vini Unciis octodecim:

Addantur

Salis Ammoniaci Unciæ sex:

Destillentur inde Unciæ decem Liquoris.

Berolinenses SYLVIVM præparationem hujus medicamenti in arcanis habuisse, nec nisi cum suis hæredibus communicatam voluisse; a quodam vero hærede agonisante manu propria ex autographo exscriptam eam atque proditam esse dicunt. Dum Secta Sylviana floruit, id genus medicamenta magni fiebant; Sal suum Volatile Auctor potissimum ad ciendos Menses laudavit; scopo Carminativo & Resolvente cum Successu datur ad Guttas viginti.

SAPO CHEMICUS, TARTAREUS *STARCKEY.*

℞. Lapidis Caustici Unciam unam:

Fundatur igne lenissimo; fuso adjiciantur

Olei destillati Terebinthinæ Unciæ tres:

Agitentur probe, usque dum Sal omne Oleum receperit.

*Absurdissime quidem huic medicamento vires tribuuntur Dra-
 sticorum & Narcoticorum correctrices, unde CORRECTORIS
 etiam nomen accepit, sed cum haud spernendarum virium Re-
 solvendi & Aperiendi spem facere videatur, earum a Medicis
 prudentibus, ut rite fiat periculum, optandum est. Dosis non ultra
 aliquot Grana erit extendenda; neque, qui in locum irritantis mul-
 tum Olei Terebinthinæ aliud mitius substituerit, oleum perdidisse
 & operam censendus erit.*

SAPO MEDICATUS.

℞. Salis Caustici Unciam unam,

Butyri Cacao lenissimo calore liquati Uncias quatuor:
 probe terantur.

*Cum eximiarum virium sapo sit ad morbos præsertim ab ob-
 structione Viscerum Abdominalium Oriundos, oleum præterea,
 quod ad ipsum recipitur, plurimum non ad saporis solum gra-*

tiam, sed virium quoque efficaciam conferat, Pharmacopolis utique incumbit, ut illum pro usibus saltem internis ipsi sibi parent.

SERUM LACTIS HIPPOCRATIS.

℞. Lactis Vaccini Uncias octo & quadraginta,
Ebullientibus adjiciatur

Cremoris Tartari sesqui Drachma:

Liquor coli ope depuratus clarificetur secundum artem, unius ovi albumine, clarificatum filtretur.

Polychrestum remedium Abstergens, Demulcens, Attenuans datur per cyathos.

Serum Lactis, in quo Ferrum candens aliquoties fuerit extinctum, CHALIBEATUM appellari & inde Roborantes vires expectari solent.

SCILLÆ PRÆPARATIO DIOSCORIDIS.

Bulbus Scillæ involvatur pasta ex farina, aqua subacta; coquatur in clibano; tunc rejecta pasta squammæ a se invicem separentur & exsiccentur.

SIEF ALBUM RHASES.

℞. Gummi Tragacanthæ Drachmam unam,
Sarcocollæ Drachmas tres,
Cerussæ Drachmas decem,
Opii Drachmam semis:

Misceantur & terantur in Pulverem tenerrimum.

Sief Arabibus Collyrium denotat. Hoc medicamentum lacte aut aqua dilutum in Ophthalmia a Lippitudine acri oriunda Oculo instillari vulgo solet; sed cum veteres æque ac recentiores Medici Opii usum in Ophthalmia perniciosum esse viderint, illud prudenti consilio omittitur.

SOLUTIO MERCURII PLENCK.

℞. Mercurii dulcis Uncias duas,
Aquæ fontanæ Uncias triginta sex;

Coquantur in vase vitreo per horas quadraginta octo :
Filtretur Liquor :

Laudatur ad Ulcera Venerea purificanda.

SOTIRELLA PARVA *MINDERERI.*

℞. Olei expressi Nucis Moschatæ Drachmas duas,
Opii Thebaici,
Specierum Diambæ ana Drachmam unam,
Camphoræ, Pineis tritæ,
Extracti Croci ana Grana duodecim,
Olei destillati Caryophyllorum Guttas triginta:
Misceantur probe.

Forma pilulæ immittitur denti carioso.

SPARADRAPUM ALBUM SEU TELA *GUALTERII.*

℞. Emplastrorum Diapalmæ,
Diachyli ana Uncias octo,
Albi cocti Uncias quatuor: .

Liquatis immisceantur

Pulveris Iridis Florentinæ Drachmæ sex, & immittantur
linteo detrito ut totum massa Emplastica imbuatur.

*Ad Excoriationes, Lactis coagulati dissipationem, nec non
ad Fonticulos adhibetur.*

SPARADRAPUM AD CORPUS CONDITUM INVOL-
VENDUM *Parisiensium.*

℞. Cerae albæ Uncias centum viginti & octo:

Liquatis & semirefrigeratis immisceantur

Oleorum Nucis Moschatæ expressi Unciæ octo,

Citri,

Neroli,

Lavendulæ,

Thymi ana Unciæ quatuor,

Ambrae gryseæ, Saccharo tritæ, Grana quindecim,

Moschi Grana octo,

Zibethi Grana quatuor:
Immittatur linteum, ut fiat Sparadrapum.

SPARADRAPUM GOULARD.

℞. Ceræ Citrinæ Uncias nonaginta sex;
Olei Olivarum Uncias viginti octo:]
Leni calore liquatis adjiciantur sub perpetua agitatione
Extracti Saturni Unciæ quatuor:

Tandem addatur

Camphoræ paulo Olei solutæ Drachma una:
Fluidæ adhuc massæ immittantur lintea usu detrita.

Multum laudatur a GOULARD ad discutiendos dolores Arthriticos.

SPECIES.

Hoc nomine medio ævo comprehendebant varii generis Pulveres compositos. Hodie Ingredientia Decoctorum & Infusorum ita appellari solent.

SPECIES AROMATICÆ ROSATÆ GABRIELIS.

℞. Florum Rosarum rubrarum Unciam unam,
Radicum Liquiritiæ Unciam semis,
Galangæ Drachmam semis,
Lignorum Aloes,
Santali citrini ana fessqui Drachmam,
Cinnamomi acuti Drachmas duas semis,
Caryophyllorum,
Macis,
Gummi Arabici,
Tragacanthæ ana Scrupulos quatuor,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi minoris ana Drachmam semis,
Spicæ Indicæ Scrupulum semis:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

Agravioribus morbis convalescentibus Pani tosto, Vino emollito, insper-

*inspersæ laudantur quidem ; sed inconcinnum medicamentum evi-
luit.*

SPECIES PRO CATAPLASMATE EMOLLIENTE

Danorum.

- ℞. Herbarum Malvæ,
 Althææ ana Uncias sex,
 Meliloti,
 Florum Sambuci Uncias octo,
 Radicum Althææ Uncias decem,
 Seminum Fœnugræci,
 Lini ana Uncias quatuor & viginti:
 Misceantur, incidantur & contundantur in pulverem crassum.
Vires ex nomine patent.

SPECIES CEPHALICÆ PRO CUCUPHIS *Argentoratens.*

- ℞. Radicis Ireos Florentinæ Uncias tres,
 Herbarum Lavendulæ,
 Majoranæ ana Unciam unam,
 Lignorum Rhodii,
 Santali citrini ana Drachmas sex,
 Corticum Cinnamomi Drachmas duas,
 Aurantiorum Unciam semis,
 Citri Unciam unam semis,
 Caryophyllorum Drachmas duas semis,
 Benzoes,
 Mastichis,
 Storacis Calamitæ,
 Succini Citrini ana Unciam semis:
 Mixta contundantur crasse, usufque tempore cujuscunque Olei
 odorati guttis aliquot irrorentur.
Ad Roborandum Encephalum adhibentur.

SPECIES PRO DECOCTO ANTINEPHRITICO *FORESTI.*

- ℞. Radicum Petroselinii,

PARS II.

P p

Radicum Fœniculi ana Uncias duas,
 Liquiritiæ,
 Ireos Florentinæ ana Unciam unam femis,
 Florum Malvæ,
 Althææ ana Drachmas sex,
 Seminum Fœniculi,
 Saxifragæ ana Drachmas sex,
 Cicerum Uncias sex,
 Jujubarum,
 Caricarum ana Numero triginta,
 Hordei mundati Uncias tres:

Incisa & contusa misceantur :

Contra Nephritidem & Ardorem Urinæ commendantur.

SPECIES PRO DECOCTO CARMINATIVO *Augustanorum.*

℞. Radicum Liquiritiæ,
 Florum Chamomillæ ana Drachmas sex,
 Passularum minorum Uncias sex,
 Seminum Anisi,
 Dauci,
 Cumini,
 Carvi,
 Fœniculi ana Uncias duas,

Incisa & contusa misceantur:

Unciæ duæ decoquantur cum Aquæ Unciis quindecim.

Pro Clysmate Flatus pellente.

SPECIES PRO DECOCTO PECTORALI DE *AUGUSTIS.*

℞. Radicis Liquiritiæ,
 Herbarum Capilli Veneris ana Unciam unam,
 Hyllopi Unciam femis,
 Passularum minorum Uncias duas,
 Dactylorum Uncias quatuor,
 Caricarum Uncias duas,

Siliquarum dulcium,
 Jujubarum ana Unciam unam semis,
 Hordei mundati Uncias duas:

Incisa misceantur.

In affectibus Pectoris a strictura aut ab acri oriundis cum successu ex aqua decoctæ exhibentur.

SPECIES PRO DECOCTO PRO POTU INFANTUM
Argentoratensium.

℞. Rafurarum Cornu Cervi Uncias sedecim,
 Eboris Uncias quatuor,
 Radicum Liquiritiæ Uncias duodecim,
 Polypodii Uncias quatuor,
 Florum Tiliæ Uncias duas,
 Caricarum,
 Siliquarum dulcium ana Uncias octo,
 Seminum Anifi,
 Fœniculi ana Uncias quatuor:

Incisa, contusa misceantur.

Olim in frequenti apud nos usu erat Decoctum ex his Speciebus paratum; hodie, haud spernendo consilio, infantibus parcius exhibetur.

SPECIES PRO DECOCTO VULNERARIO.

℞. Radicum Enulæ,
 Symphyti,
 Tormentillæ,
 Vincetoxici ana Unciam semis,
 Liquiritiæ Drachmas sex,
 Herbarum Alchymillæ,
 Saniculæ,
 Plantaginis,
 Auriculæ muris,
 Agrimonix,
 Sanguisorbæ,
 Bugulæ,

Herbæ Virgæ Aureæ,
 Florum Hyperici,
 Bellidis ana Unciam femis,
 Seminis Fœniculi Drachmas sex:
 Incisa, contusa misceantur.
Laudantur Roborandi scopo in morbis Pectoris.

SPECIES DIACRETÆ *MYNSICHTI.*

℞. Cretæ albæ præparatæ Unciam unam femis,
 Nucum Moschatarum Drachmas sex,
 Liquiritiæ,
 Seminis Cydoniorum ana Unciam femis,
 Boli Armenæ præparatæ,
 Coralliorum rubrorum præparatorum ana Drachmas duas,
 Lapidum Carpcionum,
 Macis,
 Mastichis electæ,
 Croci Orientalis ana Scrupulos quatuor,
 Sacchari albissimi Uncias sedecim:
 Misceantur & redigantur in Pulverem subtilissimum.
Dantur in Ardore Stomachi, Soda dicto, ad Sesquidrachmam pro dosi.

SPECIES DIAIREOS SIMPLICES *RENODÆI.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ,
 Sacchari candi albi,
 Specierum Diatragacanthæ frigidarum ana Partes æquales:
 Misceantur & redigantur in Pulverem.
Muci incidendi & Acrimonie demulcendæ causa Tussi laborantibus exhibentur.

SPECIES DIAMBRÆ *MESUE.*

℞. Radicum Doronici,
 Galangæ ana Drachmas tres,
 Zinziberis Sesqui-drachmam,

Foliorum Malabatri,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschatæ ana Drachmas tres,
 Spicæ Indicæ Drachmam unam,
 Cardamomorum minorum,
 Lignorum Santali citrini,
 Aloes,

Piperis longi ana Drachmas duas:

Misceantur & reducantur in Pulverem; cui addantur

Ambraë gryfæ Drachma una,

Molchi Drachma femis

Sacchari parum trita:

Omnia probe misceantur.

Capitis & Ventriculi Roborandi causa olim in frequenti usu fuerunt. Dosis ad Drachmam femis.

SPECIES DIATRAGACANTHÆ PRÆPOSITI correctæ.

℞. Gummi Tragacanthæ electæ Uncias duas,

Arabici Drachmas decem,

Amyli Unciam femis,

Radici Liquiritiæ Drachmas duas:

Misceantur; Fiat Pulvis.

Cum NICOLAUS calidas etiam Diatragacanthæ Species præscripserit, in eorum discrimen hæ FRIGIDÆ dicuntur & in Affectibus Pectoris ab Acri Demulcendi gratia adhibentur.

SPECIES DISCUTIENTES Danorum.

℞. Herbarum Majoranæ,

Menthæ,

Rutæ,

Salviæ,

Florum Lavendulæ,

Meliloti,

Baccarum Juniperi ana partes æquales:
 Misceantur & contundantur in grossum Pulverem.

Vires ex nomine patent; applicantur sub forma Fomentationis.

SPECIES EMOLLIENTES *Viennensium.*

℞. Radicum Althææ Uncias quatuor,
 Herbarum Althææ,
 Malvæ,
 Acanthi,
 Parietariæ,
 Violariæ ana Uncias duas,

Florum Chamomillæ Uncias tres:
 Misceantur & reducantur in crassum Pulverem.
Ad Clysmata & Enemata adhibentur.

SPECIES PRO EPITHEMATE CORDIS *Augustanorum*
 ET PULSUUM *Argentoratensium.*

℞. Herbarum Rorismarini,
 Majoranæ,
 Melissæ,
 Florum Cheiri,
 Tunicæ ana Unciam semis,
 Lavendulæ,
 Rosarum ana Drachmas sex,

Lignorum Aloes;
 Rhodii,

Macis,
 Nucis Moschatæ ana Drachmas duas,
 Cinnamomi Drachmas sex,
 Corticum Citri,

Aurantiorum ana Drachmas tres:

Misceantur & contundantur in grossum Pulverem.

Roborandi ergo Sacculis ex sindone rubra confectis includebantur, Agonizantibus applicandæ.

SPECIES PRO FOTU AROMATICO *Parisiensium.*

℞. Herbarum Rorismarini,

Herbarum Rutæ,
 Salviæ,
 Hyssopi,
 Lavendulæ,
 Abfynthii,
 Origani,
 Thymi,

Foliorum Lauri,
 Florum Rosarum rubrarum,
 Chamæmeli,
 Meliloti,
 Sambuci,

Salis Ammoniaci ana partes æquales:

Mixta redigantur in Pulverem crassum:

Discutiendi ergo commoto Capiti forma Epithematis sicci, sive ex Vino coclæ, instar Fomentationis, imponuntur.

SPECIES PRO FOTU AD COLICAM *Palatinorum.*

℞. Florum Chamomillæ Uncias duas,
 Baccarum Juniperi,
 Lauri ana Unciam unam,
 Seminum Anifi,
 Fœniculi,
 Carvi,
 Cumini,

Salis Ammoniaci ana Unciam semis:

Misceantur & redigantur in crassum Pulverem.

SPECIES IMPERATORIS *Augustanorum.*

℞. Cinnamomi optimi Drachmas decem,
 Zinziberis,
 Caryophyllorum ana Unciam unam semis,
 Galangæ,
 Macis,

Nucis Moschatæ ana Drachmas duas:

Misceantur & redigantur in crassum Pulverem:

Pro Roborando Ventriculo pani tosto Vinoque macerato insperguntur.

SPECIES PRO ODORAMENTO POTPOURRI.

- ℞. Florum recentium Rosarum rubrarum Unciam semis,
 Lavendulæ Drachmas duas semis
 Ligni Rhodii Unciam semis,
 Radicis Ireos Florentinæ Uncias duas,
 Herbarum recentium Basilici,
 Calaminthæ montanæ,
 Majoranæ ana Drachmas duas,
 Menthæ Piperitis Scrupulos quatuor,
 Origani,
 Polii,
 Salviæ,
 Saturejæ,
 Corticum Aurantiorum,
 Citri ana Drachmas duas,
 Cinnamomi,
 Summitatum Rorismarini,
 Caryophyllorum,
 Macis ana Drachmas tres,
 Foliorum Lauri Unciam semis,
 Moschi, Saccharo triti, Grana duo,
 Ambraæ gryseæ, Saccharo tritæ, Grana quatuor:
 Contusa in Pulverem grossum misceantur:
Vires ex nomine patent.

SPECIES RESOLVENTES *Danorum.*

- ℞. Herbarum Absynthii,
 Melissæ,
 Menthæ,
 Origani ana Uncias quatuor,
 Florum Chamomillæ,
 Sambuci ana Uncias tres,
 Bacca-

Baccarum Lauri Uncias duas:

Misceantur & reducantur in Pulverem crassum.

Discutiendi scopo sub forma Epithematis vel Fodus applicantur.

SPECIES TABACI PRO FUMO CAMERARII.

℞. Styracis,
 Mastiches,
 Benzoes,
 Succini ana Unciam semis,
 Olibani Drachmas duas,
 Foliorum Tabaci Uncias octo,
 Majoranæ Unciam unam,
 Florum Lavendulæ,
 Cyani,
 Rosarum rubrarum,
 Calendulæ ana Unciam semis,
 Liliorum convallium,
 Seminum Fœniculi,
 Anisi ana Drachmas duas,
 Caryophyllorum Aromaticorum,
 Cubearum ana Drachmas tres:
 Incidantur, contendantur & misceantur.

Laudantur ad Defluxiones Catarrhales & Odontalgiam. Sola Tabaci Folia hodie illis præferuntur.

SPECIFICUM ANTEPILEPTICUM WEISMANN.
 CUPRUM AMMONIACUM Edinburgenfium.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet:
 Dissolvatur in aqua; solutio filtretur; affundatur
 Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari quantum fatis
 ad Saturationem; tunc affundatur

Spiritus Vini rectificatissimus, usque dum Liquor totus
 turbidus evadat; Crystalli ad fundum secedentes charta bibu-
 la exsiccentur, & in vitro probe clauso asserventur.

Pars II.

Qq

Edinburgenses inde ope Micæ Panis PILULAS CÆRULEAS formant.

Pueris ad Grana quatuor, adultis ad novem usque exhibetur & unicam dosin aliquot Epilepticos sanitati restituisse Auctor testatur *N. A. Nat. Cur. T. I. p. 279. & Medical Comment. by a Society in Edinburg. Vol. VI. 30.*

SPECIFICUM ANTIFEBRILE *CROLLII.*

Videantur Conchæ.

SPECIFICUM CEPHALICUM *MICHAELIS,*
AB *Augustanis* correctum.

℞. Cinnabaris factitiæ Uncias tres,
Radicum Pæoniæ Unciam unam semis,
Lapidis Smaragdi præparati Drachmas duas,
Ungulæ Alcis Drachmam unam,
Cranii humani,
Coralliorum rubrorum,
Cornu Cervi sine igne præparati ana Scrupulos duos,
Unicornu marini,
Margaritarum,
Succini ana Scrupulum unum :

Misceantur, redigantur in Pulverem tenerrimum.

Ad affectus Capitis, Spasmos, Convulsiones præscribitur, quo vero successu? experti norunt prudentes.

SPECIFICUM FEBRIFUGUM *CRAANI.*

Videatur Regulus Antimonii Medicinalis.

SPECIFICUM JALAPPINUM *Argentoratensium*
SEU SPECIES DIAJALAPPÆ *Bartholini* correctæ.

℞. Resinæ Jalappæ, nucleis Pineis tritæ, Unciam unam semis,
Cremoris Tartari Uncias duas semis :
Misceantur exactissime.

Radici Jalappæ, cujus incerta semper dosis est, Resinam substituendam duximus, & hic saltem minus efficaci Tartaro Vitriolato Cremorem Tartari substituimus. Potest ad Drachmam semis pro dosi dari.

SPIRITUS ABSTRACTITII SIMPLICES.

Parantur in modum Aquarum abstractitiarum, loco Aquæ Spiritum Vini recipiendo & destillando usque dum Phlegma prodeat; ex tempore quoque surgunt, dum Oleum odoratum in Spiritu Vini rectificato dissolvitur; illius rationem determinabit odor.

SPIRITUS BALSAMI PERUVIANI *Hoffmann.*

℞. Balsami Peruviani Uncias duas,
Salis Tartari Unciam unam:
Probe mixtis adjiciantur
Spiritus Rosarum Unciæ duodecim:
Abstrahatur Spiritus.

Hoffmann Observat. Physic. Chym. L. I. Obs. 23. hunc Spiritum non modo a saporis gratia virtuteque Analeptica commendat, sed Diureticam quoque ejus virtutem laudat.

SPIRITUS BEZOARDICUS *Bussii.*

℞. Spiritus Eboris Uncias duas,
Salis Ammoniaci Succinati Uncias duodecim,
Vini rectificati Uncias triginta & sex,
Olei de Cedro Drachmas duas:
Misceantur probe.

Valide Sudorem & Urinam movet; olim multum ad promovendam Exanthematum eruptionem laudabatur; datur ad guttas triginta.

SPIRITUS CARMINATIVUS *Sylvii.*

℞. Radicum Imperatoriæ,
Galangæ ana Drachmam unam semis,
Q q 2

Radicis Angelicæ Drachmam unam,
 Herbarum Rorismarini,
 Majoranæ,
 Rutæ,
 Basilici,
 Florum Centaurii minoris ana Drachmas duas,
 Baccarum Lauri Drachmas tres,
 Seminum Angelicæ,
 Levistici,
 Anisi ana Unciam semis,
 Zinziberis,
 Nucum Moschatarum,
 Macis ana Drachmam unam semis,
 Cinnamomi Drachmas sex,
 Caryophyllorum,
 Corticum Aurantium ana Drachmam unam semis:
 Incisis & contusis affundantur
 Vini albi generosi Unciæ quadraginta octo,
 Spiritus Vini rectificati Unciæ duodecim:
 Digerantur per biduum, tunc destillentur ad dimidias.
Ad discutiendos Flatus & dissipanda, quæ inde oriuntur, incom-
moda ad Semiunciam exhibetur.

SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.

Videatur Spiritus Nitri dulcis.

SPIRITUS COCHLEARIÆ *Parisiensium.*

SPIRITUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS *Brunsvicensium.*

℞. Foliorum recentium Cochleariæ Uncias octoginta,
 Radicum Raphani rustici recentium Uncias decem;
 Minutim concisa infundantur per nycthemerum cum
 Spiritus Vini Unciis nonaginta sex:
 Instituaturn destillatio, usque dum liquor albescens prodeat.
Aqua temperatus hic Spiritus Collutorio scopo ad vitia Oris
Scorbutica adhibetur.

SPIRITUS CORNU CERVI *MÆBII.*

℞. Cornu Cervi in minora frusta comminuti quantum placet; immittatur in Retortam terream; cui juncto vesicæ ope excipulo, instituaturn igne nudo destillatio. Hoc negotio Spiritus, Oleum, ac Sal Volatilis obtinebitur. Filtri ope Spiritus ab Oleo, ipsi innatante, curate separandus est.

Dissolvendo humores & solida stimulando Excretiones promovet aquosas. Datur ad Scrupulum unum.

SPIRITUS DE TRIBUS.

Videatur Mixtura simplex.

SPIRITUS JASMINI *BEAUMÉ.*

℞. Olei Jasmini Uncias sedecim,
Spiritus Vini rectificati Uncias octodecim:
Miscantur; crebro concutiantur; exponantur frigori, quò Oleum consistat & supernatet Spiritui; Liqueur defundatur.

Ad odorem exhibetur.

SPIRITUS *MINDERERI.*MIXTURA SALINA VOLATILIS *Suecorum.*

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Sale Tartari; cui instilletur Aceti vulgaris quantum satis ad Saturationem:
Liqueur filtretur.

Resolvendi & Excretionis aquosas promovendi causa laudatur. Dosis ad Drachmam dimidiam.

SPIRITUS NITRI.

Videatur Aqua fortis.

SPIRITUS NITRI DULCIS *KELLII.*NAPHTA NITRI *KUNCKELII.*SPIRITUS ÆTHEREUS NITRATUS *Suecorum.*

℞. Alcoholis vini Uncias quatuor:
Immittantur in vitrum amplum epistomio vitreo obturandum & glaciei immersum; affundantur tum

Spiritus Nitri fumantis Unciæ duæ:

Claudatur vitrum; elapsis aliquot horis adjiciatur iterum

Spiritus Nitri fumantis Uncia semis:

Obturetur vitrum, negotiumque hoc repetatur post aliquot horarum intervallum, donec Naphta liquori supernatet, hæc ubi apparuerit; affundatur adhuc

Spiritus Nitri semiuncia:

Elapsis aliquot horis infundibuli ope Naphta a liquore, cui supernatet, separetur, larga aquæ copia diluatur, & adjecto ipsi Alkali, usque dum nulla ulterius effervescentia surgat, omne quod ipsi adhæret acidum inde auferatur. Distilletur tunc lenissimo igne aqua, quæ Naphtam habet, ex cucurbita, donec ista omnis in excipulum descenderit, & Naphta inde separata vitro optime clauso asservetur. Liquori acido, ex quo Naphta surrexerat, addatur Alcoholis quadruplum & destilletur ex cucurbita, quoad liquor destillans acidum sapiat, & sub nomine *SPIRITUS NITRI DULCIS* asservetur.

Respectu virium cum Liquore Anodyno convenit; multum scopo Carminativo laudatur; gratiæ ergo Julapiis adjicitur; datur ad Drachmam semis; optime substituitur SPIRITUI CARMINATIVO DE TRIBUS.

SPIRITUS NITRI FUMANS GLAUBERI.

℞. Nitri depurati Uncias duas & triginta:

Retortæ immixtis per vices affundantur

Olei Vitrioli Unciæ sedecim:

Instituatur destillatio ex Balneo Arenæ, Spiritus hac ratione obtentus vitro probe clauso asservetur. Residuum est *TARTARUS VITRIOLATUS* sive *NITRUM VITRIOLATUM Londinensium*.

Paratur pro præparatione Spiritus Nitri Dulcis.

SPIRITUS AD PERNIONES DARELII.

℞. Spiritus Vini Camphorati Uncias tres,

Salis Ammoniaci Unciam unam,

Petrolei nigri Unciam unam semis :

Misceantur.

Vires ex nomine patent.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI TARTARISATUS.

Pharmacopœæ Bateanæ.

ALCALI AMMONIACUM AQUOSUM Suecorum.

℞. Salis Ammoniaci Uncias fedecim,

Cinerum clavellatorum Uncias quadraginta octo :

Mixta destillentur Retorta, excipulo vesicæ ope munita ;
Liquori obtento adjiciantur

Aquæ fontanæ Unciæ quadraginta & octo :

Affervetur cum Crystallis destillatione obtentis.

Si liquor urinosus diluitur,

Aquæ fontanæ Unciis fedecim,

Spiritus Vini rectificati Unciis triginta duabus,

Surgit **SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.**

Egregium medicamentum pro attenuandis Humoribus, Asthmaticis multum commendatur ; Diureticos quoque & Diaphoreticos effectus edit ; nec minus egregie a Vipera morsis conducit. In Odontalgia & qualicunque Animi deliquio naribus admovetur. Dosis est ad Scrupulum unum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA

GLAUBERI.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CAUSTICUS MEYERI

VEL AMMONIACUM ALCALI VOLATILE CAUSTI-

CUM Suecorum. ALCALI FLUOR Rossorum.

℞. Salis Ammoniaci Uncias fedecim,

Calcis vivæ pulverisatæ Uncias quadraginta octo :

Celerrime mixta committantur Cucurbitæ Alembico & excipulo instructæ ; ope caloris Balnei eliciatur Spiritus, qui vulgo Aquæ Unciis triginta dilui solet.

Medicamentum antecedente multo vehementius rarissime interne datur ; scopo quoque Excitandi priore longe efficacius, hinc non bene in officinis dilutum proflare jubetur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI OLEOSI.

Spiritus Salis Ammoniaci Vinofi Unciæ uni addatur
Olei odorati Scrupulus dimidius, Spiritus Vini rectificati
paululo diffolutus.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS

Auguſtanorum. EAU DE LUCE.

℞. Spiritus Salis Ammoniaci cum Calce viva Uncias quatuor,
Olei deſtillati Succini grana octo, diſſoluta
Spiritus Vini rectificatiſſimi Uncia ſemis.

*Hic Spiritus præcipue contra affectus Capitis Catarrhales
efficacior eſſe putatur, quam Spiritus Salis Ammoniaci cum
Calce viva ſimplex.*

Obſervetur quod Roſſi *SPIRITUS SALIS AMMONIACI
LIXIVIA ALCALINA* appellant.

SPIRITUS SALIS COMMUNIS BASILII. VALENTINI.

℞. Salis communis partem unam,
Argillæ albæ partes tres:

Miſceantur & deſtillantur ex Retorta terrea, igne nudo.

*Internus ejus uſus rariffimus, externus ad Perniones commenda-
bilis eſſe perhibetur.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus Salis fumantis Uncias octo,
Alcoholis Uncias ſex:

Miſceantur & deſtillantur ex cucurbita; liquor deſtillatus de-
nuo ex Retorta leniſſimo igne deſtilletur & aſſervetur *NAPH-
TA SALIS COMMUNIS* quæ inde prodit: hujus Uncia una
miſceatur cum Alcoholis Unciis quatuor pro *SPIRITU SALIS
DULCI*.

*Qualicunque alia ratione parati Spiritus Salis dulcis eminet
aciditas. Hoc vero medicamentum cum reliquorum acidorum
dulcificatorum viribus congruit.*

SPIRITUS SALIS FUMANS *GLAUBERI.*

℞. Salis communis Uncias triginta duas:
 Affundantur sensim
 Olei vitrioli Unciæ sedecim, dilutæ
 Aquæ Unciis duodecim:
 Instituaturn destillatio ex Balneo arenæ,
Paratur proxime præcedentis laboris ergo.

SPIRITUS SAPONIS.

℞. Saponis Veneti Uncias quatuor,
 Salis Tartari Uncias duas:
 Probe tritis adjiciantur
 Spiritus Vini rectificati Unciæ duodecim,
 Quintæ Essentiæ Bergamotte Drachma semis,
Discutiendi scopo multum laudatur.

SPIRITUS SUCCINI.

Videatur Sal Succini.

SPIRITUS SULPHURIS.

Is cum sub destillatione Vitrioli ultro obtineatur, cur potius per ambages & cum dispendio, Sulphur nimirum sub campana accendendo ortosque inde vapores colligendo parari debeat, non video.

Spiritus Vitrioli aqua dilutus, foetido huic medicamento prudenter substituitur.

SPIRITUS SULPHURIS VOLATILIS *BEGUINI.*

℞. Salis Ammoniaci Uncias octo,
 Calcis vivæ Uncias duodecim,
 Florum Sulphuris Uncias quatuor:
 Misceantur, & destillatione inde elicitus Spiritus asservetur.
Scopo medicato, quamvis ab HOFFMANNO laudatus, non adhibetur. Detegendo Vini per Plumbum mangonio præcipue inservit.

PARS II.

R r

SPIRITUS TARTARI *LULLII.*ACIDUM TARTARI DESTILLATUM *Suecorum.*

Paratur ex Tartaro eodem modo, quo Spiritus e lignis elici suo loco docuimus.

SPIRITUS VINI ALCALISATUS *LIBAVII.*

Alcoholi quantæ libuerit copiæ immittatur Sal Tartari, usque dum ulterius immixtus non liquetur.

Ad extrahendas & solvendas Resinas adhibetur.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS *CORDI.*ESSENTIA CAMPHORÆ *QUERCETANI.*

℞. Spiritus Vini rectificati Uncias sedecim,
Camphoræ Unciam unam,

Solutio affervetur.

Polychrestum medicamentum est, quo Discutiendi ergo solent uti.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS CROCATUS

AQUA PESTILENTIALIS *HARTMANNI.*

℞. Spiritus Vini Camphorati Uncias duodecim,
Essentiæ Croci Scrupulum unum:

Misceantur.

Ratione virium ab antecedente vix differre videtur.

SPIRITUS VINI LOTUS *KUNCKELII.*

℞. Spiritus Vini Tartarifati,
Aquæ fontanæ ana partes æquales:

Destillatione eliciatur Alcohol sincerissimum.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS *HOLLANDI.*

Spiritus Vini quantum lubuerit:

Destilletur, donec lactescentes prodeant guttæ:

Liquor residuus *PHLEGMA* dicitur.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS *LEMERY.*

Est Spiritus Vini Alcalifatus ex Cucurbita destillatus.

SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Olei Vitrioli partem unam,
 Aquæ fontanæ partes tres:
 Sensim sensimque misceantur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Videatur L liquor Anodynus.

SPODIUM.

Videatur Ebur album. ustum.

SPONGIÆ PRÆPARATÆ *Danorum.*

Spongiæ finissimæ probe exsiccatae, in laminas sectæ, immittantur Cerae flavæ, igne liquatæ; exprimatur inde torcularis ope Cera excedens.

Pro Turundis dilatatoriis adhibentur.

SUCCI EXPRESSI.

Vegetabile recens incisum & contusum immittatur sacco lintheo, exprimatur torculari succus, qui per subsidentiam defæcatus clarificetur Albuminæ ovorum & si per aliquod tempus sit asservandus, committatur vitro angustioris colli, superfusoque ipsi paululo olei Amygdalarum vitrum exactissime obturetur.

SUCCI ANTISCORBUTICI *Danorum.*

℞. Herbarum recentium Cochleariæ partes duas,
 Beccabungæ,
 Nasturtii Aquatici,
 Pedunculorum recentium Taraxaci,
 Pulpæ recentis Aurantium ana partem unam:
 Incisa committantur prelo.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII *BASIL. VALENTINI.*

Aqua, cujus ope Hepar Antimonii fuerit edulcoratum, reponatur per aliquot menses; defundatur ab IMPURO, quod ad

℞ r 2

fundum depofuit, SULPHURE; affundatur ipfi Acetum, quoad
iftius ope nihil ulterius præcipitetur; pulvis ad fundum defi-
dens probe edulcoratus fervetur.

*Eximium medicamentum ad humorum Spiffitudinem attenuan-
dam. Datur ad Granum unum.*

SUPPOSITORIA GAUBII.

- ℞. Salis communis Unciam unam,
Saponis Veneti Uncias duas,
Mellis ad confiftentiam fpiffam cocti quantum fatis:
Formentur conii, bafis rotundæ & variæ magnitudinis.
Ad referendam Alvum oleo inuncta intruduntur ano.

SYRUPI

Canones.

- I. *Σεράπια* ACTUARIUM, qui ea barbare Syrupos dici monet, funt
liquores in fpiffitudinem minorem quam faparum, ope Sac-
chari five Mellis condenfati.
- II. Pro parandis ex Succis, aliisve coctionem non admittentibus
Syrupis, illis diffolvendum Sacchari puriffimi duplum, para-
tusque hoc modo Syrupus colandus erit.
- III. Syrupi Aromatici optime parantur Elæofacchara dimi-
dio aquæ diffolvendo.
- IV. Reliqui Syrupi Saccharo cum Decocto, quod *BRO-
DIUM* dicunt, ad iuftam confiftentiam coquendo; Albu-
mine deinde Ovorum clarificando perque pannum trajicien-
do conficiuntur.
- V. Optima ex Floribus parandi Syrupos ratio ea eft, qua Flo-
ribus recentibus adjicitur Sacchari ad confiftentiam tabu-
landi cocti duplum; cuncta per duodecim fere horas dige-
ftioni frigidæ relinquuntur; leni dein calore foventur; lin-
teo immittuntur, torcularique denique exprimitur defide-
ratus Syrupus.

SYRUPUS ALTHÆÆ FERNELII.

- ℞. Radicum Althææ,

Radicum Graminis,
Asparagi,
Glycyrrhizæ,

Herbarum Althææ,
Parietariæ,
Sanguiforbæ,
Plantaginis,
Rutæ murariæ,
Capilli Veneris ana Drachmas tres,

Passularum minorum Unciam semis,

Cicerum rubrorum Unciam unam:

Incisa & contusa coquantur ex

Aquæ fontanæ Unciis quadraginta, ad residuum Unciarum triginta:

In colatura dissolvantur

Sacchari Unciæ quinquaginta:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui Clarificatus affervetur.

Proprie quidem contra affectus Nephriticos commendatur, sed Demulcentium quoque remediorum vicem sustinet haud pœnitendam.

SYRUPUS AMYGDALINUS HORDEATUS *Parisiensium.*
EMULSIVUS vulgo.

℞. Amygdalarum dulcium Uncias decem,

Amararum Uncias sex,

Aquæ fontanæ Uncias quatuor & quadraginta:

Parretur secundum artem Emulsio:

Addantur Sacchari albi Unciæ octoginta:

Instituatur coctio ad consistentiam Syrupi:

Colato addantur

Aquæ Florum Naphæ Unciæ duæ.

SYRUPUS DE AMMONIACO *KLEIN.*

℞. Gummi Ammoniaci Uncias duas;

Dissolvantur in

Aquæ Hyffopi,
 Vini albi ana Unciis quinque:
 Solutio colata misceatur cum
 Sacchari albi ad consistentiam tabulandi cocti Unciis sedecim:
 Agitentur ad refrigerationem usque.
Egregium Medicamentum Resolvens.

SYRUPUS ANTISCORBUTICUS *Parisiensium.*

℞. Succorum non defæcatorum Foliorum Cochleariæ,
 Beccabungæ,
 Nasturtii aquatici,
 Radicum Armoraciæ ana Un-
 cias duodecim,
 Aurantiorum amarorum Un-
 cias viginti,

Corticum Aurantiorum amarorum recentium Unciam unam:
 Misceantur & digerantur frigide in cucurbita probe clausa ali-
 quoties succutienda, donec fæces subsederint, id quod ut plu-
 rimum duodecim demum horis elapsis accidere solet; liquor
 clarus filtretur, mensuretur, committatur denuo cucurbitæ;
 Adjiciatur ipsi.

Sacchari albissimi duplum:
 Solutione leni calore peracta adjiciantur
 Spiritus Cochleariæ,
 Aquæ Cinnamomi ana Uncia una:
 A facibus denuo subsidentibus decantetur Syrupus & asser-
 vetur in Vitris probe clausis.

*Præter Antiscorbuticas, Diureticas quoque, Emenagogas,
 & Humores Depurantes vires edit.*

SYRUPUS BALSAMICUS *Hoffmann.*

℞. Julepi Rosarum Uncias duodecim,
 Spiritus Balsami Peruviani Drachmas tres:
 Misceantur:
*Roborandi Ulcerumque internorum curandorum causa adhi-
 betur.*

SYRUPUS BALSAMI TOLUTANI *KLEIN.*

℞. Sacchari albissimi Uncias triginta duas,
 Aquæ fontanæ Uncias viginti:
 Brevi coctione ad spissitudinem redactis, colatis & semi refrigeratis immisceantur, assidue agitando,
 Balsami Tolutani Drachmæ sex cum Sacchari albi sesqui-
 uncia in pulverem tritæ.
Efficacia virium antecedenti par, gratia saporis superior est.

SYRUPUS BOYLEANUS.

℞. Radicis Symphyti recentis Uncias sex,
 Herbæ Plantaginis majoris Uncias tres:
 Ex contusis exprimatur torculari Succus, cui per subsidentiam depurato addatur
 Sacchari æquum pondus:
 Coquatur ad consistentiam Syrupi, qui clarificatus & colatus fervetur.
Commendatur maxime Hæmoptysi laborantibus, nec inefficax erit in aliis quoque Evacuationibus.

SYRUPUS BYZANTINUS *MESUE.*

℞. Succorum depuratorum Apii,
 Endiviæ ana Uncias quatuor &
 viginti,
 Buglossi,
 Lupuli ana Uncias duodecim,
 Sacchari albi Uncias octo & quadraginta:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui clarificetur & co-
 letur.
*Ad morbos ab obstructione Viscerum Abdominalium cum suc-
 cessu adhibetur; olim contra Febres pertinaces commendari so-
 lebat.*

SYRUPUS CHINÆ *LEMERY.*

℞. Corticum Chinæ crasse contusorum Uncias quatuor;

Vini rubri Uncias duas & triginta :
 Infundantur per biduum in vase probe clauso :
 Liquore filtrato dissolvantur
 Sacchari albissimi Unciæ sexaginta.
Contra Febres & morbos Putridos in usum trahitur.

SYRUPUS CICHOREI CUM RHABBARBARO. *POTERII.*

℞. Radicum Cichorei Uncias duas cum semisse :
 Coquantur cum
 Aquæ fontanæ Unciis octodecim ,
 Ad residuum Unciarum duodecim :
 In colatura infundatur per noctem ,
 Rhabbarbari minutim incisi Uncia una ,
 Salis Tartari Scrupulus unus :
 Colaturæ adjiciantur
 Sacchari albi Unciæ viginti duæ :
 Denuo coletur.
Infantibus maxime Evacuandi scopo exhibetur.

SYRUPUS CITRI E TOTO *DORNCRELLII.*

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium Uncias duas semis :
 Infundantur per noctem in
 Succi Citri recentis Unciis quatuor & viginti :
 In colatura dissolvantur
 Sacchari albi Unciæ quadraginta :
 Colatus Syrupus fervetur.
Ad fallendam Sitim , sedandum æstum , arcendam Putredinem merito commendabilis.

SYRUPUS CORALLIORUM *QUERCETANI.*

℞. Coralliorum rubrorum in pulverem redactorum Uncias duas ,
 Succi Berberum Uncias duodecim :
 Post digestionem aliquot dierum colentur :
 In colatura dissolvantur
 Sacchari albi Unciæ viginti :

Cola

Colatura fervetur.

Coralliorum nihil subit hunc Syrupum, SYRUPO BERBERUM omnino postponendum.

SYRUPUS CORTICUM CITRI *SERAPIONIS.*

℞. Flavedinis Corticum Citri recentium Uncias quatuor,
Granorum Chermes Drachmas tres,
Vini albi generosi Uncias duodecim:

Macerentur per viginti quatuor horas in vase probe tecto:

Liquor filtratus commisceatur cum

Sacchari albillimi ad consistentiam Tabulandi cocti Unciis
octodecim.

Refocillandi & Roborandi causa exhibetur.

SYRUPUS DIACODII, DIACODIUM LIQUIDUM

MONTANI.

℞. Capitem Papaveris Uncias duas,
Siliquarum dulcium Uncias duas semis:

Minutim incisa coquantur cum

Aquæ fontanæ Unciis octodecim,

ad residuum Unciarum decem; sub finem coctionis addan-
tur

Liquiritiæ recentis minutim incisæ Uncia una semis:

In colatura dissolvantur

Sacchari albi Unciæ sedecim:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui clarificatus asservetur.

Sopiendæ Tussi conducit.

SYRUPUS DOMESTICUS VEL DE SPINA CERVINA

VAL. CORDI.

℞. Succu baccarum Rhamni Cathartici depurati Uncias viginti,
Sacchari albi Uncias duas & triginta,

Zinziberis,

Cinnamomi,

Caryophyllorum ana Drachmam unam semis,

PARS II.

S S

Mastychis,
 Seminis Anifi ana Drachmas tres:
 Paulisper coquantur, clarificentur & ferventur.

*Alvum ducit, Urinam ciet, Hydropicis & Arthriticis datur
 cum successu ad Unciam unam pro dosi.*

SYRUPUS EMETICUS *Brandeburgensium.*

℞. Vitri Antimonii Hyacinthini Drachmas duas,
 Vini albi generosi Uncias duodecim:
 Stent in Digestione per triduum; filtratis dissolvantur
 Sacchari albi Unciæ quatuor & viginti:
 Semel ebulliant & colentur.
A Drachmis sex ad Unciam pro dosi datur.

SYRUPUS EMETICUS *GLAUBERI.*

℞. Florum Antimonii Unciam unam,
 Cremoris Tartari Uncias duas,
 Sacchari Uncias sex:
 Coquantur per sex horas cum
 Aquæ fontanæ Unciis octoginta:
 Filtrentur & evaporentur ad consistentiam Mellis.
 Addantur Spiritus Vini rectificati Unciæ sedecim:
 Per decem horas digerantur & leni igne evaporentur ad con-
 sistentiam Syrupi
*Scopo Emetico Gutte aliquot miscentur cum aqua & singulo
 horæ dimidio repetuntur, quoad desideratus surgat, effectus.*

SYRUPUS EMULSIVUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

SYRUPUS DE ERYSIMO *LOBELII*

℞. Radicum Enulæ recentium Unciam unam,
 Ireos Germanicæ Uncias tres,
 Liquiritiæ,
 Farfaræ ana Unciam unam,

Herbarum Eryfimi Manipulos decem,
 Botryos Manipulos feptem,
 Farfaræ,
 Polytrichi,
 Hyffopi recentis ana Manipulos ſex,
 Endiviæ,
 Borruginis,
 Moldavicæ ana Manipulos quatuor,
 Marrubii recentis,
 Scabiofæ,
 Cardui benedicti ana Manipulos duos;
 Chamædryos,
 Violariaë,
 Betonicæ ana Sefqui manipulum,
 Thymi,

Florum Violarum,
 Borruginis,
 Bugloffii,
 Roſarum,
 Stœchados ana Manipulum unum,
 Salviæ Pugillos duos,

Paffularum minorum,
 Caricarum ana Uncias ſex,
 Baccarum Lauri,
 Seminum Anifi,
 Fœniculi,
 Carvi,
 Cumini ana Unciam ſemis,
 Hordei Unciam unam:

Incifa & contufa coquantur cum
 Aquæ Unciis ducentis,

Ad reliquum Unciarum centum & quinquaginta:

Colatis adjiciantur

Succi Eryfimi depurati,
 Aceti ana Unciæ duodecim,

Mellis Unciæ sex & triginta,
 Sacchari albi Unciæ nonaginta sex:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui clarificatus affervetur.
*Magnopere laudatur pellendis affectibus Pectoris Pituitosis;
 contra Raucedinem peculiariter efficax fertur.*

SYRUPUS GLYCYRRHIZÆ *MESUE.*

℞. Radicum Liquiritiæ Uncias duas,
 Herbarum Capilli Veneris Unciam unam,
 Hyssopi Unciam semis:
 Incisa infundantur cum
 Aquæ fervidæ Unciis quatuor & viginti;
 Colatis dissolvantur.
 Mellis Unciæ octo,
 Sacchari albi Unciæ sedecim:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, cui clarificato adjiciantur
 Aquæ Rosarum Unciæ quatuor.
In morbis Pectoris adhibetur.

SYRUPUS HORDEATUS.

Videatur Syrupus Amygdalinus.

SYRUPUS HYSSOPÏ *ZWÆLPERI.*
 SYRUPUS SCILLITICUS *Suecorum.*

℞. Squillæ præparatæ Unciam unam,
 Foliorum Hyssopi Uncias duas,
 Zinziberis Unciam semis:
 Incisa macerentur in vase clauso per nycthemerum cum
 Aquæ Hyssopi Unciis sex & triginta:
 Colatura expressa & per subsidentiam depurata dissolvantur
 Sacchari albissimi Unciæ sex & triginta.
Resolvendi ergo cum Successu ad morbos Pectoris mucosos ad-
hibetur.

SYRUPUS DE JUJUBIS *MESUE.*

℞. Jujubarum Uncias tres,

Radicum Liquiritiæ,
 Herbæ Capilli Veneris,
 Hordei mundati ana Unciam unam:

Incisa, contusa coquantur cum
 Aquæ Unciis quadraginta quatuor, ad triginta sex Uncias
 residuas:

Sub finem coctionis adjiciantur
 Florum Violarum Unciæ quinque:

Colatura Emulgeantur

Seminum Malvæ Unciæ quinque,
 Cydoniorum,
 Papaveris albi,
 Melonum,
 Lactucæ ana Drachmæ tres:

Colatura dissolvantur

Sacchari Unciæ viginti & quatuor,
 Gummi Tragacanthæ Drachmæ tres:

Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui edulcoratus asservetur.

Conducit Demulcendo in Tussi sicca.

SYRUPUS LONGÆ VITÆ.

Videatur Syrupus Mercurialis.

SYRUPUS DE MANNA *ECHHOLDI.*

℞. Radicum Polypodii Drachmas sex,
 Ireos Florentinæ Unciam femis,

Passularum Drachmas tres,

Mellis Uncias quatuor,

Aquæ fontanæ Uncias quatuor & viginti:

Incisa coquantur ad residuum Unciarum duodecim:

In Colatura infundantur per noctem

Florum quatuor Cordialium ana Pugillus unus,

Foliorum Sennæ sine stipitibus Uncia una femis,

Cinnamomi Drachma femis:

Colatis dissolvantur

Mannæ Calabrinæ Unciæ tres ,

Sacchari Unciæ duodecim :

Coquantur ad consistentiam Syrupi , qui clarificatus fervetur.

*Datur infantibus scopo Purgandi , neque perperam ad affectus
Pectoris pituitosos adhibetur.*

SYRUPUS MERCURIALIS, PROPHYLACTICUS
LONGÆ VITÆ ZWINGERI.

℞. Radicum recentium Gentianæ Uncias quatuor ,
Ireos nostratis Uncias octo :

Incisæ infundantur cum

Vini albi Unciis octo & quadraginta ,

Infundantur per quatuor & viginti horas :

Colaturæ addantur

Succorum Mercurialis Unciæ nonaginta ,

Borraginis ,

Buglollina Unciæ quatuor & viginti ,

Mellis albi Unciæ duæ & triginta :

Coquantur ad Syrupi consistentiam , qui clarificatus fervetur.

*ZWINGER Acad. N. C. Dec. III. Vol. 7 & 8. p. 18. hu-
jus Syrupi in talia quam maxime celebrati insignem sibi quo-
que probatam efficaciam in præcavenda Vertigine, Arthritide,
Podagra, Hemicrania periodica, Cardialgia, Dolore Ischia-
dico, Phthisi, Hydrope, Obstructionibus, Alvi constipationibus
aliisque morbis quam plurimis, maximopere commendat, do-
cumentique loco duo refert exempla hominum, qui ejus usu vi-
tam ultra centum annos extenderunt. Prophylactico scopo quo-
tidie mane ejus cochlear unum hauritur.*

SYRUPUS DE NICOTIANA QUERCETANI.

℞. Succu Nicotianæ Uncias octo & quadraginta ,

Oxymellis Simplicis Uncias quatuor ,

Hydromellis Uncias duodecim :

Digerantur in loco tepido per quatuor dies , liquor clarus a
fæce decantetur , eique adjiciantur

Sacchari Unciæ octo & quadraginta.
Valide Mucum resolvit. In Asthmate pituitoso ad Unciam semis cum successu exhibetur.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, CONFECTIO DIACODION *GALENI.*

℞. Caputum Papaveris albi Uncias octo,
 Aquæ Uncias octo & quadraginta:
 Decoquantur ad dimidium:
 Colaturæ addantur
 Sacchari Unciæ quadraginta:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui clarificatus fervetur.
Lene Anodynum medicamentum datur ad Unciam semis pro dosi.

SYRUPUS RUBI IDÆI CUM ACETO *BEAUMÉ.*

℞. Succu Rubi Idæi Uncias quadraginta,
 Aceti rubri Uncias quatuordecim,
 Sacchari albi Uncias centum:
 Clarificatus Syrupus affervetur.
Syrupus palato gratissimus fallendæ siti inservit. In morbis Inflammatoriis multum conducit.

SYRUPUS SCELOTYRBTICUS *FORESTI.*

℞. Succorum Nasturtii Aquatici,
 Beccabungæ ana Uncias sex,
 Fumariæ,
 Lupuli ana Uncias tres,
 Sacchari albi Uncias sedecim:
 Coquantur ad consistentiam Syrupi, qui affervetur clarificatus.
Adhibetur ut plurimum ad medicamenta stomachica.

SYRUPUS DE SPINA CERVINA.

Videatur Syrupus Domesticus.

SYRUPO E SYMPHYTO *FERNELII* optime substituitur
SYRUPUS BOYLEANUS.

SYRUPUS VIPERARUM *Parisiensium.*

℞. Viperarum, Capitibus & Caudis abscissis & Intestinis exsectis
Numero duodecim,

Radicum Chinæ,

Sarfaparillæ ana Unciam unam :

Incisa coquantur cum

Aquæ Unciis quatuor & sexaginta,

Ad residuum Unciarum triginta :

Colaturæ clarificatæ addantur

Liquoris Unciæ decem, quæ priores prodeunt dum ex
Cucurbita abstrahuntur

Vini albi generosi,

Aquæ Florum Naphæ ana Unciæ quatuor & sexaginta,

Ligni Santali citrini,

Cinnamomi ana Uncia una,

Cardamomi minoris,

Nucis Moschatae,

Ligni Aloes ana Drachmæ tres :

In Liquoribus commixtis dissolvantur

Sacchari albissimi Unciæ octoginta :

Syrupo refrigerato admisceatur

Tincturæ Ambræ Uncia una.

*Multum commendatur hic Syrupus ad refocillandas vires græ-
vibus morbis aut ab usu Veneris fractas.*

TABULÆ VEL TABELLÆ

Videantur ROTULÆ & TROCHISCI.

TABULÆ ALIMENTARIÆ *BEAUMÉ.*

℞. Pedes Vitulinos quatuor,

Carnis de femore Bovis centum nonaginta & duas Uncias,
Carnis

Carnis de femore posteriore Vervecis Centum & sexaginta Uncias,

interno Vituli Uncias quadraginta octo:

Incisa coquantur leni igne cum Aquæ quantitate sufficiente: Decoctum despumatur & exprimitur per pannum: caro quæ remanet iterum cum aquæ idonea quantitate coquitur, despumatur, exprimitur: Jus expressum priori additur; a jure refrigerato pinguedo aufertur eique adjicitur Salis quantitas, quæ sufficit: Colatur per pannum & leni calore ad consistentiam Gelatinæ spissæ evaporatur, quæ super lapidem effunditur & in tabulas secatur calore leniori exsiccandas, & in vitro probe clauso asservandas.

Pro Jure ex tempore parando dissolvuntur aqua.

TARTARUS CHALYBEATUS *ANGELI SALÆ.*

℞. Cremoris Tartari Uncias sedecim,
Limaturæ Ferri Uncias quatuor:
Coquantur per integram horam cum
Aquæ fontanæ quantitate sufficiente:
Liquor filtratus redigatur in Crystallos.

Aperiendi scopo datur ad Scrupulum unum in largiore aqua copia dissolutus.

TARTARUS EMETICUS *MACQUER.*
TARTARUS ANTIMONIALIS *Suecorum.*

℞. Mercurii Vitæ Uncias quatuor cum dimidia,
Cremoris Tartari Uncias decem:
Coquantur in Vase vitreo cum
Aquæ Unciis centum:

Solutio filtrata evaporetur ad ficcitatem.

Emeticum vulgatissimum, cujus Dosis ad Grana tria extenditur.

TARTARUS SOLUBILIS SEU TARTARISATUS
BARCHHUSEN.

ALCALI VEGETABILE TARTARISATUM *Suecorum.*

℞. Cremoris Tartari quantum placet:

PARS II.

T t

Aqua dissoluto & ebullienti adjiciatur

Salis Tartari quantum fatis ad saturationem:

Liquor filtratus evaporetur ad cuticulam, afferventur Cryſtalli.

Ob indolem Saponaceam, qua gaudet, in attenuanda Spiſſitudine mucoſa & aperiendis Obſtructionibus reliqua quoque Salia media vincit. Datur hoc ſcopo ad Drachmam unam, Purgandi autem ſine ad Unciam unam.

TARTARUS VITRIOLATUS TACHENII.

ALCALI VEGETABILE VITRIOLATUM Suecorum.

Vitriolo viridi in larga Aquæ quantitate diſſoluto adjiciatur Solutio Cinerum clavellatorum, uſque dum nova hujus Solutionis portio ex illo liquore nihil ulterius dejiciat, nec cum eo efferveſcat; defundatur liquor a Terra metallica, quæ inde ſecellit; evaporetur ad cuticulam; filtretur; in locum frigidum reponatur; Cryſtalli hac ratione ortæ, ſi leviffimum qualiscunque coloris veſtigium habent, denuo fervida diſſolvantur, & affuſa adhuc Solutione Cinerum clavellatorum ab omni, quod iſtis accreverit, heterogeneo liberentur.

Hoc labore Pharmacopœi commode ſuperſedere poſſunt, quippe qui eundem omnino Salem ſub nomine *Arcani duplicati* aſſervant.

Incidendi & Excretiones aquoſas permovendi ergo exhibetur.

TELA GUALTERI.

℞. Emplaſtrorum Diapalmæ,
Diachyli ana Uncias octo,
Albi cocti Uncias quatuor:

Liquatis immiſceantur

Pulveris Ireos Florentinæ Drachmæ ſex:

Emplaſtro liquato immergatur linteum, quod Emplaſtro probe imbutum lævigetur cylindro ligneo.

Imponitur Ulceribus.

TERRA FOLIATA TARTARI LULLII. ARCANUM TAR-

TARI ZWÆLFFER. OXYTARTARUS SUECORUM.

TARTARUS REGENERATUS TACHENII.

℞. Salis Sodæ Uncias duodecim:

Affundatur Aceti deſtillati quantum fatis ad ſaturationem.

Evaporetur ad cuticulam ; filtretur & redigatur in Cryſtallos : ſi recipiendus eſt Sal Tartari, liquor evaporetur ad conſiſtentiam Syrupi, tunc exſiccetur leni calore, ut in formam Foliatam concreſcat.

*Ob indolem Saponaceam imprimis inter Aperientia militat.
Datur ad Drachmam unam.*

Medicamentum non minore tantum ſui pretio, ſed virium quoque præſtantia commendandum auctore BOERHAAVE paratur Cineres clavellatos Aceto crudo ſaturando, liquorem filtrando & leni calore inſpiſſando.)

THERIACA *ANDROMACHI.*

Videatur ſub Electuariis.

THERIACA COELESTIS *HOFFMANNI.*

℞. Myrrhæ electæ Unciam ſemis,
Galbani,
Maſtyches,
Opoponacis ana Scrupulos duos,
Storacis Drachmas tres,
Extractorum Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Scordii,
Tormentillæ,
Contrajervæ,
Angelicæ ana Unciam ſemis,
Opii Drachmas ſex,
Crocii,
Vincetoxici,
Valerianæ,
Gentianæ,
Ariſtolochiæ rotundæ ana Drachmas tres,
Refinarum Ligni Aloës,
Guajaci,
Ladani ana Drachmam unam,

ties succutitur: Spiritus qui per Alembicum destillavit, cucurbitæ rursus committitur, & post sufficientem digestionem Tinctura per filtrum depuratur.

II. Pro Tincturis Aquosis requiruntur ad Unciam Vegetabilis unam affundendæ Aquæ ebullientis Unciæ octo; Digestio fiat in vase clauso super cineribus calidis per noctem; liquori postridie mane filtrato adjiciantur Olei Vitrioli Scrupuli duo; Tinctura tamen Rhabarbari hic excipienda, quippe quæ nulum Acidum admittit, atque ob id ipsum vix per aliquot dies asservari potest.

III. Tincturæ Resinosæ citra Resinæ turbationem, cum Aqua misceri non possunt. Resina, antequam Spiritus Vini ipsi affunditur, pauxillo Salis Tartari teritur.

TINCTURA ALEXIPHARMACA *Huxham.*

Videatur ESSENTIA CHINÆ.

TINCTURA AMARA *Londinensium.*

Videatur ELIXIR STOMACHICUM.

TINCTURA ANTIMONII ACRIS *Hoffmann.*

℞. Reguli Antimonii Uncias quatuor,

Nitri crudi Uncias octo:

Pulverifata detonentur; relinquantur in fusione per integram horam; effundantur in mortarium & cum constiterint, mox redigantur in pulverem, qui immittatur

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis duodecim:

Digerantur per aliquot dies calore balnei arenæ, & filtretur Tinctura ruberrima.

Si Spiritus Vini prius Saponis Unciis duabus in lixivio Caustico solutis & denuo inspissatis per biduum digeritur, surgit TINCTURA ANTIMONII SAPONATA *Schulzii* & satiore colore & majoribus viribus gaudens.

Multum laudatur a Virtute Resolvente, sed in Spiissitudine Humorū uti medicamento Alcohol continente, quod Humores serosos cogit, ego quidem non auderem.

Cl. DEHNE, laudanda omnino encheiresi, jubet ab hac Tinctura Spiritum usque ad consistentiam spilli Extracti abstrahere, & hoc deinde in Aqua dissolvere.

TINCTURA ANTIMONII TARTARISATI *BASILII VALENTINI.*

℞. Pulveris Antimonii Unciam unam,
Cinerum clavellatorum Uncias tres:
Fundantur in Crucibulo; effundantur in mortarium, & quamprimum constiterint; redigantur in Pulverem, qui fervens adhuc immittatur in

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias quatuor & viginti:
Post digestionem aliquot dierum filtretur Tinctura.

Huic Tincturæ, uti verum Sulphur Antimonii inhæret, ita efficacior, quam antecedenti virtus Resolvens inesse videtur. Sed quæ ad illam monuimus, huc quoque pertinent.

TINCTURA ANTIVENEREA *FALCKII.*

℞. Mercurii sublimati Scrupulum unum:
Dissolvatur in

Spiritus Vini rectificati Uncia una:

Addantur

Balsami Canadensis,

Gummi de Guajaco ana Uncia una,

Dissolutis in

Spiritus Vini Rectificati Unciis septem, & filtratis:

Adjiciantur

Olei destillati Sassafras Drachmæ duæ, Vitrum succutiendo dissolvendæ.

Hoc Medicamento, cujus decem ad viginti Guttae in vehiculo aquoso mane & sub vesperam exhibentur, inveteratos etiam Venereos morbos felicissime curari Auctor monet, & illud contra alias quoque Acrimonias commendat.

TINCTURA AURI *GEOFFROY.*AURUM POTABILE *HELVETII.*

℞. Auri per Antimonium depurati Drachmam unam,
Aqua Regis Unciam unam:

Solutioni affundantur

Olei destillati Rorismarini Unciæ duæ:

Relinquantur in quiete, quoad Aquæ Regis flavedo profus
evanuerit, absorpta quippe ab Oleo ipsi supernatante:

Hoc jam dissolvatur

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis octo.

*Cum Aurum nullius sit in Corpus humanum efficaciæ, quem
alium hæc Tinctura quam Aquæ Reginæ Hungariæ valde con-
centratæ effectum edere possit, non video. Dosis est ad Guttas
decem.*

TINCTURA BEZOARDICA *MICHAELIS.*

℞. Radicum Zedoariæ Uncias duas,

Angelicæ,

Pimpinellæ,

Valerianæ,

Vincetoxici,

Calami Aromatici ana Unciam unam,

Costi,

Flavedinis Corticum Citri recentium,

Baccarum Juniperi ana Uncias duas,

Myrrhæ Uncias tres,

Herbarum Scordii,

Melissæ,

Millefolii,

Rutæ ana Unciam semis,

Spiritus Vini simplicis Uncias duas & septuaginta:

Digerantur in Cucurbita per octiduum; tunc addantur

Theriacæ Andromachi Unciæ sedecim:

Destillatione eliciantur Spiritus Unciæ quatuor & viginti,
quibus addantur

Spiritus Tartari Unciæ sex,
Vitrioli Unciæ tres:

Diffolvatur his

Camphoræ Uncia una.

Ex copiosa, quæ apud Auctores, occurrunt, Bezoardicarum Tincturarum tribu, hanc unam produco, cui in Febris putridis locus esse subinde possit. Dosis est ad Drachmam dimidiam.

TINCTURA CORALLIORUM KUNRATH.

℞. Coralliorum rubrorum Uncias duas:

Diffolvantur

Aceti crudi quantitate sufficiente:

Solutio leni calore inspissetur; Sali inspissato affundantur

Spiritus Vini Unciæ sex:

Digerantur per aliquot dies; Tinctura filtretur.

Ex istis Coralliis in hanc Tincturam ne hilum quidem penetrare, ægrique somniis simillimas esse miras, quæ inde PARACELSISTÆ olim ostentabantur virtutes, suo itaque merito nostra ætate ejus usum eviluisse, quis non videt?

TINCTURA LACCÆ Danorum.

℞. Gummi Laccæ a baculis abradi Unciam unam,

Aluminis crudi sesqui Drachmam,

Aquarum Salviæ Uncias tres:

Rosarum Unciam unam semis:

Coquantur ad Extractionem Tincturæ rubræ, quæ filtretur.

Ad Laxitatem & Cruentationem Gingivarum adhibetur.

TINCTURA MARTIS APERITIVA

AROPH PARACELSI, ZWOELFFERI.

℞. Florum Salis Ammoniaci Martialium Unciam unam,

Spiritus Vini rectificatissimi Uncias quatuor:

Digerantur per quatuor & viginti horas; filtrentur.

Ejus Virtuti Aperienti sit sua laus; sed Flores Salis Ammoniaci

niaci Martiales citra ullam præparationem exhibiti eandem præstabunt.

TINCTURA MARTIS APERITIVA GLAUBERI.

℞. Vitrioli Martis Uncias quatuor,
Cremoris Tartari Uncias octo:

Coquantur cum
Aquæ Unciis centum

Ad consistentiam mellaginis; immittantur cucurbitæ & affundantur

Spiritus Vini simplicis Unciæ sexaginta,
Florum Papaveris Rhœados Manipulus unus:

Post aliquot dies Digesta filtrentur.

Vulgo a LUDOVICI solet denominari a GLAUBERO jam in Philosoph. Ofen. II. Cap. 70. descripta. Tonico scopo a gravioribus morbis reconvalescentibus ad Drachmam dimidiam cum Aqua Cinnamomi exhibetur.

TINCTURA MARTIS CYDONIATA, POMATA &c.

℞. Extracti Martis Cydoniati, Pomati &c. Unciam unam:
Diffolvatur

Aquæ fontanæ Unciis duodecim:

Filtrentur.

Valide adstringit: datur ad Drachmam unam pro Dosi.

TINCTURA MARTIS HELLEBORATA WEDELII.

℞. Tincturæ Martis Aperitivæ GLAUBERI Uncias quatuor:
In quibus dissolvantur

Extracti Hellebori nigri Drachmæ duæ:

Solutio filtrata fervetur.

Ad aperienda Viscera Abdominalia datur ad Drachmam unam pro Dosi.

TINCTURA MARTIS ZWOLFFERI.

℞. Terræ foliatæ Tartari nigrae Uncias tres,
PARS II. V v

Vitrioli Martis Uncias duas:
 Redigantur cum
 Aquæ quantitate sufficiente
 In pastam, cui per aliquot dies asservatæ affundantur
 Spiritus Vini Unciæ quatuor & viginti:
 Per tres dies in Balneo Mariæ digestæ filtrentur.
Cum antecedente usu suo coincidit.

TINCTURA METALLORUM *MÆTS.*

℞. Reguli Antimonii Martialis Uncias duas,
 Cupri,
 Stanni Anglici ana Unciam unam:
 Cupro in crucibulo fluenti adjiciantur duo reliqua Metalla:
 Metallum refrigeratum redigatur in Pulverem & commisceatur cum
 Nitri Unciis duodecim:
 Detonentur & post detonationem per integram adhuc horam detineantur in fluxu; tunc effundatur massa, & quam primum confiterit, reducatur in Pulverem immittendum
 Alcoholis Vini Unciis viginti:
 Ex Digestione calida orta Tinctura filtretur.
Hoc medicamentum, cum suam virtutem perinde ac Tinctura Antimonii acris solummodo Nitro caustico debeat, ejusdemplane cum ista tenoris esse censendum est.

TINCTURA RHABARBARI

INFUSUM RHEI SALINUM *Suecorum.*

℞. Aceti vulgaris Uncias novem:
 Saturentur
 Salis Tartari quantitate sufficiente:
 Liquor saturatus digeratur cum
 Rhabarbari minutim contusi Uncia una:
 Duodecim horis post filtretur.
Egregium ad referandas Obstructiones abdominales restituentamque Digestionem Medicamentum. Exhibetur ad Unciam semis pro dosi.

TINCTURA SALINA *Danorum.*

℞. Corticum Aurantiorum recentium,
 Radicum Gentianæ ana Uncias tres:
 Concisa infundantur
 Aquæ fontanæ Unciis sex & triginta,
 Salis Tartari Unciis duodecim:
 Digerantur per quatrimum; Colatis addantur
 Spiritus Vini rectificati Unciæ octodecim:
 Filtrentur.

*Aperiendi scopo in Obstructionibus Viscerum Abdominalium
 ad Drachmas duas pro dosi datur.*

TINCTURA STOMACHICA *Danorum.*

℞. Radicum Calami aromatici,
 Gentianæ ana Sesquiunciam,
 Corticum Chinæ Uncias duas,
 Aurantiorum recentium,
 Herbæ Cardui benedicti,
 Summitatum Centaurii minoris ana Unciam unam,
 Limaturæ Martis in petia ligatæ Uncias duas:
 Incisa digerantur frigide cum
 Vini albi Unciis centum:
 Post triduum filtrentur.

*Ventriculi roborandi causa sumitur ad unum Cyathum, una
 ante prandium hora.*

TINCTURA STOMACHICA *WHYTT.*

℞. Radicis Gentianæ,
 Corticum Aurantiorum ana Sesquiunciam,
 Chinæ Chinæ Uncias quatuor:
 Incisa digerantur per sex dies in Balneo arenæ cum
 Spiritus Vini rectificati Unciis octo & quadraginta:
 Filtrentur.

*Hujus Tincturæ Cochlear unum, aquæ Cochlearibus sex dilu-
 tum, mane & vesperi exhibetur in languore Ventriculi. Contra*

Arthritidem quoque usus ejus laudatur, per plures menses continuandus.

TINCTURA SULPHURIS ZWÆLFFERI.

℞. Florum Sulphuris Unciam unam,
Salis Tartari Uncias duas:

Misceantur, fundantur & cum constiterint, reducantur in Pulverem committendum

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis octo:

Post digestionem aliquot dierum filtretur Tinctura.

Commendatur adversus Scabiem aliosque morbos ab Humoribus acribus oriundos. Datur ad Guttas sexaginta.

TINCTURA TARTARI RAYMUNDI LULLII.

℞. Salis Tartari Uncias octo,
Calcis vivæ Uncias tres:

Fundantur in Crucibulo per integram horam; effundantur & simulac constiterint, reducantur in Pulverem committendum

Spiritus Vini rectificatissimi Unciis quatuor & viginti:

Post Digestionem aliquot dierum filtretur Tinctura.

Viribus cum Tinctura Antimonii acri convenit.

TRAGEA ALBA *Argentoratensium.*

℞. Radicum Liquiritiæ,
Ireos Florentinæ ana Drachmas tres,
Gummi Arabici Unciam unam,
Tragacanthæ Unciam semis,
Amyli Uncias quinque,
Sacchari Uncias sedecim:

Misceantur & reducantur in Pulverem.

Demulcendi ergo in morbis ab Acri oriundis exhiberi potest. Olim frequens ejus apud nostrates usus erat in Torminibus infantum arcendis & curandis.

TRAGEA AROMATICA.

℞. Cinnamomi Drachmas duas,
Zinziberis Drachmam unam,

Caryophyllorum aromaticorum,

Calangæ minoris,

Granorum Paradisi,

Macis,

Nucis Moschatae ana Drachmam semis:

Mixta reducantur in Pulverem crassiusculum, cui admisceantur

Pulverum Santali rubri Drachmas sex,

Sacchari Unciæ sedecim.

Ventriculum roborandi ergo pani tosto Vino rubro madenti inspergitur. Dosis ad Unciam dimidiam extenditur.

TRAGEA GRANORUM ACTES *WOLFFII*,

Succo baccarum Sambuci imbuatur Farina Secalina, ex qua bene depsta formentur parvi panes in furno ad duritiem coquendi; cocti redigantur in pulverem, iterum Succo baccarum Sambuci imbuendum, deprendum, in panes formandum, quibus coctis, in pulverem tritis, quin tertia etiam vice toto negotio repetito, adjiciatur obtento denique pulveri ponderis ejus octava pars de Nuce Moschata in pulverem trita.

Olim hujus Medicamenti Drachmæ duæ exhibebantur Dysentericis; hodie evuluit.

TRAGEA OPHTHALMICA *HEISTERI*.

℞. Millepedum,

Seminum Anisi,

Fœniculi ana Unciam dimidiam,

Radiciſ Valerianæ Drachmas duas,

Cinnamomi,

Cubearum ana Drachmam unam,

Sacchari albi Uncias duas:

Redigantur in pulverem & misceantur.

Attenuandis Humoribus Oculorum adhibetur.

TROCHISCI.

Ex quocunque Pulvere formari possunt, siquidem ipsi ea, quæ par est, quantitas Mucilaginis Tragacanthæ adjicitur, ut massa inde surgat digitis non adhærens. Hujus massæ particulæ in orbiculos formatae, alterutri superfici ei qualicunque signo impresso, appellantur *Trochisci* sive *Tabellæ*, in aliam qualemcunque formam coactæ *Pastilli*.

TROCHISCI ALBI *RHASIS* VULGO
COLLYRIUM ALBUM *RHASES*.

- ℞. Cerussæ albæ Drachmas decem,
Sarcocollæ Drachmas tres,
Amyli Drachmas duas,
Tragacanthæ Drachmam unam,
Opii Drachmam unam:

Misceantur in Pulverem.

Parisini Opio Camphoram substituunt.
Extus contra Ophthalmiam adhibetur.

TROCHISCI ALHANDAL *MESUE*.

Ex Pulpa Colocynthidis, cortice feminibusque rejectis addita Mucilagine Tragacanthæ Trochisci formantur. Hodie pulvis ipse hoc nomine asservatur, cum quæ a virulentia medicamentorum metuuntur noxæ, prudenti potius administratione Medici, quam remediis corrigentibus sunt avertendæ.

TROCHISCI ALIPTÆ *NICOLAI*.

Eis substituuntur TROCHISCI FUMALES.

TROCHISCI ALKERMES *Argentoratensium*.

- ℞. Confectionis Alkermes completæ Drachmam unam semis,
Coccionellæ pulverifatæ Grana quinque,
Salis Tartari Grana tria,
Sacchari albi Uncias tres,

Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis:
 Misceantur & fiant lege artis exigui Trochisci.

*Cardiaco & Cephalico scopo nec non ad corrigendum Oris fœ-
 torem adhibentur.*

TROCHISCI SIVE TABULÆ ALTHÆÆ *Parisiensium.*

℞. Radicum Althææ Unciam unam,
 Ireos Florentinæ Drachmam unam,

Sacchari albissimi Uncias fedecim:

Misceantur, redigantur in pulverem &

Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis

Fiant Trochisci.

Cum Pasta Althææ quoad Vires conveniunt.

TROCHISCI BECCHICI ALBI *VALERII CORDI.*

℞. Pulveris Radicis Ireos Florentinæ Uncias duas,

Amyli Uncias duas semis,

Pulveris Sacchari albissimi Uncias quatuor & viginti,

Mucilaginis Tragacanthæ quantum fatis:

Fiant lege artis Trochisci.

Exhibentur Tuffientibus.

TROCHISCI BECCHICI CITRINI *Hamburgensium.*

℞. Radicis Liquiritiæ Unciam unam,

Croci Drachmam unam,

Sacchari albissimi Uncias fedecim:

Pulverifentur, misceantur & cogantur cum

Mucilaginis Tragacanthæ quanto sufficiente in Trochiscos.

Resolvendi vim habent majorem etiam, quam proxime prædicti.

TROCHISCI BECCHICI NIGRI *Hamburgensium.*

℞. Radicum Ireos Florentinæ Uncias tres,

Liquiritiæ,

Seminum Anisi,

Fœniculi ana Uncias quinque,

Succi Liquiritiæ Uncias novem,

Styracis Calamitæ Unciam unam,
 Sacchari albi Uncias sex & nonaginta:
 Pulverifentur, misceantur additaque
 Mucilagine Tragacanthæ
 In Trochiscos efformentur.
Supraprolatis omnibus efficaciores sunt.

TROCHISCI CYPHEOS vulgo CYPHOIDES *GALLI.*

℞. Pulpæ Passularum Uncias duas cum dimidia,
 Terebinthinæ Chiæ Drachmas sex,
 Gummi Bdellii Unciam Semis,
 Myrrhæ,
 Ligni Aloës,
 Croci,
 Cinnamomi,
 Spicæ Indicæ,
 Cassiæ lignæ ana Drachmam unam,
 Schœnanthi Drachmas tres,
 Calami Aromatici Drachmas duas,
 Mellis Uncias quinque,
 Vini Græci quantum satis:
 Misceantur.

Hoc Medicamentum eo, quod in compositiones, quæ a Veteribus ad nos descenderunt, etiamnum recipi solet, hic præterire nolui.

TROCHISCI ESCHAROTICI *Parisiensium.*

℞. Minii Unciam semis,
 Mercurii sublimati corrosivi Unciam unam,
 Micæ panis recentis Uncias quatuor:
 Optime mixta cogantur in Pastillos granum Avenæ æquantes.
Catharetico scopo a Chirurgis adhibentur.

TROCHISCI FUMALES *SCHRÆDERI.*

℞. Florum Rosarum rubrarum Unciam unam,
 Ligni Rhodii Drachmas sex,
 Caryophyllorum

Caryophyllorum Drachmas duas,
 Benzoës Uncias sedecim,
 Styracis Uncias septem,
 Sacchari Uncias octo:
 Pulverifentur, misceantur; fiant cum Mucilagine Tragacanthæ Trochisci.

Vires ex nomine patent.

T R O C H I S C I H E D Y C H R O I M A G N I .

℞. Radicum Calami aromatici,
 Phu,
 Costi,
 Asari,
 Schoenanthi,
 Cassiæ lignæ ana Drachmas sex,
 Ligni Aloës Sefquiunciam,
 Cinnamomi,
 Cardamomorum excorticatorum ana Uncias tres,
 Herbarum Majoranæ,
 Mari veri ana Sefquiunciam,
 Spicæ Indicæ Uncias duas,
 Foliorum Malabatri,
 Gummi Mastichis ana Drachmas sex,
 Myrrhæ Uncias tres,
 Croci Sefquiunciam,
 Balsami de Meccha Drachmas sex,
 Vini Græci quantum satis pro formandis Trochiscis:
Ingrediuntur Theriacam.

T R O C H I S C I H E R M E T I C I S C R E T Æ .

℞. Mercurii dulcis Drachmas quinque,
 Cinnamomi acuti Grana quadraginta,
 Resinæ Jalappæ Pineis tritæ, Grana quinque & septuaginta,
 Sacchari albi Sefquiunciam:
 Exactissime trita redigantur cum

PARS II.

X x

Mucilagine Tragacanthæ in Trochiscos centum.

Scopo Anthelmintico dantur Infantibus , ut plurimum eorum ætati numero adæquato , sed ultra decem non augetur numerus.

TROCHISCI SIVE MUSCERDÆ CATECHU.

℞. Pulverum Terræ Catechu Unciam unam ,
Sacchari Unciam femis ,
Caryophyllorum Scrupulum unum ,
Quintæ Essentiæ Citri Scrupulum femis :

Misceantur & redigantur ope Mucilaginis Tragacanthæ in Pastillos teneros, oblongos.

Detinentur sub lingua Fætori animæ avertendo.

TROCHISCI DE NITRO.

℞. Nitri depurati Unciam unam ,
Sacchari albi Uncias sex ,
Succi Citri Unciam unam :

Misceantur & cum Mucilagine Tragacanthæ redigantur in Trochiscos.

Cum summo successu ad sedandum Ardorem Sanguinis & mitigandam Tussim adhibentur.

TROCHISCI PECTORALES REGII Danorum.

℞. Succi Liquiritiæ ,
Sacchari ana Unciam unam ,
Extracti Opii Grana quatuor :

Pulveriscentur; misceantur exactissime & formentur in Trochiscos granum Piperis æquantes.

Egregie contra Tusses spasmodicas conducunt.

TROCHISCI SEU ROTULÆ BECCHICÆ *Parisiensium*:

CONFECTIO DE REBECHA.

℞. Pulverum Ireos Florentinæ ,
Gummi Arabici ana Unciam femis ,
Liquiritiæ Unciam unam femis ,

Sacchari albissimi Uncias octo & quadraginta:
 Misceantur, additaque Mucilagine Tragacanthæ, ope Aquæ
 Florum Naphæ parata, fiant vel Trochisci vel Pastilli.
A Tussientibus in usum trahuntur.

TROCHISCI REFRIGERANTES.

℞. Nitri depurati Unciam unam,
 Salis Acetofellæ Unciam semis,
 Sacchari albissimi Uncias sex,
 Quintæ Essentiæ Citri Scrupulum semis:
 Misceantur & cum Mucilagine Tragacanthæ redigantur in Tro-
 chiscos.
Aprime Refrigerant & Sitim sedant.

TROCHISCI DE SCILLA DAMOCRATIS.

Scillæ præparatæ, antequam ejus lamellæ exsiccatae fuerint,
 admisceatur Farinæ Ervi tantundem & formentur Pastilli.
Ingrediuntur Theriacam.

TROCHISCI VIPERINI ANDROMACHI.

Viperæ capite & cauda truncatæ, detracta cute & rejectis
 visceribus coquantur ex aqua, cui aliquantulum Foliorum Anethi
 & Salis cibarii fuerit immixtum, usque dum caro a spina secesse-
 rit; hæc caro contusa cum Panis Siliginei ea, qua par est, quan-
 titate in Trochiscos formetur.
Recipiuntur in Theriacam.

TRYPHERA MAGNA GALENI.

℞. Opii Uncias duas,
 Cinnamomi,
 Caryophyllorum,
 Galangæ,
 Spicæ,
 Zinziberis,
 Costi,
 Styracis,

348 TROCHISCI TURPETHUM.

Calami aromatici,
Cyperi rotundi,
Ireos Florentinæ,
 Nostratis,
Peucedani,
Mandragoræ,
Lavendulæ,
Rosarum,
Piperis,
Anisi,
Apii,
Fœniculi,
Petroselinæ Macedonici,
Dauci,
Ocymiana Unciam unam:
Redigantur in Pulverem, misceantur & cum
 Mellis quantitate sufficiente
Fiat Electuarium:
A quibusdam scopo Anodyno, maxime contra Tormina, substituitur Theriacæ.

TURPETHUM MINERALE CROLLII.

MERCURIUS EMETICUS FLAVUS *Londinensium.*

℞. Mercurii vivi Uncias quatuor:

Unde abstrahantur

Olei Vitrioli Unciæ sex:

Sali in Retorta remanenti affundatur aqua fervida; Pulvis citrinus, qui ad fundum secedit, probe edulcoratus affervetur. Aqua evaporata gignit Salem, qui deliquium patitur, & *Oleum Mercuriale* nominari solet.

Turpethum minerale ad quinque usque Grana exhibebatur olim ad oppugnandum virus Venereum; recentiori ætate contra Hydrophobiam laudabatur; his vero nostris temporibus cum medicamenta Mercurialia tutiora existant, Drastico sursum & deorsum vehementius æquo purgante jure meritoque abstinemus. OLEUM MERCURIALE Vires rodentes edit.

VINUM AMARUM *Edinburgensium.*

℞. Radicis Gentianæ Unciam semis,
 Corticum Chinæ Unciam unam,
 Aurantium recentium Unciam semis,
 Winterani Drachmam unam:

Infundantur calide cum

Spiritus Vini simplicis Unciis quatuor:

Refrigeratis addantur

Vini albi Hispanici Unciæ quatuor & viginti:

Post macerationem quatuordecim dierum filtretur liquor.

Ad roborandum Ventriculum datur cochleatim.

VINUM ANTIMONIATUM *HUXHAM.*

℞. Vitri Antimonii Unciam unam:

In tenerum pulverem redactæ adjiciantur

Vini Hispanici Unciæ quatuor & viginti:

Digerantur per biduum; filtretur liquor.

Resolvendi & Sanguinem depurandi causa pueris ad Scrupulum unum, adultis ad Drachmam unam exhibetur; Vomendi scopo illis ad Unciam semis, his ad Sesquiunciam datur.

VINUM ANTISCORBUTICUM *DUMORETTE.*

℞. Radicum recentium Raphani rusticani Uncias duodecim,
 Bardanæ Uncias quinque,

Foliorum recentium Cochleariæ,
 Nasturtii aquatici,
 Beccabungæ,
 Fumariæ,

Seminis Sinapi ana Uncias sex,

Salis Ammoniaci Uncias tres:

Incisa & contusa infundantur cum

Vini albi Unciis tercentenis & octoginta per octiduum:

Expressa filtrentur.

Datur per cyathos.

VINUM CHALYBEATUM *Danorum.*

℞. Limaturæ Ferri Uncias quatuor,
 Cinnamomi,
 Macis ana Unciam semis:
 Crassiufcule contufa misceantur & infundantur cum
 Vini Rhenani Unciis octo & quadraginta:
 Digerantur per mensem sub frequenti agitatione in vase claufo,
 deinde colentur.

Ad roboranda Viscera Chylopoïetica exhibetur per cyathos.

VINA PER CONFERMATIONEM PARATA.

Vegetabilis qualiscunque incisi Unciæ centum immittantur
 Musti recens expressi Unciis octingentis; finita fermentatio-
 ne Vinum a fæcibus detractum affervetur.

VINUM EMETICUM.

Videatur AQUA BENEDICTA *RULANDI.*

VINUM HIPPOCRATICUM *ALEXANDRI BENEDICTI.*

℞. Cinnamomi Uncias tres semis,
 Zinziberis Unciam dimidiam,
 Caryophyllorum aromaticorum,
 Cardamomorum minorum excorticorum,
 Nucum Moschatarum ana Drachmas duas:
 Contufa in pulverem crassum infundantur per aliquot dies cum
 Vini rubri Unciis quadringentis & quinquaginta:
 Colentur per manicam Hippocratis; in colatura dissolvantur.
 Sacchari albi Unciæ sex & nonaginta:
 Colentur denuo.

*Tam voluptatis, quam Ventriculi roborandi gratia bibitur
 per cyathos.*

VITRIOLUM MARTIS *BASILII VALENTINI.*

SAL MARTIS *Londinensium.*

℞. Limaturæ Martis Uncias octo,

VITRIOL. VITR. UNGUENT. 351

Spiritus Vitrioli Uncias triginta duas,

Aquæ Uncias duodecim:

Peracta solutione, calore etiam adjuvanda, liquor redigatur in Crystallos.

Tonum restituendi, Obstructiones referandi, Hæmorrhagias sistendi, Vermes necandi causa exhibetur; Dosis ad octo Grana extendi potest.

VITRUM ANTIMONII *BASILII VALENTINI.*

℞. Antimonii quantum lubet:

Ustuletur, usque dum nullos ulterius vapores Sulphur redolentes dimittat; calx hac ratione parata fundatur per unam circiter horam in crucibulo; quo factò effundatur.

Medicamentum olim ab Auctoribus non infimæ notæ ciendi Vomitus causa vel ad novem usque grana exhibitum, cum hodie constet æquo vehementius Primas irritare Vias, per se non amplius datur.

VITRUM ANTIMONII CERATUM *Edinburgensium.*

℞. Cerae citrinæ Drachmam unam:

Liquefactæ immittatur

Vitri Antimonii Uncia una:

Sub perpetua agitatione detineantur per dimidiam horam super ignem; effundantur in chartam, materia refrigerata redigatur in pulverem.

In Dysenteria & Hæmorrhagia Uteri egregios effectus præstitisse, egregii Auctores testantur.

Dosis a Granis quinque ad decem usque extenditur.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM *HILDANI.*

MEL ÆGYPTIACUM *Londinensium.*

OXYMEL ÆRUGINIS *Suecorum.*

℞. Viridis Æris Uncias quinque,

Aceti Uncias septem,

Mellis Uncias quatuordecim:

Mixta coquantur in consistentiam Unguenti.

*Medicamentum, improprie Unguentum dictum, ad depuranda
Ulcera sordida & fistulosa adhibetur.*

UNGUENTUM ALBUM MONTAGNANÆ.

℞. Axungię Porcinę Uncias sedecim,
Ceruffę albę Uncias octo:
Misceantur.

Ad Ambusta & Intertriginem adhibetur.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM MANLIJ.

℞. Unguenti albi simplicis Uncias duodecim,
Camphorę Drachmas tres;
Misceantur.

Valet ad Refrigerandum levioresque Discutiendas Inflammationes.

UNGUENTUM ALTHÆÆ PRÆPOSITI.

℞. Mucilaginum Radicum Althęę Uncias sedecim,
Seminum Fœnugręci,
Lini ana Uncias octo,

Butyri Uncias quatuor & sexaginta:

Coquantur ad consumptionem humiditatis:

Addantur

Cerę flavę Uncię sedecim,

Resinę Uncię sex,

Terebinthinę Uncię duę:

Liquatis ingeratur

Pulveris Radicis Curcumę Uncia una:

Misceantur.

Emolliendi & Resolvendi scopo adhibetur.

UNGUENTUM AD AMBUSTA *Pharmacop. Charas 1753.*

℞. Foliorum Sambuci,
Hyoscyami,
Solani scandentis,
Stramonei ana Manipulum unum,

Axungię

Axungię Porcinę Uncias duas & triginta:
 Coquantur ad confumptionem humiditatis & ferventur colata.
Vires ex nomine patent.

UNGUENTUM ANODYNUM *Brandeburgensium.*

℞. Radicum recentium Althęę Uncias duas,
 Herbarum recentium Anethi,
 Hyóscyami,
 Malvę,
 Florum recentium Meliloti,
 Verbafci ana Unciam unam,
 Chamomillę Uncias duas & triginta,
 Seminum Lini,
 Fęnuigręci ana Drachmas tres:
 Incifa & contufa coquantur cum
 Olei Olivarum Unciis duabus & triginta:
 Ad confumptionem humiditatis, in colaturá colliquentur
 Cerę flavę Uncię quatuor:
 Mifceantur.
Relaxando vires Paregoricas edit.

UNGUENTUM APOSTOLORUM SEU DODECAPHAR-
 MACUM *AVICENNÆ.*

℞. Lithargyrii Unciam unam,
 Viridis Ąris Drachmas tres:
 Diffolvantur coquendo cum
 Olei Olivarum Unciis fex & triginta,
 Aceti Unciis duabus:
 Lipientur in coctis
 Terebinthinę,
 Refinę,
 Cerę ana Uncię duę,
 Addantur denique
 Pulverum Aristolochię longę,
 Olibani,

Pulverum Bdellii,
 Myrrhæ,
 Galbani ana Uncia dimidia,
 Oppoponacis Drachmæ duæ:

Misceantur.

Detergendis Ulceribus adhibetur:

UNGUENTUM DE ARTHANITA *MESUE.*

℞. Succorum Cyclaminis Uncias fedecim,
 Cucumeris agreffis,
 Butyri ana Uncias quinque femis,
 Olei Olivarum Uncias undecim,
 Polypodii Uncias duas,
 Pulpæ Colocynthis Unciam unam femis:

Coquantur ad confumptionem humiditatis:

In colatura liquentur

Ceræ flavæ Unciæ duæ :

Addantur

Pulverum Aloës,
 Baccarum Mezeræi,
 Colocynthis,
 Scammonei,
 Turpethi ana Drachmæ duæ femis,
 Euphorbii Scrupuli septem,
 Salis Gemmæ,
 Florum Chamomillæ,
 Myrrhæ,
 Piperis longi,
 Zinziberis ana Drachma una femis,
 Fellis Tauri inspiffati,
 Sagapeni ana Drachmæ duæ :

Probe misceantur.

Hujus Unguenti, Abdomini inungendi, laus in movenda Alvo puerorum, nec non eorum omnium ponitur, quorum palatum difficile hauriendis Purgantibus reluctatur; quin & ad necandos Vermes expellendasque Hydropicorum aquas adhiberi solet.

UNGUENTUM BASILICUM *MESUE.*

TETRAPHARMACON *GALENI.*

℞. Cerae,
 Picis navalis,
 Resinae ana Uncias duodecim,
 Olei Olivarum Uncias octo & quadraginta:

Leni calore liquata colentur.

Ad Digerendum Suppurationemque promovendam valet.

UNGUENTUM BERNHARDINUM *WECKER.*

℞. Axungiae Porcinae Uncias octodecim,
 Olei Rosarum Uncias sex,
 Pulverum Sulphuris citrini Uncias novem,
 Caryophyllorum,
 Granorum Paradisi,
 Zinziberis ana Unciam unam semis:

Probe misceantur.

Scabiem prohibet.

UNGUENTUM CONTRA CANCRUM APERTUM

JACOBI.

℞. Vitri Antimonii in tenerrimum Pulverem triti Unciam unam:

Cogatur cum

Olei Vitrioli quantitate sufficiente in pastam:

Affundatur

Acetum gelu concentratum ad eminentiam trium digitorum:

Post digestionem calidam per triduum institutam filtretur liquor, ejusque ope paretur, ratione suo loco dicta, Acetum Saturni; miscendum agitando cum duplo Balsami Sulphuris, parati ex Sulphure impuro, quod sub praeparatione Sulphuris Aurati Antimonii obtinetur, cum Olei Papaveris octuplo cocto.

Ulcus Cancrosum saluberrima hujus medicamenti vi felicissime extinctum fuisse asseverat Auctor N. A. N. C. T. I. p. 235.

UNGUENTUM CARDIACUM *SCHRÆDERI.*

℞. Herbarum recentium Cardiacæ,
 Chamædryos,
 Malvæ,
 Sēnecionis,
 Solani scandentis,
 Scabiosæ,
 Sempervivi,
 Alfines,
 Jaceæ ana Manipulos duos:

Incisa coquantur cum

Butyri Unciis centum & viginti octo ad consumptionem humiditatis;

Colatura fervetur.

Olim in frequenti usu erat contra Cardiagmum Infantum.

UNGUENTUM CARMINATIVUM *Brandeburgensium.*

℞. Summitatum recentium Abrotani,
 Hederæ terrestris,
 Menthæ crispæ,
 Tanaceti,
 Florum recentium Meliloti ana Manipulum unum,
 Chamomillæ Manipulos duos,
 Baccarum Lauri Unciam semis,
 Seminum Cumini,
 Levistici ana Drachmas duas:

Incisa & contusa infundantur per quatuordecim dies in

Oleorum Chamomillæ Unciis duodecim,

Anethi,

Ruthæ ana Uncia semis,

Axungie porcine Unciis duodecim:

Coquantur inde ad consumptionem humiditatis: colatura liquentur

Ceræ Unciæ duæ:

Semirefrigeratis immisceantur

Oleorum destillatorum Anisi,
Menthæ,
Carvi ana Drachma una.

Illinitur Abdomini contra Intestinorum tormina.

UNGUENTUM CLYSMATICUM *Augustanorum.*

℞. Radicum recentium Althææ,
Liliorum alborum ana Uncias duas,
Herbarum recentium Parietariæ,
Malvæ,
Mercurialis ana Unciam unam semis,
Althææ,
Violariaë,
Florum recentium Chamomillæ,
Melilotiana Unciam unam:

Incisa coquantur cum

Butyri Unciis duabus & triginta ad consumptionem humiditatis;
Colatura fervetur.

Clysmatibus Emollientibus ad tres usque Uncias adjicitur.

UNGUENTUM COMITISSÆ *VARIGNANÆ.*

℞. Radicis Tormentillæ,
Foliorum Pruni filvestris,
Quercus,
Plantaginis,
Equiseti,
Corticum Castanearum,
Quercus,
Glandium,
Calicum Glandium,
Baccarum Myrti,
Gallarum,
Sorborum,
Mespilorum ana Unciam semis:

Incisa coquantur cum

Succi Agrestæ Unciis duabus,

Aquæ,

Vini rubri ana Unciis duodecim,

Olei Myrtillorum Unciis octodecim ad consumptionem humiditatis;

In colatura liquentur

Ceræ Unciæ octo semis:

Addantur

Olei Mastychini Unciæ octodecim,

Pulverum Corticum Quercus,

Sanguinis Draconis,

Nucis Moschatae,

Succi Hypocistidis,

Baccarum Myrti,

Sorborum,

Succini,

Florum Balauftiorum,

Mastychis,

Gummi Laccæ ana Uncia semis:

Misceantur probe.

Ad præcauendum Abortum facere VARIGNANA & SCHULZ sunt experti; ad Hæmorrhagiam Uteri, nimias Hæmorrhoides, Ani & Uteri Prolapsum, nec non ad Incontinentiam Urinæ laudatur, inungendum Abdomini, Lumbis & Femoribus.

UNGUENTUM DIGESTIVUM *Hamburgensium.*

℞. Terebinthinæ Argentoratensis Uncias octo:

Subigantur cum

Vitellis ovorum Numero quatuor

Addantur

Olei Hyperici Uncia una semis,

Pulverum Olibani,

Myrrhæ ana Drachmæ tres:

Misceantur.

Remedium polychrestum ad sustentandam Suppurationem aptatum.

UNGUENTUM DODECAPHARMACUM.

Videatur Unguentum Apostolorum.

UNGUENTUM ENULATUM *Coloniensium.*

℞. Radicum Enulæ recentium Uncias sedecim:

In pulvem contusæ coquantur cum

Axungiaë porcinaë Unciis octo,

Olei Olivarum Unciis quatuor, ad consumtionem humiditatis;

Colatura liquentur

Ceræ,

Terebinthinæ ana Uncia una.

Misceantur.

Contra affectus Cutaneos adhibetur.

UNGUENTUM FUSCUM *Paristensium.*

℞. Axungiaë Porci,

Butyri,

Sevi Vervecini ana Uncias sedecim,

Olei Olivarum Uncias duas & triginta:

In lebete vivide ferventibus addantur

Lithargyrii Unciæ sedecim:

Sub perpetua agitatione coquantur, donec colorem induerint

fuscum; quo factò liquentur in eis

Ceræ Unciæ sedecim.

Hoc Unguentum Gallis sub nomine ONGUENT DE LA MERE venit, tam Digerendis quam Abstergendis Ulceribus adhibendum.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE *PLENCK.*

℞. Unguenti Nutriti Drachmas sex,

Olei cocti Hyofcyami Drachmas duas,

Pulveris Croci Scrupulum unum,

Camphoræ Oleo subactæ Scrupulos duos:

Misceantur.

Hæmorrhoides cæcas discutit; Dolores earum sedat.

UNGUENTUM DE LINARIA *PLENCK.*

℞. Herbarum Linariæ Uncias duodecim,

Sempervivi Uncias duas,
 Hyofcyami Unciam unam:
 Contufa macerentur per aliquot dies cum
 Butyri Unciis octodecim:
 Coquantur deinde ad confumptionem humiditatis & exprimantur.

Specifice commendatur contra Hæmorrhoides cæcas.

UNGUENTUM DE LIQUIRITIA *Auguſtanorum.*

℞. Radicum Liquiritiæ recentium in pultem contufarum,
 Butyri ana Uncias fedecim:

Coquantur ad confumptionem humiditatis:

Prelo expreffis addantur

Pompholygos Drachmæ ſex,

Ceruffæ Unciæ tres,

Camphoræ, paululo Olei ſubactæ Scrupuli duo:

Mifceantur.

Ad Intertriginem, Excoriationes, Fiſſuras Papillarum adhibetur.

UNGUENTUM DE LITHARGYRIO,
 NUTRITUM, TRIAPHARMACUM *MESUE.*

℞. Lithargyrii Uncias ſex,
 Olei Olivarum Uncias octodecim,
 Aceti fortis Uncias ſex:

In vafe vitreato prunis ſuperimpoſito probe agitentur, donec penitus coierint.

Laudatur ad Ambuſtiones, Excoriationes &c.

UNGUENTUM MARTIATUM *NICOLAI.*

℞. Foliorum recentium Lauri Uncias octo,
 Rutæ Uncias quinque,
 Majoranæ Uncias quatuor,
 Roriſmarini Uncias tres,
 Myrti,

Ebuli,

Foliorum recentium Ebuli,
 Menthæ,
 Basilici ana Unciam unam:
 Incisa infundantur per aliquot dies cum
 Olei Olivarum Unciis sedecim,
 Butyri recentis,
 Axungiarum Urſi,
 Gallinæ,
 Medullæ Cervi ana Drachmis sex:
 Coquantur ad consumptionem humiditatis; expreffis & cola-
 tis liquentur
 Cerae Unciæ octo:
 Refrigeratis adjiciantur
 Pulverum Styracis Drachmæ quinque,
 Maſtyches Uncia femis,
 Olibani Drachmæ tres:

Misceantur.

*Partibus debilitatis & Abdomini infantum Torminibus labo-
 rantium inungitur.*

UNGUENTUM MATURATIVUM REINESII.

Vix differt ab Unguento Digestivo.

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM PLENCK.

UNGUENTUM AD SCABIEM ZELLERI.

℞. Mercurii præcipitati albi Unciam femis,
 Unguenti Roſati Uncias tres femis:

Probe miſceantur.

Contra Scabiem & Herpetem commendatur.

UNGUENTUM DE MINIO CAMPHORATUM

FLORENTINI.

℞. Unguenti de Lithargyrio Uncias quindecim:
 Cum his ſubigantur

Camphoræ Drachmæ duæ:

PARS II.

Z z

Addantur

Minii Uncia una semis,

Tutiæ præparatæ Drachmæ duæ:

Misceantur.

Ambustis & serpentibus Ulceribus obnilitur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS *POTERII.*

℞. Foliorum Nicotianæ Manipulos sex,

Butyri Uncias quatuor & viginti,

Terebinthinæ Uncias quatuor:

Mixta insolentur per octiduum, tum exprimantur:

Denique immisceantur ipsis

Pulverum Gummi Ammoniaci,

Galbani ana Unciæ duæ,

Antimonii crudi,

Cinnabaris ana Drachmæ tres,

Myrrhæ,

Olibani ana Drachmæ duæ.

In Ulceribus fistulosis sanandis magnopere ab Auctore laudatur.

UNGUENTUM MUNDIFICANS *STAHLII.*

℞. Mercurii vivi,

Plumbi ana Unciam unam:

Fiat Amalgama secundum artem, quod probe teratur cum

Terræ Tripolitanæ Uncia una:

Hic pulvis permisceatur penitissime cum

Unguenti albi Camphorati Unciis octo.

Commendatur ad extinguendas Efflorescentias Cutis scabiosas siccas & pruriginosas.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM *Parisiensium.*

℞. Axungia Porcinæ,

Mercurii vivi ana quantum libuerit:

Probe terantur, donec omnes globuli Mercuriales disparuerint.

Adhibetur ad Frictiones, quæ, qua solertia sint administran-

dæ, Chirurgia docet. Si Mercurio duplum aut quadruplum Axungię adjeceris, surgit UNGUENTUM CÆRULĒUM FORTIUS ET MITIUS Londinensium.

UNGUENTUM NERVINUM *Suecorum.*

℞. Sevi Ovilli Uncias octo :
 Leni calore liquatis addantur
 Oleorum Laurini Unciæ duodecim,
 destillatorum Terebinthinæ Uncia una,
 Succini Uncia semis :

Subigantur probe.
Roborandis Membris inungitur.

UNGUENTUM DE NICOTIANA *JOUBERTI.*

℞. Foliorum Nicotianæ incisorum Uncias quatuor & viginti,
 Succi Nicotianæ Uncias quatuor cum semisse,
 Axungię porcinae Uncias duodecim :

Macerentur per noctem, deinde coquantur ad confumptionem
 humiditatis, & expressis liquentur
 Resinæ Uncia una semis,
 Cerae Drachmæ sex :

Addatur
 Pulveris Aristolochiæ rotundæ Uncia una semis :
 Misceantur.

Pro pellendis, sanandis Scrophulis, Ulceribus, Tineis, Scabie quoque, commendabile.

UNGUENTUM NIHILI *Coloniensium.*

℞. Tutię præparatæ,
 Nihili albi ana Unciam unam,
 Coralliorum rubrorum præparatorum,
 Matris Perlarum præparatæ ana Unciam semis,
 Pinguedinis porcinae Uncias duodecim :

Misceantur.
Ophthalmiæ serosæ obsistit.

UNGUENTUM NUTRITUM.

Videatur Unguentum de Lithargyrio.

UNGUENTUM OCULARE *PRINGLE.*

- ℞. Unguenti albi Drachmas quinque,
Sacchari Saturni Scrupulum unum,
Balsami Commendatoris Scrupulos duos:

Misceantur probe.

Laudatur multum ad Palpebras excoriatas.

UNGUENTUM OCULARE *SLOANE.*

- ℞. Tutia preparatae Unciam unam,
Lapis Hæmatitæ preparati Scrupulos duos,
Pulveris Aloës Grana duodecim,
Margaritarum preparatarum Grana quatuor,
Axungia Viperarum quantum fatis ad consistentiam Un-
guenti:

Probe misceantur.

*In Ophthalmia hujus Medicamenti quantum fert penicillum
piclorium laboranti Oculo affricatur, hac lege, ut clausis illico
Palpebris aliquamdiu retineatur. Adhibetur mane & vespera.*

UNGUENTUM OPHTHALMICUM *SAINTYVES.*

- ℞. Butyri cocti Uncias tres,
Cerae Unciam semis:
Liquatis commisceantur
Tutia preparatae Drachma una,
Mercurii præcipitati rubri Drachmæ duæ semis,
Camphoræ, paululo Olei Ovorum dissolutæ Drachma semis:
Misceantur penitissime.

*Medicamentum egregie sanans Lippitudinem & cornea Ulcus-
cula.*

UNGUENTUM OPODELDOCH

est

Balsamum Saponaceum.

UNGUENTUM PARALYTICUM *PLENCK.*

℞. Saponis officinalis Uncias sex:
 Subigantur cum
 Olei destillati Baccarum Juniperi Uncia una,
 Pulveris Seminis Erucae Drachmis sex:
 Misceantur.
Vires titulus indicat.

UNGUENTUM PECTORALE *Augustanorum.*

℞. Olei Amygdalarum dulcium Uncias quatuor,
 Chamomillae,
 Violarum ana Uncias tres,
 Butyri Uncias sex,
 Axungiarum Gallinae,
 Anatis ana Uncias duas,
 Ceræ albæ Uncias tres:
 Leni calore colliquatis addantur
 Pulverum Ireos Florentinae Drachmæ duæ,
 Croci Drachma semis:
 Misceantur.
Ad Asthma & Tussim infantum adhibetur.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS *PLENCK.*

℞. Unguenti Neapolitani Uncias octodecim,
 Pulverum Seminum Sabadilli,
 Staphis agriae ana Uncias duas,
 Radicis Hellebori albi Unciam unam,
 Oleorum Lauri Uncias novem,
 Spicæ Unciam unam:
 Misceantur.
Exiguis modo portionibus locis, quibus Pediculi insident, in-
ungitur.

UNGUENTUM AD PERNIONES *PLENCK.*

℞. Axungiae porcinae,
 Sevi Cervini,

Olei Laurini,
 Ceræ ana Uncias duas :
 Colliquatis leni igne & refrigeratis addatur
 Camphoræ Uncia semis, dissoluta in
 Spiritus Vini rectificati Uncia una :
 Misceantur.

Vires titulus docet.

UNGUENTUM POMATUM *Danorum.*

℞. Axungię Porcinę, aqua Rosarum sæpius lotę Uncias duodecim :

Adjiciantur sensim sub perpetua agitatione
 Aquarum Rosarum Unciæ tres,
 Naphæ,
 Spiritus Rosarum ana Uncia semis,
 Oleorum Lavendulę Semidrachma,
 Ligni Rhodii,
 de Cedro ana Guttę sedecim :

Exactissime mixta asserventur.

A Pomis, quę superioribus seculis Unguentis fragrantibus adjici moris erat, id genus Unguenta, re quidem sublata, nomen tamen hodieque servant. Quę ex Floribus recentibus parantur, optime ex Gallia Meridionali aut Italia accerfuntur.

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS *Amstelodamensium.*

℞. Olei Solani Uncias sedecim,
 Cerę Uncias quinque :
 Liquatis leni igne addantur
 Cerussę Unciæ duę,
 Pompholygos præparatę,
 Plumbi usti,
 Pulveris Olibani ana Uncia una :
 Misceantur.

Commendatur ad Ulcera sananda, nec non ad discutiendam Ophthalmiam.

UNGUENTUM POPULEUM *PRÆPOSITI.*

℞. Oculorum Populi recentium Uncias quatuor & viginti,
 Pinguedinis porcinae Uncias quatuor & sexaginta:
 Afferventur in illud tempus, quod sequentia Vegetabilia sub-

ministrare valet recentia, nimirum
 Summitatum Rubi,
 Herbarum Papaveris fativi,
 Hyoscyami,
 Bardanae cum radicibus,
 Solani,
 Lactucae virosae,
 Violariae ana Unciae tres,
 Sempervivi Unciae quatuor,
 Sedi acris Unciae tres:

Incisa addantur Pinguedini, quae Gemmas Populi habet:
 Coquantur ad consumptionem humiditatis; exprimantur & co-
 lentur.

*Paregorico & Refrigeranti scopo Hæmorrhoidibus, Ambustis,
 Mammis induratis inungitur.*

UNGUENTUM PURPUREUM *WURZII.*

℞. Radicum Scrophulariae recentium,
 Herbarum Plantaginis recentis,
 Chelidonii majoris recentis ana Drachmas tres:

Incisa macerentur per aliquot dies cum
 Aceti Unciis quinque:

Colatura addantur
 Capitis mortui Vitrioli edulcorati Unciae duae,
 Viridis Aëris Drachmae decem,
 Mellis Unciae octo:

Coquantur ad consistentiam Mellis.

Cum Unguento Aegyptiaco quoad vires convenit.

UNGUENTUM ROSATUM *Wurtembergensium.*

UNGUENTUM SIMPLEX *Londinensium.*

℞. Axungiae Porcinae Uncias duodecim:

Lavetur Aqua Rosarum, donec ejus odore fuerit imbuta;
tunc addantur

Olei Ligni Rhodii Guttæ sedecim:
Misceantur.

Unguento Pomato substituitur; Demulcendi quoque virtute gaudet.

UNGUENTUM RUBRUM POTABILE *Danorum.*

℞. Radicis Alkannæ Uncias duodecim,
Vini rubri Uncias decem:

Macerentur per aliquot dies; tunc adjiciantur
Butyri Unciæ sexaginta:

Coquantur ad consumptionem humiditatis, exprimantur & colentur.

Relaxandi & Emolliendi scopo olim usurpabatur.

UNGUENTUM SAMBUCINUM *PRÆPOSITI.*

℞. Sevi ovilli Uncias sex & triginta,
Olei Olivarum Uncias duodecim:

Liquefactis committantur

Florum Sambuci Unciæ octo & quadraginta:

Relinquantur per aliquot dies; tunc lenissimo igne denuo liquata colentur.

Laudatur maxime ad Ambusta.

UNGUENTUM SATURNINUM *Edinburgensium.*

℞. Olei Olivarum Uncias duodecim,
Cerae albæ Uncias tres:

Liquatis, partitis vicibus, sub perpetua agitatione adjiciatur
Sacchari Saturni Semuncia:

Probe misceantur.

Cum Unguento Nutrito respectu virium convenit.

UNGUENTUM AD SCABIEM *Parisiensium.*

UNGUENTUM CITRINUM *Suecorum.*

℞. Mercurii vivi Uncias tres;

Diffolvantur

Diffolvantur

Spiritus Nitri Unciis quatuor:

Solutio affundatur sensim

Axungie Porcinæ calore liquatæ Unciis duabus & triginta:
Agitentur pistillo ligneo; probe mixta effundantur super char-
tam; refrigerata difsecantur in taleolas.

*Articulis Pedum & Manuum ad Drachmarum duarum pon-
dus affricatur; laudatur quoque ad efflorescentias Herpeticas.*

UNGUENTUM SOLANI *Bergamenfium.*

℞. Succi ex foliis & baccis Solani expressi Uncias sex & tri-
ginta,

Olei Olivarum Uncias quatuor & quinquaginta,

Ceruffæ Uncias octodecim,

Lithargyrii Uncias sex & triginta:

Coquantur ad Diffolutionem Calcium metallicarum;

Addantur deinde

Ceræ albæ Unciæ sex,

Pulveris Olibani Unciæ tres:

Misceantur.

Adhibetur ad Ambusta, nec non ad consolidanda Ulcera.

UNGUENTUM SPLENITICUM *Wurtembergensium.*

℞. Radicum Filicis,

Ari ana Uncias duas,

Herbarum Afari,

Hyoscyami,

Cicutæ,

Nasturtii Aquatici ana Unciam unam semis,

Nicotianæ Drachmas tres,

Florum Chamomillæ,

Hyperici,

Geniftæ,

Sambuci ana Unciam unam:

Contusa macerentur per aliquot dies cum

PARS II.

A a a

Axungia Porcinæ Unciis quatuor & viginti:
Coquantur deinde ad consumptionem humiditatis:
In expressis liquetur

Ceræ Uncia una femis:

Addantur

Pulverum Gummi Ammoniaci,
Galbani ana Drachmæ sex:

Refrigeratis adjiciantur

Oleorum destillatorum Cumini,
Anethi,
Ceræ ana Drachma una:

Probe misceantur.

*Ad prohibendam durtiem Hypochondriorum, & pellendos
Flatus adhibetur.*

UNGUENTUM STOMACHICUM *Viennensium.*

℞. Oleorum Mastichis,
Menthæ,
Cydoniorum,

Ceræ citrinæ ana Uncias octo:

Liquatis & semirefrigeratis addantur

Pulverum Ligni Aloës,
Calami Aromatici,
Caryophyllorum,
Macis ana Uncia una,

Balsami Peruviani Uncia femis,

Oleorum destillatorum Caryophyllorum Scrupuli duo,
Anisi Scrupulus unus:

Misceantur.

*Ad roborandum Ventriculum, fistendum Vomitum & Fluxus
Alvi, regioni Epigastricæ & Umbilico inungitur.*

UNGUENTUM DE STYRACE *LEMERY.*

℞. Olei Nucum Uncias duodecim,
Colophonii Uncias quindecim,
Gummi Elemi,

Ceræ ana Uncias octo:

Liquentur leni calore, liquatis & ab igne remotis addantur

Storacis liquidæ Unciæ decem:

Colentur per linteum; elapsis aliquot diebus cultri ope inde separentur fordes, quæ ad fundum secesserint.

Scopo Antiseptico ad Ulcera putrida & Gangrænam adhibetur.

U N G U E N T U M D E U V I S

est

Unguentum ad Labia.

U N G U E N T U M C O N T R A V E R M E S *Wurtembergensium.*

℞. Radicum Filicis,
 Bryoniæ,
 Allii ana Unciam unam semis,
 Herbarum Abrotani,
 Absynthii,
 Tanaceti ana Drachmas duas,

Butyri Uncias sedecim:

Incisa coquantur ad consumptionem humiditatis; in expressis liquetur

Ceræ Uncia una semis:

Refrigeratis adjiciantur

Pulverum Aloës Uncia una,
 Trochiscorum Alhandal Uncia semis,
 Fellis Tauri inspissati Unciæ duæ:

Misceantur.

Mitius agit, quam Unguentum de Arthanita, cujus in modum adhibetur.

U N G U E N T U M V I R I D E P O T A B I L E *Wurtembergensium.*

℞. Herbarum recentium Abrotani,
 Artemisiæ,
 Bellidis,
 Betonicæ,
 Fœniculi,
 Hyssopi,

Herbarum recentium Menthæ,
 Matrifylvæ,
 Millefolii,
 Majoranæ,
 Plantaginis,
 Veronicæ,
 Verbenæ,
 Salviæ,
 Ruthæ ana Unciam unam,

Baccarum Juniperi viridium Uncias tres:
 Incisa & contusa coquantur cum

Butyri Unciis octo & quadraginta ad consumptionem humiditatis:

Colentur & asserventur.

Laudabatur ex Alto lapsis & Parturientibus ad aliquot cochlearia; sed inconcinna compositio merito evilit.

ZINZIBER COCTUM *Argentoratensium.*

℞. Cinnamomi electi Drachmas duas,
 Nucis Moschatae Drachmam unam,
 Caryophyllorum Scrupulos duos,
 Macis Scrupulum unum:

Craffe contusis addantur

Pulveris Zinziberis Drachmæ sex:

Mixtæ cum

Sacchari ad consistentiam tabulandi cocti Unciis sedecim:
 Formentur inde Morsuli.

Cum successu ad morbos Capitis & Ventriculi a Muco oriundos adhibetur.



INDEX

- Al*, I. 30.
Abelmosch, I. 14.
Aben, I. 10.
Abricots, I. 35.
Abrotanum, I. 14.
Abjynthe, I. 14.
Absynthium, I. 14.
Acacia, I. 15.
Acajou, I. 28.
Acanthus, I. 15.
Acer, I. 16.
Acetabulum, I. 9.
Acetosa, I. 16.
Acetofella, I. 16.
Acetum, I. 17. II. 1.
 Antisepticum, II. 1.
 Aromaticum, II. 2.
 Bezoardicum, II. 3.
 Camphoratum, II. 3.
 Chalybeatum, II. 3.
 Colchicum, II. 4.
 Concentratum, STAHL, II. 4.
 WESTENDORF, II. 4.
 Destillatum, II. 5.
 Hystericum, II. 5.
 Odoratum, II. 5.
 Saturninum, II. 6.
 Scilliticum, II. 6.
Ache, I. 33.
Acidum Tartari Crystallifatum, II. 292.
 Destillatum, II. 314.
Ackerschwendel, I. 211.
Acmella, I. 17.
Aconitum, I. 17.
Acorus, I. 17. I. 57.
Actes grana, I. 187.
Adamas, I. 18.
 PARS II.
Adar, I. 8.
Adhatoda, I. 18.
Adiantum, I. 18.
Adlerstein, I. 19.
Ægagropila, I. 18.
Æris Flores, II. 7.
Ærugo, I. 213.
Æs, I. 19.
 ustum, II. 7.
Æfasse, I. 10.
Æther Vitrioli, II. 206.
Æthiops Antimonialis, II. 7.
 Martialis, II. 7.
 Mineralis, II. 8.
 Vegetabilis, I. 176.
Agallochum Lignum, I. 23.
Agarie, I. 19.
Agaricus, I. 19.
 Mineralis, I. 128.
 Præparatus, II. 18.
 Pedis equini facie, I. 19.
Agley, I. 33.
Agnus castus, I. 19.
Agresta, I. 214.
Agricome, I. 63.
Agrimonia, I. 20.
Agzstein, I. 201.
Ahorn, I. 16.
Ail, I. 21.
Aimant, I. 138.
Airelles, I. 152.
Alabastrum, I. 20.
Alabastre, I. 20.
Alabatre, I. 20.
Alant, I. 101.
Alaun, I. 24.
Album Græcum, I. 20.
 Bbb

I N D E X

- Alcahest GLAUBER. II. 227.
 Alkali Ammoniacum aquosum, II. 311.
 causticum, II. 311.
 Fluor, II. 311.
 Minerale Tartarifatum, II. 290.
 de Rocou, I. 111.
 Vegetabile Tartarifat. II. 329.
 Vitriolatum, II. 230.
 Volatile causticum, II. 311.
- Alcantus, I. 10.
 Alcaubolus, I. 8.
 Alcea, I. 20.
Alcée, I. 20.
 Alces Ungulæ, I. 20.
 Alchemion, I. 8.
 Alchi, I. 8.
 Alchymilla, I. 20.
 Alcovanus, I. 8.
 Alhandal Trochisci, I. 87.
 Alkilat, I. 9.
Alleluja, I. 16.
 Alkanna, I. 20.
 Alkekengi, I. 21.
Allermannsharnifch, I. 211.
 Alliaria, I. 21.
Alliaire, I. 21.
 Allium, I. 21.
 Afcalonicum, I. 22.
 Scorodoprafum, I. 22.
 Almunefi, I. 10.
 Alnus, I. 22.
 Aloës, I. 22.
 Depurata, II. 9.
 Infuccata, I. 23. II. 9.
 Lignum, I. 23.
 Lota, I. 23. II. 9.
 Rofata, I. 23. II. 9.
Alpſchos, I. 46.
 Alfine, I. 23.
- Althæa, I. 20.
 Alumen, I. 24.
 Catinum, I. 197.
 Plumofum, I. 25.
 Romanum, I. 24.
 Rupeum, I. 24.
 Saccharinum, II. 9.
 Tinctum, II. 10.
 Uftum, II. 10.
- Alun*, I. 24.
d'Amandes pâte, II. 270.
 Amara dulcis, II. 24.
 Amazonum Lapis, I. 154.
 Ambra, I. 24.
 Liquida, I. 25.
Ambre jaune, I. 201.
Ambroifie, I. 52.
Ameife, I. 107.
 Amethyftus, I. 25.
 Amianthus, I. 25.
Amidon, I. 28.
 Ammi, I. 26.
 Ammoniacum Gummi, I. 26.
 Sal, I. 27.
 Amomi femina, I. 26.
 Amomum, I. 26.
 Amphora, I. 9.
 Amygdalæ, I. 27.
 Amylum, I. 28.
 Anacardium : I. 28.
 Anagallis, I. 28.
 Anas, I. 29.
 Anatron, I. 105.
Anckenblümlein, I. 177.
 Anchufa, I. 29.
Ancoline, I. 33.
Andorn, I. 140.
 ſchwarzer, I. 44.
Andouillers, I. 74.
 Anefime, I. 10.

INDEX

- Anet*, I. 20.
Anethum, I. 20.
Angelica, I. 29.
Anglicum Sal, I. 30.
Anguilla, I. 30.
Anguille, I. 30.
Anguria, I. 84.
Anime Gummi, I. 30.
Anis de la Chine, I. 31.
 Stern, I. 31.
Anisum, I. 30.
 stellatum, I. 31.
Annulus, I. 9.
Anodynum minerale, II. 12.
Anser, I. 31.
Anserina, I. 31.
Anthophylli, I. 31.
Anthora, I. 32.
Anthos, I. 32.
Antidotaria, I. 2.
Antidotus MITHRIDATIS, II. 119.
Antihecticum POTERII, II. 10.
Antimoine, I. 32.
Antimonium, I. 32.
 Diaphoreticum, II. 11.
 Præparatum, II. 12.
Antiquarium RIVERII, 239.
Apalachine, I. 32.
Apparine, I. 32.
Aper, I. 33.
Apfel, I. 142.
Apium, I. 33.
Apothecarius, I. 2.
Apozema, II. 13.
 Febrifugum laxans, II. 101.
Apri dentes, I. 33.
Arret de bæuf, I. 157.
Aqua Absynthii composita, II. 13.
 Vinosa, II. 13.
 Acustica, II. 14.
Aqua Alexiteria, II. 15.
 Aloëtica Mercurialis, II. 37.
 Aluminosa FALLOPII, II. 15.
 Parisiensium, II. 15.
Anhaltina, II. 16.
Anodyna, II. 16.
Apoplectica, II. 17.
Aromatica, II. 17.
Asthmatica, II. 18.
Balsami Embryonum, II. 18.
Benedicta RULANDI, II. 19.
Calcis, II. 20.
 composita, II. 20.
Caponis, II. 20.
Carbunculi, II. 21.
Carmelitarum, II. 22.
contra Carient, II. 24.
Carminativa DORNCRELLI, II. 22.
 Regis Boruff, II. 23.
 Vulgaris, II. 23.
Catapultarum, II. 21.
Cinnamomi Buglossata, II. 24.
 Cordialis, II. 24.
 Cydoniata, II. 24.
 Hordeata, II. 24.
 Simplex, II. 24.
 cum Vino, II. 24.
 sine Vino, II. 24.
 Vulgaris, II. 24.
Coloniensis, II. 25.
Confortativa, II. 25.
Cornu Cervi citrata, II. 25.
 Tenellorum, II. 41.
Divina, II. 37.
Epileptica, II. 26.
Florum omnium, II. 27.
Fimi, II. 27.
Fœtida, II. 27.
Fortis, II. 28.
 Mercurialis, II. 28.
 B b b 2

I N D E X

- Aqua Fortis præcipitata, II. 28.
 ad Gingivas, II. 28.
 Grysea, II. 28.
 Hyrundinum, II. 29.
 cum Castoreo, II. 29.
 Hungarica, II. 30.
 Laxativa Anglica, II. 30.
 Viennensis, II. 31.
 Magnanimitatis, II. 31.
 Mastichina, II. 32.
 Melissæ composita, II. 33.
 Mellis, II. 32.
 Odorata, II. 32.
 Menthæ composita, II. 33.
 Mercurialis, II. 33.
 CHARRAS, II. 219.
 Mercuriata, II. 32.
 Millepedum, II. 34.
 Mirabilis, II. 26.
 Mulsa, II. 34.
 Myrrhæ, II. 34.
 Ophthalmica alba, II. 35.
 CHARRAS, II. 35.
 Cœlestis, II. 35.
 Cærulea, II. 35.
 DAGUIN, II. 36.
 Panis, II. 26.
 Perlata, II. 36.
 Pestilentialis, II. 37.
 HARTMANN, II. 314.
 Phagedænica, II. 37.
 Picis, II. 198.
 RABELII, II. 37.
 Raphani composita, II. 37.
 Reginæ Hungariæ, I. 81. II. 30.
 Regis, II. 38.
 Sclopetaria, II. 44.
 Serpylli composita, II. 38.
 Sine pari, II. 39.
 Stibiata, II. 39.
 Aqua Styptica *Berolinensium*, II. 39.
 Danorum, II. 39.
 Thediana, II. 40.
 Theriacalis, II. 40.
 Londinensium, II. 40.
 ad Tormina Infantum, II. 41.
 de Tribus, II. 222.
 Typhor. Cervi composita, II. 41.
 Veronicæ cum Vino, II. 42.
 Vegeto-mineralis, II. 41.
 Violacea, II. 41.
 Viridis, II. 42.
 Vitæ mulierum, II. 43.
 Saponacea, II. 43.
 Vitriolica, II. 44.
 Cærulea, II. 44.
 Londin. II. 40.
 Vulneraria aquosâ, II. 46.
 BAUMÉ, II. 45.
 LEMERY, II. 44.
 Mercurialis, II. 46.
 Mineralis, II. 46.
 Rubra, II. 46.
 Vinosa, II. 46.
 Aquila alba, II. 46.
 Aquilæ Lignum, I. 23.
 Arabicum Gummi, I. 33.
 Aranea, I. 34.
 Araignés, I. 34.
 Arbor vitæ, I. 34.
 Arcanum Corallinum, II. 47. 220.
 Duplicatum, II. 47.
 Tartari, II. 47. 330.
 Ardea, I. 34.
 Argentina, I. 31.
 Argent, I. 34.
 Argentum, I. 34.
 Vivum, I. 146.
 Aristolochia, I. 34. 35.

I N D E X

Aristoloché de vigne, I. 35.
 Armeniaca, I. 35.
 Armenius lapis, I. 36.
Armoise, I. 38.
 Armoracia, I. 36.
 Arnica, I. 36.
Aron, I. 38.
Arroche, I. 40.
 puante, I. 216.
 Arfenicum, I. 37.
 Artanita, I. 95.
 Artemisia, I. 38.
 Arum, I. 38.
 Arundo, I. 38.
 As, I. 7.
 Asarum, I. 39.
 Asbestus, I. 25.
 Ascia, I. 39.
Asche, I. 39.
 Aspalatum lignum, I. 23.
 Asparagus, I. 39.
Asperge, I. 39.
 Asphaltum, I. 39.
 Asphodelus, I. 40.
 Assa dulcis, I. 47.
 Fœtida, I. 40.
 Assalit, I. 8.
 Astrantia, I. 40.
 Atogochilus, I. 8.
 Atractylis, I. 40.
Attich, I. 100.
 Atriplex, I. 40. 41.
 Avellana, I. 9. 41.
 Avena, I. 41.
 Auguen, I. 8.
Argentrost, I. 103.
Aunée, I. 101.
Avaine, I. 41.
 Aurantia, I. 42.
 Aureus, I. 8.

Auricula Judæ, I. 43.
 Auricula Muris, I. 43.
 Auripigmentum, I. 37.
Aurone, I. 14.
 Aurum, I. 43.
 Fulminans, II. 47.
 Horizontale, II. 48.
 Potabile, II. 48.
Autruche noir, I. 40.
 œufs, I. 201.
 Autulas, I. 9.
 Azedarach, I. 44.
 Azoph PARACELS. II. 337.

Bachates parva, I. 10.
Bachbungen, I. 45.
 Bachilea, I. 9.
Bacile, I. 91.
 Bacilli ad fornacem, II. 48.
 de Liquiritia, II. 48.
 Baculi pectorales, II. 204.
Bær, I. 216.
Bærlapp, I. 137.
Bærwurzel, I. 147.
Berenklau, I. 53.
 Balanus, I. 9.
 Myrepicus, I. 46.
 Balauftiorum Flores, I. 114.
Baldrian, I. 210.
Balkine, I. 75.
 Ballotta, I. 44.
Balsamapfel, I. 148.
 Balsama, II. 48. 59.
 Balsamita, I. 44.
 Balsamum adstringens, II. 49.
 Anodynum, II. 49.
 Apoplecticum, II. 49.
 Arçæi, II. 50.
 liquefactum, II. 50.
 Aromaticum, II. 50. 59.
 B b b 3

INDEX

- Balsamum Burthianum, II. 50.
 Canadense, I. 59.
 Carpaticum, I. 65. 178.
 Caryophyllorum, II. 60.
 Catholicum, II. 51. 57.
 Cellense, II. 50.
 Cephal. Saxonicum, II. 50.
 Chalybeatum, II. 51.
 Cinnamomi, II. 60.
 Commendatoris, II. 57.
 ad Dentitionem, II. 51.
 FIORAVENTI, II. 52.
 Hungaricum, I. 178.
 Hystericum, II. 53.
 Ischæmeticum, II. 53.
 Lavendulæ, II. 60.
 Lectorense, II. 53.
 Lithuanicum, II. 54.
 ad Loricand. cadaver, II. 55.
 LOCATELLI, II. 54.
 Majoranæ, II. 60.
 Mercuriale, II. 55.
 Metensium, II. 62.
 Nervinum, II. 55.
 Odontalgicum, II. 56.
 Ophthalmicum, II. 56.
 Rubrum, II. 56.
 Pectorale, II. 57.
 Rutæ, II. 60.
 Samaritanum, II. 58.
 Saponaceum, II. 58.
 Saturni, II. 58.
 Schauerianum, II. 58.
 SCHERZERI, II. 59.
 Sulph. Antimoniale, II. 61.
 Crassum, II. 60.
 RULANDI, II. 61.
 Tranquillans, II. 61.
 Traumaticum, II. 57.
 Edinburgensium, II. 62.
 Londinensium, II. 62.
 Balsamum Viride, II. 62.
 Vitæ externum, II. 63.
 FUNNII, II. 63.
 HOFFMANNI, II. 63.
 TEICHMEYERI, II. 64.
 Vulnerar. *Edinburg.* II. 65.
 Londinens. II. 65.
 MINDER. II. 65.
 STAHLII, II. 66.
 Bamia Moschata, I. 14.
 Barba Capræ, I. 44.
 Barbarea, I. 44.
 Barbe de bouc, I. 209.
 Bardana, I. 45.
 Basilicum, I. 45.
 Basilic, I. 45.
 de Bassora Gummi, I. 208.
 Baumwoll, I. 50.
 Baurensenf, I. 207.
 Bdellium, I. 44.
 Beaume d'Aiguilles, II. 51.
 de Carthagene, I. 208.
 Condom, II. 53.
 de Laiture, II. 53.
 de Vinceguere, II. 53.
 Beaumier, I. 143.
 Bec de grue, I. 113.
 Beccabunga, I. 45.
 Bedeguar, I. 96.
 Behen album, I. 45.
 Nuces, I. 46.
 Rubrum, I. 46.
 Belemnites, I. 46.
 Belladonna, I. 46.
 Belledame, I. 40.
 Bellis, I. 47.
 Bengalensis Nux, I. 47.
 Benedictenwurzel, I. 65.
 Benjoin, I. 47.
 Benoite, I. 65.
 Benzoës, I. 47.

I N D E X

- Berberis, I. 47.
 Bergmünze, I. 59.
 Bergsalz, I. 185.
 Bernstein, I. 201.
 Bersingstein, I. 164.
 Bertram, I. 175.
 wilder, I. 174.
 Berufkraut, I. 88. 195.
 Beschreykraut, I. 195.
 Besenkraut, I. 197.
 Bessis, I. 7.
 Beta, I. 48.
 Betoine, I. 48.
 des montagnes, I. 36.
 Betonica, I. 48.
 Bettlerlaufe, I. 217.
 Bettstroh, I. 111.
 Betula, I. 48.
 Beurree, I. 54.
 Beyfus, I. 38.
 Bezetta, I. 49.
 Bezoar, I. 49.
 Bezoardicum Joviale, II. 10.
 Martiale, II. 66.
 Minerale, II. 66.
Bibergeil, I. 69.
Biberklee, I. 209.
Bier, I. 44.
Bigarreaux, I. 73.
 Bilances, I. 5.
 Bilsam, I. 175.
 Bingelkraut, I. 146.
Birke, I. 48.
Birne, I. 175.
Bisum, I. 149.
 Saameis, I. 14.
 Bismuthum, I. 49.
 Bistorta, I. 50.
 Bitumen Judaicum, I. 39.
Blaselwasser, I. 111.
Blaireau, I. 205.
Blanc de baleine, I. 75.
 manger, II. 194.
 de Plomb, I. 175.
 Blatta Byzantina, I. 50.
Bled noir, I. 104.
 Sarrafin, I. 104.
Bley, I. 71.
Bleyweis, I. 75.
Bleywurzel, I. 98.
Bluet, I. 95.
Blutygel, I. 120.
Blutstein, I. 116.
Bock, I. 120.
Bocksbart, I. 209.
Bæuf, I. 51.
Bohnen Sau-, I. 104.
 welsche, I. 104.
Bois gentil, I. 147.
 de Garou, I. 147.
 Sain-, I. 147.
 Boletus Cervinus, I. 50.
 Boli Lithontriptici, II. 67.
 in Quartana, II. 67.
 Vermifugi, II. 67.
 Bolus, I. 50.
 Anthelminticus purgans, II. 67.
 Armenapreparata, II. 66.
 Bombax, I. 50.
 Bondacuta, I. 9.
Bonette, I. 53.
Bonne dame, I. 40.
 Bonus Henricus, I. 51.
 Borax, I. 51.
Boretzsch, I. 51.
 Borrage, I. 51.
 Bos, I. 51.
 Botrys, I. 52.
 Mexicana, I. 52.
Bouc, I. 120.

INDEX

Bougie, II. 142.
Bouillon blanc, I. 211.
Bouleau, I. 48.
Bouquetine, I. 168.
Bourgene, I. 108.
Bourrache, I. 51.
Bovist, I. 52.
Bovista, I. 52.
Boufferole, I. 216.
Branca ursina, I. 53.
Branche ursine, I. 53.
Braffica, I. 52.
Braunwurzel, I. 192.
Bray sec, I. 87.
Briale, I. 10.
Britannica, I. 53.
Brochet, I. 136.
Brod, I. 161.
Brombeeren, I. 182.
Bruchkrautel, I. 119.
Brunella, I. 53.
Brunnkressen, I. 153.
Bruscus, I. 53. 180.
Brustbeerlein, I. 126.
 schwarze, I. 192.
Bruyere, I. 102.
Bryonia, I. 53.
Bubendistel, I. 99.
Buchwaizen, I. 104.
Buchen, I. 105.
Buchs, I. 55.
Bufo, I. 54.
Bufo nites, I. 54.
Bugle, I. 54.
Buglossum, I. 54.
Bugula, I. 54.
Bui, I. 55.
Burfa Pastoris, I. 54.
Butte, I. 96.
Butter, I. 54.

Butterweckel, I. 164.
Butyrum, I. 54.
 Antimonii, II. 10.
 Cacao, I. 55. II. 68.
 Majoranæ, II. 68.
 Rubrum, II. 68.
 Viride, II. 68.
Buxus, I. 55.

Caapeba, I. 55.
Cabaret, I. 39.
Cabbage barck, I. 55.
Caoutchou, I. 71.
Cacao, I. 55.
Cachou, I. 70.
Cadus, I. 9.
Caffé, I. 55.
Cajepoet, I. 56.
Caille de lait, I. 111.
Caillou, I. 195.
Calambuc, I. 23.
Calament, I. 57.
Calaminaire, I. 56.
Calaminaris lapis, I. 56.
Calamintha, I. 57.
Calamus Aromaticus, I. 57.
Calcaire, I. 57.
Calcarius, I. 57.
Calcitrappa, I. 58.
Calendula, I. 58.
Calmus, I. 57.
Calomelas, II. 239.
Calx, I. 57.
 Antimonii lota, II. 11.
Calyx, I. 10.
Camillen, I. 76.
Canomille, I. 76.
Campechianum Lignum, I. 58.
Camphora, I. 58.
 Camphorata

INDEX

- Camphorata, I. 59.
 Cancrorum Chelæ, I. 59.
 Lapides, I. 59.
 Oculi, I. 59.
 Candelæ Chirurgicæ, II. 68.
 Mercuriales, II. 69.
 Fumales, II. 69.
 Candeolæ, II. 142.
 Canella alba, I. 60.
 Canellæ Clavelli, I. 60. 82.
 Canelle, I. 82.
 Girofflée, I. 61.
 Canessirinde, I. 86.
 Cannabis, I. 60.
 Canneberge, I. 160.
 Cantharides, I. 160.
 Capaun, I. 61.
 Capillus Veneris, 61.
 Capillaire, I. 61.
 Capo, I. 61.
 Capparis, I. 61.
 Capres, I. 61.
 Caprifolium, I. 61.
 Capucine, I. 153.
 Capucinerlein, I. 153.
 Carannæ Gummi, I. 62.
 Cardamine, I. 62.
 Cardamomum, I. 63.
 Cardenbenedicten, I. 63.
 wilde, I. 40.
 Cardiaca, I. 63.
 Cardopatium, I. 64.
 Carduus benedictus, I. 60.
 Mariæ, I. 64.
 Tomentosus, I. 64.
 Carica, I. 64.
 Carlina, I. 64.
 Carneol, I. 65.
 Carneolus, I. 65.
 Carobes, I. 196.
 PARS II.
- Carottes*, I. 99.
Carouge, I. 196.
Carpe, I. 65.
 Carpio, I. 65.
 Carpobalsamum, I. 142.
 Carthamus, I. 65.
 Carvi, I. 65.
 Caryophyllata, I. 65.
 Caryophylli, I. 66.
 Cascarilla, I. 66.
Casse en batons, I. 67.
Cassépierre, I. 162.
 Cassia Caryophyllata, I. 67.
 pro Clysteribus, II. 70.
 Extracta, II. 70.
 Fistula, I. 67.
 Lignea, I. 67.
 cum Manna, II. 70.
 Cassiæ Flores, I. 82.
 Cassonade, I. 184.
 Cassuminar, I. 68.
 Castanea, I. 68.
Castanie, I. 68.
 Ross, I. 119.
 wilde, I. 119.
 Castoreum, I. 68. 69.
 Castumanar, I. 68.
Catagambar, I. 69. 70.
 Cataplasma Anodynum, II. 70.
 Antisepticum, II. 71.
 ex Bryonia, II. 71.
 Emolliens, II. 71.
 Maturans, II. 72.
 Saponaceum, II. 72.
 de Mica Panis, II. 72.
 Pomaceum, II. 72.
 Resolvens. II. 73.
 ad Scirrhus, II. 73.
 Cataputia, I. 69. 70.
 Catechu, I. 70.
 Ccc

INDEX

- Catholicum, II. 73.
 Catus, I. 70.
 Causticum Antimoniale, II. 10.
 Commune, II. 73.
 Mitius, II. 73.
 Lunare, II. 202.
 Potentiale, II. 73. 201.
Celeri, I. 33.
Cendres gravellées, I. 81.
Centauree petite, I. 71.
Centaurium minus, I. 71.
Centumnodia, I. 71.
Centumpondium, I. 8.
Cepa, I. 72.
Cera, I. 72.
 Arborea, II. 74.
 Citrina, II. 74.
 ad Crines, II. 74.
 Viridis, II. 74.
Cerafa, I. 73.
Ceraforum Gummi, I. 73.
Cerafus Racemosa, I. 73.
Ceratum, II. 142.
 Amygdalatum, II. 76.
 Cosmeticum, II. 75.
 Detergens, II. 75.
 ad Labia, II. 75.
 Refrigerans, II. 76.
 Saturninum, II. 76.
Cerberus triceps, II. 270.
Cerefolium, I. 74.
Cereoli, II. 68. 142.
Cerevisia, I. 74.
Cerf, I. 74.
Cerfeuil, I. 74.
Cerises, I. 73.
 à grappes, I. 73.
Cervaria, I. 112.
Cerussa, I. 75.
 Antimonii, II. 77.
Cervus, I. 94.
Ceterach, I. 75.
Ceti Sperma, I. 75.
Chacrille, I. 66.
Chalcitis, I. 215.
Χαλκος, I. 8.
Chalybs, I. 106.
Chamædrys, I. 76.
Chamæpitys, I. 76.
Chamaras, I. 91.
Chamomilla, I. 76.
Chanvre, I. 60.
Chapon, I. 61.
Characteres, I. 10. 11. 12.
Chardon benit, I. 63.
 à Foulon, I. 99.
 Marie, I. 64.
 Roland, I. 102.
 Sauvage, I. 64.
Chat, I. 70.
Chataigne, I. 68.
 d'Eau, I. 209.
Chassetaupe, I. 69.
Chassis, I. 180.
Chaussetrappe, I. 58.
Chaux vive, I. 57.
Cheiri, I. 77.
Chelidoine, I. 77.
Chelidonium, I. 77.
Chene, I. 176.
Chermes, I. 178.
Chevrefeuille, I. 62.
Chicorée, I. 80. 101.
Chiendent, I. 114.
Chinæ Cortex, I. 78.
 Radix, I. 79.
Χηνη, I. 9.
Chocalata, II. 77.
Choux, I. 52.
 marin, I. 197.

INDEX

- Chrysolithus, I. 79.
xês, I. 9.
Ciboule, I. 72.
Cicer, I. 79.
Cichorium, I. 80.
Cicum, I. 114.
Cicuta, I. 80.
Cigüe, I. 80.
 des Marais, I. 167.
Cina, I. 81.
Cineres, II. 78.
 Clavellati, I. 81.
 Depurati, II. 78.
Cinnabaris, I. 82.
 Antimonii, II. 10.
 Cremor, II. 78.
 Facititia, II. 78.
 Nativa præparata, II. 79.
Cinnamomum, I. 82.
Cire, I. 72.
Citreum Malum, I. 83.
Citron, I. 83.
Citronade, I. 83.
Citrullus, I. 84.
Clareta, II. 79.
Claretum Aurantiorum Florum, II. 81.
 Barbadense, II. 79.
 Cacao, II. 80.
 Caffée, II. 81.
 Coronarium, II. 81.
 Fructuum, II. 81.
 Huile de Venus, II. 82.
 Nucleorum, II. 82.
Clematis, I. 84.
Cloportes, I. 148.
Cloux de Giroffles, I. 66.
Clyfma Carminativum, II. 83.
 Commune, II. 83.
 Emolliens, II. 83.
 Leniens, II. 84.
Clyfma Nutriens, II. 84.
 Opiatum, II. 84.
 Simplex, II. 84.
 ad Soporofos affectus, II. 84.
 Terebinthinatum, II. 85.
Clyffus Antimonii, II. 11.
Cnidium Granum, I. 85.
Coatus, I. 10.
Cobaltum, I. 84.
Coccognidium, I. 85.
Cocculi, I. 85.
Cochénille, I. 85.
Cochlea, I. 86.
Cochlearia, I. 85.
Codagapala, I. 86.
Coins, I. 95.
Colanos, I. 10.
Colchicum, 81.
Collutorium Antiscorbuticum, II. 85.
 Gingivale, II. 85.
 Odontalgicum, II. 86.
Collyrium adstringens, II. 86.
 Album, II. 343.
 Cæruleum, II. 35.
 COMITIS DU BOURG, II. 36.
 HELVETII, II. 202.
 LANFRANCI, II. 86.
 Resolvens, II. 87.
 Roborans, II. 87.
 Sapphirinum, II. 35. 87.
Colocynthis, I. 86.
Coloquint, I. 86.
Colombo, I. 87.
Colophonium, I. 87.
Colubrinum Lignum, I. 87.
Conchæ, I. 81.
 Citræ, II. 87.
 Præparatæ, II. 87.
Concombre, I. 92.
 Sauvage, I. 93.
 C c c 2

INDEX

- Conditā, II. 88.
 Conditum de Cidoniiis, II. 221.
 Confectio Alkermes, II. 88.
 Anisi Laxativa, II. 89.
 Hamech, II. 90.
 de Hyacintho, II. 91.
 Japonica, II. 114.
 de Rebecha, II. 92. 346.
 Universalis, II. 92. 111.
 Confectionarius, I. 2.
 Confectiones siccae, II. 90.
 Congius, I. 7. 9.
 Conos, I. 10.
 Conserva Millepedum, I. 148.
 Rosarum solida, II. 286.
 Conservæ, II. 92.
 Vitriolata, II. 93.
 Consolida, I. 88.
 Major, I. 202.
 Media, I. 54.
Consoude grande, I. 202.
 Contra Semence, I. 81.
 Contrajerva, I. 88.
 Conyza Cærulea, I. 88.
 Media, I. 89.
 Vulgaris, I. 89.
 Copaiba Balsamum, I. 89.
 Copal Gummi, I. 89.
 Coq, I. 44.
 Coquelicot, I. 162.
 Coquelourde, I. 174.
 Coquerets, I. 21.
 Coquilles, I. 81.
 Corailles, I. 89. 90.
 Corallen, I. 90.
 Corallenmoos, I. 90.
 Corallia, I. 89. 90.
 Præparata, II. 93.
 Corallina, I. 90.
Coralline de Corse, I. 118.
Coralline de Malte, I. 118.
 Coriander, I. 90.
 Coriandrum, I. 90.
Coriuthen, I. 163.
 Corna, I. 90.
 Cornaline, I. 65.
Corne de Cerf, I. 90.
 Cornichons, I. 93.
 Cornouilles, I. 90.
 Cornu Cervi, I. 74.
 Auratum, II. 93.
 sine Igne præparat. II. 94.
 Philosoph. præparat. II. 94.
 Raspatum, I. 74.
 Rasura, I. 74.
 Tornatum, I. 75.
 Ustum, II. 94.
 Præparatum, II. 94.
 Cornusum, I. 10.
 Cornuum præparatio, II. 94.
 Coronopus, I. 90.
 Corrector, II. 293.
 Corticum collectio, I. 10.
 Coryli Lignum, I. 41.
 Cosmeticum CLAVII, II. 94. 215.
 Costus, I. 91.
 Hortensis, I. 44.
 Coton, I. 80.
 Cotula foetida, I. 77.
 Coulevrée, I. 53.
 Bois, I. 87.
 Courbaril, I. 30.
 Cranium humanum, I. 91.
 Crapaud, I. 54.
 Crapaudine, I. 54. 195.
 Craie, I. 91.
 Crassula, I. 91.
 Crayon rouge, I. 81.
 Cremor Barbadenfis, II. 80.
 Tartari, II. 94.

I N D E X

- Crepitus Lupi, I. 52. 91.
 Cresson, I. 153.
 d'Eau, I. 153.
 des Prés, I. 62.
 de Roche, I. 154.
 Sauvage, I. 154.
 Creta, I. 91.
 Kreuzkraut, I. 92.
 Kreuzelkraut, I. 193.
 Crithmum, I. 91.
 Crocus, I. 91.
 Antimoniatus, II. 95.
 Antimonii, II. 95. 96.
 Martis, adstringens, II. 95.
 Aperitivus, II. 95.
 Metallorum, II. 96. 197.
 Solis, II. 96.
 Croisette, I. 92.
 Cruciata, I. 92.
 Crues, I. 75.
 Cropal, I. 86.
 Crytalli Lunæ, II. 96. 202.
 Crytallum Minerale, II. 96. 203.
 Crytallus montana, I. 92.
 præparata, II. 96.
 Cuabus, I. 10.
 Cubebæ, I. 92.
 Cucumer, I. 92.
 Cucumis, I. 92.
 aux Cuillerées herbe, I. 85.
 Cuivre, I. 94.
 Culeus, I. 9.
 Culilawan, I. 93.
 Cuminum, I. 93.
 Cumulus, I. 9.
 Cupressus, I. 94.
 Cuprum, I. 94.
 Antimoniatum, II. 96. 305.
 Curage, I. 165.
 Curassavensis Cortex, I. 42.
 Curcuma, I. 94.
 Cuscuta, I. 95.
 Cyanes, I. 10.
 Cyanus, I. 95.
 Cyathus, I. 9.
 Cyclamen, I. 95.
 Cydonia, I. 95.
 Cymbalaria, I. 96.
 Cymbelkraut, I. 96.
 Cynoglossum, I. 96.
 Cynosbatus, I. 96.
 Cyperus longus, I. 96.
 Rotundus, I. 96.
 Cypres, I. 94.
 Dachs, I. 205.
 Dacrydion, II. 104.
 Dactyli, I. 97.
 Dagnet, I. 74.
 Danich, I. 9.
 Darchimi, I. 8.
 Datteln, I. 97.
 Dattes, I. 97.
 Daucus, I. 97.
 Decoctum album, II. 97.
 Amarum, II. 97.
 Antisporicum, II. 97.
 Antiscorbuticum, II. 98.
 Antivenereum, II. 98.
 Laxans, II. 99.
 Avenaceum, II. 99.
 Chinæ Radicis, II. 100.
 Citri, II. 100.
 Commune, II. 100.
 Cornu Cervi citrat. II. 100.
 Febrifugum, II. 101.
 Laxans, II. 101.
 ad Fungos Articular. II. 101.
 Hordei, II. 102.
 Citratum, II. 100. 102.
 C c c 3

INDEX

- Decoctum Ipecacuanhæ, II. 102.
 Lapathi, II. 102.
 Lignorum, II. 103.
 Pectorale, II. 103.
 Saturinum, II. 6.
 Sudoriferum, II. 103.
Défenses, I. 33.
 Defrutum, I. 214.
Demiseptier, I. 7.
 Denarius Consularis, I. 8.
 Imperialis, I. 8.
 Dens Leonis, I. 204.
Dent de Cheval marin, I. 120.
 Dentalia, I. 98.
 Dentellaria, I. 98.
 Dentaria, I. 98.
 Dentium præparatio, II. 104.
 Deunx, I. 7.
 Dextans, I. 7.
 Diacaryon, II. 283.
 Diacodion, II. 104.
 Diacodium liquidum, II. 321.
 Diacrydium, I. 190. II. 104.
 Diacydonium Aromaticum, II. 104.
 Jalappinum, II. 105.
 Lucid. Jalapp. II. 105.
 Simplex, II. 106.
Diamant, I. 18.
 Diaphoreticum Joviale, II. 10.
 Dictamnus, I. 98.
 Digestivum liquefactum, II. 106.
 Digitalis, I. 99.
Dintenbeerlein, I. 134.
 Dipsacus, I. 99.
 Dispensatorium, I. 2.
 Dodrans, I. 7.
Doitier, I. 99.
Dompte Venin, I. 120.
 Doronicum, I. 99.
Douce amere, I. 24.
 Drachma, I. 8. 10.
 Δράχμη, I. 8.
 Draconis sanguis, I. 99.
 Dracunculus, I. 100.
Dragun, I. 100.
Dreche, I. 138.
Dreyfaltigkeit, I. 123.
 Duellus, I. 8.
 Dulcamara, I. 100.
Durchwachs, I. 164.
Dürrwurz, I. 88.
 Dyll, I. 29.
Eau d'Arquebuse, II. 44.
 de Bouquets, II. 81.
 Divine, II. 79.
 de Lavande, II. 131.
 de Madame la Vrilliere, II. 85.
 Sans pareille, II. 39.
 Ebenum Lignum, I. 100.
 Eberia, I. 10.
Eberswurz, I. 64.
 Ebulus, I. 100.
 Ebur, I. 100.
 Fossile, I. 101.
 Ustum, I. 107.
Eclaire, I. 77.
 Eclegma, II. 107.
Ehrenpreis, I. 211.
 wilder, I. 101.
Eiche, I. 76.
Einbeere, I. 163.
Einhorn, I. 215.
Eisen, I. 105.
Eisenhütlein, I. 117.
Eisenkraut, I. 211.
 Ejub, I. 10.
 Elæosaccharum, II. 107.
 Aurantiorum, II. 107.
 Citri, II. 107.

INDEX

- Elaterium, II. 108.
 Elatine, I. 101.
 Electuarium Anthelminticum, II. 108.
 Antifebrile, II. 109.
 e Baccis Lauri, II. 109.
 Cathol. II. 110.
 pro Clyster II. 110.
 Dupl. c. Rh. II. 111.
 Chalybeatum, II. 112.
 Dentifric. II. 112. 115.
 Diafatoryium, II. 112.
 Diaford. FRAC. II. 113.
 Suecor. II. 114.
 Diatragacanthæ, II. 114.
 ad Gingiv. TRIL. II. 115.
 Gingivale, *Argent.* *ibid.*
 Hamech, II. 16.
 Hiera picra, II. 116.
 Hydragogum, II. 116.
 pro Infantibus, II. 117.
 Joviale, II. 117.
 Lenitiv. *Austr.* II. 117.
 FLORENZ. II. 117.
 ad morbos Pforicos,
 II. 118.
 de Manna, II. 119.
 Mithridaticum, II. 119.
 Mundificans, II. 121.
 pro Pecoribus, II. 121.
 Pectorale, II. 121.
 Philonium Rom. *ibid.*
 Purgans, II. 122.
 Resumtivum, II. 123.
 Requies NICOL. II. 120.
 ad Stomacacem, II. 124.
 ad Tæniæ, II. 117.
 Tamarind. II. 117. 124.
 Elemi Gummi, I. 101.
 Elendsklauen, I. 20.
 Elfenbein, I. 100.
 Elixir, II. 127.
 Elixir Acidum DIPPელი, II. 32. 127.
 HALLER, II. 127.
 Aloës Saponaceum, II. 128.
 Antharthriticum, II. 129.
 Anthelminticum, II. 129.
 Anticolicum Crocatum, II. 129.
 Antinephriticum, II. 37.
 Antipodag. DIPPელი, II. 37.
 GULDENKLEE, II. 129.
 Antiscorbuticum, II. 130.
 Antivenereum, II. 130.
 Aperitiyium, II. 131.
 Balsamicum HOFFM. II. 131.
 Pectorale, II. 132.
 Temperatum, II. 132.
 WERLHOFII, II. 132.
 Citri, II. 133.
 Purgans, II. 133.
 de GARUS, II. 134.
 Juniperinum, II. 134.
 Pectorale Kegis Daniæ, II. 134.
 RINGELMANNI, II. 134.
 WEDELII, II. 135.
 Polychrestum, II. 135.
 Proprietatis sine Acido, II. 136.
 Album, II. 136.
 Amarum, II. 128.
 Dulce, II. 136.
 PARACELSI, II. 136.
 Rhabarbar. II. 137.
 STAHLII, II. 128.
 Stomachicum *Edinb.* II. 137.
 ROSENSTEIN, II. 138.
 STOUGHTON, II. 138.
 Uterinum, II. 138.
 Elfenbaum, I. 73.
 Emeraude, I. 196.
 Emery, I. 197.
 Emplastrum, II. 142.
 Abbat. DE GRACE, II. 143.

INDEX

- Emplastrum Adhæsivum*, II. 143.
Album coctum, II. 144.
de Ammoniaco, II. 144.
 c. *Mercur.* II. 144.
Anglicum, II. 144.
Anodynum, II. 145.
 in *Cancro*, II. 145.
Antapoplecticum, II. 146.
Attrahens, II. 147.
de Baccis Lauri, II. 147.
 Suecor. II. 151.
de Belladonna, II. 147.
de Betonica, II. 148.
ad Bubones vener. II. 148.
Camphoratum, II. 149.
Catagmaticum, II. 149.
Cephalicum, II. 149.
de Cicuta, II. 150.
Citrinum, II. 150.
ad Clavos Pedum, II. 151.
Commune, II. 151. 155.
de Crusta Panis, II. 151.
de Cumino, II. 151.
Defensivum, II. 151.
Diabotanum, II. 151.
Diachalcitis, II. 154. 155.
Diachylon c. Gum. II. 155.
Diapalmæ, II. 155.
Diaphœnicon, II. 155.
Diaphoreticum, II. 156.
Diapompholygos, II. 156.
Diafulphuris, II. 157.
Divinum, II. 157.
ad Dolor. dentium, II. 150.
Domus Misericordiæ, II.
 149. 164.
Filii ZACHARIÆ, II. 168.
ad Fonticulos, II. 76.
ad Fracturas, II. 149.
Frigidum, II. 158.
- Emplastrum ad Fungos Articul.* II. 159.
de Galbano, II. 160.
ad Ganglia, II. 159.
Gryfeum, II. 160.
Gummosum, II. 155.
ad Hernias, II. 161.
de Hyoscyamo, II. 161.
Incognitum, II. 162. 167.
Ischiaticum, II. 162.
de Lap. Calamin. II. 155.
 WECK. II. 160.
ad Lupiam, II. 162.
Magneticum, II. 162.
Mammillare, II. 163.
Malacticum, II. 163.
Manus Dei, II. 158.
de Meliloto, II. 163.
Mercuriale, II. 163.
de Minio, II. 163.
Miraculosum, II. 164. 168.
de Nicotiana, II. 164.
Nigrum, II. 164.
Noricum, II. 164. 165.
Opodeldoch, II. 158. 165.
Polychr. II. 143. 166. 168.
de Ranis, II. 166.
 c. *Merc.* II. 166.
Santalinum, II. 167.
Saponatum, II. 167.
Saturn. *BARBETT* II. 167.
 GOULARD, II. 168.
 MYNSICHT, II. 168.
de Spermate Ceti, II. 168.
 Ranarum II. 168.
Spleneticum, II. 150. 169.
Stictic. *CROLLII*, II. 169.
 PLENCK, II. 144. 170.
Stomachicum, II. 151.
de Tacamachuca, II. 170.
ad Tempora, II. 150. 170.
 Emplastrum

I N D E X

- Emplastrum Tetrapharmacum, II. 150. *Fschalodes*, I. 22.
 Triapharm. II. 164 170. *Fschen*, I. 108.
 Vesicatorium, II. 170. *Fsprit de Savon*, II. 43.
 Viride, II. 151. 170. *Essentia*, II. 72.
- Emulsio, II. 70. *Alexipharmaca*, II. 173.
 Arabica, II. 171. *Temperata*, II. 174.
 Balsamica, II. 171. *Amara*, II. 174.
 Camphorata, II. 171. 172. *Ambrae*, I. 25. II. 74.
 Nitrata, II. 171. 172. *Sicca*, II. 175.
 Simplex, II. 172. *Anodyna*, II. 175.
 Violata, II. 172. *Antimonii*, II. 19. 175.
- Encens*, I. 157. *Balsamica*, II. 175.
Ende, I. 74. *Bezoardica*, II. 175.
Endivia, I. 101. *Calami*, II. 175.
Endivien, I. 101. *Camphoræ*, II. 175. 314.
Engelsius, I. 172. *Carminativa* TRILLER. II. 175.
Englischer Taffet, II. 145. *WEDEL*. II. 177.
- Entalia*, I. 101. *Castorei*, II. 177.
Ente, I. 29. *Catholica*, II. 129.
Ens Veneris, II. 172. *Purgans*, II. 178.
- Enula*, I. 101. *Chinae*, II. 178.
Ephen, I. 116. *Dulcis*, II. 178.
Epine blanche, I. 160. *Fuliginis*, II. 178.
 Vinette, I. 47. *Hysterica*, II. 179.
Epithimum, I. 95. 102. *Lignorum*, II. 179.
- Eponge*, I. 199. *Sicca Aurantiorum*, II. 107.
Eppich, I. 33. *Citri*, II. 107.
Epsonense Sal, I. 30. *Myrrhæ*, II. 108.
- Epurge*, I. 70. *Stomach*. HOFFMANN. II. 180.
Equisetum, I. 102. *Polychresta*, II. 180.
- Erable*, I. 16. *Succini*, II. 181.
- Erdbeeren*, I. 107. *Traumatica*, II. 181.
- Erica*, I. 102. *Essig*, I. 17.
- Erinaceus*, I. 102. *Estragon*, I. 108.
- Erlen*, I. 22. *Esula*, I. 103.
- Erndtrose*, I. 139. *Etain*, I. 199.
- Eruca*, I. 102. *Eufraise*, I. 103.
- Ervum*, I. 160. *Eupatoire*, I. 103.
- Eryngium*, I. 102. *Eupatorium*, I. 103.
- Erysimum*, I. 103. *Euphorbium*, I. 103.
- Ddd

INDEX

- Euphrasia, I. 103.
 Extractum, II. 182.
 Aconiti, II. 182.
 Aloës, II. 9.
 Belladonnæ, II. 182.
 Catholicum, II. 183.
 Chelidonii Majoris, II. 182.
 Cicutæ, II. 182.
 Cochleariæ, II. 182.
 Hellebori nigri, II. 183.
 Hyofcyami, II. 182.
 Liquiritiæ gummosæ, II. 184.
 Marocostinum, II. 184.
 Nicotianæ, II. 182.
 Opii, II. 185.
 Cydoniatum, II. 185.
 Panchymagogum, II. 185.
 RUDI, II. 186.
 Saturni, II. 186.
 Strammonei, II. 182.
 Taraxaci, II. 182.
 Eydexe, I. 129.
 Eyer, I. 111.
 Faba, I. 104.
 Ægyptia, I. 9.
 Alexandrina, I. 9.
 Crassa, I. 104.
 Græca, I. 9.
 Sancti Ignatii, I. 104.
 Marina, I. 215.
 Syriaca, I. 9.
 Ferberræthe, I. 182.
 Fagopyrum, I. 104.
 Fagus, I. 105.
 Fungzahn, I. 33.
 Faon, I. 74.
 Farfara, I. 105.
 Farinæ Emollientes, II. 186.
 Resolventes, II. 186.
 Farren, I. 106.
 Faulbaum, I. 108.
 Febrifugum CRAANII, II. 187.
 Fecula, II. 187.
 Feigbohnen, I. 137.
 Feigen, I. 64.
 Feigwarzwurzel, I. 77.
 Fel Vitri, I. 105.
 Feldkressen, I. 154.
 Fenchel, I. 106.
 Fenouil, I. 106.
 de Mer, I. 91.
 Fer, I. 105.
 Ferrum, I. 105.
 Fette Henne, I. 91. 104.
 Fève des Marais, I. 104.
 Fiala, I. 10.
 Fieberkraut, I. 206.
 Fiel de Verre, I. 105.
 Figes, I. 64.
 Filipendula, I. 106.
 Filix, I. 106.
 Fingerhut, I. 99.
 Fischbein, I. 194.
 Flachs, I. 135.
 Flagerina, I. 10.
 Flambe batarde, I. 17.
 Flammula Jovis, I. 84.
 Fleurs de Muscade, I. 138.
 Fliegen Spanische, I. 60.
 Fløhkrant, I. 165.
 Floehsaamen, I. 173.
 Flores Antimonii, II. 187.
 Benzoës, II. 187.
 Cordiales, I. 13.
 Salis Ammoniac. Mart. II. 188.
 Sulphuris, II. 188.
 Viridis Æris, II. 188.
 Zinci, II. 189.
 Florum collectio, I. 10.

INDEX

- Fœniculum*, I. 106.
 Dulce, I. 107.
 Italicum, 107.
Fœnugræcum, I. 107.
Foliorum collectio, I. 10.
Fomentatio frigida, II. 189.
Fomentum Anodynum, II. 189.
 ad Erysipelas, II. 189.
Formica, I. 107.
Formicæ Ova, I. 107.
Fotus ad Gangrænam, II. 190.
Fougere, I. 106.
Fourmis, I. 107.
Fragaria, I. 107.
Fraicasse, I. 71.
Frais de Grenouilles, I. 176.
Fraises, I. 107.
Fraisier, I. 107.
Framboises, I. 182.
Frangula, I. 108.
Franchipane, I. 128.
Franzosenholz, I. 115.
Fraueneis, I. 113.
Frauenhaar, I. 61.
Frauenmantel, I. 20.
Frauenmünz, I. 44.
Fraxinus, I. 108.
Freue, I. 108.
Fromage, I. 66.
Frosch, I. 176.
Froschlaich, I. 176.
Fructuum collectio, I. 10.
Fuchs, I. 216.
Fuden faule, I. 88.
Fuligo, I. 108.
Fumaria, I. 109.
Fune terre, I. 109.
Fünf Finger Kraut, I. 164.
Furfures, I. 109.
 Amygdalarum, I. 28.
Galanga, I. 109.
Galbanum, I. 110.
Galbuli, I. 94.
Galda, I. 110.
Galega, I. 110.
Galeopsis, I. 110.
Gallæ, I. 110.
Gallapfel, I. 110.
Gallium, I. 111.
Gallitrichum, I. 121.
Gallon, I. 7.
Galmey, I. 56.
Gamanderlein, I. 76.
Ganchus, I. 9.
Gans, I. 31.
Gensblume, I. 47.
Gensdistel, I. 197.
Genferich, I. 31.
Garance, I. 182.
Garderobe, I. 14.
Gargarisma Acetosum, II. 190.
 Adstringens, II. 190.
 Antiscorbuticum, II. 190.
 Detergens, II. 191.
 Emolliens, II. 191.
 Mercuriale, II. 192.
 ad Pituitam, II. 192.
 c. Spir. Sal. Ammon. II. 192.
Gartencypressen, I. 14.
Gauchheil, I. 28.
Geigenharz, I. 87.
Geisbart, I. 44.
Geisrauten, I. 110.
Gelatina, II. 193. 233.
 Analeptica, II. 193.
 Cornu Cervi Amygd II. 194.
 Citrata, II. 194.
Cydoniorum, II. 106.
Fructuum, II. 194.
Liquiritiæ, II. 184.
 D d d 2

I N D E X

- Gelatum, II. 195. 283.
Gemsenkugel, I. 18.
Gemsenwurzel, I. 99.
Genet, I. 112.
Genevre, I. 126.
Genippi, I. 14.
Genista, I. 112.
Gentiana, I. 112.
Gentianella, I. 113.
Gentienne, I. 112.
Geranium, I. 113.
Germandrée, I. 76.
Gerste, I. 120.
Geweih, I. 74.
Gichtrose, I. 161.
Giftheil, I. 32.
Gilla, II. 195.
Gingembre, I. 218.
Ginseng, I. 113.
Girofflée, I. 77.
Glacies Mariæ, I. 113.
Glas, I. 215.
Glaskall, I. 105.
Glaskopf, I. 116.
Glaskraut, I. 162.
Gliedkraut, I. 195.
Globuli Carminativi, II. 195.
 Martiales, II. 195.
 Mofchati, II. 196.
Globus ad Erysipelas, II. 195.
Glouteron, I. 45.
 petit, I. 217.
Glu, I. 213.
Gluten Pectorale, II. 184. 196.
Glycyrrhiza, I. 113.
Gold, I. 43.
Goldwurzel, I. 40.
Golden Gansel, I. 54.
Goldenwidderrhon, I. 18.
Gormin, I. 9.
Gossypium, I. 114.
Gottesgnadenkraut, I. 115.
Goudron, I. 170.
Goutte de Lin, I. 95.
Grains de Musc, I. 14.
Gramen, I. 114.
Gramma, I. 9.
Granatum, I. 114.
Granatus, I. 115.
Grasblume, I. 209.
Gratecul, I. 96.
Grateron, I. 32.
Gratiola, I. 115.
Gremil, I. 147.
Grenouille, I. 176.
Grieffkraut, I. 144.
Grindwurzel, I. 130.
Grosseilles, I. 180.
Grossularia, I. 180.
Gruatum, I. 42.
Grundheil, I. 159.
Grünspan, I. 213.
Guajacum, I. 115.
Gui, I. 213.
Guimauve, I. 23.
Gundelreb, I. 116.
Guttæ Anglicæ, II. 196.
 Generalis DE LAMOTTE, II. 196.
 Albæ, II. 197.
Guttæ Gummi, I. 116.
Haarstrang, I. 166.
Haas, I. 133.
Habern, I. 41.
Hæmatites, I. 116.
Hagenbutte, I. 96.
Hahnenfus, I. 177.
Hahnenfüslein, I. 62.
Haffitius, I. 10.
Halicacabum, I. 21.

I N D E X

- Hanf*, I. 60.
Hanneton, I. 90.
Harmi, I. 9.
Harnkraut, I. 135.
Harnkräutcl, I. 119.
Hartriegel, I. 134.
Harz, I. 178.
Hafelnus, I. 41.
 Römische, I. 41.
Hafelwurzel, I. 39.
Hauhechel, I. 157.
Hauswurzel, I. 193.
Hecht, I. 136.
Hedera, I. 116.
Hederæ Gummi, I. 116.
Heide, I. 102.
Heidelbeeren, I. 152.
Heidenkorn, I. 104.
Helenæ S. Radix, I. 118.
Helenium, I. 101.
Helianthemum, I. 117.
Heliotropium, I. 117.
Hellebore batard, I. 117.
Helleborus, I. 117. 118.
Helminthochorton, I. 118.
Hemina, I. 9.
Hepar Antimonii, II. 197. 281.
Hepatica, I. 119.
Hepatique d'eau, I. 119.
Herbarum collectio, I. 113.
Herbe de S. Barbe, I. 44.
 aux Chats, I. 154.
 à Eternuer, I. 174.
 de la Goutte, I. 180.
 aux Perles, I. 147.
 aux Puces, I. 173.
Herisson, I. 102.
Hermodyctyli, I. 119.
Herniaria, I. 119.
Herniole, I. 119.
Heron, I. 34.
Herzblümlein, I. 114.
Herzgespann, I. 63.
Hêtre, I. 105.
Himbeere, I. 182.
Himmelschlüssel, I. 173.
Himmelftengel, I. 113.
Hinnulus, I. 74.
Hippocastanum, I. 119.
Hippopotami Dentes, I. 120.
Hircus, I. 120.
Hirondelle, I. 120.
Hirudo, I. 120.
Hirundinaria, I. 120.
Hirundo, I. 120.
Hirschbrunst, I. 50.
Hirschkalb, I. 64.
Hirschwurzel, I. 112.
Hispidula, I. 43.
Hohlwurzel, I. 35.
Holca, I. 8.
Holder, I. 186.
Holderchwämmchen, I. 43.
Honig, I. 143.
Hordeum, I. 120.
Horminum, I. 121.
Houblon, I. 137.
Houx petit, I. 183.
Hopfen, I. 137.
Huile des Fleurs d'Oranges, II. 81.
 d'Œillets, I. 162.
Hundskoth, I. 20.
Hundszung, I. 96.
Hünerdarm, I. 23.
Hyacinthus, I. 121.
Hydrargyrum, I. 146.
Hydromel, II. 197.
Hydropiper, I. 165.
Hyofcyamus, I. 121.
Hypericum, I. 122.

I N D E X

- Hypocyftidis Succus, I. 122.
 Hyſſopus, I. 122.
 Hyltricis lapis, I. 122.
- Jacea, I. 123.
Jacinthe, I. 121.
 Jacobæa, I. 123.
Jacobszwiebel, I. 72.
 Jalappa, I. 123.
 Japonica terra, I. 70.
 Jaſminum, I. 123.
ibifch, I. 23.
 Ichthyocolla, I. 124.
Je länger je lieber, I. 24.
 Jeſuitarum Cortex, I. 78.
Igel, I. 102.
Imber, I. 218.
 Imperatoria, I. 124.
 Indi folia, I. 124.
 Indigo, I. 124.
 Infuſum amarum, II. 197.
 Angelicum, II. 198.
 Laxativum, II. 198.
 Malti, II. 198.
 Picis, II. 198.
 Rhei Salinum, II. 338.
 Saponaceum, II. 58.
- Injeſtio auricularis, II. 198.
 Balfamica, II. 199.
 Detergens, II. 199.
 Mercurialis, II. 199.
- Ingber*, I. 218.
Ingrün, I. 211.
 Intybus, I. 101.
Johannisbeeren, I. 180.
Johannisbrod, I. 196.
Johanniſkraut, I. 122.
Johanniſtrauben, I. 180.
Joubarbe, I. 193.
Ipecacuanha, I. 125.
- Iris, I. 125.
Iſop, I. 122.
 Jubabæ Cortex, I. 126.
 Judaicus Lapis, I. 126.
Judenkirſchen, I. 21.
 Juglans Nux, I. 126.
 Jujubæ, I. 126.
Jujubes, I. 126.
 Julapium Kegium, II. 200.
 Julepus acidulatus, II. 199.
 Roſarum, II. 200.
- Juniperus, I. 126.
Ivette, I. 76.
Juſquiame, I. 121.
- Kes*, I. 66.
 Kaſſitium, I. 10.
Kalkſtein, I. 57.
Kameelheu, I. 190.
 Kararit, I. 9.
Kartendiſtel, I. 99.
Katze, I. 70.
Katzenepplein, I. 43.
Katzenkraut, I. 154.
Katzentraube, I. 192.
Katzenwadel, I. 102.
Katzenwurzel, I. 167.
Kaulparſtein, I. 164.
Kellereſel, I. 148.
 Kemeraja, I. 9.
Κεράτιον, I. 8.
 Kermes mineralis, II. 200.
 Kermet, I. 9.
Keſſelbeeren, I. 160.
Keſte, I. 68.
Kiecherverbſen, I. 79.
Kieſelſtein, I. 195.
 Kikenumalo, I. 127.
 Kiriatic, I. 9.
 Kiſt, I. 10.

INDEX

- Kirschen*, I. 63.
 Cornel, I. 90.
 Herz, I. 73.
 wald, I. 73.
 Wasser, I. 73.
 welsche, I. 90.
Klapprosen, I. 162.
Klebkraut, I. 32.
Klee, I. 209.
Kletten, I. 45.
Kleyen, I. 109.
Knoblauch, I. 2.
κοχλίτριον, I. 90.
Königsgelb, I. 37.
Körbelkraut, I. 74.
Kohl, I. 52.
Kolben, I. 75.
κόγχη, I. 9.
Körck, I. 201.
κοτύλη, I. 9.
Krahenaugen, I. 216.
Krähensfus, I. 90.
Kraut, I. 52.
 weis, I. 195.
Kreide, I. 91.
Kressen, I. 153.
 wilder, I. 44.
Kreutzbeerlein, I. 198.
Kreutzblume, I. 171.
Kröte, I. 54.
 Stein, I. 54.
Kuchensalz, I. 185.
Kuchenschell, I. 174.
Kummel Berg, I. 195.
 Matten, I. 65.
 Schwarzer, I. 155.
Kunigundenkraut, I. 103.
Kupfer, I. 94.
Kürbis, I. 93.
 Efels, I. 93.
Kuffuf, I. 10.
κύαθον, I. 9.
Lablab, I. 128.
Lac, I. 128.
 Lunæ, I. 128.
 Virginum, I. 47. II. 201.
Lacca, I. 128.
Lachenknoblauch, I. 191.
Lacerta, I. 129.
Lacmus, I. 117.
Lacryma Job, I. 39.
Lactuca, I. 129.
 Virosa, I. 130.
Ladanum Gummi, I. 130.
Ladys black sticking plaister, II. 145.
Laitron, I. 197.
Laitue, I. 129.
Lamium, I. 130.
 Plinii, I. 144.
Langue de Chien, I. 96.
 Serpent, I. 158.
Lapathum, I. 130.
Lapis causticus, II. 73. 201.
 Divinus, II. 201.
 Infernalis, II. 202.
 Lyncis, I. 96.
 Martialis, II. 202.
 Medicamentof. CROLLII, II. 202.
 GEOFFR. II. 203.
 Ophthalmicus, II. 201.
 Prunellæ, II. 203.
Lapidum præparatio, II. 203.
 Pretiosiorum fragment. I. 113.
Lauch, I. 173.
Laudanum liquidum, II. 204.
 Opiatum, II. 204.
Lavendula, I. 131.
Laureola, I. 147.
Laureole Semence de, I. 85.

INDEX

- Laurocerafus, I. 131.
 Laurus, I. 131.
 Alexandrina, I. 217.
Laurier, I. 131.
Lauskraut, I. 117.
 Lazulus Lapis, I. 132.
Leberkraut, I. 119.
 Lemnitchorton, I. 118.
 Lemnia terra, I. 132.
 Lens, I. 132.
 Palustris, I. 133.
Lentille, I. 132.
 Lentiscus, I. 133.
 Lepidium, I. 133.
Λένω, I. 8.
 Lepus, I. 133.
Lerchenschwamm, I. 19.
 Levisticum, I. 133.
 Leveche, I. 133.
Lewat, I. 153.
Lezard, I. 129.
Lianne à Serpent, I. 55.
 Libra, I 6. 8.
Licorne, I. 215.
Liebäckel, I. 133.
Liege, I. 201.
Liene, I. 84.
Lienen, I. 84.
Lierre, I. 116.
Lievre, I. 133.
 Ligula, I. 9.
 Ligustrum, I. 134.
 Lilium album, I. 134.
 Convallium, I. 134.
 PARACELSI, II. 204.
Limaçon, I. 135.
 Rouge, I. 86.
 Limatura Martis, I. 106.
 Limax, I. 135.
 Limon, I. 83. 135.
 Limonada, II. 278.
 Mineralis, II. 205. 253.
 Sicca, II. 205.
 Linaria, I. 135.
Linnaire, I. 135.
 des Montagnes, I. 96.
Linden, I. 208.
 Lingua Avis, I. 108.
 Cervina, I. 191.
 Linimentum album, II. 205.
 Alcalinum, II. 205.
 Antipleuriticum, II. 205.
 Cereum, II. 206.
 Volatile, II. 206.
Linse, I. 132.
Lin, I. 138.
 Linum, I. 135.
 Catharticum, I. 135.
 Liquor Anodynus mineralis, II. 206.
 Topicus, II. 207.
 Alter, II. 207.
 Antipodagricus, II. 208.
 Aperitivus *Argentorat.* II. 208.
 HOFFMANNI, II. 208.
Liqueurs, II. 79.
 Liquiritia, I. 113.
 Cocta alba, II. 204.
 Citrina, II. 205.
 Lucida, II. 184.
 Tornata, II. 205.
 Liquor Cornu Cervi Succinat. II. 208.
 Digestivus, II. 208.
 Lithontripticus, II. 209. 211.
 contra Luem veneream, II. 210.
 Meningum, II. 209.
 Mercurialis, II. 37.
 Nitri fixi, II. 209. 227.
 Probatorius, II. 209.
 Siphiliticus, II. 209.
 Spleneticus, II. 210.

Liquor

I N D E X

- Liquor stypticus, II. 39. 210.
 Terræ foliatæ Tartari, II. 210.
 Vegeto-mineralis, II. 210.
Lis, I. 134.
Litharge, I. 135.
 Lithargyrium, I. 135.
 Lithontripticum, II. 211.
 Lithospermum, I. 147.
 Lixivia Alcalina, II. 312.
 Lixivium causticum, II. 211.
 Saponarium, II. 211.
 Tartari, II. 235.
 Loch album, II. 211.
 ad Asthma, II. 215.
 Balsamicum, II. 213.
 de Farfara, II. 212.
 Japonicum, II. 212.
 Leniens, II. 212.
 de Pulmone Vulpis, II. 213.
 Sanum & expertum, II. 213.
 Saponatum, II. 214.
Læffelkraut, I. 85.
 Look Gummi, I. 135.
 Lotus ad Hæmorrhoides, II. 214.
 Rheumatifinos, II. 214.
 Saponaceus, II. 214.
 ad Tineam, II. 215.
 Lopezia, I. 136.
Lorbeer, I. 131.
Loup, I. 137.
 Lucius, I. 136.
 de Lugos Cortex, I. 78.
 Lumbricus terrestris, I. 136.
 Luminaria, I. 2.
Lunaire, I. 136.
 Lunaria, I. 136.
Lungenkraut, I. 174.
Lungenmoos, I. 174.
Lupin, I. 137.
 Lupinus, I. 9. 137.
 Lupulus, I. 137.
 PARS II.
 Lupus, I. 137.
Lurchel, I. 21.
 Lycopodium, I. 137.
 Lyfimachia, I. 138.

Maaslieben, I. 47.
 Macis, I. 138.
 Magdaleo, II. 143.
 Magisterium Marcasitæ, II. 215.
 Saturni, II. 215.
 Sulphuris, II. 215.
 Magnes, I. 138.
 Arfenicalis, II. 215.
 Magnesia alba, II. 216.
Magfaamen, I. 163.
 Majorana, I. 138.
 Malabatri folia, I. 124.
 Malacensis Lapis, I. 122.
Magnet, I. 138.
Malaguettes, I. 162.
 Malaxare, II. 140.
 Malicorium, I. 114.
 Malta, I. 74. 138.
 Malva, I. 139.
 Arborea, I. 139.
 Malvaticum Juniperinum, II. 134.
 Malum Punicum, II. 119.
Malz, I. 138.
 Mandragora, I. 139.
 Manes, I. 8.
Mangold, I. 48.
Maniguette, I. 162.
 Manna, I. 139.
 Liquida, II. 216.
 Tabulata, II. 217.
 Tartarifata, II. 217.
Mannstreu, I. 102.
 Marcasita, I. 49.
 Mare, I. 214.
 Margaritæ, I. 140.
Marguerite, I. 47.
 Eee

INDEX

- Mariendistel*, I. 64.
 Magdalenen Blumen, I. 198.
Marjolaine, I. 138.
Marmelade, I. 36.
Marmotte, I. 150.
Marrons, I. 68.
Marronnier, I. 119.
Marrubium, I. 140.
 Nigrum, I. 41.
Marum, I. 41.
Massa ad Fornacem, II. 217.
Massoy, I. 141.
Mastyx, I. 141.
Mater Perlarum, I. 142.
Materia Perlata, II. 12.
Matricaire, I. 142.
Matricaria, I. 142.
Matrifylva, I. 119.
Maueresel, I. 148.
Mauerrauten, I. 183.
Maulbeere, I. 148.
Maulwurf, I. 203.
Mausdorn, I. 183.
Mauve, I. 139.
Maykafer, I. 190.
Meccæ Balfamum, I. 142.
Mechoacanna, I. 142.
Medicamentorum affervatio, I. 11.
 Compilationes veteres, I. 2.
Medicamentum, I. 83.
Medulla Saxorum, I. 143.
Meerballen, I. 167.
Meerbohnen, I. 215.
Meerfenchel, I. 91.
Meerkohl, I. 197.
Meermoos, I. 90.
Meerrettich, I. 36.
Meerzwiebel, I. 90.
Meisterwurzel, I. 124.
 Schwarze, I. 40.
- Mel*, I. 143.
 Ægyptiacum, II. 351.
 Anthofatum, II. 217.
 Despumatum, II. 217.
 Mercuriale, II. 218.
 Rosarum, II. 218.
Melanteria, I. 215.
Melilotus, I. 143.
 Cærulea, I. 143.
Melissa, I. 144.
 Canariensis, I. 144.
 Turcica, I. 144.
Melisse des Montagnes, I. 144.
Melissophyllum, I. 144.
Melitenis Fungus, I. 144.
Melitochorton, I. 118.
Melo, I. 144.
Melon d'eau, I. 84.
 Wasser, I. 84.
Melten, I. 140.
 Hunds, I. 41.
 Mist, I. 216.
 wilde, I. 41.
Menning, I. 148.
Mensuræ, I. 7.
Mentha aquatica, I. 146.
 Balfamina, I. 145.
 Crispa, I. 145.
 Longifolia, I. 145.
 Piperitis, I. 145.
 Rubra, I. 146.
Menthastrum, I. 146.
Menyanthes, I. 209.
Mercurialis, I. 146.
Mercurius, I. 146.
 Corallinus, II. 220.
 Corrosivus, II. 220.
 Cosmeticus, II. 217.
 Diaphoreticus, II. 218.
 Dulcis, II. 218.

I N D E X

- Mercurius Emeticus flavus, II. 347.
 Gummosus, II. 219.
 Liquidus, II. 219.
 Præcipitatus albus, II. 219.
 flavus, II. 220.
 ruber, II. 220.
 Saccharatus, II. 220.
 Sublimatus, II. 220.
 Vitæ, II. 221.
Merde des Chiens, I. 20.
Meres de Giroffes, I. 31.
Merein, I. 74.
Merises, I. 70.
Mespeln, I. 146.
Mespili, I. 146.
Metalista, I. 147.
Μητρηρίς, I. 9.
Meule, I. 74.
Meum, I. 147.
Meures de Renard, I. 182.
Mewier, I. 148.
Meyenblümlein, I. 134.
Mezeræum, I. 147.
Miel, I. 143.
Milium Solis, I. 147.
Millefolium, I. 147.
Millepedes, I. 148.
Millepertuis, I. 122.
Milten, I. 40.
Milzkrant, I. 75.
Mina, I. 8.
 Romana, I. 10.
Minium, I. 82. 148.
Mispel, I. 213.
Misy, I. 215.
Missohars, I. 10.
Miva Cydoniorum, II. 221.
 Aromatica, II. 221.
Mixtura Asthmatica, II. 222.
 Diatrion, II. 222.
Mixtura Mineralis, II. 209.
 Salina volatilis, II. 209.
 Simplex, II. 222.
 Tonico-nervina, II. 222.
Mvz, I. 8.
Mehren, I. 97.
Mellelein, I. 35.
Moldavica, I. 144.
Momordica, I. 148.
Mondbeeren, I. 160.
Mondraute, I. 136.
Moosbeeren, I. 160.
Morelle, I. 197.
Morgeline, I. 23.
Morilli, I. 35.
Moringa, I. 148.
Morfuli, II. 223.
 Antimoniales, II. 223.
 Aromatici, II. 224.
 Citri, II. 224.
 Imperatoris, II. 224.
 Purgantes, II. 224.
 ad Scabiem, II. 225.
 contra Vermes, II. 225.
Morfus diaboli, I. 201.
Morus, I. 148.
Mofchus, I. 149.
Most, I. 214.
Mottenkraut, I. 182.
Mouron, I. 28.
Mouffe marine, I. 90.
Mout, I. 214.
Moutarde, I. 196.
Moxa, I. 38.
Mucilagines, II. 225.
Muckenkraut, I. 165.
Muguet, I. 134.
 des bois, I. 119.
Muit, I. 7.
Mumia, I. 149.
E e e 2

INDEX

- Mungos, I. 150.
Münzbalsam, I. 145.
Murmelt hier, I. 150.
 Mus marinus, I. 150.
 Montanus, I. 150.
Musc, I. 149.
Muscatenblüthe, I. 138.
Muscatusse, I. 149.
 Muscerda Catechu, II. 346.
Muscheln, I. 88.
 Mucus Acaciæ, I. 150.
 Albus Quernus, I. 150.
 Arboreus, I. 150.
 Cumatilis, I. 150.
 Erectus, I. 151.
 Pyxidatus, I. 151.
 Terrestris, I. 151.
 Mustela, I. 151.
 Mustum, I. 214.
 Myrobalani, I. 151.
 Myrrha, I. 152.
 Myrtilli, I. 152.
 Myrtus, I. 152.
 Brabantica, I. 152.
 Μύσγον, I. 9.

 Nabach, I. 9.
Nachtschatten, I. 197.
Nacre des Perles, I. 142.
Nägelein, I. 66.
 gelbe, I. 77.
 Koepfe, I. 26.
 Rinde, I. 67.
Napel, I. 17.
 Naphæ Flores, I. 42.
 Naphta Nitri, II. 309.
 Salis communis, II. 312.
 Vitrioli, II. 206.
 Napus, I. 135.
 Nashorn, I. 179.

Nasturtium aquaticum, I. 159.
 hortense, I. 153.
 Indicum, I. 153.
 Petraeum, I. 154.
 Sylvestre, I. 154.
Natterwurzel, I. 50.
 zünglein, I. 158.
Navau, I. 177.
Navet, I. 153. 177.
Nefles, I. 146.
Nelke, I. 209.
Nenufar, I. 156.
Nepeta, I. 154.
Nephriticum Lignum, I. 155.
Nephriticus Lapis, I. 154.
Nerprun, I. 198.
Nessel, I. 216.
 taube, I. 110.
Nicotiana, I. 155.
Nielle, I. 155.
Nieswurzel schwarze, I. 118.
 weisse, I. 117.
Nigella, I. 155.
Nihilum, I. 155.
Nil, I. 155.
Ninzin, I. 155.
Nitrum, I. 156.
 Anodynum, II. 12.
 Antimoniatum, II. 12.
 Depuratum, II. 226.
 Fixum, II. 226.
 Tabulatum, II. 226.
 Vitriolatum, II. 310.
Noir d'Espagne, I. 201.
Noisette, I. 41.
Noix de Galle, I. 110.
 Muscato, I. 149.
Nummularia, I. 156.
Nusse, I. 126.
Nux magna, I. 8.

I N D E X

- Nux Moschata*, I. 149.
 Indica condita, I. 149.
 Parva, I. 8.
 Regalis, I. 8.
Nymphæa, I. 156.

Ὠβολ Ⓞ, I. 8.
Obolus, I. 8.
Ochra, I. 156.
Ochs, I. 51.
Ochsenzunge, I. 54.
 rothe, I. 20.
Oculi Cancrorum citrati, II. 227.
 ptæparati, II. 227.
Odermenning, I. 20.
Æillet, I. 209.
Æuf, I. 111.
Offa alba, II. 227.
Ohma, I. 7.
Oie, I. 31.
Oignon, I. 72.
Olampi Gummi, I. 156.
Olea cocta, II. 228.
 Destillata, II. 228.
 Expressa, II. 228.
 Infusa, II. 229.
Oleum Acusticum, II. 229.
 Animale, II. 229.
 Avellanorum, I. 41.
 Aurantiorum corticum, II. 228.
 Florum, II. 228.
 Behen, I. 46.
 Bergamottæ, I. 42.
 Bezoardicum, II. 230.
 Camphoræ, II. 230.
 Camphoratum, II. 230.
 Capparum, II. 230.
 Carminativ. Danorum, II. 231.
 Wurtemberg. II. 231.
 Catellorum, II. 231.
 Citri, II. 228.

Oleum Colocynthidis, II. 232.
 Heraclinum, I. 41.
 Hyperici, II. 232.
 Jasminum, II. 228.
 Lavendulæ, II. 228.
 Laurinum, I. 132.
 Lithuanicum, I. 49.
 Mucaginum, II. 232.
 Myrrhæ, II. 233.
 Neroli, I. 42. 228.
 Palmæ, I. 161.
 Philosophorum, II. 233.
 Rufficum, I. 49.
 Scarabæorum, II. 233.
 SLOTANI. II. 233.
 Stomachicum, II. 235.
 Tartari per deliquium, II. 235.
 Templinum, I. 178.
 Virioli, II. 235.

Olibanum, I. 159.
 Sylvestre, I. 159. 169.

Oliva, I. 157.
Ologinat, I. 9.
Olsnitium, I. 157.
Ombre, I. 39.
Ominos, I. 8.
Omphacium, I. 214.
Onolassent, I. 9.
Onoloffich, I. 9.
Ononis, I. 157.
Operment, I. 32.
Ophioglossum, I. 158.
Opiata adstringens, II. 236.
 Deterfiva, II. 236.
 Dysenterica, II. 236.
 Balsamica, II. 237.
 Febrifuga purgans, II. 237.
 simplex, II. 237.
Opium, I. 158.
Opobalsamum, I. 142.
 siccum, I. 165.

 E e e 3

INDEX

- Opoponax, I. 158.
Or, I. 43.
Oranges, I. 42.
Orcanette, I. 20.
Oreilles de Judas, I. 43.
Oreofelinum, I. 159.
Orge, I. 120.
Origanum Creticum, I. 159.
 Hispanicum, I. 159.
 Vulgare, I. 159.
Orleans, I. 159.
Orme, I. 276.
Orobus, I. 160.
Orpiment, I. 37.
Orpin, I. 91. 104.
Ortie, I. 216.
 blanche, I. 110.
Orvale, I. 121.
Oryza, I. 160.
Os de Sèche, I. 194.
Oseille, I. 16.
Osmunda, I. 160.
Ostecolla, I. 160.
Osterlucy, I. 35.
Ostrutium, I. 124. 160.
Ours, I. 216.
Ova, I. 111.
Ovum, I. 160.
Oxyacantha, I. 160.
ὄξυβάραρον, I. 9.
Oxycoccus, I. 160.
Oxycratum, II. 237.
Oxymel Æruginis, II. 351.
 Chalybeatum, II. 237.
 Colchicum, II. 237.
 Pectorale, II. 238.
 Scilliticum, II. 238.
 Simplex, II. 238.
Oxyfaccharum Emeticum, II. 238.
Oxytartarus, II. 330.
Pain, I. 161.
 de pourceaux, I. 95.
Palmæ Christi Semen, I. 69.
 Oleum, I. 69.
Panacea Holfatica, II. 239.
 Mercurialis, II. 239.
Panais, I. 163.
Panes faccharati purgantes, II. 239.
Panis, I. 161.
Pantoffelholz, I. 201.
Papaver album, I. 161.
 Erraticum, I. 162.
 Nigrum, I. 161.
Pâppel, I. 139. 172.
Paradieskörner, I. 162.
Paradisi grana, I. 162.
Paralysis, I. 174.
Pareira brava, I. 162.
Parietaria, I. 162.
Paris, I. 163.
Pas d'ane, I. 105.
Passerage, I. 133.
Pastulæ, I. 163.
 Laxativæ, II. 239.
Pasta Althæa, II. 240.
 Amygdalata Cosmetica, II. 240.
 Depilatoria, II. 240.
 Liquiritiæ, II. 241.
 ad Nævos, II. 241.
Pastilli Mercuriales, II. 241.
 Siphylitici KEYSER, II. 289.
Pastinaca, I. 163.
Patience, I. 130.
 d'eau, I. 53.
Patientia, I. 164.
Pavot, I. 162.
Peau divine, II. 142.
Pech, I. 170.
Pêche, I. 164.
Pedro del Porco, I. 122.

I N D E X

- Pensee*, I. 123.
Pentaphyllum, I. 164.
Percarum lapides, I. 164.
Perceboffe, I. 138.
Percefeuille, I. 164.
Percemouffe, I. 18.
Perche, I. 74.
Perfoliata, I. 164.
Perlen, I. 74. 140.
Perlenmutter, I. 142.
Perles, I. 140.
Perlures, I. 74.
Perfica, I. 164.
 Nux, I. 126.
Perficaria, I. 165.
Perfil, I. 166.
 des Montagnes, I. 112. 159.
Pervenche, I. 212.
Peruvianum Balsamum, I. 165.
 siccum, I. 165.
Peruvianus Cortex, I. 78.
Pes Cati, I. 43
Pestilenzwurzel, I. 166.
Pestnagel, I. 163.
Petalites, I. 166.
Peterlein, I. 166.
Petersilien, I. 166.
Petroselinum, I. 166.
 Macedonicum, I. 166.
Peucedanum, I. 166.
Peuplier, I. 172.
Pfaffenhüttlein, I. 93.
Pfaffentröhrllein, I. 204.
Pfeffer, I. 170.
 Kraut, I. 133.
Pfersing, I. 164.
Pfrimmen, I. 112.
Pharmaceutarum origo, I. 2.
Pharmacia quid, I. 1.
 Chemica, I. 3.
Pharmacia Galenica, I. 3.
Pharmacopœa, I. 1. 2.
Pharmacopœæ instructio, I. 4.
Pharmacopœi requisita, I. 3.
Pharmacopola, I. 2.
Phellandrium, I. 167.
Phu, I. 167.
Phytolacea, I. 167.
Pichurim, I. 167.
Pied d'Alouette, I. 88.
 de Chat, I. 43.
 d'Elan, I. 20.
 de Lion, I. 20.
 de Loup, I. 134.
Pierre d'Aigle, I. 19.
 de Perche, I. 164.
 de Ponce, I. 175.
Pierraves, I. 74.
Pignons, I. 168.
 d'Inde, I. 207.
Pilæmarinæ, I. 167.
Pillulæ Æthiopicæ, II. 242.
 Aluminosæ, II. 242.
 de Ammoniaco, II. 242.
 Angelicæ, II. 242.
 Anthelminticæ, II. 243.
 Antimoniales, II. 243.
 Aperientes, II. 243.
 Balsamicæ, II. 244.
 Cæruleæ, II. 306.
 Catarrhales, II. 244.
 Cephalicæ, II. 244.
 Cochiæ, II. 245.
 Depurantes, II. 246.
 Fœtidæ, II. 246.
 Hydragogæ, II. 246.
 Hydropicæ BONTII, II. 246.
 RICHARD, II. 247.
 Hyftericæ, II. 247.

INDEX

- Pillulæ Majores, II. 247.
 Martiales, II. 248.
 Mastichinæ, II. 248.
 Mercurial. BARBAROSSÆ, II. 248.
 BELLOST. II. 249.
 contra Obstructiones, II. 249.
 Ophthalmicæ, II. 249.
 PLUMERI, II. 249.
 Polychrestæ balsamicæ, II. 251.
 STARCKEY, II. 250.
 Resolventes, II. 250.
 RUFII, II. 251.
 Saponatæ, II. 251.
 Scilliticæ, II. 251.
 de Styrace, II. 252.
 de Succino, II. 252.
 Tartaræ, II. 252.
 de Terebinthina, II. 253.
 Tonicæ, II. 253.
 contra Variolas, II. 253.
 Pilosella, I. 43.
 Piment Royal, I. 152.
 Pimenta, I. 26.
 Pimpinella, I. 168.
 Pinien, I. 168.
 Pinæ, I. 168.
 Purgantes, I. 207.
 Pini strobili, I. 169.
 Refina, I. 168.
 Pint, I. 7.
 Pinta, I. 7.
 Piper, I. 169. 170.
 Pisse-en-lit, I. 204.
 Pistaches, I. 170.
 Pistaciæ, I. 170.
 Pix, I. 170.
 Plantago, I. 170.
 Plantain, I. 170.
 Plomb, I. 171.
 Plumbum, I. 171.
 Ustum, II. 258.
 Pœonia, I. 161.
 Poire, I. 175.
 Poirée, I. 48.
 Poivre, I. 169. 170.
 Aquatique, I. 165.
 Poix, I. 170.
 de Bourgogne, I. 178.
 Refine, I. 168.
 Poix chiches, I. 79.
 Poley, I. 171. 174.
 Polium, I. 171.
 Polygala, I. 171.
 Polypodium, I. 172.
 Pomade en Creme, II. 75.
 Pomeranzen, I. 42.
 Pomme, I. 172.
 Epineuse, I. 201.
 de Merveilles, I. 148.
 Pompholyx, I. 155. 172.
 Pomum, I. 172.
 Hierosolymitanum, I. 148.
 Pondera, I. 6.
 Pondo, I. 7.
 Populus, I. 172.
 Porc, I. 172.
 Porcinus lapis, I. 122.
 Porcus, I. 172.
 Porreau, I. 173.
 Porrum, I. 123.
 Porst, I. 152.
 Portulaca, I. 173.
 Posca, II. 254.
 Post, I. 152.
 Postkraut, I. 182.
 Potasche, I. 81.
 Potasse, I. 81.
 Potio adstringens, II. 254.
 Animoniaca, II. 254.
 Antiseptica, II. 254.
 ad Asthma, II. 255.

Potio

INDEX

- Potio confortans, II. 255.
 Cretacea, II. 255.
 Oleosa, II. 256.
 Siftens, II. 256.
Poule, I. 111.
Pourpier, I. 173.
 Præparata, II. 256.
Πράσιον, I. 140.
Prêle, I. 102.
Prime vere, I. 173.
 Primula Veris, I. 173.
 Profluvii Cortex, I. 186.
 Propolis, I. 73.
 Pruna, I. 173.
 Laxativa, II. 239.
Prunes, I. 173.
Prunier sauvage, I. 15.
 Pseudacorus, I. 17.
 Pfydium, I. 114.
 Pfyllum, I. 173.
 Ptarmica, I. 174.
 Ptisana, I. 121. II. 256.
 Acidulata, II. 257.
 Adstringens, II. 257.
 Communis, II. 100. 257.
 Nitrata, II. 257.
 Pectoralis, II. 257.
 Pugillum, I. 10.
 Pulegium, I. 174.
Puliot, I. 174.
Pulmonaire, I. 174.
 Pulmonaria, I. 174.
 Pulpa Cassiæ, II. 258.
 pro Clysteribus, II. 258.
 Tamarindorum, II. 259.
 Pulpæ, II. 258.
 Pulfatilla, I. 174.
 Pulticula de Manna, II. 119. 259.
 Saponacea, II. 259.
 Pulveres, II. 259.
 PARS II.
- Pulvis absorbens, II. 260.
 ALGECOTTI, II. 221.
 Alterans, II. 261.
 Anodynus, II. 261.
 Antarthrit. MIRANDOLÆ, II. 262.
 PERARD, II. 261.
 DUCIS PORTLANDIÆ, II. 262.
 Anthelminticus, II. 262.
 Antifebrilis, II. 262.
 Antihecticus, II. 263.
 Antilyssus COMITIS ISENBURG;
 II. 263.
 MEAD, II. 263.
 PALMARI, II. 263.
 SYLVANI, II. 263.
 Tunquinensium, II. 264.
 Antimonii albus, II. 11.
 Antisepticus, II. 264.
 Antispasmod. ROSENST. II. 265.
 STAHLII, II. 265.
 Ari compositus, II. 265.
 Arthriticus amarus, II. 62.
 Auratus, II. 265.
 Bezoardicus *Anglicus*, II. 265.
 LUDOVICI, II. 266.
 Cachecticus LUDOVICI, II. 266.
 QUERCET. II. 266.
 Carminativus, II. 266.
 Carthusianorum, II. 200.
 contra Casum, II. 267.
 e Cerussa, II. 267.
 COMITIS DE WARWICH, II. 170.
 COMITISSÆ DE KENT, II. 265.
 ad Condienda intranea, II. 268.
 ad Condiendas Carnes, II. 268.
 ad Condiendum Cor, II. 267.
 Content, II. 269.
 Cordialis, II. 269.
 CORNACHINI, II. 270.
 Cosmeticus, II. 270.
 Fff

INDEX

- Pulvis Dentifricius, II. 270.
 Epilepticus Marchionis, II. 271.
 Eryfipelatodes, II. 271.
 Fumalis, II. 271.
 GASCONII, II. 265.
 HALY contra Phtisin, II. 272.
 Hepaticus, II. 270.
 Incrassans, II. 273.
 pro Infantibus ROSEEN, II. 274.
 Infantum Danorum, II. 276.
 Masticatorius, II. 274.
 ad Palpitationes Cordis, II. 275.
 Pannonicus ruber, II. 275.
 Pectoralis, II. 275.
 Puerorum citrinus, II. 276.
 Evacuans, II. 276.
 contra Quartanam, II. 276.
 Refrigerans, II. 277.
 Resolvens, II. 277.
 Scillæ compositus, II. 277.
 Sedativus, II. 277.
 Sternutatorius *Noricor*. II. 277.
 Parisiens. II. 278.
 TRILLERI, II. 278.
 Stomachicus, II. 279.
 ad Strumas, II. 289.
 Sympatheticus, I. 214.
 Temperans RICHARDI, II. 279.
 UNZERI, II. 280.
 ad Tormina Infantum, II. 280.
 contra Vermes, II. 280.
 Purgans, II. 280.
 Pumex, I. 175.
 Purgiermoos, I. 134.
 Purgierkærner, I. 69.
 Pyrethrum, I. 175.
 Pyrola, I. 175.
 Pyrus, I. 174.
 Quadrans, I. 7.
 Quart, I. 7.
 Quartarius, I. 7.
 Quassia, I. 175.
 Quecksilber, I. 146.
 Quendel, I. 195.
 Quercus, I. 176.
 Marina, I. 176.
 Queue de Cheval, I. 102.
 Pourceau, I. 166.
 Quincunx, I. 7.
 Quinquina, I. 78.
 Quitten, I. 95.
 Rackasira balsamum, I. 176.
 Raclanarium, I. 10.
 Radices aperientes, I. 13.
 Radicum collectio, I. 10.
 Radis, I. 177.
 Raifort, I. 36.
 Raiponse, I. 177.
 Raifine, I. 214.
 Raifins, I. 163.
 Raifins de Corinthe, I. 163.
 Raifins de Renard, I. 163.
 Ranæ, I. 176.
 Ranarum sperma, I. 176.
 Ranunculus, I. 177.
 Rapa, I. 177.
 Raphanus, I. 177.
 Rapunculus, I. 177.
 Rapunzel, I. 177.
 Ratte, I. 183.
 Rave, I. 177.
 Realgar, I. 37.
 Rebs, I. 153.
 Rebstock, I. 214.
 Regenwurm, I. 136.
 Regia Nux, I. 126.
 Reglise Royale, II. 184.
 Regulus, I. 178.

I N D E X

- Regulus Antimonii Martialis, II. 280.
 Medicinal. II. 280.
 Simplex, II. 280.
- Rejelati, I. 10.
 Reiger, I. 34.
 Reine des Prés, I. 44.
 Reis, I. 160.
 Renard, I. 26.
 Renouée, I. 71.
 Reprise, I. 91.
 Resina, I. 178.
 Elastica, I. 71.
 Jalappæ, II. 282.
 præparata, II. 282.
 Ligni Guajaci, II. 288.
 Nigra, I. 87.
 Scammonei, II. 288.
- Rettich, I. 177.
 Rhabarbarum, I. 178. 179.
 Rhabarbar wilde, I. 53.
 Rheum, I. 178.
 Rhinoceros, I. 179.
 Rhodia Radix, I. 180.
 Rhodium Lignum, I. 180.
 Rhubarbe, I. 178.
 Ribes, I. 180.
 Ricini Semina, I. 69.
 Ringelblumen, I. 58.
 Ris, I. 160.
 Rittersperlein, I. 88.
 Rocambole, I. 22.
 Rochetta Alexandr. I. 197.
 Rocou, I. 159.
 Ræthel, I. 182.
 Roggen, I. 192.
 Rohr, I. 38.
 Roitelet, I. 178.
 Romarin, I. 181.
 de Boheme, I. 182.
- Roob, II. 283.
- Roob Morillorum, I. 36.
 Mororum, I. 149.
 Nucum, II. 283.
- Roquette, I. 102.
 Rorella, I. 180.
 Rosa, I. 181.
 Rose, I. 74.
 Tremiere, I. 139.
- Roseau, I. 38.
 Roshub, I. 105.
 Rosinlein, I. 163.
 Rosmarinum sylvestre, I. 182.
 Rosmarinus, I. 181.
 Ros Solis, I. 180.
 Rossolis ex Seminibus Carmin, II. 82.
 de six grains, II. 82.
- Rotulæ, II. 283.
 Becchicæ, II. 346.
 e Succo & Elæofacch. Citri, II. 284.
 Manus Christi, II. 284.
 Menthæ, I. 146.
 contra Vermes, II. 284.
- Rube, I. 77.
 Gelbe, I. 97.
 Saamen, I. 153.
- Rubia Tinctorum, I. 182.
 Rubimora, I. 182.
 Rubinus, I. 182.
 Rubis, I. 182.
 Arsenical, I. 38.
- Rubrica fabrilis, I. 182.
 Rubus Idæus, I. 182.
 Ruë, I. 183.
 Ruscus, I. 183.
 Rusten, I. 216.
 Ruta, I. 183.
 Muraria, I. 183.
- Saamkraut, I. 165.
 Sabadilli Semen, I. 183.
 Fff 2

INDEX

- Sabina, I. 183.
 Saccharum, I. 184.
 Aceris, I. 16.
 Candum, II. 284.
 Glycyrrhizæ, II. 184.
 Hordeatum, II. 285.
 Lactis, II. 285.
 Penidium, II. 285.
 Rosatum, II. 285.
 Saturni, II. 286.
 Sacrajati, I. 8.
 Sacros, I. 8.
 Safflor, I. 65. 199.
 Safran batard, I. 65.
 Saftgrün, I. 199.
 Sagapenum, I. 105.
 Sago, I. 185.
 Sagu, I. 185.
 Sain doux, I. 173.
 Sal Aceti essentielle, II. 286.
 Fixum. II. 286.
 Volatile, II. 286.
 Acetofellæ, II. 286.
 Acidum Boracis, II. 290.
 Alcali minerale, II. 287.
 SEIGNETTE, II. 287.
 Ammoniacum Martiale, II. 188.
 Cauticum, II. 287.
 Commune, I. 185.
 Cornu Cervi, II. 287.
 Digestivum, II. 287.
 de Duobus, II. 288.
 Febrifugum, II. 287.
 Fontanum, I. 185.
 Fossile, I. 185.
 Gemmæ, I. 185.
 per Incinerationem, II. 288.
 Marinum, I. 185.
 coagulatum, II. 287.
 Martis, II. 350.
 Mirabile GLAUBERI, II. 289.
 Sal Polychrestum GLASERI, II. 290.
 LEMERY, II. 290.
 SEIGNETTE, II. 290.
 Panis, I. 185.
 Prunellæ, II. 203.
 Saturni, II. 286.
 Sedativum HOMBERG, II. 290.
 Mercuriale, II. 291.
 Sedlizensis, I. 192.
 Seidschützenfis, I. 193.
 Succini, II. 291.
 Tartari, II. 291.
 Essentiale, II. 292.
 Volatile Anglic. ficcum, II. 292.
 Oleosum, II. 292.
 Salat, I. 129.
 Kaysfer, I. 129.
 Salbey, I. 186.
 Salep Radix, I. 186.
 Salicaire, I. 186.
 Salicaria, I. 186.
 Salix, I. 186.
 Salpeter, I. 156.
 Salvia, I. 186.
 Sambuci fungi, I. 143.
 Sambucus, I. 186.
 Sanctum Lignum, I. 115.
 Sandaraca Gummi, I. 187.
 Sandarague, I. 37.
 Sanglier, I. 33.
 Sangsue, I. 120.
 Sanguisorba, I. 168.
 Sanicula, I. 187.
 Sanlay, I. 187.
 Santalum, I. 187.
 Santonicum, I. 81.
 Sapa, I. 214.
 Sapo Chemicus, II. 293.
 Tartareus, II. 293.
 Medicatus, II. 293.
 Saponaria, I. 188.

INDEX

- Sapphirus, I. 188.
 Sarcocolla, I. 188.
 Sardus, I. 65.
 Sariette, I. 189.
 Sarfaparilla, I. 188.
 Sassafras, I. 189.
 Satureja, I. 189.
 Satyrion, I. 189.
 Saudistel, I. 197.
 Sauerampfer, I. 16.
 Sauerklee, I. 16.
 Sauge, I. 186.
 Saule, I. 186.
 Saurrauch, I. 47.
 Sauve vie, I. 183.
 Saxifraga alba, I. 189.
 Rubra, I. 106.
 Scabiosa, I. 189.
 Scammoneum, I. 190.
 Scariola, I. 101.
 Schaafgarben, I. 195.
 kunz, I. 196.
 Schalotten, I. 22.
 Scharlachkraut, I. 121.
 Schieferweis, I. 75.
 Schierling, I. 80.
 Schiffderr, I. 170.
 Schildkröte, I. 206.
 Schlagkrautlein, I. 76.
 Schlange, I. 194.
 Schlangenhholz, I. 87.
 wurzel, I. 50.
 Schlehen, I. 15.
 Schlüsselblumen, I. 173.
 Schnecke, I. 86.
 Rothe, I. 135.
 Schnittlauch, I. 72.
 Schellkraut, I. 77.
 Schoenanthum, I. 190.
 Schopine, I. 7.
 Schuppenwurzel, I. 98.
 Schwalbe, I. 120.
 Schwalbenwurzel, I. 120.
 Schwamm, I. 199.
 Schwarzwurzel, I. 201.
 Schwefel, I. 202.
 Schwein, I. 172.
 brod, I. 95.
 Scilla, I. 190.
 Præparata, II. 294.
 Scincus, I. 191.
 Sclarea, I. 191.
 Scordium, I. 191.
 Scorpius, I. 191.
 Scorzonera, I. 191.
 Scriptulum, I. 8.
 Scrophularia, I. 192.
 Scrupulus, I. 10.
 Sebesten, I. 192.
 Sebum, I. 52.
 Secale, I. 192.
 Sedum, I. 192.
 Seeblume, I. 156.
 Seichblumen, I. 204.
 Seide, I. 194.
 Seidel, I. 7.
 Seidelbast, I. 147.
 saamen, I. 85.
 Seifenkraut, I. 188.
 Seigle, I. 192.
 Sel d'Oseille, I. 18.
 Selenites, I. 113.
 Semina frigida majora, I. 13.
 Seminet, I. 9.
 Semifis, I. 7.
 Sempervivum, I. 193.
 Senecio, I. 193.
 Senecion, I. 193.
 Senf, I. 196.
 F ff 3

INDEX

- Senna*, I. 193.
Sepiæ Os, I. 193.
Septunx, I. 7.
Seraphique Gomme, I. 184.
Serapin Gomme, I. 33.
Serapin Gummi, I. 184.
Sericum, I. 194.
Serpens, I. 194.
Serpent, I. 194.
Serpentaria Virginiiana, I. 194.
Serpolet, I. 195.
Serpyllum, I. 195.
Serum Lactis, II. 294.
 Chalybeatum, II. 294.
 Dulce, I. 128.
Sesamum, I. 195.
Sescunx, I. 7.
Sefeli, I. 195.
Sevenbaum, I. 181.
Sextala, I. 8.
Sextans, I. 7.
Sextarius, I. 8.
Sicilicus, I. 8.
Sideritis, I. 195.
Siebengezeit, I. 145.
Sief album, II. 294.
Siegwurzel, I. 211.
Sigillum Salomonis, I. 195.
Sigmundwurzel, I. 20.
Silber, I. 34.
Silberglatt, I. 135.
Siler montanum, I. 195.
Silex, I. 195.
Siliqua, I. 8.
 Dulcis, I. 196.
Simarouba, I. 196.
Sinapi, I. 196.
Sinau, I. 20.
Singrün, I. 211.
Siri Gata Gambar, I. 70.
Smaragdus, I. 196.
Smirgel, I. 197.
Smiris, I. 197.
Soda, I. 197.
 Tartarifata, II. 290.
 Vitriolata, II. 289.
Solutio Mercurii, II. 294.
Sommerlock, I. 165.
Solanum, I. 197.
Soldanella, I. 197.
Son, I. 109.
Sonchus, I. 197.
Sonnengunzel, I. 117.
Sonnenthau, I. 180.
Sophia Chirurgorum, I. 192.
Sorbier, I. 198.
Sorbus, I. 198.
 Aucuparia, I. 198.
Sory, I. 215.
Sotirella parva, II. 295.
Souchet long, I. 96.
 Rond, I. 97.
Soucy, I. 58.
Soude, I. 197.
Soufre, I. 202.
Soye, I. 194.
Spanische Mucken, I. 60.
Sparadrapum, I. 142.
 Album, II. 295.
 ad Corpus conditum involven-
 dum, II. 295.
 GOULARD, II. 296.
Spargel, I. 39.
Species, II. 296.
 Aromaticæ Rosatæ, II. 296.
 pro Cataplasmate Emolliente ;
 II. 297.
 Cephalicæ, II. 297.
 pro Decocto Antinephrit. II. 297.
 Carminativo, II. 298.

INDEX

- Species pro Decocto Pectorali, II. 298.
 Vulnerario, II. 299.
 Diacretæ, II. 300.
 Diaireos, II. 300.
 Diambær, II. 300.
 Diatragacanthæ, II. 301.
 Discutientes, II. 301.
 Emollientes, II. 302.
 pro Epithemate Cordis & Pul-
 fuum, II. 302.
 pro Fotu Aromatico, II. 302.
 ad Colicam, II. 303.
 Imperatoris, II. 303.
 pro Odoramento *Pot pourri*,
 II. 304.
 pro Potu Infantum, II. 299.
 Resolventes, II. 304.
 Tabaci pro fumo, II. 305.
 Specificum Antifebrile, II. 306.
 CROLLII, I. 188.
 Antepilepticum, II. 305.
 Cephalicum, II. 306.
 Diajalappæ, II. 306.
 Febrifugum, II. 306.
 Jalappinum, II. 306.
 Stomachicum, II. 66.
 Specularis Lapis, I. 113.
 Spertiola, I. 177.
Spicauter, I. 218.
 Spica, I. 131.
 Celtica, 198.
 Indica, I. 198.
 Nardi, I. 131. 198.
Spiesglas, I. 31.
Spieshirsch, I. 74.
 Spigelia, I. 198.
 Spina Cervina, I. 198.
Spinne, I. 34.
Spindel, I. 40
 Spiritus abstractitii, II. 307.
 Spiritus Aceti, II. 5.
 Balsami Peruviani, II. 307.
 Bezoardicus BUSSI, II. 307.
 Carminativus SYLVII, II. 307.
 de tribus, II. 308.
 Cochleariæ, II. 308.
 compositus, II. 308.
 Cornu Cervi, II. 309.
 Jasmini, II. 309.
 Lavendulæ, I. 131.
 MINDERERI, II. 309.
 Nitri, II. 309.
 Dulcis, II. 307.
 Fumans, II. 310.
 ad Perniones, II. 310.
 Salis Ammoniaci cum Calce vi-
 va, II. 311.
 Cauticus, II. 311.
 Succinat. II. 312.
 Tartarifat. II. 311.
 Vinofus, II. 311.
 Salis communis, II. 312.
 Fumans, II. 313.
 Dulcis, II. 312.
 Saponis, II. 313.
 Succini, II. 313.
 Sulphuris, II. 235. 313.
 Volatilis, II. 313.
 Tartari, II. 314.
 de Tribus, II. 222.
 Vini Alcalifatus, II. 314.
 Camphoratus, II. 314.
 Crocatus, II. 314.
 Lotus, II. 314.
 Phlegma, II. 314.
 Rectificatus, II. 314.
 Tartarifatus, II. 314.
 Vinofus Vitriolicus, II. 206.
 Æthereus Vitriol. II. 206.
 Vitrioli, II. 315.

INDEX

- Spiritus Vitrioli dulcis, II. 315.
 Spodium, I. 100. II. 107.
 Spóngiæ, I. 199.
 Præparatæ, II. 315.
 Spongiarum Lapis, I. 199.
Spingkærner; I. 70.
 Squilla, I. 190.
Stabwurz, I. 14.
Stackelruben, I. 153.
Starcke, I. 28.
 Staphis agria, I. 199.
Stange, I. 74.
 Stannum, I. 199.
 Stater, I. 8.
Stechapfel, I. 201.
Steckruben, I. 153.
Steinbeere, I. 216.
 brech, I. 106.
 kreffen, I. 154.
 leberkraut, I. 119.
 salz, I. 185.
Stendelwurzel, I. 189.
 Stibium, I. 32.
Stier, I. 205.
 Stincus, I. 191.
 Stœchas, I. 200.
Storkenschnabel, I. 113.
 Storax, I. 200.
 Stramonium, I. 201.
Strauffeneyer, I. 201.
 Struthionis Ova, I. 201.
 Suber, I. 201.
 Subulo, I. 74.
Suc de Reglise de Blois, II. 241.
 Succii expressi, II. 315.
 Antiscorbutici, II. 315.
 Succinum, 201.
 Indiæ Occidentalis, I, 135.
 Succisa, I. 201.
Suie, I. 108.
- Suif*, I. 52.
 Sulphur, I. 202.
 Antimonii auratum, II. 315.
 Tartarifatum, II. 200.
 Præcipitatum, II. 200.
 Sumach, I. 202.
 Summitates, I. 11.
 Suppositoria, II. 316.
Sureau, I. 186.
Süsholz, I. 113.
 Symphytum, I. 202.
Syrop, I. 184.
 Syrupi, I. 316.
 Syrupus *Alexandrinus*, II. 200.
 Althææ, II. 316.
 AMBROSII, I. 147.
 de Ammoniac, II. 317.
 Amygdalinus, II. 317.
 Antiscorbuticus, II. 318.
 Balsami Tolutani, II. 319.
 Balsamicus HOFFMANNI, II. 318.
Boyleanus, II. 319.
Byzantinus, II. 319.
 Chinæ, II. 319.
 Cichorei cum Rhabarbaro, II. 320.
 Citri Corticum, II. 321.
 etoto, II. 320.
 Corallorum, II. 320.
 Diacodii, II. 321.
 Domesticus, II. 321.
 Emeticus *Brandenburg*, II. 322.
 GLAUBERI, II. 322.
 Emulsivus, II. 317.
 de Eryfimo, II. 322.
 Glycyrrhizæ, II. 324.
 Hordeatus, II. 324.
 Hyffopi, II. 324.
 de Jujubis, II. 324.
 Longæ Vitæ, II. 326.
 de Manna, II. 325.

Syrupus

INDEX

- Syrupus Mercurialis**, II. 326.
 Mororum, I. 149.
 de Nicotiana, II. 326.
 Papaveris albi, II. 327.
 Prophylacticus, II. 326.
 Rubi Idæi, II. 327.
 Saccharinus, I. 184.
 Scelotyrbcticus, II. 327.
 Scilliticus, II. 324.
 de Spina Cervina, II. 321.
 de Symphyto, II. 328.
 Viperarum, II. 328.
- Tabac**, I. 155.
Tabellæ, II. 328.
Tabouret, I. 54.
Tabulæ, II. 283.
 Alimentariæ, II. 328.
 Althææ, II. 343.
- Tacamahaca**, I. 202.
Teschelkraut, I. 54.
Taffetas d'Angleterre, II. 145.
Taffia, I. 203.
Tag und Nacht Kraut, I. 162.
τάλανον, I. 8.
Talcum, I. 203.
Talpa, I. 203.
Tamarindi, I. 203.
Tamaris, I. 204.
Tamariscus, I. 204.
Tanacetum, I. 204.
Tanais, I. 204.
Tanzapfen Oehl, I. 174.
Taraxacum, I. 204.
Tarrette, I. 116.
Tartari Crystalli, I. 204.
Tartarus, I. 204.
 Antimonialis, II. 329.
 Chalybeatus, II. 329.
 Emeticus, II. 329.
- PARS II.**
- Tartarus Martialis**, II. 195.
 Regeneratus, II. 330.
 Solubilis, II. 292. 329.
 Tartarifatus, II. 329.
 Vitriolatus, II. 310. 330.
- Tartre**, I. 204.
Taubenkropf, I. 109.
Taupe, I. 203.
Taureau, I. 205.
Taurus, I. 205.
Tausendguldenblumen, I. 71.
Taxus, I. 205.
Tela Emplastica, II. 142.
 GUALTERI, II. 295.
- Telephium**, I. 91. 104.
Terebinthina, I. 205.
Terebinthinæ Oleum, I. 205.
 Spiritus, I. 205.
- Terra foliata Tartari**, II. 330.
 Merita, I. 94.
 Sigillata, I. 206.
- Tertianaria**, I. 206.
Testudo, I. 206.
- τέτραρτον**, I. 9.
Teufelsabbiss, I. 201.
Teufelsdreck, I. 40.
Thalictrum flavum, I. 206.
- Thea Bohea**, I. 206.
 Romana, I. 52.
 Silesiaca, I. 52.
 Viridis, I. 206.
- Thée de Mexique**, I. 52.
 Missisipi, I. 32.
 Paraguay, I. 32.
- Theer**, I. 170.
- Theriaca ANDROMACHI**, II. 124.
 Cœlestis HOFFMANNI, II. 33.
 Diatefferon, II. 121.
- Thlaspi**, I. 207.
Thuris Cortex, I. 204.
 Ggg

INDEX

- Thus, I. 157.
 Judæorum, I. 207.
Thym, I. 207.
 Thymelæa, I. 447.
 Thymiamatis Cortex, I. 207.
Thymian, I. 207.
 Thymus, I. 207.
 Tilia, I. 208.
Tilleul, I. 208.
Tincal, I. 51.
 Tinctura, II. 332.
 Alexipharmaca, II. 333.
 Amara *Edinburgensium*, II. 139.
 Londinensium, II. 138.
 Antimonii acris, II. 333.
 Saponacea, II. 333.
 Taratarifata, II. 334.
 Antivenerea, II. 334.
 Auri, II. 335.
 Bezoardica, II. 335.
 Coralliorum, II. 336.
 Laccæ, II. 336.
 Martis aperitiva, II. 336.
 GLAUBER II. 337.
 Cydoniata, II. 337.
 Helleborata, II. 337.
 Pomata, II. 337.
 ZWOELFFERI, II. 337.
 Metallorum, II. 338.
 Rhabarbari, II. 338.
 Salina, II. 339.
 Stomachica *Danorum*, II. 339.
 WHYTT, II. 339.
 Sulphuris, II. 340.
 Tartari, II. 340.
 Thebaica, II. 204.
 Tolutanum Balsamum, I. 208.
 Topasius Lapis, I. 208.
Toque, I. 206.
 Tormentilla, I. 208.
 Tortue, I. 206.
 Tournefol, I. 117.
 Tourquette, I. 119.
 Toute bonne, I. 121.
 Traberen, I. 214.
 Tragacantha, I. 208.
 Tragea alba, II. 340.
 Aromatica, II. 340.
 Granorum Actes, II. 341.
 Ophthalmica, II. 341.
 Tragopogon, I. 209.
 Traubenkraut, I. 52.
 Trefle, I. 209.
 musqué, I. 143.
 Tremessis, I. 9.
 Tribuli aquatici, I. 209.
 Trichomanes, I. 18.
 Triens, I. 1.
 Trifolium, I. 209.
 Trippe Madame, I. 192.
 Tripoli, I. 209.
 Tripolitana terra, I. 209.
 Trippel, I. 209.
 Trochisci, II. 43.
 Albi, II. 342.
 Alhandal, II. 342.
 Aliptæ, II. 342.
 Alkermes, II. 342.
 Althææ, II. 343.
 Becchici albi, II. 343.
 Citrini, II. 343.
 Nigri, II. 343.
 Parisiensium, II. 346.
 Catechu, II. 346.
 Cypheos, II. 344.
 Escharotici, II. 344.
 Fumales, II. 344.
 Hedychroi, II. 345.
 Hermetici, II. 345.
 de Nitro, II. 346.

INDEX

- Trochisci Pectorales, II. 346.
 Refrigerantes, II. 347.
 de Scilla, II. 347.
 Viperini, II. 347.
Troene, I. 134.
Tryphera magna, II. 347.
Tunica, I. 209.
Turique Gomme, I. 34.
Turis Gomme, I. 34.
Turpethum, I. 210.
 Minerale, II. 347.
Tussilago, I. 105.
Tutia, I. 210.
Typhi Cervini, I. 75.

Valeriana, I. 210.
Valerienne grande, I. 167.
Vanilla, I. 210.
Vegetabilium collectio, I. 10.
Velar, I. 103.
Velvotte, I. 101.
Verbascum, I. 211.
Verbena, I. 211.
Verd de gris, I. 213.
 Vessie, I. 199.
Ver de Terre, I. 126.
Verge d'or, I. 88.
Verjus, I. 214.
Veronica, I. 211.
Veronique, I. 211.
Verre, I. 215.
Verveine, I. 211.
Vesse de Loup, I. 52.
Victorialis, I. 211.
Vigne, I. 214.
Vinacea, I. 214.
Vinaigre, I. 17.
Vinca per Vinca, I. 21.
Vincetoxicum, I. 120.
Vinum, I. 212.

Vinum Amarum, II. 349.
 Antimoniatum, II. 19.
 Antiscorbuticum, II. 349.
 Chalybeatum, II. 350.
 per Confermentation, II. 350.
 Emeticum, II. 19.
 Hippocraticum, II. 350.
Viola, I. 212.
Violaria, I. 212.
Viole, I. 212.
 gelbe, I. 77.
Violenwurzel, I. 125.
Violette, I. 212.
Vipera, I. 213.
Virga aurea, I. 213.
Viride Æris, I. 213.
Viscum, I. 213.
Vitis, I. 214.
Vitis Idæa, I. 214.
Vitriolum album, I. 214.
 Cæruleum, I. 214.
 de Cypro, I. 214.
 Martis, II. 340.
 Viride, I. 214.
 Vulgare, I. 214.
Vitrum, I. 215.
 Antimonii, II. 351.
 Ceratum, II. 351.

Ulmaria, I. 44.
Ulmus, I. 216.
Ultramarinum, I. 132.
Umbilicus marinus, I. 215.
Uncia, I. 8. 10.
Unguentum album, II. 352.
 Althææ, II. 352.
 ad Ambusta, II. 352.
 Anodynum, II. 353.
 Apostolorum, II. 353.
 de Arthanita, II. 354.
 Basilicum, II. 355.
 Ggg 2

I N D E X

- Wanzenkraut*, I. 182.
Wassernüſſe, I. 209.
Wasserpfeffer, I. 165.
Wasserschierling, I. 167.
Wasserschwertel, I. 17.
Wegdiſtel, I. 64.
Weggras, I. 71.
Wegſenſ, I. 103.
Wegweis, I. 80.
Wegerich, I. 170.
Weiden, I. 186.
Weiderich, I. 186.
Weihrauch, I. 157.
Weinmus, I. 214.
Weinstein, I. 204.
Weisdornen, I. 160.
Wermuth, I. 14.
Wiefenkreſſe, I. 62.
Wiefenraute, I. 206.
Wildſchwein, I. 33.
Winteranus Cortex, I. 217.
Wintergrün, I. 175.
Wiſmuthum, I. 49.
Wohlgemuth, I. 159.
Wohlverley, I. 36.
Wolf, I. 137.
Wolfsbeere, I. 163.
Wolfsmilch, I. 103.
Wollkraut, I. 211.
Wundkraut, I. 88.
Wurmfäamen, I. 81.
Xanthium, I. 217.
Ξίςης, I. 9.
Xylobalfamum, I. 142.
Yeble, I. 100.
Tvoire, I. 100.
Zahnwurzel, I. 98.
Zapfenholz, I. 108.
Zapſteinkraut, I. 217.
Zaunkönig, I. 178.
Zaunrube, I. 53.
Zedoaria, I. 217.
Zeitloſen, I. 47.
Zibeben, I. 163.
Zibethum, I. 217.
Zimmet, I. 82.
 Mutter, I. 67.
Zingiber, I. 218.
Zincum, I. 218.
Zinn, I. 199.
Zinſinber, I. 218.
 Coſtum, II. 372.
Zittwer, I. 217.
Zucker, I. 184.
Zwecken, I. 114.
Zweſchen, I. 173.

ADDENDA ET CORRIGENDA

PART. I.

- P. 22. l. 34. In posthumo *Supplemento* LINNÆUS optimam Aloën ex Aloë spicata parari tradit.
- P. 28. ad ANACARDIUM ORIENTALE add. Semecarpum arborem LINNÆUS in *Suppl.* appellat.
- P. 70. l. 19. In posthumo Opere LINNÆUS novam Mimofæ speciem adducit, quam fide KEERS *Catechu* appellat.
- P. 88. l. 27. Recentissimi Sueci moxDorsteniam Dreackenam, moxDorsteniam Contrajervam adducunt.
- P. 90. l. 27. Piper Cubeba in *Supplemento Linnaeano* dicitur.
- P. 100. l. 12. Diospyros Ebenum annotantibus Celeberrimis KOENIG & THUNBERG.
- P. 104. l. 30. Ignatiam amaram LINNÆUS in *Supplemento* hoc medicamentum largiri tradit.
- P. 120. l. 33. HOMO, *Homme*, *Mensch*. De Cranio supra jam egi. Reliquæ partes, quarum usum absurdissimæ hypotheses sustentarant, hodie eviuerunt, neque plurimorum quadrupedum Axungiiis *Humana*, quamvis mollior & flavior, anteferenda videtur.
- P. 142. l. 20. Amyris Gileadensis e *Pharmacopœa Suecica* adducitur.
- P. 147. l. 15. pro Athamanta leg. Æthusa.
- P. 161. l. 31. Cl. MUTIS in *Supplemento Linnaeano* Cocos Butyraceæ descriptionem profert.
- P. 165. l. 23. Cl. MUTIS *Myroxylon Peruiserum* hoc Balsamum largiri observavit.
- P. 188. l. 4. Arbor in *Supplemento Linnaeano* Pterocarpi Santalini nomine describitur.
- P. 196. l. 21. LINNÆUS in *Supplemento* Quassiam Simarubam appellat.

PART. II.

- P. 48. l. 1. pro ZWINGERI leg. WEPFERI.
- P. 62. l. 27. pro *Feuillet* leg. FOEUILLET.
- P. 112. l. 12. pro BARZONII leg. GARZONII.
- P. 184. l. 21. post MAROCOSTINUM add. MINDERERI.
- P. 195. l. 25. post MARTIALES add. WILLISII.
- P. 218. l. 26. pro orificio leg. ventri.
- P. 309. l. 26. pro KELLII leg. SNELLEN.
- P. 330. l. 23. seq. deleatur TELA GUALTERI, quippe jam pag. 295 descripta.
- P. 349. l. 12. seq. deleatur VINUM ANTIMONIATUM paginæ 19. jam insertum.

APPROBATION.

J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un Manuscrit ayant pour titre *Pharmacopée &c.* par Monsieur SPIELMANN, & j'ai jugé, qu'un Dispensaire rédigé par un Savant, qui réunit le mérite du Pharmacien, du Médecin & du Chymiste ne pouvait qu'être favorablement accueilli de ceux, qui se livrent à l'art de guérir. A Paris ce 22 Fevrier 1781.

CADET DE VAUX, *Censeur Royal.*

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux; leurs Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers, qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le Sr. SPIELMANN Nous a fait expofer, qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage de sa composition & intitulé *Pharmacopée &c.* s'il Nous plaïoit lui accorder Nos Lettres à ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons, de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, & faire vendre par tout Notre Royaume; voulons qu'il jouisse de l'effet du présent Privilege pour lui, ses hoirs, à perpétuité; pourvu qu'il ne le retrocede à personne, & si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession; l'acte qui la contiendra, fera enrégistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité tant du Privilege que de la cession, & alors par le fait seul de la cession enrégistrée, la durée du présent Privilege sera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années à compter de ce jour, si l'Exposant decede avant l'expiration des dites dix années: le tout conformément aux Articles quatre & cinq de l'Arrêt du Conseil du 30 Aout 1777, portant réglemeut sur la durée des privileges en librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de Notre obéissance; comme aussi d'imprimer, ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être,

ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit Expoſant, ſes hoirs ou ayant cauſe à peine de faiſie & confiscation des exemplaires contrefaits, de ſix mille Livres d'amende, qui ne pourra être modérée pour la première fois; de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conſeil du 30 Aout 1777, concernant les contrefaçons, à la charge que ces Préſentes ſeront enrégistrées tout au long ſur le Régistre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans Notre Royaume, & non ailleurs, en beau papier & beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du préſent Privilège; qu'avant de l'expoſer en vente, le manuſcrit, qui aura ſervi de copie à l'impreſſion dudit Ouvrage, ſera remis dans le même état, où l'Approbation y aura été donnée, éſ mains de Notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le Sieur HUE DE MIROMESNIL, Commandeur de Nos Ordres; qu'il en ſera enſuite remis deux exemplaires dans Notre Bibliothèque publique, un dans celle de Notre château du Louvre, un dans celle de Notre très-cher & féal Chancelier de France, le Sieur DE MAUPEOU & un dans celle dudit Sieur HUE DE MIROMESNIL: le tout à peine de nullité des Préſentes: Du contenu deſquelles Vous mandons & enjoignons, de faire jouir ledit Expoſant & ſes ayans cauſe pleinement & paisiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie des Préſentes, qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour dûement ſignifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de Nos amés & féaux Conſeillers-Secrétaires, ſoit ajoutée comme à l'original. COMMANDONS au premier Notre Huiffier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, charte Normande, & lettres à ce contraires; CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. DONNÉ à Paris le vingtième jour du mois de Juin, l'an de grace mil ſept cent quatre-vingt un, & de Notre Règne le huitième.

Par le ROI en Son Conſeil

LEBEGUE.

Régistré ſur le Régistre XXI. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris N^o. 2207. fol. 522. conformément aux diſpoſitions énoncées dans le préſent Privilège & à la charge de remettre à ladite Chambre les huit Exemplaires préſents par l'Article CVIII. du Règlement de 1723. A Paris, le 6 Juillet 1781.

DURAND, Adjoint.

