

吳鞠通醫案



編主譯士陸

成集書醫本基

吳  
鞠  
通  
醫  
案

吳  
璿  
著  
高  
汝  
賢  
編

世界書局印行

中華民國二十六年六月初版

吳鞠通醫案 (全一册)

實價國幣五角


(外埠酌加運費匯費)

主編者 陸士諤

發行者 陸高誼

出版者 上海大連灣路  
世界書局

發行所 上海及各省 世界書局



版權所有 不准翻印

# 序

醫之有案。猶國之有史也。治國者鑑於古代。治亂興衰之故。而後知所以爲政理民之道。爲醫者察於昔人起疴拯危之神。而後知所以治病用藥之方。蓋皆積所經驗。以傳諸後世。而資其師法者也。其爲書固不重哉。淮陰吳鞠通先生。醫聲振海內。蓋不特葉氏之高弟。抑亦仲聖之功臣也。生平著述有溫病條辨。醫醫病書。及吳氏醫案諸書。而醫案尤先生畢生精力之所薈萃。今條辨既傳布全國。爲世寶貴。而醫醫病書亦已刊行。獨醫案一書。向鮮傳本。偶有鈔錄。藏者亦祕不示人。遂使先生數十年經驗之良模。不獲見知於世。寧不惜哉。三十年前。余曾向下灶胡氏處假錄一通。常置案頭。用資師法。友人見者。均嘆爲良書。轉相傳鈔。幾於日不暇給。夫傳播古籍。以嘉惠後學。吾人之責也。若謂表章先賢。則吾豈敢。至案中有用量過重處。僉謂刊時可刪去。此余期期以謂不可。蓋刊行古書。須存古書真面。俾後學得窺遺澤。凡書內之或是或非。應在讀者各自加其主見。倘妄行編次。隨意割截。不若自行著作。何必借古人之名。而滅古人之實。逞一己之私。而貽後人之憾耶。

吳翰通醫案 序

丙辰二月後學高德僧汝賢謹序

目錄

卷一

中風	.....	一
瘦痰	.....	三
肝風	.....	四
肝厥	.....	七
脇痛	.....	一〇
肝癰	.....	一九
癲狂	.....	二四
虛勞	.....	三三
吐血	.....	三九
衄血	.....	五〇
便血	.....	五一
腫脹	.....	五六
單腹脹	.....	六四

腹脹

..... 六五

滯下

..... 六五

積聚

..... 八一

淋濁大小便閉

..... 八五

泄瀉

..... 九二

卷二

暑溫

..... 九五

伏暑

..... 一〇九

濕溫

..... 一三四

中燥

..... 一四〇

瘧

..... 一五六

冬溫

..... 一六一

傷寒

..... 一六四

卷三

頭痛

..... 一八三

胃痛

..... 一九二



脾胃.....一九四

噎食.....一九八

嘔吐.....二〇三

反胃.....二〇五

噎.....二〇六

咳嗽.....二〇七

肺癰.....二〇七

失音.....二〇九

水氣.....二一一

寒溼.....二一七

痺.....二二〇

疲飲.....二四〇

### 卷四

#### 婦科

疝瘕.....二八九

胎前.....二九六

產後	三〇一
陰吹	三一八
交腸	三一九
調經	三一九
帶下	三二五
臟燥	三二六
兒科	
痘症	三二六
痘	四〇一
瘰癧	四〇五
食積	四〇七
飧泄	四〇九
咳嗽	四一二
暑溫	四一四
伏暑	四一五

# 吳鞠通醫案

後學高德僧汝賢重錄

## 卷一

### 中風

陶氏六十歲左肢拘攣。舌厚而蹇不能言。上有白苔。滴水不能下咽。飲水則噎。此中風挾痰之實症。前醫誤與膩藥補陰。故隧道俱塞。先與開肺。

生石膏

四兩

杏

仁

四錢

鮮桑枝

五錢

雲苓塊

五錢

防

己

五錢

白通草

一錢五分

薑半夏

五錢

廣

皮

三錢

煮三杯

分三次服。

服一帖而飲下咽。服七帖而舌腫消。服二十帖諸病雖漸減而無大效。左肢拘攣如故。舌腫雖消而語言不清。脈兼結。余曰。此絡中有塊痰堵塞。皆誤補致壅之故。非針不可。於是延鄰七兄針之。針法本高。於舌上中泉穴一針。出紫黑血半茶杯。隨後有物如蚯蚓。令伊子以手探之。即從針孔中拉出膠痰一條。如勺粉長七八寸。左手支溝穴一針。透關。左手背三陽之絡。用小針針十餘針。以後用藥。日日見效。前方止滅石膏之半。服至七十餘帖。而能策杖行矣。服九十帖能自行出堂上轎矣。諸症悉除。

哈六歲 中風溼。口歪。臂不舉。腿腫。脈洪數。口渴。胃不開。與辛涼開水道法。

石 膏生四兩 扶苓皮一兩 桂 枝三錢 滑 石飛一兩 晚蠶砂三錢

防 己二錢 半 夏五錢 白通草二錢 桑 枝五錢 煮三盃。分三次服。

二帖而效。十四帖全愈。後以補脾胃收全功。

葉氏三十歲 中風。神呆不語。前能語時。自云頭暈。左肢麻。口大歪不食。六脈

弦數。此痺中也。與柔肝法。

直生地八錢 白 芍生三錢 左牡蠣五錢 生鱉甲五錢 麥 冬二錢

炙甘草三錢 煮三杯。分三次服。

一帖而神有清意。人與之言能點頭也。又於前方加生阿膠三錢。丹皮

四錢。三帖而半語。七帖而大愈能食。十二三帖而如故。

李氏七十歲 伏暑夾痰飲。肝鬱。又加中風頭痛。舌厚白苔。言蹇畏寒。脈洪數

而弦。先與辛涼清之。

連 翹三錢 苦桔梗三錢 桑 葉三錢 銀 花三錢 茶菊花三錢

甘 草一錢 薄 荷一錢五分 刺蒺藜二錢 煮三杯。分三次服。四帖。

又 頭痛畏寒。舌厚漸消。苔不退。茲以通宣三焦。兼開肝鬱。

飛滑石六錢 半 夏四錢 白蔻仁二錢 雲扶苓連皮五錢 薏 仁五錢

廣鬱金二錢

杏仁泥五錢

香附二錢

白通草一錢

煮三杯。分三次服。

服二十餘帖而大安。一切復元。

### 瘕癥

某氏其人本有肝風頭痛病根。少陽鬱勃。真水不能上濟可知。又現伏暑內發。新涼外加。金來尅木。木愈病矣。少陽所致為瘕癥。理固然也。勉與清膽絡兼清心包。己卯七月

犀角三錢

羚羊角三錢

茶菊花三錢

丹皮五錢

細生地五錢

鈎藤鈎二錢

桑葉三錢

苦桔梗二錢

鮮荷葉去蒂一枚

甘草一錢五分

煮三杯。分三次服。間服紫雪丹一二錢。

又此症肝風無疑。昨服柔肝清熱之劑而燒退。是外邪已解。現在大脈弦細。手足發涼。似有厥意。治法熄風之中。似宜添入開心胞之絡為是。倘一二天不醒。便難挽回矣。

細生地五錢

沙參二錢

生牡蠣三錢

羚羊角三錢

丹皮五錢

刺蒺藜二錢

生龍甲三錢

阿膠二錢

石菖蒲一錢

茶菊花三錢

甘草一錢

嫩桑枝廿寸

煮三杯。分三次服。

間服紫雪丹牛黃丸。

又用玉女煎加犀角丹皮。

又 用玉女煎加犀角丹皮連翹銀花重用石膏知母。  
又 少陽頭痛甚急。外因亦未盡解。

生石膏兩一

連翹連心三錢

茶菊花三錢

細生地五錢

銀花三錢

冬桑葉三錢

左牡蠣五錢

麥冬不去心五錢

鉤藤二錢

羚羊角三錢

丹皮五錢

生甘草二錢

炒知母二錢

天冬二錢

煮三杯分三次服。

間服紫雪丹二分。

肝風

章氏七十歲老年上虛下盛。又當厥陰司天之年。厥陰主令之候。以故少陽

風動。頭偏右痛。目係引急。最有壞眼之慮。刻下且與清上。癸亥正月廿八日

羚羊角三錢

連翹一錢

刺蒺藜二錢

茶菊花二錢

桑葉二錢

生甘草八分

苦桔梗一錢五分

薄荷八分

煮二杯分二次服。日二帖。服二

日。

少陽頭痛已止。現在胸痞脇脹。肝胃不和。肢痛腰痛。議兩和肝胃之中。兼

與宣行經絡。三十日

桂枝尖二錢

半夏五錢

製香附二錢

杏仁泥三錢

廣皮一分

生薑汁三匙

廣鬱金二錢

青皮一錢

煮三杯分三次服。二帖

因食冷物。晝寐。中焦停滯。腹不和。泄瀉。與開太陽鬲陽明法。二月初二日

桂枝五錢 茯苓塊五錢 肉果煨一錢五分 半夏三錢 生茅朮三錢

炮姜一錢五分 猪苓三錢 藿香梗三錢 廣皮五錢 澤瀉三錢

廣木香一錢五分 頭煎兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

諸症向安。惟餘晨泄。左手脈緊。宜補腎陽。初四日

茯苓塊五錢 補骨脂三錢 蓮子連皮五錢去心 生於朮三錢 煨肉果三錢

芡實三錢 兔絲子二錢 五味子一錢 水五碗。煮成兩碗。分二次服。渣

再煮一碗。明早服。

即於前方內去兔絲子。加牡蠣粉三錢。初七日

太陽微風。以桂枝法小和之。初十日

桂枝二錢 茯苓塊三錢 生薑二片 半夏三錢 炒白芍二錢

大棗去核一枚 廣皮二錢 炙甘草八分 煮二杯。分二次服。

右目澀小。酉刻後眼前如有黑霧。議鬆肝絡熄肝風益肝陰法。十一日

何首烏三錢 沙參三錢 茶菊花一錢五分 沙蒺藜二錢 桔梗一錢五分

生甘草八分 青箱子二錢 煮二杯。分二次服。

三帖後了。然如故。

陶氏 右脈洪大。尺部更甚。左脈弦細。上盛下虛。卒中不能言。如中風狀。乃肝風內動。絡熱竅閉之故。證勢甚重。癸酉二月十五日

鈴羊角一錢 沙參一錢五分 茶菊花一錢五分 苦桔梗一錢 麥冬二錢

刺蒺藜一錢 生鱉甲三錢 桑葉一錢 生甘草八分 細生地五分

煮二杯。分二次服。日一二帖。服三日。

上盛下虛。竅閉不能言。用輕清合芳香開上。今稍能言。但虛煩不眠。心悸頭暈。仍係厥陰未熄。茲用補心肝之體。兼實下法。二十日

大生地五錢 沙參三錢 扶苓塊三錢 炒白芍六錢 麥冬不去心五錢

炒棗仁三錢 生龜板四錢 阿膠二錢 炙甘草三錢 整硃砂綿裹五錢

蓮子連皮心五錢 水五杯。煮取兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。

黃三十歲 肝風內動。脈弦數。乃真水不配相火。水不生木。故木強而直上行。頭暈甚。即顛厥也。久不治為痲中。醫云痰者妄也。先與清肅少陽膽絡。繼以填補真陰可也。此症最易錯看胎害不小

鈴羊角三錢 桑葉三錢 苦桔梗二錢 黑芝蔴研細三錢 丹皮二錢

鉤藤鉤二錢 茶菊花三錢 薄荷七分 生甘草一錢 煮三杯。分三次服。

丸方 定風珠



肝厥

高氏四十歲

肝陽上竄。因怒即發。十餘年矣。經云。久病在絡。豈經藥可效。再

肝厥之症。亦有寒熱之不同。此證脈沈而弦細。其為寒也無疑。大凡寒厥

必死。今不死者。以其為腑厥而非臟厥也。現脇下有塊有聲。經色紫黑。議

先用溫通絡脈法。乙丑十一月十一日。

新絳紗三錢

半夏五錢

降香末三錢

川椒炒黑二錢

旋覆花包三錢

生香附三錢

桂枝尖嫩三錢

歸鬚二錢

桃仁炭三錢

煮二杯。分二次服。三帖。

額氏二十歲。除夕日亥時。先是產後受寒。痺痛。醫用桂附等極燥之品。服之

大效。醫見其效也。以為此人非此不可。用之一年有餘。不知溫燥與溫養

不同。可以治病。不可以養生。以致少陰津液被劫無餘。厥陰頭痛。單巔頂

一點痛不可忍。畏明。至於窗間有豆大微光即大叫。必室如漆黑。而後少

安。一日厥去四五次。脈弦細數。按之無力。危急已極。勉與定風珠潛陽育

陰以熄肝風。

大生地八錢

麻仁四錢

生白芍四錢

生龜板六錢

麥冬不去心四錢

生阿膠四錢

生鱉甲六錢

海參二條

生牡蠣六錢

雞子黃去渣後化入攪勻二枚

甘

草灸五錢

煮成八杯。去渣。上火煎成四杯。不時頓服。

微見小效。加鮑魚片一兩。煮成十杯。去渣。煎至五杯。服如前。正月初一日

又見效。方法如前。初二日

厥止。頭痛大減。猶畏明。方法如前。初三日

腰以上發熱。腰以下冰涼。上下渾如兩截。身左半有汗。身右半無汗。左右

渾如兩畔。自古方書未見是症。竊思古人云。琴瑟不調。必改絃而更張之。

此症當令其復厥。厥後再安則愈。照前方定風珠減半。加青蒿八分。當夜

即厥二三次。初四日

照前定風珠原方分量。一帖服後。厥止神安。初五日

仍照前方。初七日

方皆如前。漸不畏明。至正月二十八日外。徹去帳幔。湯藥服至二月春分

後。與專翁大生膏一料全愈。初八日

楊女四十九歲

初因肝鬱脇痛。繼而肝厥犯胃。醫者不識病名。肝着。與絡病治

法。無非滋陰補虛。或用涼藥。以致十年之久。不能吃飯。飲粥湯。止一口。食

炒米粉。止一酒杯。稍聞聲響。即瘳厥。終夜抽搐。二三日方漸平。六脈弦緊

而長。經閉二年。周身疼痛。痰飲咳嗽。終年無已時。骨瘦如柴。奄奄一息。此

症內犯陽明故不食。木克脾土故飲聚。陽明空虛故無主。聞聲而驚。外犯太陽。故身痛而瘕。本臟自病故厥。經謂治病必求其本。仍從肝絡論治。甲

十一月  
初二日

新絳紗

旋覆花包

降香末

廣鬱金

歸橫鬚

川椒炭

蘇子霜

桂枝

半夏

服前方七帖。脇痛雖輕。痰飲特甚。咳嗽頻仍。夜臥不安。暫停絡藥。專與和

胃蠲飲。十四日

半夏錢八

生薏仁錢五

枳實錢二

茯苓錢六

淡乾薑錢三

廣皮錢四

桂枝錢三

煮三杯。分三次服。

胃口稍開。能食稀粥半碗。脇仍痛。仍服前活絡方。內去川椒炭。加廣皮。十二日

日七

脇痛平。咳嗽未除。再服前蠲飲方。十二月初四日

因余有由淮上赴紹興之行。令其常服和胃方。脇痛發時。暫服新絳旋覆

花湯。此時已能吃爛飯半碗矣。十一日

脈稍和平。雖弦而有胃氣。乾飯能吃一碗有半。經亦復通。仍間服前一二方。

乙酉二月  
廿八日

夜間偶感燥氣症。欲起不得起。欲坐不得坐。欲臥不得臥。煩燥無奈不可

當。約二時。服霹靂散三兩許。始安。三月初九日

次日仍與和胃

能食乾飯兩小碗矣。六脈又和一等。仍間服前二方。十八日

余復由淮至紹。初八日至蘇州。不放心此病。作書一封。令其調適性情。五  
月間又作書一封。痛以大道理開導之。十月間始得回書。據云竟以余書  
作座右銘。每日諷誦一過。飲食又進。精神大長。闔家歡樂。四月初三日

脇痛

伊氏二十歲

肝鬱脇痛。病名肝着。亦婦科之常症。無足怪者。奈醫者不識。見

其有寒熱也。誤以爲風寒。而用風藥。夫肝主風。同氣相求。以風從風。致風

鳴張。肝主筋。致令一身筋脹。肝開竅於目。致令晝夜目不合。不得臥者七

八日。肝主疏泄。肝病則有升無降。失其疏泄之職。故不大便。小溲僅通而

短赤特甚。醫者又不識。誤以爲腸胃之病。而以大黃通之。麻仁潤之。致令

不食不饑。不便不寐。六脈洪大無倫。身熱。且坐不得臥。時時欲嘔。煩躁欲

怒。是兩犯逆也。金匱謂一逆尙引日。再逆促命期。不待智者而知其難愈

也。議宣通絡脈法。肝藏血。絡主血故也。必加苦寒泄熱。脈沉洪有力。且膽

居肝內肝病。膽即相隨故也。

新絳紗四錢

蘇子研四錢

歸橫鬚四錢

桃仁四錢

旋覆花包五錢

降香末四錢

川楝皮五錢

雲連炒二錢

廣鬱金三錢

急流水入碗。煮成三碗。晝夜六次服。

又服前方見小效。即於前方內減川楝皮二錢。加丹皮炒黑三錢。生香

附二錢。

又脇痛減去大半。但不得寐。時時欲嘔。議兩和陽明厥陰。仍兼宣絡。

半夏醋炒五錢

降香末三錢

黃芩二錢

新絳三錢

蘇子霜三錢

青皮一錢五分

桃仁三錢

川楝子二錢

秫米一撮

歸鬚三錢

廣鬱金二錢

煮三碗。分日二夜一。三次服。

又昨方業已效。今日再服苦藥。即苦與辛合。能降能通之義。即與前方

內加古勇連薑汁炒二錢。

又昨用苦辛法。脈減便通。今日腹覺通。將近經期。一以宣絡為主。

新絳紗包五錢

丹皮炒三錢

元胡索二錢

旋覆花包三錢

歸鬚三錢

製香附二錢

降香末三錢

鬱金二錢

兩頭尖二錢

條芩酒炒一錢五分

桃仁泥三錢

蘇子霜二錢

水八杯。煮取三杯。分日二夜一。三次服。

又 昨日一味通絡。已得大便通利。腹中痛止。但不成寐。今日用胃不和則臥不安。飲以半夏湯。覆杯則寐。法仍兼宣絡。此仲景先師所謂衝脈累及陽明。先治衝脈。後治陽明法也。

新絳紗 錢四

半 夏 一兩

降香末 錢二

旋覆花 包五錢

秫 米 二兩

水十杯。煮成四杯。日三夜一。分四次服。

又 昨與半夏湯和胃。業已得寐。但脈沉數。澁赤短。諱加苦藥。泄肝熱而通小腸火府。

新絳紗 錢四

黃 柏 鹽水炒二錢

生香附 錢三

旋覆花 包五錢

半 夏 六錢

炒雲連 錢二

降香末 錢三

秫 米 一兩

煎法如前。

又 昨日和胃宣絡。兼用苦通火府。今日得寐。澁色稍淡。口亦知味。是陽明已有漸和之機矣。惟胸中微痛。背亦掣痛。按肝脈絡胸背則太陽經也。是由厥陰而累及少陽。肝膽為夫妻也。由少陽而累及太陽。少太為弟兄也。今日仍用前法。加通太陽絡法。

新絳紗 錢三

黃 柏 鹽水炒一分

桂枝嫩尖 錢三

旋覆花 包三錢

半 夏 錢五

降香末 錢三

川棟子皮 錢二

秫 米 六錢

古勇黃連 錢一

生香附 錢三

煎法如前。

又 繞臍痛瘦也亦衝脈肝經之病

桂枝尖三錢

雲 連炒黑 一錢

淡吳萸炒黑 三錢

新絳紗三錢

半 夏五錢

生香附三錢

全當歸炒三錢

秫 米八錢

小茴香炒黑 三錢

川棟子三錢

煎法如前。

又 兩和肝胃兼治腹痛。

淡吳萸炒黑 三錢

半 夏八錢

全當歸三錢

新絳紗三錢

烏 藥三錢

生香附三錢

旋覆花包三錢

青 皮二錢

小茴香炒黑 三錢

降香末三錢

雲 連炒黑一錢五分

淡乾姜二錢

桂枝尖三錢

秫 米一兩

煮成四杯。日三夜一。分四次服。

又 腹中拘急而痛。小便短赤。皆陰絡阻塞。濁陰凝聚之象。與宣通陰絡

降濁法。

桂枝尖三錢

歸 鬚三錢

小茴香炒三錢

降香末三錢

吳 萸一錢五分

桃仁泥炒二錢

川棟子三錢

琥 珀研細沖 三分

元胡索二錢

新絳紗二錢

麝 香研細沖 五釐

兩頭尖二錢

水六杯。煮成一二杯。每服半杯。沖韭白汁兩小茶匙。日一夜一。明早一分

四次服。

又 仍用前法。但昨日未用半夏。今徹夜不寐。酉刻再服素問半夏湯一帖。

又 因肝病不得疏泄。兼有痺痛。議兩疏氣血法。

桂枝尖三錢

新絳紗三錢

歸鬚三錢

川棟子三錢

小茴香炒黑三錢

防己二錢

降香末三錢

晚蠶砂三錢

牛膝二錢

桃仁泥三錢

古勇連吳黃汁炒一錢

不用田連田連即種連徒傷脾胃也

煮三杯。分三次服。

又 諸症悉減而未盡除。左脈已和。右脈弦大。是土中有木。於疏氣血之中。兼泄木安土法。

桂枝尖三錢

半夏五錢

新絳紗三錢

川棟子三錢

白芍酒炒三錢

小茴香炒三錢

降香末三錢

防己二錢

歸橫鬚三錢

茯苓皮三錢

青皮二錢

廣鬱金二錢

杏仁泥三錢

牛膝二錢

晚蠶砂三錢

煮三杯。分三次服。

又 右脈弦剛。土中木盛。

薑半夏六錢

白芍酒炒六錢

新絳紗三錢

桂枝尖四錢

歸鬚三錢

川棟子三錢

茯苓塊四錢

鬱金二錢



小茴香錢三 降香末錢三 廣皮錢二 煎法如前。

又 脈沉數。頭痛時微時盛。向來時發時止。已非一日。此乃少陽絡病。虛

風內動也。今日且與清膽絡法。勿犯中焦。

苦桔梗錢一 白芍錢二 甘菊花炒二錢 鈴羊角八分

丹皮錢一 刺蒺藜錢一 鉤藤鉤錢一 桑葉錢二

生甘草八分 共為粗末。分二次服。

又 治下焦絡法。

整當歸酒洗五錢 白芍酒炒六錢 生香附三錢 新絳紗二錢

澤蘭錢五分 廣鬱金錢三 桂枝尖錢二 砂仁研細二錢

小茴香錢三 煮成三杯。日二晚一。分三次服。

又 入脈麗於肝腎。肝病久。未有不累及入脈者。用通補陰絡兼走入脈

法。

桂枝尖錢一 歸身錢三 小茴香錢二 杭白芍錢六

杞子炒二錢 桂圓肉錢二 新絳紗錢一 砂仁錢五分

煮三杯。分三次服。

又 法同前。

桂枝尖一錢

炒白芍六錢

生香附三錢

降香末三錢

澤蘭一錢

廣木香一錢

新絳紗三錢

川芎八分

桂圓肉二錢

全當歸三錢

煮三杯分三次服。

尹氏三十歲誤服大辛大溫致傷心陽使下焦濁陰來攻過提致少陽無忌

有升無降上愈盛而下愈虛且與鎮固法非治病也特醫藥耳。

新絳紗三錢

薑半夏六錢

焦白芍三錢

旋覆花包三錢

炙龜板五錢

黑梔子三錢

代赭石兩一

降香末三錢

古勇連一錢五分

紫石英研細一兩

煮成三大茶杯分三次服渣再煮一杯服。

又鎮衝脈泄膽陽業已得效仍宗其法其血絡之鬱痛未能純治蓋事

有緩急也。

紫石英兩一

新絳紗三錢

焦白芍五錢

代赭石兩一

旋覆花包四錢

炒梔子三錢

炙龜板八錢

薑半夏六錢

古勇連一錢

煮成三大茶杯分三次服渣再煮一杯服。

蘇氏三十歲脈弦數左尺獨大瘦居右脇發則攻心痛躍不止病名肝着先

宜宣絡後補入脈。癸亥十一月二十八日

新絳紗三錢

桃仁炒三錢

炒丹皮三錢

旋覆花包三錢

鬱 金 二錢

元胡索 二錢

降香末 三錢

歸 鬚 二錢

兩頭尖 三錢 揀淨

煮三杯。分三次服。

肝着用通絡法。業已見效。仍宗前法。但必須用化癥回生丹。間服為妙。取其治病不傷正耳。十二月初一日

新絳紗 三錢

桃 仁 三錢

半 夏 三錢

生香附 三錢

旋覆花 包三錢

元胡索 二錢

蘇子霜 三錢

降香末 三錢

烏 藥 二錢

廣鬱金 二錢

歸 鬚 二錢

歸 鬚 二錢

煮三杯。分二次服。二帖。初三日

於前方內加兩頭尖三錢。丹皮炒黑五錢。白芍炒三錢。韭白汁三小匙。

藥力不及。且用進法。初六日

新絳紗 三錢

生香附 三錢

桃仁泥 三錢

旋覆花 包三錢

歸 鬚 一錢五分

焦白芍 六錢

川棟子 三錢

丹 皮 五錢

藏紅花 二錢

煮三杯。分三次服。三帖。

新絳紗 三錢

桃 仁 五錢

黑梔子 五錢

旋覆花 包三錢

香 附 生三錢

蘇子霜 三錢

降香末 三錢

鬱 金 二錢

元胡索 三錢

川棟子 三錢

歸 鬚 一錢五分

藏紅花 三錢

煮三杯。分三次服。十四日

業已見效。照前方日服半帖。丸藥減三分之一。二十六日

經來五日。顏色已正。不得過行傷正。其瘕氣留為丸藥緩化可也。茲議寧

心止汗。甲子正月十九日

白芍炒六錢

直熟地錢五

牡蠣錢五

茯苓錢五

炙龜版錢八

丹皮錢三

麥冬不去心五錢

五味子製一錢

小麥洗淨後入三錢

洋參錢二

整豆砂大紅紗包三錢

大棗去核二枚

水入碗。煮取八分。三碗。分三次服。三帖。

繼脈弦緊。肝鬱瘀血作燒。兼之痰飲喘欬。不得臥。不能進食。當臍疝痛。為

日已久。勢甚危急。勉與逐痰開胃。兼之化痰止熱。戊子二月十四日

新絳紗錢三

良姜錢二

桃仁泥錢三

旋覆花包三錢

青皮錢二

小枳實錢三

薑半夏錢六

歸鬚錢二

蘇子霜錢三

降香末錢三

廣皮錢三

川椒炭錢三

煮三杯。分三次服。一帖。此方下有案未全。

恆婦歲十九

肝鬱兼受燥金。脇痛二三年之久。與血相搏。發時痛不可忍。嘔

吐不食。行經不能按月。色黑且少。漸至經止不行。少腹痛脹。湯藥先宣肝

絡。兼之和胃。再以丸藥緩通陰絡。庚寅六月二十九日

新絳紗三錢

桃仁三錢

川椒炭三錢

旋覆花包三錢

歸鬚三錢

蘇子霜三錢

薑半夏五錢

青皮二錢

廣橘皮三錢

降香末三錢

生薑五錢

煮三杯。分三次服。十四帖。

外以化癥回生丹。每日清晨服一錢。開水調服。

諸症俱減。照原方再服七帖。分十四日服。每日仍服化癥回生丹一錢。七月十四日

十四日

痛止脹除。飲食大進。惟經仍未行。六脈弦細。右更短緊。與建中合二陳湯

以復其陽。二十日

薑半夏四錢

桂枝四錢

生薑三大片

廣橘皮三錢

白芍炒二錢

大棗去核二枚

炙甘草三錢

膠飴一兩去渣後化入

煮二杯。分二次服。每日服化癥回生丹一錢。

服前方十數帖。兼服化癥回生丹十數丸。一切俱佳。經亦大行。八月十七日

### 肝癰

謝四十歲病起肝鬱脇痛。痰中帶血。病名肝着。醫者不識絡病。因由與絡病

治法。非見血投涼。即見血補陰。無怪乎愈治愈窮也。大凡血症之脈。左脈

堅搏。治在下焦血分。右脈堅搏。治在上焦氣分。茲左手脈浮取弦。沈取洪

大而數。重按卽芤。前會痰有氣味。現在痰夾瘀滯黑色。唇舌晄白。其爲肝經絡瘀夾痰飲。咳血無疑。勢已憊極。勉與宣絡止血。兼之兩和肝胃以逐痰定咳。辛巳三月二十四日

新絳紗錢三

桃仁錢三

廣鬱金錢二

旋覆花包三錢

半夏錢三

蘇子霜錢一

降香末錢一五分

歸鬚錢一五分

廣皮炭錢二

煮兩茶杯。分四次服。二帖。

血家左手脈堅搏。治在下焦血分。此症先因肝絡瘀滯。以致血不歸經。日久不治。由陰經損及陽氣。自汗溺變痿弱。陽虛也。身熱左脈洪數而芤。陰傷也。如是陰陽兩傷之極。而瘀滯仍然未淨。通絡則虛。急補虛。又絡滯。兩難措手。不得已日用新絳一方。緩通其絡。其補藥則用陰陽兩攝法。聊盡人力而已。四月初二日

遼參錢一

沙蒺藜錢三

牡蠣錢六

茯神錢五

枸杞子錢三

龜板錢五

麥冬不去心四錢

五味子錢一

海參錢二

煮三杯。分二次服。

病起於脇痛。瘀血誤補致壅。久嗽成勞。至骨痿不能起床。仍有瘀滯不化之形。且痰有臭味。卽係肝著成癰。前日脈雖芤大而澹。昨日大見瘀血後。

今日則純然孔矣。豈非瘀血之明徵乎。若一味貪補。斷難再起。兼之宣絡。萬一得甦。妄誕之論。高明酌之。

又新絳覆花湯。與前補劑間服。初四日

新絳紗三錢

桃仁泥三錢

歸橫鬚八分

旋覆花包二錢

丹皮炭五錢

廣皮炭一錢

製半夏五錢一分

煮二杯。分二次服。

此方金匱載在婦人虛勞門。有識者其悟之。上平日服此方完。下平日服前補方。

痰中臭味太甚。黑痰未淨。是活絡之方不能除。脈孔自汗。甚是補攝之方。又不可緩。痰稀脣白。內有支飲。於補方中去牡蠣。海參鹽味之磚飲者。此症極虛極實。時人但知是虛而不知其實。所以日誤一日。以至於此。治實磚虛。治虛磚實。焉望成功。○一通一補。俱每日照前服法未改。初五日脈較前斂戢。於新絳方內半夏加一錢五分。成三錢。餘仍舊。服法亦如之。初七日

今日左尺脈獨大。加封固腎氣法。餘有原案。二方每日間服如前。初八日

炙龜版八錢

人參一錢

沙蒺藜二錢

左牡蠣六錢

麥冬不去心三錢

五味子製一錢

眞雲苓五錢

杞子炒黑三錢

炙甘草三錢

焦白芍三錢

蓮

子五錢

煮二杯。分二次服。

於前方內加入人參五分成一錢五分。又加海參一條。淡菘蓉三錢。餘悉如

前。四帖。初十日

仍照前每日間服一通一補方。十三日

左脈空大未斂。精神較前雖好。猶宜收攝下焦。於前補方內。去龜板五味

子。白芍海參菘蓉。餘如舊間服法。煮好去渣。再上火煎成二杯。分二次服。

十七日

痰色猶不能清白。氣味亦不淨。仍須宣絡。同日

新絳紗三錢

薑半夏五錢

歸橫鬚一錢

旋覆花包二錢

廣鬱金一錢五分

廣皮炭一錢五分

煮二杯。分二次服。上平。日服此方。四帖。

脈少斂。通補二方。間服如前。四帖。廿一日

痰濁未變。脈象少斂。午後微熱。不寐。飲食由漸而加。不可太過不及。廿四日

人參一錢五分

左牡蠣三錢

蓮

子連皮心五錢

雲苓五錢

枸杞子炒黑三錢

蒺藜二錢

麥

冬不去心五錢

炒棗仁三錢

炙甘草五錢

海參洗二小條

煮三杯。分二次服。新絳方仍如前服七帖

身熱不寐已愈。脈象大為斂戢。面色亦佳。惟濁痰未淨耳。仍用二方間服。



後方以逐未盡之癰膿而宣肝絡。即所以開肝絡鬱也。五月初四日

人參五分 左牡蠣五錢 蒺藜三錢 麥冬不去心

枸杞子炒黑三錢 海參洗二條 雲苓五錢 炒棗仁三錢

淡菜大三錢 蓮子連心皮五錢 五味子熟一錢 炙甘草三錢

煮二杯。分二次服。午後服此。

又方

新絳紗二錢 香附二錢 桃仁泥二錢 旋覆花包二錢

歸鬚二錢 廣鬱金二錢 薑半夏三錢 廣皮八分

煮兩小茶杯。午前服。

覆診於補方內去牡蠣五味子。餘仍舊。二方間服如前。初八日

痰已漸清。肝亦漸平。精神漸旺。議去搜逐而補中。與外臺茯苓飲意。專用

一方十三日

人參二錢 雲苓塊六錢 香附三錢 於朮五錢

生薏仁五錢 廣皮三錢 半夏五錢 小枳實一錢

炙甘草三錢 麥冬不去心三錢 煮三杯。分三次服。四帖。

覆診於前方內去麥冬。加白薏仁研一錢。以腹微不和也。十七日

大便頻而不爽。氣滯而有溼也。廿一日

雲苓塊六錢 遼參一錢五分 薑半夏三錢 生苡仁五錢 於朮焦三錢 廣皮炭二錢

白蔻研淨一錢 杏仁三錢 白通草一錢 煮三杯。分三次服。四帖。

孫氏三十歲 嗆咳膿血氣臭。午後身熱面赤。宛若陰虛。但左脇痛甚。膿血之

中兼有稀痰。乃肝癰夾痰飲所致。先治肝癰與活肝絡。

新絳紗 半夏 歸鬚 旋覆花包 廣皮

鬱金 降香末 桃仁 蘇子 元胡索

人參後方加入 青皮 煮杯分 次服

服六七帖。膿血由漸而少。熱退。脇痛大減。於前方加入人參。又服四五帖。

後以補脾胃逐痰飲收功。

癩狂

陀五十歲 病由情志而傷。中年下焦精氣不固。上年露瘵中之萌。近因情志

重傷。又屆相火主令。君火司天。君火客氣。內與本身君相火相應。以致肝

風鳴張。初起如狂。醫者仍然攻風刮痰。大用辛溫剛燥。復以苦寒直下。是

助賊為虐也。現在左脈實大堅牢。大非佳兆。勉以紫雪丹定痙癢肢厥。而

泄有餘之客熱。再以定風珠濟不足之真陰。而熄內風之震動。如果病有

回機神色稍清。再議後法。

紫雪丹

二兩 每服二錢二時一服以神清為度牙關緊閉用烏梅蘸醋擦牙關其牙即開

大生地

一兩 左牡蠣八錢

麥冬

八錢 不去心

生白芍

一兩 真阿膠四錢

麻仁

四錢 生鱉甲一兩

蚌

生開沖入 牛酒杯

炙甘草

六錢 雞子黃二枚

藥煮成去渣後和 入上火一二沸

煮成三碗。渣再煮兩碗。共五碗。四刻服半碗。盡劑再作服。

左脈仍然牢固。較昨日諸症俱減。舌苔黃黑。尺膚熱。陽明絡現。昨謂不止

本身虛熱。且有客氣加臨。非虛語也。湯藥仍照前方。再以清宮湯化牛黃

丸紫雪丹輩。二時一次。二十日

連翹心

三錢

連心麥冬

五錢 元參心五錢

竹葉捲心

三錢

蓮子心

五分

煮一大碗。

服牛黃丸紫雪丹時。即以此湯化服。待湯已涼化入丹丸

瘰癧肢厥雖止。其狂如故。會厭不利。脈仍牢固數大。按陽竝於上則狂的

係陽火有餘。非極苦之藥。直折其上盛之威。其勢未必得減。況小腸火腑。

非苦不通。火降痰亦因之而降。其會厭庶可得利矣。廿一日

洋蘆薈

三錢

犀角

八錢

元參

五錢

龍膽草

三錢

麥冬

不去心 八錢

知母

六錢

真雅連

三錢

丹皮

八錢

白芍

六錢

細生地

六錢

頭煎三碗。今日服。二煎兩碗。明早服。二帖半。

脈氣大減。但陽升阻絡。機竅不靈。議兼清會厭膽絡之熱。廿四日

鈴羊角三錢 洋蘆薈一錢五分 直生地三錢 知母三錢 麥冬不去心三錢

龍膽草一錢五分 鉤藤二錢 連翹一錢五分 冬桑葉一錢五分 煮成三杯。

外米醋杯半。每藥一茶杯。沖入半酒杯。今晚一帖。明早一帖。

於前方內加石膏二兩。廿五日

稍進糜粥。覺勇力倍常。舌紅黑。脈較昨日實大。猶為陽火有餘。廿六日

犀角六錢 細生地四錢 雅連四錢 麥冬不去心五錢

洋蘆薈四錢 丹皮五錢 知母五錢 龍膽草三錢

米醋每藥一杯沖入半杯 濃煎三二杯。分三二次服。渣再煮二杯。明早服。

於前方內加鐵落煎湯代水。鐵落即鐵鋪中打鐵時所落鐵皮片

諸證與脈皆減。然未能盡。苦藥猶不能減也。頗腫係客氣。議加辛涼。初二日

犀角五錢 洋蘆薈三錢 雅連三錢 麥冬不去心六錢

龍膽草三錢 知母四錢 連翹三錢 鈴羊角三錢

丹皮五錢 銀花三錢 鉤藤三錢鐵落水煎 頭煎三碗。二煎三碗。分六

次服。明日午前令盡。間服牛黃丸紫雪丹。日三次。

於前方內加生地八錢。初三日

齊四十歲脈弦數而勁。初因肝鬱。久升無降。以致陽奔於上。則狂。心體之虛。以用勝而更虛。心用之強。因體虛而更強。間日舉發。氣伏最深。已難調治。今歲又係風木司天。有木火相攝之象。勉與補心體瀉心用兩法。己巳二月初三日

洋參三錢 大生地二兩 丹參三錢 白芍六錢

生龜板兩一 黃柏三錢 麥冬不去心 六錢 蓮子心一錢

山連三錢 丹皮四錢 煮三椀。分三次服。

外用紫雪丹六錢。每次一錢。與此方間服。

操持太過。致傷心氣之狂疾。前用補心體瀉心用。攝心神。已見大效。脈勢

亦減。經謂脈小則病退是也。初六日

洋參三錢 女貞子四錢 丹皮五錢 龜板二兩 龍膽草一錢

山連三錢 白芍六錢 黃柏炭二錢 蓮子五錢 麥冬不去心 六錢

鐵落水煎。煎三杯。分三次服。外以米醋一酒杯沖。

某左脈弦勁。經謂單弦飲僻。五日前因觀劇。後做惡夢。遂病狂肢厥。經謂陽竝於上則狂。兩陰交盡則厥。靈樞有淫邪發夢一卷。大意以五臟偏勝。非因夢而後病也。前人有諸般怪症。皆屬於痰之論。雖不盡然。然此症現在咳嗽塊痰。左脈單弦。應作痰治。廿七日

石菖蒲二錢

半夏五錢

扶神塊五錢

天竺黃二錢

丹皮三錢

白附子二錢

煮三杯。分三次服。先服陳李濟牛黃清心丸一二丸。溫開

水調服。

狂而厥。左脈單弦。咳嗽塊痰。昨議應作痰治。今日左脈漸有和平之象。證現於外者亦效。但形貌怯弱。色白而嫩。脈亦不壯。此症之痰。究因驚起。凡神氣壯者不驚。況驚後惡夢。夢後大汗。其為陽虛神怯顯然。此症將來必歸大補而後收功。現在不得以攻痰見效。而忘其虛怯。與化痰之中。微加益氣。廿八日

半夏五錢

扶神塊五錢

秋小麥八錢

麥冬不去心五錢

石菖蒲一錢

大棗去核二枚

煮三杯。分三次服。

廿九日

體虛有痰之症。不能純治一邊。今日脈微滑數。於昨日方法中少加逐痰。

扶神塊五錢

半夏五錢

陳膽星一錢

白附子二錢

麥冬不去心三錢

秋小麥合一錢

石菖蒲一分

煮三杯。分三次服。

先服牛黃清心丸半丸。

昨日稍加逐痰。痰出如許。大勢安靜。但多怒耳。右脈仍滑。痰未淨也。初一

扶神塊錢三

半夏六錢

石菖蒲錢一

代赭石煨飛錢一

白附子錢二

秋小麥錢八

旋覆花包三錢

炙甘草錢一

煮三杯。分三次服。其後痰去。以大補心脾而安。

鮑三十歲大狂七年。先因功名不遂而病。本京先醫市醫儒醫已歷不少。既

而徽州醫杭州醫蘇州醫湖北醫。所閱之醫不下數十百矣。大概補虛者

多。攻實者少。間有已時。不旋踵而即發。余初診時。見其蓬首垢面。下體俱

赤。衣不遮身。隨著隨毀。門牕粉碎。隨釘隨折。鐐靠手足。外有鐵索錮鎖大

石磨盤上。言語之亂。形體之羸。更不待言。細詢其情。每日非見婦人不可。

婦人不願見彼。竟鬧不可言。叫號聲嘶。哀鳴令人不忍聞。只得令伊姬妾

強侍之。然後少安。次日仍然。無一日之空。診其脈六部弦長而勁。余曰此

實症。非虛症也。於是用極苦以瀉心膽二經之火。瀉心者必瀉小腸。病在

臟。治其腑也。膽無出路。借小腸以為出路。亦必瀉小腸也。十月初二日

龍膽草錢三

天冬三錢

細生地錢三

胡黃連錢三

麥冬三錢 不去心

粉丹皮錢三

煮三杯。分三次服。

服二帖大效。妄語少而舉動安靜。

見其效也。以為久病體虛。恐過剛則折。用病減者減其製例。於原方減苦

藥加補陰之甘潤。初二日

病家來告云。昨服改方二帖。病勢大重。較前之叫哮妄語加數倍之多。無一刻之靜。此症想不能治。諒其必死。先生可不必再診矣。余曰不然。初用重劑而大效。繼用輕劑加補陰而大重。吾知進退矣。復診其脈。弦長而數。於是重用苦藥。初五日

龍膽草六錢

天冬五錢

真雅連五錢

洋蘆薈六錢

麥冬不去心二錢

烏梅肉五錢

胡黃連五錢

秋石二錢

煮三椀。分三次服。

服此方一氣六帖。一日較一日大效。至十一日大為明白。於是將其得病之由。因伊念頭之差。因未識文章至高之境。即能至高。尚有命在。非人力所能強為。何怒之有。人生以體親心為孝。痛乎責之。俯首無辭。以後漸減苦藥。加補陰。半月以後。去刑具。着衣冠。同跪拜。神識與好人無異。服專翕大生膏一料而大壯。下科竟中矣。

章氏四十歲

二歲

先是二月間病。神識恍惚。誤服肉桂熟地等補藥。因而大狂。余

於三月間。用極苦以折其上盛之威。間服芳香開心包。醫治三十日而愈。但脈仍洪數。余囑其戒酒肉。服專翕大生膏。補陰配陽。彼不唯不服丸藥。至午節大開酒肉。於是狂不可當。足臭遠聞至鄰。不時脫淨衣褲上大街。



一二男子不能搏之使回。五月十四日。又延余診視。余再用前法隨效。二三日仍然如故。蓋少陽相火旺極。挾制君主行令。藥雖暫開其閉。暫折其威。相火一動。而仍然如故。延至六月十六日午刻。復自撕碎其褲。人不及防。而出大門矣。余坐視不忍。復自慚無術。以已其病。因謂其胞弟曰。此症非打之使極痛。令其自羞。褲也不可。蓋羞惡之心。亦統於仁。能仁則不忍。忍則不仁。不仁之至。羞惡全喪。打之極痛。則不能忍。不忍而仁心復。而羞惡之心亦復矣。此先聖王撲作教刑之義也。伊弟見其乃姊如是。景况羞而成怒。以保父母體面為義。於是。以小竹板責其腿。令羞褲。彼知痛後。而自羞衣。着後稍明。次日十七日立秋。余與大劑苦藥一帖。而全愈。蓋打之功。與天時秋金之氣。藥之力。相須而成功也。後以專翕大生膏。而收全功。富二十歲陽弁於上。則狂。先以極苦折其上盛之威。左脈洪大。膽無出路。瀉膽者。必瀉小腸。心主言。多言者必瀉心。瀉心者亦必瀉小腸。小腸火腑。非苦不通。丁亥三月十七日

龍膽草四錢

天冬三錢

生牡蠣打碎五錢

洋蘆薈三錢

麥冬不去心四錢

胡黃連三錢

細生地五錢

丹皮三錢

鐵落水煎。煮三杯。分三次服。二帖。

狂病與極苦瀉小腸已效。仍宗前法。少加收攝陰氣。餘有原案。以前人誤下。大便太稀故也。十九日

龍膽草 三錢 天冬 三錢 生鱉甲 打五錢 洋蘆薈 二錢 麥冬 不去心三錢

生牡蠣 五錢 胡黃連 三錢 丹皮 五錢 五味子 一錢 次生地 五錢

鐵落水煮成。去渣。加陳米醋半酒杯。分三次服。

狂病與育陰兼瀉小腸。病退其半。脈之洪大者亦漸小。經謂脈小則病退。宗其法而減其製。二十一日

龍膽草 二錢 天冬 二錢 牡蠣 五錢 洋蘆薈 一錢 麥冬 不去心三錢

白芍 三錢 胡黃連 二錢 丹皮 三錢 秋石 一錢 細生地 五錢

鐵落水煮三杯。分三次服。四帖。

狂病左關洪大有力。得苦藥反大於前。議進法。餘有原案。廿六日

龍膽草 五錢 知母 四錢 天門冬 四錢 洋蘆薈 五錢

丹皮 二錢 細生地 二錢 胡黃連 五錢 秋石 一錢

鐵落水煮成三杯。加陳米醋一酒杯。分三次服。其碧雪丹仍服。

彥 廿一歲 狂病有年。六脈洪大有力。左關更甚。與極苦折其上盛之威。丁亥三月

日十八

龍膽草 三錢

胡黃連 三錢

麥冬 三錢 不去心

洋蘆薈 三錢

細生地 三錢

丹皮 三錢

煮二杯。分二次服。

碧雪丹 二錢 溫開水沖

虛勞

伊氏 二十歲 勞傷急怒吐血。二者皆治肝絡。醫者不識。見血投涼。以致胃口

為苦寒傷殘。脾陽腎陽亦為苦寒滑潤。伐其生發健運之常。此腹痛晨泄

不食。脈沉弦細之所由來也。按三焦俱損。先建中焦補土。可以生金。腎關

之虛。亦可仰賴於胃關矣。

茯苓塊 三錢

人參 一錢

蓮子 去心 五錢

白扁豆 一分 五錢

芡實 三錢

冰糖 三錢

廣皮炭 一錢

煮一大碗。緩緩服。多服為宜

陳氏 三十歲 脈弦細失音。謂之金碎不鳴。暮熱不食。食則嘔。亦係三焦俱損。

為難治。甲子四月初五日

茯苓塊 三錢

洋參 二錢

冬桑葉 二錢

甜杏仁 三錢

沙參 二錢

白扁豆 五錢

柏子霜 三錢

冰糖 三錢

胡桃肉 三錢

煮三杯。分三次服。

另含鮑魚片。洋參片。

陳 三十歲 左脈搏大。下焦肝腎吐血。上焦咳嗽。中焦不食。謂之三焦俱損。例

在不治。勉議三焦俱損先建中焦法。甲子四月初五日

茯苓塊二錢

沙參三錢

蓮子三錢

焦白芍一錢五分

桂枝二錢

芡實三錢

白扁豆三錢

桑葉二錢

冰糖三錢

胡桃肉三錢

煮三杯分三次服。

服此方四帖後能食。

施二十歲 形寒而六脈弦細時而身熱先天不足與諸虛不足之小建中法。

乙酉四月廿三日

白芍六錢

炙甘草三錢

生薑四錢

膠飴一兩去渣後化入

大棗去核四枚

煮三杯分三次服。

前方服過六十劑諸皆見效陽雖轉而虛未復於前方內減薑桂之半加

柔藥兼與護陰。八月初二日

大生地五錢

麥冬不去心四錢

五味子二錢

姚三十歲 六脈弦細而緊勞陽吐血諸虛不足小建中湯主之。乙酉五月初二日

白芍六錢

炙甘草三錢

生薑五錢

桂枝四錢

膠飴一兩化入

大棗去核三枚

扶神四錢

煮三杯分三次服。

共服二十一帖愈矣。

李廿四歲 每日五更胃痛欲食得食少安胃痛則背冷如冰六脈弦細陽微。

是太陽之陽虛。累及陽明之陽虛。陽明之陽虛現症。則太陽之陽更覺其虛。此等陽虛。只宜通補。不宜守補。乙酉五月初三日

桂枝八錢 廣皮四錢 川椒炭五錢 半夏六錢 乾薑四錢

煮三杯。分三次服。

背寒減。腹痛下移。減桂枝。加萊萸良薑。十四日

傅十八歲 六脈弦細而緊。吐血遺精。陽氣不攝。胃口不開。法當與建中復其

陽。奈酒客中焦溼熱壅聚。不可與甘。改用辛淡微甘以和胃。胃旺得食。而

後諸虛可復也。乙酉五月十三日

半夏五錢 雲苓塊五錢 麥冬不去心三錢 白芍五錢 生薏仁五錢

神麴炒五錢 桂枝三錢 廣皮炭三錢 薑汁每杯點三小匙 煮三杯。分三次服。

業已見效。胃口得開進食。脈尚弦緊。多服為宜。廿一日

沈十五歲 幼孩脈雙弦而細緊。瘰癧結核。胃陽不開。色白食少且嘔。形體羸

瘦。與通補胃陽。乙酉五月十五日

雲苓塊四錢 半夏四錢 生薑三錢 白扁豆四錢 廣皮炒二錢

煮三杯。分三次服。

前藥已服十二帖。嘔止胃開。腹微脹。脈有回陽之氣。於前方加厚樸杉皮

消脹。脹消後。接服後方化結。於前方內去生薑廣皮。加香附土貝母忍冬

藤青橘葉海藻以化癰癥結核。六月十日

錢廿七歲 六脈弦緊。胃痛久。病在絡。當與和絡。乙丑五月廿八日

降香末錢三 桂枝尖錢三 烏藥錢二 小茴香炒炭二錢 半夏三錢

歸鬚錢二 公丁香分八 良薑錢一 生薑片三 煮三杯。分三次服。

此方服七帖後痛止。以二十帖為末。神麩糊丸。服過一料。

六脈弦細而緊。臟氣之沉寒可知。食難用飽。稍飽則腹脹。食何物則噁何

氣。間有胃痛時。皆腑陽之衰也。陽虛損症。與通補臟腑之陽法。大抵勞病。

勞陽者十之八九。勞陰者十之二三。不然。經何云勞者溫之。世人僉以六

味入味治虛損。人命其何堪哉。永戒生冷。暫戒猪肉介屬。八月十九日

雲苓塊錢五 半夏六錢 公丁香錢二 白蔻仁錢三 良薑錢三

小枳實錢二 益智仁錢三 生薑錢五 廣皮炭錢四 川椒炭錢三

煮三杯。分三次服。

經謂必先歲氣。毋伐天和。今年陽明燥金。太乙天符。故用藥如左。他年

溫熱宜減。

前方已服五帖。脈之緊無胃氣者已和。痛楚已止。頗能加餐。神氣亦旺。照

前方減川椒一錢。公丁香一錢。再服七帖。可定丸方。廿四日

前因脈中之陽氣已回。頗有活潑之機。恐剛燥太過。減去川椒丁香各一

錢。今日診脈。雖不似初診之脈緊。亦不似廿四日脈和。肢涼陽微。不及四

末之故。與前方內加桂枝五錢。再服七帖。三十日

丸方。諸症向安。惟六脈尚弦。與通補脾胃兩陽。

雲苓塊八兩 人參二兩 益智仁四兩 生薏仁八兩 半夏八兩

小枳實二兩 於白朮四兩 廣皮四兩 白蔻仁一兩 共為細末。神麩入

兩。煎湯法丸如梧子大。每服二三錢。日再服。日三服。自行斟酌。

備用方。陽虛之體質。如冬日畏寒。四肢冷。有陽微不及四末之象。服此

方五七帖。以充陽氣。

桂枝四錢 炙甘草三錢 生薑五錢 白芍六錢 膠去渣化入一兩

大棗去核三枚 煮二杯。分二次服。

此方亦可加綿黃耆。人參。雲苓。白朮。廣皮。

譚四十歲病後六脈弦細而緊。絕少陽和之氣。形體羸瘦。幸喜胃旺。可以守

補。與形不足者補之以味法。乙酉八月廿三日

白芍六錢 雲苓塊四錢 甘草三錢 桂枝四錢

炙黃耆四錢

生薑三片

人參二錢

大棗去核二枚

桂圓肉三錢

膠飴一兩去渣後化入

煮三杯分三次服。

陳十九歲脈虛數。頭目眩冒。暮有微熱。飲食少減。面似桃花。身如柳葉。與二

甲復脈法。

熟地六錢

生鱉甲八錢

白芍生六錢

麥冬不去心五錢

生牡蠣五錢

麻仁二錢

阿膠三錢

炙甘草六錢

煮三杯分三次服。

服廿帖。紅退暈止。食進。後用專翕大生膏四飴收功。

李四十歲面赤舌絳。脈虛弦而數。聞婦人聲則遺。令其移居至大廟深處。與

三甲復脈法。

乾地黃

麥冬

生鱉甲

生白芍

生龜板

炙甘草

生牡蠣

阿膠

麻仁

煮三杯分

次服

服四十帖。由漸而效。後以天根月窟膏一料。計廿四飴收功。

羅四十歲精關開泄太早。兼之讀書謀慮。遺滑多年。耳鳴。目至暮昏。頭暈。頭

中覺有物旋轉。時忽響。精神不振。飲食短少。與專翕大生膏。每日一兩。服

至二年始愈。

常二十四歲久遺。脈弦細。與桂枝龍骨牡蠣湯。服六十帖而愈。



吐血

王 脈弦如刃。吐出血後。左脇脹痛。喉中如有物阻。治在肝絡。使血不凝。則吐血可止。止後當與補陰。

新絳紗三錢

鬱金二錢

降香末三錢

旋覆花包三錢

桃仁炒三錢

元胡索二錢

歸橫鬚二錢

丹皮三錢

蘇子霜二錢

煮三杯。分三次服。

又 如刃之脈。已見平減。但虛細如故耳。

降香末三錢

丹皮炒五錢

細生地三錢

新絳紗三錢

歸鬚二錢

焦白芍三錢

旋覆花包三錢

香附製一錢五分

廣鬱金二錢

煮三杯。分三次服。

又 肝為剛臟。勁氣初平。未便膩補。取鬆靈之能入肝絡者宜之。

遼沙參三錢

麥冬不去心五錢

白蒺藜三錢

細生地三錢

丹皮炒五錢

廣鬱金二錢

焦白芍六錢

歸身一錢五分

生甘草一錢

整石斛三錢

桑葉一分

煮三杯。分三次服。

又 昨日仍瘀血吐出。今尙未可呆補。

細生地三錢

沙參三錢

焦白芍三錢

羚羊角二錢

麥冬不去心五錢

沙蒺藜二錢

整石斛五錢

當歸一分

茶菊花二錢

炒丹皮五錢

桑葉一分

生甘草一錢

煮三杯。分二次服。

外另服新絳紗三錢。

曾女廿二歲 大凡吐血左脈堅搏治在下焦血分右脈堅搏治在上焦氣分。又有心血肝血大腸血小腸血胃血衝脈血各種不同。豈一概見血投涼所可治哉。無怪室女童男勞瘵乾血之多。皆世無明眼醫士識病故也。此症左脈沉大有力。類緊不甚數。體厚色白。少腹痛。小便短赤。咳吐瘀紫。繼見鮮色。喉中鹹。此衝脈襲受寒邪。致經不得行。倒逆而吐耳。大忌柔潤寒涼。議溫鎮衝脈。行至陰之瘀濁。使經得行而血症愈矣。苦辛通法。

川棟子三錢

降香三錢

兩頭尖二錢

小茴香二錢

桃仁三錢

琥珀屑沖三錢

紫石英三錢

歸鬚二錢

韭白汁三錢

煮三杯。分三次服。

羅三十歲 右脈浮洪。咳痰吐血。唇絳。治上焦氣分。壬戌八月廿八日

茯苓塊五錢

沙參三錢

生扁豆五錢

生薏仁五錢

蓮翹八分

冬桑葉二錢

杏仁泥三錢

煮三杯。分三次服。

血後咳不止。進食不香。右脈不浮而仍洪。兼與養陽明之陰。九月初二日

沙參三錢

生薏仁三錢

扁豆三錢

麥冬三錢

茯苓塊三錢

百合二錢

玉竹二錢

甜杏仁二錢

桑葉一分

煮三杯。分三次服。

諸症俱退。惟進食不旺。右脈大垂尺澤。先與甘寒養胃陰。初五日

大麥冬不去心六錢

沙參三錢

生扁豆三錢

細生地三錢

玉竹炒香三錢

秋梨汁杯一 甜杏仁錢三 桑葉錢一 煮三杯分三次服

甘潤養陰初九日

大生地錢三 沙參錢三 火麻仁錢二 甜杏仁去皮尖二錢

麥冬不去心六錢 柏子霜錢二 生白芍錢三 桑葉錢一

生扁豆錢三 炒玉竹錢三 冰糖錢三 煮三杯分三次服

伊四歲 六脈弦數兩關獨浮左更甚右脇痛胸中痞塞肝鬱吐血先理肝

絡癸亥七月二十五日

新絳紗錢三 降香錢二 炒丹皮錢三 旋覆花包二錢

歸鬚錢二 蘇子霜錢三 廣鬱金錢二 煮三杯分三次服

血家脇痛與和肝絡脇痛已愈但咳嗽黃痰氣短懶食脈弦細數議甘能

益氣補土生金清涼降熱而護胃陰令能食三十日

沙參錢三 細生地錢三 桑葉錢二 甜杏仁錢三 麥冬不去心三錢

藕汁沖一酒杯 玉竹炒香二錢 葶薺汁沖一酒杯 煮三杯分三次服四帖

血家脇痛不食與和肝絡養胃陰兩法俱效仍咳嗽兼胸中隱痛動則喘氣虛金匱謂諸虛不足與小建中復其陽和營衛令能食從食中復其虛診脈弦為減正合其論但脈數而痰濃陰亦大虧議復脈法兩補陰陽方

中亦包建中法在內。仍然甘能益氣而補土生金也。但肆中阿膠不佳。又兼滑膩。且大便糖。以牡蠣易之。八月初四日

沙參三錢 大生地三錢 麻仁一錢 麥冬不去心 三錢 左牡蠣三錢

大棗去核 二枚 白芍炒 三錢 炙甘草三錢 薑汁仲二小匙 桂枝二錢

煮三杯。分三次服。

血後咳嗽氣虛。用復脈法。甘緩理中。補土生金之義。飲食漸加。是其大效。如果胃土旺。無不生金之理。如果飲食加。無不可復之虛勞。因前法而進

之。初九日

洋參炒 二錢 大生地六錢 麻仁二錢 桂枝三錢 麥冬不去心 六錢

杭白芍六錢 芡實三錢 炙甘草五錢 牡蠣五錢 蓮子去心留皮 三錢

生薑汁二小匙 大棗去核 二枚 鱉甲三錢 煮三碗。分三次服。

現因相火行令。血復來。右脈大。暫清肺胃。九月初七日

麥冬不去心 六錢 北沙參三錢 白花百合六錢 石斛一兩

甜杏仁去皮尖 研 三錢 秋梨五錢 桑葉三錢 生扁豆三錢

煮三杯。分二次服。

史五十四歲 酒客脈洪面赤。吐狂血不止。仍然飲食如常。議金匱大黃黃連瀉

心湯。急瀉。三陽實火。而血自止。

又 前法已效。不可再進。議甘涼法。服三日再議。

又 前以瀉心法大效。未敢再進。血復來。議再用瀉心法減其製。

又 昨用瀉心法減其製。雖見效。而血未盡。今仍照原方。服二日大效。以後永不再發。

唐三十歲

凡咳血者。右脈堅搏。治在上焦氣分。癸亥九月二十日

白扁豆皮三錢

桃仁二錢

白茅根三錢

炒黑梔皮一錢

側柏葉炭三錢

生薏仁三錢

桑葉一錢五分

煮三杯。分三次服。二帖而愈

陳三十歲 吐血。左手脈堅搏。治在下焦血分。乙丑三月十七日

沙參三錢

細生地五錢

丹皮五錢

白芍四錢

黃芩炭二錢

麻仁三錢

阿膠二錢

天門冬三錢

三七一錢五分

雲連炒黑一錢

麥門冬四錢

甘草一錢五分

水入杯。煮取三杯。分三次服。

左脈沉弦細數。鋒銳如刃。吐血。左手脈堅搏。治在下焦血分。廿三日

沙參三錢

細生地五錢

阿膠二錢

扶苓塊三錢

麥冬不去心四錢

天冬三錢

元參三錢

霍石斛五錢

麻仁三錢

白芍四錢

黃芩炭二錢

甘草一錢五分

丹皮五錢

煮四杯。分四次服。

脈數減弦。剛甚。廿六日

- 洋參三錢
- 大生地五錢直
- 阿膠三錢
- 麥冬四錢
- 茯苓塊三錢

- 麻仁二錢
- 白芍四錢炒
- 生牡蠣三錢
- 炙甘草一錢五分
- 丹皮五錢

煮四杯。分四次服。

趙勞陽吐血。脈雙弦。金匱謂大則為虛。弦則為減。虛弦相搏。其名曰革。

男子失精亡血。諸虛不足。小建中湯主之。丙寅二月初九日

- 白芍六錢
- 炙甘草三錢
- 生薑五片
- 桂枝四錢
- 膠飴去渣後化入上火二三沸一兩

大棗去核二枚 水五碗。煎取兩碗。渣再煮一碗。分三次服。輕者日一帖。重

則日再服。

章 右脈空大。左脈弦細。血後咳吐。濁痰腥臭。真液不守。陰火上沖克金。

非純補純清之症。然而憊矣。丙寅二月廿四日

- 沙參三錢
- 甜杏仁去皮尖研二錢
- 扁豆生三錢
- 麥冬不去心

- 枇杷葉蜜炙一分
- 桑葉三錢
- 天冬三錢
- 五味子一錢五分

白花百合二錢 阿膠三錢 霍石斛五錢煎湯代水 濃煎兩杯。分二次服。

脈少斂。痰咳亦減。切戒用心。廿八日

- 沙參三錢
- 生白扁豆三錢
- 阿膠三錢
- 洋參一錢五分

製五味子錢三

牡蠣錢三

麥冬不去心 錢三

白花百合錢三

桑葉錢二

天冬錢三

水五杯。煮取兩杯。渣再煮一杯。服。日二帖。

脈大斂戢。古所謂脈小則病退是也。頗有起色。若得舌苔化去則更妙矣。

三月初三日

生薏仁錢五

沙參錢三

生白扁豆錢三

天冬錢三

洋參錢五分

桑葉錢三

製五味子錢三

麥冬不去心 錢三

梨汁沖一杯

鮮蘆根汁沖五杯

煮三杯。分三次服。四帖。

胡三十歲榮陽吐血。汗多足麻。六脈弦細不數。小建中湯主之。乙酉四月廿八日

白芍錢六

甘草炙三錢

生薑五錢

桂枝錢四

膠飴後入 一兩

大棗去核 三枚

煮三杯。去渣後。將膠飴化入。上火二三分三次服。沸攪令勻

汗減足麻愈。食少。加原方再服。五月初六日

前藥已服十四帖。諸症皆愈。惟咳嗽未止。於前原方加雲苓半夏十五日

沈二十歲六脈弦數。勞陽吐血。建中湯主之。乙酉正月 初十日

白芍炒六錢

丹皮錢三

大棗去核 三枚

桂枝錢三

甘草炙三錢

薑汁沖三匙

麥冬不去心 五錢

膠飴一兩

去渣後化入 上火二三沸攪勻

煮三杯。分三次服。

肝鬱脇痛。病名肝着。治在肝經之絡。經藥弗愈也。十四日

新絳紗三錢 半三錢 夏三錢 蘇子霜三錢 旋覆花包三錢 青皮二錢

歸橫鬚二錢 降香末三錢 吳萸泡淡一錢 廣皮炭二錢 廣鬱金二錢

煮三杯。分三次服。

六脈弦勁。前用建中。現在右脈已和。左手仍勁。胸中咳甚則痛。間有一二口紫色之血。按肝脈絡胸。是絡中尚有瘀滯。且與建中宣絡。十五

新絳紗三錢 降香三錢 丹皮炭三錢 旋覆花包三錢 鬱金二錢

蘇子霜二錢 桃仁泥三錢 歸鬚二錢 廣皮炭二錢 薑半夏五錢

煮三杯。分三次服。

六脈弦數。以春氣在頭之故。偶受微風。右寸獨浮大而衄血。暫與清清道

之風熱。二十一日

白茅根五錢 甜杏仁三錢 茶菊花三錢 側柏炭三錢 桑葉三錢

鮮蘆根三錢 黑山梔二錢 煮三小杯。分三次服。

吳七十歲 周身癢不可當。脈洪吐狂血。與大黃黃連瀉心湯。以後永不發。

史五十歲 酒客大吐血成盆。六脈洪數面赤。三陽實火為病。與

大黃六錢 黃連五錢 黃芩五錢 瀉心湯一帖而止。二帖脈平。後

七日又發。脈如故。又二帖。



吳二十 每日飽食就牀。脾陽致困。因失其統血之職。此為傷食吐血脈弦

與竈心黃土。每日一飭。分二次煎服。將盡半月而愈。戒其夜食。永遠不發。

岳二十 勞傷吐血。兩脇俱痛。六脈弦緊。誤補難愈。凡勞傷肝鬱。必有瘀血。

故症現脇痛。一以活絡為主。俟瘀血去淨。而後可以補虛。乙酉十一月十二日

新絳紗錢三 桃仁三錢 蘇子霜錢二 旋覆花錢包三 歸鬚三錢

丹皮炭錢五 廣鬱金錢二 降香三錢 煮三杯。分三次服。四帖。

覆診脈之弦緊雖減而未和緩。脇痛雖大減而未盡除。與原方去桃仁加

細生地五錢。二十一日

六脈弦細緊。金匱謂脈雙弦者寒也。弦則為減。男子失精亡血。小建中湯

主之。勞傷吐血愈後。以建中復陽生陰。十二月十五日

白芍錢六 麥冬三錢 大棗去核二枚 桂枝三錢 丹皮錢三

生薑片三 炙甘草錢三 膠飴一兩 去渣後化入上火二三沸攪勻 煮三杯。分三次服。

諸症全愈。胃口大開。虛未全復。於原方加麥冬二錢。使分佈胃中津液。於

十二經臟之虛。則從飲食中復矣。十八日

汝三十歲 本有肝鬱脇痛症。又受秋涼燥金之氣。不唯腹痛大發。且有表症。

午後身熱。雖見血。乃燥氣非溼溫也。治在肝經與絡也。戊子七月十七日

桂枝尖三錢

柴胡三錢

淡吳黃二錢

薑半夏四錢

歸鬚二錢

蘇子霜二錢

降香末三錢

廣皮三錢

川椒炭三錢

煮三杯。分三次服。燥退去柴胡

服此方一二日。燥氣已退。去柴胡。再服二三帖。

日 肝鬱脇痛。乃肝絡中有瘀血方痛。古人僉用新絳旋覆花湯。橫走絡者也。後人多用逍遙散。豈走經者也。故多不見效。沉久病必治絡乎。

新絳紗三錢

桃仁二錢

廣鬱金二錢

旋覆花包三錢

歸鬚二錢

蘇子霜二錢

薑半夏三錢

香附三錢

廣皮炭二錢

降香末二錢

煮三杯。分三次服。

日 有肝鬱者必克脾。脾受克者必停飲。飲停射肺者必咳嗽。清胃者必不寐。故靈樞謂胃不和則臥不安。飲以半夏湯覆杯則寐法。

薑半夏二錢

秫米二合

急流水八杯。煮三杯。分三次服。戒生冷猪肉。

王四十歲咳嗽胸滿。短氣自汗。夜甚。大便秘。六脈俱弦而微緊。雖嗽甚見血。

的係痰飲。而非虛勞。法宜溫通陽氣。和胃逐飲。忌生冷猪肉介屬鹹味。己丑

二月初九日

雲苓塊六錢

桂枝四錢

焦白芍三錢

薑半夏六錢

杏 仁錢五

五味子錢四

小枳實錢五

廣 皮錢五

乾薑炭錢四

麻黃根去蘆 三錢

甘 草炙 三錢

甘瀾水六大茶杯。煮成兩大茶杯。渣再以六杯水煮兩杯。日三夜一。分四次服。

服此方四帖。吐血喘滿全愈。咳嗽亦愈六七。

(方論)按痰飲十數日。大便燥結。乃肺氣不降。肺與大腸相表裏。肺痺則大腸亦痺。開肺痺即所以開大腸之痺也。故此方重用杏仁。又由於津液屯聚胃中。不得下行。以致大腸乾燥。故用枳實橘皮。直通幽門。俾津液下行。又辛能潤也。再九竅不和。皆屬胃病。故重用半夏。合橘皮和胃。病由痰飲。逐痰即所以和胃也。故其應如響。今人僉用大黃。苦寒堅陰。甚至用元參麥冬生地作增水行舟之計。豈非背道而馳哉。

照前方再服一帖。初十日

少陽膽絡頭痛。與清膽絡之熱。不犯中下二焦。今日頭痛全止。六脈沉弦不數。咳嗽喘滿。短氣自汗。不食面黃。肢微腫。純然痰飲見症。斷無補陰助邪之理。議病痰飲者。當以溫藥和之。十一日

桂枝木三錢

杏仁三錢

焦白芍二錢

麻黃根去蘆三錢

乾薑三錢

五味子一錢五分

薑半夏五錢

廣皮三錢

炙甘草三錢

小枳實三錢

煮三杯分三次服

王三十歲六脈弦細而沈吐血久而不止久病當與絡中求之且先吐紅血

後吐黑紫絡中顯有瘀滯金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之此

下字須活看謂拔去病根則不再發矣金匱又謂脈雙弦者寒也此證斷

不可用陰柔呆膩之品致永無愈期議先與溫通絡脈拔去病根繼以建

中收功壬辰八月初七日

新絳紗三錢

桂枝三錢

薑半夏三錢

旋覆花包三錢

歸鬚二錢

橘皮炭二錢

茯苓塊三錢

乾薑炒半黑一錢五分

煮三杯分三次服

衄血

暨四十歲衄血右脈洪大誤用大劑當歸以致大衄不止無論辛走行氣之

藥不可用卽涼血和血而不走清道者亦不見效議清清道之熱己丑正月十六日

側柏炭五錢

連翹連心三錢

銀花炭三錢

黑山梔四錢

桑葉三錢

白茅根一兩

凌霄花三錢

煮三杯分三次服

衄雖止而氣血兩虛脈雙弦而細法當補陽以衄血初罷之候且與復脈

法。廿一日

大生地五錢

炒白芍三錢

生鱉甲五錢

阿膠二錢

麥冬不去心四錢

炙甘草四錢

生牡蠣五錢

麻仁二錢

煮三杯。分三次服。

前日衄血初止。六脈俱弦而細。氣血暴虛也。似當補陽。而未敢驟補。與一

甲復脈湯四帖。今日六脈俱大而滑。氣血暴伏也。仍與翕攝真陰與三甲

復脈湯法。廿五日

大生地六錢

白芍四錢

生牡蠣五錢

生鱉甲五錢

麥冬不去心四錢

生阿膠三錢

生龜板五錢

麻仁三錢

炙甘草五錢

煮三杯。分三次服。

便血

毛十二歲糞後便血。責之小腸寒溼。不與糞前為大腸熱溼同科。舉世業醫

者不知有此。無怪乎數年不愈也。用古法黃土湯。癸亥十二月初二日

竈中黃土二兩

生地三錢

黃芩炒三錢

製蒼朮三錢

阿膠三錢

甘草炙三錢

熟附子三錢加

白芍酒炒三錢

全歸一錢五分

水八碗。煮成三碗。分三次服。

小兒脈當數而反緩。糞後便血。前用黃土湯。業已見效。仍照前方加剛藥。

即於前方內去白芍全當。加附子一錢。蒼朮二錢。初七日

孫三十八歲 湖州孝廉

其人素有便紅之症。自十八起。至今不絕。現在面色萎黃。失血

太多。急宜用古法。有病則病受之。雖暑月無碍也。戊寅七月初一日

方法分兩同前。服一帖即止。次日停服。後半月復發。再服一帖全愈。

福廿九歲

初因恣飲冰振黃酒。冰浸水果。又受外風。致成風水。頭面與身腫

大難狀。腫起自頭。先與越脾湯發其汗。頭面腫消。繼與利小便。下截腫消

脹消。後與調理脾胃。自上年十月間服藥起。至次年三月方止。共計湯藥

一百四十三帖。其病始安。囑其戒酒肉生冷。不意夏熱甚時。仍恣吃冰浸

水果。自八月後糞後大下狂血。每次有升許之多。余用黃土湯去柔藥。加

剛藥。每劑黃土用一觔。附子用六錢或一兩。他藥稱是。服至九十餘帖。始

大愈。

胡三十歲

本係酒客。溼中生熱。久而發黃。顏色暗滯。六脈俱弦。其來也漸。此

非陽黃。沉糞後見血。又謂小腸寒濕乎。乙酉九月十七日

竈中黃土八兩

猪苓三錢

附子熟三錢

雲扶苓皮三錢

澤瀉三錢

茵陳五錢

炒蒼朮炭三錢

黃柏三錢

煮三杯。分三次服。五帖全愈。

陳四十歲

糞後便血。寒濕為病。誤補誤涼。胃口傷殘。氣從溺管而出。若女子

陰吹之屬。瘦氣皆然。左脇肝部。臥不著席。得油膩則寒戰。叢雜無倫。幾於無處下手議治。病必求其本。仍從寒濕論治。令能安食。再商與黃土湯中去柔藥加剛藥。乙酉四月廿二日

竈中黃土兩四

雲苓錢五

川椒炭錢三

茅山蒼朮錢生三

生益智仁錢三

附子錢熟三

香附錢三

廣皮錢三

生薑錢三

煮三杯。分三次服。

照原方再服二帖。五月初一日

心悸短氣。加小枳實四錢。乾薑一錢。四帖。初二日

於原方去川椒炭。五帖。十一日

諸症皆效。大勢未退。左脈緊甚。加熟附子一錢。乾薑一錢。降香末三錢。三

帖。廿一日

諸症向安。惟糞後便血又發。與黃土湯法。糞後便血。乃小腸寒濕。不與糞

前為大腸濕熱同科。廿七日

竈中黃土兩八

附子錢熟四

黃芩炭錢四

雲茯苓塊錢五

蒼朮錢炒四

生益智仁錢二

廣皮炭錢三

煮三杯。分三次服。

以血不來為度。

面色青黃滯暗。六脈弦細無陽。胃陽不振。暫與和胃。其黃土湯俟便紅發

時再服。七月十四日

薑半夏 錢六

益智仁 錢三

川椒炭 錢一

雲苓塊 錢五

白蔻仁 錢一

廣皮 錢三

生薏仁 錢五

煮三杯。分三次服。

於原方加桂枝五錢。日十七

肝鬱夾痰飲。寒濕為病。前與黃土湯。治糞後便血之寒濕。茲便紅已止。繼與通補胃陽。現在飲食大進。諸症漸安。惟六脈弦細。右手有胃氣。左手弦緊。痰多胃寒。脇下仍有伏飲。與通補胃陽。兼逐痰飲。十一月十五日

薑半夏 錢八

桂枝 錢六

川椒炭 錢三

雲苓塊 錢五

白芍 錢三

乾薑 錢三

旋覆花 錢三

香附 錢四

廣皮 錢五

小枳實 錢三

煮三杯。分三次服。

脈弦緊。痰多畏寒。衝氣上動。與桂枝茯苓甘草湯。合桂苓加桂湯法。先伐

衝氣。十二月 初十日

桂枝 錢一

雲苓塊 錢二

全歸 錢三

搖桂 錢五

炙甘草 錢五

川芎 錢二

煮三杯。分三次服。

服一帖。衝氣已止。當服藥後。吐頑痰二口。

衝氣已止。六脈緊退而弦未除。可將初十日方再服半帖。以後接服廿九

日。改定方。以不畏寒為度。日十一



服十一月十五日疏肝藥二帖。十二日

背畏寒。脈仍弦緊。再服十二月初十日桂枝加桂湯二帖。以峻補衛陽。服

藥後吐黑頑痰二口。十四日

脈仍弦緊。背猶畏寒。陽未全復。照原方再服二劑。分四日服。十七日

前日之畏寒。至今雖減。而未全愈。脈之弦緊。亦未充和。衝氣微有上動之

象。可取十四日桂枝加桂湯再服二帖。分四日。立春以後故也。廿九日

六脈俱弦。右脈更緊。糞後便紅。小腸寒濕。黃土湯為主。方議黃土湯去柔

藥。加滲濕通陽。雖自覺心中熱。背心如水澆。所謂自云熱者非熱也。况有

惡寒乎。丙戌正月  
初五日

竈中黃土八兩

桂枝五錢

黃芩炭四錢

雲茯苓塊六錢

生薏苡仁五錢

附子熟四錢

廣皮四錢

蒼朮炭四錢

煮四杯。分四次服。血多則多服。血少則少服。萬一血來甚湧。附子加至

七八錢。以血止為度。再發再服。切勿聽淺學者妄轉方也。

丸方 陽虛脈弦。素有寒濕痰飲。與蠲飲丸法。通陽滲濕而補脾胃。

雲苓塊八兩

桂枝八兩

乾薑炭四兩

薑半夏八兩

蒼朮炭四兩

益智仁四兩

生薏仁八兩

廣皮六兩

炙甘草三兩

右為細末。神麩和丸。小梧子大。每服三錢。日三服。忌生冷介屬。

糞後便紅。雖止。寒濕未盡。脈之緊者。雖減。當退剛藥。背惡寒未罷。行濕之

中。兼與調和營衛。初十日

竈中黃土兩一 桂枝錢四 廣皮錢二 雲茯苓塊錢三

生薏苡仁錢三 白芍錢四 生薑錢三 蒼朮炭錢三

薑製半夏錢三 大棗去核二枚 黃芩炭一錢五分 煮三杯。分二次服。

腫脹

陳三十歲 太陰所至。發為腹脹者。脾主散津。脾病不能散津。土曰敦阜。斯膜

脹矣。厥陰所至。發為腹脹者。肝主疏泄。肝病不能疏泄。木穿土位。亦膜脹

矣。此症起於肝經鬱勃。從頭面腫起。腹固脹大。的係蠱脹。而非水腫。何以

知之。滿腹青筋暴起。如蟲紋。竝非本身節骨之筋。故知之。治法以行太陽

之陽。泄厥陰之陰為要。醫者誤用八味丸。反攝少陰之陰。又重加牡蠣。瀉

陰戀陽。使陽不得行。而陰凝日甚。六脈沈弦而細。耳無所聞。目無所見。口

中血塊。累累續出。經所謂血脈凝泣者是也。勢太危急。不敢驟然用藥。思

至陽而極靈者。莫如龍。非龍不足以行水。而開介屬之翕。惟鯉魚三十六

鱗。能化龍。孫真人會用之矣。但孫真人千金原方。去鱗甲。用醋煮。茲改用

活鯉魚大者一尾得六斤。不去鱗甲。不破肚。加葱一斤。水煮熟透。加醋一斤任服之。

服鯉魚湯一晝夜。耳聞目視如舊。口中血塊全無。神氣清爽。但腫脹未除。

甲寅二月  
初四日

經謂病始於下而盛於上者。先治其下。後治其上。病始於上而盛於下者。先治其上。後治其下。此症始於上腫。當發其汗。與金匱麻黃附子甘草湯。  
日 初五

麻黃 去節 二兩

熟附子 一兩 六錢

炙甘草 二錢

煮成五飯碗。先服半碗。得汗止後服。不汗再服。以得汗爲度。

此方甫立。未書分量。陳頌篛先生一見云。斷然無效。予問曰。何以不效。陳先生云。吾曾用來。予曰。此方在先生用。誠然不效。予用。或可效耳。王先生名謨。忘其字。云。吾甚不解。同一方也。藥止三味。竝無增減。何以爲。吳用則利。陳用則否。豈無知之草木。獨聽吾兄使令哉。余曰。蓋有故也。陳先生之性情忠厚。其膽最小。伊恐麻黃法陽。必用八分。附子護陽。用至一錢。以監麻黃。又恐麻黃附子皆慄悍藥也。甘草平緩。遂用一錢二分。又監制麻黃附子。服一帖無汗。改用八味丸矣。八味陰柔藥多。乃敢

大用。如何能效。陳蔭山先生入內室取廿八日陳頌箒所用原方。分量一毫不差。在坐者六七人皆譁然笑曰。何吳先生之神也。余曰。余常與頌箒先生一同醫病。故知之深矣。於是麻黃去淨節用二兩。附子大者一枚。得一兩六錢。少麻黃四錢。讓麻黃出頭。甘草用一兩二錢。又少附子四錢。讓麻黃附子出頭。甘草但坐鎮中州而已。衆見分量。又大譁曰。麻黃可如是用乎。頌箒先生云不妨。如有過差。吾敢保。衆云。君用八分。未敢足錢。反敢保二兩之多乎。頌箒云。吾在菊溪先生處。治產後鬱冒。用當歸二錢。吳兄痛責。謂當歸血中氣藥。最能竄陽。產後陰虛陽越。例在禁條。豈可用乎。夫麻黃之去當歸。奚啻十百。吾用當歸。伊責之甚。豈伊用麻黃。又如是之多。竟無定見乎。余曰。人之所以畏麻黃如虎者。爲其能大汗亡陽也。未有汗不出而陽亡於內者。湯雖多。但服一杯。或半杯。得汗卽止。不汗再服。不可使汗淋漓。何畏其亡陽哉。但此症閉錮已久。陰霾太重。雖盡劑未必有汗。余明日再來發汗。病家始敢買藥。而仙芝堂藥舖竟不賣。謂錢字想是先生誤寫兩字。主人親自去買。方得藥服盡劑。竟無汗。

衆人見汗不出。僉謂汗不出者死。此症不可爲矣。予曰不然。若竟係死症。

鯉魚湯不見效矣。余化裁仲景先師桂枝湯。用粥發胃家汗法。竟用原方分量一劑。再備用一帖。又用活鯉魚一尾。得四斤。煮如前法。服麻黃湯一飯碗。卽接服鯉魚湯一碗。汗至眉上。又一次汗至上眼皮。又一次汗至眼下皮。又一次汗至鼻。又一次汗至上唇。大約每一次汗出寸許。二帖俱服完。鯉魚湯一鍋。合一晝夜亦服盡。汗至伏兔而已。未過膝也。臍以上腫俱消。腹仍大。初六日

經謂汗出不至足者死。此症未全活。雖腰以上腫消而腹仍大。腰以下其重如故。因用腰以下腫當利小便。例與五苓散。服至二十一日。共十五天不效。病亦不增不減。陳蔭山云。先生前用麻黃。其效如神。茲小便涓滴不下。奈何。祈轉方。余曰。病之所以不效者。藥不精良耳。今日先生去求好肉桂。若係前所用之桂。明日余不能立方。方固無可轉也。初七日

陳蔭山購得新鮮紫油安邊青花桂一枝。重八錢。乞余視之。予曰。得此桂必有小便。但恐脫耳。膀胱爲州都之官。氣化則能出焉。氣虛亦不能化。於是用五苓散二兩。加桂四錢。頂遼參三錢。服之盡劑。病者所睡係棕牀。予囑其備大盆二三枚。置之牀下。溺完被濕不可動。俟明日予親視挪牀。其溺自子正始通。至卯正方完。共得溺三大盆有半。予辰正至其家。視其周

身如空布袋。又如腐皮。於是用調理脾胃。百日全愈。二十日

洪氏六十歲 孀居三十餘年。體厚。憂鬱太多。肝經鬱勃久矣。又因暴怒重憂。

致成厥陰太陰兩經腹脹竝發。水不得行。腫從跗起。先與腰以下。腫當利。

小便例之五苓散法。但陰氣太重。六脈沈細如絲。斷非輕劑所能了。

桂枝五錢 茯苓皮六錢 肉桂四錢 猪苓五錢 生蒼朮五錢

廣皮五錢 澤瀉五錢 老厚朴四錢 煮三杯。分三次服。

前方服三五帖不效。亦無壞處。小便總不見長。肉桂加至二三兩。桂枝加

至四五兩。他藥稱是。每劑近一觔之多。作五六椀。服五七帖後。六脈絲毫

不起。腫不消。便亦不長。所以然之故。肉桂不佳。陰氣太重。憂鬱多年。暴怒

傷肝。必有陳菟。仍用原方。加雞矢醴熬淨烟六錢。又加附子八錢。服之小

便稍通。一連七帖。腫漸消。飲食漸進。形色漸喜。於是漸減前方分量。服至

十四帖。腫脹全消。後以補脾陽疏肝鬱收功。

郭氏六十歲 先是郭氏喪夫於二百里外。其祖墓之側。郭氏攜子奔喪。饑不

欲食。寒不欲衣。悲痛太過。葬後廬墓百日。席地而臥。哭泣不休。食少衣薄。

回家後致成單腹脹。六脈弦。無胃氣。氣喘不能食。唇口刮白。面色淡黃。身

體羸瘦。余思無情草木。不能治有形之病。必得開其愚蒙。使情志暢遂。方

可冀見效於萬一。因問曰。汝之痛心疾首。十倍於常人者何故。伊答曰。夫死不可復生。所遺二子。恐難成立。余曰。汝何不明之甚也。大凡婦人夫死。曰未亡人。言將待死也。汝如思夫念切。卽死於墓側。得遂同穴之情。則亦已矣。雖有病何必醫。醫者求其更甦也。其所以不死者。以有子在也。夫未死以夫爲重。夫既死以教子爲重者。仍係相夫之事業也。汝子之父已死。汝子已失其蔭。汝再死。汝子豈不更無所賴乎。汝之死。汝之病。不爲無益於夫。而反重害其子。害其子。不惟無益於子。而且大失夫心。汝此刻欲盡婦人之道。必體亡夫之心。盡教子之職。汝必不可死也。不可死且不可病。不可病。必得開懷暢遂。而後可愈。單腹脹。死症也。脈無胃氣。死脈也。以死症而見死脈。必得心火旺相。泄肝鬱之陰氣。而後血脈通。血脈通。臟氣遂。死症亦有可生之道。詩云。見晛曰消。者是也。伊聞余言大笑。余曰。笑則生矣。伊云。自此以後。吾不惟不哭。竝不敢憂思。一味以喜樂從事。但求其得生矣。育吾兒而已。余曰。汝自欲生則生矣。於是爲之立開鬱方。十數劑而收全功。

旋覆花

新絳紗包三錢

香

附三錢

廣鬱金三錢

薑半夏四錢

青

皮二錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

廣

皮三錢

歸橫鬚二錢

川厚朴三錢

煮三杯。分三次服。

吳氏八歲。春夏間乘舟由南而北。途間溫毒愈後。感受風濕。內脹外腫。又因寡居。肝鬱之故。時當季夏。左手心勞宮穴。忽起勞宮毒。如桃大。此症有治熱碍濕。治濕碍熱之弊。選用幼科痘後餘毒歸肺喘促咳逆之實脾利水法。加極苦。合為苦淡法。脾熱毒由小腸下入膀胱。隨濕氣一齊泄出也。蓋勞宮毒屬心火。瀉心者必瀉小腸。小腸火腑。非苦不通。腰以下腫當利小便。利小便者亦用苦淡也。

飛滑石 兩一

扶苓皮 兩一

黃柏 錢四

猪苓 兩一

晚蠶沙 錢四

黃芩 錢四

澤瀉 兩一

白通草 錢三

雅連 錢四

煮成五杯。分五次服。以小便長為度。

此方服七帖。分量不增不減。腫脹與勞宮毒俱消。以後補脾收功。

陳六歲。脈弦細而緊。不知饑。內脹外腫。小便不利。與腰以下腫當利小便。

法。陽欲滅絕。重加溫熱。以通陽。況今年燥金。太乙天符。經謂必先歲氣。毋

伐天和。乙酉五月十五日

桂枝 錢六

扶苓皮 錢六

川椒炭 錢五

猪苓 錢五

生茅朮 錢三

廣皮 錢三

澤瀉 錢五

公丁香 錢二

杉皮 兩一

厚樸 錢四

煮四杯。分四次服。



諸症皆效。知饑。腫脹消其大半。惟少腸有疝。竟若有一根筋吊痛。於原方內減丁香一錢。加小茴香三錢。廿五日

單氏四十歲腫脹六年之久。時發時止。由於肝鬱。應照厥陰膜脹例治。乙酉十月十七日

雲苓皮六錢 厚樸三錢 歸橫鬚三錢 旋覆花包三錢 香附三錢

大腹皮三錢 薑半夏四錢 青皮二錢 廣鬱金二錢 降香末三錢

木通二錢 煮三杯。分三次服。不能寬懷消怒。不必服藥。

服前方八帖。腫脹稍退。惟陽微弱。加川椒三錢。大便不通。加兩頭尖三錢。

去陳苑。二十日

好五十歲先喘後腫。六脈洪大有力。左尺獨大。肺腎之熱可知。腰以下腫本

當利小便。但不宜溫利耳。且置喘於不問。其如治病必求其本者何哉。壬辰

四月十一日

生石膏四兩 雲苓皮五錢 海金沙五錢先煎代水 飛滑石一兩

薑半夏三錢 晚蠶沙三錢 杏仁泥六錢 小枳實四錢

白通草一錢五分 甘瀾水八杯。煮成三杯。分三次服。

六脈仍洪數。左尺仍獨大。猶宜涼利小便。十七日

飛滑石一兩先煎代水 海金沙五錢 杏仁六錢 生石膏四錢 小枳實四錢

厚樸三錢 薑半夏五錢 晚蠶沙三錢 橘皮三錢 雲苓皮五錢

白通草一錢五分 甘瀾水八杯。煮成三杯分三次服。

單腹脹

毛四十四歲病起肝鬱。木鬱則克土。克陽土則不寐。克陰土則臌脹。自鬱則脇

痛。肝主疏泄。肝病則不能疏泄。故二便亦不能宣通。肝主血。絡亦主血。故

治肝者必治絡。癸巳四月初四日

新絳紗三錢 香附三錢 蘇子霜三錢 旋覆花包三錢 歸鬚三錢

小茴香三錢 薑半夏八錢 青皮三錢 廣鬱金三錢 降香末三錢

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

服肝絡藥。脹滿脇痛不寐少減。惟覺胸痛。按肝脈絡胸亦是肝鬱之故。再

小便赤濁。氣分濕也。初七日

旋覆花新絳紗包三錢 桂枝三錢 小茴香炒黑三錢 川棟子三錢 半夏六錢

晚蠶沙三錢 降香末三錢 歸鬚二錢 兩頭尖三錢 茯苓皮三錢

橘皮青三錢 白通草二錢 煮三杯。分三次服。

驅濁陰而和陽明。現在得寐。小便少清。但肝鬱必克土。陰土鬱則脹。陽土

鬱則食少。而無以生陽。故清陽虛而成胸脾。暫與開脾。初十日

半 夏兩一 茯苓皮錢五 厚 朴錢三 桂枝尖錢五 廣鬱金錢三

薤 白錢三 生苡仁錢五 栝連皮仁 小枳實錢二 煮三杯。分三次服。

脈緩。太陽已開。而小便清通。陽明已闔。而得寐能食。但腹脹不除。病起肝

鬱。與行濕之中。必兼開鬱。十四日

茯苓皮錢五 半 夏錢五 廣木香錢二 生苡仁錢五 厚 朴錢三

煨肉果一錢五分 降香末錢三 廣 皮錢二 白通草錢三 廣鬱金錢二

煮三杯。分三次服。

腹脹

徐三十歲 腹脹且痛。脈弦細。大便泄。小便短。身不熱。此屬寒濕傷足太陰。

桂 枝錢三 生苡仁錢五 厚 朴錢三 猪 苓錢三 黃芩炭錢一

乾 薑錢一五分 澤 瀉錢三 白通草錢二 廣 皮錢二 煮三杯。分三次服。

滯下

丁氏五十歲 滯下白積。欲便先痛。便後痛減。責之積重。脈遲而弦。痛甚。蓋冷

積也。非溫下不可。

生大黃錢五 厚 朴錢五 廣木香錢三 南查炭錢三 良薑炭錢二

黃芩炭錢三 廣 皮錢五 熟附子錢五 檳 榔錢三 小枳實錢二

焦白芍三錢 煮三杯分三次服。

梁二十歲 滯下白積欲便先痛便後痛減責之有積用溫下法。

生大黃酒炒黑三錢 厚朴三錢 檳榔尖一錢五分 熟附子三錢

枳實五錢 廣木香一錢 炒白芍二錢 廣皮二錢

炒雲連一錢 炒黃芩二錢 水五杯煮兩杯分二次服。

張三十歲 先泄而後滯下脾虛傳腎症為難治。甲子十一月十八日

白芍二錢 黃芩炭二錢 猪苓三錢 川椒目三錢 雅連吳萸一錢二分炒枯

厚朴二錢 澤瀉三錢 生茅朮三錢 良薑二錢 生苡仁二錢

廣木香一錢五分 水六杯煮取二杯渣再煮一杯分三次服。

先泄後滯下古云難治非一時可了且喜脈弱尙有生機。二十日

白芍炒三錢 眞山連二錢酒炒半枯 紅麴二錢 黃芩酒炒二錢 地榆炭三錢

歸尾一錢 厚朴去白皮姜汁炒三錢 小枳實搗碎二錢 廣皮二錢 檳榔五分

廣木香一錢五分 煎法如前。

脈沈而有力滯下脹痛太甚便後少減片時其痛仍然議網開一面用溫

下法。二十三日

生大黃酒炒黑五錢 白芍酒炒半三錢 廣木香二錢 安邊桂去粗皮淨二錢

黃芩 酒炒半錢 小枳實 三錢 紅麴 二錢 黃皮炭 二錢  
 真山連 酒炒半錢 老厚朴 三錢 歸尾 五錢 水五杯煮成三杯分三次服。

於二十日方內加兩頭尖三錢 廿三日

腎症復歸於脾用四苓合苓均湯法 廿四日

茯苓皮 五錢 猪苓 五錢 生苡仁 五錢 生茅朮 五錢 澤瀉 五錢 瀉 五錢

廣木香 五錢 焦白芍 二錢 厚朴 二錢 炒川連 五分 炒黃芩 五分

廣皮 一錢五分 水八杯煮取三杯分三次服。

於前方內加白通草二錢 廿五日

肝鬱則小便亦不能通此徒用四苓不效議開陰絡法 廿六日

猪苓 三錢 小茴香 三錢 歸鬚 二錢 澤瀉 三錢 川棟子 一錢五分

琥珀 研沖三分 降香 三錢 兩頭尖 一錢 口麝 研沖五厘 桃仁 三錢

煮三杯分三次服。

開陰絡已效於前方內加安邊桂三分鬱金三錢生香附三錢 廿七日

九竅不和皆屬胃病用開太陽闔陽明兼瀉心法 廿八日

半夏 六錢 茯苓皮 連塊三錢 黃芩 二錢 猪苓 三錢 生苡仁 三錢

厚朴姜汁炒 瀉錢三

廣木香錢一

青皮錢二

廣皮錢二

炒川連錢一 乾薑錢二

水五杯。煮取兩杯。渣再煮一杯。分三次服。

開太陽。闔陽明。兼去濕中之熱。廿九日

薑半夏錢六 猪苓錢三

黃芩炭錢二

茯苓皮錢三

澤瀉錢三

廣木香錢一 生苡仁錢三

白芍錢二

真山連錢一

川葶藶錢二

廣皮錢二 白通草錢二

煮三杯。分三次服。

糞後帶血。加黃土湯法。三十日

半夏錢五 廣木香錢一

竈中黃土錢六

葶藶錢三

全歸錢一

雲茯苓皮錢三 炒白芍錢三

炒茅蒼朮錢三

黃芩炭錢二

厚朴錢二

廣皮錢二 水五杯。煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

舌絳甚。胸中嘈雜無奈。喉且痛。糞中猶帶血跡。譏酸苦泄熱法。十二月初一日

肉桂去粗皮 黃芩錢二

生大黃片酒炒黑 桃仁分八

神麴錢一

厚朴錢五分 枳殼錢六

竈中黃土錢八

神麴錢一

炒地榆炭錢一 檳榔分八

淨烏梅肉枚九

歸尾錢一

廣皮錢七 廣木香分八

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。服一帖。去

大黃肉桂。再服一二帖。

又 卽於去大黃肉桂方內。再去歸尾地榆桃仁。加蒼朮一錢五分

四苓合芩芍法。以小便短。口糜猶有滯下也。初二日

焦白芍二錢

半夏三錢

竈中黃土三錢

炒黃芩一錢五分

蒼朮炭一錢五分

雲茯苓皮三錢

猪苓三錢

當歸一錢

澤瀉三錢

淨烏梅肉三錢

山連一錢五分

頭煎兩杯。分三次服。

小腹脹痛。不小便。仍係肝鬱不主疏泄之故。初二日

降香三錢

小茴香炒黑三錢

歸鬚二錢

桃仁三錢

黃芩炭二錢

琥珀五分

生香附三錢

兩頭尖三錢

口麝同研沖五厘

雲連炒二錢

韭白汁三錢

煮三杯。分三次服。

於前方內加廣鬱金一錢。初四日

苦辛淡法。開下焦濕熱。兼瀉肝火。初五日

葶藶五錢

川棟子三錢

吳黃炒黑一錢五分

生香附三錢

小茴香炒黑三錢

通草二錢

雲連炒黑三錢

黃柏炭二錢

水五杯。煮取二杯。分二次服。

某小兒。滯下紅積。欲便先痛。便後痛減。積滯太重。非溫下不為功。恐纏

綿日久。幼孩力不能勝。滯下。為臍病也。

生大黃一錢五分

黃芩一錢五分

真山連一錢

安邊桂一錢

紅麴一錢五分

檳榔剪一錢

焦白芍一錢五分

歸尾一錢

廣木香八分

煮兩杯。先服一杯。再便不痛即止。否則再服一杯。

孫四十餘歲感受燥氣。燥金克木。本有肝鬱。故邪氣乘之。現在胸痞微痛。先與

開痞化鬱丙戌六月十五日

旋覆花包三錢

香附二錢

杏仁泥三錢

降香末三錢

廣皮二錢

廣鬱金三錢

煮三杯。分三次服。外紫雪丹一錢。分二次服。

神昏煩躁。邪入心包。而又發黃。勢甚重大。勉與開心包一法。與紫雪丹二

三錢。以神清為度。湯藥清濕熱之黃。十六日

飛滑石六錢

猪苓三錢

麥冬不去心 四錢

雲苓塊連皮 五錢

澤瀉三錢

茵陳三錢

煮三杯。分三次服。

伏暑成痢。滯下紅積。欲便先痛。便後痛減。責之積重。非溫下不可。十七日

生大黃酒炒成 黑五錢

連川二錢

廣木香二錢

安邊桂三錢

黃芩二錢

生白芍三錢

降香末三錢

紅麴三錢

烏梅肉三錢

廣皮炭二錢

歸鬚二錢

煮成三大茶杯。每服半杯。以便前之痛止為度。

昨與下溫。服藥一杯。而痛更甚。下皆紅積。邪入肝絡之故。與前方內加十



桃仁泥錢三

檳榔剪錢五分

地榆炭錢二

煮小半杯。投入前藥。分二次服。

滯下紅積。用溫下法。服藥竟劑。而痛略減。仍用前法。稍減其製。日十九

生大黃酒炒半  
黑三錢

歸鬚錢二

廣木香錢二

安邊桂去粗皮  
錢二

紅麴錢三

檳榔剪錢五分

生白芍錢二

黃芩錢五分

炒廣皮勿可太  
桂二錢

小茴香炒黑  
錢二

川連錢五分

烏梅肉錢二

煮三杯。分三次服。以痛止為度。

滯下痛減六七。脈漸小。擬仍服前方。不必竟劑。如痛止。接服此方。日二十

生白芍錢二

厚朴錢三

小枳實錢二

炒黃芩錢二

檳榔錢五分

炒廣皮錢二

杏仁泥錢三

川連錢五分

白通草錢三

廣木香錢三

紅麴錢三

烏梅肉錢五分

煮三杯。分三次服。

陳積已去。餘邪未淨。右脈未靜。目白睛仍黃。故知氣分不清。議進苦辛淡

法。宣導脈氣。使餘邪由膀胱化氣而出。兼與開胃。令能納穀。日廿一

雲苓皮錢五

猪苓錢三

廣木香錢三

薑半夏錢四

澤瀉錢三

杏仁泥錢三

炒白芍錢三

厚朴錢三

炒廣皮錢二

炒黃芩錢二

川連姜汁炒半  
錢五分

煮三杯。分三次服。

邪著裏不易外達。惟經下。氣機究未宣暢。肛門墜滯。蓋由受邪之際漸而深。故其化也亦緩而滯。非苦無能勝濕。非辛無能通利邪氣。仍用前法。重與行氣。廿一日

炒銀花二錢

澤瀉三錢

炒黃芩二錢

廣木香三錢

茵陳三錢

歸橫鬚二錢

小枳實三錢

赤芍一錢五分

檳榔剪三錢

細甘草梢二錢

川連一錢五分

烏梅肉二錢

煮三杯。分三次服。

夜半肛門痛甚。陰分邪氣久羈。今日漸覺畏寒。陽明久不納穀。胃氣不冲之故。未可純任苦寒。今擬暫用白頭翁湯法加溫藥。仍是苦辛複法。此權宜之計也。廿二日

白頭翁二錢

秦皮二錢

廣木香三錢

薑半夏五錢

歸鬚二錢

丹皮炭一錢五分

川連五分

廣橘皮二錢

防風根一錢

上肉桂一錢五分

煮三杯。分三次服。

凡病日輕夜重者。皆屬陰邪。昨藥於偏之溫者。以此。今日肛門痛減者。亦坐此。茲邪去大半。少寐不饑。正須商進疏補脾胃。勝濕仍不可少。蓋胃和則神安矣。脾治則痢減矣。廿四日

焦白芍三錢

於朮

朮土炒二錢

白頭翁整二錢

黃芩炭一錢

肉桂

桂一錢

廣木香三錢 薑半夏五錢 山連炒五錢 蒼朮炭一錢 雲苓塊四錢

廣皮炒二錢 烏梅肉一錢五分 高麗參一錢 煮三杯分三次服。

此方進而肛門愈贅痛積滯反多穢濁特甚者扶正則餘邪續出也。

昨得輕補肛之贅痛又甚正旺驅邪之故今日暫停扶正注意逐邪然久

病亦不敢太過舌白苔廿五日

炒白芍一錢五分 安桂二錢 小茴香炒炭三錢 炒黃芩一錢五分 歸鬚二錢

檳榔剪二錢 薑半夏五錢 秦皮二錢 南查炭二錢 白頭翁整三錢

紅麴二錢 炒山連一錢 煮三杯分三四次緩緩服。

昨與逐邪濁膩續下痛減今議再加疏補以扶正氣廿六日

白頭翁整三錢 肉桂去皮一錢五分 炒於朮二錢 炒白芍二錢 黃芩炒一錢五分

小茴香三錢 薑半夏五錢 歸鬚一錢五分 南查炭二錢 雲苓塊五錢

秦皮二錢 檳榔剪八分 高麗參一錢 紅麴二錢 炒山連一錢

煮三杯分三次服。

積滯漸輕微有寒熱舌起白苔廿七日

雲苓塊連皮三錢 白芍炒一錢 廣木香一錢 薑半夏三錢 黃芩炭八分

焦神麴一錢五分 焦於朮二錢 廣皮二錢 南查炭八分 高麗參一錢

煮三杯。分三次服。

寒熱止。積滯尙未盡。舌苔白濁而厚。是其徵也。少寐少食皆其故。於前方

增其製。加宣通中焦。廿八日

雲苓塊錢四

白芍錢炒一

廣木香錢三

薑半夏錢五

黃芩錢炒一五分

焦神麩錢三

益智仁錢五分

於朮錢焦二

白蔻仁錢一

高麗參錢一

廣皮錢炒三

南查炭錢二

煮三杯。分三次服。

今日夜間尙有宿積。舌微黃。則其伏邪未盡可知。猶非純補純清之症。七月初一日

初一日

雲苓塊錢四

炒白芍錢二

焦於朮錢五分

薑半夏錢三

炒黃芩錢二

焦神麩錢三

益智仁錢五分

生薏仁錢三

白蔻仁錢沖一

高麗參錢一

炒廣皮錢二

煮三杯。分三次服。

宿積猶然未淨。舌白苔。初四日

雲苓塊錢五

生薏仁錢五

於朮炭錢三

薑半夏錢四

神麩錢三

白蔻仁錢五分

益智仁錢五分

廣皮錢炒三

煮三杯。分三次服。

今日仍下宿積許多。舌根黑苔未盡。肚門熱痛。不寐。暫與清積。一二日後

再議補法。初八日

雲苓塊錢 白頭翁二錢 焦神麩三錢 焦白芍三錢 薑半夏三錢

益智仁二錢 黃芩炭二錢 焦於朮三錢 炒廣皮三錢 煮三杯分三次服

痢雖止而不寐不饑仍然固係胃不和之故。但其人平素好用心機。又屈

心事叢雜之際。未免過慮。議一面和胃。一面兼補心氣。十一日

雲 苓五錢 野山參二錢 棗 仁炒熟三錢 麥 冬不去心三錢 焦於炭二錢

蓮 子連皮心打三錢 遠 志去淨骨三錢 薑半夏錢 冰 糖三錢 煮三杯分三次服

史 紅白滯下。一月有餘。痢疾之脈忌洪大。喜腹脹。此症腹不脹而脈洪

大。所以難已。日久便滑而頻數。清滯之中兼與固下。丁亥九月初九日

黃芩炭三錢 白 芍三錢 真山連五分 焦於朮二錢 歸 鬚二錢

南查炭二錢 廣木香三錢 木 瓜二錢 五味子錢 肉果霜二錢

紅 麩二錢 烏梅肉錢 丹皮炭三錢 煮三杯分三次服

滯下已久。六脈洪大。有陽無陰。前與重收陰氣。而去積滯。即在收陰之中。

以故脈見小而滯下少。現在兩關獨浮。有木陷入土之象。切忌惱怒助肝。

克脾傷胃。又忌生冷猪肉。滑大便而助濕邪。今日用藥大意。仍不能驟離

前法。加入土中拔木兼補宗氣。十五日

高麗參三錢 白 芍黃酒炒五錢 廣木香三錢 黃 芩黃酒炒三錢

南查炭二錢

雲苓塊三錢

焦於朮三錢

歸鬚二錢

五味子一錢

肉果霜三錢

紅麴二錢

烏梅肉三錢

濃煎三茶杯分三次服。

德氏七十歲

七旬以外之老人滯下紅白積業已一月有餘六脈洪大滑數

而且歇止乃痢疾之大忌舌苔老黃積滯未清腹痛當臍醫者一味收補

置積滯於不問邪無出路焉得收功勢已重大之極勉與化滯兼與溫通

下焦丁亥十月初八日

薑半夏五錢

白芍炒三錢

焦神麴三錢

杏仁泥三錢

黃芩炒三錢

真山連五分

廣木香三錢

檳榔二錢

廣皮炭三錢

川椒炭三錢

歸鬚二錢

烏梅肉三錢

公丁香五分

紅麴二錢

煮四小茶杯日三夜一分四次服。

滯下本係積滯暑濕之實症前醫一味呆補希圖止瀉不知邪無出路如何能止腹痛已減議且減其製初十日

薑半夏三錢

白芍炒一錢五分

檳榔剪一錢

蒼朮炭一錢

黃芩炒一錢五分

廣皮炭二錢

廣木香一錢

山連炒一錢

烏梅肉二錢

川椒炭五分

紅麴一錢

煮三杯分早中晚三次服。

陳 休息痢。本係不治之症。為其久久累贅。氣血虛盡矣。此症且喜年輕形壯。而又欲便先痛。便後痛減。陳積不行。尚可借手於一下。所謂網開一面也。金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之。戊子二月初七日

生大黃 酒炒半黑五錢

歸 鬚 三錢

降香末 三錢

上安桂 二錢

檳 榔 二錢

廣木香 一分五錢

炒白芍 三錢

真山連 二錢

炒黃芩 三錢

廣 皮 三錢

烏梅肉 五錢

紅 麴 三錢

煮三杯。分六次服。

腹仍痛。照前方再服一帖。初八日

再服一帖。初九日

血分久痢。三用溫下。陳積尚多。皆起於誤補。留邪在絡之故。未便再用大下。恐致傷陰。暫用通陰絡法。細搜絡中閉錮之陳積。三日後再服。初十日

化癥回生丹十九。早中晚各服一丸。溫開水和。餘邪留肝絡中。一時難盡。切戒厚味以固之。藥宜搜剔法。十七日

降香末 三錢

黃芩炭 二錢

川椒炭 三錢

南查炭 二錢

焦白芍 三錢

廣木香 二錢

真山連 八錢

歸 鬚 二錢

廣皮炭 三錢

丹皮炭 三錢

紅 麴 三錢

烏梅肉 三錢

煮兩大杯。分二次。晚一杯清晨空心服丸藥一丸。

復診。於前方內。去廣皮加白芍二錢。烏梅二錢。丸藥照常服。日八

久痢邪留肝絡。縣縣不已。合苦辛搜絡。無他謬巧。仍宗前法。日十九

白頭翁 整三錢

大黃 酒炒黑三錢

川椒炭 三錢

焦白芍 三錢

肉桂 頂好一錢五分

廣木香 三錢

黃芩炭 二錢

歸鬚 三錢

南查炭 三錢

降香末 三錢

山連 姜汁炒一錢

烏梅肉 五錢

煮三杯。分三次服。丸藥仍照前服。

長四歲腸僻身熱。古所大忌。茲幼孩滯下紅白。而身又熱。症非淺鮮。壬辰九月十一日

炒白芍 二錢

桃仁 一錢

廣木香 八分

炒黃芩 一錢

歸鬚 一錢

炒山連 一錢

降香末 一錢五分

紅麴 一錢五分

炒神麴 二錢

南查炭 一錢五分

煮三杯。分三次服。

又加斑疹。日十三

炒白芍 二錢

連翹 二錢

真山連 炒一錢

炒黃芩 一錢

銀花 二錢

廣木香 八分

檳榔剪 二錢

殭蠶 二錢

炒神麴 二錢

桃仁泥 一錢

蟬退 一錢

烏梅肉 二錢

歸橫鬚 一錢

紅麴 二錢

煮三杯。分三次服。

腸僻身熱。本所大忌。又加溫疹。難就一邊。現在斑疹已過四日。業有漸化。



之機。但身壯熱如火。譫語煩躁。起臥不安。滯下紅積。後重太甚。欲便先痛。便後痛減。責之積重。不得不借手於一下。所以網開一面也。日十五

黃芩一錢五分 生大黃酒炒半黑二錢五分 紅麴一錢 白芍一錢五分

安邊桂一錢 歸鬚一錢 廣木香一錢 廣皮一錢五分

川連八分 烏梅肉一錢五分 煮三小茶杯。分三次服。

外紫雪丹一錢五分。每服五分。溫開水調。

滯下紅積。狂熱譫語後重。欲便先痛。前日與溫下法。茲大熱與譫語均退。惟後重未除。滯下未清。腰痠特甚。雖仍腹痛。且暫停下藥。俟二日後細察病情再商。日十七

炒黃芩二錢 桂枝一錢五分 廣木香一錢 炒白芍二錢

神麴炒二錢 廣皮炭一錢 檳榔剪二錢 川連炒一錢

烏梅肉三錢 川椒炭一錢 紅麴二錢 煮三杯。分三次服。

熱雖退而未盡。舌色尚絳。口乾。滯下白積。腰痠甚。日十九

炒黃芩二錢 檳榔一錢五分 小茴香炒三錢 炒白芍二錢

厚朴一錢 焦神麴三錢 茯苓塊三錢 銀花二錢

炒川連一錢 廣木香一錢 煮三杯。分三次服。

諸症皆減。滯下未清。舌絳甚。口渴。仍後重。脈仍數。廿一

雲 苓三錢

銀 花三錢

細生地三錢

炒黃芩二錢

歸 鬚二錢

檳 榔二錢

丹皮炭二錢

炒白芍二錢

川 連炒七分

烏梅肉三錢

煮三杯。分三次服。

滯下白積未清。便前仍痛。微有身熱。再少與溫下法。廿三

大 黃酒炒半黑三錢

熟附子一錢

神 麩二錢

黃 芩二錢

雲 苓塊三錢

川 連一錢

白 芍二錢

烏梅肉三錢

廣 皮二錢

煮三杯。先服一二杯。痛除則止。

去附子大黃。又服一帖。廿五

腹痛於原方內仍加附子大黃。又加南查炭一錢

小枳實一錢

川椒炭一分

再服二帖。廿六

照原方再服二帖。廿八

滯下雖已大減。仍有潮熱腹痛。積滯仍未清也。三十

炒白芍三錢

南查炭二錢

炒神麩三錢

黃芩炭二錢

廣木香一錢

橘皮炭五分

雲苓皮三錢

川椒炭一錢

烏梅肉三錢

生苡仁三錢

煮三杯。分三次服。

積聚

張<sup>七十歲</sup>臍右有積氣。以故右脈沈伏弦細。陽微之極。濁陰太盛克之也。痢

其初。原從左脇注痛而起。其為肝着之咳無疑。此症不必治咳。但宣通肝

之陰絡。久病在絡故也。使濁陰得有出路。病可自已。所謂治病必求其本

者是也。若不識綱領而妄冀速愈。必致剝削陽氣殆盡而亡。<sup>甲子一月十三日</sup>

旋覆花 新絳紗包三錢

烏藥 三錢

川棟子 二錢

桂枝尖 三錢

青皮 一錢

小茴香 三錢

降香末 三錢

歸鬚 三錢

蘇子霜 三錢

桃仁泥 三錢

廣皮 一錢

煮三杯。分三次服。

服通絡藥。已見小效。脈氣大為回轉。但右脇着席則咳甚。脇下有支飲故也。議於前方內去桃仁川棟子小茴香。加生香附三錢。半夏六錢。杏仁三

錢。肉桂八分。

再服四帖。<sup>十九日</sup>

先痛後便而見血。議通陰絡法。<sup>廿三日</sup>

降香末 三錢

半夏 五錢

歸橫鬚 二錢

小茴香 三錢

香附 二錢

蘇子霜 三錢

藏紅花 一錢

桃仁 二錢

廣皮炭 一錢

廣木香 一錢

丹皮 三錢

兩頭尖 三錢

煮三杯。分三次服。

張二十八歲。左癥瘕。面黃。肢倦食少。不能作文。看書亦不能久。宛如虛損。與化癥回生丹。緩通陰絡法。每日空心服一丸。亦有早晚各服一丸之時。服至二年有餘。計服化癥回生丹六七百丸之多。癥始化淨。氣體復原。看書作文。始舉進士。

吳三十一歲。臍右結癥徑廣五寸。鞏丸如鵝卵大。以受重涼。又加暴怒而得。痛不可忍。不能立。不能坐。竝不能臥。服辛香流氣飲。三日服五帖。重加附子肉桂至五七錢之多。絲毫無效。因服天台烏藥散。初服二錢。滿腹熱如火燒。明知藥至臍右患處如搏物者然。痛加十倍。少時腹中起蓓蕾無數。凡一蓓蕾下濁氣一次。如是者二三十次。腹中痛楚鬆快。少時痛又大作。服藥如前。腹中熱痛。起蓓蕾下濁氣亦如前。但少輕耳。自己初服藥起至亥正。共服五次。每次輕一等。次早腹微痛。再服烏藥散。則腹中不知熱矣。以後每日服二三次。七日後腫痛全消。後以習射助陽而體壯。

葉四十五歲。無論癥瘕雖有氣血之分。然皆係陰病。結於陰部。豈有用陰藥之理。維日已久。沈寒痼冷之疾。非巴豆不能除根。天台烏藥散。乙酉四月二十六日

業已見效。未能除根。照常服前藥。早晚各五分。瘕痛發時服二錢。舌苔白厚。面色淡黃而暗。左脈沈細陽微。再與湯藥行濕通服。六月初九日

雲苓塊錢五

半 夏錢五

益智仁錢五分

生苡仁錢五

茯苓錢二

白蔻仁連皮一錢

川草薢錢四

廣皮錢三

白通草錢一

煮三杯。分三次服。服至舌苔退為度。

廿九歲

十年瘕氣。六脈弦細而緊。乙酉五月初一日

烏藥錢三

小茴香炒黑五錢

吳黃炮淡三錢

良薑錢二

川椒炭錢五

歸鬚錢二

煮三杯。分三次服。

病減者減其製。每日服半帖。初九日

王氏四十歲 大脈弦緊。心下伏梁。非易化之症。一生憂泣。肝之鬱也可知。又

當燥金太乙天符之年。金來克木。痛愈甚矣。與溫絡法。其吐血亦絡中寒

也。乙酉五月廿一日

降香末錢三

半 夏錢三

小枳實錢三

川椒炭錢二

廣皮錢二

歸橫鬚錢三

公丁香分八

煮三杯。分三次服。四帖。

諸症皆效。自覺氣上阻咽。加旋覆花包五錢。廿五日

效不更方。再服。廿九日

加淡吳茱萸三錢。六月初六日

金氏三十歲 瘕結臍左。經來必痛。六脈沈細陽微。乙酉五月廿四日

川棟子三錢

全歸三錢

淡吳萸三錢

降香末三錢

良薑二錢

公丁香一錢

小茴香三錢

艾炭三錢

煮三杯。分三次服。服七帖後。接服化癥回生丹。

業已見效。每日服半帖。再服十天。六月初二日

每行經前三日。腹微痛時。空心服化癥回生丹一丸。服至經盡後。腹中絲

毫不痛為止。下月經行痛發時。再如此服法。癥痕痛亦空心服一丸。化淨

為度。二十日

車五歲鬚髮已白大半。臍左堅大如盤。隱隱微痛。不大便數十日。先延外

科治之。外科謂腸癰。以大承氣下之。三四次終不通。延余診視。按之堅冷

如石。面色青黃。脈短澹而遲。先尚能食。屢下之後。糜粥不進。不大便已四

十九日。余曰。此癥也。金氣之所結也。以肝木抑鬱。又感秋金燥氣。小邪中

裏。久而結成。愈久愈堅。非下不可。然寒下非其治也。以天台烏藥散二錢。

加巴豆霜一分。薑湯和服。設三服以待之。如不通。第二次加巴豆霜一分

五釐。再不通。第三次加巴豆霜二分。服至三次。後始下黑亮球四十九枚。

堅莫能破。繼以苦溫甘辛之法調理。漸次能食。又十五日不大便。余如前

法。下至第二次而通。下黑球十五枚。雖亦堅結。然破之能碎。但燥極耳。外

以香油熬川椒熨其堅處。內服苦溫芳香透絡。月餘化盡。於此症方知燥金之氣傷人如此。而溫下寒下之法。斷不容紊也。丙辰日

治通廷尉久疝不愈。時年六十八歲。先是通廷尉外任時。每發疝。醫者必用人參。故留邪在絡。久不得愈。至乙丑季夏受涼復發。堅結肛門。坐臥不得。脹痛不可忍。汗如雨下。七日不大便。余曰。疝本寒邪。凡堅結牢固。皆屬金象。况現在勢甚危急。非溫下不可。於是用天台烏藥散一錢。加巴豆霜分許。下至三次始通。通後痛漸定。調以倭硫黃丸。兼用金匱蜘蛛散。漸次化淨。乙酉年

### 淋濁大小便閉

郎五十六歲便濁帶血。既有膀胱之濕。又有小腸之熱。用導赤合四苓湯。

滑石飛五錢 茯苓皮五錢 猪苓三錢 萹蓄五錢 次生地五錢

澤瀉三錢 木通三錢 甘草梢一錢 竹葉二錢 煮三杯。分三次服。

又少腹痛。於前方加川楝子三錢 小茴香三錢

王十七歲濕土司天。濕熱下注。致成淋症莖腫。

茯苓皮二錢 萹蓄五錢 車前子二錢 生苡仁五錢 澤瀉三錢

甘草梢三錢 飛滑石二錢 蘆根三錢 白通草一錢 煮三杯。分三次服。

又於前方內加黃柏炭一二錢。

龔五十八歲 先是大小便俱閉。自用大黃八錢。大便雖通。而小便涓滴全無。續

用五苓仍不通。診其六脈弦緊。病因肝鬱而成。當開陰絡。

降香末三錢

歸鬚三錢

琥珀三分

兩頭尖三錢

丹皮三錢

麝香全研沖五厘

韭白汁沖三匙

煮三杯。分三次服。

一帖而通。二帖而暢。

普三十歲 小便淋濁。莖管痛不可忍。自用五苓入正葶藶分清飲等淡滲。愈

利愈痛。細詢病情。由房事不遂而成。余曰。溺管與精管異途。此症當通精

管為是。用虎杖散。現無虎杖草以杜牛膝代之

杜牛膝五錢

丹皮三錢

歸橫鬚三錢

降香末三錢

琥珀全研末六分

兩頭尖三錢

桃仁泥三錢

麝香全研沖五厘

煮三杯。分三次服。

一帖而痛減。五帖而痛止。七帖濁淨。後以補奇經而愈。

珍十八歲 血淋太多。先與導赤不應。繼以脈弦。細詢由怒鬱而起。轉方與活

肝絡。

新絳紗三錢

歸鬚三錢

片薑黃二錢

旋覆花包三錢

香附三錢



蘇子霜二錢  
降香末三錢  
鬱金二錢  
丹皮炭三錢  
桃仁泥三錢

紅花二錢  
煮三杯分三次服四帖而安

王四十五歲小便狂血脈弦數病因怒轉

細生地五錢  
香附三錢  
降香末三錢  
新絳紗三錢  
歸鬚三錢

桃仁泥三錢  
青皮二錢  
旋覆花包三錢  
丹皮炭五錢  
煮三杯分三次服

服四帖而血止止後兩月又因動怒而發仍與前方七帖而愈

范七十二歲因怒鬱而大小便閉與極苦以通小腸借通膽腑法

蘆薈三錢  
龍膽草三錢  
鬱金三錢  
胡連三錢  
桃仁泥三錢

歸鬚三錢  
煮三杯分三次服服二帖而大小便皆通

保女十歲怒鬱少腹脹大如斗小便涓滴全無已三日矣急不可忍仰臥不能轉側起立與開陰絡

降香末三錢  
香附三錢  
廣鬱金二錢  
龍膽草三錢  
琥珀五錢

兩頭尖三錢  
歸橫鬚三錢  
韭白汁沖三錢  
小青皮五錢  
麝香全研沖五厘

煮三杯分三次服一帖而通二帖而暢

保五歲夏日痘後受暑小便不通脈洪數玉莖腫亮捲曲如鉤與涼利膀胱

法

飛滑石六錢

雲苓皮五錢

杏仁三錢

苡仁五錢

白通草一錢五分

蠶沙三錢

煮三杯。分三次服。一帖而通。三帖而玉莖復元。

王八歲 金實無聲。六脈俱弦。痰飲而兼濕痺。小便白濁。先與行濕。乙酉七月初一日

薑半夏五錢

滑石六錢

杏仁泥四錢

雲苓皮五錢

桂枝三錢

晚蠶沙三錢

川萆薢五錢

防己三錢

白通草一錢

生苡仁五錢

甘草一錢

煮三杯。分三次服。十四日

復診於原方加猪苓三錢。澤瀉三錢。

伏飲濕痺便濁。前與淡滲通陽。已服過三十三帖。因停藥二十餘日。現在

飲又上泛。胸滿短氣腰痠。淋濁未除。且與行心下之飲。脈弦細。陽不復。九月初三日

初三日

雲苓皮五錢

桂枝四錢

晚蠶沙三錢

薑半夏五錢

杏仁四錢

廣橘皮五錢

川萆薢五錢

防己四錢

白通草一錢五分

小枳實四錢

煮三杯。分三次服。

於前方去杏仁防己。加薑半夏五錢。生苡仁五錢。十二日

痰飲痺症淋濁。皆寒濕為病。誤與補陰。以致濕邪膠痼沉着。急難清楚。前

與開痺和胃。現雖見效不少。究係濕為陰柔之邪。久為呆補所困。難以且

晚奏功也。十月初五日

飛滑石六錢

桂枝四錢

生苡仁五錢

薑半夏六錢

猪苓三錢

小枳實三錢

雲苓皮五錢

澤瀉三錢

晚蠶沙三錢

川萆薢五錢

廣皮五錢

車前子三錢

煮三杯分三次服。

濁濕誤補久留。與開太陽闔陽明法數十帖之多。雖大見效。究未清楚。小便仍間有濁時。腿仍微有痠痛。廿五日

薑半夏一兩

桂枝四錢

川椒炭三錢

雲苓皮五錢

猪苓三錢

片薑黃二錢

生苡仁五錢

防己三錢

晚蠶沙三錢

川萆薢五錢

廣皮五錢

白通草一錢

小枳實三錢

煮三杯分三次服。

痺症夾痰飲。小便濁。喉啞。先開上焦。後行中下之濕。餘有原案。十一月十八日

苦桔梗五錢

半夏一兩

雲苓皮五錢

生苡仁五錢

杏仁五錢

生甘草三錢

煮三杯分三次服。

喉啞服此。

備用方 行中下兩焦濁濕法。

飛滑石一兩

桂枝四錢

生苡仁五錢

雲苓皮六錢

黃柏鹽水炒三錢

車前子四錢

薑半夏六錢

廣皮三錢

晚蠶沙三錢

川萆薢五錢

煮三杯分三次服。便濁服此。

桑 先淋後且血篡後癢而脹痛。脈洪數。應從精道論治。與虎杖散合導赤法。戊子二月二十日

杜牛膝三錢

白芍三錢

木通二錢

細生地三錢

丹皮五錢

琥珀三錢

降香末二錢

歸鬚二錢

兩頭尖三錢

麝全研沖五厘

煮三杯。分三二次服。

滿六七十歲血淋多年不愈。起於驚閃。現在痛甚。有妨於瀉。瀉則痛更甚。且有紫血條。顯係瘀血之故。法當宣絡。再久病在絡。又定痛亦須絡藥。蓋定痛之藥。無不走絡。走絡之藥。無不定痛。但有大絡別絡腑絡臟絡之分。此症治在陰絡。左脈沈弦而細。所謂沈弦內痛是也。辛卯三月二十日

杜牛膝三錢

桃仁三錢

歸橫鬚三錢

降香末三錢

琥珀全研細沖三分

兩頭尖三錢

丹皮炭五錢

麝全研細沖五厘

煮成三小茶杯。分三二次食遠服。

照前方服一帖。廿一日

於前方內加小苗香炭五錢。杜牛膝加二錢。成五錢。琥珀加二分。成五分。

口麝加二厘。成七厘。再服二帖。廿二日

血淋之後膏淋。顯有穢濁之物。下出不暢。以故效而未愈。再用前法而進。

之大抵以濁攻濁。日廿四

杜牛膝錢五

歸鬚錢三

兩頭尖錢三

小茴香錢五

琥珀分八

川椒炭錢二

降香末錢三

韭白汁每杯點三小匙

口麝全研細沖八厘

丹皮炭錢三

煮三杯。分二次服。

病減者減其製。照原方服半帖。日廿六

脈數身熱。風溫所致。如今晚仍然大熱。明日服此方。溫病宜辛涼。最忌發

表。且有下焦病。以純走上焦。勿犯中下二焦為要。日廿七

連翹錢三

苦桔梗錢三

甘草錢二

銀花錢三

香豆豉錢三

蘆根錢三

薄荷分八

荊芥穗錢一

煮一小茶杯。分三次服。

照原方再服一帖。日廿八

風溫解後。服溫藥。治他病太急。微有喉痛之意。且與清上焦。開提肺氣。無

任溫病餘邪滋長。其下焦溫藥。初一日晚再服未遲。日廿九

桔梗錢三

殭蠶錢二

甘草錢一

連翹錢三

蟬退去頭足一錢

蘆根錢三

銀花錢一

煮二杯。分二次服。

照前方服一帖。日三十

以病退入九故未服藥。四月初一日

風溫已解無餘膏淋亦清至九分。惟瀉後微痛。微有絲毫濁滯未清。議用

前通絡泄濁法五分之一。以清餘邪。俟十分清楚。再商善後。初二日

扶 苓 連皮 三錢

杜牛膝 一錢

丹 皮 二錢

琥 珀 二分

小茴香 二錢

歸 鬚 八分

兩頭尖 一錢

口 麝 全研細 沖二厘

煮一大茶杯。分二次服。以濁滯淨盡為度。

照前方服一帖。初二日

大通之後。胃氣受傷。食少而陽氣不振。再九竅不和。皆屬胃病。擬通補胃

陽。冀開胃健食。穀氣以生宗氣。初四日

雲苓塊 五錢

益智仁 二錢

麥 冬 不去心 三錢

高麗參 二錢

橘皮炭 四錢

薑半夏 三錢

炙甘草 二錢

生 薑 三片

大 棗 去核 二枚

煮三杯。分三次服。

仍服前方。初五日

前方仍再服。初六日

泄瀉

陶 四十歲 久泄脈弦。自春而來。古謂之木泄。侮其所勝也。乙酉四月十五日

柴胡錢三

雲苓塊錢五

廣皮錢三

桂枝錢三

薑半夏錢五

生薑錢五

猪苓錢三

炙甘草錢二

大棗去核 三枚

澤瀉錢三

煮三杯分三次服。

泄瀉已減。於前方內加炒蒼朮三錢。前後共服十三帖。全愈。十九日

前曾木泄。與小柴胡湯。十三帖而愈。向有糞後便血。乃小腸寒濕之症。現

在脈雖弦而不勁。且兼緩象。大便復澹。不必用柴胡法矣。轉用黃土湯法。

去柔藥避其滑潤。五月初六日

竈心土兩四

雲苓塊連皮 五錢

熟附子錢三

炒蒼朮錢五

黃芩炭錢二

廣皮炭錢二

煮三碗分三次服。

濕多成五泄。先與行濕止泄。其糞後便血。少停再議。十二日

雲苓連皮 大錢

生苡仁錢五

桂枝錢五

猪苓錢五

茅蒼朮錢四

廣皮錢四

澤瀉錢五

廣木香錢二

煮三杯分三次服。以泄止為度。

胃不開。大便澹。小便不暢。脈弦。八月初六日

雲苓皮錢五

柴胡錢一

白蔻仁錢一

生苡仁錢五

猪苓錢三

廣橘皮錢二

薑半夏錢三

澤瀉錢三

煮三杯。分三次服。

陸氏<sup>二十歲</sup>六脈弦細。面色淡黃。泄則脾虛。食少則胃虛。中焦不能建立。安

望行經。議先與強土。<sup>乙酉五月十九日</sup>

雲苓塊<sup>三錢</sup>

半

夏<sup>三錢</sup>

藿香梗<sup>二錢</sup>

益智仁<sup>一錢</sup>

苡仁<sup>二錢</sup>

白蔻仁<sup>一錢</sup>

廣木香<sup>一錢五分</sup>

蘇梗<sup>一錢五分</sup>

廣皮炭<sup>一錢五分</sup>

煮三杯。分三次服。

右脈寬泛緩也。胃口稍開。泄則加添。小便不通。加實脾利水。<sup>廿八日</sup>

雲苓塊<sup>五錢</sup>

猪

苓<sup>三錢</sup>

澤

瀉<sup>二錢</sup>

生苡仁<sup>五錢</sup>

加在前方內。

前方服十四帖。泄止胃稍醒。脘中悶。舌苔滑。周身痺痛。六脈弦細而沈。先

與和胃。治痺在後。<sup>六月十八日</sup>

生苡仁<sup>五錢</sup>

桂

枝<sup>三錢</sup>

益智仁<sup>一錢五分</sup>

薑半夏<sup>五錢</sup>

杏仁<sup>三錢</sup>

藿香梗<sup>三錢</sup>

白蔻仁<sup>二錢</sup>

防

己<sup>三錢</sup>

廣橘皮<sup>三錢</sup>

煮三杯。分三次服。



卷二

暑溫

廿四歲暑溫邪傳心包。譫語神昏。右脈洪大數實而模糊。勢甚危險。壬戌六月廿九日

連翹六錢 生石膏兩一 麥冬六錢 銀花八錢 細生地六錢

知母五錢 元參六錢 生甘草三錢 竹葉三錢

煮成三碗。分三次服。牛黃丸二丸。紫金丹二錢另服。

溫邪入心包絡。神昏溼厥。極重之症。七月初一日

連翹三錢 生石膏六錢 麥冬連心五錢 銀花五錢 細生地五錢

知母二錢 丹皮三錢 生甘草一分 竹葉二錢

今晚二帖。明早一帖。再服紫雪丹四錢。

周五十二歲 世人悉以羌防柴葛治四時雜感。竟謂天地有冬而無夏。不亦冤

哉。以致暑邪不解。深入血分成厥。衄血不止。夜間煩躁。勢已膠錮難解。焉

得速功。壬戌七月十四日

飛滑石三錢 犀角三錢 冬桑葉三錢 羚羊角三錢 元參五錢

鮮蘆根兩一 細生地錢五 丹 皮錢五 鮮荷葉邊張一 杏仁泥錢三

今晚一帖。明早一帖。

厥與熱似乎稍緩。據云夜間煩躁亦減。是其佳處。但脈弦細沉數。非痊厥所宜。急育陰而戀陽。復鹹以制厥法。日十五

生 地錢六 生鱉甲錢六 犀 角錢三 元 參錢六 鈴羊角錢三

丹 皮錢三 麥 冬連心八錢 生白芍錢四 桑 葉錢三 日服二帖

脈之弦剛者。大覺和緩。沈者已起。是為起色。但熱病本屬傷陰。况醫者誤以傷寒溫燥藥五六帖之多。無怪乎舌苔燥如草也。議啓腎液法。日十六

元 參兩一 天 冬錢三 丹 皮錢五 沙 參錢五 銀 花錢三

麥 冬錢五 犀 角錢三 鱉 甲錢八 桑 葉錢二 日服三帖。

即於前方內加細生地六錢。連翹一錢五分。鮮荷葉邊三錢。

再按暑熱之邪。深入下焦血分。身半以下。地氣主之。熱來甚於上焦。豈非熱邪深入之明徵乎。必借芳香以為搜邪之用。不然。恐日久膠錮之邪。一時難解也。一日熱邪不解。則真陰正氣日虧。一日矣。此紫雪丹之必不可少也。日十七

紫雪丹一錢五分 分三次服。

厥已回。面赤。舌苔乾黑芒刺。脈沈數有力。十餘日不大便。皆下症也。入雖虛。然亦可以調胃承氣湯小和之。日十八

大黃生五錢

元明粉沖三錢

甘草生三錢

先用一半煎一茶杯。緩緩服。夜間不便。再服下半劑。服前方半劑。即解。黑大便許多。便後用此方。

麥冬雨一

大生地雨一

鱉甲雨一

白芍六錢

大下宿糞若許。舌苔化而未滋潤。脈仍洪數。微有潮熱。除存陰。別無二法。日十九

沙參三錢

大生地雨一

鱉甲五錢

麥冬六錢

生白芍六錢

牡蠣五錢

天冬三錢

炙甘草三錢

丹皮四錢

日服二帖。

小便短而赤甚。微咳。面微赤。尺脈仍有動數之象。議甘潤益下。以治虛熱。少復苦味。以治不盡之實邪。且甘苦合化陰氣而利小便也。按甘苦合化陰氣利小便法。舉世不知。在溫熱門中。誠為利小便之上妙法。蓋熱傷陰液。小便無由而生。故以甘潤益水之源。小腸火腑。非苦不通。為邪熱所阻。故以苦藥瀉小腸而退邪熱。甘得苦則不呆滯。苦得甘則不剛燥。合而成功也。廿一日

生驚甲錢八

元參錢五

麥冬連心六錢

生白芍錢六

沙參錢三

麻仁錢三

古勇連錢一

阿膠錢三

丹皮錢三

炙甘草錢四

日二帖。

已得效。仍服前方二帖。廿二日

復脈復苦法。清下焦血分之陰熱。廿三日

元參錢五

驚甲生五錢

阿膠化沖三錢

白芍生六錢

天冬錢二

丹皮錢三

麻仁錢五

麥冬連心五錢

甘草炙五錢

日服二帖。

王二十歲暑溫。舌苔滿佈。色微黃。脈洪弦而剛甚。左反大於右。不渴。初起即

現此等脈症。恐下焦精血之熱。遠甚於上焦氣分之熱也。且舊有血益。故

手心熱。又甚於手背。究竟初起。且清上焦。然不可不心知其所。以然。癸亥六月初五日

日

連翹錢二

細生地錢一五分

粉丹皮錢二

銀花錢二

苦桔梗錢一

白茅根錢二

麥冬錢二

牛蒡子錢一五分

香豆豉錢五分

元參錢一五分

藿香梗錢一

生甘草錢一

薄荷錢三分

日三帖。

熱退大半。胸痞。腹中自覺不和。按暑必夾溼。熱退溼存之故。先清氣分。初六日

日

藿香梗三錢  
飛滑石五錢  
白扁豆二錢  
杏仁泥二錢  
連翹二錢

廣鬱金二錢  
生苡仁三錢  
銀花五分  
白通草八分  
香豆豉二錢

日二帖。

病後六腑不和。初七日

藿香梗三錢  
飛滑石三錢  
香豆豉一錢  
生苡仁三錢

半夏二錢  
廣皮炭一錢  
廣鬱金一錢  
厚朴二錢  
日服一帖。

向有失血。又屆暑病之後。五心發熱。法當補陰以配陽。但脈雙弦而細。不惟陰不充足。即真陽亦未見其旺也。議二甲復脈湯。仍用舊有之桂枝薑

棗。初十日

白芍炒四錢  
大生地四錢  
沙參三錢  
桂枝二錢

生鱉甲五錢  
麥冬四錢  
麻仁二錢  
生牡蠣五錢

生薑二片  
阿膠化沖二錢  
炙甘草五錢  
大棗去核二枚  
煮三杯。分三次服。

又丸方。八仙丸加麻仁白芍。

麥冬連心六兩  
直熟地八兩  
山藥三兩  
茯苓四兩  
五味子三兩

麻仁三兩  
澤瀉三兩  
山黃肉酒炒三兩  
白芍酒炒六兩  
丹皮四兩

蜜丸如梧子大。每服三錢。日三服。

馬八歲 暑熱本易傷陰。誤用消導攻伐。重傷陰氣。致令頭中耳中鳴無止時。此係肝風內動。若不急救肝腎之陰。痲癢熱厥立至矣。癸亥六月初八日

大生地六錢 麥冬五錢 生牡蠣五錢 炒白芍六錢 丹皮三錢

菊花炭二錢 生鱉甲五錢 桑葉五分 炙甘草三錢 火麻仁二錢大便稀去此

煮三杯。分三次服。

外邪雖退。無柰平素勞傷太過。虛不肯復。六脈無神。非參不可。十二日

沙參三錢 大生地六錢 阿膠三錢 元參六錢 生鱉甲六錢 丹皮三錢

麥冬六錢 火麻仁三錢 白芍六錢 甘草四分 煮三杯。分三次服。

得大便後去元參加牡蠣六錢。人參三錢。桂枝一錢。大棗去核二枚。生

薑一片。

病後飲食不調。又兼暑濕着裏。腹中絞痛。痛極便澹。脈微數。欲作滯下。議

芩芍法。奪其滯下之源。七月初六日

焦白芍一錢五分 厚朴二錢 廣木香一錢 黃芩炭二錢 枳實一錢

小茴香八分 南查炭一錢五分 廣皮炒一錢五分 雲連炭八分 神麩炭二錢

一二帖後。腹痛除。仍服復脈湯。

榮女十五歲 暑溫夾痰飲。怒鬱。故脈扎身熱而脇痛。誤用足六經表藥。煩躁

不寤六日不解。至危之症。乙丑六月十一日

生石膏四錢

杏仁三錢

生香附三錢

旋覆花包三錢

連翹三錢

藿香梗二錢

廣鬱金二錢

薄荷一錢

煮兩杯。分二次服。三時一帖。服二日大見效。再商。

於前方內加青橘皮二錢。鮮蘆根五錢。鮮荷葉邊一枚。十三日

富氏廿二歲暑傷足太陽發為臃脹。渴不欲飲。飲則嘔。身微熱。舌白滑。肢逆。

二便閉塞。病在中焦居多。以香開腑濁為主。乙丑六月十三日

杏仁泥三錢

半夏五錢

小枳實三錢

旋覆花包三錢

厚朴四錢

廣鬱金二錢

生苡仁三錢

香附三錢

白蔻仁二錢

藿香梗三錢

廣皮二錢

煮兩杯。分二次服。今日一帖。明日服二帖。

孫四十歲頭痛。左關獨高。責之少陽內風掀動。最有損一目的弊。若以為外

感寒則遠甚矣。議清少陽膽絡法。再此症除左關獨高。餘脈皆緩。所謂通

體皆寒。一隅偏熱。故先清一隅之熱。金匱為先治新病。病當後治也。乙丑閏六月初

日六

羚羊角二錢

丹皮一錢五分

茶菊花一錢五分

苦桔梗二錢

生甘草一錢

薄荷六分

刺蒺藜一錢

桑葉一錢五分

鮮荷葉去蒂半張

鉤藤鉤一錢

煮兩杯服。今日一帖。明日兩帖。

前日左關獨浮而弦。係少陽頭痛因暑而發。用清膽絡法。茲左關已平其半。但緩甚。舌苔白厚而滑。胸中痞悶。暑中之熱已解。而溼尚存也。議先宣上焦氣分之溼。初八日

生苡仁五錢

飛滑石六錢

藿香梗三錢

杏仁泥五錢

半

夏五錢

廣鬱金三錢

旋覆花包三錢

廣皮三錢

白通草一錢

茯苓皮三錢

白蔻仁連皮二錢

煮二杯。今日服。渣再煮一杯。明早服。

諸症俱減。舌白未除。中濕尚多。議進法於前方內。加生蒼朮三錢。草果炒

一錢。初九日

王廿八歲

暑傷兩太陰。手太陰之症為多。一以化肺氣為主。乙丑閏六月初三日

飛滑石八錢

連翹三錢

白通草一錢

杏仁泥五錢

金銀花三錢

白蔻仁連皮二錢

生苡仁五錢

厚朴三錢

鮮荷葉去蒂一張

藿香葉一錢

白扁豆花一枝

煮兩杯。分兩次服。今晚明早各一帖。

兩太陰之暑症。昨用冷香合辛涼。暑中之熱已退其半。但裏溼與熱未克

即除。故大便紅水。胸中痞悶。

飛滑石六錢

猪苓五錢

藿香梗三錢

杏仁泥三錢

澤瀉

瀉五錢



廣鬱金錢二 扶苓皮錢三 生苡仁錢五 白通草錢二 白蔻仁錢五分

厚朴錢三 煮三杯服。今晚明日各一帖。初四日

舌苔白厚。腹甚不和。腸鳴泄瀉。聚溼尚多。急宜分泄。以免延拖。初五日

飛滑石錢六 半 夏錢五 藿香梗錢三 扶苓皮錢六 澤瀉錢五

南蒼朮錢三 生苡仁錢六 椒目錢五 白蔻仁錢三 老厚朴錢三

廣皮錢三 水入碗。煮取三碗。分三次服。渣再煮一碗服。

廣廿四歲 六脈洪大之極。左手更甚。目邪視。怒氣可畏。兩臂兩手捲曲而瘳。

瘳。舌邪向。不語三四日。面赤身熱。舌苔中黃邊白。暑入心包。膽絡。以清心

膽之邪為要。先與紫雪丹。乙丑七月廿二日

連翹連心五錢 羚羊角錢三 竹茹錢三 金銀花錢五

暹羅犀角錢三 丹皮錢三 麥冬錢五 細生地錢五

桑葉錢三 天冬錢三 鮮荷葉去蒂一張 煮四杯。分四次服。

又碧雪丹一兩。每服三錢。涼開水調服。以神清熱退為度。

肝熱之極。加天冬涼肝於前方內。廿三日

加天冬三錢。其碧雪丹。仍照前常服。

暑入心膽兩經。與清心絡之伏熱。已見小效。仍用前法而進之。廿四日

烏犀角錢五

連翹連心四錢

粉丹皮錢五

鈴羊角錢三

銀花錢三

茶菊花錢三

細生地錢五

麥冬連心五錢

冬桑葉錢三

煮四杯。分四次服。日廿五

加黃芩三錢。白扁豆花一枚。山連一錢五分。鮮荷葉邊一枚。日廿五

暑入心膽兩經。屢清兩經之邪。業已見效。今日飲水過多。水入微嘔。蓋暑

必挾濕。議於前方內去柔藥加淡滲。日廿六

茯苓皮錢五

銀花錢三

黃柏炭錢二

生苡仁錢五

連翹連心三錢

真川連錢一

鈴羊角錢三

犀角錢二

冬桑葉錢三

黑山梔錢三

茵陳錢三

荷葉邊錢一

煮三杯。分三次服。暑熱退後。嘔水。身微黃。熱

退濕存。日廿七

雲苓塊連皮五錢

銀花錢三

白蔻皮錢二

生苡仁錢五

連翹錢三

黃柏炭錢二

杏仁泥錢三

茵陳錢三

白通草錢一

黑山梔錢三

煮三杯。分三次服。

熱未盡退。舌起新白苔。胸痞。暑兼溼熱。不能純治一邊。日廿九

飛滑石錢六

銀花錢三

藿香梗錢三

雲苓皮錢五

連翹不去心三錢

真山連錢一五分

杏仁泥錢五

白通草錢一

生苡仁錢五

白蔻打碎一錢五分

煮三杯。分三次服。

暑熱已退七八。惟十餘日不大便。微有譫語。脈沈。可與輕通陽明。與增液承氣法。八月初二日

細生地六錢

元參八錢

麥冬不去心六錢

生大黃四錢

煮成三杯。先服一杯。約二時不大便。再服第二杯。明早得大便。止後服。

否則服第三杯。

溫病下後宜養陰。暑溫下後宜兼和胃。蓋暑必夾溼。而舌苔白滑故也。脈

緩與外臺茯苓飲意。初三日

雲苓塊五錢

麥冬不去心五錢

廣鬱金一錢

生苡仁五錢

半夏三錢

白蔻皮一分五錢

藿香梗三錢

厚朴二錢

煮三杯。分三次服。

暑溫熱退濕存故嘔。腹不和而舌有白苔。與三仁湯宜剛法。初五日

杏仁五錢

益智仁一錢

苡仁五錢

半夏五錢

藿香梗三錢

黃芩三錢

厚朴二錢

白蔻仁一分五錢

生薑三片

煮三杯。分三次服。

王三十八歲。暑溫誤表。汗如暴雨直流。有不可猝遏之勢。脈洪。乳氣短。與白虎

人參湯。丁卯六月十五日

生石膏八兩

知母二兩

粳米合一

炙甘草一兩

洋參八兩

煮四碗。一時許服一碗。以汗止為度。不止再作服。

汗勢減。照前方服半劑。日十六

脈靜身涼汗止。與三才湯。三帖全愈。日十七

吳四十歲 先暑後風。大汗如雨。惡寒不可解。先服桂枝湯一帖。為君之

桂枝用二兩。盡劑毫無效驗。次日用桂枝八兩。服半帖而愈。翰通自醫丁丑六月十三日

某 暑溫誤表。致有譫語。邪侵心包。熱重面赤。脈洪數。手太陰症為多。宜

辛涼芳香以清肺熱。開心包。陽有汗。陰無汗。及頸而還。極大症也。丁亥閏五月廿二日

生石膏兩一 連翹連心三錢 丹皮三錢 飛滑石六錢 銀花三錢

桑葉三錢 細生地五錢 知母炒三錢 甘草二錢 苦桔梗三錢

煮三大杯。分三次服。外服紫雪丹。

脈之洪數者少減。熱亦少退。舌心黑滑。大便頻澹。暑必夾濕。况體厚本身

溼痰過重者乎。議兩清濕熱。日廿三

雲苓皮錢五 連翹連心三錢 藿香梗三錢 生苡仁錢五 銀花錢四

六一散錢三 薑半夏錢三 黃芩錢一 白蔻仁錢一 煮三杯。分三次服。

外服紫雪丹分五

脈洪大又減。但沈數有力。伏邪未淨。舌中黑滑。耳聾。大便仍頻澹。日廿四

雲苓皮六錢

苡

仁五錢

黃

芩三錢

薑半夏五錢

連

翹三錢

銀花三錢

雅

連姜汁炒一錢

六一散六錢

竹葉三錢

煮三杯分三次服

外服紫雪丹五分

即於前方內連翹銀花加至五錢。苡仁加至八錢。紫雪丹仍服五分。廿五日

熱漸退而未盡。脈漸小而仍數。面赤減。大便頻數亦少。餘邪未盡。廿六日

連翹四錢

飛滑石六錢

黃芩三錢

銀花四錢

雲苓皮六錢

雅連一錢

苡仁五錢

薑半夏五錢

甘草一錢

白蘧連皮一錢

煮四杯分四次服

照前方仍服一帖。廿七日

即於前方內加桑葉三錢。目白睛赤縷故也。廿八日

大熱雖退。餘焰尚存。耳聾。與苦淡法。廿九日

銀花五錢

飛滑石六錢

丹皮三錢

連翹連心三錢

雲苓皮六錢

苡仁六錢

雅連炒一錢

苦丁茶三錢

桑葉三錢

牡蠣五錢

龍膽草一分

煮四杯分四次服

脈靜身涼熱已退矣。舌有新白滑苔。濕猶有存者。與三仁湯。宣化三焦。通

調水道。六月初一日

雲苓塊連皮六錢

苡仁五錢

晚蠶砂三錢

杏仁泥三錢

澤瀉二錢

益智仁五錢

薑半夏三錢

白蔻一錢五分

黃芩炭一錢五分

藿香梗三錢

通草一錢

煮三杯分三次服。

吳二十歲

暑兼濕熱。暑溫不比春溫之但熱無濕可用酸甘化陰。鹹以補腎

等法。且無形無質之熱邪。每借有形有質之濕邪以為依附。此症一月有

餘。僉用大劑純柔補陰退熱法。熱總未減。而中宮痞塞。得食則痛脹。非抹

不可。顯係暑中之濕邪。蟠踞不解。再得柔膩膠固之陰藥。與邪相搏。業已

喘滿。勢甚重大。勉與通宣三焦法。仍以肺氣為主。蓋肺主化氣。氣化則濕

熱俱化。六脈弦細而沈洪。庚寅六月廿一日

苡仁五錢

生石膏二兩

厚朴三錢

杏仁四錢

雲苓皮五錢

青蒿二錢

連翹三錢

藿香梗三錢

白蔻一錢五分

銀花三錢

鮮荷葉邊一片

煮四杯分四次服。兩帖。

暑濕誤用陰柔藥。致月餘熱不退。胸膈痞悶。前與通宣三焦。今日熱減。脈

亦減。但痞滿如故。喘仍未定。舌有白苔。猶為棘手。廿三日

生石膏兩一

厚朴三錢

藿香梗三錢

飛滑石四錢

連翹三錢

小枳實二錢

雲苓皮三錢

廣皮三錢

白蔻仁二錢

生苡仁五錢

煮三杯。分三次服。二帖。

熱退喘減。脈亦稍平。惟仍痞。且泄瀉。皆陰柔之累。姑行濕止瀉。廿五日

滑石五錢 薑半夏三錢 黃芩炒二錢 猪苓三錢 雲苓皮五錢

廣鬱金二錢 澤瀉二錢 藿香梗三錢 通草一錢 苡仁五錢

煮三杯。分三次服。二帖。

喘止。胸痞亦開。熱雖減而未退。瀉未止。廿七日

生石膏兩一 澤瀉三錢 薑半夏五錢 飛滑石六錢 黃芩三錢

藿香梗三錢 雲苓皮六錢 煮三杯。分三次服。二帖。

諸症俱減。惟微熱。大便漉。調理飲食為要。廿九日

雲苓塊連皮五錢 猪苓三錢 藿香梗三錢 生苡仁五錢 澤瀉三錢

炒黃芩三錢 薑半夏二錢 蘇梗二錢 白蔻仁一錢 杏仁泥二錢

煮三杯。分三次服。四帖。

伏暑

周十四歲 伏暑內發。新涼外加。脈右大左弦。身熱如烙。無汗。吐膠痰。舌苔滿

黃。不宜再見泄瀉。不渴。腹脹。少脹痛。是謂陰陽並病。兩太陰互爭。難治之

症。議先清上焦濕熱。蓋氣化濕熱亦化也。壬戌八月十六日

飛滑石三錢 連翹二錢 象貝母一錢 杏仁泥三錢  
 銀花二錢 白通草一錢 老厚朴二錢 蘆根二錢  
 鮮梨皮二錢 生苡仁五分 竹葉一錢 今晚一帖。明早一帖。  
 案仍前日十七

飛滑石三錢 連翹二錢 鮮梨皮五分 杏仁泥五分 冬桑葉一錢  
 銀花二錢 老厚朴五分 薄荷八分 扁豆皮二錢 苦桔梗五分  
 蘆根二錢 荷葉邊五分 炒知母五分 午一帖。晚一帖。明早一帖。  
 兩與清上焦熱已減其半。手心熱甚於手背。謂之裏熱。舌苔紅黃而厚為實熱。宜宣之。用苦辛寒法。再按暑必夾濕。腹中按之痛脹。故不得不暫用苦燥法。日十八

杏仁泥三錢 木通二錢 廣木香一錢 真山連薑汁炒黃一錢五分  
 黃芩炭一錢 厚朴一錢 小茴香炒黑一錢五分 栝婁連皮仁八分  
 炒知母五分 小枳實打碎一錢五分 檳榔八分 廣皮炭一錢  
 煮二杯。分二次服。

腹之痛脹俱減。舌苔乾燥黃黑。肉色絳。嗆咳痰粘。幼童陰氣未堅。當與存陰退熱。日十九



麥冬不去心

煨石膏四錢

丹皮五錢

沙參三錢

細生地四錢

杏仁二錢

元參五錢

炒知母二錢

蛤粉三錢

犀角二錢

生甘草一錢

煮三杯分三次服。

津液稍回。潮熱因宿糞未除。夜間透汗。因邪氣還表。右脈仍然浮大。未可

下。宜保津液。護火克肺金之嗽。二十日

細生地六錢

元參六錢

藿石斛三錢

焦白芍四錢

麥冬六錢

柏子霜三錢

煨石膏三錢

沙參三錢

牡蠣粉一錢五分

杏仁泥二錢

犀角一錢

煮三杯。陸續服。

諸症悉解。小有潮熱。舌絳苔黑。深入血分之熱。未盡除也。用育陰法。廿一日

沙參三錢

大生地五錢

牡蠣三錢

麥冬不去心

焦白芍四錢

丹皮三錢

天冬一錢五分

柏子霜三錢

甘草炙二錢

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

津液消亡。舌黑乾刺。用復脈法。廿二日

大生地六錢

麥冬不去心

柏子霜四錢

炒白芍六錢

丹皮四錢

火麻仁三錢

生鱉甲六錢

阿膠沖三錢

炙甘草三錢

生牡蠣四錢

頭煎三杯。今日服。二煎一杯。明早服。

右脈仍數。餘邪陷入肺中。咳甚痰艱。議甘潤兼宣涼肺氣。廿三日

麥冬不去心 一兩 細生地錢五 象貝錢三 沙參錢三 杏仁泥錢三

冬桑葉錢三 玉竹錢三 苦桔梗錢三 甘草錢三 丹皮錢二

茶菊花錢三 梨皮錢三 一帖藥。二次煎。每煎兩茶杯。共分四次服。

舌黑苔退。脈仍數。仍咳。腹中微脹。廿四日

細生地錢五 麥冬不去心 五錢 藿香梗錢二 茯苓塊錢三 沙參錢三

廣鬱金錢一 五分 杏仁粉錢三 丹皮錢三 生扁豆錢三 苦桔梗錢三

象貝錢二 煮三杯。渣再煮一杯。分四次服。

昨晚得黑宿糞若許。潮熱退。唇舌仍絳。熱之所過。其陰必傷。與復脈法復

其陰。廿五日

大生地錢八 麥冬不去心 一兩 火麻仁錢三 炒白芍錢六 沙參錢三

真阿膠沖二 錢 生鱉甲錢五 元參錢三 炙甘草錢三 生牡蠣粉錢五

丹皮錢三 水入碗。煮成三碗。分三次服。渣再煮一碗。明早服。

又得宿糞若許。邪氣已退八九。但正陰虛耳。故不欲食。晚間乾咳無痰。廿六日

大生地錢八 麥冬不去心 六錢 火麻仁錢三 生白芍錢五 天冬錢二

牡蠣粉錢三

北沙參錢三

阿膠沖三錢

炙甘草錢三

煮三杯。分三次服。

外用梨汁葶薺汁各一黃酒杯。重湯燉溫頓服。

熱傷津液。大便燥。微有潮熱。乾咳舌赤。用甘潤法。廿七日

細生地錢五

元參錢六

知母炒黑二錢

火麻仁錢三

麥冬不去心六錢

阿膠錢二

郁李仁錢二

沙參錢三

梨汁沖一盃

葶薺汁沖一盃

煮三杯。分三次服。

伏暑內漬。續出白痧若許。脈較前恰稍和。第二次舌苔未化。不大便。廿八日

麥冬不去心六錢

大生地錢五

元參錢三

沙參錢三

牛蒡子炒研細三錢

阿膠錢一五分

連翹連心二錢

生甘草錢一

麻仁錢三

銀花炒二錢

煮三杯。分三次服。服此晚間大便。

潮熱復作。四日不大便。燥糞復聚。與增液承氣湯微和之。九月初四日

元參錢五

細生地錢五

大黃生二錢

麥冬不去心二錢

炙甘草錢一

煮二杯。分二次服。服此得黑燥糞若許。而潮熱退。脈靜以後。與養陰收

功。

陳廿八歲左脈洪大數實。右脈陽微。陰陽逆亂。伏暑似瘧。最難即愈。議領邪

外出法。癸亥十二月十一日

生驚甲二兩

麥冬不去心

粉丹皮三錢

沙參三錢

桂枝尖三錢

炒知母三錢

焦白芍三錢

青蒿四錢

炙甘草一錢五分

煮三碗分三次服。

伏暑寒熱往來已愈。不食不飢不便。胸中痞悶。九竅不和。皆屬胃病。十四日

半夏五錢

茯苓塊五錢

桂枝一錢五分

黨參三錢

生苡仁五錢

廣皮一錢五分

青皮一錢五分

廣鬱金二錢

煮三杯分三次服。

久病真陽虛則膈痛。餘邪化熱則口苦。正氣不復則肢倦。十七日

生洋參二錢

桂枝三錢

廣皮炭一錢五分

茯苓塊三錢

半夏三錢

炙甘草一錢五分

焦白芍三錢

生薑二片

大膠棗二枚

黃芩炭一錢五分

煮三杯分三次服。

斬十九歲不兼濕之伏暑誤治。津液消亡。以致熱不肯退。唇裂舌燥。四十餘

日不解。咳嗽膠痰。謔語口渴。可先服牛黃清心丸。清包絡而搜伏邪。湯藥

與存陰退熱法。乙丑八月廿二日

細生地三錢

生扁豆三錢

生驚甲五錢

麥冬不去心

沙參三錢

生甘草一錢

生牡蠣五錢

炒白芍三錢

煮三杯分三次服。

暑之偏於熱者。誤以傷寒足經藥治之。以致津液消亡。昨用存陰法。兼芳

香開絡中閉伏之邪。已見大效。茲因小便赤甚而短。熱雖減而未除。議甘

苦合化陰氣法。廿四日

二甲復脈湯加黃芩三錢。如有譫語。牛黃丸仍服。

昨用甘苦合化陰氣法。服後大見涼汗。茲熱已除。脈減。舌苔盡退。但六脈重按全無。舌仍乾燥。識熱之所過。其陰必傷例。用二甲復脈湯。重加鱉甲

甘草。廿六日

與六十歲夏傷於濕。冬必咳嗽。况六脈俱弦。木旺克土。脾土受克則泄瀉。胃

土受克則不食而欲嘔。前曾腹脹。現在胸痞。舌白滑。此寒濕病也。而脈反數。思涼思酸。物極必反之象。豈淺鮮哉。急宜戒惱怒。小心一切為要。乙丑九月十六日

日

薑半夏三錢

飛滑石三錢

生苡仁五錢

杏仁泥四錢

旋覆花包二錢

廣鬱金三錢

茯苓皮五錢

白蔻皮一錢

白通草一錢

水五杯。煮取兩杯。

渣再煮一杯。分三次服。

脈數甚。思涼。濕中生熱之故。十八日

飛滑石六錢

苡仁六錢

白蔻仁一錢五分

茯苓皮六錢

半夏四錢

廣鬱金二錢

杏仁泥六錢

黃芩二錢

白通草二錢

藿香梗三錢

枳實一錢五分

水八碗。煮取八分三茶碗。渣再煮一碗。日三夜一。分四次

服。

伏暑必夾火與濕。不能單顧一邊。至服藥後。反覺不快。乃久病體虛。不任開泄之故。渴思涼者火也。得水則停者濕也。二十日

生石膏六錢

半夏三錢

炒知母一錢五分

杏仁泥六錢

黃芩一錢

白蔻仁一錢

煮三杯。分三次服。

於前方內去薏仁。加

生石膏四錢

藿香梗三錢

炒知母五分

飛滑石四錢

白通草一錢五分

加入前方內。煮四杯。分四次服。

飲居右脇不得臥。格拒心火。不得下通於腎。反來鑠喉。故隘乾。廿七日

薑半夏五錢

杏仁三錢

小枳實三錢

茯苓皮三錢

香附三錢

藿香梗三錢

旋覆花包三錢

廣皮二錢

蘇子霜三錢

煮三杯。分三次服。

小便不通。於前方內加

飛滑石三錢

生苡仁三錢

白通草一錢五分

前後共八帖。

小便已通。於前方內去滑石通草生苡仁。服五帖而全愈。初六日

巴廿八歲面色青黃。其為濕鬱無疑。右脈單弦。其為伏飲無疑。噯氣胸痛。合

之左脈弦。其為肝鬱無疑。上年夏日曾得淋症。誤服六味湯丸。酸甘化陰。

致令暑濕隱伏久踞。故症現龐雜無倫。治法以宣化三焦。使邪有出路。兼和肝胃。能令食爲要。

生石膏八錢

半夏五錢

生苡仁五錢

飛滑石兩一

萆薢四錢

茯苓皮五錢

旋覆花包三錢

香附三錢

廣鬱金三錢

杏仁泥三錢

通草二錢

晚蠶砂三錢

煮成四碗。分早中晚夜四次服。

此症方案失收。姑不全錄。自四月至八月一日。不斷服藥。諸症從面目青黃。逐漸退淨。而愈。其面青由額往下。由耳往中。約十日。褪一暈。及褪至鼻柱。約月餘。方亮。皆誤服柔藥之弊。所用不出此方。故方不全。而案可以載。欲爲隔年暑濕之症。開一門路。

某其人。本有飲咳。又加內暑外涼。在經之邪。似瘧而未成。在腑之邪。泄瀉未止。恐成滯下。急以提邪外出爲要。按六脈俱弦之泄瀉。古謂之木泄。卽以小柴胡湯爲主方。况加之寒熱往來乎。六脈俱弦。故謂脈雙弦者寒也。指中焦虛寒而言。豈補水之生熟地所可用哉。現在寒水客氣。燥金司天。而又大暑節氣。與柴胡二桂枝一法。丙寅六月初六日

柴胡六錢

炒白芍二錢

青蒿二錢

桂枝三錢

藿香梗三錢

生薑三錢

半夏六錢

廣橘皮三錢

大棗去核二枚

黃芩二錢

炙甘草一錢

煮三杯。分三次服。

寒暑兼受。成瘧則輕。成痢則重。前與柴胡二桂枝一湯。現在面色青。熱退寒重。痰多而稀。舌之赤者亦淡。脈之弦勁者微細。不渴。陽虛可知。與桂枝柴胡各半湯。減黃芩。加乾薑。初八日

桂枝三錢 炒白芍一錢五分 乾薑三錢 柴胡三錢 炒黃芩一錢

生薑五錢 半夏六錢 炙甘草二錢 大棗去核三枚 煮三杯。分三次服。

內暑外寒相搏。既欲成瘧。大便溏泄。恐致成痢。口乾不渴。經謂自利不渴者。屬太陰也。合之腹痛則更可知矣。仲景為表急。急當救表。裏急。急當救裏。茲表裏無偏急之象。議兩救之法。表仍用柴胡桂枝各半湯法。以太少兩經俱有邪也。救裏與理中湯。初九日

桂枝四錢 焦白芍二錢 良薑二錢 柴胡四錢 黃芩炭一錢

半夏六錢 炙甘草一錢五分 川椒炭三錢 生薑五錢 苡仁五錢

白蔻仁一錢五分 大棗去核二枚 乾薑三錢 煮三杯。分三次服。

昨用兩救表裏。已見小效。今日仍宗前法而退之。以脈中陽氣已有生動之機故也。不可性急。反致僨事。初十日

桂枝三錢 炒白芍二錢 炒厚朴二錢 柴胡三錢 炒黃芩一錢五分

炙甘草一錢五分 半夏六錢 川椒炭二錢 生薑五錢 乾薑二錢



煨草果錢一

大棗去核二枚

煮三杯。分三次服。

內而痰飲蟠踞中焦。外而寒暑擾亂胃陽。連日已奪去成痢之路。一以和中。蠲飲為要。蓋無形之邪。每借有形質者以為依附也。十一

桂枝錢三

焦白芍錢二

枳實錢三

柴胡錢三

黃芩炭錢一五分

青蒿錢三

杏仁錢三

茯苓皮錢五

廣皮錢二

半夏錢一兩

白蔻仁錢一五分

生薑錢三

苡仁錢五

煮三杯。分三次服。

雜受寒暑。再三分析。方成瘧疾。以伏暑成瘧。則輕。寒多熱少。脈沉弦。乃邪氣深入。與兩陰陽之中。偏於溫法。十二

青蒿錢三

藿香梗錢三

枳實錢二

柴胡錢三

薑半夏錢八

良薑錢二

厚朴錢三

瓜蒌皮錢二

生薑錢五

檳榔錢一

黃芩炭錢一五分

大棗去核二枚

煮三杯。分三次服。

寒熱少減。胸痞甚。去甘加辛。去大棗。加生薑。十四

脈弦細。指尖冷。陽微不及。四末之故。兼之腹痛便溏。痰飲咳嗽。更可知矣。以和胃陽。溫中陽。逐痰飲立法。十六

半夏錢六

生苡仁錢五

乾薑錢二

杏仁錢五

川椒炭錢三

炒廣皮錢三

桂枝錢三

白蔻仁錢二

生薑錢三

煮三杯。分三次服。

張 伏暑。酒毒遇寒涼而發。九日不愈。脈緩而軟。滯下。身寒譫語。溼熱發黃。先清溼熱。開心包絡。日十七

飛滑石 錢五

茵 陳 錢五

黃柏炭 錢三

茯苓皮 錢五

黃 芩 錢三

真山連 錢二

生苡仁 錢三

通 草 錢一

梔子炭 錢二

煮三杯。分三次服。

先服牛黃清心丸一丸。戌時再服一丸。

熱退。滯下已愈。黃未解。日十八

飛滑石 錢五

茵 陳 錢三

梔子炭 錢三

茯苓皮 錢五

葶 藶 錢三

真雅連 分八

黃柏炭 錢三

杏 仁 錢三

燈心草 錢一

白通草 錢一

煮三杯。分三次服。

黃亦少退。脈之軟者亦鼓指。惟舌赤。小便赤而濁。餘濕餘熱未盡。尚須清之。日十九

飛滑石 錢五

茵 陳 錢四

黑山梔 錢三

茯苓皮 錢五

半 夏 錢三

真雅連 分八

生苡仁 錢三

杏 仁 錢三

廣皮炭 錢二

黃柏炭 錢二

葶 藶 錢三

煮三杯。分三次服。

黃退。小便赤濁。舌赤脈洪。濕熱未盡。日二十

飛滑石 錢五

半 夏 錢三

海金沙 錢三

炒梔皮 錢二

葶藶錢三

真雅連錢一

煮三杯。分二次服。

王氏廿八歲

上年初秋伏暑。午後身熱汗出。醫者誤以為陰虛勞損。不食。胸

痞。咳嗽。舌苔白滑。四肢倦怠。不能起牀。至今年三月不解。已經八月之久。

深痼難救。勉與宣化三焦。兼從少陽提邪外出法。乙酉三月二十日

飛滑石六錢

桂枝三錢

白蔻仁二錢

茯苓皮五錢

青蒿三錢

炒黃芩二錢

薑半夏五錢

苡仁五錢

白通草一錢

杏仁泥四錢

廣皮三錢

煮三杯。分三次服。

此方服二帖能進食。服四帖飲食大進。即起。能行立。後八日復診。以調

理脾胃而愈。

王氏廿六歲

伏暑咳嗽。寒熱將近二年不解。難望回生。既咳且嘔而泄瀉。勉

與通宣三焦。俾邪得有出路。或者得有生機。何以知其為伏暑而非癆瘵。

勞之咳重在丑寅卯木旺之時。濕家之咳在戌亥子水旺之時。勞之寒熱

後無汗。伏暑寒熱如瘧狀。丑寅卯陽升乃有汗而止。勞之陰虛身熱。脈必

芤大。伏暑之脈弦細而弱。故知其為伏暑而非癆瘵也。再左邊臥不著席。

水在肝也。乙酉三月廿六日

桂枝三錢

雲苓皮五錢

鬱

金一錢

半

夏五錢

生苡仁五錢

廣皮二錢 青蒿八分 旋覆花三錢 生薑三錢 香附三錢

白蔻仁二錢 大棗二枚 煮三杯分三次服。

此方服四帖寒熱滅去青蒿服之十帖全愈後以調理脾胃收功。

金氏<sup>三十歲</sup> 上年伏暑寒熱時發如瘧狀以通宣三焦立法補陰補陽皆妄

也。<sup>乙酉四月廿五日</sup>

半夏<sup>四錢</sup> 雲苓皮五錢 黃芩二錢 杏仁三錢 藿香梗三錢

生薑<sup>三片</sup> 青蒿<sup>八分</sup> 白蔻仁<sup>五分</sup> 大棗<sup>二枚</sup> 苡仁<sup>五錢</sup>

煮三杯分三次服。

伏暑愈後以平補中焦為要仍須宣通勿得粘滯。<sup>二月初五日</sup>

半夏<sup>三錢</sup> 雲苓塊五錢 蓮子五錢 苡仁<sup>五錢</sup>

益智仁<sup>一錢</sup> 生薑<sup>三片</sup> 廣皮<sup>二錢</sup> 煮三杯分三次服。

裘<sup>四十歲</sup> 酒客中虛濕重面色暗滯業已多日現在又感伏暑新涼頭脹便秘

糖舌白滑脈弦細。<sup>中虛寒濕可知</sup> 不能戒酒病斷不除蓋客症易除久病伏濕虛寒

難療也。<sup>乙酉八月初五日</sup>

雲苓皮<sup>一兩</sup> 杏仁<sup>三錢</sup> 藿香梗<sup>三錢</sup> 薑半夏<sup>六錢</sup> 青蒿<sup>二錢</sup>

白蔻仁<sup>三錢</sup> 生苡仁<sup>一兩</sup> 廣皮<sup>五錢</sup> 黃芩炭<sup>二錢</sup> 煮三杯分三次服。

頭脹。除去青蒿。七帖全愈。

陶五十歲伏暑。遇新涼而發。舌苔晄白。上加灰黑。六脈不浮不沉而數。誤與

發表。胸痞不食。此危症也。何以云危。蓋四氣雜感。又加一層。腎虛又加一

層。肝鬱又加一層。誤治又加一層。酒客中虛。何以克當。勉與河間之辛苦

寒法。一以通宣三焦。而以肺氣為主。望其氣化而濕熱俱化也。乙酉九月十九日

飛滑石錢五 杏錢四 藿香葉錢三 薑半夏錢五 苡錢五 仁錢五

廣鬱金錢三 雲苓皮錢五 黃錢三 芩錢三 眞雅連錢一 白蔻仁錢三

廣錢三 皮錢三 白通草錢五分 煮三碗。分三次服。

舌之灰苔化黃。滑而不燥。唇赤顴赤。脈之弦者化爲滑數。是濕與熱俱重

也。廿三日

滑錢二 石錢一 雲苓皮錢六 杏錢五 苡錢六 仁錢六 黃柏炭錢四

雅錢二 連錢二 半錢五 夏錢五 白蔻仁錢三 木錢三 通錢三 茵錢五 陳錢五

煮三碗。分三次服。

伏暑。舌之灰者化黃。茲黃雖退。而白滑未除。當退苦藥。加辛藥。脈滑甚重。

加化痰。小心復感爲要。廿一日

滑錢一 石錢一 雲苓皮錢五 鬱錢三 金錢三 杏錢五 仁錢五 小枳實錢三

薏 仁三錢

半 夏一兩

黃柏炭三錢

廣 皮三錢

苡 仁五錢

藿香梗三錢

煮三碗。分三次服。

伏暑雖退。舌之白滑未化。暑中之伏濕尚存也。小心飲食要緊。脈之滑大

者已減。是暑中之熱去也。無奈大小而不甚流利。是陽氣未充。不能化溼。

重與辛溫。助陽氣。化濕氣。以舌苔黃為度。十月初二日

半 夏六錢

白蔻仁研沖三錢

木 通二錢

杏 仁五錢

益智仁三錢

廣 皮五錢

苡 仁五錢

川椒炭三錢

乾 薑三錢

煮三碗。分三次服。

伏暑之外感者。因大汗而退。舌白滑苔。究未化黃。前方大用剛燥。苔未盡

除。務要小心飲食。毋使脾困。初六日

杏仁泥四錢

煨草果八分

川椒炭三錢

薑半夏五錢

蒼朮炭三錢

益智仁三錢

茯苓皮五錢

老厚朴二錢

白蔻仁三錢

生苡仁五錢

廣皮炭五錢

神麩炭三錢

煮三碗。分三次服。

薛氏四十歲 初因肝鬱。繼而內飲招外風為病。現在寒熱如瘧狀。又有伏暑

內發新涼外加之象。六脈弦細而緊。兩關獨大而浮。厥陰克陽明。醫者全

然不知病從何來。亦不究脈象之是陰是陽。一概以地黃等。陰柔補陰。以

陰藥助陰病。人命其何堪哉。勢已沉重。欲成噎食反胃。勉與兩和肝胃。兼

提少陽之邪外出法。乙酉九月廿四日

桂枝三錢

薑半夏六錢

苡仁三錢

杏仁三錢

旋覆花包三錢

青蒿一錢

白蔻仁二錢

香附三錢

生薑四錢

廣皮三錢

川椒炭二錢

煮三杯。分三次服。

寒熱減半。嘔止。舌苔滿黃。但仍滑耳。即於前方內加。

炒黃芩二錢

再服四帖。如二三帖寒熱止。去青蒿。如腹痛止。舌不滑不乾燥。去川椒

炭。加茯苓皮。五錢。

伏暑已解七八。疲飲肝鬱未除。下焦且有濕鬱。十月初六日

杏仁泥四錢

苡仁五錢

川萆薢五錢

旋覆花包三錢

香附三錢

通草一錢

白蔻仁三錢

雲苓皮五錢

晚蠶沙三錢

薑半夏五錢

廣皮二錢

煮三杯。分三次服。數帖而愈。

李十八歲 伏暑如瘧狀。脈弦數。寒熱往來。熱多於寒。解後有汗。與青蒿鱉甲

湯。五帖全愈。乙酉十二月初九日

圖廿七歲 伏暑內發。新涼外加。腹脹身熱。身胸痛脇痛。與柴胡桂枝各半湯。

丁亥九月初七日

雲苓皮錢五 桂枝錢三 鬱金錢二 薑半夏錢三 柴胡錢三

黃芩錢二 防己錢三 杏仁泥錢三 廣皮錢三 藿香梗錢三

煮三杯。分三次服。

伏暑新涼。昨用各半湯一帖。腹脹胸脇痛身痛已愈。今日頭痛已愈。今日

泄瀉。身熱寒多。按自利而渴者。屬太陰也。與五苓散。雙解表裏。初八日

桂枝錢四 雲苓皮錢五 苡仁錢五 猪苓錢三 益智仁錢二

木香錢二 澤瀉錢三 蒼朮炭錢二 廣皮錢三 煮三杯。分三次服。

伏暑新涼。以頭痛身熱而又泄瀉之。故用五苓散。雙解表裏。今日頭痛身

熱雖減。而泄瀉未止。咳嗽痰多。與開太陽。鹽湯明法。初九日

桂枝錢五 薑半夏錢五 苡仁錢五 猪苓錢四 雲苓皮錢五

廣皮錢三 澤瀉錢四 益智仁錢二 生薑片五 蒼朮錢三

煮四茶杯。日三夜一。分四次服。

泄瀉已止。熱退未淨。咳嗽嘔惡未平。頭偏右痛。兼有肝鬱。初十日

薑半夏錢五 苡仁錢五 旋覆花包三 雲苓皮錢五 炒炭黃芩一錢五分

香附錢三 桑葉錢三 蘇梗錢三 廣皮錢三 茶菊花錢三

煮三杯。分三次服。



伏暑身熱。咳嗽嘔惡。大便稀溏。兼有肝鬱。偏頭痛。舌絳口渴。腹微脹。濕中生熱。與苦辛淡法。日十一

雲苓皮錢六

滑石錢六

通草錢一

薑半夏錢五

苡仁錢五

廣皮錢五分

藿香梗錢三

蔻仁錢五分

生薑片錢三

黃芩炭錢三

煮三杯。分三次服。

伏暑未解。痰飲咳嗽太甚。胃不和。不寐。先與和胃令寐。治咳即愈。日十二

雲苓皮錢六

苡仁錢六

蘇梗錢四

薑半夏兩二

秫米合一

煮三杯。分三次服。

伏暑飲渴不寐。昨與半夏湯法。已寐。惟大便仍溏。咳未止。口渴甚。議渴者

與猪苓湯。加和胃止渴。去阿膠。以其滑膩也。日十三

飛滑石錢六

猪苓錢四

苡仁錢五

雲苓皮錢六

澤瀉錢四

蘇梗錢三

薑半夏錢六

煮三杯。分三次服。兩帖。

伏暑已愈大半。惟咳未盡除。渴未全止。暑中伏濕難清。濕中生熱。濕家之

渴。猪苓湯最合拍。宗前法而進之。日十五

飛滑石錢六

猪苓錢五

蘇梗錢三

雲苓皮錢六

澤瀉錢五

廣皮錢二

苡仁錢五

薑半夏錢五

甘草錢一

炒黃芩錢五分

煮三杯。分三次服。兩帖。

潘三十歲濕熱發黃。已愈六七。繼感勁金涼氣。頭暈而痛。身熱而嘔。伏暑漫

延三焦。與苦辛淡滲法化氣。氣化則濕熱俱化。庚寅九月初八日

飛滑石五錢 猪苓三錢 薄荷八分 薑半夏三錢 杏仁三錢

桑葉三錢 苦桔梗三錢 茵陳五錢 竹茹二錢 荆芥穗二錢

連翹二錢 橘皮二錢 白蔻仁一錢 煮三杯。分三次服。

伏暑中之濕熱。瀰漫三焦。舌苔滿佈重濁。脈弦。一以化氣為要。濕熱相搏。

徒治一邊無益也。十一日

猪苓五錢 雲苓皮五錢 茵陳五錢 澤瀉三錢 杏仁泥四錢

木通二錢 滑石六錢 薑半夏三錢 蔻仁一錢 苡仁五錢

黃柏炭二錢 廣皮一錢五分 煮四小茶杯。日三夜一。分四次服。

濕熱瀰漫三焦。前與化氣。昨日汗大出。今日大便通快。舌苔已化。惟小便未暢。餘熱未除。仍以化氣為要。十四日

滑石六錢 雲苓皮五錢 苡仁五錢 猪苓三錢 藿香梗三錢

木通二錢 半夏三錢 蔻仁一錢 杏仁三錢 生薑汁每盃沖三茶匙

煮三杯。分三次服。兩帖。

伏暑已解七八。餘熱未除。且有疲飲。日十七

雲苓塊連皮六錢

猪苓四錢

小枳實三錢

薑半夏六錢

杏仁四錢

藿香梗二錢

生苡仁五錢

廣皮三錢

白蔻仁一錢

煮三杯。分三次服。五帖。

伏暑諸症俱解。惟餘疲飲。少腹不爽。日廿二

雲苓塊五錢

焦小茴香三錢

廣皮三錢

薑半夏五錢

生苡仁五錢

杏仁泥三錢

生薑片三錢

小枳實一錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

奔氏三十歲暑傷兩太陰。身熱泄瀉。腹微脹痛。舌苔不甚黃。口不甚渴。煩燥

不安。晝夜不寐。脈洪數。業已十日以外。為難治。辛卯七月廿八日

連翹不去心五錢

雲苓皮五錢

杏仁三錢

生苡仁五錢

金銀花三錢

雅連一錢五分

猪苓三錢

藿香葉二錢

蔻仁一錢

半夏三錢

煮三杯。分三次服。

即於前方內減去連翹二錢。加半夏二錢。又加小枳實二錢。再服一帖。日廿九

脈小則病退。諸症漸減。惟心下痞悶。與瀉心法。八月初一日

半夏五錢

雲苓塊連皮五錢

乾薑三錢

炒黃芩三錢

生苡仁錢五

生薑汁每盃沖三小匙

焦黃連錢五分

小枳實錢五分

煮三杯。分三次服。

痞略減。仍不寐。微煩。初二日

連翹錢三

雲苓皮錢五

藿香半梗半葉二錢

銀花錢三

薑半夏錢五

蔻仁錢一

猪苓錢三

小枳實錢三

橘皮錢三

杏仁錢三

炒黃芩錢三

煮三杯。分三次服。

陽亢於上不寐。脈洪數。口渴。惡人與火。與闔陽明法。初三日

生石膏兩二

苡仁錢五

炒知母錢三

茯苓塊錢三

杏仁錢三

炒黃芩錢三

薑半夏錢三

蔻仁錢一

生甘草錢二

煮三杯。分三次服。

氣上阻胸。不寐。初四日

雲苓塊錢五

生苡仁錢五

白蔻錢一

旋覆花包三錢

杏仁泥錢三

薑半夏錢五

香附錢三

炒黃芩錢三

橘皮錢三

小枳實錢三

炒黃連錢五分

生薑汁每杯沖三小匙

煮三杯。分三次服。

即於前方內去旋覆花。減小枳實一錢。初五日

伏暑夾肝鬱。不寐。煩燥雖減而未除。初六日

雲苓皮錢五

滑石錢六

炒黃芩錢四

薑半夏錢五

苡仁錢五

炒黃連錢一 杏仁泥錢四 鬱金錢二 白豆蔻錢一 旋覆花包三

香附錢二 生甘草錢一 煮三杯分三次服。初七日

憂甚。即於前方內加代赭石錢六 再服四帖。初七日

伏暑已愈六七日。惟胸膈不舒。腹微痛。小便赤。餘邪未淨。初九日

扶苓錢五 炒黃芩錢三 鬱金錢二 苡仁錢五 白蔻仁錢一五分

香附錢三 半夏錢五 炒黃連錢八分 橘皮錢三 杏仁錢三

淡吳黃錢八分 煮三杯分三次服。

伏暑小愈後。又感燥金秋氣。胸痞痛。舌起新苔。六脈弦緊。與溫法。初十日

扶苓連皮 薑半夏錢五 淡吳黃錢二 桂枝錢三 生苡仁錢三

藿香梗錢三 良薑錢三 薑汁每盃沖三茶匙 川椒炭錢三 川連與萊黃同炒八分

廣皮錢三 煮三杯分三次服。

新感又減。惟夜間頭痛。十一日

桂枝錢三 焦白芍錢二 廣皮錢三 扶苓連皮 川椒炭錢三

吳黃錢二 半夏錢五 炒小茴香錢三 苡仁錢五 黃連與萊黃同炒八分

煮三杯分三次服。

頭痛已止。舊有之癥瘕。上攻胃口。有妨於食。脈弦緊。多汗。十二日

桂枝錢五 公丁香錢一 吳黃錢三 雲苓錢五 川椒炭錢三

半夏錢五 炒小茴香錢二 橘皮錢三 良薑錢二 黃連某黃同 炒八分

煮三杯。分三次服。外服化癥回生丹一錢。

胃中之痛與煩躁。係新受之燥氣。腹中痞塊上攻。係舊有之躁氣。十數年

之久。新舊並病。粹難速愈。十四日

茯苓塊錢五 吳黃錢三 川椒炭錢三 薑半夏錢五 栝婁皮錢二

黃連某黃同 炒一錢 高良薑錢二 廣皮錢三 歸橫鬚錢一 公丁香錢一

煮三杯。分三次服。二帖。外間服化癥回生丹一錢。

大用陽剛。胃痛稍減。未申後陰氣旺。猶不爽。胸痞陰邪。未盡退也。十六日

半夏錢五 茯苓塊錢五 厚朴錢三 吳黃錢二 川椒炭錢四

廣皮錢三 小枳實錢三 生薑錢三 良薑錢二 黃連吳黃黃酒 同炒一錢

公丁香錢一 煮三杯。分三次服。二帖。仍間服化癥回生丹錢一

燥氣之胸痞痛。與純剛大燥。七日方解。議病減者減其製。十八日

茯苓塊錢四 猪苓錢三 藿香梗錢三 薑半夏錢四 厚朴錢二

生苡仁錢二 川椒炭錢三 橘皮錢一 炒黃芩五分 煮三杯。分三次服。

三帖。仍間服化癥回生丹錢一

諸症向安。惟病後氣弱。舊有之癥瘕未除。法宜通補陽氣。兼之調和營衛。

日廿一

茯苓錢三 焦白芍錢二 廣皮錢三 桂枝錢三 柏子霜錢三

生薑片三 半夏錢三 白蔻仁錢一 膠去核二枚 苡仁錢三

川椒炭錢一 煮三杯。分三次服。四帖。

諸症皆愈。惟欲便先痛。便後痛減。當責之積重。且便後不爽。恐成滯下。俗

名痢疾。少用溫下法。日廿五

厚朴錢二 川椒炭錢二 熟附子製二錢 生大黃黃酒炒中黑一錢五分

廣皮炭錢三 良薑錢二 南查炭錢三 炒神麴錢三

煮二杯。分二次服。服一帖。如仍痛。又服一帖。

陰邪愈後。兼有癥瘕。無補陰之理。即陽藥中之守補者。亦不可用。日廿九

茯苓錢五 姜半夏錢五 橘皮錢三 桂枝錢三

焦白芍錢三 生薑片三 苡仁錢五 炒小茴香錢三

煮三杯。分三次服。

服二帖後。凡五錢。改作三錢。凡三錢。改作二錢。再服三五帖。俟大能飲

食。早晚各服化癥回生丹一錢。以腹中癥瘕化盡為度。

俞十九歲 伏暑誤表十數劑之多。又誤下十數劑之多。從古無此治法。以致

正虛邪實。泄瀉不止。熱仍未退。舌苔白滑。脈弦細數急。咳嗽喘急。勉與宣

通肺氣。蓋肺主氣。氣化則濕熱俱化。萬一邪退。再議補正。癸巳九月初五日

生石膏錢八 猪苓錢五 薑半夏錢五 茯苓皮錢五 杏仁錢二

炒黃芩錢三 生苡仁錢五 橘皮錢三 白蔻仁錢一 煮三杯。分三次服。

外間服紫雪錢一 分三次。涼開水調。

伏暑誤治前與宣通三焦。仍以肺氣為主。今日諸多見效。熱亦退。微見汗。

惟咳嗽未除。初七日

茯苓皮錢五 猪苓錢五 炒於朮錢三 姜半夏錢五 杏仁錢三

白蔻仁錢一 生苡仁錢五 橘皮錢三 生薑汁每盃沖三小匙 煮三杯。分三次服。

二帖收功。

溼溫

王三十歲 證似溫熱。但心下兩脇俱脹。舌白。渴不多飲。嘔惡噯氣。則非溫熱

而從溼溫例矣。用生薑瀉心湯之苦辛通降法。壬戌四月廿二日

茯苓塊錢六 生薑兩一 古勇連錢三 生苡仁錢五

半夏 錢八 炒黃芩錢三 生香附錢五 乾薑錢五



頭煎水八杯。煮三茶杯。分三次服。約二時一杯。二煎。用三杯水煮一茶  
杯。明早服。

心下陰霾已退。溼已轉陽。應清氣分之溼熱。廿三日

煨石膏錢五 連翹錢五 廣鬱金錢三 飛滑石錢五 銀花錢五

藿香梗錢三 杏仁泥錢三 蘆根寸五 黃芩炭錢三 古勇連錢二

水入碗。煮成三碗。分三次服。渣再煮一碗服。

斑疹已現。氣血兩燔。用玉女煎合犀角地黃湯法。廿四日

生石膏一兩五錢 細生地錢六 犀角錢三 連翹兩一 苦桔梗錢四

牛蒡子錢六 知母錢四 銀花兩一 炒黃芩錢四 元參錢八

人中黃錢一 薄荷錢三 水入大碗。煮成四碗。早中晚夜分四次服。

面赤舌黃大渴。脈沈肢厥。十日不大便。轉矢氣。譫語。下症也。議小承氣湯。

廿五日

生大黃錢八 小枳實錢五 厚朴錢四

水入碗。煮成三碗。先服一碗。約三時得大便。止後服。不便再服第二碗。

廿五日

又 大便後宜護津液。議增液法。

麥冬不去心 一兩

細生地一兩

連翹三錢

元參四錢

炒甘草二錢

金銀花三錢

煮三碗分三次服能寐不必服

陷下之餘邪不清仍思涼飲舌黃微以調胃承氣湯小和之廿六日

生大黃二錢

元明粉八分

生甘草一錢

頭煎一杯二煎一杯分兩次服

昨日雖大解而不爽脈猶沈而有力身熱不退而微微渴甚面赤猶宜微

和之但恐犯數下之戒議增液承氣合玉女煎法廿七日

生石膏八錢

知母四錢

黃芩三錢

生大黃三錢另煎分三次每次沖一分

煮成三杯分三次服若大便秘稀而不紅黑後服止大黃

大便雖不甚爽今日脈浮不可下渴思涼飲氣分熱也口中味甘脾熱甚

也議用氣血兩燔例之玉女煎加苦藥以清脾瘴廿八日

生石膏三兩

元參六錢

知母六錢

細生地一兩

麥冬不去心 一兩

古勇連三錢

黃芩三錢

煮四碗分四次服得涼汗

止後服不渴亦止服

大用辛涼微甘合苦寒斑疹續出若許身熱退其大半不得再用辛涼重

劑議甘寒合化陰氣加辛涼以清斑疹廿九日

連翹錢三 細生地錢五 犀角錢三 銀花錢三

天花粉錢三 黃芩錢三 麥冬錢五 古勇連錢二

薄荷錢一 元參錢四 煮三碗分三次服渣再煮一碗服。

大熱雖減餘焰尚存口甘弄舌面光赤色未除猶宜甘寒苦寒合法五月初一日

連翹錢三 細生地錢六 元參錢三 銀花錢三

炒黃芩錢三 丹皮錢四 麥冬錢一 古勇連錢一

水八碗煮三碗分三次服。

即於前方內加暹羅犀角二錢知母一錢五分煮法服法如前初二日

邪少虛多宜用復脈去大棗桂枝以其人本係酒客再去甘草之重甘加

二甲丹皮黃芩初二日

麥冬錢一 大生地錢五 阿膠錢三 丹皮錢五 炒白芍錢六

炒黃芩錢三 炙鱉甲錢四 牡蠣錢五 麻仁錢三

頭煎三碗二煎一碗日三夜一分四次服。

此甘潤化液復微苦化陰又苦甘鹹寒法。

尚有餘邪未盡以甘苦合化入陰搜邪法初四日

元參錢二 細生地錢六 知母錢二 麥冬錢一 冬錢八 生鱉甲錢八

粉丹皮錢五 黃芩錢二 連翹錢三 青蒿錢一 銀花錢三

頭煎三碗。二煎一碗。分四次服。

邪少虛多。仍用復脈法。初九日

大生地錢六 元參錢四 生白芍錢六 生阿膠錢四 麥冬錢八

生鱉甲錢六 火麻仁錢四 丹皮錢四 炙甘草錢三

頭煎三茶杯。二煎一茶杯。分四次服。

陳三十歲 面赤目赤。舌苔滿佈如積粉。至重之溫病也。最忌發表。且用辛涼。

乙丑四月 初七日

苦桔梗錢六 銀花錢八 香豆豉錢五 連翹錢八 藿香葉錢五

廣鬱金錢四 荊芥穗錢五 杏仁錢五 生甘草錢三 牛蒡子錢五

薄荷錢四 共為粗末。分八包。一時許服一包。蘆根湯煎。去渣服。

面赤目赤。舌苔滿佈。至重之溫熱病。脈反緩而弦。外熱反不盛。口反不渴。

肢微厥。所謂陽症陰脈。乃本身陽氣不能十分充滿。不肯化解耳。茲與化

邪法。初九日

廣鬱金錢二 杏仁錢二 藿香錢二 苦桔梗錢一 荊芥穗錢二

連翹心錢五分 銀花錢二 青蒿錢一 香豆豉錢五分

煮兩杯。今晚一帖。明早一帖。

溫病未有不渴而燥者。今舌苔滿佈而不渴。雖黃而滑。脈緩甚。熱不壯。血夾濕之故也。議從濕溫例。治用苦辛寒法。日十一

生茅朮三錢 杏仁泥三錢 藿香二錢 銀花二錢 炒黃芩一錢

白蔻仁一錢 雅連一錢 連翹三錢 廣皮二錢 鬱金三錢

煮兩杯。今晚一帖。明早一帖。

張三十歲 六脈弦細而勁。陰寒證脈也。咳嗽稀痰。陰濕咳也。舌苔刮白而滑。

陰舌苔也。嘔吐泄瀉。陰濕症也。雖發熱。汗出而解。乃濕中兼風。病名濕溫。

天下有如是之陰虛症乎。丙寅四月初八日

茯苓塊四錢 桂枝三錢 炒白芍二錢 薑半夏五錢 於朮三錢

廣皮炭二錢 生苡仁五錢 澤瀉四錢 生薑汁每盃沖三小匙 煮三杯。分三次服。

痰飲兼風。誤治成壞症。前用溫平逐飲除風。諸惡症俱減。惟寒少熱多。熱

後汗出未除。現在面赤口渴。暮夜譫語。有風化熱之象。但六脈尚弦。未盡

轉陽也。再咳嗽則胸脇小腹俱微痛。又有金克木之象。初十日

桂枝三錢 生石膏六錢 青蒿三錢 半夏五錢 茯苓塊四錢

生薑片三錢 杏仁三錢 焦白芍二錢 大棗去核二枚 猪苓二錢

炙甘草二錢 煮三杯分三次服。

脈弦數。午後潮熱。前有白苔。茲變為黃。嘔惡口渴。頗有濕瘧之象。但咳嗽便溏。又有濕溫之形。伏邪內陷所致。最難清理。十四日

生石膏八錢 桂枝四錢 生苡仁五錢 飛滑石六錢 知母三錢

杏仁泥三錢 茯苓皮五錢 青蒿二錢 炙甘草二錢 煮三杯分三次服。

某失其年月並年歲 六脈俱弦而細。右手沈取數而有力。面色淡黃。目白睛黃。自春

分午後身熱。至今不愈。曾經大瀉後。身軟不渴。現在雖不泄瀉。大便久未

成條。午前小便清。午後小便赤濁。與濕中生熱之苦辛寒法。初十日

飛滑石六錢 茵陳四錢 蒼朮炭三錢 雲苓皮五錢 杏仁三錢

晚蠶沙三錢 生苡仁五錢 黃芩二錢 白通草一錢五分 海金沙四錢

山連一錢 煮三碗分三次服。

於前方內去蒼朮炭加石膏。增黃連黃芩。十三日

文三十歲 濕溫。舌苔白滑厚濁。脈象模糊。或弦細而濡。用通宣三焦法。先寒

熱。繼微熱。後不熱。更方三十餘帖。大抵不出滲濕之苦辛淡法。四十五日

以後方解。解後以兩理脾胃收功。丁卯七月初二日

中燥

傅七十歲感受燥金之氣。腹痛泄瀉嘔吐。現在泄瀉雖止。而嘔不能食。腹痛

仍然。舌苔白滑。肉色刮白。宜急溫之。兼與行太陰之溼。乙酉四月十九日

雲苓塊錢五 吳 萸錢二 川椒炭錢三 薑半夏錢五 良 薑錢二

益智仁錢二 生苡仁錢五 廣 皮錢三 公丁香錢一 煮三杯。分三次服。

背仍痛。於原方加良薑一錢。吳萸一錢。桂枝五錢。廿二日

已效。陰氣未退。再服三帖。分四日服完。廿七日

已服三帖。痛減。嘔與泄瀉俱止。減川椒吳萸良薑之半。又服六帖。五月初三日

陰未化。陽自不復。且心下堅大如盤。脈如故。再服。十三日

謝四十歲燥金感後。所傷者陽氣。何得以大劑熟地補陰。久久補之。胃陽困

頓。無怪乎不能食而嘔矣。六脈弦緊。豈不知脈雙弦者寒乎。乙酉四月廿一日

半 夏錢五 雲苓塊錢五 廣 皮錢三 苡 仁錢五 川椒炭錢三

生 薑錢三 乾 姜錢二 公丁香分八 煮三杯。分三次服。

於前方內加桂枝三錢。增乾薑一錢。減川椒炭之半。五月初二日

嘔痛皆止。飯食已加。惟肢軟無力。陽氣太虛。加甘草合前辛藥。為辛甘補

陽方法。十一日

復感燥氣。嘔而欲瀉。於前方去甘藥加分量自愈。六脈弦細如絲。陽微之

極。廿一日

桂枝錢五

淡吳萸錢三

半夏錢五

雲苓錢五

川椒炭錢三

廣皮錢三

乾薑錢三

公丁香錢五分

生薑錢五

煮三杯。分三次服。

諸症悉減。脈稍有神。於原方中去吳萸丁香之剛燥。加苡仁之平淡。陽明

從中治也。廿七日

李四十歲胃痛脇痛。或嘔酸水。多年不愈。現在六脈弦緊。皆起初感受燥金

之氣。金來克木。木受病未有不克土者。土受病之由來。則自金始也。此等

由外感而延及內傷者。自唐以後無聞焉。議變胃而不受胃變法。即用火

以克金也。又久病治絡法。乙酉六月十六日

雲苓錢五

生苡仁錢五

枳實錢四

半夏錢五

川椒炭錢三

生薑錢五

廣皮錢三

公丁香錢一

煮三杯。分三次服。

復診。仍用原方。廿三日

現在胃痛脇痛。吐酸之症不發。其六脈弦緊不變。是胸中絕少太和之氣。

議轉方用溫平。剛燥不可以久任也。五月初二日

桂枝錢四

生苡仁錢五

廣皮錢三

半夏錢五

雲苓塊錢五

生薑錢三

白芍錢四

炙甘草錢二

大棗去核二枚

乾薑錢二



煮三杯。分三次服。無弊可多服。

診視已回陽。原方去乾薑減桂枝之半。日十一

復診脈仍緊。加益智仁。餘仍照原方。日廿四

桂枝二錢 焦白芍四錢 廣皮三錢

雲苓五錢 益智仁二錢 生薑三錢

半夏五錢 炙甘草二錢 大棗去核二枚

苡仁五錢 煮三杯。分三次服。

余五十歲胃痛脇痛。脈雙弦。午後更甚。陰邪自旺於陰分也。乙酉五月初二日

半夏五錢 川椒炭三錢 吳萸二錢 苡仁五錢

公丁香五分 香附三錢 降香三錢 山查炭二錢

廣皮三錢 青皮二錢 青橘葉三錢

煮三杯。分三次服。接服霹靂散。

診視病稍減。脈仍緊。加小枳實三錢。減川椒炭一錢。去山查炭青橘葉。日十七

脈之緊者稍和。腹痛已止。惟頭暈不寐。且與和胃令寐。再商後法。日廿四

半夏一兩 小枳實三錢 雲苓五錢 苡仁一兩

煮三杯。分三次服。以得寐為度。如服一二帖仍不寐。加半夏至一二兩。再

服一帖。

譚四十歲

感受金涼。胸痺頭痛。脈弦細而緊。乙酉五月十六日

桂枝三錢

薑半夏三錢

廣皮三錢

薤白三錢

生苡仁五錢

生薑五片

厚朴二錢

川椒炭三錢

大棗去核二枚

良薑二錢

煮三杯。分三次服。

燥氣雖化。六脈俱弦。舌苔白滑。與陽明從中治。用苦辛淡法。忌酸甘。日八

薑半夏四錢

廣皮三錢

生苡仁五錢

雲苓塊四錢

香附三錢

益智仁二錢

川椒炭二錢

乾薑一錢五分

白蔻仁一錢五分

煮三杯。分三次服。

脈仍弦緊。熱藥難退。咳嗽減。效不更方。右脇微痛。於前方內增香附三錢。

日廿一

右脇痛甚。脈弦緊如故。於前方內加

旋覆花包三錢

降香三錢

蘇子霜三錢

脇痛咳嗽皆止。痰尚多。脈弦未和。於前方去香附蘇子霜。旋覆花降香。加

桂枝四錢

乾薑一錢五分

以充其陽氣。行痰飲。和弦脈。

霹靂散方

主治中燥吐瀉腹痛。甚則四肢厥逆。腿痛轉筋。肢麻。起臥不安。煩躁不寧。再甚則六脈全無。陰毒發斑。疔痕等症。並一切凝寒固冷聚

安。煩躁不寧。再甚則六脈全無。陰毒發斑。疔痕等症。並一切凝寒固冷聚

積之疾。寒輕者不可多服。寒重者不可少服。以愈爲度。對症宜隨時頻服。但非實在純受濕燥寒三氣陰邪者。不可服。孕婦對症者不忌。

桂 枝六兩 降香末五兩 烏 藥三兩 薤 白四兩 萹澄茄五兩

吳 萸四兩 苡 仁五兩 川椒炭五兩 乾 薑三兩 附 子三兩

青木香四兩 檳 榔二兩 防 己三兩 五靈脂二兩 細 辛二兩

良 薑三兩 公丁香二兩 雄 黃五兩 草 果二兩 水菖蒲二兩

(方論)按內經有五疫之稱。五行偏勝之極。皆可致疫。雖癘氣之至。多見大症。而燥金寒濕之疫。亦復時有。蓋風火暑三者爲陽邪。與穢濁異氣相參則爲溫癘。濕燥寒三者爲陰邪。與穢濁異氣相參則爲寒癘。現在見症多有肢麻轉筋。手足厥逆。吐瀉腹痛。脇肋疼痛。甚至反惡熱而大渴思涼者。經謂霧傷於上。濕傷於下。此症乃燥金寒濕之氣。直犯筋經。由大絡別絡內傷三陰臟真。所以轉筋入腹。卽死也。既吐且瀉者。陰陽逆亂也。諸痛者。燥金寒水之氣所搏也。其渴思涼飲者。少陰篇謂自利而渴者屬少陰。虛則少陰真水受尅。陰火上炎。故飲水求救也。其頭面赤者。陰邪內逼於上。陽不能降安其位。所謂戴陽也。其周身惡熱喜涼者。陰邪蟠踞於內。陽氣無附。欲散且脫也。諸斑

疹者。陰邪凝結於血絡。同於陽火薰灼也。陰病反見陽症。所謂水極似火。其受邪尤重也。諸陽症畢現。有一認定爲陰寒者。然必當臍腹痛甚拒按者。方謂陽中見純陰。乃爲真陰之症。否則必有轉筋腿痛等寒症。此處斷不可誤。故立方薤苳溫三陰經剛燥苦熱之品。急溫臟真。保住陽氣。又經謂陽明之上中見太陰。又謂陽明從中治。且重用芳香急驅穢濁。一面由臟真而別絡大絡外出筋經。經絡以達皮毛。一面由臟絡腑絡以痛六腑。外達九竅。俾穢濁陰邪。一齊立解。大抵皆扶陽抑陰。取義於雷霆奮迅。所謂離照當空。羣陰退避也。

(後注)再此證自唐宋以後。醫者皆不識燥氣所干。凡見前證。俗名曰痧。近時竟有著痧症書者。捉風捕影。雜亂無章。害人不淺。卽以病論。未有不干天地之氣。而漫然成痧者。究竟所感何氣。不能確切指出。故立方毫無準的。其誤皆由前人謂燥不爲病。又有燥氣化火之說。雖亦爲其所誤。故初刻溫病條辨時。雖再三疑慮。多方辨難。見於雜說篇中。而正文祇有化氣之火證。無勝氣之寒證。其燥不爲病之誤。誤在陰陽應象大論篇中脫秋傷於燥一條。將在夏傷於濕。又錯秋傷於濕。以爲竟無燥證矣。不知天元紀氣交變。五運行五常政六微旨

諸篇。平列六氣。燥氣之爲病與諸氣同。何嘗燥不爲病哉。經云。風爲百病之長。按風屬木。主仁。大易曰。元者善之長也。得生生之機。開生化之源。尙且爲病多端。况金爲殺厲之氣。歐陽氏曰。商者傷也。主義主收。主刑。主殺。其傷人也。最速而暴。竟有不終日而死者。班目擊神傷。故再三致意。而後補於原書云。

右藥共爲細末。開水和服。大人每服三錢。病重者五錢。小人減半。再病甚重者。連服數次。以痛止厥回瀉止筋不轉爲度。

趙三十歲

感受燥金之氣。腹痛甚。大嘔不止。中有蓄水。誤食水果。乙酉七月廿四日

半 夏兩一

川椒炭錢六

烏梅錢三

雲苓錢五

公丁香錢三

廣皮錢五

吳萸錢四

小枳實錢三

生薑兩一

良薑錢四

以五碗水煮成二碗。渣再煮三碗。另以生薑一兩煮湯一碗。候藥湯涼。先服薑湯一口。接服湯藥一口。少停半刻。俟不吐。再服第二口。如上法。以嘔止腹不痛爲度。

燥氣腹痛雖止。當臍仍堅。按去微痛。舌苔微黃而滑。周身筋骨痛。脈緩。陽明之上中見太陰。當與陽明從中治例。廿五日

桂枝錢六

焦白芍錢三

苡仁錢五

雲苓錢六

川椒炭錢二

防己三錢 半 夏五錢 公丁香一錢 生薑三錢 煮三杯。分三次服。  
服此身痛止。

脈小於前。身痛已止。六脈未和。舌黃苔白。廿六日

雲苓五錢 大腹皮三錢 厚朴一錢五分 半夏五錢 川椒炭一錢

廣皮三錢 苡仁五錢 白蔻仁一分 生薑三錢 煮三杯。分三次服。

腹痛如故。不寐。加半夏一兩。廿八日

太陽痺。八月初一日

飛滑石六錢 桂枝六錢 片薑黃三錢 雲苓塊五錢 杏仁五錢

晚蠶沙三錢 生苡仁五錢 防己四錢 白通草一錢 煮三杯。分三次服。

腹脹停飲。於前方去滑石。加苦辛之通。初六日

大腹皮三錢 厚朴三錢 廣皮三錢 小枳實三錢

六脈俱弦。胃口不開。腹脹肢倦。宜通六腑。即勞者溫之之法也。初十日

雲苓塊五錢 桂枝六錢 大腹皮三錢 薑半夏五錢 厚朴二錢

小枳實二錢 益智仁三錢 廣皮五錢 川椒炭三錢 煮三杯。分三次服。

服此方五帖而愈。

張女十五歲 燥金之氣直中入裏。六脈全無。殭臥如死。四肢逆冷。已過肘膝。

腿痛轉筋。與通脈四逆湯。加川椒吳萸公丁香一大劑。厥回脈出一晝夜。次日以食粥太早。復中。宛如前症。脈復厥體厥又死去矣。仍用前方。重加溫熱一劑。厥回其半。又二劑而復活。後以補陽收功。

顧

五十歲

直中燥氣。嘔少瀉多。四肢厥逆無脈。目開無語。睛不轉。與通脈四逆湯。加人參川椒吳萸丁香一劑而效。三劑脈漸復。重與補陽而愈。

楊室女

五十歲

脇痛心煩懊懣。拘急肢冷。脈弦細而緊。欲坐不得坐。欲立不得立。欲臥不得臥。隨坐即欲立。剛立又欲坐。坐又不安。一刻較一刻脈漸小。立刻要脫。與霹靂散不住灌之。約計二時。服散約計四兩而稍定。後與兩和肝胃而全愈。

鄭

二十歲

先是三月初九日得太陽中風。與桂枝湯已愈。十二日晚已臥。下身有微汗。因廚房不戒於火。止穿小汗衫一件。未著襪。出外救火。俟火熄復臥。一覺。身微熱惡寒。腹中脹痛。脈弦數。與桂枝柴胡各半湯。汗出稍輕。究不能解。以後外雖化熱。面赤汗多。如溫病狀。以當臍之痛未休。舌白不燥。斷不敢用辛涼。而辛溫之藥。或進或退。十日不解。至二十四日反重。用溫熱反佐頂高黃連三錢。次日表症裏症。一齊俱解如失。後與調理脾胃兩陽而全愈。

多十六歲燥淫於內。表裏兼病。面赤身熱。舌黃燥。口渴。六脈洪數而緊。經謂脈盛大以濇者。寒也。大便秘。小便短。通體全似火症。只有當臍一點痛。拒按。此謂陽中之陰。乃為真陰。與苦熱芳香一劑而熱退。減分量二帖而病全愈。

華二十歲感受燥金之氣。陽明之上中見太陰。胸痛脇痛。腹脹泄瀉。飲咳。皆

太陰病也。誤服寒涼。勢已重大。勉與開太陽合陽明法。丁亥九月十三日

- 雲苓皮錢五
- 猪苓錢三
- 厚朴錢二
- 薑半夏錢五
- 澤瀉錢三

- 乾薑錢二
- 桂枝錢三
- 川椒炭錢三
- 廣皮錢四
- 廣木香錢一五分

煮三杯。分三次服。

仍服一帖。十四日

燥症誤用涼藥。泄瀉不止。右脈如無。左脈弦細而緊。不寐。痰飲。咳嗽仍舊。

惟胸脇痛止。十五日

- 雲苓皮錢六
- 猪苓錢四
- 大腹皮錢三
- 薑半夏錢八
- 澤瀉錢四

- 廣木香錢三
- 南蒼朮錢二
- 桂枝錢四
- 廣陳皮錢三
- 煮四杯。分三次服。

再服一帖。十六日

諸症皆退。惟餘咳嗽口渴。與辛能潤法。十七日



雲苓皮五錢 蘇梗三錢 杏仁泥三錢 薑半夏六錢 乾薑二錢

五味子二錢 生苡仁五錢 廣皮三錢 炙甘草三錢 煮三杯分三次服

於前方內減五味子一錢。加炙甘草一錢。改雲苓皮為塊。日十八

咳嗽已止。脈靜身涼。惟舌白口渴。尚有伏飲。調理飲食要緊。藥與通補脾

胃兩陽。日十九

雲苓塊三錢 益智仁二錢 廣皮二錢 薑半夏三錢 蒼朮炭二錢

生姜三片 生苡仁五錢 炙甘草二錢 大棗去核二枚 煮三杯分三次服

以後通補中焦可收功。日二十

李氏四十歲 大脈陽微之極。弦細而緊。內而飲聚。外而痺痛。兼之內苛。飲食

減少。得食嘔。乃內傷生冷。外感燥金之氣而然。以急救三焦之陽。與陽明

之陽為要。丁亥九月廿八日

枝枝三錢 薑半夏六錢 乾薑三錢 降香三錢 雲苓塊連皮五錢

苡仁五錢 吳萸一分 川椒炭三錢 廣皮三錢 薤白三錢

公丁香一錢 生薑五片 煮四杯。日三夜一。分四次服。二帖。

陽虛已久。急難猝復。餘有原案。日三十

薑半夏一兩 雲苓皮五錢 厚朴三錢 小枳實三錢 薤白三錢

川椒炭三錢 廣皮五錢 乾薑三錢 生薑五片 公丁香二錢  
 煮三杯分三次服三帖。

如是剛燥。脈仍弦緊。受病太深之故。於前方內去薤白。加川椒炭五錢再服三帖。十月初三日

陽氣稍復。痰飲上冲。咳聲重濁。晝夜不寐。暫與靈樞半夏湯和胃令得寐。初六日

薑半夏二兩 廣皮五錢 秫米一合 雲苓塊五錢

甘瀾水十杯。煮成四杯。日三夜一。分四次服。二帖。

陽微。飲聚不寐。與半夏湯已得寐。但六脈無神。陽難粹復。病久而又誤用

陰柔苦寒之故。一以復陽為要。初八日

薑半夏八錢 桂枝五錢 川椒炭三錢 雲苓塊六錢 乾薑三錢

小枳實二錢 杏仁泥三錢 廣皮三錢 炙甘草二錢

甘瀾水八杯。煮三杯。分三次服。二帖。

脈之緊者已和。諸見症亦減。但脈仍太細。陽未全復。初十日

薑半夏五錢 桂枝三錢 焦白芍三錢 雲苓塊五錢 乾薑二錢

川椒炭二錢 小枳實五分 炙甘草二錢 廣皮炭三錢

煮三小茶杯。分三次服。四帖。

胃不和則臥不安。飲以半夏湯。脈又弦緊。胃陽為痰飲所困。皆日前過傷生冷之故。十四日

薑半夏二兩

公丁香一錢五分

秫米一合

川椒炭三錢

煮三杯。分三次服。二帖。

痰飲喘咳不得臥。周身覺冷。脈弦緊。陽虛極矣。十七日

薑半夏一兩

桂枝五錢

乾薑四錢

小枳實五錢

杏仁四錢

廣皮五錢

川椒炭三錢

煮三杯。分三次服。

此方服至二十餘帖。或作或止。後以蠲飲丸收功。

某燥金克木。由厥陰外犯太陽。季脇偏右攻。腰痛。不發於春夏而發於冬令。不發於已前而發於午後。六脈弦數。其為陰邪留滯絡中。沈着不移。可知。以故久而不愈。此症當於絡中求之。戊子十月二十日

霹靂散四兩

每服二錢。每日早中晚三次開水和服。以清絡中之邪。

又金匱謂凡病至其年月日時復發者當下之。此症病發時。不得大便。乃肝主疏泄。肝受病則不得疏泄。但不可寒下耳。

天台烏藥散一錢 加巴豆霜六厘。以泄絡中沈着之伏邪。庶可拔其根也。

瑞二十歲 感受燥金之氣。表裏兼受。與各半湯。加苦溫甘熱法。戊子八月十八日

桂枝五錢 薑半夏四錢 廣皮三錢 柴胡三錢 川椒炭三錢

生薑二錢 吳黃三錢 炙甘草一錢 大棗去核二枚 黃芩三錢

煮三杯。分三次服。

十九至廿二日誤服他人苦寒藥。今議陽明從中治。燥中見濕。故宗其法。

廿三日

桂枝木五錢 猪苓三錢 淡吳黃三錢 薑半夏四錢 川椒炭存性三錢

澤瀉三錢 雲苓皮六錢 乾薑三錢 炒真山連二錢 蒼朮炭三錢

煮三杯。分三次服。

大脈俱弦。怯寒泄瀉。表裏三陽皆虛。仍與陽明從中治法。廿四日

桂枝五錢 姜半夏五錢 吳黃三錢 猪苓三錢 雲苓塊連皮六錢

乾姜三錢 澤瀉三錢 川椒炭三錢 廣皮二錢 蒼朮三錢

煮三杯。分三次服。

燥症本屬陰邪。誤用大苦大寒。致傷胃陽。晝夜無眠。與胃不和則臥不安。

例之半夏湯。廿五日

姜半夏二兩 秫米二合 急流水八杯。煮取三杯。分三次服。二帖。

有轉機。仍以和胃爲要。廿七日

雲 苓 牛塊半皮五錢

姜半夏 兩一

秫 米 合一

廣 皮 三錢

小枳實 二錢

姜 汁 每杯沖三茶匙

煮三杯。分三次服。一二帖。

胃不和兩用半夏湯和胃。已得眠食。腹中疝痕未消。微痛脈弦。夜間身微

熱。七日不大便。小便短赤。與辛通苦降淡滲法。廿九日

姜半夏 六錢

青 皮 二錢

公丁香 七分

小茴香 三錢

炒山連 一錢五分

吳 萸 三錢

川椒炭 三錢

廣 皮 三錢

煮三杯。分三次服。

腹脹甚。於前方內加

生苡仁 五錢

半 夏 二錢

炒山連 五分

厚 朴 三錢

雲苓皮 三錢

再服二帖。分量加則力更進。

於前方內去丁香五分。山連五分。仍服一二帖。初三日

疝痕寒熱。俱未盡除。初五日

姜半夏 八錢

吳 萸 三錢

炒小茴香 三錢

雲苓塊 五錢

厚 朴 二錢

青 蒿 二錢

川椒炭 三錢

桂枝尖 三錢

檳榔剪錢一 公丁香錢五

廣皮錢三

煮三杯分三次服。

服此方二帖。方見大效。

前日大用剛熱。下焦方知藥力。其中寒甚可知。猶宜溫熱。兼之透絡。初七日

桂枝錢三 炒小茴香錢三

厚朴錢二

半夏錢五

川椒炭錢三 檳榔剪錢一

青蒿分八

吳萸錢三

公丁香錢一  
五分

廣皮錢三

良薑錢二

煮三杯分三次服。二帖。

檀氏三十歲 燥金克木。連少腹久痛不休。腿脚俱痛。兼有盜飲。與陽明從中

治法。乙丑正月十五日

姜半夏錢五

雲苓半塊半  
皮六錢

淡吳萸錢三

川椒炭錢六

益智仁錢三

良薑錢三 薑錢三

公丁香錢一  
五分

廣皮錢三

煮三杯分三次服。七帖。

瘧

吳廿五歲 但寒不熱。似乎牝瘧。然渴甚。皮膚捫之亦熱。乃伏暑內發。新涼外

加。熱未透出之故。仍用苦辛寒法。加以升提。癸酉七月十六日

飛滑石錢三

花粉錢二

藿香葉錢二

杏仁泥錢三

知母錢一

廣鬱金錢二

生苡仁錢三

青蒿錢一

白蔻仁錢二

老厚朴錢二

黃芩錢一

煮三杯。分三次服。

但寒不熱之瘧。昨用升提已出陽分。渴甚。脈洪數甚。熱反多。昨云熱邪深伏。未曾透出。不得作牝瘧看。非虛言也。用苦辛寒重劑。十七日

生石膏錢八

厚朴錢三

廣鬱金錢三

飛滑石錢三

知母錢二

白蔻仁錢三

杏仁粉錢五

黃芩錢二

生甘草錢一

藿香梗錢三

煮三杯。分三次服。

伊氏二十歲。妊娠七月。每日午後先寒後熱。到戌時微汗而解。已近十日。此

上年伏暑成瘧。由初春升發之氣而發。病在少陽。與小柴胡法。丙寅正月初七日

柴胡錢五

姜半夏錢四

生薑錢三

人參錢二

炙甘草錢二

大棗去核二枚

黃芩錢三

煮三杯。分三次服。

一劑寒熱減大半。第三日用前方三分之一全愈。

朱三十歲。體厚本有小腸寒溼。糞後便血。舌苔灰白而厚。中黑滑。嘔惡不食。

但寒不熱。此濕瘧也。與切法。庚申八月廿五日

茯苓塊錢五

生草果錢三

熟附子錢一

生蒼朮錢五

杏仁錢三

檳榔錢三

黃芩炭錢三

生苡仁錢五

煮三杯。分三次服。

前方服三帖而病勢漸減。舌苔化黃減其製。再服三帖而寒來甚微。一以理脾為主。廿八日

姜半夏三錢

白蔻仁二錢

薏苡仁二錢

炒於朮三錢

廣皮三錢

黃芩炭二錢

益智仁二錢

煮三杯。分三次服。服七帖

而胃開。

孫四少陰三瘧。二年不愈。寒多熱少。脈弦細。陽微損及入脈。與通補奇

經丸四錢。服完全愈。

蕭三少陰三瘧。久而不愈。六脈弦緊。形寒嗜臥。發時口不知味。不渴。腎

氣上泛。面目黧黑。與扶陽湯法。

毛鹿茸

生剉未先用  
酒煎三錢

桂枝三錢

當歸三錢

熟附子二錢

人參一錢

蜀漆二錢

煮三杯。分三次服。四帖。

鄭五脈雙弦。伏暑成瘧。間三日一至。舌苔白滑。熱多寒少。十月之久不

止。邪已深入。急難速出。且與通宣三焦。使邪有出路。勿得驟補。乙酉四月十九日

雲苓皮五錢

知母三錢

杏仁泥二錢

生苡仁五錢

炒黃芩二錢

青蒿二錢

藿香梗三錢

姜半夏三錢

白蔻仁二錢

煮三杯。分三次服。

加青蒿一錢。白蔻仁一錢。服四帖。廿六日



脈緊汗多加桂枝三錢服二帖。五月初四日

脈已活動色已華寒大減熱亦少減共計減其半汗至足底時已早至八刻議去青蒿加黃芩一錢舌苔雖減而仍白餘藥如故再服四帖。初六日

三瘧與宣三焦右脈稍大熱多汗多舌苔之白滑雖薄而未盡化濕中生熱不能驟補與兩清濕熱。十四日

扶苓皮五錢 黃芩三錢 杏仁泥三錢 姜半夏五錢 知母三錢

生苡仁五錢 白蔻仁一錢五分 黃連姜汁炒二錢 白通草一錢 煮三杯分三次服

加廣皮炭三錢藿香梗三錢服四帖。十九日

病減者減其製每日服半帖六日服三帖。廿二日

病又減去黃連加益智仁以其脈大而尚緊也仍以六日服三帖。廿九日

餘邪未盡仍以六日服三帖。六月初五日

三瘧與宣化三焦十退其九白苔尙未盡退今日診脈弦中兼緩氣來至靜是陽氣未充議於前法退苦寒進辛溫。十二日

扶苓塊連皮五錢 桂枝三錢 藿香梗三錢 杏仁泥三錢 焦白芍二錢

黃芩炭三錢 薑半夏五錢 苡仁五錢 白蔻仁研三錢 益智仁三錢

廣皮三錢 煮三杯分三次服

左脈弦緊。右大而緩。舌白未化。瘧雖止而餘濕未消。此方仍服。去白蔻仁一錢。黃芩炭一錢。益智仁一錢。以後又服八帖。廿三日

四瘧已止。胃亦開。脈已回陽。與平補中焦。七月初二日

茯苓塊錢五

焦於朮錢三

炙甘草錢二

姜半夏錢三

生苡仁錢五

白蔻仁錢一  
五分

生姜錢三  
片三

廣皮炭錢三

大棗錢二  
去核

煮三杯。分三次服。

服七帖後。可加人參二錢。服至收功。

丸方 瘧後六脈俱弦微數。與脾腎雙補法。八月初八日

扶苓兩六

何首烏兩四

野朮兩四

沙蒺藜兩二

炒黑杞子兩四

蔻仁錢五

人參錢四

五味子兩二

蓮子兩六  
去心

山藥兩四

右為細末。煉蜜為丸如梧子大。每服二三錢。開水送。每逢節氣。以遼參

三五分煎湯送。

高十六歲 間三瘧脈弦。暑邪深入矣。乙酉六月 初十日

滑石錢五

茯苓皮錢三

知母錢二

杏仁錢三

製半夏錢三

黃芩錢三

柴胡錢二

藿香葉錢三

生薑片三

青蒿錢三

白蔻仁錢一

大棗錢二  
去核

苡仁錢三

炙甘草錢一

煮三杯。分三次服。

診脈數。熱重。加知母二錢。十二日

瘧止熱退。去知母柴胡青蒿生薑大棗。改藿香梗一二錢減滑石二錢。廿三日

餘邪已輕。再服數帖。廿九日

朱三十八歲。但寒不熱。舌苔白滑而厚三四日。灰黑而滑五六日。黑滑可畏。脈

沈弦而緊。太陰寒濕之瘧。與牝瘧相參。但牝瘧表寒重。此則偏於在裏之

寒濕重也。初起三日。用桂枝蒼朮草果茯苓杏仁廣皮澤瀉猪苓。三四日

加附子。五六日又加蒼朮草果。分量再加生薑。舌苔始微化黃。惡寒漸減。

服至十二三日。舌苔惡寒皆始退。瘧愈之後。峻補脾腎兩陽。然後收功。

姚二十五歲。久瘧不愈。寒多。舌苔白滑。濕氣重也。宜通宣三焦。微偏於濕。乙酉七月

廿五日

杏 仁五錢 茯苓皮五錢 青蒿二錢 半夏五錢 煨草果一錢五分

廣皮四錢 苡仁五錢 炒黃芩一錢五分 生薑三片 蔻仁三錢

煮三杯。分三次服。

前方服六帖。瘧疾已止。照原方去草果青蒿。加滑石六錢。益智仁三錢。八月

初二日

### 冬溫

張六十八歲。舌黃口渴。頭不痛而惡寒。面赤目赤。脈洪熱甚。形似傷寒。實乃冬

溫挾痰飲與伏暑一類。甲子十一月廿五日

連翹六錢 苦桔梗八錢 荆芥穗五錢 金銀花六錢 廣鬱金三錢

廣皮三錢 半夏八錢 藿香梗五錢 甘草三錢 杏仁六錢

白通草三錢 共為粗末分七包。一時許服一包。蘆根湯煎。

於前方內去芥穗通草。廿六日

冬溫餘熱未清。廿七日

連翹三錢 細生地三錢 薄荷一錢 銀花二錢 苦桔梗三錢

黃芩一錢五分 杏仁三錢 炒知母二錢 甘草一錢 水五杯。煮兩杯。分

兩次服。

溫病。渴甚熱甚。面赤甚。脈洪甚。廿九日

石膏八錢 苦桔梗五錢 姜半夏六錢 荆芥穗三錢 連翹三錢

杏仁泥五錢 廣鬱金二錢 銀花二錢 甘草三錢 薄荷三錢

煮三杯。分三次服。

溫病最忌食復。况老年氣血已衰。再復則難治矣。口渴甚。痰多脇痛。三十日

銀花五錢 苦桔梗五錢 半夏六錢 連翹三錢 杏仁霜五錢

薄荷一錢五分 石膏四錢 廣鬱金三錢 甘草二錢 煮三杯。分三次服。

大勢已退。餘熱尙存。仍須清淡數日。無使邪復。十二月

連翹錢三

細生地錢五

元參錢二

銀花錢三

粉丹皮錢二

黃芩錢二

麥冬不去心

生甘草錢二

頭煎二杯。二煎一杯。分三次服。

脈洪滑。即於前方內加半夏三錢。初三日

某脈不浮而細數。大渴引飲。大汗。裏不足之熱病也。用玉女煎法。乙丑二月

廿一日

知母錢四

生石膏兩一

甘草錢三

麥冬錢五

細生地錢五

京米撮一

桑葉錢三

煮三杯。分三次服。

溫熱。大渴。大汗。脈數。昨用玉女煎法。諸症俱減。平素有消渴病。用玉女煎。

大便稀溏。加牡蠣一面護陰。一面收下。廿三日

牡蠣兩一

生石膏錢五

炙甘草錢三

麥冬錢五

大生地錢五

炒知母錢二

京米撮一

煮三杯。分三次服。

某冬溫。脈沈細之極。舌赤面赤。譫語。大便閉。邪機純然在血分之裏。與

潤下法。丙寅十一月初一日

細生地錢六

元參錢六

粉丹皮錢三

生大黃錢五

麥冬不去心

生甘草錢二

元明粉錢一

煮三杯。先服一杯。得快便。

止後服。外服牛黃清心丸二丸。

冬溫。譫語神昏。皆誤表之故。邪在心包。宜急速開膈中。不然。則內閉外脫矣。大便閉。面正赤。昨因瀉下未通。經謂下不通者死。非細故也。得藥則嘔。忌甘也。先與廣東牛黃丸二三丸。以開膈中。繼以大承氣湯攻陽明之

實。初二日

生大黃八錢

元參八錢

老厚朴二錢

元明粉三錢

丹

皮三錢

小枳實四錢

煮三杯。先服一杯。得便即止。不便再服。

傷寒

唐五十八歲

太陽中風。尚未十分清解。兼之溼痺脾痛。癸亥二月初二日

茯苓皮五錢

桂枝四錢

片姜黃二錢

杏仁三錢

防己三錢

厚朴二錢

陳橘皮一分

晚蠶沙三錢

炙甘草一分

煮三杯。分三次服。

一二帖。

行經絡而和營衛。則風痺自止。初四日

桂枝八錢

焦白芍四錢

生薑五片

防己六錢

生於朮五錢

大棗去核二枚

半夏五錢

炙甘草三錢

水八碗。煮取三碗。分三次服。頭

一次稀粥。令微汗。佳。其二三次不必啜粥。

左脈沈緊。卽於前方內加熟附子五錢。初五日

脈洪大而數。經絡痛雖解。而未盡除。痺也。小便白而濁。濕也。初六日

飛滑石錢五 桂枝錢三 生苡仁錢五 茯苓皮錢五 猪苓錢三

黃柏炭錢一 杏仁泥錢五 澤瀉錢三 白通草錢三 煮三碗。分三次服。

昨服開肺。與大腸痺法。濕滯已下。小便亦清。身熱已退。但大便與痰中微

有血跡。症從寒濕化熱而來。未便卽用柔藥以清血分。今日且與宣行腑

陽。右脈仍見數大。可加苦藥。如明日血分未清。再清血分未遲。初七日

飛滑石錢五 半夏錢三 生苡仁錢五 杏仁泥錢三 厚朴錢二

黃柏炭錢一 黃芩炭錢二 廣皮錢一 細蘇梗錢一 頭煎兩杯。二煎一

杯。分三次服。

舌苔仍有新白。衣被稍薄而畏寒。身熱已退。陽虛。濕氣未淨無疑。初八日

薑半夏錢五 桂枝錢三 焦白芍錢二 生苡仁錢五 厚朴錢二

生茅朮錢二 杏仁泥錢三 廣皮錢一 全當歸錢一 頭煎兩杯。二煎一

杯。分三次服。二帖。

諸症向安。惟營氣與衛不和。寐不實。寐後。自覺身涼。以調和營衛爲主。初十日

桂枝三錢 茯苓塊三錢 廣皮一錢五分 白芍三錢 生苡仁五錢

生薑三片 半夏六錢 炙甘草二錢 大棗去核二枚 頭煎兩杯 二煎一

杯 分三次服 六帖。

營衛已和。即於前方內增白芍二錢。加膠飴三錢。服七帖而安。十六日

唐氏五十六歲 太陽中風漏汗。桂枝加附子湯主之。癸亥二月十六日

桂枝六錢 焦白芍四錢 生薑三片 炙甘草三錢 熟附子三錢

大棗去核三枚 煮三杯。分三次緩緩服。

中風漏汗。兼之腎水上凌心。心悸腹痛。昨用桂枝加附子湯。諸症悉退。今

左脈沈緩。右脈滑數。表雖清而濁陰未退。議苓桂伐腎邪。歸苗溫衝脈。吳

萸半夏生薑兩和肝胃。白芍以收陰氣。合桂枝而調營衛。加黃芩一以清

風化之熱。合諸藥為苦辛通法。此外感之餘。兼有下焦裏症之治法也。十七日

日

茯苓塊五錢 桂枝四錢 淡吳萸三錢 薑半夏四錢 青皮一錢五分

全當歸炒黑三錢 小茴香炒黑三錢 生薑三片 黃芩炭一錢 焦白芍二錢

甘瀾水煮三杯。分三次服。

脈緩。濁陰久踞。兼有滯物續下。用藥仍不外苦辛通法。稍加推蕩之品。因



其勢而利導之。大意通補陽明之陽。正以驅濁陰之陰。若其人陽明本旺。胃陰自能下降。六腑通調。濁陰何以能聚。再胃旺自能坐鎮中州。濁陰何能越胃而上攻心下。反覆推求。病情自現。日十九

桂枝尖四錢

厚朴三錢

焦白芍二錢

茯苓塊三錢

青皮一錢五分

小枳實一錢五分

淡吳萸三錢

烏藥二錢

廣木香一錢

小茴香吳萸同炒黑三錢

廣皮一錢

黃芩炭一錢

川棟子二錢

煮三杯。分三次服。

凡痛脹滯下。必用苦辛通降。兼護陽明。固不待言。前法業已見效。細詢病情。已十有餘年。以半產後得之。誤用壅補而成。按久病在絡。再痛脹偏左。下至少腹。扳着其中。必有瘀滯。非純用湯藥所能成功。蓋湯者蕩也。滌蕩腸胃。通和百脈。固其所長。至於細雕密鏤。緩行攻絡。是其所短。非兼用化癥回生丹。緩通不可。且湯劑過重。有瘕散為蠱之虞。不得不思患豫防也。  
廿二日

桂枝尖一錢

半夏三錢

廣木香八分

炒白芍二錢

厚朴一錢

地榆炭一錢

降香末二錢

紅花七分

炒桃仁一錢五分

川棟子二錢

小茴香炒黑二錢

廣鬱金一錢

全當歸炒黑一錢

烏藥一錢五分

兩頭尖二錢

黃芩炭一錢

黃連八分

廣皮炭八分

甘瀾水煎。前後四杯。日三夜一。

分四次服。五帖。

昔李東垣用藥有至三十餘味者。張仲景鱉甲煎。亦有三十幾味。後人學問不到。妄生議論。不知治經。治以急。急則用少。而分量多。治絡治以緩。緩則用多。而分量少。治新則用急。治舊則用緩。治急可獨用。治舊必衆用。獨則無推諉。而一力成功。衆則分功。而互相調濟。此又用藥多寡之權衡也。兼服化癥回生丹一丸。

宣絡法兼兩和肝胃。廿七日

炒白芍錢六

半夏錢三

炒丹皮錢三

製香附錢二

全當歸錢三

川芎錢五

炒蒺藜錢三

小茴香炒黑 錢三

炒青皮分八

煮三杯。分三次服。

寐仍不實。於前方內加生苡仁六錢。半夏二錢。服三帖。廿八日

薑半夏錢五

全當歸錢三

製香附錢一 錢五分

降香末錢二

良薑錢二

桃仁泥錢一 錢五分

小茴香錢三

烏藥錢二

廣皮炭分八

乾薑炭錢五

青皮分八

煮三杯。分三次服。

絡瘀多年。腹痛脹攻胃。食後腹脹。今搜去絡中瘀滯。飢甚則如刀刮竹絡。

氣虛也。與通補絡法。初五日

炒白芍錢六

丹參錢三

炒杞子錢一

白歸身錢三

丹皮錢三 桂圓肉錢三 小茴香錢一 煮三杯分三次服。

九帖全愈。

吳氏廿三歲 頭項強痛而惡寒。脈緩有汗。太陽中風。主以桂枝湯。甲子二月廿一日

桂枝錢三 炙甘草錢二 大棗去核二枚 白芍錢二 生薑錢三

水五盃。煮二杯。頭杯即啜稀熱粥。令微汗佳。有汗二杯不必啜粥。無汗

仍然。

不解。於前方內加羌活五錢。廿四日

服前方。業已脈靜身涼。不肯避風。因而復中。脈緊無汗。用麻黃湯法。廿五日

麻黃自去節三錢 白芍錢三 生薑片三 桂枝錢三

炙甘草錢二 羌活錢三 大棗去核二枚 煮兩杯分兩次服。

服前藥。不知身重疼痛。其人肥而陽氣本虛。平素面色淡黃。舌白。濕氣又

重。非加助陽勝濕之品不可。於前方內加重。廿六日

麻黃去節五錢 共成八錢 杏仁泥錢三 白朮錢三 桂枝二錢 共成五錢

炙甘草一錢 共成三錢 熟附子錢三 水五碗。先煮麻黃。去上沫。入諸藥。取二

碗分二次服。服一帖而汗出愈。

唐五十歲 頭風惡寒。脈緊言蹇肢冷。舌色淡。太陽中風。雖係季春天氣。不得

看作春溫。早間陰晦。雨氣甚寒。以桂枝二麻黃一法。甲子三月十六日

桂枝六錢 杏仁五錢 生薑六片 麻黃去節三錢 炙甘草三錢

大棗去核二枚 煮三杯。先服一杯。得微汗。止後服。不汗再服。再不汗。促役

其間。

於原方倍麻黃減桂枝。加附子三錢。一帖。十七日

照原方服一帖。十八日

諸症悉減。藥當暫停以消息之。十九日

中風表解後。言蹇減食則汗。頭引痛。舌白滑。脈微緊。宜桂枝加附子湯。除

風實表護陽。二十日

桂枝六錢 焦白芍四錢 生薑五片 附子三錢 炙甘草二錢

大棗去核二枚 水五杯。煮二杯。分溫二服。渣再煮一杯服。

表解後。復中惡寒。胸痞。舌苔厚而白。脈遲緊裏急。廿一日

桂枝六錢 茯苓塊五錢 厚朴三錢 杏仁五錢 熟附子四錢

乾薑三錢 茅朮三錢 小枳實二錢 廣皮二錢 日二帖。

於前方內去茯苓減杏仁。加炙甘草二錢。生薑二兩。日二帖。廿二日

諸證悉衰。當減其製。照前方日服一帖。廿三日

中風表解後。餘邪入裏。舌黃身熱。胸痞。譏瀉心湯瀉其痞。廿四日

半夏六錢 黃芩三錢 炒牛黃三錢 生薑五錢 乾薑五錢 黃連二錢 炒牛黃

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。

某 先寒後熱。脇痛腰痛。少陽症也。議從少陽領邪外出太陽法。

柴胡六錢 黨參三錢 甘草三錢 桂枝四錢 黃芩三錢

羌活五錢 生薑三錢 半夏五錢 煮三杯。分三次服。

又 熱後寒退。熱存脇脹。

半夏五錢 廣鬱金二錢 生薑三錢 黃芩四錢 廣皮炭一錢 五分

香附三錢 大棗二枚 去核 生甘草一錢 煮三杯。分三次服。

張 今年風木司天。現在寒水客氣。故時近初夏。猶有太陽中風之症。按

太陽中風。係傷寒門中第一關。最忌誤下。時人不讀晉唐以上之書。故不

識症之所由來。仲景謂太陽至五六日。太陽症不罷者。仍從太陽驅去。宜

桂枝湯。現在頭與身仍微痛。既身熱而又仍惡風寒。的是太陽未罷。理宜

用桂枝湯。但其人素有濕熱。不喜甘。又有微咳。議於桂枝湯內去甘藥。加

辛燥。服如桂枝湯法。廿五日

桂枝六錢 半夏四錢 廣皮三錢 白芍四錢 杏仁三錢

水八杯。煮成三杯。先服一杯。即啜稀熱粥。令微汗佳。有汗。二三杯不必啜粥。無汗仍然。

太陽中風誤下。胸痞四五日。太陽症未罷。昨用太陽症仍在例之桂枝湯法。今日惡寒已罷。頭目已清。惟胸痞特甚。不渴。舌白而壯熱。泄瀉稀水。頻仍。仲景云。病發於陽而誤下之成胸痞者。瀉心湯主之。今用其法。廿六日再經謂脈不動數者。為不傳經也。昨日以動數太甚。斷無不傳之理。可畏在此。

扶 苓 連皮 五錢 乾 薑 五錢 生 薑 三片 半 夏 五錢 黃 連 三錢

煮三杯。分三次服。

太陽中風誤下。前日先與解外。昨日太陽症罷。即瀉胸痞。今日胸痞解。惟自利不渴。舌灰白。脈沈數。經謂自利不渴者。屬太陰也。太陰宜溫。但理中之人參甘草恐不合拍。議用其法而不用其方。廿七日

扶 苓 連皮 一兩 蒼朮炭 四錢 乾 薑 五錢 半 夏 六錢

廣皮炭 二錢 生 薑 五錢 煮三杯。分三次服。

太陽中風。先與解外。外解已。即與瀉。誤下之。胸痞痞解而現自利不渴之太陰症。今日口不渴而利止。是由陰出陽也。脈亦頓小其半。古云。脈小則

病退。但仍沈數。身猶熱而氣粗不寐。陷下之餘邪不淨。仲景傷寒論。謂真陰已虛。陽邪尙盛之不寐。用阿膠雞子黃湯。按此湯重用黃芩黃連。議用甘草瀉心法。廿八日

半 夏錢五 黃芩錢四 生薑錢三 雲苓錢三

山連錢三 大棗去核二枚 甘草錢三 煮三杯。分三次服。

脈沈數。陰經熱。陽經不熱。是陷下之餘邪在裏也。氣不伸而噦。噦者傷寒門中之大忌也。皆誤下之故。議少用丁香柿蒂湯法。加黃連以徹裏熱。疏逆氣。廿九日

公丁香錢二 黃芩錢三 柿蒂枚九 真山連錢一

廣皮錢二 薑汁沖三茶匙 煮二杯。分二次服。

誤下成胸痞自利。兩用瀉心。胸痞自利俱止。但陷下之邪。與受傷之胃氣搏而成噦。昨用丁香柿蒂湯。去人參。加芩連。方雖易。仍不外仲景先師苦辛通降之法。病者畏而不服。今日噦不止。而左脈加進。勉與仲景噦門中之橘皮竹茹湯。其力量減前方數等矣。所以如此用者。病多一日。則氣虛一日。仲景於小柴胡湯中。卽用人參。况誤下中虛者乎。初一日

廣皮錢六 半夏錢三 生薑錢五 竹茹錢五 人參二錢若無人參以梓參代之

炙甘草四錢

大棗去核四枚

煮三杯。分三次服。

誤下中虛。氣結成噦。昨與金匱橘皮竹茹湯。今日噦減過半。古謂效不更方。仍用前法。但微喘而舌苔白。仲景謂喘家加厚朴杏仁佳。議以前方內加厚朴杏仁。

廣皮六錢

老厚朴二錢

生薑三錢

竹茹五錢

杏仁泥三錢

大棗去核二枚

洋參三錢

炙甘草五錢

煮三杯。分三次服。

於前方內加柿蒂三錢。初三日

誤下之陷。症噦而喘。昨連與金匱橘皮竹茹湯。一面補中。一面宣邪。茲已邪潰。諸惡候如失。脈亦漸平。但其人宗氣受傷不淺。議與小建中湯。加橘皮半夏。小小建立中氣。調和營衛。兼宣胃陽。令能進食安眠。初四日

焦白芍六錢

桂枝四錢

生薑三片

新會皮一錢

半夏四錢

大棗去核三枚

炙甘草三錢

膠飴一兩

去渣後化入。攪令勻。再上火三

二沸。煮三杯。分三次服。

病解後。微有飲咳。議與小建中。去膠飴。加半夏廣皮茯苓苡仁薏仁杏仁。

初五日

桂枝四錢

炒白芍六錢

廣皮三錢

半夏五錢

茯苓塊三錢



生薑片三錢  
苡仁五錢  
白蔻仁一錢  
大棗二枚  
杏仁二錢

炙甘草三錢  
煮三杯分三次服。

病後兩服建中。胃陽已復。脾陽不醒。何以知之。安眠進食。是為胃陽復。舌起白滑苔。小便短。大便不解。脈作數。是脾陽未醒。而上蒸於肺也。議與宣利三焦法。以醒脾陽。

半夏五錢  
小枳實三錢  
苡仁五錢  
茯苓五錢  
益智仁一錢

廣皮三錢  
杏仁五錢  
白蔻仁一錢  
煮三杯分三次服。

大小便已利。脈仍洪數。舌白滑苔未除。仍宜苦辛淡法。轉運脾陽。宣行濕熱。初八日

茯苓皮五錢  
半夏五錢  
黃柏炭三錢  
生苡仁五錢  
杏仁三錢

蒼朮炭三錢  
白蔻仁一錢五分  
廣皮五錢  
黃芩炭三錢  
煮三杯分三次服。

脈仍沉數。舌苔反白滑。仍宜建中行濕。以除伏邪。濕最傷氣。非濕去。氣不得健。與急劫濕法。十一日

茯苓皮五錢  
製蒼朮四錢  
白蔻仁一錢五分  
薑半夏五錢  
生苡仁五錢

黃芩炭二錢  
煨草果四錢  
黃柏炭二錢  
炒廣皮一錢五分  
杏仁泥三錢

益智仁二錢  
煮三杯。周十二時服完。

吳<sup>五十</sup>六歲 內熱外寒兼發痰飲。喉啞咳嗽痰多。頭痛惡寒。脈浮。與麻杏石甘湯。加半夏廣皮苦桔梗。乙酉十一月十二日

生石膏<sup>六兩</sup> 麻黃<sup>去節五錢</sup> 苦桔梗<sup>六錢</sup> 薑半夏<sup>一兩</sup> 廣皮<sup>四錢</sup>

炙甘草<sup>四錢</sup> 杏仁泥<sup>八錢</sup> 煮四杯。先服一杯。得汗即止。不汗再服。汗後

避風。

肺脈獨浮。去麻黃三錢。<sup>十四日</sup>

脈浮。喉啞咳嗽痰多。<sup>十七日</sup>

生石膏<sup>四兩</sup> 麻黃<sup>去節三錢</sup> 桔梗<sup>五錢</sup> 半夏<sup>六錢</sup> 廣皮<sup>三錢</sup>

炙甘草<sup>二錢</sup> 杏仁<sup>六錢</sup> 煮三杯。先服一杯。得汗。止後服。

脈浮。喉啞咳嗽痰多。內飲招外風為病。與大青龍湯法。<sup>廿三日</sup>

麻黃<sup>去節五錢</sup> 生石膏<sup>四兩</sup> 廣皮<sup>五錢</sup> 杏仁<sup>八錢</sup> 薑半夏<sup>八錢</sup>

生薑<sup>三錢</sup> 桔梗<sup>五錢</sup> 炙甘草<sup>三錢</sup> 大棗<sup>去核二枚</sup> 煮二杯。先服一杯。

得汗。止後服。不汗再服。

病減者減其製。去麻黃三錢。廣皮生薑大棗。於原方加木通一錢。以小

便短也。<sup>廿四日</sup>

喉復啞。脈洪數。小便已長。照前方去木通。加生石膏二兩。<sup>廿七日</sup>

趙十三 頭痛。脈浮弦不甚緊。無汗。與杏蘇散法。乙酉十一日

杏 仁二錢 羌 活一錢 生 薑三片 蘇 葉三片 桔 梗三錢

大 棗去核二枚 防 風二錢 甘 草一錢五分 煮一茶杯。先服一杯。覆被令微

汗。不可使汗淋漓。得汗。止後服。不汗再服第二杯。又不汗再作服。以得

汗為度。汗後避風。只啜粥。須忌葷。

某四十餘歲 頭項強痛而惡寒。脈浮而緊。無汗。的係傷寒。法當發汗。何得妄為

冬溫而恣用涼藥。丁亥十一月十一日

麻 黃去節六錢 杏 仁四錢 甘 草四錢 桂 枝五錢 煮三杯。先服一杯。

被令微汗。周身佳。得汗。止後服。不汗再服。

盡劑而汗始至足。

傷寒與麻黃湯。頭項強痛已解。脈不浮緊。胃亦開。但受傷太重。陽虛。體痛

畏寒。與溫太陽經脈。日十二

桂 枝六錢 焦白芍四錢 甘 草三錢 防 己一錢 杏 仁 泥三錢

生 薑五片 廣 皮四錢 熟 附 子三錢 大 棗去核二枚 煮三杯。分三次服。

脈症仍舊。陽未全復。照前方加附子。再服一帖。服藥後不必啜粥。

痺症身痛大減。惟足痛甚。濕傷於下。仍歸於下也。仍與溫通太陽經絡。十四

日

雲苓皮錢六

桂枝錢六

熟附子錢五

生苡仁錢六

防己錢四

片薑黃錢三

杏仁泥錢四

甘草錢三

海桐皮錢三

煮四杯。分早中晚

夜四次服。

諸症向安。惟六脈陽微之極。仍以補陽為要。但去痺未遠。宜通不宜守。俟

三四月後。毫無遺症。再議守補。日十五

雲苓塊錢三

桂枝錢六

生苡仁錢二

熟附子錢三

萆薢錢三

炙甘草錢三

煮三杯。分三次服。二帖。

脈沈細。背脊仍有畏寒之意。舌白滑。苔頗厚。寒濕未清。猶未敢呆補。日十七

雲苓皮錢五

桂枝錢八

川萆薢錢四

生苡仁錢五

防己錢二

白通草錢一

薑半夏錢四

廣皮錢二

炙甘草錢三

熟附子錢四

煮三杯。分三次服。

史三十歲脈浮洪而數。頭痛身痛惡寒有汗。此為太陽中風。但中風脈緩。今

洪數有力。恐傳經也。桂枝湯主之。戊子正月十六日

桂枝錢六

炙甘草錢三

大棗去核三枚

白芍錢四

生薑錢五

煮兩杯。先服一杯。即啜稀熱粥一碗。覆被令微汗佳。得汗。止後服。不汗

再服。

脈之洪大已減。頭痛身熱惡寒俱減。餘邪陷入少陽。乾嘔口苦。與小柴胡湯。渴者加天花粉。日十七

柴

胡三錢

薑半夏五錢

生

薑三錢

黃

芩三錢

天粉花一錢五分

廣

皮三錢

大 棗去核二枚

炙甘草一錢五分

煮二大杯。分二次服。

脈靜身涼。外感已解。惟舌上白濁。夾黃苔太甚。胃口不清。與宣通腑陽。切

忌早食多食。日廿八

薑

半夏五錢

益智仁二錢

白蔻仁八分

雲苓皮五錢

小枳實三錢

廣

陳皮三錢

杏仁泥三錢

炒神麩三錢

白通草八分

煮三杯。分三次服。

二帖。

劉氏

五十餘歲

太陽中風。就延五日不解。衝氣上動。宛若奔豚。腹滿泄瀉而渴。

兼有少陰症矣。兩脣兩感。太陽少陽。並見一兩感也。其人積怒內傷。又加

外感。此二兩感也。可畏之至。且先伐其衝氣。乙丑正月初五日

桂

枝八錢

雲苓塊一兩

川

芎一錢五分

當

歸三錢

川

椒炭三錢

生

薑五大片

煮三杯。分三次服。

太陽少陽兩感。衝氣上動如奔豚。與苓桂重伐腎邪。今日一齊俱解。脈靜

身涼。衝氣寂然。可喜之至。微有痰飲咳嗽。當與和胃令能食。初六日

雲苓塊六錢 桂枝三錢 生薑三片 薑半夏五錢

廣皮三錢 大棗去核二枚 焦白芍三錢 煮三杯。分三次服。

錢三十 太陽中風汗多。誤與收瀉。引入少陽。寒熱往來。口苦脈絃。與小柴

胡湯和法。其人向有痰飲喘症。加枳實橘皮。去人參。乙丑正月二十日

柴胡五錢 薑半夏六錢 生薑五錢 廣皮五錢

小枳實四錢 大棗去核二枚 炙甘草三錢 黃芩炭一錢五分

煮三杯。先服一杯。寒熱止。止後服。盡劑不止。再作服。

風入少陽。與小柴胡湯已解其半。仍須用和法。寒多熱少而口渴。較前方

退柴胡。進黃芩。加天花粉。廿三日

薑半夏三錢 柴胡二錢 生薑三大片 天花粉三錢

炒黃芩三錢 大棗去核二枚 炙甘草二錢 煮三杯。分三次服。

某四十歲 風寒夾痰飲。喘咳吐血。業已發汗。身熱不退。現已右脈洪大數滑。

病勢太重。勉與大青龍法。去表藥。加半夏。己丑十一月十四日

生石膏四兩 雲苓塊五錢 生薑汁沖三小匙 薑半夏六錢

杏仁泥五錢 甘瀾水八盃 煮三杯。分三次服。

傷寒夾痰飲吐血。誤治喘咳。脈數極。與大青龍法。去表藥。加半夏。身熱已退。喘已定。惟咳血未除。十七日

生石膏

兩三

薑半夏

錢六

橘

皮

錢三

雲苓皮

錢六


杏仁泥

錢五

生薑汁

沖三茶匙

煮三杯。分三次服。





卷二二

頭痛

趙氏五十歲六脈弦而遲。巔頂痛甚。下連太陽。陽虛內風眩動之故。乙丑三月初八日

桂枝六錢 生黃耆六錢 生薑五錢 白芍三錢 全當歸二錢

大棗去核三枚 炙甘草三錢 川芎一錢 膠一錢 飴化入五錢

陽虛頭痛。愈後用著建中。初十日

桂枝四錢 生縣薯五錢 生薑三片 白芍六錢

大棗去核三枚 炙甘草三錢 膠一錢 飴化入五錢

季少陽頭痛。本有損一目之弊。無奈盲醫不識。混用辛溫。反助少陽之火。甚至有附子之雄烈者。無怪乎醫者盲。致令病者亦盲矣。況此病由於伏暑發瘧。瘧久不愈。抑鬱不舒。而起肝之鬱勃難伸。肝愈鬱而膽愈熱矣。現在仍然少陽頭痛未罷。議仍從少陽膽絡論治。

刺蒺藜五錢 茶菊花三錢 羚羊角三錢 麥冬不去心五錢

苦桔梗三錢 鉤藤鉤三錢 丹皮三錢 青箱子二錢

苦丁茶一錢 麻仁三錢 生甘草一錢五分 桑葉三錢

陳三五歲少陽風動。又襲外風為病。頭偏左痛。左脈浮弦而數。大於右脈一倍。最有損一目之弊。識急清膽絡之熱。用辛甘化風方法。乙丑十月廿二日

羚羊角三錢

丹皮五錢

青葙子二錢

苦桔梗三錢

茶菊花三錢

鉤藤鉤二錢後入

薄荷二錢

刺蒺藜二錢

生甘草一錢

桑葉三錢

水五杯。煮取兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。日一二帖。

於前方內減

薄荷一錢四分。加木賊草一錢五分 蕤仁三錢

頭痛。眼蒙甚。日三帖。少輕。日二帖。

於前方內加蕤仁。白茅根。麥冬。十一月十八日

章四十歲衄血之因。由於熱行清道。法當以清輕之品。清清道之熱。無奈所

用皆重藥。至頭偏左痛。乃少陽膽絡之熱。最有損一目之患。豈熟地桂附

鹿茸所可用。悖謬極矣。無怪乎深痼難拔也。勉與清少陽膽絡法。當用鈴

羊角散。以無鈴羊。故不用。乙酉四月十八日

苦梗一兩

桑葉一兩

連翹連心八錢

銀花八錢

丹皮八錢

薄荷二錢

茶菊花一錢

鉤藤鉤六錢後入

白蒺藜四錢

苦丁茶三錢

甘草四錢

共為極細末。每服二錢。日三次。每服白扁豆花湯調。外以豆漿一擔。熬至碗許。攤貼馬刀患處。以化淨為度。必須鹽醋點之。做豆腐水並非可吃之豆腐漿。

復診症見小效。脈尚仍舊。照前清少陽膽絡方再服二三帖。俟大效後再議。如此時無扁豆花為引。改用鮮荷邊煎湯為引亦可。廿七日

少陽絡熱。誤用峻補陽氣。以致頭目左畔麻木發癢。耳後癰腫。發為馬刀。現在六脈沈洪而數。頭目中風火相攝。前用羚羊角散法。雖見小效。而不能大愈。議加一煎方。暫清腦戶之風熱。其散方仍用勿停。五月初二日

苦桔梗 三錢 生黃芩 三錢 茶菊花 三錢 側柏葉炭 三錢 炒蒼耳子 一錢五分

連翹 三錢 桑葉 三錢 辛夷 五分 鮮荷葉 去蒂一張 黑山梔 五枚 大便秘去山梔

細閱病狀。由少陽移熱於陽明。六月初五日

生石膏 兩一 知母 三錢 葛根 三錢

偏頭痛係少陽膽絡病。醫者誤認為虛。而用鹿茸等峻補其陽。以致將少陽之熱。移於陽明部分。項腫牙痛。半邊頭臉腫痛。目白睛血赤。且閉不得開。如溫毒狀。舌苔紅黃。六脈沈數有力。議與代賑會濟散。急急兩清少陽陽明之熱毒。十二日

代賑會濟散 十包。每包五錢。用鮮蘆根煎湯水二杯。煮成一杯。去渣。

先服半杯。其下半杯含化。得稀涎即吐之。一時許。再煎一包。服如上法。舌黃更甚。脈猶數。腫未全消。目白睛赤縷。自下而上。其名曰倒垂簾。治在陽明。不比自上而下者。治在太陽也。日十六

代賑普濟散 每日服五包。嚥下大半。漱吐小半。每包加生石膏三錢。煎成一小碗。服二日。外以連心麥冬一兩分二次煎代茶。

今日偏頭痛甚。且清少陽之絡。其消腫之普濟散加石膏。午前服一包。餘時服此方。日十八

鈴半角錢一

連翹錢一

刺蒺藜分一

凌霄花錢一

鈎藤鈎分六  
後入

茶菊花錢一

銀花錢一

苦桔梗分八

冬霜葉錢一

生甘草分四

犀角分八

丹皮錢一

兩杯半水煎一杯。頓服之。日三帖。

大便結加元參二錢。糖則去之。日二十

經謂脈有獨大獨小獨浮獨沈。斯病之所在也。茲左關獨大獨浮。膽陽太旺。清膽絡之熱。已服過數十帖之多。而膽脈尚如是之旺。絡藥輕清上浮。服至何日得了。議膽無出路。借小腸以為出路。小腸火腑。非苦不通。暫與極苦下奪法。然此等藥可暫而不可久。恐化燥也。日廿三

洋蘆薈錢二

麥冬連心  
五錢

川連錢二

胡黃連錢二

龍膽草三錢

丹

皮五錢

秋

石一錢

前方服二帖。左關獨大獨浮之脈已平。續服羚羊角散一天。代賑普濟散一天。目之赤縷大退。其耳前後之馬刀。堅硬未消。仍服代賑普濟散。日四

五次。廿六日

脈沈數。馬刀之堅結未化。少陽陽明經脈受毒之處。猶然繹拉板滯。議外面改用水仙膏敷患處。每日早服羚羊角散一帖。已午後服代賑普濟散

四包。七月初一日

服前藥。喉嚨較前甚為清亮。舌苔之黃濁去其大半。脈漸小仍數。裏症日輕。是大佳處。外症以水仙膏拔出黃瘡若許。毒氣尚未化透。仍須急急再敷。務期拔盡方妙。至於見功遲緩。乃前人誤用峻補之累。速速解此重圍。非旦晚可了。只好忍耐性情。寬限令其自化。太緊恐致過剛則折之虞。前羚羊角散每日午前服一帖。午後服代賑普濟散四包。分四次。再以二三包煎湯漱口。以護牙齒。初九日

數日大便不爽。左脈關部復浮。瘡口痛甚。再用極苦以瀉小腸。加芳香活絡定痛。十七日

生大黃

酒炒黑三錢

龍膽草三錢

乳

香三錢

歸

尾三錢

沒

藥二錢

洋蘆薈錢二 胡黃連錢三 銀花錢五 川連錢二 秋石錢三

煮三小杯。分三次服。得快大便一次即止。

馬刀雖潰。少陽陽明之熱毒未除。兩手關脈獨浮。膽氣太旺。與清少陽陽明絡熱之中。兼疏肝鬱。轉堅化核。日十八

苦桔梗錢三 金銀花錢三 夏枯草錢三 生香附錢三 連翹錢三

霜桑葉錢三 凌霄花錢三 茶菊花錢三 粉丹皮錢五 海藻錢二

馬刀以誤補太重而成。為日已久。一時未能化淨。以畏疼停止。水仙膏之故。舌上白苔。浮面微黃。其毒尚重。現在胃口稍減。水來克土之故。於前方

加宣肝鬱。日廿五

銀花錢三 丹皮炭錢三 香附錢二 桑葉錢三

連翹錢三 茶菊花錢三 苦梗錢二 廣鬱金錢二

仍以代賑。普濟散。漱口勿嚥。

肝鬱誤補。結成馬刀。目幾壞。現在馬刀已平其半。目亦漸愈。脈之數者已平。惟左關獨浮。其性甚急。肝鬱總未能降。胃不甚開。胸中飯後覺痞。舌白滑微黃。皆木旺尅土之故。其敗毒清熱之涼劑。暫時停止。且與兩和肝胃。

日廿

新絳紗三錢 薑半夏三錢 粉丹皮三錢 廣皮炭二錢 歸橫鬚二錢

旋覆花三錢 廣鬱金二錢 降香末五錢 蘇子霜五分

少陽相火。誤補成馬刀。原應用涼絡。奈連日白苔太重。胃不和。暫與和胃。

現在舌苔雖化。納食不旺而嘔。未可用涼。恐傷胃也。於前方減其製。八月初三日

新絳紗三錢 半夏五錢 黃芩炭二錢 廣鬱金二錢 生薑汁三錢

旋覆花三錢 丹皮三錢 仍用代賑普濟散敷口。

於前方內去黃芩。加香附三錢。廣皮炭二錢。初六日

肝移熱於腦。下為鼻淵。則鼻塞不通。甚則衄血。議清腦戶之熱。以開鼻塞。

兼宜少陽絡氣。外有馬刀故也。初八日

銀花二錢 蒼耳子四錢 辛夷炒去毛

連翹二錢 茶菊花三錢 桑葉三錢 又於前方內加旋覆花三錢 廣鬱金二錢 疏肝鬱。加薑半夏二錢 止嘔。

馬刀已出大膿。左脇肝鬱作痛。痛則大便日下六七次。其色間黃間黑。時

欲嘔。有大瘦泄之象。與兩和肝胃。十三日

新絳紗三錢 炒黃芩二錢 降香末三錢 香附三錢

歸鬚二錢 薑汁三錢 旋覆花三錢 廣鬱金二錢

焦白芍 三錢

薑半夏 四錢

廣皮炭 三錢

外症未除。內又受伏暑成痢。舌白苔黃滑。小便不暢。大便五七次。有黑有白。便又不多。非積滯而何。不惟此也。時而嘔水與痰。胃又不和。內外夾攻。何以克當。勉與四苓合苓芍湯法。十九日

雲苓皮 五錢

猪苓 三錢

炒黃芩 二錢

澤瀉 三錢

薑半夏 五錢

紅麴 二錢

炒白芍 三錢

炒廣皮 三錢

薑炒川連 一錢五分

廣木香 二錢

降香末 二錢

病由膽而入肝。客邪已退。所見皆肝膽病。外而經絡。內而臟腑。無所不病。初診時卽云深痼難拔。皆誤用大熱純陽之累。所謂雖有善者。亦無如之何矣。再勉與瀉小腸以瀉膽火法。廿四日

龍膽草 三錢

連翹 三錢

茶菊花 三錢

真雅連 一錢五分

炒黃芩 三錢

薑半夏 三錢

竹茹 三錢

冬桑葉 三錢

烏梅 去核 三錢

脈少大而數。卽於前方內加苦桔梗。三錢 金銀花 三錢 雲苓皮 三錢 廿六日

脈仍數。肝膽俱病。不能純治一邊。廿九日

金銀花 三錢

薑半夏 三錢

川連 五分

黃芩 六分

連翹 三錢

茶菊花 三錢

冬桑葉 三錢

烏梅 三錢

雲苓 三錢

麥冬 連心 五錢



前方服十一帖。胃口大開。舌苔化盡。肝氣亦漸和。惟馬刀之核未消盡。鼻猶塞。脣猶強。變衄為軌。脈弦數。大便黑。議於原方內去護土之剛藥。加入腦戶之絡藥。蓋由風熱蟠聚於腦戶。故鼻塞而衄或軌。誤補而邪不得出也。  
九月十日

連翹心三錢

銀花三錢

烏梅三錢

蒼耳子三錢炒

麥冬五錢

苦桔梗三錢

辛夷三錢

川連二錢

茶菊花三錢

桑葉三錢

龍膽草一錢

黃芩二錢

人中黃一錢五分

閱來札。前方服七帖。肺胃之火太甚。議於原方內加生石膏一兩杏仁二錢。開天氣以通鼻竅。清陽明以定牙痛。如一二三帖不知。酌加石膏。漸至二兩再敷。

水仙膏以消核之未盡。廿八日

右脈洪大而數。渴欲飲水。牙牀腫甚。陽明熱也。於前方內加石膏一兩。共二兩。

兩。銀花二錢桑葉二錢各如服三五帖後。腫不消。加石膏至四兩。廿九日

長氏一歲先牙痛。陽明熱也。繼因怒而偏頭痛。少陽熱也。痛甚而厥。口歪。

議清少陽陽明兩經之絡熱。丁亥八月初二日

金銀花三錢

茶菊花三錢

桑葉三錢

連翹不去心三錢

鈎藤鈎三錢後入

生石膏六錢

苦桔梗三錢

黃芩炭二錢

丹皮錢五 兒茶錢二 甘草錢二

牙疼甚加此。疼止去此。

胃痛

伊氏三十歲

脈弦急。脇脹攻心痛。痛極欲嘔。甫十五日而經水暴至。甚多。幾不能起。不欲飲。少腹墜脹而痛。此怒鬱傷肝。暴注血海。肝厥犯胃也。議胞宮陽明同治法。蓋金匱謂胞宮累及陽明。治在胞宮。陽明累及胞宮。治在陽明。茲因肝病下注胞宮。橫穿土位。兩傷者兩救之。仍以厥陰為主。雖變金匱之法。而實法乎金匱之法者也。甲子十月廿七日

台烏藥錢二

半夏五錢

小茴香錢二

製香附錢三

血餘炭本人之髮更佳三錢

廣鬱金錢二

青皮八分

五靈脂一分

黃芩炭錢一

艾炭錢三

水五杯。煮取兩杯。分二次服。

金匱謂胞宮累及陽明。則治在胞宮。陽明累及胞宮。則治在陽明。茲肝厥既克陽明。又累胞宮。必以厥陰為主。而陽明胞宮兩護之。廿九日

製香附錢三

半夏五錢

台烏藥妙二錢

桂枝錢三

萆薢錢二

艾炭一分

杜仲炭錢二

淡吳黃錢二

黑梔子錢三

川棟子錢三

小茴香錢三

水五杯。煮取兩杯。分二次服。

尹氏二十歲脈雙弦而細。肝厥犯胃。以開明心地為要緊。無使久而成患也。

甲子十月廿九日

降香末三錢

半

夏六錢

烏藥二錢

廣

皮五錢

廣鬱金二錢

淡吳萸二錢

川

椒炒黑二錢

青

皮五分

生

薑三片

川楝皮二錢

水五杯。煮取兩杯。分二次服。三帖。

王氏二十歲

肝厥犯胃。濁陰上攻。萬不能出通陽泄濁法外。但分輕重耳。前

三方之所以不大效者。病重藥輕故也。茲重用之。甲子十一月初四日

薑半夏五錢

厚

樸三錢

降香末三錢

川

椒炭五錢

台烏藥三錢

淡吳萸五錢

良

薑五錢

小枳實三錢

雲

連一錢

兩頭尖揀淨兩頭圓三錢

用甘瀾水八碗。煮取三碗。分六次服。

重剛刮濁陰。業已見效。當小其製。初六日

薑半夏三錢

台烏藥二錢

厚

樸二錢

良

薑三錢

川椒炭三錢

小枳實二錢

青

皮二錢

廣

皮一錢五分

用甘瀾水八碗。煮取三碗。分三次服。二帖。

車脈沈弦而緊。嘔而不渴。肢逆且麻。濁陰上攻。厥陰尅陽明所致。宜急

溫之。

台烏藥三錢

淡吳萸五錢

半夏五錢

厚樸三錢

萐撥二錢

小枳實三錢

川椒炭三錢

乾薑三錢

青皮二錢

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。

脾胃

許四十脈弦而緊。弦則木旺。緊則為寒。木旺則土衰。中寒則陽不運。土衰

而陽不運。故吞酸噫氣。不寐。不食。不飢。不便。九竅不和。皆屬胃病。濁陰蟠

踞中焦。格拒心火。不得下達。則心熱如火。議苦辛通法。癸亥二月二十日

半夏一兩

小枳實三錢

廣皮二錢

薏苡仁五錢

厚樸三錢

淡吳萸三錢

生薑六片

炒雲連二錢

用甘瀾水入碗。煮成三碗。分三次服。渣再煮一碗服。

大脈陽微。濁陰蟠踞。不食。不飢。不便。用和陽明兼驅濁陰法。今腹大痛。已

歸下焦。十餘日不大便。肝病不能疏泄。用驅濁陰通陰絡法。又苦辛通法。

兼以濁攻濁法。廿四日

台烏藥二錢

厚

樸三錢

淡吳萸三錢

川棟子三錢

小茴香炒黑三錢

兩頭尖揀淨三錢

檳

榔二錢

小枳實二錢

炒良薑二錢

廣

皮炒黑五分

以得通大便為度。

服以濁攻濁法。大便已通。但欲便先痛。便後痛減。責之絡中宿積未能通清。臍上且有動氣。又非湯藥所能速攻。攻急恐有瘕散為蠱之虞。議化癥回生丹緩攻為妙。廿七日

某 脈沈緊為裏寒。木旺土衰。濁陰上攻。腹拘急時痛。脇脹腰痛。議苦辛通法。兼醒脾陽。

藿香梗三錢 厚樸二錢 生香附三錢 生薏仁三錢

廣鬱金二錢 官桂一錢 薑半夏三錢 廣木香八分

白蔻仁一錢 萹撥一錢 台烏藥二錢 廣皮五分

某 脈弦細而緊。濁陰上攻胸痛。用辛香流氣法。初五日

川棟子三錢 良薑三錢 厚樸二錢 烏藥二錢 淡吳萸三錢

檳榔一錢五分 小枳實二錢 萹撥二錢 廣皮二錢 廣木香一錢 三帖

補火生土兼泄濁陰。初八日

茯苓塊三錢 台烏藥二錢 淡乾薑二錢 益智仁煨一錢五分

生薏仁三錢 半夏三錢 陳皮五分 淡吳萸二錢 四帖

李歲十三 六脈俱弦。不浮。不沈。不數。舌苔白而滑。不食。不飢。不便。不寐。九竅

不和。皆屬胃病。臥時自覺氣上阻咽。致令臥不著席。此肝氣之逆也。額角上有蟲斑。神氣若昏。目閉不欲開。視不遠。醫云有蟲。亦復有理。議先與兩和肝胃。如再不應。再議治蟲。乙酉五月十四日

半夏夏雨 旋覆花五錢 包煎 秫 米合一

六腑不通。九竅不和。醫者不知六腑為陽。以通為補。每見其二便閉也。則以大黃葶仁寒藥下之。以後非下不通。屢下屢傷。遂致神氣若昏。目閉不開。脈弦緩而九竅愈不通矣。已成壞症。勉與通陽。二十日

薑半夏三錢 雲苓皮三錢 厚 樸三錢 白蔻仁二錢

益智仁二錢 煨 雞內金二錢 炒 廣 皮二錢 大腹皮三錢

六腑閉塞不通。有若否卦之象。按否之得名。以坤陰長陽消之候。將來必致上下皆坤而後已。坤為腹。故腹大無外。坤為純陰。初爻變震為復。然則欲復其陽。非性烈如震者不可。豈大黃等陰寒藥所可用哉。廿三日

天台烏藥散錢二 加巴霜二分和勻。分三份。先服一分。候五時不便。再

服第二份。得快便即止。

服一次。五時得快便。宿物下者甚多。目之閉者已開。神氣亦清。稍食粥飲。

知頑笑矣。廿四日

六腑不通。溫下後大便雖通。而小便仍然未解。心下窒塞。不飢不食。六脈弦遲。急急通陽爲要。與開太陽闔陽明法。廿五日

半 夏錢五 雲苓皮錢五 良 薑錢二 猪 苓錢三 川椒炭錢三

安 桂錢一 公丁香錢一 澤 瀉錢三 廣 皮錢三

大便已能自解。胃能進食。是陽明已闔。惟小便不通。是太陽不開。與專開

太陽。六月初一日

雲苓皮錢五 桂 枝錢三 猪 苓錢三 安邊桂錢五分

晚蠶沙錢三 蒼 朮錢三 澤 瀉錢三 飛滑石錢三

煮三杯。分三次服。以小便通爲度。若小便已通而尙渾濁者。再服一帖。

以小便清爲度。

服前方二帖。小便暫通。連日大小便復閉。大便不通已七日。自覺胃中痞

塞。臉上蟲斑未退。議用前配成之烏藥散再服四份。如二便俱通。卽停藥。

統俟初八日清晨再商。如大便通一次。而小便不通。或大便竟不通。明日

再服三份。若大便二三次。而小便仍然不通者。卽勿服。初六日

服烏藥散四分。內巴霜四厘。已得快便。今朝且能自行小便。六腑俱通矣。

只與和胃。令能進食。可以收功。蓋十二經皆取決於膽。皆秉氣於胃也。初八

雲苓塊四錢

益智仁一錢煨

半夏三錢

生薏仁五錢

廣皮炭二錢

生薑五錢

慶室女十六歲 不食十餘日。諸醫不效。面赤脈洪。與五汁飲降胃陰法。兼服

牛乳三日而大食矣。

甘蔗汁 梨汁 蘆根汁 葶薺汁 藕汁 各等分。拌勻。

邱十八歲 溫熱愈後。午後微熱不除。脈弦數。面赤。與五汁飲。三日熱退進食。

七日全愈。

噎食

王 左尺獨大。腎液不充。腎陽不安其位。尺脈以大為虛。經所謂陰衰於下者是也。右手三部俱弦。食入則痛。經所謂結陽於上者是也。有陰衰而累及陽結者。有陽結而累及陰衰者。此症形體長大。五官俱露。木火通明之象。凡木火太旺者。其陰必素虛。古所謂瘦人多火。又所謂瘦人之病。慮虛其陰。凡噎症治法。必究陰衰陽結。何者為先。何者為後。何者為輕。何者為重。此症既係陰虛為本。陽結為標。何得妄用大黃十劑之多。雖一時暫通陽結。其如陰虛而愈虛何。業醫者豈不知數下亡陰乎。且雲岐子九法。



大半皆攻。喻嘉言痛論其非。醫者豈未之見邪。愚謂因怒停食。名之食隔。或可一時暫用大黃。亦不得恃行數用。今議五汁飲。果實之甘寒。牛乳血肉之變化。降胃陰以和陽結。治其標。大用專翕大生膏。峻補肝腎之陰。以救陰衰。治其本。再能痛戒怒惱。善保天和。猶可望愈。

專翕大生膏方 酸甘鹹腥臭直達下焦法

大熟地斤四

海參斤四

山萸肉斤二

揀洋參斤四

鱉甲斤四

桂圓肉斤二

鮑魚斤四

提麥冬斤四

杭白芍斤四

牡蠣斤四

龜板膠斤四

雲苓斤四

猪脊髓斤一

烏骨雞斤一

蓮子斤四

沙蒺藜斤四

芡實斤二

羊腰子斤二

真阿膠斤四

白蜜斤四

雞子黃斤四

取盡汁。文火煎煉成膏。

李五十五歲

大凡噎症由於半百之年。陰衰陽結。古來紛紛議論。各疎所長。俱

未定宗。大抵偏於陽結而陰衰者。宜通陽氣。如旋覆代赭湯。進退黃連湯之類。偏於陰衰而陽結者。重在陰衰。斷不可見一毫香燥。如丹溪之論是也。又有食隔宜下。痰隔宜導。血隔宜通絡。氣隔宜宣肝。嘔吐太過而傷胃液者。宜牛轉草覆其液。老僧寡婦。強制太過。精氣結而成骨。橫處幽門。宜鵝血以化之。廚役受穢濁之氣傷肺。酒肉勝食氣而傷胃。宜化清氣。不可

勝數。按此症脈沈數有力而渴。面色蒼而兼紅。甫過五旬。鬚髮皆白。其為平日用心太過。重傷其陰。而又伏火無疑。議且用玉女煎法。癸亥十月十三日

煨石膏八錢

麥冬不去心 六錢

牛膝三錢

旋覆花新絲炒 包三錢

大熟地六錢

白粳米撮

知母二錢

炙甘草三錢

每早服牛乳一茶碗。

張六十歲老年陽結。又因久飲怒鬱。肝旺尅土。氣上阻咽。致成噎食。按陽氣

不虛不結。斷非破氣可療。議一面通補胃陽。一面鎮守肝陰法。甲子二月十三日

代赭石煨一兩 二錢

半夏一兩

薑炒洋參二錢

桂枝六錢

旋覆花五錢 包煎

生薑六錢

茯苓塊四錢

七帖

陽脈已起。恐過個其依。議進陰藥。退陽藥。二十日

代赭石一兩 煨

半夏六錢

炒白芍六錢

旋覆花六錢 包煎

洋

參四錢

炙甘草三錢

桂枝三錢

茯苓塊三錢

薑汁每盃沖 三小匙

前日脈數。因退陽進陰。今日脈緩而痰多。仍須進陽。俾中焦得運。以復其

健順有常之體。廿五日

半夏一兩 二錢

代赭石一兩 六錢

生薑五片

焦白芍三錢

桂枝六錢

茯苓塊八錢

洋參二錢

旋覆花六錢 包煎

兩帖

傳五十歲

先因酒樓中飲酒。食燒小猪響皮。甫及下咽。即有家人報知朋友

凶信。隨即下樓尋車。車夫不知去向。因步行四五里。尋至其友救難未遇。

又步行四里。又未遇。渴急。飲冰振烏梅湯一二碗。然後僱車回家。心下隱

隱微痛。一月後痛有加。延醫調治。一年不效。次年五月。飲水一口。胃中痛

如刀割。乾飯不下咽。已月餘矣。閏五月初八日。計一粒不下已十日。骨瘦

如柴。面赤如赭。脈沈洪有力。胃中痛處高起如桃大。按之更痛不可忍。余

曰此食隔也。當下之。因用大承氣湯加牽牛作三碗。伊家見方重。不敢服。

求籤而後服一碗。痛至臍。服二碗。痛至小腹。服三碗。痛至肛門。大痛不可

忍。又不得下。於是又作半劑。服一碗。外加蜜導法始下。如雞蛋黑而有毛。

堅不可破。次日先吃爛麵半碗。又次日飲粥湯。三日食粥。五日吃乾飯矣。

下後所用者。五汁飲也。

楊四十歲

先因微有痰。飲咳嗽。誤補於前。誤下於後。津液受傷。又因肝鬱性

急。致成噎食。不食而大便燥。六脈弦數。治在陰衰。

大生地六錢 麥冬五錢 麻仁三錢 廣鬱金八分

生阿膠三錢

白芍四錢

丹皮三錢

炙甘草三錢

服七帖而效。又於前方加鱉甲四錢。杞子三錢。服十七八帖而大效。進

吳鞠通醫案 卷三 噎食 二〇一

食如常。惟餘痰飲。後以外臺茯苓飲減廣皮枳實。收全功。

陳<sup>三十歲</sup>酒客不戒於怒。致成噎食。其勢已成。非急急離家玩遊山水。開懷

暢遂。斷不為功。蓋無情草木。不能治有情之病。與進退黃連湯法。<sup>庚寅五月十八日</sup>

雲苓塊<sup>四錢</sup> 人參<sup>二錢</sup> 炙甘草<sup>一錢</sup> 旋覆花<sup>新絳紗包四錢</sup>

炒黃連<sup>一錢五分</sup> 半夏<sup>四錢</sup> 生薑汁<sup>沖三匙</sup> 薤白<sup>三錢</sup>

煮三杯。分三次服。

效。不更方。再服四帖。<sup>廿二日</sup>

即於前方內加廣橘皮三錢。又服四帖。<sup>廿八日</sup>

怒鬱兼酒毒。與進退黃連湯法。業已見效。仍宗前法。餘有原案。<sup>六月初四日</sup>

人參<sup>三錢</sup> 雲苓塊<sup>四錢</sup> 生薑汁<sup>三匙</sup> 神麴<sup>三錢</sup> 旋覆花<sup>新絳紗包四錢</sup>

半夏<sup>四錢</sup> 炙甘草<sup>一錢</sup> 炒黃連<sup>一錢五分</sup> 薤白<sup>三錢</sup> 廣橘皮<sup>三錢</sup>

煮三杯。分三次服。

諸症雖減。六脈弦緊。於前方減去黃連。加溫藥調和營衛。餘有原案。<sup>十二日</sup>

人參<sup>三錢</sup> 雲苓塊<sup>四錢</sup> 生白芍<sup>三錢</sup> 薑半夏<sup>四錢</sup> 廣橘皮<sup>三錢</sup>

桂枝<sup>三錢</sup> 旋覆花<sup>四錢包煎</sup> 炒黃連<sup>五分</sup> 炙甘草<sup>一錢</sup> 大棗肉<sup>二枚</sup>

薤白<sup>三錢</sup> 神麴<sup>三錢</sup> 生薑<sup>三錢</sup> 煮三杯。分三次服。

諸症雖減。六脈弦緊。於前方內去黃連薤白。加代赭石五錢。廿二日

趙四十歲噎食。脈弦細。脇痛。前與宣肝絡。其痛已止。與代赭旋覆湯治其噎。

七月十五日

代赭石煨飛 八錢

人參三錢

薑半夏五錢

炙甘草三錢

旋覆花五錢 包煎

洋參一錢

雲苓塊五錢

大棗肉三枚

生薑五錢

煮三杯。分三次服。

覆診效。不更方。再服四帖。能用關東參更妙。廿四日

又服四帖。廿九日

### 嘔吐

金六十歲舊有痰飲。或發嘔吐。仍係痰飲見症。醫者不識。乃用苦寒堅陰。無

怪乎無可存之物矣。議食入則吐。是無火例。癸亥三月二十日

淡吳萸五錢

半夏八錢

淡乾薑五錢

生薏仁六錢

廣皮三錢

生薑汁每次沖 三匙

水五杯。煮二杯。分二次服。渣再煮一杯服。

前方業已見效。但脈遲緊。與通養胃陽。廿三日

人參一錢 五分

淡吳萸三錢

半夏三錢

生薏仁三錢

茯苓二錢

生薑五片

不拘帖。

恒氏七十歲初因大驚。肝氣厥逆。嘔吐頻仍。後因誤補。大嘔不止。嘔即避人。

以剪刀自刎。漸至粒米不下。體瘦如柴。奄奄一息。仍不時乾嘔。四肢如冰。後事俱備。脈弦如絲而勁。與烏梅丸法。

遼參三錢 川椒炭四錢 吳萸三錢 黃芩炭一錢

薑汁三匙 川連二錢 雲苓塊五錢 烏梅五錢

服二帖而進米飲。服四帖而食粥。七帖後全愈。後以兩和肝胃到底而

大安。

珠氏二十歲 嘔吐不食已久。六脈弦細而弱。與安胃丸法。己丑正月 初十日

薑半夏八錢 川椒炭六錢 廣皮五錢 雲苓塊六錢 烏梅肉四錢

生薑五錢 甘瀾水入茶杯。煮成三杯。分三次服。

嘔吐不食。與安胃丸法已效。但小便猶短。兼有口瘡。議兼開太陽。十四日

薑半夏六錢 豬苓三錢 桂枝三錢 生薏仁五錢 雲苓六錢

澤瀉三錢 川連八分 川椒炭四錢 生薑三錢 吳萸三錢

煮三杯。分三次服。

喻六十歲 肝鬱停痰。嘔吐百餘日。治不如法。肝未愈而胃大傷。議與苦辛以

伐肝。甘淡以養胃陽。辛卯五月 廿八日

薑半夏五錢 人參三錢 淡吳萸三錢 雲苓五錢 川椒炭四錢

炒川連錢五

生薑汁三匙

煮三杯。分三次服。

於前方內減川椒炭一錢。淡吳萸一錢。加旋覆花新絳紗包三錢。香附三

錢。薑半夏一錢。六月初四日

肝木橫穿土位。嘔逆百餘日不止。與苦辛伐肝。用甘淡養胃陽。已見大效。

俟脇下絲毫不脹。用此方鎮肝逆。養肝陰。補中陽。性情之病。胸中須海闊

天空。以迓天和。初六日

代赭石錢八

人參錢三

薑半夏錢六

雲苓塊錢六

炙甘草錢三

旋覆花三錢  
包煎

生薑錢三

煮三杯。分三次服。

反胃

周七十歲老年陽微濁聚。以致胸痺反胃。二焦之陽齊閉。難望有成。議先通

胸上清陽。甲子十一月廿五日

桂枝尖錢五

半夏錢五

括蔞錢二

薤白錢三

小枳實八分

白茯苓錢二

白蜜半  
牛酒杯

厚樸錢一

薑汁三匙  
小

水八杯。煮取三杯。分三次服。

老年陽微濁聚。反胃胸痺。用開清陽法。業已見效。但嘔痰仍多。議食入則

吐為無火例。用茱萸湯合大半夏法。三十日

吳 黃炮燉 半 夏二錢 白 蜜一黃酒杯 洋 參姜炒 生 薑二兩

水入碗。煮取三碗。分三次服。渣再煮半碗服。

即於前方內加茯苓塊五錢初三日

於前方內去吳萸。加薤白三錢初十日

嘔於決切與呃同

王三十歲 六脈俱濡。右寸獨大。濕淫於中。肺氣賁鬱。因而作嘔。與傷寒陽明足太陰之寒嘔有間。以宣肺氣之痺為主。癸亥六月十五日

飛滑石三錢 竹 茹三錢 白通草二錢 生薑汁每盃沖入三小匙

杏仁泥三錢 柿 蒂三錢 生薏仁三錢 廣 皮二錢

泄瀉胸悶。於前方內加茯苓三錢。藿香梗二錢。十七日

脈之濡者已解。寸之大者已平。惟胃中有飲。隔拒上焦之氣。不得下通。故於其旺時而嘔甚。今從陽明主治。十九日

茯苓塊五錢 半 夏六錢 杏仁泥二錢 飛滑石三錢 小枳實一錢五分

生薏仁五錢 廣 皮三錢 藿香梗三錢 白通草三錢 柿 蒂三錢 三帖

嘔雖止而六脈俱數。右手更大。泄瀉色黑。舌黃。氣分濕熱可知。廿二日

連 翹二錢 茯苓皮五錢 黃芩炭一錢 銀 花二錢 飛滑石三錢



厚樸錢一 扁豆皮錢三 生薏仁錢三 澤瀉錢三 白通草錢二

煮三杯。分三次服。三日六帖。

咳嗽

吳二十歲 六脈弦勁。有陰無陽。但咳無痰。且清上焦氣分。甲子四月廿四日

沙參錢三 生扁豆錢三 連翹錢一五分 麥冬錢三 冬霜葉錢三

玉竹錢三 冰糖錢三 茶菊花錢三 杏仁錢三

煮三杯。分三次服。三帖。

於前方內去連翹。加丹皮二錢。地骨皮三錢。廿六日

肺癰

王氏五十歲 初起喉痺。為快利藥所傷。致成肺癰。胸中痛。口中燥。痺仍未痊。

不食不寐。痰氣腥臭。已有成膿之象。脈短而數。寒熱且移於大腸。而泄瀉

難愈之證。勉與急急開提肺氣。議千金葦莖湯與甘桔合法。癸亥三月初八日

苦桔梗錢二 桃仁錢五 冬瓜仁錢五

生薏仁錢一兩 甘草錢一兩 鮮葦根錢四兩

水八碗。煮成三碗。渣再煮一碗。分四次服。

堂伯兄四十歲 飲火酒。坐熱炕。晝夜不寐。喜出汗。誤服枇杷葉麻黃等利肺

藥致傷津液。遂成肺癰。臭不可當。日吐膿二升許。用千金葦莖湯合甘桔

法。己巳年冬月

葦根八兩

苦桔梗三兩

桃仁一兩五錢

薏仁二兩

冬瓜仁一兩五錢

生甘草一兩

煮成兩大茶碗。晝夜服完。碗半。膿去十之七八。盡劑。膿去八九。又服半

劑。毫無臭味。後以調理脾胃收功。

朱詠齋世兄

五十餘歲

以二月初受風。與桂枝湯一帖。風解。膽怯不敢去厚衣。

因而汗多。初四五等日。又受風溫。口渴思涼。脈洪數。先與辛涼輕劑。不解。

脈又大。汗更多。口更渴。身更熱。因與辛涼重劑。石膏等一帖。身涼渴止。脈

靜。仍膽怯不去厚衣。初十日。當大內差使。坐夜起五更。衣更厚。途間不敢

去皮衣。以致重亡津液。而成肺癰。與葦莖湯日二三帖。服之五七日。不應。

膿成臭極。加苦葶藶子五錢。膿始退。未能十分淨盡。後十日。又發。膿又成。

吐如菘豆汁。膿臭。每吐一椀餘。又與前方加葶藶三錢。服二帖。方平。後以

補胃逐痰飲收功。再其人色白體肥。夙有痰飲。未病之前。秋冬雨季。已在

上書房行走。早起恐寒。誤服俗傳藥酒方。本不嗜酒。每早強飲數小杯。次

年患此。急之由也。己卯年

失音

朱 右脈洪數有力。金實無聲。麻杏石甘湯證也。奈已為前醫發汗。麻黃未便再用。議清音湯加石杏。乙丑二月初二日

半

夏六錢

苦桔梗

六錢

石

膏六錢

杏仁粉

五錢

葦

根五錢

生甘草

二錢

水五杯。煮成二杯。渣再煮一杯。分三次服。

肺藏本熱。為外風所搏。實而無聲。究係麻杏石甘之法為速。初三日

生石膏

兩

麻

黃五錢

炙甘草

三錢

杏仁泥

六錢

半

夏五錢

右脈之洪數有力者。已減其半。而音亦漸開。仍用麻杏石甘加半夏一帖。

初四日

生麻黃

去節淨三錢

生石膏

兩

杏仁霜

七錢

薑半夏

七錢

炙甘草

三錢

甘瀾水八碗。煮成三碗。分三次服。以後病減者減其製。

沈二十歲

六脈弦細如絲。陽微極矣。咳嗽便澹。納食不旺。由上焦損及中焦。

所以致損之由。初因遺精。繼因秋傷於濕。冬必咳嗽。外邪未清。驟然用補。

使邪無出路。致咳嗽不已。古謂病有三虛一實者。先治其實。後治其虛。現

在喉啞。治實先與開提肺氣。治虛與諸虛不足之小建中湯。乙酉正月廿九日

苦桔梗 錢四

雲苓塊 錢五

杏仁泥 錢二

薑半夏 錢四

生薏仁 錢五

生甘草 錢二

煮二杯。分二次服。

六脈弦細之極。陰陽俱損。急須用補。以外感未淨。喉音未清。暫與理肺。二一帖後再診。二月初六日

茯苓塊 錢四

苦桔梗 錢二

生甘草 錢三

甜杏仁 錢四

冰糖 錢四

鮮蘆根 錢四

薑半夏 錢三

煮三小杯。分三次服。

珠 四十五歲 酒客失音。與麻杏石甘湯。

生石膏 兩四

麻黃 錢五

杏仁 錢四

炙甘草 錢三

又 服一帖無汗。音不出。服二帖微汗。音出不甚響。仍用前法。

蜜炙麻黃 錢三

生石膏 錢三

炙甘草 錢三

杏仁 錢四

又 服五帖。音大出。但脈滑耳。與清音湯。

苦桔梗 錢六

薑半夏 錢六

炙甘草 錢二

又 服五帖。音清脈滑。痰飲不盡。與外臺茯苓飲法。減辛藥。

茯苓 錢八

沙參 錢三

半夏 錢五

廣皮 錢二

甘草 錢一

麥冬 錢五

小枳實 錢一

七帖而安。

歌兒 十五歲 失音。歌唱勞傷。肺火喉啞。

洋參切薄片一兩 鮑魚切薄片四兩

早晚各取鮑魚一二錢。洋參五分。煎湯頓服之。歌時取鮑魚、洋參各一片。貼牙後腮間。嚙其津液。以後不復啞矣。

歌兒十六歲 因飲酒過度。貪食水果。寒熱相搏。濕熱內壅。

蘇梗 苦桔梗 神麩 半夏

甘草 蘆根 茯苓塊 服數帖而愈。

水氣

蘭女十四歲 脈數。水氣由面腫至足心。經謂病始於上而盛於下者。先治其

上。後治其下。議腰以上腫當發汗例。越婢加朮湯法。甲子三月廿一日

麻黃去節五錢 白朮三錢 杏仁泥五錢

石膏六錢 桂枝三錢 炙甘草一錢

水五杯。煮取二杯。先服一杯。得汗止。後服。不汗再服。

生石膏八錢 麻黃三錢 生薑三片 炙甘草二錢

杏仁泥五錢 桂枝二錢 大棗去核二枚

水八杯。煮取三杯。分三次服。以汗出至足為度。又不可使汗淋漓。

水氣由頭面腫至足下。與越婢法。上身之腫已消其半。茲脈沈而數。以涼

淡復微苦。利其小便。廿四日

飛滑石錢五

生薏仁錢五

杏仁錢三

茯苓皮錢六

黃柏炭錢一

海金沙錢六

澤瀉錢三

白通草錢三

不能戒鹹。不必服藥。

通女十九歲 右脈大於左。浮而緊。諸有水氣者。腰以上腫當發汗。但其人自

汗。不得再發。咳而軌。仍以肺氣為主。用小青龍湯去麻辛。甲子三月廿一日

杏仁泥錢四

半夏錢五

製五味錢一

生薏仁錢三

炙甘草錢二

桂枝錢三

炒白芍錢一五分

乾薑錢二

水五杯。煮取二杯。分二次服。

於前方內加茯苓塊五錢。廿二日

風水愈後。咳亦止。多汗。議苓桂朮甘草湯。加黃耆蠲飲而護表。廿四日

茯苓錢五

生縣薯錢三

炙甘草錢三

桂枝錢四

於朮錢三

煮取二杯。分二次服。三帖。

章四十歲 腰以下腫。當利小便。六脈沈細之極。腸鳴色黑。陽氣幾微。溼沒矣。

茯苓皮錢八

桂枝錢八

良薑錢三

生茅朮錢五

澤瀉錢六

老厚樸錢三

猪苓錢六

椒目錢三

安邊桂錢三

廣皮錢二

水八碗。煮取三碗。渣再煮一碗。分四次服。以小便利爲度。

又 腫脹胸痞。用半夏瀉心湯法。俟痞愈。再服前方。

半夏 夏 川 連 生 薑 黃 芩 乾 薑

某 前因中焦停飲。咳嗽。轉用溫藥。今雖飲咳見效。小便究未暢行。脈之

沈部洪較有力。症本濕中生熱。又有酒毒。仍以涼利小便之苦辛淡法。子甲

三月十日  
六日

飛滑石六錢 晚蠶砂三錢 杏 仁四錢 雲苓皮五錢 黃柏炭二錢

海金砂五錢 生薏仁四錢 半 夏二錢 白蔻仁一錢五分 白通草一錢

冬霜葉三錢 煮成三杯。分三次服。

風水已愈其半。復感風寒。身熱頭痛。身半以上復腫。口渴。脈浮數。與越婢

加朮法。廿八日

生石膏二兩 麻 黃去節 五錢 炒蒼朮三錢

杏仁泥五錢 桂 枝三錢 炙甘草二錢

煮成三杯。先服一杯。得微汗即止。

風水汗後。脈洪數。渴而停水。腫未全消。猶宜涼開膀胱。廿九日

生石膏二兩 雲苓皮五錢 白蔻仁二錢 杏仁泥五錢 薑半夏三錢

飛滑石 錢六

小枳實 錢四

晚蠶砂 錢三

生薏仁 錢三

海金沙 錢五

益智仁 錢三

白通草 錢一

猪苓 錢三

廣皮 錢一

煮三杯。分三次服。

改用前方去石膏四月初一日

水腫未全消。脾陽不醒。食不能磨。糞後見紅。初二日

竈中黃土 兩一

飛滑石 錢五

熟附子 錢二

杏仁泥 錢五

雲茯苓皮 錢五

黃芩炭 錢一

海金沙 錢四

白通草 錢一

鴛眼枳實 錢二

生薏仁 錢五

南蒼朮 錢三

煮成三杯。分三次服。

小便猶不甚長。胃中得熱物微噎。右脈滑數。初五日

飛滑石 錢五

杏仁 錢五

小枳實 錢二

草薢 錢三

益智仁 錢一

雲苓皮 錢五

厚樸 錢一

海金沙 錢五

木通 錢一

廣皮炭 錢二

生薏仁 錢三

煮成三杯。分三次服。

小便仍未通暢。右脈數大未退。仍宜涼肺以開膀胱。初七日

飛滑石 錢六

杏仁 錢五

晚蠶砂 錢三

雲苓皮 錢五

薏仁 錢五分

大腹皮 錢二

厚樸 錢二

生薏仁 錢四

海金沙 錢六

桑皮 錢三

白通草 錢一

煮成三杯。分三次服。

腫未全消。又發痰飲。咳嗽。表通則小便長。右脈洪數。議照盜飲例與大青



龍法。初九日

生石膏兩一

麻黃蜜炙三錢

細辛一錢

桂枝四錢

雲苓塊連皮五錢

薑半夏五錢

杏仁五錢

生薑三錢

大棗去核二枚

炙甘草三錢

煮成三杯。分三次服。

咳減。小便數而欠。渴思涼飲。鼻衄。肺熱之故。十一日

生石膏兩四

薑半夏五錢

桂枝五錢

杏仁泥六錢

小枳實三錢

雲苓皮三錢

炙黃耆三錢

生薑三錢

炙甘草三錢

大棗去核二枚

煮成三杯。分三次服。

腰以下腫已消。腰以上腫尚重。與治上焦法。十三日

茯苓皮五錢

生薏仁五錢

麻黃去節三錢

薑半夏五錢

白茅根三錢

生石膏兩四

白通草一錢五分

杏仁五錢

蘆根五錢

煮三杯。分三次服。

腫減。咳增。脈洪數。衄未止。十五日

杏仁泥八錢

麻黃蜜炙三錢

生薏仁三錢

旋覆花三錢包煎

生石膏四錢

半夏三錢

白茅根三錢

白通草一錢

飛滑石六錢

蘆根五錢

煮成三杯。分三次服。

咳雖減。脈仍滑數。腫未全消。十七日

生石膏四兩

杏

仁六錢

苦葶藶三錢炒

飛滑石六錢

海金砂五錢

茯苓皮三錢

半

夏五錢

蘇葉連梗三錢

煮成三杯。分三次服。

福四十二歲初因愛飲冰振黃酒。與冰振水果。內濕不行。又受外風。從頭面腫

起。不能臥。晝夜坐被上。頭大如斗。六脈洪大。先以越婢湯發汗。腫漸消。繼

以調理脾胃藥。服至一百四十三帖而愈。囑其戒猪肉黃酒水果。伊雖不

飲。而冰振水果不能戒也。一年後糞後便血如注。與金匱黃土湯。每劑黃

土用一飭。附子用八錢。服至三十餘劑而血始止。後與溫補脾陽。至九十

帖而始壯。

范十八歲風水腫脹。

生石膏四兩

麻

黃去節六錢

生薑三錢

桂枝三錢

杏仁泥五錢

炙甘草三錢

大

棗去核二枚

煮成三杯。分三次服。

一帖而汗解。頭面腫消。次日與實脾利水。五日全愈。戒其避風。伊不聽。

後八日復腫如故。仍與前法而愈。後受戒規。故不再發。

周十八歲腫從頭面起。

麻黃去節六錢

生石膏一兩

杏仁五錢

桂枝三錢

炙甘草三錢

蒼朮三錢

煮成三杯。分三次服。如汗出不止以松花粉撲之

服一帖汗出不至足次日又服半帖腫全消後以理脾收功

寒濕

郭三十歲 太陰中濕病勢沈悶最難速功非極剛以變脾胃兩陽不可 月十二

日

薑半夏 六錢

桂枝 五錢

生茅朮 四錢

茯苓皮 五錢

椒目 三錢

小枳實 三錢

廣皮 三錢

生薏仁 五錢

生草果 三錢

生薑 兩一

老厚樸 四錢

煮成三椀分三次服

寒濕為病誤用硝黃致濁陰蟠踞堅凝如石苟非重剛何以直透重圍 九

日

川椒 炒黑 四錢

安邊桂 二錢

生薏仁 五錢

熟附子 五錢

猪苓 三錢

老厚樸 四錢

茯苓皮 五錢

澤瀉 三錢

乾薑 四錢

小茴香 三錢

生草果 二錢

白通草 二錢

廣皮 三錢

煮四椀分四次服 共服十三帖而後服轉

薛二十歲 外痺寒濕太重內痰飲不食不寐咳嗽口渴大小便赤脈數先開

肺痺 辛卯十月十八日

生石膏 先煎代水 一兩

桂枝 四錢

薑半夏 三錢

飛滑石 先煎 六錢

生薏仁三錢

杏仁泥五錢

小枳實三錢

扶苓皮五錢

防己五錢

橘皮三錢

煮四杯。日三夜一。分四次服。

外痺痛而內痰飲內外俱痺。二十日

生石膏先煎代水二兩

桂枝三錢

海桐皮三錢

飛滑石六錢

杏仁五錢

片薑黃三錢

扶苓皮五錢

穿山甲炒三錢

薑半夏五錢

地龍三錢

生薏仁三錢

白通草一錢

橘皮三錢

煮四杯。分四次服。二帖。

痺痛腕重。用藥以由經達絡為要。廿二日

生石膏兩

桂枝尖三錢

防己五錢

飛滑石六錢

穿山甲炒三錢

杏仁泥五錢

片薑黃三錢

地龍三錢

扶苓皮五錢

嫩桑枝三錢

薑半夏三錢

乳香二錢

橘皮二錢

煮四杯。分四次服。二帖。

痺症先腿重而後腕重。昨與通經活絡。茲上下皆輕。痛減能動。脈亦漸小。

脈小則病退也。但加飲咳。廿四日

生石膏八錢

飛滑石四錢

防己五錢

蘇子霜三錢

杏仁泥五錢

薑半夏六錢

穿山甲炒二錢

地龍三錢

晚蠶砂三錢

雲苓皮五錢

桂枝尖三錢

桑枝尖三錢

橘皮三錢

煮四杯。分四次服。二帖。

右寸猶大。腿痛未除。廿六日

生石膏兩一 飛滑石錢六 杏仁錢六 海桐皮錢三 雲苓皮錢三

片薑黃錢三 穿山甲炒三錢 防己錢六 晚蠶砂錢三 薑半夏錢三

桂枝尖錢三 白通草錢一 地龍錢三 煮四杯分四次服二帖

右寸已小故右肢痛減左脈弦故左肢仍痛廿八日

杏仁泥錢五 雲苓皮錢五 獨活錢五分 防己錢六 乳香錢三

穿山甲炒三錢 桂枝尖錢五 沒藥錢三 地龍錢三 歸鬚錢三

片薑黃錢三 海桐皮錢三 煮四杯分四次服二帖

毓氏二十歲 風寒濕三氣合而為痺脈弦又感燥金涼氣腹痛峻溫猶恐不

及尙可吃生冷猪肉介屬等陰物乎壬辰七月廿七日

熟附子錢三 桂枝錢五 吳茱萸錢二 扶苓塊連皮六錢 生薏仁錢五

杏仁錢三 高良薑錢二 片薑黃錢二 川椒炭錢二 橘皮錢三

煮四杯分四次服二帖

表裏俱痺肢痛板痛前用峻溫現在板痛少減仍遊走作痛兼有痰飲不

寐先與和裏廿九日

薑半夏錢八 桂枝錢五 吳茱萸錢三 小枳實錢三 扶苓塊連皮六錢

防己錢三 高良薑錢二 川椒炭錢三 橘皮錢三

吳鞠通醫案 卷三 寒濕 二一九

煮三杯。分三次服。二帖。

諸證已愈。八九。惟痺痛尙有。斯須。自覺胸中氣阻。飽食反不阻矣。宗氣之虛可知。議通補中焦。八月初二日

茯苓塊六錢

桂枝四錢

薑半夏三錢

焦於朮三錢

高麗參二錢

杏仁三錢

片薑黃二錢

炙甘草二錢

橘皮三錢

煮三杯。分三次服。四帖。

痺

崑氏二十歲風濕相搏。一身盡痛。既以誤汗傷表。又以誤下傷裏。渴思涼飲。

面赤舌絳。得飲反停。脇脹胸痛。皆不知病因而妄治之累也。議木防己湯。

兩開表裏之痺。五月初十日

生石膏兩一

桂枝六錢

木防己四錢

杏仁四錢

生香附三錢

炙甘草三錢

蒼朮五錢

煮三杯。渣再煮一杯。分四次服。

脇脹止而胸痛未愈。於前方內加薤白廣皮。以清胸上之陽。十二日

薤白三錢

廣皮三錢

痺症愈後。胃不和。土惡濕也。十四日

薑半夏兩一

秫米二錢

生薑三錢

茯苓塊五錢

水五碗煮取二碗渣再煮一碗分三次服。

痺後清陽不伸。右脇痠痛。十六日

半 夏六錢 薤 白三錢 吳 萸一錢 桂 枝二錢

烏 藥二錢 青 皮一分 廣 皮二錢 鬱 金二錢

煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

吳十一行痺。十一歲

生石膏五錢 桂 枝三錢 海桐皮一分 杏仁泥三錢

防 己二錢 茯苓皮二錢 片薑黃一分 炙甘草一錢

煮三杯。分三次服。

張二十歲 風濕。癸亥十一月十五日

羌 活三錢 苦桔梗三錢 桂 枝二錢 半 夏二錢

杏仁泥三錢 陳 皮二錢 生 薑三片 炙甘草一錢

風濕相搏。一身盡痛。汗之不汗。用麻黃加朮法。十六日

麻 黃去節五錢 蒼 朮五錢 杏 仁五錢 桂 枝三錢

炙甘草三錢 羌 活一分 生 薑三片 煮三杯。分三次服。

晚 於前方內加熟附子二錢半帖而愈。

胡十八 附腫。右脈洪數。痰多。咳嗽。口渴。莖中痛。與涼利小便法。乙酉四月廿九日

生石膏錢八 滑石錢六 海金沙錢五 雲苓皮錢五

生薏仁錢五 甘草梢錢一分五分 半錢三 夏錢三 煮三杯。分三次服。四帖。

脈之洪數者減。去石膏二錢。加杏仁三錢。廣皮三錢。五月初六日

濕熱傷氣。氣傷則短。汗多必渴。濕聚則附腫。與猪苓湯去阿膠加銀花。以

化濕熱。化則諸證皆愈。十二日

飛滑石錢六 猪苓錢四 銀花錢三 雲苓皮錢五 澤瀉錢一

煮三杯。分三次服。

濕熱不攘。下注腿腫。小便不利。莖中痛。二十日

滑石錢六 茯苓皮錢五 草薢錢五 猪苓錢三 薏仁錢三

晚蠶砂錢三 澤瀉錢三 木通錢二 甘草梢錢一分五分 煮三杯。分三次服。

服至小便暢為度。

脈洪數。小便反黃。加黃柏滑石。莖痛止。去甘草梢。廿四日

小便已長。腫未全消。脈弦滑。咳嗽多痰。七月初四日

半錢六 生薏仁錢五 草薢錢五 猪苓錢三

澤瀉錢三 廣皮錢四 茯苓皮錢五 煮三杯。分三次服。



張二十歲身熱頭痛腰痛肢痛無汗六脈弦細兩目不明食少寒濕痺也西乙

四月十九日

川烏頭三錢 桂枝五錢 防己三錢 熟附子三錢 生薏仁五錢

杏仁五錢 羌活二錢 澤瀉三錢 茯苓皮五錢 廣皮三錢

煮三杯分三次服。

服前方二帖頭痛止旋即誤服他人補陰藥便溏腹脹今日復診因頭痛

愈用原方去羌活治藥逆加厚樸三錢五月初三日

痺症已愈頗能舉步便溏泄瀉皆止目已復明胃口較前加餐因多服一

帖脈稍數寒濕有化熱之象當與平藥逐其化熱之餘邪而已初八日

飛滑石六錢 杏仁二錢 蠶砂三錢 桑枝五錢 茯苓皮五錢

生薏仁五錢 澤瀉三錢 防己二錢 煮三杯分三次服。

又感受暑濕泄瀉脈弦腹脹與五苓法六月十八日

桂枝五錢 雲苓皮五錢 生薏仁五錢 猪苓四錢 澤瀉三錢

廣木香二錢 炒蒼朮三錢 廣皮三錢 大腹皮三錢 煮三杯分三次服。

趙氏四十歲 太陽寒痺脈弦背心板着而痛乙酉六月二十日

茯苓皮五錢 桂枝五錢 川椒炭三錢 生薏仁五錢

川烏頭三錢

白通草一錢

防己三錢

煮三杯。分三次服。

服前藥已效。而背痛難除。加附子三錢廿五日

脈已回陽。痛未止。每日服半帖。六日三帖。加晚蠶砂四錢木通三錢七月初二日

脈仍小。陽未回。背仍痛。再服三帖。分六日。初九日

趙三十歲痺症夾伏濕。腹脹痛。且有肥氣。濕已化熱。故六脈洪滑。此症本寒

標熱。先治其標。本當在後。乙酉五月初六日

生石膏兩四錢

桂枝六錢

厚樸五錢

防己四錢

杏仁泥六錢

薑半夏五錢

廣皮四錢

煮三杯。分三次服。四帖。

復診尺脈洪數更甚。加雲苓皮六錢黃柏三錢木通三錢初十日

尺脈仍洪。腹痛欲便。便後肛門熱痛。原方再服二帖。十二日

水停心下。漉漉有聲。暫與逐水。無暇治痺。十六日

半夏六錢

枳實六錢

生薑五錢

廣皮五錢

甘瀾水八杯。煮成三杯。分三次服。

水響退。腹脹甚。仍服前方。去黃柏。加大腹皮。十九日

痺少減。胃悶不開。其人本有肥氣。肥氣成於肝鬱。暫與兩和肝胃。廿三日

半夏六錢

雲苓塊五錢

香附三錢

益智仁二錢

青皮二錢

厚樸錢三 降香末錢三 廣皮錢三 煮三杯分三次服。

右脈大而數。去蘇子厚樸青皮。加黃芩二錢。六月初三日

諸症向安。脈亦調適。胃口亦開。以調理脾胃立法。初五日

雲苓皮錢五 半 夏錢五 白蔻仁錢一 生薏仁錢五

黃芩炭錢二 廣皮錢二 煮三杯分三次服。

誤食西瓜。寒冷未有不發停飲者。二十日

雲苓塊錢五 半 夏錢五 公丁香分八 乾薑錢三 小枳實錢三

白蔻仁錢一 廣皮錢三 益智仁錢一 煮三杯分三次服。

錢氏三十歲 寒痺。脈弦短澹而緊。由腿上連少腹。痛不可忍。甚至欲厥。兼有

痰飲胃痛。乙酉五月廿九日

桂枝錢六 雲苓皮錢五 小茴香錢三 川椒炭錢三 防己錢四

生薏仁錢五 川烏頭錢三 海桐皮錢三 廣皮錢三 片薑黃錢三

煮三杯分三次服。

左脈稍長。仍然緊甚。再服二帖。六月初一日

丸方寒濕為病。

雲苓塊八兩 炒蒼朮六兩 熟附子二兩 葶藶四兩 川椒炭三兩

生薏仁八兩 小茴香四兩 川棟子三兩 木通  
兩 兩 兩 兩

共為細末。神麩為丸。如小梧子大。每服三錢。薑湯下。

楊氏二十歲 前曾崩帶。後得痿痺。病者自疑虛損。詢病情寒時輕熱時重。正

所謂經熱則痺。絡熱則痿者也。再行經有紫有黑。經來時不惟腰腿大痛。

少腹亦痛。經亦不調。或多或少。日數亦然。此中不但濕熱。且有瘀血。治濕

熱用湯藥。治瘀血用丸藥。左脈浮取弦而沈取寬 右脈浮取弦沈取洪 湯藥用諸痺獨取太陰法。丸藥

用化癥回生丹。乙酉正月 初七日

生石膏二兩 桂枝四錢 海桐皮三錢 杏仁泥五錢 生薏仁五錢  
兩 錢 錢 錢 錢

防己四錢 晚蠶砂三錢 雲苓皮五錢 白通草一錢 煮三杯。分三次服。

黃四十歲 暑濕痺症。誤以熟地等柔藥滑脾。致令泄瀉。臥牀不起。兩足踈曲

不伸。飲食少進。兼之疝痛。先以五苓加川椒廣皮木香止其瀉。繼以半夏

廣皮良薑益智白蔻開其胃。復以丁香川椒吳萸雲苓薏仁薑黃平其疝。

又以防己杏仁桂枝烏頭薏仁雲苓皮川椒等伸其痺。未惟引痛。風在筋

也。重用地龍桂枝。引痛亦止。後以補脾胃而全愈。乙酉月 日

王四十歲 寒濕為痺。背痛不能轉側。晝夜不寐二十餘日。兩腿拘攣。手不能

握。口眼歪斜。煩躁不寧。畏風自汗。脈弦。舌苔白滑。面色昏暗且黃。睛黃。大

便閉。先以桂枝杏仁薏仁羌活廣皮半夏茯苓防己川椒滑石令得寐。繼以前方去川椒羌活。加白通草蠶砂葶藶。得大便。一連七八日。均如黑彈子。服至二十餘劑。身半以上稍鬆。背足痛甚。於前方去半夏。加附子片子薑黃地龍海桐皮。又服十數帖。痛漸止。又去附子地龍。又服十數帖。足漸伸。後用二妙丸。加雲苓薏仁葶藶白朮等藥收功。

六十歲

手足拘攣。誤服桂附人參熟地等補陽。以致面赤。脈洪數。小便閉。

身重不能轉側。手不能上至鬢。足踈曲。絲毫不能轉側移動。細詢病情。因大飲食肉而然。所謂濕熱不攘。大筋輒短。小筋弛長。輒短為拘。弛長為痿者也。與極苦通小腸。淡滲利膀胱。

生石膏八兩

防

己五錢

胡黃連三錢

茯苓皮六錢

晚蠶砂四錢

飛滑石一兩

杏

仁三錢

龍膽草四錢

穿山甲三錢

白通草二錢

泮蘆薈三錢

桑

枝五錢

地龍三錢

煮三碗。分三次服。

前方服至七日後。小便紅黑而濁。臭不可當。半月後。手漸動。足漸伸。一月後。下牀扶椅。桌能行。四十日後。走至簷前。不能下階。又半月。始下階。三月後。能行四十步。後因疲。飲用理脾肺收功。此症始於三月廿三日。至八月廿三日停藥。

周二歲 兩腿紫絳而腫。上起小細瘡如癩。已三年矣。兩腿膝痠痛不能立。六脈弦細而緊。竇氏扁鵲心書謂之蘇木腿。蓋寒濕着痺也。

附 子八兩 雲苓皮一兩 桂 枝一兩 生薏仁一兩 烏 頭六錢

煮四杯。分四次服。服至三十餘帖而始策杖能行。後去烏附用通經活

絡滲濕而愈。

成五十歲 腰間痠軟。兩腿無力。不能跪拜。間有腰痛。六脈洪大而滑。前醫無非補陰。故日重一日。此濕熱痿也。與諸痿獨取陽明法。

生石膏四兩 杏 仁四錢 晚蠶砂三錢 防 己四錢 海桐皮二錢

飛滑石一兩 萆 薢五錢 生薏仁八錢 桑 枝五錢 雲苓皮五錢

白通草二錢 煮三碗。分三次服。共服九十餘帖。病重時自加石膏一倍。

後用二妙散收功。

趙四十歲 肝鬱挾痰飲。腎水上凌心。心悸短氣。腹脹胸痺。六脈反沈洪。水極而似火也。與蠲飲伐腎邪兼降肝逆法。乙酉正月十五日

雲苓皮一兩 桂 枝五錢 蘇子霜三錢 小枳實五錢 川椒炭三錢

薑半夏八錢 降 香三錢 旋覆花三錢 廣 皮四錢 生薑汁每盃沖三匙

甘瀾水煮四杯。分早中晚夜四次服。四帖。戒生冷猪肉鹹菜。

痰飲兼痺。腎水上凌。心驚悸。短氣。腰脊背痛。皆太陽所過之地。小便短而腹脹。肚臍突出。是內而臟腑。外而肌肉。無不痺者。且與開太陽之痺。脈洪大。與大青龍合木防己湯法。二十日

生石膏兩四 杏 仁錢四 厚 樸錢三 雲苓皮錢六 防 己錢四

飛滑石錢六 桂 枝錢五 半 夏錢五 生薏仁錢五 廣 皮錢三

小枳實錢五 通 草錢一 煮四杯。分四次服。

於前方內加飛滑石四錢。晚蠶砂三錢。廿一日

外而經絡之痺。內而臟腑之痺。行痰開痺。俱不甚應。現在脈洪大。少腹脹。

小便短而臭濁。先與開支河。使濕熱得有出路。再商後法。廿二日

飛滑石一兩二錢 海金沙錢五 猪 苓錢四 雲苓皮錢五 白通草錢一

小茴香錢三 川草薺錢五 澤 瀉錢三 煮三杯。分三次服。二帖。

加去陳莖法。兩頭尖三錢。半夏五錢。三帖。廿五日

痺症夾痰飲。六脈洪數。濕已化熱。屢利小便不應。非重用石膏宣肺熱不可。諸痺獨取太陰也。廿九日

生石膏兩四 桂 枝錢五 生薏仁錢五 防 己錢五 晚蠶砂錢三

飛滑石兩二 杏 仁錢五 雲苓皮錢五 黃 柏錢四 白通草錢一

飛滑石兩二 杏 仁錢五 雲苓皮錢五 黃 柏錢四 白通草錢一

完 活錢一 煮四杯分四次服四帖。

痺症十年。誤補三年。以致層層固結。開之非易。石膏用至二觔有餘。脈象方小其半。現在少腹脹甚。而小便不暢。腰痛胸痛。邪無出路。必得小便暢行。方有轉機。二月初四日

生石膏兩四

桂 枝錢六

杏仁泥錢六

老厚樸錢五

飛滑石兩四

防 己錢五

小茴香炒炭三錢

小枳實錢五

雲苓皮兩一

木 通錢六

煮四杯分四次服。

以後脈大而小便不利用此。小便利者去滑石。

大用石膏。六脈已小。經謂脈小則病退。蓋脈為病之帥。脈退不怕病不退。經又謂脈病人不病者死。人病脈不病者生。現在病歸下焦血分。其人本有肝鬱。兼通下焦血分。初五日

雲苓皮兩一

桂 枝錢六

小枳實錢五

防 己錢六

小茴香炒炭六錢

海桐皮錢三

木 通錢四

炒黃柏錢三

廣 皮錢三

川椒炭錢二

全當歸錢三

煮三杯分二次服。

加石膏三兩。滑石一兩。初六日

加厚樸三錢。薑半夏五錢。初七日



蛻螂丸方 痺症夾痰飲疝瘕六脈洪大用諸痺獨取太陰法脈洪大之極者已小難經所謂入病脈不病者生但脈雖平而瘕脹痺痛未除議以烏藥散退瘕痺之所以難退者以久病在絡故也再以緩通肝絡法脈若復大仍服前方數帖見效即止。

蛻螂蟲兩一

降

香兩三

小茴香兩三 炒

穿山甲兩三 炒

片薑黃兩三

歸

鬚兩四

川棟子兩三

兩頭尖兩二

海桐皮兩三

口

射兩三

滴乳香兩一

地龍兩二 去泥

而止。共為細末酒水各半為丸每服二錢日二三從此服蛻螂丸起兩月

痺症夾痰飲脈本洪數前用辛涼脈減兼用通絡散瘕丸散亦效現在六脈中部仍洪但不數耳議暫用宣肺三月廿四日

生石膏兩四

桂

枝錢八

半夏錢八

杏仁錢八

雲苓塊兩一

飛滑石兩二

防

己錢六

全歸錢三

廣皮錢三

小枳實錢四

海桐皮錢三

煮四杯分四次服。

復診右脈更大小便反短用苦辛淡法於前方內加黃柏二錢廿六日

痺痛夾痰飲四月十日 六日

生石膏錢八

桂枝錢五

生薏仁錢五

雲苓皮錢五

晚蠶砂錢三

防己錢四

杏仁泥錢五

薑半夏錢五

白通草錢一  
五分

廣皮錢三

煮三杯分三次服。

內而脇痛。外而腰背痺。是氣血兼痺也。日十七

桂枝尖錢五

雲苓皮錢三

防己錢三

杏仁泥錢五

旋覆花錢三  
包煎

生薏仁錢三

廣鬱金錢二

半夏錢四

小枳實錢四

片薑黃錢二

白蔻仁錢一  
五分

歸鬚錢二

廣皮錢三

煮三杯分三次服。

痰飲踞於中焦。痺痛結於太陽。氣上沖胸。二便不利。日廿五

雲苓塊錢二  
一兩

桂枝錢八

小枳實錢六

飛滑石錢六

薑半夏錢五

防己錢六

杏仁泥錢八

白通草錢一

廣皮錢三

煮三杯分三次服。

大凡腹脹之疾。不責之太陰。即責之厥陰。此症自正月以來。開太陽之藥。未有不泄太陰者。他症雖減其半。而腹脹不除。其故有三。一者病起肝鬱。二者肝主疏泄。誤補致壅。三者自正月以來。以右脈洪大之故。痺症雖重。治在肺經。經有諸痺。獨取太陰之明訓。茲右脈平而左脈大。不得着於前議。暫與泄厥陰之絡。久病在絡故也。三月初五日

半夏錢五

旋覆花錢五  
包煎

黃芩錢三

蘇子霜錢三

歸鬚錢三

厚樸錢五 小枳實錢五 降香錢三 晚蠶砂錢三 廣皮錢三

杉皮錢三 廣鬱金錢三 煮三杯分三次服。

左脇痛脹。臥不着席。胸亦悶脹。氣短。肝脈絡胸之故。廿三日

旋覆花三錢 包煎 歸橫鬚三錢 半錢五 廣鬱金錢三 廣皮錢三

新絳紗三錢 包煎 蘇子霜三錢 香附錢四 小枳實錢四 青皮錢三

川椒炭錢四 降香末錢三 煮三杯分三次服。七帖。

痰飲肝鬱。脈弦細。氣上沖胸。六月初一日

旋覆花四錢 包煎 蘇子霜三錢 半錢六 降香末錢三 小枳實錢三

廣鬱金錢三 桂枝尖錢三 廣皮錢五 公丁香錢二 片薑黃錢三

小青皮錢三 煮三杯分三次服。

痰飲上泛。咳嗽稀痰。兼發痺症。初三日

桂枝錢六 雲苓皮錢五 川烏錢三 小枳實錢四 防己錢六

杏仁錢五 飛滑石錢四 薏仁錢三 炒黃柏錢三 桂心錢二

廣皮錢五 白通草錢二 煮三杯分三次服。

小便不暢。下焦濕聚。於原方複滋腎丸法。初六日

痺症未盡除。痰飲未全消。當盛暑流行之際。逐飲開痺。即所以防暑。十一

半夏 夏 錢六

雲苓塊 錢六

防己 錢三

生薏仁 錢六

桂枝 錢三

杏仁 錢三

小枳實 錢二

廣皮 錢二

煮三杯分三次服

暑泄腹脹舌黃其人本有痰飲痺症議五苓去朮加滑石厚樸杉皮木香

半夏藿香廣皮 日十二

桂枝 錢三

雲苓皮 錢五

木香 錢五分

飛滑石 錢六

豬苓 錢四

澤瀉 錢四

白蔻仁 錢三

厚樸 錢三

藿香梗 錢三

山連 錢一

半夏 錢三

川椒炭 錢二

杉皮 錢三

煮三杯分三次服

脈緩 日十五

脈緩甚俱服前方 日十六

久病在絡其本病統俟丸藥立方但逐痰飲宣氣化捍時令之暑濕而已

日廿二

半夏 錢六

雲苓塊 錢五

厚樸 錢二

小枳實 錢三

香附 錢三

杉皮 錢三

大腹皮 錢三

廣皮 錢三

煮三杯分三次服

服化癥回生丹起每日一丸 日廿六

脈浮筋骨痠痛氣短五心煩熱新感暑濕之氣加以辛涼與宣三焦 日廿七

銀花 錢三

小枳實 錢三

杏仁 錢三

藿香葉 錢三

連翹 錢三

廣皮三錢 白蔻仁二錢 薏仁五錢 煮三杯分三次服

背痛甚。先與通太陽之痺。七月初二日

桂枝六錢 雲苓皮八錢 小枳實五錢打碎 杏仁泥三錢 防己五錢

半夏五錢 川椒炭二錢 煮三杯分三次服。亥初令完。

近日陰雨連綿。背痛腹脹不減。兩便不爽。非暖則噦。與宣痺開鬱。兼去陳

莖。初九日

杏仁泥六錢 桂枝六錢 防己六錢 小枳實五錢 雲苓皮牛皮半塊二兩

公丁香三錢 厚樸五錢 晚蠶砂三錢 白蔻仁三錢 兩頭尖三錢

小茴香三錢 煮四杯分四次服。

寒濕發痺。脈緩甚。中有痰飲。廿一日

茯苓連皮八錢 生薏仁四錢 枳實三錢 熟附子二錢 防己五錢

桂枝八錢 片薑黃三錢 薤白三錢 川草薢五錢 杏仁四錢

川烏二錢 白通一錢五分 廣皮五錢 煮四杯分四次服。

脈弦緊。痰飲痺症。癥瘕因燥氣而發。臟腑經絡俱痺。故肢冷而畏寒也。峻

與通陽。廿八日

桂枝一兩 小枳實四錢 杏仁五錢 公丁香三錢 澤瀉三錢

川椒五錢 片薑黃三錢 半夏五錢 穿山甲一錢 防己五錢

歸鬚二錢 廣皮六錢 煮四杯分四次服。

自六月廿六日起。每日空心服化癥回生丹一丸。七月廿九日以後。每日服天台烏藥散三分五分一錢二錢不等。至十月十二日。每兩烏藥散中加巴霜一分。每晚服三分五分不等。間有服至一錢。十一月初一日以後。每晚間服通補奇經丸。

痺痛飲咳。脈弦細。十二月初十日

雲苓皮六錢 桂枝八錢 生薏仁五錢 川葶藶五錢 飛滑石四錢

防己五錢 小枳實三錢 川椒炭三錢 川烏頭三錢 杏仁四錢

煮四杯分四次服。

衝氣上動。畏寒。脈沈細。與桂枝加桂湯法。直伐衝氣。十二日

桂枝尖一兩二錢 紫石英六錢研 小茴香五錢炒 檇桂心八錢 雲苓塊三錢

煮四杯分四次服。

大寒節衝氣未止。脈反弦緊。於原方內加當歸五錢。川芎三錢。十三日

服二帖。脈中陽氣生動。衝氣平。畏寒止。仍然早服化癥回生丹一丸。晚

服通補奇經丸三錢。

宋女

十六歲

六脈弦緊。面色青白。寒痺攻胃。嘔吐不能食。足痠痛不能行。誤

與陰虛門中之陰柔以助其陰。又大用苦寒堅陰。重傷胃陽。無怪日重一

日也。先與和胃。令能食。再商治痺。戊子十一月初十日

薑半夏錢六

生薏仁錢六

生薑片二大

雲苓塊錢六

川椒炭錢三

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

六脈俱弦而緊。經謂脈雙弦者寒也。又謂緊則為寒。面色青黃。是色脈皆陰也。症現兩腿足痠痛。不能履步跪拜。按陽明主前。不能前者。陽明傷也。太陽主卻。不能卻者。太陽傷也。足太陽陽明兩經。為風寒濕三邪之干而成痺。更可知矣。痛甚則氣上沖心。嘔不能食。按諸上升之氣。皆自肝而來。姑娘年輕失母。肝鬱多端。肝木病則克胃土。挾寒上升。能不嘔乎。金匱謂腳氣攻心發作欲死者是也。再按腳氣即痺症之一端。濕燥寒三者為陰邪。此乃陰邪太實之症。醫法自當以通經達絡和胃開鬱為要。無奈不識陰陽。不分寒熱。不知虛實。一以補陰寒涼純陰之品。誤助病邪。甚有以大黃芒硝混下者。病家以得二便通利。則病勢少減。故屢用之。以致胃氣傷殘。日重一日矣。其大便通而病少減之故。蓋肝主疎泄。肝病則不得疏泄。又痺者閉也。初病在絡。經誤治成久病。延及臟腑矣。即用通大便法。亦當

溫下。不當用寒下。既助寒濕之邪。又重傷胃陽。繼傷腎陰。精神血氣。無一不傷。從茲以往。尚有生理乎。經云。勞者溫之。未聞勞者寒之也。又云。得穀者昌。又云。有胃氣者生。無胃氣死。治此症第一義。急救胃氣為要。胃氣和而得食得寐。再商治痺。如居家者然。萬事從緩。先安爐竈也。

脈弦細而緊。寒濕上攻。嘔吐不食。與和胃止嘔。稍能進食。仍宗前法。小便短。兼開太陽。日十二

薑半夏 六錢

草 薺 五錢

益智仁 二錢

生薑汁 三匙 沖

雲苓皮 六錢

香 附 三錢

煮三杯。分三次服。

寒痺。六脈弦緊。不食而嘔。便短。純陰沍寒之疾。與鬪陽明。嘔止得進食。與開太陽。便稍通。前方單救陽明。次方兼醒脾陽。將來治痺。且須峻補腎中真陽。而世人以予藥為熱不可服。不知頭等陽藥。如烏附之類。尙未服也。  
日十五

薑半夏 六錢

雲 苓 牛塊半 皮六錢

雞內金 三錢

生薏仁 六錢

益智仁 二錢

香 附 三錢

川葶薺 四錢

白通草 一錢

白蔻仁 三錢

廣 皮 二錢

煮三杯。分三次服。

誤傷胃陽。不食而嘔。自以復陽明之陽為主。即以十七歲不月而論。經謂



二陽之病發心脾。女子不月。此病亦當以通補陽明立法。再陽明主約束筋骨而利機關。經謂諸痿獨取陽明。痿痺更以通補陽明爲要。又謂虛則補其母。陽明陽土也。其母火也。補火焉能不用熱藥哉。日十七

薑半夏錢五

草 藳錢三

川椒炭錢一五分

生薏仁錢三

雲苓塊錢五

香 附錢三

益智仁錢一五分

廣皮炭錢三

生 薑錢三

煮三杯。分三次服。

魯氏三十一歲

太陽痺。腰腿痛甚。脈弦遲。與溫通經絡。己丑十一月初九日

雲苓皮錢五

桂 枝錢五

片薑黃錢三

生薏仁錢五

海桐皮錢三

羌 活錢一

木防己錢三

公丁香錢一

乳 香錢一

煮三杯。分三次服。服一帖。去羌活。再服一帖。

太陽痺。腰腿痛甚。因風寒而起。脈弦遲。與溫通經絡。茲風已化熱。右脈洪

大。痛未止。議用經熱則痺例。日十二

生石膏兩二

桂 枝錢六

小茴香錢三

雲苓皮錢六

杏仁泥錢五

生薏仁錢六

防 己錢六

片薑黃錢三

煮三杯。分三次服。

太陽痺。與經熱則痺例已效。仍宗前法。加利小便。使邪有出路。日十七

生石膏二兩

桂枝六錢

生薏仁六錢

飛滑石四錢

晚蠶砂三錢

雲苓皮六錢

防己六錢

杏仁泥五錢

小茴香三錢  
炒

川萆薢三錢

煮四杯。分日三夜一四次服。

痰飲

張氏四十歲

內而伏飲。外而新涼。內外相搏。痰飲斯發。壬戌八月廿五日

薑半夏五錢

杏仁粉三錢

厚樸三錢

飛滑石三錢

小枳實二錢

生薏仁五錢

桂枝木三錢

廣皮二錢

茯苓皮三錢

白通草三錢

生薑三片

煮三杯。分三次服。

支飲射肺。眩冒。小青龍去麻辛。廿八日

焦於朮三錢

桂枝四錢

生薏仁五錢

半夏六錢

小枳實二錢

杏仁粉五錢

乾薑二錢

製五味一錢

生薑三片

炙甘草二錢

炒白芍三錢

煮三杯。分三次服。

渴為痰飲欲去。不寐為胃仍未和。故以枳實橘皮湯逐不盡之痰飲。以半

夏湯和胃令得寐。九月初一日

半夏一兩

生薏仁五錢

秫米一合

小枳實二錢  
打碎 桂枝三錢

杏仁粉三錢

廣皮三錢

生薑三片

煮三杯。分三次服。得寐再診。

服半夏湯既得寐矣。而反更咳痰多。議桂枝乾薑五味扶苓湯。合葶藶大  
棗瀉肺湯逐飲。初六日

半夏錢五 扶苓塊錢六 苦葶藶子三錢 乾薑五錢  
炒黃

桂枝錢五 五味子錢三 肥大棗肉錢四

甘瀾水五椀。煮取二椀。分二次服。渣再煮一椀服。

先以葶藶大棗瀉肺湯。行業已攻動之飲。令其速去。初八日

苦葶藶錢四 肥大棗五枚 水五杯。煮取八分二杯。分二次服。  
去核

又服葶藶大棗湯後。即以半夏湯和胃。

半夏兩一 小枳實錢四 生薑五片 洋參生薑廿塊同搗  
錢二 炒老黃色

水八杯。煮取三杯。分三次服。

逐去水後。用外臺扶苓飲消痰氣。令能食。九月初十日

炒於朮錢六 扶苓塊錢六 廣皮三錢 半夏三錢

小枳實錢四 生薑八錢 洋參二錢 煮三杯。分三次服。  
製黃色 姜汁

飲踞脇下則肝病。肝病則脾氣愈衰。故得後與氣則快。先與行脇下之飲。  
泄肝即所以舒脾。俟脇痛止。再議補脾。十五日

生香附錢三 半夏錢四 蘇子霜錢三 廣皮二錢 旋覆花三錢  
包煎

小枳實一錢五分 青皮一錢五分 降香末三錢 煮三杯。分三次服。

行脇絡之飲。業已見效。尚有不盡。仍用前法。二十日

生香附三錢 半夏三錢 廣鬱金二錢 旋覆花三錢 包煎 蘇子霜一錢五分

歸鬚一錢 降香末一錢五分 廣皮一錢 小枳實一錢 煮三杯。分三次服。

通補中陽。兼行脇下不盡之飲。廿二日

代赭石五錢 半夏五錢 焦白朮三錢 桂枝三錢 旋覆花三錢 包煎

茯苓塊五錢 生薑三片 炙甘草三錢 煮三杯。分三次服。

通降脇下之痰飲。兼與兩和肝胃。十月初二日

半夏六錢 旋覆花三錢 包煎 廣皮二錢 桂枝尖二錢 小枳實二錢 打碎

乾薑一錢五分 蘇子霜三錢 生薑三片 煮三杯。分三次服。

金氏二十歲 風寒夾痰飲為病。自汗惡風。喘滿短氣。渴不多飲。飲則嘔。夜咳甚。倚息不得臥。小青龍去麻辛。加枳實廣皮。行飲而降氣。癸亥二月初十日

桂枝六錢 茯苓塊六錢 廣皮二錢 小枳實二錢 炒白芍三錢

半夏六錢 炙甘草三錢 乾薑三錢 製五味一錢五分 生薑三片

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

昨用小青龍。咳雖稍減。仍不得寐。今日用葶藶大棗合法。十一日

桂枝木八錢 半 夏六錢 小枳實二錢 苦葶藶三錢 炙甘草三錢

炒白芍四錢 乾薑五錢 五味子二錢 大棗肉五錢 廣皮三錢

水八杯。煮取三杯。分三次服。渣再煮一杯服。

用小青龍逐飲。兼利小便。使水有出路。十二日

杏仁泥五錢 桂枝五錢 小枳實二錢 乾薑二錢 炒白芍二錢

生薏仁五錢 半 夏五錢 白通草一錢 生薑三錢 製五味一錢

炙甘草一錢 煮成兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。

脈稍平。病起本渴。大服薑桂。渴反止者。飲居心下。格拒心火之渴也。仍以

蠲飲為主。微惡寒。兼和營衛。十三日

茯苓塊三錢 桂枝六錢 小枳實一錢 炒白芍三錢 大棗肉二錢

杏仁泥四錢 半 夏六錢 炙甘草一錢 廣陳皮一錢 製五味一錢

乾薑三錢 生薑三錢 煮成兩杯。分二次服。渣再煮一杯服。

咳則脇痛。不惟支飲射肺。且有懸飲內痛之虞。兼逐脇下懸飲。十四日

薑半夏八錢 桂枝六錢 蘇子霜二錢 旋覆花三錢 杏仁泥四錢

乾薑四錢 小枳實二錢 廣陳皮二錢 廣鬱金三錢 青皮二錢

生香附三錢 製五味五分 生薑五錢 煮三碗。分三次服。渣再煮一碗

服。

咳止大半。惟脇痛攻胸。肝胃不和之故。切戒惱怒。用通肝絡法。日十五

薑半夏錢六 桂枝尖錢三 乾薑錢三 廣鬱金錢三 旋覆花錢三 包煎

蘇子霜錢三 降香末錢三 歸鬚錢二 生香附錢二 青皮錢二

頭煎兩杯。二煎一杯。分三次服。

謝氏二十歲 痰飲哮喘。咳嗽聲重。有汗。六脈弦細。有七月之孕。與小青龍去

麻辛主之。癸亥二月廿二日

桂枝錢五 小枳實錢二 乾薑錢三 炙甘草錢一

半夏錢五 五味子錢一 廣皮錢五分 白芍錢三

甘瀾水五杯。煮取二杯。分二次服。渣再煮一杯服。

其人本渴。服桂枝乾薑熱藥當更渴。今渴反止者。飲也。惡寒未罷。仍用小

青龍法。胸痺痛加薤白。按飲為陰邪。以誤服苦寒堅陰。不能速愈。日廿三

桂枝錢八 小枳實錢二 半夏錢六 炒白芍錢四 薤白錢三

乾薑錢五 製五味錢一 厚樸錢三 炙甘草錢二 廣皮錢二

甘瀾水五杯。煮取二杯。渣再煮二杯。分四次服。

胃不和則臥不安。亥子屬水。故更重。脹也痛也。皆陰病也。無非受苦寒藥

之累。廿四日

薑半夏八錢

桂枝八錢

杏仁泥三錢

炒白芍三錢

茯苓塊五錢

乾薑五錢

五味子五分

苦桔梗三錢

生薏仁五錢

厚樸三錢

炙甘草一錢

薤白三錢

甘瀾水八碗。煮取三碗。分三次服。渣再煮一

碗服。

寒飲。誤服苦寒堅陰。大用辛溫三帖。今日甫能轉熱。右脈始大。左仍弦細。

咳嗽反重者。是溫藥啓其封閉也。再以溫藥兼活痰。痰出自然鬆快。廿五日

桂枝五錢

杏仁泥三錢

厚樸三錢

小枳實二錢

半夏八錢

茯苓五錢

炒白芍三錢

薤白三錢

製五味一分

乾薑三錢

薏仁五錢

栝蒌二錢

煎法服法如前。

右脈已退。病勢稍減。但寒熱汗多。胸痺。恐成漏汗。則陽愈虛。飲更難愈。議

桂枝加附子。去甘草以助脹故也。合栝蒌薤白湯意。通中上之清陽。護表

陽為急。廿六日

桂枝木六錢

厚樸二錢

小枳實一分

炒白芍四分

熟附子二錢

薤白三錢

大棗肉二枚

生薑三片

甘瀾水五杯。煮取兩杯。渣再煮一杯。分三次服。其第一杯服後。即噉稀

熱粥半碗。令微汗佳。其二三次不必啜粥。

昨日用桂枝湯加附子再加薤白法。漏汗已止。表之寒熱已和。但咳甚。議

與逐飲。廿七日

桂枝錢六 薑半夏錢五 茯苓錢六 生薏仁錢五 葶炒研細二錢

大棗肉枚五 甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

僧四十二歲 脈雙弦而緊。寒也。不欲飲水。寒飲也。喉中癢。病從外感來也。痰清

不粘。亦寒飲也。咳而嘔。胃陽衰而寒飲乘之。謂之胃咳也。背惡寒。時欲厚

衣向火。衛外之陽虛。而寒欲乘太陽經也。面色淡黃微青。脣色淡白。亦寒

也。法當溫中陽而護表陽。未便以吐血之後。而用柔潤寒涼。小青龍去麻

辛。加枳實廣皮杏仁生薑湯主之。用此方十數帖而愈。

徐氏二十六歲 酒客脈弦細而沈。喘滿短氣。脇連腰痛。有汗。舌白滑而厚。惡風

寒。倚息不得臥。此係裏水招外風為病。小青龍去麻辛證也。癸亥二月初十日

薑半夏錢六 桂枝錢六 炒白芍錢四 旋覆花三錢包煎 杏仁泥錢五

乾薑錢三 製五味錢一五分 炙甘草錢一 生薑片五 煮三杯。分三次服。

邵二十六歲 右關單弦。飲癖。少陰獨盛。水臟盛而土氣衰。已至吞酸。飯後吐痰

不止。治在胃腎兩關。不能戒酒。不必服藥。用真武湯法。癸亥七月廿三日



熟附子五錢

細辛一錢五分

茯苓塊六錢

真山連同吳茱萸浸炒一錢五分

生薑五片

吳茱萸三錢

生薏仁六錢

水八杯。煮三杯。分三次服。四帖。

內飲。用溫水臙法。已見大效。但藥太陽剛不可再用。所謂一張一弛。文武之道。且議理陽明。以為過峽文字。廿八日

薑半夏六錢

小枳實一錢五分

廣皮一錢

茯苓塊六錢

白豆蔻一錢

生薏仁六錢

生薑六錢

煮三杯。分三次服。四帖。

用理陽明。亦復見效。惟吐酸仍然未止。按吞酸究屬肝病。議肝胃同治法。

八月初三日

半夏六錢

茯苓三錢

青皮二錢

桂枝三錢

吳萸三錢

生薑三片

薏仁五錢

山連二錢 姜炒

煮三杯。分三次服。四帖。

某氏 內飲。招外風為病。既喘且咳。議小青龍法。

桂枝三錢

茯苓塊三錢

炒白芍一錢五分

乾薑三錢

麻黃一錢 蜜炙

製五味一錢

生薏仁五錢

細辛八分

半夏三錢

炙甘草一錢五分

煮三杯。分三次服。

又 痰飲喘咳。前用小青龍。業已見效。但非常服之品。脈遲緩。議外飲治

脾法。

茯苓塊六錢

桂枝五錢

生於朮三錢

益智仁五分

製茅朮四錢

半夏六錢

生薏仁五錢

炙甘草二錢

生薑五片

煮三杯。分三次服。四帖。

皮氏

四十歲

痰飲喘咳。左脈浮弦。沈緊自汗。勢甚凶危。議小青龍去麻辛。加

厚樸。杏仁。甲子十月廿八日

桂枝六錢

杏仁霜五錢

厚樸三錢

製五味二錢

半夏六錢

炙甘草三錢

乾薑五錢

炒白芍四錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

於前方內加雲苓塊五錢。半夏五錢。廿九日

服小青龍已效。然其水尙洋溢。未能一時平復。三十日

桂枝八錢

杏仁霜五錢

乾薑五錢

五味子三錢

雲苓八錢

半夏二錢

炒白芍五錢

廣皮三錢

炙甘草三錢

生薑五片

甘瀾水煮成四碗。分四次服。

以眩冒甚。於前方內加於朮六錢。十一月廿二日

脈現單弦。喘止咳減。眩冒未寧。再太陰屬土。既重且緩。萬不能一時速愈。

且痰飲多年。豈三五日可了。初四日

於六錢 杏仁霜五錢 桂枝五錢 五味子六錢

半一兩 炙甘草三錢 乾薑三錢 雲苓六錢

甘瀾水八碗。煮取三碗。分三次服。三帖。

福三十歲 痰飲胸痺。兼有脇下懸飲。乙丑二月 初三日

旋覆花三錢 包煎 桂枝三錢 厚樸二錢 薤白三錢 小枳實三錢

杏仁泥三錢 半五錢 栝蒌二錢 廣皮一錢五分 生香附三錢

水八碗。煮取三碗。分三次服。三帖。

胸痺懸飲已愈。惟腸痺食不甘味。議和肝胃。兼開腸痺。初七日

生薏仁五錢 半三錢 廣皮二錢 白通草二錢 小枳實二錢

杏仁八錢 薑汁三匙 水五杯。煮取二杯。渣再煮一杯。分三次服。

李三十歲 脈弦細而沈。咳嗽。倚息不得臥。胸滿口渴。用小青龍去麻辛法。丑乙

十一月十一日

桂枝六錢 小枳實七錢 白芍四錢 乾薑五錢 半一兩 夏五錢

五味子二錢 扶苓一兩 廣皮三錢 炙甘草三錢 煮四碗。分四次服。

服小青龍已效。但喉啞知渴。脈見微數。為痰飲欲去。轉用辛涼開提肺氣。

法。十三日

蜜炙麻黃三錢 石膏八錢 杏仁五錢 半夏三錢 苦桔梗三錢

生甘草三錢 廣皮一錢 煮三杯。分三次服。

煥氏三十歲 痰飲。法當惡水。反喜水者。飲在肺也。喜水。法當用甘潤。今反溫

燥。以其為飲也。既喜水。曷以知其為飲。以得水不行。心悸。短氣。喘滿。眩冒。

咳嗽。多痰。嘔惡。諸飲證畢具也。既為飲證。何以反喜水。以水停心下。格拒

心火。不得下通於腎。反來上燠華蓋。反格拒腎中真水。不得上潮於喉。故

溢乾而喜水以救之也。是之謂反燥。反燥者用辛能潤法。丙寅正月十四日

半夏一兩 小枳實八錢 雲苓塊一兩 杏仁泥六錢 廣皮五錢

生薑一兩 甘瀾水八椀。煮取三椀。渣再煮一椀。分四次服。

顏四十歲 嗽不欲飲。倚息不得臥。脇痛。自汗。不寐。脈弦緩。識小青龍去麻辛。

加杏仁薏仁。再重加半夏。丙寅正月廿四日

杏仁泥六錢 桂枝六錢 五味子一錢五分 焦白芍三錢

生薏仁一兩 半夏一兩 炙甘草一錢五分 乾薑三錢

甘瀾水八椀。煮取三椀。分三次服。

嘔涼水。於前方內加乾薑二錢。廣皮三錢。以消痰氣。廿七日

金匱謂桂枝乾薑為熱藥。服之當遂渴。今反不渴者。飲也。茲證不惟不渴。反嘔涼水不止。其為寒飲無疑。既真知其為飲。雖重用薑桂何懼乎。世人不能立方者。皆未真知病情也。畏而不敢服者。亦未真知病情也。二月初一日

桂枝八錢 小枳實二錢 乾薑七錢 焦白芍四錢 茯苓連皮四錢

半夏二兩 五味子一錢五分 廣皮三錢 炙甘草二錢 生薑五片

甘瀾水八杯。煮取三杯。渣再煮一杯。分四次服。

崑四十歲 飲家眩冒。用白朮澤瀉湯法。脈洪滑而沈。丙寅正月廿六日

半夏一兩 茯苓塊一兩 澤瀉二兩 白朮一兩 小枳實三錢

甘瀾水八碗。煮取三碗。渣再煮一碗。分四次服。

於前方內加竹茹六錢。生薑汁每杯沖三小匙。廿七日

脈沈微數。二月初十日

於朮一兩 半夏一兩 竹茹一兩 澤瀉二兩 茯苓塊一兩

甘瀾水八碗。煮取三碗。渣再煮一碗。分四次服。

丸方

半夏八兩 澤瀉八兩 雲苓塊六兩 天麻八兩 白朮六兩

共為細末。神麩糊薑汁為丸。如桐子大。每服三錢。日再服。重則三服。

陶氏三十歲 痰飲 脈洪數 咳嗽 倚息不得臥 有汗 胸痺 丙寅二月廿五日

生石膏八錢 桂枝五錢 老厚樸三錢 半夏六錢 杏仁泥五錢

小枳實五錢 廣皮二錢 炙甘草三錢 煮三杯 分三次服

某 懸飲者 水在肝也 非下不可 但初次診視 且用輕法

半夏一兩 旋覆花四錢 包煎 生香附五錢 降香末三錢 青皮三錢

廣皮三錢 蘇子霜三錢 煮三杯 分三次服

修氏六十歲 脈沈細而不調 喘滿短氣 心悸 氣上阻胸 咳嗽 倚息不得臥 乃

中焦痰飲 下焦濁陰為患 年老全賴陽氣生活 茲陰氣陰邪上僭如此 何

以克當 勉與通陽降濁法 己巳二月十六日

半夏二兩 旋覆花四錢 包煎 秫米合一 小枳實一兩 茯苓六錢

廣皮六錢 乾薑六錢 煮三碗 分三次服

懸飲內痛腸鳴 非下不可 以老年久虛 且不敢下 止有降逆而已 十七日

薑半夏二兩 桂枝五錢 廣皮五錢 薤白五錢 小枳實一兩

秫米四錢 椒目四錢 生薑一兩 旋覆花三錢 包煎 煮三碗 分三次服

年近八旬 五飲俱備 兼之下焦濁陰 隨肝上逆 逼迫心火 不得下降 以致

胸滿而瀆瀆然 無奈兩用通陽降逆 絲毫不應 蓋老年真陽太虛 一刻難

生難長。故陰霾一時難退也。議於前方內加香開一法。日十八

半 夏兩一 桂 枝錢六 小枳實兩一 栝 薑錢三 薤 白錢三

乾 薑錢五 茯苓連皮一兩 廣 皮錢五 生 薑兩一 沈 香研細末仲二錢

降 香錢三 煮三椀分三次服。

五飲而兼濁陰上攻。昨用苓桂重伐腎邪。大辛以開中陽。雖見小效。大勢

陰大盛而陽太衰。恐即時難以復辟也。勉與齊通三焦之陽法。日十九

桂 枝錢六 薑半夏錢六 厚 樸錢三 公丁香錢三 扶 苓兩一

乾 薑錢五 黑沈香錢三 薤 白錢四 小枳實錢六 生 薑兩一

廣 皮錢四 肉 桂研細末仲二錢 煮三椀分三次服。

仍宗前法而小變之。日二十

桂 枝錢六 薑半夏錢八 乾 薑錢五 茯苓塊兩一 薤 白錢三

廣 皮錢四 小枳實錢五 肉 桂錢三 炒川椒錢五 厚 樸錢三

生 薑兩一 煮三杯分三次服。

膀胱已開。今日可無伐腎邪。心下氣阻不能寐。仍然議中焦降逆法。令得

寐。日廿三

代赭石錢八 薑半夏兩二 旋覆花錢五 秫 米合一 廣 皮錢五

小枳實錢八

生薑自然汁仲

煮三椀分三次服。

昨用降逆和胃。業已見效。但逆氣雖降。仍然有時上阻。陰霾太重。肝氣厥

逆也。廿四日

代赭石錢八

半 夏一兩

旋覆花四錢 包煎

扶 苓連皮 一兩

薑 汁沖半 酒盃

小枳實錢六

廣 皮錢四

煮三椀分三次服。

陳四十病由瘧邪傷胃。正虛邪實。六脈俱結。且有痰塊塞滯經絡。陰道。病

有三虛一實者。先治其實。後治其虛。乙酉正月 廿五日

薑半夏錢六

扶苓塊錢五

杏仁泥一兩

廣 皮錢三

鴛眼枳實錢四

蘇子霜錢二

甘瀾水入椀。煮取三椀。分早中晚三次服。二帖。

脊痛。痺也。右腿偏輭。痿也。咳嗽而喘。支飲射肺也。日久不愈。皆誤補用熟

地等壅塞陰道之故。脈洪。廿八日

生石膏兩三

桂 枝錢五

扶苓皮錢五

薑半夏錢五

杏仁泥錢五

防 己錢四

片薑黃錢三

廣皮炭錢三

薏 仁錢五

煮四椀分四次服。

兩帖後。退生石膏一兩。加赤扶苓塊一兩。

再兩帖後。復加生石膏一兩。以左乳傍有結核作痛。加青橘葉五錢。

痺夾痰飲。與開痺蠲飲法。現在痺解而飲未除。脈之洪者亦減。病減者減



其製六日

薑半夏錢五

桂枝錢五

茯苓錢六

防己錢三

小枳實錢三

青橘葉錢三

薏仁錢五

廣皮錢三

煮三杯分三次服

加小枳實二錢廣皮二錢飛滑石六錢初八日

加生石膏一兩初九日

肝鬱夾痰飲咳嗽痰多吐瘀血十一日

旋覆花三錢包煎

萹仁錢二

桃仁泥錢二

廣皮炭錢二

薑半夏錢六

青皮錢二

降香末錢三

青橘葉錢三

蘇子霜錢三

歸鬚錢二

煮三杯分三次服

又痰飲夾肝鬱吐出瘀血後以兩和肝胃為主

丸方

雲苓連皮八兩

香附兩六

生薏仁兩八

半夏兩十

鬱金兩二

澤瀉兩八

益智仁兩四

廣皮兩五

共為極細末神麩水法為丸如小梧子大每服三錢日三服開水送下

暑濕行令脈弦細胃不開渴而小便短議渴者與猪苓湯法六月初五日

飛滑石錢六

猪苓錢五

雲苓錢四

澤瀉錢五

薑半夏錢四

益智仁一錢五分 廣皮三錢 煮三杯分三次服。胃開即止。

痰飲之質。冒暑欲嘔。六脈俱弦。雖渴甚難用寒涼。與局方消暑丸法。初六日

薑半夏八錢 茯苓四錢 藿香梗三錢 廣皮三錢 生甘草二錢

生薑汁每盃沖三小匙 煮三杯分三次服。

病減者減其製。減半夏四錢。茯苓二錢。初八日

腰以下腫。當利小便。渴而小便短。議渴者與猪苓湯例。十二日

飛滑石一兩二錢 猪苓八錢 半夏四錢 澤瀉八錢 雲茯苓六錢

煮三杯分三次服。以渴減腫消為度。

脈沈細。胃不開。減猪苓三錢。澤瀉三錢。飛滑石三錢。加廣皮三錢。藿香梗

三錢。益智仁三錢。十四日

暑濕病退。小便已長。陽氣不振。與通補陽氣。十六日

雲苓塊五錢 桂枝三錢 茅蒼朮二錢 半夏三錢 生薏仁五錢

白薏仁一錢 廣皮二錢 炙甘草二錢 煮三杯分三次服。

頭脹胸悶。脈緩氣軟。暑必夾濕也。十七日

藿香半梗半葉三錢 雲苓皮五錢 杏仁三錢 半夏三錢 薏仁五錢

白薏仁二錢 廣皮三錢 煮三杯分三次服。

小便濁加猪苓四錢。澤瀉四錢。十九日

暑月頭脹微痛。與清上焦。廿四日

藿香葉三錢 薄荷一錢 荷葉邊去蒂一張

六脈陽微。暑濕之餘。小便白濁與分利法。廿五日

草 薺仁五錢 桂枝三錢 益智仁三錢 猪苓三錢

蒼朮三錢 雲苓皮五錢 澤瀉三錢 煮三杯。分三次服。

濕熱為病。與苦辛淡法。七月十九日

半夏五錢 飛滑石六錢 桂枝三錢 猪苓三錢 杏仁三錢

澤瀉三錢 木通三錢 雲苓皮五錢 生薺仁五錢 煮三杯。分三次服。

濕熱為病。與苦辛淡法。小便已長。胃不開。與盪陽明。廿二日

半夏六錢 茯苓皮五錢 廣皮三錢 生薑三錢

薺仁五錢 益智仁三錢 煮三杯。分三次服。

加桂枝三錢。枳實三錢。白朮三錢。廿五日

痰飲喘咳。脈弦。與小青龍法。九月廿一日

薑半夏五錢 桂枝三錢 炒白芍二錢 杏仁泥四錢 小枳實三錢

乾薑二錢 五味子二錢 廣皮三錢 炙甘草一錢 煮三杯。分三次服。

痰飲脇痛而咳嗽。是謂懸飲。懸飲者水在肝也。脈弦數。水在內。外風未淨也。廿四日

薑半夏六錢

杏仁三錢

葶藶子二錢

香附三錢

桂枝尖三錢

旋覆花三錢  
包煎

青蒿三錢

黃芩炭五分

廣皮二錢

小枳實四錢

生薑汁三小匙

煮三杯。分三次服。

身熱退。去青蒿黃芩炭葶藶子。加杏仁二錢。廿五日

痰飲脇痛而咳嗽。是謂懸飲。水在肝也。脈弦數。廿七日

半夏六錢

桂枝尖三錢

小枳實三錢

旋覆花三錢  
包煎

杏仁三錢

蘇子霜三錢

降香末三錢

生薑汁三匙

香附三錢

廣皮二錢

煮三杯。分三次服。

病減者減其製。減半夏三錢。枳實一錢。蘇子一錢。降香一錢。桂枝一錢。連

前共服五帖收功。廿九日

錢十七歲。春初前曾不寐。與胃不和之靈樞半夏湯。服至二十帖。始得寐。茲

胃仍不甚和。猶有不寐之弊。納食不旺。再與和胃。乙酉四月廿七日

半夏六錢

生薑仁五錢

白蔻仁連皮一錢

益智仁一錢

雲苓四錢

薑汁仲三小匙

廣皮炭五分

煮二杯。分二次服。

備用方 肝遺熱於腦則成鼻淵。蒼耳子散主之。

辛 夷兩一

蒼耳子炒一兩

連 翹連心八錢

苦桔梗錢五

桑 葉錢六

銀 花錢八

茶菊花錢六

甘 草錢三

黃芩炭錢二

薄 荷錢二

共為極細末。每服二錢。雨前茶調。日二次。

胃不和。數與和胃。已得寐。進食。夜眠必流口水者。經謂胃熱則蟲動。蟲動

則廉泉開。廉泉開則液自出。與辛涼和胃法。五月初一日

半 夏錢六

生石膏錢四

扶 苓連皮六錢

白蔻皮錢五分

杏 仁錢三

薏 仁錢五

生薑汁每盃沖三小匙

煮三杯。分三次服。四帖。

口水減。牙痛。脈如故。再服四帖。初六日

方如前。再服四帖。十一日

風淫所勝。治以辛涼。佐以苦甘。十六日

金銀花錢三

芥 穗分八

苦桔梗錢二

連 翹錢二

香豆豉錢三

杏 仁錢二

生甘草錢一

桑 葉錢二

煮兩杯。分二次服。熱退為度。二帖熱退。

胃熱。夜間口中液自出。與和胃陰法。十八日

生石膏錢六

半 夏錢五

扶 苓錢五

白蔻仁錢五分

麥 冬不去心三錢

煮三杯。分三次服。

諸症皆減。去石膏。加麥冬二錢。廿二日

胃中向有飲聚。不寐。服半夏湯已愈。後因痰涎自出。與涼陽明亦減。餘飲未除。與服外臺茯苓飲意。廿八日

扶苓錢五 洋參錢二 生薑片三 半夏錢三 麥冬不去心 一錢

大棗去核 二枚 廣皮錢五分 枳實錢五分 煮兩杯。分二次服。

吳五十歲 六脈洪數。右寸獨大。酒客痰多。肺熱之至。乙酉四月廿九日

生石膏兩四 半夏錢五 薏仁錢五 杏仁錢五

茯苓皮錢五 防己錢三 煮三碗。分三次服。

加廣皮三錢。至五月二十日。共服二十帖。五月初十日

酒客形體壯盛而陽萎。其為濕中生熱。非精血之虛。其象顯然。與諸萎獨

取陽明法。廿六日

生石膏兩三 半夏錢五 防己錢四 薏仁錢八

黃柏錢五 茯苓皮錢八 木通錢三 煮三碗。分三次服。

去黃柏二錢。木通三錢。以喉嗆太久。今可兼清肺氣。加苦桔梗三錢。飛滑

石六錢。甘草一錢。六月十二日

脈洪數。右大於左。喉啞痰多。戒油膩。二十日

生石膏兩四 半 夏錢六 蘇葉牛梗三錢 炙甘草錢一

苦桔梗錢三 杏 仁錢五 煮三椀。分三次服。

七月廿一日

生石膏兩三 半 夏錢六 苦桔梗錢四 生甘草錢一

茯苓皮錢六 杏 仁錢四 煮三杯。分三次服。

右寸脈獨大。金實無聲。已效而未全愈。照前方再服三劑。前後共服八十

餘劑。計石膏二百數十兩。八月初四日

巖三十歲 六脈弦細短澹。吐血三年不愈。兼有痰飲。咳嗽。五更汗出。經謂陽

絡傷則血上溢。要知絡之所以傷者。有寒有熱。並非人之有絡。只許陽火

傷之。不準寒水傷之也。今人見血投涼。見血補陰。為醫士一大痼疾。醫士

之疾不愈。安望病家之病愈哉。此症陽欲亡矣。已難救治。勉照脈症立方。

乙酉五月初二日

薑半夏錢六 焦白芍錢三 乾薑炭錢三 桂枝木錢三 茯苓塊錢五

五味子錢二 廣皮炭錢三 小枳實錢二 煮三杯。分三次服。

覆診據云飲食已增。午後之五心煩熱如故。脈稍和緩。諸病必究寢食。得

穀者昌。方無可轉。至午後之熱。方即甘溫除大熱法也。因脈稍和緩。去乾薑炭。初六日

前後共服過十劑。汗斂食增。血並不吐。頭中發空。得甜食則咳減。中氣虛也。加甘草三錢。以補中氣。再服四帖。脈仍緊故也。十三日

前後共服十四帖。諸病向安。惟脈之弦緊如故。咳甚則欲嘔。於原方去五味子。減甘草。再服四帖。十七日

諸症皆漸減。痰亦漸厚。心悸甚。加枳實一錢。再服四帖。廿一日

脈弦細如故。咳嗽日減。夜甚。陽微陰盛可知。午後身熱已減。惟食後反覺嘈雜。胸中有水狀。少時即平。於原方加乾薑一錢。枳實二錢。廿五日

汗止。嗽減。五心煩熱亦減。脈弦數。夜間咳甚。服熱藥反不渴。飲尚重也。病痰飲者。冬夏難治。三十日

茯苓塊五錢 桂枝三錢 半夏六錢 五味子一錢五分 小枳實五錢

薏仁五錢 白芍三錢 廣皮炭五錢 炙甘草一錢 乾薑一錢

煮三杯。分三次服。

前方已服四帖。脈弦緊不數。仍不知渴。於前方內加炙甘草一錢五分。乾

薑二錢。再服三帖。大月初四日



脈弦緊如故。嗆咳如故。舌白滑甚。加桂枝二錢。再加乾薑三錢。初八日

脈之短濇退。而弦細如故。痰飲仍重。於前方內加桂枝二錢。再加乾薑二

錢。茯苓三錢。以化飲。十二日

夜咳已止。是其佳處。咳來日淺。亦是最好。左脈沈細。右脈弦緊。飲未盡除。

至遍身骨痛。久病之故。古人云。勞者溫之。甘溫調營衛而復胃氣。胃旺進

食。久久自愈。病減者減其製。十七日

桂枝三錢 五味子一錢五分 乾薑三錢 半夏五錢 枳實五錢

廣皮三錢 炙甘草二錢 煮三杯。分三次服。

蠲飲丸 痰飲久聚。未能一時猝去。業已見效。與丸藥緩化可也。戒生冷

惱怒。

桂枝半兩 小枳實四兩 乾薑六兩 蒼朮炭六兩 茯苓半兩

半夏一兩 益智仁四兩 廣皮十二兩 炙甘草六兩

共為細末。神麩糊為丸。如梧子大。每服三錢。日三服。飲甚時服小青龙

湯。

陳五十歲 人尙未老。陽痿多年。眩冒昏迷。胸中如傷油膩狀。飲水多則胃不

快。此伏飲眩冒症也。先與白朮澤瀉湯逐其飲。再議緩治濕熱之陽痿。豈

有六脈俱弦細而恣用熟地久服六味之理哉。乙酉五月初十日

冬於朮二兩 澤瀉二兩 煮三杯分三次服。

已效而未盡除再服原方十數帖而愈。十三日

李四十歲其人向有痰飲。至冬季水旺之時必發。後因伏暑成痢。痢後便溏。

竟夜不寐者多日。寒熱飢飽皆不自知。大便不痛。按暑必挾濕。況素有痰

飲。飲即濕水之所化。醫者毫不識病。以致如此。臥牀褥而不得起。不亦冤

哉。議不食不飢不便不寐。九竅不和。皆屬胃病例。與靈樞半夏湯令得寐

再商。乙酉五月初一日

薑半夏二兩 秫米二合

急流水八杯。煮取三杯。分三次服。得寐為度。

諸竅不和。六脈純陰。皆痰飲為呆膩。補藥所閉。昨日用半夏湯。已得寐而

未熟。再服前方三帖。續用小青龍去表藥。加廣皮枳實以和其飲。蓋現在

面色光亮。水主明也。六脈有陰無陽。飲為陰邪故也。左脈弦甚。經謂單弦

飲僻也。有一症必有一症之色脈。何醫者盲無所知。吾不知伊一生所學

何事。寧不愧死。十一日

薑半夏六錢 桂枝五錢 五味子二錢 炒白芍三錢

小枳實錢五 乾薑錢二 炙甘草錢三 廣皮錢三

甘瀾水八杯。煮成三杯。分三次服。

胃之所以不和者。土惡濕而陽困也。昨日純剛大燥。以復胃陽。今脈象較前生動。胃陽已有生動之機。但小便白濁。濕氣尙未暢行。胃終不得和也。與開太陽闔陽明法。日十八

薑半夏錢二 秫米錢一 猪苓錢六 桂枝錢四 茯苓皮錢六

飛滑石錢三 廣皮錢三 澤瀉錢六 通草錢一

急流水十一碗。煮成四碗。分早中晚夜四次服。

於原方內去滑石通草。加川椒炒去汗三錢。六月初三日

高五十歲 脈弦。痰飲。喘咳。與小青龍去麻辛。加廣皮枳實。乙酉五月十六日

薑半夏錢六 桂枝錢五 小枳實錢五 廣皮錢三 炙甘草錢三

五味子錢二 白芍錢三 乾薑錢二 煮三杯。分三次服。二帖。

已見小效。汗多加淨麻黃根三錢。日十八

病減者減其製。去桂枝枳實各二錢。日二十

服前藥汗少。惟善嚏。周身痠痛。於原方減乾薑一錢。加杏仁三錢。防己二

錢。日二十

董四十歲脈沈細弦弱。咳嗽夜甚。久而不愈。飲也。最忌補陰。補陰必死。以飲為陰邪。脈為陰脈也。經曰無實實。乙酉五月廿七日

桂枝六錢 小枳實二錢 乾薑三錢 五味子一錢 白芍四錢

半夏五錢 炙甘草一錢 廣皮三錢 煮三杯。分三次服。

復診加雲苓二錢 枳實二錢。六月初一日

其人本有痰飲。服小青龍胃口已開。連日午後頗有寒熱。正當暑濕流行之際。恐成瘧疾。且與通宣三焦。十七日

茯苓皮五錢 杏仁三錢 薑半夏四錢 生薏仁五錢

小枳實三錢 青蒿二錢 藿香梗三錢 白蔻仁一分

廣皮三錢 煮三杯。分三次服。

寒熱已止。脈微弱。去薏仁青蒿。加桂枝乾薑以治其咳。十九日

咳減。寒熱止。胃口開。嗽未盡除。脈尚細。小效不更方。服至不咳為度。廿二日

某。六脈弦緊。右脈沈取洪大。先從腰以上腫。例。舌白滑。無汗。從盜飲例

之大青龍法。減甘藥。為其重而滯也。乙酉五月初八日

生石膏兩一 桂枝五錢 炙甘草二錢 杏仁去皮留尖五錢

細辛二錢 大棗肉二枚 麻黃去節六錢 生薑三錢

煮成三杯。先服二杯。覆被令微汗佳。得汗止後服。不汗再服第二一杯。如上法。

盜飲。脈緊。無汗。咳嗽浮腫。昨用大青龍。汗出腫消。喘咳減。與開太陽。闔陽明法。十一日

半 夏五錢 飛滑石五錢 茯苓五錢 生薏仁五錢 桂枝一分

澤瀉三錢 蒼朮炭二錢 猪苓三錢 廣皮三錢 煮三杯。分三次服。

已服十數帖。後加蓮子五錢。益智仁二錢。

陳七十歲 懸飲。脈弦。左脇不快。為水在肝。法當用大棗湯。近八旬之老人。難

任藥力。與兩和肝胃可也。乙酉正月 初十日

旋覆花三錢 包煎 半夏五錢 香附五錢 廣皮三錢

小枳實三錢 淡吳萸二錢 青皮三錢 煮三杯。分三次服。

前方已服十餘帖。復診脈結加杏仁泥六錢。再服三帖。廿三日

覺羅六十歲 酒客痰飲哮喘。脈弦緊數急。與小青龍去麻辛。加枳實橘皮湯。

不應。右脇痛甚。此懸飲也。故與治支飲之小青龍。不應。應與十棗湯。以十

棗太峻。降用控涎丹。壬戌正月 十三日

甘遂五錢 大戟五錢 白芥子五錢

共爲細末。神麩糊丸。如梧子大。先服十三丸。不知。漸加至二十一丸。以得快便下黑綠水爲度。三服而水下喘止。繼以和胃收功。

汪室女

十七歲

伏暑夾痰飲。與三仁湯重加半夏廣皮。屢效。而熱不退。痰不除。右脈微結。中有痰塊堵塞隧竅。因延鄭芷谷兄針中泉穴。紫血出後。繼咳老痰二口。以後用藥。無不見效。半月後伏暑痰飲皆愈矣。

錢氏

三十歲

咳嗽。胃中停水。與小青龍去麻辛。重加枳實廣皮。五帖已愈。入

九。因回母家爲父祝壽。大開酒肉。其父亦時醫也。性喜用人參。愛其女。遂用六君子湯。服關東參數十帖。將近一年。胃中積水脹而且痛。又延其父視之。所用之藥。大抵不出守補中焦之外。愈治愈脹。愈治愈痛。以致胸高。不可以俯。夜坐不可以臥。已數日不食矣。其翁見勢已急。力辭其父。延余治之。余見其目欲努出。面色青黃。胸大脹痛不可忍。六脈弦緊。七八至之多。余曰。勢急矣。斷非緩藥所能救。因服巴豆霜三分。下黑水將近一桶。勢稍平。以和脾胃藥調之。三四日後漸平。胃大開。於是吃羊肉餃三十二枚。胃中大痛一晝夜。又用巴豆霜一分五厘。下後痛止。嚴禁血肉。通補脾胃。一月而安。

甲子八月  
初十日

趙四十歲太陽痺則腰脊痛。或左或右。風勝則引也。或喘或不喘者。中焦留

飲上泛則喘。不泛則不喘也。切戒生冷猪肉。與一切補藥。周年可愈。六脈  
洪大已極。石膏用少。萬不見效。命且難保。乙酉正月三十日

生石膏六兩

桂枝五錢

小枳實五錢

生薏仁五錢

薑半夏五錢

杏仁五錢

雲苓皮五錢

黃栢炭二錢

白通草一錢

防己四錢

煮三杯。分三次服。四帖。

復診於前方內加猪苓三錢。飛滑石一兩。小枳實二錢。四帖。二月初三日

於前方內去半夏猪苓。加海桐皮三錢。片子薑黃二錢。晚蠶砂二錢。黃柏

一錢。服至廿五日止。計十八帖。於前方再加桑皮二錢。初七日

於前方用石膏四兩。去黃栢炭。加薑半夏五錢。廿六日

兩日減石膏。止留二兩。廿七日八日

石膏仍用四兩。因拜婦停藥六天。廿九日三月初一日

石膏每劑用一二兩。初八日九日

右手脈洪大已減。石膏只用一兩。初十日

每日用石膏二兩。十一日十二日

石膏每天用一兩。十三日十四日

因感燥氣。停藥五天。十五日至十九日

石膏每帖用一兩。廿一日

每劑石膏用二兩。共服九帖。廿二日至三十日

自淮安復至紹興。又診得洪大之脈。較前已減七八。然較之平脈。仍大而有力。現在小便赤濁。牙縫臭味復出。痺痛雖止。陽明太陽兩經濕熱未淨。

太陰化氣未復。四月十五日至

生石膏兩四

杏 仁錢四

雲苓皮錢五

飛滑石錢六

海金砂錢五

晚蠶砂錢三

木 通錢三

薏 仁錢五

煮三杯。分三次服。四帖。

脈漸退。減石膏至一二兩。加薑半夏錢五 廣皮錢三

每日用石膏一兩。廿二日至廿六日

每日用石膏二兩。廿六日至廿七日

小便不利。廿七日

生石膏兩四

杏 仁錢四

薑半夏錢五

飛滑石錢六

生薏仁錢五

木 通錢三

茯苓皮錢五

海金砂錢五

陳 皮錢三

煮三杯。分三次服。四帖。

感受風寒。服桂枝湯。五月初一日

仍服前廿七日方三帖。初四日



內飲招外風爲病。初七日

薑半夏五錢 桂枝四錢 杏仁三錢 白芍二錢 小枳實五錢

防己三錢 乾薑一錢 廣皮三錢 炙甘草五分 煮三杯分三次服。

其第一杯服後即噉稀熱粥一碗覆被令微汗即解得汗後餘藥不必

噉粥服四帖。

前因風寒夾飲之故用小青龍法現在風寒解而飲未除脈復洪大仍與

大青龍與木防己湯合法兼治飲與痺也。十一日

生石膏六錢 桂枝六錢 防己四錢 茯苓皮六錢 飛滑石六錢

半夏六錢 木通三錢 小枳實三錢 杏仁四錢 廣皮三錢

煮三杯分三次服。

其人本有痺症痰飲現屆盛夏發泄暑濕傷氣故四肢痿軟少氣口中膠

膩欲嘔與局方消暑丸意。十四日

茯苓連皮一兩 炙甘草三錢 半夏六錢 生薑汁三匙 荷葉去蒂三錢

煮三杯分三次服。

停藥。十九日至廿三日

仍服十一日方至六月初七日止服十一帖。廿四日

停藥六月初八日

氣急欲喘。新感暑濕之故。於原方內加小枳實二錢。廣皮二錢。服五帖。

日十八

生石膏六錢

桂枝四錢

半夏六錢

飛滑石六錢

茯苓皮六錢

杏仁四錢

防己四錢

廣皮三錢

小枳實四錢

木通三錢

煮三杯。分三次服。四帖。廿三日

於原方內減石膏三錢。加飛滑石六錢。共成一兩二錢。木通二錢。共成五

錢。晚蠶砂三錢。廿七日

渴欲飲水。水入則吐者。名曰水逆。五苓散主之。廿九日

蒼朮三錢 炒枯

桂枝三錢

茯苓皮六錢

半夏五錢

猪苓四錢

澤瀉四錢

藿香三錢

生薑汁三匙

煮三杯。分三次服。

飲食有難化之象。於原方內去蒼朮。加廣皮炭四錢。神麩三錢。益智仁二

錢。小枳實三錢。以通胃腑。竝醒脾陽。七月初二日

右脈洪數。六腑不和。食後惡心。二便不爽。暑濕所干之故。議宣三焦。初七日

生石膏三兩

茯苓皮六錢

黃芩炭三錢

飛滑石六錢

生薏仁五錢

薑半夏五錢

小枳實三錢

益智仁三錢

白蔻仁一錢五分

廣皮三錢

生薑片三錢

煮三杯分三次服

加益智仁小枳實初九日

中焦停飲晚食倒飽是脾陽不伸之故一以理脾陽為法初十日

薑半夏五錢

茯苓五錢

益智仁一錢五分

川椒炭八分

生薏仁五錢

廣皮三錢

小枳實二錢

煨草果五分

白蔻仁一錢五分

煮三杯分三次服

停飲兼痺脈洪向用石膏並不見效數日前因食後倒飽脈不大石膏已

用至三十觔之多轉用溫醒脾陽絲毫不應水之蓄聚如故跗腫不消胃

反不開右脈復洪大有力小便短思天下無肺者無瀉肺寒者瀉短肺熱

者無瀉仍用石膏涼肺胃十七日

生石膏四兩

桂枝三錢

枳實五錢

防己四錢

薑半夏五錢

生薏仁五錢

廣皮五錢

煮三杯分三次服

於前方內加茯苓皮五錢杉皮五錢減石膏二兩廿一日

石膏只用四兩一帖廿二日至廿四日

石膏每帖只用二兩廿五日至廿八日

飲聚不行小便已清少時即變臭濁六腑之不通可知大藥已用不少而

猶然如是病機之頑鈍又可知矣議暫用重劑餘有原案廿九日

生石膏四兩

杏仁八錢

雲苓皮八錢

飛滑石一兩

薑半夏八錢

防己三錢

海金沙八錢

小枳實五錢

廣皮四錢

煮三杯分三次服

加石膏二兩八月初一日

又加石膏二兩初二日

減去廣皮四錢小枳實一錢初七日

脈之洪大不減加石膏二兩初十日

仍服前方十一日至廿七日

服石膏至五十觔之多而脈猶浮洪千古來未有如是之頑病皆誤下傷正於前誤補留邪於後之累今日去補陽明藥蓋陽明之脈大也九月初四日

生石膏八兩

防己五錢

雲苓皮一兩

木通三錢

飛滑石二兩

杏仁泥一兩

小枳實五錢

煮四杯分四次服

專以苦淡行水服兩帖再商

復診加生石膏四兩共成十二兩服四帖初七日

脈洪滑痰飲未除晨起微喘足跗腫未消盡餘有原案十三日

生石膏八兩

半夏六錢

生薏仁六錢

飛滑石一兩

雲苓皮六錢

杏仁四錢

葶藶子三錢

木通四錢

氣已不急。去葶藶子。右脈仍洪。加石膏一倍。共成一觔。日十五

氣急者。得葶藶而止。右脈之洪大者。得石膏一觔大減。病減者減其製。但

脈仍滑數。加行痰飲。日十六

生石膏六兩 半 夏一兩 枳 實三錢 杏 仁四錢 雲苓皮五錢

旋覆花四錢 廣皮四錢 香 附五錢 煮四杯。分四次服。

脈漸小。減石膏二兩。服二帖。日十八

脈洪數。加石膏八兩。共成十二兩。服二帖。日二十

脈洪數。減石膏六兩。加葶藶子一錢五分。日廿二

脈之洪大者。得石膏一觔。業經大減。病減者減其製。俟脈復洪大有力。再

酌加其製。日廿五

生石膏十二兩 半 夏一兩 香 附五錢 枳 實五錢

雲苓皮五錢 旋覆花四錢 廣皮四錢 杏 仁四錢

煮四杯。分四次服。

小便短。於原方加飛滑石一兩。日廿九

妙應丸 金匱謂凡病至其年月日時復發者。當下之。此證痰飲兼痺。自

正月服藥至十月。石膏將近百觔之多。雖無不見效。究未拔除病根。左脇

間澆澆有聲。不時喘咳。此水在肺也。金匱水在肺。十棗湯主之。又謂偏弦飲辭。又謂咳家之脈弦。尚有水。十棗湯主之。又謂咳家一百日至一歲不死者。十棗湯主之。合而觀之。此症當用十棗無疑。但十棗太峻。南人膽怯。未敢驟用。降用妙應丸續續下之。庶無差忒也。

製甘遂錢五

製大戟錢五

白芥子錢五

共為細末。神麩糊為丸。如小梧子大。從三十九丸服起。得下痰水即止。停數日。水不盡。再服。以盡為度。

服妙應丸二分六厘。大棗三枚煎湯下。清晨服。約二刻。先從左脇作響。隧痛至少腹。便下綠水膠痰。碗許。十月初二日

服妙應丸二分六厘。大棗二枚。煎湯下。便下痰水如前。湯藥未服。初三日氣喘。於前方內加石膏四錢。共成一觔。杏仁四錢。共成八錢。廣皮二錢。共

成六錢。加桂枝六錢。生薑四錢。服四帖。初四日

生石膏觔一

半

夏兩一

茯苓皮錢六

飛滑石兩一

小枳實錢五

杏

仁八錢

旋覆花四錢

蘇子霜二錢

廣皮錢三

煮四杯。分四次服。三帖。初八日

服妙應丸三分。十一日

服仍洪大有力。日十二

生石膏兩八

薏仁錢六

半夏錢六

香附錢三

雲苓皮錢六

旋覆花四錢  
包煎

杏仁錢四

廣皮錢三

煮三杯分三次服。

飛滑石兩一

半夏兩一

杏仁錢八

桂枝錢六

枳實錢五

茯苓皮錢五

旋覆花四錢  
包煎

廣皮錢四

香附錢三

蘇子霜錢二

煮三杯分三次服。日十二

去香附加蘇子霜。日二十

妙應丸三分四厘服之即下痰水。日廿二

妙應丸三分八厘服之下痰如前。日廿九

右服洪數本有聚飲小便不長。日十一月初四日

生石膏兩一

飛滑石兩二

小枳實錢四

半夏錢六

茯苓皮錢六

晚蠶砂錢三

生薏仁錢六

杏仁錢六

白通草錢二

煮三杯分三次服。

服妙應丸三分八厘下痰水如前。日初六

於前方加鬱金三錢。日十一

於前方加廣皮三錢石膏八兩。日十二

於前方加枳實二錢。旋覆花四錢。絹包。日十三

於前方加蘇子霜四錢。日十四

服妙應丸四分六厘。下痰水如前。日十五

服妙應丸六分。下痰水如前。日十六

痰飲喘咳。右脈洪。左關獨浮。與建金制木法。日十七

生石膏兩八

半

夏錢六

杏

仁錢六

香

附錢四

旋覆花四錢。包煎。

蘇子霜錢三

青

皮錢三

煮三杯。分三次服。

服妙應丸六分。自服丸藥。每次皆下痰水。惟此次未下。以服藥後即食粥

也。日廿一

服妙應丸六分。大便仍行痰水。日廿三

洪大之脈已退。惟兩關獨浮。右大於左而兼實。木陷入土。與兩利肝胃。兼

開膀胱。小便短而水易停故也。日廿七

飛滑石兩一

半

夏錢六

雲苓皮錢六

白

芍錢四  
酒炒

旋覆花錢三  
包煎

香錢三

附錢三

蘇子霜錢三

廣皮錢三

青

皮錢二

煮三杯。分三次服。

數日不服石膏。右脈復然洪數。左關之獨浮者。亦未十分平靜。與金木同

治法。日十二月初一日



生石膏兩六

半夏六錢

雲苓皮六錢

杏仁六錢

飛滑石兩一

小枳實六錢

香附四錢

旋覆花四錢  
包煎

煮三杯。分三次服。

以後凡右脈大者服此。小即停止。

服妙應丸六分。下痰水如前。初二日

仍服初一日原方二帖。初二日

於初一日方內加桂枝四錢。廣皮四錢。以畏寒故也。服五帖。初五日

服妙應丸八分。下痰水如前。初十日

於前方內去桂枝廣皮。脈不小故也。再服五帖。十一日

服妙應丸一錢。仍下痰水如前。十六日

曹四十歲咳嗽。脈洪大數實。面色黧黑。已為難治。況左脇脹痛。臥不著席。此

水在肝也。更為重極之症。先與大青龍以平其脈。再議逐脇下之飲。正月十九日

生石膏兩四

麻黃三錢  
去節

生薑五片

炙甘草三錢

杏仁泥五錢

桂枝三錢

大棗去核  
三枚

細辛二錢

煮三杯。先服一杯。得汗止後服。不汗再服。

痰飲。喘咳無汗。六脈洪大數實。與大青龍全劑。脈小咳減。惟口渴思涼未

除。脈仍帶數。仍與大青龍去麻辛可也。二十日

生石膏 三兩先煎代水

桂枝 三錢

小枳實 三錢

薑半夏 六錢

杏仁泥 六錢

雲苓 半皮半塊六錢

炙甘草 三錢

煮三杯。分三次服。

於原方內減石膏一兩。加枳實二錢。廣皮五錢。廿一日

痰飲喘咳。左邊臥不着席。脈洪大數實。與大青龍三次見效。脈已平復。惟

仍數耳。廿一日

生石膏 兩二

雲苓 半塊半皮六錢

桂枝 三錢

小枳實 三錢

薑半夏 六錢

炙甘草 三錢

杏仁泥 五錢

廣皮 五錢

煮三杯。分三次服。

陳女 十五歲 六脈弦數。午後身熱。前曾腹脹泄瀉。痰多喘咳。氣上阻胸。內飲

招外風為病。兼有伏暑之象。與通宣三焦。丙戌四月十五日

雲苓塊 六錢

生薏仁 五錢

白蔻仁 五分

薑半夏 五錢

杏仁泥 三錢

旋覆花 三錢包煎

黃芩炭 一分

藿香梗 三錢

煮三杯。分三次服。

六脈弦數較前雖減。而身熱未除。喘咳亦減。胃少開。鬱少舒。仍宗前法。餘

有原案。十八日

雲苓皮錢六

生薏仁錢五

廣鬱金錢二

薑半夏錢五

旋覆花錢三  
包煎

黃芩炭錢三

白蔻仁錢二

藿香梗錢三

杏仁錢三

青皮錢二

青蒿錢二

煮三杯。分三次服。

肝鬱夾痰飲。咳嗽。氣上阻胸。寒熱。與宣肝絡以開鬱。和胃以逐飲。降肝氣。鎮肝逆以去氣阻。調營衛以止寒熱。餘有原案。二十

代赭石錢五  
煨

桂枝錢三

炒白芍錢三

旋覆花錢三  
包煎

薑半夏錢五

香附錢三

廣鬱金錢二

歸橫鬚錢二

降香末錢三

廣皮錢三

煮三杯。分三次服。

肝鬱夾痰飲。兼有伏暑。寒熱。前與通宣二焦。繼以調和營衛。宣肝鬱。逐痰飲。兩法俱效。仍宗第二法。廿三

代赭石錢三  
煨飛

桂枝錢三

生薏仁錢五

香附錢三

旋覆花錢三  
包煎

炒白芍錢三

歸鬚錢二

薑半夏錢五

廣皮錢三

白蔻仁錢一

廣鬱金錢二

降香末錢二

煮三杯。分三次服。

脈大則病進。脈小則病退。肝鬱夾痰飲。三法俱效。仍以兩和肝胃調和營衛立法。廿六

代赭石錢五  
煨飛

桂枝錢三

降香末錢二

香附錢三

新絳紗錢三

炒白芍三錢

歸鬚二錢

旋覆花三錢 包煎

廣皮三錢

益智仁一錢五分

薑半夏五錢

煮三杯。分三次服。

諸症向安。惟餘痰飲。經未行。仍與兩和肝胃。廿九日

茯苓塊五錢

桂枝三錢

薑半夏五錢

香附三錢

炒白芍三錢

廣皮三錢

降香末三錢

生薑三片 大

全當歸二錢

煮三杯。分三次服。

脈和。昨日經行。經前腹痛。色紫黑。今日不痛。但少腹脹。須服化癥回生丹。

一二九。五月初四日

薑半夏三錢

桂枝二錢

香附三錢

廣皮二錢

焦白芍二錢

降香末二錢

歸鬚二錢

生薑三片

煮二杯。分二次服。

舒氏四十歲痰飲喘咳夜甚。脇痛。少腹亦痛。溺濁。水在肝也。經謂之懸飲。懸

飲者十棗湯主之。恐其太峻。宗其法而不用其方。己丑正月初七日

薑半夏五錢

生薏仁六錢

旋覆花三錢 包煎

香附三錢

雲苓皮六錢

小枳實三錢

降香末二錢

廣皮三錢

蘇子霜三錢

煮三杯。分三次服。

魯氏七十歲痰飲喘咳。倚息不得臥。左畔更不能着席。脇下有飲。水在肝也。

加逐肝中之飲。與小青龍法。己丑正月十一日

薑半夏六錢

桂枝四錢

廣橘皮三錢

旋覆花三錢 包煎

小枳實四錢

香 附三錢 五味子一分 乾 薑四錢 炙甘草二錢 煮三杯。分三次服。

痰飲喘咳。倚息不得臥。前與小青龍法。痰少活。右手今日脈結。塊痰所致。

重與利肺氣為要。十四日

薑半夏六錢 苦桔梗五錢 杏 仁五錢 雲苓塊五錢 小枳實四錢

旋覆花三錢 廣 皮三錢 蘇子霜三錢 生薑汁三匙 煮三杯。分三次服。

痰飲喘咳。倚息不得臥。脈結。前與利肺氣治結脈法。茲結脈已愈。但自覺

冷氣上冲。當伐其衝氣。十八日

雲苓塊一兩 桂 枝六錢 廣橘皮三錢 薑 汁三匙 小枳實四錢

薑半夏六錢 乾 薑四錢 甘瀾水煮三杯。分三次服。

潘二十歲 痰飲喘咳。脈弦。庚寅十月十六日

薑半夏六錢 桂 枝五錢 廣橘皮三錢 白 芍三錢 小枳實三錢

炙甘草三錢 乾 薑二錢 五味子二錢 煮三杯。分三次服。

喘稍定而不寐。與胃不和則臥不安。飲以靈樞半夏湯。十八日

薑半夏二兩 秫 米二合 甘瀾水入杯。煮取三杯。分三次服。

左脈弦甚。所謂單弦飲辭也。久飲受風。因而大喘不寐。與半夏湯。喘止能

寐。伏飲未除。廿四日

薑半夏六錢

桂枝三錢

小枳實三錢

乾薑三錢

雲苓塊五錢

炙甘草三錢

廣皮三錢

炒於朮三錢

煮三杯分三次服

覺羅氏少陽膽絡偏頭痛。係上焦火。病屬陽。胸滿短氣。不食不便。咳喘。脈沉弦。頭面肢腫。欲小便則寒噤。係中下焦水。病屬陰。陰陽水火兼病。礙難措手。勉與清上焦。勿犯中下二焦。俟上焦愈。再治下焦。己丑二月 初八日

連翹三錢

牛蒡子二錢

鉤藤三錢

刺蒺藜二錢

銀花三錢

荆芥穗一錢

丹皮二錢

茶菊花三錢

桑葉三錢

煮三小杯。分三次服。服一帖。頭痛減。

痰飲誤用苦寒。以致胸滿短氣。便閉不食。初九日

薑半夏八錢

小枳實四錢

廣皮三錢

杏仁泥八錢

煮三杯。分三次服。以大便通為度。

服一帖。便通思食。胸滿除。但頭復微脹。

珠氏三十歲六脈沈弦細弱。陽氣虛極。嘔吐。停水。食少。再吃生冷豬肉鹹味。

不可救矣。壬辰正月 廿八日

茯苓塊六錢

吳黃三錢

橘皮四錢

良薑三錢

川椒炭三錢

薑半夏六錢

生薑五錢

煮三茶杯。分三次服。

即於前方內去良薑加乾薑炭三錢。二月初

陽虛受寒服溫藥已效。仍有脇脹臍痛。六脈弦細。初五日

薑半夏錢五 吳黃錢二 厚樸錢二 川椒炭錢三 小茴香三錢 炒黑

良薑錢二 香附錢三 青皮錢二 廣橘皮錢三 煮三杯分三次服。

於前方內加扶苓塊五錢。初九日

陽微脈弦細。脇脹減而腹痛未除。十二日

吳茱萸錢三 烏藥錢二 檳榔錢二 小茴香三錢 炒 廣橘皮錢三

良薑錢三 青皮錢二 生薑錢三 片 川椒炭錢三

煮三小杯分三次服。

本受燥金寒氣。又加肝鬱脇痛。治在肝絡。廿二日

新絳紗錢三 香附錢三 蘇子霜錢三 包煎 旋覆花三錢 薑半夏錢五

青皮錢二 川椒炭錢三 歸橫鬚錢二 降香末錢三 橘皮錢三

煮三杯分三次服。

某其人本有痰飲喘咳。又感風溫。不惡寒。反惡熱。口渴。暮夜身熱。頭暈

汗多。暫與辛涼清上。壬辰二月初五日

連翹錢三 苦桔梗錢三 銀花錢三 香豆豉錢二 蘆根錢三

杏仁泥三錢 桑葉三錢 炙甘草一錢五分 竹葉三錢 煮三杯分三次服。

痰飲喘咳。又加溫熱。前與辛涼。茲溫熱已退。脈猶微數。尚不能純然大溫。

以治飲。且與平劑為穩。初七日

茯苓皮六錢 杏仁五錢 小枳實四錢 香附三錢 薑半夏六錢

旋覆花三錢 橘皮四錢 蘇子霜三錢 煮三茶杯分三次服。

胃不和則臥不安。與靈樞半夏湯和胃。初九日

薑半夏二兩 秫米一合 急流水八杯。煮取三杯。分三次服。

痰飲喘咳。脈弦細。十一日

薑半夏六錢 桂枝四錢 五味子一錢五分 焦白芍二錢 廣橘皮四錢

乾薑三錢 小枳實一錢 細辛一錢 炙甘草三錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

痰飲喘咳。與溫中降氣已效。仍宗前法而進之。十三日

桂枝三錢 小枳實五錢 細辛一錢 蘇子霜三錢 杏仁三錢

焦白芍二錢 乾薑三錢 廣橘皮五錢 炙甘草三錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

痰飲喘咳已愈五六。惟口乾頭暈不寐。與辛能潤法。十五日



薑半夏二兩 秫 米合一 急流水八碗。煮取三碗。分三次服。

痰飲不寐。與半夏湯已寐。惟短氣心悸未除。汗多。日十八

薑半夏六錢 桂 枝三錢 小枳實三錢 雲苓塊五錢 五味子三錢

乾 薑三錢 炙甘草三錢 廣橘皮三錢 麻黃根去淨蘆三錢 煮三杯。分三次服。

痰飲喘咳俱愈。又感風溫。頭暈。脈數。身熱。與辛涼法。日廿一

連 翹三錢 苦桔梗三錢 桑 葉三錢 荊芥穗一分 銀 花三錢

香豆豉三錢 竹 葉二錢 炙甘草一錢 薄 荷一錢

煮三小杯。分三次服。

風溫已解。痰飲不寐。左脇痛。與兩和肝胃。日廿二

薑半夏六錢 桂 枝三錢 降香末三錢 歸 鬚二錢 旋覆花三錢

香 附四錢 廣橘皮三錢 青 皮二錢 蘇子霜三錢 秫 米一撮

煮三杯。分三次服。

飲脹。脇下痛而咳。日廿五

薑半夏六錢 桂枝尖三錢 香 附四錢 降香末三錢 小枳實四錢

旋覆花三錢 杏仁泥三錢 乾 薑三錢 蘇子霜三錢 廣橘皮四錢

甘瀾水八杯。煮取三杯。分三次服。

病減者減其製。餘有原案。廿八日

薑半夏錢六

香

附錢三

小枳實錢二

乾

薑錢三

旋覆花二錢 包煎

廣橘皮錢三

青

皮錢二

蘇子霜錢二

煮三杯。分三次服。

痰飲未盡除。脇下有癢痕硬塊。與溫通絡法。三月初八日

薑半夏錢五

香

附錢三

小枳實錢三

旋覆花三錢 包煎

川椒炭三錢

乾薑錢三

吳茱萸錢二

蘇子霜錢三

小茴香三錢 炒

廣皮三錢

煮三杯。分三次服。

卷四

疝瘕

胡氏二十歲脈沈而細。體厚而白。陽虛可知。奔豚從少腹上攻心胸。發作欲死。氣回則已。嘔酸。瘰癧。大便結燥。頭暈心悸。皆肝經累及衝脈為病。八月廿三日

桂枝尖二錢

降香三錢

川棟子五分

淡吳萸三錢

廣木香一錢

炒全歸三錢

雲連炭一錢

炒小茴香三錢

川芎一錢

廣鬱金二錢

青皮三錢

兩頭尖二錢

煮三杯。分三次服。三帖。

復診仍用前法廿六日

桂枝一錢五分

製香附三錢

全歸三錢

降香三錢

炒小茴香三錢

川芎五分

半夏三錢

淡吳萸二錢

廣皮二錢

青皮二錢

雲連炭一錢

煮三杯。分三次服。三帖。

仍以前法加減廿九日

紫石英研細五錢

生香附三錢

淡吳萸三錢

降香末三錢

廣皮二錢

桃仁泥二錢

川棟子三錢

炒全歸三錢

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢

青皮一錢五分

煮三杯。分三次服。

通補八脈。九月初三日

生鹿角四錢

肉桂去粗皮 淨八分

降香末三錢

紫石英生研細 五錢

杞子三錢

炒全歸三錢

桂枝尖二錢

生香附三錢

炒小茴香三錢

煮三杯。分三次服。

章氏七十歲老年瘦泄。小腹堅痛。上連季脇。小便短赤之極。六脈洪數。法宜

急開陰絡。且令得小便。庶可痛減進食。乙丑四月廿七日

川棟子三錢

歸鬚三錢

藏紅花一錢

降香末三錢

良薑一錢 五分

兩頭尖三錢

炒小茴香三錢

琥珀三分

薤白汁點三匙

麝八釐與琥珀同研極細沖

生香附三錢

煮三杯。分三次服。

六脈洪數。較前更甚。於前方內去兩頭尖。加川黃連一錢。廿八日

脈小則病退。較平人猶覺大也。廿九日

川棟子三錢

檳榔一錢 五分

淡吳萸二錢

降香末三錢

青皮一錢 五分

真雅連一錢

炒小茴香三錢

琥珀四分

藏紅花八分

生香附三錢

歸橫鬚八分

麝同研極細 沖五釐

煮三杯。分三次服。

病勢少減。惟嘔惡不食。兼與和胃。三十日

烏藥二錢

製半夏三錢

檳榔一錢 五分

歸鬚二錢

降香末三錢

紅花五分

川連一分

淡吳黃三錢

血珀三分

青皮二錢

炒小茴香三錢

口

麝五釐與血珀同研極細

頭煎八分兩茶杯。二煎一茶杯。分三次服。

帶下痕聚。皆衝任脈為病。數日來急通陰絡。效已不少。但大脈洪數有力。

謹防下部生瘡。凡瘡皆屬君火。瀉心者必瀉小腸。且膽無出路。必借小腸

以為出路。小腸火腑。非苦不通。五月初一日

蘆薈一錢

龍膽草三錢

山連五分

半

夏

川棟子三錢

青皮五分

歸鬚三錢

生香附三錢

琥

珀三分

口

麝同研極細

烏藥二錢

淡吳黃三錢

檳榔二錢

小茴香三錢

煮三杯。分三次服。

今日脈雖小而泄較多。初二日

吳黃三錢

降香末三錢

草薢三錢

良薑三錢

薑

生香附三錢

烏藥二錢

半夏二錢

川棟子三錢

歸鬚二錢

鬚二錢

青皮五分

小茴香三錢

廣皮二錢

煮三杯。分三次服。

大瘕泄痛甚。且有瘀血積滯。法宜通陽和絡。初三日

吳黃三錢

降香末三錢

紅花五分

安

桂一分

川棟子三錢

琥珀三分

歸鬚三錢

廣木香二錢

生香附三錢

口

麝同研極細沖五釐

川椒炭三錢

青皮五錢

川連五錢

煮三杯分三次服

脈證俱減。惟脇脹嘔惡。仍用前法而小變之。初四日

川棟子三錢

安桂一錢五分

川椒炭三錢

降香末三錢

青皮二錢

生香附三錢

淡吳萸三錢

紅花五分

廣鬱金二錢

小茴香三錢

廣皮二錢

川黃連一錢五分

煮三杯分三次服

於前方內去川椒炭再服一帖。初五日

老年久病勢已緩。且減其製。間服烏藥散五分。不痛不服。初六日

半夏六錢

炒小茴香五錢

川連一錢五分

全歸土炒老黃三錢

川棟子三錢

吳萸泡一錢五分

桂心研細沖一錢

生香附三錢

廣皮一錢

紅花五分

煎二杯分二次服

老年久病。諸症悉減。未便純任攻伐。議通補兼施。能入奇經者宜之。初七日

炙龜板三錢

全歸黃酒炒三錢

小茴香少加黃酒炒黑三錢

鹿角霜二錢

艾炭一錢

生香附三錢

枸杞子炒二錢

砂仁一錢五分

煎二杯分二次服

王氏 濁陰上僭。滴水不下。痛脹不可忍。而又加之以大瘕泄。六脈幾於

無陽殆哉。廿六日

炒川椒八錢

萹撥四錢

小枳實五錢

淡吳萸六錢

良薑三錢

焦白芍三錢

安邊桂去粗皮五錢

紅麴三錢

炒黃芩二錢

老厚樸五錢

歸鬚一分五錢

炒川連二錢

九碗水煮成三碗。加桂再煮。得八分三碗。分三次服。

濁陰之上攻者少平。積滯之下趨者未淨。且有黑暗紫穢之形。思有形有質之邪。非急趨不可。議溫下法。欲便先痛。便後痛減。是其可下之據也。再以體虛而論。急逐其實。正所以護其虛也。不然。纏綿日久。終歸於憊。反欲下而不能矣。古人所謂網開一面也。初一日

桂心三錢

生大黃酒炒黑五錢

炒黃芩二錢

川椒炒黑五錢

炒白芍三錢

紅麴二錢

厚樸三錢

淡吳萸五錢

廣皮三錢

歸尾二錢

炒川連二錢

水八杯。煮成三杯。先服二杯。以知消息之。即得快大便方

已之意。

化癥回生丹方

鼈甲膠一兩

人參六兩

桃仁三兩

益母膏八兩

熟地四兩

紅花二兩

公丁香三兩

白芍四兩

麝香二兩

小茴炭三兩

歸尾四兩

乾漆二兩

五靈脂二兩

杏仁三兩

川芎二兩

京三稜二兩

蘇木三兩

香附二兩

蘇子霜二兩

安桂二兩

阿魏二兩

元胡索二兩

降香二兩

艾炭二兩

片薑黃二兩

吳黃二兩

良薑二兩

兩頭尖二兩

乳香二兩

水蛭香油炒  
焦二兩

川椒炭二兩

沒藥二兩

蟲蟲二兩

蒲黃炭一兩

大黃八兩

此物為細末以高米

醋一斤半熬濃晒乾為末再加醋熬如是二次晒乾末之

右藥共為細末。以鱉甲大黃益母三膠和勻。再加煉蜜為丸。重一錢五

分。蠟皮封護。用時溫開水和。空心服。瘀甚之症黃酒下。

一治癥結不散不痛。

一治癥發痛甚。

一治血痺。

一治瘧母左脇痛而寒熱者。

一治婦女乾血癆症之屬實者。

一治婦女經前作痛。古謂之痛經者。

一治婦女將欲行經而寒熱者。

一治婦女將欲行經。誤食生冷腹痛者。



一治婦女經閉。

一治婦女經來紫黑。甚至成塊者。

一治產後瘀血。少腹痛。拒按者。

一治腰痛之因於跌撲死血者。

一治跌撲昏暈欲死者。

一治金瘡棒瘡之有瘀滯者。

馬氏二十歲。腹痛十數年不愈。三日一發。或五日十日一發。或半月一發。發時痛不能食。無一月不發者。與天台烏藥散。發時服二錢。痛輕服一錢。不痛時服三五分。一年以外。其瘕化盡。永不再發。

史氏三十歲。少腹痛不可忍。六脈弦細而緊。其夫曰。妊孕業已足月。想欲產耳。余曰。胎脈流利。弦緊乃賊克之脈。此瘕也。見病脈故不見胎脈。與辛香

流氣飲二帖而痛止。三日後大生如故。

王室女二十歲。肝鬱結成癥瘕。左脈沈伏如無。右脈浮弦。下焦血分閉塞極矣。此乾血癆之先聲也。急宜調情志。切戒怒惱。時刻能以恕字待人。則病可愈矣。治法以宣絡為要。乙酉八月三十日

新絳紗三錢

桃仁泥三錢

廣鬱金三錢

蘇子霜三錢

旋覆花包三錢

吳鞠通醫案

卷四 疝瘕

二九五

歸橫鬚三錢

降香末三錢

公丁香一錢五分

煮三杯分三次服

服前藥四帖。六脈沈伏如故。絲毫不起。病重則藥輕。於前方內加川椒炭三錢。良薑二錢。九月初四日

再用化癥回生丹早晚各服一丸。服至癥瘕化盡為度。三四百丸均未可定。斷不可改絃易轍也。

癥瘕瘀滯。服宜絡溫經藥二十二劑。化癥回生丹四十餘丸。業已見效不淺。脈亦生動。經亦暢行。藥當減其製。化癥回生丹每早空心只服一丸。效則不必加。切戒生冷猪肉介屬。可收全功。十月十七日

新絳紗三錢

丹皮五錢

廣鬱金二錢

香附三錢

旋覆花包三錢

歸橫鬚二錢

降香末二錢

廣皮二錢

蘇子霜一錢五分

煮三杯分三次服

此方常服可全愈

胎前

汪氏三十歲痢疾古稱滯下。冗久病脈實。欲便先痛。便後痛減。其為積滯未

清無疑。非網開一面。不能補虛。議溫下法。所以敢用此者。經謂有故無殞

故無殞也。癸亥七月初五日

生大黃三錢

官桂一錢五分

焦神麩二錢

炒白芍二錢

黃芩一錢五分 南查炭一錢 老厚樸二錢 雲連一錢

廣木香一錢 桃仁泥一錢 歸鬚一錢

水四茶杯。煮成六分三茶杯。先服一杯。候四個時辰。問病人再便腹不

痛。止後服。若欲便之。先痛減其半。再服一分之半。痛仍照前。再服一分。

其第三次亦如前候法。

服前藥全然不痛。初七日

焦白芍一錢五分 茯苓二錢 廣木香八分 黃芩炭八分 雲連酒炒三分

老厚樸一錢 焦茅朮一錢 蓮子二錢 廣皮炭一錢 煮二杯。分二次服。

滯下腹痛已去七八。咳嗽冷痰。脈近緩。仍然雞鳴欲便。議宣滯之中。兼醒

脾胃兩陽。初九日

茯苓塊四錢 厚樸二錢 製茅朮三錢 焦白芍二錢 半夏二錢

煨肉果一錢五分 黃芩炭二錢 廣皮一錢 廣木香一錢 煮三杯。分三次服。

黃氏三十歲 死胎不下已三日矣。六脈大。心悸甚。汗大出而喘。按俗脈僉

以平胃散加樸硝。茲陽虛欲脫。前法下咽即死矣。與救逆法護陽斂汗。陰

陽和而胎自下。

遠參三錢 牡蠣五錢 蓮子五錢 雲苓四錢

龍骨錢五

炙甘草錢三

麥冬砂拌  
錢三

煮三杯。服一杯而汗減。喘定。服二杯而死胎自下。服三杯而神定。以天

根月窟膏兩補下焦陰陽法。兩月而安。

關氏三十歲難產三日不下。脈大。年長陰氣不足。交骨不開。

生龜板兩八煮兩碗。盡劑而生。生後補陰而安。

滿氏三十歲難產五日不下。呼吸定息。脈再至。陽氣不充。裏寒。且有癰瘕。與

溫經。

肉桂錢五

雲苓塊錢五

川芎錢二

人參錢一

川椒炭錢三

全歸錢三

煮三杯。分三次服。盡劑而生。大小無急。

又產後惟腹中癰痛甚。仍以前方內加

炮薑錢四

淡吳萸錢三

炒小茴香錢三

桃

仁錢三

煮三杯。分三次服。服後下血塊長六七寸者二枚。略如狗形無腿。腹中尚有一枚。不敢再攻。以服通補奇經丸化淨。而身體大健。

史氏妊娠七月。溫熱。用承氣大下。已載溫熱門中。胎氣全然無傷。其所

生之子已三十三歲矣。

范氏二十歲八歲。每殞胎必三月。肝虛而熱。業已殞過三次。考古法用桑寄生湯。

按寄生湯內用人參五錢。又非二三帖所能保。况業已見紅。即人參甚便。亦不能定其必可以保。况力不足者多。能用參者少。且寄生未定其桑也。柳寄生亦復不少。藥不真焉能見效。內經謂上工治未病。何若於未孕未殞之前。先用藥為妙。故用專翕大生膏一料。計二十四觔。每日服一兩。分早中晚三次。一料盡又受孕。自二百四十天仍舊不保。其夫來報。余甚慚愧。自以為計之不善也。其夫云不然。前次之殞。滑不可解。若不知者然。此次之殞。宛如大生。艱難萬狀。是藥力已到。而未足其補之量也。皆久滑難補之故。望先生為加減急急再做一料。乘月內服起。必可大生也。於是照前方加重分量。共計生料八十斤。外加嫩麋茸二觔。作細末。和膏內。得乾丸藥三十觔。以後連生四五胎。無一小產者。

專翕大生膏 酸甘 鹹法

- |                          |                                |                       |                         |                          |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 人                        | 參 <small>二觔 無力者以製 奔參代之</small> | 熟地黃 <small>三觔</small> | 杞子 <small>炒黑 一觔</small> | 白芍 <small>二觔</small>     |
| 沙蒺藜 <small>一觔</small>    | 牡蠣 <small>一觔</small>           | 扶芩 <small>二觔</small>  | 五味子 <small>半觔</small>   | 海參 <small>刺大者 二觔</small> |
| 麥冬 <small>不去心 二觔</small> | 烏骨雞 <small>雌雄 一對</small>       | 鮑魚 <small>二觔</small>  | 豬脊髓 <small>一觔</small>   | 龜板 <small>另熬膠 一觔</small> |
| 蓮子 <small>湖南 二觔</small>  | 鼈甲 <small>另熬膠 一觔</small>       | 羊腰子 <small>八對</small> | 芡實 <small>三觔</small>    | 阿膠 <small>二觔</small>     |
| 白蜜 <small>一觔</small>     | 鷄子黃 <small>去白 二圓</small>       |                       |                         |                          |

右藥分四銅鍋。忌鐵器攪用銅杓以有情歸有情者二。無情歸無情者二。文火細

煉三晝夜。去渣。再熬六晝夜。陸續合為一鍋。煎煉成膏。未下三膠合蜜

和勻。以方中有粉無汁之茯苓白芍蓮子芡實為末。合膏為丸。每服二

錢。漸加至三錢。日三服。一日一兩。期年為度。每殞胎必三月。肝虛而熱

者。加天冬一觔。同熬膏。再加鹿茸二十四兩為末。本方以陰生於八成於七故用三七二十一之奇方守陰也加

方用陽生於七成於八三八二十四之偶方以生胎之陽也古法通方多用偶守方多用奇陰陽互也或加桑寄生一觔。

方論。夫乾其動也直。其靜也專。是以大生焉。夫坤其動也闢。其靜也翕。是

以廣生焉。此方法乾坤之靜取靜以到動之義。專治陽極而亢。陰衰而躁。

如產後血虛鬱冒。自汗出。大便難。瘕瘕。俗名驚風每殞胎必三月。溫熱誤下。誤

汗。邪退後陰之所存無幾。一切陰虛而陽不損之症。蒼萃三陰柔藥。半用

血肉有情。蠕動而不呆板之物。養陰最速。接其生氣。而以收藏納縮之少

陰為主。蓋陽主開。陰主閉。故從來治腎。以大封大固為主。經云腎為封藏

之本。兼溼燥寒三項陰邪之病者禁用。

干氏 每殞胎必三月。前人謂肝虛而熱。用桑寄生湯。余前保范氏胎。以

寄生湯藥品難得。又鞭長莫及。改用專翕大生膏。純然補陰。為乙癸同源

之治。遂大生四五胎。茲症面青黃。脈弦細。不惟不熱。且虛寒之甚。改用天

根月窟膏。兩補下焦陰陽。兼補入脈。始大生一胎。孩體冰涼不赤。未能存活。又服藥一年。又大生一胎。嬰兒仍不甚溫。又服藥一年。又大生兩胎。存活一男一女矣。

產後

王氏<sup>二十歲</sup>熱雖重而陰脈有餘。非虛證也。乃伏暑為病。陽陷入陰之故。疲

多咳嗽。胸痞不饑。忌柔藥。<sup>癸亥二月 初四日</sup>

炙龍甲<sup>五錢</sup>

茯苓皮<sup>三錢</sup>

乾薑<sup>一錢</sup>

青蒿<sup>三錢</sup>

廣鬱金<sup>三錢</sup>

青皮<sup>一錢五分</sup>

半夏<sup>三錢</sup>

青橘葉<sup>三錢</sup>

生薑<sup>三片</sup>

廣皮<sup>一錢五分</sup>

黃芩炭<sup>一錢五分</sup>

煮三杯。分三次服。

服剛藥而寒反多。熱反少。脈反緩而小。不渴。太陰溼重也。<sup>初六日</sup>

茯苓<sup>連皮 五錢</sup>

茅朮炭<sup>三錢</sup>

青蒿<sup>三錢</sup>

半夏<sup>五錢</sup>

廣鬱金<sup>二錢</sup>

廣皮<sup>二錢</sup>

乾薑<sup>三錢</sup>

黃芩炭<sup>一錢五分</sup>

生薑<sup>三錢</sup>

草果<sup>煨 一錢</sup>

煮三杯。分三次服。

脈緩。舌苔重。便溏。胸痞。色淡黃白。合而觀之。為溼重脾寒之象。<sup>初七日</sup>

半夏<sup>五錢</sup>

茯苓塊<sup>五錢</sup>

薏仁<sup>五錢</sup>

杏仁<sup>二錢</sup>

生茅朮<sup>三錢</sup>

炒黃芩<sup>二錢</sup>

檳榔<sup>一錢</sup>

煨草果<sup>五分</sup>

廣皮<sup>二錢</sup>

乾薑<sup>三錢</sup>

白蔻仁六分 煮三杯分三次服。

諸症俱減。宜減其製。初八日

扶苓三錢 淡乾薑五錢 生茅朮二錢 半三錢 夏三錢 黃芩炭一錢

檳榔八分 杏仁二錢 白蔻仁六分 廣皮一錢 煮二杯分二次服。

病退八九。以養中焦為法。初十日

半三錢 扶苓塊五錢 薏仁五錢 杏仁三錢 鐘子連皮打碎 去心三錢

炒於朮二錢 廣皮一錢 白蔻仁八分 煮三杯分三次服。

產後陰傷。因有寒溼外感症。但見脈緩。而陰脈有餘之寒溼瘧症。故忌柔用剛。茲溼症全愈。而陰虛脈洪數。陰脈不足之症現。則不得不退剛用柔。因時制宜。醫貴乎活潑流動。神明變化。以求合乎道者此也。豈有一毫私意存乎其間哉。十三日

大生地四錢 麥冬不去心 四錢 熟五味打碎 九粒 焦白芍六錢

生牡蠣四錢 炙甘草二錢 炙鼈甲三錢 煮三杯分三次服。

丁氏二十歲 血與水搏。產後惡露不行。腹堅大拒按。神思昏冒。其為瘀血上

攻無疑。癸亥五月廿六日

歸尾五錢 藏紅花三錢 川芎一錢 桃仁三錢



兩頭尖三錢

煮三杯。分三次服。間服化癥回生丹五丸。

血化為水。瘀滯攻心。昨已危急。因用回生丹以直入厥陰。陰絡之兩頭尖為嚮導。續下瘀滯。而神氣已清。但瘀滯尚多。議以化癥回生丹緩攻為宜。  
日廿七

藏紅花二錢

澤蘭二錢

兩頭尖三錢

廣鬱金三錢

煮兩杯。渣再煮一杯。分三次服。化癥回生丹三丸。每次和服一丸。

腹中無處不痛。脈沈數有力。瘀血尚多。廿八日

歸尾五錢

元胡索四錢

澤蘭三錢

桃仁三錢

京三稜三錢

莪朮三錢

紅花二錢

兩頭尖五錢

川芎一錢五分

煮四杯。每杯和化癥回生丹一丸服。

瘀滯已去不少。腹痛減去八九。經謂大毒治病。十衰其六。即無毒治病。十衰其九。勿使過劑。今日頭暈而冒。視歧見兩物。不可猛浪再與攻瘀。議七味丸加車前子牛膝琥珀。一面攝少陰生氣。一面宣絡脈之血。方為合拍。此時生死相關之際。不可不精細也。廿九日

茯苓炒黃四錢

熟地炭八錢

肉桂炒焦三錢

炒澤瀉六錢

萸肉炭三錢

丹皮炒焦四錢

山藥炒黑三錢

車前子四錢

牛膝四錢

共炒炭。煮成三碗。

又加琥珀細末九分分三次沖服。

同前。三十日

瘀血隨衝氣上攻神昏。又用化癥回生丹五丸。六月初一日

前用攝少陰開太陽法。小便稍利。腫脹微消。但衝氣上動。咳而不寐。議伐

腎邪以止衝氣。和胃以令寐。初二日

茯苓塊連皮八錢 半 夏六錢 紫石英生研細三錢 桂枝木三錢

秫 米撮一

製五味錢一 甘瀾水煮成三杯分三次服。

昨與伐衝氣兼和胃業已見效。仍宗前法。腰冷少腹脹。加小茴香。初三日

猪 苓三錢 茯苓塊連皮八錢 半 夏八錢 澤 瀉三錢 老厚樸一錢

秫 米合一錢 桂 枝三錢 小茴香炒炭一分五錢 甘瀾水煮成三杯分三次服。

脈漸小為病退。左關獨大為肝旺。夜間氣上衝胸。濁陰隨肝陽上升之故。產後陰虛。不敢峻攻。食少宜開太陽。兼與和胃。初五日

茯苓塊連皮五錢 桂 枝三錢 小枳實打碎一錢 旋覆花包三錢 澤 瀉三錢

五味子製一錢 焦白芍三錢 半 夏六錢 廣皮炭一分 廣鬱金五分

澤 蘭一錢五分 煮三杯分三次服。

諸症悉除。惟餘痰飲。咳嗽喘滿。短氣胸痺。皆係應有之症。無足怪者。經謂

病瘵飲者冬夏難治。况十數年之痼疾。又屆產後乎。初七日

桂枝五錢

薑半夏六錢

厚樸二錢

桂心沖三錢

生薏仁五錢

薤白一錢五分

猪苓三錢

茯苓塊五錢

廣皮二錢

澤瀉三錢

煮三大杯。分三次服。

王氏 鬱冒。自汗出。大便難。產後三大症俱備。因血虛極而身熱發厥。六

脈散大。俗云產後驚風。不知皆內症也。斷斷不可誤認外感症。議翁攝真

陰法。

大生地六錢

麥冬不去心三錢

炒白芍三錢

生龜板五錢

阿膠三錢

五味子製一錢

生牡蠣三錢

鮑魚三錢

炙甘草一錢

雞子黃二枚去渣後攪入上火二三沸

海參條二

煮三杯。分三次服。

又 夜間汗多。加龍骨三錢。

又 產後鬱冒。自汗出。六日不大便。血少而淡。一以增津補液為主。

元參五錢

大生地六錢

洋參一錢

麻仁五錢

炒白芍三錢

鮑魚四錢

麥冬不去心四錢

生龜板三錢

海參三錢

阿膠三錢

五味子一錢五分

炙甘草一錢五分

白蜜一酒杯

煮三大杯。分三次服。見大便去元參

又 於前方內去洋參甘草。

文氏 太陰溼土司天之年。六脈沈細而緩。舌苔滿佈白滑。得飲則胸滿。大便溏泄。面青黃。脣白。身萎不起。顯係寒溼所傷。致脾胃兩陽大敗。法以通補腑陽。使寒溼得行方妙。豈有橫補中焦守補臟真之理。皆因其產後而誤也。乙丑四月廿四日

生茅朮三錢

半夏五錢

小枳實三錢

猪苓三錢

茯苓塊連皮五錢

煨草果一錢五分

生薏仁五錢

澤瀉三錢

廣木香一錢五分

老厚樸三錢

廣皮一錢五分

甘瀾水煮三杯。分三次服。

產後中溼。昨用剛燥通陽。業已見效。今日細詢鼻出涼氣。腸鳴腹痛。背惡寒。吞酸。皆表裏陽虛見症。餘詳前案。廿五日

薑半夏五錢

桂枝三錢

小枳實一錢五分

生薏仁五錢

乾薑三錢

煨草果一錢五分

老厚樸三錢

椒目三錢

廣橘皮三錢

生茅朮三錢

煮三杯。分三次服。

六脈陽微之極。稍緩則難救矣。即於前方內加

桂枝二錢

煨草果五分

吳

萸抱痰二錢

良薑二錢

生茅朮二錢

乾

薑共五錢

產後中溼。大用苦辛剛燥。已見大效。古法效者減其製。但夜間不寐。非重

用半夏不可宗素問也日廿七

半夏一兩二錢

茯苓皮五錢

乾薑三錢

椒目五錢

生茅朮五錢

秫米一合

草果二錢五分

生薏仁五錢

甘瀾水煮三杯分三次服

吞酸不得寐照前方內加

半夏八錢共二兩

淡吳萸五錢

秫米一合共二合

前因得效而減其製。但與和胃令寐。今雖得寐。而舊症復來。仍與廿六日

方再服一帖。日廿九

產後中溼。昨日復行。大用剛燥。又見大效。今日仍減其製。日三十

茯苓塊五錢

半夏八錢

椒目三錢

生茅朮三錢

桂枝三錢

乾薑三錢

老厚樸三錢

薏仁三錢

廣皮二錢

小枳實一錢五分

煎法服法如前。

昨日減製。病便不大效。今日於前方內加

薏仁二錢

生茅朮二錢

乾薑二錢

草果一錢五分

諸症悉減。惟口不知味。不能起坐。脈微陽未復也。用真武湯法。初二日

熟附子三錢

桂枝五錢

生白朮三錢

生茅朮五錢

椒目錢五

煨草果錢五分

茯苓塊錢五

生薑片五

生薏仁錢五

煮三杯分三次服。

於前方內加乾薑三錢。附子五錢。良薑三錢。去白朮初三日

又於前方內加厚樸三錢。枳實三錢。廣皮三錢。初四日

微惡寒。右脈未起。陽不復也。初六日

桂枝錢六

熟附子錢四

乾薑錢二

茅朮錢三

茯苓塊錢三

生薑片五

薏仁錢五

小枳實錢二

煮三杯分三次服。

諸症悉減。脈滑不寐。胃不和也。與素問半夏湯。初八日

茯苓錢三

薑半夏錢八

秫米合一

薏仁錢五

杏仁泥錢三

煮三杯分三次服。

仍不寐。加半夏至成兩半。寐則不必加。初九日

溫毒。頰腫喉痛。牙床木痛。與普濟消毒飲。但久病大虛初愈。藥不宜過重。

耳。初十日

元參錢二

苦桔梗錢一

射干錢一

銀花錢一分

牛蒡子錢一

芥穗錢八

連翹錢五分

人中黃錢八分

殭蠶錢一

薄荷五分

茶菊花一分

馬勃八分

午刻一帖。申刻一帖。戌刻不見重。明早服一帖。若口渴身熱痛腫甚。戊刻加一帖。

照初十日方服三帖。十一日

再服三帖。○外洗目方。赤爛風弦。脾經溼熱。他症不可用此方也。

桑葉三錢

薄荷一錢

明礬六分

連翹三錢

枳殼二錢

膽礬三分

先煎四味草藥。去渣。後入三礬。上火化令相得。先薰後洗。洗後勿令見風。

病減者減其製。十三日

銀花一錢

青箱子一錢

茶菊花五分

連翹一錢

苦桔梗八分

冬桑葉八分

薄荷三分

牛蒡子一錢

生甘草五分

射干八分

煮二杯。分二次服。

諸症悉減。餘熱未除。大勢可無虞矣。十四日

苦桔梗一錢

銀花一錢

冬桑葉一錢

草決明一錢

連翹一錢

黃芩炭五分

茶菊花一錢

兒茶八分

生甘草錢一 煮二杯。分二次服。今晚一帖。明早一帖。

於前方內加刺蒺藜八分。日十五

於前方內加草決明 黃芩日十六

諸症悉平。惟餘肝鬱。仍宜兩和肝胃。兼宣絡脈。日十七

降香末錢三 青皮錢二 生薏仁錢五 旋覆花錢包三 香附錢三

廣木香錢一 製半夏錢六 廣皮錢二 益智仁錢一 煮三杯。分三次服。

進食不旺。且與和胃。日二十

茯苓塊錢三 半夏錢五 白蔻仁錢一 藿香梗錢三 生薏仁錢五

廣鬱金錢二 益智仁錢一 廣皮錢三 炒黑 大麥芽錢二 煮三杯。分三次服。

下焦濁陰因寒溼蟠踞。且來上攻。心胸若痞。舌白滑濁。議蠲飲法。日廿一

川椒錢三 淡吳萸錢三 厚樸錢三 良薑錢三 小茴香錢三

廣皮錢二 青皮錢二 小枳實錢三 煮三杯。分三次服。

藥服後如腹痛不止。可服天台烏藥散一錢。不知服二錢。

昨晚泄瀉一次。今日痛減。仍不知味。日廿二

茯苓塊錢三 澤瀉錢二 熟附子錢三 生茅朮錢三 廣皮錢二

老厚樸錢二 淡吳萸錢三 生薑錢三 益智仁錢五分 生薏仁錢三



煮三杯分三次服。

腹中水氣仍然未盡。廿三日

茯苓塊錢五

半夏錢五

生茅朮錢三

生薏仁錢五

乾薑錢三

小枳實錢三

老厚樸錢三姜炒

生薑錢五

益智仁錢二

甘瀾水頭煎一二杯。

二煎一杯分三次服。

舌色漸正。是其佳處。大便溏滑。溼正行而未盡也。責在脾不和。不寐者胃

不和也。廿五日

半夏雨

茯苓塊錢六

薏仁錢五

猪苓錢三

生茅朮錢五

乾薑錢三

澤瀉錢三

益智仁錢三

秫米錢二

桂枝錢三

甘瀾水八碗。煮取三碗。分三次服。一日一帖令盡。

下焦濁陰上攻。心悸。卽衝疝奔豚之類也。議桂枝加桂法。廿八日

茯苓錢五

熟附子錢三

全歸錢三

桂枝錢五

焦白芍錢二

川芎錢一五分

川椒錢三炒黑

小茴香錢三炒黑

生薑錢三

肉桂錢二去粗皮研細沖

煮三杯分三次服。

脾陽幾無。非再與重劫脾陰不可。廿九日

茯苓塊錢五

桂枝錢三

生薏仁錢五

生茅朮錢五

肉桂錢五去粗皮

黑川椒錢三 熟附子錢三 廣皮錢二 煨草果錢五分 煮三杯。分三次服。

於前方內加附子二錢。乾全蝎二個。煨草果五分。肉桂五分。六月初一日

肝鬱脇痛。久必成肝着。速速開朗情志要緊。以痛止為度。初二日

新絳紗錢三 半 夏錢三 生香附錢三 歸鬚錢五分 旋覆花錢包三

廣鬱金錢二 降香末錢三 青皮錢五分 蘇子霜錢三 高良薑錢二

煮三杯。分三次服。

肝鬱則脇痛。寒溼則腹痛。初八日

淡吳萸錢三 良薑錢二 生香附錢三 旋覆花錢包三 青皮錢二

廣鬱金錢二 降香末錢三 萆撥錢五分 煮三杯。分三次服。

久病脾胃兩虛。切戒大飽大饑。現在不寐。初九日

半 夏兩一 藿香梗錢三 益智仁錢五分 秫米合一 廣鬱金錢三

甘瀾水煮三杯。分三次服。以得寐為度。

諸證悉減。惟餘舌白滑。脇下痠痛。十一日

半 夏錢五 降香末錢三 生香附錢三 青皮錢二 生薏仁錢三

廣鬱金錢二 歸鬚錢二 台烏藥錢二 元胡索錢二 良薑錢二

煮三杯。分三次服。

脾氣久虛未復。調理飲食要緊。防成痢疾。在暑月雖常人之脾必虛。况久病乎。<sup>十四</sup>

半夏錢五 茯苓塊錢三 厚樸錢三 良薑錢二 廣木香錢一

香附錢三 烏藥錢二 益智仁錢一 椒目錢二 青皮錢二

煮三杯。分三次服。

寒溼未淨。復受暑溼。議開太陽闔陽明法。<sup>十六</sup>

桂枝錢五 茯苓塊錢五 薏仁錢五 半夏錢六 生茅朮錢三

椒目錢五 安桂錢二 肉果霜去淨油 乾薑錢二 猪苓錢五

益智仁錢一 廣皮錢三 澤瀉錢五 煮四杯。分早中晚夜四次服。

客氣加臨之溫病已退。舌苔白滑。寒溼傷陽之本病復舉。先與和陽明之陽。以為坐鎮中州之計。微泄厥陰之陰。斯乃撥亂反正之規。<sup>十八</sup>

茯苓塊錢三 生薏仁錢五 淡乾薑錢二 製半夏錢四 吳黃泡淡

益智仁錢一 生茅朮錢三 川椒炒黑 煮三杯。分三次服。

今日腹痛。<sup>十九</sup>

茯苓塊錢三 半夏錢三 藿香梗錢二 生薏仁錢五 良薑錢二

廣鬱金錢二 淡吳黃錢三 厚樸錢三 炒乾薑錢一 小茴香錢三

廣皮一錢五分 煮三杯分三次服。

面色猶然暗淡青黃。舌苔刮白。時退時復。大便或泄或不泄。得油膩則滑甚。四末時或一冷。則脾陽未能一時全復可知。仍以醒脾利溼立法。

生茅朮四錢 半 夏三錢 川桂枝三錢 茯苓塊連皮三錢

肉桂去粗皮一錢 廣鬱金二錢 生薏仁三錢 椒目三錢

生益智二錢 大豆卷三錢 神麩二錢 廣皮炭二錢

煮三杯分三次服。

暑溼傷氣。腹中按之微痛。善悲者肺氣虛也。補之以辛。廿五日

蒼朮炭三錢 半 夏三錢 老厚樸二錢 茯苓塊三錢 良薑一錢

生益智一錢五分 生薏仁五錢 乾薑一錢五分 廣皮炭一錢五分 川椒炭二錢

煮三杯分三次服。

鼻尖涼與胸中涼風上升者。皆脾陽久困。一時不能復辟之象。口舌淡稍減。思飲。是其佳處。閏六月初二日

生茅朮八錢 桂枝五錢 熟附子三錢 茯苓塊五錢 神麩三錢

小枳實三錢 生薏仁五錢 廣皮三錢 煨益智三錢 煮三杯分三次服。

諸證悉減。惟餘便塘腹痛。日已渴。且減大熱純剛。暫與分利。初四日

蕙 仁五錢 生茅朮八錢 椒 目三錢 猪 苓錢 廣木香一錢五分

神 麴二錢 澤 瀉三錢 益智仁一錢五分 廣 皮一錢五分 煮三杯分三次服。

泄瀉已止。惟食後欠安。初六日

生茅朮三錢 半 夏三錢 廣鬱金二錢 老厚樸薑炒二錢 青 皮一錢

焦神麴二錢 生薏仁三錢 廣 皮一錢五分 益智仁一錢 淡吳萸二錢

煮三杯分三次服。

諸證悉除。惟餘晨泄。由脾虛及腎矣。議兼理下焦。十一日

桂 枝三錢 生茅朮三錢 鐘 子去心三錢 扶 苓三錢 肉果霜三錢

芡 實三錢 半 夏三錢 大豆卷二錢 生 薑三片 椒 目研三錢

煮三杯分三次服。

溏泄雖止。但終夜不寐。胃尙未和也。專與和胃。廿七日

半 夏二錢 生薏仁一錢 秫 米一合

甘瀾水入碗。煮取三碗。渣再煮一碗。分四次服。

周氏三十歲 產後子腸不收。突出戶外。如小西瓜大一塊。但軟扁耳。脈弦數。

氣血皆虛。着重在氣。先以吳萸細末作袋墊身下。湯藥以補中益氣湯少。

加川芎八分。一帖而收。二帖去川芎。三帖去升柴。加桂圓。彌月而安。

百氏<sup>二十歲</sup>產後鬱冒。一日厥去四五次。先與定風珠。即復脈湯去薑桂大

專翕大生膏一料全壯。

呂氏<sup>七十歲</sup>產後腰痛不可忍。入脈虛而受寒。

桂枝<sup>三錢</sup> 安邊桂<sup>二錢</sup> 杏<sup>三錢</sup> 鹿茸<sup>三錢</sup> 鹿角霜<sup>三錢</sup>

炒杜仲<sup>三錢</sup> 蒼朮<sup>三錢</sup> 枸杞子<sup>炒三錢</sup> 牛膝<sup>二錢</sup> 煮三杯。分三次服。

服十餘帖而大安。

秀氏<sup>三十歲</sup>產後不寐。脈弦。嗆咳。與靈樞半夏湯。先用半夏一兩。不應。次服

二兩。得熟寐。又減至一兩。仍不寐。又加至二兩。又得寐。又減又不得寐。於

是竟用二兩。服七八帖。後以外臺茯苓飲收功。

某氏<sup>三十歲</sup>產後感受風溫。自汗身熱。七八日不解。現在脈沈數。邪陷下焦。

瘕癥。俗云產後驚風。與復脈法。但須先輕後重。<sup>丁亥四月十二日</sup>

細生地<sup>四錢</sup> 麥冬<sup>不去心四錢</sup> 火麻仁<sup>二錢</sup> 生白芍<sup>二錢</sup> 丹皮<sup>三錢</sup>

炙甘草<sup>一錢</sup> 生龍甲<sup>打碎五錢</sup> 阿膠<sup>二錢</sup> 煮三杯。分三次服。

產後陰虛。又感風溫身熱。與復脈法。身熱已退。但脈仍數。虛未能復。仍宗

前法而進之。<sup>十四日</sup>

丹 參 三錢  
大生地 五錢

生龍甲 五錢  
麻 仁 三錢

丹 皮 三錢  
阿 膠 三錢

曾氏 七歲 二十  
產前暑傷肺衛。身大熱。三日而生。產後十五日熱不解。連前三

日已十八日矣。逆傳心包。神呆瘦癯。全入心營。大便結。六脈乳。虛症已深

危。勉與邪少虛多之復脈湯法。兼以清上。辛卯七月廿七日

生牡蠣 五錢  
炒白芍 三錢

麥 冬 三錢 不去心  
炙甘草 二錢

濃煎三茶杯。分三次服。

元 參 四錢

細生地 五錢

麥 冬 四錢 不去心  
冬桑葉 三錢

茶菊花 三錢

焦白芍 三錢

火麻仁 四錢

丹 皮 三錢

阿 膠 三錢

煮三杯。分三次服。

外服牛黃清心丸一丸。

炙甘草 三錢

生龍甲 五錢

元 參 一兩

產後伏暑瘦癯。與復脈法已愈。惟大便結。脈虛。不可以下。只有導法可行。  
湯藥潤津液為要。八月初九日

元 參 一兩

大生地 五錢

生白芍 三錢

麻 仁 五錢

產後陰虛 十二日

阿 膠 五錢

煮三杯。分三次服。此方服三帖。大便通。

麥 冬 三錢 不去心

火麻仁 三錢

沙 參 三錢

麥 冬 五錢 不去心

生阿膠 三錢

大生地 六錢

火麻仁 三錢

沙 參 三錢

麥冬不去心 四錢

炙甘草三錢

炙阿膠三錢

歸身二錢

桂圓肉三錢

生白芍三錢

萸肉三錢

煮三杯分三次服

陰吹

英氏三十歲 陰吹。按金匱婦人門之陰吹。治以猪膏髮煎。純然補陰。注謂腸

胃俱槁。再按腸胃俱槁。陰不足者陽必有餘。脈當數。面與脣舌當赤。口當

渴。茲面青。脈弦而遲。不食不饑不便不寐。蓋痰飲蟠踞胃中。津液不行大

腸。腸雖槁而胃不槁。議通幽門法。

半夏一兩

桂枝六錢

廣皮五錢

枳實八錢

煮三杯分三次服。服一帖而減。三帖而退。惟餘痰飲。調理脾胃數月。而

痰飲亦愈。

黃氏四十歲 痰飲誤補。喘而脈洪。汗出。先與大青龍去麻辛而安。半月後。又

因感受燥金之氣。兼之怒鬱傷肝。脈弦緊。身熱腹痛。先與柴胡桂枝各半

湯。熱退而腹痛未愈。且泄瀉陰吹。焉得腸槁。用川椒吳萸良薑丁香各五

苓散而陰吹愈。後調理痰飲一月而安。

李氏二十歲 臍左有塊痛。少腹亦痛。大便自調。陰吹亦非腸槁。與化癥回生

丹而愈。



交腸

穆氏 前陰出糞。病名交腸。溼熱之故。以其人喜飲黃酒。大食猪肉之所致也。與五苓散法。五苓散加黃柏黃連龍膽草數帖而愈。告以切戒猪肉黃酒。伊遵戒半年。飲食精神大好。已復元矣。八月節開肉後又開酒。病復發不可為矣。

調經

楊室女二十歲經停一年。腹有癥瘕。寒熱往來。食少。肝陽鬱勃下陷。木來克土。先與提少陽生發之氣。

薑半夏錢五

桂枝錢三

全當歸錢二

焦白芍錢三

青蒿錢一

白蔻仁錢二

生薏仁錢五

廣皮錢二

黃芩炭錢二

煮三杯。分三次服。

服三四帖而寒熱盡退。

再與天台烏藥散。每日早晚各服一錢。驅臟中之濁陰。即所以通下焦之陽氣。不惟通下焦之陽。亦且大通胃陽。胃陽得開而健食。健食而生血。所謂受氣謂穀氣取汁取胃汁變化而赤。是為血。此血也。心主之。脾統之。肝藏之。由肝下注衝脈。在男子上潮於唇生鬚髭。在女子下泄為經。故此方服二十餘日。而癥散經通矣。蓋巴豆多用則殺人。少用則和胃。此方

中用巴豆之氣而不用其質。少之又少。既能祛下焦之濁陰。又能通胃中之真陽。以胃雖受濁而最惡濁。驅陰正所以護陽。通陽正所以驅濁。一筆文字而兩面俱醒。此其所以見效若神也。伏暑門中醫王氏之方。亦同此義。

余氏二十歲無論半產與暴崩。六脈沈軟而細如伏。陽虛體質。產後漏經半年。經止後一年有餘。忽來如崩。又疑半產。一以溫經為要。乙酉八月十九日

阿膠四錢去渣後化入 小茴香炒炭四錢 乾薑炭三錢 艾炭四錢

全當歸二錢 炙甘草二錢 煮一大茶杯。分二次服。

經停年餘始行。故多若暴崩。脈沈細若伏。少腹痛甚。故用膠艾湯溫經。茲又感受燥金寒溼。面腫胸痛而泄。少腹痛拒按。舌上白苔滿佈。仍與溫法。去守補之。阿膠甘草。廿三日

艾葉炭五錢 炮薑五錢 小茴香炒炭三錢 薑半夏五錢 雲苓五錢

淡吳萸三錢 生薏仁五錢 全歸二錢 川椒炭三錢 降香末三錢

煮三杯。分三次服。

經色全然不赤。面腫已消。似當用補。但六脈滑甚。舌苔較前雖薄。仍然純白。腹中按之則脹。少腹仍痛。溼邪之歸下焦者未消。仍與溫經行溼。廿七日

艾葉炭錢五

薏仁錢五

車前子錢五

薑半夏錢五

白通草錢一

炮薑錢三

大腹皮錢三

雲苓皮錢五

厚樸錢二

小茴香炒炭  
錢三

廣皮錢二

益母膏錢二

煮三杯分三次服

停經一年有餘。經通後舌白滑。五日前面腫腹痛。帶下特甚。其為帶脈之

寒。溼下注無疑。九月初一日

艾葉炭錢五

薏仁錢五

車前子錢三

小茴香炒炭  
錢五

萆薢錢五

白通草錢一

薑半夏錢三

全歸錢三

益母膏錢二

大腹皮錢三

炮薑錢三

煮三杯分三次服

溼多成五泄。兼之口糜。與五苓散法加薏仁木通。十六日

猪苓錢五

雲苓皮錢五

桂枝錢一

澤瀉錢五

蒼朮炭錢一

木通錢二

薏仁錢五

煮三杯分三次服。服一二帖全愈。

帶症已久。不時舉發。經不調。六脈陽微之極。皆產後受傷。虛不肯復之故。

治在入脈。非通補奇經丸不可。且與湯劑行溼而溫經。體厚脈細易腫者

溼多。此方不妨多服。十一月十四日

雲苓皮錢六

全歸錢三

紫石英錢三

川萆薢錢六

艾葉炭錢三

蓮子去心連皮  
錢五

炒杞子錢三

小茴香錢三

芡實錢五

煮三杯分三次服

通補奇經丸方 帶下本係入脈虛寒之病。久帶則下焦愈虛。古人所以有漏卮之喻也。一以通補入脈為要。此證陽虛兼溼。一用熟地黃肉陰柔之品。斷無生理。

鹿角膠 四兩

鹿茸 八兩

沙蒺藜 四兩

肉蓯蓉 六兩

小茴香 炒炭 六兩

人參 四兩

補骨脂 四兩

川萆薢 六兩

當歸 六兩

炙龜板 四兩

烏賊骨 四兩

桑螵蛸 六兩

生牡蠣 六兩

杜仲炭 二兩

紫石英 生研 二兩

枸杞子 四兩

右為細末。益母膏和丸。如小梧子大。每服三錢。早晚各服一次。不知。午刻加一次。暫戒猪肉。永戒生冷。若不能戒。不必服藥。間服震靈丸四五十九。

大凡胞宮累及陽明者。治在胞宮。陽明累及胞宮者。治在陽明。此症兼而有之。病起產後。漏經半年。胞宮之損可知。體厚溼重易腫。納食不旺。陽明之虛又可知矣。當兼治之。每日空心服奇經丸三錢。以補胞宮。午間晚間各服湯藥一碗。湯藥以理陽明為主。丙戌正月 初六日

薑半夏 六錢

雲苓 六錢

益智仁 三錢

川萆薢 六錢

廣皮 四錢

川椒炭 三錢

生薏仁 八錢

生薑 三錢

水八碗。煮取兩碗。午服一碗。臨臥服一碗。納食漸旺。形體稍瘦。則不必服。食減不瘦。則再服。

阮氏三十歲

六脈俱細。左兼弦緊。下焦虛寒。入脈不固。陽氣不攝之病。豈純陰所能靜守。雖暫用固澀。不旋踵而仍復崩潰。古謂初崩宜溫。現在且用

溫經。將來非峻補入脈不可。以兼有帶症故也。丁亥二月十二日

鹿角霜五錢

艾炭三錢

小茴香黃酒炒三錢

真阿膠四錢

全歸二錢

乾薑炭三錢

煮二杯。分二次服。一帖。

金匱謂脈雙弦者寒也。又謂大則為虛。弦則為減。女子半產漏下。主以小建中。其意蓋以中焦陽氣為要。令營衛調和。胃旺自能生血。前以崩漏而用溫下焦之陽。現在雖止。脈仍弦緊。陽未復也。况又自汗。納食不旺。今日仍宗前法。兼與建中以衛陽虛故也。十四日

鹿角霜三錢

桂枝二錢

黑杞子二錢

焦白芍四錢

全歸三錢

真阿膠二錢

艾炭二錢

炙甘草一錢

川萆薢三錢

小茴香三錢加黃酒濕透炒半黑

煮三杯。分三次服。服此方四肢畏寒解。納食旺。

崩帶脈弦。左手更緊。四肢畏寒。納食不旺。皆誤用陰藥之故。昨與溫補下焦。兼用建中調中焦。現在四肢畏寒解。納食稍旺。左脈之緊亦解。崩止而

帶未除。與通補八脈法。日十六

鹿角霜五錢

萆薢四錢

小茴香三錢

雲苓塊三錢

紫石英生研細三錢

全歸三錢

炙龜板四錢

杞子炒黑三錢

生薑炭一錢

煮三杯。分三次服。

於前方內去生薑炭。加桑螵蛸三錢。日十九

崩止而帶未除。於前方內加入參海螵蛸鮑魚日廿二

八脈虛寒。脈弦緊。與通補奇經丸。日廿三

鹿角膠四兩

黃毛鹿茸十二兩

鹿角霜四兩

雲苓六兩

小茴香大兩加黃酒濕透炒黑

補骨脂六兩

生牡蠣六兩

杞子炒黑六兩

肉蓯蓉四兩

炙龜板八兩

萆薢六兩

兔絲子四兩

高麗參四兩

全歸六兩

紫石英生研水飛四兩

右為細末。老蜜丸。如小梧子大。每服二錢。日三服。若服三錢。早晚各一

次。

池氏前因中下焦有寒。服霹靂散已效。惟月事總不應期。經云二陽之病發心脾。女子不月。二陽者陽明也。陽明陽氣受傷。肝來克土。故常吐白沫。胃虛而肝乘之。故時發嘔逆。現在受病確與經文相合。議與和胃。蓋胃和則不嘔。肝不來克。納食旺自然生血。經所謂中焦受氣取汁變化而赤是為血。又謂營出中焦。陽氣充滿。則血無阻滯。此等調經法。世人絕不知之。

丁亥閏五月  
月初四日

薑半夏錢五

薏仁錢五

生香附錢三

雲苓塊錢三

廣皮錢三

降香末錢三

生薑片五大

煮成三杯。分三次服。以至不嘔不吐沫納食旺為度。

帶下

李氏三十歲

久帶甚至流入跗踵。可為狂帶矣。脈弦數。下焦陰陽入脈皆虛。

與天根月窟膏每日一兩。分早中晚三次服。服至百日外而愈。

達女十七歲

初因內傷生冷。又加伏暑中之溼熱。去冬寒熱頻仍可知。以致

經閉淋帶腹痛等症。現在食太少。大便漉。識先與和腑。經謂二陽之病發

心脾。女子不月。應從此處入手。近世罕知之。再補土者必先行溼。土惡溼

故也。戊子二月初十日

薑半夏錢五

薏仁錢五

川椒炭錢二

雲苓塊錢五

葶錢五

白蔻仁錢一

益智仁錢二

廣皮錢二

煮三杯。分三次服。

照前方再服三帖。十三日

瘕氣繞臍痛。少腹亦時痛。十七日

天台烏藥散兩二

每服一錢。分早中晚夜四次服。淡薑湯和。如痛甚。服

二錢服二三日再商。

腹痛已減。胃亦漸開。脈仍弦數。肢倦。與宣肝絡之中。兼兩和肝胃。廿一日

新絳紗三錢

歸鬚二錢

薑半夏五錢

鬱金二錢

旋覆花包三錢

降香末三錢

雲苓塊五錢

廣皮三錢

益智仁三錢

生薏仁五錢

煮三杯。分三次服。

每日空心服天台烏藥散五六分。此方服十二帖。胃漸開。腹痛止。肢倦

減。面色稍紅。

臟燥

陳室女十五歲

脈弦數。時時欲哭。每日哭四五次。勸住一時又哭。無故而然。

每逢經後更甚。此行經太早。臟氣燥也。與金匱甘麥大棗湯以潤之。服十

數劑漸愈。後服專翕大生膏四劑全安。

痘症 庚申十月起

周氏 一週零

身熱耳冷。隱隱有點。防痘。夏令感溫暑而發。先宜辛涼解肌。

令其易出。切忌辛溫發表。致表虛發癢潰爛。且助溫熱。

連翹三錢

苦桔梗三錢

甘草一錢

炒銀花三錢

荆芥穗八分

蘆根三錢

薄荷八分



二期 點出未透。仍宜解肌。照前方

三期 險痘三天。業已出齊。但頂陷色暗。與活血提頂法。再色白皮薄。兩太陰素虛之體。此痘若用羌防。必致癢塌。一進苦降。必致泄瀉。

全 歸土炒二錢 苦桔梗一錢五分 木 通二錢 炒銀花三錢

黃芩炭一錢五分 白 芷二錢 連 翹二錢 焦白芍一錢五分

紫 草八分 暹羅犀角一錢 南查炭一錢

四朝 氣虛則根鬆頂陷。血鬱則色淡盤軟。毒重則攢簇。且與清毒活血提頂。扶過七日。能用補托。方可有成。不然。九朝塌癢可慮。况現在泄瀉。

全 歸土炒二錢 苦桔梗二錢 白 芷二錢 暹羅犀角三錢

鈴羊角三錢 紫 草一錢五分 連 翹三錢 炒銀花三錢

紅 花一錢 皂 針一錢 生甘草一錢五分 公雞冠血每大牛黃酒杯點入三小匙

五朝 痘五天半。氣虛不能載毒外出。牽延時日。必致內陷塌癢。今日仍然外感用事。未敢大補。亦須用托法。

棉 著生三錢 白歸身三錢 白 芷二錢 連 翹一錢五分

苦桔梗二錢 皂 針一錢五分 丹 皮二錢 燕窩根五錢

紫 草一錢 甘 草五分 雞冠血三五匙

濃煎一茶杯。服完。渣再濃煮半杯。明早服。

六朝 六天少用補托。業已起脹。顏色頗鮮。但皮薄殼亮。今日須大補。明日須峻補。

黨參 三錢  
生黃耆 五錢  
白歸身 三錢  
白芷 二錢

苦桔梗 三錢  
炙甘草 一錢五分  
紫草 二錢  
燕窩根 一兩

廣皮炭 一錢  
川芎 一錢  
雞冠血 每二酒杯三點  
公雞湯煎藥

七朝 兩用補托。色鮮而潤。陷者復起。但青漿十之二三。殼亮頗多。今到

七日。臟腑已週。氣血用事。正好施補氣載毒之方。

人參 一錢  
生黃耆 五錢  
廣木香 八分  
白芷 一錢

苦桔梗 三錢  
炙甘草 二錢  
川芎 四分  
煨肉果 一錢五分

燕窩根 一兩  
廣皮 一錢  
公雞湯煎

八朝 入天痘頂圓綻者不過一二。頭面行漿。胸背清漿三四。四肢全然

空殼。根盤色淡。此氣血兩虛。急宜峻補。用參歸鹿茸合陳氏異功法。

生黃耆 一兩  
煨肉果 二錢  
扶苓塊 三錢  
黃毛鹿茸 水黃酒另煎五錢

人參 一錢  
廣木香 一錢  
苦桔梗 三錢  
歸身 六錢

炙甘草 三錢  
廣皮炭 二錢  
白芷 三錢  
燕窩根 一兩

公雞湯碗一 右藥煮成四茶杯。加鹿茸汁半茶杯。雞湯一中碗。燕窩湯

一碗。和勻。上火煨濃。小人服一半。大人服一半。

九朝 九天昨用峻補。兩臂雖有黃漿。四肢仍然空殼。泄瀉之故。用陳文

仲大異功散。

嫩生黃耆兩一 人參錢一 煨訶子錢三 茯苓塊錢六

廣木香錢二 鹿茸尖酒煎六錢 炒於朮錢五 肉桂去粗皮為末一錢

煨肉果錢三 廣皮炭錢二 歸身土炒五錢 炙甘草錢三

十朝 卽於前方內去肉桂鹿茸尖歸身。加生黃耆四錢。澤瀉五錢。

十一朝 照前方。

十二朝 卽於前方內加薏仁五錢。

十三朝 漿未十分滿足。四肢間有破損。難保無痘毒咳嗽等事。茲用利

水以助結痂。驅逐餘毒。卽在其中。所謂一舉而兩得者也。

茯苓塊錢五 洋參錢三 廣木香錢一 焦於朮錢三 薏仁錢八

煨訶子錢二 煨肉果錢二 澤瀉錢三 炙甘草一分 廣皮炭錢一

十四朝 腳腫。胸悶。溲短。水不利也。

茯苓塊錢五 冬朮錢三 炒銀花錢二 生薏仁錢五 連翹錢二

廣皮炭一錢五分

飛滑石二錢

澤瀉二錢

五穀蟲五分

何男四歲

三天氣虛毒重粘連成片兼之色滯頂陷攻毒則礙虛溫托則礙

毒兩難措手和中安表更不濟事勉與活血擺毒不犯中下二焦九月初四日

烏犀角五錢

連翹三錢

全當歸三錢

鈴羊角三錢

紫草三錢

南查炭三錢

苦桔梗三錢

白芷一錢

直天蟲二錢

粉丹皮三錢

薄荷一錢

生甘草一錢

每一酒杯和猪尾膏三小匙

四天昨用活血解毒大有起色但喉聲微啞面目浮腫太甚唇色絳紅時

癘之火毒太重今日猶宜解毒初五日

暹羅犀角六錢

鈴羊角三錢

紫草三錢

連翹三錢

苦桔梗六錢

白芷一錢

丹皮三錢

穀精草三錢

炒查肉二錢

全歸二錢

永黃連一錢

天蟲三錢

桃仁一分

人中黃三錢

用銀花五錢紫花地丁五錢煎湯代水

五天半漸有起色但險症變幻不一時刻小心為要今日仍宜活血提頂

微加托裏初六日

犀角三錢

生棉薯三錢

紫草三錢

銀花三錢

穀精草三錢

白芷二錢

連翹五錢

全歸三錢

皂針一錢

紅花三分

炙甘草一錢五分 雞冠血每一酒杯藥加三小匙

六天半時癘已退。氣血用事。頭面清漿三四。週身亮殼。非重用溫托不可。看守不懈。不致破損。可望成功。初七日

生綿著八錢 黨參三錢 炙甘草三錢 白歸身三錢

紫草二錢 燕窩根五錢 廣木香五分 白芷二錢

雞冠血每杯沖三小匙 十二時服二帖。

七天半。漿未及半。咬牙寒戰。灰白塌陷。非陳文仲大異功散不可。初八日

綿著八錢 扶苓塊二錢 白芷三錢 人參一錢五分 焦於朮三錢

廣皮一錢五分 桂心一錢五分 廣木香二錢 糯米一撮 歸身四錢

炙甘草三錢 公雞湯煎。

八天半。昨用大異功法。咬牙寒戰已去大半。但漿猶未足。用異功合參歸

鹿茸法。初九日

綿黃著一兩 人參三錢 訶子肉二錢 黃毛鹿茸片五錢 肉桂去粗皮二錢

煨肉果二錢 扶苓塊三錢 全歸三錢 廣皮炭二錢 焦於朮三錢

白芷二錢 炙甘草一錢五分 廣木香二錢 濃煎

九天半。咬牙寒戰已去十分之九。但身上清漿腿足未灌。泄瀉頻仍。翁仲

仁有泄瀉安寧土虛少毒之論。今猶宜峻補。如泄瀉不止。再加濟陽初十日

綿黃耆兩一

人參錢三

訶子肉煨三錢

生鹿茸酒另煎五錢

厚樸錢二

廣木香一分錢五分

上肉桂錢二

白芷錢二

炙甘草錢二

煨肉果錢三

廣皮一分錢五分

十天半。用異功得效。但泄瀉未止。膚癢漿薄。必有餘毒。今日仍可補托一

天。議於明日用實脾利水收痲法。俾不盡之熱毒從小便而去。日十一

綿黃耆兩一

人參錢二

廣木香錢二

上肉桂錢一

厚樸錢二

煨肉果錢三

訶子肉錢三

炙甘草錢三

廣皮炭錢二

十一天半。痲雖結而漿薄。泄瀉以實脾利水為法。仍兼澀腸。日十二

炙黃耆錢五

人參分八

廣木香錢二

生薏仁錢五

肉桂錢一

訶子肉錢三

焦於朮錢三

厚樸錢二

廣皮炭錢二

茯苓塊錢三

肉果煨三錢

炙甘草一分錢五分

十二天。漿薄微嗽。痲癢便溏。仍當補氣。兼與實脾。日十三

生黃耆錢五

人參分八

訶子肉錢二

茯苓塊錢五

肉果煨一錢五分

廣皮炭錢一

焦於朮錢三

薏仁錢五

炙甘草錢三

廣木香錢一

厚樸錢二

十三天。喉啞咳嗽而渴。肺中餘毒宜清。便塘瀾短。痘後脾虛宜實。日十四

茯苓塊錢三 銀花炒二錢 訶子肉煨二錢 炒冬朮錢三 連翹一分錢五分

地骨皮錢二 苦桔梗錢三 厚樸一分錢五分 五穀蟲錢一 生薏仁錢五

何女歲五 險中途痘二三天。繁紅扁瀾。成片不起。翁仲仁謂毒重壅遏。其形退

縮。且煩躁肢冷。脣焦舌黃。溲短腹痛。痘頂先出者已焦。勉用雙解法。已酉九月廿日

芥穗錢三 生大黃錢五 查肉錢三 銀花錢三

苦桔梗錢三 桃仁錢二 連翹錢二 牛蒡子錢三

薄荷錢一 全歸錢三 甘草生一錢 豬尾膏三匙入梅冰二分

四天。艷紅扁瀾。下後稍見起發。究不肥綻。何能起脹成漿。咳嗽痰多。且與

清涼敗毒。活血鬆肌。開提肺氣。日廿一

犀角錢三 羚羊角錢三 銀花錢三 紫草二錢加豬尾膏

苦桔梗錢五 芥穗錢三 連翹錢三 牛蒡子錢三

歸尾錢一 杏仁錢三 南查炭錢五 甘草錢一

五天。密佈不齊。身熱未退。扁瀾瀾陷。形色滯暗。不能起脹。那得成漿。勉與

清毒之中。兼活血提頂。日廿二

犀角錢三 羚羊角錢三 白芷錢二 銀花錢三 苦桔梗錢三

紫草二錢 連翹三錢 牛蒡子三錢 皂針一錢 杏仁三錢

南查肉二錢 天蟲二錢 歸鬚二錢 雞冠血每杯沖四茶匙 甘草一錢

六天。頭面雖有行漿之勢。究竟週身平陷。較昨日顏色略潤耳。仍與清毒

活血提頂。少加托裏。廿三日

黃蓍二錢 苦桔梗五錢 全歸三錢 犀角三錢 牛蒡子三錢

天蟲二錢 杏仁三錢 穿山甲一錢 紫草三錢 銀花三錢

人中黃一錢 白芷二錢 連翹三錢 雞冠血每杯沖四茶匙 皂針一錢五分

七天。頭面行漿。周身半塌。空殼。用伍氏內托法。廿四日

綿黃蓍八錢 炙甘草一錢五分 苦桔梗三錢 洋參炒老黃色一錢五分

川芎五分 燕窩根五錢 紫草二錢 牛蒡子三錢 炒研細

公雞湯一碗 全當歸三錢 白芷二錢 雞冠血每杯沖三茶匙

八天。頭面漿足。周身平塌者已起。空殼者亦有行漿之勢。翁仲仁謂喉啞聲嘶。漿行飽滿亦何妨。再咬牙在七日以後屬氣虛。况其食少乎。非陰虛也。廿五日

也。廿五日

苦桔梗五錢 白芷二錢 黃蓍八錢 牛蒡子三錢 洋參炒老黃色一錢五分

天蟲三錢 象貝二錢 公丁香四分 雞湯一杯 炙甘草一錢



九天。漿已行及大半。但氣虛作癢。看守勿懈。毋令破損為要。廿六

綿黃耆一兩二錢 洋參二錢 象貝母三錢 苦桔梗六錢 白芷三錢

廣木香一錢 牛蒡子三錢 天蟲三錢 炙甘草三錢 冬白朮二錢

十天。漿行已及十之七八。惟痰咳微癢。眼中出膿為可慮。廿七日

綿黃耆五錢 連翹一錢五分 穀精草一兩 焦冬朮三錢 桑葉一錢

生薏仁三錢 苦桔梗三錢 甘草一錢 土貝母三錢

十一天。溼重。小便不利。畏寒咬牙。廿八日

生黃耆五錢 洋參一錢五分 穀精草三錢 茯苓塊三錢

薏仁五錢 廣皮炭一錢五分 焦冬朮三錢 炙甘草三錢

十二天。實脾利水以收痲止嗽。加辛涼敗毒以護目疾。廿九日

生黃耆二錢 銀花炒二錢 穀精草三錢 茯苓塊三錢 連翹二錢

地骨皮二錢 生薏仁五錢 冬朮炒三錢 炙甘草一錢五分

十三天。溼行痲結者過半。氣化痲落者過半。飲食甚好。目開無恙。已收全

功。惟咳嗽減而未清。仍宜實脾利水。複以辛涼敗毒。十月初一日

茯苓塊三錢 地骨皮一錢 生薏仁三錢 銀花炒一錢五分

連翹一錢五分 五穀蟲一錢 炒冬朮三錢 象貝一錢五分

某七官 痘粒分顆。原屬純正。但殼薄頂平無漿。間有二三陷者。且有灰色。明日七朝。氣血用事。非峻補不可。一切辛竄走裏者必不可不用。為其溫中而托絡也。其走表者斷不可用。以其虛表而致癢塌也。再九日以後須防咳嗽泄瀉。

嵩女五個月 相火用事。民病溫。防發痘。先宜辛涼達表。切忌發汗。初十日

銀花錢二 苦桔梗錢二 薄荷分五 連翹錢二 牛蒡子錢二

甘草錢一 芥穗分八 杏仁粉錢二 蘆根把三

險痘一天。十一日

銀花錢二 苦桔梗錢二 紫草錢一 連翹錢二

牛蒡子錢二 薄荷分八 芥穗錢一 歸橫鬚分八

甘草錢一 蘆根一兩。煎湯代水。

脾經險痘二天。色重粘連。船小載重。夜間煩躁。先以活血敗毒。十二日

南查肉錢三 銀花錢五 地丁錢三 苦桔梗錢二 連翹錢二

丹皮錢二 桃仁泥分八 犀角錢一 當歸土炒 分八 人中黃錢一

大黃錢一 紅花分三 猪尾膏匙三小 白茅根一兩。煎湯代水。

險痘三天。色重粘連。間有陷頂。宜涼血提頂。十三日

犀角八分

羚羊角二錢

歸鬚八分

連翹二錢

細生地一錢五分

紅花五錢

銀花一錢五分

苦桔梗一錢

甘草八分

丹皮二錢

白茅根三錢

蘆根三把

險痘四天。形色俱有起色。但頂平便澹耳。將就可望有成。十四日

生黃耆三錢

洋參炒一錢

白茅根三錢

茯苓塊三錢

銀花炒二錢

炙甘草一錢五分

白朮炭二錢

白芷一錢

雞冠血三小匙

穿山甲炒一錢

皂針八分

公雞湯煎藥。

五天。即於前方內去銀花雞冠血。加廣皮一錢。十五日

六天。雖然行漿。但不可色灰便澹。十六日

綿黃耆三錢

洋參薑炒二錢

廣木香一錢

茯苓塊三錢

肉果煨一錢五分

訶子肉一錢

焦於朮一錢五分

甘草炙二錢

廣皮炭一錢

濃煎

七天。業已回漿。十分全功。但便澹溼重。仍有意外之虞。宜實脾利水。十七日

茯苓塊三錢

洋參薑炒一錢

訶子肉一錢

焦於朮三錢

薏仁三錢

廣皮炭八分

廣木香一錢

肉果煨一錢

炙甘草一錢五分

嵩女三歲 癸亥十一月初十日

芥穗一錢五分

苦桔梗二錢

防風一錢

杏仁一錢

藿香葉八分

桑葉一錢 薄荷八分 生甘草一錢 蘆根二把 連翹二錢

重險痘一天熱一日而見點陽明絡現粘連成片汗多便溏氣虛毒重九

朝癢塌難防勉與擺毒鬆肌日十一

連翹三錢 苦桔梗三錢 歸尾八分 桑葉三錢

牛蒡子研八錢 蘆根五錢 丹皮二錢 銀花五錢

甘草一錢 猪尾膏三匙入冰片二厘

紫花地丁五錢與銀花先煎代水

出不爽快按未三歲之兒九日限期時刻有違限之慮即於前方內加白

茅根五錢暹羅犀角一錢日十二

重險痘三天面貌繁紅殼薄頂陷根鬆粘連成片身上色淡不起小便清

大便多而稀頭溫足冷應作氣虛不能送毒外出看總之九朝塌癢之症

勉與活血提頂而兼補氣日十三

洋參一錢 生綿薯三錢 白芷二錢 犀角一錢

穿山甲一錢 紅花一錢 連翹二錢 生甘草一錢

皂針一錢 歸尾五分 猪尾膏三匙入冰片二釐

重險痘四天較昨稍好然不能起脹焉得成漿塌陷之症勉與提頂日十四

犀角二錢

生黃耆五錢

白芷二錢

杏仁二錢

苦桔梗二錢

紅花一錢

銀花二錢

穿山甲一錢

皂針一錢

薄荷八分

雞冠血五匙

甘草一錢

重險痘五天較昨日略好。究竟不能起脹。面紅。身色灰白。頭溫足冷。虛寒

之極。勉用辛溫而甘者。助其元陽。日十五

生綿著五錢

洋參二錢

穿山甲二錢

焦白朮一錢五分

半

夏一錢五分

藏紅花一錢五分

廣木香一錢五分

白芷二錢

公丁香五分

桑

蠶生搗沖一錢

煨肉果八分

炙甘草一錢五分

濃煎如膏。

六天。虛寒亮殼。急用峻補以救萬一。日十六

生綿著兩

洋參六錢

藏紅花一錢五分

茯苓塊三錢

鹿茸五錢

穿山甲三錢

焦於朮四錢

歸身土炒三錢

廣皮炭二錢

廣木香三錢

白芷三錢

炙甘草三錢

煨肉果一錢五分 老公雞湯煎如膏。

七天。殼薄無漿。便溏。氣血兩虛。用陳文仲法。日十七

生綿著兩

洋參薑炒三錢

煨訶子二錢

鹿茸尖酒炒六錢

磁

桂去皮淨八分

公丁香八分

焦於朮二錢

半夏一錢五分

廣皮炭一錢五分

廣木香煨二錢

白芷二錢

炙甘草三錢

煨肉果二錢

公雞湯煎如膏

八天。咬牙泄瀉。目開。殼薄無漿。皆係虛寒塌癢之象。急用陳文仲大異功

散法。惜無力用參耳。日十八

黨參五錢

熟附子一錢

茯苓三錢

洋參五錢

廣木香三錢

白芷二錢

於朮四錢

肉果霜三錢

廣皮二錢

綿蒼三錢

訶子肉三錢

炙甘草三錢

搖桂一分

公丁香三錢

濃煎如膏。分六七

次服。

九天。昨用陳文仲大異功。仍然塌陷。咬牙。水漿不得入口。然根盤未散。斷

不可棄而不治。議於前方內加肉果二錢。公丁香二錢。連服二帖。日十九

十天。昨日此方連服二帖。頭面業已行漿。下身仍然灰白塌陷。再用前方

二帖。日二十

十一天。痘灰白色。漿不足必陷。仍服前方二帖。日廿一

十二天。頭面漿足。四肢空殼尚多。於前方內改肉桂為桂枝。再服二帖。日廿二

十三天。仍須托裏溫中。白日服完。夜間再服半帖皆可。日廿三

十四天。灰白。咬牙。泄瀉。猶在險途。日廿四

生綿著錢五 洋參錢五 公丁香錢六 肉果霜錢六 黨參錢五

生薏仁錢五 茯苓塊錢五 桂枝錢五 廣木香錢五 於白朮錢五

白芷錢三 炙甘草錢三 訶子肉錢三 廣皮錢三 水九碗濃煎如膏

徐六歲重險痘三天骨立無肉血枯而燥乾紅色暗粘連成片皆隱在皮中

乃鼻毒把持之故勉與兩解重法若照常理立方恐鞭長莫及癸亥十二月初四日

紫花地丁一兩 查肉半生半炒三兩 暹羅犀角一兩 大黃半生半用黃酒炒黑四兩

桃仁半生半炒四兩 銀花二兩 紅花三錢 青皮二兩

加上上梅片三厘研細加入湯藥內小豬尾血每半酒杯水入碗煮成

三碗先服半碗約二時再進以舌苔退痘起發為度

重險痘四天大下後業已起發不必再用沈降議涼血提頂初五日

銀花八錢 烏犀角八錢 羚羊角五錢 連翹五錢 紫花丁五錢

人中黃三錢 白芷二錢 苦桔梗五錢 白茅根一兩 皂針二錢

重險痘五天大有起色仍宜涼血活血兼與敗毒初六日

銀花八錢 細生地八錢 紫花丁五錢 連翹四錢 苦桔梗五錢

人中黃二錢 犀角五錢 羚羊角五錢 白茅根一兩 白芷三錢

分四次服

重險痘六天。雖然行漿。但火毒太重。不必用補。亦不可用補。猶宜涼血解毒。以為結痂之地。初七日

細生地兩一 銀花八錢 苦桔梗五錢 烏犀角兩一 連翹三錢

人中黃錢二 粉丹皮錢八 元參五錢 白茅根兩一 紫花丁錢六

七天。於前方內減犀角一半。加麥冬五錢。初八日

八天。漿已滿足。色已蒼。胃已旺。議辛涼以助結痂之用。初九日

銀花三錢 白茅根五錢 麥冬不去心 五錢

連翹三錢 五穀蟲一錢五分 甘草一錢五分

九天。四肢大熱。非重用辛涼。其痂不結。初十日

銀花五錢 細生地三錢 元參五錢 連翹五錢 白茅根六錢

丹皮五錢 麥冬不去心 八錢 生甘草一錢五分 黃芩酒炒黑 一錢五分

十天。回漿甚緩。微咳。用辛涼少兼實脾。十一日

細生地三錢 連翹三錢 粉丹皮三錢 生薏仁五錢 麥冬不去心 三錢

人中黃一錢五分 地骨皮一錢 黃芩一錢 白茅根三錢 冬桑葉一錢

十一天。仍服前方一帖。十二日

十二天。再服前方一帖。十三日



十四天十分全功。惟敗餘毒而已。<sup>十五</sup>

仙人杖皮<sup>二錢</sup> 連翹<sup>三錢</sup> 五穀蟲<sup>二錢</sup>

人中黃<sup>一錢五分</sup> 丹皮<sup>三錢</sup> 白茅根<sup>三錢</sup>

呂女重險痘二天。色重粘連成片。攢簇頗多。第一方以達外感活血鬆肌

爲法。<sup>癸亥十二月十三日</sup>

薄荷<sup>一錢</sup> 牛蒡子<sup>三錢</sup> 當歸<sup>一錢五分</sup> 芥穗<sup>二錢</sup>

南紅花<sup>一錢</sup> 前胡<sup>一錢五分</sup> 半夏<sup>一錢</sup> 夏枯梗<sup>三錢</sup>

蘇葉<sup>一錢</sup> 杏仁<sup>三錢</sup> 生甘草<sup>一錢</sup>

早第二方以擺開鼻毒爲主。蓋攢簇者必攻也。况色重乎。<sup>十四</sup>

生大黃<sup>一牛生用一牛酒炒黑二兩</sup> 桃仁<sup>半生半炭六錢</sup> 南山楂<sup>半生半炭六錢</sup> 苦桔梗<sup>四錢</sup>

猪尾膏<sup>一小酒杯研入上上梅冰五釐</sup> 青皮<sup>四錢</sup> 人中黃<sup>二錢</sup> 每次沖二三小匙。

重險痘三天。早用必勝法。現在顏色已退。脣重色絳。抱鬢蒙頭。腰中腎俞

太重。弄舌唾嘴。心火太重。恣議以涼重敗毒。<sup>申刻</sup>

次生地<sup>三錢</sup> 杏仁<sup>三錢</sup> 全歸<sup>三錢</sup> 鈴羊角<sup>三錢</sup>

犀角<sup>六錢</sup> 川連<sup>一錢</sup> 苦桔梗<sup>三錢</sup> 銀花<sup>三錢</sup>

廣皮<sup>一錢五分</sup> 牛蒡子<sup>二錢</sup> 連翹<sup>三錢</sup> 甘草<sup>一錢五分</sup>

豬尾膏 每次三匙 研入大冰片五釐。

險中逆痘四天。氣既虛而毒又重。色暗根鬆。瀉瀾殼薄。頭溫足冷。抱鬢攢腰。下不可補。又不可。此其所以難也。勉與活血提頂。日十五

苦桔梗 六錢 犀角 五錢 銀花 五錢 紫花丁 五錢 全歸 三錢

白芷 三錢 穿山甲 二錢 查肉 六錢 皂針 三錢 人中黃 三錢

丹皮 五錢 紅花 一錢五分 奪命丹 三粒 豬尾膏 研入冰片五釐 每次沖三小匙

險中逆痘五天。較昨日雖有起色。究竟色滯而重。板着不行。二日不大便。

皆梟毒把持。恐不能行漿。若過此關。則不能再用沈降矣。議必勝法。日十六

桃仁 生炒各半一兩 紅花 一錢五分 查肉 炒一兩 生大黃 半生半酒炒一兩

苦桔梗 六錢 甘草 三錢 青皮 六錢

險中逆痘六天。昨日復用必勝法。雖有起色。究竟頭面不如週身之半。梟

毒把持。陽亢可知。日十七

紫花丁 五錢 大黃 酒炒黑五錢 白芷 三錢 苦桔梗 五錢 犀角 五錢

紅花 二錢 南查炭 三錢 銀花 五錢 穿山甲 炭二錢 皂針 二錢

全歸 三錢 廣皮 二錢 人中黃 三錢

險中逆痘七天。頭面起發色鮮。週身色淡。逆者已順。現有行漿之勢。一以

上漿爲主。十八日

黨參五錢

生綿著咀豆大 歸身土炒

洋參薑炒

茯苓塊三錢

防風三錢

桂枝五錢

炒廣皮二錢

白芷三錢

於朮三錢

炙甘草三錢

入天。照前方再服二帖。十九日

九天。身上色灰。四肢尙空。大便頻仍。寒戰發癢。皆係虛象。急急用陳文仲

法。防其內陷。二十日

黨參三錢

茯苓塊五錢

半夏三錢

肉果霜五錢

洋參薑汁炒黃三錢

白芷三錢

於朮五錢

訶子肉煨五錢

廣皮炒二錢

官桂去粗皮一錢

廣木香三錢

甘草炙三錢

附子熟一錢

大棗肉二枚

生薑三片

咬牙加公丁香三錢。第二帖做極細末。

將昨日第二帖之末藥每服三錢。約兩三時辰做一服。廿一日

呂男二歲狀元痘原不必服藥。但現在半生半熟。泄瀉。脣色寒。猶恐遺毒損

目。議溫托法。甲子正月十二日

生綿著三錢

黨參二錢

訶子肉二錢

茯苓塊三錢

白朮一錢

生薏仁二錢

製半夏一錢

廣皮一錢

炙甘草三錢

汪男<sup>三歲</sup>初報痘點。形即繁重。表虛脈滑。心熱恣甚。謹防八九朝癘塌。且與辛涼解肌透毒。<sup>初六日</sup>

銀花<sup>五錢</sup> 苦桔梗<sup>五錢</sup> 丹皮<sup>三錢</sup> 連翹<sup>連心二錢</sup>

牛蒡子<sup>三錢</sup> 全歸<sup>一錢</sup> 薄荷<sup>三分</sup> 杏仁泥<sup>二錢</sup>

險痘一天。頭面粘連。點現瀉闊。足涼。非純然毒重。亦非純然氣虛。且與活

血鬆肌擺毒。大涼大溫。皆在難施之例。<sup>初七日</sup>

鎊犀角<sup>五錢</sup> 苦桔梗<sup>五錢</sup> 全歸<sup>五分</sup> 銀花<sup>五錢</sup>

牛蒡子<sup>一錢</sup> 青皮<sup>二錢</sup> 連翹<sup>三錢</sup> 南查炭<sup>三錢</sup>

甘草<sup>二錢</sup> 薄荷<sup>八分</sup> 猪尾膏<sup>三匙</sup> 外以胡荽酒洗足。

險痘二天半。但脣腫右顴腫。心脾之火甚也。足已溫。痘苗稍大者即頂陷。<sup>初八日</sup>

白茅根<sup>兩一</sup> 犀角<sup>五錢</sup> 查肉<sup>五分</sup> 紫花丁<sup>五錢</sup> 銀花<sup>五錢</sup>

紅花<sup>八分</sup> 苦桔梗<sup>三錢</sup> 連翹<sup>三錢</sup> 廣皮<sup>八錢</sup> 牛蒡子<sup>二錢</sup>

全歸<sup>二錢</sup> 甘草<sup>一分</sup> 猪尾膏<sup>三匙</sup>

按白茅根秉燥金之體。感風木而花藏胎內。異於衆草。生發最速。其性喜潔。故能化毒開清。其味甘涼。故能走肺胃而不傷肺胃之陰。本草稱

其主衄症。蓋言其所然。而不言其所以然也。但此物性平和。不假以重權。不為功也。凡一切清竅病用之最良。而痘症中護眼護喉。走清道血。分為尤良也。

險痘三天半。兩顴兩眼肉腫瘡不腫。心脾之火太甚也。血無不活。故今日不加血藥。初九日

鈴羊角錢五

元參錢五

細生地錢三

烏犀角錢五

銀花錢五

紫花丁錢五

苦桔梗錢六

連翹錢三

白茅根兩一

牛蒡子錢五

白芷錢二

生甘草錢一五分

穀精草錢三

重險痘四天半。額滯於額。頰滯於身。此陽火有餘之象。雖不必大下。仍以

敗毒為主。而提頂次之。初十日

鈴羊角錢五

犀角錢五

紫花丁錢五

次生地錢五

銀花錢五

穀精草錢三

苦桔梗錢五

元參錢二

真山連錢五分

牛蒡子錢二

黃芩錢三

生甘草錢二

白茅根兩一

十二茶杯水煮五杯。分十次服。

五天半。已有行漿之勢。不必提頂托漿。但喉已聲啞。趁此猶係外感用事之時。仍用昨日方開提肺氣敗毒。減其蒸騰鍊毒之火。使歸於和平。即行此陽火痘之漿法。所謂道無定體者此也。高明以為何如。十一日

仍用昨日方一帖。限明日黎明服完。

六天半。面已有漿。四肢腰背皆空。五更大便兩次。痛快而漉。今晚已入氣。血用事之關。須漸進補托。兼與清毒。日十二

炙綿薯 錢三

黨參 錢五分

白茅根 錢六

烏犀角 錢三

銀花 錢三

苦桔梗 錢一

冬白朮 錢二

白芷 錢二

廣皮炭 錢一

茯苓塊 錢三

日入後服。

七天半。頭面漿已七八。腰背不足。四肢尚空。今日正是氣血當令。已有瘡態。必得扶其不及。多得一分漿。即少得一分後患。此身小痘多之定法也。  
日十二

生綿薯 錢五

白朮 錢三 土炒黃

藏紅花 錢一

茯苓塊 錢三

黨參 錢三

廣皮炭 錢五分

廣木香 錢一

白芷 錢二

炙甘草 錢五分

晚足九天。於前方內去紅花。日十四

十天。漿足色蒼。形勢圓綻。四肢陸續上漿。皮膚捫之平和。不冷亦不過熱。脈洪數有力。合觀皆情理之正。其不食畏縮。皆痛象也。痘多漿亦多。鍊氣血而成漿。痛亦情理之正。斷非陷症。議補氣以勝痛。活絡以定痛。法似不岐於路矣。日十五

人參分五 生綿著錢三 紅花分四 冬朮錢一 熟綿著錢三

厚樸分六 乳香分八 茯苓錢三 廣皮錢一 沒藥分八

廣木香錢一 甘草錢三 白芷錢二 廣皮錢一 沒藥分八

十一天。大勢已有成功之象。猶須防其泄瀉作癢。日十六

茯苓錢三 洋參炒黃 廣木香煨八 炒冬朮錢二

黨參錢二 炙甘草錢一 焦白芍錢二 廣皮炒半黑

十二天。小便長。大便滯。暫與宣化腸胃。日十七

茯苓錢三 黨參錢一 五穀蟲錢三 穀精草錢三 厚樸錢一

十三天。痘後肺液受傷。渴而咳。日十八

沙參錢三 地骨皮錢三 象貝錢一

麥冬錢三 白茅根錢六 葦根錢三

某男。風溫發熱三天。耳冷尻冷。已有微點。謹防天花。法宜辛涼解肌。芳

香透絡。最忌三陽表藥。多汗致成癢塌。日廿六

銀花錢三 苦桔梗錢三 芥穗錢一 連翹錢三 牛蒡子炒研

桑葉錢三 薄荷分八 白茅根錢三 甘草錢一

當日晚大瀉水糞。加黃芩錢三 瀉止。

虛寒痘二朝。甫二日熱退其半。神氣安靜。大便溏泄。佈痘不多。亦屬均稱。但痘形扁闊。根鬆。色亦過淡。觀其皮色。脾經素有飲食傷損。議異功保元

合法。廿七日

生綿薯三錢

人參一錢

廣木香五分

雲苓塊三錢

廣皮二錢

炙甘草二錢

生於朮二錢

仍用前方。廿八日

十二朝。痘雖稀少。漿行薄弱。腰下尙未結痂。乘此機會。再用保元以助餘

漿。初七日

雲苓塊三錢

人參一錢

炙甘草五分

生薏仁三錢

綿薯三錢

仍用前方。初八日

補案辛巳年述

癸酉初夏。余有漣水之游。長女甫二齡。於四月十一日見

點。至廿五日已半月矣。余適回家。見其形勢。鼓立者半。頂陷者半。根抱者

半。散者半。毫無汁漿。本係謝寶靈兄調治。因請同看。伊立一方。余視之曰。

此方若上得起漿。甘受重罰。此方若上不起漿。亦受重罰。謝兄愕然曰。足

下左右皆受罰何故。余曰。今且不必明言。明日來視漿色。伊去後。余仍用

其方。照方製廿帖。加燕窩十二兩。此味亦原方所有。但加重耳。大公雞一



隻重九觔。紫河車一具。並藥共十餘觔。先分九鍋煎。去渣後。復并一鍋煎。自早之暮。不敢草率。成濃膏。得二碗許。令乃母飲半茶杯。小人飲半酒杯。二鼓時。其母因乳脹。謂余曰。藥甚靈。余無乳者。已數日。今忽蓬蓬。豈非藥力乎。余曰。可急令小兒吮之。彼曰。小兒不得寐者。已數日。今方熟睡。可驚之乎。余曰。限期已緊。所以令汝服藥。爲以乳汁上漿也。今乳脹可與之吃矣。因促之醒。痛吮一飽。少時又寐。漏下三鼓。清漿如露矣。未至四鼓。又令母女服藥如前。四鼓未罷。漿如蠟色。五鼓以後。又如茶色。濃厚如及時之漿。然天明已十七朝矣。又延謝兄至。彼一視曰。奇哉。何因得此。余曰。用君原方。彼曰。只添得燕窩一味。何神止此。余曰。余昨云。此方若上得起漿。甘受重罰者。先生於七八朝。即用此方。彼時氣血方壯。毫無汁漿。今以十五朝。氣血消耗。豈能上漿乎。余又謂此方不能上漿。亦受重罰者。以先生之方若錯。小女早不活矣。因令伊執方之背面視之。伊見照方廿帖之文。又令視諸藥渣。因謝曰。余實不能。

某女 十九朝。痘後便塘而頻久。則脾腎兩傷。補瀆爲穩。二十日

真雲苓 五錢

白朮 土炒 三錢

肉果霜 三錢

生薏仁 五錢

半夏 一錢

訶子肉 三錢

實脾利水之中兼化清氣。廿四日

雲苓錢五

生薏仁錢五

晚蠶沙錢三

於朮士炒三錢

地骨皮錢三

五穀蟲錢三

蟬退去頭足七枚

炙甘草一錢五分

三十天痘後餘毒腫潰。補托之中加以敗毒。初一日

人參錢一

生薏仁錢五

黃耆錢三

於朮錢三

五穀蟲錢三

銀花錢三

雲苓錢三

痘後餘毒腫潰。稍加銀花。大便即溏。議於前方去銀花。加肉果訶子。初四日

茯苓塊錢三

人參錢一

廣木香錢一

生薏仁錢五

於朮錢三

五穀蟲錢二

肉果霜一錢五分

黃耆錢三

炙甘草一錢五分

訶子肉炒三錢

三十六天痘毒潰爛。應照潰瘍例。即用痘科門中之保元合異功法。初七日

人參錢一

生薏仁錢三

於朮錢二

雲苓錢五

炙甘草錢二

廣皮錢一

綿耆錢五

傷食。暮熱。嘔吐。痘後太飽之故。與止渴消食。其熱當自止。調理飲食要緊。

初八日

茯苓錢三

地骨皮錢三

薏仁錢三

半夏錢二

炒廣皮錢一

神麩一錢五分

某男 風木司天之年。又當風木司令之候。風木內含相火。時有痘疹。無論但受風溫。身熱而不發痘。或因風溫而竟發痘。或發斑疹。皆忌辛溫表藥。惟與辛涼解肌透絡為穩。此時醫所不知。蓋風淫所勝。治以辛涼。佐以苦甘。內經之正法也。二十日

銀花三錢 苦桔梗三錢 連翹三錢 牛蒡子一分 薄荷八分

桑葉三錢 芥穗一錢 鮮蘆根五錢 甘草一錢

一二帖 此方治痘初起多能化少涼絡而易出見點亦服此

險兼逆痘二天。痘色豔紅。脣赤舌赤。見點繁瑣。三五成羣。參毒陽位。勉與

涼血擺毒。廿一日申刻

石膏生末一兩八錢 生大黃炒黑三錢 地丁紫花三錢 犀角五錢

苦桔梗三錢 桃仁三錢 銀花五錢 人中黃三錢

地龍三錢 連翹三錢 白茅根三錢 丹皮三錢

此案為鈔錄者失去十四帖。大意以犀角地黃湯加連翹銀花白茅根細生地等一味涼血收功。至十五朝。猶用犀角。十六朝。以辛涼清餘熱

一方。服至廿一朝。

十二姑九歲 暑傷兩太陰。身熱而嘔。舌白滑。乙酉六月廿二日

雲苓皮四錢 連翹三錢 藿香葉二錢 生薏仁三錢 銀花三錢

白蔻仁一錢 製半夏三錢 杏仁三錢 黃芩炭二錢

痘三天頂平根鬆色暗夾虛夾毒之症與活血提頂敗毒扶到七天方好

補托廿三日

苦梗三錢 牛蒡子二錢 白芷三錢 防風三錢

紫花丁二錢 紅花二錢 連翹三錢 人中黃五分

全歸二錢 銀花三錢 紫草茸一錢 查炭一錢

痘四天頂平根鬆色暗便閉不食昨用活血敗毒宣絡今夜已見大便熱

退能食頭面已有起脹之勢前後心續出盈千皆根泛頂平暗滯稍大者

頂即陷應照虛寒例治與宣氣活絡提頂不得過用敗毒清裏致令便溏

內陷廿四日

當歸二錢 藏紅花二錢 查炭二錢 防風二錢

廣木香一錢 磨菰一錢 銀花三錢 穿山甲一錢

甘草五分 白芷三錢 廣皮炭二錢

痘五天頂平滯陷根鬆色暗昨日即照虛寒例治而用溫煦芳香今日口  
竝不渴而舌苔白厚盛暑之際尙兼足太陰之暑溼症七日以前外感用

事必視其在何臟腑而清之。以爲七日以後上漿之地。廿五日

茯苓皮三錢

當歸土炒三錢

六一散三錢

生薏仁三錢

銀花四錢

藏紅花二錢

廣木香一錢

防風三錢

廣皮炭二錢

白豆蔻一錢

白芷三錢

煮四小杯。分四次服。

痘六天。頂平多陷。根鬆色暗。頭面色已華。前後心尙多陷而暗。身痛。口不

渴。與活血提頂。令其易於上漿。廿六日

當歸三錢

生綿著土炒五錢

紅花二錢

銀花五錢

穿山甲三錢

白芷三錢

乳香二錢

廣木香二錢

廣皮三錢

沒藥二錢

雞冠血每杯點三匙

甘草三錢

公雞湯煎煮三杯。分三次服。

七朝已有行漿之勢。平頂陷頂尙多。加補托以助之。廿七日

痘八天。頭面行漿已有七成。臂次于手。足次于胸。順也。胸以下陷頂多面

色灰。仍須溫煦以助行漿之勢。廿八日

綿著八錢

高麗參三錢

白芷三錢

防風三錢

茯苓塊三錢

紅花二錢

當歸土炒三錢

廣木香三錢

廣皮三錢

甘草衣一分五分

痘九天。正在行漿之際。便頻眼開。卽是虛象。粘連之處。顏色卽灰。非虛而

何急急補托而兼溫煦為要。廿九日

人參三錢 炙綿薯兩 白芷二錢 於朮炒三錢 肉果霜三錢

廣皮三錢 扶苓三錢 廣木香二錢 甘草炙三錢 防風三錢

十天雖已結痂。漿未十分滿足。尙有正行漿之處。仍用前方再為補托。明

日再與收痂未遲。七月初一日

十一天痘已結痂。漿未十分滿足之故。皆因連日便頻受暑積滯而成痢

疾。先擬溫下其積。今視四肢鼓立。胸前全陷。並非正結。恐一進沈降。竝四

肢而亦陷矣。前方係必不可不用之藥。茲且暫停。勉與實脾利水以結痂。

少加化積。俟十四朝之後。痘勢收場。如積滯未化。再與下法。初二日

生薏仁五錢 茯苓連皮五錢 黃芩炭一分 焦白芍二錢 真山連薑炒一錢

檳榔二錢 益智仁二錢 神麴炒三錢 廣皮炭三錢 南查炭三錢

痘十二天仍服前方。初二日

痘十三天業已結痂。原可妥當收功。不意盛暑流行之際。食物不化。成致

欲便先痛。便後痛減。裏急後重之痢疾。法當溫下。假使畏縮不前。拖延日

久。必無好音。莫若乘此邪氣初聚之時。急奪其邪。冀邪去正存。方收拾一

切未完也。初四日

白芍三錢

炒黃芩三錢

熟附子二錢

生大黃牛生牛酒炒  
半黑五錢

檳榔三錢

小枳實三錢

赤搖桂一分  
五分

神麴四錢

廣皮炭三錢

真山連炒二錢

查炭三錢

煮成三杯。先服一杯。候一二時。俟其再便。腹不痛。即勿服。腹仍痛再服。第二杯三杯亦如之。

痘十四天。四肢結痂。十有其五。昨日服藥後。腹痛愈甚。便中糞多積少。日夜共七八次。今用前方減附子一錢。搖桂二分。服後已刻至未刻。便紅積一次。腹中仍痛。糞色如赭。後二杯即加赤搖桂八分。約服一杯半。腹痛即便紅積。仍有糞色黃。夜半服第三杯。丑寅時連便兩次。糞色仍赭。微有紅積。腹仍微痛。初五日

痘十五天。膝下至足趾痂尚未結全。已刻便一次。燥糞黃色兼赭色。溏糞微帶紅積。腹不痛。午刻服下第一杯。至亥刻。便一次。糞色黃。丑刻便一次。無積糞黃。初六日

高麗參三錢

白芍炒三錢

黃芩炭一錢五分

雲苓皮五錢

檳榔二錢

赤桂心五分

生薏仁五錢

山連薑炒一錢

廣皮炭三錢

南查炭二錢

神麴炒三錢

炙甘草一錢

痘十六天。痂已結齊。痂已全可。不必服藥。目帶微腫。穀精草泡茶飲之。初七

日

青睛有雲翳。速清膽絡之熱毒。初八

穀精草四錢

連翹三錢

青箱子三錢

茶菊花三錢

桑葉三錢

痘漿未足。毒流膽絡。故青睛白翳。又感時令燥氣化火。故白睛起太陰睛

瘡。考古治法以六味丸作湯。改扶苓為君。再加清膽絡之熱毒以退翳。初九

日

扶苓四錢

穀精草三錢

萸肉一錢五分

生地二錢

茶菊花二錢

丹皮二錢

山藥一錢五分

青箱子二錢

桑葉二錢

澤瀉一錢五分

仍照前方服。內加銀花五錢。連翹三錢。生甘草一錢五分。目內白翳稍退。

煩躁常突。因痘後血虛化燥故也。與甘麥大棗湯主之。初十日

甘草生一錢五分

小麥七合

大棗五枚

煮粥服之。

因瘡痛而突。目內白翳仍有。身上起大小瘡十數粒。復生細痘。在舊痂窩

內。痘漿未足。流毒成瘡故也。仍服初九日方。十一日

目內白翳退。太陰睛瘡仍在。瘡未見消落。原方再服。十二日

目內太陰睛瘡仍在。續出之瘡痘未退。仍服原方。瘡貼紫草膏如爛草炭。



十三

服原方一帖。日十四

未服藥。日十五

目內太陰睛瘡稍退。仍有翳。身上瘡痂已落者復生。小瘡未落之處。復有倒漿欲潰。總之流毒未清之故也。原方再服。目內翳以四退散治之。日十六  
痘已滿月。目內太陰睛瘡未淨。翳仍在。仍服原方。又服錢氏蟬退散。一日  
一服。日十七至廿三日

蟬退為末。每服一錢。羊肝湯下。日二服。

四退散 主治目睛老翳。

人退即手指甲

蛇退

雞退即風衣

蟬退

每藥一兩。加頂高梅冰片一分。左眼右鼻聞。右眼左鼻聞。每聞少許。兩月全愈。

趙女十歲體堅。痘少。原可不必服藥。但愈少漿更不可不足。舌苔厚。中黃邊白。且與清毒一帖。明日再與托漿一帖。乙酉六月十五日

苦桔梗錢一

連翹錢三

人中黃分八

牛蒡子錢一五分

銀花錢三

鮮荷葉角一

全當歸錢五分

煮二小杯。分二次服。

於前方內加生綿耆四錢。白芷五分。黨參三錢。炙甘草一錢五分。日十六

辛涼結痂。古之正法也。實脾利水。亦有溼者所宜施之。茲當暑月。舌苔厚

而白。溼也。身熱未盡退。熱也。二法可合用。日十七

銀花三錢 扶苓塊連皮三錢 蘆根三錢 連翹三錢 生薏仁三錢

福歲一二三天佈痘稀疎。苗頭純正。但色白皮薄之兒。頂平根鬆色淡。有鼓薄

無漿之慮。雖在初起。即用保元湯為當。

黨參三錢 連翹二錢 紅花三錢 綿耆生三錢

銀花炒二錢 甘草炙二錢 胡荽根一錢 服三帖。

五朝 氣血兩虛之症。色淡根鬆頂平。大便溏泄而頻。痘不鼓立。焉得成

漿。漿既清薄。痂必不厚。雖係順症。有痘後壞目牙疳之慮。此等症舉世輕

忽之。及至壞證已現。必不可為。余見之屢矣。議陳氏木香散法。必得漿足

結痂為要。

綿耆炙五錢 高麗參三錢 廣皮一錢五分 於朮二錢

扶苓塊二錢 甘草炙二錢 白芷二錢 肉果霜三錢

生薑片二錢 木香一錢 訶子肉三錢 大棗去核二枚

七朝 痘已成漿。兼有結痂。究竟未滿足。大便仍溏。於前方內去高麗參

訶子白芷再服三帖收功。

某 見點之初神氣昏冒先開心包透絡繼以辛涼達表使其易出再商後法切忌發汗傷無辜之表。廿九日

紫雪丹二錢 分四次服涼開水送以神清為度。

辛涼散七包 二時服一包。

頭面色赤而頂平根寬鬆反不如腰以下鼓立甫三日小便濁須兼分利形體胖本係溼胎應照毒搏論治扶過六七朝以後能用補托方妙。初一日

茯苓皮四錢 猪苓三錢 白通草一錢 苦桔梗三錢 澤瀉三錢

芥穗二錢 牛蒡子炒研一分 連翹三錢 甘草一分 紫花地丁二錢

銀花五錢 蘆根五錢 晚蠶沙二錢

醫者補偏救弊之謂也三五日前見有何處偏勝及時去之以免七日以後糾纏時人不知以為此等方非治症也。

四天色陷頂平根鬆夜間煩燥毒氣未化氣分更虛與化毒提頂。初二日

連翹三錢 紫花地丁三錢 白芷二錢 銀花三錢 苦桔梗三錢

甘草二錢 丹皮三錢 牛蒡子二錢 葦根五錢 防風二錢

白茅根三錢 煮兩大杯分四次服。

五天根已抱住。頂平皮薄。議於化毒之中稍加安表。初三日

苦桔梗三錢 綿 著生三錢 防 風二錢 牛蒡子炒研三錢 連 翹三錢

白 芷二錢 人 中 黃二錢 銀 花三錢 葦 根五錢 白 茅 根三錢

六天。面色佳。惟頂間有平者。身上色淡。時有癢意。表虛皮薄之症。重與實

表提頂。初四日

淨 參半炒二錢 生 綿 著六錢 白 芷二錢 銀 花三錢

炙甘草三錢 蘆 根五錢 防 風二錢

七天。面上稍有渾漿。餘皆清而皮薄。急急內托為要。體胖溼多。加苓朮預

為收痧之地。又合小異功法。初五日

人 參三錢 生 綿 著一兩 廣 皮炒三錢 於 朮三錢 雲 苓 塊三錢

生 薑三錢 防 風三錢 廣 木 香煨二錢 大 棗去核二枚 白 芷三錢

仍用前方。加肉果霜一二錢。初六日

照前方再服一帖。初七日

溼體虛痘十天。雖已回痧之期。但破損太多。仍然發癢。暫與護表實脾一

帖。明朝再議。初八日

生 綿 著五錢 防 風二錢 生 薏 仁三錢 扶 苓 塊五錢

白芷二錢 廣皮炭二錢 炒白朮三錢

某險兼逆痘六天。額顛攢聚。本係毒重。色白皮薄。痘頂下陷。頭溫足冷。根暈不紅。氣血兩虛。先與提頂。將來能受陳文仲法。方望成功。初八日

人參一錢 煨肉果去淨油二錢 紅花三錢 綿蒼生五錢 穿山甲二錢

廣皮二錢 防風三錢 廣木香五分一錢 甘草二錢 白芷二錢

險兼逆痘七天。昨用陳氏溫托法。今日稍有起色。但頂陷者尚多。已有損

破。亦且汗多不能滿漑。焉能鍊毒成漿。今日再以陳氏木香散法溫中托

絡。毋使內陷癢塌。看守勿懈。不致再有破損。方可有希望。初九日

人參五分一錢 廣木香三錢 白芷三錢 綿蒼生八錢 肉果霜二錢

半夏三錢 於朮二錢 藏紅花五分一錢 廣皮二錢 防風三錢

公丁香錢一 甘草炙三 歸身錢二 再加公雞冠血以提頂。

便澹而頰加訶子肉。餘藥加分量以助漿。初十日

自初十日至十五日。皆服此方。惟分量加重。

白痘十四朝。頭面雖然漿足。兩足尚在行漿。其勢未能十分充滿。猶然大

便頻數。又有咳嗽。設大便不調。尚在險關。仍須補澀。兼充養已喪之氣血。

立方候裁。十六日

人參七錢 廣木香二錢五分 訶子二錢五分 於朮炒三錢 肉果霜二錢五分

半夏一錢 雲苓二錢 赤石脂二錢 廣皮炒二錢五分 薏仁五錢

慶十一歲 痘後餘毒未清。又加溫癘。陽明發斑。口臭之極。脣腫而黑。目腫而

閉。胃幾爛矣。急救猶恐不及。况再緩乎。廿二日

元參一兩 生石膏八兩 知母二兩 烏犀角一兩 麥冬不去心一兩

丹皮一兩 銀花一兩 人中黃五錢 一時許服一茶杯。

得大效。原方再服一帖。勻二日。廿四日

於原方內減元參為三錢。加射干五錢。黃芩五錢。廿六日

包五歲 秋干燥氣化火。現在君火客氣司令。故有發痘之孩。本有自汗。何可

再以羌活發汗。致令表虛。身壯熱。肢厥。舌黃赤。口渴。脈洪大而數。晚間微

有譫語。大便結。皆火證也。皮色黃痘之頂平根鬆。氣虛苗也。先以辛涼鬆

肌擺毒清熱。扶過七日。能用補托方妙。丙戌九月十四日

生石膏五錢 元參三錢 炒黃芩二錢 苦桔梗三錢 連翹三錢

全當歸一錢五分 牛蒡子二錢 銀花三錢 人中黃一錢五分 紫花地丁二錢

外紫雪丹六分。夜間服。

險痘二天半。尙未出齊。稍大者業已頂陷。其為氣虛可知。雖不大便。未可

沉降與活血提頂擺毒。日十五

次生地錢五 苦桔梗錢三

牛蒡子錢三 黃芩錢二

白芷錢二 銀花錢三

全歸錢二

連翹錢三

人中黃錢五分

元參錢三

紫草茸錢三

煮三杯分三次服。

險痘四天。頭面顏色雖重。腿腳甚淡。頂陷者不少。大便已見。舌尖有紅刺。而苔白柔潤。宜退。謹防大便塘滑。夢語仍有。口仍渴。且與辛涼清上。芳香透絡。使火毒及熱邪從內達外。日十六

苦桔梗錢三 連翹錢三

銀花錢三 白芷錢三

黃芩錢一 人中黃錢二

天虫錢二

白茅根錢三

煮二杯分三次服。

皂角刺錢二

杏仁錢二

另和服局方至寶丹一丸。

五天陷者稍起。色漸勻。寐稍安。舌苔白膩。是中宮食滯未清。口仍渴。上焦之熱未退。仍用前法。兼與和中。日十七

杏仁錢三 苦桔梗錢三

藏紅花錢一 黃芩錢二

廣皮錢一 皂針錢二

白芷錢三

丹皮錢三

生甘草錢五分

連翹牛殼半 心三錢

南查炭錢二

另服局方至寶丹一丸

六天。身半以上。清漿七八。惟腿過半。顏色尚屬適中。頂平便溏。舌白氣虛。有溼之徵。今日宜輕與補托。清上仍不可少。中焦有滯。必須急急清理。能受補劑厚味方妙。日十八

生綿著 錢三

於朮 錢二

炒神麩 錢三

苦桔梗 錢三

白芷 錢三

廣皮炭 錢一五分

雲苓塊 連皮四錢

銀花 錢一五分

生甘草 錢一五分

連翹心 錢三

查炭 錢三

煮三杯。分三次服。

七日有奇。正氣血用事之期。漿行尚不顛預。頭面顏色亦佳。身上與四肢微覺稍暗。四末微涼。大便溏。微嘔。皆脾陽不足之象。今日疎補為宜。稍加香溫托裏。日十九

生綿著 錢五

白芷 錢三

高麗參 錢二

雲苓塊 錢五

查炭 錢二

廣木香 錢三

炒於朮 錢四

廣皮 錢三

肉果霜 去淨油一錢五分

薑半夏 錢三

煮三杯。分三次服。

入天半。漿不十分濃足。食少便溏。尚覺安靜。周身有疼痛之象。氣虛而溼重。難於峻補。仍以補脾滲溼為主。稍加宣絡定痛。仍須看守防護。不致再有損傷要緊。日二十



生綿著 錢五

於 朮 炒 錢三

肉果霜 錢五分

雲苓塊 錢五

半 夏 錢三

廣皮炭 錢三

穀精草 錢三

白 芷 錢二

炙甘草 錢二

訶子肉 錢三

濃煎三小杯。分三四次服。

九天漿未滿足。眼開太早。大便稀澹。有痘毒目疾之虞。喜胃開進食。仍宜

補澀。日一

生綿著 錢六

人 參 錢三

肉果霜 錢三

訶子肉 錢三

於 朮 炒 錢三

廣皮炭 錢三

穀精草 錢三

半 夏 錢三

炙甘草 錢二

廣木香 錢二

白 芷 錢二

煮三杯。分二次服。

漿未滿足。即已收痂。氣虛火熾。大便已止。且免收瀉。與實脾為主。日二

雲苓塊 錢五

人 參 錢五分

穀精草 錢三

炒於朮 錢四

半 夏 錢三

五穀蟲 錢三

生薏仁 錢五

白 芷 錢二

廣橘皮 錢三

廣木香 錢三

煮三杯。分二次服。

實脾兼敗餘毒。日三

雲苓塊 錢三

於 朮 錢五分

廣木香 錢一

生薏仁 錢三

銀 花 炒 錢三

黃芩炭 錢一

穀精草 錢三

歸 鬚 錢一

五穀蟲 錢五分

氣虛溼重之痘。甫經落痂。即作滯下。舌苔白滑。脣淡而宣浮脾溼之象。與

實脾利水之中。不用守藥。加微苦兼入血分。廿四日

- 雲苓塊連皮 五錢
- 猪苓二錢
- 穀精草三錢
- 蒼朮炭五錢
- 白芍一錢五分

- 南查炭三錢
- 廣木香三錢
- 黃芩炒二錢
- 五穀蟲三錢
- 炒銀花二錢

- 歸鬚五分
- 橘皮炭二錢
- 丹皮炭二錢

便後仍有積垢兼血。脈與舌苔脣口較昨日皆佳。并喜眠食均好。神氣亦

清爽。痲落尙不艱難。一以實脾爲主。兼敗毒宣絡。廿五日

- 猪苓三錢
- 茯苓塊連皮 五錢
- 歸鬚二錢
- 赤芍五錢
- 廣木香三錢

- 桃仁五分
- 黃芩二錢
- 南查炭三錢
- 半夏打碎 一錢
- 蟬退去頭足 二錢

- 五穀蟲三錢
- 青皮二錢
- 銀花炒二錢
- 炒丹皮二錢

便後垢膩兼血。脾與小腸寒溼。右脈仍大。好在眠食俱佳。與燥溼宣絡。廿六日

- 猪苓二錢
- 廣木香三錢
- 雲苓塊五錢
- 歸鬚一錢
- 竈中黃土二兩先煎代水

- 蒼朮炭二錢
- 蟬退去頭足 二錢
- 南查炭二錢
- 桃仁半錢
- 川黃連薑汁炒 六分

- 痘後餘毒不安。大便中夾有血積紅滯。小便白濁。與宣絡清溼敗毒兼化

濁中清氣。廿七日

- 雲苓皮五錢
- 猪苓二錢
- 黃芩五分
- 蒼朮炭一錢
- 澤瀉二錢

- 雲苓皮五錢
- 猪苓二錢
- 黃芩五分
- 蒼朮炭一錢
- 澤瀉二錢

白芍 錢一

晚蠶沙 錢五分

桃仁 錢二

五穀蟲 錢五分

蟬退 錢五分

銀花 錢二

山連 錢八分

南查炭 錢二

煮兩大茶杯。分三四次服。

糞後瘀血未淨。舌白滑苔。脈滑甚。廿八日

豬苓 錢三

竈中黃土 錢五

地榆 錢二

澤瀉 錢二

蒼朮炭 錢二

歸鬚 錢二

半夏 錢二

雲苓皮 錢三

丹皮 錢二

蟬退 錢二

黃芩炭 錢一

煮三杯。分三次服。

糞後之血已無。惟舌厚白苔。脈洪滑。小便白濁。濕氣尙重。廿九日

雲苓 錢三

生薏仁 錢三

黃芩 錢二

豬苓 錢三

蒼朮炭 錢一

歸鬚 錢一

澤瀉 錢三

晚蠶沙 錢二

半夏 錢五分

蟬退 錢一

五穀蟲 錢一

煮三杯。分三次服。

於前方內加竈中黃土五錢。三十日

紅未見。小便白濁仍然。脈洪大。初一日

竈中黃土 錢五

雲苓皮 錢三

豬苓 錢二

晚蠶沙 錢三

飛淨滑石 錢三

澤瀉 錢二

生薏苡仁 錢三

五穀蟲 錢五分

白通草 錢一

南蒼朮炭 錢五分

黃柏炭 錢一

煮三小杯。分三四次服。

包女 六個月

周身溼毒。又加痘瘡。舌苔黃厚。脈洪數之至。又赤爛風弦。甫經

六月之孩。船小載重。恐難勝任。勉與辛涼解肌敗毒。九月廿八日

連翹三錢 茯苓皮三錢 木通一錢 銀花三錢 茶菊花一錢五分

桑葉一錢五分 苦梗一錢 人中黃八分 蘆根三錢 澤瀉一錢

煮兩茶杯。每服半酒杯。

險痘三天。溼毒已多。痘亦不少。舌苔黃厚滿佈。船小載重。恐難勝任。廿九日

銀花三錢 冬桑葉三錢 連翹五錢 苦桔梗五錢 紫花地丁三錢

茶菊花二錢 黃芩一錢 牛蒡子一錢 人中黃一錢 丹皮二錢

煮兩茶杯。每服半酒杯。服至明早令完。

於前方內加細生地二錢。三十日

險痘四天。色太豔。血熱也。眼未封。大者頂陷。氣亦不旺。外有溼瘡。餘有原

案。與犀角地黃湯法。十月初一日

犀角一錢五分 細生地五錢 炒白芍一錢五分 銀花三錢 茶菊花二錢

黃芩八分 連翹二錢 炙甘草一錢 丹皮二錢 煮兩茶杯。分四五

次服。

險痘五天。未周歲之孩。只有七天限期。便要收功。五天後半日。即係三歲以後之七日。忽爾泄瀉七八次。大非所宜。急與補托透絡。初二日

雲苓塊三錢

澤瀉一錢五分

肉果霜一錢五分

炒於朮二錢

白芷一錢五分

廣皮炭一錢

廣木香一錢

木通八分

煮兩茶杯。頻頻服。以瀉止爲度。

險痘六天。業已上漿。但因泄瀉之後。頂平有發癢之象。急宜實表內托。初三日

日

生綿薯五錢

半夏二錢

肉果霜一錢五分

雲苓塊連皮三錢

防風二錢

廣木香八分

炒於朮二錢

白芷三錢

煮兩茶杯。分四五次服。

險痘七天。漿未足而泄瀉發癢。喉啞聲嘶。必得瀉止漿足方妙。初四日

生綿薯五錢

於朮炒三錢

薑半夏三錢

茯苓塊連皮三錢

防風二錢

肉果霜一錢五分

苦桔梗三錢

白芷二錢

廣皮炭二錢

廣木香一錢五分

煮三杯。自服一半。乳母服一半。

入天。於前方內肉果霜加至二錢。仍服一帖。初五日

九天。業已收痂。溼瘡所生之痘。尚有餘漿。大便仍多。猶有癢象。初六日

生綿薯三錢

半夏三錢

肉果霜一錢

炒於朮二錢

防風二錢

廣木香一錢

雲苓塊三錢

白芷二錢

五穀蟲二錢

苦桔梗二錢

煮兩大杯。頻頻服。

十天業已結痂。大便猶漉。而頻與實脾利水法。初七日

雲苓塊三錢

於朮二錢

肉果霜去淨油一錢

穀精草三錢

薏仁五錢

五穀蟲五錢

廣木香一錢

煮兩大杯。緩緩服。服至明日令完

於前方內去半夏。減肉果霜四分。初八日

十二天大便漉。初九日

穀精草三錢

雲苓二錢

五穀蟲五分

肉果霜一錢

於朮炒二錢

廣皮炭五分

廣木香一錢

蟬退去頭足一錢

煮兩杯。分二三次服。

十三天痘前本溼瘡赤爛風弦。溼瘡隨痘已落。惟眼邊赤爛。雖較前勢減

而未愈。微有羞明之象。初十日

雲苓皮三錢

連翹不去心一錢

草決明二錢

生薏仁三錢

銀花一錢

冬桑葉一錢

穀精草二錢

澤瀉二錢

十四天於前方內加茶菊花一錢。十一日

十五天眼皮之腫較昨已消其半。眼亦能開。仍用辛涼以清餘熱。十二日

雲苓皮三錢

連翹五分一錢

草決明二錢

生薏仁三錢

銀花一錢五分

五穀蟲一錢

穀精草二錢

桑葉一錢

煮兩杯。分數次服。以腫消為度。

包二歲身熱瘰癧。脈數自汗。耳冷脚冷。脣冷。有風溫欲痘之象。大便頗仍。亦

風邪也。辛甘化風為宜。九月初二日

連翹一錢五分

苦桔梗一錢

丹皮五分

銀花一錢五分

鉤藤鈎一錢後入

甘草生五分

麥冬八分

茶菊花一錢

瘰癧之後。業已見點。泄瀉嘔惡太重。裏症重於表症。脈滑甚。初三日

連翹三錢

苦桔梗二錢

黃芩二錢

銀花三錢

粉丹皮三錢

牡蠣五錢

煮兩杯。頻頻服。

二天。根鬆色白。泄瀉咳嗽。乳食有不化之形。初起之經表雖熱。現在熱已

退。裏虛可知。雖不敢峻補。亦不可再涼。初四日

雲苓塊連皮三錢

廣木香一錢

藏紅花一錢

於朮炭三錢

當歸鬚一錢

廣皮炭一錢

薑半夏二錢

煮三杯。分三次服。

三天。色白根鬆。皮薄之虛寒痘。昨日兩天。即用兩補氣血。今日色稍紅。泄

瀉咳嗽大減。但皮薄太甚。恐表虛癢塌。與昨日方內再加實表。初五日

生綿蒼三錢

防風二錢

藏紅花一錢

扶苓塊三錢

歸身一錢五分

廣木香一錢五分

於朮炭三錢

廣皮二錢

桂圓肉二錢

薑半夏二錢

四天。面色稍紅。周身尚白。仍宜溫托補血。初六日

生綿著五錢

半夏三錢

藏紅花三錢

雲苓塊三錢

防風二錢

肉果霜一錢

焦於朮二錢

白芷二錢

炒廣皮一錢五分

廣木香一錢五分

歸身二錢

桂圓肉二錢

煮三杯。分四次服。

五天。下半已紅。頭面行漿。於前方內去紅花。減肉果霜七分。初七日

六天。漿已足。但皮薄易破。看守勿懈為要。初八日

生綿著三錢

半夏二錢

廣木香一錢五分

扶苓塊三錢

防風二錢

炙甘草五分

焦於朮二錢

煮兩小杯。分四次服。

七天。業已收痂。大便溏。與實脾利水。兼之補氣。初九日

焦於朮二錢

雲苓三錢

五穀蟲一錢

廣皮炭一錢

薏仁三錢

煮一大杯。分二次服。

八天。大便仍溏。與實脾利水。兼之化氣。初十日

雲苓塊三錢

薏仁三錢

五穀蟲二錢

焦於朮三錢



蟬退去頭足一錢 廣皮炭一錢 切忌發物生冷。

九天於前方內加晚蠶沙二錢。十一日  
十天實脾利水。十二日

雲苓塊三錢 蟬退去頭足一錢 晚蠶沙一錢 焦於朮二錢

通草七分 五穀蟲一錢 生薏仁三錢

弈四歲痘瘡見點一日。面色青暗。陽部白。陰部紅。額似輕而白。頰甚重而紅。

兼之三五成羣。遊蠶嬉窠不少。實係逆症。勉與活血擺毒。鬆肌透絡。令其

易出再商。九月廿六日

紫花地丁二錢 連翹五錢 藏紅花三錢 苦桔梗五錢

銀花五錢 荆芥穗三錢 牛蒡子三錢 薄荷二錢

南查炭三錢 桃仁泥三錢 歸尾三錢 人中黃二錢

煮成三茶杯。和入猪尾膏。加入大梅冰片一分。每次服一黃酒杯。愈多

愈妙。

逆痘二天。陽部不發。陰部稍有起色。陽部之陽額也。見點若有若無。陽部之陰頰也。甚為顯透。其為毒鬱不發可知。周身根鬆皮薄扁闊色暗。其為氣虛又可知矣。現當生發之際。金擺毒活血鬆肌。皆外道也。扶過六天。至

七天能用補托方妙。廿七日

紫花地丁三錢

銀花五錢

荊芥穗三錢

苦桔梗三錢

白芷二錢

南查炭三錢

南紅花三錢

防風二錢

人中黃二錢

桃仁泥三錢

歸鬚三錢

煮三杯。分四次服。仍和豬尾膏。加入梅冰片五釐。

三天逆痘有漸順之機。夜臥安靜。飲食尙可。是其佳處。但攢簇太多。頂平根鬆。扁闊不起。今日議減敗毒。加以提頂。令其起脹。預護將來之虛。廿八日

連翹二錢

苦桔梗三錢

紅花三錢

芥穗三錢

南查炭三錢

川芎一錢

全歸三錢

人中黃一錢五分

煮三杯。加入豬尾膏。頻頻服。

四天漸有起色。但根鬆頂平。扁闊太多。必得鼓立方妙。廿九日

銀花五錢

苦桔梗三錢

紅花三錢

連翹不去心三錢

穿山甲炒一錢五分

全歸二錢

防風二錢

廣木香八分

川芎八分

白芷三錢

人中黃二錢

廣皮炒炭一錢

煮三杯。分三次服。

五天雖已起脹。究竟頂平根鬆。顏色灰白。水泡亦多。大便頻而澹。口渴。且

與提頂敗毒三十日

銀花五錢

苦桔梗三錢

南紅花二錢

連翹三錢

穿山甲二錢

白芷三錢

防風二錢

人中黃二錢

廣皮炒炭一錢五分

煮三茶杯。頻頻緩服。服至明日午前令完。

六天正在行漿之際。大便溏泄。睡臥安靜。痘勢雖未塌陷。較昨見改觀。顏色雖未灰白而暗淡。根鬆頂陷。兼有縐紋。正合大虛少毒之象。急與木香

散法令泄止方妙。十月初一日

生綿著五錢

人參一錢

肉果霜去淨油三錢

雲苓塊五錢

防風三錢

訶子肉二錢

炒於朮三錢

白芷三錢

廣木香三錢

薑半夏三錢

廣皮三錢

炙甘草三錢

濃煎三大茶杯。不時頻服。

汪七歲痘三天。攢簇四五處。雖不過多。究竟毒過。與擺毒鬆肌為妥。但痘形

扁闊。不聳氣虛之苗。扶過七朝。必須補托。方好上漿。丁亥正月初四日

紫花地丁二錢

銀花五錢

南紅花二錢

苦桔梗三錢

連翹三錢

生甘草一錢

牛蒡子三錢

芥穗二錢

豬尾膏三錢

南查炭二錢

全歸二錢

四天痘已佈齊。神氣亦清。無煩躁之象。脣舌不絳。是其佳處。但額上色淡。與面頤四肢亦過淡。形勢間有扁闊氣虛之徵。今日大便已行。不乾。火毒有限。辛涼只須輕用。七日後必須補托。初五日

連翹三錢

苦桔梗三錢

川芎四錢

銀花一錢五分

南紅花三錢

全歸二錢

芥穗一錢

生甘草一錢

天虫三錢

煮二小杯。分三次服。

五天形間扁闊。而色鮮明。已有起脹之勢。惟足微冷。氣虛之徵。七朝必須補托。方可漿足。初六日

連翹三錢

苦桔梗三錢

白芷二錢

銀花三錢

南紅花二錢

甘草二錢

防風二錢

炒廣皮二錢

煮兩杯。分二次服。明日如再便澹。可加廣木香。

六天。於前方內銀花甘草俱減至一錢五分。連翹減至二錢。加廣木香二

錢。初七日

七天。頭面雖有行漿之勢。但色稍暗而足冷。古謂頭溫足冷。便作虛看。議

溫托法以助其漿。初八日

人參一錢

生綿薯六錢

白芷二錢

桂枝五分

廣木香二錢 廣皮三錢 防風二錢 炙甘草一錢五分

煮三杯。分三次服。

八天。漿未足而大便溏。加宣絡塞便。即於前方內加

扶苓三錢 肉果霜二錢 訶子肉二錢 於朮炒炭一錢五分

九天。頭面業已回。痲腿足漿尙未足。雖溫而不熱。猶宜輕輕托之。初十日

人參八分 生綿著三錢 白芷一錢五分 於朮炒二錢

肉果霜一錢五分 廣皮一錢五分 雲苓三錢 廣木香一錢

甘草炙一錢 防風一錢 煮兩小杯。分三次服。

十天。業已收痲。足溫。大便乾而脣赤。與辛涼助結痲。兼解餘毒。十一日

連翹三錢 五穀蟲三錢 麥冬不去心三錢 銀花二錢

晚蠶沙二錢 甘草一錢 扶苓三錢

十一天。唇赤較昨已退。大便乾。去扶苓。十二日

汪三歲見點即多攢簇。熱重可知。且與辛涼擺毒解肌。令其易出。如明日攢

簇太多。再攻未遲。戊子正月廿六日

紫花地丁三錢 連翹三錢 荆芥穗一錢五分 苦桔梗三錢

銀花三錢 冬桑葉三錢 牛蒡子三錢 薄荷一錢

人中黃錢一 猪尾膏三匙加梅冰片三釐 煮二小杯。分三次服。明日午前令完。

一。二天。攢簇太多。必須擺毒鬆肌方妙。廿七日

紫花地丁一錢五分 連翹三錢 南查肉炒三錢 苦桔梗三錢

銀花三錢 歸橫鬚二錢 牛蒡子三錢 芥穗二錢

人中黃一錢 蘆根四錢 猪尾膏三匙加梅冰四釐

二。三天。色重。大便乾燥。小便短而白濁。溼重可知。不可用大黃。廿八日

細生地三錢 紫花地丁二錢 葶藶三錢 連翹三錢

苦桔梗三錢 丹皮三錢 銀花三錢 牛蒡子三錢

全歸一錢五分 元參二錢 人中黃一錢 煮二小杯。分三次服。

四。天。色豔。大便微澹。小便已長。頂未全起。於前方內去潤下。稍加提頂。十二日

日九

細生地三錢 苦桔梗三錢 防風一錢 白芍炒二錢

紫花地丁一錢五分 白芷一錢 連翹三錢 人中黃三錢

丹皮三錢 銀花三錢 煮二小杯。分三四次服。

五天。大便澹。小便白濁。三十日

連翹三錢 雲苓塊三錢 白芷二錢 銀花一錢五分

廣木香一錢五分 廣皮炒二錢 防風二錢 白茅根三錢

六天大便稀漉小便白濁二月初一日

雲苓塊三錢 澤瀉三錢 生薏仁三錢 於朮炭二錢

防風一錢五分 廣皮炭二錢 廣木香二錢 白芷一錢

煮二杯分二次服。

七天大便泄瀉於前方內去防風白芷澤瀉加肉果霜訶子初二日

多十個周歲以內身熱三日時時惡寒上令餘火太甚現在冬寒司令本

係寒熱交加之際於茲發痘最為氣分阻遏身面隱隱有點背腰尤顯先

宜辛涼達表使外感速清己丑十月廿二日

連翹一錢 苦桔梗一錢 橘紅一錢 銀花一錢五分 荆芥穗一錢五分

生薑三片 薄荷一錢 人中黃三分 蘆根一錢

二天神識安靜頭溫足冷大便稀漉形勢不振似乎虛寒一邊但面上顏

色較身上甚淡未為無毒氣虛不能送之外出耳總須順此機括方為無

慮姑與開提肺氣使易充長廿三日

苦桔梗一錢五分 銀花一錢五分 歸尾一錢 荆芥穗一錢 天蟲二錢

紅花一錢 人中黃五分 蟬退去頭足一錢 白芷一錢 雞冠血沖匙

重險痘三天。兩腮攢簇。面色淡於身。即係毒參陽位。身大小。形太弱。既氣虛而又毒重。此其所以棘手也。且與活血涼血敗毒擺毒。令其易出再商。

廿四日

紫花地丁 二錢

連翹 二錢

當歸尾 一錢

苦桔梗 二錢

銀花 二錢

荆芥穗 一錢

牛蒡子 一錢

犀角 五分

南紅花 一錢

丹皮 一錢

人中黃 一錢

豬尾膏 一大酒杯  
加冰片五厘

重險痘四天。按痘四日當齊。茲頭面與身較昨日頗長。但色太重。足心尙

未見點。爲可慮耳。舌苔老黃。毒不爲不重。猶宜敗毒涼血。廿五日

紫花地丁 二錢

犀角 五分

歸橫鬚 一錢

苦桔梗 二錢

連翹 二錢

南紅花 一錢

荆芥穗 五分

銀花 二錢

人中黃 一錢

丹皮 五分

廣皮炭 二錢

豬尾膏 一大酒杯  
生麝香三厘

五天。色漸淡。神清。大便溏。廿六日

於朮 炒一錢

雲苓塊 一錢

白芷 一錢

防風 一錢

廣木香 五分

廣皮 二錢

川芎 七分

高麗參 八分

煮一大茶杯。分三次服。

六天。色淡。便頻。與異功法。廿七日

雲苓塊 一錢

人參 一錢

肉果霜 一錢

炒於朮 一錢

白芷 一錢



廣橘皮一錢  
薑半夏一錢  
防風八分  
炙甘草五分  
廣木香一錢

生薑二片  
黑大棗一枚去核  
訶子肉八分  
煮一大茶杯。分三次服。

七天。正屈行漿之際。不宜四肢俱冷。急宜溫補。廿八日

雲苓塊一錢五分  
人參一錢  
訶子肉一錢  
炒於朮一錢  
白芷一錢

肉果霜一錢五分  
薑半夏一錢五分  
防風一錢  
公丁香五分  
廣木香一錢

廣皮一錢五分  
炙甘草八分  
濃煎一大茶杯半。分四次服。

入天。色白皮薄之孩。兩大陰必虛。易于泄瀉。當與實脾。廿九日

雲苓塊一錢五分  
人參一錢  
廣木香一錢  
炒於朮一錢  
廣皮一錢五分

炙甘草八分  
煮一大茶杯。分三四次服。

舒歲六喜痘三天。形小密碎。此毒火過甚。以歸宗法主之。然余素不諳此科。

仍須高明。己丑十月十一日

大黃一錢五分  
生梔子二錢  
厚樸一錢  
生地三錢  
小枳實一錢

知母一錢五分  
麥冬三錢  
炙甘草一錢  
蘆根三把  
元參二錢

煮一杯。分兩次服。此方文先生所定

四天。蟾窠遊蠶。是毒重也。足冷頂平。扁闊無輪。腹痛。是氣虛也。既毒重而

又氣虛。兩難兼顧。勉與敗毒鬆肌活血。十二日

連翹錢三 紫花地丁錢三 南山查炒炭 銀花錢三 苦桔梗錢三

全歸錢三 白芷錢二 大力子錢二 廣皮錢三 紅花錢三

人中黃一錢五分 蘆根錢三 皂針一錢五分 豬尾膏一酒杯加入麝香五厘研細

五天氣虛毒重之痘。昨與活血敗毒鬆肌。今日大有起色。兩足已溫。血色

已活。夢語似謔語。包絡中之熱也。以紫雪丹清之。十三日

苦桔梗錢三 紫花地丁錢三 白芷錢二 銀花錢五 大力子錢三

南山查錢二 連翹錢三 人中黃錢三 蘆根錢五 防風錢二

外紫雪丹一錢。分二次。溫開水送。

六天毒已漸化。夢語已除。大涼大熱之品。皆在所忌。於和中安表之中。稍

加托漿。十四日

銀花錢三 生綿薯錢三 廣皮錢三 防風錢三 薑半夏錢二

甘草錢一 白芷錢二 苦桔梗錢二 蘆根錢二 煮兩杯。分三次服。

七天痘已放肥。漿清色淡。須與漸次補托。必得漿濃滿足方妙。十五日

半夏錢三 生綿薯錢四 白芷錢三 全歸錢三

益智仁一錢五分 紅花錢一 防風錢三 炙甘草錢二

廣皮錢三 煮三杯。分三四次服。

八天業已行漿。但空殼居多。根猶有不紅者。稍用溫托。日十六

防風錢二 生綿薯錢五 神麴炒三錢 白芷錢二 薑半夏錢三

廣皮錢三 青皮錢二 炙甘草錢三 蘆根錢三

九天漿有漸足之勢。仍宜助漿。蓋未足九天。猶有空處也。日十七

生綿薯錢五 薑半夏錢三 白芷錢二 防風錢二 焦神麴錢三

廣皮錢二 青皮錢二 炙甘草錢三 糯米錢二

十天。此方缺。日十八

十一天。業已收痂。與辛涼化毒。兼清溼熱。日十九

銀花錢三 生薏仁錢四 甘草錢一 連翹錢二

穀精草錢三 蘆根錢三 五穀蟲錢三 麥冬不去心三錢

明女歲四 重險痘二天。攢簇細碎。頂平。謔語。色淡。既毒重而又氣虛。且與擺

毒鬆肌。己丑十月廿七日

苦桔梗錢三 連翹錢三 紅花錢三 南查炭錢五 銀花錢三

杏仁錢二 牛蒡子錢三 薄荷錢三 全歸錢二 人中黃一分

芥穗錢三 蘆根錢三 猪尾膏一酒杯加入麝香六厘研細沖 煮三杯。分四次服。

外紫雪丹二錢。分四包。每包五分。今日分服兩包。明日再服兩包。

重險痘三天大便閉毒遏不發與必勝湯法餘有原案廿八日

生大黃酒炒半黑五錢 銀花五錢 南紅花三錢 紫花地丁五錢 元參三錢

苦桔梗三錢 南山查五錢 歸尾二錢 牛蒡子二錢 桃仁泥三錢

天蟲二錢 人中黃一錢五分 猪尾膏一酒杯加入麝香六厘研細沖

煮四大茶杯分五六次服服至明日午刻令完

重險痘四天昨用大黃五錢大便未通竝小便全無脣腫渴甚仍用必勝

法兩解氣血之毒餘有原案廿九日

生石膏四兩先煎代水 元參五錢 桃仁泥三錢 銀花五錢 生大黃一兩酒炒半黑

苦桔梗三錢 紫花地丁五錢 歸尾三錢 牛蒡子三錢 猪尾膏一酒杯加入麝香六厘研細沖

天蟲三錢 人中黃二錢 煮四大茶杯分四次服

重險痘五天昨日用大黃石膏大便已暢周一晝夜小便止一次嗆咳肺

氣之熱可知形色較昨日頗覺起發頭面已有行漿之勢仍宜敗毒涼肺

護喉兼之提頂十一月初一日

元參五錢 生石膏二兩先煎代水 黃芩三錢 銀花五錢 紫花地丁三錢

紅花二錢 苦桔梗三錢 牛蒡子三錢 白芍二錢 防風二錢

人中黃二錢 皂針一錢 天蟲二錢 煮三大茶杯分三次服

六天業已行漿。頭面脊背甚可。四肢平頂稍覺灰白。似當補托。但痘太多。毒太重。身太熱。且與清毒護喉。明日七朝。再托未遲。寒涼似不可重耳。初二日

日

細生地三錢

苦桔梗三錢

銀花三錢

元參三錢

藏紅花三錢

皂針三錢

防風三錢

牛蒡子三錢

白芷三錢

天蟲三錢

人中黃二錢

黃芩二錢

七天漿行五六。腸鳴下氣。恐有泄瀉之患。急宜溫托。初二日

人參一錢

雲苓塊三錢

廣皮二錢

黃蓍六錢

薑半夏三錢

甘草二錢

於朮三錢

肉果霜三錢

生薑三片

白芷三錢

訶子肉三錢

大棗去核二枚

防風二錢

廣木香三錢

煮四杯。烤三杯。分

四五次服。

入天漿行至足。顏色鮮明。飽綻。可以成功。再照前方一帖。分八九兩朝。濃

煎緩緩服。初四日

十天業已結痂。惟脚腫。與實脾利水法。初六日

雲苓塊連皮三錢

銀花五錢

精穀草四錢

於白朮一錢五分

連翹三錢

五穀蟲三錢

生薏仁五錢

煮三杯。分二次服。

痘十一天。仍用前方。再服一帖。初七日

富使女十歲痘因溫毒而發。喉痛身熱。鼻衄嘔惡。苗出扁闊。根鬆多不可解。勉

與先清溫毒。己丑十月廿九日

生大黃酒炒半 黑六錢 苦桔梗錢五 芥穗錢三 連翹錢三 牛蒡子錢五

丹皮錢三 銀花錢三 人中黃錢三 射干錢三 元參錢五

側柏炭錢三 天蟲錢三 薄荷錢三 白茅根錢五 馬勃錢五分

煮六杯。分六次服。服至明日午刻令完。

重險痘二天。苗暗紫而根扁闊。昨用大黃六錢。仍然大渴。便閉。先以敗毒

通腑涼血立法。十一月初一日

生石膏四兩先煎 煎代水 銀花錢五 荆芥穗錢五 生大黃酒炒半 黑一兩 桃仁錢五

紫草茸錢三 苦桔梗錢五 歸尾錢三 人中黃錢二 紫花地丁錢五

射干錢三 白茅根錢三 牛蒡子錢五 煮五大茶杯。分五次服。

重險痘三天。大便已見。喉痛甚。急清溫毒。初二日

紫花地丁錢五 銀花錢五 射干錢三 苦桔梗錢五 元參錢五

天蟲錢三 牛蒡子錢五 歸尾錢五 蟬退去頭足 二錢 人中黃錢五

芥穗錢三 馬勃錢一 白茅根錢三 煮五杯。分五次服。

重險痘四天王平根鬆色重喉痛且與敗毒提頂日

銀花錢五 紫花地丁錢五 天蟲錢三 連翹錢三

穿山甲錢二 白芷錢三 苦桔梗錢三 牛蒡子錢三

皂針錢三 全歸錢五分 人中黃錢一 煮三杯分三次服。

某男 色暗扁闊形體太弱氣虛之症以渴而煩躁故且與鬆肌擺毒丑己

十一月初一日

苦桔梗錢三 生石膏錢六 芥穗分八 連翹錢三

南查炭錢一 紅花分八 銀花錢二 人中黃錢一

蘆根錢三 知母錢炒一 煮二小杯分二次服。

重險痘二天既氣虛而又毒重泄瀉舌絳煩躁汗多勉與涼血擺毒須避

滑潤初二日

生石膏兩一 犀角錢三 凌霄花錢三 紫花地丁錢五

丹皮錢三 炒黃芩錢二 金銀花錢五 連翹錢三

人中黃錢五分 苦桔梗錢三 山連酒炒一錢 白茅根錢三

重險痘三天毒遏不發正看似少傍看甚多身半以下甚顯而赤頭面甚暗而平即係毒參陽位合之舌絳煩躁泄瀉勢非輕淺初三日

紫花地丁錢五

銀花錢五

凌霄花錢三

雲苓皮錢三

犀角錢三

炒山連錢一

苦桔梗錢三

丹皮錢三

人中黃錢一 五分

炒黃芩錢二

桑葉錢三

白茅根錢三

重險兼逆痘四天。毒參陽位。昨日大用涼血解毒。今日大有起色。頭面頗

長。但攢簇太多。根鬆頂平。毒重氣虛。雖當補托。然必清出地界。七日氣血

用事。再商。舌絳不渴。邪歸血分。故不用石膏而加甘潤。初四日

紫花地丁錢五

犀角錢三

金銀花錢五

細生地錢五

丹皮錢四

苦桔梗錢三

凌霄花錢三

麥冬錢三 不去心

人中黃錢二

桑葉錢三

白茅根錢三

豬尾膏一酒杯加入麝香五厘研細沖

重險痘五天。昨用涼血敗毒甘潤。今日津液頗回。痘亦充長。但平頂尚多。

大便頗溏。議於涼血敗毒之中。少加提頂。理脾去甘潤。扶過明日至七朝。

能用補托。可望有成。初五日

紫花地丁錢三

苦桔梗錢三

丹皮錢三

銀花錢三

雲苓皮錢三

白芷錢二

犀角錢三

廣木香錢一

皂針錢二

防風錢二

人中黃錢一

煮三杯。分三四次服。

痘六天。已有行漿之勢。大便仍頻。可少與補托。兼之實脾。初六日



人參五分 雲苓塊三錢 防風二錢 綿薯五錢 廣木香一錢

白芷二錢 於朮一錢五分 炙甘草二錢 煮三杯分三次服。

七天漿雖已行。但色淡皮薄。大便澹。氣虛之至。重用補托。漿雖不能十分滿足。必須入成方妙。男子故也。初七日

炙綿薯八錢 遼參二錢 廣木香二錢 雲苓塊三錢 於朮炒三錢

肉果霜三錢 薑半夏三錢 白芷三錢 炙甘草三錢 訶子肉煨三錢

廣皮三錢 濃煎四大茶杯。一時辰服半杯。

八天漿行五六。形勢鼓粒。而漿色不黃。微帶灰色。四肢空殼尙多。仍須重用溫托。成功在此一舉。初八日

炙綿薯兩一錢 人參三錢 肉果霜三錢 雲苓塊三錢 於朮炒三錢

訶子肉煨三錢 薑半夏三錢 白芷五錢 廣木香三錢 公丁香五分

廣皮五錢 炙甘草三錢 濃煎四杯分四次服。

九天漿未足而色灰。雖不咬牙。而微有寒戰。雖不泄瀉。而大便頻澹。與十四味異功散法。減其大者之分量可也。初九日

茯苓塊三錢 人參五錢 肉果霜研細三錢 薑半夏三錢

防風三錢 訶子肉三錢 白朮土炒三錢 白芷三錢

廣木香 三錢

熟附子 一錢

肉桂 一錢

炙甘草 二錢

公丁香 一錢五分

廣皮 三錢

煮三杯。分四五次服。

十天。漿雖不足。而灰色頗變。間有黃者。大便頻澹。仍舊虛寒之象。可憐仍

須補托。初十日

雲苓塊 三錢

人參 三錢

肉果霜 三錢

於朮 土炒三錢

白芷 三錢

訶子肉 煨三錢

廣木香 三錢

防風 二錢

炙甘草 二錢

薑半夏 三錢

廣皮 三錢

煮三大杯。烤二杯。分六次服。

十一天。業已收痂。漿未足。大便太滑。十四朝猶係險關。仍不得離補托收

瀋法。十一日

生薏仁 三錢

人參 一錢

肉果霜 五分

雲苓塊 一錢

於朮 一錢五分

煨訶子 一錢

薑半夏 二錢

廣皮 一分

炙甘草 一錢

廣木香 一錢

煮兩茶杯。分四次服。

十二天。仍照前方再服一帖。十二日

十三天。再服一帖。十三日

十四天。於前方內去人參肉果訶子雲苓。再服一帖。十四日

張氏 十七歲 重險痘二天。雁行扁闊。胸痞嘔惡。頭痛口渴。先解溫毒為要。丑己

十一月  
初三日

生石膏 四兩先煎代水

連翹 五錢

黃芩 三錢

苦桔梗 五錢

銀花 五錢

知母 三錢

薄荷 三錢

牛蒡子 五錢

蘆根 三錢

人中黃 二錢

芥穗 三錢

重險痘三天。昨因雁行扁闊。胸痞嘔惡。大用石膏。今日症退。形勢鼓粒。分  
顆原純正不合。前醫誤與發表。甫三日。癢不可解。喉痛。溫毒未盡。未可大  
食。初四日

元參 五錢

生石膏 二兩

黃芩 三錢

防風 三錢

苦桔梗 五錢

白芷 三錢

知母 二錢

牛蒡子 三錢

桑葉 三錢

天蟲 三錢

人中黃 二錢

煮三杯。分三次服。

重險痘四天。痘之形色頗佳。但溫毒之喉痛未止。又加性急動肝。則更痛  
矣。誤傷表氣之發癢。恐破損致傷。此其所以為險也。初五日

元參 五錢

烏犀角 三錢

射干 三錢

知母 五錢

苦桔梗 五錢

桑葉 三錢

防風 三錢

牛蒡子 五錢

蘆根 五錢

白芷 三錢

人中黃 二錢

煮三杯。分三次服。

五天喉痛減而未除。已有行漿之勢。但有二三成頂平者。少用托法。初六日

元 參 三錢

生綿薯 五錢

皂 針 五分

防 風 三錢

牛蒡子 三錢

蘆 根 三錢

白 芷 三錢

金銀花 三錢

六天。頭面漿已有七八。肢尚未足。大便未見。口乾。初七日

元 參 五錢

生綿薯 五錢

白 芷 三錢

麥 冬 不去心 四錢

次生地 四錢

蘆 根 三錢

防 風 三錢

金銀花 三錢

糯 米 一撮

七天。頭面漿足。口乾熱重。大便結。不必再為托漿。與甘潤法以配陽之有

餘。初八日

元 參 六錢

次生地 五錢

甘 草 二錢

麥 冬 不去心 四錢

黃芩炭 二錢

蘆 根 三錢

銀 花 三錢

八天。漿已足。眼未封。多淚不爽。防餘毒傷目。兼之辛涼結痂。初九日

元 參 五錢

穀精草 六錢

黃 芩 二錢

銀 花 三錢

五穀蟲 三錢

桑 葉 三錢

丹 皮 三錢

生甘草 一分

蘆 根 三錢

九天。辛涼結痂。目未封。兼清心膽兩經之餘毒。初十日

蘆 仁 五錢

穀精草 五錢

黃 芩 三錢

連 翹 三錢

茶菊花 三錢

丹 皮 三錢

銀 花 三錢

五穀蟲 三錢

桑 葉 三錢

十天。目已愈。有水泡未乾。脈已不洪數。與實脾利水。十一日

薏仁五錢

雲苓塊五錢

於朮炒二錢

連翹三錢

五穀蟲三錢

蘆根三錢

銀花三錢

煮三杯分三次服。

明女二個

身熱三天見點有發痘之機。微咳最忌發表恐虛表致癢。蓋痘

由少陰而發。至太陽之位而上漿結痂。以成全功。無辜誅伐太陽。是毀其

成功之地。且痘因溫熱之氣而發。又最忌發汗。與辛涼法。己丑十一月初三日

銀花三錢

苦桔梗三錢

芥穗一錢

連翹二錢

牛蒡子三錢

天蟲二錢

杏仁一錢五分

生甘草一錢

蘆根三錢

薄荷六分

煮兩茶杯分四次服。

逆痘二天。面色青白。身體羸瘦。見點似出不出。毒遏不發。呻吟晝夜。防悶。

咳嗽有汗。初四日

苦桔梗三錢

穿山甲三錢

芥穗二錢

銀花五錢

南查炭五錢

天蟲二錢

連翹三錢

牛蒡子三錢

地龍二錢

薄荷一錢

人中黃一錢

煮三杯分五六次服。

外紫雪丹二錢分四包。先服一包。晚間服一包。明晨再服一包。與湯藥

間服。

重險痘三天。面色稍轉。呻吟咳嗽俱減。身腰點亦明亮。惟頭面尚不顯彰。

毒遏不發之故。初五日

苦桔梗 錢三

穿山甲 錢二

川芎 錢五

銀花 錢五

全當歸 錢二

天蟲 錢三

薄荷 錢一

牛蒡子 錢三

地龍 錢二

芥穗 錢二

人中黃 錢一五分

重險痘四天。痘形起立。惟色淡。四肢與身不熱。不住哭叫。腹不和也。初六日

苦桔梗 錢三

白芷 錢二

南查炭 錢三

炒神麩 錢三

川芎 錢一

藏紅花 錢二

全當歸 錢五分

廣皮 錢二

人中黃 錢一

重險痘五天。已放肥者皆破損。可慮之至。四肢不熱。與溫托法。初七日

生綿耆 錢五

防風 錢二

廣木香 錢五分

薑半夏 錢三

白芷 錢二

炙甘草 錢二

藏紅花 錢三

廣皮 錢三

煮三小杯。分四次服。

重險痘六天。色暗頂平。身不熱。雖有行漿之勢。但清而不暢。須急與補托。

初八日

人參 錢一

生綿耆 錢六

紅花 錢三

半夏 錢二

廣木香 錢二

廣皮 錢三

防風 錢二

熟附子 分八

生薑 錢三

白芷 錢二

炙甘草 錢二

大棗 去核 二枚

煮三杯。烤成一杯。分三四次服。三更令完。

劉四歲三朝三五成羣之痘。且有疊錢一二三塊。豈善證哉。且與鬆肌達表。活

血擺毒。壬辰九月廿七日

苦桔梗一錢五分 連翹三錢 南山查二錢 全當歸一錢 銀花三錢

炒黃芩一錢 荆芥穗八分 薄荷六分 紫草茸一錢 牛蒡子一錢

殭蠶一錢 人中黃一錢五分 猪尾膏研入上上梅冰片五厘半酒杯 煮三小杯。分三次服。

四天。於原方內加生石膏一兩。生大黃酒炒五錢。廿八日

五天。色淡根鬆頂平。與敗毒活血提頂。於前方內加白芷二錢。防風二錢。

皂針二錢。紅花三錢。廿九日

七天。已有行漿之勢。但色淡。間有根鬆。一味托補。使漿行飽滿。諸毒隨漿

而泄。閏九月初一日

洋參炒二錢 生綿蒼二錢 白芷二錢 銀花三錢 藏紅花一錢

全歸一錢 防風二錢 炙甘草三錢 煮三杯。分三四次服。

九天。漿已足而口渴甚。火未退。與辛涼助結痂之用。初三日

連翹三錢 生石膏一兩 黃芩二錢 銀花三錢

細生地五錢 桑葉三錢 麥冬不去心三錢 生甘草一錢

煮三杯。分三次服。口渴止。去石膏。

十一天。痂已落而熱未退。與辛涼清熱。加納氣歸原法。初五日

次生地三錢 地骨皮三錢 黃芩二錢 銀花三錢 五穀蟲一錢五分

桑葉三錢 連翹二錢 生甘草一錢 煮三杯。分三次服。

孟三頭面腰間有粒。身熱防痘。宜辛涼。最忌發汗。壬辰十二日 月廿一日

連翹三錢 苦桔梗二錢 元參二錢 銀花三錢 牛蒡子三錢

芥穗一錢 薄荷一錢五分 南查炭二錢 甘草一錢 煮三杯。分三次服。

仍服原方一帖。廿二日

險痘二天。臉面獨重。根鬆頂平。地界不清。廿三日

紫花地丁三錢 連翹三錢 南山查三錢 細生地三錢 銀花三錢

粉丹皮三錢 苦桔梗二錢 天蟲二錢 荆芥穗一錢五分 牛蒡子二錢

蘆根三錢 人中黃一錢五分 豬尾膏半酒杯加入 梅冰片三厘 煮三杯。分三次服。

險痘三天。臉面之板滯已化。活潤不合。兩腿鼠跡。不大便。須微攻之。廿四日

紫花地丁四錢 苦桔梗三錢 銀花五錢 生大黃三錢 連翹三錢

荆芥穗二錢 牛蒡子三錢 天蟲二錢 人中黃二錢 豬尾膏一酒杯加入 梅冰片四厘

煮三杯。分三次服。

重險痘四天。頭面根鬆頂平。背與兩腿蟻窠鼠跡太多。有殼薄漿清之虞。



雖不大便。不敢峻攻。以有疔痕故也。且與提頂拔毒。廿五

紫花地丁錢五 苦桔梗錢三 白芷錢二 牛蒡子錢三 銀花錢五

皂針錢一 白茅根錢二 連翹錢三 天蟲錢三 人中黃錢二

防風錢二 蘆根錢三 猪尾膏一酒杯加入  
梅冰片五厘 煮三杯。分三次服。

險痘五天。昨用提頂。今日頂起者大半。根亦漸緊。業有行漿之勢。大便昨日已通。茲與領清氣以行漿。廿六

連翹錢三 苦桔梗錢三 丹皮錢二 銀花錢三 牛蒡子錢三

白芷錢二 防風錢二 人中黃錢五分 天蟲錢二 橘皮錢二

白茅根錢三 蘆根錢三 煮三杯。分三次服。

痘六天。業已氣血用事之際。當與托漿。廿七

銀花錢三 生綿著錢五 白芷錢二 防風錢二 白茅根錢三

蘆根錢三 丹皮錢二 炙甘草錢五分 煮三小杯。分三次服。

痘七天。仍須托漿。廿八

生綿著錢五 銀花錢三 白芷錢三 細生地錢五

防風錢三 甘草錢五分 白茅根錢五 煮三小杯。分三次服。

痘八天。漿不甚足。仍須托之。於原方內去生地銀花白茅根。加人參橘皮。

廿九日

痘九天。與辛涼結痂。於原方內加五穀蟲。穀精草。三十日

福女三歲身熱色絳。譫語癲狂。先與紫雪丹二錢。分二次服。以開心包。壬辰十月廿七日

早七日

重險痘一天。心經報痘。譫語癲狂。得香開少定。其見點已有連珠之形。恐將來攢簇必多。唇舌色絳。心火太急。陽亢不寐。又恐入九朝癘場。急宜預防。或可避也。廿七日午

暹羅犀角錢五 銀花錢五 桃仁泥錢三 連翹錢三 紫花地丁錢五

荆芥穗錢三 細生地錢五 丹皮錢三 苦桔梗錢三 凌霄花錢三

薄荷錢一 歸橫鬚錢一 川連錢五分 人中黃錢二 豬尾膏一酒杯加入梅冰片五厘

煮三大茶杯。分五六次服。一帖後得寐。

神識不清。仍服紫雪丹一錢。廿七日

照原方再服一帖。廿八日

重險逆痘三天。連珠雁行太多。急宜擺毒。色重宜涼血。便溏宜堅陰。廿九日

暹羅犀角錢四 銀花錢五 苦桔梗錢三 連翹錢五 紫花地丁錢五

凌霄花錢三 細生地錢三 川連酒炒二錢 牛蒡子錢三 豬尾膏一酒杯研入梅冰片五厘

天 蟲二錢 人中黃二錢 煮三杯分三次服。

照原方一帖。分二日服。三十日

痘六天。將至氣血用事。業已行漿。變逆為順。是其佳處。但頭面雖起。遍身

色白。火反不足。與溫托法。癸巳正月 初二日

銀 花三錢 生黃耆五錢 白 芷三錢 防 風三錢

炙甘草三錢 橘 皮五錢 煮三杯分三次服。

九天。頂下已有結痂之勢。大便漉而頻泄。與實脾利水以收痂。少加敗毒。  
初四日

生薏仁五錢 銀 花三錢 穀精草三錢 雲苓塊三錢

蘆 根三錢 五穀蟲三錢 於朮炭二錢 煮三杯分三次服。三帖。

痲 太陽所至為痲

溫 甫六十日之幼孩。痲已廿餘日。現在脈不數。額上涼汗。竝無外感可

知。乃雜藥亂投。致傷脾胃。故乳食有不化之形。恐成柔痲。俗所謂慢慢脾風。

識護中焦。乃實土制風法。又肝苦急。急食甘以緩之之義也。癸亥閏二月廿九日

生薏仁五錢 肉 果一錢 明天麻三錢 扶苓塊五錢 乾 薑二錢

廣木香八分 焦於朮三錢 甘 草三錢 煨生薑片一錢

甘瀾水五茶杯。煮成兩茶杯。小人服十之一二。乳母服十之八九。渣再煮一茶杯。服如前法。

赤子不赤而刮白兼青。脈遲涼汗。舌苔白滑而厚。食物不化。洞泄者必中寒。按瘧必因於溼。古所謂柔瘧是也。議從中治。經謂有者求之。無者求之。此症全無風火之象。純然虛寒。乳中之溼不化。土愈虛則肝中內風愈動。若不崇土。而惟肝是求。恐日見窮促矣。三月初一日

生於朮錢一

人參分四

明天麻錢一

焦白芍錢一

肉果煨五分

生薏仁錢一

廣木香分五

甘草錢一

廣皮炭分三

風溼相搏。有汗為柔瘧。形若反弓者。病在太陽。俯視目珠向下者。病在陽明。以陽明為目下綱也。今久病為雜藥困傷脾胃。大便泄。乳食不化。為溼多風少。瘧時俯視。多為病在陽明。故此症以脾胃為主。議補中益氣法。溼下行。內用風藥。領邪外出。初二日

人參分三

茯苓塊錢三

山藥錢一

桂枝分二

甘草炙五分

焦白芍錢二

葛根錢二

白朮錢一

生薏仁錢五分

寒溼柔瘧。昨用升陽益氣法。從陽明提出太陽。茲精神倍昔。顏色生動。舌上白苔化淨。大便已實。甚為可喜。但瘧家有灸瘡者難治。初二日

人參分三

茯苓塊錢一

薏仁錢一

於朮錢一

嫩桂枝分三

葛根分二

白芍錢一

廣皮炭分二

甘草分五

蓮子三粒去心不去皮打碎

痙家自汗。有灸瘡者難治。刻下且保住脾胃。從脾胃中土以條達四肢。是久痙一定之至理。若鏤治其痙。是速之也。初四日

茯苓塊錢一

人參分三

訶子肉分五

焦於朮分八

桂枝分二

煨肉果分三

生薏仁錢一

廣皮分三

炙甘草分八

茅朮炭分六

痙家重為苦寒所傷。脾陽下陷。又有灸瘡。其痙萬萬不能即愈。議護中陽。勿致虛脫為要。非深讀錢仲陽陳文仲薛立齋葉天士之書者。不知此義。初五日

茯苓塊錢一

人參分四

訶子肉分六

炒於朮錢一

桂枝分三

廣皮炭分三

煨肉果分六

白芍錢二

炙甘草分五

廣木香分四

薏仁分五

濃煎

脈仍不數。大便猶溏。但舌苔微黃。神氣漸復。不似前虛寒太甚之象。宜退剛藥。少進柔藥。醫經謂上守神。粗守形。兵法謂見可而進。知難而退。此之謂也。初七日

人參分三

茯苓塊錢一

蓮子一錢

於朮錢一

炒白芍錢一

麥冬米炒 錢一

炙甘草七分

廣皮鹽水炒 黑四分

諸症漸退。神氣亦佳。但舌上復起重濁之白苔。乳溼之故。暫停參藥。且用

疏補法。初九日

茯苓塊錢一

焦神麩八分

生薏仁一錢五分

麥冬不去心 一錢

厚樸五分

廣皮炭五分

廣木香四分

蓮子整用 一錢

張<sup>十三歲</sup>脈沈細而弱。舌苔白滑。幼童體厚。純然溼邪致痘。一年有餘。乙酉六月初三日

生薏仁六錢

桂枝三錢

川椒炭三錢

雲苓皮五錢

廣皮三錢

白蔻仁一錢

蒼朮炭三錢

痘症發來漸稀。效不更方。初八日

脈至沈至細至緩。舌白滑甚。溼氣太重。故效而不愈。於前方加劫溼而通

補脾陽之草果。調和營衛之桂枝。白芍甘草。五帖。十六日

痘症。脈沈細至緩。舌白滑甚。溼氣太重。與溫淡法。發來漸稀。未得除根。於

前法內去剛燥。加化痰。廿一日

半夏六錢

雲苓塊五錢

廣皮三錢

桂枝四錢

益智仁二錢

甘草炙 一錢

薏仁五錢

炒白芍三錢

薑汁沖三匙

服前方四帖已效。舌苔仍然白滑。六脈陽微。照前方再服四帖。廿五日

前方已服四帖。諸症皆安。惟痰尚多。再服四帖。廿九日

前方又服九帖。瘧症止發一次。甚輕。已不嘔吐。痰尚多。脈甚小。照前方再

服。六月初九日

### 瘧癘

陳十五歲病久陰傷已極。骨瘦如柴。又加卒然中暑中熱氣。舌絳芒刺。脣乾

液涸。無怪乎瘧厥神昏。十指蠕動。危險之至。以脈尚浮弦而扎。勉與一面

香開心包。一面大隊填陰。兼鹹以止厥法。先與紫雪丹二錢。涼開水和服。

共服六錢。乙丑閏六月廿五日

犀角五錢 羚羊角三錢

阿膠三錢 牡蠣五錢

神識未清。間有譫語。廿八日

犀角五錢 直生地八錢

生白芍五錢 麻仁三錢

邪少虛多。用復脈已當。但舌上黑苔未化。宿糞未見。兼加潤法。七月初一日

元參二兩 直生地八錢

麻仁五錢 犀角五錢

白芍五錢

炙甘草二錢

龜甲五錢

阿膠三錢

炙甘草六錢

麥冬不去心

龜甲六錢

炙甘草四錢

鱉甲五錢

麻仁二錢

麥冬不去心

冬不去心

生白芍六錢

麥冬不去心

阿膠三錢

冬不去心

細生地二錢

濃煎。緩緩服。

冬不去心

冬不去心

冬不去心

冬不去心

冬不去心

煮三碗。分三次服。

服前藥五帖。見宿糞若許。黑苔已化。但神識尙未十分清楚。用三甲復脈湯加犀角。卽於三甲復脈湯內加犀角四錢。初五日

神識仍未清楚。湯藥照前。間服牛黃丸三丸。初八日

陳三歲燥氣已化。火壯熱。舌黃脈數。癩癧而厥。法宜辛涼解肌。切忌發表。丑乙

九月十六日

銀花八錢 羚羊角三錢 黃芩二錢 連翹六錢 苦桔梗六錢

丹皮三錢 杏仁四錢 牛蒡子三錢 甘草二錢 薄荷二錢

共爲粗末。分五包。一時許服一包。蘆根湯煎去渣服。

燥氣化火。身壯熱。渴甚。於前方內去薄荷。羚羊角。牛蒡子。丹皮。加煨石膏。

生地。麥冬。炒知母。十七日

岳八個未及歲之兒。溫毒頭腫。既痊且厥。壯熱氣促。脈極數大。恐眞陰不。

勝陽邪。先以普濟消毒飲宣毒外出。必去升麻柴胡之直升少陽陽明者。

加犀角。羚羊角。瀉心。膽之熱。乙丑閏六月廿八日

連翹六錢 苦桔梗三錢 薄荷二錢 銀花六錢 牛蒡子六錢

芥穗二錢 元參五錢 板藍根二錢 天蟲三錢 馬勃三錢

人中黃二錢 共爲粗末。分八包。一時許服一包。外以鮮荷葉一張。鮮蘆



根一兩煎湯代水加犀角鎊四錢。羚羊角鎊四錢。另包不必為末。於前藥每包加犀角五分。羚羊角五分。同煎。

吳<sup>三歲</sup>辰刻以跌撲驚後瘕癰。至戌正始醒。醒後身大熱。口渴脈數。舌無苔。

用復脈湯六帖。熱退脈靜。又服二帖而安。六月初九日

尹<sup>十五歲</sup>卒中暑風瘕癰。口歪。四肢抽掣。頭微痛。與清少陽膽絡法。

羚羊角<sup>二錢</sup>

連翹<sup>二錢</sup>

粉丹皮<sup>一錢</sup>

苦桔梗<sup>一錢五分</sup>

銀花<sup>二錢</sup>

冬桑葉<sup>一錢</sup>

茶菊花<sup>二錢</sup>

薄荷<sup>八分</sup>

生甘草<sup>一錢</sup>

鉤藤<sup>一錢</sup>

五帖全愈。

百<sup>五歲</sup>痘後餘邪入少陽陽明之絡。但脣口與眼皮瘕癰。致飲食不能合收。每從口張時隨即吐出。四肢不掣。與清二經之絡法。

連翹<sup>連心二錢</sup>

細生地<sup>三錢</sup>

鉤藤<sup>一錢</sup>

銀花<sup>二錢</sup>

苦桔梗<sup>二錢</sup>

桑葉<sup>二錢</sup>

麥冬<sup>不去心三錢</sup>

茶菊花<sup>二錢</sup>

生甘草<sup>一錢</sup>

丹皮<sup>二錢</sup>

刺蒺藜<sup>一錢</sup>

先服湯藥數帖。後以三十帖作散。每日早中晚三次。各服二錢。服至半年方愈。

### 食積

金男三歲 幼孩手心熱。舌苔厚而濁。嘔吐。食積也。法當和胃而醒脾。宜降不  
宜升。乙酉七月十一日

藿香梗二錢 半 夏二錢 廣皮炭一錢 焦神麩一錢五分 厚 樸一錢五分

雞內金一錢 白豆蔻一分研三 薏 仁一分研二 煨生薑三小片

熱退脈平。以調理脾胃為主。十三日

茯苓塊三錢 半 夏一錢 白扁豆一錢 炒白朮二錢

山 藥炒一錢 廣皮炭六分 炒神麩一錢 厚 樸六分

泄久脾虛。將成滯下。廿三日

焦白芍一錢 扶 苓二錢 煨益智五分 廣木香八分 厚 樸二錢

雞內金二錢 焦神麩二錢 薏 仁三錢 廣皮炭一錢五分 黃芩炭八分

陶二歲 幼孩手心熱甚。舌微黃。身微熱。體瘦。神不足。防成疳疾。與疏補中焦

兼之消食。乙酉七月初一日

雲苓塊三錢 薏 仁三錢 廣皮炭一錢 炒神麩一錢 厚 樸八分

雞內金一錢 益智仁七分 煮三小杯。分三次服。三帖全愈。

孫九歲 疳疾已久。若不急講調理飲食。則勢不可為矣。用藥以疏補中焦立

法。丁亥七月廿五日

薑半夏錢三 雲苓連皮四錢 雞內金炒二錢 益智仁一錢五分 厚樸二錢

南查炭錢五分 廣木香錢一 廣皮炒炭二錢 煮三小杯分三次服

繼診脈大。浮取弦數。脾虛食滯。疴疾將成。大便頻仍。面腫腹大。與溫宣中

焦法。丁亥十月廿四日

雲苓皮錢三 薏仁錢四 益智仁五分 薑半夏錢三 神麴炒三錢

黃芩炭錢五分 白蔻仁錢一 廣皮炒炭二錢 煮三小杯分三次服 三帖。

大便後見血。乃小腸寒溼。加黃土湯法。於前方內加熟附子一錢。蒼朮炭

三錢。竈中黃土四兩。再服三帖。廿八日

### 殮泄

章男十一月十一日 泄久傷脾。恐成柔瘕。俗所謂慢脾風。議疏補中焦。甲申六月十三日

茯苓塊錢三 厚樸錢一 煨肉果錢一 炒薏仁錢三 蓮子連皮去心三錢

炒扁豆錢二 廣木香錢五分 芡實錢五分 廣皮炭錢八分

今日仍用通補而進之。十四日

茯苓塊錢二 人參錢五分 煨肉果錢一 炒薏仁錢二

半夏錢二 小茴香錢一 藿香梗錢八分 厚樸錢八分

焦范麴錢八分 廣木香錢七分 扁豆炒三錢 廣皮炭錢八分

疏補中焦業已見效仍不能外此法。日十六

扶苓塊三錢 人參五分 煨肉果一錢五分 薏苡仁炒三錢

於朮一錢 炒扁豆三錢 藿香梗八分 半夏二錢

廣皮炭八分 廣木香八分 厚樸八分

神氣聲音稍健皮熱亦覺和平大有起色但積虛非旦晚可充。日十七

扶苓塊三錢 人參五分 肉果霜一錢五分 淮山藥一錢五分 半夏二錢

炒扁豆二錢 廣木香八分 蓮子二錢 廣皮炭一錢五分

舌有黃苔小便色黃微有積皆脾虛不運之故今日且暫停參藥加宣通

法。日十八

扶苓塊三錢 於朮一錢 白蔻仁五分 生薏仁三錢

半夏炒二錢 雞內金一錢 煨肉果一錢 厚樸一錢

廣皮炭八分 廣木香七分 蓮子去心二錢

大便有不化之形思乳食為血肉有情應於疏補之中加消血肉積滯者。

日十九

扶苓塊三錢 薏仁三錢 白蔻仁三分 煨肉果一錢 厚樸一錢五分

雞內金炒一錢 南查炭一錢 神麩八分 廣皮炭一錢 廣木香七分

脾虛火衰則食物有不化之形。肝腎與衝脈伏寒。怒甚則疝痛。二十

製茅朮錢一 扶苓錢一 煨肉果一錢五分 小茴香炒黑二錢

薏仁錢三 白薏仁錢五分 南查炭一錢五分 烏藥八分

廣皮炭八分 廣木香錢一 青皮六分

通補中下。廿一日

茯苓塊錢三 人參三分 煨肉果錢一 薏仁五分 小茴香炒黑一錢五分

白薏仁五分 廣木香六分 蒼朮製八分 南查炭八分

張男八個月泄瀉四五日。暑邪深入下焦。頭熱如火。手冷如冰。謂之暑厥。羸瘦難堪。脈遲緊。未必得愈。姑立方以救之。先與紫雪丹五分。作三次服。

桂枝木錢一 猪苓錢二 製蒼朮錢一 茯苓塊錢二

澤瀉錢一 廣皮炭七分 廣木香七分 扁豆錢一

又略。略有轉機。然終可畏也。

薏仁錢三 茅朮炭錢一 半夏五分 猪苓錢二 廣木香八分

厚樸六分 澤瀉錢一 炒扁豆五分 廣皮五分

孟十五歲伏暑泄瀉。加以停食。欲瀉腹痛。瀉後痛減。防成滯下。與五苓散加

消食。脈弦細而緩。乙酉八月初六日

雲苓皮 錢五

桂枝 錢三

南查炭 錢二

蒼朮炭 錢三

猪苓 錢三

小枳實 錢二

炒神麴 錢四

澤瀉 錢三

廣皮炭 錢四

川椒炭 錢二

一月後覆診。病已大愈。善後方與調理脾胃。

咳嗽

郭男 八歲

咳而嘔。胃咳也。痰涎湧塞。喘滿氣短。癸亥七月十一日

半夏 錢三

茯苓塊 錢三

薏仁 錢三

杏仁 錢二

小枳實 錢一

陳皮 錢一

蘇梗 錢二

藿香梗 錢一

生薑 錢二

即於前方內去藿香梗蘇梗。加半夏一二錢。苦葶藶一錢五分。蘇子二錢。再

服一帖。十八日

小兒脾虛。溼重胃咳。二十日

茯苓塊 錢三

半夏 錢六

焦神麴 錢二

生薏仁 錢五

杏仁 錢三

蘇子霜 錢一  
五分

旋覆花 包三  
錢三

扁豆 錢三

小枳實 錢一  
五分

生薑汁 每次沖  
三小匙

即於前方內去焦神麴。加杏仁二錢。蘇子霜一錢五分。廣皮三錢。服十帖。

廿一日

吳 三五八歲

上三幼孩。連咳數十聲不止。八歲者且嘔。與千金葶藶湯。加苦

葶藶子三錢。有二帖愈者。有三四帖愈者。第二四帖減葶藶子之半。甚嘔

者加白茅根五錢。

文<sup>四</sup> 幼孩嗆咳數十日不止。百藥不效。用千金葦莖湯加苦葶廔子。二帖

而愈。

周女<sup>十</sup> 春風嗆咳。醫用麻黃向外發。又用訶子白果百合向內收。以致嗆

不可解。吐出者皆血沫。用金沸草湯。三帖而愈。

劉<sup>十七</sup> 三月間春溫嗆咳見血。現在六脈弦細。五更丑寅卯時單聲咳嗽。

甚謂之木扣金鳴。風本生於木也。議辛甘化風。甘涼柔木。<sup>乙酉五月廿四日</sup>

連 翹<sup>三錢</sup>

細生地<sup>三錢</sup>

薄 荷<sup>一錢</sup>

銀 花<sup>二錢</sup>

苦 桔 梗<sup>三錢</sup>

桑 葉<sup>三錢</sup>

天 冬<sup>一錢</sup>

茶 菊 花<sup>三錢</sup>

甘 草<sup>二錢</sup>

麥 冬<sup>三錢</sup>

鮮 蘆 根<sup>三錢</sup>

咳嗽減。食加。脈猶洪數。左大於右。效不更方。再服四五帖。<sup>廿八日</sup>

木扣金鳴。與柔肝清肺已效。左脈洪數已減。於前方去氣分辛藥。加甘潤。

六月初二日

沙 參<sup>三錢</sup>

麥 冬<sup>三錢</sup>

冰 糖<sup>三錢</sup>

玉 竹<sup>三錢</sup>

李女<sup>四</sup> 風溫夾痰飲喘咳壯熱太甚。勢甚危急。勉與宣肺絡清肺熱法。<sup>己丑</sup>

二月初十日

生石膏末二兩

杏仁五錢

蘆根五錢

苦葶藶子三錢

黃芩炒三錢

煮三杯分三次服

溫熱夾痰飲喘咳十二日

生石膏二錢

杏仁四錢

茯苓皮三錢

蘆根五錢

冬瓜仁三錢

苦葶藶炒研一錢五分

煮三小杯分三次服服此方一二帖而燒退

暑溫

史男七歲右脈洪大無倫暑傷手太陰有逆傳心包之勢喘渴太甚煩躁不

寧時有譫語身熱且嘔議兩清心營肺衛之熱癸亥六月十二日

連翹連心一錢

生石膏三錢

厚樸一錢

銀花二錢

杏仁泥二錢

川連一錢

知母一錢

藿香梗一錢

竹葉一錢

丹皮一錢

生甘草八分

日一帖

諸症俱減熱已退但右脈仍洪舌黃而滑嘔未盡除十三日

飛滑石一錢

連翹五錢

川黃連一錢

杏仁泥一錢五分

銀花一錢五分

生甘草八分

生薏仁二錢

葦根三錢

荷葉邊二錢

炒知母八分

一二帖



與男歲二暑溼傷脾。暮夜不安。小兒脈當數而反不數。且少腹以下常腫痛。肝腎亦復虛寒。沉面色青黃。舌苔白。手心時熱。調理乳食要緊。防成疳疾。議腑以通為補。食非溫不化例。癸亥七月初二日

生薏仁二錢

半夏炒一錢五分

小枳實八分

杏仁泥一錢五分

厚樸一錢五分

白蔻仁四分

焦神麴一錢五分

扁豆炒一錢

廣皮炭八分

小茴香炒一錢

生薑煨三小片

雞內金一錢

四帖

前證已愈。惟脾尚虛弱。以疏補中焦為主。初六日

田歲十四暑溫誤下。寒涼太多。洞泄之後。關闌不藏。隨食隨便。完穀絲毫不

化。脈弦。與桃花湯改粥法。

人參 赤石脂末 乾薑

甘草炙 禹餘糧 粳米

先以人參甘草乾薑三味煎去渣。湯煮粥成。然後和入赤石脂禹餘糧末。愈後補脾陽而大健。

伏暑

周歲五本係伏暑。誤以為風寒。挾食。發表消導。致邪氣深入下焦血分。夜熱

早涼。與前厥痺瘧相似。食減脈大。汗多便結。先與救陽明之陰。

元參五錢 藜汁一酒杯 葶藶汁一酒杯 麥冬不去心 五錢

藕汁一酒杯 蘆根汁一酒杯 三帖

台氏十六歲 伏暑內發。新涼外加。誤與三陽經表藥。以致譫語神昏。前用芳

香開包絡。神識已清。惟舌苔白厚。腹脹。熱未盡除。與通宣三焦法。丁亥八月十二日

雲苓皮五錢 厚樸二錢 藿香梗三錢 飛滑石五錢

香附二錢 炒黃芩二錢 杏仁泥三錢 廣皮二錢

白蔻仁一錢 生薏仁五錢 煮二杯。分三次服。二帖。

伏暑新涼。今日新涼之邪已退。而伏暑之溼邪未除。以腹未全消。故知之。

十四日

雲苓皮五錢 薏仁五錢 大腹皮三錢 薑半夏三錢

豬苓三錢 黃芩炭二錢 杏仁泥二錢 厚樸三錢

白蔻仁一錢五分 藿香梗三錢 廣皮三錢 煮三杯。分三次服。二帖。