

大德重校聖濟總錄卷第二十二

傷寒門

中風傷寒

傷寒濕溫

傷寒時氣

傷寒疫癘

傷寒結胸



中風傷寒

論曰中風傷寒三陽三陰候各不同太陽中風其脉陽浮陰弱其證發熱自汗蓋陽浮熱自發陰弱汗自出嗇者惡寒漸漸惡風燭燭發熱鼻鳴乾嘔又曰太陽病發熱汗出脉緩者名爲中風不可燔炙若以火發其汗邪風爲火熱所劫血氣流溢榮衛失常兩陽熏灼其身發黃陽盛卽衄陰虛卽小便難陰陽俱虛竭則身體枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則讖言甚者至噦手足搔擾循衣摸牀其小便利者可治陽明中風卽陽明病能食爲中風其證曰苦咽乾腹

滿微熱惡寒脉浮若緊下之則腹滿小便難少陽中風
兩耳無聞目赤胸中滿而煩不可吐吐之則悸而驚太
陰中風四肢煩疼其脉陽微陰澀而長爲欲愈少陰中
風其脉陽微陰浮爲欲愈厥陰中風其脉微浮爲欲愈
不浮爲未愈凡此六經中風之病其狀雖異大抵其脉
皆浮經所謂浮爲風是也

治傷寒太陽中風脉浮緊發熱惡寒身痛不可屈伸而躁
煩者大青龍湯方

麻黃

去根節煮桂去
去沫陸兩皮

合不同甘草炙制各
貳兩

杏仁去皮尖雙
人與拾枚石膏如雞子
大碎

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生
薑一棗大拍碎棗二枚去核同煎至八分去滓溫服
取微汗汗後者以溫粉粉之煎至八分去滓溫服
治中風傷寒陽浮陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出
惡寒發熱鼻鳴乾嘔等疾桂枝湯方

桂枝

去毒

芍藥各分

甘草炙

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗
大拍碎棗二枚去核同煎至一盞去滓溫服不拘時
以汗爲度未汗更服仍作生薑稀粥投之以助藥力
治中風傷寒防風湯方

中防風祛風去濕 麥門冬去心焙 山芋

大黃剉末 夏桂去粗皮 白朮去心

人白附子剉 牛膝去苗酒浸切焙 半夏湯洗染編與

白朮和藥 芍藥切 木一狗脊 茯苓切 一清

黃耆剉 遠志去心 乾薑剉

甘草炙 附子剉

布一十五味搗篩 每服五錢匕水一盞半入生薑

一大拍碎 棗二枚去核 同煎至八分去滓 溫服空

心日午席臥 各一二對 去滓同煎至八分去滓 溫服

治中風傷寒頭痛四肢痠痛身體沉重石膏湯方入土

石膏去粗皮 甘草炙 麻黃去根節煎

桂皮去粗皮 芍藥各

右五味搗篩 每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓 空心溫服不出而臥

治傷寒巨陽中風項背強痠惡寒汗不出薑附湯方

附子炮裂去皮 乾薑炮 煎至八葛根 碎食前麻

甘草炙 芍藥各 茯苓剉 木芍藥 入土薑一

麻黃去根節先煎 芍藥剉 木芍藥 入土薑一

右七味剉 如麻豆每服三錢匕水一盞入棗二枚 去核同煎至七分去滓 食前溫服取汗未汗再服

治中風傷寒頭目四肢疼痛惡寒乾嘔桂附湯方

桂去毒 皮 芍藥各壹兩 麻黃去根節先煎

甘草炙各兩 附子炮裂去皮

右五味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑一

棗大拍碎棗二枚去核同煎至八分去滓食前溫服

以熱粥投之取汗避風

治中風傷寒脈浮緊發熱惡寒身體疼痛汗不出而煩

麻黃桂心湯方

麻黃去根節先煎 桂去毒

甘草炙 乾薑炮各兩

白芍去毒 杏仁去皮尖雙

右七味麻搗篩每服五錢匕水一盞半入棗二枚去

核同煎至八分去滓食前溫服

治中風傷寒頭痛沉重麻黃湯方

麻黃去根節先煎 附子炮裂去皮

細辛去苗 乾薑炮各分 甘草炙

杏仁去皮尖雙

右六味剉如麻豆每服三錢匕水一盞煎至七分去

滓食前溫服日三

治中風傷寒頭痛發熱胸中氣逆惡寒嘔噦小便難足

冷桂心湯方

桂去麤皮

芍藥

附子炮裂去皮臍

麻黃

去根節先煎掠去沫焙各參分

甘草

炙

杏仁去皮尖

半夏湯洗染偏生薑等分同炒焙

乾薑炮各半兩

右八味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入葱白三寸

生薑一棗大拍碎同煎至七分去滓食前溫服日三

治中風傷寒初得其外證頭項疼腰背強壯熱語澀恍

惚涕唾稠黏偏身拘急桂枝湯方

桂去麤皮參分

芍藥

半夏湯洗染偏生薑等分同搗

炮

附子炮裂去皮臍

芎藭

麻黃去根節先煎掠去沫焙

羌活去蘆頭

細辛去苗葉各半兩

白芷壹分

右九味剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑一棗

大拍碎煎至七分去滓食前溫服蓋覆取汗

治中風傷寒身體反強天麻湯方

天麻

麻黃去根節煎掠去沫焙羌活去蘆頭

附子炮裂去皮臍

桂去麤皮各半兩

杏仁去皮尖雙入炒

人參

細辛去苗葉

白朮各壹分

右九味剉如麻豆每服四錢匕水一盞酒半盞入生

薑一棗大拍碎同煎至八分去滓食前溫服

治中風傷寒頭痛四肢煩疼三附散方

附子炮裂去皮臍

白附子炮

半夏

湯洗棗偏炒乾各壹分

右三味搗羅為散每服半錢匕濃煎生薑湯調下不

拘時得汗即止

治中風傷寒頭痛惡寒四肢煩疼心躁悶麻黃細辛九

方

麻黃

去根節煎掠去沫焙壹兩

細辛

去苗

人參

白茯苓

去黑皮

甘草

炙

白朮

各半兩

栝樓根

參

右七味搗羅為末鍊蜜和搗丸如雞頭大每服一九

食前薄荷蜜湯研下

治中風傷寒初受病一日至三日頭痛肢體疼煩躁惡

風身熱憎寒白朮湯方

白朮

石膏

各貳兩

乾薑

炮半

五味子

炒

甘草

炙

人參

芎藭

麻黃

去根節煎掠去沫焙各壹兩

右八味搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚同煎至七分去滓稍熱服

治中風傷寒壯熱肢節疼痛頭目昏眩欬喘癰石膏

芍藥湯方

石膏 碎

芍藥

前胡 去頭 蘆

葛根

柴胡 去苗 各兩

升麻 半兩

桑根白皮 剉

荆芥穗

黃芩 各參

右九味廔搗篩每服三錢匕水一盞半煎至八分去

滓稍熱服

治中風傷寒頭目昏眩壯熱肩背拘急疼痛前胡湯方

前胡 去頭 蘆

蔓荆實 去白 皮

芎藭

麻黃 去根節 煎 掠去沫 焙

防風 去 又

羌活 去頭 蘆

白茯苓 去黑 皮

石膏 碎

甘草 炙 剉 各參兩

枳殼 去穢 炒 兩 黃芩 壹兩

右十二味廔搗篩每服三錢匕水一盞半煎至

二片煎至七分去滓溫服

初風 去兩 法 又 合

解中風傷寒頭痛體疼發熱惡寒石膏獨活湯方

石膏 碎 壹兩

麻黃 去根節 煎 掠去沫 焙 羌活 去頭 蘆

獨活 去頭 蘆

甘草 炙 剉 水一盞 煎至 天南星 炮 去滓

青橘皮 去白 麩 炒

枳殼 去穢 炒

乾薑 炮

芎藭 去頭 蘆

益智皮 去

桂 去麩 皮 各半兩 煎

右十二味廔搗篩每服三錢匕水一盞葱白二寸

豉二十七粒煎至一分去滓熱服蓋覆出汗

治中風傷寒頭目昏眩情寒壯熱四肢煩倦荆芥湯方

荆芥穗

木通剉碎

羌活去蘆

獨活去蘆

芎藭

麻黃去根節煎

甘草炙各

右七味麤搗節每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服

麻黃去根節煎

治中風傷寒百節痠疼前胡白朮湯方

前胡去蘆

白朮

防風去又各

此胡去蘆

薰草

白鮮皮剉碎

石膏碎

麻黃去根節煎

杏仁剉碎

甘草炙

右九味麤搗節每服三錢匕水一盞入薄荷五葉同

煎至七分去滓溫服不拘時

治中風傷寒身熱頭痛肢體煩疼百解湯方

前胡去蘆

柴胡去蘆

甜葶藶炒

麻黃去根節湯煮

獨活去蘆

桔梗炒

羌活去蘆

獨活去蘆

桔梗炒

人參

陳橘皮湯浸去白焙

白朮

枳殼去麩炒

甘草炙

白茯苓去黑皮

石膏碎

石膏碎

杏仁剉碎

右一十七味爲膏每服三錢匕水一盞入生薑三片同煎至七分去滓溫服不拘時候

傷寒濕溫

論曰傷寒有五其一爲中濕蓋風濕之氣中人爲病發熱與溫病相類故曰濕溫也此因汗出當風或因取冷過度致陰濕氣襲人肌膚流傳經絡其證喜汗出關節疼痛發熱而煩小便不利大便反快是謂中濕若風濕相搏則一身盡疼日晡所劇濕熱相蒸則身必熏黃凡治風濕者欲其微汗卽風氣解而濕自去濕甚者常利其小便不可大發汗大汗則風去濕在其病不去亦不可下之下之早則噦下之而利不止卽死診其脉當沉而細難經曰濕溫之脉陽濡而弱陰小而急是也治濕溫病一身盡疼發熱日晡卽劇此病傷於汗出當風或久傷取冷所致麻黃杏仁薏苡甘草湯方

麻黃

去根節參兩
煎去沫

杏仁 去皮入雙入
參拾枚炒

薏苡人

兩

甘草 炙壹兩

右四味咬咀每服五錢匕水一盞半煎取八分去滓

溫服

治傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而澹者桂枝附子湯主之若其人大便堅

小便自利者木附子湯主之桂枝附子湯方

桂去麤皮

附子

炮裂去皮

甘草炙

兩

右三味咬咀每服五錢匕水一盞半入生薑五片棗

二枚擘破同煎取八分去滓熱服

木附子湯方

附子

炮裂去皮

白朮

兩

甘草

炙

兩

右三味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生薑

五片棗二枚擘破煎取七分去滓溫服初一服其人

身如痺半日許復服之三服後其人如膏狀勿怪此

以附子朮併走皮內逐水氣未得除故使之然耳法

當加桂四兩此本一方二法以大便堅小便自利故

去桂也以大便不堅小便不利當加桂附子參枚恐

多也虛弱家及產婦宜減服之

治風濕相搏骨節疼痛煩燥痛不得屈伸近之則痛劇汗

出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附

子湯主之方

附子

炮裂去皮

甘草

炙

兩

兩

桂去麤皮

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎

取七分去滓溫服日三服初服得微汗則解能食汗

止復煩者少減服之千金云身腫者加防已四兩釋
氣小便不利者加茯苓三兩既有附子冷加桂薑三

兩

治濕家身煩疼麻黃湯加木四兩發其汗爲宜慎不可
以火攻之方

出試

麻黃

去節

桂

芍藥

甘草

四兩

二兩

二兩

前風

杏人

去皮

白朮

二兩

白朮

二兩

二兩

二兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半煎

取七分去滓溫服取微似汗則解

治風濕脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之方

防已

兩

黃耆

兩

甘草

兩

白朮

兩

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕以水一盞半入

生薑半分拍碎大棗二枚擘破同煎取七分去滓溫

服日三喘者加麻黃胃中不和者加芍藥氣上衝者

加桂下有陳寒者加細辛服後當如蟲行皮中腰以

下如冰後坐被上又以一被遶腰以溫下令微汗差

治風濕身體疼痛惡風微腫杏人湯方

杏人

去皮尖雙入

桂

去皮

半入

麻黃

去節先煮

芍藥

天門冬 去心焙 各壹兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入生

薑半分切煎取七分去滓溫服不拘時候

治濕溫傷寒身涼脉短日逐有汗者下虛上攻頭目昏

痛溫風丸方

白附子

陽起石

滑石 各壹兩

寒水石 肆兩

右四味搗研為末用糯米粥飲和丸如梧桐子大每

服二十九用荆芥木香湯下

治濕溫傷寒四五日後汗出肢體冷安息香丸方

安息香 壹兩

五靈脂 貳兩

麻黃 去根節 壹兩

附子 尖箇 柒分

巴豆 去皮 兩

甘草 半兩

右五味搗羅四味為末研巴豆為膏天麻藥丸如彈

子大每服一丸麩炭上燒存性生薑湯化下

傷寒時氣

論曰春溫夏熱秋涼冬寒是為四時正氣非其時有其

氣人或感之病無少長率相似者謂之時氣如春時應

溫而或寒夏時應熱而或冷以至當秋而熱當冬而溫

皆是也其候與傷寒溫病相類但可汗可下之證比傷

寒溫病藥之宜輕爾

治時氣二三日不解頭痛壯熱惡寒葛根湯方

葛根制壹兩

麻黃

去根節煎掠去沫焙貳兩

甘草炙

陳橘皮湯浸去白焙

甘草

炙

黃芩去黑心

知母焙

杏仁

湯浸去皮尖雙

芍藥春酒洗

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片同

煎至七分去滓溫服

治時氣頭痛壯熱石膏湯方

石膏

碎貳兩

葛根

剉

梔子

人藥水破

芫胡

去

赤芍藥

各壹兩

甘草炙

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎煎至八分去滓溫服不拘時候

治時氣壯熱頭痛嘔逆前胡湯方

前胡去頭

知母

焙

犀角鎊

葛根

赤芍藥

各壹兩

石膏碎

右六味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入生薑半

分拍碎蒸白二寸切煎至八分去滓溫服不拘時候

治時氣頭痛壯熱肢體煩疼七聖湯方

麻黃

去根節煎掠去沫焙參兩

蒼朮炒

橘皮

湯浸去白焙

木通

剉各兩

桔梗炒

山茵陳

兩

甘藷

炙

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞入生薑三片煎至七分去滓溫服

治時氣渾身疼痛壯熱不解人參湯方

人參

赤茯苓去黑皮 白朮

乾葛剉

甘草剉生用各壹兩

麻黃去根節煎掠沫焙壹兩

半

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葱白鹽豉各少許同煎至六分去滓溫服

治時氣一二日頭痛壯熱心神煩悶八神湯方

麻黃去根節煎掠沫焙壹兩

當歸切

甘草剉

大黃剉炒

白朮

山梔子人

各半兩

芍藥

荆芥穗各壹分

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞入薄荷三葉葱白一寸生薑二片同煎至六分去滓熱服

治時行一日至三日頭痛壯熱心神煩悶此胡湯方

此胡去

石膏碎

麻黃去根節煎掠沫焙各壹兩

兩

甘草剉生用半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞入豉三十粒葱白二寸同煎至六分去滓熱服併三服汗出効不計時

治時行身熱頭疼四肢痠痛山茵陳散方

山茵陳剉

蒼朮米泔浸壹宿去皮作片炒參兩

麻黃去根節煎掠去沫壹兩

石膏碎研各壹兩

右四味搗羅為散每服三錢七熱蔥茶清調下連併

三服衣覆取汗

治時行憎寒壯熱骨節煩疼頭疼項強麻黃厚朴湯方

麻黃去根節煎掠去沫壹斤

厚朴去蘊皮剉半斤

甘草剉 大黃剉各肆兩

右四味生用廬搗篩每服三錢七水一盞入生薑三片葱白三寸豉二十粒同煎至七分去滓熱服連三

服汗出立愈

杏人剉

蘇合剉

治時氣頭目昏疼久積熱毒鼻口出血清涼散方

麻黃去根節煎掠去沫燂 大黃剉 芍藥各壹斤

右三味搗羅為細散每服一錢匕沙糖冷水調下食

後服

治時行表不解壯熱惡寒人參乾葛湯方

人參 乾葛剉 白芍藥剉

桔梗妙各壹兩 赤茯苓去黑皮參分 甘草剉

右四味水香各半 麻黃去根節煎掠去沫燂 人參剉

右八味廬搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

熱服併三兩服溫覆出汗木一盞煎生小分去滓

治四時傷寒頭疼徧身壯熱口苦舌乾人安湯方

麻黃去根節煎 惡膏杜各各 甘草炙兩

人參 赤茯苓去黑皮 天門冬焙

麥門冬去心 各壹兩惡寒人寒薄甚減之

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二

枚同煎至七分去滓溫服併三服取汗差本喘不食

治時氣頭痛五心煩熱語言狂亂五解湯方

麻黃去根節煎 白朮去毒 桔梗炒

石膏碎 杏仁去皮尖 越桃炒 各一兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞豉七粒葱白一

寸生薑三片薄荷五葉同煎至七分去滓熱服如欲

出汗併煎兩服衣被蓋覆差

治時氣頭痛壯熱或暑毒伏心狀如瘧疾茵陳林黃散

方

山茵陳肆 麻黃去根節煎

石膏碎 蜀椒去目并閉口

蒼朮水浸去麁

右五味搗羅為細散每服二錢匕點茶調下如狂言

熱躁沙糖冷水調下

治時氣出汗吐下後四肢羸劣嘔逆減食白朮湯方

白朮剉炒

厚朴去麤皮生薑汁炙透黃耆細剉

人參

白茯苓去黑皮

桔梗剉炒

桂去麤皮

陳橘皮湯浸去白焙

甘草炙剉各

右九味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治時氣頭痛壯熱三日內宜服麻黃大黃散方

麻黃去根節壹兩

大黃剉

桂去麤皮

黃芩去心

甘草剉

乾薑炮各半兩

右七味搗羅為散每服三錢七煖酒調下衣被蓋取

汗

治初得傷寒時氣桂枝湯方

桂去麤皮

甘草剉

芍藥半斤 大棗十二枚 炙甘草二兩

乾薑炮各半兩

杏仁去尖雙人炒黃肆柒枚

麻黃去根節壹兩

右六味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓併兩服以衣被蓋令汗透

治時氣解表發汗五苓散方

赤茯苓去黑皮

桂去麤皮

澤瀉剉

白朮炒剉各壹分 豬苓去黑皮半兩

右五味搗羅為散每服五錢匕以新汲水調頓服訖

以蒸豉粥投之厚衣蓋覆取汗

治時氣發汗蒸白湯方豉壹合

葱白爛研貳兩

生薑細切壹兩

豉拍碎壹合

細茶末貳錢

右四味先以水二盞煎葱并薑至一盞半次下豉煎

少時即入茶末去滓頓服厚衣蓋覆取汗

治初得傷寒時氣壯熱頭痛解表湯方

甘草炙剉貳兩

生薑貳兩

黑豆貳升 豉壹合

右三味咬咀每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓

頓服厚衣蓋覆出汗

治傷寒時氣附柱散方

附子炮裂去皮臍

桂去蟲皮各半兩

右二味搗羅為散每服三錢匕熱酒調頓服厚衣蓋

汗出為度

和養三焦調順陰陽升降痞滯祛遺寒邪溫中散濕煖

胃和脾滋助氣血思美飲食虛寒痼冷痲痺動氣心膈

疼痛噎悶嘔逆一切氣疾不日痊愈萬靈湯方舊名萬靈散

前胡去蘆頭

芫胡去苗

秦艽去苗土

甘草炙各半斤

藿香子炒

木香土

桂去盡皮各壹斤

檳榔拾枚

肉豆蔻去殼半斤

芍藥半斤

青橘皮去白半斤

芎藭半斤

甜葶藶半斤

桔梗肆兩

右一十四味蠶搗篩每服三錢匕水一盞大棗二枚

擘破同煎至七分去滓食前溫服

治時氣熱病狂言心躁苦參湯方

苦參不拘多少

右一味焙燥麤搗篩每服二錢匕水一盞煎至八分

去滓連三服差

傷寒疫癘

論曰人居天地間稟氣於陰陽氣和則安氣盪則病故一歲之內節氣不和寒暑乖候皆爲疫癘之氣感而爲病故名疫癘其狀無間長少率皆相似俗又名天行其病與時氣溫熱等病相類治各隨其證以方制之

治溫疫病頭痛壯熱惡寒不解神明白散方

白朮剉兩

桔梗

細辛去苗葉

附子炮裂去皮

烏頭炮裂去皮

右五味搗羅爲散以絹囊盛帶之居閭里間皆無病

有病疫癘者溫酒服方寸匕覆取汗或得吐卽差若

經三四日抄三錢匕水二盞煎一盞半去滓分溫三服

治時行疫癘壯熱欬嗽頭痛心悶前胡湯方

前胡去蘆

升麻

麥門冬去心焙

貝母去心

紫苑去苗土

杏仁去皮尖雙人

甘草炙

石膏壹兩

右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞竹葉三七片煎

至七分去滓不拘時溫服

治傷寒辟毒氣疫病七物赤散方

丹砂研別

烏頭炮裂去皮細辛去苗

羊躑躅

乾薑炮白木切炒

栝樓壹兩

白木壹兩豆豉五十粒

石七味搗羅爲散每服半錢匕溫酒調服汁出解不

解增至七錢匕

治時行疫癘病頭痛體熱渴躁百骨節疼痛麻黃湯方

麻黃去節

葛根剉黃芩去黑心

梔子人

芍藥

杏仁去皮尖雙人

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞入葶五十粒同

煎至七分去滓溫服

治時行疫癘兼風熱目疼心中妨悶葛根湯方

葛根壹兩

芍藥參分

葱白參莖切

豉半合

右四味剉二味如麻豆用水三盞煎至一盞半去滓

分溫二服

治時行疫癘病壯熱頭痛脣乾石膏湯方

去黑

石膏碎兩

葛根剉參分

白芍藥蘇林黃芩

貝母去心

百合

升麻各半兩

梔子人

甘草各

白芍藥蘇林黃芩

右八味麻搗篩每服三錢匕水一盞半豆豉五十粒

葱白五寸同煎至一盞去滓溫服

治時行疫癘一二日頭疼壯熱煩躁麻黃解肌湯方

麻黃去根節

升麻

甘草炙

芍藥

石膏碎各

杏仁去皮尖雙

貝齒燒壹分

右七味麻搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓不計時候溫服

治時行疫癘未經汗下體熱煩悶桂心湯方

桂去麤皮參分

芍藥壹兩

麻黃去根節

杏仁去皮尖雙黃芩去黑心

甘草炙各半兩

右六味麻搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一

枚擘煎至七分去滓溫服

治時行疫癘壯熱惡寒食即嘔吐前胡湯方

前胡去蘆

生乾地黃焙

麥門冬焙

陳橘皮湯浸去白焙

人參各半

右六味蠶搗篩每服三錢匕水一盞竹葉二七片煎

至七分去滓溫服

治時行疫癘發表攻裏不盡形證尚在其人垂死不瘳

者苦參湯方

苦參貳兩

右一味蠶搗篩每服三錢匕酒一盞煎至半盞去滓

頓服即差

治時行疫癘病數日未得汗渾身壯熱嘔逆不下食此

胡湯方

小茈胡去苗

麻黃去節

升麻二兩

桂去麩皮

大黃剉炒

甘草炙

龍甲燻炙去裙襴

枳實去炒

知母參分

梔子大分

蘇子八分

右一十味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑三

片煎至七分去滓溫服

蘇子八分

治時行溫疫惡氣熱毒攻心脇氣滿脹急及注忤鬼氣

沉香丸方

沉香剉 丁香

薰陸香各半

犀角屑

升麻

木香

羚羊角屑

黃芩

梔子

麝香

鬼臼

芒消

大黃

人黃

甘草

右一十三味搗研爲末令勻鍊蜜和丸如梧桐子大

每服十九至二十九米飲下

治時行疫癘一二日頭痛壯熱花胡湯方

花胡去苗

芍藥

梔子

黃芩去黑心

石膏

葛根

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半葱白三寸豉

三十粒煎至七分去滓不計時候溫服

治疫癘病始得之頭疼壯熱葱豉湯方

葱白貳莖

豉

蜀椒

細切

右三味麤搗篩水三盞煎至二盞去滓頓熱服汗出

差水愈更煎服

治疫癘病壯熱煩躁頭疼體痛救生散方

人參 五味子

白朮

麻黃去根節

桂去毒

厚朴去蟲皮

大黃剉妙各兩

附子炮裂去皮甘草兩

炙半兩

右九味搗羅爲散每服二錢匕新汲水調下後用熟水漱良久喫生薑熱茶一盞投以衣被覆之如陽毒

汗出陰毒瀉下立差

治大行時疫三二日內未經汗下木疏湯方

蒼朮妙伍兩

豉妙參兩半

麻黃去根節

貳兩

右三味麤搗篩每服三錢匕水一大盞煎至七分去滓熱服蓋覆出汗未汗再服

傷寒結胸

論曰傷寒病發於陽下之早邪毒之氣結聚於胸膈故名結胸其證心下堅硬按之則痛項強如柔瘕狀或從心下至少腹堅滿而痛其痛不可近其脉寸口浮關上自沉是其候也若正在心下按之卽痛而脉浮滑亦名結胸凡此本太陽病脉浮而動數醫反下之胃中空虛容氣動膈令人短氣躁煩心中懊憹陽氣內陷心下堅滿則爲結胸又或因得病二三日不能卧但欲起者心下必結若脉微弱者此素有積寒而反下之利止必作結胸但下之而脉浮者必結胸皆當下之脉促者不爲結胸也脉若浮卽不可下下之則死結胸證具而躁者

亦死又有水結在胸膈者又有藏結者結胸無大熱為水結似結胸狀飲食如故時下利陽脈浮關上沉細而緊者為藏結舌上白胎滑者為難治若心下痞堅按之不痛者非結胸乃痞也宜審察而各依其法治之

治傷寒結胸心下堅實大便不利陷胸丸方

大黃細剉葶藶子隔紙杏仁湯浸去皮

兩其五朴消壹兩研細杏仁雙入妙研

右四味除杏仁消外搗羅為末再同研勻入少鍊蜜

和更作三五百下丸如彈丸大每服一九別入甘遂

末半錢匕蜜一合用水一中盞煎至四合溫頓服之

一宿乃下如不下更服取下為効

治傷寒結胸頭項強心下痛按之實鞭大陷胸湯方

白芩大黃細剉甘遂濕紙裹朴消別研

右三味各搗研為末每服用水一中盞入大黃末二

錢匕煎五七沸去滓次下朴消末一錢匕再煎一兩

沸次下甘遂末一字匕攪勻溫服取快利為度

治傷寒小結胸病正在心下按之則痛脈浮滑者小陷

胸湯方

黃連去須半夏湯洗栝樓實大者

右三味各細剉先以水五盞煎栝樓實取三盞去滓

入黃連半夏各一半煎取一盞半去滓分溫三服

治傷寒結胸心悶汗出葶藶散方

葶藶子隔紙炒 大黃剉醋炒 檳榔剉

桂皮去毒 陳橘皮湯浸去白焙 赤茯苓去黑皮

甘草炙剉各

右七味搗羅為散每服二錢七空心溫熟水調服

治傷寒實結胸無熱證者與三物小陷胸湯用前方

白散亦可服方

桔梗微炒 巴豆去皮心熬黑 貝母去心

右三味除巴豆外搗羅為散入巴豆合研勻每服強

人半錢七麻人減之並溫熟水調服病在膈上痰味

在膈下必利不利進熱粥一杯利不止進冷粥一杯

身熱皮粟不解欲引衣自覆若以水濕之洗之益令

熱却不得出當汗而不汗則煩假令汗出已腹中痛

與芍藥三兩如上法

治傷寒結胸心下痛如石堅鞭小便利葶藶湯方

葶藶子隔紙炒 檳榔剉 桑根白皮剉

杏仁湯浸去尖 大黃剉 芍藥剉 枳實剉 茯苓剉

右六味搗篩每服五錢七水一盞半煎至八分去

滓食前溫服

治傷寒下後虛氣不理毒復上攻毒氣相搏結於胸中

縱不下者毒已入胃胃中不通毒還攻上心中結滿厥

逆欲絕心起高胸手不可近當先理其氣增損理中丸

方

人參

白朮

甘草

栝樓根

枳實

枳殼

赤茯苓

法夏

黃芩

牡蠣

乾薑

枳實

枳殼

赤茯苓

法夏

黃芩

右八味搗羅爲末鍊蜜丸如彈丸大每服九丸熟水

化下不歇再服不過五六丸胸中豁然

治傷寒結胸毒氣內盛手足逆冷腹脹喘息急大便不

通陷胸青龍湯方

牽牛子

微炒

人參

陳橘皮

湯浸

去白

桂

去

栝樓皮

枳實

枳殼

大黃

半兩

枳實

枳殼

枳實

水朴消

枳實

枳殼

大黃

半兩

枳實

枳殼

枳實

右七味搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎同煎至七分去滓食前溫服

治傷寒熱病飲水結胸鞭滿大黃桔梗湯方

大黃

桔梗

甘草

枳實

枳殼

大黃

枳實

水朴消

枳實

枳殼

大黃

半兩

枳實

枳殼

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食前溫服

治傷寒結胸氣逆手足厥冷嘔逆不定大金鍼九方

陽起石

研

不灰木

阿魏

研各

巴豆

貳拾伍枚去皮心膜不出油研

杏仁

貳拾伍枚去皮尖雙人研

右五味搗研為細末用輭粟米飯為丸如小彈丸大

每服一九用鍼穿燈焰上燒煙絕為末生薑米飲調

服以利為効

治結胸傷寒心下痛按之實鞭泥金丸方

木香

丁香

大戟

甘遂

炒各

附子

炮裂去皮臍壹枚

紫苑

去土參錢

黑牽牛

參錢半生半炒

膩粉

參錢

硫黃

兩皂子大

檳榔

大者壹枚剉

水銀沙

子參錢

巴豆

貳拾粒去皮心膜用胡餅

麩裏慢火燒熟去麩不用

右一十二味各搗研為末再和令勻鍊蜜為丸如小

雞頭大看虛實每服一九爛嚼燒生薑一塊子同燕

下藥不得嚼

治傷寒結胸已轉下不除者大戟散方

大戟

炒

甘遂

炒各壹兩

膩粉

半兩

硫黃

研壹分

水銀

壹子內與硫黃同研作沙子半兩

右五味搗研爲散再同研勻每服二錢匕溫漿水調

下

治傷寒結胸逐利熱毒越桃九方

越桃

桃花暴乾各壹分

大黃生剉半兩

鬱金錢

白牽牛取末伍兩

郁李人去皮研壹兩

丹砂研壹錢

巴豆霜研伍錢

右八味搗研爲末滴水九如小豆大每服一九蜜水

下

治傷寒結胸伏陽在裏心下堅鞭按之則痛陷胸散方

前胡去蘆頭

甘遂炒

甜葶藶隔紙炒

大黃剉

杏仁湯浸去皮尖

芒硝研

馬牙消研各壹兩

蘇黃壹兩

白豆研

右六味搗研爲末每服一錢匕生薑蜜水調下更看

虛實加減加減

黑賊下

阿膠各壹

治傷寒結胸心下堅鞭宜毒九方

大黃剉 白牽牛剉 滑石剉 芒硝剉

朴消剉 甘遂剉 郁李人剉

大戟剉

續隨子去皮煮 白礬剉

右八味搗研爲末鍊蜜和丸如彈丸大看虛實以龍

腦蜜水化下丸九

治傷寒結胸及瘡疹後毒氣攻心涎嗽喘急大通散方

甘遂炒 生地黄兩與甘遂同搗焙乾 鉛白霜研分

檳榔對 麥藥炒 右五味搗研為末看虛實用龍腦漿水調下半錢七

治傷寒陰氣結伏在胸膈虛痞或痛不可忍者金鍼丸

方

不灰木錢 陽起石 阿魏各錢

白丁香各錢 丹砂研 乳香木隔丁夏

膩粉各錢 硫黃分 巴豆去皮心膜出

右九味同研勻細糯米粽子和丸如梧桐子大每服

五九至七九丁香湯下不拘時候

治傷寒結胸心下堅痛膈毒丸方

郁李人皮去 黑牽牛炒 大戟煎實土蘆

甘遂各錢 牛黃研 乳香研各

麝香研 龍腦研各 郁李人皮去

右八味搗研為末同再研勻用白麪糊和丸如梧桐

子大每服七丸煎燈心小麥湯下臨臥服

治傷寒結胸理餅子方

甘遂各錢 大戟去皮各 黑牽牛生用

輕粉錢 粉霜錢 巴豆去皮醋煮

水銀壹錢入錫壹錢
錢結砂子

右七味先將前三味為末入白麩五錢水和作餅子

文武火煨焦黃再為末入後四味拌勻水和為丸如

菉豆大捏作餅子每服三餅茶清下四餅

治傷寒結胸熱氣蘊蓄宜風丸方白麩麻味火破散味

大黃末

牽牛子末

郁李人去皮研
各半兩

巴豆

壹分去皮
膜油燂研

右四味再同研勻鍊蜜為丸小豆大看虛實生薑蜜

水下一丸至二丸

治傷寒結胸心下堅滿金黃散方

大黃

黑牽牛末

大黃末各壹錢

鬱金末

胡黃連末

各半錢

右四味作一服入膩粉一錢七新水調下傷寒四日

五日後結胸可服或吐或瀉或汗出即愈小兒量大

小加減

傷寒謔語

以夫論其始也下之宜大承

論曰傷寒不應發汗而汗之遂致亡陽津液內竭胃中燥實則令謔語此病或由津液不和內有燥屎或三陽合病或於熱蓄血在裏或婦人熱入血室皆使謔語也然謔語屬胃胃者足陽明經也陽明爲病主身熱故謔言妄語則身當有熱脉當洪大而洪大亦陽脉也故其病爲順若謔語而手足四厥脉反沉細而微者爲逆也然又有鄭聲者取其鄭重之意與謔語相類蓋古人以此分虛實醫者當以脉證參合別之不可不慎故謂虛則鄭聲實則謔語

治傷寒陽明病其人多汗以津液外出胃中燥大便必
鞭鞭則譫語宜小承氣湯若一服譫語止更莫服小承

氣湯方

大黃肆兩

厚朴

去蟲皮薑汁炙貳兩

枳實

炒參棧

並世

右三味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七
分去滓溫服

治傷寒陽明病下血譫語者此為熱入血室但頭汗出
者刺期門隨其實而寫之滅然汗出則愈汗出譫語者
以有燥屎在胃中此為風也須下者過經及可下之下
之若早語言必亂以表虛裏實故也下之愈宜大承氣

湯方

大青

人參

大黃酒洗

厚朴

去蟲皮薑汁炙

枳實

枳實伍枚

至去滓

右三味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七分

去滓入芒消一錢匕更上微火一兩沸溫服

治傷寒三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢譫
語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足逆冷若自

汗出者治虎湯方

知母陸兩

石膏碎壹斤

甘草炙貳兩

粳米陸兩

水一盞半煎至八分

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服

治傷寒熱實得汗不解腹滿脹痛煩躁譫語芫胡湯方

芫胡

去苗

大黃

剉微

黃芩

去黑

芍藥

半夏

湯洗米編焙乾各三分

枳殼

去瓤炒

右六味咬咀如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑

一分拍碎煎至七分去滓溫服

治傷寒邪熱在胃譫言妄語身體壯熱犀角湯方

犀角

鎊

大青

人參

各一分

遠志

去心

升麻

剉

芫胡

去苗

黃芩

去黑心

甘草

炙剉

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑半分

拍碎蘆根茅根各五寸同煎至半盞去滓溫服

治傷寒脉沉在裏而反發汗津液越出大便難甚表虛

裏實遂發譫言其人如狂枳實湯方

枳實

去穢

木香

各一分

朴消

各一分

大黃

剉微炒

甘草

炙半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服

治傷寒裏實譫語狂妄芎藭湯方

芎藭分

大黃剉兩

甘草剉兩

右三味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服

治傷寒熱病譫言妄語四肢煩熱犀角湯方

犀角鎊

芫胡剉

吳藍

馬牙消各壹兩

升麻

葛根剉各壹兩半

甘草剉兩

右七味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後溫服日再

治傷寒執實煩躁譫語芫胡湯方

芫胡剉

人參

黃芩剉各壹兩

犀角鎊

朴消

茯苓剉各壹兩

甘草剉兩

右七味廩搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓溫服

治傷寒經六七日不解默默煩心腹中乾燥大腸結澀

譫言妄語人參芫胡湯方

人參分

芫胡剉

芍藥剉

知母

黃芩剉

大黃剉

萎蕤

半夏湯洗

甘草炙各兩

右九味廬搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一分拍碎同煎至七分去滓溫服

治傷寒煩熱不解譫言妄語欲發狂走黃芩散方

黃芩去黑心

甘遂炒

龍膽去蘆頭各壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢匕冷水調下更令病人飲水三兩盞腹滿則吐之此方療積熱甚効

治傷寒發熱煩躁言語譫妄目赤口乾心神恍惚栝樓

散方

栝樓根兩

鬱金四兩

甘草生各壹兩

右三味搗羅爲散每服一錢生薑蜜水調下不拘時

傷

治傷寒發汗多亡陽譫語者不可下與此胡桂枝湯和其榮衛以通津液後自愈方

芫胡去苗肆兩

桂去皮

黃芩去黑心

芍藥

人參各壹兩半

半夏湯洗

甘草炙各兩

右七味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半入生薑半分拍碎大棗兩枚擘破同煎至七分去滓溫服日三

傷寒潮熱

論曰傷寒潮熱者謂潮作有時由邪氣入裏故病有日
晡所發潮熱已而微利者有微發潮熱而大便溏者有
潮熱而欬逆者有結胸而潮熱者大凡潮熱皆以邪氣
內實也制方者宜酌其輕重

治傷寒陽明病發潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去
者小此胡湯方

此胡去苗

黃芩去黑

甘草炙

人參各參

半夏洗棗屑

枳實炙

右五味細剉如麻豆大拌勻每服四錢匕水一盞半
生薑半分切大棗二枚擘破煎至八分去滓溫服

三

治傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而

微利此本此胡下之以不得利今反利者知醫以丸藥
下之此非其治也潮熱者實也先宜服小此胡湯以解
外後與此胡加芒消湯方

此胡去苗

黃芩去黑

人參炙

煎甘草炙

半夏洗棗屑

芒消研末

右六味除芒消外細剉如麻豆大每服四錢匕水一
盞半生薑半分切大棗二枚擘破煎至八分去滓入
芒消末一錢匕再煎令沸溫服

治陽明病識語潮熱脉滑而疾者小承氣湯方

大黃

酒洗剉 炒肆兩

厚朴

去蘘皮薑汁炙貳兩

枳實

炒去華人壹兩

右三味細剉如麻豆大拌勻每服四錢匕水一盞半

煎至八分去滓溫服初服當利不爾再服

治傷寒陽明病潮熱大便微鞭者大承氣湯方

大黃

酒洗剉 炒肆兩

厚朴

去蘘皮薑汁炙半斤

枳實

炒

芒消

研各貳兩

右四味咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞半煎至

七分去滓溫服以利為度熱不潮者不可與之

治傷寒經十日已上潮熱不解日晡即發發即壯熱如

火胸滿嘔逆六味此胡湯方

此胡

去苗壹兩

桂皮

去麩

栝樓根

各半

黃芩

去黑心參分

牡蠣

燒不懸甘葦

乾薑

各半

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎煎至七分去滓溫服以水一盞半煎至小盞去

治傷寒後潮熱不退或時頭痛目眩此是腹中有結燥

此胡厚朴湯方

葵藿

餅羊食

各半

此胡

去苗壹兩

厚朴

去蘘皮薑汁炙

枳消

研各壹兩

大黃

剉炒肆兩

枳殼

炒去心參分

枳實

各半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

淨溫服以利爲度

治傷寒十日已上潮熱不退此胡石膏湯方

此胡去苗

石膏

赤茯苓

白米

姜棗

羚羊角

梔子人

桑根白皮

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

淨溫服

治傷寒差後已經十餘日潮熱不退身體沉重昏如

醉前胡湯方

林

林

前胡

知母

葛根

麥門冬

石膏

麻黃

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

淨溫服

治傷寒過經潮熱不解或時作寒如瘧狀此胡鼈甲湯

方

此胡

人參

胡

鼈甲

鼈甲

赤茯苓

黃芩

知母

桑根白皮

甘草

知母

桑根白皮

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎煎至七分去淨溫服不拘時

治傷寒後潮熱不退發歇無時秦朮湯方

秦朮去苗 龍甲醋炙去襍 甘草炙

右三味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎取一百粒葱白五寸煎至七分去滓溫服

治傷寒汗下後潮熱不退口乾煩躁芫胡人參湯方

芫胡去苗 人參 知母焙

石膏碎 葛根剉 赤茯苓去黑皮

甘草炙

右七味麤搗篩每服五錢匕水一盞半生薑半分拍

碎煎至七分去滓溫服不拘時

治傷寒餘毒潮熱不解秦朮芫胡湯方

秦朮土法 芫胡去苗 知母焙 大黃白

青蒿各壹兩

大黃剉

龍甲醋炙去

常山各半 鬼臼各半 常山各半 燕屎肉 生衣合

最右八味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至半盞去滓

人溫服不拘時

治傷寒潮熱不退常山湯方

常山剉

烏梅肉

龍甲去襍

生黃耆剉 大黃剉 龍甲去襍 甘草炙

此胡去苗 龍甲去襍 三錢匕水一盞半人小麥一盞

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半入小麥一匙
生薑三片煎至七分去滓熱服不拘時日

傷寒煩渴

論曰腎者水藏勝膀胱者津液之府二經爲表裏傷寒熱
入於藏流於少陰之經則腎受病矣腎水惡燥熱盛則
燥故渴而引飲又傷寒邪氣非發汗吐下則不能除殆
發汗吐下過甚則亡津液津液耗少熱氣内生亦令渴
也

治傷寒服桂枝湯大汗出大煩渴不解脈洪大者白虎
加人參湯方

知母焙參兩

石膏碎兩

甘草炙兩

糯米合參

人參壹兩

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至
米熟去滓溫服

治傷寒發熱六七日不解煩渴飲水水入則吐此爲水
逆五苓散方

豬苓去黑皮

赤茯苓去黑皮

白朮各分

澤瀉壹兩

桂去麤皮

右五味搗羅爲散每服一錢半匕溫熱水調下不拘
時日三服多飲煖熱水汗出愈

治傷寒脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯方

猪苓去黑皮

赤茯苓去黑皮

阿膠剉炙

澤瀉

滑石各壹兩

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服

治傷寒數日不解心躁煩亂小腹脹急臍下悶痛大渴

喘乏八味知母湯方

知母焙

芍藥

麥門冬去心焙

苈胡苗去

澤瀉各參分

石膏壹兩半

黃芩去黑心

甘草炙各半兩

右八味搗篩每服三錢匕水一盞入生薑一棗大

拍碎竹葉三七片同煎至七分去滓食後溫服

治傷寒躁渴頭痛不得眠睡四肢煩痛葛根飲方

葛根剉

黃芩去黑心

大青

石膏碎

人參各壹兩

甘草炙半兩

右六味搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服對飲兩

治傷寒六七日煩渴不止麥門冬飲方

麥門冬去心焙

土瓜根

枇杷葉拭去毛炙黃各壹兩

甘草炙半兩

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時

土瓜根

欬味藥

黃芩 芍藥 甘草 人參

治傷寒煩渴不止栝樓湯方

栝樓根兩壹

右一味細剉每服五錢匕水六盞半煎至八分去滓

溫服不拘時

人參 芍藥

甘草 芩

治傷寒下後除熱止煩渴人參湯方

人參 黃芩 芍藥 甘草 麥門冬 五味子

石石膏神各兩壹

甘草 炙半兩

人參 芍藥 黃芩 五味子

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓溫服不拘時

治傷寒下後頭疼口乾煩渴葛根石膏湯方

葛根剉

麥門冬 去心

黃芩 去黑心

升麻各壹兩

石膏 碎壹兩半

甘草 炙半兩

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎生七分去滓

溫服不拘時

治傷寒吐下後內外有熱煩渴不止黃芩蘆根湯方

黃芩去黑心

蘆根

人參

赤茯苓

去黑皮 各壹兩 桂 半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入生薑一棗

大拍碎棗三枚擘破同煎至八分去滓溫服不拘時
治傷寒溫病吐下後餘熱未盡頭痛口乾煩渴麻黃葛

根湯方

麻黃去根

甘草炙各兩

知母焙

葛根剉

石膏碎各壹兩半

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓食後溫服

治傷寒溫病吐下後有餘熱煩渴不止芍藥黃連湯方

芍藥

黃連須去

麥門冬各心焙

栝樓根半兩

甘草炙分

黃芩去黑心

右六味麤搗篩每服三錢匕用水一盞煎至六分去

滓食後溫服

治傷寒吐利後煩渴不止竹茹湯方

青竹茹雞子澗人參

烏梅去核

水一

右三味細剉每服三錢匕水一盞煎至八分去滓溫

服不拘時

治傷寒熱氣熏蒸臍腹煩渴飲水不休葛根鬱金湯方

葛根剉

鬱金剉

石膏碎

荆芥穗各壹分

甘草炙壹兩

水一盞煎至七分去滓

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

食後臨臥溫服

治傷寒煩躁大渴飲水不休升麻飲方

升麻剉

黃芩去黑心

葛根剉

芫胡剉

山梔子木

不刺芥穗金器

牡丹皮

黑牽牛各壹分

黃連去鬚

消石研各半

三錢木 監煎入 去粉飲

右二十味蠶搗篩九味拌和研者每服三錢匕水一

盞煎至七分去滓溫服食後臨臥

治傷寒時氣煩渴飲水不止黃連丸方

黃連去須

楮樓根各壹兩

葛根半 生六公 去

右三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸

煎大麥湯溫下不拘時煎小麥湯下

治傷寒後胃熱引飲煩渴不止茯苓地黃湯方

赤茯苓去黑皮

生乾地黄焙

楮樓根各壹兩

知母焙

麥門冬去心

乾薑半

右五味蠶搗篩每服五錢匕水一盞半入小麥一百

粒淡竹葉三五片棗三枚擘破同煎至八分去滓溫

服不拘時

治傷寒後毒氣上攻津液燥少大渴引飲土瓜根湯方

土瓜根擘 甘草各半 瓜根用 合半 入大

右三味並細剉分作三服每服用水一盞半入大棗

二枚擘破同煎至七分去滓食後溫服土瓜根湯方

治傷寒後體虛心脾積熱口乾煩渴栝樓丸方

栝樓根二斤黃連去須枳實同茯苓去神桂去葶藶

麥門冬去心枳實同桑根白皮剉一犀角屑小麥一百

人參去地骨皮剉鐵粉

黃芩去黑心甘草炙水一

右二十一味搗羅為末鍊蜜和搗五百料丸如梧桐

子大每服三十丸食後煎小麥湯下

治傷寒後煩渴飲水無度日漸瘦悴知母犀角湯方

知母去犀角各半升麻各半

石膏碎麻黃去杏仁去水一盞半煎至八

右四味並細剉每服五錢匕以水一盞半入竹葉二

七片小麥五十粒同煎七分去滓入土瓜根汁栝樓

根汁各半合攪勻食後溫服式後同研合芍藥煎

治傷寒汗後煩熱燥渴不止黃芩飲方

黃芩去芍藥去甘草炙水一盞半煎至八

麥門冬去心甘草炙水一盞半煎至八

右五味搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

飲溫服不拘時服

治傷寒大汗後煩渴及熱不解知母湯方

知母焙 石膏碎各六分

水一斗 煮取六升 分三服

甘草炙半斤

水一斗 煮取六升 分三服

右四味為篩每服三錢匕水一盞厚至六分去滓

溫服不拘時熱渴不止黃芩湯方

治傷寒煩渴小便不利豬苓湯方

豬苓去毛 茯苓去毛 赤茯苓去毛 澤瀉切 白朮切

右五味等分為篩每服五錢匕水一盞厚至八分去滓不計時候溫服

治傷寒霍亂發熱煩渴紫蘇丸方

紫蘇葉切 茯苓去毛 白茯苓去毛

水一斗 煮取六升 分三服

治傷寒霍亂發熱煩渴紫蘇丸方

紫蘇葉切 茯苓去毛 白茯苓去毛

右七味搗羅為細末入麝香三錢同研令勻煉蜜和

丸如櫻桃大每服一九疇破以溫熱水下不拘時候

傷寒煩躁

論曰傷寒陽氣多陰氣少病發於陽經者故令煩躁其

候身熱而煩渴引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有虛

陰經煩躁者當辨之

傷寒煩躁

論曰傷寒陽氣多陰氣少病發於陽經者故令煩躁其

候身熱而煩渴引水漿若胃中乾燥者必譫語亦有虛

治傷寒太陽中風脈浮發熱惡寒身疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此為逆大青龍湯方見經其

麻黃去節

桂皮

甘草

各二分

杏仁去皮尖雙仁

石膏如雞子 浮萍切 白芍

右五味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一斗煮取五升

五升漿二枚擘煎至八分去滓溫服汗出多者溫粉

粉之服汗者停後服

各二分

白芍

各二分

治傷寒太陽病發汗後大渴出中乾煩躁不得眠欲飲水者少少與之令胃氣和則愈若脈浮小便不利微

熱消渴者五苓散主之方

豬苓去黑皮

白朮

赤茯苓

各半分

桂皮

澤瀉

各半分

右五味搗羅為散每服二錢匕白飲調下日三多飲

煖水汗出愈

治傷寒若吐若下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加

人參湯主之方

知母

石膏

甘草

人參

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半入粳米一匙同煎米熟去滓溫服立夏後立秋前乃可服立秋後不可服正月二月三月尚冷亦不可服服之則嘔利而腹痛諸亡血虛家亦不可服服之則腹痛利者但可溫之當愈

治傷寒汗下後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之方

白茯苓去黑皮 人參壹兩 附子壹枚生用去皮臍破剉片

乾薑壹兩 甘草貳兩

右五味剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

治傷寒少陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者吳茱萸湯

主之方和藥論論母期三錢匕水一盞入於藥十八分

吳茱萸湯洗焙升 艾參貳兩

右二味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半生薑

大一棗大切大棗二枚擘煎至八分去滓溫服日三

治傷寒煩躁不解麻大喘熱頭疼知母湯方

知母湯洗切 栝樓根切 甘草微炙各壹兩

石膏貳兩

右四味屬梟節每服三錢匕水一盞入粳米少許煮

米熟去滓溫服不拘時

治傷寒頭痛大熱煩躁黃芩散方

黃芩心法

濕熱

玄參

各減木

大黃

妙

甘草

積殼

去麩炒

升麻

壹兩

右六味搗羅為散每服五錢匕熟水調下立愈

治傷寒心神煩躁壯熱狂言毒氣伏留於胸膈大黃湯

方一錢大四錢二枚淨煎至八合去滓

大黃

妙

黃連

須

甘草

各

麥門冬

去心

芫薺

去苗各

右五味搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉十片生

薑三片煎至六分去滓溫服不拘時

治傷寒煩躁退熱葛根散方

葛根

剉

黃耆

剉木

一盞

甘草

剉

山梔子

剉

石膏

碎研

右五味搗研為散每服二錢匕新汲水入蜜調下

治傷寒狂躁悶亂大安丸方

凝水石

半斤

煨赤土

內

兩

取出

研末用

覆盆子

和作餅

再研

又和

又陰

參

大為

右三味同研勻細再用葦葶汁和丸難丸即入少許

煨餅丸如彈子大又一等如梧桐子大每服一丸生

地黃汁化下如復躁時即化大丸子下小九子十五

九只一服定如緩急無地黃汁新水化下火下十五

治傷寒大熱煩躁悶亂不死木散方干大每服一丸坐

不灰木兩貳滑石兩貳凝水石兩貳人少精

板藍根 甘草生用各甘草生用各

右五味搗研為散每服二錢七用生米泔化乳糖

治傷寒大熱下咽人安方

治傷寒煩躁悶亂不解雞湯散方泔水入鹽

鬱金貳枚薑貳枚生薑兩

右一味搗羅為散用新汲水一盞生羅子兩一枚調

清勻頓服與利行躁熱立定

治傷寒陽盛煩躁及夏月中熱發躁入石散方

代赭兩參凝水石 甘草炙剉別

不灰木各兩金星石 銀星石

雲母兩石膏兩太陰玄精石各肆

生陽起石貳兩別

右一十味除陽起石甘草外餘八味固濟堯罐中歇

口約一秤炭火煨赤頻將代赭出醋中淬五度去火

候冷取出濕地上紙襯益合土蓋兩宿搗羅更細研

三二日入陽起石甘草末拌勻每服半錢至一錢七

生薑蜜水或新汲水調下

熱及欲發黃即別入龍腦少許相和雞子清調服小

兒服六錢或半錢也慈蘇末與諸限十黃合兩許黑

治傷寒三日後心煩躁熱狂言鉛霜散方

鉛白霜燒研馬牙消兩 黃蘇末 諸限十 黃合兩 許黑

右玉味研勻每服半錢匕生薑蜜水調下小兒一字

丹也斷必效婚式

治湯毒楊樂五六日以上袒胸中煩熱乾嘔燥渴蘆根

湯乃至六分去滓服

本蘆根兩 蘆根兩 知母二錢 小栝樓根小 麥許 藥

此胡去兩 黃芩去黑 甘草炙 兩各

右六味蘆搗篩每服三錢匕水二盞生薑三片煎至

七分去滓溫服不拘時

治傷寒溫病後煩躁龍膽湯方類書式

龍膽兩 葵藿許 芍藥空 鼠脊兩 黃芩去黑 石膏兩 麻心許 麻黃去節 黃芩去黑

升麻兩 甘草炙 各許 葛根兩 出不

桂去 皮去 大青兩 藥

右一十一味蘆搗篩每服三錢匕水一盞生薑一棗

大拍碎煎至六分去滓溫服

治傷寒七八日汗後心煩躁渴人參湯方

人參兩 黃芩去黑 石膏兩 麻心許 麻黃去節 黃芩去黑

人參八日黃芩黃芩去黑人參胡苗

葛根劉各山梔子人甘草劉各

右六味搗篩每服五錢匕水一盞半生薑一棗大拍碎煎至七分去滓不拘時溫服

治傷寒陽明病脉浮而緊咽燥口苦腹滿而喘汗出不惡寒反惡熱身重若發汗則躁心憤憤而反譫語若加溫鍼必怵惕煩躁不得眠若下之則胃中空虛客氣動膈心中懊憹舌上胎者屬梔子豉湯方

梔子人豉半

右二味以水三盞煎梔子取一盞入豉再煎取七分

去滓溫服一服得吐者止

治傷寒火逆下之因燒鍼煩躁者屬桂枝甘草龍骨牡蠣湯方

桂去蟲皮甘草炙龍骨

牡蠣熟各

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓溫服日三

治傷寒煩躁身熱譫妄消石丸方

消石半丹砂壹

右二味細研糯米粥和丸如櫻桃大每服一丸生糯

米汁入油一兩點化藥青柳枝打勻服

治傷寒陰陽不順發躁悶亂氣虛嘔逆神應散方

丹砂

研

石硫黃

研各壹錢

土消

貳錢

蛤粉

參錢半

人參

白茯苓

去黑皮各壹分

右六味搗羅爲散每服一錢匕用脂麻水調下不計

時候服

傷寒厥

論曰傷寒病手足逆冷其名曰厥此因陽氣衰陰氣盛陰勝則陽脉逆而不通于四肢所以逆冷其證令人惡寒不飲水下利清穀或清便自調或小便數外證默靜

是其候也宜溫之灸之若灸之而手足不溫者爲難治然厥亦有熱厥者先發熱而後厥熱深厥亦深熱微厥亦微脉雖沉伏按之當滑若或畏熱或飲水或揚手擲足煩躁不得眠大便秘小便赤外證昏憤者雖厥不可溫也宜下之

附子

炮裂去皮

乾薑

炮裂

人參

兩半

甘草

兩

甘草

壹兩

麻豆

兩

甘草

兩

右四味各判如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至八

分去滓溫服

右六味判如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓溫服

治傷寒因肢厥冷又下利惡寒附子湯方

附子炮裂去破甘草炙

乾薑炮裂

芍藥各壹

右四味判如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至一盞

去滓溫服

治傷寒裏寒外熱手足多厥人參湯方

人參各壹白朮各壹桂枝各壹甘草各壹

乾薑炮裂附子炮裂白朮各壹甘草各壹

右五味搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓食前溫服

治傷寒四逆陽起石丸方

陽起石炮裂太陰玄精石各壹滑石各壹

附子炮裂芍藥各壹白朮各壹桂枝各壹

右四味搗研為細末湯浸蒸餅和丸如梧桐子大每

服五丸至十九丸新汲水下汗出解

治傷寒手足厥冷脉沉細正陽丸方

硫黃各壹滑石各壹太陰玄精石各壹

右三味細研入堯瓶子內瓦子塞口黃泥固濟陰乾

以炭火一斤養令火盡放冷出藥研如粉酒煮麪糊
和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸熱酒下不

計時候

治氣虛陽脫體冷無脈氣息欲絕不省人及傷寒陰厥

百藥不効者葱熨法

葱以麻縷纏如盡許大切去根及葉惟存白長二寸
許如大餅餡先以火燻一面令通熱乃以熱處坐在
病人臍中連臍下其上以熨斗滿貯火熨之令葱餅
中熱氣入肌肉中須預作三四餅子一餅壞不可熨
又易一餅良久病人當漸醒手足溫有汗更服四逆

湯輦溫其內卽差