

H O R T I
M A L A B A R I C I
P A R S O C T A V A,

DE V A R I I G E N E R I S

H E R B I S
P O M I F E R I S & L E G U M I N O S I S;

*Latinis, Malabaricis, Arabicis, Belgicis, Bramannum characteribus
nominibusque expressis.*

Adjecta Florum, Fructuum, Seminumque nativæ magnitudinis vera
delineatione, colorum viriumque accurata descriptione,

A D O R N A T A

Per Nobilissimum ac Generosissimum D.D.

HENRICUM VAN RHEDE TOT DRAKESTEIN,

Toparcham in Mydrecht, quondam Malabarici Regni Gubernatorem, supremi Confessus apud
Indos Belgas Senatorem Extraordinarium, nunc vero Equestris Ordinis nomine Illustribus
ac Præpotentibus Provinciæ Ultrajestinae Proceribus adscriptum,

Notis adauxit, & Commentariis illustravit

J O H A N N E S C O M M E L I N U S

In ordinem redegit, & latinitate donavit

A B R A H A M U S à P O O T M. D.



Mo. Bot. Garden,

A M S T E R ¹⁸⁹³ E D A M I.

Sumptibus Viduæ JOANNIS van SOMEREN, Hæredum JOANNIS van
DYCK, HENRICI & Viduæ THEODORI BOOM,

Anno cIdo Idc Lxxxviii.

ILLUSTRI ac GENEROSISSIMO

V I R O

D. FRIDERICO ADRIANO

BARONIDE RHEEDE, LIBERO DOMINO DE REINS-
WOUDE, EMMINCHAUSEN, BORNEWALL &c. ORDI-
NIBUS EQUESTRIS DIGNITATIS TRAJECTINÆ DIO-
CÆSEOS ADSRIPTO.

M Eo jussu pervenit ad Te Tomus Octavus Horti
Malabarici, testis perpetui Mei in te studii &
amoris. Conjunxit nos quidem dudum sanguinis,
unde genus uterque ducimus, necessitudo, &
collegii societas, sed non minus me tibi devinxit tua
virtus, elegantia & morum mirifica suavitas. Inter
elegantia, quam in omnis tua vita præ te fers, documenta cum
politioris omnis doctrina, cum hortorum cultura studium in primis
elucet. Nam & in optimis & cultissimis scriptis legendis, ac
quicquid in iis pulchrum & eximium invenitur memoria mandandis;
& in excolendis Hortis tuis, omnique florum & fructuum exquisito-
rum genere conferendis Te totum esse & ipse novi, & omnes qui Te
norunt, non ignorant. Persuasissimum itaque mihi est, non posse non
gratum Tibi esse hoc munus, quod ab extremis Indorum oris Tibi
mitto. Pasces enim oculos tuos spectaculo multarum mirarum, &
Europæ adhuc invisitarum arborum, fruticum & herbarum, quas
apud olim illas gentes collegi, ad quas nunc singulari quodam fato, cum
typis Amsterodami hæc describuntur, & luci committuntur, publicæ
rei causa cum imperio & magistratu extraordinario sum ablegatus. Tu
velim sic existimes me ubique terrarum & gentium tui amorem alta
mente conditum circumferre. Illum nulla temporis locorumque
longinquitas delebit. Semper enim ero

Nobilissimo Nomini Tuo

Deditissimus

HENRICUS VAN RHEEDE.

ABRAHAMUS à POOT M.D.

L. B. S. P.



Ostendam cum hanc HORTI MALA-
BARICI partem colligerem, ex authen-
ticis non potui deprehendere, quin Auctor
in Fruticum pergeret descriptione, ast cum
ad Tabulam XXII. pervenissem, & reli-
quas inspexissem, vidi me errasse, illum-
que non jam de Fruticibus sed de Herbis agere, atque ideo
pro *Frutex*, vel *Frutex qui*, legendum erit *Herba*, vel
Herba quæ, hoc te B.L. scire volui & valere.

Lagenaria vulgaris
var.

Part 8 Tab. 1


Belá-schorá Lat.

Cogn. 418

വെളുത്തലാമി Mal.

سَلْمَعُ حَيَاءُ Arab.

गानद्वी Bram.



PARS OCTAVA
HORTI
MALABARICI

DE VARIIS GENERIS

HERBIS
POMIFERIS & LEGUMINOSIS;

BELASCHORA.

T A B. I.



Chorà, variae dantur species, *Belà-Schorà*, *Bilen-Schorà*, *Schakeri-Schorà*, *Caripà-Schorà*; *Belà-Schorà*; à Bramannibus, *Gara-Dudi*; Lusitanis, *Babora-Branca*; Belgis, *Witte Pe-poenen* vocantur. *Radix* intus filamentis, lignosis pertexta, corticem habet album.

Caules quadrangulati, profundè striati, inflexi, viridi diluti, pilosi, minus lignosi, succulenti, fistulosi, latum in medio habent tubulum. *Folia* unà cum claviculis, è cymis, pediculis longis, crassis, rotundis, tortuosis, viridi dilutis & pilosis proveniunt, magna, anterius cuspidata, ad pediculum excisa, in margine hinc inde acuminata, minutissimis pilis obsita, lenia instar *Veluti*, in recta parte viridi fusca. Ex *costa* media duæ magnæ laterales excurrunt, quæ iterum variè disperguntur. *Flores* solitarii, cum suis pediculis pilosis, spithamam plus minus longis proveniunt, pentapetali, circa basin stricti, ad extremitatem latiores, corrugati, albi, ac deinde flavescentes, tribus costis emi-

A

nen-

mentibus striati, pilosi, lanugine membranacea obsiti, transparentes. *Fructus* aquosi & fungosi, longitudinem pedis æquant, circa verticem crassiores; cortex, cum teneriores sunt mollis, pilis albicantibus obductus; vetustiores, durus, crassus, lignosus. *Semina* oblonga secundum longitudinem in latitudine fructuum conspiciuntur, primùm albicantia, dein ex albo flavo fusca, quadrilateralia, ex opposito valde compressa, in medio nonnihil striata: nucleus albus est. *Succus* cum momento cumini sumptus, spontaneam lassitudinem, ac debilem tollit respirationem: *Foliorum* decoctum cum saccharo Ictericis prodest. Per totam hæc planta crescit Malabariam, in hortis excolitur & comeditur, florens tempore pluviali.

T A B. I.

Bela-Scharà hæc est *Raji Pepo vulgaris*; vide sis ipsius *Hist. Plant. lib. 13. cap. 2.*



Cucurbita moschata

Part 8 Tab. 2.

Schakeri-schora *Sw.*

ਬਰਫ਼ੀਲਾ ਮਠਾ *Mal.*

چاقھرا حیارے *Arab.*

कुट्टी *Burm.*



S C H A K E R I - S C H O R A.

T A B. I I.



Schakeri-Schora; secundum Bramannes, *Polita-Cali-Dadi*; Lusitanos, *Bobara-Guinea*; Belgas, *Pepoenen*, altera species *Schora*, frutex est cum priori conveniens. *Radix* eadem & caules, sed hi minus angulati & pilis hirsutis ac asperis obsiti. *Folia* ejusdem formæ & magnitudinis, sed hirsutiora & in oris dentata, quorum etiam pediculi crassiores, longiores, hirsuti, ac spiculis aculeatis muniti. *Flores* quorum alii fructibus insident, alii sine fructibus proveniunt, grandiores, aureo flavi, monopetali, quinque partiti, crispatis, pilosi, exterius quoque crassis costis, viridibus, pilosis, altè eminentibus instructi, circa cuspides non ita flavi ac minus rubescentes. In medio illorum qui sine fructu prodeunt, *stylus* crassus & erectus est, croceus & gemmulis flavis farinaceis in totum consitus, quibus detritis, variis condensis flavisque striis fulcatus videtur; qui cum fructu, in medio stylum habent albicantem, superius in tres quasi ramulos divisum, quorum singuli duobus longis, surrectis, crassis rubro fuscis staminibus donati. *Calix* quinque oblongo angusta habet folia, viridia, pilosa, in medio nervo obducta. *Fructus* pene iidem; alii oblongi, alii plano rotundi, duorum pedum latitudinem adæquantes, in longum costis extuberantes, primum virides, dein in totum flavi, carne densa & sublava, interiori valde fungosa & crocea, saporis dulcis. *Semina* eadem serie videntur oblongo-rotunda & plana, superficie parum convexa & æquali, quorum pulpa candida est. *Succus* cum momento Muschati, debilitatem & corporis languorem sublevat. Inter edulia habetur & ubique invenitur.

T A B. I I.


Species hæc est *Pepo Indicus compressus maximus*, | *ra folio non fisso, fructu albo maximo sessili.* Joh. Bauh.
 Morison. Hist. Oxon. Sect. 1. Cap. 3. & *Cucurbita aspe-* | Tom. 2. Lib. 16.

Cumbulam Lee.

செவ்வாய் மல.

فخومجالاتم Arab.

கூரல் brah.



M A L A B A R I C U S.

5

C U M B U L A M.

*Bennecasa hirsuta
Cogn. 515.*

T A B. I I I.



Rutex qui Malabariensibus, *Cumbulam*; Bra-
mannibus *Cuvaly*; Lusitanis *Bobara d'Agoo*
dicitur; Belgicè, *Water Pepoenen*; inter
edulia habetur & ubique in hortis excolitur,
arenosa & lutea amans loca. *Radix* fibrosa
& albicans. *Caules* fungosi, aquei, virides,
striati, pilosi, spiculis albicantibus muniti, ad exortum
foliorum claviculas emittentes. *Folia* in longis, crassis,
viridi-claris, interius striatis, rigidioribus, albicantibus
spiculis minutis, proveniunt pediculis, magna, cuspidibus
eminentia, in margine excisa, aspera & pilosa, interiori
parte viroris fusci, exteriori clari. *Costa* media duas
laterales emittit quæ circa basin divaricantur, omnes
eminent, maximè in adversa parte. *Flores* pene in similibus
videntur pediculis, pentapetali, aureo flavi, exterius pilosi,
pluribus crassis costis viridibus in longum obsiti, interius
striati. *Stylus* in medio tripartitus, superiori parte capitulum
efformans subflavum & plicis quasi convolutum. *Calyx*
aliquo modo crassus & planus, superne circulo circum-
scriptus, foliolis parvis, cuspidatis, viridibus coronatim
circumdatus. *Capsulae seminales* coniformes sunt, virides
& eminentibus costis striatæ. *Fructus* prægrandes, è
genere *Cucumerum*, aquei, fungosi, exterius virides, ob-
longo rotundi, quorum caro seu medulla valde fungosa,
aquea & flatulenta, saporis aquei. *Semina* respectu situs
& formæ intar Cucumerum, saporis subamari. Tener
hic frutex venenosus est, maturus è contra alexipharma-
cum; in febre calida ossium, ac tussi conducit, nec non
in ardoribus pectoris, manuum ac pedum, si nempe
fructus in conserva dentur; idem triti & cum butyro sumti
veriginem sedant & appetitum promovent: semina trita
& mixta cum oleo Schirgelim pro dysuria adhibentur.

B


T A B.

T A B. I I I.

Cumbulain est *Pepo oblongus* *Moriff. Hist. Oxon. Sect. 1. cap. 3.* & quanquam hæ species etiam in hisce regionibus inveniatur, sciendum tamen illas primo ex seminibus exoticis esse progerminatas.



Caca-palam L.
കൊക്കമരം Mal.
قحايه جيرة Arab.
कवडी bra.m.



CACAPALAM.

*Lagomonia vulgaris, Sw.
Cogn. 1798*

TAB. IV.




Aca. Palam; lingua Bramannum, *Carandely*; Lusitanorum, *Fruita Quisoute*, Belgarum, *Swalm Appel*, frutex est, densa amans nemora. *Radix* crassa est, brachium adæquans, ramosa, fibrosa, corticulâ exteriori flava, interiori nonnihil ruffa, & ex parte sanguinea, circa lignum albicans, in medio corculum radii lignosis striatum habens, inter radios mollius, ac fistulis conspicuis in longum pertusum, -saporis amari. *Caulis*, uti radix striatus, & fistulosus, superiorâ versus tenuis, striatus, glaber & viridis, multos transversos ejicit cauliculos. *Folia*, quorum pediculi striati, tribus seu quinque cuspidibus eminent, in recta parte hirsuta sunt & aspera, in adversa villosa, in margine dentata. *Costa* media utrinque duas alias emittit, in adversa parte eminentes. *Flores*, qui pediculis brevibus supra ex origine foliorum emergunt, albicantes, pentapetali, crispatis, interius plurimis longis, albicantibus filamentis obsiti, exterius tribus rubris eminentibus costis striati, pedem habent oblongum, crassum, nonnihil nitentem, intus nonnihil lanuginosum, inferiori parte durum, rigidum, à superiori velut nodulo distinctum. *Calyx* ex quinque foliis constat rubris, angustis, cuspidatis. *Stamina* è medio emicant tria, cum suis oblongo rotundis & planis apicibus, & cum iis *stylus* ex rubro albicans, in summitate crassior, ac trifidus. *Fructus*, velut mala sunt oblonga, primum acuto apice armati, qui deinde decidit, initio virides, tum rubro obscuro, post magis magisque flavescentes, ac tandem in totum miniato pulchri, cortice tenui, pulpâ flavâ, quæ saporis amari. Intra pulpam numerosa continentur *semina* oblongo rotunda & plana, singula ceruleo viridibus membranis involuta, variis filamentis sibi invicem annexa, odoris teterrimi. Matura semina ruffo fusca, valde amara.

Floret


Floret hæc planta mense Julio, circa *Paleoti*, semper ex radice de novo progerminans; nullius in medicina usus.

T A B. I V.

Varia hujus generis inveniuntur *Colochynthides* | descripta est *Colochyntus oblonga* B. Pin. & *Cucur-*
 uti videre est apud C. Baubinum in Pin. scilicet. 4. lib. 8. | bita aspero folio, amara, grandis, rotunda, viridis Joh.
 Hæc ab Authore nostro sub nomine *Cara-Palam* | Baub. T. 2. lib. 16.



Caijá-schorá L.
റെക്കുവിയെറ Mal.
كايچا جيتو Arab.
काडुवोट्टे bram.



CAIPA-SCHORA.

*Lagenaria vulgaris, Ser.
Cogn. 428*

T A B. V.



Aipa-Schora, species est *Schora*; à Bramanibus, *Culivò-Dudi*; à Lusitanis, *Bobora-Calabassen*; à Belgis, *Fles appelen* & *Calabassen* vocantur, nascens in solitudinibus circa *Warapoli*, florens tempore pluvioso, ac cum prioribus in multum conveniens. *Radix* eadem, præter quod cortex sit amarus, & *caules*, & *folia* sed parum minora, non ita mollia & viridi fusciora, & *flores*. *Fructus* formâ & magnitudine differunt, minores enim sunt, rotundi, saporis valde amari, *semina* plane eadem, sed minora. *Succus* foliorum cum tantillo *Mofchati* ructum abigit: medulla fructus immaturi trita & cum aqua calida sumta vomitum promovet, pectoris angustiam tollit, prægnantibus prodest, capitis dolorem tollit, pro lotione adhibita animi deliquium tollit; cum feminibus trita phlegmata evacuat.

T A B. V.

Caipa-Schora est *Colochyntis Piviformis*, seu *Pepo Amarus Bauh. Pin. Sect. 4. lib. 8.*

B I L E N S C H O R A.



Ilenschora eodem nomine ut cæteræ species cognita, cum prima specie pene in omnibus convenit, excepto quod caules sint quinque angulati, magis pilosi & crassiores. Vires cum illis *Caipa-Schora* conveniunt.


Mullén-belleri Lav.

சுத்தெலும்பெலத்தி Mal.

Taua-fini

தவழிளி bra.

رُوَالِهَتْ وَرُوَالِكْفِرِي Arab.



MULLEN-BELLERI.

Cucumis sativus, L.
Cogn. 498

T A B. V I.



Ulen-Belleri; Bramannicè, *Táva-Tini*; Lufitanicè *Pepinbo do Mato*, frutex est caulibus hirsutis, asperis, uti & foliis; floribus flavis, pentapetalis; corculum medium quinquilaterale est; fructubus Cucumeri formibus majoris generis ac spinosis; uno verbo, *Cucumis sylvestris*. Hujus, cum *Palmae sylvestris* tenera folia, cum tosto *Cumini* pulvere in aqua decocta, difficili ac sibilanti respirationi, & impeditæ diglutitioni medentur. Succus cum oleo *Sergelim*, & tosto *Cumini* semine haustus, vel cum *Feribeli* temporibus illitus, respirandi difficultatem ex ictu vel lapsu levat.

T A B. V I.

Mullen-Belleri A°. 1684. ex Ceylone mihi transmissa & terræ mandata per tres annos continuos maturos protulit fructus, boni & grati saporis. Dissecti liquorem exstillabant flavescentem, carne multum sicciore & densiore, quam Cucumeres vulgares, neque ita aquei, formâ oblongiores & angustiores.

Picinna L.

മാക്കി മാക്കി mal.

پیشینغاء arab.

ഗോശാല brah.



PICINNA.

TAB. VII.

*Luffa acutangula, Roxb.
Cogn. 460.*



*P**Icinna* duæ dantur species, una ejus nominis, altera *Cattu-Picinna*. Prima Bramannibus, *Gonsaly*; Lusitanis, *Pátolas*; Belgis, *Traken* vocantur, frutex ex nascens in arenosis, qui etiam multis in locis excolitur & inter edulia habetur, bis quotannis frugens. *Radix* longè subtus terram in transversum excurrentis, in superiori parte glandulosa, fibrisque barbatis vestita, cum cortice crasso, molli, humido & viridi, inferius albicans; intus humidis, laxis & lignosis filamentis instructus. *Caules* tenues, virides, quinquangulati, geniculati, ex geniculis claviculos emittentes, striati, minus lignosi, humidi, vetustiores in angulis asperi, teneriores raris ac brevibus pilis obfiti. *Folia* ex geniculis proveniunt, magna, anterius tribus armata cuspidibus, quorum medius maximus, duo reliqui minores, pilosa & aspera, in rectâ parte viridi fusca, in adversa diluta. *Costa* media præter alias minores, duas laterales emittit. *Flores* pentapetali sunt, rotundiores, parum oblongi, versus interiora crispatis convoluti, flavi, anterius flavo saturi, inferius pallidiores & subvirides; exterius quinque viridi dilutis, nonnihil pilosis foliolis, superius subflavis obfiti, interius striati. *Stamina* habent quinque brevia, viridi diluta & subflava, inferiori parte magis albescentia, superius in ramulos latos, tenues, plicatos ac corrugatos, superius subflavos divisa. *Calyx* ex quinque constat viri dilutis & cuspidatis foliis, exterius costulis in longum striatis. *Gemmæ* rotundæ, cuspidatæ, pyriformes. *Flores* gemini sunt, fructiferi, simul cum fructu erumpentes, ac eidem insidentes, reliqui non item, qui & sine fructu videntur. *Fructus* ipsi, cucumeris habent formam, in longitudine decem costis striati, spithamam vel etiam duas longi, cum cortice viridi fusco, intus carne fungosa, humida, saporis

aquei. *Semina* plana, compressa, oblongo-rotunda, primum albicantia, dein valde nigra ac nitentia. *Radix* decocta choleram reprimat, pituitam expurgat, & tumorem ventris tollit; *Fructus*, ceu illorum medulla ad pondus ʒj. in aqua macerata & assumpta vomitum provocat; ex feminibus oleum contra impetiginem distillatur.

T A B. V I I.

Hæc Cucumeris species jure merito, *Cucumis* à nullis, quod sciam, aliis Auctoribus descri-
sylvestris Malabaricus, fructu striato amaro dici potest; | pta.



Cattu-picinna L.

കാട്ടു കിളിത്തടവ് Mal.

قَطَوُّ بِحَيْبِغَاءِ Arab.

माटीगोसाळी Bra.



CATTU-PICINNA.

Luffa cylindrica, Rivin.
Cogn. 456.

TAB. VIII.



Attu-Picinna; secundum Bramannes, *Matti-Gonsali*; Lusitanos, *Fruita-cota*; Belgas, *Kors-Appel*, nascitur in arenosis, circa *Cranganoor*, in densis nemoribus, ac etiam aliis in locis, plerumque frugens, ac in radice longo tempore superstes. *Radices & caules* cum priori specie conveniunt, ut & *folia*, nisi quod minora sint, superficie magis aspera, & costas tenuiores habeant. *Flores* iidem. *Fructus* ejusdem formæ, sine costulis tamen, sed decem radiis striati, minores ac non ita craffi; saporis valde amari. *Semina* paulò minora, in margine tenui limbulo circumdata. Nullius in Medicina usus.

TAB. VIII.

Cattu-Picinna etiam ex genere est Cucumeris sylvestris, & à nemine descriptus; illam vero ut & alias præcedentes ad hoc genus pertinere, liquido ex omnibus notis constat characteristicis; nisi forte ob summam amaritudinem pro specie Colochyntidis, haberi quis vellet.

Pandi-páuel Lav.

പട്ടങ്ങി മാല.

valli Carati

वाळक्याती *bram.*

يعنظي يا ووهل *Arab.*



PANDI-PAVEL.

TAB. IX.

*Momordica charantia L.
Cogn. 436*



Pavel quatuor numerantur species, *Pandi-Pavel*, *Erima-Pavel*, *Pável* & *Bem-Pável*: prima Bramannibus, *Valli-Carati*, Lusitanis *Folbas Margoseira com fruita grande*, Belgis, *Groot Bierblad* dicitur, densa amat nemora, florens tempore pluviali; loco lupuli adhibetur ad dequoquendam cerevisiam. *Caules* tenues sunt, virides, quinquangulares, pilis raris minutis obsiti, hinc inde claviculos emittentes. *Folia* quæ pediculis crassis, longiusculis, interius striatis proveniunt, qui passim claviculis sunt instructi, mollia, tenuia, pilis subtilibus, miutis, raris, maxime in rectâ parte obsita, in septem lacinias divisa, quarum anteriores longiores & cuspidatæ, ac in oris nonnihil angulatæ. *Costa* media pilosa, viridi diluta, duas transversales emittit, etiam in recta parte nonnihil eminentes, ubi folia viridi fusca & surda, saporis amari, odoris gravis. *Flores* inferiori parte foliolo viridi, parvo, rotundiori substricto, supra ex origine foliorum prodeunt, diluto flavi, pentapetali, tenues, oblongo rotundi, ad oras nonnihil crispatis, in adversa parte costulis eminentibus, ac in rectâ vestigia relinquentibus, striati; in medio corculum habent, cum suo croceo capitulo, ex sex staminibus constans brevibus, albicantibus, quæ tribus datata sunt apicibus surrectis, croceis ac arcte in unum conjunctis; & sunt fructiferi vel non, quod cum reliquis speciebus ipsis commune est; nullius odoris. *Calyx* ex viridi albicans est, quinque oblongis & cuspidatis gaudens foliolis. *Fructus*, cucumeri formes, oblongo rotundi, in acutum cuspidem desinentes, totâ superficie majoribus inæqualibus tuberculis extuberantes, coloris primum albicantes ac parum viridis, dein flavo rubri & crocei; sub cortice pulpa latet humida, parum fungosa, in principio albicans, dein crocea. *Semina* plana, glabra, crassiuscula,

anteriori & posteriori parte nonnihil cuspidata, oblonga, tria quatuorve numero, sacculis quasi membranaceis & carnis, corallino rubri & nitentis coloris investita, primo albicant, exin ruffescunt, saporis subamari. Integra planta cum *Nala-Tirtava*, *Cinamomo* ac *Pipere longo* trita, atque aquæ *Oryzæ* oleoque *Marotti* mixta, unguentum suppeditat contra Pforam, Scabiem, Papulas, aliosque morbos cutaneos. *Folia* cum aqua calida è pota lumbricos enecant. *Succus* pruriginem abigit. Tota planta cum floribus *spinæ*, *curcuma* viridi, *gingibere* sicco, *pipere* longo, aliisque unâ pulverisata, oleo *Marotti* tinctâ & candente ferro levigata, oleum fundunt, quo Pfora, Pruritus, Impetigo, imo ipsa lepra, liniendo tollitur; simplex ejusdem pulvis, lepræ atque ulceribus malignis oblistit.

T A B. I X.

Pertinent hæ plantæ ad *Herbas Pomiferas Capreolatas*, sunt enim genus *Cucumeris*, præter hanc quæ sub nomine *Cucumeris Puniceæ Cordi*, seu *Balsamina rotundi folio repentis seu maris*, *Bauh. Pin.* venit. Ita Author noster varias adhuc ejusdem conspicias describit. Anno 1686. in Horto Medico Amstelodamensi maturos protulit fructus & semina;

quæ semina ex Insula Mauritiæ primum per Dominum *Isacum Lamotium* sunt transmissa. Etiam in Insula Ceylon aliisque locis inveniuntur. Ast quoniam hæc præ cæteris maximos habeat fructus, jure meritò *Cucumis Puniceus Indicus* fructu majore ex flavo rubente appellari potest.

Parel Lat.
Mal.
कानवी bram.
ياوونج arab.



PAVEL.

TAB. X.



Pavel; lingua Bramannum, *Carati*; non differt à *Pandi-Pavel*, nisi quod hujus fructus cucumeriformes, qui & eodem modo in superficie tuberosi sunt, minores, non ita oblongi, & infra cuspidem oblongum, ventre globofo. Planta in pulverem redacta, admixtis nigri *cumini* seminibus, *sale*, *assa fœtida*, *zingibere* sicco, *pipere* longo ac *melle*, in pilulas formatis, ventris lincinationes & tormina sedant, flatus dissipant. Cum cortice *Panitsji* & quatuor speciebus *Alu* in aqua *Lanjæ* contusa, additoque limonis succo calefacta, insigne præbet gargarisma pro *Aphtis*. Cum immatura *Curcuma*, & sicco *zingibere* si succus extrahatur, cum succo limonum, tosto pulveratoque *Cucumi* femine ac saccharo candido permixtus, tussim sedat, phlegmata expectorat, & claram reddit vocem.

TAB. X.

Pavel minor est conspecies plantæ præcedentis, sed ab Authore nostro non plenè descripta; discrimen tantum ponens in magnitudine & tuberositate fructuum, ad idcirco *Cucumis Malabaricus* fructu ex flavo rubente minor merito appellari potest; & est ipsissima planta quæ à Dom. Hermans in *Catal. Hort. Academ. Lugd. Batav.*, nomine *Cucumeris Punicee Zeylanici* indigitatur.


M. mucronata Charantia, 2. p. abstrusati, Su
Cogn. 438
M. mucronata, Willd.
Cogn. 438

Balia-mucca-piri Lat.

வந்தள முக்கிடு Mal.

والباقي عفتاء بيضوي Arab.

கரிசி Tam.



BALIA-MUGGA-PIRI.

TAB. XI.




Alia-Mucca-Piri; lingua Bramannum, *Carinti*; Lusitanorum, *Tindalica*; Belgarum, *Milten*; frutex est nascens in dumetis & locis silvaticis circa *Cochien*, semper florens vel frugens. *Radix* longè super terram extensa, hinc inde fibras emittit, rufo & subrufo cortice, intus viridis, aquosa & filamentis lignosis contexta, saporis amari. *Caules* inflexi, claviculati, quadrangulati, aculeati, viridi fusci, raris aculeis, qui cuspidibus versus posteriora reflexi sunt, obsiti, ad tactum asperi. *Folia* ex geniculis prodeunt, aculeata, interiori parte profundè striata, majora ut illa primæ speciei, in cuspidem minus acutum desinentia, in oris minutis crenis incisa, ad tactum magis scabra & aspera, crassioribus, longioribus hirsutis pilis obsita, interiori parte cancellis pertexta, saporis magis amari. *Flores* in cymis supra ex origine foliorum, tres quatuorve simul fructubus insident, pentapetali, crispatis & corrugati, flavi, vel etiam lutei, cum corculo cujus medium flavum, similes ut illi primæ speciei, sed triplo ferme majores, ac magis stelliformes. *Calyx* viridi dilutus & flavescens, ex quinque brevibus, angustioribus, cuspidatis constat foliis, versus exteriora inflexis. *Fructus* grandiusculi, oblongo-rotundi & cucumeri formes, ex una parte viridi fusci & nitentes, ex alia viridi diluti & albicantes, hinc inde acutis gemmulis eminentes, quorum cortex crassus, aqueus; caro etiam aquea, in qua semina eodem modo ut in cucumeribus posita sunt, sapor aqueus est & amarus, non sunt in eduliis. *Semina* oblongo rotunda & plana, seminibus cucumerum haud dissimilia. *Foliorum Succus* expressus & ad quantitatem unius uncix sumtus, omne venenum, ac dolores ex flatibus obortos tollit; in unctiōne adhibitus humores discutit. *Fructus* triti ac lacte vaccino permixti, vel etiam cocti,

Coccinia cordifolia, Cogn.
Cogn. 529

phrenosin fedant, memoriam consortant, vertiginem tollunt, capiti appositi & colligati; tota planta, cum *Palmodecca* trita & in butyro decocta, idem præstat.

T A B. X I.

Bala. Mitha. Pira tertia species est *Balsamina Cucumerina* nostri Authoris, ac revera inter illam in delineatione non bene observatum. Nostro récénteri debet; quamvis autem descriptio diætet *Balsamina Cucumerina Indica* folio integro frudu *variegato* appellari potest. caules tactu asperos esse & acutos, illud tamen




Érima-páuel Lat.

എരിമ പാലുവക Mal.

Pageli

फगलि Bram.

حمر يا ووهل Arab.



E R I M A - P A V E L .

*numerica diversa, Lib.
Cogn. 441.*

T A B . X I I .



Erima-Pavel; Bramannes *Pávali* dicunt; Lusitani *Tindali-Spinosa*; Belgæ *Doorn-Milssen*; frutex est nascens post *Paelurti*; plerumque florens vel frugens. *Radix* magna, capitata, cortex ruffo-obscurus, caro densa & albicans. *Caules* quadrangulares ac glabri.

Folia multo majara sunt, mollia, lenia, pilis rarioribus ac minutis obsita, ad petiolum angulatim divisa, cum tribus laciniis, quarum media oblongior, costis in adversa parte, quæ etiam in interiori conspicuæ, striata, viroris fusci. *Flores* formâ & colore ut præcedentes. *Fructus* plane similes sunt, sed exactius oblongo rotundi, & bullis minoribus aculeatis, densis & æqualibus, undequaque obsiti, primum in totum virides, dein ex parte virides, ex parte albicantes, cortice denso, carne alba fungosa, saporis aquei & minus amari, quare & inter edulia habentur. *Semina* plana sunt, rotundiola, parum convexa, ac in oris nonnihil ferrata, numero sex in circulum posita, sacculis membranaceis, carneis, rubris involuta, coloris albicantis. Planta hæc verè cephalica est; nam cum *Nuca Indica*, *pipere*, *Cinnab: Mercurii*, *Sandalo rubro*, vel denique cum *Mattengu-Panna-Schelengu* & floribus *Neli* trita, aqua *Oryzæ* permixta, & in formam linimenti redacta, omnes capitis sistit dolores.

T A B . X I I .

Quinta hæc species est Balsaminæ Cucumerinæ, & jure merito dici potest Balsamina Cucumerinæ, quæ hic sub nomine *Erima Pavel* describitur, foliis integris fructu aculeato.

Muccá-piri Lat.

മുക്കുപിരി മാ.

مُعَقَّى بِدُضِيّ Arab.

देवतवसिणी Bram.



M U C C A - P I R I.

T A B. X I I I.

*Melothria**Melothria patana, Cogn.
Cogn. 622.*

Mucca-Piri duæ dantur species, una ejusdem nominis, altera *Bullia-Mucca-Piri*; prima à Bramannibus *Deva-Teva-Sini* appellatur, frutex est arboribus se affigens ac nascens in arenosis. *Radix* longe supra terram se extendit, rufa est cum cortice subrufo, intus viridis, aquosa & amara. *Caules* tenues sunt & inflexi, angulati, in angulis acuti, & subtilibus aculeis, quorum cuspides interiora versus inflexi, condensè obsiti, virides & claviculati. *Folia* ex cymis ceu inflexuris proveniunt, quorum pediculi rotundi, asperi, aquei, viridi-diluti, interiori parte subtili lyra striati & aculeis obsiti; oblonga, tricuspidata, crenata, superficie in utraque parte valde aspera, in recta minutis hirsutis pilis obsita, viridis diluti & furdi, in adversa dilutioris & parum nitentis, saporis sylvestris & subamari. *Costam* habent mediam quæ duas emittit laterales etiam in recta parte eminentes. *Flores* in cymis supra ex origine foliorum visuntur, duo, tres, quatuorve simul, cum suis petiolis valde brevibus ac viridi dilutis fructibus insidentes, minores sunt, pentapetali, lutei ceu flavo diluti, in medio striati & corrugati; corculum habent flavum. *Calyx* viridi dilutus, nonnihil pilosus, ex quinque brevibus, cuspidatis constans foliolis. *Fructus* baccæ sunt rotundæ vel etiam nonnihil oblongo rotundæ, parva cerasa referentes, ruboris valde saturi ac corallini, superficie glabri, pilis albicantibus rarissimis obsiti, carne intus albicante, succulenta ac nonnihil unctuosa, saporis amarissimi, cum aperiuntur odoris gravissimi. *Semina* ceu grana inter carnem confertim confident, oblongo rotunda & plana, ad unam partem contractiora, coloris albicantis. In decocto data coleram sedat per sudores & urinam, dysuriam, gonorrhæum sistit, calculos infringit. Succus

G

ex-

expressus & cum aqua rosacea addito pauxillo Moscati assumptus, flatu dissipat; radicis decoctum idem præstat; quæ per se masticata, dentium dolores sedat.

T A B. X I V.

Mucca-Piri quæ sexta species est *Balsamina Cucumerina punicea glabra, maculis albis notata* vocatur.



Lovel lat.
 കൊരമ്പല mal.
 Tenculi
 തേക്കി bram.
 فَعْوَوَهَل arab.



C O V E L.

T A B. X I V.



Ovel; linguâ Bramannum, *Tenduli*; Lusitanorum, *Tindeli-Comprido*; Belgarum, *Milten*; frutex est nascens in saltibus circa *Cochien* & in aliis locis. *Radix* tenuis, albicans, intus filamentis lignosis pertexta, vetustior cinerea, lenta. *Stipes* crassitiem brachii adæquat, cinereo cortice obductus, nodis crassis extuberans, una cum ramis fasciam referens, incus filamentis lignosis, humidis & laxis, ac circa corticem carne subaquea pertextus. *Caules* foliosi, tenues, rotundi, glabri, virides, aquei, minus lignosi, cymis inflexi, ac ex illis hinc inde novos emittentes furculos. *Folia* cum claviculis ex convexa parte cymarum, pediculis mediocriter longis, crassitie caules suos superantibus & parum nitentibus in caulibus proveniunt, cucumerum foliorum formam referentia, textura densa & mollia, fractu facilia, superficie glabra & lenia, in recta, ubi etiam costæ conspiciuntur, parte, viridis fusci, in adversa dilutioris & furdi, saporis nullius, nisi aquei, odoris ingrati. *Flores* monopetali, campaniformes, quinque partiti, in totum candidi, cuspidati ac nonnihil crispati, exterius versus cuspidem, tribus costulis viridibus & nitentibus, quarum media maxima est, striati, interius sulcati, densioribus & oblongioribus pilis, quam quidem exteriori parte, obsiti. *Stylus* è medio emicat albicans, crassior, capitulo plicato, rotundo, viridi claro, flaviusculo farinaceo rore consperso dotatus. *Calyx* florem arcte excipiens viridi dilutus, quinque vel sex angusta, brevissima, cuspidata, versus petiolum inversa, & a se mutuo distita habet foliola, quæ in cuspide rubro colore tinguntur. *Fructus* cucumeri formes, ad longitudinem trium quatuorve pollicum, cortice in totum rubicundo croceo; sed cum teneres viridi fusco, nitente, punctulis ac etiam hinc inde albicantibus maculis intersperso; pulpa fun-

Coccinia *corallifera*, *Cogn.*
Cogn. 529.

fungosa est, rubicunda & crocea. *Semina* ut illa cucumerum, sed minora, plana, oblonga, ad unam partem extenuata, primum ex flavo albicantia, dein crocco rubicunda, in propriis loculis confita, liquore magis gelatino & copioso, subalfo & subacido obducta, in orbem ad se mutuo sita, cum tenuiore parte cortici obverla. *Fructus* teneriores comeduntur. Est & alia species *Covel*, à priore nihil differens, præterquam quod fructus sint amari. Integra planta cum radice *Elà-Calli* ac *Cumini* pulvere cocta, gonorrhæam sistit; si febris adsit ac bilis orgasmus, adduntur *Sacchari* rubri ac flores *Neli* cum aqua orizæ; Folia cum recenti butyro contusa, in formam linimenti adhibita, exanthemata tollunt. *Succus* ex *Pada-Kelengü*, floribus *Neli* & hac planta expressus Cephalæam & præcordiorum æstum mitigat; cum saccharo sumtus bilem refrenat, radix in aqua decocta idem facit.

T A B. X I V.

Septima hæc specis *Balsamina Cucumerina pinacea glabra, maculis albis notata* nomen gerit.




Paduralam Lat.

പടവളം Mal.

بَعُونَاءٌ وَفَلَاغٌ Arab.

പൊക്കി bram.



P A D A V A L A M .

T A B . X V .

*Trichosanthes cucumerina, L.
Cogn. 358.*


Padavalam duæ sunt species, una hujus nominis, altera *Scheru-Padavalam*; prior linguâ Bramannum, *Pouli*; Lusitanorum, *Sabino*; Belgarum, *Kalpert* dicitur, frutex est repens ac claviculis sese arboribus affigens, nascens in arenosis circa *Mutan* & in aliis

locis, florens mense Junio & Julio, odoris in totum gravis & maleolentis. *Radix* longè excurrit, minus lignosa, fibrosa & albicans. *Caules* quinquangulati sunt & striati, parum asperi, pilosi, aquei, minus lignosi, hinc inde inflexi, cinerei, teneriores virides. *Folia* quæ petiolis nonnihil pilosis, ex cymis una cum claviculis prodeunt, laciniata, ad petiolum excisa, texturâ mollia, superficie lenia, brevissimis ac subtilissimis pilis obsita, in margine hinc inde parvis apicibus emicantia, coloris in recta parte viridi fusci. *Costæ* albicantes sunt, in adversa parte eminentes. *Flores* vel fructubus insident, vel non, & hi plures congregatim proveniunt, parvi, albi, pentapetali, stelliformiter expansi, venulis paralellis in longum striati, in oris plurimis tenuibus ac candidis filamentis, quæ interiora versus contorta & crispa sunt, obsiti, superne nodulo communi flavo ad unum juncti; illi *stylum* habent viridi dilutum, in summitate albicantem ac tricuspdatum, apicibus subflavis instructum, ex fructu emergentem. *Calyx* quinque habet folia angustissima, cuspidata & viridia, inter unguiculos foliorum florum confita. *Gemmae* oblongo rotundæ. *Fructus* qui pediculis brevibus, incurvis, viridifuscis & nitentibus adhærent, oblongo-rotundi, in conum ad imam partem nonnihil inflexum desinentes; quorum exterior cortex, primum viridis ac nitens, punctulis albicantibus aspersus, ex apice conii versus pediculum albis radiis striatus; dein ex flavo rubescens. In fructubus cum carne viridi diluta, fungosa ac succulenta, tres seminum

ordines visuntur, carnosis parietibus in longum ductis, qui in vertice coeunt, à se invicem interstincti; in uno quoque ordine quinque vel sex confita sunt *semina* tenera, carne tenui subviridi à se mutuo sejuncta; matura verò sacculis rubris, humidis, laxis inclusa, suntque oblongo plana, ad oras angulata. Decoctum cum saccharo sumtum, digestioni confert, tormina intestinorum, ac alios ventris doloris sedat, phlegmata expectorat, pectoris angustiam tollit; febres minuit, humores attemperat, vermes enecat. Succus expressus idem præstat & vomitum provocat. Radicis succus ad quantitatem duarum unciarum epotus, valde purgativus est, in ipsa accessione febrium quotidianarum ac quartanarum ex pituita provenientium, frigus vel diminuit vel in totum tollit, per vomitum scilicet: stipes in decocto datus phlegmati expectorando conducit: fructus quaquo modo sumti tumores expellunt.

T A B. X V.

Octava hæc species est, quæ non immerito | *glabro ex flavo rubescente*, appellari potest:
Balsamini Cucumerina folio amplo, flore candido, fructu




Scheru-padavalam Lat.

ശെറു പടവളം Mal.

جَهْرُ يَوْضَاءِ وَفَلَامِ Arab.

ചെറുക്കി Bram.



SCHERU-PADAVALAM.

*Trichosanthes cuspidata, Lam.
Cogn. 357*

T A B. X V I.



Ltera species Belgicè *Klein Kalpert* vocatur, cum prima in totum conveniens, præter quod folia, flores, fructus, semina in totum sint minora. Vires etiam omnino eadem.


T A B. X V I.

Nona species *Balsamina* hic quasi conspecies *Padavalam* ponitur, sed folia differunt ut & fructus; hæc enim longa, in margine incisa habet folia in acutum cuspidem desinentia; flores qui fructibus insident multo majores sunt, fructus vero minores, & est *Balsamina Cucumerina*, flore candido muscoso, fructu glabro.



TOTA

Toti-pira Lat.
 ٢٤٥٥٠ Mal.
 Gorinti
 गोदरी bra.
 طوطرہ Arab.
 پیرا



T O T A - P I R I.

T A B. X V I I.



Ota-Piri species est *Tindeli* vel *Milsen* Belgarum, frutex est qui circa *Cranganoor* invenitur, florens tempore pluvioso. *Caules* tenues sunt, cymis inflexi & parum angulati. *Folia* in cymis pediculis tortuosis proveniunt cum capreolis, formâ oblongi cordis,

ad pediculum excavata, antè in cuspidem stricta, in oris apicibus brevibus emicantia, viroris in recta parte fusci, in adversa diluti. *Costa* media duas laterales emittit. *Flores* oblongis, viridiusculis petiolis in ramis proveniunt, pentapetali, angusti, stelliformes, interius candidi, ac in oris oblongis, candidis filamentis, quæ mutuo implicantur, capillati, exterius viridi diluti, venis viridi fuscioribus nonnihil eminentibus striati, antè transparentes. Illorum collum, crassum ac turgens, è cujus medio capitulum teres, oblongum, flavescens, angulis in longum striatum, erumpit, nullius odoris. *Fructus* cucumeri formes ut illi *Padavalam*, sed oblongiores, & pluribus seminibus repleti. Ex *foliis* & allio medicamentum conficitur errhinum, pro morbo comitiali. Ex *succo* foliorum & oleo 't *Zil-Elu* linimentum præparatur, quo maniacorum tempora summo cum successu perunguntur. Ex eodem *succo* cum *pipere* longo, *Zinzibere* & *auripigmento* pilulæ conficiuntur, oculis immittendæ, pro virulento serpentis morfu. *Cortex* fructus cum *succo* foliorum levigatus, in alienatione mentis, pro suffimigio adhibetur, funiculo laneo in illis immisso.

T A B. X V I I.

Tota-Piri, decima species est, & non incommodè *Balsamina cucumerina* fructu viridi striis albis appellatur.

Trichosanthes muricata L.
Cogn. 356.



Bin-pavel Lat.
 വെങ്കലം വെളി Mal.
Dadula-pagali
 दादुलाफागली Bram.
 ووهن يا ووهل Arab.

348

B E M · P A V E L.

T A B. XVIII.



Em-Pavel; Bramannicè, *Dadula-Papali*; Lusitanicè, *Tapadeira da fula tristedodio*; Belgicè, *Avond-bly* frutex est qui in *Cranganoor* invenitur, dumeta amans & loca silvosa, semper florens & frugens, quorum flores oriente sole pereunt, sed semper vespertino tempore novi succedunt. *Radix* oblonga, crassa, fibrosa, ruffo flava, cum pulpa densa ex albo flavescente, superiori parte strictior, oculum habet, qui radice emortua, suo tempore in majorem radicem excrescit. *Caules* tenues, striati, virides, quadrangulati, geniculati, rigidiores, glabri, ex geniculis claviculos tortuosos emittentes, intus virides & aquei, filamentis tenuibus, lignosis ac duris pertexti. *Folia* ex geniculis & claviculis, pediculis, oblongis, tortuosis, rigidiusculis, exterius planis ac nonnihil excavatis, viridi aqueis & humidis proveniunt, vel integra vel laciniata, ad pediculum lato sinu profunde excisa, in margine cuspidibus eminentia, vel lenia, quæ viridi clava, vel aspera, quæ fusciora sunt; saporis haud amari, odoris aliquantulum gravis. *Costa* media utrimque tres laterales emittit, in adversa parte eminentes, rectam striantes. *Flores*, oblongis, viridi dilutis, striatis & rigidiusculis pediculis, seu simplicibus seu ramosis in geniculis proveniunt, heceta petali, oblongi, cuspidati, flavi & lutei, in adversa parte tribus costulis eminentibus obducti, interius tribus venulis striati, ac plicis in longum crispati. *Stylus* cum suo capitulo, plicis striato, ac in plicarum oris croceo, è medio emicat umbilico, albicans & crassus. *Calix* flaviusculus ac nitens, florem in interstitiis foliorum arripit; suntque odoris fortis vegeti, haud injucundi. *Gemmæ* conicæ sunt. *Fructus* nulli. *Planta* cum cortice *Muricu*, *sandallo*, nigræ testudinis concha, ac aqua oryzæ trita, linimentum suppeditat, abscessus maturans & resolvens; si vero absque

que maturatione resolvere quis satagat, aquam *Lanjæ*,
apium ac *sandalum* coctum addere oportet.

T A B. X V I I I.

Bem-Pavel etiam species & quidem undecima | ast ex omnibus circumstantiis liquet illam ad hoc
Balsamina cucumerina est, radice tuberosa, & se- | genus pertinere; fructuum descriptionem quod
 cundum nostrum Authorem nullos ferret fructus, | attinet oblitam esse conjicio.



Nehomēka L.
Kavanoali Brot.



N E H O E M E K A.

T A B. X I X.



Eboemeka; Bramannes dicunt, *Kaviandali*; Lufitani, *Nhola*; Belgæ *Slitten*, nascitur in & circa *Catate* & aliis locis, florens mense *Januario*. *Radix* fibrosa. *Caules* tenues, angulati, viridi diluti, tortuosi, claviculis crispatis instructi. *Folia* pediculis longis, crassis, anterius sulco striatis viridi dilutis, in caulibus proveniunt, in quinque laciniis angulosis profunde incisa, tenuia, mollia, fusca, saporis nullius, odoris grave olentis. *Costa* media laterales emittit. *Flores* vel cum fructu simul, cui insident, vel sine fructu proveniunt tetrapetali, viridi diluti, in unguiculis striati & pilosi, maxime in oris; in floribus sine fructu tria videntur staminula, laciniata, in oris laciniarum limbo præditâ; fructiferi vero unum viridi fuscum habent stamen ex vertice fructus emicans ac trifidum. *Calix* viridi dilutus florem, qui nullius est odoris, arcte excipit, pro numero petalorum quatuor vel quinque cuspidibus constans. *Fructus* rotundi, globosi, glabro cortice, primum viridi fusci, nitentes, lineis albis in longitudine hinc inde obducti ac maculati, dein sanguineo rubescentes, ac lineis albis remanentibus, post rufescentes, & cum sicci sunt, ruffo-albicantes. *Semina* in propriis sacculis continentur, membranaceis, pellucidis, cæruleis, intus aqueo humore, inflatis interstitiis à se mutuo desjuncta, passim bina, suntque officula cruci formia, clavum oculatum referentia, per cujus oculum stylus transmittitur in medio filamentum obsitus, superficie non nihil scabra & ruffo obscura. *Foliorum* succus cum lacte vaccino epotus, bilem temperat: cum aqua *Lanja*, oleo *Sergelim* & tosti *cumini* pulvere febribus medetur: cum melle & saccharo, apprime conveniens remedium est contra febres, tussim, abscessus, internos flatus: cum aqua rubro *Lanja* respirandi difficultatem minuit, dentes firmat, flatus discutit.

T A B. XIX.

Planta hæc *Bryonia* est *Ceylanica* foliis profunde
laciniatis, ut videre est in *Catal. Hort. Acad. Lugd.*
Batav. Do. Hermanni, vel ejusdem conspecies. Ve-

Hermans pentapetalos, forte delineator erravit,
 ast respectu formæ & augmenti fructuum, spe-
 cicibus *Balsamina cucumerina* annumerari potest.



Modikka Lat.
മോടിക്ക - Mal.
boin - Guaji
मुंडकवाकि - Bram.
ماضيقي - Arab.



M O D E C C A.

T A B. X X.



Odecca quatuor sunt species, *Modecca*, *Palmodecca*, *Motta Modecca*, *Ovela Modecca*; prior lingua Bramannum, *Bui-Cuivali*; Lusitanorum *Narola*; Belgarum, *Croeselingen*, audit, frutex est densa amans nemora circa *Oedampare*, *Candanate* & alia loca, semper fere florens. *Radix* longa tres spithamas ac duas ferme crassas evadit, cortice primum viridi & albicante, fibras subtus & à latere emittens, intus densa, humida, albicans, non lignosa, circulis raparum instar striata, saporis pene nullius, oculos habet ex quibus novæ propagantur plantæ. *Caules* tenues, viridi-fulci, rotundi, glabri, brevioribus spinis binis & binis ex quibus claviculos ejiciunt, muniti. *Folia* quæ intra spinas proveniunt, difformia sunt, alia in cuspidem desinentia, alia in duas, tres, quinqueve lacinias incisa; mollia, plana, lenia, viridi fulca, in margine rubro limbo circumdata, passim tribus gemmis seu oculis in adversa parte instructa, duo ad pediculum qui rubro annulo circumdantur, saporis amari & sylvestris. *Costa* media alias transversales emittit, in utraque parte eminentes. *Flores* plures congregatim proveniunt ac claviculos ejiciunt, pentapetali albicantes, subflavi, filamentis in margine vestiti, ac in longum venulis striati, odoris nullius. *Stamina* in medio conspiciuntur quinque parva, apicibus albicantibus dotata, in quorum medio stylus sese erigit tenuis, qui ex principio fructus exoritur. *Calix* tria lata & tenuia habet folia. *Fructus* majores ut illi secundæ speciei, cortice primùm viridi, dein in totum aurancei coloris, glabri sine rugis, tribus quatuorve subtilibus liris in longum striati, quæ sese omnes, cum fructus ad maturitatem sunt perducti, relaxant; intus sub cortice lata capacitate officula continentes, quæ singula, candidâ, argenteâ, pellucidâ, membranaceâ ac apertâ quasi bursâ, involuta, in tribus quatuor-

ve feriebus disposita, formâ rotundo plana, in medio extuberantia, angustâ orâ circumscripta, superficie in totum aspera & scabra, primò albicantia, dein nonnihil rufosusca, cortice minus duro, nucleo albo, qui subdulcis est. *Succus* expressus cum lacte *Coci Indici* sumtus angustias pectoris tollit: *Radix* trita cum *Parnenti* & aliis in oleo decocta ac interne adhibita artus corroborat, vires naturales auget; melancholiam abigit, præcipue in mulierculis, ac obsessis.



Modékka- altera Sw.
മോടക്ക മാ. Mal.
مافقاع Arab.
तेजोकाविकी Bram.



PALMODECCA.

TAB. XXI.



Almodecca, quæ & conspecies est *Narolæ* cum *Modecca* in omnibus convenit, floribus exceptis, sunt autem illi oblongo cyathi formi collo, quinque oblongorum cuspidum, albicantes ac subviridescentes; in medio quinque emicant *Stamina* viridifatura, plana ac foliosa, longis albicantibus pilis capillata; in medio illorum globulus est rotundus ex viridi albicans, invertice stylum gerens albicantem ac trifidum, in furculis planis, viridi dilutis, granulatis penicillis dotatum; florum petali fragiles sunt, & venulis viridiusculis intus pertexti, in fundo capillati, quinque minutis brevibus staminulis præditi: Nullius sunt odoris. *Folia* cum aqua *oryzæ* trita linimentum cephalicum perhibent, pro balneo adhibita febres curant algidas.



Motta-modikka L.

മട്ടി മോടിക്ക Mal.

ماتح ما صفتا Arab.




MOTTA-MODECCA.

TAB. XXII.



St & tertia species, quæ etiam conspecies *Narolæ* crescens eodem modo & in iisdem locis post *Angecamál*, cum prioribus conveniens, præter quod fructus alii rotundi, alii oblongi ovales sint; rotundi tribus se relaxant futuris, oblongi ac ovales duabus.

Planta oleo incocta, phtificis opitulatur: ex cortice radicis melle permixto linctus contra tussim præparatur.



Orela-modékka Lat.

ഒറിലമൊദക്ക Ma.

عُرْبِلَا مُؤَضَّقِيَا Arab.



O R E L A - M O D E C C A .

T A B . X X I I I .



Rela-Modecca conspecies *Narolæ*, belgicè *Kroeseling*, nascitur in *Berkencour*, quarta species *Modecca*, à prioribus non differt, præter quod illarum folia sint incisa, hujus non, vel rarius. Oleum per infusionem cephalicum est; cum butyro concocta planta, hæmorrhoides sanat: *foliorum* succus partum facilitat.

T A B . X X . X X I . X X I I . X X I I I .

Species hæc quatuor *Modecca* etiam pertinent inter *herbas pomiferas clavicularis donatas*; ast quoniam cum aliis jam cognitis nullam habeant commu-
 nionem, per se relinqui debent; descriptiones enim duarum postremarum tam breves & imperfectæ; ut de illis nihil dici queat.

Modiu-Canicam Lev.
മോദികാ കറക്കിയ. Mal.

Karó

कासे ^{fran.}

ما دپرا قما جهپرام Arab.



MODIRA-CANIRAM.

TAB. XXIV.




Modira-Caniram; Lusitanis *Pao de solor* vel *Pao da Cobra*; cum *Caniram* in prima parte descripta, in omnibus pene convenit, sed hæc arbor, illa herba, cujus fructus cortice duro, viridi fusco, & pulpâ interiore albicante, ac maturi spadiceo nigrescentes, cum illi *Caniram* miniate rubescant. *Modira* dicitur ob similitudinem myrtacum, *Modira* enim myrtax est. Natale solum est circa *Mangatti*, *Paroe* & alia loca, semper fere vel florens vel frugens. *Folia* cum *zinzibere* & lacte ad consistentiam unguenti cocta, arthriditem, *Vilvada* Malabaribus appellata, abigit; balneum ex illis præparatum idem præstat.

TAB. XXIV.

Quantum laboris & quot conjecturas herba hæc doctis causaverit, videre est apud *Bauhin.* in *Pinac.* lib. 12. sect. 6. & *Joh. Bauh.* Tom. 1. lib. 3. cap. 147, est enim hæc *Caniram* secunda species istius generis. Semen quod in duarum harum specierum poma vel fructus continetur, vera est *Nux vomica* officinarum: prima parte; pag. 67. inter arbores est descripta, & Author noster primus est qui nobis veram hujus delineationem & descriptionem elaboravit ac dedit. Semina hæc in offi-

cinis perquam nota, vocantur enim ibi *Nuces Vomica*, beigicè *Kraan-oog*; lignum est ipsissimum lignum colubrinum. Fructus *Caniram* apud *Clusum Exot.* lib. 2. cap. 9. delineatus & descriptus sub nomine orbicularis fructus peregrini, & apud jam supra citatum *Joh. Bauh.* Tom. 1. lib. 3. cap. 149. sub nomine fructus peregrini granis uncis vomica similibus, plane idem videtur, qui à nostro Authore traditur.

Carabá-vágon L.
 കരവേലക. Mal.
 قماره و حشام Arab.
 साफस. Bram.



C A R E L O E - V E G O N.

T A B. X X V.



Arcloë-Végon; linguâ Bramannum *Sapoëssi*; Lusitanorum, *Aterlusi*; Belgarum, *Kokerlingen*, herba est nascens in insula *Baypin*, florens tempore pluvioso. *Radix* tenuis lignosa, fibrosa, odoris fortis & aromatici, saporis acris & amari, cortice sub crusta nigricante flavo ac ligno albo. *Caules* nodulis distincti, nec claviculos nec radices emittunt, suntque vetustiores cortice cinereo, teneriores virides & angulati. *Folia* hinc inde in caulibus, parvis, tenuibus ac viridi dilutis pediculis, interius striatis, ex nodulis proveniunt, oblongo rotunda, cuspidata, tenuia, saporis acris & aromatici. *Costa* media in adversa parte, multis est comitata nervulis. *Flores* monopetali, oblongo rotundi, exterius viridi fusci, interius fusco rubri ac surdi, una cum nodo pugionem referunt. *Fructus* oblongo rotundi, in vertice plani, sex latera habent, quæ singula in medio nervo emicant, coloris viridis, in sex capsulas feminales oblongas, quæ membranaceis interstitiis sunt distinctæ divisi: plurimas in se triangulares, planas, subvirides & albicantes tessulas seu laminas continentes, in quibus singulis unum planum, & compressum semen, formâ instar cordis humani videtur, coloris flavi ac ruffi; saporis subamari & acris; odoris aromatici, ut ille zinziberis viridis. *Decoctum* hujus plantæ cum oleo pro linimento adhibitus venenatum serpentum sanat morsum. *Radix* trita cum aqua sumpta, vel in decocto data, idem præstat, febres frigidas, dolores capitis, ventrem tumefactum ac dysuriam sistit; pro lotionibus usurpata dolores podagricos sedat; pulvis cum pipere trito & aqua calida exhibitus fluxum sanguinis sistit.

T A B. X X V.

Hæc *Carelœ-Végon* est *Aristolochia Clematitis*, at- | flore albicante, fructu majore, appellari potest.
que ideo summo jure *Aristolochia Clematitis Indica*, |


N

Mo. Bot. Garden,
1893

K A.

Larivi-valli Lat.
കടവനളു Mal.

gointi
गोडडी bram.
فَارِيوِي وَاللِّي Arab.



K A R I V I - V A L L I.

T A B. X X V I.




Karivi-Valli; secundum Bramannes, *Gointi*; Lusitanos, *Popinho do Patare*; Belgas, *Karlingen*; nascitur in sylvis *Atroparotto*, *Belango*, & aliis locis, semper frondens & vel florens vel frugens. *Caules* tenues, rotundi, virides, leviter sulco striati. *Folia* in pediculis tortuosis proveniunt, claviculis comitata, formâ cordis, ad pedunculum excisa, spissa & glabra, viroris in recta parte saturi ac nitentis, in adversa diluti. *Costæ* in adversa parte eminent. *Flores* plures congregati supra exortum foliorum proveniunt, monopetali, quinque partiti. *Stamina* in medio tria habent albicantia, flavis gemmulis nodulata; nullius odoris. *Florum gemmæ* oblongæ, superne *planæ*, stellulam quinque viridi fuscæ venarum in vertice gerentes. *Fructus* oblongi, antè cuspidati, costulis eminentibus instructi, cucumeri formes, primò virides, dein croceo rubescens seu aurancei, carne intus albicante, fungosa, quæ deinde flava evadit; sapor ut cucumerum. *Semina* oblongo sunt & involuta. Integra planta cum foliis *Muricu*, radice *Bel-adambu*, aqua ac butyro recenti trita, abscessus aperit. Ex hujus ac *Cadali* foliis succus elicitur, qui *oryzæ* aqua, *Cumini* semine, *Zinzibere* sicco ac *Allio* permixtus & exhibitus, sanguineam ac purulentam intestinorum excretionem, sanguineumque lotium sanat. Eiusdem & *Padda-Kelengu* radix cum pul-taceo fructus *Caniram* succo trita, maniacorum temporibus summo cum fructu illinitur; Eadem cum *Aracambulla* aquæ incocta ac cum butyro & lacte mixta confert in gonorrhæa, dysuria, Pitao morbo, de quo supra, veneno, aliisque ex adusto bile notis malis: pro sola gonorrhæa conducit eiusdem pulvis cum *Sandalo*, radice *Mottengu*, lacte, saccharoque commixtus.

T A B. X X V I.

Hæc *Karivi-Valli*, ratione fructuum cum conspeciebus *Aristolochia* convenit.

Kudici-ralli Lat.
കുടിരല്ലി Mal.
فُحُورِجِّي وَاللَّبِ Arab.



K U D I C I - V A L L I.

T A B. X X V I I.



Udici-Valli; secundum Bramannes, *Bajasajo*; Lusitanos, *Folhas da Coroa*; Belgas, *Kroonblad*, nascitur circa *Warapoli*; & in aliis locis, florens mense Septembri, Octobri, Novembri, *Cauliculi* tenuissimi, rotundi, virides, lignosi. *Folia*, capreolis comitata, optimæ sunt formæ, lilia coronæ Imperatoria referentia, tenuia, lenia, viroris in recta parte fusci & furdi. *Flores* pediculis ramosis, tenuibus, viridi dilutis, qui ad originem foliorum erumpunt, quatuor, quinque vel etiam sex simul congregati proveniunt, monopetali, campanæ formes, in longum venulis, in utraque parte eminentibus, obducti, circa oram coloris flavi & perpulchri, in collo viridi albicantis, nullius odoris. *Stamina* è collo emicant quinque tenuia, oblonga, albicantia, albis instructa apicibus. *Stylus* oblongior, valde tenuis & albicans, bifidus, nonnihil nodulatus, cum capitulo albicante. *Calyx* quinque cuspidata habet folia, florum colum arcte excipiens, coloris viridi fusci. *Florum gemmæ* plano rotundæ, in cuspidem strictæ. *Capsulæ seminales* quatuor obtusis ac rotundis angulis emicant, futuris eminentibus inter angulos, & per illorum medium obducti, coloris primùm viridi fusci, dein fusci nigri. In unoquoque angulo, duo triangulata reperiuntur *Semina*, uno latere rotundo, duobus planis, intersepimento sejuncta, coloris primò viridi diluti, dein nigricantis. Extra usum in Medicina est.

U L I N J A.

T A B. X X V I I I.



Linja; Bramannes dicunt *Piru-Dakka*; Lusitani, *Fruita-Bolsa-China*; Belgæ, *Timpen*, herba est florens in principio & sub finem temporis pluuiosi, cuius natale solum est circa urbem *Cochien*. *Caules* latè se diffundunt, claviculis suis tortuosis arboribus se affigentes ac circumvincientes. *Radix* lignosa, hinc inde in bullas turgescens, fibrosa. *Folia* in petiolis propriis, tenuibus, viridibus, striatis videntur, supra tres ramulos spargentes, tria in unoquoque ramulo, incisa ut illa *Petroselin*, tenuia, lenia, viroris surdi, interius & exterius subtilibus costulis striata. *Flores*, supra ex origine petiolorum foliaceorum oriuntur, in propriis pediculis perinde ac folia, qui duastenues, breues, valde intortas eijciunt claviculas, supra quarum exortum, se in tres findunt ramulos, terni in singulis ramis, suntque parvi, octopetali, quorum quatuor exteriores oblongo rotundi, in latum expansi, in totum candidi, interiores angusti, surrecti, quorum duo qui se mutuo adjacent, in superiore parte flavi ceu crocei, quatuor viridibus substringuntur foliis, ac illorum duo oblongiora sunt & foliis exterioribus candidis æqualia; duo contractiora. *Stamina* in iis conspiciuntur octo, candida, tenuia, apicibus albis subflavis nodulata. *Stylus* in medio crassus, viridis, angulatus, in vertice stellula albicante tricuspidata signatus. *Capsulæ seminales* folliculi sunt virides, plano triangulares, qui inflore ipsum folium constituunt, singuli anguli nonnihil in latum excurrunt, in medio futura obducti, ac per membranas inter medias stylo medio affixi, in tres loculos distincti, in vertice tricuspide parvo, rubro dotati, ad pediculum quatuor parvis foliolis succincti. *Semina* in iis terna, in unoquoque loculo, unum, angulis suis quam firmiter stylo medio annexa, suntque rotunda, primum viridia, dein spadiceo

nigra, ultimò nigra, ac si atramento essent suffusa, ad unguam semilunula albicante signata. Planta cum aqua trita & affectæ parti illita, arthritidem curat & artuum ex frigore rigiditatem. Ex foliis succus elicitor, & cum oleo foliorum de *Enfermo* ceu *t'ZitAvanacu* mixtus, alvum ciet: idem tepidus cum successu arthriticis propinatur; cum nigro *Cumini* semine puncturam ex cardialgia ortam abigit. *Folia* trita tussi medentur; cum impuriore saccharo mixta, & in oleo concocta, oculorum vitiis succurrit.


T A B. X X V I I I.

Planta hæc est *Halicacabum peregrinum* multis, | *vescarium*, fructu nigro. alba macula notato, B. *Pinar.*
sive *Cor Indum Lobelii*, & *Joh. Bauhini*; vel *Pisum* |



Naga-valli vel Mandaru-valli Lat.
നഗ വാളി mal.

Serpata-valli
सरपताळी bram.
نقنع والبري arab.



NAGAVALLI

Vel

MANDARU-VALLI.

TAB. XXIX.



Aga-Valli vel *Mandaru-Valli*; Lusitanicè, *Trapadeira da Cobra*; Belgicè, *Aalclim* vocatur; herba est quæ nec floret nec fruget, semper virens circa *Mangatti*. *Folia* in furculis viridibus, striatis, qui & ad exortum & superne extuberant, proveniunt, in medio ad extremitates bifida, antè duobus cuspidibus oblongis, angustis eminentia, tenuia, lenia, viroris communis. *Costa* media in utroque latere tres emittit laterales, rubescentes, suntque folia saporis subastringentis, ac tenera sanguineo rubescunt, foliis *Belutta Mandaru* quàm simillima. Planta hæc cum lacte & recenti butyro trita ac capiti inuncta cephalalgiam, ac cum nares tum oculos corrodentem catharrum edulcorant: *Gemma* cum minio & alumine mediante *Oryzæ* lotura in pilulas formantur pro oculis ex cephalæa tumentibus & inflammatis; cum succo *Carimbolæ* contritæ parotides internosque glandularum tumores imminuunt; *Radix* cum aqua *Oryzæ* & butyro recenti pro frontale adhibita idem præstat.

Naga-mu-ralli lat.
മല മര മൂല mal.


Serpata-ralli

ഇടലി

نقغق والبر



Naga-mu-ralli Lec.
نك موقلي Arab.



N A G A - M U - V A L L I.

T A B. XXX. & XXXI.



Naga-Mu-Valli, à Lusitanis, *Bastao de jogi*; Belgis, *Bedelhoud*, vocatur, nomen traxit à serpente qui lingua Malabarica *Naja* dicitur, eo quod stipites serpentino ductu sinuantur, suntque Jovi sacri, quos in itinere secum ferunt; nascitur in terreo & elato solo circa *Tirthour*, *Berkencour* & alia loca, semper progerminans ac longè à radice arbores transcendens, flores vero nec fructus unquam deprehendi possunt: *Folia* in petiolis oblongis, viridibus, tenuibus, ad exortum & superiorem partem majori crassitie extuberantibus, conveniunt, suntque uti folia *Mandaru* ad pediculum, ut & antè in medio profunde incisa, & duobus angustis cuspidibus eminentia, texturâ tenuia, superficie lenia, viroris in recta parte fusci & nitentis, in adversa dilutioris & surdi. Costarum figura ut & propagatio jam præcedenti tabula sunt descripta. *Stipites* complanati, lati, septem, vel octo ferme digitos transversos, ac pollicem plus minus crassos evadentes, sinuati, extuberantes, ac frequenter superne ex convexa parte, furculos ramosos, qui foliis vestiuntur, emittentes, ac etiam hinc inde spinas oblongas, supra furcatim divisas, ac annulatim seu barbatim intortas; primum virides sunt, vetusti ligno durissimo ac cortice crasso & valde duro, ruffo fusco & lignoso, tam arcte ligno agglutinato, ut nullo modo deglubi queat; suntque præterea secundum longitudinem hinc inde fissi, spinis quoque duris & lignosis instructi. Ramus hujus plantæ à doctissimo D^o. *Paulo Hermans*, in celeberrima Leidenfium Academia Botanices Professori celeberrimo, asservatur. In Medicina ignoti est usus.


T A B. XXIX. XXX. XXXI.

Cum duorum horum generum *Clematis* nec flores nec fructus sint inventi, difficile dictu inter quas pertineant species.

Acacia acuminata
Spreng. bot. 2. 59

Entada Purse-thorn

Part 8 Tab. 32
Perim-kaku-valli lac.
മലബാർ പഴം മാല.
garail
ഗാരൈ
بهریم قاقو واللہ arab.








Perim-kaku-ralli lav.
ಎಲಿವೆ ಕಿಡಿಯಿಟ್ಟು mal.

garai

गारा bram.

قاريم قاقو ولي arab.





Perim-laku valli lev.
 ಎಲವು ಹೂವು ಮಲ.

garail
 ಗಾರೈಲಿ bram.

قاريم قاقو والي arab.

PERI-M-KAKU-VALLI.

TAB. XXXII. XXXIII. XXXIV.



Erim-Kaku-Valli, Lusitanicè & Belgice *Gairo* audit, herba est nascens post *Mangatti* & in aliis locis, semper virens, & fructus vel maturos vel immaturos habens; ob usum fabarum quæ alvum & vomitum promovent inter mercaturas numeratur. *Stipes* immani fit crassitie, quinque hominum amplexus implens. *Rami* transversi longè latèque super arborum vicinarum fastigia repunt, primò virides, dein nigricantes. *Folia* in furculis communibus viridibus, qui ad exortum ventre extuberant, ac interius sulco sunt striati, geminata & in duabus proveniunt seriebus, oblongo rotunda, uno latere, quod à petiolo medio aversum, latiori & rotundiori, texturâ parum tenuia & rigidiuscula, viroris in recta parte saturi, in adversa diluti, saporis sylvestris. *Costa* media viridi-albicans utrinque eminet ast maximè in adversa parte. *Flores* conferto proveniunt numero omni ex parte furculo circumpositi, ac sibi mutuo valde vicini, præcipue cum in gemmis sunt, quæ se in quinque aperiunt folia, stelliformiter cuspidata, viridia. *Stamina* ex illis emicant decem oblonga, apicibus viridibus instructa, quæ deinde pallidè flavescunt, ac postea crocea suffunduntur colore. *Stylus* inter illa brevis ac rubeus se offert; suntque flores odoris grati, mellini, qui ad fastigium furculorum consiti, diutius in gemmis clausi manent, inferiores prius aperiuntur. *Flores* hi, utut parvi, & à communi forma florum fabaceorum recedentes, dant siliquas illas prægrandes; ast cum maxima parte decidant, ac nullum in iis siliquarum appareat rudimentum, hinc diu dubitatum utrum falsi sint nec ne, sunt autem hæ siliquæ, quæ in ramis pediculis crassis, lignosis dependent, immanis magnitudinis, longitudinem quinque, sex septemve pedum, latitudinem palmæ adæquantes, rectæ vel passim tortuosè annulariter, aliisve modis inflexæ, duo

complanata habentes latera, & in utroque latere crassa costa præcinctæ, foras cochleata cavitate extuberantes, striatæ, odorem florum *Kaida* spirantes, quarum cortex viridis si vulneretur, resinofum, pellucidum ac candidum gummi exsudat; cum siccæ sunt, cortex durus, lignosus, corneus ac cinereo nigricans est, exterius transversis striatæ sulculis, in utriusque limbi parte instar atramenti nigerrimæ, glabræ ac nitentes. Longo hæ filiquæ tempore ramis adhærent, ac etiam in illis visuntur, cum furculos de novo floriferos ejiciunt. *Fabæ* in una filiqua triginta, plus minus, singulæ in suis oculis continentur, per intersepi-menta transversa sejunctæ, convexo limbo, filiquæ ad angulum oculi sui inferiorem, filamentis longis adhærentes, nucleum habent album, cujus pulpa dura, densa, pinguis, oleosa: teneriores fabæ corticem habent candidum & nitentem, ac valde crassum, venis minutis concellatim condense pertextum, cujus sapor astringens; pulpam intus candidam, aqueam, in duobus lobis divisam, saporis aquei sylvestris, subamari, intra lobos oculo præditæ; siccæ multo sunt contractiores, & futuris mediis laxatis seu ruptis se solvunt, inter nuclei lobos larga cavitate turgentes.

T A B. XXXII. XXXIII. XXXIV.

Inter omnes species *Lobi* adhucdum cognitæ, hæc maxima est, à nemine ante hac descripta. Semina vel fabæ tanta copia inveniuntur, ut totæ naves cum illis onerari possint, ad varios adhibentur usus, planæ similes descripsit nobis doctissimus *Clusius*, *Exot. lib. 3. cap. 8.* sub nomine

Lobi crassi, ex insula *S. Thomæ*, & refert quod ob cordis figuram à nonnullis *Cor S. Thomæ* vocatur, sed magnitudo nimium differt; ut & *Joh. Bauhinus*, *tom. 2. lib. 17.* sub nomine *Phaseoli novi orbis* sive *Faba purgatricis latissima variatio longioris*.

Mai-coraná Lav.
നട്ടുക്കായ *mal.*
قنقن *Arab.*
കുടന്ന *bram.*
quilo



N A I - C O R A N A.

T A B. X X X V.



N *Ai-Corana*; secundum Bramannes, *Guilo*; Lusitanos, *Fabas Cuseira*; Belgas, *Maagde Kruyt*, floret mense Julio & Augusto, circa *Mangatti*, *Poiga* & alia loca. *Radix* fibras suas capillatas latè supra arenam diffundit, cujus cortex albus, infuscatus, filamentis lignosis minus arcte contextus, odoris gravis & aliquo modo acuti. *Cauliculi* rotundi, glabri, claviculati. *Folia*, quorum pediculi longi, glabri, rotundi, claviculati, terna congregatim proveniunt, oblonga, in cuspidem contracta, valde tenuia, superficie plana, glabra, raris ac minutissimis pilis obsita; medium hastæ simile est; lateratila ferme duplo latiora sunt ac magis incurvata. *Costa* media etiam in recta parte nonnihil eminent. *Flores* papilionacei, tetrapetali, diffformes, quorum unus unguiformis, rigidus, transparent, venulis in longum striatus, dorso extuberante, ac cum stylo, qui ad dorsum aecumbit unguam constituens, duo ad latus angulum amplectentes, surrecti sunt, oblongo angusti, venulis in longum striati, unâ parte ora parum rotundiori, colore purpureo-rubicundo-fusco: quartus ad quem unguula cum rostro inflexa est, brevior est, rigidiusculus, latus, unguiculas cæterorum succingens, purpureo albicans, odoris nullius. *Stylus* qui in unguula continetur crassus, theciformis, albicans, in tenuia fissus staminula, flavis apicibus, lingulisque in vertice dotata, in parte verò concava tenui lira striatus, tenui, libera, albicante staminula obducta, quæ stylum transmittit albicantem ac pilosum, è rudimento siliquoso oblongo ac viridi originem trahentem. *Calix* quatuor cuspidata, viridi diluta & difformia habet folia; maximum, breve florum folium, arcte substringit; duo angustiora sunt & minora, etiam unguiculas foliorum arcte complectentia; quartum laxum est cum cuspe longiori, folia surrecta ad dorsum unguulæ excipiens. *Gemmae* flo-

florum cuspidatæ. *Siliquæ* quatuor ferme pollices longæ, & digitum latæ, ad originem & summitatem in contrarias partes intortæ, parum planæ, superficie exteriori in totum villosæ, seu pilis densis, longis, tenuibus obsitæ; urticarum instar non modo pruritus excitantes, sed etiam supra illas pungentes & ardentes, qui ardor non facile, nisi herbam *Thumba* pro antidoto adhibeas, tollitur; coloris ex una parte arancei ac nitentis, ex alia aranceo viridescentis. *Semina* seu fabas in se continent quinque vel sex, æquæ latas ac longas, à se invicem intersepimentis distinctas, oblongo sunt angustæ, oculis ex latere adhærescentes, coloris primum viridis, dein nigricantis surdi, saporis subamari. *Radix* decocta & assumpta urinam promovet; cum oleo concocta dolores arthriticos sedat; morbum sacrum, facta perunctione sanat; cum radice *Cocinil* & oleo insigne remedium est pro urina purulenta: *Folia* trita & apposita, summo cum successu in ulceribus adhibentur. *Fabæ* comestæ motus excitant venereos.

T A B. X X X V.

Thascolus hæc planta *Zurattensis* est siliqua hirsuta, pungente, *Cobuge* dicta, *Raji Hist.* *Morison. hist. part. 2. fol. 69.* Doctissimus *Rajus hist. plant. lib. 18. cap. 1.* de viribus hujus plantæ, hæc habet. *Hujus planta siliqua duodecim, in duobus cerevisiæ sextariis infunde, & insusum proprina, ad quartam sextarii partem singulis matutinis, certissimum est hydropis remedium. Comunicavit D^o. Husbandus Eques auratus, qui in insula Barbados aliquot annis vixit, ejusque sæpe in servis suis Ethiopicis experimentum fecit.*

Pisum giganteum W. & A. 3. 1801

Mucuna gigantea

Pars 8 Tab. 36

Kaku-valli Lat.

കക്കുവല്ലി mal.

Cairóli

काङ्गोळी bram.

قحاقو ولى Arab.



Pisum altissimum
Jey. Am. 211

K A K U - V A L L I .

T A B . X X X V I .



Aku-Válli, lingua Bramannes, Lusitanorum, *Faba Coseira*, Belgarum; *Groot Maagdekruid*. Nascitur circa *Parou* & in aliis locis. *Radix* crassa, fibrosa, lignosa, cortice crasso flavo ac cuticula nigricante obducto, ligno albicante in circulos striato, à striis rectis, ex circuloꝝ meditullio intrestincto. *Stipes* hominis crassitiem æquans, cortice crasso, fusco cinerescente in gummosum, ruffum, glutinosum liquorem, ubi insectus exsudante; rami rotundi glabri, virides. *Folia* in petiolis oblongis tenuibus viridibus qui ad exortum extuberant terna proveniunt, suntque oblonga anterius cuspidata, spissa, crassiola, glabra, viroris in recta facie saturi & nitentis in adversa diluti: folia lateralia laterc quod à medio aversum, latiori. Cum *Costa* media, quæ costas transversas emittit ex petiolo utrinque una costa exit, in adversa maximè eminentes. *Flores* fabacei, tetrapetali viridi diluti transparentes ac rigidiusculi, unum folium brevius est & latius, oblongorotundum & venulis ex unguiculo lato nonnihil striatum, reflexum, alterum unguulatum cum rostro folio latiori obversum; duo folia angustiora ad latus unguulati folii consita, falcata, surrecta, cum ora rectiori folio latiori obversa, ac interius velut inflata; suntque flores in foliis colore viridi-diluto, in dorso unguulæ exterius albicantes ac parum nitentes, odore nullo: intra unguulatum folium stylus est albicans theciformis, versus folium latius inflexus, parte superiori in novem stamuncula, quæ apicibus flavo fuscis, surrectis dotata sunt, fissus, ad concavam partem ubi sulcatus lyra tenuè stamine libero adjacente, quod suo apice nodulatum obductus. Ex medio *Stylo* emicat filamentum tenue viridi albicans ex rudimento siliquæ quod in umbilico calicis est prodiens ac supernè capitulo crasso oblongo viridi fusco, piloso ac ni-

R

tente

2. Policho altissimus
Jug. an. 261

tente nodulatus. *Calix* latus profundiolus parte qua folium latius est, arctius substringens, & hinc inde ex altera parte arcuatis oris in cuspides breves sinuatus, colore viridi diluto & exterius longiusculis flavorubris aut fulvis nitentibus ac decumbentibus pilis, qui facile deteruntur, obfiti. *Gemmae* florum oblongae ac cuspidatae, calice fulvo obteetae. *Siliquae* longiusculae longitudine unius spithamæ, latæ tres pollices, pede stricto, arcto è calice laxo prodeantes; suntque compressæ in oris ad futuras quatuor alis, in singulo latere unâ, strictæ, cortice viridi, ac densis longiusculis, fulvis, nitentibus ac decumbentibus pilis densè obductæ, cum teneriores ac digitum plus minus longæ, in pilis fulvi aurancei, cum vetustiores fulvi ac spadicei, intus carne viridi diluta ceu albicante, suntque hæ filiquæ ut & folia calicis, ac petioli admodum pilosi insignem accerimumque pruritum excitantes: siccæ glabræ sine pilis ac cortice nigricante, & interiori corticula quæ præ ficitate laxatur spadiceo dilutæ & nitentes. *Semina* rotundiola & plana sunt, jacentque tria, quatuor quinque in una filiqua in latis loculamentis, quæ intersepiementis carneis a se mutuo distincta sunt, circumdata maxima parte in ora unguia viridi, quæ futuræ ex qua unguia procedit firmiter adhærent, cortice crasso, primum albicante, subflavo, nitente, dein spadiceo rubro ac nigrescente, intus pulpa candida, densa; tria horum seminum comesta mortem adferunt: In filiquis semina minuscula albicantia ceu candida capacitatem loculamenti tantum ex parte implere primum conspiciuntur, reliquam partem vacuam relinquentes. Hujus plantæ virtus in Arthritide conspicua est: ejusdem *folia* gravidas mulieres a capitis vertigine liberant, quippe & in aqua orizæ decocta superfluos humores exsiccant: illius *Cortex* cum zinzibere sicco, fructuque *Caringolæ* contritus & in oleo *fosule de Enferno* ac *Bepu* coctus oleum elargitur, quod medullæ spinali inunctum icheumata ac nocivos catharros compescit: Ejusdem *nucleus* rejecta interiori cuticula vaccino lacte ac butyro recenti coquendo permiscetur in Unguenti consistentiam, contra pustulas &

& ulcuscula in mulierum præsertim pudendis prodeuntia; Idem cum planta, *Felis Oculis* dicta in Orizæ lotura & ebutyrato lacte decoctus unguentum contra articulare morbum præbet; Idem efficit *radix* si cum radice *Carimbolæ* & *Caniram* ac foliis *Muniæ* in linimenti forma usurpetur; vel si cum *Tamarindorum* cortice & *Zinzibere* sicco pulveretur, atque primo lactis sero, dein simul oleo *Bépu* incoquatur ad linimentum.

T A B. X X X V I.

Conspicua hæc planta est præcedentis, sed omni ex parte major; atque ideo *Phaseolus Indicus* | *siliqua majore pungente*, summo jure, meo judicio appellari potest.



Putrja-paerú Lat.
മലയാളം Mal.

mugi

മുগി bram.

پوتریا پاریز Arab.



P U S T J A - P A E R U.

T A B. X X X V I I.




Est species *Paeru*, lingua Bramannum, *Mugi*; Lusitanorum *Fabas Cuseira Pequeno*; Belgarum, *Klein Maagdekruid*, nascitur in *Angicacmal* & aliis locis, sinuosis ramis fevinciens. *Radix* fibrosa, lignosa, albo-rufescens. *Caules* ac rami tenues, pampini formes & cymis ad diversas partes reflexis, virides, pilis vestiti, ac ad tactum subasperi. *Folia* terna numero in petiolis viridibus, rigidis, pilosis ac spithmam ferme longis, qui ad exortum ventre crasso, aqueo, viridi diluto extuberant, ac interius sulco striati sunt, proveniunt pedunculis brevibus, crassis, suntque cuspidata, contextura tenuia, lenia, raris pilis in utraque parte obsita. *Costa* media laterales habet, utrinque eminentes, maximè in adversa: Medium folium lateribus est æqualibus; quæ ei lateralia, latere averso magis dilatato sunt, per quod costulæ transversæ ex petiolo excurrentes altius ascendunt, quam quæ per latus decurrunt. *Flores* sunt fabacei, coloris flavi, tetrapetali, quorum unum folium latius, rotundum & ex viridi magis flavescens, duo quæ folium ungalatum ad latus amplectuntur angustiora & magis saturè flava, & dilutè viridescentia: folium ungalatum magis ex flavo albicans ac se in duo folia velut findens; odoris expertes. *Stylus* ungalatus albicans ac nitens, supernè in decem *stamina* fissus, quæ flavis rotundis gemmulis dotata seu nodulata sunt, in se continens germen filiquosum cum filamento viridi, quod ex vertice emittit. *Siliquæ* rectæ, angustæ, duos tresve pollices longæ, longiusculis, hirsutis, subasperis pilis albicantibus obsitæ. In hisce filiquis parvæ *fabæ*, oblongæ, teretes continentur, in tractu longitudinis cum sua longitudine sitæ, ac intersepimentis-membranaceis sejunctæ, decem plus minus in una filiqua, suntque primum viridi

flavescentes, siccæ spadiceo fuscæ, nitentes, gustu haut dissimiles ciceribus communibus, siliquæ siccæ exterius in corticè planè nigricant ac interius spadiceo diluti sunt coloris. Integra hæc planta cum quatuor *Alu* speciebus contrita atque in lotura orizæ *Patsjeri* (*Oriza Patzejri* oblonga teretia simul ac pingua habet grana, multæ enim sunt orizæ species ex quibus hæc quidem maximè apud Malabares usui Medico inservit) ac sero lactis addito melle in linimentum decocta exanthemata tollit: Cum nigro *sale* oleo *Foule de Enferno* mixta ptoram, pruritusque fugat: Cum vaccino lacte trita atque vel potiunculæ vel linimenti forma usurpata, morsus glirium & scorpionum malignitatem prepedit, endemiumque testium tumorem duritiemque minuit. Ramusculorum cortex cum *Mangeræ*, *Ambalangeræ* cortice contritus & in aquari orizæ decoctus atque ita spinali medulla illitus arthritidem eradicat, atque gonorrhææ virulentiam pellit, si cum *Mirabolanis*; radice *Mottenga* aliisque lotura, orizæ ac melli ad Cataplasmatibus consistentiam coquatur. Eadem porro miscella foliis *Perigil* addita, argilla obducta atque inter carbones torrefacta oleum effundit contra lepram & phagædemica ulcera: Radix autem cum foliis *Pavettæ*, *Hummatuque* trita succum stillat qui cum oriza *Patsjari* in cataplasma componitur ad lancinantes testiculorum dolores mitigandos; vel cum radice *Peragu*, tenellis *Peralii* foliis, ac virente *Curcuma* in lotura orizæ decocta, hæmorrhoidibus adversatur, quas si comitentur ulcera, sinuosa licet, commiscetur hæc radix *Zinzibere* sicco, *Calamo* aromatico, *Melle* atque *Cumini* semine tosto pro haustu: triturata porro eadem cum floribus *Tsjem-pariti* utroque *Sandalo*, foliis succoque *Betel* lentiginem, alphum, melamque delet, quod si successu careat adjungitur fructus *Tageræ* ac *Cynoglossæ* succus.

T A B. X X X V I I.

Patsja Paeru, omnium est minima, ac etiam | descripta, quam ab hoc nostro, atque ideo de
cum maxima à nullo, quod sciam, antea Authore | illis nihil vel ulterius indagari vel dici potest.

Schanga-cuspi Lax.
 മറ്റു പേരുകൾ. mal.
 چانغوي پوجشنام arab.
 gocarni
 गोकर्ण bram.



S C H A N G A - C U S P I.

T A B. XXXVIII.



Changa-cuspi; lingua Bramannum *Gocarni*; Lusitanorum, *Fabas de Brhamanne*; Belgarum, *Smalt kruid*, nascitur in campis circa *Warapoly*, semper florens; quæ etiam in Horto Medico Amstelodamensi excolitur. Cauliculis palmitum more currentibus se affigens. *Radix* brevis, tenuis ac fibrosa est & albicans. *Cauliculi* tenues, rotundi, lignosi, nodulati, viridi-clari cum teneriores sunt, pilisque minutissimis rarioribus obsiti. *Folia* bina & bina proveniunt in singulis furculis ceu furculorum ramulis, passim tria, paria, cum uno in vertice, quorum bina quæ cauliculi proxima, nonnihil minora reliquis, quod in summitate autem majus est; forma sunt rotunda, parum oblonga ac antè rotunda ora, tenuia, mollia, utraque parte pilis minutissimis sed raris obsita, subaspera, colore in parte adversa viridi-claro. E *Costa* media costulæ utrinque quinque vel sex oblique anteriora versus exeunt, utraque parte eminentes. *Flores* supra folia ex nodulis furculorum proveniunt, albicantes, fabacei, constantes foliis quatuor, unum unguiforme subviride cum stylo quem complectitur unguam constituens, duo surrecta unguula intermedia arcte complectuntur, colore subviridi, in longum costulis exterius striata ac costula media viridi eminente, è qua hinc inde costulæ excurrentes oblique & annulatim reflexæ in oras incurrunt tractuum suorum lyras in recta parte relinquentes; quartum folium, quod exterius est & versus quod unguula inflexa, grandiusculum ac rotundiolum ac versus exteriora nonnihil inflexum, in exteriori superficie ex petiolo ceu calice instar unguulæ equinæ excurrentis & unguulam cum duobus foliis lateralibus circumplectens; nullius sunt odoris. *Stylus* viridis quem unguula in se occultat superius in filamenta de-


decem, quorum singula nodulis subflavis dotata sunt, se dividit, in se recondens filamentum quod in summitate pilis barbato est, ac ex germine filiquoso prodit. *Calix* quinque foliorum *Siliquæ* longiusculæ, angustæ: *fabæ* oblongæ sunt & nonnihil compressæ, cum sua longitudine confitæ in longitudine filiquarum, quarum saturæ ad unam partem cum unguis lateralibus adhærent, suntque primum viridi dilutæ, maturæ ac siccæ coloris cinerei ac nigris punctis conspersæ. Est & alia species *Schanga-cuspi* in nullo alio differens nisi in colore florum, qui cæruleus est. *Succus* ex eo expressus ac cum oleo de *Schirgelim* epotus vomitum excitat; ejus *Radix* trita & epota cum aqua calida ventrem laxat. Reliquæ virtutes ut illæ præcedentis plantæ.

T A B. X X X V I I I.

Schanga Cuspi est *Flos Clitorius Tarmatensis* *Brey- ni, Centur. I.* At hæc nostri Authoris flores habet albos, & varietas in colore tantum consistit, | cum utraque detur species. Pertinet hæc planta inter genera *Phaseoli*.



Könni Lat.
Bam mal.
Latená-gundi
रतनगुडी bram.
فوني Arab.



K O N N I.

T A B. X X X I X.



Omni; Lusitani dicunt, *Fruita Contsj*; Belgæ, *Ronde Weeg bónen*, secunda species est *Mangielin*, nascitur circa *Cochien* & per totam *Malabariam* florens mense Augusto. *Rami* virides, ligno albicante. *Folia* in petiolis viridibus, qui ad exortum ventre viridi diluto extuberant, & interius lato sunt striati sulco, geminata ac in duabus proveniunt seriebus, oblonga, rotundâ orâ, texturâ tenuia, mollia, superficie plana, lenia, glabra. *Costa* media in adversa parte leniter eminent. *Flores* fasciati videntur, papilionacei, rubescentes, ad dilute ad persicum vergentes, tetrapetali; quorum unum foliolum lato rotundum, internè circa medium sature rubescens, alterum unguatum angustum, cum rostro versus folium latius inflexum; duo reliqua angusta, surrecta, folium unguatum ad latus complectentia; odoris nullius. *Stylus* in medio theciformis, unguatus, candidus, nitens, in staminula, flavis apicibus nodulata, fissus, ac stamen breve viridiusculum includens. *Calyx* rotundus cyathiformis, viridi albicans ac subrubescens. *Siliquæ* oblongæ sunt, rectæ, ad latera compressæ, virides, maturæ flavescentes; odoris grati. *Fabæ* quæ in iis continentur, membranaceis intersepimentis à se invicem sunt sejunctæ, futuræ superiori umbilico adhærentes, rotundæ, duræ, coralline rubescentes, ac macula nigra semilunulata variegata. *Folia* cum *Calamo Aromatico* cum aqua trita vel oleo incocta, lancinantes ex pituita falsa & acri ortos dolores sopiunt. Eorundem pulvis insolatione tostus & cum saccharo deglutitus, acriorem mitigat tussim. *Succus* expressus membrorum dolores ex frigore ortas abigit, crassos lentosque humores discutit, si cum lacte vaccino, oleo *Sergelim*, *Pipere* longo & *Zinzibere* ad linimenti consistentiam redigatur. *Radix* cum *Cumino* in aqua lævigata & assumta, tenacem intestinorum

pituitam incidit ac corrigit. *Fructus* radici admixtus cum lacteo *Nucis* Indicæ succo, hæmorrhoidibus aduersatur.

T A B. X X X I X.

Koni magna species est *Abri*, à nemine antea descriptus; atque ideo meo iudicio *Phaseolus alatus major*, fructu coccineo, macula nigra notata; apud Indos etiam *Anacok* vocatur; sub quo nomine planta hæc mihi A°. 1685. ex *Sirinama* est transmissa. Tres hujus plantæ inveniuntur species, quæ omnes ex prædicto venère loco; illa nempe quæ hic describitur; altera *Phaseolus alatus five Abrus minor* fructu coccineo, macula nigra notata, *Morison*; tertia, *Phaseolus Siranamenfis trifolius*, fructu minimo striato, coccineo colore, macula nigra notata, perennis; quæ hodie in *Hort. Medic. Amstelod.* videre est.



A N A.


Ana-mullu lac.

ἄνα μύλλου Mal.

hasti-cantó

हस्तिकान्तो bram.

عَنْعُ مَوْلُحُو Arab.



A N A - M U L L U.

T A B. X L.



Na-mullu; lingua Bramannum *Hasticantò*; Lusitanorum, *Fabas Turquesca*, Belgarum *Maanbonen*; cujus natale solum est *Tecken-kour* & alia loca, florens tempore pluviolo, semper virens. *Radix* crassa, lignosa, fibras spargens, cujus cortex spadiceo dilutus, odoris suavissimi. *Stipes* pedem ferme crassus, cortice crasso cinereo, ac velut calce hinc inde consperso sub crusta cinerea viridi, ligno albicante duro, ac omni ex parte, maxime autem in pede spinis munitis numerosis, quæ quinque sex vel etiam plures simul ex tuberculis emicant; spinæ autem rectæ, lignosæ, duræ, cuspidatæ, quatuor pollices etiam longæ & pollicem quoque crassæ evadentes, cuspidate interdum inflexo ac intorto. *Surculi* ac rami ex stipite enascentes, tenues, spinis brevibus ac rarioribus obsiti, cum vetustiores nigricantes, teneri viridifusci. *Folia* proveniunt in furculis viridibus, tenuibus, qui quinque sex pollices longi, ac pilis brevissimis leviter obsiti sunt, & hinc inde ex ramis ac etiam spinis emergunt, brevibus rotundis pedunculis in duabus feribus hinc inde appendentia; parva sunt, oblongo-rotunda, in medio anterioris oræ sinu parvo passim incisa, majuscula, quæ ad extremitatem furculi sita unum digiti articulum longa, pollicem ferme lata, contextura densa, superficie plana, glabra, virore in recta fusco & nitente instar *Veluti* ceu holoserici ob subtilissimam pilorum decumbentium lanuginem in adversa dilutiora; odoris nullius, saporis hortensis, cum teruntur fabacei. In medio una tantum est costula in adversa parte eminens. *Flores* umbellati in superioribus ramis supra ex origine petiolorum foliaceorum proveniunt, suntque parvi, papilionacei & candidi. *Stylus* unguis theciformis, qui folio cavo

accumbit, viridi-dilutus, superne fissus in filamenta, quæ croceis apicibus nodulata sunt, filamentum viride quod ex filiquæ germine prodit, per se transmittens. *Calyx* qui florem excipit arctus brevium cuspidum; flores odoris grati, sed debilis. *Siliquæ* digitum aut amplius longæ, rectæ, unum aut duos pollices latæ, valde compressæ, lateribus oppositis arcte junctis, viridi dilutæ, venulis reticulatis striatæ, in oris viridi fuscæ. *Fabæ* quæ in filiquis arcte constrictæ valde planæ, oblongæ & lunulatæ cum sua longitudine in longitudine filiquarum, ac ferme in medio laterum confitæ, ac in medio concavæ oræ viridi uncinulo prominenti firmiter adhærentes in majusculis filiquis numero ternæ vel binæ, à se mutuo latitudine ferme pollicis distitæ, in minoribus una tantum; in filiquis autem foli obversis hæc lunulata femina conspicua sunt ac densiori & opaciori carne circumdata; suntque hæc fabæ lunulatæ, viridi-dilutæ & nitentes, saporis nullius. Præter hæc filiquas numerosi fructus spurii in inferioribus furculis visuntur, nulli vero in superioribus ubi flores vel filiquæ proveniunt, foliis omnes insidentes, ceu particulis foliorum marcescentium, adeo ut primo adspectu ipsis quoque foliorum particulis visui obiectis ramis furculisque insidere videantur, uno constantes folio, vel soli, vel bini, terni passim costulis mediis rarius lateribus insidentes; suntque oblongo-rotundi, viridi-fusci, in vertice uno tenui stilulo præditi, ac rarâ intus cavitate instar vesicularum inflati, in quibus singulis vermiculus albo-flavus hospitatur, cortice rigido, vitreæ ac fragili superficie, intus nitenti & glabra. Cum hujus plantæ spinis cortice dempto Malabares auriculas suas perforant, in quibus ad ornatum aurum gemmasque pretiosas gestiunt. *Vires* hæc planta mystica naturæ vi his incolis antipathetica vel sympathetica, inter amicos nolentes volentesve censetur; ejusdem folia in *orizæ* lotura ac *lactis sero* decoquuntur pro balneo contra ventris ex flatu & extravasata lymphâ intumescenciam; hujus porro simul ac *Beteleiræ* lignum tostum & in pulverem tritum exanthematibus ac exulcerationibus advesatur.

Pacru Lav.
 ۱۰۵۴ Mal.
Janvati
 ३०८१ Bra.
 ۱۰۵۴ Arab.



P A E R U.


T A B. X L I.



P *Aeru*; lingua Bramannum *Sanwali*; Lusitanorum, *Graos da Nossa Senhora*; Belgarum, *Heylbónen*; nascens in *Angiecamal* & alia loca, semper florens. Plures sunt species. *Radix* tenuis, albicans, fibrosa, in fibris rotundis globulis vestita. *Cauliculi* teneri parum lignosi, asperi & viridi diluti. *Folia* in petiolis longis, languidis, subasperis, interius late sulcatis, viridi dilutis, ac ad sui exortum extuberantibus terna proveniunt, ac communi petiolo pedunculis crassis rotundis, brevibus, viridi fuscis adhærent, suntque oblonga & cuspidata medium est hastæ simile ac lateribus uniformibus, maxima ad pedunculum latitudine, rectisque vel tenuiter incurvis oris in cuspidem stricta, quæ lateralia uno latere, medio folio proximum angustiori, altero vero latiori, ac ad pedunculum latè dilatato & exprorecto, suntque subaspera, colore viridi fusco, in adversa viridi-claro. Cum *Costa* intermedia costulæ utrimque obliquo annulari ductu superiora versus exeunt, in adversa parte eminentes, ac nonnihil in recta. *Flores* in summitate petioli surrecti rotundi qui ex origine petiolorum foliaceorum exoritur, tres quatuorve congregati brevibus pedunculis proveniunt, papilonacei ac cerulei, exteriora versus reflexi, uno folio ungulato albicante quod cum rostro versus folium latius inflexum, ac interius hiat, & duobus oblongis angustioribus surrectis, cæruleo-saturis quæ rostrum ungulati folii complectuntur. In medio *stylus* ungulatus, theciformis, albicans, & supernè in stamun-

cula novem albicantia tenuia fissus, quæ apicibus flavis dotata, & in concava parte uno stamine, quod etiam flavum gerit apicem, obductum, ac filamentum viride in summitate barbatum, cujus exortus est in filiquoso rudimento, quod in se recondit. *Calyx* cuspidatorum est foliorum. *Siliquæ* rectæ, oblongæ angustæ petiolo longo appendentes, primum virides, dein flavescentes ac probe maturæ rubescentes. *Semina* quæ in iis continentur oblongo-rotunda sunt, umbilico futuræ affixa; maxima longitudine, in earum longitudine ad se invicem consita & tenuibus membranaceis intersepimentis sejuncta, siliquasque adeo implentia ut subtus corticem extuberent, colore primum viridi, dein albicante, denique ex maturitate flavescente ac ruffo. Hujus plantæ semina cum utroque *Sandalo* & *Cumini* semine tritis secundum artem in aqua decocta potionem emittunt in gonorrhæa utilem: Eadem cum fructu *Mottenga* vel *Nelica* & cortice *Patsjotti* atque *Mâra-manjèl* aliisque in vaccino lacte decocta cephalicum sudant balneum: Ex iisdem seminibus fit pulvis qui alterutro *Sandalo* vel *Tamarindorum* contusis fibrillis, radiceve, vel succo *liquiritiæ* mixtus cæphalæam ex viscosa pituita atque oculorum phlegmonem ex hac obstructione ortam corrigit: idem pulvis *Cumini* semine & *melle* commixtus præcordiorum ex mordicantibus halitibus oriundum æstum emendat. Cum floribus *Neli* & succo *limonis*, singultientibus propinatur: Trita eadem cum *tritico* tosto ac in farinam trito, *ficibus* Indicis elixatis pulveratisque ac *Zaccharo* candido semina exhibentur in inordinata bilis effervescentia, atque inde scaturientibus vertigine, pectoris æstu, oculorum caligine, phlegmoneque ac stomachi nausea: eadem cum immaturis *ficibus* *melle* aliisque comesta singultum cohibent: Mixta autem cum *allio* oleoque *Sergelim*, *Bepu* & *foule*

foule de Enferno, id est *Foliis Ricinus* seu *Cit-amanacu*, unguentum præbent in artuum lassitudine & articulorum dolore, punctura, tremore, paralyfi, spasmo, aliisque ex malignis frigidisque humoribus ortis malis medullæ spinali inungendum. Hujus simul ac *Curundotti* radix cum *Zinzibere* exsiccato in aqua decocta & cum Butyro epota, vel etiam additis *sempervivi* foliis tritis, linimenti forma usurpata, capitis dolores aufert. Notandum quod tanta harum fabarum quanta cæterorum ingredientium in singulis miscellis compositis debet esse quantitas, quæ apud hosce incolas communiter ad *Mirabolani* magnitudinem pro una dosi sumuntur.



Kātu-paerú Læ.

കാട്ടു പേരൂ Mal.

Pāna-janvali

पानवली bram.

فخاطو پانهره Arab.



C A T U P A E R U .

T A B . X L I I .




Atu Paerù; Bramannes dicunt, *Rana-Sanwali*, Lusitani, *Fabas Caringejo*; Belgæ, *Qualbónen*, circa *Palurti* & alia nascitur loca, florens tempore pluvioso. *Radix* longe prorepens ac fibris albicantibus vestita, intus ligno molli ac lento cortice, crassiole, albicante ac lacteo, terreo-fusco colore. *Rami* seu *Caules* teneri virides & aquei, filamentis laxis pertexti, vetustiores, cortice terreo, fusco ac lacteo. *Folia* in petiolis viridibus interius lato sulco striatis ac ad exortum extuberantibus terna proveniunt, quorum duo transversa videntur cum tertio seu medio in vertice pedunculis crassis appendentes, suntque subaspera; virore communi sub fusco, in recta parum nitente & fusciori, pilis raris ac brevibus tenuiter obsita; transversa sunt laterum difformium, quorum quod à medio folio longius distat latius distenditur ac antè in cuspidem contrahitur. Quod in vertice, est hastiforme in cuspidem desinens & majusculum, uniformibus lateribus cum maxima latitudine propius ad pedunculum sita. *Costa* media costulas transversas obliquè fundit, ac etiam cum iis in recta eminet, licet magis in adversa. *Flores* papilonacei, rosaceo saturi, purpurei coloris, quatuor constantes foliis, unum latum rotundum, albicans, exterius sub purpurascens, ac prope ad unguiculum macula flava notatum: folium unguulatum quod huic oppositum, latum & candidum est cum cuspidem seu rostro, quod versus folium latum inflexum, cochleatim intortum: duo folia quæ unguulatum ad latus amplectuntur ac falciformia una ora, qua a folio lato averfa convexiori sunt, ac antè rotundiori ambitu, & interiora versus crispa ac in inferiori parte oræ concavæ folio unguulato affuta & annexa, exterius rosaceo

ceo-faturo-purpurea, interius dilutiora & albescentia, ex unguiculis ut folium latius venis striata. *Clausi* unguolata forma & virides. *Calyx* rotundus, viridis ad partem folii unguolati trium cuspidum, ac ad latera inferius duobus brevissimis foliolis seu cuspidibus succinctus. *Stylus* in medio theciformis candidus à folio unguolato exceptus in novem filamenta, oblonga quæ flavis oblongis apicibus nodulata sunt, supernè fissus, ac uno filamentum in parte concava ubi lyra striatus, obtectus, transmittens filamentum crassum candidum, quod supernè flavo capitulo oblongo, estque cuspidis intortus folii unguolati candidus & nitens, ob flavum istud capitulum, apicesque flavos transparentes, etiam flavum apparet. *Siliquæ* compressæ, rectæ, parum inflexæ, sex pollices longæ, medium digiti articulum, cum virides ferme latæ; suntque siliquæ primum virides, siccæ cortice ruffo diluto ceu flavescente, ceu argenteo & nitente. *Semina* quæ in iis confita cum uncinulis futuræ ventris annexa, ac in cortice extuberantia & in propriis oculis per intermedia farinacea candida intersepimenta a se mutuo diffita, in cortice extuberantia, liris parallelis paulo obliquè striata; forma nonnihil quadrilatera ac convexa; primum viridia & nitentia, post coloris spadicei subviridis, ac signo uncinulæ albissimo. Integer hic *phaseolus* cum cortice *Mulæ* arboris in pulverem redactus, *Saccharoque* puro ac *vaccino* lacti incoctus gonorrhææ, *orizæ* vero loturæ commixtus flatibus, cum solo *lacte* præparatus dempto tamen cortice, diabete adversatur. Eiusdem *radix* cum *Feribeli* utroque *Sandalo saccharoque* ac consimilium virium aliis, addito *butyro* recenti in linimentum inspissatur, vel eodem omisso in pilulas mane diglutiendas formatur, vel etiam adjunctis *Sandalo*, *Butyro*, jusculo *Gallinaceo* succo *liquiritiæ*, *lacte* *vaccino* &c. in balsamum excoquitur, atque tribus hisce modis contra quævis oculorum vitia, suffusionem, pterygium &c. servatis exactæ dietæ regulis cum utilitate exhibetur.

T A B. XLI. & XLII.

Fructus *Paeru* & *Katu Paeru* pro cibo adhibentur, ut illi *Thola Paeru*, *part. 6. pag. 23.* descripsi, qui uno communi nomine *Kajan* vel *Katsjan* appellantur; à Chinensibus *Lak Goetum*, qui hasce plantas omni cum diligentia excolunt, quorum nutrimentum valde bonum & confortans. Vide *Nicuhoyii Itinerar. pag. 268.* Secunda hæc *Katu-Paeru* species ejusdem est sylvestris; priorem *Phaseolum Indicum trifoliatum* minorem, flore caruleo, fructu minore; posteriorem *Phaseolum Indicum trifoliatum sylvestre*, flore purpurascente, fructu majore, nominavi.





Kātu-tojāndi Lav.

കടലാസ് മാല. mal.

Canavali

कानवाली bram.

قحاطون چيانضحي Arab.


C A T U T S J A N D I.

T A B. X L I I I.



Atu-Tsjandi; Bramannice *Canavaly*; Lusitanicè, *Grao do Boy*; Belgicè, *Oyle bonen*, nascitur circa *Cochien*, florens mense Januario, semper virens. *Radix* brevis, fibrosa, nonnihil capillata, colore nigricante. *Cauliculi* sinuosi ac implexi, tenues, rotundi, colore viridi-flavescente. *Folia* in petiolis brevibus interius sulcatis pedunculis brevibus crassis nonnihil pilosis & sub-ruffis, terna numero proveniunt, quorum illud quod in vertice magis amplum, anterius rotunda ora ac cuspede brevi, ac exteriora versus inflexo eminentia, colore viridi. Ex *Costa* media costulæ transversæ obliquè anteriora versus excurrunt, in adversa parte eminentes, minus in recta transversis nervulis, venulisque cancellatim intertextæ. *Flores* qui supra exortum petiolorum foliaceorum congregati proveniunt, in furculis seu petiolis longioribus sunt papilionacei constantes quatuor foliis, quorum unum versus quod unguatum folium cum suo rostello inflexum, latius est, ac in summitate tenui hiatu incisum ac cum oris exteriora versus nonnihil inflexum, colore exterius pallido albicante, interius rosaceo saturo cærulescente, unguiculo lato viridescente, in medio rima inferius fissum, colore rosaceo-ceruleo-claro: duo folia quæ unguatum ad latus amplexantur angustiora & inflexa, colore quoque ex rosaceo claro cærulescente: *Stylus* quem folium unguatum includit crassus, theciformis, candidus, versus folium latius inflexus, supernè fissus in novem tenuia stamuncula quæ apicibus flavescentibus, crassiolis, farinaceis dotata sunt, ac lyra, quæ & stamunculo candido arcte impletur in concava parte sulcatum: in medio *stylo* filamentum candidum, crassum, quod viridi gemmula nodulatum est, inferne viridi-dilutum ex germine filiquæ emicans. *Calyx* florum rotundus & profundiusculus, viridi clarus & venulis in

longum striatus, ad partem unguinati folii tribus apicibus nonnihil acutis & ad latius folium duabus laciniis rotundis latioribus florem arripiens ac succingens : suntque flores odoris suavis ac mellei. *Siliquæ* eadem ut *Catu-Bara-mareca*. Hujus *folia* cum cortice de *Canja* succum fundunt, qui cum *butyro* coctus glandularum tumores atque ecchymomata : cum *Sinapi* vero allioque trito, torrefacta & epithematis forma applicata ventris tormina dissipant, adjecto autem pulvere dicto *Malabaribus*, *Astasurnam-podi* suffumigium suppeditant, quod dolorosam artuum lassitudinem tollit.




Baramareca L.

ബദ്രമരയ്ക്ക മാ.

Dala-rallu

दाळवाळ ब्रह्म.

دالوا Arab.



B A R A - M A R E C A .

T A B . X L I V .



Ara-Mareca; Lusitani dicunt *Favas dos Paros sativo*; Belgæ, *Tamme Crimponen*, planta domestica est & sativa, eadem cum priori, nisi quod siliquæ grandiores, quodque fabæ sint in eduliiis. Nascitur in *Angiecamal* & aliis locis, fructus circa initium temporis æstivi proferens maturos. Hujus *folia* in aqua *orizæ* vel immaturæ *nucis Indicæ* succo contrita propinantur cachecticis: ex *fructibus* autem cum *zingiberis* sicci ac *piperis* longi mixtura fiunt pillulæ antispasmodicæ; ex iisdem, dempta interiori pellicula cum cortice *Muringu* triturationis, conficitur linimentum antiarthriticum, quippe hujus plantæ præstantia in arthritide elucescit, vel etiam cum radice *Vattæ*, *Calamo aromatico*, cortice maturo fructus *Arekæ* dicti *Pinang* in aqua *Orizæ patsjeri* & olio foliorum de *Enferno* mixtis, vel etiam cum *Curcuma*, *cynoglossô* Malabarico aliisque, lacteo *Indicæ nucis* succo, ac oleo foliorum de *Enferno*, vel denique cum tribus *Alu* speciebus *orizæ* lotura ac dicto oleo copulatis.

Katu-barumareca Lev.

കട്ടുലളുരയക്കു mal.

Canavallu

கனவால் bram.

قناطرو و كلالعرقا arab.



CATU-BARAMARECA.

T A B. X L V.




Atu-Baramareca; lingua Bramannum *Rana-Valu*; Lusitanorum, *Favas dos Paros*; Belgarum, *Krimphonen*, planta sinuosis ramis se vinciens nascensque in arenosis circa *Cochien* & alia loca, semper ferè florens, ac cum *Cáta Tsjándi* maxima parte conveniens, præter quod pene sit venenata, corpori noxia & dolorem excitans. *Folia* terna proveniunt uti & in *Cátu-Tsjándi*, suntque hæc oblongo-rotunda rotundæ oræ antierius, cuspidè oblongo eminentia, contexturâ crassa, mollia, superficie lenia, virore utrinque fusco, superiori parte nonnihil nitente; *Costa* media in adversa maxime eminent, minus in recta: à foliis *Cátu-tsjándi* differunt, quod illa multo minora & rotunda sint ac antierius obtusa ora sine cuspidè; hæc oblongiora. *Flores* fabacei forma, colore ac odore cum *Cátu-tsjándi*. *Siliquæ* nonnihil incurvæ ac ferme spithamæ oblongæ & tres quatuorve pollices latæ, in superiori parte maxima latitudine, dorso acuto, rotundiolo, ventre non acuto, sed plano, nonnihil concavo, pollicem ferme lato, ac antierius in cuspidem protenso, & in dorso ac ventre limbulo ceu nervo viridi-fusciori obsitæ, lateribus valde extuberantibus & convexis, quæ proximè ad ventrem magis exturgescunt, & ad dorsum magis extenuata sunt, cortice crasso, qui primum viridis & glaber, & intus tunica carnosâ, humida, subviridi obductus, siccescens colore spadiceo fusco & plurimis rimis ceu fissuris, quæ ex ventre oblique in dorsum excurrunt fatiscens, in interiori tunica argentei coloris ac villosus. *Fabæ* quas continent ac umbilico futuræ mediæ ventris, in cujus tractu relaxantur, adhærent, sunt oblongo-rotundæ & lateribus nonnihil convexis cum sua longitudine in longitudine siliquarum confitæ, in una ora laterum umbilico oblongo præditæ, cortice spadiceo ruffo & glabro, qui primum ubi fabæ teneræ,

subviridis, albicans, pilosus ceu villosus, ac laxus. instar
 facculi, umbilico cinereo, qui limbulo spadiceo fusco cir-
 cumdatus; sub cortice nucleo albo & denso; qui saporis
 fabacei subdulcis, sed non sunt in eduliis, in fabis cum
 teneræ sunt ac pellicula albicante denudantur in medio in-
 ferioris partis oculus oblongus se prodit, qui ad fabæ ro-
 tunditatem cum cuspidate versus umbilicum fabæ inflexus
 est, saporis ingrati silvestriis.

T A B. XLIII. XLIV. XLV.

Tres hæ fabarum species peregrinæ, a nostro Authore recensitæ, omnes ad genera pertinent
 Lobi, cujus diversæ species à Clusio in *Exoticis*, & Johanne Bauhino Tom. 2. lib. 17. describuntur.



Tojeria-Sametti-valli Lac.

മല ദക്ഷിണ ഭാഗത്തു മാല.

Ura-valli

ഉപ്പുവാനി ^{bram}

جَهْرِيَا فَخَامِطِي وَاللَّيْ Arab.



T S J E R I A C A M E T T I V A L L I .

T A B . X L V I .



Sjeria-Cametti-Valli; à Lusitanis, *Fabas d'Aya*, à Belgis, *Salcken*, vocantur; planta est nascens circa *Cranganoor* & *Cochien*, semper fere florens vel frugens. *Radix* fibrosa, nigricans ac interius cortice rubro, ligno albo.


Stipites lignosi, fusci ceu nigricantes ac cum vetustiores sunt, interiori cortice rubro; cum minus vetusti, interiori viridi, teneri autem viridi cortice. *Folia* in propriis furculis tenuibus, viridibus, qui in exortu ventre extuberant, ac interius sulcati sunt, terna, quinave proveniunt, suntque oblongo-rotunda, ad pedunculum latiusculo & rotundo ambitu, & inde in cuspidem oblongum stricta, contexturâ densa & mediocriter crassiola, superficie plana, glabra, viroris in recta fusci & nitentis, in adversa dilutioris. *Costa* media albicans in adversa parte eminent. *Flores* proveniunt congregati in viridibus rotundis petiolis ceu furculis qui supra ex origine furculorum foliaceorum oriuntur, quibus pedunculis parvis viridibus, & in singulis pedunculis bini, terni adhærent; suntque parvi, fabacei, constantes quatuor foliis, qui primum cum clausi ceu in gemmis sunt ex albo-subrubescent, post aperti rubore dilutissimo seu albicantes, unum folium latius & summitati furculorum magis obversum, alterum unguiforme, & versus folium latius inflexum, ad cujus latera duo angustiora ex albo nonnihil subrubescentia ac cum stylo medio quem includit versus illud inflexum. *Stylus* qui folio unguato accumbit ac versus folium latius quoque inflexus, superne fissus in *stamina* novem tenuia albicantia, quæ flavis nodulis dotata sunt, ac in concava parte ubi lyra striatus, uno stamine quod & flavo apice nodulatum, obductus, transmittitque filamentum albicans, quod ex filiquoso viridi germine ceu stylo erumpit. *Calix* crassus, rotundus, laxis ac fusce-rubescens, flores odoris

nu-

nullius. *Siliquæ* sunt parvæ, oblongo-rotundæ, articuli ferme longitudine, latæ unum pollicem, compressæ, viridi-dilutæ ceu viridi-flavescentes, oris rotundis, viridi fuscis, in medio latere ad unam partem oræ sinu lacunoso, venulisque ceu nervis exstantibus reticulatim in cortice utrinque pertextæ, ac proxime ad illam oram relicto intervallo nervulo extuberante viridi-fusco obductæ. Intus unum passim *semen* viride oblongum in una parte oræ rotundo ambitu, in altera medio sinu excavatum, qua sinui filiquæ affixum, lateribus duobus compressis, parum convexis ac reniformibus cavitatem filiquæ ad implens, rarius duo, in superficie venulis striantur. *Siliquæ* hæ primum valde compressæ ac foliosa planitie lateribus arcte mutuo accumbentibus, in quibus semen parvum conspicitur per tenuem ac viridi dilutum & reticulatum corticem transparens ac maximam filiquæ capacitatem vacuum relinquens. Eandem cum priore efficaciam obtinet; *Radix* hujus tosta trita & oleo commixta linimentum sudat abscessibus externis adversum.

Penár-válli Luc.
പെനാർ വള്ളി mal.

peti
पेटी bram.
يَغْنَارُ وَاللِّي arab.







fruit. papayanum hinc relatum est
 Lescl. & Arn. Mus. Bot. nat. 37. 418
 Bot. L. C.

folia sunt nimis acuta licet juniorum
 arborum non diffinitely Bot. L. C.

Arbor Toxicaria

Sp.

Artocarpus toxicaria Lescl. Bot. Pans. 56.


Penar-valli Sw.

ဝဏ္ဏိဒဏ္ဍိ mal.

Peti

ပဲဒါ bram.

بِنَارِ وَاللَّيْ arab.



P E N A R - V A L L I . *Fœmina.*

T A B . XLVII. & XLVIII.



Penar-Valli; à Bramannibus *Penaar*; à Lusitanis *Fruita Bandoliera*; à Belgis *Næet-Klim* vocatur; cujus natale solum est *Mangatti*, *Paroe* & alia loca, ingens & latè se dispergens planta est, florens tempore pluvioso. *Rami* virides, striati, spadicei, quorum filamenta lignosa, intus carne viridi humida interpolati, sub cuticula exteriori, quæ facile deglubitur; viridi fuscis. *Folia* cum suis petiolis oblongis, tortuosis, crassis, viridi fuscis, nitentibus ac interius lato sulco striatis videntur, oblongo rotunda, angusta, anterius brevi cuspide eminentia, texturâ crassa, spissa & mollia, superficie plana, viroris in recta parte saturi, umbrosi & nitentis, in adversa parum dilutioris. *Costa* media crassa est, cum lateralibus utrinque extuberans, saporis amari. *Flores* in racemis viridibus, qui supra exortum foliorum erumpunt, proveniunt, monopetali, quinque partiti, ex albicante subviridescentes; cuspides versus inferiora inflectuntur, suntque crassi ac carnosii, intus pilis albicantibus oblongis obfiti, cum pede pollicem transversum longo, qui primordium fructus est. In medio tria crassiola emicant *stamina*, in superiori parte bifida, crispata, ac sibi mutuò juncta, quæ cum tempore ita explanantur, ut in fructu ipso basin ejus triangularem constituent. *Calix* trium est foliorum. *Fructus* fasciati in pedunculis oblongis dependent, formam baltei sclopetariorum (belgicè dicimus *Bandeliers*) referentes, oblongi, tribus rotundiusculis lateribus obscurè extuberantes, circa pediculos strictiores, circa basin latiores, quæ tribus rotundiolis lateribus circumscripta est, & ex centro basi, tribus futuris ad angulos laterum striati, cortice crassiusculo, qui primò viridis, dein ruffi est coloris; in medio columnam habent carneam triangularem; quam inter & corticem *semina*, ad singula columnæ latera, duo

confita sunt oblongo rotunda, plana in centro oblongæ membranæ, quæ tunicæ instar latus mediæ columnæ obvelat, suntque una cum fructibus saporis & odoris ut cucumeres. Ex *foliis* tritis balneum præparatur adversus corporis ætus, nervorum contractionem, minores abscessus atque carbunculos. Ex iisdem cum Vaccino *lacte* ac recenti butyro linimentum antispasmodicum conficitur.

T A B. XLVII. XLVIII.

Quod si forma arboris *Ahoray Thereti* accuratè esset descripta, dijudicari posset utrum planta hæc cum illa conveniret, quoniam inter fructus non minima similitudo intercedit.



C. ... ♂
Pars 8 Tab. 49

Penar-valli M_u



P E N A R - V A L L I . *Masc.*

T A B . X L I X .



St & *Penar-Valli* mascula apud indigenas idem nomen gerens cum priori, ac cum illa ex omni parte conveniens, præter quod hujusce *flores* quinque habeant stamina, ac nullos proferant fructus.

T A B . X L I X .

Quamvis hæc planta nomine *Penar Valli* mascula nuncupetur, nulla tamen inter illas intercedit convenientia.




Kātu-ulunu Lat.

കാതുലുനു Mal.

ududi

உதுதி Tam.

قطقو ووروزضقو Arab.



K A T U - U L I N U.

T A B. L.



Atu-Ulinu; Bramannes dicunt *Udidi*; Lusitani *Grao do Pulia*; Belgæ *Meerboonen*, planta est quæ nascitur circa *Paloerti* & aliis in locis, florens tempore pluviioso. *Radix* albicans, fibrosa. *Caules* tenues, angulati, virides & etiam ex parte rubescentes, pilis longis dense obsiti, asperi, parum lignosi. *Folia* in petiolis oblongis, viridibus, pilosis, asperis, qui ad exortum ventre viridi diluto extuberant, ac duobus foliis viridi-dilutis cuspidatis succinguntur & interius lato sunt striati fulco, terna simul proveniunt, lata, anterius striata, pilis obsita & subaspera, viroris in recta parte surdi: medium folium latera habet uniformia, suntque saporis & odoris silvestris. *Costa* media duas laterales majores, & plures minores dispergit. *Flores* plures congregatim videntur, papilonacei, flavi, *stylum* includunt crispatum, candidum, superiori parte in tenuissima stamina fissum, flavis nodulata gemmulis. *Siliquosum germen* viride, quod oblongum, candidum ac nitens, filamentum superne barbatum emittit, in se tamquam theculam includens. *Calix* viridis, in orificio quatuor habens cuspides. *Siliquæ* oblongæ sunt, ad magnitudinem duorum digiti articulorum, rotundæ, rectæ, viridi dilutæ, pilis ruffo rubris, anteriora versus surrectis obsitæ, duabus instructæ futuris. *Fabæ* forma teretes sunt, latiori futuræ adhærentes, suntque in eduliis. *Plantæ* hujus vires in medicina adhucdum incognitæ.


Dioscorea sativa L.

Pars 8 Tab. 51

Mikilengu Sav.

செங்குடி மல.

مؤقحورینگا Arab.



M U K E L E N G U .

*Dioscorea salutaris
L. et. 1463*

T A B. L I.



U-Kelengu; secundum Bramannes, *Neya*, Lusitanos, *Inhame do Cao*; Belgas, *Hondswortel*, nascitur circa *Cochien*, *Mutan*, & aliis in locis, semper virens, florens tempore pluvioso, sine fructu. *Radix* crassa, carnosa, urens, sed cocta acrimoniam deponit, ac apud indigenas in eduliis est. *Cauliculi* rotundi, lanuginosi, viridi-diluti, sub tunica lanuginosa glabro viridi saturo cortice. *Folia* formam cordis referunt, anterius in cuspidem crassiolum ac rigidiusculum stricta, tenuia, mollia, lanuginosa, viroris clari & diluti, in adversa nempe parte, in recta, plana, glabra ac viroris saturi & nitentis, odore & sapore destituta. *Costa* media cum suis lateralibus in adversa parte eminent. *Flores* petiolis seriatim insident, penta vel hextapetali, viridi saturi, exterius nonnihil lanuginosi, latiori ac profundiori orificio, ex quo stamina quinque vel sex pro numero petalorum emicant, quæ flavis instructa sunt apicibus; in umbilico globulum continent viridem, parvo & lanuginoso excipiuntur calice. *Florum Gemmae* rotundæ, lanuginosæ, nullius odoris. *Folia* in decocto *Orizæ* trita abscessibus medentur.

T A B. L I.

Cogomen *Kelengu* Malabares diversis communicarunt herbis & plantis. Hæc species est *Batalis* silvestris, nascens etiam in insula *Ceylone*, ubi porci cum radicibus faginantur, atque etiam jam jam in Horto Medico Amstelodamensi virens videri potest.



I N D E X.

Prior Numerus Tabulam, posterior Paginam Indicat.

	A.								
A Na-Mullu.		40.	73	Mu-Kelengu.		51.	97		
				Mucca-Piri.		13.	25		
				Mullen-Belleri.		6.	11		
	B.								
B Alia-Mucca-Piri.		11.	21		N.				
Bara-Mareca.		41.	85	N Aga-Mu-Valli.		30	31.	57	
Bela-Schora.		5.	9	Naga-Valli			29	55	
Bem-Pavel.		18.	35	vel					
Bilen-Schora.		5.	9	Mandaru-Valli.					
				Nai-Corana.			35.	61	
				Nehoemeca.			19.	37	
	C.								
C Aca-Palam.		4.	7		O.				
Caipa-Schora.		5.	9	O Rela-Modecca.			23.	45	
Careloe-Vegon.		25.	49						
Cattu-Picinna.		8.	14		P.				
Catu-Bara-Mareca.		45.	87	P Ada-Valam.			15.	29	
Catu-Paeru.		42.	79	Paeru.			41.	75	
Catu-Tsjandi.		43.	83	Pandi-Pavel.			9.	17	
Covel.		14.	27	Pavel.			10.	19	
Cumbulam.		3.	5	Penar-Valli. Fœmina.		47.	48.	91	
				Penar-Valli. Masc.			49.	93	
	E.			Perin-Kaku-Valli.		32.	33	59	
E Rima-Pavel.		12.	23	Picinna.			7.	12	
				Putsja-Paeru.			37.	67	
	K.								
K Aku-Valli.		36.	63		S.				
Karivi-Valli.		26.	49	S Chakeri-Schora.			2.	3	
Katu-Ulini.		50.	95	Schanga-Cuspi.			38.	69	
Konni.		39.	71	Scheru-Pada-Valli.			16.	31	
Kudici-Valli.		27.	51						
	M.								
M Andari-Valli.		29.	55	T Ota-Piri.			17.	33	
vel				Tsjera-Canetti-Valli.			46.	89	
Naga-Valli.									
Modeca.		20.	39		U.				
Modira-Caniram.		24.	47	U Lina.			28.	53	

