

文
戎

九

庫文閣内	
函	漢
架	三
内閣文庫	
番號	漢 12421
冊數	12 (9)
函號	300 216




綴じ部(喉部分)の文字等が開きが不鮮明な場所あり

少陰證




四逆散



茯苓四逆湯

四逆加人參湯

姜附湯



木附湯

易簡真武湯

易簡姜附湯



白通湯

易簡四逆湯


易簡附子湯

白通加豬膽汁湯

通脈四逆湯

四逆加豬膽汁湯

麻黃附子細辛湯



麻黃附子甘草湯

仲景附子湯

四物附子湯

桂枝附子湯

附子白朮湯

少陰證

王朝奉論悸并方

王朝奉辨陰陽證

仲景桔梗湯例

仁宗御名如聖湯

肺癰門

孫思邈單方

耳桔二生湯

苑

海藏紫花散

如聖丸

衍義蛤蚧散

百部丸

錢氏如聖散

搜膿散

橘波茯苓湯

桔梗枳殼湯

黃耆鱉甲散

硃砂膏

定脾散

定肺丸

解毒丹

蛤蚧散

古方紫苑散

增損防風通聖散

咽痛例

咽痛備急丸

人參清肺散

代鍼散

發聲散

解毒丸

消毒散

玉壘丸

赴還散

振博酸枣仁例

胡洽酸枣仁湯

活人酸枣仁湯

八味定志丸

保真定志丸

又方

茯神例

人参茯神湯

延壽丹

保真秘一丹

日月丹

仲景腎氣例

仲景八味丸

茯苓丸

東坡四神丸

天門冬例

鵬砂散

漱菜地黄散

五痺散

聖惠方

酸枣仁飲子

局方定志丸

保神丸

預知子丸

神注丹

補心丹

張天師草還丹

無比山茱丸

易老天广丸

古方天地丸

增損三方丸

魏武帝服天门冬例

易简真降心丸

二茸丸

益斯九

混元丹

又治耳聾方

神注丹

丁香丸

紫石英丸

温经汤

抱朴子法

内茱萸生丸

万子丸

保安丸

大效牡丹皮散

玉抱肚

锦襦法

七宝散

乾荷叶散

乌金散

玉粉散

神效丸

五补例

海藏大五补丸

局方五补丸

瓊玉膏

牡蛎地黄丸

卷第十

素问寒癰疽例

骨碎补丸

虎骨散

千

千金翼地黄丸

明目例

六合丸

益陰丹

諸風例

易老祛風丸

烏白散

龍蛇散

退凡散

黃蘗例

大鳳髓丹

小鳳髓丹

拔毒丹

易老珍珠丸

保真丸

清心丸

鍾進十精丸

十補丸

大和膏

腎氣內消丸

枳壳五倍丸

七仙丸

永壽丹

御方祛風丸

大傳方

復肌丸

正鳳髓丹

解毒丸

固元丸

秘真丸

賀蘭先生解毒丸

火府丹

神仙六子丸

補虛五味子丸

驪珠丹

金鈴子丸

碩夫枳壳茴香丸

碩夫枳壳茴香丸

碩夫枳壳茴香丸

香壳丸

易簡枳壳湯

越婢湯

防己加茯苓湯

甘草廣黃湯

附子廣黃湯

黃耆芍藥桂枝苦酒湯

桂枝加黃耆湯

桂枝去芍藥加廣黃附子細辛湯

枳實湯

海藻集仲景水氣例

仲景葶藶大棗瀉肺湯

仲景十棗湯

三花神祐丸

除濕丹

玄青丹

越^趁痛丸

明理越^趁痛丸

五皮散

調胃白朮沃瀉散

紫苑散

仲景十棗湯

水氣求責法

化水丹

取瘡^頭中痛例

局方神助散

神方

又方

百一方

食治十種水氣

又方

又方治十種水氣

治穀氣方

沈香湯

錢氏塌氣丸

木香塌氣丸

木香散

又方

折傷門

乾城劉家接骨丹真方

接骨散

接骨丹

貼茶

神仙正骨茶

又一方

聖惠方

導帶散

又方

又方

又方

正骨膏

一方

接骨丹

善

療瘍疥癬例

善應膏

神仙太乙膏

摩風膏

白龍膏

仲景治頰人陰瘡蝕爛方

御茶太紅膏

又方

替鐵膏

追膿錠子

張子和泄水丸

治大小癰疽無頭方

生肌茶

蝕惡瘡方

生肌肉

銀絲膏

五核膏

治惡瘡或有小虫方

治疥癩癬

枯痛神志膏

金絲膏

肉紅散

拓

消腫痛

又方

栝榔散

治便癰外貼方

治熱油湯火燒

瘡疼痛不可忍

蜘蛛咬變成瘡方

治下疳久不愈方

醫聖元戎卷第九

趙州教授兼提舉管内医学王好古進之答次

少陰證

先足經從湯液

後手經從雜例

仲景真武湯

主治脩製並見本方

茯苓

芍藥

白朮

附子

生姜

茯苓四逆湯

治療脩製並見本經

茯苓

乾姜

人參

附子

甘草

四逆湯

甘草 一分 乾姜 二錢半 附子 半錢

四逆加人參湯

四逆加豬胆汁湯 二藥主療 並見本經

四逆散

柴胡 枳實 芍藥 甘草

欬加五味子 悸加桂 腹痛加附子

蕪

泄瀉下重者煎蕪白內菜小便不利加茯苓
海藏云此散因說少陰四逆從舉或欬或悸

調用此散若果四逆手足厥冷下利腹痛更

不復用此散也

姜附湯 無汗者用此主療並見本方

乾姜 炮 附子 炮

木附湯 自汗者用此主療並見本方

白朮 附子

白通湯 主療加減並見本方

附子 乾姜 葱白

易簡真武湯

宜

治傷寒數日以後發熱頭痛頭目昏沉四收
沈重疼痛大便自利小便或利或澀或嘔者
皆風服之若已經汗下不解仍發熱者心下

腹 腹

渴後

飲

嘔頭眩暈、目^身動振、欲擗地者、此由湯液
餘水停留中脘所致、並宜服之

茯苓

熟附

各三分 白朮 二分

每

右以咀、每服四錢、薑五片、水一盞半、煎至八
分、去粗^渣、溫服、小便利者、去茯苓、大便利者、去
芍藥、加乾薑一分、嘔者、無服、加生薑五片、同
煎、欬者、加五味子二分、細辛、乾薑各一分、發
熱而泄瀉者、服此未退、當投四逆湯、仍服震
吳丹、用之、衣手而愈、此藥不惟陰證傷寒可
服、若虛勞之人、發熱自利、時復增寒、皆宜服

真易節作湯

易簡四逆湯

因取名固真湯、增損亦如前法

微

穀

在續

覺體

治陰證傷寒、自利不渴、嘔噦不止、或吐利俱
作、小便或澀、或利、脈微絕、腹脹滿、手足厥冷、
或悸或欬、內寒外熱、下利清濇、四肢沉重、或
汗出厥逆者、或汗出熱不去、並宜服之、及治
一切虛寒、冷厥、或傷寒病有表、醫誤下之、續
後下利不止、雖寬頭疼、能痛、發熱惡寒、四肢
拘急、表證悉具、未可攻表、宜服此藥、以助陽
救陰、次服桂枝、次以解表證

甘草 一匁 乾姜 熟附 各三分

右以咀、每服四錢、水一盞半、煎至八分、去滓

溫服、利止虛者、加人參半兩、嘔者加生薑一

枳易簡作莖

兩、面赤者每服加葱白一朮根、腹痛者加芍藥

一兩、利止脉不出者、加人參一兩、霍亂吐瀉

之後、尤宜服之、陰證傷寒、或無汗唇青面黑

背易簡作脊

自昏強痛、四肢厥冷、昏不知人、如欲服四逆

湯、先以附子散、用附子三分、官桂當歸白朮

各半兩、辛夏乾姜各一分、葱煎服、被覆取汗

或氣虛陽脫、脉冷無脉、氣息欲絕、不省人事

者、當灸丹田氣海、仍以葱一把、以索纏如餅

切去根葉、存白二寸、以烈火烘一面、令通

熱、勿令灼人、乃以熱處着病人胸中、上以熨

斗、盛火熨之、溫則換以他餅、其人甦醒、手足

溫而有汗、乃瘥、仍服四逆、姜附之類

易簡姜附湯

治中寒口噤、四肢強直、失音不語、或卒然暈

倒、口吐涎沫、狀如暗風、手足厥冷、或後煩燥

兼治陰證傷寒、大便自利而熱者

乾姜 熟附 各二匁

湯以生者易簡作
生用字

濕

右以胆、每服四錢、水一盞半、煎七分、去滓服
或慮此茶大燥、即以附子理中湯相繼服餌
善附本治傷寒經下之後、又復發汗、內外俱
虛、身無大熱、晝則煩燥、夜則安靜、不嘔不渴
六脈沈伏、並宜服此、不知脈者、更宜審之、兼
治中皖虛寒、久積痰水、心腹冷痛、霍亂轉筋
四肢厥逆、一方附子湯、以生者名白通湯、治
傷寒下利、一方用白通湯加白朮倍之、甘草
減半、名生附白朮湯、治中風濕昏、同恍惚、腹
一方用善附湯加廣黃、白朮、甘草、人參等名
附子麻黃湯、治中寒濕昏、暈緩弱、項背強急、
口眼喎斜、語聲渾濁、心腹腫脹、氣上喘促、不
能轉動、更宜審而用之

易簡附子湯

治風寒濕合痺、骨節疼痛、皮膚不仁、肌肉重
着、四肢緩縱、腰脚痠疼

仲景附子湯方內亦有此方、在厥陰門

生附子 芍藥 官桂 甘草

茯苓 人參 白朮

右以胆、每服四錢、水二盞半、煎至六分

據易簡方下當有
姜字

疲

去粗食前服、惡甜者、減甘草一半、兼治疲極、筋力氣虛、倦怠、四肢疲疼、一方治歷節風、四肢疼痛、如搥鍊、不可忍者、加乾姜半兩、去生附、加熟附等分、名附子八物湯、煎如前法、若尋常寒濕相搏、頭痛而脚軟痛、及氣虛頭眩、止用白朮附子各一兩、甘草半兩、乾姜同煎、服、名增損朮附湯、久履湿地、腰重脚軟、尤宜服之、若為濕氣所中、則白朮倍附子之數、仍用白朮半兩、酒一盞、煎至六升、連進數服、取微汗即愈、不能食者、以水煎、若冒雨濕着于

飲冒

肢、身、肌膚、或腠理、開、汗出、溼、得病、於增損

大附湯中、加茯苓、官桂、如甘草之類、名茯苓

白朮湯

白通加豬膽汁湯

附子、乾姜、葱白、人溺

豬胆汁

通脈四逆湯

以上通治裏寒

麻黃附子細辛湯、六黃附子甘草湯、以上通治

仲景附子湯

附子 人參 白朮 茯苓 芍藥

本草附子湯 四物附子湯 內減生薑是也

四物附子湯

附子 官桂 白朮 甘草 乾薑

易簡附子湯 見前善附湯後與下方注小異

附子湯 四君子湯 加桂附芍藥

外臺云論療傷寒八九日因風濕相搏身躄

煩疼不能轉側不渴不吐下之脈浮虛而濡

者屬桂枝附子湯若大便鞭小便自利者附

子白朮湯

桂枝附子湯 桂心 四兩 附子 三枚炮 去皮 生薑 三兩

炙甘草 二兩 乾姜 十二枚 擘

右五味切以水六升煮取二升去滓分溫三

服忌生葱豬肉海藻菘菜

附子白朮湯

白朮 四兩 芍藥 十二枚 炙甘草 二兩 生薑 三兩

附子 二枚 炮 作四片

右五味切以水六升煮取二升去粗分溫三

服初一服其人身如瘧半日許復服之都盡

瘧

怪

其人如冒狀當自涇水此以水附性走皮中逐水遂氣
未除故使人如冒狀者本云附子一枚加之
二枚名附子湯忌見前千金翼同張仲景治
法當加桂枝四兩此本一方二法以大便難
小便自利故去桂也以大便不難小便不利
當加桂枝附子三枚恐多也虛弱家及產婦
宜減服之一句句即知男子婦人同一治也男
子服四物以滋血亦与婦人同

少陰證

旬

王翊奉論悸并方

欲

身暈

悸者動也病源內有虛熱則渴而飲水氣
乘心振寒而心悸也傷寒二三日心中悸
而煩小定中湯發汗時下悸欲作奔豚發
汗過多心下悸欲得按者桂枝甘草湯發
汗止仍發熱心下悸自胸動真武湯傷寒
脉結代心悸動炙甘草湯少陽不可發汗
發汗則譫語屬胃不和煩而悸小柴胡湯
傷寒厥而心下悸宜先治水茯苓甘草湯却
治其厥不出尔上漬入胃必作利中風往
來寒熱或心下悸小柴胡湯錢氏腎病見

夏水勝火、腎勝心也。當治腎、輕者病退、重者當悸、動者小搖也。易老云：腎水乘心者悸。仲景不治木火、調其水也。

王朝奉辨陰陽證

夫病發熱而惡寒者、發於陽也。不發熱而惡寒者、發於陰也。發於陽者、可攻其外、發於陰者可溫其內。發表以桂枝、溫裏以四逆湯。

張仲景論少陽通脈四逆證、面色赤、又少陰

下利、脈沈遲、面色少赤、此二證似陽然、皆下

黃湯證、脈陰陽俱緊、少陰脈微細、為異也。又

汗出為陽微、故仲景云：陰不得有汗、脈陰陽

俱緊而反汗出、為亡陽也。屬少陰、仲景論傷

寒、脈浮、自汗出、小便數、脚拳為反、與桂枝攻

表誤也。常暈之云：便合用桂枝加附子湯治

之。若誤服桂枝湯、即便有發厥吐逆證、語等

證、治其本論太陽上篇中孫兆云：陽證即頭

痛、身熱、脈洪數也。陰證則頭微痛而身不熱

、脈沈細遲緩。凡陰病、宜夕四逆、理中輩皆

自愈。若夏日得陰證、亦慮四逆、大熱宜與理

其恐具此

中最佳也。又云大抵矣。热惡寒者是表證，屬太陽也。只惡寒是陰證也。然陰證即有矣。熱者蓋是表熱裏寒，其脈必沉遲，或手足微厥，或下利清穀，更以別證驗之，可知也。又云本是陰病，醫以熱藥過多，却見熱證者，亦斟酌以涼藥解之。又云陰證形靜，無妄狂者，惟解溫藥過多，胸中熱實，或大便硬，有妄狂者，亦宜用柔氣輩而下之，不可輕用。本是陽病，熱證，醫誤吐下過多，遂成陰證者，却

不愈，脈及沉遲，手足厥逆者，此為下部脈不至，陰陽隔絕，邪容於足少陰之經，毒氣上薰，故咽喉不利，或痛而瘡。

仲景甘草湯例

仁宗御名如聖湯，治少陰咽痛。

炙甘草 一兩
桔梗 三兩

右麻末水煎，加生姜煎亦可。一法加訶子皮二錢，煎去粗飲清，名訶子散。治失音、无聲、如欬、逆上氣者，加陳皮。如涎嗽者，加知母、貝母。如酒毒者，加葛根。如少氣者，加人參、麥門

冬如唾膿血者加紫苑如疫毒腫者加黍粘
子大黃如欬渴者加五味子如嘔者加生薑
半夏如目赤者加梔子大黃如胸滿膈不利
者加枳實如不得眠者加梔子如心胸痞者
加枳實如膚痛者加黃耆如面目腫者加茯苓
冬如咽痛者加黍粘子竹茹如肺痿者加阿
膠能續氣如癡狂者加防風荊芥如聲不出
者加半夏

肺痿門

經云帝曰勞風之病何如岐伯曰勞風發在

肺下其為病也使人強上直視唾出若涕惡
風而振寒此為勞風之病帝曰治之奈何岐

伯曰以救俛仰巨陽引精者三日中年者五
日不精者七日欬出清黃涕其狀如膿如彈

子大從口中出者從身中出者則傷肺傷肺
則欬也肺痿之門在太陽門仲景廣黃升麻
陽條下

孫思邈草方一門並見金匱祖方

甘草 二兩

右以水三升煮一升半分作三服

久 此證初得可治久則難愈微緊則膿未成

脉紧数则膿已成喘而不得卧葶藶大枣湯

肺湯主之

妙

葶藶

二兩不紫色

右并碎成凡以水三升煮大枣二十個取二升去粗肉麻黄五味子各半兩取清飲頓服令三日服一劑瘥叔和云衄血吐血沈細宜忽然浮大即傾危唾血之脉沈弱言言忽然實大少乘侵脉要云肺脉悻悻而長當病吐血注云肺虛極則終逆則血閉故唾血出也

無干惡寒脉浮紫

傷寒得者麻黄 肺痿上枯水之源下竭水

之本 傷酒得者葛根

有汗惡寒脉沉實

甘桔二生湯

治欬胸中滿振寒脉數咽乾不渴時河吐膿臭久々吐膿如米粥肺痿作癰也膿在胸中者為肺癰

甘草

桔梗 各等分

右剉以水三升煮取一升去粗分二服必爽然吐出膿血矣又一法治一切咳唾膿血及

酥

款而血出不止 好酥三十斤 三遍煉停取凝
成膏 酥兩服 一合日三服 瘡

海藏紫苑散

善治款唾中有膿血 虛勞證 肺痿 變癰

人參

紫苑

知母

桔梗

貝母

甘草

石簾末 生姜水煎 一法加五味子 一法加茯苓

苓 一法加阿膠

經云 陽明司天 唾出白血者 其狀淺紅 如肺色

海藏云 以正對化分輕重

人參紫苑散

治唾膿血 以有甘桔 故入炎陰例 以肺腎為

母子 當補肺以生腎水之源 以泄命門 使五

液不上行也 及以金花丸酒製 苓朮丸青黛

為衣 隨經增損 並見本條 又以易老門冬 飲

加天門冬 人參 保定肺氣 右以四君子湯倍

生姜 大益脾胃 以固中州 又以三才丸 加當

飯 以補骨髓 如唾血從治者 加桂枝 乾姜

寸口脈虛實之圖

微為癸湯者欲愈始前可救
虛小者為肺痿熱之所過初結為膿
寸口脈二者皆欬唾膿血在胸中實大者
為肺癰血為凝滯化為五色
者難治成膿難已
教為弱不渴

○如聖丸

治風熱毒氣上攻咽喉痛痺腫塞妨問及肺
癰噴欬膿血胸膈振寒咽乾不渴時出濁沫
氣臭腥臭久咯吐一作膿狀如米粥

簡按此方用微毒
咽痛奏效

右為細末煉蜜丸每兩作二十丸每服一丸
噲化

○嗽菜青龍散

石膏八兩 朴硝 甘草生瓶各一錢 青黛五錢

原本方下空一字

右為細末每服二三錢煎薄苛湯點熱漱冷
吐治肺痿唾膿涎痰唾多出血心中濕方
右以甘草一味重二兩以水三升煎作一升
半分為三服

百部丸 治諸嗽不得氣息唾膿血方

百部根二斤 升麻半兩 桂心 五味子

甘草

乾姜

各一
冬舊校云恐兩

右為細末、蜜丸、桐子大、飲服、三九日、三、以和為度。

衍豕蛤蚧散 在前陽明經、衄血、犀角、地黃湯

條下

治肺虛嗽久成瘡、吐膿血。

犀角 羚羊角 鹿角 阿膠 蛤蚧

搜膿散 治諸瘡膿汁不絕、盡膏。

黃耆 白芍藥 香白芷 各一分

右為細末、乾上患心、上用膏藥敷貼、一日一

換、海藏云、此方雖云、上瘡、吐膿、血、久不盡

者、亦宜用、此藥作湯散煎、調服之、又互糊為

丸、桐子大白湯下、三五十九、或乾糝、細末咽

津大妙

○錢氏如聖散

桔梗 甘草 阿膠 炒白

煎甘草取清、內膠化

桔梗枳殼湯

陳皮 一兩 桔梗 一兩 甘草 七錢 枳殼 半兩

善煎服

橘皮茯苓湯

陳皮一兩 茯苓半兩

甘草七錢

右為細末，生薑煎服。一法加廣黃杏仁治

外感咳嗽，嘔加半夏，噦加竹茹。寒者

加乾姜。

桔梗湯

桔梗半兩 陳皮各一兩 枳實半兩

生薑煎服。

黃耆鱉甲散

治虛勞客熱，肌肉消瘦，四肢倦怠，五心煩熱，

口燥咽乾，頰赤心忪，日晚潮熱，夜者盜汗，胸

眼不利，減食多渴，欬唾稠粘，時有膿血。

枯

知母 焙 桑白皮 去紅皮 黃芩 去酒

炙甘草 赤芍藥 紫苑 各五錢 半 上六味

一本

秦艽 洗去 白茯苓 去皮焙 別有忌 生地黃

柴胡 去芦 地骨皮 各六錢 已上三分 淨肉桂皮 去

不見火 人參 桔梗 已上三分 淨 各五

鱉甲 去裙用酥 天門冬 湯洗去心焙 一本

味各 半夏 五分

右為篩末，每服二大錢，水一盞煎至七分，去

關

粗食後溫服 海藏云此方內黃香疑黃

芩是黃香也然內有黃芩有小柴胡今治虛

熱妙為有盜汗亦無妨也兼加知母地骨皮

即

赤芍藥即錢氏地骨皮散也治盜汗亦妙內

有桂木治發熱惡寒即柴胡加桂也天門冬

人參地黃即三才丸也秦艽柴胡甘草鱉甲

芍藥即黃龍湯也紫苑桔梗甘草即紫苑散

也桂芍黃香甘草即黃香建中湯也又云此

方治本無傷寒風而得 仲景廣黃升廣湯

治唾膿血從傷寒而得 孫真人治唾膿血

用廣黃升廣之類及青龍湯之類亦從傷寒

而得也內多五味子皆祖仲景法無論傷寒

傷風皆可加五味子又云桔梗一味有辛有

苦辛以散之苦以泄之當如上下之意

御醫院正方

○硃砂膏 鎮心神解熱除煩唾血等證

硃砂別研半 珍珠末 生犀角

人參一作高 玳瑁末 甘草各一分

泥 金箔一分 粉一分半

牛黃別研 麝香 龍腦別研

南硼砂

琥珀

羚羊角

遠志

赤茯苓

已上各

安息

石土

右為細末入研茶極細煉蜜丸蘘合油和諸

茶為錠子更以金箔為衣每兩作五錠每服

一皂角子大噲化人參湯下亦得並阿膠丸

相離雜服尤勝至寶丹

肺癰痿其皮如麩糖有冒腕成癰其皮緊如

甲錯有腸癰晨大膿血於腸胃之間叔和

云寸乳積血在胸中胸內逢乳腸裏癰

糖疑当糠誤

定肺散

御米壳

炒二

知母

烏梅肉

各二

貝母

人參

枯卷

一本半兩

白朮 各二 炙半

右為細末水煎生薑湯點服煉蜜丸彈子大

噲化亦得

定肺丸

款冬花

紫苑

知母

貝母

人參

炙甘草

桑白皮

御米壳

麥門冬

百部

烏兜鈴

五味子

烏梅肉

已上各亦分

右為細末煉蜜丸彈子大倉化一九

解毒丹

桔梗 生甘草 大黃 當歸

荊芥 僵蚕 紫荷車 赤芍藥

赤白皮 各半分

右為細末煉蜜丸彈子大新水化下一丸

蛤蚧丸

蛤蚧一對 炙甘草 廣黃 南星 炮

人參 半夏 知母 貝母

烏梅肉 瓜蒌 槐花子 炒各等分

右為細末生姜五片水煎服

古方紫苑散

紫苑 欵冬花 各半 百部 二錢

右為細末烏梅湯點服生姜亦得 如欵加

五味子喘加杏仁 渴加烏梅 氣逆加陳

皮 頭痛加細辛三錢甘草二錢 氣脫者

加御米殼蜜炒麤末水煎

增損防風通聖散 治鼻塞不通肺氣不利

桔梗 桑白皮 紫苑 耳

鼠粘子 各半 荊芥 穗 三 甘草 一兩已上 各生用

右為麤末防風通聖散各半和勻每服四錢
水一盞半生姜五片煎至七分去渣溫服食
後

咽喉例

仲景有口瘡赤爛之証上實下虛熱重咽喉又

脾熱重上焦故口生瘡宜

升麻六物湯

升麻 梔子 錢各二 大青 杏仁

黃芩 各一錢半

右為粗末每服五錢匕水一小盞半葱白三

莖煎至一盞去粗當粗溫服又法黃蘗蜜漬一宿

噲之嚙汁勿絕瘡

咽喉備急丹

青黛 三兩各芒硝 甘草 各四兩各 姜蚕 一兩各

牛

右四味為細末用臘月牛胆汁者黃春盛菜

於其中懸於背陰處四十九日教過多尤妙

如用時旋取如腮喉咽閉用皂子大塊碾碎

為末以竹筒子吹之咽喉愈

人參清肺散

治咽喉腫痛並喉閉

人參

山梔子

黃連

盆硝

各一兩

連翹

大黃

黃芩

白附子

各一兩

甘草

二兩

薄荷

半兩

右為齋末水煎每服三錢水一盞半煎至七分

分去粗食後溫服

代鍼散

治咽喉腫痛氣息難通

硝石

四兩

白礬

皂角子

牙硝

七錢

為良

右為末吹喉中

發聲散

治咽喉腫痛語聲不出經進方

枯藁根

白僵蚕

去頭

甘草

已上各半分

右為細末每服三錢溫酒調下或生薑自然

汁調下更用半錢綿裹噲化津嚥亦得不拘

時候三日兩服

解毒凡見前安肺凡後風熱上攻咽喉腫痛

又治咽喉腫痛欲死者喉閉急也此方急備

不同宜定急用之

白僵蚕

南星

各一分

右並生用、同為細末、生薑自然汁調服、立愈

鵬砂散

滿

治心氣熱毒、內發咽喉、生瘡、腫痛、木舌、脹、甚、悶塞、水食不下

玄參

貫衆

茯苓

鑄砂仁

滑石

荊芥穗

山豆根

甘草

生各五分

南鵬砂

三兩

薄芎

一兩

右為細末、每服半錢、新汲水調下、或乾糝舌

消毒散

治咽喉腫痛、小兒痘疹已出不勻、雖出不快

壯熱狂躁、咽隔窒塞、臥睡不安、大便秘澀

牛房子

炒六兩

甘草

二兩

荊芥穗

一兩

右為細末、每服二錢、水一盞、煎至七分、去滓

食後溫服

漱茶地黃散

治脾胃熱風熱、上攻咽喉、腫痛、生瘡、閉塞不通

或生古脹

作根

黃芩八兩

甘草

二兩

荊芥

一錢

薄芎葉

一兩

右為細末每服三錢水一盞入薄荷少許同煎四立沸去滓無時漱冷吐

玉壺丸

治三種癰當在少陽條下

海藻

海帶

昆布

雷丸

各等分

右細末米飲為丸如榛子大食後嚼化續使菜不斷神効

五痺散

治五種喉痺

大黃

白僵蚕炒各等分

右細末每服五錢生姜自然汁蜜各半盞一引處調服以利為度

赴選散

治舌上瘡不能食

銅綠

研半兩

香白芷末

一兩

右杵和勻糝舌上溫醋嗽立愈

振悸酸束仁例

胡洽酸束仁湯

治振悸不得眠

酸束仁

人參

白朮

茯苓

各二兩

耳草 五錢

右切以水半斗、生薑六兩、同煎三升、分作四

服

聖惠方

治胆虛睡卧不安、心多驚悸

酸棗

生用二兩

金鏡茶

二兩、生薑汁、塗炙、令微焦

右為細末、每三錢、水七分、煎至六分、無時服

之

活人酸棗仁湯

治傷寒吐下後、心煩令氣盡不得眠

活人作之氣晝夜不眠

酸棗仁

升

麥門冬

去心

炙甘草

一兩

川芎

三兩

知母

二兩

茯苓

乾薑

各二兩

右桑末、每服四錢、水煎服

酸棗仁飲子

治虛煩不得眠、下氣上衝心

酸棗仁

二錢

桂心

五分

生薑

二錢

陳皮

去白

茯神

五味子

人參

各一錢

右切、水三盞、煎至一盞半、去滓、分作二服

海藏百合四君子湯

治老弱人不得眠

心虛則熱、一作伏枚干肉、定志丸、補心丹、腎虛則

收

寒動于中八味丸腎氣丸此二臟不足者補之心盛

則生熱汚心湯三黃湯腎盛則生寒善附

湯四逆湯此二臟有餘之枚于內動于中則異

于所生之寒熱豈可止一熱字便作熱漸止

一寒字便作寒漸誤矣當看前後上下文勢

則可也

定志丸隨證加料

髓陽不足加生地黄當飯肺氣不足加天

門冬麥門冬五味子心氣不足加上黨人

參神菖蒲脾氣不足加白朮白芍藥益

智仁肝氣不寤加天麻川芎腎氣不足

加熟地黄遠志牡丹皮脾氣不足加細辛

酸棗仁地榆神昏不足加硃砂預知子茯

神神

八味定志丸神益心神安鎮魂魄治痰去胸中邪熱理腎肺

人參菖蒲遠志茯苓

硃砂白朮麥門冬各等分

右細末煉蜜丸桐子大米飲下三十九丸無時

每十九日三服亦得

局方定志丸

治心氣不足、五臟不安、悲憂不樂、忽多夢遺、朝瘧暮劇、狂眩不寧。

遠志

菖蒲

茯苓

人參各三兩

茯神三兩

硃砂

右細末、煉蜜丸、桐子大、硃砂為衣、米湯下、五

七九、日三、作散服亦佳、亦名茯神丸。

保真定志丸加

黃連

破故紙

藕節

蓮子肉

保神丸
調和心腎、補養精神

白茯苓

黃連

菖蒲

遠志

各二兩

硃砂

十文 一半入菜 一半為衣

右為細末、浸莖餅為丸、桐子大、硃砂為衣、陰

乾、每服五十九、煎人參湯送下、臨卧加七八

十九、一法定志丸、加保真黃連丸、治勞

黃連

茯苓

各等分

右為細末、酒糊丸、桐子大、茴香酒、塩湯下、破

故紙湯下亦得、說不盡者、一切製度、並取前

後例。

又方、此陰陽各半、

黃連

茯苓

破故紙

菖蒲

各五

右為細末、酒糊丸、桐子大、每服五十九、空心

酒塩湯任下、

預知子丸

主治并法見本方、於定志丸內、加預知子、

山茱

枸杞子

栝子仁

地骨皮

黃精

茯神例

人參、茯神、湯

茯神

遠志

菖蒲

甘草

補麻末、水煎服、

千金翼、聖惠同、補心虛、治健忘、令人耳目聰明、

用戊日、取東引桃枝三寸、枕之、開心目不忘、

菖蒲

遠志

右搗為細末、服方寸匕、食後、令人耳目聰明、

從外見裏、坐見千里之外、令人長生、去三百病、

毒不能偽、

開心明目、使人不忘、

遠志 去心 茯神 各一分 菖蒲 三分

右合每服方寸匕、食後服之、令人不忘大聰明。

延壽丹

齊戒沐浴、服之、千日成仙。

人參 菖蒲 遠志 白朮

枸杞 茯苓 天門冬 麥門冬

生地黃 茯神 栝子仁 車前子

地骨皮 五味子

右細末煉蜜、木白、千石、并丸、各從製法。

神注丹 後丁香條 疑子神注同法、日月丹當在

此條

補心丹

茯神 遠志 人參 菖蒲

硃砂

右為細末、糊丸、桐子大、豬心血拌和丸、亦可。

保真秘一丹

白茯神 木猪苓 各一兩

右切作塊、微煨透、去猪苓不用、茯神細末一

兩、好燥一兩、倍開和作八九平、且向東空心

燥是蠟

細嚼燕津服吸三同燕

張天師草還丹

此菜久服輕身隨風而去如列子之乘也若
髮白者從根而黑如末白者永不白有不信
者將菜拌飯勻白猫食之一日即黑

地骨皮 生地黄 石菖蒲 牛膝

遠志去心 兔絲子 酒浸三宿

右等分細末煉蜜丸桐子大每服三十九空

心温酒下塩湯亦得脩製忌婦人鷄犬見此上

下取陰上下厥陰之菜也海藏云若如天門

冬人參內有三才九也又為上下太陰白增
損三才九相為表裡

日月丹

丁香 木香 茴香 炒 沒藥 碎

麝香 乳香 木通 各二錢

蓮子肉 代赭 酒洗 珠砂 各三錢

青娘子 七箇 玄頭尾 紅娘子 六箇

蛤蚧 一對 頭尾全

右細末糯米糊丸櫻桃大單日一丸雙日兩

丸空心温酒下至十日為度後再服

仲景腎氣例

仲景八味丸

熟地黄

神腎 真水

肉桂

補腎 真火

附子

能行 諸經 不止 兼益 火而

牡丹皮

補神 志不足

白茯苓

能伐 腎邪 濕滯

茯苓

去肥 中藥

遺精及

乾山

能治 皮膚 燥皴

山茱萸

治精 滑

右八味皆君主之劑若不依易老加減服之

終不得効若加五味子為都氣丸述類象形

之藥也 聖惠云各地黃丸能伐腎邪皆君

藥也宜加減用 楊氏云常服去附子加五

桃

味子桃公張文仲時後加減不同其說雖嘗

然莫若易老之說為愈也 易老云治脉耗

而虛西北三方之劑也金弱木勝水火火劇

或飭鼓按之有力服之亦効何也答曰紫者

為寒火虧也為內虛也水少為木勝而金弱

也故服八味丸亦効 益火之源以消陰翳

壯壯水之主以制陽光錢氏地黃丸減桂附

無比山茱萸丸 一名萬安丸 主治並見局方

從容丸篋中秘室方上方同且錙銖異耳欲

進食者加麻茸欲身肥者加石膏欲躰淫者

加柏子仁欲能記不忘者加遠志

潤 蓮

易老天麻丸

天麻 六兩 酒浸三日

玄參 六兩 秤除凡

草薢 六兩 另為

附子 一兩 炮行

獨活 五兩 邪

牛膝 六兩 酒浸三日

杜仲 七兩 剉炒去絲

當歸 二十兩 和

羌活 十兩 去

生地黄 一斤 益

間腎

易老云治脉弦而虛東北二方之劑木弱水少火虧西南有二濕熱一也燥熱一也視上

二法則三隅可知為觸類而長更當以逆順

惟之天下之能事畢矣易老補丸補春秋二分

東坡回神丸

醫又云專此四味久服可以愈大凡疾

羌活 玄參 當歸 熟地黄

素問云不知持滿不時御神務快其心逆於

生樂帝御一十女而登天今人有一妻而喜

命以不知陰陽之要故也人之文會陽氣秘

密神不妄施生氣以強而能久長有若空瓶

小口傾既不入為無出者氣故不得入也又

如虛管以水注揭揜竅懸之水固不泄無為

密

河

入者氣則不得出也故當志不乱意不狂真
不泄是謂得要世以戰勝氣交阿逆龜飲諸
法皆不及黃帝法內即丹茶固裏外不用陰
引陽陰陽會合氣過屏翳例行上入升至九
大營天太即成太丹素問云兩者不和若春無秋若
冬無夏用而和之是謂至度大凡陽氣發盛
中外相應先得陰氣女子面赤然後陽施而
不縱為則無傷也又云勇者氣強而已怯者
若而為病焉得陰之氣能養真陽不可肆行

以失其精所謂陽勝則強也陽氣能強陰氣

絕傷陰平陽秘精神乃治苟或力強腎氣乃
傷高骨乃壞何以久常帝曰以人療人真得
其真所以長久百禩為神
孫真人口訣 東坡先生論議當在此下
復有仲景治陰股汗出一條在仲景沒石子條
下續以此條在三才丸後并蠱斯等丸

天門冬例

古方天地丸 一名二儀丸

天門冬 地黃 各等分

右不犯鐵石罍用木臼木杵搗為細末煉蜜

和丸如梧桐子大空心酒下三五十九誤犯

鯉魚以浮萍草解之

補骨煎

天地丸內加當歸是也三才丸天地丸加人

參是也

增損三才丸一名續嗣丸一名說丸

天門冬酒洗熟地黄酒洗人參去芦

茯苓酒浸遠志去心五味子酒浸茯苓酒浸

透陰乾酥炙麻茸酥炙

酥

不足一法加白馬革一法加麥門冬令人右子一法加

續斷以續筋骨一法加沈香暖下元虛冷

右未杵一作背可研搗細稀給羅則可若蜜恐

不下煉蜜杵下然後可丸桐子大每服五

十九空心好酒下羊老欲補如混沌衣金

一入菜即胎衣

魏武帝服天門冬例

魏武帝皇甫隆令曰聞卿年出二百歲而能

力不衰耳目聰明顏色和悅此盛事也何所

服食施行可得聞乎相蜜示封上疏對曰臣

當

使

聞天地之性人為貴人之所貴莫貴於生荒
 唐無始却運無窮人足其間或如電過每一
 思此惘然心熱生不再來逝不可追何不抑
 情養性以自保息一作惜一作今令四海垂定太平之象又
 須常展才布德万年無窮猶當修道：甚易
 知但莫能什臣嘗聞道人荆涼年已百七十
 八歲而甚下壯言當朝：服食玉泉啄齒便
 人下壯有顏色去三虫而堅齒玉泉者口中
 唾也朝旦未起早漱津令滿乃吞之輒啄齒
 二七遍如此者亦名曰煉精削道人年三百

其

疾統

面少告臣言但取天門冬去心切乾之搗取
 方寸七日三令人不老補中益氣愈百病也
 仲長統曰王候之宮美甘兼千鄉士之家侍
 妾數百晝則以醇酒淋甚骨髓夜則以房室
 輸其氣血耳聰當聽淫声目擊邪色宴宴日不出遊
 外不返三公得之於上豪傑馳之於下及其
 生產不時孕育大早或以童孺而擅氣或以
 疫病而遺精：氣薄惡血脉不流傷胎孩脆
 而病未及堅剝復從情慾重：相生病：相
 仍門無良醫醫無審術共佐其間過謬常有

或有一疾一作病者莫能自免當今少有百歲之人者豈非所習不絕正耶

易簡真降心丸

治心腎不足熱盜汗徒忘遺精及服熱藥過多上盛下虛氣血不降小便黃赤稠濁不

清鎮益心神補虛養血益丹田秘精氣

天門冬

法心秤三兩 遠志 甘草煮五兩

熟地黃

洗去泥焙 茯苓 去皮 乾山藥

人參

各二兩 珠砂 半兩

右細末煉蜜丸 固精法 孫真人

訣 日辰宜忌法並當在此條下

章帝泰和御穩方但從權而無益非若此方神

驗大有補益無損可以壽而康也諸藥本草

乃諸子書異傳具載以功德久服皆成仙不為

虛語

二茸丸

肉蓯蓉

油浸 牛膝 酒浸 兔絲子 酒浸

石斛

酒炒 枸杞子 巴戟

山茱萸

沈香

白茯苓

沢瀉

乾山茱

五味子

杜仲 各二兩

冬夏二至加麻茸四兩酥炙四十已上加天

雄二兩 各為麻末煉蜜丸桐子大空心温

酒下三五十九

鍾斯凡

治婦人無子絕產

厚朴

杜仲

秦艽

桂心

各三

防凡

附子

各六

白薇

半夏

各二

四支

細辛 五錢

茯苓 六錢

右並生用杵羅為末煉蜜丸小豆大每服五

丸空心温酒下漸加至十丸不妨十餘日覺

娠三日後不可更服 有一人妻年二十九

歲服藥十二日有娠餘藥與石門主薄其妻

斷產十三年服此藥有子又餘藥與前太守

子中舍字交其妻年四十九歲五子服此藥

婦人有娠苦食馬肉難則當產出月始皇母

先懷而後性恐知則教食馬肉則延斯而

生

混元丹此藥可增入三才丸

胞衣一箇頭尾兒者斟用酒浸曝乾細坐
為末

經驗後方

華山錠子茯苓研削如棗許大令四方有角
安新甌瓶中以好酒浸三重紙封其頭候百
日開其色如飴當飴糖可日食二塊百日後肌體
潤澤服一年後可夜視物久久服之血化為
筋延年耐老面如童子

治婦人始覺妊娠養胎轉女為男

雄黃一兩、囊盛帶之

治耳聾方

雄黃

硫黃

各一分

右為細末、綿裹塞耳中

神注丹 在定志丸前

茯苓

四兩

硃砂

四錢

右糯米酒煮茯苓至軟、切作片子、陰乾為末、
入硃砂末二錢、和勻、乳香水打糊為丸、桐子
大硃砂為衣、餘不盡者、用茶、陽日二丸、陰日
一丸、要秘新汲水下、要送氣過、空心溫酒下

作陽日一九陰日二九可較也

丁香丸

丁頭代赭石

五錢

南乳香

紫色者另研

丁香 右油者 各三錢

舶茴 二錢

右二味先杵碎為末吹二味搗羅為末後入

香和勻重羅至身好釀醋浸蒸餅為丸如鷄

頭大好心紅三錢為衣當辰火日合茶并火

日初服一日一九次日二九三日一九四日

二九週而後始至十日為度許一作計十九每服早

辰及新水迎日先照水然後飲嚥送下

孫真人枕中記服茯苓百日百病消除二百

日夜如畫三年後能使鬼神四年後玉甘耒

從抱朴子云任子季服茯苓十八年玉甘

耒從之能隱能彰不食米志炙癥減面生光

玉沃

紫石英丸

治婦人絕子當在姦斯丸後

紫石英

研水飛

天門冬

酒浸去心焙乾三兩

當飯

焙切

川芎

紫威

卷柏

去根

桂

川烏

炮去

熟地黄

葳蕤

石解

去根

禹餘糧

醋洗

辛夷

各二兩

桑寄生

續斷 細辛根 厚朴 姜製

乾薑 炮 食茱萸 牡丹皮

人參 牛膝 酒浸各一兩 拍子仁 輕粉

炙甘草 烏魚骨 燒炙 山預 各一兩

右二十六味為極細末煉蜜丸桐子大每服

三十九丸溫酒米飲任下空心食前日二

經 溫徑湯

當飯 川芎 人參 芍藥

牡丹皮 桂 車草 阿膠 起炒

吳茱萸 洗炒已上 麥門冬 去心洗五兩

半夏 一兩 右到每服三錢水一盞半生薑五片煎至八

分去粗得清當粗內膠化同溫服空心食前此劑

即調和也

抱朴子法

婦人絕嗣孕 引弦用緊將 三箇月定候

胎氣受遺途

內系續生丸 並見珍珠囊藥後

母丁香 附子 枯卷 肉豆蔻

烏魚骨

右製度綿裹內陰中、打糊入茶內、為奠九、綿裹內之

治帶下絕產

川芎 枯荖 炮一有

右等分、為細末、煉蜜丸、彈子大、綿裹內陰中

太白薇薇凡 小白薇丸 熟地黄丸 沢蘭丸

在牡丹凡下 牡丹煎丸 二葉並治婦人血

保母丸 保命救生丹 並見後

御方茯苓羹、多服、亘子孫、羊土、羊止、行、黃白

鱗

肉凝落 洗淨、去鮮甲皮垢、同心、如有黃白

糯酒浸透 羊脊骨連髓 三兩、另別碎、銀器

四升、麻腰脊髓、或羊腸脊髓 不計多少

栢子仁 湯澄皮、去薄 胡桃仁 湯浸、去薄皮

山茱 不計多少

共右將上件物、於羊骨汁內、先入松泥、胡桃

泥作羹、熟入、五時、味隨意調和、空心與服、餅

鷄鷄、毛硫黃、鱈魚、雞等、皆可作美食、用鴨子

亦同、粳米、与熟雞頭泥相和、作粥食之、可

以益精髓、強心志、耳目聰明、粳亦作糯、夏月

食雞頭肉、次食粳米粥、飯亦妙

萬安丸

一名山茱丸

一名菴蓉丸

菴蓉

酒浸四兩

山茱

二兩

五味子

三兩半

杜仲

切焙三兩

牛膝

酒浸

兔系子

酒浸

赤石脂

紫巴戟

去心各二兩

白茯苓

沢泻

熟地黄

山茱萸

各二兩

右各搗細末別拌菴蓉末酒熬膏和丸桐子

大每服五十九空心温酒下忌大醋羊血自

灰物七日丹顏色精神菴蓉丸四加法欲

進者加白馬莖骨如無以麻茸代之陰下濕

痒者加蛇床子一兩

保嬰丸

治胎前產後三十六種冷氣血風半身不遂手

脚疼痛又治八風十二痺疝瘕乳中風淋血

聚胎動不安子灰腹中胎衣不出赤白帶下

嘔逆一作吃非惡心痰滿膝下痛此方出草細辛條下

赤茯苓

牡丹皮

芍藥

各三兩

人參

細辛根

桂

牛膝

當歸

木香

葉本

白芷

川芎

附子

麻黃

沢泻

細辛根

蘭

沈 蝶

灸甘草

凝水石

防風

桔梗

蟬壳 各五錢

茱萸

流香

生地黄

馬明退

世各一兩

蚕紙非也。蚕復退下皮即真馬明退也。兼初故以蚕紙歲日既淹習以成弊。詳之。

一法加細墨乳香各少許一法以硃砂為衣

右為細末煉蜜丸彈子大每服一二丸細嚼

酒下

大效牡丹皮散

治吐瀉虛風及頭目不利不思飲食手足煩熱及節拘急疼痛胸膈不利大腸不調陰陽相干心驚怔忡或時旋運支節勞倦

牡丹皮

枳壳

一兩

當飯

一兩

玄胡索

桂皮

陳皮

炙甘草

三稜炮

乾姜炮

半夏洗

羌活 各五錢

川芎 二兩

白木

麩炒

木香 各三分

訶子肉

芍藥

各二錢

右細末每服二錢水半盞煎至五七沸食前溫服此藥婦人常服益血海退血凡勞攻注

消寒疾、實脾胃、理血氣、攻刺、及氣虛惡寒、潮熱等證、至妙。

○仲景治陰汗

沒石子、燒灰、先以溫湯^浴、不以錦輕裹、然後敷灰囊上、甚良。

玉胞^{當花}肚

川烏

細辛

良姜

乾姜

桂

天仙子

牡蛎粉

桐椒

右為細末、醋調塗、膝下、錦衣覆之。

綿襠法、去陰汗、濕痒、或注瘡、一

荊芥

地骨

小椒

廉零陵香

何首烏

牡蛎

細辛

蛇床子

吳茱萸

各一兩

大艾葉

許

右細末、每用一匙、入葱白三寸、封煎、散沸得

菜力、熱漂淋洗。

七寶散

治為汗熱、浸漬成瘡、痛痒不已。

黃耆

當飯

防風

荊芥穗

木通

地骨皮

各二兩

枯礬

右麻末、每服一兩、水三大碗、煎至六七沸、去

痿

粗熱淋洗患處拭乾避風少時

千金方治丈夫陰下濕痒蒲黃敷之良

陰囊濕痒槐枝煎湯漂洗

乾荷葉散

治陰腫痛及陰痿囊濕痒又陰下濕痒若熱

則梔子金花丸

蛇床子

乾荷葉

浮萍 各等分

右粗末每服三大匙水一碗煎三五沸去滓

淋漂避風寒

問曰翕奄沈名曰滑何調也然沈為絕陰翕

為正陽陰陽相合故令脈滑關尺自平陽脈

微沈食飲自可少陰脈微滑者緊之浮名也

此為陰實其人必股內汗出陰下濕也若痒

則者風宜以

白附子

白蒺藜

黃香

杜枯

防風

右等分若虛則補宜八味丸

烏金散

治夢泄精滑不禁

九助鱉甲每服一字用清酒半盞童子小便

半小盞葱白七八寸同煎至七分和滓空心
温服

玉粉散

治汗热浸漬生瘡腫痒振痛

一作柳當吹

定粉

蛤粉 各九兩 滑石 八兩半

白石脂

石羔

白龍骨 各五錢

粟米粉

寒水石

各一兩

右為細末乾摻患處

神効凡

原蚕蛾取速連者不以多少去頭尾毛羽

右乾為細末煉蜜丸桐子大每服七丸至十

丸臨卧菖蒲湯下

千金云臨其時當使玉莖至陰節間而止不雨

則過子宮矣予問其故師曰深則少陰之分肅

殺之方何以生化淺則厥陰之分融和之方

故能生矣所以受胎之處在淺而不在深也

忌辰非月經後皆不可用事但經後一日男二

日廿三日男此之外皆不成胎大凡大雨大

寒大暑陰晦日月蝕八節非常之變易皆不

可交接所生男女病聾瘡癰四吸不完多窮

下賤乖戾異常若不犯此即大聰明智惠富貴之子

五補例

乃方五補丸

人參 牛膝 茯苓 地骨皮

熟地黄

右細末煉蜜丸桐子大空心酒下三十丸本

方服數服以七一作七空丸泄之一作易老云凡十補

必一一作泻之數一作泻必亦補之所以不失通塞之

道補必虛必泄也泻實必虛滯則通之使後藥必

能成功若不泄有服八味丸一二年不成功

者但補後泄滯不必七宝丸泄之可以去滯

者皆是也

海藏大五補丸 此當在三寸凡下

天門冬 麥門冬 茯苓 石菖蒲

人參 益智仁 枸杞子 地骨皮

遠志 熟地黄 各等分

牡蛎地黄丸

論曰火多水少亡精損血之源火少水多陽

竭停液之本精遇過水衰者熱退而愈精衰熱

盛者服滿而痛經云又丹兩傍以候服天^人外

以候經往云服之上腎之分服之內腹之分

着^若脾胃得積濕塞其水路肝藏不足無血漬

其腎熱也又曰伏^{去聲}氣以生精托^案臑寒以追

熱若服此味養命延年^{穀案}

生地黄 二兩 牡蛎 煨存性 枳實 各二兩

當歸 一宿煨 天門冬 各二兩 人參 一兩半

車前子

右細末生薑自然汁糊丸桐子大下如足腫

如服下喘噎善湯下

熱小便赤扼致湯下如腹痛芍藥甘草湯

間服五十九空心服如飲食少無味人參

湯下

瓊玉膏鐵冠先生方

人參 二斤 十四兩 生地黄 一十二斤 取汁不

搗 白茯苓 十四兩 枳實 石木白內

右件人參茯苓為末用白沙蜜十斤生用濾

過地黃取自然汁木石白皆可取汁盡去滓

用棗一處拌勻入銀器內或好磁器內封^對如

器物小或兩處亦可用洋紙二三十重封開

開

入湯內以柴炭煮六日連夜火煮三日夜取出
出旧湯內煮一日用蠟紙敷重包裹瓶口懸
井中以去火毒一伏時取之再入旧湯內煮
一日以出水氣取出閉封取三匙作三盞好
溫酒化開服不飲者白湯化之此膏填精補
髓髮白變黑返老還童行如飛羽日進教服
終日不餓不食通心強志日誦萬言神識高
邁夜無夢寐人年二十七歲已前服此一料
壽二百六十歲四十五歲已前服者可壽二
百歲六十三以前服者可壽一百二十四歲
已上服者可壽百歲誠不虛說若服之十劑
絕嗜欲修陰功可地仙矣一料分五處可救
五人癰疾分十處可救十人勞瘵令時預齊
戒沐浴淨室焚香志勿輕易當謹慎脩製無
示非人惟此藥可以夕三才丸為表裡

合

醫聖元戎第九卷 終

癸丑人日技于直舍
夜三更訖 元蘭記

此卷兩字多作各字蓋非是也

