

肝火風熱釣藤散脾鬱痰滯二陳姜汁竹瀝若
兼症相雜看所兼重輕分治

一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝
火也用加味道遙散漸愈又用釣藤散而止更
以四君加釣藤山梔柴胡而安

一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項
強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊又用歸
脾湯全安

羚羊角散 治妊娘冒悶角弓反張及子癇子胃

風痙等症

羚羊角 獨活 酸棗仁 炒 五加皮 防風

川芎 苾仁 炒 川歸 洗 杏仁 去皮尖

茯神 各五分 炙甘草 木香 各二分 右姜水煎服

釣藤湯 方見胎動不安卷

雲箕子葛根湯 妊娘臨月因發風痙忽悶憤不
識入吐逆眩倒併治子癇

葛根 貝母 丹皮 防風 川歸 川芎

茯苓 桂心 澤瀉 甘草 各一兩 獨活

石羔 人參 各三兩 右以水九升煮取三升分作三服 ○貝母 令人易產 未臨月升麻代之 此症多由風寒濕乘虛而感 皆從太陽經治 活人獨活防風湯 治太陽有汗名柔瘧

桂枝 獨活 防風 各一兩 芍藥 三兩 甘草 半兩 右每服乙兩水煎溫服

防風葛根湯 治太陽無汗名曰剛瘧

葛根 四兩 麻黃 三兩 芍藥 二兩 防風 各二兩 桂枝 一兩 每服一兩先煮麻沸去上沫入餘藥同煎溫服


○妊娠瘕瘕

瘕者筋脉急而縮也 瘕者筋脉緩而伸也 一縮一伸手足相引搐搦不已 大抵與嬰孩發搐相似

此症多屬風主搖動 駱龍吉云 心主脉 肝主筋 心屬火 肝屬木 主風 火相熾則為瘕瘕

也 ○治法 若因風熱用釣藤湯 加柴胡 山梔 黃芩 白朮 以平肝木 降心火 養血氣 若風痰上壅

加竹瀝 南星 半夏 若風邪急搐 加全蝎 姜蚕 氣血虧損 用小珍湯 倍加釣藤 山枝 若抽搐無力



戴眼反折汗出如珠者肝氣絕也皆不治

薛氏治一妊婦四肢不能伸服祛風燥濕之劑遺尿痰甚四肢抽搐乃肝火血燥用个珍湯倍加炒黑黃芩佐以釣藤湯而安後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用釣藤散加山枝柴胡而血止續用加味道遙散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥釣藤飲食進而漸安

釣藤散 治肝厥頭暈

釣藤鈎 陳皮 炒半夏 麥冬 茯苓

茯神 人參 甘菊 防風 各一錢 炙甘草 二分

石膏 煨二錢 姜三片 水煎服

○妊鬼胎

入由臟府失調血氣不充營衛虛損則精神衰弱而鬼魅之類得以乘之亦如懷妊之狀故名曰鬼胎也

薛氏曰一婦經閉八月肚腹漸大面色或青或黃用胎症之藥不應薛診視之曰面青脉瀦寒熱往來肝經血病也面黃腹大食少体倦脾經血

病也此鬱怒傷肝脾之症非胎也不信仍用胎劑無功乃與加味歸脾湯逍遙散各二十餘劑諸症稍愈彼欲速效別服通經九一服下血昏潰自汗惡寒手足俱冷嘔逆不食用人參炮姜二劑漸愈又用十全大補湯五十餘劑而安治此症大抵要着虛實者可攻涉虛者必於補中兼消而佐以雄黃丸之類行而散之

雄黃丸 治鬼胎瘕血腹痛

雄黃 鬼臼 去毛 莽草 丹砂 巴霜

獺肝 炙黃各半兩 蜥蜴 一枚炙 蜈蚣 一條炙

右為末蜜丸梧子大每服二丸空心溫酒下日二服或下蛇驚之類

治鬼胎及血氣痛不可忍

班猫 去頭翅足用糯米炒 延胡索 炒等分

為末溫酒下五分以去穢物為度空心服

斬邪丹 治鬼胎大如抱甕

吳茱萸 川烏 秦艽 柴胡 姜蚕 芎藭 醋炒 巴戟 巴仁 各一兩

為未蜜九梧子大每服七九蜜酒下取下惡物

○妊娠不語此名曰瘕

黃帝曰人有重身九月而瘕此為何也岐伯對曰胞之脉絡絕也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫於腎少陰之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

此至人窮理之言患此者當靜以偵之不必驚惶而乱投劑十月分娩後當自語也

○妊娠傷寒熱病防損胎

良方曰非節之氣傷於妊娠熱毒侵損胞胎若不

早治多致墮胎漏血則子母之命亦不能全矣

薛氏曰此亦當分六經為主相參而治

妊娠傷寒身痛壯熱

葱白升一 前胡 葛根 石膏各二兩半 青代一兩

升麻兩二 梔子枚十二 水煎分三服

妊娠傷寒大小便閉結

前胡兩二 大黃 石膏各五兩 山梔枚十 知母

黃芩 茯苓 生姜各二兩 水煎分三服

妊娠傷寒發斑忽黑小便如血其胎欲落

山梔 升麻各四兩 青代二兩 生地四兩 石膏八兩
葱白一升 黃芩三兩 水煎分三服

又用井中泥塗心下乾則易

妊娠熱病先宜白朮散以安其胎傷寒亦然

白朮 黃芩各二錢 加姜朮水煎服

若四肢厥逆陰症也不可服

妊娠傷寒

生生子曰妊娠傷寒所干甚大治之不早及治不知法多傷胎損母吾人以四物加入引經散邪

之劑可選而用之然亦不能及其變茲錄以補之

阿膠散 治時氣傷寒先服此以安胎却以主藥

相間服

阿膠炒 白朮炒 桑寄生 人參 茯苓

右為末每服一錢糯米飲調下日三服

前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩痛

石膏錢一 前胡 甜竹茹 枝子炒 黃芩炒

大青 知母各五分 加葱白水煎服



蕪木湯 傷寒時行洒淅寒振或煎噦者

赤芍 橘紅 黃芩炒 黃連炒 甘草 蕪木

各五分水煎服汗出即瘥胎不安更服阿膠

黃龍湯 妊娘寒熱頭疼嘔不食脇痛嘔痰及

產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來及

勞復熱不解散者

柴胡二錢 黃芩炒 人參 甘草各一錢 水煎服

柴胡石膏湯 頭疼惡寒身熱拘急口乾

柴胡二錢 甘草一錢 石膏三錢 姜水煎服

若氣虛加人參

枳實散 傷寒四五六日腹脹少食腰疼身重

枳實炒三錢 陳皮一錢 麥冬半錢 姜葱水煎服

旋覆花湯 傷寒頭自旋疼壯熱心燥

旋覆花 赤芍 甘草各五分 前胡 石膏各一錢

麻黃去節 白朮 人參 黃芩各三分 姜水煎

麥門冬湯 傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參 石膏各一錢半 前胡 黃芩各五分 葛根

麥冬各一錢 加姜朮竹茹水煎服

梔子大青湯 發斑變黑屎便血

升麻 梔子 木青 杏仁 黃芩 各一錢

加葱白三寸水煎服

白朮湯 傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮 橘紅 麥冬 人參 前胡 川芎

甘草 半夏 赤茯苓 各五 姜竹茹水煎服

芎藭散 治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉 川芎 白朮 白芍 麥門冬

陳皮 乾葛 各五分 甘草 各三分

右姜葱白水煎服

參蘓飲 治症同上

○妊娠時行病

四季之間反常如春寒夏冷秋熱冬煖乃非其時而有其氣者謂時行不正之氣也感之者少長三五相似甚至治內鬪境相類妊娠患之重者多致損胎○亦當與傷寒熱病參治

秦朮散 治時氣五六日不得汗口渴飲水狂言嘔逆

秦艽 柴胡各五分 石膏 一錢 犀角 赤茯苓

前胡 甘草 葛根 升麻 黃芩各四分

加淡竹茹水煎服

葛根飲子 時氣煩熱口乾頭疼

乾葛 麻黃夫根節各半兩 石膏 一兩 豆豉 一合

白米升半 枝子十四粒 葱白 二莖

水煎分三服汗出為効

消熱飲子 治時氣六七日大小便不利

芒硝一兩 細研 葵子 二兩 水煎分三次以利為効

人參敗毒散 治四時傷風頭痛發熱咳嗽

此方即倉廩湯減陳倉米是也

○過時熱病

冬時觸胃嚴寒即病曰傷寒不即病而毒藏於肌骨之間至春發為溫病至夏發為熱病也妊娠患之多致墮胎熱病與暑病相似但熱病脉實暑病脉虛治當審察

治妊娠熱病頭痛嘔吐煩悶

人參無 一方竹茹 葛根各一兩 升根二兩 知母三兩

麥冬半一兩

每服五錢葱白三寸水煎服

枝子仁飲

治病發斑黑色小便如血氣喘急胎

欬隨

梔子 升麻 石膏 生地各二兩 黃芩 一兩

大青錢八 每服五錢葱白七寸豉九十四粒 水煎服

大黃飲 治熱病六七日大小便秘澀

大黃微炒 石膏各一兩 知母 前胡 赤茯苓各七錢半

梔子 甘草 黃芩各五錢 生地黄半一兩

每服七錢水煎服

芫根湯 治熱病頭痛心煩嘔吐

知母兩四 竹茹兩三 每服五錢生芫根一握同

糯米一撮水煎服

梔子五物湯 治妊婦傷寒壯熱頭痛

梔子 前胡 知母各二兩 黃芩 一兩 石膏 四兩

每服五六錢水煎服

升麻六物湯 治傷寒斑黑溺血

升麻 梔子各二兩 大青 杏仁 黃芩各一兩

每服五錢葱白五寸水煎服

又方

伏龍肝為末每服一錢水調下外用木調塗臍

又方

芎根煮汁時服一盞

○熱病胎死腹中

良方曰熱病以致胎死腹中不能出者但服黑神

散胎自下矣

陳無擇先生曰當視其產母若面赤舌青其子已死面青舌赤母死子生唇青吐沫子母俱死若

雙胎或一死一活用黑神散

薛氏曰竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐大熱不宜輕用果胎已死者用平胃散加朴硝水銀下之最為穩當庶不併傷生者

生生子曰前症妊母既曰熱傷其胎矣必其母衝任熱極營衛枯槁其胎乃死猶之藤枯而瓜焦也仍以熱藥下之寧不重傷妊母乎薛公語之當也而良方每謂妊婦致疾多起於寒按其逐月所著春胎之方籍熱藥為主是亦一偏也

其間豈無挾熱者乎故丹溪曰虛曰熱謂涼血則血循經而胎得以滋養血熱則沸騰也今此症始既曰熱病胎死腹中矣又復以熱藥下之意者恐以死胎不下為急而不暇顧其母耶不然必為用寒涼治熱太過而中氣虛寒熱劑為不得已用之也否則何陳無擇之高哲寧肯從而主之

黑神散 又名烏金散

桂心 當歸 芍藥 甘草 炙 乾姜 炮

生地 各一兩 黑豆 二兩 炒去皮 大附子 炮去半兩

為末每服二錢溫酒下

又方 治胎死腹中

紅苓 酒煮汁濃飲之 二三碗 効

又方

伏龍肝為末溫酒下二錢白湯下亦可

又方

朴硝為末童便和熱酒調下二錢立下

○ 姪娠瘡疾

妊娠病瘡乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作妊娠而作多傷於胎 當於瘡症門尋治

薛氏曰若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參三陰三陽經而治之

即瘡症門仲景方劉中真分經治療法也

清脾飲 小柴胡湯 逍遙散 補中益氣湯

選而用之極為穩當 黃芩白朮陳皮三味煎湯服亦佳

○妊娠泄瀉

良方論曰妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞瀉水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之喉腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃氣湯寒冷脐下陰冷理中湯治中湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利

用不換金正氣散胃苓湯或四症之大略也仍
參泄瀉門互治

生生子曰前症予見之屢矣人皆以為小疾忽而
不治及生子率多虛弱子姪婦每懷妊必瀉治
亦不愈分娩後又自止也其生子也脆而白無
血色得非胎虛之故歟予因思之妊娠則日水
蓄之以養胎血亦濕類也以停濕故瀉經曰溫
勝則濡泄是也治宜健脾燥濕后孕以白朮半
夏等為丸與之而安

薛氏曰按前症若米食所傷用六君加穀蘖麩食
所傷六君加麥蘖南食所傷六君加山查若兼
寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生姜
魚嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加姜
桂不應 用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴
肢體倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土
之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛
惡寒乃中焦虛寒用六君加木香姜桂若瀉在
五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神

九日間服白朮散如不應或愈而復發或飲食少思急用不味丸補右腎以培脾土為善

厚朴丸 治洞泄寒中

乾姜炮 厚朴製等分

為末糊丸梧子大米飲下五十丸

草果散 治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴姜制 肉果麵煨 草豆蔻煨 十枚

每服三錢水煎服

○妊娠下痢黃水

妊娠痢疾宜搜痢疾門參治而痢黃水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣看所兼何症而治之在臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類也

產寶方 治妊娠痢黃水

厚朴姜汁炒 黃連各二兩 肉果五枚

右水煎徐徐服以効為度

又方 治熱痢

黃連一升 黃栢一升 梔子二十枚

每服五錢水煎如嘔者加橘紅生姜



又方 妊娠下痢痛

糯米合一 當歸炒 黃芪各一 水煎分四服

臨產下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調甚効

妊娠大小便不通

大小便不通由臟府之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不通大小腸俱熱更推其因而藥之

當歸散 妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小便澀產門腫

當歸五分 赤茯苓 枳壳麩炒 白芍 川芎各一錢

白姜炮 木香 甘草各三分 姜一片 水煎

若氣弱者枳壳減半大便秘加蜜同煎服

妊娠大小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黃炒 木通 枳榔各一 枳壳麩炒三錢

訶子四枚去核半生半熟用 大腹子三枚

共為末童便一盞葱白七莖煎六分調服錢

治妊娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪

苓散

猪苓散

治妊娠小便澀痛及胎水

猪苓皮去

為末白湯調下一錢加至二錢日三

服夜二服

又方

車前子一兩

大黃炒半兩

共為末每服三錢蜜湯調下

○妊娠小便不通名曰轉脬

妊娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不通耳若



兼心肺氣滯則致喘急陳無擇云妊娠胎滿

胞多致小便不利若心腎氣虛清濁相干而為

諸淋若胞系不戾小便不通名曰轉脬若胎滿

尿出名曰遺尿

薛氏曰按丹溪云轉脬小便閉多因胎婦虛弱憂

悶性躁燁炙厚味古方用滑利疎導藥鮮効若

脬為胎所壓而不通但當升舉其胎俾胞系疎

鬆而小便自行若脬腹作脹而小便淋閉此脬

胃氣虛胎壓尿胞四物二陳參朮空心服後探

婦人小兒

吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虛不能下
輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦
有金為火燄脾土濕熱甚而不利者更當詳審
施治

一婦患此小腹腫脹絕至於殆用八味丸一服小
便淋瀝再以八味丸料加車前子一劑即利肚
腹頓宛而安

八味丸 治妊婦飲食如故煩熱不得卧反側倚
息因脬系了矣不得溺名轉脬但利小便則

愈內有茯苓故也緩則不救

其方即六味地黄丸加附子桂心

古今錄驗治妊婦小便難飲食如故

當歸 貝母去心 苦參各三 滑石半兩

為末蜜丸小豆大每服三十九米飲下

治妊婦小便不通脐下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮各一兩 葱白七莖水煎分二服

古今錄驗妊婦不得小便者

杏仁去皮尖 炒黃搗丸豆大燈心湯吞下七丸

又用滑石末水和塗臍下

又方

車前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方

杏仁 滑石末 等分 飯丸大豆每白湯下廿九

又方

紫苑為末井花水調下二錢

葵子散

妊娠小便不利身重惡寒眩暈水腫

葵子

赤茯苓 各五

為末每服二錢米飲下

至生子曰予嘗以補中益氣湯加桔梗治數婦皆
効但用滲利藥而不得通者必須升提氣升則
水自降氣虛者非大補則提亦無功

子淋

妊娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然妊
婦胞繫于腎之間虛熱而成斯症甚者心煩悶
乱名曰子淋也

薛氏曰前症若頸項筋挛語瀯痰甚用羚羊角散
看小便澀少淋瀝用安榮散看肝經濕熱用龍

胆瀉肝湯若肝經虛熱用加味逍遙散腿足轉筋而小便不利急用个味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黃柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而頻數用个味丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黃芩清肺飲若膀胱陰虛用六味丸用滋腎丸若膀胱陽虛用無所化用六味丸地膚大黃湯 治子淋

大黃炒 地膚草各三兩 知母 黃芩炒 猪苓
 通草 赤芍藥 枳實炒 升麻 甘草各二兩
 每服五錢水煎服
 安榮散 治子淋甚妙
 麥冬 通草 滑石 川歸 灯心 甘草
 人參 細辛各五分 水煎服
 治小便淋痛心煩悶乱
 藿麥穗 赤茯苓 桑白皮 木通 葵子各一錢
 黃芩炒 車前子炒 芍藥 枳壳各五分

婦人全書 卷之三 十一

右水煎服

治子淋小便澀痛

冬葵子 滑石 水通 各等分

每服六錢葱白七寸水煎服

猪苓散 方見大小便不通卷

○妊娠遺尿

良方曰妊娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下
或白礬牡蠣為末酒調下二錢或鷄毛灰末酒
服一匕或灸桑螵蛸益智仁為末米飲下

薛氏曰若脬中有執宜加味道遙散若脾肺氣虛
宜補中益氣加益智若肝腎陰虛宜六味九

一妊婦遺尿內熱肝脈洪數按之微弱或兩太陽
作痛脇肋作脹以為肝火血虛用加味道遙散
六味地黃丸尋愈后又寒熱或發熱或恚怒前
症仍作用不珍散逍遙散兼服以清肝火養肝
血而痊

○妊娠尿血

妊娠尿血良方謂內熱乘於血分以致血熱流滲

於脬名曰血淋用菘子一斤研水五升煮二升分三服或生艾葉一斤酒五升煮二升分三服或生地一斤酒四升煮二升分三服亦治墮胎後下血

薛氏曰因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火者補中益氣湯因厚味積熱宜加味清胃散若因肝經血熱宜加味道遙散因脾氣下陷補中益氣湯若因脾虛血熱宜加味道遙散
子妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作

脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而熱也加味道遙散六味丸兼服漸愈又用个珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治妊娘下血及尿血

當歸 生地各一兩 續斷半兩 赤芍半兩

為末每服二錢空心葱白湯調下

治妊娘尿血

阿膠炒 熟地各四兩 同搗為丸每服个十九空心米飲下

又方

四苓散

加炒阿膠車前子茅草根水煎服

又方

白茅根

濃煎湯吞酒蒸黃連丸

加味清胃散

方見

○妊娠胎水腫滿

產乳集云妊娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分娩方消者此脾胃氣虛或衝經有血風亦有脾虛水氣流溢或因瀉痢臟

府虛寒或因瘧疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足腫肚腹腫也

薛氏曰若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若面自虛浮肢體如水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫補中益氣湯加茯苓若飲食失宜嘔吐泄瀉六君子湯腿足發腫喘悶不安或指縫出水天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應補中益氣湯若脾肺氣滯加味歸脾湯佐

以加味逍遙散

一妊婦每至五月肢體倦怠飲食無味先而足腫漸至遍身後及頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈○凡治妊婦母泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散

婦人有水氣而成胎以致兩腿足腫

天仙藤

畧洗

香附子

炒 陳皮

烏藥

軟白辣者佳

甘草

各五分

右每服五錢生姜木瓜蕪葉各三

片水煎日三服

澤瀉散

妊娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澀

澤瀉

木通

枳壳

炒

赤茯苓

枳郎

各五分

右姜水煎服

防己散

脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防己

三錢

桑皮

紫蘇莖葉

赤茯苓

水香

二分

右姜水煎服

千金鯉魚湯

妊娠腹大胎間有水氣

白朮

五兩

茯苓

四兩

當歸

芍藥

各三兩



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

右咬咀先以小鯉魚一尾如食法煮取汁二
盞入藥五錢姜七片橘皮少許煎七分空心
服

腎著湯

治妊娘腰脚腫

茯苓

白朮

各八分干姜炮

甘草各一錢

杏仁五分

右水煎服

五皮散

治胎水腫滿

大腹皮

桑白皮炒

生姜皮

茯苓皮

橘皮各一錢

木香二分

右水煎服

全生白朮散

妊娘面自浮腫四肢腫如水氣名

曰胎氣又名胎腫

白朮

一兩

生姜皮

大腹皮

陳皮

白茯苓

各五錢為末每服二錢米飲下

治妊娘脚浮腫因脾衰血化成水以生料平胃散

姜朮水煎服或為末紫菀葉湯調下二錢日二

服以腫退為度

○腹內鐘鳴

良方曰孕婦腹內鳴用鼠兗中土為末入射香酒

調服二錢五愈或黃連煎濃汁常飲之

薛氏曰兒在腹中哭產寶方亦用空房中鼠穴土或黃連煎濃汁飲之即止又云臍帶上疙瘩兒含口中因產婦登高舉臂脫出兒口以此作聲冷姪婦曲腰就地如拾物狀仍復原入兒口即止然黃連性寒麝香開竅當斟酌用之

龔彥德孕癰方

治孕癰用烏藥五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一兩煎化溫服或薏苡仁煮汁飲之

薛氏曰按孕癰即是腹內患癰積前法治之倘不應宜用牡丹皮散或薏苡仁湯

薏苡仁湯 又名瓜子仁湯

治腸癰腹中疔痛煩毒不安或脹滿不食小便澁婦人產后虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

薏仁 二錢 一方用冬瓜子仁無冬瓜子以括

萎代之姚氏去薏仁用杏仁崔氏加芒硝

薏苡仁 括萎仁 各三錢 牡丹皮 二錢

右作一劑水煎服

牡丹皮散 治腸癰冷症腹濡而痛時利膿

丹皮 人參 天麻 白朮 黃芩 白芷

苡仁 薏仁夫皮 當歸洗 川芎各一錢

炙甘草 官桂各五分 木香三分 右水煎服

臟躁悲傷

許學士云一婦無故數次悲泣是為臟躁用大東湯而愈又程虎卿內姪娘五月慘感悲傷亦投大東湯而痊

薛氏曰或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察

一婦無故自悲用大東湯二劑而痊後又復患用

前湯佐以四君子加山梔而安

一姪婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自歎悲

耳用淡竹茹湯為主佐以个珍湯而安

大東湯

甘草三兩 小麥三兩 大棗十枚

淡竹茹湯 姪娘心虛驚悸臟躁悲傷或作虛煩

麥冬 小麥 半夏湯炮各一錢 人參 白朮各一錢

甘草

五分

加姜朶竹茹水煎服

又方 治臟躁悲哭

紅朶燒存性為末米飲調下二錢

○妊娠十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳壳散

八月服之令胎瘦易產昔湖陽公

主每產累日不下南山道人進此方

枳壳

二兩 麩炒

炙甘草

一兩

右為末每服二錢空心沸湯調下日三服

允孕六七月宜服之温隱居助當歸木香等

又方 治同上

兼治諸疾下氣寬膈

枳壳

五兩 麩炒

甘草

半一兩

香附子

三兩

右為末每服二錢白湯調下

又方 易產滑胎

車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸 臨月服之神効

通明乳香

半兩

枳壳

麩炒一兩

右蜜丸梧子大每空心酒服三十丸

榆白皮散 滑胎易生

榆白皮 甘草各二兩 葵子一兩

右為末每以五錢水煎服

保氣散 寬氣進食瘦胎易產或居處失宜頓作

胎動若胎痛胎漏兼服佛手散

香附 木香各四兩 山藥二兩 砂仁 粉草各一兩

益智 蘇葉各半兩 為末每服二錢白湯調下

薛氏云神寢丸枳壳散併此方八月宜常服

保產無憂散 妊娘身居安逸口厭甘肥憂樂不

常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢八月服

之易生

當歸 川芎 白芍 枳壳炒 乳香各三錢

木香 甘草 血餘即髮灰以攢猪心

右為末每服三錢水煎日二服神効

妊娘臨月以猪肚一具煮爛徐食令易產

一產論

二曰正產 懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相

次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛谷

道捷逆繼之漿破血出兒乃遂生此名正產



二曰傷產 懷胎未產一月已前忽然臍腹疼痛
有似欲產仍却無事是名誦非正產也又名
曰柔痛凡產母未有正產之候切不可令人抱
腰亦不可令產母妄亂用力若兒身未順總方
轉動便教產母空亂用力使子錯路忽橫忽倒
不能正生皆由產母用力於未當用力之所致
也直待兒身順適逼臨產始可用力一送令
兒趨力生下
綱目曰右傷產一法最為切要勿輕忽也凡十

月味足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰
柔痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非
正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未
挺逆者非正產之候水漿未破血未出者非正
產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候凡未
有正產之候且令扶行耐忍如不能行或凭物
坐之或安臨之或且服安胎藥一二帖即安得
安即止慎勿妄服催生藥又勿惶惶致令產母
憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停令老

婦人產後 三六 七

誠練達穩母先說諭之如齋心中煩悶可取白
蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力是困之其
母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道探
逆方是正產候也此時始可用力并服催生藥
也子男婦于未產一月已前腰腹俱痛全似將
產其痛至甚但遇已時稍止如此十餘日計無
所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與
肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一
男設若此際亂動亂用力并服催生等藥則立

見其危矣

三曰催產 若婦欲產漿破血下已見是為正產
之候但却未生即可服催生藥催之忽有經及
數日產母困苦亦可服藥以助產母之正氣令
兒速生也

四曰凍產 凡冬月天冷產母經血得冷則凝以
致兒子不能生下此害最深但冬月產者下身
不可脫去綿衣尤不可坐卧寒處當滿房著火
常有暖氣冷產母皆身向火令膝下腿膝間常
暖血得熱則流動使兒易生此名凍產

五曰熱產 九盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不令房中人多恐熱逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏如醉乃至不知人事此名熱產

六曰橫產 凡兒先或露手或先露臂此乃產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須

是產母仰臥然後推兒徐正之候其身正煎催生藥一盞飲之方可用力令送兒下此名橫產

七曰倒產 凡產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順去

八曰偏產 兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不

能生下當令產母仰臥次令看生之人輕推
兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產
母用力一送即便生下若是小兒頭腦後骨偏
柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣及溫
裹手於穀道外方輕推兒頭令正便令產母
用力送兒生也此名偏產

九曰礙產 兒身已順而露正頂不能生下蓋因
兒身迴轉肚帶繫其肩以此露正頂而不能生
下當令產母仰臥令看生之人輕推兒近上

徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候
兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名
礙產

右橫產倒產偏產礙產四法若看生之人非
精良妙手不可依用此法恐恣其愚以誤人
命也按倒產者今時往往隨其倒足生下並
無後患子母双全不必依推足復正之法亦
可又礙產者往往有肚帶纏在兒頂上而兒
頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶

從兒頭頂過而下之者又有肚帶纏在頂上
一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必
以此礙產法復入產門內撥下也

十日坐產 臨產時高處繫一手中令產母以手
攀之輕之屈足坐身令兒生下非坐在物上也
此名坐產

十一日盤腸產 趙都運恭人每產則大腸先出
然後產子既產之後其腸不收甚以為苦名曰
盤腸產醫不能料偶在建昌得一坐婆施一法

而收之其法以醋半盞新汲水七分和勻喫產
母面每喫一縮三喫收足此良法也

丹溪治產後腸不收香油五斤煎熟盆盛俟溫令
產母坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻
中嚏作立上

又方 葶麻子十四粒去壳研如膏貼產母頭頂
心上其腸上即措去

又方 腸出盛以潔淨漆器濃煎黃芪湯浸之即
收

○催生

催生柞木飲子

難產或胎爛腹中腹悶神効

生柞木一尺

甘草大者五寸

右水三鍾封罐口煎一鍾半候胎順產門徐

溫服即時分娩更無諸苦

催生如神散

治橫生逆產其功甚大

百草霜

白芷不見尖

右為末每服三錢至胎順產門以童便米醋和

為膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血

得黑即止此藥大能固血而挽血氣甚妙

如聖散

黃蜀葵花焙為末熱酒調下二錢○若

漏血胎乾胞溢難產併進三服即產如無花

用子半合末之溫酒服尤妙○若打撲胎死

紅花酒調下

順生丹 治同上

兔腦髓去皮膜

明乳香一兩

母丁香二兩

麝香一錢

右以兔腦子丸雞頭子大陰乾每服一丸溫水

下

又方 透明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用
冷水醋少許調服扶立令兩手握大石燕二
枚口念醫靈藥聖三遍行數步用坐產法便
生更無痛楚神效薛氏曰其法士人視之
似迂然用之者稱驗甚

治逆產

蛇退完全者
一條順下

蚕退張一

右共入新瓦罐內鹽泥固濟煨存性為末煎
榆白皮湯下一錢三服竟痛便生

又方 伏龍肝研末每服一錢酒調下兒戴土而下
又方 魚膠許一尺新瓦上煨灰陳醋調服立下

胞漿先乾胎溢不下急服大料四物湯滋其血氣
并濃煎葱湯薰洗產戶更用油燭塗產戶內却
服前藥

神妙乳砂丹 明乳香為末以猪心血丸梧桐
子大硃砂為衣陰乾每服二九嚼碎冷酒下良
又未生再服或以蓮葉蒂七個水煎化服二九
尤妙良又未生再服

○交骨不開產門不開

交骨不開產門不開皆由元氣素弱胎前失於調

攝以致血氣不能運達而然交骨不開陰氣虛也。用加味芎歸湯補中益氣湯產門不開氣血俱虛也。用十全大補湯。

一婦交骨不開兩日未生服加味芎歸湯一劑即時而產。彼後以此方傳與人服應手而効。


一婦生平分娩最易至四十歲妊娠下血甚多產門不開與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而生。

一產婦玉門不開發熱惡寒十全大補加五味子

數劑而寒熱退。又以補中益氣加五味子數劑而玉門歛。○若初產腫脹或熾痛而不閉者用加味道遙散。若腫既消而不閉者用補中益氣湯。切忌寒涼之劑。

一婦脾胃素弱兼有肝火產後至戶腫痛寒熱作渴嘔吐不食。敷大黃等藥服驅利之劑腫及於臀。虛症蜂起。此真氣虛也。先用六君子以固脾胃。乃以補中益氣湯升舉而消。

一產婦失治腫潰不已。形体消瘦飲食少思。朝寒



暮熱自汗盜汗半年矣子用補中益氣加茯苓
半夏以健脾胃膿水漸少飲食漸進用歸脾湯
以解脾鬱共五十餘劑元氣復而瘡亦愈矣
一產婦玉門不閉小便淋瀝腹中一物攷動脇下
或脹或痛用加味逍遙散加車前子而安
一產婦子宮腫大二日方收損落一片殊類猪肝
面黃體倦飲食無味內熱晡熱自汗盜汗用十
全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育
加味芎歸湯 治交骨不開不能生產

川芎 川芎 各一 龜板 一個 婦人頭髮 燒存性
右為散每服一兩水煎服約入行五里即生縱
死胎亦下

○產難方論

郭稽中曰產難者因兒轉身將兒枕血塊破碎與
胞中敗血壅滯兒身不能便利是以難產急以
勝金散消敗其血使兒易生陳無擇云多因兒
未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而
血水乾產路澁而難下宜先服催生如神散以

固其血設或逆生橫產當按法施治

勝金散 催生如神 麝香錢 豆豉兩

為末秤鎚燒赤淬酒下

下死胎方

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢予意其胎已死令視其舌青黑真朴硝一兩許服之化下穢水而安

一婦胎死腹中服朴硝下穢水肢體倦怠氣息奄奄用四君子為主佐以四物姜桂調補而安

又方 以利斧燒紅置酒中待溫飲之其胎便下

又方 錫粉 水銀各一 束肉為丸豆許大水吞立下

又方 平胃散錢五 酒水各一盞煎至一盞投朴硝五錢再煎三五沸溫服其胎即化水而去

寶慶方云凡欲斷臍帶先以繫物墜下後可斷之否則胞衣上即冲心而死

○產難生死脉訣

欲產之婦脉離經沉細而滑也同名夜半竟痛應

分誕來日下午定知生身重體熱寒又煩舌
之脉黑復青反舌上冷定知死腹中瀕遣子
面赤舌青細尋者母活子死定應難唇口俱青沫
久出子母俱死總高判面青舌青沫出頻母死
子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不
新產之脉緩活吉實大弦急死來侵者得沉重小
者吉忽若堅牢命不停
寸口澁疾不調死沈細附骨不絕生審看此候分
明記長須念此向心經

○胞衣不出

郭稽中曰胎衣不下者因氣疲憊不能努出或血
入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速
服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦効
子婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近用滾酒下失
笑散一帖惡露胞衣並下
子婦胞衣不出腹痛手按之稍緩此氣虛不能送
出也用無憂散而下○前症常詢諸穩婆云宜
服益母丸或就以產婦頭髮入口作嘔其衣自

出不出者必死然前法甚効

奪命丹

大附子

炮半兩

牡丹皮

兩一

乾漆

炒烟盡

大黃

兩一

為朱醋煎大黃成膏九梧子大溫酒

吞七丸

花蓋石散

治產后敗血不尽血迷血暈胎衣不

下至死心頭煖者急用一服即化水而出其効

如神

花蓋石

斤一

上色硫黃

兩四

右和勻以紙泥封固瓦罐內炭火煨赤次日取出細研每服一錢童便熱酒下

牛膝散

治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化

而下緩則不救

川芎

朴硝

牛膝

蒲黃

各三兩

川芎

半兩

桂心

錢五

右每服五錢姜三片生地

錢一水煎服

又方 紅花一兩酒者濃汁服

又方 鹿角鎊三錢為末葱湯調服

又方 取產母鞋底烘熱熨小腹上下二十七次

○產後血暈

良方曰產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用

黑神散主之。下血過多，用清魂散補之。或以醋湯細飲，或預燒秤錘以醋沃之，或醃醋塗口鼻，或燒漆器薰之，使產母鼻吸其氣，庶無此患。
薛氏曰：若惡露上行，用失笑散；血下過多，芎歸湯。若過勞所傷，補中益氣湯；血虛極，用清魂散。凡產後口眼喎斜等症，當大補氣血為主，而兼以治痰。若脾胃虛弱，用六君子湯。至於七月之前服安胎飲，至八九月間加大腹皮、黃楊頭、木氣、虛弱、八珍湯。產用無憂散，則無前患。

一婦人月胎下墜，或動面黃，躄倦飲食少思，此脾氣虛弱，用補中益氣湯。倍白朮，加蘇梗三十餘劑，而安產。後眩暈胸滿咳嗽，用四物加茯苓、半夏、桔梗而愈。

一婦人因飲酒惡露甚多，患血暈，口出酒氣。此血得酒熱而妄行，虛而作暈也。以佛手散加煨甘葛二錢一劑而痊。酒性慄悍，入月及產後不宜飲，恐致前症。

奪命丹 治血暈腹痛 沒藥 血竭 為末

分每服二錢熱童便沖酒下

清魂散 產後氣血暴損虛火妄動血隨火上以

致心神昏亂口噤眼花甚至悶絕而甦

澤蘭葉 人參各一錢 荊芥三錢 川芎一錢 右各

另為末每服一二錢熱湯和酒調灌之

一方 五靈脂半生半炒 為末每服二錢溫酒灌入

即甦

一方 荊芥為末童便調服

一方 神麩末每服二錢熱水調服

一方 菲菜切入瓶內注熱醋以瓶口對鼻薰之

一方 半夏為末九釐大入鼻中即醒亦治五絕

佛手散 治產後去血眩暈欲絕又治血崩不止

又能治胎痛安生胎而落死胎神效

川芎酒洗 當歸酒浸各五錢

酒水各一鍾煎至一鍾服

○產後顛狂

產後顛狂乃敗血上沖用大聖澤蘭散加砂仁末

三分煎酸棗仁湯調下或硃砂為末二錢乳汁

調和入紫項活地龍一條漆二三沸去之入酒
再用重湯煮溫分三服

薛氏曰乃血虛神不守舍非補養元氣不可

產婦患前症或用大聖澤蘭湯而愈後又怔忡
妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用
八珍湯加遠志茯苓養其氣血而瘥

產婦亦患此用化痰安神芩藥病益甚神思消
燥余以為心脾血氣不足用大劑參朮芎歸茯
神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五十餘劑

而愈

茯苓散 治產後心虛恍惚言語錯亂健忘少睡
或自汗盜汗

人參 炙甘草 芍藥 當歸 生姜 各八分
遠志 茯苓 各一錢 桂心 六分 麥冬 五分 大棗 二枚
水煎溫服

抱膽丸 治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀 二兩 黑鉛 五錢 硃砂 乳香 各一兩
右將黑鉛入鉢內火熔化俟稍冷下水銀擾成

砂子再入乳香硃砂乘熱用柳木槌研勻丸
鷄頭子大每服一丸薄荷湯下得睡勿驚寤
未即安○妙香散亦善

此症屬火者多不可槩視為瘀血及虛治也童
便極好或冲入涼血藥中用之屢見效

○產後狂言譫語

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍
虎丹參丸琥珀地黄丸亦可如驚悸歌尖顛狂
等症當參治之

產婦形体甚倦時發譫語用柏子仁散稍愈又
用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便
下血用加味道遙散以清肝火養肝血頓瘥又
佐以加味歸脾湯而安

治敗血上衝發熱狂走脉虛大者

乳荷葉

生地 丹皮各等

濃煎湯調生蒲

黃二錢服之即止

妙香散

治產後語言錯亂用生地當歸煎湯調
服立效

炙甘草 人參 桔梗各五錢 茯苓 茯神
 山藥煨汁 黃芪 遠志各一兩 辰砂三錢 麝香二錢
 木香半錢 右為末每服二錢溫酒調服
 ○又能治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗
 夢與鬼交等症

○產後不語

產後不語因心氣虛而不能通津於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

七珍散

人參 石菖蒲 生地 川芎各一兩 細辛 一錢

防風 辰砂另研各五錢

為末每一錢薄奇湯調服

胡氏孤鳳散 治產後閉目不語用之即効

牛白礬為末每服一錢熱酒調下

產後不語

人參 石蓮肉 石菖蒲芽分

每以五錢水煎服





國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大宮詹少溪吳馭閱校

終

赤水玄珠婦人門第二十八卷目錄

產後乍見鬼神

心神驚悸

中風恍惚

虛極生風

虛汗不止

汗多交瘕

口噤腰背反張

產後中風

四肢筋挛

遍身疼痛

產後腰痛



產後腹痛兒梳痛

產後寒疝腹痛

產後兩脇脹痛

產後血瘕

虛煩發熱



產後血渴

產後乍寒乍熱

產後瘡疾

嘔吐腹脹

氣急喘促

口鼻黑鼻衄

月水不通

四肢浮腫

腹痛泄瀉

赤白痢

大便秘澀

大小便不通

產後遺糞

產後諸淋

小便不禁

小便出血

玉門不開

乳少或止

婦人齒唇

終

婦人全書卷之四

新安生生子孫一奎著輯

○產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語譫妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

○薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用个珍加炮姜若心血虛損用栝子仁散天抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神

自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其
或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散
益甚痰涎湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用
加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散 治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時

見怪 沒藥 琥珀 桂心 白芍炒

當歸各七 細辛五 麝香少 右為末每服半錢

姜湯酒各少許調服

栢子仁散 治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言

栢子仁 遠志 人參 桑寄生 防風

當歸炒 生地 甘草炙 各等分用白羊心壹

個水三盞煮清汁七分入藥五錢煎服

○產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心之所主者血心一虛
神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黄丸局方妙香散
隨效再患服之其症益甚而脉浮大按之如無

發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黄丸

治產婦惡露未尽胸腹作痛或小便不利

琥珀

延胡索

川歸

糯米同炒去米

各一斤研取汁留

蒲黃

生地黄

研取汁

生薑

各二斤研取汁留

內炒地黃滓以地黃汁炒生薑滓各乾為度

右為末蜜丸如彈子大

每服一丸當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂

琥珀

沒藥

當歸

右為末每服

二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每


以酒調下一錢

○產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善蓋風

乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治



其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憤左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加釣藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸 產後中風驚狂起卧不安或痰涎

上湧 石菖蒲 遠志 去心芦用 人參 茯神

辰砂 各三錢 川芎 山藥 鐵粉 麥冬 細辛

天麻 半夏 南星 白附子 各一兩 為末

姜汁糊為丸 荒荳大別以硃砂為衣 每服三十丸 姜湯送下

○產後極虛生風

產後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風藥則悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虛用十全大補湯如不應加



附子釣藤鈞若肝經血虛用逍遙散加釣藤
云脾之榮在唇心之液為汗乃心脾二臟虛極
急用參附湯救之

婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸
鳴腹疼以為陽氣虛寒用六君子姜附各加至
五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍
前腸鳴腹痛後灸關元穴百餘壯及服十全大
補湯方効

濟危上丹 乳香 五靈脂 硫黃 玄精石

阿膠 卷栢 桑寄生 陳皮各等分 將上四味
入石器微火炒再研入餘末用生地黄汁丸梧
子大每服二十九食前溫酒或當歸酒下

當歸建中湯 治產後腹痛拘急痛連腰背自汗

少食 當歸 桂心各三兩 白芍六兩 炙甘草二兩

每服五錢姜枣水煎入飴糖一匙以効為止

獨參湯 一切失血惡寒發熱作渴煩躁或口噤
痰鳴自汗盜汗氣虛脉脫手足逆冷蓋血生於
氣補氣者乃陽生而陰長也

○產後虛汗不止

產後汗不止者皆陽氣頓虛腠理不密而津液妄洩也若遇風則變痙縱虛乏短氣則身體消瘦唇口乾燥久則經水斷絕由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虛急用十全大補湯她不應參附著附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之五好古曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之所會也由虛熱薰蒸而出竊謂前症當以部位分之額左屬肝額右屬肺鼻屬脾頤屬腎額屬

心治者審之

一產婦略聞音响其汗如水而昏曠諸藥到口即嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊

一產婦盜汗不止遂致癡寐神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃柏炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯

產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安