

顧問醫藥

海上大眾書局印行

必備醫藥顧問 卷九

會稽馬小琴纂述

■ 胸痺概要

小琴按諸陽受氣於胸中。胸

次寬曠則清氣轉運布息。展

舒。否則濁陰上逆阻其升降。

而爲渾結。乃胸膈喘息短氣。

不利痛引心背矣。施治之法。

大抵陽微者用甘溫。(荅桂

尤甘湯)陰甚者用溫通(理

中湯)飲逆者用辛泄。(吳

茱萸湯)痞滿者用辛滑。(括

萎薤白湯)喘逆者用苦降。

(桂枝加朴杏湯)癲久者兼

通絡。(旋福花湯)只在旋轉

醫藥顧問

上焦清陽疏利膈間痰氣不

杏仁 薑 蘿蔴

與胸痞結胸等混治是爲得

矣。

荅桂尤甘湯(陽虛)

茯苓 玉桂 白朮 甘草

理中湯(陰虛)

白朮二兩十炒 人參 炮薑

炙草各一兩 每服四錢

吳茱萸湯(食逆)

吳萸 人參 薑 蘿蔴

括萎薤白湯(陽微)

括萎 薩白 白酒

桂枝加朴杏湯

桂枝 白芍 甘草 川朴

附心痛 心癱

旋覆花 葱管 新絳

杏仁 檳榔 童便煎

熨背散 外治

烏頭 肉桂 附子

細辛 川芎 川椒

裹烘令緩熨背

茯苓杏甘湯(利肺)

茯苓 杏仁 甘草

爲末繩

■ 九種心痛

附心痛 心癱

小琴按經言。真心痛。旦發夕死。

夕發旦死。由寒邪攻觸猝

大痛無聲。而青氣冷。手足青

至節急用麻黃桂附之屬溫

散其寒。或能死中求活。然死

者極八九矣。至九種心痛。金

匱主。(九痛丸)通治之。醫通

謂九種心痛。乃久客之劇症

由腎水乘心。脚氣攻心等別

名也。痛久血瘀陰邪團結。故

現是症。茲臚舉症治如下。

湯。

【四曰火】痛不時發。宜薑汁炒山梔少加炮薑甘草。

熱鬱痛。脈數口渴便秘。宜清中下重五積散。

【四曰火】痛不時發。宜薑汁炒

梅丸。

或因蠕動而嘔。痛有休止。宜烏梅丸。

【九曰疰】鬼疰心痛。昏憒妄言。或猝倒口噤。由感惡所致。宜蘇合香丸。

由停飲蓄注也。宜胃苓湯治之。方錄後下。倣此。

【二曰食】由飽悶噫敗卵氣生冷。食物過多也。宜青皮丸加味。

【五曰氣】胸中氣壅。攻刺作痛。沉香降氣散。

【六曰血】好飲熱酒。血留胃口。脈必濇。或芤。飲作呃。宜手拈散。

以上係九種心痛。小琴按心痛之症。不一大抵寒者溫之。熱者散之。見症施治。慎勿因寒投寒。因熱投熱。齒莽減裂。

加味。

虛人血瘀。四物(見前)加桃仁。

甲片 桂心角降香。

【七曰悸】心痛而煩。發熱動悸。

此爲虛傷。宜辰砂妙香散。

【八曰蟲】面有白斑。脣紅口沫。能食。宜剪紅丸。

而爲之斯在戒例。

【心痛】經云陽明有餘上歸於

心。滑則病心痛。考諸家最簡單者。厥惟下法。生薑汁和五苓散。

小茴香煎湯送。

【心癱】脣胸乳間。一名井疽狀。

如豆大發如蜂窠。深心熱盛宜

疏導心火。主涼血飲。

小便濁者涼膈散加減。

大便閉者涼膈散加減。

胃苓湯(飲痛)

蒼朮 厚朴 陳皮 甘草名

【平胃散】白朮 澤瀉 猪苓

之。青皮丸(食痛)

青皮 山楂 神麴 蘿芽

草果此加砂仁枳壳

桂枝七氣湯(溫散)

半夏五錢 川朴三錢 茯苓

四錢 紫蘇二錢 薑 荚

水煎又名三因七氣湯今再加

桂枝 白芍 人參 陳皮

甘草 彙脾湯(虛寒)

人參 焦朮 伏神 蔡仁

龍眼各二錢 炙薑錢半 當

歸 遠志各一錢 本香 甘

草各五分 薑 糜 水煎此

加乾姜 桂心 菖蒲

朮附湯(寒厥)

白朮 附子 甘草 此加蔻

朴 枳 陳

手拈散(血痛)

延胡醋炙五靈脂醋炒草蔻沒藥每服三錢酒下此加桔梗開提其氣。

加減五積散(腎寒)

茯苓 半夏 陳皮 甘草

麻黃 白芷 川芎 當歸

乾姜 桔梗 赤芍 蒼朮

川朴

清中湯(火痛)

川連 山梔 陳皮 茯苓

半夏 甘草 草蔻 薑

沉香降氣散(氣痛)

沉香二錢八分砂仁七錢半香附、兩二錢半炙甘五錢半每

服二錢薑湯下

辰砂妙香散(悸痛)

檀香 菖撥 詞黎勒

山藥二兩 人參 黃蓍 遠

涼血飲(心癱)

志 伏苓 伏神各一兩 桔

荆 梔 地 麥 茄 芝

梗三錢 甘草二錢 木香錢

翹 草 木通 翟麥 薄荷

半 噛 一錢 辰砂二錢

花粉 車前各八分 燈芯

烏梅丸(肚痛)

十條 竹葉二十片

烏梅 川椒 川附 桂枝

涼膈(上)

乾薑 川柏 川連 細辛

大黃 巴硝 連翹 山梔

當歸 人參

甘草 黃芩 薄蜜 原方

蘇合香丸(症痛)

去硝黃 加白芷 天花粉

蘇合香

瞿麥

青木香 白朮 沉香 香

上方去硝黃 加白芷 花粉

龍腦 丁香 麝香一兩各研

生地

又(下)

白蜜和分作五十丸另以硃砂

剪紅丸(蟲痛)

五靈脂 延胡 蓬朮 良姜

附 烏犀角一兩各研 加煉

當歸等分爲末每二錢醋湯調

一兩水飛爲衣蠟護原方又有

義朮 三棱 雄黃 木香

檳榔 乾漆 陳皮 大黃
貫仲 糊丸米湯下

小琴按胃氣痛須用刲藥蓋
氣不舒則鬱鬱久生熱熱久
生火若溫散溫利即助火添
邪最好以山梔爲熱藥之導

今錄三方以備參用

倉卒散

山梔四十九枚連皮炒大附子

一個泡去皮臍爲末每三錢水

一盞酒半盞煎七分入鹽少許

愈痛散(心胃痛)

服加川芎尤妙

當歸等分爲末每二錢醋湯調

心頭痛方

烏梅三個 元棗三個 杏仁七個
麝香一錢 捣如泥黃

酒一杯煎溫服

九痛丸

附子三兩 茶萸 人參 炮

蜜丸 桐子大溫酒下三五丸

狼毒五錢

調服。

【心痛】雞子一個打破醋兩合。水服之即止。

附邊單方

蜜丸桐子大溫酒下三五丸

狼毒五錢

同研白湯調服。即止。

葵豆二十一粒胡椒十四粒。同

研白湯調服。即止。

烏梅一個棗二枚杏仁七粒。一

同搗爛男用酒女用醋。(海上

仙方)

晚蠶沙一兩滾湯泡過濾取清

水服之即止。

【急心氣痛】五靈脂錢半炮乾

薑三分爲末熱酒服。

【蛇蟲心痛】作痛如刺口吐清

水者。白熟艾一升水三升煮服。

或生艾搗汁五更食香脯一片

乃飲汁。

【結氣心痛】刺蝟心剖取帶血

二層皮搗碎煎湯服。即止。永不

再發。(本草綱目)

■ 腸痛概要

炒山梔 川連 黃芩各一兩

炒 大黃 青黛 蘆薈各五

小琴按肝脈佈脇脈循脇。凡氣血食痰風寒之滯於肝者皆足致病。正傳曰。凡脇痛皆屬肝木有餘。凡性急之人常患腹脇痛。入門曰。肝熱鬱則脇必痛。茲將治法略舉如下。

【兩脇痛】丹溪曰。肝火盛。兩脇痛。不得伸。舒宜先以琥珀膏貼

患處。以當歸龍蒼丸服之。

【琥珀】大黃朴硝各一兩爲末。

大蒜搗膏和勻作片貼之。一方

加麝五分名硝黃膏。

【龍蒼丸】當歸 龍眼草

炒山梔 川連 黃芩各一兩

炒 大黃 青黛 蘆薈各五

錢 木香一錢 蘆五分蜜丸

留按之痛甚宜復元活血湯。

【腹脣常痛】凡性急多怒之人。
患此宜小柴胡加味。

柴胡 半夏 人參 甘草

柴胡 當歸 花粉 甲片
紅花 桃仁 大黃 甘草

【痰經腹痛】由痰飲流注其

黃芩 薑 蔘 再加川芎

經宜控涎丹二陳湯送

青皮 白芍

控涎 紅芽大戟 甘遂

送龍膏丸方口前條。

白芥子

【控涎】 紅芽大戟 甘遂

【腹痛煩躁不寐】宜當歸龍膏
丸

三陳 半夏 陳皮 伏苓

調下。右宜推氣散

方見前條。

【因怒腹痛】宜香附湯。

香附 當歸 川芎 柴胡

【腹痛驚恐】且肝氣虛腹痛慄
慄不止。兩目讝瞞善恐宜四物
加味。

【因鬱腹痛】宜逍遙散。

歸 菖 地 药 柴 胡 青

山梔 有微熱加薄荷

川芎 枳實各五錢 炙草二錢。
每服三錢薑湯調下。

歸 菖 地 药 柴 胡 青

小琴按風寒痛不論左右脣

皆能致痛此症諸家皆謂木
氣有餘丹溪主治以川芎陳

【跌仆闪挫作痛】係有瘀血停
皮

旋覆 新絳 葱管 再加歸
鬚 小茴 延胡 倍新絳葱
管

加味。

皮醋炒。醫鑑謂必用青皮醋。

炒煎服或末服以青皮乃肝

膽二經物。倘怒鬱積宜此

解之。若二經氣血不足當先

補血。(逍遙四物等)少用青

皮總之治病不宜偏執也。

裹。宜香砂理中湯減味。

白朮炒二兩 人參 炮薑

炙草各一兩 每服四錢 此

再加木香 砂仁 令減白朮

六君去朮

【氣虛痛】兼痰或嘔者宜香砂

急以鹽一撮抄刀尖上火燒令

焦融白湯點之溫服或燒鹽和

陰陽水服陰陽水卽熱水和冷

井水也無井水河水亦可。

亂門其症胸腹絞痛上不得吐

下不得瀉脈伏而沉宜後法。

急以鹽一撮抄刀尖上火燒令

焦融白湯點之溫服或燒鹽和

陰陽水服陰陽水卽熱水和冷

井水也無井水河水亦可。

小兒按凡人身以背爲陽以

腹爲陰中脘屬太陰少腹左

右屬厥陰臍腹正中屬少陰

衝任諸凡中寒中暑食積氣

滯皆能令腹作痛閱者宜從

各門求之今但舉其略者如

左寒腹痛喜熱手按山氣滯陽

腹痛概要

人參 茯苓 甘草 木香
砂仁

【食滯痛】腹中有一條杠起宜

通降苦利後痛減宜消導香砂

枳朮各加減

木香 砂仁 白朮炒 枳實

茯苓 甘草 薤 藕

【腹痛吐酸濁】宜吳茱萸湯。

吳茱萸 人參 薤 藕

【幹霍亂腹痛】嘗求之本編著

沉香 桃榔 烏藥 枳實

木香 白酒磨服

【血虛腹痛】飢勞更甚宜芍藥

甘草湯加味。

白芍 甘草 加桂枝 當歸
棗

【跌傷瘀血作痛】由血瘀。脇腹
作痛。宜復元活血湯。

方見脇部跌仆門。

【死血阻絡腹痛】宜後方。

大黃 枳實 川朴 桃仁
紅花 紫木

【蟲痛】時作時止。有塊梗起。日

吐清水。脣有紅點。脈乍大乍小。
宜烏梅丸加減。

方見九種心痛。蛇痛條。

【疝氣痛】必引睾丸。小琴按此

內痛腹痛。宜香橘散。立效散。
大茴五錢炒 橘核 薑肉

檀香各一兩。鹹水炒。每服三

錢。溫酒下。(香橘)

查肉一兩 川棟子 尚香鹽

水炒 枳實 茅朮 香附

山梔葉汁炒 青皮各五錢。醋
炒 吳萸三錢爲末。每服五

錢(立效)。

【腸癰】右足屈。大腸癰。左足小

腸癰。其症身皮甲錯。小便如淋。

腹皮急。按之濡。宜牡丹皮散。

丹皮 地榆 蓼蕎 黃芩各
錢半 赤芍 桔梗 升麻

甘草 敗醬各一錢(另詳腸
癰門)。

小琴按以上腹痛之大略症。

候也。若虛寒腹痛。太陰厥陰
人參 冬朮 伏苓 甘草

少陰。俱有腹痛現症。又如婦人胎前產後。小兒傷食蟲積。腹痛之症亦甚多。閱者請從各門中求之。茲不多贅。

胃脘痛概要

小琴按胃脘主吸受飲食。與心痛相似。但其症必脹滿。嘔逆不食。便難。而浮肢倦心。痛則在包絡。胃脘則當心下。也初痛在經。久痛入絡。經主氣絡。主血。治法須分清之。茲舉其概。

【胃陽衰。脘痛】食入不運。當辛甘理陽。六君加味。

人參 冬朮 伏苓 甘草

木香 砂仁 桂枝 良姜

【肝木乘胃】氣衝脹脹當辛酸

制木

吳萸 白芍 青皮 木瓜

川朴 金橘

辛溫泄濁吳萸湯

【腎寒厥逆脫痛】吐沫嘔涎當

吳萸 人參 薑 草果

【煩勞傷氣脫痛】待食稍緩當

甘溫和中小建中湯

桂枝 白芍 甘草 乾姜

饴糖 蜜

【客寒犯膈猝痛】嘔逆不食當

溫中散寒大建中加味

蜀椒 乾薑 人參 飴糖

加白蔻仁

【積寒致痛】綿綿不已無增無減當辛熱通陽虎附湯加味

白朮 附子 甘草 加川朴

草蔻

川連 山梔各薑汁炒 香附

【火鬱致痛】發則連日脈弦數

當苦辛泄熱

川芎 陳皮 枳壳 炮薑

【痰積脫痛】必嘔噫宜清中湯

半夏 陳皮 伏苓 甘草

加味

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

虎丸加味

木香 砂仁 枳壳 白朮

陳皮 半夏荷葉包米煨飯爲丸加半夏麴

【氣鬱脫痛】攻刺脹滿沉香降氣散

【氣鬱脫痛】攻刺脹滿沉香降氣散

【傷力脫痛】必瘀血停留

沉香二錢八分砂仁七錢半香附六兩二錢半炙草五錢半每服二錢薑湯下

方見九種心痛丸

【痛久不愈】必入血絡，宜後方。

歸鬚

桃仁 延胡 紫降香
或失笑散方列下

蒲黃五靈脂等分爲末，水酒煎

服

小琴按此症亦有單方，但誤認之反多誤事故，不錄其症。
按之痛止者爲虛，不反痛者爲實。此其大較也。

■腰脊腿足痛

附腰痙 腰僵廢 腰軟 肪

膝 跟

小琴按腰者腎之腑，屬太陽經。脊者督脈及太陽經所過。

【風寒濕痺腰痛】宜後法。
川烏頭三個生搗爲末，少加鹽水調攤帛上貼痛處，立止。

酒糟 葱白 生薑 搗爛卷

腿足爲足六經所至，尻係足少陰及督脈所經，兼屬厥陰

【陰虛火盛腰痛】宜知柏八味丸。

膝爲筋之腑，足跟足心均隸

即六味地黃丸加知母川柏

足少陰腎，其爲痛者不外風寒溼熱，陰陽氣血不足，今併

【內挫跌仆諸痛】其腰不可俛仰，宜復元通氣散。

【腰傷濕痛】由坐臥濕地，或傷雨露，身重，脈緩，天陰更甚，腰溶

溶如坐水中，宜後方。
白芷二兩，炙甲片炒面香各一

兩，五錢陳皮，延胡，炙草各一兩，木香五錢爲末，每服二錢，薑湯

送本方用酒調服。

茯苓皮 木防己 晚鶯 滑石 用朴 茅薢 蓼蕎 热等品可也。

【血瘀腰痛】轉動如刺，大便黑或祕結，四物加味。

其山藥風稜熟則參入，祛風清

桃仁 穿山甲 延胡 大黃
歸芍 地芍 加紅花
外用後方

〔肝氣失暢腰痛〕臥覺腰痛。頻

欲轉側。曉起則止。宜柴胡疏肝

散。

香附 柴胡 陳皮 川芎

白芍 枳壳 甘草

〔痰注腰痛〕痛在一塊。宜導痰

湯加味。

半夏 陳皮 伏苓 甘草

再加膽星 枳實

〔帶束腰痛〕腰肋如帶束引痛。

帶脈爲病也。宜後方。

延胡 歸鬚 桑寄生 杞子

小茴 沙苑

〔以上腰痛〕

〔陰虛脊痛〕項脊常熱而痛。宜

六味丸加味。

熟地 肉桂 淮藥 丹皮

茯苓 澤瀉 再加鹿茸

〔陽虛脊痛〕身常覺寒。宜八味

丸加味。

即六味丸見上條。加附子。肉桂。

再加鹿茸

〔以上脊痛〕

〔腿足陰虛作痛〕足心及股脛

熱痛。宜虎潛丸。

川柏 知母 熟地 龜版

虎脣骨 鎮陽 當歸 牛膝

九 此症去陳皮 加肉桂

白芍 陳皮 羊肉 捣

〔腿足陽虛作痛〕足浮腫無力。

大便瀉。山脾與命門火俱衰。宜

八味丸。

方見本門。陽虛脊痛。

〔血虛作痛〕足不任地。行則振

掉。宜六味湯加味。

六味方。見本門。陰虛脊痛。再加

續斷。杜仲。鹿茸。

〔腎虛作痛〕因風裏下體痿弱。

骨節疼痛。安腎湯主之。

桃仁 桂心 當歸 海桐皮

檳榔各五分 赤芍 附子

川芎 枳壳各三分 薏米一片

棗三枚 煎服。

〔寒濕作痛〕兩腿癱痛。或麻頑

作腫。身重。肢節亦疼。宜白朮附

子湯。

白朮 附子 甘草

【腿轉筋衝腹】上衝入腿。宜瓜

萸散

木瓜 樟榔各二錢半 吳萸錢半

以上腿足

【婦女腰痙】宜六味丸加味。

六味方見本門陰虛脊痛加杜仲 川斷

【腰痙癓】乃熱邪深入血脈久

閉桃仁承氣湯加減。

大黃 巴硝 桂枝 桃仁

甘草 本症宜多用肉桂 少

川附子通經。

【腰痙】濕襲經絡所致。宜腎著湯。

湯。

炮姜 茯苓 白朮 甘草

如溺赤加蒼朮

陳皮 丁香

【膝痙風濕痛】宜二妙散加味。

二妙見上條 加羌活 防風

升麻 柴胡

【膝脹疲弱腫痛】多挾風濕。宜

方見前痛風鶴膝條。

又腎陽虛不能久立。宜八味丸。

即六味丸加肉桂。

挾濕宜換骨丹。

六味方見本門脊此加肉桂。龜版。

【足跟痛】係腎陰虛腫熱跟痛。

沒藥各二錢二分酒丸。

川烏草烏各炮去皮臍。南星臍套七次。地龍焙乾各一兩。乳香

獨活寄生湯。

二活 芎 藁 防 草各五分 蔓荆三分

【屈伸不利】膝爲筋之腑。倘行

則僵。俯筋將僵矣。宜活絡丹。

川烏草烏各炮去皮臍。南星臍

套七次。地龍焙乾各一兩。乳香

獨活寄生湯。

二活 芎 藁 防 草各五分 蔓荆三分

【足心及踝骨熱痛】由腎虛濕著宜腎着湯。

腎着見本門腰軟六味迭見上條。下六味丸。

『以上膝足跟』附

■腸癰概要

小琴考昔賢醫籍說症最詳者厥惟林義桐氏但備錄之爲篇幅所不容也茲略舉其概林氏謂小腸在臍左（關元穴屬小腸）患癰則左腿不能伸大腸在臍右（天樞穴屬大腸）患癰則右腿不能伸金匱千金概名腸癰其

症小腹痞腫按之痛小便數似淋發熱時自汗出復惡寒身皮甲錯腹皮急如腫狀脈遲緊者膿未成可下之脈洪數者膿已成膿從瘡出或有出膿者惟大便下膿血者自愈云云又謂其症治法略同

凡患此者不可驚驚則斷腸而死坐臥轉側宜緩飲食不宜過飽庶可保生亦經驗之談故并錄之。

【小腸癰】小便數似淋或出膿血如脈遲緊者膿未成可下之（大小腸癰同治）桃仁承氣湯方見上門腰痠廢條。

【大腸癰】大便出膿血者是膿

素成桃仁承氣湯與小腸癰同治脈洪數膿已成者大黃牡丹湯（大小腸癰同法）大黃芒硝各錢半枯萎丹皮桃仁各二錢半一方有冬瓜仁服下有膿即出無即下血。

【盤腸癰】膿從臍中出者是多不治

小琴按辛酉秋初余治一甘姓老翁以西黃丸早晚分服甚為有效西黃丸方錄下。

製乳香製沒藥各二兩當歸尾黃各三分為末黃米飯搗爛和丸如粟米大每服三錢空腹食後每次錢半

【見症施治諸方】

【寒症】宜牡丹皮散。

參 薑 苍 丹 蕃 芍

歸 芍 天 麻 桃 仁 各一錢

官 桂 甘 草 各五 分 木 香

三分

【膿未成】宜通腸飲。

忍 冬 藤 歸 尾 皂 刺 花 粉

乳 沒 茜 草 或 用

黃 蟬 磬 爲 丸 或 煎 服。

【又】大黃煎

大 黃 朴 硝 各一錢 丹 皮

白 芥 子 桃 仁 各二錢

【潰後】宜排膿散

薯 草 歸 防 茜 草 翠 草

銀 花 甲 片 各一錢

【膿滯】宜薏苡湯。

薏 仁 蕺 仁 各三錢 丹 皮

桃 仁 各三錢

【血瘀】宜四物延胡湯。

當 歸 生 地 各五 分

牛 膝 各七 分 桃 仁 紅 花

水 煎

■ 腸鳴概要

小攀按腸鳴之症。恆有所見。

其為泄瀉而鳴者。從泄瀉治。

因飢而鳴者。為胃空。當實胃。

若無故自鳴。抑又何也。考之

內經謂中氣不足。腸為之苦

鳴。又曰脾虛則腹滿。腸鳴飧

泄不化。又曰腸中雷鳴上衝。

陽邪在大腸。又曰土鬱之發。

腸鳴而為數。後又曰熱淫所勝。病腹中腸鳴。氣上衝胸云。

此腸鳴之經文也。世有患者。醫多妄調其症。特列入之。

【中氣不足腸苦鳴】宜六君子

加味。

參 虍 苍 甘 夏 陳

再 加 火 薑

【腹滿腸鳴】宜香砂六君子湯

加味。

即上條六君。加木香砂仁。再加神曲。

【腸中雷鳴】宜半夏瀉心湯。

半 夏 川 連 黃 苓 人 參

甘 草 薑 粧

【土鬱腸鳴】平胃散加味。

蒼朮 川朴 陳皮 甘草

再加茯苓 半夏 木香

散。【腸鳴氣上衝胸】宜草薢木香

赤荅 茯苓 白朮 澤瀉

桂心 藜蘆 木香 木通

滑石 甘草

■ 痛氣概要

小琴按內經七疝。衝狐厥癲

瘕膿癰巢氏分厥癰寒氣盤

腑狼張子和別列寒水筋血

氣狐癰別有小腸氣名曰氣

癰膀胱氣名曰水瀆奔豚響

痛丸癰兒疝種種等名大抵

少腹偏墜散結爲先陰丸腫

大逐濕可效。氣上攻者宜辛散。下墜者宜苦溫。按之大痛者爲實不痛者爲虛痛處寒者爲寒積熱者爲濕熱萃縮者宗筋受寒。卵大小上下不常者屬氣分。囊腫脹堅頑者屬血分。又疝之上攻者衝病下注者任病偏墜者小腸病。

癰閉者膀胱病。卵癰出自白者腎病。筋急瘕聚囊腫濁逆者。

肝胃病。此疝症之大概也茲將子和所論七疝臚列症治

如下。

【寒疝】囊冷如石。陰莖不舉。

宜當歸四逆湯。

【狐疝】囊如水晶。濕瘻出水。

宜加味五苓散。

【癰疝】治同上。

【雜疝】

【小腸氣】名曰氣癰。痛引腰臍宜天台烏藥散。

【膀胱氣】名曰水癰。不得小便宜加味五苓散。

【奔豚】疝是氣水衝突下焦。

方列後。

宜加味五苓散去虎。

【筋疝】萃痛筋急或挺縱不收。

宜龍膽瀉肝湯。

【血疝】狀如黃瓜在小腹兩旁。

宜復元通氣散。

【氣疝】上連腎下及囊。因怒氣

脹宜氣疝飲。

【狐疝】

【癰疝】治同上。

【雜疝】

【小腸氣】名曰氣癰。痛引腰臍宜天台烏藥散。

【膀胱氣】名曰水癰。不得小便宜加味五苓散。

【奔豚】疝是氣水衝突下焦。

方列後。

【丸癩兒痘】(翠丸偏腫)由啼

學傷動陰器宜導氣湯

寶鑑常歸四逆湯(寒痘)

歸尾七分 附子 官桂 茴

香 柴胡各五分 白芍四分

延胡 川棟子 茯苓各三

分 澤瀉三分水煎

加味五苓散(水痘)

豬苓 一兩 茯苓 一兩 澤瀉

八錢 肉桂錢半

龍膽瀉肝湯(筋痛)

龍膽草 黃芩 桔子 澤瀉

生地 木通 車前 當歸

柴胡 升草

復元通氣散(血痘)

白丑二兩 疣甲片 茴香炒

各一兩五錢 陳皮 延胡
炙草各一兩 木香五錢 爲末每服二錢。
黃連二錢用吳萸煎水浸炒人參白朮各一錢白芍陳皮各七分甘草三分黃三片。

天台烏藥散(小腸氣)

川棟子十個巴豆同炒

烏藥 木香 茴香 良姜 青皮

各五錢 檳榔三錢 爲末每

服一錢酒下

加味五苓散(膀胱氣)

豬苓 茯苓 白朮各一兩

錢半 爲末每服四錢加鹽八

分水煎日三服。

簡易方(經痛)

木通 川連各一錢 茴香五

分 飛鹽酒調服

導氣湯(兒痘)

川棟子四錢 木香三錢 茴

香二錢 吳萸一錢

附選單方

【寒痘】痛連小腹及翠丸偏縮者以胡椒十餘粒研細摻合藥

上烘熱貼陰囊上痛即止偏縮者貼小半邊蓋縮者即寒也吳茱萸炒布包熨小腹上大荔枝核十二三個煅灰火酒調如糊服

【濕痘】陰丸作痛斬艾紫蘇葉

烘川椒炒熟各三兩。拌勻乘熱
絹袋盛夾囊下勿泄氣。

絹袋盛夾囊下勿泄氣。

【心痛】腎氣衝心故名。用韭菜
汁和猪苓茯苓白朮各一錢。澤
瀉錢半肉桂三分研末兌入水

煎服(丹溪心法)

【癩痛】香附末二錢以海藻一
錢煎酒空心調下並食海藻(一
集簡方)

癩痛疾重墜大如杯。薏苡仁同
東方壁土炒黃色去土入水煮
爛放沙盆內研成膏每日無灰
酒調服二錢(衛生寶鑑)

【狐疝】超越舉重卒得狐疝用
地膚子五錢白朮二錢半桂心

五分爲末酒服三錢忌用生葱。

必效方

【熱痛】痛處如火洩赤便艱口
乾畏熱芙蓉葉黃檗各三錢爲
末以木鼈子仁一個磨醋調塗
囊上。

如服小茴香荔枝核等藥不效
者此熱症也取芙蓉花根去心
用皮搗極爛加大黃末敷患處
二三日必愈(資生集)

【橫梁疝】小腹有塊直衝心胸
此症最難醫治婦人患此居多
用補骨脂一斤黑芝麻二兩拌
炒去芝麻不用只將補骨脂瓦
器中磨末以酒爲丸每服三錢

冬煎湯調下小腹引等丸。連腰
脊而痛者用四製香附鹽水炒
茴香等分爲末空心酒下三錢
卽換一日數次聯續數日便愈

(千金方)

生雞子攢碎入銅器中一面將
秤錘燒紅先淬以醋再入銅器
中將雞蛋收上候冷剝下臨臥
食之痛可立愈(肘後方)

【小腸疝】莖縮囊腫者浮水石
末酒服二錢(儒門事紀)

爲末每服二錢木通赤茯苓麥
冬煎湯調下小腹引等丸。連腰

脊而痛者用四製香附鹽水炒

茴香等分爲末空心酒下三錢
卽換一日數次聯續數日便愈

絲瓜燒灰調酒服

大茴香荔枝核炒黑各等分研
末每服一錢溫酒調服

以陳壁土炙熱布包熨腎囊冷
卻換一日數次聯繫數日便愈

芙蓉葉、黃蘂各三錢爲末。木鼈子仁一個磨醋調塗陰囊上。自止與熱痛同治。

牡蠣灰良薑末等分。米泔水少許調塗患處。

用穿山甲、茴香二味爲末。酒調服乾物壓之。

【痛氣】諸症初起。新鮮地骨皮生薑各四兩。搗如泥絹包囊上。其癢異常忍之。

連蒂老絲瓜燒存性研末。每服三錢。熱酒調下。甚者亦不過二

三服。(資生集)

大茴香炒青皮炒烏藥良薑各等分。共爲末。空心溫酒下。(墨娥小錄)

鮮荔枝殼及核。盛入盆中。文火燃之。患者以臀部承其上。徐徐薰之。三四次卽愈。(儒門事親)

因被如沙如石之物所阻。初起宜後方。

石膏 滑石 琥珀 木通

日飲三次。盡量爲度。(孫氏集效方)

茴香炒作兩包。更換熨。(簡便單方)

杜牛膝五錢。鹹淡秋石各二錢半。水濃煎。加麝少許。空腹服。

【血淋】革中熱痛者。宜後法。淡秋石一味。泡湯空腹服。

小琴按溺竅淋竅分疆別界。溺竅出淋。精竅出濁。淋症有

五濁。亦多門茲姑分列後方。

【沙淋】卽【石淋】輕者爲沙。重者爲石。由膀胱蓄熱。溺管刺痛。

木香八分。沉香八分。枳壳錢半。甘草梢七分。滑石三錢。木通一

錢

【膏淋】精寒溺隧。小便澀痛。宜

海金砂散加味。

金砂滑石各一兩。甘草二錢半。

杵散每服二錢。燈芯湯下。本症

再加茯苓三錢。

若臨溺不痛。須固攝其精。主後

方。

鹿角霜 兔絲子 蓮鬚 山

藥 茄實

【勞淋】由脾腎不足。多由煩勞

所致。宜補中益氣湯加味。

黃耆錢半 人參 甘草各一

錢 白芍 陳皮 當歸各五

分 升麻 柴胡各三分 薑

棗 本症加車前 澤瀉

【冷淋】寒客胞中。欲溺先發寒。慄宜腎氣丸加味。

熟地 莢肉 淮藥 丹皮

茯苓 澤瀉 附子 肉桂

牛膝 車前 鹿角膠 沉香

【一切雜淋】溺赤如血者。屬熱

淋小便後。澄濁如米泔者。稠黏

如膠葦。澀痛者。濕痰流注者。伏

暑致淋者。虛者。因怒而淋者。思

慮過度者。以及妊娠淋病。列方

如下。

導赤散(熱淋)由於心火。

生地 木通 甘草梢 竹葉

草薢分清飲(挾寒)尿澄如米

泔 益智 草薢 石菖蒲 烏藥

蒼朮二陳湯(濕濁)濕痰流注。

各一錢 加鹽一撮水煎。
腎氣湯方見本條冷淋(勞淋)

即八味丸加牛膝、車前。今症去

桂附

蒼朮二陳湯(濕濁)濕痰流注。

猪苓 茯苓 澤瀉各一錢半

白朮 半夏各二錢 陳皮

一錢 炙草八分

六一散(清濕熱)伏暑成淋

滑石 甘草

生脈散(肺燥)暑淋虛者。

人參 麥冬 五味子

通治(因怒而淋)

青皮 山梔 沉香 木通

歸脾湯(補脾)思慮過度

當歸一錢 聚仁 人參 焦

朮 龍眼各二錢 炙草錢半

五分 遠志一錢 木香 甘草各

五分 薑 聚 水煎

葵子湯(姪淋)

冬葵子 桑白皮 木通 赤

苓 罂粟各一錢 黃芩 白

芍 枳實 車前子各五分

薑五片

『濁症』

【便濁】色白如泔。乃濕熱內蘊。

過食肥甘辛熱炙燭所致。宜荅

朮 陳煎。

茯苓 白朮 陳皮 半夏

甘草

【精濁】由相火妄動。或逆精使

然以致精溺並出。宜主後方。
牛膝 赤朮 川柏 遠志
細生地 甘草梢。
丸。【赤濁】由血不及變精。宜遠志
遠志八兩 茯神 益智各二
兩 研末酒煮麵糊丸棗湯下。
【白濁】白如泔漿。濕熱內生。
火妄動。精離其位。不能閉藏。與
溺並出。實卽上條之便濁也。若
或因虛滑精不固。宜六味丸加
味。

丸方見上。今症加蘇芡實。鹿角
霜。菟絲子。

【赤白濁】蒸中熱痛如火灼刀
淡豆豉二錢。伏龍肝三錢。酒歸

刺。溺濁或曰或赤。蓋赤屬血分。
白屬氣分也。若濁色黃。赤濁來
刺痛。宜六味丸隨症加減。

丸方見上。

【溺血】其症由於腎虛。血來鮮
紅。並無消痛。與血淋亦濁大異。
係火盛下迫所致。逆治方列下。
益母草搗汁一升服效。
【又方】煨鬱金。炒槐花各一兩。
研末。每用三錢。豆豉煎湯下效。
【又方】小柴今春。庚午遇邱
姓姪婦。溺血鮮紅。日二三次。唇
甲俱白。以後方治之。二服而血
止。再以扶氣養血法。燉之。五劑
後。面轉紅潤。溺血方列後。

身二錢。黑旱蓮錢半。杜紅花六分。阿膠炭三錢。冬瓜子五錢。桑

寄生三錢。

【又方】胡姓童子年十五患溺

血。七閱月矣。百藥罔效。余亦以

前方減桑寄生。紅花。阿膠。加丹

參。炭地榆炭各二錢。甘草梢七

分。鮮藕汁一杯冲。三劑而止。

【又方】林義桐氏主無比山藥

丸。去巴戟遠志方錄後。

熟地 莱肉 牛膝 茯神

澤瀉 赤石脂各一兩 杜仲

兔絲子 山藥各三兩 加阿

膠一兩 丹皮五錢炒 麥冬

二兩 赤芍五錢炒

【白淫】經言思想無窮所願不

得。意淫於外。入房太甚。發爲筋
痿及白淫。宜降心火。主半荅丸。
半夏 茯苓 菖蒲 河車大戟
鹽酒糊丸 米湯下
【一切濁症】如胃中濕熱下流
者。濁久痛去。濁不止者。肥人濕
澤瀉 赤石脂各一兩 杜仲
濁瘦人水濁心虛遺濁虛寒帶
潤濁久澄尿如糊。足膝痿軟者。
薰中大痛濁亦者。腎虛淫火動
精滑膩如膏者。忍精不洩成濁
者並一切白濁丹方。

【髓條】小便推出髓條。痛不可
忍。由房事失節所致。宜便出髓
條方。

人參 聚仁 茯苓 菖蒲

補骨脂 益智仁 牡蠣等分

鹽酒糊丸 米湯下

二丸二荅湯。(肥人濕濁)

龍膽瀉肝湯。(瘦人肝火濁)

龍膽草 黃芩 桔子 洋瀉

生地 木通 車前子 當歸

柴胡 甘草 六味丸

方見前。

二陳湯加味。(濕熱下流)
元蔕丹。(濁久痛去)
元蔕丹 川柏 洋瀉 菖蒲
半夏 陳皮 茯苓 甘草

菟絲子兩酒炒 五味七兩酒
浸 茯苓 蓼肉各三兩 為
末另研山藥末六兩 酒煮糊

丸

二丸二荅湯。(肥人濕濁)

龍膽瀉肝湯。(瘦人肝火濁)

龍膽草 黃芩 桔子 洋瀉

生地 木通 車前子 當歸

柴胡 甘草 六味丸

方見前。

六味丸加味。(濁久尿澄如糊)

方見前再加 草薢 麥冬

通治(葷中大病)

生地三錢 麥冬 山梔 知母各二錢 加六一散煎六一

方見本條伏暑成淋

四荅散

猪苓 茯苓 白朮 澤瀉

通治單方(一切白濁)

杞子錢半 菟絲 車前 蕺

子各一錢 蓼子廿粒 共入

豬膶膀內煮加葱酒啜汁并食

猪脬蓮子連服二三次甚效

【附選單方】

(衛生家寶方)

【虛勞白濁】羊骨爲末酒服一小匙。日三度。(千金方)

【白濁】婦女戴過夜之茉莉花。

不拘多少代茶飲之良效。(本

黑娥小錄)

雞蛋一個頂上敲損一孔入生

大黃末三分在內紙糊煮熟空

心服四五朝即愈。(經驗良方)

【赤濁】遠志甘草水煮八兩茯

神益智仁各二兩爲末酒糊丸

梧子大空心棗湯下五十九(

普濟方)

菟絲子麥門冬等分爲末蜜丸

梧子大鹽湯下每服七十九神

效。(醫學入門)

乾紅蓮子連心衣六兩炙甘草

一兩共研末每一錢燈心湯下

(衛生家寶方)

【赤白濁】石菖蒲草薢益智仁。

島藥各一兩水煎不拘時服

草萬方鍼線)

野芝麻炒黑研末以陳酒冲服。

奇驗(余居士選奇方)

陳冬瓜仁炒爲末每空心米湯

服五錢(救急良方)

清明所插簷上之柳條煎服治

白濁神效(芷園臆草)

桑螵蛸炙白龍骨等分爲細末。

每服二錢空心用鹽湯送下。(

外臺祕要)

頭生雞蛋五個各開小孔每入

白果肉二枚飯上蒸熟每日服

一個可愈(聖惠方)

【虛勞白濁】羊骨爲末酒服一

小匙。日三度。(千金方)

【脾虛白濁】羊脛骨灰一兩薑

製厚朴末二兩。麵糊丸梧子大。

經驗良方)

米飲湯下百丸。早晚各一次。(

集簡方)

【小便如膏】茴香炒苦棟子炒。

等分爲末。每食前酒服二錢。(

保命集)

【小便如泔】王瓜根一兩。白石

脂二兩。菟絲子酒浸二兩。桂心

一兩。牡蠣粉一兩。爲末。每服二

錢。粥飲湯調服。(衛生寶鑑)

白茯苓等分爲末。米飲湯糊丸

梧子大。每次聚湯下三十丸即

愈。(聖濟總錄)

五味子一兩。炒赤爲末。醋糊九

梧子大。每次醋湯下三十九。(

(直指方)

(活人書)

(外臺祕要)

(普救方)

(奇效良方)

(千金方)

(聖惠方)

(簡便單方)

(血淋)

(黃芩一兩水煎熱服。)

(空心飲或入酒服。危亦林得

空心飲或入酒服。(危亦林得
效方)

【勞淋】勞傷虛損。小便不出。小

腹急痛。尿出自白汁一點一滴者

是用連壳核桃黃泥塗裏文火

七錢半爲末。每服四錢。煎服。將黃泥燒至黑色。取淨肉。有油

者不用。研爲細末。早晚用鹽開

水空心送下三錢。三日即愈甚

效驗。(普救方)

(奇效良方)

船底青葉苔一團。約如雞子大。

水煎服。(奇效良方)

(血淋)黃芩一兩水煎熱服。

(黃芩煎湯煎服大妙。(聖惠方)

(葵花根車前子一錢水煮。日服

茄葉煎乾爲末。每服二錢。溫酒。

或鹽湯下。隔年者尤爲佳妙。(

經驗良方)

桃膠炒木通。石膏各一錢。水一盞。煎七分食後服。(楊氏家藏

方)

晚蠶蛾爲末。熱酒服二錢。(聖

惠方)

海螵蛸末一錢。生地黃汁調服。

(經驗良方)

【治色慾過度。精濁白濁。小水

長而不痛者。并治婦人虛寒淋帶崩漏等症】

生龍骨水飛 生牡蠣水飛

生兔絲粉生韭菜子粉

右四味各等分。不見火研末。生

乾麵冷水調漿爲丸。每服一錢。砂少許。煎濃溫服即效。

六七服即愈。

【色白如泔漿。濁在溺後。不痛】

五爪龍藤連根一兩。土茯苓

杜牛膝各八錢。生白酒三碗。

煎至一碗空心服三次愈。并治

下疳如神。

用黃柏末。猪脊筋去衣同搗和。

爲丸如桐子大。早晚各服三十

丸。開水送下。

【赤白濁方】木通五錢。滑石

五錢。甘草梢二錢。蔓荊子

一錢。四味水煎空心服。

【血淋痛不可忍】

側柏葉 藿節 車前子 滑

石各三錢 生草梢五分 硃

【下焦結熱。小便淋祕尿血。甘草五錢。瞿麥一兩。山梔仁五錢。爲末。每服五錢。蜜燉

心煎湯調下。

遺精概要

小琴按經曰。恐懼不解則傷精時自下。又曰。厥氣客於陰器。則夢接內。蓋臟腑之精悉輸於腎。而恆擾於火火動。則

【用心過度】心腎不攝。宜交心腎。遠志丸佐靈砂丹。

遠志 茄蒲 茶荳 茶神

人參 龍齒 蜜丸辰砂爲衣

(遠志)

水銀 碗黃 二味炒成砂子。

入水火鼎鍛煉爲末。糯米糊丸

如下。

五倍子二兩 茶荳四兩 為

末丸服。

熟地 魚鱠 杞子 羊腎

麻子大每服三丸。米飲下。

桑螵蛸 龍骨 龜版 當歸

【相火動而夢遺】其人腎精素虧。宜厚味填精。

熟地 魚鱠 杞子 羊腎

以介類潛陽法加 龜甲 牡蠣 淡菜等 養陰固攝佐之

【積想不遂】宜安神固氣解鬱。疎肝宜妙香散。吞玉華丹。

山藥 蓮子 芙實 菟絲 桑螵蛸等

遠志 黃蓍 茶荳 茶神各一兩 桔梗三錢 甘草二錢

木香錢半 蘿一錢 辰砂二錢

桑螵蛸等

遠志 黃蓍 茶荳 茶神各一兩 桔梗三錢 甘草二錢

木香錢半 蘿一錢 辰砂二錢

桑螵蛸等

(玉華) 鍾乳粉一兩 陽起石煅 白石脂煅各五錢 左

牡蠣煅七錢 糯米粉糊丸

【不夢而泄】精關久滑。宜桑螵蛸散。

人參 茶神 遠志 茄蒲

桑螵蛸 龍骨 龜版 當歸

【陽陷遺精】房勞過度。精遺不

禁。宜六味丸加味。

六味方。迭見前加鹿茸 菟絲

五味 龍齒 蔴蓉

【久曠溢精】壯年久不近色。精

滿自溢。宜清火安神

生地 知母 川柏 萱蒲

遠志 茯神 蓼子

【濕熱下注自遺】由陰虛不攝所致。宜泄熱導濕。

萆薢 川連 川柏 茯苓

澤瀉 蕺苡

【醇酒厚味思遺】由厚味釀成

脾胃濕熱。宜清痰火。

半夏 陳皮 茯苓 甘草

升麻 柴胡 蒼朮 白朮

小琴按此症治法。不外陽虛者補氣。陰虛者益精。陽强者

瀉火而已。若鬼魅相感而夢贊化血餘丹。

遺精者。其狀不欲見人。獨言

笑時悲泣。脈乍大乍小。綿綿

不知度數。顏色不變。是其候

也。但不常見。治宜蘇合香丸

服之。(丸方見前藥肆備售)

不贅。

鹿茸地黃丸

熟地五兩 莪肉酒炒 山藥

炒各三兩 鹿茸一具酥炙

龍骨煅一兩半 為末蜜丸

三子丸

蛇床子 五味子 菟絲子

蜜丸

青娥丸。

補膏脂 杜仲 等分爲末以

核桃肉研膏加煉蜜爲丸 酒

下每服四錢

又有其餘陽事諸症。亦爲本編所應列入者。附錄如后。

【**羣丸冷**】丸冷陰汗如水溺有

餘瀝此肝經有濕宜投柴胡勝

濕湯。

升麻 柴胡 羌活 茯苓

澤瀉 甘草 川柏 龍胆草

歸尾 麻黃根 防已 五味

水煎

【**相火大盛而痿**】腎脈强大右

尺尤盛此相火鑠陰也宜六味

地黃丸。

方迭見上。

【**陰蒸內縮**】乃肝筋受寒。

附子 乾薑 甘草 葱 冷

補骨脂 家韭子各一兩 研末每服三錢水煎日三次

【**玉莖潰爛**】謂之下疳先用米

白朮 附子 地黃 黃芩 甘草 阿膠各錢半 灶心土

服名四逆湯 今症再加參

桂 小琴按亦宜冷服

【**陰縱不收**】乃肝筋傷熱。

柴胡 半夏 人參 甘草

黃芩 薑 聚名小柴胡湯今

症再加 黃柏酒炒

【**陰莖堅舉**】名曰強中莖舉不

衰精流不止或由肝火太盛或

由金石性發宜瀉火解毒

知母 石膏 元參 生地

大豆 甘草

【**玉莖長硬不痿**】精自出捏之

脆癢如針刺。

補骨脂 家韭子各一兩 研

【**遠血**】黃土湯

白朮 附子 地黃 黃芩 甘草 阿膠各錢半 灶心土

泔水溫洗再用後方。
爐甘石 乳香 血竭 川連

各一錢 輕粉五分 冰片一

分 研末搽大效

■便血腸風臟毒

小琴按金匱謂先便後血爲

遠血先血後便爲近血實熱

迫注血色稠鮮脾胃虛寒血

色稀淡陽衰不攝血色瘀晦

此便血之大略也腸風臟毒

同爲便血但便血火淫腸風

風淫臟毒濕熱茲條舉如下。

如雞子大一枚。先將灶土打碎水煎澄清再煎諸藥。

熱致此由濕毒腸澼宜升陽益胃湯。

【近血】赤小豆當歸湯。

赤小豆二升。浸出芽晒乾。

當歸三錢。研末調服方寸七

白三次。

【實熱迫注下血】由醇酒厚味釀成。宜約營煎。

生地 赤芍 黃芩 地榆

續斷 甘草 槐花 荆芥

等分爲末。烏梅二個。水煎

【脾胃虛寒下血】宜歸芍異功散。

參 苍朮 草陳歸

芍

【血下紫黑】宿有血症。因感濕

防風各六分。烏梅二個。薑三片。再加 秦艽。若有挾濕。挾熱隨症加減。

【臘毒】血色暗濁。係濕熱蘊毒。

宜臘連丸重則聚金丸。

（臘連）川連一兩酒炒研

槐花二兩炒研。陳倉米三合入豬臘內蒸爛杵丸。

（聚金）黃芩 防風各二兩

川連四兩半生半酒炒 研末

醋糊丸 米飲下

【腸風血色清鮮遠射四散如箭。宜加減四物湯。

生地 當歸 川芎 側柏葉

各八分 枳壳 荆芥 甘草

槐花各四分 地榆 條芩 生地 蜜丸

二便不通

大便不通。有實秘。虛秘。熱秘。
冷秘。風秘。氣秘。陽結陰結。

東垣曰。實秘。熱秘。即陽結也。

宜散虛秘。冷秘。即陰結也。宜

溫氣燥以。(杏仁枳實)行之。

血燥以。(大黃麻仁)通之。風

燥以。(麻仁大黃)利之。氣濁

不通。以。(郁李仁皂角子)潤

之。氣壅便閉。以。(人參當歸)

麻仁大黃)開之。葉香巖

氏治腸痺必開降肺胃。加(

杏仁桔梗冬葵子。枇杷葉鬱

金汁紫菀)。以降肺。(半夏。

花粉竹茹橘紅枳實汁。薑汁。

以和胃。即丹溪開上竅以通下竅之義也。小琴錄此由大便不通其原因甚爲複雜。若詳論之殊占篇幅。閱者苟能於此悉心推考。治理此症游刃有餘矣。

附類及諸症

【婦人風祕】宜大麻仁丸。

麻仁熟大黃各三錢木香

枳壳 檳榔各五錢 蜜丸

【肺氣不降】失於傳送者。

杏仁 桔梗 枳壳 桔梗

山梔 香豉 鬱金 橘白

【老人氣秘血秘】氣秘橘杏丸

血秘蘇麻粥。(橘杏) 橘皮 杏仁 等分

人參 枳壳 當歸 陳香櫟

爲末蜜丸

(蘇麻) 蘇子 麻仁 水浸

研汁粳米煮粥。

【脾約】陽明症。自汗。小便數津

液內竭。宜脾約丸。

大黃酒蒸 枳實 川朴 赤

芍 麻仁 杏仁 為末蜜丸

【失血便結】其症煩渴。生地一味研汁煎服

【血液燥結】

熟地 蒸熟每服五錢。

【虛氣迫注肛門】裏急後重。氣逆嘔惡。通利升提。均所不任宜

後法。

人參 枳壳 當歸 陳香櫟

或用當歸 川芎煎湯入淨便

桶內乘熱坐薰之甚效。

【小便不通】

有痰盛者。有熱結者。有陽亢陰衰者。濕熱閉阻經府氣分者。分別治之。亦甚煩瑣。茲錄其通治法如下。

【通治法】

獨囊蒜數枚。梔子三枚。鹽少許。搗爛。攤紙貼臍上。良久即通。

【又方】

食鹽半斤。炒熱布包。運少腹。自通。

【又方】諸藥不效。用此極速。

白菊花根搗爛。以生白酒沖和。取酒汁溫服。神效。

【又方】

活田螺一個連壳搗極爛。加麝少許。置臍上。以蛤蜊壳合之。以帛紮定。甚效。

【又方】錄家嚴醫存。

活田螺二三枚。用針挑去盤。以塊冰片少許。嵌入去螺尾端。滴水臍中。大約一二枚。小水即下。

祇多不過一枚。少加麝尤速驗。

■閉癃遺溺

后。

【熱在下焦血分。小便閉不渴者】宜潤腎燥滋腎丸。
黃柏二兩 知母一兩 俱酒炒肉桂一錢 蜜丸。

【熱在上焦氣分。渴者】宜清肺滋水黃芩清肺飲。
黃芩 山梔 或加鹽豉。

【腎火衰水不能化】宜金匱腎氣丸。

爲虛。何謂閉。點滴難通也。癃滴瀝不爽也。閉屬暴病。癃屬久病。仲景云。陰虛則小便難。小便難。東垣曰。小便不通皆經曰。陽入陰分。則膀胱熱而熱邪爲病。茲將各症略舉如後。

八味丸加牛膝 車前方見前

【元氣下陷 便閉者】宜升清

降濁補中益氣湯加味

黃耆錢半 人參 甘草各一

錢 白朮 陳皮 當歸各五

分 升麻 柴胡各三分 再

加木通 車前

【下焦瘀血小便閉塞】宜代抵

當湯

大黃 歸尾 生地 甲片

元明粉 肉桂

【以上閉癃】

【小兒睡中遺溺】由腎氣不攝

宜寇氏桑螵蛸散

人參 伏神 遺志 菖蒲

桑螵蛸 龍骨 龜版 當歸

醫藥顧問

卷九 閉癃遺溺

【遺溺不知】由大病後或類中

風宜獨參湯

人參一味濃煎頻飲之

【命火衰遺溺】宜鞏隄丸

熟地 蒲絲子酒煮 白朮各

二兩 五味 孟智 骨脂各

酒炒 附子 茯苓 蕤子炒

各一兩 爲末山藥粉糊丸

加人參尤妙

【老人溺多滴瀝者】真陽不固
畫甚陽虛夜甚陰虛莖中痛肝腎濕熱欬嗽遺溺膀胱急列方

如下

【滴瀝】宜桑螵蛸散見本條小

兒遺溺

(畫甚)宜補中益氣湯見本條小

【產後小便不禁】或由脬損固

歸朮 茯苓 蕃柴 陳

元氣下陷

(夜甚)宜八味丸(迭見前)

卽六味丸加附桂

(革中痛)宜龍膽瀉肝湯

膽草 黃芩 山梔 濤泄

生地 木通 車前 當歸

柴胡 甘草

【欬瀉】宜伏菟丸

蒲絲五兩 茯苓三兩 石

瀉肉二兩 爲末酒糊丸

湯或米湯下三十九

鹽

【妊娠溺出不知】由脬熱宜加

味道遙散

甘 桑

三五七

脬丸。補脬飲。或用猪羊脬煎。

(脬丸)茴香三兩 附子五錢

戎鹽一錢 桑螵蛸炙五錢

製菟絲子三兩 酒糊丸

(脬飲)生黃絲絹一尺剪碎

白牡丹根皮 白芨各一兩

爲未必絹熟爛空心服不得作

聲作聲不效或再加 參 虎

或用猪羊脬煎

【胞痺】胞居膀胱之中。受氣化以藏溺出。溺若氣痺不通。多由膏梁積熱於上。作強傷精於下。濕熱乘虛結於胞中。故痺也。宜

腎着湯加味

炮薑 茯苓 白朮 甘草
如瀨赤便塘加蒼朮 陳皮

丁香 今症不加蒼朮再加革
蘚

【溺濇痛引穀道】多由老人精衰貪慾。以致溺濇。少腹脹閉痛引肛門。宜腎氣丸。

方見本門上條腎火癆。

■轉胞交腸

【轉胞】由忍溺入房。或溺急疾走水逆氣迫。則胞系曲戾其症。膀下急。小水不通。與癃閉迥異。

直指曰。此症孕婦多有。或忍溺直指曰。此症孕婦多有。或忍溺之際。胎壓膀胱。小便不通者。以入房使小腸氣逆不通。大腸氣

與之俱滯。外水不得入膀胱內。淋瀝急數。大便亦裏急頻併。因

水不得出膀胱。(胞居膀胱中)
丹溪治一婦患此。診脈兩手濡。重取則弦。此得之憂患。濡為血。少氣多弦。爲有飲。以參虎飲空

益氣湯 方見閉癃元氣陷條。

【又】令孕婦臥榻上。將榻倒豎起。則胎不壓而溺自通。若臨盆之際。胎壓膀胱。小便不通者。以手指托其胎。小水自出。

丹溪治一婦患此。診脈兩手濡。重取則弦。此得之憂患。濡為血。少氣多弦。爲有飲。以參虎飲空

腹分服。

參 虎 陳 草 夏 地

芍 歸 芍 薑 聚 服後

探吐以指點喉使吐少頃又與

一服凡八服而安後歷試皆驗

【強忍房事】致胞轉而閉者非

沉香不治。

【老人轉胞】宜六味湯倍澤瀉

六味湯卽丸料規作飲片重用

澤瀉丸方迭見前。

【驚憂暴怒致轉胞溺閉】由氣

乘膀胱所致。宜葱白湯。

陳皮三兩 冬葵子一兩 葱

白三莖 水五升煎取三升分

三服。

【交腸】此症婦人多有之。由大

口脫肛

肛頭癢痛

小腸失於傳送。致清濁混淆。或

因病後嗜酒。大便前出。小便後

出。

丹溪治一婦人嗜酒。常痛飲。忽

糟粕出前竅。溲尿出後竅。六脈

沉細。投四物湯加味卽愈。

歸 芍 地 芍加海金沙

木香 枳榔 桃仁 木通

【前陰出屎】回春曰。一婦病後

患此。先與五苓散二劑。又投補

中益氣湯卽愈。

補中湯見閉癃元氣下陷條。

五苓散 猪苓 茯苓 白朮

澤瀉 肉桂

右切一劑煎服。

血虛加白芍熟地。血熱加黃柏。

附
【治脫肛氣熱者神效痔瘻同
法】熊膽散。

熊膽五分。孩兒茶三分。冰

右爲末。用人乳調點患處。熱汁

自下而肛收矣。

【治氣虛脫肛】雙補湯。

人參八分。黃耆八分。當歸

八分。川芎八分。升麻五分。

右切一劑煎服。

虛寒者加炮乾薑。外用五倍子

末托而上之。

【治久痢腸胃俱虛肛門自下】
二靈散。

治久痢腸胃俱虛肛門自下。

龍骨煅五錢 木賊草燒存性

上托入。

二錢五分

五倍子三錢。白礬少許爲末。水

萬年青連根煎湯洗。以五倍子
七分溫服。

右爲末。繖肛自歛。

一椀煎湯洗。

【治痢後脫肛潤腸散】
鱉頭灰 五倍末 伏龍肝

生礬末 赤石脂 詞子肉各

摻

五錢俱晒乾。貼水荷葉。焙研酒服三錢。併以

荷葉盛末坐之。

慈石半兩煅醋淬。七次爲末。空

心米飲服一錢。仍以鐵屑煎湯

洗。

先以麻油潤之。再用風菱殼煎

湯洗之。即刻縮上不脫矣。(張

氏經驗方)

枳殼防風各一兩。桔礬二錢。煎

水乘熱熏洗。隨以赤石脂末摻

苦參五倍子陳壁土等分。煎湯

洗之。以木賊末敷之。(醫方摘要)

紫背浮萍爲末。乾點之。奇效。(得效方)

蒲黃和猪脂敷。日三五度。
白雞冠花防風等分爲末。每服
一匙。空心米飲下。

豆板莧煎湯入脚盆內。放白礬
三四枚。乘熱熏之。稍冷即洗。洗

至湯冷爲度。隨以手指按住肛
門。自然收進。(醫林集要)

大田螺井水養三四日去泥以
雞爪黃連研細末入殼內待化
成水。以茶洗淨。將鷄翎蘸掃之。

以軟帛托上。

蝸牛一兩燒灰。猪脂和敷立縮。
(聖惠方)

豆板莧煎湯。倒入脚桶內放白
藥三四粒乘熱薰之。稍冷即洗。

洗至湯冷爲度。其肛欲手撲之。
自然收進。(怪證奇方)

【痔瘡脫肛】冷水調黃連末塗
坐。冷即易。

【虛冷脫肛】石灰炒熱。蘆帛裹

加明礬煎洗。再用五倍子炒研
末敷托而上。

【久痢脫肛】石榴皮。陳壁土。少
許。骨各二錢研細末。以茶少許和

藥。摻肛上。絹帛揉入。

苧麻根煎湯。外以木賊研末敷

部中。明日蟲皆出。(必效方)

鶴虱草爲末。水調五錢服愈。

【肛門腫痛】馬齒莧葉三葉酸
草等分。煎湯熏洗。一日二次。頗

有效驗。(集簡方)

生苧麻根。搗爛坐之。甚良。(集

簡方)

【肛門痛癢】杏仁不拘多少。取

膏頻頻敷之。(肘後方)

【洗脫肛方】因於寒者。宜後方洗擦。

龍頭煅。胡葱。煎湯洗。伏龍肝。研末麻油

調植

因於熱者。宜後方洗擦。
朴硝。白礬。煎湯洗。

川柏炒。牡蠣煅。研末摻擦。

大田螺數枚去殼。入冰片末去
螺尾端滴水貯碗中。舊筆洗淨

蘸擦之。

【肛頭癢】

朴硝煎湯熏洗。

【肛頭癢痛】由大腸受濕。流注
肛頭。宜秦艽羌活湯內服。

羌活錢半。秦艽。黃蓍各一
錢。防風七分。升麻。麻黃

柴胡。甘草各五分。紅花
細辛各三分。

【挾濕熱生蟲而癢】宜萹蓄湯。
萹蓄一握水煎服。

外以苦棟根煎湯頻洗。

【腸頭努出下血】宜當歸郁李

仁湯

郁李仁 皂角仁各一錢 槐

花米七分 秦艽 麻仁 當

歸尾 生地 蒼朮各五分

大黃製三分

■ 痘瘡

附

耳痔 鼻痔 腦漏 偷

糞鼠瘡 騎馬癰

【牡痔】即外痔。肛外發露肉珠。
狀如鼠奶者是。

【牡痔】肝內腫突。膜潰卽散者
是。串臂者有串腸者。有串陰者有

衣輒出清血。穢從瘡口出者漏卮不塞。精血
日枯漸成損怯。難治。宜戒酒色。
【脈痔】肝邊痛。癢。顆顆發癟。更
肝者是。

【血痔】因便血注者是。

【氣痔】憂思怒恐。立見腫痛。大

便艱難者是。自牡痔至氣痔此
五種皆屬內痔。

【酒痔】飲酒發動。瘡痛流血者
是。

小琴按諸痔有形如 雞冠蓮

花 櫻桃 胡桃 雞心

鼠奶之狀久而生蠱。便前血射一
縷爲痔瘻。(同漏)近旁穿穴。

加芩 連

中生脆管。流膿不止。卽爲漏。有
串臂者。有串腸者。有串陰者。有
穢從瘡口出者。漏卮不塞。精血
日枯漸成損怯。難治。宜戒酒色。
【氣痔方】宜歸脾湯化裁。
人參 生朮 伏神 荘仁
龍眼各二錢 生薯錢半 當

歸 達志各一錢 木香 甘
草各五分 薏 聚全再加枳
壳 廣皮

【酒痔方】宜芩連四物湯。槐角

丸加味

(芩連) 歸 蒀 地 荻再

(槐角) 槐角炒 黃芩 地

宜梅連丸。

榆當歸 防風 枳壳炒

川連一兩酒浸研 百草霜

分加 冰片研細水調敷

各等分爲末 酒丸桐子大。每

一兩 烏梅一百 游川連之

服六十九空心米飲下極效。

或加烏梅炒今再加銀花 甘

酒浸烏梅 蒸杵爲丸桐子大

或加烏梅炒今再加銀花 甘

空心服四五十丸三日效十日

洗 次以木鼈子 錦金 等

草 【血痔方】若諸藥不應。宜黑以

止。 【不論痔瘻蟲痔方】水銀裹子

外治法。 小琴按取田螺水法則取大

石煤或代百草霜 槐花 空

心烏梅湯下神效。

田螺挑去其盤加冰片於中

小琴按四物湯方見前。以當

歸改酒炒歸身鮮生地加蒲

去螺尾端以碗承取其水

黃炭 黑山梔 蓮衣炭

魚腥草 荔棟根 馬齒莧

或取大田螺數十枚加清水半

茜草根炭 阿膠炭 冬瓜

朴硝 煎湯薰洗

螺過一宿去螺取水調冰片聽

子 紅花亦效

【洗翻花痔方】

用

【不拘痔瘻腸紅方】止血通用。

荆芥 防風 朴硝 等分煎

蠶繭數枚開一口。納指甲其中。

令滿外用童髮纏裹燒存性蜜水調敷

【透膿法】如瘡潰後或又起小核上面槁白內已黑腐宜追毒丸再用閉管丸

【追毒】胡黃連一兩姜汁炒刺猬皮二兩切炙炒黃爲末

麝二分爲細末以軟飯爲丸如麻子大每空心服一錢酒下

(閉管) 胡黃連一兩淨末

甲片麻油內煮黃石決明煅槐花炒各五錢爲末煉蜜丸麻

子大每服一錢空心米飲下早晚各一次漏深者四十日愈

(四邊硬肉突起) 即前閉管丸中加蠶繭二十個。

炒末和入按此方遍身諸漏皆效

【穿腸漏方】

用水安息香擦之十日全消按此香出波斯國以椰子盛之狀似膏黏而薄黃黑色著手其香

透爪甲者爲真

(親驗方) 宜聖祖御賜方

大祖親驗方

(親驗方) 犀角屑 象牙屑乳香 沒藥各一兩 明礬

黃蠟各五錢 銅器烊化黃蠟入藥末爲丸以連翹銀花

浸酒煮半日服丸每服二十一丸明太祖驗方(涼血)

草節 連翹各四錢 爲末金銀花一斤 煎濃汁泛丸如龍眼大 每早晨鹽湯下三錢 初起者半料愈年久者一料此聖祖御賜陳山凱方也

【管退漏眼未平】宜生肌膏

雞蛋黃油三錢卽鳳凰油 輕粉一錢研細 乳香 血竭

龍骨各五分研細 人蛋油內和勻日以雞翎塗患孔內外蓋膏藥半月可以完口

【洗瘡孔穢物】露蜂房 白芷 苦參 煎湯熏洗日三次

【耳瘻】耳中生如羊奶宜內服

清肝湯。外點藥粉甚驗。

(內服) 當歸 白芍 青黛

燈草 山梔 柴胡 丹皮

鮮石膏蒲 生甘草

(外點) 磷砂一錢 輕粉

雄黃各三錢 冰片五厘 水

調和點之效。

【鼻痔】鼻中生瘻肉。

瓜蒂 甘遂炒各四錢 枯礬

五分 甘研細末 淨松香五

分 為衣香油調為丸每用一

丸入鼻內點痔日一次即化臭

水而愈。

【腦漏】腦中時流臭涕。

辛夷二錢 羌活 獨活 防

風 藥本 細辛各五分 蒜

外用 生大黃三錢 熟石膏

艾一兩 將藥末斬艾內捲作條點火熏鼻即愈 或用荆樹葉搓塞鼻中亦效。

小琴按松花粉再研極細搐鼻亦效。

小琴按松花粉再研極細搐鼻亦效。

小琴按松花粉再研極細搐鼻亦效。

【偷糞鼠瘡】生近肛門潰膿後

極易穿漏腫痛時宜後法治之。

屋上乾鴉屎金魚同搗爛敷患

處立消或貓頭骨炙灰研同酒

服亦效。

【騎馬癰】即懸癰亦名跨馬癰

生肛前陰後適在肛門腎囊之

中間初起如松子大漸如蓮子

後如桃李宜用。

生甘草梢四兩 水煎服即愈。

外用 生大黃三錢 熟石膏

小琴按心之蟲曰蛔脾之蟲曰寸白腎之蟲如刀絛絲縷肝之蟲如蠶杏肺之蟲如蠶

一兩 紫金錠一塊 同搗碎水調敷立能止痛。

肝經若蘊濕熱 宜龍膽瀉肝湯

龍胆草 黃芩 山梔 澤瀉

生地 木通 車前子 當歸

柴胡 甘草

已成膿者生黃蓍 人參 川

芎 當歸各一錢 白芷 官

桂 甘草防風各五分 一服

痛止再服內潰十服肉使生

水而愈。

人身蟲病

又有三蟲曰長蟲曰赤蟲曰
蟾蟲五臟之蟲惟肺者最
能殺人令人瘡咳咯血聲嘶
殊爲難治三蟲中能爲人病
者厥惟燒蟲但性喜甜得
甘則動得苦則止得酸則軟
得辛則伏治之之法必於月

牽牛 柏榔 大黃 三稜
莪朶 木香 共研末用皂角
子研碎煎濃湯去渣煮麵糊丸
以茶清下四十九

【消渴蟲】最耗陰液宜下方。
苦棟根白皮一握切焙加麝少
許水煎服蟲下渴止。

(桃仁) 桃仁去皮尖 槐花
米各三錢 生艾五錢 大棗
十枚水煎

(瀉心) 黃芩 川連 大黃

甘草

【狐惑】宜下列雄黃銳散

雄黃 苦參 青箱子 川連

桃仁 研細搗生艾汁爲丸如

棗核大綿裹納入肝門

【糞後蛆蟲】其病熱道微瘡宜

五臘蟲】(三蟲)宜先飲肉汁。

以遇仙丹。

【應聲蟲】口發言腹應聲搗藍
汁飲或服雷丸湯。

藍汁卽染坊所用藍靛。

雷丸湯卽以雷丸一味煎湯。

【狐惑】已見一卷中其症狀類

桃仁 槐子 陳艾各三錢

紅棗肉杵丸

【大腸蟲出】行坐不得。

鵝糞灰五錢水調服自愈。

【溺竅蟲出】乃小腸濕熱宜導

赤散加味。

生地 木通 甘草梢 竹葉

加 史君子 草薢 川柏

【婦人陰蝕蟲癧】

蛇床子 煎湯洗拭乾 內繆

桃仁 雄黃 等細末

【渾身蟲出】血肉俱壞。
蘇鹽醋湯半月即安。

【八角錦陰毛生蟲】生肉中
出毛孔。由肝腎陰虧所致。
宜內服六味地黃丸方。外以白果肉擦之。

【筋肉化蠶】如蟹走皮膚內作
微腫瀉盡蟲立愈。(肘後方)
聲急用後法

雄黃 雷丸各一兩爲末摻

豬肉上炙熟食盡自愈。

【附選單方】

【蟲積】苦棟根取東向不露出

土者去皮及骨四兩史君子去

殼二兩生薑三兩水五椀煎至

三椀去渣再煎至一椀加白蜜
四兩又熬至一椀露一宿次早

隔水燉熱空心服一日服完不
吐不瀉蟲從大便成團而出少

則一服多則兩服除根。(應驗
良方)

雄黃水飛半斤熬酒數斤。朔後
望前時取雄黃與酒和飲令常

酸石榴東引根濃煎五更服。
馬齒莧水煮加鹽醋空心食之。
生蕪荑生檳榔等分爲末蒸餅

丸梧子大每白湯下二十九

腹內蟲痛者烏梅一個。老薑二
片榧子十粒花椒十四粒加黑
糖少許煎服

【寸白蟲】馬齒莧水煎一椀和
鹽醋空心食之少頃蟲盡出。(

食療本草)

榧子四十九枚去皮於月上旬
平旦空心服七枚七日服盡蟲
消成水。

桑根白皮切三升以水七升煮
二升平旦空心頓服。

雷丸水浸去皮切焙爲末。五更初食。炙肉少許以稀粥飲服少許。須上半月服蟲乃下。（經驗良方）

先食豬肉一片。以沙糖調黑鉛灰四錢。五更服之。蟲盡下。食白粥一日。（醫宗必讀）

棟實。醉苦酒中浸。再宿用棉裹納穀道中。頻易。

〔𧇯蟲〕攻心腹痛者。薏苡根二斤剉水七升煮取三升食前服。使君子肉火煨熟五更食。以殼煎湯送下。

繅絲蠶蛹兩合研爛絞取汁。頓服或繅絲時蠶蛹曬研細末和粥食。

𧇯蟲上行者。烏梅煎湯飲。

必備醫藥顧問 卷十

會稽馬小琴纂述

經汎門

痛腰痠等症。係屬血枯宜用。

無瘀塊下降。此婦人血氣健旺也。如有參前落後。請查閱先期

經多經少

全當歸二錢 丹參錢半 桂圓肉五粒 杜紅花五分 臨

後期門。

【經多】婦人性急多怒。往往傷肝以動衝任之脈。宜用黃柏。

知母各等分蜜丸梧子大。每服五十九名。補陰丸能瀉衝任之火。而調經種子。

【又方】歸身三錢 川芎錢半

生地三錢 白芍二錢 錢 炒黑荆芥一錢 生甘草

黃柏八分。鹹水炒。知母錢半六分。如再不止用鮮茅根搗或酌加銀柴胡五分。條芩五分。

【又方】歸身三錢 川芎錢半

生地三錢 白芍二錢 錢 炒黑荆芥一錢 生甘草

黃柏八分。鹹水炒。知母錢半六分。如再不止用鮮茅根搗或酌加銀柴胡五分。條芩五分。

【又方】歸身三錢 川芎錢半

生地三錢 白芍二錢 錢 炒黑荆芥一錢 生甘草

黃柏八分。鹹水炒。知母錢半六分。如再不止用鮮茅根搗或酌加銀柴胡五分。條芩五分。

【經濃經淡】常服藥局所合六味地黃丸亦效。

【經水欲來】臍腹疼痛宜用烏藥 細砂 木香 玄胡氣各一兩 香附炒去毛二兩

【經少】婦人臨月經少。苟無腹

【經濃】經來色濃。設非過多。並

甘草炙一兩半 右細剉每服

七錢生薑三片水煎溫服。

〔臨經腹痛〕宜桃仁四物湯

歸尾二錢 川芎 赤芍 丹

皮 製香附 元胡索各錢半

紅花五分 桃仁二十粒 如

瘦體火盛加黃連炒 黃芩炒

各一錢 肥人有痰加枳壳

蒼朮各一錢

【經孕腹痛】

宜用加減八物湯

台黨一錢 白朮一錢 醋炒

香附一錢 浙苓錢半 歸身

一錢 川芎一錢 白芍一錢

生地一錢 木香五分 青皮

七分 紅棗二枚 鮮薑一片

煎服

〔又方〕行經後少腹疼痛。係腎

氣虧涸乃水不生木木尅土之

象宜用調肝法。

炒淮山藥五錢

阿膠三錢白

麵炒當歸三錢酒洗 白芍

三錢酒炒 山萸肉三錢蒸熟

巴戟一錢水浸 生甘草一錢

水煎服

【經來參前】

宜涼血固經法。用。

當歸二錢 白芍炒二錢 生

地二錢 川柏炒一錢 知母

炒六分 川芎八分 阿膠炒

分 炙甘草七分 水煎服

〔又方〕凡腎中水火太旺子宮

灼熱難以受孕。蓋水旺則血多。

火旺則血熱故亦先期也。宜用

清經散

丹皮三錢 地骨皮五錢 白

芍三錢酒炒 大熟地二錢九

蒸 青蒿二錢 白茯苓一錢

川柏五分鹹水浸炒

水煎服 小琴按經水先期此方最驗。

余診婦人此候屢以此方投之神效且易孕也。

〔又方〕凡經來先期。在性度溫和之婦人。乃屬血盛且有熱也。

宜用

川芎七分 赤芍一錢 生地

小琴按經水先期此方最驗。

余診婦人此候屢以此方投之神效且易孕也。

一錢 知母一錢 麥冬一錢 地骨皮一錢 生甘草五分

水煎空腹服

【又方】在性度急躁。多怒多妒者。此氣血俱熱。且有鬱也。宜用

製香附炒研一錢 歸身一錢 川芎一錢 白芍一錢 條芩

炒一錢 川連八分 生甘草

五分 生地七分 水煎

【又方】三補丸專治血熱。

黃芩 黃柏 川連 俱炒各

等分蜜丸如梧子大。每晨開水

下三四十九

【經來落後】

凡後期來多者。血寒而有餘來少者。血寒而不足也。夫諸經之

血悉附腎而下注。無由收攝。往往致成不足之症。下列二方。凡後期者皆可用。倘元氣不足。可加入參一錢。其方名曰溫經攝血湯。

人參一錢 黃芪一錢 山藥一錢 白茯苓一錢 川芎一錢 白芍一錢 熟地一錢

蓬莪朮 萍蘭各一錢 炙甘草 肉桂各四分

【又方】治血脈虛弱後期。

人參一錢 黃芪一錢 山藥

一錢 白茯苓一錢 川芎一

錢 白芍一錢 熟地一錢

【經來先後不定】

凡患此症者。係腎鬱而氣不宣。輕則之或通或閉所致。宜用定經法。

【又方】後期不行乃血寒氣滯

也。宜用補血行氣法。

當歸 赤芍 砂仁四分拌炒

山藥五錢炒 荆芥穗二錢炒

黑柴胡五分 水煎服四劑。

經期可定。

小琴按此方余曾治愈數人。真有奪造化之妙不可忽視。

醒睡也。

【經來漏痛】

【又方】加減八物湯。

台黨 白朮 茯苓 炙甘草

當歸 川芎 陳皮 丹參

製香附 丹皮各一錢 薑二

片 紅棗三枚水煎服。

【臨經倦寐】

此脾病也。經過卽復原狀。雖不

服藥亦無所礙。或以爲憂可服

下方

全當歸二錢 遠志四分 生

研棗仁三錢 炒蕷豆花二錢

水煎

【又方】單用生棗仁三錢搗碎

煎服亦甚效。蓋熟者安眠生者

婦人性急多怒遂致傷肝衝任

【經一月兩至】

地榆炭一錢 白歸身二錢

此血門弛張。溺管逼仄也。宜用

川棟子皮一錢 緣通一錢

歸尾錢半 川牛膝三錢

【又方】如經來疼痛小便如刀

割宜用

川牛膝三錢 明乳香一錢

麝香二分 水一碗半 煎牛

膝至一碗細研乳香及麝香調

牛膝湯空心服之。卽愈。如係火

症。用辰砂益元散。附辰砂益元

散方 飛滑石 生甘草 辰

砂

之脈。因而損動。屢有此症。宜瀉
衝任之火。

歸身錢半 川芎一錢 白芍

一錢 生地二錢 柴胡五分

黨參一錢 條芩八分 生甘

草六分 川連四分 煎服亦

宜參閱經多門調治

【延經不淨】

此症不外動肝。損傷衝任。但因

肝火贍鬱而致。經滴瀝下注者。

治法宜參「經多」、「經一月兩

至」等。候調治。或因經後未淨。
遽爾媾合。亦往往有此症。其爲

傷衝任之脈。則一而所以致病

之由不同。宜後方。

鹹水炒川柏六分 根生地二錢

丹皮炭一錢 黑棗仁錢半

生白芍一錢 菟絲子一錢

水煎服三五劑愈或加地骨皮二錢

根生地二錢

【又方】

十灰丸五錢 晨間空腹時用淡鹹湯送。頓服之亦甚效。十灰丸尋常藥鋪皆有製售。故不贅方藥。

小琴按延經不淨之症屬衝任發炎。余常治此候。首用前二方投之。無不捷如影響。但

通商諸埠。嘗有一種婦女。往往因男子問花尋柳傳染一種輕微梅毒(如白濁等類)

人參八分 於朮八分 茯神湯。

人參八分 於朮八分 茯神湯。

二錢、炒聚仁二錢研清茶

著八分 全當歸錢半 遠志

溺管。按炎歸遺細君初則臨瀉短數。牡戶刺痛繼則陰唇翻腫。熱度增高。白帶白淫腥穢狼籍。最後其經水爲熱毒所逼。津津不止。若亦以前方

治之。非徒無益。且有害也。宜

用清血解毒之品服之。庶幾

不謬。但此非本書範圍。故不

立方。所以表而出之者恐醫

者偶值此症。而輕用前二方

也。

【又方】如脾不統血宜用歸脾湯。

人參八分 於朮八分 茯神湯。

人參八分 於朮八分 茯神湯。

二錢、炒聚仁二錢研清茶

著八分 全當歸錢半 遠志

簡四分 廣木香六分 清炙甘草六分 龍眼肉五枚 紅棗三枚 鮮生薑一片 水煎服

此症之作必不思飲食。蓋由胃氣不開所致。宜取雄鴨頭頂上血冲酒服之。立愈。如寒熱交作。係感冒風邪。陷入血室。日中明了。夜必譖語。宜用小柴胡加地黃湯方見下。不贅。

【臨經潮熱】

婦人中風發熱惡寒。經水適來

晝則明爽。夜則譖語。如見鬼狀。

發作有時。此名熱入血室。宜用

小柴胡湯。此方并治產後惡露。

經。忽然斷絕。

小琴按月汎方至寒熱適來。

其經必阻下方最驗。

柴胡二錢 半夏二錢 黃芩

二錢 人參錢半 甘草五分

生地黃錢半

右作一服水二鍾 生薑五片紅

棗二枚煎一鐘不拘時服

【又方】四物湯用生地加柴胡

亦可。

當歸錢半 川芎一錢 生白

芍一錢 生地黃錢半 柴胡八

分

【又方】婦人傷寒經汎適至寒

熱陡作或狂言如見鬼用乾薑

柴胡湯

柴胡一錢 桂枝三分 桔梗

根五分 炒牡蠣三分 乾薑

泡三分 甘草三分 右水煎

服汗出而愈

【又方】治熱入皿室發狂不認

人者。

牛黃二錢 碳砂三錢 鐘金

三錢 牡丹皮三錢 腦子一

錢 甘草一錢 右爲細末煉

蜜丸如桐子大每服一丸新水

化下 小琴按向藥鋪購牛黃

清心丸爲便捷

【又方】小琴按南方多傷溫北

方多傷寒醫者宜注意及之大

抵此症南則宜採小柴胡湯北

宜乾薑柴胡湯但古今氣運遞

嬗風土之厚薄不能無異拘泥古劑刻舟求劍未可爲訓醫者臨症總宜細心制裁譬之繪事以古法爲藍本着色佈景固不必規規求肖也余南人嘗治此證雖本小柴胡法而分量之間斟酌加減往往效如應響不揣謙陋列方如下求政有道。

銀柴胡四分 嫩桂枝二分

淡黃芩六分 露半夏二錢

丹皮錢半 根生地二錢 連

翹二錢 廣陳皮五分 右水

煎一二劑便愈並治尋常寒熱如舌燥口乾加金石斛三錢先煎甚效。

婦人行經後感冒風寒。衝任內虛必致下陷。則臍腹間作陣痛。如風邪化熱下入血室。則寒熱不時日中明瞭。夜則囁語。醫者宜謹察之。

【寒入血室】婦人經來。偶感風寒。旋即阻止。腹痛不可忍。此係衝虛而寒氣陷入也。宜桃仁桂枝湯。

桂枝二錢 苓藥二錢 生地二錢 桃仁去皮尖七錢 生甘一錢 右爲粗末生薑三片

棗一枚水煎溫服。

濟陰綱目此方下附注一婦人。冬月經行偶值歸寧。途中傷冷。遂經止不行。腹痛不可忍。此藥

一劑而痛止。經復行。其效如神。小琴按此症往昔內子亦嘗偶罹。凡痛極而不能眠臥者。三晝夜百藥罔效。余友某君。精於脈理。邀與磋酌。總無治法。後由岳家求一籤方。一劑而痛定。再劑而神清。不禁愕然。後與某君研究。此方固不啻臨的發矢。其偶然中病耶。抑冥冥中固有神權也。其神俗呼童老爺。不知昉於何時。

在紹興孫鑛鎮邑廟。

【病因】昔年產後。感忿惡露。停結不下。彌月後。胃不思納。肌肉瘦。月經不調。營衝不和。痰嗽。

春初月汎竟臨。頗脫病範。不圖此時春雪綿綿。寒風料峭。偶用冷水洗巾。至起後。各象

抽掣口乾咳嗽。湧痰白絕不思食。小解甚稀。大解不下。喉間作水雞聲。不能眠臥。

杏仁二錢 桃仁二錢 澤蘭錢半 丹參三錢 紅花一錢陳皮一錢 玄參錢半 大紅棗八枚 薑汁半杯

【經方淨寒熱大作】此症亦宜用小柴胡湯照熱入室同治。

【經病寒熱】

婦人血虛煩熱。口燥咽乾。減食嗜臥。月經不調。營衝不和。痰嗽。

潮熱肢體羸瘦漸成骨蒸宜用逍遙散。

當歸酒洗 白芍藥 白朮

黃各一兩 柴胡半兩 黃芩

白茯苓 柴胡各一錢 甘草
炙五分 右加生薑三片麥冬二十粒去心水煎服不拘時○

一方加牡丹皮梔子炒名加味

逍遙散○一方加知母地骨皮
○有嗽加桑白皮貝母桔梗知

母麥冬咳血加生地黃山梔牡丹皮○嘔血加陳皮半夏旋覆

當歸 川芎 白芍藥 生地

黃 黃芪 地骨皮各一錢

右咬咀水煎空心服

牡丹皮一方四物湯加川黃連極効

【又方】婦人血氣不足肌體煩熱四肢倦怠不進飲食

當歸 川芎 白芍藥 生地

黃 黃芪 地骨皮各一錢

右咬咀水煎空心服

【又方】婦人血脈不調往來寒熱狀如勞倦宜用

當歸 川芎 黃芪 甘草

官桂各一錢 熟地黃 白芍

皮 桂心各半兩 右咬咀每

服三五錢水一盞半生薑三片

煎七分服

【又方】婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食宜用柴

胡散

【又方】婦人衝任虛損月經不行。肌膚發熱如勞瘵狀宜用加味四物湯。

二陳湯

當歸 川芎 黃芪 甘草
官桂各一錢 熟地黃 白芍
藥 白朮各二錢 柴胡 阿

皮 桂心各半兩 右咬咀每
服三五錢水一盞半生薑三片
煎七分服

北柴胡 赤茯苓 黃芪 白朮各

一錢 麥門冬去心三錢

鼈甲醋炙二錢 人參 地骨

皮 枳殼麸炒 生地黃 桑

白皮 赤芍藥 桔梗 千草

各五分 右作一服。水二鍾生

薑三片煎至一鍾。不拘時服。

【又方】婦人寒熱往來宜用七

寶湯。當歸 川芎 莎藥 熟地黃

防風去蘆 知母 生地黃各

半錢 柴胡去蘆 前胡去蘆

秦艽 甘草炙各二錢半

右咬咀。每服五錢水一盞半加

人參三分煎七分服。

熱。(下四物湯與小柴胡湯合)

方也。宜柴胡四物湯。

當歸 川芎 莎藥 熟地黃

各一兩半 柴胡八錢 人參

黃芩 半夏 甘草各三錢

右剉每服一兩。生薑三片水煎

而多不遂是以惡寒發熱證宜

虎骨五錢 當歸 莎藥 白

芷 附子各三

錢 右爲粗末。每服五錢水二

鍾生薑五片棗三枚煎至一盞

柴胡抑肝散。

柴胡二錢半 青皮二錢 赤

芍藥炒 牡丹皮各一錢 蒼

朮米泔浸炒 山梔子炒 地

湯。【又方】婦人經事將行臍腹絞

痛者氣滯血濕故也。宜用八物

湯。不拘時服。此治身痛之劑。

【又方】婦人經事將行臍腹絞

痛者氣滯血濕故也。宜用八物

湯。水煎食前服。

當歸 川芎 莎藥 熟地黃

玄胡索 苦棟碎炒各一錢

木香 檳榔各五分 右作一

服。水煎食前服。

婦人血氣虛寒。身體作痛。宜用越痛散。

虎骨五錢 當歸 莎藥 白

芷 附子各三

錢 純斷防

虎 茯苓 甘草

各一錢。水煎服。

【又方】婦人經水將來作疼不

止宜用加味四物湯。

當歸酒洗 川芎各一錢半

芍藥炒 熟地黃 玄胡索

蓬朮醋煮 製香附醋煮一錢

砂仁八分 桃仁去皮尖七分

紅花酒炒五分 右剉水煎服。

【又方】婦人經候前偶感風寒。

腹痛不可忍。宜用桂枝桃仁湯。

桂枝 芍藥 生地黃各二錢

桃仁去皮尖七錢 甘草炙各

一錢 右爲粗末生薑三片聚

一枚水煎溫服。

【又方】婦人營衛不通。經水不

調。腹中撮痛氣多血少。結聚爲

瘕及產後中風。宜用交加散。

生地黃 生薑各五兩各研取

汁 右交互取汁浸沾一夕。汁

盡爲度各炒黃末之。尋常腹痛

酒調下三錢。產後尤不可缺。

【又方】婦人營衛不和。月事湛

濁。逐散惡血。治臍腹撮痛。腰腿

重墜。宜去交加散。

生薑一斤搗取汁存滓用 生

地黃二斤搗取汁存滓用 白

芍藥 當歸 玄胡索醋紙包

煨熱用布擦去皮 蒲黃隔紙

炒各一斤 桂心一兩 紅花

炒無惡血不用 沒藥另研各

生薑汁浸地黃滓 培乾同諸

藥爲細末。每服三錢溫酒調下。

○若月經不依常。蘇木煎酒調

下。○若腰痛糖球子煎酒調下。

【又方】婦人經不調。血塊脹痞

肚服疼。宜用交加地黃丸。

生地黃 老生姜各一斤俱另

取汁 漬 玄胡索 當歸

川芎 芍藥各二錢 明乳香

木香各一兩 桃仁去皮尖

人參各半兩 香附半斤 右

爲末先以生薑汁浸地黃滓以

地黃汁浸生薑滓晒乾皆以汁

盡爲度共十一味合一處晒乾

皆爲末醋糊爲丸。空心姜湯下

【又方】婦人瘀血作痛。宜用瓦

龍湯。

香附炒煮四兩 當歸 牡丹

去皮尖 大黃酒蒸各二兩

川芎 紅花各半兩 瓦龍子

煅醋煮一晝夜二兩 右爲末。

炒餅丸空心溫酒下三四丸。

【又方】室女血氣相搏腹中刺痛。引心系經行澀少。或經事不調。以致疼痛。宜用二神丸。

香附子擦去毛。不拘多少米醋浸一日。用瓦錠。熬令醋盡。右

爲末。醋糊丸如桐子大。晒乾每服五十丸。淡醋湯下。

【又方】婦人月經壅滯。每發心

腹脣病痛。不可忍。及治產後惡露不快。血上捨心。迷悶不省氣

切不少。亦宜多合以濟人。

升生薑半斤。切片。米醋四升。同

煮至豆爛爲度。焙乾入後五味。

同爲細末。每服二錢。溫酒調下。

空心食前服。○本事云。一方不

用菊花。蒲黃。用烏藥。玄胡索。亦

佳。予家之祕方也。若是尋常血

氣痛。只一服。產後血衝心。二服

便下。常服尤佳。予前後救人急

新舊虛實腹痛。宜玄胡索散。

當歸酒浸。赤芍藥炒。玄胡

索。蒲黃隔紙炒。桂皮。乳

香木切。沒藥各一錢。右爲

細末。每服三錢。溫酒空心服。

【又方】婦人久積血氣病痛。小

橘紅二兩。玄胡索去皮醋煮當歸酒浸略炒各一兩。右爲

【又方】婦人月經壅滯。每發心腹脣病痛不可忍。及治產後惡露不快。血上捨心。迷悶不省氣絕欲死。宜琥珀散。

當歸酒浸。赤芍藥炒。玄胡索。蒲黃隔紙炒。桂皮。乳香木切。沒藥各一錢。右爲細末。每服三錢。溫酒空心服。

【又方】婦人久積血氣病痛。小

【又方】婦人血海疼痛。宜加味

京三稜 蓬莪朢 赤芍藥

索。蒲黃隔紙炒。桂皮。乳

香木切。沒藥各一錢。右爲

烏藥湯。當歸一錢半。香附二分。當

劉寄奴 牡丹皮 熟地黃

索。蒲黃隔紙炒。桂皮。乳

香木切。沒藥各一錢。右爲

歸一錢。木香。甘草炙各五

花各一兩。右前五味用豆一

升生薑半斤。切片。米醋四升。同

煮至豆爛爲度。焙乾入後五味。

便刺痛四肢無力。宜當歸散。
當歸 赤芍藥酒炒 劉寄奴
枳殼炒 玄胡索 沒藥各等分。右爲末熱酒調下二錢
不拘時服。

【又方】婦人臍腹疼痛不省人事。只一服立止。人不知者云是心氣痛誤矣。此經驗方也。

木通去皮 芍藥炒 五靈脂
炒各等分。右㕮咀每服五錢。
醋水各半盞。煎七分溫服。

小琴按婦人之病。以腹部疼痛爲最多。以上諸方可云完備。有家室者。手此一編。按圖索驥。母待他求也。

【經來大小便俱血】

【此名蹉經】因吃熱物過多積久而成。宜用分利五苓散去其熱毒。調其陰陽即安。

猪苓 澤瀉 白朮 赤苓各一錢 阿膠炒 當歸 川芎
各八分。水煎空心服即愈。

【又方】此方係絳歷年所經驗亦甚效也。

當歸錢半 根生地二錢 丹皮一錢 淡子芩酒炒六分
絳通八分

【經少腹大狀如漏胎】
此名腸蕈。因經行之時寒氣自肛門而入。客於大腸。以致經血凝滯。月信雖行。而血卻少。其腹漸大。如孕狀。如胎漏肚盛。婦人半年以後。氣盛而除虛怯者。必成脹病。用桂枝桃仁湯。桂枝梢榔各一錢五分。白芍 生地 枳殼各一錢。桃仁二十粒。炙草五分。薑棗引水煎服。更宜常服四製香附丸。見後此症載靈樞經內人鮮知者。特表而出之。

【經逆行從口鼻出】
此因食椒薑熱毒之物。其血亂行。急用犀角地黃湯。犀角白芍 丹皮 枳實各一錢。黃芩 橘紅 百草霜卽鍋底烟子。以燒草者爲佳。燒煤炭者斷不可用。桔梗各八分。生地 甘草各三分。水煎空心

服數劑卽愈

【又方】

韭菜搗汁一盞入童便半盞蒸熟服極效若無童便其功稍緩。

【又方】以好陳墨磨水一盞服其血立止次用歸尾紅花各三錢水一鍾半煎八分服。

【又方】兼咳嗽氣緊者宜推血下行當用紅花散七帖次用冬花散止咳下氣熱去全安。

【紅花散】紅花 黃芩 蘇木各八分 花粉六分水煎空心服

【冬花散】冬花 粟殼蜜炒桔梗 枳殼 蘇子 紫菀知母各八分 桑皮炒石羔

杏仁各一錢 水煎服

【臨經誤動房事】

此證俗名撞紅惟服下方萬安萬穩

明雄水飛淨三錢 好酒沖服一次卽愈。

【經數月一行】

婦人形盛多痰氣虛至數月而經始行者宜服蒼附六君湯兼服蒼附導痰丸若形瘦胃弱氣血兩虧至對月而經始行者宜

服十全大補丸三方列後

蒼附六君湯

人參六分 白朮四錢 茯苓三錢 炙甘草六分 半夏錢分 肉桂三分 薑二片 聚半 陳皮八分 米醋浸蒼朮三枚 水煎服

八分 童便製香附錢半 酒炒條芩六分 川芎一錢 當歸二錢 穀炒枳殼六分 水煎食前服

蒼附導痰丸

蒼朮 香附 枳殼各二錢

陳皮 茯苓各一兩五錢 膽星 甘草各一兩 細末薑汁和神龜丸淡薑湯

十全大補丸

人參六分 密炙冬朮八分

地三錢 當歸三錢 川芎錢茯苓二錢 炙甘草六分 熟

三錢 白芍二錢 蜜炙黃耆八分 肉桂三分 薑二片 聚

按此症如不覺有病及腹塊或三四月經水一行汎期準確此係季經俗呼四季轉非病也又有終年而經一至則曰週經抑或終年絕無而體質自旺兼能懷孕此名暗經俱非病徵更有平時汎來甚准忽停而不行胃納自若別無他候此爲居經亦可不藥若經事忽停或見瘀血或洒淅畏寒面額時炎此停經也

見停經門

【停經】婦人胃熱消渴減食漸瘦津液爲熱燥竭以致血海乾枯宜玉燭散。

婦人胃熱消渴減食漸瘦津液爲熱燥竭以致血海乾枯宜玉燭散。

當歸 川芎 白芍藥 地黃
大黃 芒硝 甘草 等分
右剉每服八錢水煎食前服。
【又方】治勞心心火上行以致胞脈閉塞月事不來宜三和丸
當歸 川芎 白芍藥 地黃
大黃 朴硝 黃芩 桔子
連翹 薄荷 甘草各等分
右剉每服八錢水煎服。

【又方】婦人多產育傷血或誤服汗下尅伐之藥以致血衰氣乏而經不行宜用十全大補丸
人參 白朮 白茯苓 甘草
澤蘭葉三兩 當歸酒洗 荻
炙 當歸 川芎 白芍藥
熟地黃 黃芪 肉桂各二錢
藥炒各一兩 甘草一錢 右
爲粗末每服五錢水煎二盞。一
右作一服水煎服。
蓋溫服。

【又方】婦人血虛有火月經耗損漸至不通日漸羸瘦而生潮熱及室女思慮成勞經閉慎勿以毒藥通之宜服柏子仁丸兼服澤蘭湯
柏子仁炒研 牛膝酒洗 卷柏各半兩 澤蘭葉 繩斷各二兩 熟地黃三兩酒浸半日石臼內搗成膏 右細末煉蜜丸如桐子大空心米飲下三十丸。

【又方】婦人飲食勞倦。損傷脾胃。氣弱體倦。發熱作渴。飲食減少而不生血者。宜加味補中益氣丸。

黃芪 人參 甘草炙 白朮
當歸 陳皮各一錢 升麻
柴胡各三分 生地黃 天花
粉各八分 右剉作一服水煎
服。

【又方】婦人室女經脈不通。宜
二黃散。靈應如神。

大黃燒存性二錢。生地黃三
錢。右爲末作一服。空心好酒
調下。

【經閉腹塊】

婦人經閉不通。臍下有塊。已經

三載。百藥無效。服此數劑。經行
又投數劑而塊消矣。宜養真湯。
當歸酒洗 川芎 白芍藥酒
炒 熟地黃 薑汁炒 白茯苓
陳皮 桔子炒 山茱萸去核
益母草 小茴香酒炒 香附
子醋浸炒各等分 右剉每服
一兩水煎服。五六劑後。經通作
丸服。

【又方】婦人經閉不通。及血塊
疼痛。宜經丸。

炒五錢 蘿蔴八分 右爲末。

皂角五錢。芫花二錢。水煎糊爲

丸。如桐子大。每服五十九米湯
下。丸如桐子大。每服五十九米湯
行。宜千金桃仁煎。
大黃濕紙裏煨 桃仁去皮尖
炒 朴硝各二兩 蚊蟲一兩
去足翅炒黑 右爲細末。醋二
升半銀石器中。慢火熬膏。却入
大黃虻蟲桃仁末。不住攪。度可
丸。却入朴硝再攪。良久出之。丸
如桐子大。五更初溫酒下五丸。
至日午取下。如赤豆汁。雞肝蝦
蟆衣樣。候鮮紅住。仍以調氣藥
補之。

【又方】婦人經水滯不行。腰

背臍腹疼痛漸成血塊。宜下方。

芍藥一兩。當歸。木香。肉

朮。乾漆炒烟盡。大黃炮。

湯金匱丸。

桂。乾漆炒烟盡。五靈脂。

桃仁去皮尖炒各等分。右爲

【調經湯】。當歸一錢。生地

大黃。黃芪煨各半兩。水蛭

末先將四分用米醋熬成膏和

一錢。益母草一錢。川芎八

炒二錢半。虻蟲三十個去頭

餘六分。成劑白中杵丸如桐子

大。晒乾每服二十九。用淡醋湯

足翅膀。桃仁二十七個湯浸

下加至三十九。溫酒亦得空心

食前服。○濟生方去川烏加紅

子大食前醋湯或酒下二十九。

花本草入雞子清同丸畏漆入

空心服此方統調諸經宜驗證

【又方】婦人月水澁滯不快。結

下加減如血熱先期及紫色成塊

成瘕塊脹大欲死。宜用聖惠方。

馬鞭草根苗五觔剉細水五斗。

過期者加煨姜肉桂各三分。

煎至一斗去渣別以淨器盛熬

膏食前溫酒調下半匙。

臨期正行作痛者加玄胡索青

膏。食前溫酒調下半匙。

婦人室女月候不通。或誤認水氣。宜調其經。經調則腫

成血癥。宜通經丸。

誤認水氣。宜調其經。經調則腫

自消矣。然服煎藥必須十餘劑。

當歸。桂心。青皮。乾姜炒

庶無愆期之患。至服丸散更宜

久。可免復腫之憂。宜服調經

川椒炒出汗。川烏炮。蓬莪

飲食者加白朮八分。陳皮一

砂仁各五分 肥人多痰赤白
帶下者加 製南星製蒼朮各

八分 氣虛血弱四肢痠軟面

色不澤者加 人參黃芪各五

分

【金匱丸】 四製香附米四兩

沒藥去油淨六錢 當歸童便

浸 伏苓去皮 白薇洗去蘆

白朮糯米泔浸透蜜炙黃 恰

粉炒阿膠珠 白芍各四兩

人參去蘆 砂仁去壳各二兩

生地酒浸洗去泥以益智仁二

兩用好酒同炒去益智仁不用

淨用生地八兩 川續斷酒浸

洗以五倍子同炒去五倍不用

淨用川續斷四兩 淮山藥棗

小琴按婦人之病覩縷不能

汁炒十二兩 共爲細末水丸

女月經初來不知保養誤飲冷

水或用冷水洗衣洗手而血見

冷則凝以致經閉面色青黃遍

身浮腫人皆誤作水腫治之不

效宜服通經丸通其血而腫自

消

三稜醋炒 菟朮醋炒 當歸

酒洗 川芎 赤芍 莞花

穿山甲炒 劉寄奴 糯米糊

丸酒下絳按此方太毒臨用宜

審慎之。

【經阻略血】

大生地三錢

鮮白茅根一兩 去心 黑旱

蓮草錢半 炒黑錦紋 二錢

殫述卽以咯血而論亦千頭
萬緒茲姑採述數條列後俾
閱者斟擇焉

【經阻瘀血】 血隨瘀出凝而且
厚月水不通一二月並無喘咳

此血逆妄行宜下方

歸尾 三錢 炒黑牛膝 三

錢 炒黑錦紋 錢半 丹參

二錢 鹿角屑 五分 紅花

六分 光桃仁十四粒 水煎

服如肥人宜加陳皮半夏瘦人

則參加清補滋腎等品腹痛加

玄胡索

【經阻狂血】 大生地三錢

蓮草錢半 炒黑錦紋 二錢

炒黑牛膝三錢 藕節炭三枚

黑棗仁二錢 丹參二錢 水

煎服此方通治男女咯血如不

止宜後方。

錢 蜜炙枇杷葉鮮去毛包三
片 玉胡蘿兩對 藕節炭三
枚

【又方】

鮮生地一兩 鮮白

茅根去心一兩 生錦紋三錢

以上三味加水少許搗爛攪

汁磨頂好陳墨立服立止。

鮮枇杷葉三片包 苦光杏勿
打三錢 紫苑錢半 黑旱蓮
草錢半 玉胡蘿兩對 三七
炭四分 根生地三錢 川貝
錢半

【又方】婦人經阻二三月。早晚
咳嗽而頰炎熱氣微喘。此勞怯
垂成之象。宜下方。
海蛤壳一兩 陳阿膠三錢
巴旦白杏三錢 蜜炙款冬花
包一錢 鮮枇杷葉三片包
桃奴桃樹上嫩桃乾朽不落者
冬月及正月收。掇鼠糞卽

【又方】婦人室女月經不通漸

成脹滿及治男子墜馬跌撲損

傷以致瘀血停積欲成血癧病

者悉皆治之。宜桃奴飲子。

桃奴桃樹上嫩桃乾朽不落者
冬月及正月收。掇鼠糞卽

雄鼠糞兩頭尖者是。玄胡索

五靈脂 肉桂 香附子 砂

蛤粉炒阿膠珠三錢 白薇二

錢 甜白杏勿打三錢 川貝錢半

炒桑葉一錢 淡蓆蓉八分

甘草一錢 淡蓆蓉八分

青蒿葉一錢 地骨皮二錢

當歸尾 赤芍藥 紫葳 劉

寄奴 牛膝 玄胡索 紅花

蘇木 桃仁炒各一錢 青皮

香附各八分 桂心五分 右

作一服水煎空心服。

【經閉腹膨】

婦人室女經候不行時作膨痛。

宜行經紅花湯。

仁 桃仁去皮尖另研各等分
右爲細末每服三錢空心溫酒
調下。

【又方】婦人癟脂經閉腹脹膨

悶或否宜加味導痰丸

半夏錢半 陳皮一錢 白茯

苓三錢 甘草六分 枳實一

錢 黃連三分 川芎錢半

右加生薑水煎服(或用川朴)

經云氣上迫肺則心氣不得下

通故月事不來今用連朴之類

導痰降火使不上迫於肺故心

氣下通而月事來也。

【又方】婦人經水閉不利臟堅

癰腹脹悶不止中有乾血下白

物宜樊石丸。

樊石三錢燒 杏仁二錢 右
二味末之煉蜜丸。棗核大內陰
中劇者再納之。

【經閉腹痛】

婦人月經不通腹中痛。

牛膝六分 大黃 桃仁去皮

尖炒 細辛各五分 川芎

當歸各四分 水蛭三分糯米

炒黃 右爲細末煉蜜丸桐子

大每服二十九空心溫酒下

【又方】婦人經事不來繞臍寒

痛痛宜萬病丸。

乾漆杆研炒烟盡須放地上約

一時 牛膝去苗酒浸一宿焙

乾一兩 右爲末以生地黃汁

一升入二藥末銀器內慢火熬

可丸卽如桐子大每服二丸空
心米飲或酒下。
【又方】婦人心膈迷悶腹臍撮
痛氣急氣悶月信不通等疾宜
琥珀散。
天台烏藥二兩 當歸 蓬朮
煨切各一兩 右爲細末每服
二錢溫酒調下後以食壓之忌
生冷油膩產後諸疾炒薑酒調
下。
【又方】婦人經候不行或積瘀
血腰腹疼痛及室女月經不通
宜紅花當歸散。
紅花 當歸尾 紫葳 牛膝
蘇木細剉 甘草各十兩 赤
芍藥九兩 劉寄奴五兩 桂

心白芷各一錢半。右爲細

末。空心熱酒調下三錢。食前。臨

臥再服。若久血不行濃煎紅花

酒下。孕婦勿服。零花即紫葳。

【又方】婦人經道不行。繞臍寒

痛。痛徹其脈沉緊。此由寒氣客

於血室。血凝不行。爲氣所衝。新

血與故血相搏。所以作痛。宜此

湯與桂枝桃仁湯。此名溫經湯。

當歸 川芎 芍藥 官桂

牡丹皮 蓬朮各一錢 人參

牛膝各一錢 甘草炙五分

右㕮咀水二鐘。煎至一鐘。不拘

時服。

【又方】婦人月水不行。發熱腹

痛。宜凌花散。

當歸 赤芍藥 凌霄花 劉寄奴 牡丹皮酒洗 玄胡索

官桂 白芷 紅花酒浸各等

分 右㕮咀每服四錢水 一盞

酒半盞煎服

【又方】婦人血臟久冷。月水不

調。及瘀血凝滯。臍腹刺痛。宜薑

黃散。

薑黃 白芍藥炒三兩 當歸

牡丹皮 玄胡索各二兩 川

芎 蓬朮根切 官桂 紅花

各一兩。右剉一兩。水二盞。酒

少許同煎。食前服。

【經阻咳喘】

小琴按此症多兼骨蒸勞損。

非此編所能該。宜見症治。

【牡丹皮湯】丹皮 當歸各

悉心研究。若妄採丹方。恐致誤事。但余每遇此症。則以下方治之。殊覩微效。姑臚如下。以質方家。

甜白杏三錢勿打 蜜炙桑白

皮二錢 紫苑一錢 海蛤壳

六錢 金石斛三錢 川貝錢

半 水煎如膏蒸酌加地骨皮

生地略血加黑旱蓮草錢半

玉胡蠻兩對

【又方】大凡室女經閉勞嗽。因

思慮過度。月經閉塞。此由心病

不能養脾。故不嗜食。脾虛不能

生。故咳嗽發熱。宜服牡丹皮湯。

兼服四神丸。

錢半 白芍 生地酒洗 陳

皮 冬朮蜜炙黃 香附各一

錢 川芎 柴胡 黃芩各七

分 生甘草四分 水煎服

【四神丸】 橘紅二錢 玄胡

索醋製 當歸酒炒各一兩

川鬱金五錢 共爲末酒糊丸

艾醋湯下百丸

醫藥顧問 卷十

經汎門

三九〇

必備醫藥顧問

卷十一

會稽馬小琴纂述

崩漏門

【停經忽崩】

婦人此症多因痰濕氣阻鬱衝任以致血門不開日久停滯一旦腎氣旋運驟崩而下一瀉無餘衝任氣虧不能關攝全身之下乘隙奔赴大有暈厥之虞宜

下方治之

酒炒歸身三錢 上川芎錢半
生地炭三錢 酒炒白芍二錢
蓮衣炭五分 血餘炭五分
側柏炭一錢 絲瓜絡三錢
如痰體加橘白一錢 濕加澤

瀉炭一二錢 氣加鮮建蘭葉
三支 如無建蘭以澤蘭一錢
鋪購十灰丸四五錢淡鹹湯送

下亦極效十灰丸方見血崩通動血爲火逼崩中不止治宜先舒其脾抑其肝止其崩列方如

代之

【又方】婦人此症如見所下之血已無紫塊等狀可用道地藥下亦極效十灰丸方見血崩通治門

炒香附錢半 合歡花一錢
歸身二錢 黑荆芥一錢 側柏炭一錢 生地炭二錢 餘藥隨證加減

【童女血崩】

童女任脈初通天癸應時而至或因寒濕痰氣凝閉血門久久未下驟然血崩宜效停經諸崩各門施治乃有過期不嫁標梅思吉抑鬱不得志先天慾火妄

當時未至而後至者亦有卒然暴下淋瀝不止有若崩漏者失血過多變生諸證悉宜服之四物湯四錢 加香附子炒去毛一錢半 右加生薑五片水煎食前服○如血色鮮而不止者

去熟地黃加生地黃

【老婦血崩】

小琴按婦人年屆七七，天癸應止，乃有逾期不止已屬病象。而況崩中半乎？間嘗稽覽羣集，凡老婦此症，不出下列諸門：（一）氣傷衝任。（二）勞動傷任。（三）過食辛辣。（四）過

動房事以上三症，祇須參照尋常血崩例施治，可不列方。惟房事一層，中年以後，已不宜過動。垂老之年，血海枯涸，羊水不潤，一旦興至，亦僅可草草了事，而乃翻雲覆雨，行年輕之行，當時慾火內燔，勉貪歡樂，不覺其疲，過後嗜臥，

氣息奄然，此必然之事也。蓋

草芽甫萌，不宜輕折，盡人皆曉。乃有隆冬凋木，再剗其根，豈所宜哉？故醫者近此症，必切囑其愈後，斷絕此念。若不能徑絕，恐不死於當時，而必死於後日也。謹採下方以備一節。

白歸身酒炒二錢 生地炭三錢 上川芎一錢 白芍酒炒二錢 炙龜版二錢 淡蓀朶一錢 無人參以太子參二錢 或真潞黨三錢，代之血猶津津不止，加童便一杯。

【崩後滴瀝不止】

婦人崩漏不止，蓋心氣不足，勞役及飲食不節所得。經隔少時，其脈兩尺俱弦緊而洪。按之無力，其證自覺臍下如水求厚衣服以禦其寒，白帶白滑之物，雖多，間下如屋漏水，下時有鮮血不多。右尺脈時微洪，如屋漏之水，多暴下者，是急弦脈爲寒多，而洪脈時見，乃熱多合而言之。急弦者，北方寒水多也。洪脈時出，命門包絡之火也。黑物多赤物少，合成屋漏水之狀也。宜

四分 阿膠炒六分另後入。

生艾葉一錢後入。右爲細末。

作一服水二盞煎至五沸去滓入膠艾再上火煎至一大盞空

心宿食消盡帶熱服三服效。

【又方】婦人漏血不止及風寒

冷熱勞損衝任月水不調崩中

暴下腰重裏急淋瀝不斷及產

後失血過多虛羸腹痛或妊娠

胎動不安下血連日小便頻數

肢體煩倦頭暈目暗不欲飲食

宜芎藴湯

芎藴 黃耆 茄藥 乾地黃

吳茱萸 半夏各二兩 當

歸 乾薑各一兩 右咬咀以

水一斗煮取三升分三服○若

月經後因有赤白不止者除地黃茱萸加杜仲人參各二錢

【又方】婦人經血滴瀝不止宜

柏黃散。

黃芩一兩二錢半 側柏葉

蒲黃各一兩 伏龍肝二兩須

正中對火土 右咬咀水二升

煎取八合分爲二服。

【又方】婦人崩中不止結作血

片如雞肝色碎爛淫淫不止。

芎藴十二分 生地黃 伏龍

肝各十二分 阿膠 青竹茹

各八分 常歸六分 繢斷

地榆 小蘗根各一分 右用

水九盞煮取三盞去滓分三服。

【又方】婦人氣血勞傷衝任脈

虛經云非時忽然崩下或如豆汁或成血片或五色相雜或赤白相兼臍腹疼痛經久未止令人黃瘦口乾飲食減少四肢無力虛煩驚悸宜伏龍肝散。

伏龍肝 赤石脂各一兩 蔡

蘆三兩 熟地黃 艾葉微炒

各二兩 麥門冬去心兩半

當歸 乾薑各一錢半 肉桂

甘草各半兩 右爲麁末每服

四錢棗一枚水同煎。

【又方】婦人崩中漏下不止宜

地榆散

地榆 蒲黃 白芍藥 白茯

苓 柏葉微炒 蟹爪微炒

熟地黃 鹿角膠碎炒令黃

漏蘆各一兩 蒜頭 當歸各七錢半 伏龍肝一兩半 乾姜炮桂心 甘草炙赤各半兩

右剉碎。每服三錢水一中盞入。

竹茹一分煎至七分去滓食前溫服。按伏龍肝爲止血之聖藥。蓋燥可去濕也。先賢治崩用旋覆花半夏。治膈間濕痰而崩止者。亦此意。

【又方】婦人崩中漏下不止。虛損羸瘦。宜鹿茸散。

鹿茸(一兩去毛塗酥炙微黃)

白龍骨 鱷甲(塗酥炙令黃去裙) 熟地黃 白芍藥

白石脂 烏鰣魚骨炙黃 繢

斷各一兩 肉蓴蓉一兩半酒浸去皮炙乾。右爲細末。每服二錢。食前粥飲調下。

【又方】婦人經水不止。衆藥不愈。宜牡蠣丸。

牡蠣火煅研細。用醋調成丸。再煅過通紅候冷研細出火毒。却用醋調艾末熬成膏。和丸如桐子大。每服五十丸。醋艾葉下。

【崩後白帶】

小琴按婦人白帶。非僅崩後所有語云。十男九遺。十女九

帶。可見婦人帶症不可以此

門括之。但此係崩後白帶。如

下列帶症。俾資閱者互相參

攷云爾。

婦人衝任氣虛。崩中漏下。經脈不調。每遇月候時來。臍腹腰脚先痛。漸減飲食。四肢乏力。及帶下三十六疾。悉能療之。

宜斷下湯。

人參去蘆 熟地黃 艾葉醋炒各三兩。烏鰣骨燒灰。當歸酒洗各二兩。阿膠蛤粉炒成珠。川芎各七錢。乾薑炮半兩。右咬咀水煎食前服。

烏鰣骨即海螵蛸

【又方】婦人血崩不止。赤白帶下。宜如神散。

香附子炒 赤芍藥炒各等分。

右爲末。入鹽一撮。水煎食前溫服。一方用香附白芷爲丸。

【又方】婦人諸虛不足久不姪
娠。骨熱形瘦崩中帶下宜補宮丸。

白薇 牡蠣 白芍藥 鹿角霜
山藥 白朮 白茯苓

烏鵲魚骨 白芷各等分。右爲細末。麵糊丸如桐子大。每服五十丸。空心米飲送下。

【崩後虛脫】
婦人暴崩氣脫。宜獨參湯加童便。人參一錢。童便一杯沖。

【又方】婦人血崩不止及昏不省人事。
五靈脂不拘多少炒令煙盡研末。右爲末。每服一錢。溫酒調服。

【又方】治症同前。名抽刀散。
五靈脂炒令煙盡。每服三錢。水酒童便各半盞。煎至八分通日服。並治產後有病。服三服散。

【崩後虛脫】
婦人崩漏初起。不問虛實。服之同煎。或水酒童便各半盞。同煎服。

【血熱崩漏】
蛇蝎蜈蚣咬塗傷處立愈。
家不可不備。此藥兼能解毒。及婦人崩漏初起。不問虛實。服之立止。宜荆芥四物湯。

常歸 川芎 白芍藥炒 生地黃 荆芥穗 緒芩 香附子炒各一錢。右剉水煎服。如不止。加防風升麻白朮蒲黃。一方加地榆尤效。一方四物加芩連梔子黃柏。一方並加膠艾。

【又方】治症同前。名失笑散。
五靈脂 蒲黃 各等分同炒治失血。及產後半產。惡血攻心昏迷不省。及心腹絞痛欲死者。乘陰所謂天暑地熱經水沸溢其效如神。再救急之良方也。人者宜簡易。黃芩湯。黃芩一味研

爲細末每服三錢麝靈酒調下。

(卽燒秤錘酒)○一方荆芥湯

煎下

【又方】婦人血室有熱崩下不止。服溫藥不效者宜金華散。

玄胡索 當歸 萍穗 牡丹

皮 乾薑各二兩 石膏二兩

桂心另研 茼蒿仙各七錢

蒲黃半兩 右爲細末每服三

錢水煎空心溫服日二次。

【又方】婦人經漏下血脈虛洪

經水紫黑宜河間生地黃散。

生地黃 熟地黃 白芍藥

黃芪 桑杞子 天門冬去心

地骨皮 柴胡 右咬咀水煎服便血者加地榆。

【又方】婦人血崩不止。腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩也。宜涼血地黃湯。

生地黃 當歸尾各五分 黃連 黃柏 知母 菟本 川芎 升麻各三分 柴胡 防風 炙活 黃芩 細辛 荆芥 茴荆子 甘草炙各一分

紅花少許 右咬咀作一服水煎空心稍熱服。

【又方】婦人崩中晝夜不止。

不能治者宜芎藾酒。

芎藾一錢 生地黃汁一盞

右用酒五盞煮芎藾一盞去滓

下地黃汁再煎二三沸分爲三服。

右二味細切用酒五觔煮取四

【又方】婦人肝經虛熱血沸騰而久不止宜奇效四物湯。

當歸酒洗 川芎 白芍藥炒熟地黃 阿膠炒成球 艾葉黃芩炒各一錢 右剉水煎服。

【又方】婦人崩漏不止色明如水得溫則煩悶者此陽傷於陰令人下血當補其陰脈數疾小者順大者逆宜小蘿蔔湯。

小蘿蔔葉搗取汁 生地黃搗取汁各一盞 白朮半兩挫

右三件入水一盞煎減一半去渣溫服。

【又方】婦人崩中去血不止。

筋去渣分四服。

【勞傷崩漏】

婦人勞傷血氣月水過多。或崩漏不止。及妊娠胎氣不安。或因損動漏血傷胎者。宜膠艾四物湯。

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃

阿膠炒成珠 艾葉各一錢

甘草炙五分 右剉水酒

各半煎空心服。

【又方】婦人經脈漏下不止。其

色鮮紅。先因勞役脾胃虛弱。氣短氣逆。自汗不止。身熱悶亂。惡

見飲食。四肢倦怠。大便時泄。宜

當歸芍藥湯。

黃蓍一錢半 白朮 蒼朮泔

湯。

浸去皮 當歸身 白芍藥各一錢 陳皮 熟地黃各五分 生地黃 甘草炙各三分 柴

胡二分 右作一服水煎空心熱服。東垣爲一婦人製此方。一服之後。諸證悉去。予族一婦。因勞役傷血。每來兩旬不止。醫者

拘血熱之說。用四物加芩連。累

治不愈。一日血大下。昏迷不醒。

急以問予。予投此藥一劑少頃

頓醒。過兩時。血遂止。後常用此

藥。其病遂不復作。蓋血虛須兼

補氣。譬譬之。血猶水也。氣猶隄

也。隄堅則水不橫決。氣固則血

不妄行。自然之理也。此藥用黃

芪最多。白朮次之。所以神效俗

止。宜柏子仁湯。

【又方】婦人憂思過度。勞傷心

經不能藏血。遂致崩中。下血不

止。宜柏子仁湯。

柏子仁炒 香附子炒 莒芻

五分 蒼朮 柴胡七分 葛

鹿茸擦去毛酒蒸焙 伏神去

根 當歸身 甘草炙各三分

木當歸各一錢半 川續斷

紅花少許 右咬咀作一服水

二錢 阿膠炒 遠志去心各

一錢 甘草炙五分 右作一煎去渣趁熱空心服微汗立止

服生薑五片水煎空心服

【又方】女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或

素有心氣不足因飲酒勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜臥

黃芪 蒼朮 羌活各一錢半

防風 藝本 升麻 柴胡

甘草炙各一錢 當歸酒浸

獨活各五分 蔓荆子七分

劫川芎 生地黃各八分

甘草五分 右剉水煎食前服

炒黑各二錢 壽皮醋炒 柴

四股不時困倦乏力無氣以動

氣短上氣逆急上衝其脈緩而

弦急按之洪大皆中之下得之

脾土受邪也脾主滋榮周身者

皆在脈脈者血之府也脈者人

也心主血血主脈二者受邪病

皆在脈脈者血之府也脈者人

也心主血血主脈二者受邪病

皆在脈脈者血之府也脈者人

也心主血血主脈二者受邪病

皆在脈脈者血之府也脈者人

羌活 獨活 藝本 升麻各

壯或三七壯立已

此藥乃權衡之法。用風勝濕

知此編係備家庭便閱起見。

便少許同煎服。

爲胃氣下陷而氣迫於下以致

故略爲區分。以清眉目要知

其血之暴崩也。若病愈經血惡

尋常醫集皆先列湯項後標

物已盡。主病雖除後必須以黃

病象皆爲知醫者而設。此編

薯甘草人參當歸之類數服以

獨否。蓋作者之苦心冀達症

補之於補氣升陽湯中加和血

覓方者一覽不復也。

藥是也。若經血惡物下之不絕

婦人血崩不止宜香附子散。

香附子炒四兩。當歸尾一兩

四物湯見前卽當歸川芎

脾胃退心火之亢乃治其根蒂

熟地白芍

細末每服五錢。醋湯調下空心

湯

服立效。

【又方】婦人血崩臍腹痛。宜立

效散。

香附炒三兩。當歸一兩。赤

芍藥良薑五靈脂各半兩

二兩。沒藥丁香桂去皮

各三錢。右爲細末酒調三錢

溫服。

【又方】縮砂不拘多少。於新瓦

治頤體質有強弱。發病有異同。在精於醫理者。自一望而

右爲細末。每服三錢。酒一盞。童

上炒香爲細末。米飲調下三錢。立止。

【又方】婦人崩中下血不止。小腹痛。宜大全方。

芍藥一兩炒黃。柏葉六兩微炒。丹溪云柏性多燥。右用水

一升煎至六合入酒五合煎取七合。空心分爲二服。一方爲細末。酒調二錢。一方有鹿角膠等酒調治白帶臍腹痛。

【又方】婦人崩中不能止。宜蒲黃散。

蒲黃炒破故紙炒千年古石灰炒過各等分。右爲細末。每服二三錢。淡酒或醋湯調下。

【又方】婦人血崩。

竈砂炒一兩。伏龍肝半兩。阿膠一兩。右爲末。空心溫酒調服二三錢。(大全名無比散)無阿膠。

【又方】婦人血氣虛損經候不調崩中漏下。

鯉魚皮。棕櫚皮。黃牛角茸。破故紙。亂髮各二兩。烏鵲熟地黃各半兩。右剉碎拌勻

入磁罐內。鹽泥固濟。乾以炭火五斤燒令通赤。烟盡取放土

內埋令冷取出研細。每服三錢。溫酒調服。

【又方】婦人崩中下血不止。宜五灰散。

蓮蓬殼。黃絹。血餘。百草霜。棕皮以上共燒灰。山梔炒黑。蒲黃炒黑墨。血竭右爲細末。調服或煉蜜丸。桐子大清米飲下五十丸。

【又方】婦人下血不止。宜十灰散。

錦片。木賊。棕櫚。柏葉。艾葉。乾漆。鯽魚鱗。鯉魚鱗。血餘。當歸以上逐味火燒存性各等分研末。麝香少許研右研勻。每服二錢。空心

【又方】婦人崩中下血不止。宜十灰丸。

錦灰一云錦片。黃絹灰。馬

尾灰 艾葉灰 蘿節灰 蓮

各一錢 棕毛灰五錢 右爲

香附三兩一半生一半炒 棕

房灰 油髮灰 赤松皮灰

末每服四錢米飲調空心服忌

皮一兩燒存性 右爲細末每

棕櫚灰 蒲黃灰各等分 右

研勻用醋煮糯米糊和丸如桐

子大每服七十丸加至一百丸

油膩豬魚雞等物

服五錢酒與童便各半盞煎七

空心米飲下

【又方】婦人血崩屢效
當歸 白芍藥 乾薑 棕櫚

各等分 右各煅存性研爲細

末醋調以有節朱筠左攬四十九轉食前服

過二錢 右爲細末研勻每三

錢並燒存性 右爲細末每服

二錢烏梅酒調下空心食前服

散

久患不渴二服愈一方去乾姜

用甘草二十半生半熟共爲末

一方槐花一兩 棕毛灰五錢

二三錢淡醋湯調服

右爲末水二盞鹽少許煎至七

分去滓服

【又方】婦人血崩不止宜當歸

散理氣血而又清血者也

一方用陳槐花一兩百草半

當歸 龍骨燒赤 香附子炒

末每服三錢溫酒調服

兩秤鍾燒紅淬酒下一二錢

【又方】婦人血海崩敗又治腸

風下血立應散

一方槐花研燒灰溫酒調下二

錢七

一方槐木耳燒作灰酒服方寸

湯調下

根去土勿洗以磁石器搗爛仍

一方荆芥蓮房各等分燒灰存

一方棕櫚燒存性淡酒調下三錢。

入冷水半盞取汁服之立止。

性爲細末空心米飲調下二錢

一方五瓣脂炒令烟盡爲末溫酒調下一錢

婦人血崩而心痛甚者名曰殺

一方荆芥穗燈火燒焦爲末每服三錢用黃便調下

一方黃牛角腮用尖燒爲黑灰

是以作痛若小產失血過多而

一方葫蘆去子穰實荆芥穗燒存性米飲調服

一方鹿角燒灰細研食前溫酒調下二錢

心痛甚者亦然但當重用甘溫

一方香附子去毛燒焦黑存性爲末熱酒調服二錢不過兩服

一方烏鵲魚魚骨燒存性爲細末每二錢煎木賊湯下

以養營氣宜用十全大補湯倍用參朮連服數十劑以痛止爲度

一方亂髮皂角水洗淨爲末空心酒調下二錢

一方京墨爲末二錢七同燒露蜂房爲末三指撮酒調服

一方桃仁燒灰存性研細食前溫酒調下二錢

一方烏梅燒灰存性爲末烏梅

一方用大薑俗呼爲馬茨芥連

分 薑三片棗二枚水煎服

【老婦行經】體質素健。生育不多。纔及四旬。汎卽停止。或青年多病。以及虛境。不佳。經停甚早。晚年心寬體胖。奉養豐腴。於是枯井起瀾。經水復至矣。第嚴冬百物閉藏。而冬行春令。桃李反花。決非佳朕。故世俗名之曰倒開花。一遭此症。無或能愈者。小琴行醫三十年。治此症無慮百餘。若五十以外者。多幾救治。望六者。十不得一。逾六旬者。萬難挽救。且望六者。服藥後。經雖旋止。而清水淫淫。漫溢不斷。卒至化脹以死。考之古書。論此症者絕少。自愧閱書不廣。未敢妄談。謹將經過治方錄左。

吉林參 酒炒歸身 清炙著
芯 炒白芍 滯蒺藜 煙龍
骨 酒炒烏鵲骨 白茯苓等
或加 炙紫河車 炙坎炁
藏紅花 等等多有能止者。但無法以止清水云。

乾薑一方用二兩。似誤。
【又方】治婦人赤白帶下甚妙。
苦棟碎酒浸 懷香炒一方大
茴香 當歸各等分。右爲末。
酒和丸如桐子大。每服三十五
丸。空心溫酒下。○療血加桃仁。
○血海寒加桂。○如腰腿疼四
物湯四錢。加羌活防風各一錢。
煎湯送下。

【又方】婦人赤白帶因濕熱勝
物。如脂或有臭濁污水並神效。
而下者。

花三十多年治此症無慮百
餘。若五十以外者。多幾救治。望
六者。十不得一。逾六旬者。萬難
挽救。且望六者。服藥後。經雖旋
止。而清水淫淫。漫溢不斷。卒至
化脹以死。考之古書。論此症者

絕少。自愧閱書不廣。未敢妄談。
謹將經過治方錄左。

名萬安散。

小茴香炒香 木香各二錢半

黑牽牛一兩另取頭末 右爲

細末以生薑自然汁調二錢臨
臥服取盡惡物爲效未盡再服
湯或溫白湯飲三五口催之半
明可行三五次取下惡物及臭

污水爲度後以白粥補之服藥
不可食晚飯及葷酒等物

柴胡升提之

二錢後以白粥補之忌熱毒食
物

【又方】女人癢瘕癰氣腹脹胸

滿赤白帶下以及氣虛痿黃無
力並休息赤白痢疾並皆治之

當歸 川芎 白芍藥酒炒
生地黃 人參 白朮 白茯苓
附炒各一錢 甘草炙五分
右加烏梅一箇 生薑三片
醋浸四兩米泔浸四兩各浸一
宿取出晒乾 當歸酒浸 白

荳蔻炒 杜仲酒炒 香

生地黃各二兩 澤蘭葉 艾
葉 白朮各一兩半身黃芩二
兩 右爲末醋糊爲丸如赤小
豆大每服六十九空心白湯或

水煎食前溫服 肥

人加半夏 瘦人加黃柏 泡

酒下

陳皮去白 黃芪 桑白皮
白朮 木香 胡椒各二錢半
木通各五錢 白牽牛炒取頭
末二兩 右爲末每服二錢用

燬加砂仁去人參 腹痛夫人
下宜加味八珍湯

【又方】婦人氣血兩虛赤白帶
下 参加小茴香玄胡 冬月加煨
乾薑 日久元氣下陷加升麻
柴胡升提之

【又方】婦人經脈不調赤白帶
下久無子宜當歸澤蘭丸

香附子用極大子杵去毛一斤
分四分童便浸四兩酒浸四兩
醋浸四兩米泔浸四兩各浸一
宿取出晒乾 當歸酒浸 白

芍藥 川芎 熟地黃酒洗

生地黃各二兩 澤蘭葉 艾
葉 白朮各一兩半身黃芩二
兩 右爲末醋糊爲丸如赤小
豆大每服六十九空心白湯或

水煎食前溫服 肥

人加半夏 瘦人加黃柏 泡

酒下

痛不欲飲食。日見羸瘦宜嚴氏

當歸煎。

錢 黃芩五錢 艾葉三錢
右爲末。煉蜜丸。桐子大。每服三

下。宜當歸附子湯。
【又方】婦人臍下冷痛。赤白帶

當歸酒浸 赤芍藥炒 白芍

四十九。鹽湯下早晚各進一服。
當歸二錢 良薑 附子各錢

藥炒 熟地黃酒蒸炒 阿膠

續斷酒浸 牡蠣煅各一
兩 地榆半兩 右爲末。醋糊
丸如桐子大。每五十丸。空心米

腹痛宜元戎四物湯

四物湯兩錢 桂 附子炮各
五分 右剉水煎食前服。
方四物加懷香桂

【又方】婦人赤白帶下。此藥不
熱不寒。得其和平助陰生子宜
散。

乾薑焙乾 白芍藥 香附炒
焦各五分 甘草生用五錢
右爲細末。每服三錢。用白水酒

調下。一方只用白芍藥酒炒二
兩。乾薑炮半兩。爲細末。米飲調
下。二錢。
【又方】婦人赤白帶下及子宮

虛冷無子者。宜暖宮妙應丸。
當歸 川芎 白芍藥 熟地

黃 艾葉 牡丹皮 苓茶
龍骨 牡蠣 赤石脂各等分
右爲末。麵糊丸。如桐子大。每服

各八分 五味子 防風各六
當歸酒浸 赤芍藥炒 白芍
覆盆子 蛇床子各一兩 錢
當歸酒洗 白芍藥炒 川芎
各一兩 牡蠣火煅 烏鰌骨
各八分 五味子 防風各六

【又方】婦人帶下之證有三。未嫁之女月經初下止而即得。或

溶之以冷水或熱而扇或當風。此室女病帶下之由有嫁之婦陰陽過多卽傷胞絡風邪乘虛

而入胞經。冷遂成穢液與血水相連而下。產後帶下由亡血失氣傷動胞絡。門開而外風襲

肌體虛而冷風入冷風與熱氣相連故成液而下。冷則多白熱則多赤。冷熱相交赤白俱下。宜鵝頭丸。

當歸二錢鹽泥包煅 艾葉二兩
以醋半盞浸乾 右爲細末研勻醋糊和丸如桐子大。以赤石脂爲衣。每服五十丸。空心用艾葉食鹽烏梅煎湯下。

【又方】婦人血海虛寒外乘風冷搏結不散。積聚成塊或成堅癥及血氣攻注。腹脹疼痛小便急腹或虛鳴嘔吐涎沫頭旋眼花腿膝重痛。面色痿黃肢體浮腫。月候欲行先若重痛。或多或少帶下赤白崩漏不止。驚怖健忘。小便頻數或自時見虛熱盜汗。羸瘦此藥不問胎前產後室女並皆治之。常服安心去邪逐瘀。養新血令有子。宜神仙聚

寶丹。一名琥珀硃砂丸。當歸一兩 滴乳香二錢半 麝香辰砂各錢。右各另研爲細末。合一處研勻。水丸如龍眼核大。每用一丸溫酒磨下。不拘時胎息不順。腹內疼痛一切產難。以童便磨下。○產血量敗血奔心口噤舌強或惡露。盞發渴面浮煎烏梅湯和童便磨下。○室女月候不調溫酒磨下半丸。○產後血氣不調童便磨下。

【又方】婦人赤白帶下以致不能成孕。宜側柏地榆湯。

黃芪 侧柏葉 地榆 烏蘿

魚骨 白僵蠶 牡蠣用鹽泥

當歸七錢半酒浸。附子炮去皮半兩。龍骨鹽泥包煅。茱萸泡去涎。赤石脂火煅醋淬。乾薑炮各兩半。牡蠣一

兩二錢鹽泥包煅 艾葉二兩
以醋半盞浸乾 右爲細末研勻醋糊和丸如桐子大。以赤石脂爲衣。每服五十丸。空心用艾葉食鹽烏梅煎湯下。

【又方】婦人赤白帶下以致不能成孕。宜側柏地榆湯。

黃芪 侧柏葉 地榆 烏蘿

魚骨 白僵蠶 牡蠣用鹽泥

固濟火煨透去泥研各一錢

肉蓴蓉酒浸

白芷 蛇床子

各一錢二分 右剉加生薑三

片水煎半餓時服

【又方】婦人赤白帶下不問遠年近日並皆治之

龍骨半兩 舶上硫黃三錢

右爲細末每服半錢空心無灰

酒下

【又方】婦人血崩後赤白帶下

宜茅花散

茅花一握 櫟榔皮三寸 嫩

荷葉三張 千草二寸 右

爲細末空心酒調半匙服

【五色帶】

小琴按婦人三十六疾。卽七

癥八瘕九痛十二帶。但癥癥
痛列有專門茲略不具。獨帶
一門詳採博徵限於篇幅亦
缺憾也。顧何謂十二帶。是所
下之物一者如膏二者如青
血三者如紫汁四如赤皮五
如膿漿六如豆汁七如葵羹
八如凝血九如清血似水十
如米泔十一如月浣十二如

經度不應期也。爲婦醫者不
可不識。產寶云。婦人帶症。傷

足厥陰肝經色如青泥。傷于

少陰心經色如紅津。傷于太

陰肺經形如白涕。傷于太陰

脾經黃如爛瓜。傷于少陰腎

經黑如衃血。醫宜者審慎詳

察而施治之。豈第五色已哉。
婦人中風邪帶下五色宜小柴
胡湯

柴胡二錢 黃芩 半夏 人

參 甘草各一錢 右剉加生

薑三片棗二枚水煎服○色青

屬肝加山梔防風色赤屬心加

黃連山梔當歸○色白屬肺用

補中益氣湯加山梔○色黃屬

脾用六君子加山梔柴胡不應

用歸脾湯○色黑屬腎用六味

地黃丸

【又方】治婦人五色帶及二十

二帶嘔吐下血宜地榆散

地榆三錢剉碎以醋水各半升

煮十餘沸去渣食前稍熱服一

合。

○木草注云。地榆去帶下十二

病。一曰多赤。二曰多白。三曰月

水不通。四曰陰蝕。五曰子臟堅。

六曰子門滯。七曰合陰陽患痛。

八曰小陰寒痛。九曰子門閉。十

曰子宮冷。十一曰夢與鬼交。十

二曰五臟互定。

【又方】治婦人下焦虛冷臍腹

疼痛。帶下五色。月水崩漏淋瀝。

不斷宜茱萸浴湯。

吳茱萸湯炮杜仲炒去絲

蛇床子一兩。木香一錢。陳皮各一

兩。木香丁香各半兩。右剉如麻豆大。每用半兩以生絹袋盛水三大碗。煎數沸乘熱熏

下部通手淋浴。早晚二次薰洗。

【青帶】

小琴按青主肝。肝屬木。木喜

水潤而惡濕。淫木之氣欲上

升而濕欲下降。兩相抵觸。停

滯中焦。遂入帶脈。由陰器而

出其色青者。以其乘肝木

之氣化也。治宜解木火之鬱

利膀胱。水則病自去矣。

【加味道遙散】治婦人青帶。

茯苓五錢。酒炒白芍五錢。

生甘草五錢。柴胡一錢。陳

皮一錢。茵陳三錢。焦山梔

三錢。水煎服四五劑愈。

【黃帶】

小琴按黃帶乃任脈之濕熱

也。蓋帶脈橫生。通於任脈。任脈直上。走於唇齒之間。口中精液盡化爲精以入腎。倘有

邪熱存於下焦。則津液悉以化濕。濕爲土氣。得熱則煎熬成黃。此必然之事也。

【易黃湯】治婦人黃帶。

炒山藥一兩。炒芡實一兩。

鹹水炒黃柏一錢。酒炒車前

子一錢。白果十枚打碎。水

煎服四五劑愈。

【黑帶】

小琴按帶色黑。則火熱之極。

其證必腹中疼痛。陰戶浮腫。

小便時如錐刺。面色變紅。日久黃瘦。飲食加量。口渴喜冷。

飲此胃火與命門膀胱三焦之火併合熬鑠而成炭色也。

治宜泄火滋腎

【利火湯】治婦人黑帶。

生大黃三錢 土炒白朮五錢
茯苓三錢 酒炒車前子三錢
黃連三錢 焦梔子三錢 知母二錢 王不留行三錢 煅石膏五錢 刺寄奴三錢 水煎服一劑。小便疼止而通利。二劑黑色。白三劑白減再服數劑而病愈矣。

【白崩】

小琴按血崩一症。盡人皆知。

而白崩皆誤認爲帶。此不可不研究也。徐用誠先生云。帶

下白屬氣而赤屬血。大抵婦人陽氣虛弱。白滑之物下流。或濕痰流注下焦。或肝腎陰

下。猶津津不止。如從前之暴下者。則照白帶例治之可也。

【白淫】附白嶺

小琴按李氏曰。白淫緣思想無窮所願不得意。淫于外入

房太甚。發爲筋痿。久爲白淫。

謂白物淫如白精之狀。不可誤作白帶。過服熱藥。又有日夜流津如清米泔。或如黏膠

者。謂之白溢。與白淫大同多憂思過度所致。故難治療用

平補鎮心之劑治之。或庶幾矣。

吉林參六分 土炒於朮一錢

白歸身二錢 酒炒白芍二錢

酒炒車前子二錢 煅花龍骨三錢半 澤瀉炭錢半 生白蘿

婦女小便不順。甚者陰戶疼痛。不研究也。徐用誠先生云。帶

半夏酒洗七次一兩 厚朴薑

汁製 赤茯苓 香附子炒各

五錢 紫蘇 甘草各二錢

右咬咀分四貼每服水二鐘生
薑三片煎八分去滓加琥珀末
一錢調服。

【又方】婦人勞傷血脈胞絡受
寒小便白濁日夜無度臍腹疼
痛腰膝無力宜內金鹿茸丸。

鹿茸 黃耆 雞內金 肉蓆

芙蓉 五味子 遠志肉 牡蠣

桑螵蛸 龍骨 附子各等分

右爲細末煉蜜和丸如桐子大
每服五十九食前溫酒或米飲
任下。

【又方】婦人小便白濁或白淫

淋瀝宜鎮精丸。

破故紙炒 青鹽 白茯苓

五味子 右爲末酒糊丸桐子

大空心鹽湯或酒丸三十九。

【又方】婦人真氣不足呼吸短
氣四肢倦怠脚膝瘦軟目暗耳
鳴遺精溢汗及婦人白濁白淫
等證宜金鎖正元丹。

肉蓆蓉洗焙 紫巴戟去心
葫蘆巴炒各一斤 補骨脂酒

浸炒十兩 五倍子八兩 茯

苓去皮六兩 硫砂二兩另研

龍骨二兩 右爲末入藥研令

勻酒和丸如桐子大每服二十
丸空心溫酒鹽湯送下。

【又方】婦人血海久冷白帶白

濁白淫下部常濕小便如米泔
或無子息宜威喜丸。

黃蠟四兩 白茯苓去皮四兩

作塊用 苓二錢半 同於磁
器內煮二十餘沸出日乾不用

猪苓 右以茯苓爲末 黃蠟
煉爲丸如彈子大空心細嚼滿

口生津徐徐嚥服以小便清爲
度忌米醋只吃糠醋尤忌使性
氣。

【又方】婦人下虛胞寒小便白
濁或如泔或如凝脂或小便無
度腰重等證宜固精丸。

牡蠣煅粉 桑螵蛸酒炙 龍

骨 白石脂 白茯苓 五味子
兔絲子酒蒸焙 韭子炒

各等分。右爲末。酒糊丸如桐子大。每服七十九。空心鹽湯下。

錢 甘草一錢 陳皮五分
黑芥穗五分 柴胡六分

【又方】止帶丸。

當歸酒洗 川芎 白朮 人

參 山藥

杜仲薑汁酒炒去

絲 香附

破故紙酒炒 牡

蠟火煅 椿根皮酒炒 繢斷

各等分 青黛減半 右爲細

末。煉蜜丸如桐子大。每服五十

丸。空心米湯。○腹痛加玄胡

索小茴香。○瘦人加酒炒黃柏。○冬月加

炮薑少許。○夏月加黃柏。

【又方】治婦人白帶。

土炒白朮一兩 炒山藥一兩

人參二錢 酒炒白芍五錢

雜宜解帶散。○瘦人加酒炒黃柏半夏。○四肢倦怠。五心煩熱。痰鬱嘈

當歸身酒洗 香附子醋炒各

錢五分 白芍藥酒炒 白朮

土炒各一錢二分 蒼朮 白

茯苓 陳皮去白 牡丹皮各

一錢 川芎 玄胡索各八分

甘草炙四分。右剉一劑。加生

薑水煎空心服。

【又方】治帶下名四神丸。

香附四製八兩 蒼朮泔浸牡

蠟粉炒 椿根皮蜜水炒 砂

仁炒各二兩 右爲末。黃米煮

飯丸。桐子大。每服五六十丸。空

心酒下。○以上諸方俱輕劑。

【又方】婦人白帶。因七情所傷

而脈數者。宜側柏枝皮丸。

椿根皮炒二兩 香附子醋炒

白芍藥 白朮炒各一錢 側柏葉酒蒸 黃連炒

節損傷脾胃以致陽氣下陷白帶下久不止宜補中益氣湯。

歸脾湯。

黃芪 白芷燒存性三錢 右粥丸桐子大米飲下七十九丸

黃芪 人參 白朮 甘草炙 各一錢 當歸 陳皮各七分

人參 炒黃芪 白朮 伏苓

○按椿根皮性涼而燥濕熱盛者宜之後一方有黃連香附木

當歸 龍眼肉 遠志筒炒棗仁各一錢 木香 甘草各

當歸 龍眼肉 遠志筒炒

升麻 柴胡各三分 右作一服水煎服

升麻 柴胡各三分 右作一服水煎服

胱白帶不止宜滲濕消癥飲

【又方】婦人胃虛有痰飲食減少中氣不和時時帶下宜六君子湯

宮丸

香故可治七情所傷。

【又方】婦人濕熱痰積滲入膀胱

鹿角霜 白芍藥 白朮 白

七衣 橘紅 白茯苓 白芷

茯苓 陳皮去白 半夏湯炮七次各一錢 右剉一服加生薑

伏苓 山藥 香白芷 白薇

香附各一錢 甘草炙五分右剉水煎服有熱加黃芩血虛

牡蠣殼 烏鰯骨等分右爲末麵糊丸如桐子大每服

升麻柴胡升提之。

【又方】婦人勞役過度飲食不

五十丸空心米飲湯下

【又方】婦人白帶屬真陰虛者

加當歸氣虛加參芪久不愈加升麻柴胡升提之。

【又方】婦人勞役過度飲食不

宜丹溪方。

龜板炙 梔子各二兩 黃藥
炒兩 香附子 山茱萸 苦
參 檸皮 貝母各半兩 白
芍藥七錢半 乾薑炒二錢半
右爲末。酒糊丸如桐子大。每服
五十丸。空心米飲下。

【又方】婦人白帶下。陰戶中痛。
控心而急痛。身黃皮緩。身重如
山陰中如冰。宜助陽湯一名升
陽燥濕湯

柴胡一錢二分 良薑二錢

防風 郁李仁 乾薑 甘草
各一錢 白葵花七朵 陳皮
生黃芩各五分 右剉散只作
一服水二盞煎至一盞。食前熱
服。○右二方用葵花郁李仁之

炒兩 香附子 山茱萸 苦
參 檸皮 貝母各半兩 白
芍藥七錢半 乾薑炒二錢半
右爲末。酒糊丸如桐子大。每服
五十丸。空心米飲下。

【又方】婦人癩疽白帶下。注腳
氣腰以下。如在冰雪中。居火坑
以厚衣重蓋。猶冷小便不止。與
右作一服。水煎食前溫服。

【又方】婦人癩疽白帶下。注腳
氣腰以下。如在冰雪中。居火坑
以厚衣重蓋。猶冷小便不止。與
當歸一兩 茴香半兩 黑附
子炮去皮臍 良薑各七錢

白帶長流而不禁。固肌肉消瘦。
面白口青目慌。慌無所見。身重
如山行步欹側。腿膝枯絀。大便
閉結。心下痞悶。懊憹飲食不下。
而垢背寒。小便遺而不知。此上
中下三陽真氣俱竭。故噦嘔不

止。胃寒之極也。其脈沈緊而澁。
按之空虛。若脈洪大而澁。按之
無力。猶爲中寒之證。况按之空
極也。其空虛乃氣血俱虛之極
也。宜酒煮當歸丸。

當歸一兩 茴香半兩 黑附
子炮去皮臍 良薑各七錢
炒黃鹽 丁香各半兩 全蝎
三錢 柴胡二錢 升麻根
木香各一錢 苦棟子 甘草
炙各五分 玄胡索四錢 右
同爲細末。酒煮麵糊丸如桐子

大。每服二十九空心宿食消盡

淡醋湯下忌油膩冷物酒麵

【又方】婦人白帶大下不止臍

腹疼痛。捫之如冰。陰中亦然。目

中溜火。視物目昏無所見。齒惡

熱飲痛。須得黃連末擦之。其痛

乃止。惟喜乾食。大惡湯飲。此病

係寒濕乘其胞內。故喜乾而惡

濕。宜以丸藥治之。蓋寒在下焦。

治主宜緩。大忌湯散以酒製白

右脂。白龍骨以枯其濕。以炮乾

薑大辛熱瀉寒水以黃蘖之大

使以芍藥半錢。導之恐辛熱之

藥太甚。損其肝經。故微瀉之。以

當歸身之辛溫大和其血脈用

藥之法備矣。名固真丸。

白石脂燒赤水飛研細焙乾

柴胡各一錢 白龍骨二錢酒

煮晒乾水飛爲末 當歸酒洗

三錢 乾薑炮四錢 黃蘖酒

洗 白芍藥各五分 右爲細

末水煮稀糊 丸如雞頭大每

服三十九空心宿食消盡煎白

沸湯放溫送下。無令胃中停住

待少時以早膳壓之是不令熱

藥犯胃忌生冷硬物與酒麵

【又方】治白帶如神。

石灰一兩 白茯苓二兩 右

【坐藥龍鹽膏】治帶下。
玄胡索五錢 厚朴二錢 當歸 茴香 炒黃鹽 酒防已

肉桂 紅豆 龍骨各二錢

全蝎二枚 枯礬五分 右爲

末煉蜜丸彈子大綿裹留線在外

納陰戶內

【勝陰丹】爲上藥力小再加三

錢再加行性熱藥

羌活 柴胡各二錢 大蒜一

錢 破故紙與蒜同焙一錢

三奈子 川烏頭 大椒各一分

甘松三分 升麻 枯白

藜各二分 全蝎三個 膜膏

少許。右爲細末，同前法製用。

【回陽丹】

全蝎 升麻 甘松各二分

草烏頭 羌活各三分 大椒

三奈子 菖撥 枯礬各五分

大蒜 破故紙各二錢 水蛭

三條炒焦二錢 川烏頭 柴

胡各七分 虾蟲三個去翅足

炒（炒黃鹽一錢必用之藥去

之則不效）右爲極細末依前

製如指尖大用綿裹納陰戶中

覺脅下暖爲效

【如聖丹】治婦人經脈不調。赤

白帶下

枯礬四兩 蛇床子二兩 右

爲末醋爲丸如彈子大用臘脂

爲衣。緊裏放陰戶中定坐半日
熱極再換大抵月水不通亦自
此取易痊且速效而不傷臟氣
也。○一方用枯礬川烏各等分

帶下多因子宮不潔服藥難效

燒蜜丸如彈子大綿裹陰中治

婦人久無孕育者服加味地黃

丸効如響應

熟地黃四兩 山茱萸肉 山

藥各二兩 白茯苓 牡丹皮

各一兩五錢 澤瀉 香附子

童便炒各一兩 蒜艾醋煮五

錢 右爲末燒蜜丸如桐子大

小琴按婦人無子多由血少

不能攝精所致或婦體壯實

無病月汎以時久而不孕

者當責之男子萬不可浪服

變多病也。下列諸方皆種子
之仙丹延嗣之寶筏幸勿漠
視之。

婦人久無孕育者服加味地黃

丸効如響應

熟地黃四兩 山茱萸肉 山

藥各二兩 白茯苓 牡丹皮

各一兩五錢 澤瀉 香附子

童便炒各一兩 蒜艾醋煮五

錢 右爲末燒蜜丸如桐子大

小琴按婦人無子多由血少

不能攝精所致或婦體壯實

無病月汎以時久而不孕

者當責之男子萬不可浪服

當歸酒浸 熟地黃酒浸 白

藥 為子宮虛寒致藥熱

偏鍊臟腑血氣沸騰無病適

芩 香附各一兩半 陳皮

貝母去心 伏苓 麥門冬去心各二兩 阿膠 甘草炙各五錢 黑豆炒去皮四十九粒右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服七八十九丸。食前空心白湯酒任下。忌食諸血。

【又方】女人服之有孕。名金蓮種子仙方。一名夢熊丸。有小茴香二兩無熟地黃。

熟地黃酒洗

當歸酒洗 白芍藥酒炒黃 益母草 川芎酒洗 蒼朮米泔水浸一宿各三兩 蛇床子酒洗炒 條芩酒洗 覆盆子炒 玄胡索微炒 陳皮水洗去白 丹參水洗各二兩 砂仁去皮一兩五

錢 山茱萸酒浸去核 香附四製各五兩。右爲極細末。先用白毛烏骨雄雞一隻。預先喂養一月。勿令與雌雞同處。臨時將雞緝死。不出血乾去毛剖開去腸內汚物。并膝內宿食。肫內黃皮。用酒洗盡。一應事件仍裝入雞肚內。不令見水。置罐內入酒二斤。封固重湯煮爛。取出割下。

淨肉搗如泥。又將雞骨用酥油和原汁或酒炙煉爲末。入前藥末內攪勻。再用醋煮米糊同雞肉左杓內搗極細爲丸。如桐子大。每服四五十九丸。漸至八十九丸。空心清水飲下。○如月信期而至者。加黃芩地骨皮黃連

各一兩半。清水飲下。○如月信先期而至者。加黃芪一兩。人參白朮各一兩半。溫酒或淡鹽湯下。○如白帶者。加蒼朮白朮升麻白芷各一兩半。淡薑湯下。【又方】女人服此藥。調經養血。安胎順氣。不問胎前產後。月事參差有餘不足諸症。悉皆治之。名百子建中湯。

當歸酒洗 南川芎 白芍藥酒炒 熟地黃姜汁浸焙 真阿膠蛤粉炒成珠 薤艾葉醋煮各二兩 右爲細末。煉蜜丸如桐子大。每服八十九空心百沸湯點醋少許下。內寒者溫酒

【子宮寒冷不孕】

黃人參 白茯苓 桂心

心酒下。

方用 吳茱萸 川椒各八兩
爲末。煉蜜丸彈子大。棉裹納陰。
中日夜一換。一月後子宮溫暖。
即可成孕。

【又方】硫磺煎水常洗甚效。
【又方】每臨媾接前以脚驢熾
炭重蓐坐烘腔待熱任男子
馳驟無不成孕。

【又方】婦人無子或斷經上熱

下冷等病宜白薇丸。
白薇 熟地黃 川椒去核及
閉口者微炒出汁 白龍骨各
一兩 蘿門冬去心一兩半

蘿本 卷柏 白芷 覆盆子
桃仁湯浸去皮尖雙仁炒微
燒丸如桐子大每服五十九空

菖蒲 遠志去心各七錢半
車前子 當歸微炒 蒼朮
錢半 右爲細末。煉蜜丸如桐
子大每服三十九空。心日午溫

酒下。昔有數人無嗣俱用此方。
踰年而皆有子故述之。

【又方】婦人衝任虛寒胎孕不
成多損墜宜調生丸。

澤蘭葉 常歸洗焙 熟地黃
洗焙 川芎 白芍藥 牡丹
皮 玄胡索 石斛酒浸炒各
一兩 白朮 一兩半 乾薑炮
肉桂去皮各五錢 右爲末。醋

糊丸如桐子大每服五十九空
各三兩 大川芎 吳茱萸去

當歸酒洗 川芎 肉桂各二
錢 白芍藥煨 香附 艾葉
醋炒 阿膠蛤粉炒成珠各四
兩 右爲末。醋糊丸如桐子大。
每服五十九食前米湯下。

【又方】婦人子宮虛冷帶下自
淫面色痿黃四肢疼痛倦怠無
力飲食減少經脈不調血無顏
色肚腹時痛久無子息宜艾附
煖宮丸。

香附六兩用醋五斤以砂石罐
煮三晝夜搗爛成餅漫火焙乾
艾葉大者去枝梗 川芎酒洗
各三兩 大川芎 吳茱萸去

梗 黃芪 白芍藥淡酒炒各二兩 繢斷去蘆一兩五錢

灰 薯蕷各一兩半 牛膝
柏子仁炒 草茱萸 桑寄生

處修合有孕母服無夫婦人不可服

生地黃酒洗一兩 官桂五錢
右共爲細末用上好醋打糊丸如桐子大每服五七十丸淡醋湯食遠下擇壬子日或天德月

德日修合

【又方】婦人子宮久冷不_{成孕}育及數經墮胎月候不勻崩中漏下七癥八癥白淫白帶宜紫石英丸。

【又方】此藥服之不過一月有孕試之有效名壬子丸。
吳茱萸 白芨 白茯苓 白
白斂一兩 人參 桂心 沒
藥各四兩 乳香三兩 川牛

膝 厚朴各五錢 當歸 石
菖蒲 白附子炮去皮各一錢
右爲細末煉蜜丸如桐子大每
服三四十丸溫酒或鹽湯下日
進三服用壬子日雞犬不聞之

蠟各二兩 粉草 烏鰣骨燒
辛夷仁 禹餘糧炒醋淬 當歸
石斛各三兩 紫威 牡
蠟各二兩 粉草 烏鰣骨燒

芎 卷柏 烏頭炮 熟地黃
兩半 茯苓二兩熟地黃酒
潤 香附子炒 澤蘭葉各四
兩 川椒炒去目 山藥各三
兩 蒜米泔浸八兩 大豆

黃卷炒半斤 一方川椒白藥

各七錢半 右爲末。煉蜜爲劑

每兩作六丸。每服一丸。細嚼空

心溫酒醋湯任下。或以醋調和

丸如桐子大。每服五十九丸亦可。

【血虛不孕】

婦人無子多因七情所傷。致使

血傷氣盛。經水不調。或前或後。

或多或少。或色淡如水。或紫如

血塊。或崩漏帶下。或肚腹疼痛。

或子宮虛冷。不能受孕。宜調經

種玉湯。百發百中。效可通神。

當歸酒洗 川芎 吳茱萸炒

各四錢 熟地黃酒洗 香附

炒各六錢 白芍藥 白茯苓

去皮 陳皮 牡丹皮 玄胡

分 川芎三錢 右剉水煎服

芍藥酒炒 川芎 川續斷酒

索各三錢。右剉作四劑。每一

月經前三服。經正行三服。經

行後三服。

【又方】婦人血虛不孕。服加味

四物湯能令有子。

當歸 川芎各二錢 白朮微

炒 熟地黃酒洗各一錢半

白茯苓 芍藥微炒 繼斷

阿膠各一錢 香附醋煮八分

橘紅七分 甘草炙三分 右

剉服二錘煎八分食遠服。

【又方】婦人久無子嗣。服經驗

育胎丸。經調血盛子宮溫煖成

孕。孕後服之。可保胎氣堅固。

當歸酒浸 熟地黃酒蒸 白

芷 白茯苓各一錢 人參五

克 香附各四兩 砂仁三兩

洗陳皮 黃芩酒炒各二兩

右爲細末糯米糊丸如桐子大
每服七八十九空心淡醋湯下
酒亦可以乾物服之。

【又方】婦人服歸附丸不但種
子且無小產產後諸證。

香附子大者炒罐內醋煮極熟
水洗焙乾爲末一斤當歸大

者去蘆梢用身酒洗切片焙乾
爲末十兩鹿角大者刮去粗

皮鎚末二三兩綿紙墊鐵鍋內
文火炒爲細末用二兩右三

味和勻醋糊丸如桐子大每服
三錢早起臨睡各一服白滾湯
下一月經後入房即孕。

【又方】瘦人無孕乃無血攝精

宜大五補丸潤之。

天門冬去心 麥門冬去心

菖蒲 茶荳 人參 益智

枸杞子 地骨皮 遠志肉

熟地黃各等分

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服三十丸
空心酒下服本方數服後以七
宜丸潤之。

【又方】婦人血虛及百病宜小
烏雞丸

吳茱萸 良薑 當歸 白芍

藥 玄胡索 破故紙 川椒
陳皮 劉寄奴 生地黃 荞
兩 北艾二兩 右爲末用白

毛烏骨雞緝死煮爛去骨取肉

搗如泥拌藥末晒乾磨細以雞
子汁作糊爲丸如桐子大每服
五十丸空心隨引下○如從來
未曾生育者乃油膜包裹子宮

以致不能生氣成孕宜加鳳凰
衣燒存性七個硃砂爲衣○如
腹痛血黑色者加炒黃連有濕
痰者加南星蒼朮香附同丸○
月水不通紅花蘇木酒下○子
宮久冷茯苓煎湯下○亦帶清
茶下○白帶牡蠣分調酒下○
血成豆淋酒調綿灰下○胎不
安蜜酒下○腸風陳米飲湯調
百草霜下○心痛菖蒲酒下○
腹痛芍藥酒下○胎漏下血烏
梅酒下○胎死不動斑蝥三個

調酒下。○胎衣不下。夢薹菜研

水下。○胎前產後白痢。乾薑煎

兩半。白朮。黃芪。牛膝。

湯下。○赤痢。甘草煎湯下。○耳

柴胡。牡丹皮。知母。貝母。

各二兩。

黃連。

地骨皮。

玄

青蒿即野蒿五月採一斤。香附子童便鹽水酒醋各浸四兩

附子童便鹽水酒醋各浸四兩。胡索。乾薑各一兩。白茯苓

二兩半。秦艽二兩半。艾葉

炒共一斤。斬艾醋煮全當歸酒洗一宿炒。牡丹皮。地

骨皮。白芍藥酒浸炒。黃芪

蜜炙。茯苓。人參。白朮。

川芎各一兩。鼈甲醋煮一兩

五錢。右爲細末。取白毛烏骨

雄雞一隻初發聲者。絞殺乾去毛。不用湯亦不用水。先惟用水

去肉。焙骨焦爲末。與前末和勻。

同熟地黃一兩。煮雞熟去骨合

前藥搗爛作餅。復晒乾爲末。仍

或米飲下。忌煎炒覓菜。

【又方】婦人服青蒿烏雞丸能

令多子。

青蒿即野蒿五月採一斤。香

附子童便鹽水酒醋各浸四兩

附子童便鹽水酒醋各浸四兩。胡索。乾薑各一兩。白茯苓

二兩半。秦艽二兩半。艾葉

炒共一斤。斬艾醋煮全當歸酒洗一宿炒。牡丹皮。地

骨皮。白芍藥酒浸炒。黃芪

蜜炙。茯苓。人參。白朮。

川芎各一兩。鼈甲醋煮一兩

五錢。右爲細末。取白毛烏骨

雄雞一隻初發聲者。絞殺乾去毛。不用湯亦不用水。先惟用水

去肉。焙骨焦爲末。與前末和勻。

同熟地黃一兩。煮雞熟去骨合

前藥搗爛作餅。復晒乾爲末。仍

【又方】婦人羸瘦血虛。有熱經水不調崩漏帶下不能成胎。及骨蒸等證。宜大烏雞丸。

香附一斤四製。熟川黃四兩

生地黃。當歸。白芍藥。人

用煮雞酒調糯米粉爲糊丸如

桐子大。每服七八十九。酒下日
二三服不拘時。一月見效。造藥
忌鐵器。

【血熱不孕】

小琴按婦人血熱經水先期。

必難受孕。蓋媾合之際。男精
射入牡戶之中。熱度甚高。凝
涕之物。曷任煎鍊。故難於孕
育也。無已。請檢續本編經水
參前。以及關於血熱諸門。安
心調經。經來準確。而宮內之
溫度適宜。陽施陰化。誕麟之
兆。不難預占矣。不贅立方。

【痰凝不孕】

婦人痰盛。下注胞宮。不能孕育。
者雖不免有痰。而有痰者却未

宜坐藥法。

母丁香 附子 肉豆蔻 枯
礬 烏魚骨 右爲末。糊爲軟
丸。綿裹內陰中。此治痰塞不孕

極效。

【又方】消脂膜導痰湯。

半夏薑製 南星火炮 橘紅
枳壳去穰 苓荅 滑石研細
各一錢 川芎 防風 羌活
各五分 車前子七分 右細
切作一服。加生薑五片。水煎空
心服。以乾物壓之。

【體肥不孕】

小琴按婦人體肥必多痰。治體
肥不孕。實可概痰凝一節體肥

必皆肥。故勉區爲二。俾閱者參
互考鏡。之婦人體肥不孕。係濕
痰內蘊所致。宜加味補中益氣
湯。

酒洗當歸三錢 土炒白朮一
兩 升麻四分 陳皮五分

茯苓五錢 製半夏三錢 生
綿苔二錢 柴胡一錢 人參

三錢 甘草一錢 水煎服
【又方】肥盛婦人。稟受甚厚。恣
於酒食。經水不調。不能成孕。謂
之軀脂滿溢。閉塞子宮。

南星 半夏 羌活 蒼朮
台芎 防風 滑石 右剉水
煎服。

【又方】婦人肥盛無子。以身中

有脂膜閉塞子宮也。宜服丹溪
植芝湯。

當歸酒洗一兩 川芎七錢半
白芍藥 白朮 半夏湯泡
香附 陳皮各一兩 伏苓二
兩 甘草半兩 右剉作十貼。
加生薑三片水煎

〔體瘦不孕〕

宜養精種玉湯

大熟地酒蒸一兩 當歸酒洗
五錢 白芍酒炒五錢 山萸
肉蒸熟五錢 水煎服

〔男女興偏長不孕〕

小琴按男女媾合。興度適宜。
陽神陰化無不易孕。乃有女
興甚短。男興正濃。追陽精洩。

射而牝孔之餘潤瀕枯。遑論
能涵育精蟲。蚌珠暗結乎設
或男短女長。其病相等。此蓋
關乎先天。非藥餌所能奏功。
也。余有某友者。性漁色。媾精
每不易出。聚妻十年不育。復
納妾三年。亦不獲孕。遍訪
名醫。皆以爲斲喪太甚。輒以
參芪助陽等品投之。愈助慾
餓。而妻妾皆憚之如蝎。一日
至妻所。妻峻拒。至妾所。妾亦
哀求免戰。某憤甚。齋宿十餘
日。偶值酒後。竟往妻處。妻方
臨廁。某啞臥床上。自玩其勢。
迨熱度正高。而相好合。遂一
索而孕。後復以此法投。妻妾

亦娠一年。而得二男焉。距今
八年矣。已獲四男一女。此非
女興之短。實男興過長所致。
長者抑之。短者畜之。陰陽合
拍。自易孕育。無論男女。凡患
短長興之病者。皆可以此法
推求之。

醫藥顧問

卷十一

種子門

四二四

必備醫藥顧問卷十二

會稽馬小琴纂述

胎前門

食螃蟹。令子橫生。

食生薑。令子多指。

【妊娠食忌】

雞肉合糯米食。令子生寸白蟲。

食犬肉。令子無聲。

鯉魚同雞子食。令子生瘡多瘻。

食兔肉。令子缺唇。

食羊肝。令子多厄。

食鼈肉。令子項短縮頸。

雞子與桑椹同食。令子倒生心

寒。

鮮魚同田雞食。令子瘡瘍。

雀肉同豆醬食。令子面生黑黯

黑子。

【驗胎法】

月汎不至。已二三月欲明有無。

宜驗胎方。

用川芎爲細末。濃煎艾葉湯空心調下。二錢覺腹內微動。即有

胎也。否則是經滯。

【男女預知法】

小琴按經云。陰搏陽別。謂之

有子。此是氣血調和。陽施陰化也。診其手少陰脈動甚者。

姪子也。少陰心脈也。心主血

脈。又按尺中腎脈流利不絕

亦姪娘也。三部正等。按之無

斷絕者。亦屬有娠。凡左脈沉

實爲男。右脈浮大爲女。左右

俱沉實生二男。左右俱浮大

生二女。又尺脈左偏大爲男

右偏大爲女。左右俱大產二子。

又左右手尺脈俱浮。產二

男不爾。女作男生。俱沉產二女。不爾。男作女生。又左手尺

脈浮大者。男右手尺脈沉細

者。女以上係就脈理約略言

之。而嘗籀覽古籍。蓋不止此。

謹條列如下。以證世之究產科者。

某氏之言曰。婦人月汎初來。記

其時而算以三十時辰爲率。即

兩日半也。此時積穢蕩滌新血

初生。交無不孕。第一日爲男二

日女。三日亦男。此外皆不成胎

云。

又曰。經止。一日三日五日媾

合得奇數爲陽。生男。二日四日

六日得偶數爲陰。生女。

李東垣朱丹溪之言曰。經水斷後一二日。血海始淨。精勝其血。感者生男。四五日後。血脈已旺。精不勝血。感者成女。陳自明婦人良方曰。婦人經絕後一日三日五日瀉精者皆男。二日四日六日瀉精者皆女。

又某氏云。夫之體質較妻虛弱者。多生女。反之則多生男。又云夜間交合。成孕者多女。晝間媾接受胎者多男。

又云。其夫左乳房有核。生男。妻乳房有核。生女。

又云。婦人腹大如釜。生男。如箕。

三分陳皮二分。潮熱加柴胡。

生女。

【妊娠帶多】

婦人妊娠。帶綿綿不絕。宜下方。若月份尚少。宜參鬱帶症門治之。
酒炒烏鵲骨三錢。酒炒車前子二錢。酒炒白芍二錢。酒炒歸身二錢。濃煎用生白蘿蔔七枚打爛冲服。

【胎動不安】

安胎散。妊娠者常服安胎。

白朮。當歸合一錢。黃芩一錢五分。甘草炙五分。右剉。

水煎服。如腹脹。加神龜麥芽各二分半。氣虛泄瀉。加人參。

一錢 氣上逆。加枳殼三分。

【又方】蒼米湯常服健脾清熱。
故胎不動。

子芩一兩 白朮五錢 右剉

水煎服。一方芩朮各半兩加

當歸二錢。一方用芩朮等分

爲末粥丸。桐子大每服五十丸

白湯下名安胎丸。

【又方】妊娠或因傾仆或因毒
藥胎動不安腰腹疼痛或有所
下宜阿膠散。

阿膠蛤粉炒成珠 艾葉炒

當歸酒炒 川芎 白芍藥炒
熟地黃洗 黃蓍 甘草炙各

一錢 右㕮咀加生薑五片聚
三枚水煎空心服。

【又方】妊娠八九月胎動腹痛。
而青冷汗氣欲絕者此由勞動
用力以傷胎宮宜鈎藤湯。

鈎藤 常歸 伏神去木 人

參各一錢 桔梗一錢五分

桑寄生五分 右剉水煎服。

煩熱加石膏二錢半

【又方】妊娠二三月上至八九
月頓仆跌胎動不安腰腹疼痛

欲死已有所下宜膠艾芎歸湯

阿膠 川芎各三兩當歸

乾地黃 艾葉各二兩 一方

有甘草無地黃 右切細以水

七升煮取三升半分三服

【又方】因母疾病氣衰血少不
能護養其胎以致不安者宜十

聖散。

人參 黃蓍 白朮 地黃
砂仁各五分 甘草炙 當歸

川芎 茄藥炒各一錢 川續
斷八分 右剉水煎服。

【又方】胎動不安腹痛下黃汁
人參 黃蓍 白朮 地黃
砂仁各五分 甘草炙 當歸

川芎 茄藥炒各一錢 川續
斷八分 右剉水煎服。

【又方】妊娠因事築磕胎動不
安或子死腹中惡露不下疼痛
不已用此藥擦之若不損則痛

止子母俱安若胎損立便遂下

當歸去蘆酒浸三錢 芭翁二

錢 右剉先用酒一鍾煎乾再

入水一鍾煎三沸溫服。

【逐月保胎法】

小琴按妊娠一月始胚二月

始晉三月始胞四月形體成

五月能動六月筋骨立七月

毛髮生八月五臟具九月穀

氣入胃十月諸神備卽產矣

妊娠一月陰陽新合爲胎寒多

爲痛熱多卒驚舉重腰痛腹滿

胞急卒有所下當預安之宜烏

雌鷄湯

烏雌鷄一隻治如食法 茶

人參 麥門冬五合去心 白

朮 苓各三兩 甘草 生

薑各一兩 右咬咀以水一斗

二升煮雞汁取六升。

若曾傷一月胎者當預服補胎

湯。

細辛一兩 防風三兩 乾地

黃白朮 生薑四兩 吳茱萸

大麥各五錢 烏梅一升

右咬咀以水七升煮取二升半

分三服先食服 寒多者倍細

辛茱萸熱多渴者去之加瓜萎

根二兩 若有所思加柏子人

參一方有人參一兩

妊娠二月陰陽踞經有寒多壞

不正有熱卽萎悴中風寒有所

動搖心滿膽下懸急腰背強痛

卒有所下乍寒乍熱宜服艾葉

黃連 人參各一兩 吳茱萸

五合 生薑三兩 生地黃五

兩 一方用當歸半兩 右咬

咀以酢漿七升 煮取三升 分四

服日三夜一十日一修合若頗

覺不安加烏梅一升水煎不用

艾葉 丹參 當歸 麝黃各

一兩 人參 腎膠各三兩

甘草一兩 生薑六兩 大棗

十二枚 右咬咀以酒三升水

一斗煮減半去滓內服煎取三

升分三服 一方 烏雌雞一

隻煮汁並頭血煎服

若曾傷二月胎者當預服黃連

湯。

黃連 人參各一兩 吳茱萸

五合 生薑三兩 生地黃五

兩 一方用當歸半兩 右咬

咀以酢漿七升 煮取三升 分四

服日三夜一十日一修合若頗

覺不安加烏梅一升水煎不用

姪娠三月爲定形。有寒大便青。有熱小便難。不喜卽黃卒驚恐。憂愁嘔怒喜。頓仆動於經脈腹滿。繞脅苦痛或連腰背卒有所下。宜服雄鷄湯。

雄雞一隻治如食法

黃芩

白朮

芍藥 人參

五合

茯苓 茶

甘草

阿膠各一兩 大棗十枚

二枚

右咬咀以水一斗三升煮鷄減半出鷄內藥煮取半升

內清酒三升并膠煎取三升分

三服一日分盡一方用當歸

川芎各二兩不用黃芩生薑

若曾傷三月胎者當預服茯神湯

湯

茯神 丹參 龍骨各一兩
人參 當歸 阿膠 甘草各一兩
大棗二十枚 機 赤小豆二十粒

歸各二兩 麻黃 阿膠各二兩 半夏四兩 生薑五兩
大棗十二枚 右咬咀以水八升煮取三升分四服先日服七

日後服一劑 腰痛者加桑寄生二兩 深帥有薤白一兩麻子

升 大棗三十枚 機 赤小豆二十粒

右咬咀以水八升煮減半內清酒三升并阿膠

妊娠五月有熱苦頭眩心亂嘔

若曾傷五月胎者當須服安中湯

吐有寒苔腹滿痛小便數半有

黃芩一兩當歸芍藥乾

恐怖四肢疼痛寒熱胎動無常腹痛悶頓欲仆卒有所下宜

丹黃人參各二兩甘草

服阿膠湯

芍藥各三兩麥門冬五味

阿膠四兩人參一兩當歸

子火麻仁各五合生薑六

芍藥甘草黃芩各一兩

大棗三十五枚右咬咀

麥門冬升吳茱萸七合

以水七升清酒五升煮取三升

旋覆花二合生薑六兩右

半分四服日三夜一七日復服

㕮咀以水九升煮熟減半內清

一劑

酒三升牛膠微火煎取三升半

妊娠六月卒有所動不安寒熱

分四服日二夜一先食服便愈不瘥再服一方用烏雌雞一

有所下腹痛如欲產手足煩疼

割取咽血內酒中以水煮雞汁

煎減半內酒并膠煎取二升半

麥門冬一升人參甘草

分四服

黃芩各二兩乾地黃三兩

阿膠四兩生薑六兩大棗十五枚右以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分

十五枚右以水七升煮減半內清酒二升并膠煎取三升分

有所下。手足厥冷。脈若傷寒。頭熱腹滿氣短。常苦頸項及腰背。

強宜葱白湯。

葱白三四寸長十四莖。黃蓍當歸。

甘草各三兩。

人參一兩。

黃芩兩半。黃芩一兩。阿膠四兩。

麥門冬半夏各一升。生薑八兩。

旋覆花二合。右咬咀以水二升煮減半。內清酒三升。

及膠煎取四升。每服一升。日三夜一。中間進食七日服一劑。

一方用白雞一隻。煮汁煎以水二升煮減半。內清酒三升。

及膠煎取四升。每服一升。日三夜一。溫臥當汗出。若不出者加

麻黃二兩。煮服如前法。若秋後勿強責汗。一方以黃雌雞一隻。割取血。內酒中煮雞取汁。以煎藥。

若曾傷七月胎者。當預服杏仁。

湯。

杏仁甘草各二兩。紫苑一兩。

鍾乳乾薑各二兩。麥門冬吳茱萸各二升。

五味子二合。粳米五合。右咬咀以水八升煮取三升。半分四服。

日三夜一。中間進食七日服一劑。

一方用白雞一隻。煮汁煎以水二升煮減半。內清酒三升。

及膠煎取四升。每服一升。日三夜一。溫臥當汗出。若不出者加

麻黃二兩。煮服如前法。若秋後勿強責汗。一方以黃雌雞一隻。割取血。內酒中煮雞取汁。以煎藥。

白朮當歸甘草各二兩。

厚朴二兩。薤白切一升。右咬咀以水五升。清酒四五合煮。

取三升。分四服。日三夜一。一方用烏雌雞煮汁。以煎前藥。

若曾傷八月胎者。當預服葵子湯。

葵子二升。芍藥四兩。白朮柴胡各三兩。厚朴甘草各

二兩。生薑六兩。大棗二十枚。右咬咀以水六升煮取三升。分三服。日三凡十日一劑。

一方用烏雌雞一隻。煮汁煎藥。

妊娠九月。若水得下。痢腹滿懸急。胎上衝心。腰背痛。不可轉側。

短氣宜服半夏湯。

半夏 麥門冬 吳茱萸 當

歸 阿膠各三兩 乾薑一兩

因房事過度觸動胎氣不安者。
而多瀉 加木香三分 渴加

大棗十二枚。右咬咀以水九

升煮取三升去滓 宜加味四物湯

微火上溫服四服。痢卽止。

歸身酒洗 熟地 阿膠蛤粉

方雌烏雞一隻煮汁煎藥。

炒成珠各一錢

炒仁炒 炙

草各五分 竹茹一團 水煎

肉十個

若曾傷九月胎者當預服豬腎

調男子襯檔布燒灰一錢服。更

草各五分 竹茹一團 水煎

【又方】胎動不安宜黑白安胎散。

湯。猪腎一具 白朮四兩 茯苓

【附通治安胎方】

桑寄生 乾薑 乾地黃 萸

人參一錢虛者倍用 當歸二

翦各三兩 附子中者一枚

錢熟地三錢 條芩一錢川

大豆三合 麥門冬一升 右

芩七分 白朮二錢 陳皮四

分 紫蘇四分 甘草四分元

【漏胎】

內諸藥煎取三升半分四服。日

走失足跌損傷胎腹痛腰脹一

三夜。十日更一劑。

白 加川連五分 脾胃滯瀉

服卽安。雖然見血一二日未離

【房事傷胎胎動】

宮者。再服無有不愈。倘或先因三四五月內曾經小產過者。將

及前月分。又覺腰骨瘦脹。急速服下一劑。卽安。名安胎萬全神應散。

酒洗當歸一錢 川芎六分

土炒白朮一錢 酒炒黃芩一

錢 薑汁浸熟地八分 酒炒

白芍 鹽炒杜仲七分 蛤粉

炒阿膠珠七分 連壳研砂仁

五分 炙甘草三分 酒水各

一碗煎湯空心服。如胸前作脹。

加紫蘇陳皮各六分。或白帶或

紅多加。黃炒地榆各一錢。艾葉七分。如見紅加製續斷一錢。

糯米一百粒。

【又方】治三五月漏胎小產。宜鳳衣散。

用頭生雞子抱出小雞子蛋殼。

陰陽瓦焙黃研細末。如前次小

產在何月分至時。預先用無灰

酒沖服。可免小產。

【又方】姪婦受胎數月後。胎動

漏胎。及子懸症。宜苧根湯。

野苧麻根。姪一月者。用一寸加

金銀器煎湯服之。立安。

【又方】姪婦頓撲跌挫動胎下

血不止。宜膠艾安胎散。

人參一條。芩阿膠蛤粉炒成

珠各一錢。土炒白朮錢半。

當歸酒洗熟地各二錢 川

芎 艾葉各八分 陳皮 紫

蘇 炙草各四分 姜棗引水煎服。

【又方】胎漏下血。安胎用止漏

絕神丹。神妙。

土炒白朮五錢 熟地一兩

三七根末三錢 水煎服。此方

妙在三七根末。乃止血神品。故

用之極效。

【又方】姪婦或因傾撲。或因毒

藥動胎不安。腰腹疼痛。或所下

血。宜阿膠散。

阿膠蛤粉炒成珠 艾葉炒

歸身酒洗 川芎 白芍 熟

地 蜜芪 炙草 姜棗引水

煎空心服。

【又方】誤服毒藥動胎或下血。

或否。宜三物解毒湯。

生甘草 黑豆 淡竹葉各等分。用

水煎濃汁服之。
阿膠各一錢 川芎五分 甘草五分 白芍二分 黃芪一錢半 黃楊葉三片 生薑二片 水煎甚者日進一劑。

【又方】妊娠胎漏經血妄行。此實胎息未實。或因勞役過度傷動胞胎。或因房室驚觸。致令子宮虛滑。經血淋漓。若不急治。日漸胎乾。子母不保。急服寄生散

或參歸飲。或阿膠濟陰湯。
阿膠 白朮各一錢 地黃

白芍 當歸 川芎各一錢 砂仁帶壳五分 條芩 薊艾

各錢半 香附八分 炙草五分 糯米一撮 水二湯碗。煎至一碗。溫服。如下血塊加地榆一錢。痛加杜仲。患胞胎加金銀花

等分。加姜五片。水煎服。
參歸飲
人參 當歸 寄生 生地熟地 條芩 香附 伏苓

桑寄生 川斷 阿膠 香附 黑 人參 白朮 川芎 各等分。加姜五片。水煎服。
一日一夜三服。以防取血攻心。
【又方】受孕之後。經血不時點滴。大率以勞傷氣血虛弱之故。或因惱怒。或炙燭熱物所致。宜

補中安胎飲。

條芩 白朮 人參各三錢 熟地三錢。當歸三錢 白芍一錢 甘草五分 蘇梗八分

【又方】妊娠跌撲。動胎下血不止。急服安胎參蘇飲。
人參 薊艾 川芎各三分 當歸一錢 條芩 白朮生用各二錢 陳皮紫蘇 生甘草各四分 阿膠一錢 有外感砂仁四分。

凡妊娠一二月。惡阻嘔逆煩悶嗜臥。卽俗所謂病兒也。此由婦人本原虛弱。平時喜怒不節。寒

暑不調中。脫宿有停痰積飲受孕經閉。飲食相搏。氣不宣通以致心下煩悶。頭眩眼花。四肢倦怠。聞食卽吐。喜酸嗜鮮。多臥少起。甚至嘔逆不食。法當順氣理血豁痰導水。而諸症自除。以加味參橘飲治之。

人參一錢 白朮二錢 砂仁三分 厚朴一錢 檘紅四分 當歸一錢 香附五分 甘草三分 姜三片 竹茹一錢 若無力服參去之亦可 加夏麵八分

【又方】妊娠患阻。嘔吐心煩。頭暈。惡聞食氣。好食醃酸。多臥少起。有頭痛。腹脹。有痰胎孕不牢。宜半夏茯苓湯。半夏湯洗七次。薑汁炒黃。白朮 陳皮各一錢。熟地黃一錢。陳皮去白鹽水炒。茯苓各一錢。半夏製一錢半。子芩濃茶。生薑三片。水煎空心服。兼服姜汁炒枳殼炒紫蘇各八分。甘草炙五分。右切一劑。生薑三片。水一鍾煎七分食。遠溫服。

【又方】妊娠脾胃虛弱。飲食不能化。嘔吐不止。宜細砂二陳湯。半夏姜汁炒黃。陳皮。砂仁。

有紫蘇葉細辛。有熱加黃芩。有客熱煩渴。口瘡去橘皮細青竹茹湯。

各一錢 茯苓二錢 炙草五分 用姜棗烏梅引水煎服二劑。

辛加前胡知母各七分半。若赤瀉去地黃。加大黃七分半。黃芩一錢。腹冷下利去地黃。加炒桂心五分。若胃中虛熱大便秘小便

芩一錢。

【又方】懷姪氣血不足。胎氣始盛。逆動胃氣惡。用嘔吐不淨飲

食。宜陳皮半夏湯。

陳皮去白鹽水炒。茯苓各一

錢。半夏製一錢半。子芩濃

茶。生薑三片。水煎空心服。兼服

姜汁炒枳殼炒紫蘇各八分。甘草炙五分。右切一

劑。生薑三片。水一鍾煎七分食。

竹茹彈子大一團 橘皮 白茯苓各一錢半 半夏洗炒

茯苓各一錢半 半夏湯泡七

次 生薑各二錢半 右剉水煎

溫服。忌羊內餚鮮等物。

〔又方〕妊娠嘔吐不食兼吐痰

水宜蘆根湯

生蘆根七分 桔紅四分 生

薑六分 檳榔二分 枇杷葉

三分 右切以水二盞煎七分

空心熱服。

〔又方〕妊娠惡阻嘔吐不止頭痛全不入食服諸藥無效者宜

歸原散。

人參 甘草 川芎 當歸

芍藥 丁香各半兩 白茯苓

白朮 陳皮各一兩 桔梗炒

枳殼炒各二錢半 半夏洗炒
黃一兩 右咬咀每服三錢加

生薑五片棗一枚水煎服。

〔又方〕胃虛惡阻吐水甚至十

餘日水漿不入者宜白朮湯。

白朮炒一兩 人參五錢 丁

香二錢半 甘草一錢 右爲

細末每服二錢加生薑五片水

煎食前溫服。

〔又方〕妊娠胎動不安氣不升降嘔吐酸水起坐覺重宜三香散。

香附子一兩 薤香葉 甘草

各二錢 右爲細末每服二錢。

沸湯調下不拘時。

〔又方〕治妊娠惡阻胃寒吐逆

翻胃吐食及心腹刺痛宜人參
丁香散。

人參五錢 丁香 薤香各二
錢半 右咬咀每服五錢水煎

服。

〔又方〕妊娠惡阻少食嘔吐或

兼吐瀉作渴宜保生湯。

人參一錢 白朮炒 甘草炒

香附

烏梅一方作烏藥 橘

紅各五分 右剉加生薑水煎

服。覺惡心嘔吐加丁香

〔姪婦心痛〕

姪婦心氣疼宜火龍散。

川棟子 茴香炒各三錢 艾

葉末鹽炒一錢半 右作一服

水二鍾煎至一鍾不拘時服。

【又方】妊娠卒心痛氣欲絕。宜

死者謂之中惡。

產寶丸

生地黃二錢 枳殼一錢 木

川芎 當歸 茯苓 厚朴製

香三分 右剉酒煎服。

各一兩 右用水六升。煎取二

升分二服。

【又方】妊娠卒心痛欲死。不可

忍者。宜白朮湯。

妊娠腹中絞痛。心下急痛。宜當

歸芍藥散。

白芍藥炒四兩 當歸 茯苓

白朮各二兩 澤瀉 川芎各

一兩。右爲細末。每服二錢。食

前沖服。

芩一兩半 右切。以水六升煎

取三升半分三服。半日令

下。

【又方】妊娠素有冷氣。忽心腹

痛如刀刺。宜川芎散。

青竹茹一升 羊脂八兩 白

川芎 當歸各一錢 人參

蜜三兩。右三味合煎。每服棗

吳茱萸 厚朴姜製各五分

核大三枚。食前頓服。日三服。

茯苓 桔梗各四分 茯苓七

分半 枳殼 甘草各二分

安。

【又方】妊娠忽然心痛悶絕欲

右劑。水煎。稍熱服。

【又方】妊娠胎動腹中防痛。不

思飲食。宜阿膠散。

當歸炒 陳皮各一兩 白朮

白茯苓 阿膠炒 川芎各七

錢半 甘草二錢半 右咬咀

每服三錢。水一盞。姜一片。棗一

枚。煎七分服。

【又方】妊娠胎動欲落。腹中痛

不可忍。

上等銀一斤 茅根二斤去黑

皮。右以水九升。煮銀取五升。

入清酒一升。同煎茅根。取三升。

分服立安。

【又方】妊娠患腹痛。并胎動不

安。

當歸三兩 川芎 阿膠 人

安小腹痛連腰下血。

杜仲 五加皮 當歸 苓藥

參 厚朴各二兩 葱白切一

升。右咬咀以水七升煎至三

川芎 草薢各等分 又爲末

升分三服 一方有甘草無厚

人參 艾葉各四分 茯苓一

每用三錢空心酒調下。

升分三服 一方有甘草無厚

朴川芎。

【又方】婦人有孕腹痛。宜地黃

當歸湯。

當歸一兩 地黃二兩 右爲

妊娠腰痛不可忍。或跨痛。宜五

未作一服。水三升。煎至一升。去

杜仲四兩炒 五加皮 阿膠

渣。頓服。未效。加人參白朮陳皮。

炙另八錢 防風 狗脊 川

芎 白芍藥 細辛 草薢各

三兩 杏仁八十個去皮尖麵

大黑豆二合炒令香熟酒一大

加味四物湯。治血少胎痛。當

盞。煮取七分。去豆空心頓服。

歸 川芎 白芍藥 熟地黃

炒 右咬咀水九升煮取二升。

去滓下膠作三服。

香附子各等分 右爲末。每服

三錢。紫蘇湯調下。

【又方】妊娠被驚惱。胎向下不

痛。

【又方】觸動胎氣以致腰痛背

動向下。宜小品苧根湯。

生地黃 莖根各二兩 當歸

芍藥 阿膠 右細切以水六

升煮取二升去滓。內膠煎烊分

竹茹三錢水煎去滓入蜜半匙。

皮三味右剉一服加生薑三

三服。一加海藻蕪荑。

再煎一二沸溫服。

片水煎服。

【姪姪咳嗽】

姪姪風寒欬嗽痰多喘滿宜百

食宜桔梗散。

姪姪吐血衄血咯血溺血下血諸見血無寒皆屬於熱但血家

百合蒸 紫苑黃洗 貝母去

天門冬去心 赤茯苓各三錢

證皆宜服生地黃散。

心 白芍藥 前胡 赤茯苓

麻黃去節三分 貝母 人參

生地黃 熟地黃 桂枝子

桔梗炒各一錢 甘草炙五分

甘草炙各三分 一方有杏仁

地骨皮 天門冬 黃芪 白芍藥 黃芩

右作一服水二鍾生薑五片煎

無貝母 右剉加生薑水煎服

甘草各等分

至一鍾溫服。

【又方】姪姪氣壅塞咳嗽氣喘

脈微身涼惡風每兩加肉桂半

安。宜紫苑湯

宜馬兜鈴散。

右咬咀每服一兩水煎服。如

紫苑 天門冬去心各一兩

馬兜鈴 苦梗 人參 甘草

錢如下。血加地榆。

桔梗半兩 杏仁 桑白皮

去白 大腹皮黑豆水浸洗

吐血衄血嘔血咯血宜局方必

甘草各一錢； 一方有防風

紫蘇各一錢

勝散。

五分。右咬咀每服三錢或加

一方有枳殼無人參貝母桑白

熟乾地黃 小蘗并根用 人

參蒲黃微炒當歸去蘆

濟生方加髮灰少許極効。

煎葱白湯調下名獨聖散。

葛鷄烏梅肉各一兩右件。搗羅爲末每服五錢水煎溫服。

【又方】妊娠小便難飲食如故。宜歸母苦參丸。

當歸貝母苦參各二錢

水煎服或再加滑石二三錢

【又方】妊娠小便不通臍下妨

悶心下煩亂宜葵榆湯

葵子研榆白皮切各一兩

右水煎分三服

【又方】妊娠卒不得小便。

妊娠入小便不通宜大腹皮散。

大腹皮赤茯苓枳殼炒炒

水煎空心服外以冬葵子滑石末塗臍周圍四寸熱易之。又

白梔子爲末田螺肉搗膏或葱汁調膏貼臍中立通。

【又方】妊娠小便不通宜全生茯苓散。

赤茯苓冬葵子各等分右咬咀每服五錢水煎空心服。

蔓荆子爲末每服二錢食前濃

石末塗臍周圍四寸熱易之。又枳殼炒一錢半大黃炮二錢甘

參閱前編二便不通門

小琴按妊娠大小便不通由臟腑之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不利大小腸俱熱則大小便俱不通宜推其因而藥之。

草決一錢研爲細末作三服濃煎急白湯調下。

【又方】妊娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小便

瀦產門腫宜當歸散當歸五分赤茯苓枳殼數

炒白芍藥川芎各一錢乾薑炮木香煨粉草各三分右用薑水煎服氣弱枳殼減半大便秘加蜜同煎

炒白芍藥川芎各一錢乾薑炮木香煨粉草各三分右用薑水煎服氣弱枳殼減半大便秘加蜜同煎

桑螵蛸炙黃二十枚右爲末每服二錢空心米飲調下。

桑螵蛸炙黃二十枚右爲末每服二錢空心米飲調下。

桑螵蛸炙黃二十枚右爲末每服三錢食前溫酒調服。

【又方】妊娠小便不禁宜桑螵蛸散。

【小便不禁】附尿血
妊娠尿出不知宜白薇散白薇白芍藥各等分右爲末每服三錢食前溫酒調服。

【又方】薑蜜湯生薑七片蜜半盞白茅根一握右入水濃煎服。

【又方】無故尿血龍骨一兩蒲黃半兩右爲末每服二錢酒調日三服。

【子淋】卽小便淋瀝刺痛參閱五淋門。

孕婦小便澀數名曰子淋宜地膚子湯

孕婦小便澀數名曰子淋宜地膚子湯

地膚子車前子知母黃芩赤茯苓白芍藥枳殼炒升麻通草甘草各三分右切一劑水煎服。

【又方】妊娠小便澀痛頻數宜子淋散。葵子二升滑石四兩碎右當歸生地黃各一兩續斷半兩赤芍藥二錢半右爲末每服二錢空心葱白湯調下。

以水五升煮取一升去渣盡服須臾當下便愈。

麥門冬去心 赤茯苓 大腹皮 木通 甘草 淡竹葉等分。右剉水煎空心服。一方。

無甘草大腹皮二味。

【又方】姪婦嘔病自汗或因下

痢後小便短少不痛者此津液不足也宜生津湯。

當歸 甘草炙各五錢 麥門冬去心 通草 滑石各三錢

人參 紗辛各一錢 右爲細末。每服六七錢燈心煎湯空心調服。

【又方】孕婦熱結膀胱小便淋瀝宜五淋散。

赤芍藥 山梔子各二錢 赤茯苓一錢二分 當歸一錢

調服。

【又方】孕婦熱結膀胱小便淋

瀝宜五淋散。

赤芍藥 山梔子各二錢 赤

茯苓一錢二分 當歸一錢

子芩六分 甘草五分 右水煎服一方加生地黃澤瀉木通熟炒甘草炙各一錢。右爲滑石車前子各等分。未每服一錢濃煎葱白湯下通。

【又方】胎前諸般淋瀝小便不通。

【又方】胎前諸般淋瀝小便不通。

檳榔 赤芍藥各等分 右剉。

每服五錢水煎溫服。甚效。

【又方】姪娠心經蘊熱小便赤

澁淋瀝作痛宜忘憂散。

琥珀不拘多少 萍草根一握

右琥珀爲細末。每服五分濃煎

萍草根調服。

【又方】姪婦八九月胎形肥碩

小便短少小腹脹身重惡寒起

則暈眩欲倒此胎氣逼塞膀胱

之氣不行也宜大腹皮散

赤茯苓三錢 大腹皮 枳殼 木通 生地黃 赤芍藥 淩

木通 菓子各一兩 黃芩

芍藥 枳殼 車前子各半兩

右剉每服四錢水煎服。

【又方】姪婦奉養太厚喜食炙

燄酒麵辛熱之物以致內熱小

便赤澁作痛宜加味木通湯。

便赤澁作痛宜加味木通湯。

【又方】姪娠小便澁少遂成淋

淡竹葉十二片水煎服。

瀝宜安榮散

胎氣不和。湊上心腹。脹滿疼痛。

死不能飲食。

麥門冬去心

通草 滑石

謂之子懸。宜紫蘇飲。

白朮五兩 黃芩二兩 茄藥

人參 細辛各二錢

當歸酒

紫蘇葉二錢 大腹皮 川芎

四兩。右用水六升。煮取二升。

浸燈草

甘草各半兩。右

白芍藥 陳皮去白。當歸各

爲細末。每服二錢。煎麥門冬湯

一錢 人參 甘草各五分

赤茯苓六分 桑白皮五分

調下。一方無滑石。燈心有車

前扁蓄。此方恐滑石太重而

前胡四分 郁李仁 檳榔各

滑胎若臨月可用。若六七個月

以前宜斟酌之。

七寸水煎服。

【子懸】卽心腹脹滿

小琴按妊娠胎氣不和。上湊

三分。右爲細末。以水一升煮

心腹滿痛難忍。謂之子懸。凡

頻數大便虛滑。宜安胎和氣飲。

取一半去渣。夜臥服。

受孕至四五個月。斯時相火

炒 甘草炙各一錢。陳皮去白。高良薑炒

兩。陳皮 大腹皮 桑白皮

養胎火盛。胎熱則氣湊心多

服生薑五片。水煎服。忌生冷之

物。

【又方】妊娠遍身痛。

或衝心欲

黎勒散

倘近此症。當諦認之。

兩岐。

炒 甘草炙各一錢。右作一

兩。陳皮 大腹皮 桑白皮

有此症與前心腹痛症兩岐。

各七錢半 枳殼 川芎 白

朮各半兩。右爲粗末。每服四

錢。薑二片。棗一枚。水煎服。

【又方】胎前四五個月。身體困倦。氣急發熱。飲食無味。貪睡頭暈等症。宜保胎和氣飲。

枳殼四錢。厚朴。香附子各三錢。砂仁。蒼朮。橘紅各一錢。蘇葉一錢。甘草九分。小茴香一錢半。右剉分作三

服。每服用水一鍾半煎七分服。【又方】胎上逼心煩悶。又治胎動困篤。宜葱白湯。

【子煩】即煩躁。姪娠心驚胆怯。煩悶不安。名曰子煩。宜服竹葉安胎飲。

人參三分。白朮。條芩。當歸各二錢。棗仁。遠志各八分。陳皮三分。川芎七分。生甘草四分。生地錢半。麥冬一錢。竹葉十片。姜棗引。有痰加竹瀝。姜汁。虛甚人參加倍。用瀉加芡實。減生地。按此症亦多在四五月之時。相火用事。或因夏令君火盛行。俱能乘肺。以致煩躁。湯建中云。因相火者。加知母。因君火者。加川連。

【又方】姪娠心脾壅熱。咽膈渴苦。煩悶多驚。宜知母飲。

當歸酒洗。川芎。人參。阿膠。甘草炙各一兩半。連根葱白一握。右細剉。以水二升。煎四味至升半去渣。下葱再煎。減二合。入阿膠溫服。一劑分二三服。

【又方】胎前五六個月。胎脹困弱。體重貪睡。食不知味。肚腹胎動。宜瘦胎飲。

當歸二錢。白芍藥。益母草。枳殼各四錢。砂仁。香附子。益智各三錢。甘草一錢。右剉分作三服。每服水一鍾半煎至七分。空心溫服。

【又方】婁全善云。此方神效。脈浮滑者。宜之。本草云。葱白通陽氣。安胎。

用葱白二七蒸。濃煮汁飲之。若胎未死。卽安。已死。卽出。未效。再服。知母。因君火者。加川連。

知母 麥門冬去心 赤茯苓
各一錢半 黃芩 黃耆各二

錢 甘草一錢 右作一服水

二鍾入桑白皮二錢煎至一鍾。
再入竹瀝些少同煎一二沸服
無時。

【又方】治子煩宜當歸散。

當歸二錢酒洗 川芎 阿膠

珠 豆鼓 桑寄生各一錢

葱白七莖 右剉水煎溫服。

【又方】妊娠熱乘心脾津液枯
少煩躁乾渴宜人參散。

人參 麥門冬去心 赤茯苓

地骨皮 乾葛 黃芩炒 犀

角鏗各七錢五分 甘草半兩
右剉每服三錢水煎服。

錢 甘草一錢 右作一服水

二鍾入桑白皮二錢煎至一鍾。
再入竹瀝些少同煎一二沸服
無時。

【又方】妊娠煩躁或胎不安宜
竹茹湯。

用淡青竹刮茹一兩以水一大

升煮取四合徐徐服盡爲度。

【又方】妊娠因服藥致胎氣不
安有似虛煩不得眠巢氏謂之

子煩也醫者不知作虛煩治之。

損動胎氣宜矣應用一母丸。

丸如彈子大每服一丸煎人參

湯下。

【又方】妊娠心煩熱不止。

葱白一握 破二分 右以水

二大盞煎至一盞半去渣溫分

三服。

【子癟】卽風癟。

小琴按大全云妊娠體弱受

風而傷太陽之經絡復遇風

寒相搏發則口噤背強名之

曰癟其候冒悶不識人須臾

自醒良久復作謂之風癟又

名子癟云。

妊娠冒悶角弓反張名曰子癟

風癟宜羚羊角散。

羚羊角錢 獨活 酸棗仁炒

五加皮 蓼蕎仁炒 防風

當歸酒浸 川芎 茯神去木

杏仁各五分 木香 甘草各

二分 右咬咀加生薑五片水

煎服。

【又方】妊娠中風癟口噤四肢

強直角弓反張宜羌活酒。

羌活去蘆一兩半 防風去蘆

一兩 黑豆一合去皮 右前

二味咬咀。好酒五斤。浸一宿。每服用黑豆一合炒令熱。投入藥酒一大盞候沸。卽住去滓分溫灌服之。

【子暗】

小琴按黃帝問曰。人有重身。

九月而瘖。此爲何也。歧伯對曰。胞之絡脈絕也。帝曰。何以

言之。歧伯曰。胞絡者。繫於腎

少陰之脈。貫腎繫舌本。故不

能言。帝曰。治之奈何。歧伯曰。

無治也。可知此症不必服藥。

產後自能言語。且歷稽古籍載方極稀。而所用諸方亦不

過保生丸四物湯之類。故不備錄。

【子腫】卽胎水腫滿又名子滿子氣。小琴按妊娠經血壅閉。藉以養胎。若忽然虛腫。乃胎中挾水。水血相搏。脾胃惡濕。濕潰氣弱。則肌肉虛。水氣流溢。故令身腫滿。陳無擇云。凡婦人宿有風寒。冷濕。妊娠喜脚腫。俗呼爲皺脚。亦有通身腫滿。

【又方】妊娠腹脹。或渾身浮腫。小便赤。宜千金鯉魚湯。當歸一錢半。白芍藥各三錢。白茯苓一錢半。白朮三錢。橘紅五分。鯉魚一尾。右作一服。

陳皮 生薑皮 大腹皮 桑白皮一錢 右剉水煎服。或爲細末。每服三錢。米飲調下。一方去白朮。名五皮散。或加木香急小便不利。宜木通散。

木通 香薷 紫蘇葉各一錢。枳殼麵炒。檳榔。條芩各五分。右剉。生薑三片。水煎食前服。

【又方】妊娠腹脹。或渾身浮

腫。小便赤。宜千金鯉魚湯。

當歸一錢半。白芍藥各三錢。白茯

苓一錢半。白朮三錢。橘紅五分。鯉魚一尾。右作一服。

白朮二錢半。茯苓一錢半皮。

將鯉魚去鱗腸。白水煮熟去魚。

用汁一盞半入生薑三片煎至

半右剉一服加生薑五片水煎服。

茯苓、白朮各四兩、旋覆花急痛宜崔氏方。

一盞空心服胎水卽下。如未盡腹悶未除再合一劑服之。

【又方】妊娠脾虛遍身浮腫。腹脹喘促小便不利。宜防己湯。

防己一錢半桑白皮燒紫

蘇葉 赤茯苓各二錢木

香五分右剉一服加生薑四片水煎服。如大便不通加枳殼檳榔

香附子炒陳皮甘草鳥藥木香各等分一方作木瓜右剉每服五錢加生薑三片紫蘇五葉水煎日三服。腫消止藥。

茯苓四兩杏仁檳榔各三兩旋覆花郁李仁各一兩右爲粗末以水六升煮取三升去滓分溫三服。小便通即瘥。

【子鳴】卽腹內子鳴。

小兒腹哭者蓋臍帶上疙瘩兒含口中。因孕婦登高舉臂脫出兒口。以此作聲令姪婦曲腰就地如拾物仍入兒口卽止。

麵炒 檳榔 赤茯苓各一錢

澤瀉 桑白皮 木通 枳殼右咬咀水煎服。

【又方】妊娠體腫有水氣心腹急大便不通小便赤澁。謂之子滿。宜澤瀉散。

甘草各一錢杏仁一錢半

【又方】孕婦腹中兒哭。用黃連煎濃汁。母常呷之。即止。

【中風卒倒】

姪娘中風卒倒。心神悶絕。口噤不能言。四肢急強。宜防風散。

防風去苗 葛根 桑寄生各一兩 羚羊角屑

當歸 甘菊花 漢防己去皮

秦艽去蘆 桂心 茯神去木

甘草炙各半兩 右咬咀。每服

八錢水一盞。生薑五片。煎至一大盞。去滓。入竹瀝半合。攪勻。溫服無時。

【又方】姪娘卒中風。不語。四肢強直。心神惛憒。宜生犀角散。

生犀角屑 麻黃去節各一兩

防風去蘆 赤箭 羌活 當

白僵蠶炒 天麻 獨活去蘆
各一兩 麻黃去節兩半 烏

芍藥各七錢半 秦艽 甘草
炙各半兩 石膏一兩半 右

咬咀。每八錢。煎服法如前。
半夏湯洗七次。薑製 天南星

【又方】姪娘中風。口眼喎斜。手

足頑痺。宜防己散。

防己去皮 羌活 防風各去

蘆六錢 麻黃去節 松木節

羚羊角屑各一兩 桂心 荆

芥蕙 蒼苡仁 桑寄生 甘

草炙各一兩 右咬咀。每服五

錢。生薑五片。水煎溫服。不拘時。

【又方】姪娘中風。口噤。心膈痰涎壅滯。言語不得。四肢直直。宜

白僵蠶散。

白僵蠶炒 天麻 獨活去蘆

各一兩 麻黃去節兩半 烏

炮 薑香各半兩 龍腦二錢

半另研 右爲細末。入研藥和

勻。每服一錢。生薑薄荷湯調下。

不拘時日三服。

【又方】姪娘中風。手足不隨筋

脈緩急。言語蹇澁。皮膚不仁。宜

赤箭丸。

赤箭 草薢酒浸 麻黃去筋

獨活去蘆 鼠黏子 熟乾地

黃 羚羊角屑各一兩 阿膠

炒 防風去蘆 莎翁 當歸

去蘆 蒼苡仁 五加皮 秦

羌去蘆 漢防己去皮 柏子仁 酸棗仁炒 丹參去蘆各七錢半。右爲細末。煉蜜和搗。三五百下。丸如桐子大。每服三十丸。豆淋酒送下。食前服。

【又方】妊娠中風。口噤言語不得。宜白朮酒。

白朮一兩半 獨活一兩 黑豆一合炒

右細剉以酒三升。煎取一升半。去滓溫分四服。口噤者。拘口灌之。得汗即愈。

【又方】妊娠因感外風。如中風狀。不省人事。熟艾三兩。陳米醋炒。令極熱。以綿帛裹熨臍下。良久卽省。

【姪婦霍亂附瘧】

小琴按。霍亂者。胃經陽明之病也。蓋因平日厚味釀腐成痰。七情鬱結氣盛化火。偶爲涼風冷食所侵襲。以致邪正交爭。陰陽相混。心腹絞病吐利。並作揮霍變亂。故名霍亂。

如邪在上。胃腕則當心而痛。其吐多。邪在下。胃腔則當臍而痛。其利多。邪在中。腕其腹中痛。吐利俱多。吐多則傷氣。利多則傷血。血氣俱傷。不能護養其胎。症殊危惡。宜亟治之。

【又方】中氣不和。霍亂吐瀉。但一點胃氣存者。服之回生。名回生散。

陳皮去白 蕃香各五分 右

爲末。水煎溫服。

【又方】妊娠霍亂。腹痛。四肢逆冷。汗出。脈虛弱者。宜理中湯。白朮 人參 乾薑炮 甘草一錢 甘草炙 蕃香葉 緩炙各五分。右剉水煎服。甚者加熟附子五分。

【又方】姪娠霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入宜人參散。

半 又竹茹湯(嘔吐) 益元散 桂苓甘露飲、冬葵子湯

人參 厚朴薑製切 橘紅各二錢 當歸炒 乾薑炮 甘草炙各五分 右作一服加生

薑三片棗一枚水煎服。 【又方】姪娠霍亂腹痛吐利不止宜白朮散。

白朮 益智仁 枳殼炒橘紅各七錢半 草豆蔻煨去皮 良薑炒各半兩 右爲散。

每服五錢入生薑半分水煎服。 【又方】金毛狗脊一個銼碎用酒水各一碗煎一碗用密布濾淨溫服子母俱安(如不飲酒用水照煎亦可)

俱大溫之劑。若發熱煩渴脈數陽證者服之卽死宜用後方。吳萸茱湯洗七次 生薑切各七錢半 木瓜竹刀切一兩半右細剉水二盞煎一盞去滓分三服熟服 一方有麝香七錢

活雄鼠腎一對麝香三分。搗爛分作三丸好硃砂爲衣。白

服此自然轉動三合濟生湯當歸三錢 川芎二錢炒 壳二錢 柴蘇八分炒 香附錢半 姜汁洗大腹皮錢半甘草七分 右銼水煎待腹痛

小琴云此奇驗神方也。王君子廉夫人當日胎墮腹中曾用此方母子旣離毫無他患其催生胎落死胎之秘藥乎近聞李君脩夫亦合一料施送鄰家產婦亦奇驗。

甚服之即產。

【又方】催生如意散。臨產腹痛。
方可服之。

人參一錢 乳香一錢 辰砂

五分

共爲末。臨產之時急用。鷄子清

一個。用姜汁調開冷服。如橫生
倒產。卽時順正。子母均安。

【分娩後骨不開】或五七日不
下垂死者。活命芎歸湯。

川芎一兩 當歸五錢 男女

婦人髮一把燒灰存性

其爲末。每一兩水煎服良久。無

論生死胎即下。再用自死龜壳

一個。如無坊肆中炙酥亦可。

【活水無憂散】

十月滿足。或因恣慾內傷。或患
潮熱。兼產前多吃熱毒物。或七

情傷觸。遂致瘀血相搏。臨產橫

逆。輒用穩婆下手取胎。觸死胎

兒。一主之以是方。

益母草二兩 大枳壳一兩

當歸四錢 川芎一錢 白芍

二兩 生地二兩 官桂一錢

急性子四錢 陳皮一錢 甘

草八分 生 鯉魚一個

共剉分二服。每用水三碗煎至

二碗。臨服再加好醋一匙。每

碗烏金丸一粒。每碗如死

胎尙不能下。急取無根水再煎

藥渣進二服。奇驗。

【千金保胎方】

人參五分 白朮一錢 白茯

大熟地 常歸 川芎 蛤粉
炒阿膠珠 四製香附米一條
芩 酒炒白芍 白朮 砂仁
炒研

以上各五分。水二鐘。糯米一撮。

煎至八分。食遠溫服。右方兩

月半者服十帖。四月半者服八

帖。（原句係兩個半月。四個半

月未識改者可不失其意否。特

注之。）永無小產之患。或平時

不傷動其氣。肚痛見紅者。急用

【又方】膠艾固真湯。

治胎氣腹痛兼見紅將墮者。服

之立效。

芩一錢 炙甘一錢 常歸一
錢 川芎五分 熟地一錢
炒白芍一錢 酒炒條芩八分
蜜炙黃芪一錢 醋炒艾葉八

分

水三鐘煎一鐘溫服。渣再煎服。

【又方】烏金丸

蛤粉炒真阿膠一兩八分 蘇

木一兩 艾葉二兩端午日收

去梗乾 穀麥芽各二兩 龍

衣卽蛇退。要全者一條煨乾。又

要蛇頭下出的方好。

共爲細末。煉密爲丸。如芡實大。

每用一丸。童便和酒化下。治臨

產艱難。橫生逆產。胎衣不下。并

治產後諸病。

凡修合此藥。天月二德。天醫生氣吉日。凝神安慮。洒掃淨室。按太極而生兩儀。九宮而分八卦。最忌婦人鷄犬。大聲喊音。須待夜間寂靜。齋戒至誠。先念淨口。淨心。淨天地神咒。咒曰。天精地靈。靈精靈靈。左轉北斗。右轉北辰。人逢此藥。各保安甯。急如律令。

【急救難產方】治死胎胞衣不下。均驗。

巴三草七脫衣裳。

細研如泥。入麝香。

捏作餅兒。臍下貼。

須臾子母兩分張。

小琴按種福堂急救神方。(

見鄙於大雅。茲姑錄之。存其

舊也。

【交骨不開產門不閉】

婦人交骨不開。產門不閉。皆由

元氣虛弱。胎後失於調攝。以致

血氣不能運用。而然也。交骨不

開。陰氣虛也。用活命芎歸湯。補中益氣湯。產門不閉者。氣血虛也。用十全大補湯。活命芎歸湯。方見上。

須臾子母兩分張。

其注云。此方用草麻子三

個巴豆四個(均去皮)加麝

香二分同研成餅貼產門上

交骨其胎立下如月分未足

胎或轉動不可輕用若足月

臨盆竟日不下者用此立驗

儀徵張姓婦生產三日不下

子死腹中命在呼吸照方配

用死胎立下產母保全

【又方】保產無憂散

專治婦人難產或數日不下

服卽產凡臨產一月前服一帖

臨產又服一帖其效難以盡述

酒洗當歸錢半去心川貝母

五分 炙甘五分 姜汁炒厚

常歸七分 赤芍七分

朴七分 蒺艾七分 生黃芪

八分 荆芥穗八分 枳壳六

分酒炒白芍一錢二分 (冬

日一錢) 兔絲子一錢四分

(酒炮乾) 川芎一錢五分

【治慣要小產】服此方可免千

金保孕丸

杜仲四兩 (糯米炒斷絲) 酒

洗川斷二兩 爲末 山藥煮

糊丸如桐子大每服八十九丸空

心米湯下

【濟陰還魂丹】

催生兼橫產逆產胎前產後一

切諸病 益母草八兩 南木香五錢

去壳草麻子四十九粒 煅蛇

退一條 硫砂研末一錢 雄

黃研末一錢

爲末蜜丸如彈子大每服一丸

好酒童便各半化下若臨急倉

卒未能修合只用生益母草搗

爛紋汁入蜜水少許服之甚效

【難產水下胞乾】宜經驗滑石

散 滑石粉一兩 白蜜半盞 香

油半盞 將油蜜慢火熬熱三四沸掠去

沫調滑石頓服外以油塗產婦

臍腹上下摩之立效

右爲末。晚米糊爲丸。如彈子大。
臨產時先用花粉湯洗臍納藥。

一丸於臍中。以紙蓋上。用白棉
束之。產畢取下。一丸可用數次。

小琴按所束白棉可代以膏
藥。

【又方】
用茱莉花七朵。開時摘下。夾在

書本內。勿令泄氣。若用鮮者。
更佳。用時將花放在淨碗內。
以芝麻一把入銅鍋炒香。清水
煎一二沸。傾入花碗。蓋片時浸
出花味。與產婦服之。壯者並芝
麻和花食之。奇效。月分未足不
可用。

【治死胎不下】獨鳳丹。

用鳳仙花根四五寸許。剝去皮。
將根插入陰戶。卽化爲水而下。

小琴云。鳳仙根最軟堅。損骨
不可輕用。

【治死胎不下】桂香散。
桂心三分。麝香一分。爲末。

酒下。

【又方】
黑豆三升。醋煮濃汁。頓服。立出
胞衣不下。用白蒺藜貝母等分
爲末。米飲下二三錢。胞切忌手
取慎之。

【又方】三退散。
治血寒胎衣不下。神效。

蛇退一條。蠶退紙一方。蟬
退四十九個。

右用磁罐內燒存性。研末順流
水調下。效。

【又方】奪命丹。
治症同前。

歸尾二錢。川牛膝五錢。木
通五錢。滑石四錢。冬葵子
五錢。水煎連服二帖。卽下。

臨產一切血痛危急欲死。及胎
衣不下。諸醫不識之症。神驗難
以盡述。

【又方】神應黑龍丸。
酒洗當歸五錢。五靈脂研五
錢。川芎五錢。良姜五錢。
熟地五錢。

右藥晒極乾。以小瓦鐘蓋頭封
口嚴密。文武火煅一炷。香浴地。

出火毒。開取藥。研末爲丸。并調

入花蕊石。另研二錢。百草霜五

錢。乳香二錢半。研琥珀一錢。另

研醋糊如彈子大。每服一丸。臨

用時。將丸投炭火煨紅。淬生薑

自然汁內化開。再入好酒童便

調服。奇效。

胎漏下血

四虛散

白朮一條。芩一錢。砂仁一錢。阿膠

等分爲末。每服二錢。艾湯下。

漏胎

白朮一錢。芩一錢。只壳

白朮枳殼丸。

白朮一錢。芩一錢。只壳

一錢

水煎服。

【橫生逆產方】

患此。若須臾不救。子母俱亡。服

此可免。

蛇退一條。蟬退十四個。胎

髮灰一丸。

並燒灰。共爲末。分作二服。酒調

下。須臾進一服。仰臥即下。

子死腹中

子死腹中。多因驚動太早。或觸

犯禁忌。或抱腰太重。或頻拭水。

胞衣先破。血水先盡。而胎乾涸

故耳。如產母唇血皆青者。子母

俱死。若舌黑。或脹悶甚者。子死

母存。先以「平胃散」一兩。酒水

各半煎。再入「朴硝」半兩。服下。

效。或用「朴硝」一兩。用「童便」

水。煎服。

【治氣血俱虛。慣於三月內墮胎】

宜因以山藥固胎飲。

人參。黃芪。白朮。條芩。各

一錢。當歸一錢。川芎。白

芍各七分。熟地。陳皮各五

分。黃連。升麻。柴胡各三

分。糯米八十一粒。

右爲末。晚米粥爲丸。桐子大。每

服五十丸。米飲下。

【治胎動腹痛。下血】極效。獨虛散。

砂仁不拘多少。帶皮同炒。勿令

焚黑。去皮取仁。爲末。熱酒調服。

不飲酒者。米飲亦可。

【治小產氣虛。血下不止】人參

黃芪湯。

人參一錢 蜜炒黃芪一錢

當歸一錢 炒白朮一錢 醋

炒白芍一錢 醋炒艾葉一錢

炒阿膠二兩水煎服

【小產痛證】

小產腹痛拒按。係瘀血爲患。宜

失笑散。按之反寬。係血虛。置四

物參苓白朮。痛而作噯。係胃虛

宜六君子。痛而作瀉。宜六君子

送二神丸。

■ 產後門

【生化湯】

此藥善破舊血。驟生新血。於崩

娩時。產婦未進飲食之先。連服

二錢。遠志一錢。威靈加防風一錢。頭痛倍加川芎

分溫服。

驚悸怔忡。加棗仁。(炒黑細研)

即前方加減之。

【生化湯加減法】

即前方加減之。

【胎衣不下】

去黃鶴子清一個。

以酸醋一合和之。啜入口中。即

二帖可免頭暈腹疼諸症。嗣後每日一帖。迨精神旺。止服。

川芎全歸八錢 川芎四錢 去皮尖桃仁十四粒(炒焦研碎)

乾姜五分(炒焦黑) 炙甘四分水一碗半。黃酒半茶鐘。煎七

錢 澤蘭(酒炒)一錢

腿膀疼不能舉步。加川草薢三

錢 胡索(醋炒搗碎)二錢

草麻子十四粒 去壳研塗兩足心。胞衣即下。

急洗去。否則腸出可危。如腸出

就以此藥貼頂心。腸即縮回。神

效。

【又方】

生葱白數莖嚼之卽下。

【胎衣不下血沖心腹中血塊】

生軍一兩爲末好醋半升熬膏丸如梧子大以醋化五丸服之須臾卽下。

右方又治【月經不通】以及血海乾涸死

胎等危證。

皮硝二錢

壯者可用三錢如寒天加大

附子煨去皮臍五分用好酒半鐘童便半鐘入硝煎一二沸溫服立下百發百中。

【腸出】

用脚盆貯腸用芋煎水洗之蓋

藥水甚滑也洗過後以冷水噴其胸。則令作寒噤。藉勢以手托搭於陰門口上。令產婦仰面半睡。卽時可愈。
小琴云。俗用香油潤腸托入。當不亞此法。

【產後氣血虛損】以大補氣血

爲主。此方治一切諸病脾胃怯弱或惡露不行或血行過多或

飲食失節或怒氣相沖以致發

熱作寒自汗口乾心煩喘急心

腹疼痛頭眩眼黑耳鳴等症不

語昏憊不省人事並皆治之歸

炒。

有汗加黃芪(蜜汁炒)酸棗仁。

(炒)

口乾苦。加麥冬。(去心)

身不發熱。小腹痛不可忍。加桃

敗血。閉於心竅。神智不能明了。去蘆炒白朮。去心麥冬。去又心氣通於舌。心氣閉塞。則舌亦強矣。宜服八珍湯。

心防風。去皮白茯苓。酒洗當歸。加紅棗二枚。水煎溫服。

仁。(去皮搗爛)五錢

韭菜汁和酒送下。立效。

人參。石菖蒲。生地黃。川芎各一兩。細辛二錢。防風五分。另研辰砂五分。甘草一錢。

去皮白茯苓一錢。蜜炒黃芪。人參錢半。去蘆白朮二錢。錢半。陳皮一錢。去皮尖桃仁一錢。炙甘五分。

惡露不行。加益母草。牡丹皮桃仁。入童便酒同服。

吐痰。加半夏貝母。

咳嗽不止。加五味子桑白皮。

昏憤口禁不語。加荆芥穗。

【產後三日牙關緊急。眼目直視四肢厥冷。】

(乾姜炒黑)一錢。水煎入童便服之。立效。

論曰。產後不語者何。曰人心有七孔。三毛。產後虛弱。多致停積。

(乾姜炒黑)一錢。水煎入童便服之。立效。

〔陰戶產後腫痛癢〕

〔陰戶癢不可忍。用食鹽一兩研塗之。〕

〔陰戶腫痛。用吳茱萸煎湯洗之。〕

〔產後血量不知人事。〕宜清魂散。散。

澤蘭葉四兩 荆芥穗四兩

川芎二兩 人參一兩 甘草

八分 為末。每服二錢酒下。

【產後血積成塊腹痛】宜四物

一黃散。

當歸 川芎 熟地 白芍酒

炒各五錢 蒲黃炒二錢 每

服二錢。空心酒調下。

【當歸血竭丸】治症同前。

當歸 血竭 茜朮 白芍酒

炒各二兩 五靈脂四兩

爲末醋糊丸。桐子大。每服六十

丸。空心酒下。

【又方】單用五靈脂半兩。生軍

炒爲末去生軍酒下。二錢甚效。

【產後一切諸疾】腹痛頭痛。更

病不作。宜四味湯。

當歸 元胡索 血竭 沒藥

各等分。以血竭沒藥另研爲末。當歸元胡亦另研之。每和服二錢酒。童便各半調下。

【產後陰戶突出】宜硫黃散。

硫黃一兩 蒼絲子五錢 吳

茱萸五錢 蛇床子五錢

研勻每用四錢。水煎頻洗。自收。

【產後蓐勞】寒熱如瘡。自汗無

力。咳嗽。頭痛。腹痛俱效。宜豬腰

飲。

猪腰一對。酒炒白芍一兩。

當歸一兩。

先將水三碗。煎歸芍至二碗。去

渣。將豬腰切塊。煎入。又晚米。

合香菇一錢。加葱椒鹽空心日

服一次。神效。

【治產後敗血凝結】令人浮腫。

不可作水脹治此藥行其氣血。

浮腫自消。宜小調經丸。

琥珀 沒藥 桂心 當歸

白芍各二錢 細辛五分 薑

香三分

共爲末。服錢半。姜湯酒一分。

【保孕催生】

桃仁一個。對半分開。用硃砂一

面寫一日字。一面寫一月字。候

乾。仍舊合好。拔取產婦項心長

髮三根。縛桃仁作十字樣。令產

婦用水吞下。立刻落蓐。男左女

右手捻出奇效。

【治胎衣內停】

無名異三錢（卽漆匠所用煎

油干子）爲末。以鷄蛋白調勻。
貯碗中。以米醋一茶杯熱滾沖
藥服之。卽下。不下再作服。

【又方】

黑豆三合。醋和水煎濃湯服之。
立下。

【又方】草紙燒烟薰鼻立下。

【產後血氣痛】

益母草一兩 當歸五錢 丹

參三錢

【產後血量急治法】

鐵秤錘炭火燒紅淬米醋內使

聞鼻中立甦。

【乳癰乳吹】餘考瘡癰門。

鮮蒲公英不拘多少搗汁熱酒

沖服。再用其渣敷乳上。次日卽

消。（已釀膿者無效。）

【又】乾蒲公英四兩 香白芷

三錢 煎湯數碗。作五六服每

碗和陳紹酒一分。亦以渣敷乳

甚效。

【又方】乳癰乳吹腫痛。未釀膿

者。服之立瘥。

牙皂燒存性 炒蛤粉 等分

爲末。每服五錢。好酒調下。以醉

爲度。熱服。出汗立愈。外用巴豆

三個。香油調敷癰頭上。蓋以膏

藥。四周以鐵箍散圍之。立愈。

【附鐵箍散方】

白芨 白斂 白芷稍 赤芍
稍 右爲末。蜜調。

【產後宜注意者】

（一）產後卽服生化湯一帖。饑渴甚。食白粥一盞。不可太飽過

一時。又服生化湯。如未欲進食。

必連服生化湯兩帖。

（二）纔產不得過與酒。酒能散

血入四肢。且曠虛不勝酒力。

（三）七日內不可洗下部。七日

後方可溫水。枕床坐洗。滿月後。

方可梳頭洗澡。一百二十日內。

不可勞力過度。

（四）冬月做產。當四圍置火。常

令有煖氣。并下部不可去棉物。

方免胎寒血結。以致難產停胎。

也。

【產後鄉俗習弊有十】

(一) 產畢卽食牛羊豬鵝鷄子麵等難消化之物。
(二) 產後食涼粉綠葷粉喬麵等等。

(三) 產後多飲胡椒艾酒血塊雖得熱流通殊耗新血。

(四) 寶波習俗產後用薑數斤以消血塊致發熱亡血而死。

(五) 產後食梨橘柑橘種種生冷果品及冷茶冷藥水必致血塊凝結。

(六) 產後食枳實香砂等丸多損血氣。

(七) 產後二三日內不可梳洗。

勞神以及勉強早起使冒風寒。

(八) 月內毋多言勞女工。

(九) 暑月毋用涼水洗手足。
(十) 大寒月毋生烘衣漫腹因

漫時雖熱去則便冷恐血塊凝結。

結。

【產後用藥十誤】

(一) 服耗氣順氣藥反增飽悶。

(二) 服消食藥過多損胃傷脾下胞。

(三) 因發熱誤用芩連梔柏亦傷脾胃切忌。

(四) 三日內未服生化湯以消血塊毋用人參芪朮致痛不除。

(五) 毋卽用地黃以滯惡露獨傷脾。

【產後禁用藥】

氣血不順禁枳朴。

傷飲食禁枳實大黃蓬稜。

身熱禁芩連梔柏。

用枳壳實牛膝以消血塊。

(六) 毋用大黃芒硝以通大便致起瀉疾或成鼓脹。

(七) 毋用蘇木稜蓬牛膝等以消血塊因大損新血也。

(八) 習俗多用山楂一味煎汁以攻血塊剝削脾胃耗損真元。

死之招也忌之。

(九) 毋服濟坤丹二三丸下胎下胞。

(十) 毋信產保百問及婦人良方。

七日內禁地黃芍藥。

血塊痛禁牛膝蓬稜蘇木。

大便不通禁硝黃。

又

服濟坤丹要損氣血。

服瘦胎丸要傷胎。

不可用產寶峻劑。

【產後宜忌食物】

生冷藥物(如梨藕西瓜等)停

血作痛。

寒涼食物。(如菜豆粉喬麥麵等)停塊痛。

肉食(如豬鵝等肉)同上。

菜(莧菜生菜苦菜)同上。

砂糖酒損新血。

獨煎山楂湯同上。

食胡椒艾酒行血致崩。

生姜酒(甯波俗弊)發汗行血。

濃茶汁(寒)停塊痛。

雜治門

【求子】

見前不孕門此從別本錄入稱爲驗方。

【螽斯丸】

婦人月經不調目昏頭暈子宮

久冷此藥溫中益氣能令有孕神效。

人參二兩 桂心五錢 姜汁

炒斷絲杜仲五錢 防風五錢

秦艽五錢 白薔薇五錢炮

薑五錢 沙參五錢 酒炒牛

膝五錢 半夏五錢 白茯苓

一兩 細辛一兩 製附子一

兩 右爲末蜜丸桐子大每服五十

丸空心米飲下或酒下有孕便止服。

【滋陰暖宮丸】一名百子附歸丸。

治陰陽不利氣血不足服之無有不效而受孕也。

酒醋童便四製香附米十二兩
酒洗歸二兩 川芎 酒

炒白芍 酒蒸熟地 蛤粉炒珠仁阿膠 醋煮晒乾艾葉各二兩

右爲末醋糊丸桐子大每服一

百丸空心醋湯下。食物壓之。

小琴按醋酸苦溫斂氣散瘀
除癥

【五子衍宗丸】

男子服此藥添精髓疏利腎氣。

不礙下焦明淨硫黃一兩用

銅銚甘草煮湯一日取出陰乾。

研細糊丸桐子大(約二百粒)

每遇婦人經期過後空心酒下

二十五丸次日下三十五丸三

日下四十丸迨百丸盡交媾無

不感孕如不孕次月期復行經

則照前法再服百丸(約二百

丸作兩次服如服前百丸受孕

後百丸止服)決有孕矣此以

後常服清熱養血之劑以固胎

氣而肅胎熱此方百發百中不可以簡易而忽之按交媾感孕原於血熱硫黃補虛實寒熱服之自平古今第一方世有服此藥子孫蕃衍故名衍宗

甘枸杞 兔絲子各八兩

酒煮搗作餅焙乾微炒研車

前子二兩 酒洗淨覆盆子四

兩 北五味子二兩

共爲末蜜丸桐子大空心臨臥

白湯下九十九

脩合法春取丙子己丑夏取辰

戌丑未秋取壬癸亥子冬取甲

乙寅卯

上半截帶葉益母草一兩(忌見鐵器)去蘆人參白朮
去皮白茯苓炙甘酒洗
當歸 川芎 酒洗白芍
酒蒸熟地

右爲末蜜丸如彈子大空心蜜
湯下一丸如不能嚼改作小豆
大每服七八十九丸脾胃虛寒加
砂仁一兩姜汁炒腹中脹悶
加山楂一兩飯上蒸過多食者
加香附一兩(童便製)

【八珍益母丸】
治經不調腰痛腹脹緩而不至。
當歸三錢 川芎二錢 茯苓
芍藥

生地黃各三錢 柴胡二錢
山梔子 牡丹皮 龍膽草各一錢
右剉水煎服。

又換直至喉中覺枳管氣則痛
止腫消便利矣。

【治婦人陰腫堅痛】宜白礬散。

大黃微炒 黃芩 黃蓍各一兩
赤芍藥 玄參 丹參

白礬半兩 甘草半分 生大黃一分
共爲末水和丸如棗大。綿裹內陰中日兩換以愈爲度。

山茱萸 蛇床子各半兩 共爲細末每服二錢食前溫酒調服。

【治婦人陰中腫痛】黑白散。
小麥 朴硝 白礬 五倍子
葱白 煎湯頻洗。

【治陰中生蟲】亦治茄子疾。宜硫鯉丸。

【治婦人陰腫如石】痛不忍。二便不利宜枳橘熨。

大鯉魚一個去頭皮入硫黃一兩黃泥固濟火煅烟盡爲末米糊丸如桐子大每服二十九溫酒下。

枳實 陳皮各四兩 二味炒

【療婦人陰痒不止】廣濟方。

令香熱以絹袋盛之遍身從上至下及陰腫處頻頻熨之冷則

【又方】狼牙二兩細剉 蛇床

硝石 蕪荑各半兩 藜蘆二錢半 右爲細末以臘月猪脂和如膏用細布作繩子如指長一寸半以藥塗上內陰中日一易之易時宜用花椒根三五兩水煮稍熱洗乾拭內之

【治陰中生細蟲】痒不忍若食入臟腑卽死。

梓樹皮焙乾爲末二錢 枯礬五分 麝香少許 右和一處研勻敷之立效。

【又方】桃仁雄黃研勻納陰中仍服清肝解鬱之藥。

【又方】蛇床子白礬煎水淋洗卽止。

子三兩 以米三升煮汁沸熱洗

【又方】取牛肝或豬肝截五寸繩繫內陰中半日蟲入肝取出立效

【又方】取鷄肝乘熱內陰中如有蟲當糞下

【又方】新桃葉搗爛綿裹納陰中日三兩易

【又方】生艾汁調雄黃末燒烟薰之更用雄黃末納陰中

【療陰中有蟲痒且痛目腫身黃欲得男子漏血下白多氣思美食】

用鯉魚長一尺去頭肉取骨搗末熬黃黑以猪脂和以絹袋盛

如常法納陰中至痛處卽止蟲當自出
【崔氏療陰痒不可忽方】杏仁燒作灰乘熱綿裹納陰中日二易之
【又方】蒜煮湯洗之一方用枸杞根煎湯洗
【又方】小蘿不拘多少水煎作湯熱洗日三次
【治陰戶生瘡】
【補心湯】治婦人陰戶生瘡名曰懲瘡或痛或痒如蟲行狀膿淋瀝陰蝕已盡治之當補心存性右爲細末如瘡口深用小絹袋子二個盛藥滿結口臨上床炙熱安在陰中立愈

皮 枇杷去穰炒 紫蘇常歸 白芍藥各一兩熟地黃一兩半右剉每服四錢加薑漿煎服如濕熱有蟲者去薑蘇參梗四味加苦參蕲艾桃仁吳茱萸水炒黃連

桔梗 乾薑 甘草各五錢

【治婦人陰瘡】麝香杏仁散。右爲細末如瘡口深用小絹袋子二個盛藥滿結口臨上床炙熱安在陰中立愈
【柏蛤散】治下疳濕瘡黃柏以磁鋒刮末蛤粉各等分右摻上即愈蓋黃柏去熱蛤粉燥濕故也

【又方】平胃散加貢衆末。每服。

二錢熟豬肝拌藥內陰戶數日可安。

治陰痔

【治婦人陰中生痔】九竅有肉突出者皆名爲痔。

用烏梅肉七箇燒存性。用小瓦罐盛。隔醋淬之。乘熱熏候溫手沃之良。

【洗方】治茄子疾 茄皮 白礬 臭椿樹根 朴硝 澤蘭 各等分 石灰炒少許 右煮水薰洗。

【敷藥】治茄子疾 朴硝爲末。黃荆柴燒瀝調敷。或濃鐵漿水調傅。

【治陰挺】當歸 當歸散 治婦人陰中突出一物。甚大牽引腰腹心躁連綿黃水易治。白水難愈。用生枳殼爲散。煎湯熏洗。却用綿帛包枳殼溼納入陰中。卽日漸消。

【治陰挺下脫】

【當歸散】治婦人陰中突出一物。長五六寸。名陰挺。又名癩瘤。當歸 黃芩各一兩 牡蠣一兩半。蝟皮炙一兩 赤芍藥右爲末。每服二錢。食前溫酒調下。滾湯亦可。如不應。更以補中益氣湯倍加升麻柴胡兼服之。

【治陰挺】當歸 穿山甲 蒲黃炒各半兩。辰砂一錢。麝香少許。右爲末。每服二錢。酒糊丸如桐子大。每服三十五丸。木通湯下。○下虛加川烏炮去皮。肉桂去粗皮各一兩。腰腹痛甚。加桃仁去皮尖炒。別研青皮去白。枳實去穰各一

【又方】治茄子疾

調下尤效。

治陰中生一物。甚大牽引腰腹。治陰中生一物。甚大牽引腰腹。膨脹痛至甚。不思飲食。皆因多服熱藥及煎燉或犯非理房事。兼意淫不遂。名陰挺。宜三茱丸。食茱萸 吳茱萸湯浸微炒。山茱萸肉 舶上茴香 白蒺藜 桔梗慢火炒 青皮去白核玄胡索各一兩。二錢半。右爲末。酒糊丸如桐子大。每服三十五丸。木通湯下。○下虛加川

兩真有木香七錢半服之。

一方每服二錢。生地黃湯調仍

用金毛狗脊五倍子白礬水楊

根魚腥草山黃連各一兩爲散

分作四服。以有嘴瓦罐煎熱預

以銀錫作一長小筒下透罐嘴。

嘴上貫梃上先熏後洗立效。再

服白薇散凌霄花少許煎。

【捻金丸】服前藥未效却用此。

玄胡索 船上蘿香 吳茱萸

炒 川棟子去核 青木香各

二兩 右爲末。粳米飯糊丸如

桐子大。每服三十五丸空心木

通湯下。又用梅花腦子半錢鐵

鏹粉一錢水調刷上。如陰畔生

五茄皮 乾姜 丹參 蛇床

酒方

腹內熱爲度

【又方】蛇床子一兩 吳茱萸

孢。再加血餘三錢凌霄花少許
煎。

地骨皮 天門冬各一兩鍾乳
粉四兩右剉碎以生絹袋盛用
酒十五觔漬二宿每服一盞空
心食前飲之一方用枸杞子無
地骨皮。

【薰洗法】用荆芥穗臭椿樹皮
藿香葉煎湯薰洗卽入。

【托藥】用草麻子葉（有九角
者好）飛過白礬爲末以紙片
攤藥托入。

【繆藥】先以淡竹根煎湯洗仍
用白礬五倍子爲末乾繆立效。

【敷藥】用溫鹽水洗軟却用五
靈脂燒烟熏次用草麻子研爛
塗上吸人如入則洗去。

【治陰冷】

遠志 乾薑 蓮花各半兩
蛇床子 五味子 右搗羅爲
末每用兼以免糞塗陰門用綿
裹一錢內陰中熱卽爲效。

【又方】蛇床子 吳茱萸 甜
葶苈各半兩 石子一枚
右爲末綿裹糞許大內陰中令

一兩半生用 一方用麝香

日三四度擦。

右爲末。煉蜜丸如酸棗大。以綿

裹納陰中。下惡物爲度。

【溫中坐藥】用蛇床子爲末。白
灰敷之。

粉少許和勻。如聚大綿裹納之。
自然溫熱有效。

【又方】用熟艾緊裹一團。然後
以綿裹內陰中。

【集驗方】療女人交接陽道違
理及他物所傷犯血流瀝不止。

者取釜底墨斷。蘆塗藥內之。

【又方】療女童交接陽道違理。

血出不止。用燒髮并青布末。

粉塗之。一方割雞冠血塗之一。
方以赤石脂末。繆之。一方五倍

子末。繆亦良。

【千金方】治女人交接出血。

桂心 伏龍肝各五錢 右爲

末。酒服方寸匕。卽瘥。

【又方】黃連六分 牛膝 甘

草各五分(每一分二錢半也)
分 右剉。以水四升煮取二升。洗

頭。宜桑白皮湯。

桑白皮半兩乾薑桂心五寸大
右細切。以水四升煮取二升。洗

頭。宜桑白皮湯。

【又方】海螵蛸燒爲末。酒調服。
方寸七日三服。

【又方】小麥甘草二味各等分。
煎湯洗甚效。

【治傷丈夫頭痛】

【療女人傷丈夫】四肢沉重。嘔
頭痛。宜集驗方。

生地黃八兩 荻藥五兩 甘

草三兩 香豉一升 怨白一

斤 生薑四兩 右以水七升

煮取二升半分三服。不得重作。
忌房事。

升。醉去淨分溫服。衣適厚薄。毋

令汗出。

醫樂顧問

卷十二

藥治門

四七〇

必備醫藥顧問卷十三

會稽馬小琴纂述

兒科

脈法

錢仲陽云。小兒脈法。脈亂不治。氣不和。弦急。傷食。沈緩。虛驚。促急。風浮。冷沈。細未至三歲。看男左女右虎口。第二指根第一節。名初關。一名風關。若脈見初關病。第二節爲中關。又名氣關脈。見病深重。第三節爲末關。又名命關脈。見死不治。三關青是四足驚。三關赤是水驚。三關黑是人驚。紫色鴻利。黃色雷驚。三關有通度脈。是極驚之證。必死。餘

病可治。或青或紅。有紋如線。一短長大小各有邪。干浮主風。直者。是乳食傷脾。及發驚熱。左右一樣者。是驚與積齊。有三條或散。是肺生風痰。或似齁輪之聲。有赤。是傷寒及嗽。如紅火。是瀉。有黑。相兼主下痢。紅多白痴。黑多赤痢。有紫相兼。加渴。不痾。虎口脈紋亂。乃氣不和也。青虛。虎口脈紋入掌內弔。驚青。黑發慢驚脈。入掌內弔。虛。虎口脈紋亂。乃氣不和也。青骨中有熱。弦長。是鬲肝有風。緊熱。沈緊。主腹痛。不歇。虛濡。有氣。數驚。風四肢掣戰。浮洪胃口有熱。沈緊。主腹痛。不歇。虛濡。有氣。又兼慢驚。芤多。痢大便有血。四歲用一指。按虛實。五歲六歲用一指。滾轉三部。平正關上爲八至。爲平脈。九至不安。十至危。準。七歲八歲。稍移指少許。尋三

部。九歲十歲次第依三關部位尋取。十一十二歲亦同。十歲看十四歲十五歲方依大方脈部位診視。凡看脈先定浮沈遲數陰陽冷熱皆依大方也。沉遲爲病疾痞癧。其色白者大腸滑洩。陰浮數爲陽。更兼看面部青色主驚風。白色主瘡瀉。赤色主痰熱。黑色病勢難當。黃色是脾家病積。以此相參察其病源審度治療必無疎失矣。

〔而上氣色〕

左腮爲肝。右腮爲肺。額上爲心。鼻上爲脾。下頸爲腎。赤者熱也。隨證治之。此仲陽之至論也。口議所謂五位氣色總見者。其藍青色者。乃驚精不散。欲發風候。

其火紅色者。痰積壅盛。驚悸增進。其黃土色者。食積癥傷。欲作瘡疾痞癧。其色白者。大腸滑洩。水穀不分。欲作吐利。其黑色者。臟腑欲絕。其疾危惡。其兒不久也。又有面部形色。額有青色。主驚風欲發。紅主大熱。印堂青色。初入驚并瀉。紅主大驚夜啼。黑色主客忤。山根青至。主二次驚青。死年壽平陷者。主天青。主發熱生驚。黑主利死。紅主燥死。微黃曰平。黃甚主霍亂死。鼻准微黃甚人中黑。主蛔蟲咬。患久唇反者死。短縮者因利死。邊旁黃主熱口瘡。右赤肺熱。黃主有積。紅

胃逆。青色主下利。正口紅者平。乾燥脾熱。白主失血死。黃有積。青因驚風死。黑氣達口者死。承漿青因飲食時被驚。黃主吐逆。赤主血痢。赤黑主驚風。兩眼黑睛黃有熱。白睛黃食積不化。瘡眉上青吉。忽紅主煩躁夜啼。黃主霍亂久病。紅者死。風氣二池青主風候。紫主吐逆。又發熱。黃吐逆。紅主煩躁夜啼。兩頰赤色。肺有客熱。兩太陽青主二次受驚。青白太陽入耳者死。紅主血淋。兩臉青主客忤。黃主痰溢。赤主風熱。兩頰赤主傷寒。左赤心。右赤肺熱。黃主有積。紅

主血淋。兩頸青。主吐蟲。兩金匱。
青。主第三次驚。生風黑。透口二

日死。青連目入耳。七日死。兩風。

門紅。主風熱。黑。主痈。青水。驚。黑。

從眉入耳。當日死。唇黑不食者。
死。又面青眼青。肝之病而赤心

之病。面白肺之病而黃脾之病。
而黑腎之病。五臟各有所主。看

裏受盈虧。胎氣虛實。陰陽補瀉。
當救其生。臟腑表裏。若能辨其
標本。則神望工巧。自然得矣。

■ 小兒初誕

【去口中惡涎】

【朱蜜法】葛氏肘後方。

小兒初生。先用黃連甘草法拭

口。吐其惡汁。稍時更與朱蜜定。
魄安神。口。白。胎氣虛實。陰陽補瀉。
抹口中非獨鎮心安神。能解惡
毒之物。一生免痘瘡之患。

硃砂一大豆許。

右細研以蜜一蚬殼許。和硃砂

抹口中。非獨鎮心安神。能解惡
毒之物。一生免痘瘡之患。

【黃連法】

臨月用黃連細切。搗碎綿裏。百

沸湯拭口。

【甘草法】

預以甘草細切少許。產臥時以

綿裹沸湯泡盞內蓋定。收生之

際。急以軟綿裹指蘸甘草汁拭

其口。次用黃連法朱蜜法。

【又牛黃法】

與朱蜜同。少加牛黃。益肝膽除

治宿食不消。巢氏云。宿食不消。
脾胃冷故也。小兒乳哺飲食生

熱。定精神。止驚。和脾。惡氣除。
小兒百病。

【茯苓丸】直指方。

治嬰兒初生。其聲未發。急拭其

口。令惡血淨盡。不得下咽。則無
他病。稍遲惡穢入腹。則腹滿氣
短。不能飲乳。或胎中受寒。則令

赤茯苓。黃連。冷證去此加
芍藥。枳殼炒。赤茯苓。黃連。冷證去此加
芍藥。枳殼炒。

右等分爲末。煉蜜丸如梧子大。
每丸乳汁開下。

【消乳劑】

【消乳丸】又名消食丸。

治宿食不消。巢氏云。宿食不消。
脾胃冷故也。小兒乳哺飲食生

冷過度。冷氣積於脾胃。胃爲水穀之海。脾氣磨而消之。胃氣調和。則乳哺消化脈沈者。傷食不化故也。

縮砂仁 陳皮 京三稜煨

蓬莪朶煨 神麴炒 麥蘖炒

各半兩 香附子

右爲末。麵糊丸。如麻子大。食後

白湯送下。

【噤風】

噤風者。眼閉口噤。啼聲不出。舌上聚肉如粟米狀。吮乳不得。口

吐白沫。大小便皆通。蓋由胎中

感受熱氣。流毒於心脾。故形見

於喉舌間。抑亦生下。復爲風邪。擊搏所致。

自滿月至百二十日。或

然虛每服一豆粒許。寒驚金

右爲末。和黑用好油紙封裏。自

字

全蠍號散。治初生小兒。七日不

日見此名曰犯風噤。依法將護防於未然。則無此患。

【甘草湯】

治撮口取吐風痰。

甘草生一錢

右剉煎服。令吐出痰涎。却以諸

乳點入口中瘥。

【辰砂膏】

治眼閉口噤。啼聲不出。吮乳不得。口吐白沫。大小便皆通。

辰砂三錢 硼砂一錢 馬牙硝一錢

玄明粉二錢 全蝎五分

真珠末五分 蘆香一

右爲末。和黑用好油紙封裏。自

字

全蠍號散。治初生小兒。七日不

銀箔薄荷煎湯。下潮熱甘草湯。下。或用乳汁調傅乳上。令兒吮下。

【撮口】

聚口撮而飲乳有妨。若口出自沫而四肢冷者。不可救。其或肚脹青筋弔腸卵疝。內氣引痛。皆腸胃鬱結不通致之。治法貴乎疎利。

【僵蠍膏】亦宜胎驚門千金龍胆湯。

赤脚蜈蚣半條炙 鈎藤一錢

硃砂一錢 直僵蠍焙一錢

全蠍稍一錢 蘆香一字 每

服一字。取竹瀝調下。

食乳名撮口。殼蠶四個去嘴。

略炒茯苓少許。

右爲末蜜稠調。抹兒口內。又七

日不小便。葱白三寸。人乳共

搗如泥。抹兒口內。名葱號散。

【又方】直殼蠶二枚去嘴略炒。

名提風散。

右爲末。蜜調傅脣口中亦可用。

甘草湯

【臍風】

臍風者。斷臍之後。爲水溼風冷。

所乘。入於心脾。日夜多啼。不能

吮乳。甚則發爲風搐。若臍邊青

黑撮口不開。是爲內搐。不治。爪

甲黑者即死。

【瓜蒂散】小兒心滿堅硬。脚手

心熱。則變爲黃。若不急治。害人

甚速。臍風撮口吹入鼻內。啼則

可醫。(三歲內兒多有之)

瓜蒂七個。赤小豆七粒。棘

米七粒。

右爲末。用一豆許吸兩鼻內。令

黃水汁出。殘藥未盡。水調服之。

得吐黃水即瘥。一方瓜蒂一兩。

赤小豆四兩爲末。每服一錢。溫

水調下。藥下便臥。即當有吐。以

吐爲度。吐出黃水爲妙。

【又方】

前臍傷於外風。致臍瘡不乾。用

白礬龍骨爲末。少許傅之。又用

舊綿少許燒灰。爲末乾摻之效。

【朱銀丸】

治臍風壯熱。痰盛。翻眼口噤。取

下胎中蘊受之毒。亦治驚癇。但

量情用之。一方無積字。

水銀一錢蒸棗肉研如泥。白

附子一錢五分。全蝎一錢。

南星一錢。硃砂一錢。天漿

此證者。百無一生。如坐視其螭者。良可憫焉。此法極驗。世罕有

知者。凡患此證。看兒齒齦上有

小泡子。如粟米狀。以溫水蘸熱

帛裹指擦破。即開口便安。不用

服藥亦良法也。安臍散。治臍中

汁出。或赤腫用白石脂末。日三

度傅。或油髮灰。或當歸末。傅

亦佳。

子夫殼 牛黃 蘆薈各一錢

二分 鉛霜五分和水銀研

片腦一字 磬五分 直僵蠶

炒七個

右爲末粟米糊丸芥子大每服

一丸薄荷湯下如未通利加至

二三丸

【口噤不開】

定命散

治初生兒口噤不開。

蟬蛻十四個去嘴脚 全蝎十

四個去毒

右爲細末入輕粉少許和勻用

乳汁調乳前服少許。

【胎驚】

【千金龍膽湯】

治胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱血脈盛實四肢驚掣發

熱大吐及變蒸不解中客人鬼下皆可服之及有慄氣者加人參當歸如龍膽數一百日童加三銖一歲加五錢

龍膽草 鈎藤 柴胡 黃芩

桔梗 苦藥 茵蒼 升草各

五錢 蟠蛻二枚半翅足炙

大黃煨二錢半

右剉散每服二錢水一盞煎半

盞服之以漸加服得利即止直

指方加防風麥門冬以導心熱

黃芩減半北柴煎服去蟠蛻亦可

【斷臍後臍脹臍腫】

【天麻丸】

治因斷臍後爲水溼風冷所乘入於臍流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮乳此藥利驚化痰凡鈎腸鎖肚撮口竝宜服之。

南星炮二錢 白附子炮 牙硝 天麻 五靈脂 全蝎焰

各一錢 輕粉五分 巴霜一

字

右末糊丸麻子大每服三丸薄

荷生薑煎湯下

【繩蒸】

巢氏云小兒變蒸者以長血氣也變者上氣蒸者體熱。巢氏

云。上多變氣。仲陽云。變者易也。又生變蒸者。自內而長。自下而上。又身熱。故以生之日後至三十二日一變。每變畢。卽覺性情有異於前。使之長生臟腑意智故也。何謂三十二日長骨添精神人有三百六十五骨。以象天數。以應明歲。以分十二經絡。故初生至三十二日一變。生發屬足少陰經。腎臟藏精與志。至六十四日二變。一蒸生壬屬足太陽經。膀胱府。其發耳與魄。令水地六成之。至九十六日三變生丁。屬手少陰經。心臟藏神。其性爲喜。至一百二十八日四變。

二蒸生丙。屬手太陽腑。小腸腑。其發汗出。而微驚心與小腸合。主火。地二生火。天七成之。至一百六十日五變生乙。屬足厥陰經。肝臟藏神。喜哭。至一百九十二日六變三蒸生甲。屬足少陽經。膽腑其發目不閉。(一本作開)而亦肝與膽全主木。天三生木。地八成之。至二百二十四日七變生辛。屬手太陰肺臟藏魄。主聲。至二百五十六日八變生庚。屬手陽明經。大腸腑。其發膚熱而汗。或不汗。肺與大腸合主金。地四生金。天九成之。至二百八十八日九變生己。屬足太陰經。脾臟藏意與智。至三者微止。不可別治。又六十四日。

百二十日十變五蒸生戊。屬足陽明經。胃腑。其發不食。腸痛而吐。乳脾與合主土。天五生土。地十成之。又手厥陰經。心包絡爲臟。手少陽經。三焦爲腑。此一臟一腑俱無形狀。故不變而不蒸也。前十變五蒸。乃天地之數。以生成之。此後始生齒能言。知喜怒。故云始全也。太倉云。氣入四肢。長碎骨于十變後。六十四日爲一大蒸。計三百八十四日。最其經脈手足。手受血。故能持物。足受血。故能行立。經云。變且蒸。其經脈手足。手受血。故能持物。畢蒸。謂而足一歲之日有餘也。師曰。不汗而熱者。發其汗。大吐。

爲二大蒸計四百四十八日。又一百二十八日爲三大蒸共計五百七十六日。變蒸既畢兒乃成人也。變者變生五臟也。蒸者

蒸養六腑也。所以成人變者上氣蒸者體熱。每經一變一蒸。情態卽異。輕則發熱微汗。其狀似驚。重則壯熱脈亂而數。或吐或汗。或煩渴燥渴輕者五六日解。重者七八日解。其候與傷寒相似。亦有變蒸之餘續寒邪者。但變蒸則耳冷。臍冷。上唇發泡狀。

如濁珠苔。寒邪搏之。則寒熱交爭。腹中作痛。而噦叫之聲日夜不絕。變者易生。蒸於肝則目眩。蒸於肺則嘔噦。毛聳凡五微。蒸於肺則嘔噦。毛聳凡五

歲。服五丸。米飲吞下。一二百日。內兒三丸。乳汁下。更宜量其虛實加減。微利爲度。此藥兼治驚痰諸疾。雖下不致虛人。

【紫霜丸】

治變蒸發熱不解。并傷寒溫壯汗後不歇。胸中有痰癖。乳哺不進。乳則吐。隱先寒後熱者。又治

食積。乳哺失節。宿滯不化。或因食而發癆。大便酸臭。茲宜服之。

代赭石。煅醋淬七次。赤石脂各一錢。杏仁五十枚去皮尖

巴豆三十枚去皮膜心出油右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏。却入代赭石脂末研匀。

人參。甘草。微炙。麥門冬去心各二錢。龍膽草。防風各一錢。柴胡三錢。

【紫陽黑散】

治變蒸解利熱氣。麻黃一兩不去節。大黃五錢。杏仁去皮尖二錢半。右三味同一處搗和。略燒存性。再以杏仁少許研膏和之。密器盛貯。每用一豆許。乳汁調下。

【柴胡湯】

治變蒸骨熱心煩。噦叫不已。

人參。甘草。微炙。麥門冬去心各二錢。龍膽草。防風各一錢。柴胡三錢。

研如膏。却入代赭石脂末研匀。

不絕變者易生。蒸於肝則目眩。

變蒸則耳冷。臍冷。上唇發泡狀。

右剉散。每服三錢煎服。

微。蒸於肺則嘔噦。毛聳凡五

【當歸散】

治變蒸有寒無熱。

當歸二錢 木香

官桂 辣者
甘草炙 人參各一錢

右剉散。每服二錢 薑棗煎服

【調氣散】

治變蒸吐瀉不乳。多啼慢驚欲

發。

木香 香附子 人參 橘皮

薑香 甘草炙各一錢

右爲末。每服二錢 薑棗煎服

【小兒五臟主治】

【心臟】心熱視其睡。口中氣溫。

或合面睡及上竄咬牙皆心熱也。

右爲末。每服二錢 薑棗煎服

【導赤散】

治心驚內虛邪熱。

生地黃 生甘草 木通 黃

芩 赤芍藥 羌活各五分

竹葉五片 燈心二分

右剉一劑水 盞煎五分。食前

【瀉心散】

治心中痰氣。實則氣行澀。合臥

則氣不通。故喜仰臥。則上下通也。

黃連一兩去鬚

右爲末。每服半錢。或一錢。臨臥

時溫水下。

【肝臟】肝熱手尋衣領及亂捻

物。有風目連眨不擗。重者唇白而死。

右爲末。每服半錢。或一錢。臨臥

太黃三錢 木香半兩

【大青膏】

治傷風痰熱發搐。百日左右。并

二三歲亦可服。

天麻一錢 香附子一錢 蝎

尾半錢 硫砂一字 青黛一

錢 天竺黃一字 膜香一字

烏蛇酒浸取肉焙乾半錢

右爲末。生蜜爲丸。如芡實。大月
中兒梗米大同牛黃膏薄荷湯
化下。五歲以上同甘露散服之。

【大黃丸】

治小兒無辜疳疾。急疳壯熱疳

勞骨蒸頭髮作穗。身上生瘡瘰
癧核塊。多要噬煎飲食不爲肌

膚腹大頭細

右爲末。米醋一升相和。置銅罐

中下於鑄內。浮水上炭火煮用。

竹簽子擣藥候可丸。卽丸入稠

糊丸如小豆大。二歲二十丸。米

湯下。加減與之。當下青膿爲效。

一方治無辜疳疾。肚大或時瀉

痢。冷熱不調。漏蘆爲末。每服一

錢。豬肝一兩。鹽少許。煮空心服

之。

【瀉青丸】

治小兒赤眼多泪。睛疼心躁。并

消熱翳。急驚發搐。

當歸 川芎 防風 龍膽草

大黃 羌活 山梔仁各等分

一方加甘草赤芍藥。

右爲末。煉蜜丸如芡實大。每服

一丸。沙糖湯下。

【脾臟】脾胃不和。面白無精。

光口舌氣冷。不思食。吐水。

【益黃散】

治小兒吐瀉。脾虛不食。米穀不

化。困倦力少。滑腸夜起。并疳虛

盜汗。并治涎唾不收。領下常溼

名曰滯癩。

陳皮去白一兩 丁香二錢 一

方用木香 虶子炮去核 青

皮去穰 甘草炙各五錢

右爲末。每服二錢。水一盞。煎三

分。食前服。

【理中丸】或作湯同。

治脾胃不和。中寒止衝。胸膈逆

滿。心腹疼痛。痰逆惡心。嘔吐心
氣動也。去白朮加桂四兩。吐多
者去朮加生薑三兩。下多者還
用朮。悸者加茯苓二兩。或四肢

拘急腹滿下利轉筋者去虎加附子一個生用末之蜜丸如鷄

子大黃名理中丸又名調中丸。

治厥陰臟寒上入膈吐長蟲或胃中虛冷因發汗故吐蟲先

服理中丸或加枳實茯苓蜜丸

治傷寒結胸欲絕心鬲高起實

滿作痛手不得近竝用熱湯化下。

【肺臟】胸滿短氣氣急喘嗽上

氣

【瀉白散】

治小兒痰壅咳嗽寬氣進食

地骨皮桑白皮炒各一兩

甘草炙一錢

右剉散入粳米一撮水二小盞

阿膠一兩半蛤粉炒

鼠黏子

【甘桔湯】

煎七分食前服。

二錢半炒香馬兜鈴半兩焙甘草一錢炙杏仁七個去皮

糯米一兩

右爲末每服二錢水一盞煎六

分食後溫服。

【地黃丸】

熟地黃山茱萸乾山藥各四錢澤瀉牡丹皮白朮

右爲粗末每服二錢水一盞煎

芩各三錢

右爲末煉蜜丸如桐子大三歲以下一二丸空心白湯化下行

遲鶴膝加鹿茸牛膝五加皮

【腎臟】腎虛兒本虛怯胎氣不成則神氣不足目中白睛多

其顏即解額開面色缺自此皆難養

【地黃丸】

治腎疳。即急疳。腦熱肌削。手足如冰滑洩。腹痛。

方見上條。

【發搐】

男左視無聲。右視有聲。女則反是。

【涼驚丸】潮熱口內涎。手足動搖。此心旺也。

治驚疳。有熱發搐。心神驚悸。上視赤色。牙關緊。

黃連末五分。龍腦一錢。龍膽三錢。防風三錢。青黛二錢。鈎藤二錢。牛黃一字。麝香一字。

【通關散】

如冰滑洩。腹痛。

方見上條。

治諸風搐搦。關竅不通。皆由痰

塞中。脘留滯。百節所致。痰之所爲。潮塞者。氣僵使之。

南星炮一錢。麝香一字。豬牙皂一錢。略燒存性。赤蜈蚣一條。炙。直僵蠶一錢。

右爲末。以手點薑汁蘸藥少許。擦牙或用物引滴入藥三兩點。涎自出。

【嘵關散】

生半夏一錢。皂角半錢。右爲末。用一豆許。用管子吹入鼻立醒。

【開關如聖散】

全蝎十四個去尾。防風二錢。

白附子一錢。炮南星一錢。有熱用膽星。蟬蛻一錢。僵蠶

赤蜈蚣一條。中分爲兩片各用

葱汁浸一宿焙乾。全蝎一個一錢。麝香二錢。金箔十片。

亦中分爲兩片。各記左右。以二物各記左右。分兩處。右各爲末。左眼翻。左手搐。以左藥末。搦入左鼻孔。右眼翻。右手搐。以右藥末。搦入右鼻孔。雙眼翻。雙手搐。兼用之。

【至聖保命丹】

治小兒胎驚。內釣。腹肚緊硬。睡眠不安。夜多啼哭。及治急慢驚風。目地上視。手足抽掣。不省人事。悉皆主之。冷證用此。

全蝎十四個去尾。防風二錢。白附子一錢。炮南星一錢。有熱用膽星。蟬蛻一錢。僵蠶

赤蜈蚣一條。中分爲兩片各用

葱汁浸一宿焙乾。全蝎一個一錢。麝香二錢。金箔十片。

有熱證加牛黃冰片硼砂各少許

半夏 枳實各二錢半 伏苓 治驚悸煩躁不得眠。

右爲末粳米糊丸每兩作四十

半兩 桔紅 甘草各一錢半 酸棗仁去殼二錢半 腹疼加

驚風諸證湯臨時換一方加入

參白茯苓二錢

【省風湯】

治驚風口噤筋脈掣急抽掣疼

右咬咀每服一錢入竹茹少許 薑棗煎服

【玉餅子】

治小兒夾食傷寒其證發熱嘔

吐亦有肚疼者。噯氣辦得分曉

先用此藥一服推下食積却用

平和藥發散調治如惺惺散加

減參蘇飲皆妙

右咬咀每服二錢生薑一片煎

去滓不拘時服

【溫膽湯】

滑石末一錢 輕粉半錢 半夏末一錢 南星末一錢 巴豆廿四個去皮膜用水一升煮

乾研細。

右三味搗羅爲末入巴豆粉次

入輕粉又研勻却入餘者藥末

如法令勻糯米粉丸如棗大每

量小兒虛實用藥三歲已下豆

服三丸至五丸空心紫蘇湯下

忌熱物若三五歲兒壯實者不

以此拘加至二十丸以利爲度

【安神丸】

人參 伏神 蘆門冬 乾山

藥 龍腦各二錢 龍齒一錢

硃砂 甘草 寒水石末各半

錢 金箔

右爲末蜜丸綠豆大燈心湯調

下。【青州白丸子】一名蘇青丸。

治一切風。小兒驚風。

天南星三兩 白附子二兩

川烏頭去皮臍半兩生用 半

夏浸洗過白好者七兩

右同井花水浸晒過次日早再

換新水春五日夏三日秋七日

冬十日晒乾爲細末以糯米粉

煎粥清爲丸如葵豆大小兒驚

風薄荷湯調下和蘇合香丸服

名蘇青丸

【浴體法】

天麻末二錢 全蝎去毒爲末

硃砂各半錢 烏蛇肉酒浸焙

乾 白礬各半錢 麝香一字

青黛三錢

右同研勻每用三錢水三椀桃

枝一握葉五七枝同煎至十沸
溫熱浴之勿浴背

丸二丸葱湯下
右爲末糊丸如小豆大三歲一

【塗顱法】

麝香一字 蝎尾去毒爲末半

錢一作半字 薄荷葉半字

蜈蚣末 牛黃末 青黛末各

一字

右同研用熟棗肉劑爲膏新綿

上塗勻貼顱上四方可出一指

許火上炙手頻熨百日內外小

兒可用此塗浴法

【珍珠丸】

治小兒急驚風涎潮壯熱痰氣

上壅

白附子 滑石 輕粉各一錢

巴豆十五粒去油 全蝎半錢

右爲末以瓶器收之每服一字
枳殼去白一兩以水潤之以巴
豆四十九粒去皮同研却去巴
豆 大黃一兩 朴硝半兩
甘草半兩

薄荷湯調下。

【惺惺散】

天花粉 人參 細辛 白茯苓 去皮 白朮 甘草炙 桔梗各等分

右剉每服一錢水煎服。

【龍齒散】

龍齒 蟬蛻 鈎藤 羌活 茯苓 人參等分

右爲末。每服半錢。薄荷湯下。

【鈎藤散】

鈎藤勾三錢 蟬蛻 天麻

防風 蝎尾 人參各半兩

麻黃去節 煅蠶炒 甘草炙

川芎各 鈎 麻香一字

右爲末。白水煎。寒多加附子末。

半錢。

【防風通聖散】

防風去蘆半兩 荆芥二錢半 穗 川芎 常歸 薄荷葉

大黃錦紋者佳 菊藥 麻黃

去根節 迹翹去蒂 芒硝各半兩

石膏細紋者佳 黃芩

桔梗各一兩 滑石六兩 甘草二兩

白朮 桔子各二錢

當歸 防風 赤芍藥 柴胡 滑石 蟬蛻 甘草炙各一錢

山梔仁 黃芩

右剉細。每服二錢。加柴草煎溫服。熱甚加大黃。更詳證加減。

餘如大青膏導赤散。益黃散地黃丸等。皆可採用。但詳見上不

贅錄小琴注。

【急驚】

急驚者。因聞大聲及大聲而發。搖發過則如故。此無陰也。小兒急驚者。本因熱生於心身。熱面赤。引飲口中氣熱。大小便黃赤。劇則搖也。蓋熱甚。則風生。風屬癇。丹毒。臍風。肝。此陽盛陰虛也。

【定命丹】

治急驚天釣撮口通利痰熱。

全蝎七個 天麻 南星炮

白附子各二錢半 硫砂

黛各一錢半 輕粉 麝香各

五分 片腦一字

右爲末粟米糊丸或豆大每服

一丸荆芥薄荷湯化下先研半

丸吹入鼻中一方無片腦

【利驚丸】小琴按此急驚主方也。

治小兒急驚風痰盛發熱潮搐。

青黛 輕粉各一錢 牽牛末

半兩 天竺黃二錢

右爲末白麵糊丸如小豆大二

十九薄荷湯下一法煉蜜丸如

芡實大一粒化下

【導赤散】

生地黃 生甘草 木通各等

分 竹葉三片

右咬咀加黃芩赤芍藥羌活燈

心煎服。

【至寶丹】

生犀屑 生玳瑁屑 琥珀研

細水飛 雄黃細研水飛各一

兩 金箔五十片一半爲衣

銀箔五十片 片腦研 麝香

研各一錢 牛黃半兩研 安

息香一兩半爲末以無灰酒滌

去砂石約取一兩慢火熬成膏

右和勻以安息膏丸如梧子大

每歲一丸人參湯化下

【琥珀散】

治小兒急慢驚風涎潮昏冒目瞪搖搦驚吊肚疼及和順痘瘡

稍有驚哭眠臥不安入口立效

驚癇時發常服永除病根

辰砂一錢半 琥珀 牛黃

天麻 媵蠶炒去絲嘴 全蝎

去毒 白附子 乳香 蟬蟇

各一錢 麝香半錢 代赭石

煅醋淬七次一錢 片腦一字

牛膽南星一字

右爲末三歲一錢薄荷湯下慢

其候或吐或瀉痰鳴微喘眼開

神緩睡則露睛驚跳搐搦乍發

乍靜或身熱身冷四肢熱口鼻

冷氣而色淡白淡青。或眉青唇
青其脈沉遲散緩。蓋由急驚過
用寒涼或轉下太驟傳變成之。

又有吐利不止而成者。有氣虛

暴吐瀉而成者。有臟腑虛洞泄。

而成者。有久利氣脫而成者。有

取瀉下積而成者。有吐血下血

而成者。有感風不解傷寒傳變

而成者。有嗽久作癆不已者。有

蟲積衝心者。有疝氣腹痛者。或

日夜汗出脾困多睡煩躁引飲。

四肢浮腫。大小便閉。丹瘤腫毒

龍帶纏腰走馬急症。並傳慢候。

惟吐瀉積利成虛。致之則證變

甚速。

〔括囊湯〕治慢驚。

括囊根二錢 白甘遂一錢 按 本草曰甘遂乃蚤休又名草甘遂不用赤者。

右用慢火炒焦。黃色研勻。每服

一字煎麝香薄荷湯調下。無時

凡藥性雖冷炒焦用之乃溫也。

【理中湯】

人參 白朮 乾薑炮各等分

甘草炙減半

右剉散每服二錢水一盞。薑三

片。聚一枚煎服。

【五苓散】

治霍亂吐瀉燥渴飲水小便不利

澤瀉二兩半 官桂一兩 猪

苓 白茯苓 白朮各一兩半 猪

苓 白朮各一兩半 猪

右爲細末。每服一錢。白湯調下。燥渴新水調服大小以意加減。不拘時候加辰砂一兩治驚熱。

【龙附湯】

治風溼相搏身體煩疼不能轉

側不嘔不渴大便堅硬小便自

利及風虛目眩甚則口不知味。

白朮四兩 附子炮去皮臍一

兩半 甘草炙二兩

右剉每服三錢水蓋半。薑三片。

聚一個同煎服。

【調氣散】

木香 香附子 人參 橘皮

藿香 甘草炙各一錢 薑棗

煎服

【太乙保生丹】治慢驚尚有陽

證。

全蝎十四個 白附子生 疊

右爲末。每服半錢煎服。

蠶 牛膽南星 蟬蛻 琥珀

各一錢 蘇香半錢 防風

硫砂各一錢 金箔二片作衣

右爲末。每服二丸薄荷湯下。

硫砂各一錢 金箔二片作衣

硫黃 磷硝鉛 研

青皮 陳皮去白 半夏曲炒

等分

右爲末。粟米糊丸麻子大。每服三

三丸。米飲送下。

硫砂半錢 蘇香少許

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服一

丸菖蒲湯調下。

人參 侯神 琥珀 天麻

右爲末。粟米糊丸麻子大。每服三

三丸。米飲送下。

全蝎炙

防風

南星 生白

右爲末。粟米糊丸麻子大。每服三

三丸。米飲送下。

硫砂半錢 蘇香少許

右爲末。煉蜜丸桐子大。每服一

丸菖蒲湯調下。

【蟬蝎散】治方傳慢驚。

全蝎七個去尾 蟬退二十一

個 甘草二錢半炙 南星一

個炮。

上透明 太陰玄精石研細水

飛各 兩 陳皮去白 五靈

脂水澄去砂石日乾 青皮去

穰各二兩

硫黃 磷硝鉛 研

五靈脂

右用靈脂二皮爲細末。次入玄

精石末及前二藥末拌勻以好

醋打和爲丸。如豌豆大。每服三

十粒空心粥飲下。甚者五十粒

小兒三粒新產生嬰兒一粒小

兒慢驚風或吐痢不止變成虛

風搐搦者非風也。胃氣微絕故

也用五粒喫下。

【王氏惺惺散】

人參 侯神 木香焙 天麻

硝石同硫黃竝爲細末微火略

炒用柳箆子不住手攬令陰陽

氣相入不可火太過。硫黃舶

右爲末。每服半錢。菖蒲略煎服。

【醒脾散】

全蝎焙半錢 白附子炮 天

天麻 甘草炙 人參 白茯

苓 石菖蒲 木香 石蓮肉

白朮各一錢 有熱者去木香

右剉每服三錢 薑二片棗一個

水二小盞煎服

【大醒脾散】

南星 白茯苓 桔紅各一錢

全蝎焙 甘草炙 白附子炮

石蓮子 人參 木香各半錢

陳倉米三百粒

右剉每服三字 薑棗煎服 驅風

解脾兩方通用

【溫白丸】驅風豁痰定驚

人參 防風 生白附 疊蠶

全蝎焙各一錢 南星湯泡焙
天麻各二錢

右爲末麵糊丸桐子大每服一

丸薑湯調下

【星香散】治慢驚風

南星煨二錢 木香 人參

橘紅各一錢 全蝎炙三個

甘草炙半兩 有熱加防風

右剉每服一錢 入紫蘇薑棗濃

煎旋以時送下

【定命飲】

半夏 茯苓 木香 生薑各

一錢 白朮 甘草炙 天麻

各五分

右爲末每服半錢 薑棗煎湯調

下

【四聖散】治慢驚吹入鼻中

全蝎七個 遷蠶十四個 南

右將南星爲末水調作餅裹蠶

蝎川烏外用溼紙重包慢火中

煨令赤色頓地上一伏時每服

一字煎金銀湯點好茶清少許

再服即去川烏

【烏蝎四君子湯】

人參 白朮 甘草 白茯苓

等分 川烏 全蝎各少許

右爲末每服半錢 薑棗煎服如

上作小坑深八寸許炭火燒通

【天南星散】驅風豁痰

南星一個重九錢以上者就地

紅。以好米醋半盞洒入坑中。卽納星於內。次以火炭密蓋之。又用盆蓋其上。一伏時取出燒淨切焙。

右末每半錢。入琥珀全蝎各一錢。生薑湯調下。

【烏沉湯】治慢驚祛風助胃。天麻二錢。人參。生川烏。全蝎焙。南星炮。木香。沉香各一錢。甘草炒半錢。右剉。每服三字。薑三片煎服。

【沉香散】茯苓二錢。沉香。丁香。木香。藿香。厚朴製。甘草炙。右爲末。每服一字。米飲調下。

【礞石丸】礞石搗碎一兩。焰硝半兩同研。丁香各一兩。龍腦研兩半辰砂另研水飛一兩。右爲末。煉蜜并酒丸。硃砂爲衣。薑湯下一豆許。

合礞石法入窩內用炭火煅令

【天南星丸】

天南星一斤。每一個重一兩。上下者用溫湯浸洗刮去裏外浮皮。酒浸一宿。桑柴蒸不住添湯。令釜滿飰。內氣溢更不住洒酒。常令藥潤七伏時。滿取出用銅刀切開一個大者。嚼少許不麻舌爲熟末。卽再炊以熟爲度。然後用銅刀切細焙乾。麝香研。丁香各一兩。龍腦研兩半辰砂另研水飛一兩。右爲末。煉蜜并酒丸。硃砂爲衣。包火內煨半錢。右末米醋煮生半夏糊丸。麻子大薑湯下三丸。

【靈脂丸】

五靈脂。白附子焙。木香。直殼蠶炒各一分。全蝎焙半錢。硃砂一錢。大南星溼紙包火內煨半錢。右末米醋煮生半夏糊丸。麻子大薑湯下三丸。

【七珍丸】治頑痰壅盛。

細辛。川芎。直殼蠶一錢。

通紅候冷。

右爲末。雪糕薄糊丸。桑豆大每服二丸。急風薄荷荆芥泡湯調下。慢風慢脾風木香煎湯下。礞石焰硝古文錢。雖能利痰。然其性非胃家所好。故以木香佐之。

半白附子一錢 硫砂半錢

【脾風】

川烏生一錢 全蝎 木香各

入蝎四個焙右末大南星煮糊爲丸麻子大。

慢脾風之候而青舌短頭低眼合不開困睡中搖頭吐舌頻嘔

半分 嘴吐加丁香

薑湯下每五丸。性弱。

【四君子湯】 榮衛氣虛臟腑及收或身冷或身溫而四肢冷

右末每三字薑三片煎去其半。眠寢禁口咬牙手足微搐而不旋滴入口中。

人參去蘆 伏苓去皮 甘草白朮各等分

【銀白散】 藜米炒二兩 扁豆蒸二兩 薑香一分 白朮炒一分 丁香二錢 甘草炙三錢

右爲末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓快脾正色直指方

右爲末紫蘇米飲調下加天麻砂仁白茯苓快脾正色直指方

【黑附湯】治慢脾風盛四肢厥冷若手足煖而甦省卽止後劑

附子炮三錢 木香一錢半 白附子一錢 甘草炙五分

右剉散每服三錢薑五片煎取其半以匙送下。加炮白附全蝎木香石蓮肉生薑

【川烏散】祛風回陽。助胃回陽卽前四君子湯加生附子末四分之一厥冷者對加

每服半錢。水煎以匙送下。

【異功散】利氣補氣

人參 茯苓 白朮 甘草

橘紅 木香等分

右爲末。每服三字。薑棗煎服。

【蟬附散】回陽氣豁風痰

全蝎一個 附子炮二錢 南
星炮 白附子炮 木香各一
錢

右爲末。每服半錢。薑三片煎服。

(上門已載者不錄)

【醒脾散】同上兼補元氣

全蝎焙半錢 白附子炮 天

麻焙 甘草炙 人參 白朮

荳 石菖蒲 木香 石蓮肉

白朮各一錢

右爲末。每服三字。薑棗煎服。

【陰癒散】祛風豁痰回陽正胃。

白附子 黑附子 南星 半

夏並生各一分半

右爲末。井水浸七日。逐日換水。

浸乾控乾。次入全蝎末二錢。每
服二字。生薑湯下。

■急慢驚脾風 (備選

(諸方)

足冷而微搐
黑附子一個八錢重者去皮臍
頂上刻一孔入辰砂末一錢。仍
用附子末塞之。以炭火燒存性
爲度。南星炮半兩 白附子

培 五靈脂 蝎梢各一分

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服

一丸。薑汁湯下。

【防風丹】治風熱痰壅大使不通。

羌活 防風 枳實 川芎
甘草炒 大黃溼紙裹煨各一
錢半

右剉每服三字。薑棗煎服。或加
赤芍藥

【宣風散】疏風導熱。

雄樟榔一個 甘草 橘紅膏

兩半。牽牛二兩半生半炒
右爲末。每服半字。蜜湯調下。

【枳殼散】治小兒疳氣腹脹噦

枳殼一兩炒 巴豆廿一粒

湯調下。

同上炒黃去之

右爲末三歲小兒半錢砂糖湯
調下。

【青金丸】治風痰壅盛。

巴霜一字 青黛 南星炮各一錢

滑石二錢 全蝎一錢

培丸薄荷湯送下。

右爲末稀麵糊丸麻子大每一錢

全蝎五個焙巴霜一字 輕粉半錢

砂各一錢 冰片 蘆薈各一錢

粉半錢 蘆薈 南星炮 砂各一錢

字鬱金一分皂角水煮焙乾

右爲末每服一字煎金銀薄荷

砂各一錢 冰片 蘆薈各一錢

【蘆薈散】治驚風痰盛發搐
全蝎五個焙巴霜一字 輕粉半錢

右爲末香墨水丸麻子大每服一丸薄荷湯下。

【王監京墨丸】治痰熱驚積楚
州王監賣此藥著名者

【牛黃涼膈丸】治熱盛涎潮

牙硝 寒 石煅 石膏 甘

各半兩 膽星二錢半 紫草

石英一錢 牛黃 片腦 蘆

香各半分

右末甘草膏丸葵豆大每服一丸橘皮湯調下。

【青金丹】疎風利痰。

蘆薈 牙硝 青黛各一錢

史君子 砂砂 輕粉半錢

項藥煨令赤色 砂砂一錢半

牙硝 輕粉各三字

右爲末每服二字煎金銀薄荷

湯調下。

【硃砂膏】治驚風痰盛。

硃砂一錢 牙硝一錢 川靈

芝一錢 蘆薈一錢 蘆香一

字 冰片一字

青黛 史君子炒熟 蘆薈

膽星各二錢 川靈二錢 脣

粉 蘆香半錢 冰片一字

右末飛麵糊丸桐子大每服一丸薄荷湯調下。

【揭風湯】治利下痰熱。

青黛 蘆薈 全蝎各一分

南星半兩爲末調作餅 裹前

項藥煨令赤色 砂砂一錢半

牙硝 輕粉各三字

右爲末每服二字煎金銀薄荷

湯調下。

【硃砂膏】治驚風痰盛。

硃砂一錢 牙硝一錢 川靈

芝一錢 蘆薈一錢 蘆香一

字 冰片一字

右末。甘草膏丸。桑豆大。金箔衣。

薄荷湯下一丸。

【疎風散】治驚風痰熱俱盛。

檳榔 陳皮各二錢 牽牛

大黃炭各三錢

右爲末。每服半錢。生蜜調下。

【驚癇】

幼小血脈不斂。骨氣不聚。爲風

邪所傷。驚癇所觸。乳哺失節。

滯經絡而得之。其候神氣怫鬱。

瞪眼直視。面目牽引。口噤涎流。

腹肚膨緊。手足搐掣似生似死。

或聲或默。或項背反張。或腰脊

強直。但四肢柔軟。發而時醒者。

爲癇若一身。強硬終日不醒則

爲瘧症。

代赭石煅醋碎七次 赤石脂各六錢 杏仁五十枚去皮尖

【紫霜丸】

巴豆三十枚去皮膜心出油
右先將杏仁巴霜入乳鉢內細研如膏。却入代赭石脂末研勻以湯浸蒸餅爲丸。如粟米大。一歲服五丸。米飲吞下。一二百日

內兒三丸。

乳汁下更宜量其虛

實加減。微利爲度。此藥兼治驚

痰。諸疾雖下。不致虛人。

【星蘇散】與上天南星散通用。

利四肢不收者。曰脾癇。比五

臟之證然也。調理之法。惟以

驚風食三種陰陽二證別而

治之。

【天南星略炮剉散】每服一錢。

右薑四片。紫蘇五葉煎取其半。

入雄豬膽少許溫和服。凡不語

者。大小便須要疎導。治慢風不語。只用南星以人參石菖蒲爲

【五癩丸】

治食癩。

硃砂半兩 水銀二錢半 雄

黃一兩 真珠一兩細研

右爲末。煉蜜爲丸。麻子大。每服

二丸。金銀煎湯送下。

【雌黃丸】

治顫癩。搗掣。惡聲。嚼舌。

雌黃 黃丹微炒各半兩 麻

香半錢

右爲末。拌和用牛乳汁三合。熬

成膏。入藥末杵三百下。丸如麻

子大。每服二丸。溫熱湯下。

【薄荷散】

薄荷葉半兩 茅活 全蝎

甘草 麻黃去節 僧蠶炒去

絲嘴 天竺黃 白附子各一

分半。麝一字另研。

右爲末。粳米飯丸如桐子大。每

錢半。右爲末。薄荷湯下。熱極生風。加

竹瀝少許與服。又一方有柴胡。

川芎 桔梗茯苓無全蝎殼天

竺黃白附子

鈎粉四錢研極細。

右末化蒸餅爲丸。用金銀剪刀

股湯五歲以上吞下。幼小化下。

如麻子大丸。

【斷癩丹】

右爲末。粳米飯丸桐子大。每服

一丸。人參煎湯調下。

【錢氏蛇黃丸】

黃芪蜜水塗炙 滬勾 細辛

去根去葉 甘草炙各半兩

蟬蛻四個洗去土 蛇退皮三

【養生必用蛇黃丸】

蛇黃丸一枚火煅醋淬 青礞

石 辰砂 雄黃各二錢 鐵

鎊粉四錢研極細。

右末化蒸餅爲丸。用金銀剪刀

股湯五歲以上吞下。幼小化下。

如麻子大丸。

【斷癩丹】

右爲末。粳米飯丸桐子大。每服

一丸。人參煎湯調下。

【薄荷散】

薄荷葉半兩 茅活 全蝎

甘草 麻黃去節 僧蠶炒去

寸酒塗灸 牛黃一字另研

右末煮棗肉爲丸如麻子大煎

人參湯下一歲十九大小加減

【散風散】

治癆先用此。

牛膽南星二錢

羌活

獨活

防風 天麻 人參去蘿 荆

芥 川芎 細辛各一錢

右爲末煉蜜爲丸桐子大每服

二丸薄荷紫蘇湯調下。

【保安丸】

治諸風癆久遠亦驗。

川烏生去皮尖二錢半 五靈

脂半兩

右爲末治心血丸如桐子大每

服一錢薑汁泡湯調下。

【獨活湯】

治風癆解表通裏。

獨活 麻黃去節 川芎各一

錢 大黃焰 半草炒各一錢

右剉散每服二錢薑二片煎服

【牛黃丸】

治風癆迷悶搖掣涎潮。

牛膽南星 蘆五分 全蝎

蟬蛻各二錢半 防風 白附

子生 天麻 僵蠶炒各一錢

五分

右爲末以煮棗去皮核取肉和

水銀半錢研極細入藥末丸如

蚕豆大每服二丸荆芥生薑湯

調下。

【比金丸】

治驚癇先用此。

人參 琥珀 白茯苓 硃砂

遠志薑製焙去心 天麻石

菖蒲細節者 撫芎 南星

青黛各一錢 蘆一字

右爲末煉蜜丸桐子大每服一

丸薄荷湯調下。

【虎睛丸】

治驚癇邪氣入心。

虎睛細研 遠志薑製浸 尖

角 石菖蒲 大黃裹煨

門冬各二錢半 蟑螂去足炒

三枚

右爲末粟米糊丸桐子大每服

一丸竹葉煎湯調下或金銀煎

湯下。

【七寶鎮心丸】

治驚癇心熱

遠志肉 薑製焙 雄黃 鐵粉

琥珀 硃砂各一錢 金銀箔

二十片 蘿香少許

右爲末。棗肉丸桐子大。每服一

丸去心麥門冬湯送下

【清神湯】

治驚癇

犀角 遠志薑製去心 白蘚

皮 人參 石菖蒲 甘草炙

各一錢

右爲末。每服一錢。去心麥門冬

煎湯調下。

【蜜陀僧飲】

治驚癇入心不語。神効諸驚失

音大人通用。

右蜜陀僧爲末。每服一字。米醋

湯調下。大人用一錢。熱酒調下。

【妙聖丹】

治食癇通用。

代赭石煅醋淬五分 雄黃

蝎稍 硃砂各一錢 輕粉

麝香各一字 巴豆三箇去心

膜出油 杏仁去皮尖微炒二

錢

右爲末。蒸棗肉丸桐子大。每服

一丸。木通煎湯調下。

【斷癇丸】

治諸癇痰盛。

皂角盈寸者三挺碎用水一升

浸取汁瀝過銀器內熬成膏

白礬煅枯研細一兩半 南星

濕紙炮熟一兩 硃砂 直僵

蠶炒 雄黃另研 白附子各

半兩 烏蛇酒浸取肉焙二錢

半兩 麋一錢 赤蜈蚣一條去

頭足酒浸炙

右爲末同水煮半夏糊和皂角

膏爲丸桐子大。每服一丸。薑湯

調下。

【當歸大黃湯】

治諸癇壯熱利下。心中惡血。

大黃濕紙裹略煨

甘草炙

當歸各三錢

赤芍藥二錢半

分 半夏製 川芎各一錢半

右爲末。每服一錢。薑棗煎服。

【蝎虎散】

治驚癇

雄黃 鐵粉

琥珀 硃砂各一錢

二十片

麝香少許

右爲末。棗肉丸桐子大。每服一

丸去心麥門冬湯送下

【清神湯】

治驚癇

犀角 遠志薑製去心 白蘚

皮 人參 石菖蒲 甘草炙

各一錢

右爲末。每服一錢。去心麥門冬

煎湯調下。

卷十三

驚癇

治驚癆屢効。

褐色生蝎虎一箇連血細研

右八硃砂末并麝少許同研薄

荷湯調下作一服數年頗癆亦

効蓋癆疾皆心血虛滯生蝎可

以管守其血繼是以二陳湯與

之若無生蝎當取帶性雄猪心

血代入代赭石散中亦効

【代赭石散】

治陰陽癆通用。

代赭石煅醋淬研爲末水飛過

日乾。

右爲末每服半錢以金銀煎湯。

和金銀箔調下連進二服良久

小兒脚脛上自有赤斑卽邪氣

發出其病隨瘥若無赤斑卽難

治也。

【日應丹】

治頑癆連年不瘥。

黑錫 硫黃 水銀 鐵粉研

各半兩 金銀箔三十片

右水銀鐵粉金銀箔夾和一處。

先將黑錫於銚內鎔開次入硫

黃不住手就銚內碎攬候硫黃

烟氣欲息次入餘藥就火上同

攬少頃時傾出地土上宿出火

毒再研細粳米飯丸麻子大硃

砂衣每服三丸食後人參湯下。

【地龍散】

治諸癆發熱無時。

乾地龍焙半兩 虎睛 人參

天竺黃 代赭石煅醋淬 砥

定癆利痰。

砂 鐵粉各二錢半 輕粉五

分 雄黃一錢半 金 箔三

右爲末每服五分紫蘇湯調服

【全蝎五癆丸】

治小兒五癆。

赤蜈蚣一條去頭足酒浸炙

南星炮二錢半 麝香一字

全蝎 防風 硫砂細研 遠

志薑製焙去心 白附子生

蘆薈 延胡索各一錢 金銀

箔三十片

右爲末入麝糕糊丸桐子大每

服一丸菖蒲紫蘇湯調下。

【星珠散】

南星濕紙裏炮香熟一兩 砂

砂一錢

右爲末帶性豬心血爲丸桐子大每服一丸防風調下

【化風丹】

涼風化痰退熱定搐。

膽南星 羌活 獨活 防風

天麻 人參去蘆 川芎 荆芥

粉草 全蝎各等分

右爲末煉蜜丸芡實大薄荷湯

下一方加辰砂麝香少許

【鎮驚丸】治一切驚癇

紫石英燒醋淬 鐵粉 遠志

薑製焙去心 輕粉各七分半

茯神 人參 琥珀 滑石

南星炮 龍齒 蛇黃醋淬

熊膽各二錢半

右爲末煉蜜丸如桐子大砂砂

爲衣每一丸金銀湯下或用猪

乳調抹入口中

【開牙散】

細辛 南星 朴硝各一錢

麝香五分 蝎稍七箇

右末以少許用烏梅肉揉和擦

牙兼用細辛皂角荆芥末吹入

鼻中治諸風搐搦驚癇用此開

關竅與前開關散通用

【驚風】

驚者虛惕性忡氣怯神散痰涎

來去其瀉必青漸生風而未至

風也驚邪入心則面紅臉赤惕

惕夜啼驚邪入肝則面日俱青

眼目竄視驚邪入腎則面黑惡

叫囁齶咬牙驚邪入肺則面目

淡白喘息氣乏驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃

【神妙奪命丹】

七月取青蒿節內蟲入砂麝

香爲丸加片腦

【人參羌活湯】

治傷寒驚熱或中風體硬加麻

黃乾葛薏苡仁

川羌活 獨活 前胡 柴胡

白茯苓 川芎 桔梗 枳殼

人參 地骨皮 天麻各等分

甘草減半

右剉散生薑薄荷煎服加蟬蛻

治驚熱

【防風導赤散】

治小兒初驚

生地黃 木通去節 防風

甘草各等分 有熱加黃芩赤芍藥羌活

右剉散每服三錢水一盞竹葉少許同煎

【蟬蛻釣藤飲】

治肚疼驚啼又前有鉤藤散可參對

鉤藤 天麻 茶荳 川芎

白芍藥各二錢 甘草 蟬蛻各一錢

右剉散燈心煎 加木通麥門冬防風羌活

【寬熱散】

石膏 黃芩 甘草 赤芍藥

葛根各二錢半

右剉散三歲兒每服二錢水一

撮 小盞 生薑少許 葱白三寸 豆豉一

【七寶洗心散】

治小兒煩熱生瘡兼治驚風

生地黃 荆芥穗 防風 甘

草 黃芩 羌活 赤芍藥各

等分

右爲末入辰砂減半加當歸尤

妙每服一錢燈心薄荷湯下空

心食前服又前洗心散可參對

【神芎丸】

治風熱壅滯頭目昏眩口舌生

瘡牙齒疳蝕或遍身瘡疥咬牙

驚惕怔忡煩躁多渴或大小便澁滯或積熱腹滿驚風潮搐並皆治之

大黃生 黃芩各二兩 生牽牛末一兩 滑石兩 黃連

薄荷葉 川芎各半兩

右爲細末滴水丸桐子大每服四五十九丸食後溫湯下一方加蒲黃止血證用

【化風丹】去驚風化痰涎

膽南星 羌活 獨活 防風

天麻 人參去蘆 川芎 蒜

芥 粉草 全蝎等分

右爲末煉蜜丸芡實大薄荷湯

下方加麝香辰砂

【安神丸】

人參 伏神 麥門冬 山藥

各二錢 龍腦 龍齒各一錢

寒水石五分 甘草五分 硃

砂五分 金箔二片 錢氏方

有馬牙硝龍腦

右爲末。煉蜜丸如芡實大。每服

一丸燈心湯下。

【清心丸】

人參 伏神 防風 砂砂

柴胡各二錢 金箔二片

右爲未。煉蜜丸桐子大。每服一

丸。竹瀝調下。

【天鈞內釣】

天鈞屬陽內釣屬陰。

天鈞者。壯熱驚悸。眼目翻騰。手

足抽掣。或喘或笑。喜怒不常。甚

者爪甲皆青如祟之狀。蓋由乳

母酒肉過度。熱毒入乳。哺兒遂

使心肺生熱。痰鬱氣滯。加之外

挾風邪致有此耳。治法解利風

熱則愈。又有內釣者。腹痛多噏

唇黑。囊腫。僵僂。反張。眼內有紅

筋斑。血蓋寒氣壅結。兼驚風而

得之。經云內釣胸高時復漸安

眼毛紅脈見是也。此乃胎中有

風有驚故。有此證。先是內臟抽

掣。極痛狂叫。或泄瀉縮脾忍疼

呻吟。內證一過。外證抽掣又來。

內外交攻。極難調理。

【鈎藤膏】

治小兒腹中極痛。乾噏後。脣名。

天麻前有鈎藤散。又蟬蛻鈎藤

盤腸內釣

乳香 沒藥 木香 薰黃芩

一錢 木鼈子去油三個

半丸入蜜服。先用此藥定痛後

服魏香散。

【蓬朮五錢】 阿魏二錢

右先將溫酒化阿魏。浸蓬朮一

晝夜焙乾。爲末。紫蘇米飲調下。

【鈎藤飲】

治小兒夜啼。乃臟冷也。陰盛於

夜則冷動。冷動則爲陰極。發躁

寒盛作疼。所以夜啼不歇也。鈎

藤散主之。治驚啼。加蟬退防風

天麻前有鈎藤散。又蟬蛻鈎藤

飲可參看。

釣藤勾 伏神 伏苓 川芎

當歸 木香 甘草 白芍藥
各一錢

右爲末。每服一錢。薑棗略煎服。

其或心熱而煩渴必有臉紅舌

白小便赤澀之症。釣藤飲去木

香加硃砂末一錢研和。每服一

錢。木通湯調下。或剉散煎服亦

可。

二丸菖蒲釣藤湯下。

【木香丸】

乳香 沒藥 全蝎各半錢
釣藤 舟上茴香 木香各一

錢

右先將乳香沒藥另研。次入諸

藥末和畢。取大蒜少許研細。和

丸桐子大。每服二丸。釣藤湯下。

盤腸氣

【乳香丸】

治驚風內釣。腹痛驚啼。

乳香半錢 沒藥 沉香各一

錢 蝎梢十四個 雞心檳榔

一錢半

右爲末。煉蜜丸如桐子大。每服

沉湯或沉香降氣湯便定。

【釣藤膏】

當歸 木香 甘草 白芍藥
各一錢

右爲末。每服一錢。薑棗略煎服。

其口閉脚冷上唇乾是也。此是

生下洗遲感受風冷。或青糞不

實。却有此症。當服釣藤膏。魏香

蘇合油入安息膏內。熏陸香

右先將溫酒化阿魏浸蓬朮一晝夜。焙乾爲末。紫蘇米飲調下。

【蘇合香丸】

治傳屍骨蒸殭蝶。肺癰疰忤鬼

氣。卒小痛霍亂吐利。時氣瘴癥。

赤白暴利。瘀血月閉。痃癖丁腫。

驚癇鬼忤中人。小兒吐利。

蘇合油入安息膏內。熏陸香

別研 龍腦研各一兩 木香

白朮 白檀香 丁香 砂砂

研水飛 沉香 香附子炒

烏犀屑 菖撥 安息膏別爲

末用無灰酒一升煮膏 乳香

研 詞黎勒煙取皮各二兩

右研細末入研藥勻用安息香膏並煉白蜜和劑每服旋丸如意化服四丸老人小兒服一丸。

梧桐子大早朝井花水溫冷任溫酒化下亦得並空心服用蠟紙裹一丸如彈子大紺綃袋盛

當心帶之一切邪神不敢近去

龍腦名麝香蘇合丸治一切邪神胸膈噎寒腸中虛鳴宿飲不消飲症並同

【當歸散】

治小兒夜啼。臟寒腸痛面青手冷不吮乳。

當歸去蘆 白芍藥 人參各二錢半

甘草炙 桔梗 橘皮去白各一錢

右爲末水煎半盞時時少與服又有熱痛亦啼叫不止夜發面赤唇焦小便黃亦與三黃丸人參湯下

【烏沉湯】治慢驚祛風助胃。

天麻一錢 人參 具川烏生

用 木香 全蝎焙 南星炮

沈香各一錢 甘草半錢

右剉散每服二錢 薑三片慢火煎取其半用之

【沉香降氣湯】

治陰陽壅滯氣不升降。胸膈痞塞心腹脹滿喘促短氣乾噦煩滿咳嗽痰涎口中無味嗜臥不安減食。

香附子二兩半炒去毛 沉香一錢 砂仁三錢 甘草七錢

半

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點之清晨霧露空心服之去邪惡氣使無瘴疫

■ 胎驚風

妊娠調適乖常飲酒嗜欲忿怒驚撲母有所觸胎必感之或挾風邪傷胎其候月內溫壯翻眼

握拳噤口。身腰強直。涎潮嘔吐。

搐掣驚怖。啼哭腮縮。顫開眼合。

莫誤作慢脾。妄用溫藥。視其眉間氣色。紅赤鮮碧者可治。若色

黯青黑者。不治。尻口指紋曲入

裏者可治。反出外者不治。

【朱銀丸】

治癆風壯熱痰盛。翻眼口噤。能

下胎中蘊受之毒。亦治驚積。但

量情用之。一方無積字。

水銀一錢蒸棗子肉研如泥

白附子一錢半全蝎一錢

南星一錢硃砂一錢天漿

蘆薈一錢二分片腦一字

鉛霜半錢和水銀研

麝香半

琥珀人參天竺黃檀香

錢直殼蠶炒七箇

右爲末。粟米糊丸。芥子大。每服

一丸。薄荷湯下。如未通利。加至

二三丸。

【抱龍丸】治小兒諸驚。

我者父母也。肝爲母。心爲子。母

安則子安。况心藏神。肝臟魂神

魂既定。驚從何生。故曰抱龍丸。

理嬰孩諸驚。四時瘟疫邪熱致

煩燥不寧。痰嗽氣急。瘡疹欲出

發搐並宜投服。其藥性溫平。不

僭不燥。常服驅風化痰。鎮心解

熱。和脾胃。益精神。

白茯苓各七錢甘草炙一兩

半枳殼炒五錢辰砂水

飛二兩山藥半斤炒

膽星炒五錢金箔五十片

右爲末。蜜丸。芡實大。每服一丸

薄荷薑湯下。

□胎風遍身軟

此症生下如湯火潑。因胎熱母

肥如腦額生瘡難治。滿五年如

未滿臘前便撮口。兩拳相握。腰

項如隨便知臍脇中生邪毒。此

只三朝定不可療。男指向裏。女

指向外。尚可醫治。逆候則不須

投藥餌矣。更看眉中有青筋碧

色。應須有命。若眉紅斷不可治。

如有可治之症。但用全蝎散釣藤散等劑。

【全蝎散】(釣藤散)均見前。

【醉紅散】治小兒急慢驚風。涎潮搐盛口眼偏斜諸惡症。

天南星大者一個酒浸溼紙裹

煨熟焙乾。蜈蚣一條酒炙白殭蠶七條炒去絲嘴。

全蝎七個去毒。

天仙子一字。硃砂一錢別研。

一錢龍骨一錢煅。防風一錢。

百合一錢。牛黃一錢別研。

白芷一錢。麝香一錢升。

麻三錢。大黃煨四錢。乳酥一兩。

白蜜三兩。

右藥先以牛黃乳香硃砂各研爲末。除酥蜜外十五味搗爲粗

末。用水一升入銀鍋內煎至三

合。以新綿濾去滓。却入鍋內入

牛黃乳香硃砂末及酥蜜等。以

柳籠不住手攬。慢火熬如稠餳。

方止。封固甕瓶內聽用。周歲兒

每服一茶匙。大沸湯化下。日二

三錢量兒大小加減。

五軟

週歲內小兒往往有之。五軟者。

頭軟項軟手軟腳軟肌肉軟是也。無故不舉。頭腎疳之病。項脈軟而難收。治雖暫瘥。他年必再發。手軟則手垂。四肢無力亦懶。

橘連丸

治疳瘦久服消食和氣長肌肉。

陳橘皮一兩。黃連一兩去鬚

米泔浸一日。

右爲細末。別研入麝香五分。用

猪膽七箇。分藥入膽內。漿水煮候臨熟。以針微劄破。以熟爲度。取出以粟米粥和丸如棗豆大。

每服至二三十丸。米飲下。量大小與之無時。

生之理。小續命湯加減治之尤良。羌活散等劑皆可用。

【小續命湯】

治中風不省人事。涎鳴反張。失音厥冷。

麻黃去節 人參 黃芩 川芎 茯苓 茵薑 甘草炙 杏仁去皮尖炒 漢防已 官桂各一兩半 防風七錢半 附子炮去皮膽七錢半

川羌活 川獨活 前胡 柴胡 川芎 白茯苓 桔梗 枳殼 人參 地骨皮 天麻 各等分 甘草減半蜜水煎

【地黃丸】

熟地 莢肉 淮藥 丹皮

茯苓 澤瀉

■五硬

五硬則仰頭取氣。難以動搖氣壅。疼痛連胸膈。腳手如冰冷而硬。此爲風症難治。壯大青筋急而不寬。用去積之劑。積氣消

即安。面青心腹硬者。性命難保。如風症。只依中風治之。必有回

【光活散】

治傷寒驚熱。或中風體硬。可加麻黃乾葛米仁。

