

玉機微義卷之二十九

眼目門

論目為血脉之宗

內經曰諸脉者皆屬於目目得血而能視針經曰五臟六腑精氣皆上注於目而為之精精之窠為眼骨之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精則為約束裹擷筋骨血氣之精而與脉并為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢其身之虛其入深則隨眼系入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目眩以轉矣邪中其精其精所中不相比也則精散精散則視岐故見兩物目者五臟六腑之精榮衛魂魄之所常營也神氣之所主也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼

法於陰白眼赤脉發於陽故陰陽合傳而為精明也目者心之使也心者神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑也東垣曰夫十二經脉三百六十五絡其血氣皆上走於面而走空竅其清陽氣上散於目而為精其氣走於耳而為聽因心煩事冗飲食失節勞役過度致脾胃虛弱心火大盛則百脉沸騰血脉逆行邪害空竅失明則日月不明矣夫五臟六腑之精氣皆禀受於脾上貫於目脾者諸陰之首也目者血脉之宗也故脾虛則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣心者君火也主人之神宜靜而安相火化行其令相火者包絡也主百脉皆榮於目既勞役運動勢乃妄行又因邪氣所并而損血脉故諸病生焉凡醫者不理脾胃及養血安神治標不治本是不明正理也

按此論目為肝臟血脉精氣之宗至為詳悉豈但世俗拘之於五輪八廓而已也

論目昏赤腫翳膜皆屬於熱

原病式曰目昧不明目赤腫痛翳膜皆瘍皆為熱也及目膜俗謂之眼黑亦為熱也或平白目無所見者熱氣鬱之甚也或言目昧為肝腎虛冷者誤也是以妄謂肝生于目腎主瞳子故妄言目昧為虛而冷也然腎水冬陰也虛則當熱肝木春陽也虛則當冷腎陰肝陽豈能同虛而為冷者歟或通言肝腎之中陰實陽虛而無由目昧也俗妄謂肝腎之氣衰少而不能至于目也不知經言熱甚目瞑眼黑也豈由寒爾又而仲景言傷寒病

熱極則不識人乃目盲也正理論曰由熱甚怫鬱於目而致之然也若目無所見耳無所聞悉由熱氣怫鬱玄府閉密而致氣液血脉榮衛精神不能升降出入故也各隨鬱結微甚而有病之輕重也故知熱鬱于目無所見也故目微昏者至近則轉難辨物由目之玄府閉小也隔纗視物之象也或視如蠅翼者玄府有所閉合者也或目昏而見黑花者由熱氣甚而發之於目亢則害承乃制而反出其泣氣液昧之以其至近故雖微而亦見如黑花也又衝風泣而目暗者由熱甚而水化制之也故經言厥則目無所見夫人厥則陽氣并于上陰氣并于下陽并於上則火獨光也陰氣并于下則足之陰陰則脹也夫一水不能勝五火故目皆而盲是以衝風泣下而不止夫風之中於目也陽氣內守於睛是火氣燔目故見風泣下

按此論熱甚怫鬱陰陽并厥玄府閉密致目病之由為詳蓋一主於火熱之化也若由飲食辛熱七情所動六氣淫鬱氣血虛實則東垣子和陳無擇董論亦已詳然亦有痰熱濕熱與夫服食金石燥熱之藥致者或久病後榮衛虛弱肝氣腎陰不足或元氣精氣虛衰交脫營為病皆有虛熱實熱之殊並宜分治

論眼證分表裏治

機要曰在腑則為表當除風散熱在臟則為裏宜養血安神綦發者為表而易治久病者在裏而難愈

論目疾宜出血最急

子和曰聖人雖言目得血而能視然血亦有太過不及也太過則目壅塞而發痛不及則目耗竭而失明故年少之人多太過年老之人多不及但年少之人則無不及年老之人其間猶有太過者不可不察也夫目之內皆太陽經之所起血多氣少目之鋭眥少陽經也血少氣多自之上綱太陽經也亦血多氣少目之下綱陽明經也血氣俱多然陽明經起於目兩旁交頞之中與太陽少陽俱會于目惟足厥陰經連於目系而已故血太過者太陽陽明之實也血不及者厥陰之虛也故出血者宜太陽陽明蓋此二經血多故也少湯一經不宜出血血少故也刺太陽陽明出血則目愈明刺少陽出血則目愈昏要知無使太過不及以養血目而已凡血之為物太多則濫太少則枯人熱則血行疾而多寒則血行遲而少此常理也目者肝之外候也肝主目在五行屬木雖木之為物太茂則蔽密太衰則枯瘁矣夫目之五輪乃五臟六腑之精華宗脉之所聚其白人屬肺金肉輪屬脾土赤脉屬心火黑水神光屬腎水兼屬肝木此世俗皆知之矣及有目疾則不知病之理豈知目不因火則不病何以言之白輪變赤火乘肺也肉輪赤腫火乘脾也黑水神光被翳火乘肝與腎也赤脉貫目火自甚也能治火者一句可了故內經曰熱勝則腫凡目暴赤腫起羞明隱澁淚出不止暴寒目瞤皆太熱之所為也治火之法在藥則鹹寒吐之下之在針則神廷上星顖會前頂百會血之翳者可使立退痛者可使立已昧者可使立明腫者可使立消惟小兒不可刺顖會為肉分淺

薄恐傷其骨然小兒水在上火在下故目明老人火在上水不足故目昏內經曰血實者宜決之又經曰虛者補之實者瀉之如雀目不能夜視及內障暴怒大憂之所致也皆肝主目血光禁出血止宜補肝養腎至於暴赤腫痛皆宜以鍼針刺前五穴出血而已次調鹽油以塗髮根甚者雖至于再至于三可也量其病勢以平為期

按此謂目疾出血最急於初起熱痛暴發或久病欝甚非三稜針宣泄不可然年高之人及久病虛損并氣欝者宜從毫針補瀉之則可故知子和亦大畧言爾於少陽一經不宜出血無使太過不及以血養目而已斯意可見

論內障外障

龍木論曰眼疾有七十二般內障二十三候外障四十九候病狀一一不同據其疾狀認識既不差錯治療少有所憑

謹按諸候詳見本論然內障為黑水神光昏翳外障則有翳膜者是今論中雖且諸候而所用藥多本風熱故並畧云然內障有因於痰熱氣欝血熱陽陷陰虛腠營所致種種病因皆畧之不議況外障之翳有起於內眥外眥睛上睛下睛中當視其翳色從何絡而來如東垣治例魏邦彥夫人目翳從下而上病自陽明來也綠非五色之正殆肺腎合而為病也乃就畫家以墨調臙粉合成色諦視之與翳色同矣肺腎為病者無疑乃瀉肺腎之邪而以入陽明之藥為之使既効而他日復病作者三其所從來之經與翳色各異因詢此必經絡

不調。百病未已。問之果然。如所論治之疾。遂不作。若此憑其色。究其所兼。所本之因處治而不愈者。蓋邪蘊日久。而實元氣陰氣不足所致也。當以王道論治。庶可但世俗不能守此理。遂致失明者多矣。悲夫。

論瞳子散大

東垣曰。瞳子散大者。由食辛熱之物。太甚故也。所謂辛主散。熱則助火上乘於腦中。其精故散。精散則視物亦散大也。夫精明者。所以視萬物者也。今視物不真。則精衰矣。蓋火之與氣勢不兩立。故經曰。壯火食氣。壯火散氣。手少陰之厥陰。所主風熱連目系。邪入中人。各從其類。故循此道而來。攻頭目腫悶。而瞳子散大。皆血虛陰弱故也。當除風熱。凉血益血。以收耗散之氣。則愈矣。

論倒睫赤爛

東垣曰。夫眼生倒睫拳毛者。兩目緊急。皮縮之所致也。蓋內侵熱。致陰氣外行。當去其內熱。并火邪。眼皮緩。則眼毛立出。腎膜亦退。用手法拏出內臉向外。速以三稜針出血。以左手爪甲迎其針鋒。立愈。

目眶歲久赤爛。俗呼為赤瞎是也。當以三稜針刺目眶外。以瀉濕熱而愈。

按已上所論。可謂深達病情。然是證亦多是血熱陰虛火動所致。蓋血所以滋經脉。養毛髮者也。故當外治以瀉其瘀熱。內治以杜絕其源可也。

論目不能遠視為陰氣不足

東垣曰能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛而血盛也血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也此老人桑榆之象也能近視不能遠視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛血虛氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣真氣之賊也元氣來也徐而和細細如縷邪氣來也緊而強如巨川之水不可遏

謹按陽氣者猶日火也陰氣者金水也先儒所謂金水內明而外暗日火內暗而外明者也然人目眼備腑臟五行精華相資而神明故能視即此理之常也雖經曰目得血而能視殊不言氣者蓋以得氣為水火之交而能神明之也否則陰虛不能視遠陽之不能視近是為老人桑榆之漸然學者於目病能求諸此則思過半矣

論目疾分三因

陳無擇云病者喜怒不節憂思無並致臟氣不平鬱而生涎沫逆氣上厥逢腦之虛侵淫眼系陰注於目輕則昏澁重則瞳膠淚努肉白膜瞤睛皆內所因或數月風寒不避暑濕邪中於目無虛循系以入於腦故生外腎醫論中所謂青風綠風紫風黑風赤風白風白翳黃翳等隨八風所中變生諸證皆外所因或嗜慾不節飲食無時生食五辛熱炙炙煿馳騁田獵冒涉烟塵勞動外情喪明之本皆不內外因治之

按論中所言致證之因至為詳悉惜乎其方多本於風熱及水臟陽虛處治而未備學者當自為通變矣

論目不能遠視為陰氣不足之
東垣曰能遠視不能近視者陽氣不足陰氣有餘也乃氣虛而
血盛也血盛者陰火有餘氣虛者氣弱也此老人桑榆之象也
能近視不能遠視者陽氣有餘陰氣不足也乃血虛氣盛血虛
氣盛者皆火有餘元氣不足火者元氣穀氣真氣之賊也元氣
來也徐而和細細如線邪氣來也緊而強如巨川之水不可遏
謹按陽氣者猶日火也陰氣者金水也先儒所謂金水內明
而外暗日火內暗而外明者也然人目眼備腑臟五行精華
相資而神明故能視即此理之常也雖經曰目得血而能視
殊不言氣者蓋以得氣為水火之交而能神明之也否則陰
虛不能視遠陽之不能視近是為老人桑榆之漸然學者於
目病能求諸此則思過半矣

論目疾分三因

陳無擇云病者喜怒不節憂思無並致臟氣不平鬱而生涎
氣上厥逆腦之虛侵淫眼系陰注於目輕則昏澁重則瞳翳眵
淚努肉白膜瞤睛皆內所因或數月風寒不避暑濕邪中於目
乘虛循系以入於腦故生外翳翳論中所謂青風綠風紫風黑
風赤風白風白翳黃翳等隨八風所中變生諸證皆外所因或
嗜欲不節飲食無時生食五辛熟炙煎煿馳騁田獵冒涉烟塵
勞動外情喪明之本皆不內外因治之
按論中所言致證之因至為詳悉惜乎其力多本於風熱及
水臟陽虛處治而未備學者當自為通變矣

論偷針眼

巢氏曰凡眼內眥頭忽結成皰三五日間便生濃汁世呼為偷針此由熱氣客在眥間熱搏於津液所成但其勢輕者小小結聚汁漬熱歇乃瘥

謹按世傳眼眥初生小皰視其背上即有細紅點如瘡以針刺破眼時即瘥故名偷針實解太陽經結熱也人每試之有驗然巢氏但具所因而不更分經絡其諸名實所過者多矣

眼目門

治風之劑

局方蜜蒙花散治風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明并暴赤腫

羌活　白蒺藜炒　木賊　蜜蒙花

石決明各兩　菊花二兩

右為末每服二錢茶清食後調下

三因羌活散治風毒上攻眼目昏澁翳膜生瘡及偏正頭疼目小黑花累累者

羌活　川芎　天麻　旋伏花

青皮　南星炮　藁本各一兩

右為末每服二錢水煎入姜三片薄荷七葉

按已上並足太陽厥陰藥也

東垣明目細辛湯治兩目發赤微痛羞明畏日怯風寒怕火眼睫成紐眵糊多癮澁而難開眉攢腫悶鼻塞涕稠粘大便秘澁

麻黃　羌活各三錢　防風二錢　藁本

白茯苓　當歸尾各錢　川芎　細辛

蔓荊子各半錢　荊芥穗一錢半　生地黃一錢酒製

椒八箇　桃仁二十箇　紅花少許

右㕮咀分作四服每服水煎食後熱服

按此足太陽厥陰手少陰藥也

機要四物龍膽湯治目赤暴發雷霆疼痛不可忍

四物湯各半兩　羌活　防風各三錢

草龍膽　防已各二錢

右㕮咀作數服水煎

按此足厥陰太陰太陽藥也

防風飲子治拳毛倒睫

黃芪　甘草　人參各一錢　葛根半錢

防風　細辛葉　蔓荊子各半錢　當歸十分半

右㕮咀作一服水煎食後服

按此足太陽陽明手足太陰藥也

治熱之劑

局方洗心散

濟生羊肝丸治肝經有熱目赤睛疼視物昏澁

羊肝一具生用局方用白羊肝　黃連去鬚為末

右先將羊肝去筋膜於沙盆內搗爛入連末杵和丸如梧子大每五十丸用熟水送下

按此手少陰之太陰厥陰藥也

東垣瀉熱黃連湯治眼暴發赤腫疼痛

黃芩酒製炒　黃連同製　草龍膽　生地黃各一兩　升麻半兩　柴胡一兩

右㕮咀每四錢水煎去滓於日午前飯後熱服

按此手少陰太陰之陽明少陽少陰藥也

治風熱之劑

局方明目流氣飲治風上攻眼目視物不明常見黑花當風多淚隱澁難開

牛蒡子炒　川芎　菊花　黃芪煨　白蒺藜炒　細辛　防風　玄參　山梔　黃芩　甘草炙　蔓荊子　荊芥　木賊各一兩　草決明一兩半　蒼朮泔浸炒二兩

右為末每二錢臨卧用溫酒調下

按此手之三陰之陽明太陰藥也

洗肝散治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵淚

薄荷葉　當歸　羌活　防風

山梔仁　甘草　大黃　川芎　各二兩

右為末每二錢食後煎水調下

按此是太陽厥陰手足太陰藥也

錢氏瀉青丸治目暴發赤腫疼痛

方見熱門

按此是太陽少陽太陰厥陰藥也

東垣連翹飲子治目中溜火惡日與火應澁小角弩久視昏花

迎風有淚

蔓荊子　生甘草　連翹　各三分　柴胡　二分

黃芩　酒製半錢　生地黃　當歸　紅葵花

人參　各二分　黃芪　防風　羌活　各半錢

升麻　一錢

右㕮咀作一服水煎食後熱服

按此是三陽少陰厥陰藥也

治濕熱之劑

神芎丸治濕熱內甚目赤腫或白睛黃色

方見火門

按此是陽明厥陰藥也

東垣龍膽飲子治肝眼流膿生疳腎濕熱為病

黃芩　炒　青蛤粉　羌活　草龍膽　各三錢

麻黃　一錢半　蛇退皮　穀精草　川芎　各半錢

炙甘草　各半錢　升麻　二錢

右細末每二錢食後茶調服

按此足太陽陽明手足太陰藥也已上六方宜隨表裏而輕重之亦不可例用

理血之劑

局方明目地黃丸治男女肝腎俱虛風邪所乘熱氣上攻目翳遮睛目澁多淚

牛膝酒浸三兩　石斛　枳殼炒　杏仁去皮炒

防風各四兩　生熟地黃各一斤

右為末煉蜜丸如梧子大每三十丸食前鹽湯下

按此出太陽例又氣藥也

簡易加減駐景丸治肝腎氣虛兩目昏暗視物不明

車前子炒三兩　熟地黃　當歸各五兩　楮實子

川椒炒各一兩　五味子　枸杞子各二兩　兎絲子酒製半斤

右為末蜜糊丸如梧子大每三十丸食前溫酒下

謹按肝為相火有瀉無補況陰水虛而陽火實病目者多故此二方蓋補肝之陰虛也頗有理故收入

地芝丸治目不能遠視能近視或亦妨近視

生地黃焙乾　天門冬去心焙各四兩　枳殼二兩炒　甘菊花二兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大茶清送下百丸食後

理氣之劑

局方空志丸治眼不能近視反能遠視者

白茯苓　人參各三兩　遠志去心　菖蒲各二兩

右為細末煉蜜丸如梧子大以朱砂為衣每服七丸至二三十丸溫米飲下食後日三服

按已上二方手太陰少陰藥也

淅米生菜白皮散治肺氣壅塞喜氣上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛

玄參　桑白皮　枳殼炒　升麻

杏仁炒　茯復花　防風　赤芍

黃芩　甘菊花　甘草炙　甜葶藶炒各一兩

右㕮咀每半兩入姜三片煎

按此又治風熱之劑也出太陽例養陽之劑

東垣神效黃芪湯治渾身麻木不仁或頭面或手或腿脚麻木不仁兩目緊急縮小及羞明畏日或視物無力

黃芪一兩　人參八錢　炙甘草一兩　蔓荊子三錢

白芍一兩　陳皮半兩

右㕮咀每五錢水煎臨卧熱服

蓋氣聰明湯治飲食不節勞役形體脾胃不足得內障耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥能令人目廣大久服無內外障耳鳴耳聾之患

黃芪　甘草　人參各半兩　升麻

葛根各三錢　蔓荊子一錢半　芍藥　黃栢酒炒各一錢

右㕮咀每服三錢水煎臨睡熱服近五更再服之得腫更妙

如煩悶或有熱漸加黃柏春夏加之盛暑夏月倍之若此一味多則不效

人參補胃湯治勞役所傷飲食不節內寒昏暗

前黃芪湯減陳皮芪再減半加黃柏一兩酒拌透

右㕮咀每服三四錢水煎食遠稍熱服後兩目廣大視物如童時覺兩脚踏地不知高下蓋冬天多服升陽藥故也病減住服

按已上手足太陰少陰藥也

滋陰之劑

東垣連柏益陰丸

羌活　獨活　甘草　當歸尾製

防風　五味子各半兩石決明燒三錢草決明

細黃芩　黃柏　知母　黃連酒拌炒各一兩

右件為細末煉蜜為丸如菉豆大每服五十丸漸加至百丸食遠茶清送下常多服補陽湯少服此丸

滋陰腎氣丸此壯水之主以鎮陽光

熟地黃三兩　牡丹皮半兩　生地黃四兩　澤瀉

茯苓各二兩　當歸尾　山茱萸　柴胡

五味子　乾山藥各半兩

右件於石臼中杵為細末煉蜜為丸如桐子大每服五七十丸鹽湯空心服

按已上並少陰藥也

養陽滋陰之劑

局方菊睛丸治肝腎不足眼目昏暗常見黑花多淚

枸杞子 三兩　覆盆 酒浸炒　巴戟 去心各一兩　甘菊花 四兩

右為末煉蜜丸如梧子大每五十丸溫酒鹽湯食遠任下

東垣滋陰地黃丸治眼目瞳子散大於黃睛視物無的或卒然見非常之處

熟地黃 一兩　生地黃 一兩半　柴胡 八錢　天門冬

麥門冬　枳殼 各三錢　人參　地骨皮 各二錢

黃連　五味子 各三錢　黃芩 生一兩　當歸身 半兩酒拌焙

右件為細末煉蜜為丸如菉豆大每百丸溫茶清送下日進二次忌辛辣生冷之物

按此二方之少陰之劑也前方主右腎此主左腎之藥故亦異爾

補陽湯治陽不勝其陰乃陰盛陽虛則九竅不通青白翳見於大皆及足太陽少陰經中欬逆足厥陰肝經氣不得上通於目故青白翳內阻也當於太陽少陰經中九原之下以益肝中陽氣衝天上行此乃先補其陽後於足太陽　太陰標中標者頭也瀉足厥陰肝經火下伏於陽中乃次治也內經云陰盛陽虛則當先補其陽後瀉其陰是也每日清晨服補陽湯臨卧服益陰丸若天色變飲食不調俱不得服

羌活　獨活　甘草

熟地黃　黃芪　人參

白术 各一兩　澤瀉

陳皮 各半兩 生地黃 白茯苓 知母 炒各三錢
柴胡 三兩 防風 白芍 各半兩 肉桂 一錢
當歸身 酒製三錢
右同為粗末每服半兩水煎空心服之
沖和養胃湯治內障眼得之脾胃元氣衰弱心火與三焦俱盛
飲食失節形體勞役心不得休息故上為此疾服之神效
柴胡 七錢 防風 半兩 羌活 炙甘草
黃芪 各二兩半 當歸 製 白朮 升麻
人參 葛根 各兩 白芍 六錢 白茯苓 三錢
乾姜 一錢 五味子 一錢 黃芩 黃連 各七錢
右㕮咀每五六錢水煎食遠稍熱服

按已上是三陽手足太陰藥也
治障翳諸方
龍木論還睛丸治眼內赤澁有花或黑或白或紅皆因肝臟積
熱肺受風邪初患之時宜令針治諸穴內服此
人參 桔梗 黃芩 熟地黃
防風 羌蔚子 車前子 知母 各二兩
細辛 五味子 各二兩半 玄參 半兩
右為末煉蜜丸如梧子大空心茶下十丸
按本論治內障諸方與此相類者甚多姑存此法
局方蟬花無比散治大人小兒風毒傷肝或為氣攻一切眼目
昏暗漸生翳膜及久患頭風牽搐兩眼漸漸細小連眶赤爛

茯苓　甘草炙　防風各四兩　石決明鹽水煮研如粉
川芎　羌活　當歸各二兩　赤芍十兩炒
蒺藜炒半斤　蟬退二兩　蒼朮十二兩　蛇蛻一兩

右為末每三錢食後米泔調服茶清亦得

按此是三陽太陰厥陰藥也

蟬花散治肝經蘊熱毒氣上攻眼目赤腫多淚羞明一切風熱昏翳

穀精草　菊花　蟬脫　羌活
甘草炙　白蒺藜炒　草決明　防風
山梔　川芎　密蒙花　木賊
荊芥穗　黃芩　蔓荊子

右為末每二錢食後茶清調下

按此是太陽少陽厥陰手太陰藥也

本事方羊肝丸

兎絲子　車前子　麥門冬　決明子
茯苓　五味子　枸杞子　羌蔚子
苦葶藶　雞仁　地膚子　澤瀉
防風　黃芩　杏仁炒　細辛
桂心　青箱子各兩　熟地黃二兩半
白羯羊肝只用子肝一片薄切新瓦上炒乾

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三四十丸溫水下日三次

按此足太陽少陰手太陰少陰藥也

秘方撥雲退翳丸　皇統年間醫官劉昌祖傳于世

瓜蔞根　枳實　甘草炙　蔓荊子炒

薄荷各五錢　川芎　木賊浸一宿焙　蜜蒙花

荊芥穗　地骨皮　羌活　白蒺藜

甘菊花各兩　蛇退　黃連各三錢　川椒七錢半炒去目

當歸一兩半酒浸焙乾　蟬退三錢

右為細末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸食後臨卧日進三服翳者米泔水下睛暗當歸湯下內障木香湯下

按此足太陽厥陰手少陰藥也然翳膜之疾有氣血虛實或夾痰熱七情六淫或陰火動濕熱致者種種不同皆宜求責但已上法不能以盡病情之變學者宜擴充焉

點洗諸方

局方湯泡散治肝經風熱上壅眼目赤澁睛疼多淚

赤芍　當歸　黃連等分

右為末每二錢湯頓調熱洗日三五次御藥院方加荊芥

三因立勝散治風熱攻眼隱澁羞明腫痛

黃連　秦皮　防風　黃芩等分

右㕮咀水煎熱用新羊毫筆蘸刷洗眼

金露膏除昏退翳截赤之疼

蒺藜仁搗碎　黃丹各兩　黃連半兩　蜜六兩

右先將黃丹炒令紫色入蜜攪勻下長流水四升以嫩柳枝

五七盞上一把之攪之次下雞仁候滚十數沸又下黄連用柳
枝不住手攪熬至升七八合罩籬内傾藥在紙上慢慢滴之
勿令塵污如有瘀肉加硇砂末一錢上火上慢開入前膏子
内用
龍木論云惡傷寒熱病後切不可點恐損眼也斯言可以為
藥禁云
寶鑑春雪膏治風熱上攻眼目昏暗痒痛癮澁難開多眵淚羞
明疼痛或生翳膜
黄連 四兩剉用童便并浸一宿去連用淬甘石
南薑甘石 十二兩淬便汁浸 好黄丹 六兩水飛
硇砂 一錢細研水調在蚌内頻乾為度
乳香 烏魚骨 燒存性 當歸 各三錢
麝香 輕粉 各少許 白丁香 半錢
右各研另貯先用好蜜一斤四兩煉去蠟却下甘石末不住
手攪次下丹次下諸藥末不住手攪至紫金色不粘手為度
搓作挺子每用一粒新水磨化時時點之忌酒濕麪蕎麥
拔萃方嚙藥治偏頭疼眼疾
蒼耳頭 薄荷葉 盆硇 石膏 各一錢亂之者
乳香 華細辛 貫弓 各半錢
右為極細末早午夕三時嚙鼻
寶鑑方無蒼耳乳香細辛有荆芥桔梗
蟾光膏治遠年病目不通道路退去雲膜須用十二月開成日

合

白砂蜜 四兩用隔年葱一根去須皮切短段入一同熬去白膜候蜜熟為度以綿濾淨紙取蠟面

黃丹　蜜陀僧 各水飛三錢半用　蘆甘石 火煅五錢水飛

已上三味研極細傾入前蜜中桃柳無節者各一枝攪勻

當歸　赤芍　杏仁 湯泡去皮尖各五錢

黃連 去苦淨一兩　川芎 半兩　秦皮　呵子皮

防風　石膏　玄精石　并泉石

無名異　玄參　代赭石　石決明

已上十味各三錢㕮咀用雪水或長流水五升於銀器內熬至二升濾去滓淨再熬至一升傾入前藥蜜內銀器內慢火熬紫金色時再下後藥勿令過火

乳香　琥珀　沒藥　朱砂

蕤仁 各三錢

已上五味先乾研極細入蕤仁研細水飛澄清極細才傾入前藥一同復熬以筯點藥於水中不散為度勿令過與不及取下於土中埋七日取出置於銀器或磁器中如法收貯便再添入後細藥以桃柳枝攪勻

南鵬砂　珎珠　龍腦　珊瑚枝 各一錢

麝香 半錢

右五味研極細入藥中封定如有取不盡藥用淨水斟酌洗渲熬過另放洗眼或膏子稠了傾此小調解

炙雀目瘡眼法

寶鑑云小兒雀目夜不見物灸手大指甲後一寸內臙橫文頭白肉際灸一炷如小麥大

小兒疳眼灸合谷二穴各一壯炷如小麥大在手大指次指兩骨間陷者中

按灸法詳見資生等經茲不備錄

卷之二十九

玉機微義卷之三十

牙齒門

論牙齒諸痛所因

東垣曰夫齒者腎之標也者脾之竅諸經多有會於口者其牙齒是也手足陽明之所過上齒隸於坤土乃足陽明胃之脉貫絡也止而不動下齒嚼物動而不休手陽明大腸之脉所貫絡也手陽明惡寒飲而喜熱足陽明喜寒飲而惡熱其病不一牙者腎之標亦惡寒寒者堅牢為病不同熱甚則齒動齒斷袒脫脩痛不已故所治療不同也有惡寒作痛者有惡熱而作痛者有惡寒又惡熱而作痛者有惡寒飲少熱飲多而作痛者有惡熱飲少寒飲多而作痛者有牙齒動搖而作痛者有齒袒而為

痛者有齒斷為府所蝕缺少血出為痛者有齒斷腫起為痛者有脾胃中有風邪但覺風而作痛者又有牙上多為虫所蝕其齒缺少而色變為虫牙痛者有胃中氣少不能於寒袒露其齒作痛者有牙齒浪痛而穢臭之氣不可近者痛既不豈可一藥而盡之哉

按此論齒惡寒熱等作痛本手足陽明動搖斷脫本足少陰故此三經所主為多然齒袒虫府濕熱斷腫血出作痛痛而穢臭者皆胃熱火盛所致亦有諸經錯雜之邪與夫外因者故已上病機現證其詳學者宜究其機而處治焉

論牙痛分三因

陳無擇云齒為關門腎之餘也腎衰則齒豁精固則齒堅又大腸支脉在牙斷主灌注於牙大腸壅則齒為之浮大腸虛則齒露挾風則攻目頭面府匱則齒脫為痛皆氣鬱而生諸證不同治之

謹按頭面外冒風寒或口吸寒冷致牙痛者皆外因也實熱或陰虛火動骨蒸所致氣鬱血熱虫蝕皆內因也硬物所支打擊等致皆不內外所因也故諸證不同治之陳止言經病而不具三因者恐傳梓時脫簡爾

論齒痛為風熱濕熱所致

東垣曰劉經歷之內年三十餘病齒痛不可忍須騎馬外行口吸涼風則痛止至家則其痛復作家人以為祟神禱於巫師而不能愈病乃濕熱為邪也足陽明多血多氣加以膏粱之味助其

濕熱故為此病因立一方不須騎馬常令風寒之氣生於齒間以黄連胡桐淚之苦寒新薄荷葉荆芥穗之辛凉四味相合而作風寒之氣治其濕熱為主以新升麻之苦平行陽明經為使牙齒骨之餘以羊髓骨灰補之為佐麝香少許入肉為引用為細末擦之痛乃減半又以調胃承氣湯去硝加黄連以治其本服之下三兩行其痛良愈遂不復作

按此論實熱例而合辛凉風劑蓋風能勝濕苦以泄熱也今世俗有以大戟芫花小麥椒細辛蒼耳熬湯熱嗽而牙痛立止者正同此例大抵人之牙齒致病實多內則氣鬱血熱骨髓等因外則咀炙熱受寒冰酸酸辛辣之味適口豈不漬搏耶且如以醋沃石則石為蘇況人之骨餘者乎然雖經絡之喜寒熱氣不同所受病異者則豈全在標爾

治風之劑

局方細辛散治風蛀牙疼腮頷浮腫

荊芥穗　細辛各二兩　砂仁半兩　白芷

紅椒　草烏各二兩　鶴虱　牙皂角

畢撥各半兩

右為末每少許頻擦患處有涎吐之仍用水漱嗽

按此手陽明足少陰藥也

三因玉池散治風蛀牙疼齒牙齦潰爛宣露出血口氣

地骨皮　白芷　升麻　防風

細辛　川芎　槐花　當歸

藁本　甘草等分

右為末每用一字揩之痛甚取二錢水盞半黑豆半合姜三

片煎嗽

按此手足陽明厥陰藥也

百一選方治風牙疼

白芷一兩　朱砂一分

右為末煙熏之櫻桃大每一丸擦牙上

按此手陽明之的藥也

御藥院方獨活散治風毒牙疼牙根浮腫

川芎　獨活　羌活　防風各半兩

細辛　荊芥　薄荷　生地黃各二錢

石吹咀每三錢水煎漱嚥

按此之太陽厥陰少陰藥也

元戎立效散治牙疼

小椒　露蜂房　青鹽　等分

右為細末煎數沸熱漱即止

按此足少陰藥也

東垣羌活散治風寒濕犯腦項筋急牙齒動搖肉齒褪脫疼痛苦楚

麻黃去節三兩　羌活一錢半　柴胡半兩　升麻

蒼朮各半錢　草豆蔻一錢　防風三分半　藁本三分

細辛少許　當歸身六分　白芷　桂各三分

羊脛骨灰二錢半

右為末先以溫水漱過擦之

按此足三陽太陰藥也

治寒之劑

御藥院方丁香散治牙齒

丁香　畢撥　蝎梢　大椒　等分

右為末每少許擦於患處

按此足陽明太陰藥也

草蘚散搐藥

草蘚　良姜　胡椒　細辛　等分

右為末每少許溫水隨痛處鼻內搐

按此足少陰太陰藥也

乘垣白芷散治大寒犯腦牙齒疼痛

麻黃　草豆蔻各錢半　黃芪　升麻各二錢

吳茱萸　白芷各四分　當歸　熟地黃各半錢

藁本三分　桂枝二分半　羌活八分

右為末先用溫水漱淨以藥擦之

按此手足陽明太陽厥陰藥也

治風熱之劑

元戎胡桐淚散治足陽明經虛風熱所龍流傳牙齒攻注牙斷則致腫結妨悶甚者與齒間津液相搏化為濃汁宜用此藥

胡桐淚　石膽礬　黃礬　蘆會

升麻各半兩　麝香　亂髮灰各錢　朱砂

細辛　當歸頭　川芎　牛膝各二錢半

右為末先以甘草湯漱口後用藥少許傅之以嘗用少許擦牙去風熱消腫化毒牢固永無牙宣痛血之病

按此足陽明厥陰藥也

犀角升麻湯治陽明經受風熱口唇頰車連牙腫痛

犀角七錢半　升麻五錢　防風　羌活各三錢半

川芎　白芷　黃芩　白附子各二錢半

甘草一錢半

右㕮咀水煎

按此手足陽明太陽藥也

治寒熱之劑

東垣當歸龍膽散治寒熱停牙痛

麻黃　升麻　黃連　草龍膽

草豆蔻各錢　白芷　骨灰　當歸尾各半錢

生地黃五分

右件為末擦之

按此太陽陽明少陰厥陰藥也

益智木律散治寒熱牙疼

草豆蔻錢二分　木律二分　熟地黃　益智仁

骨灰各半錢　升麻半錢　黃連　當歸各四分

右為末乾擦之如寒多不用木律

按此足陽明厥陰藥也

麝香散治熱多寒少牙露根肉斷脫血出齒動欲落大作疼痛

妨食涼少忤熱多

麻黃根一分　草豆蔻　黃連各一錢半　益智仁二分半

升麻錢　當歸　生地黃　人參

漢防已酒製各三分　熟地黃二分　骨灰二錢

麝少許

右為末擦之

按此足陽明太陰藥也

攻下之劑

元戎調胃丸治齒痛血出不止

右以謂胃承氣湯為末蜜丸服

升麻丸治陽有熱攻注牙齒腫痛脉洪大而實

細辛　升麻　防己　羌活

牽牛　大黃

右等分煉蜜丸桐子大每二十丸溫水臨臥服

按此二方陽明例藥也論云病源有手陽明之支脉入於齒齒是骨之所終髓之所養若風冷客於經絡傷於骨髓冷氣入齒根則齒痛或胃與大腸俱熱大便秘結經絡壅滯而齒斷痛者治法不同也

清胃凉血之劑

東垣清胃散治因服熱藥使上下牙疼不可忍引頭腦滿面發熱大痛喜寒惡熱

生地黃 二分酒製　升麻 一錢　牡丹皮 半錢

當歸 三分　黃連 三分

右作末為一服水煎冷服

神功丸治多食肉口臭不可近牙齒腐蝕牙斷肉將脫齒落血不止

黃連 酒製　砂仁 各半兩　生地黃　甘草 各三錢

藿香葉　木香　當歸身

蘭香葉 如無藿香葉代之各一錢　升麻 二錢

右為末湯浸蒸餅丸如菉豆大每服百丸至二百丸白湯食遠下

按此二方並陽明例藥也

治虫之劑

秘方馬夜眼燒存性研末敷上立愈

瑞竹堂方治虫牙疼

天仙子不以多少燒烟用竹筒抵牙引烟熏之其虫即死

謹按牙齦生虫乃陽胃土濕熱甚而生也學者宜治其本

補劑

金匱八味丸治腎虛牙痛

方見補虛門

三因安腎丸治虛羸牙齒疼痛浮腫

方見腰痛門

按此二方並少陰例藥也

取牙藥

本事方取牙落不犯手

草烏　畢撥各兩半　川椒　細辛各三兩

右為末每少許指在患處其牙自落

謹按牙齒動搖多因陽明風熱或濕熱蝕牙齦坦露故久則動搖脫之漸也然亦宜求其本而治其內堅藥擦其外庶或有可安之意否則一以動搖取之非也況此藥太躁恐非所宜姑米之以備其例爾

堅牙藥

聖濟總錄方治牙齒動搖

黑錫半斤大鍋內化成汁入乘條灰柳木槌研合成砂以
熟絹羅為末每日早辰揩牙溫水漱在盂內以水洗眼能
明目黑鬚鬢

食療云治牙動及血蟲並差其齒堅牢

皂角 二錢　鹽 半兩

右燒令赤細研夜用擦牙齒一月

西嶽華峯方

猪牙皂角及生姜　西國升麻熟地黃
木律旱蓮槐角子　細辛荷葉要相當 荷葉取心
青鹽等分同燒煆　研細將來用最良
揩牙牢牙齒髮黑　誰知世上有仙方

元戎麝香閻王散

醋石榴皮　訶子 各二兩　升麻　綠礬 枯
何首烏　青鹽　百藥煎　五倍子
沒石子 各兩半　白茯苓 一兩　細辛　石膽礬 各半兩
荷葉灰　白檀　川芎　白芷
甘松　苓苓香　茴香　藿香葉
猪牙皂角 灰木鱉子 各二錢半搗　青黛 各一錢半
麝香 一錢　腦子 半錢
右為末用藥後茶清漱又方無腦子加沉香二錢

瑞竹堂方蒺藜散治打動牙齒

蒺藜根一味燒灰貼動處

東垣白牙散

升麻一錢　骨灰一錢　白芷七分　石膏一錢半

麝香少許

右為末先以溫水漱擦之

按齒者骨之餘精氣所養然無病不可常擦蓋精氣腎氣反有所惡耳昔人有以苦參揩牙久病腰者腎受傷也此其鑑焉已上方宜隨證選用

嚴氏香鹽散常用牢牙去風冷蛀齒宣露一切齒疾

大香附子炒令極黑三兩　青鹽半兩另研

右為細末如常法擦用

卷之三十