

人民日報
1957年10月

他們的特權，而對於群眾的欺騙。

馬克思早已駁斥過許多資產階級和小資產階級的“社會主義者”企圖利用“階級不平等化”口號來減弱和掩飾階級的對立。當他同巴枯寧鬥爭的時候，曾指出：照字義了解起來，階級不平等化就是資產階級社會主義者這樣固執地宣傳的“資本與勞動的調和”。^①十月革命後，列寧不斷地拆穿了那些資產階級代表人和叛徒們用自由平等的口號欺騙人民的伎倆。他說：“工人和農民作為勞動者是平等的，但飽腹的糧食投機者和挨餓的勞動者是不平等的。在駁斥叛徒考茨基那一套“平等”胡說的時候，列寧這樣指出：“剝削者不能同被剝削者平等。這個真理考茨基很不喜歡，但它是社會主義的最重要的內容。另一個真理是：在一個階級剝削另一個階級的可能性沒有完全消滅以前，決不能有真正的事實上的平等。”^②

在地主資產階級統治的社會里，統治階級絕不會給被壓迫的人民以平等；被壓迫的任務是要推翻剝削階級的統治，而不是要求什麼“階級的平等”。在以無產階級為首的大眾經過革命取得政權而反動階級成為專政的對象以後，在已經成為國家主人的人民大已經被打倒的反動階級之間，當然也不會有什麼平等。社會主義革命的任務是要在無產專政下建設社會主義，徹底消滅階級，也不是要求什麼“階級的平等”。在這時候，要求“平等”不過是那種不甘心於滅亡的剝削階級的一種叫囂。資產階級右派發出了這種叫囂來向社會主義進攻，而右傾機會主義者則在黨內響應這種叫囂。

即使在階級消滅以後，在社會主義完全實現以後，要完全消除任何不平等，也是不可能的，這種提法也是反馬克思主義的。恩格斯說得好：“消除一切社會的和政治的不平等”用以代替“消除一切階級差別”的話，也是很問題的。在各個國家、省份乃至各個地方，在生活條件方面總是存在某種不平等，這種不平等將來可以減少到最低限度，但永遠不能完全消除。……把社會主義社會當作平等樂園的觀點是個與“自由、平等、博愛”這一號有聯繫的片面的法國觀點，——這個觀點作為一定的發展階段在當時是正確的，是現在這個觀念則像以前社會主義學派的一切片面性一樣應當克服去，因為它只能引亂，並且因為現在已經有了闡述這個問題的更精確的方法。”^③

右傾機會主義者滿腦子堆了那些資產階級的觀念，他們在我們的隊伍里面，實際上資產階級革命家的身份進行活動，而不是以無產階級革命家的身份進行活動，不是以馬

① 見馬克思：“國際工人協會總委員會致國際社會主義民主同盟中央常務局信”（1869年3月9日）。

② 列寧：“在全俄社會教育第一次代表大會上的演說”，《列寧全集》第29卷，人民出版社1956年版。

③ 列寧：“無產階級革命和叛徒考茨基”，《列寧全集》第28卷，人民出版社1956年版，第234頁。

④ 恩格斯：“致倍倍爾的信”，1875年，《馬克思恩格斯文選》兩卷集第2卷，莫斯科外交出版社，40—41頁。

說：“天鵝肉也是人吃的”，“路是人走出來的”，“只要有毛主席領導我們，就是地塌了，我們也有本事修補起來。”文武高級社黨支部書記楊富業（白族）帶頭把“老太神”砍倒，接着二、三百人沖上去，一下子就將老太廟全部掀掉，放出一股活龍潭水來。各村群眾聽見這個消息，紛紛自帶工具、行李趕來參加，幾天之內，水利工地的人馬就上齊了。

不久，那個隱藏在黨內的資產階級右派分子范錫功被揭發了。他不僅反對聯合修水庫，還惡毒地攻擊黨的領導和社會主義制度。斗倒這個右派分子以後，全县幹部和群眾的眼睛更亮了，要求辦大社、走社會主義大道的決心更加堅定了。縣委又向群眾提出“搞好生產，迎接辦大社”的號召。于是在省委、地委的同意下，經過大理市委（下關市和鳳儀縣在一九五八年四月合併為大理市）的積極籌備，鳳儀縣和下關市郊區於一九五八年六月正式合併為一個大聯社。不久，毛澤東同志關於“人民公社好”的指示和“中共中央關於在農村建立人民公社問題的決議”也傳達下來，各族人民更加干劲冲天，決心以新的生產高潮迎接人民公社的成立。各族群眾齊聲擁護辦公社。江西管理區白族農民說：“小社小增產，大社大增產，人民公社全面發展。這回毛主席領導我們又高升了一步。”山區吊草村的彝族農民聽說要成立人民公社，怕壩區嫌他們產量低，全村立即晝夜趕種晚秋作物，並且催支部書記瞿鈞趕快下山，向壩區農民提出保證：“山上的彝族決不落後，我們的單產雖然達不到千斤，可以多開些荒，每人平均糧食要趕上你們。”住在高山上的傣族農民，也派代表趕下山來，要求全部加入公社。兩三天內，各

族農民就寫了成千上萬張大字報、申請書、保證書、決心書，要求參加人民公社。於是大聯社就正式改組為鳳鳴人民公社。這是白族地區第一個人民公社；它對於自治州迅速實現公社化，起了有力的推動作用。

“穿心江”變成了“幸福江”

鳳鳴公社三面環山，北臨洱海，波羅江從南往北，兩岸是個狹長的小壩子。解放前，由於水利失修，水土流失嚴重，波羅江越來越小，壩區五萬多亩土地就有四萬多亩因缺水而不能按時栽種。處於波羅江下游的鳳鳴鎮、石龍、瀘江等地區，幾乎每年都有二萬多亩稻田要改種旱谷，而雨季一到，山洪暴發，沿江兩岸的幾萬亩稻田又要遭洪水淹沒。嚴重的自然災害，使得上下游各民族之間常為爭水鬧糾紛，以至發生流血慘劇。云禾村的“閩王壩”就是個打死人不償命的地方。各族農民一提起這條江，就如尖刀穿心，多年來都把它叫做“穿心江”。

解放後，年年治理，波羅江兩岸的情況已經逐步好轉。到一九五七年，灌溉面積就增加到四萬二千多亩，比解放前增加了一倍多。但是沿岸仍有一萬多亩稻田因缺水灌溉，不得不種旱谷。遇到特大的洪水，還不能控制。大躍進和公社化以後，公社統一配勞動力，用了三十八萬多个工日，修建中型水庫四個、小型水利工程一百四十多处，增加灌溉面積達二萬七千四百六十一亩，等於解放七年來所修水利總和的一點八倍。目前，全部灌溉面積達六萬九千多亩，基本改變了“十年干旱九年涝”的面貌。能蓄水一千二百萬立方米的三哨水庫，已完工程量的

化核膏 較正醫林狀元壽世保元辛集卷之八

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才著

男 龔定國校

茶油四斤

壁虎十四

條蜘蛛二

十八箇蠟

牛三十六

枚入鍋熬

至枯浮油

面取出再

入各新鮮

首烏藤葉

甘菊根薄

街牛蒡蒼

小兒科

小兒形色論

論歌脈症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為齠齖九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食指為上中指為中名指為下若三指俱熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若三指俱令主外感內傷發熱吐瀉若食中指熱主上熱下冷名中指熱主夾驚食指熱主胸膈氣滿乳食不消又要觀形察色假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

耳等草各

半斤武火

熬至草枯

出渣俟油

冷再入連

翹元葶苦

獲白蘇白

芥子煙蘇

水紅子仁

各搗碎大

黃荆芥防

風各四兩

浸一宿熬

至黑枯以

入門審候歌

觀形察色辯因由

要知有熱肚皮求

渾身皆熱是傷寒

陰弱陽強髮硬柔

鼻冷便知是瘡疹

上熱下冷傷食定

若是傷寒雙足冷

耳冷應知風熱症

觀形察色面目圖

眼胞絡屬脾 痒爛主風熱

眼烏珠屬肝 青主肝有驚

眼瞳人屬腎 不轉睛腎虧

眼尾角屬心 紅主心有熱

眼白睛屬肺 白主肺受冷

觀面部

左腮屬肝其色青者為順白者為逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚

風腹痛淡赤主潮熱痰嗽

右腮屬肺其色白者為順黑者為逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬脾

頰屬腎

酒澆清見

通斤兩加

製木蠶油

半斤配煉

黃丹慢入

慢攪攪勻

又火再熬

熬至滴水

成珠膏不

黏指為度

再加入丁

香油麝香

各二錢蘇

合油一兩

腎則小便赤澁或淋閉不通

額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛癡啼哭微黃主盜

汗頭髮乾燥驚疳骨熱

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便

閉面鼻燥衄血

頰屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

又

面赤心家熱

面黃脾有積

面白肺家寒

面青肝有風

唇赤心家熱

唇黃脾有積

唇白肺虛寒

唇燥脾有熱

眼赤心經熱

眼青肝有驚

眼黃脾有積

眼白肺有驚

鼻青主吐瀉

人中青感風

人中赤肺家痰

人中黑腹虫痛

風池紅多啼

風池黃吐逆

山根紫傷食驚

承漿黃主吐青主驚

唇紅面赤傷寒

臉青唇黑驚風

唇青面白瘡疾

面黃如土食癥

痢下眉頭皺

驚風面頰紅

渴來唇帶赤

熱甚眼朦朧

櫻勻退火
攤貼凡瘰

應結核惡

核此膏貼

即暗消但

毒根不除

必以子龍

九日服三

次外用膏

貼方可除

根以杜後

發

○白花膏

面黃多食積

青色是驚風

面白多成瀉

傷寒色紫紅

手指脉紋式

夫小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關紋理兩手食指本節為風關中節為氣關第三節為命關其紋曲直不同如紋只在本節病易治透過中節則病重過第三節則難治驚則紋青淡紅則寒熱在表深紅必主傷寒痘疹紋亂則病久紋細則腹痛多啼乳食不消紋麓直射指甲必主驚風惡候紋黑如墨必困重難醫此乃神聖工巧之一端也

虎口三關脉紋圖

虎口又手處是也三關在第二指

仄看三節第一節風關第二節名

氣關第三節名命關

脉指歌



小兒食指辨三關男左女右一般看皆知初氣中風候末是命門易亦難要知

虎口氣紋脉倒指看紋分五色紅黃安樂五臟和紅紫依稀損益紫青傷

香油一斤

青槐枝百

段陸續入

酒熬枯油

至滴水不

散取出枯

枝入黃蠟

兩半鉛粉

兩半離火

溫時再下

製淨乳香

見茶沒藥

白花蛇各

三錢樟腦

食氣虛煩青黑之時症候逆忽然純黑在其間好手醫人心膽寒若也直上
 到風關粒米短長分兩端如鎗衝射驚風至分作枝又有數般弓反裏順外
 為逆順逆交連順已難又頭長短尤可救如此醫人仔細看初看掌心中有
 熱便知身體熱相從肚熱腳冷傷積定腳熱額熱是感風額冷腳熱驚所得
 瘡疹發來耳後紅孩子無事忽大叫不是驚風是天癇大叫氣促長聲龔誤
 吃熱毒悶心竅急須吐下却和脾若將驚藥真堪笑痢後努氣眉頭皺不努
 不皺腸有風冷熱不調分赤白脫肛因毒熱相攻十二種痢何為惡禁口刮
 腸大不同孩兒有病不可下不熱自汗兼自瀉神困顛陷四肢冷乾嘔氣虛
 神怯怕吐蟲面白毛焦穗疳氣潮熱食不化鼻塞咳嗽及虛痰脉細腸鳴煩
 燥訝方將有積與疎通下了之時必生詫孩兒實熱下無辜面赤睛紅氣壯
 強脉大弦洪肚上熱肝腮喉痛尿如湯屎硬腹脹脇肋滿四肢浮腫夜啼長
 遍體生瘡肚隱痛下之必愈是為良

小兒脉理

小兒一歲變蒸已足方有脉自寸口而生子見小兒初生未滿月手掌高骨之

一兩麝香

一錢同油

攪勻成膏

浸水內一

宿專治癩

極見骨者

紫微膏

香油四兩

燭油兩半

黃蠟兩半

熬至滴水

不散入炒

際亦有脉息吸吸而動脉者氣血之波瀾既生乃成人必有氣血焉得無脉
只不比大人察其端的之至意也

小兒脉歌

小兒有病須憑脉一指三關定息數遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識左手
人迎至外証右手氣口至內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰積致洪緊無
汗是傷寒浮緩傷風有汗液浮洪多是風熱盛沉細元因乳食積沉緊腹中
痛不休弦緊喉間作氣急緊促之時疹痘生緊數之際驚風至虛軟慢驚作
痰癰緊實風癩發搐搦軟而細者為疳蟲牢而實者因便閉脉芤大小使中
血虛濡有氣兼驚悸滑至露濕冷所傷弦急客忤君須記大小不勻為惡候
二至為脫三至卒五至為虛四至損六至平和曰無疾七至八至病尤輕九
至十至病勢急十一二至死無疑此訣萬中無一失

小兒五臟主病脉歌

心脉

心脉浮數驚與熱

傷暑焦啼明白訣

弔腸疝氣及盤腸

壅結口齋小腑虛

鉛粉三兩

輕粉乳香

阿魏白蠟

沒藥各五

錢兒茶六

錢雄黃龍

骨真珠各

五錢攪勻

遠火入麝

香五錢成

膏聽用生

肌收口○

○ 麝蘇膏

心脉沉遲臟腑寒

下指端詳仔細看

肝脉浮數定主風

或痒或痛怕羞明

肝脉沉遲主有寒

良醫仔細要參詳

脾脉浮數熱痰涎

唇紅臉赤胃中熱

脾脉沉遲主風吹

滯頤嘔惡醒脾丸

肺脉浮數主便血

瀉痢潮熱大腑澁

肺脉沉遲主虛寒

下根不定即無根

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生糞

面青唇白眼喜張

諸病傳入慢風候

能食胃惡脾臟堅

滯頤口瘡停壅結

更加吐瀉慢脾傳

氣虛胃弱不能食

傷寒咳嗽遍身熱

氣急痰盛或瘡疹

臟腑滑腸或洞泄

仍有咳嗽與痰涎

麝香五靈

脂沒藥雄

黃乳香各

一兩蟾蜍

五錢蘇合

香油二兩

洞天嫩膏

八兩共攪

勻入瓷瓶

固藏過大

難空出患

頂取此塗

圍如乾以

雞毛黏酒

腎脉

腎脉浮數實有熱

偏墜膀胱痛又赤

口臭咬牙是腎驚

停身齒內出鮮血

腎脉沉遲定有寒

臟腑停留入腎囊

偏墜膀胱尤不痛

光浮虛大最難當

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下盧醫也須怕忽然腹痛鼻青時不必更求醫青色連目橫入

耳此候必知死黑色繞口及連目看看定不足黑色眉間也不良十日必然

亡人中黑色入口來孩子入泉理水腫之病準頭黑報君腎氣滅咳嗽切忌

白入眉肺絕要君知孩子吐時鼻色白命斷難再得中風切忌面如粧焉能

得久長日焰無光兼直視必定三朝死更有瞳人不動時死候要君知自似

開如又不開也是死之媒口噤全然不進乳此病終不起瀉下之物如溺血

孤兒不得活長吐不止止又吐休要勞心顧痢久不食更啖人終與死為隣

瀉痢不歇歇又來指曰下泉台小便艱難又大渴昇竟難得活大便用藥全

不通扁鵲也無功耳上生瘡黑班出醫人無此術久嗽四肢皆逆冷無由難

擲上神效
內服醒消
丸立瘡○

○ 聾耳散

凡耳內有

膿作痛取

新鮮白養

魚腦中枕

骨入火燒

紅取出俟

冷每兩加

冰片一錢

共研用麝

得醒體熱多應睡不醒休要費精神痘疹出後熱不退此候應爲害下莖青
黑不止時不覺貧良醫久渴之後加燥渴命必難得活腹腫脹時氣又斃終
久命不甦

小兒死候形症

大衝無脉滿口粘涎身出黑汗舌縮生瘡五心凸腫瀉出黑血丹毒徧身瀉止
又瀉直視看人面黑狂燥驚叫咬人吐瀉不止魚口氣麗鼻乾黑燥忽作鴉
聲啼哭無淚兩眼半開四肢羸瘦氣喘無烟肚大青筋四肢逆冷汗珠不流
唇反舌縮用手撒人搖頭動項顛門作坑涎如牽鋸拘腰凸肚鼻內氣冷患
者皆死已上並是死候難以醫療不可順情

看兒眼法

小兒諸病但見兩眼無精光黑精無運轉目睫無峰芒如魚眼猫眼之狀箇箇
不治或神藏於內外若昏困者無妨其有病篤而眼中神氣不脫者可以活
眼者五臟六腑神氣之所發神氣已脫脉雖僅存亦未能保

相兒命短長法

花捲乾耳
兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽

膿吹藥二
啼聲散不成人
啼聲深不成人
臍中無血者好

三次即癒
臍小者不壽
通身軟弱如無骨者不壽

鮮白長大者壽
自開目者不成人
目視不正數動者大非佳兒

消管方
汗血者多死不壽
汗不流不成人
小便凝如脂膏不成人

○
頭四破不成人
常搖手足者不成人

皂角刺尖
早坐早行早齒早語皆惡性非佳兒
頭毛不周匝者不成人

柘樹膜炙
髮稀少者強不聽人一作不聰
額上有旋毛者早貴妨父母

淨末各五
兒生枕骨不成者能言而死
尻骨不成者能倨而死

錢紅腹金
掌骨不成者能匍匐而死
躡骨不成者能行而死

錢驚炙淨
臍骨不成者能立而死
身不收者死

末三錢榆
魚口者死
股間無生肉者死

麪直蟬蛛
頭下破者死
陰不起者死

各一錢和
陰囊下白者死
卵縫通達黑者壽

入加工研

細固藏聽

用每遇漏

管先以豬

鬃探通料

其淺深然

後以縣紙

捲藥為條

塞入日易

日塞至瘡

乃止○

癰酒方

○

用本地白

急驚

脉訣啟蒙曰小兒脉促急為虛驚○直指云浮數洪緊為急驚○沉遲散緩為

慢驚○虎口脉紋青紫為驚風○紅者風熱輕○赤者風熱盛○青者驚積

○紫者驚熱○青紫相半驚積風熱俱有主急驚風○青而淡紫伸縮來去

主慢驚風○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風○形勢灣

入裏者順○出外者逆

夫急驚風者因內有鬱熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家生風而發熱夫木

制在金火盛則金受尅金衰不能平木木能生火火得風則火焰起故子母

縱橫血亂氣併痰涎壅塞關竅不通風火蕃成而不得泄暴烈而成急驚也

其症牙關緊急壯熱涎潮鼠視反張搐搦擅動唇口睜眼眨引頻併六脉浮

散洪緊治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐之次用敗毒散保命丹或雄

黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散但噴藥不下通關不嚏眼睛番

轉口中出血兩足擺跳肚腹鼓動或神緩而摸床尋衣症篤而晨昏氣促心

卷之二十一 急驚 五十五

椀皮南星 中熱痛忽大叫聲者不治

檀榔各一 噓驚散 半夏 牙皂 各等分爲末用豆許吹入鼻中

兩樟腦生 〇一論小兒急慢驚風發熱口噤不省人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急並

木鼈各五 宜湧法

錢斑蝥三 吐風散 全蝎炒一箇 瓜蒂炒十箇 赤小豆三十箇

十箇蟾蛛 右爲末每一歲兒服一字温米飲調下未吐再服

三錢共浸 〇一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼

滴花燒酒 發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲出發搐并時行瘟疫等症宜

一斤內聽 加味敗毒散 羌活 獨活 前胡 柴胡 白茯苓去皮

用遇癰三 人參 枳殼去穰 桔梗 天麻 全蝎 僵蚕

日一鬚一 白附子 地骨皮 川芎 甘草

拂至癢乃 右作一劑生薑三片水煎熱服

止〇 〇一論小兒急驚搐搦眼番口噤搖頭天用痰嗽喘熱服

鮮角膏 南極壽星湯 胆星 防風 白附子 蟬退 薄荷

方○

甘草

右剉水煎服

五月初旬

○一 小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

取新鮮皂

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

角刺數斤

○一 小兒驚風咳嗽痰喘

搗爛水煮

天南星

一筒

大者炮去裂為末每服一錢

生薑三片水煎溫服

濃汁漚出

○一 論小兒胎驚內弔肚腹堅硬目睛上視手足搐搦角弓反張痰嗽喘熱一

易水再煮

切急慢驚風並皆治之

三三度出

至聖保命丹

南星

炮去皮用白礬水浸一宿再出晒乾再用生薑水浸一宿曬乾再炒

半夏

同上

青黛

渣以汁共

薄荷

各一兩

全蝎

去尾尖

天麻

白附子

略炒

僵蚕

姜汁炒

防風

歸一鍋復

鬱金

甘草

各五錢

麝香

少許

朱砂

為末五錢

火煎至成

右為細末煉蜜為丸朱砂為衣芡實大每服一丸燈心薄荷湯化下

膏如治橫

○一 論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用

痲每日取

千金散

內閣秘傳

全蝎

炙熟

直僵蚕

各三分

朱砂

四分

牛黃

六厘

二錢同糯

冰片

天麻

黃連

各四分

胆星

甘草

各二分

米煮粥日

食而瘡如

治頑癬用

皂角刺醋

熬成膏鬚

髮後塗敷

目翳白敷

毒水盡再

敷數次全

瘡○

喉證方

○

蘇子前胡

赤芍各二

右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

人參

茯苓去皮

遠志去心

天麻

白附子

麥門冬

全蝎

蓮肉

茯神去皮

朱砂各等分

右為細末每服燈心湯調下

○一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用

抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝遂熱退而驚定愈矣

○一小兒痰涎啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯

加木香柴胡鈎藤鈎啼叫漸緩更加當歸又二劑而安

○一小兒目內色青發搐目上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈反咬牙頓

闕小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

慢驚

夫慢驚風者因外感風寒內傷乳食而作吐瀉或得大病之餘或誤吐下之過

錢甘草桔

稷各二錢

元棗連翹

浙頁各一

錢半治風

火喉閉鎖

喉風○實

火用川連

一錢桔梗

牛蒡元棗

赤芍荆芥

各一錢半

連翹黃芩

花粉射干

脾胃兩虛脾與肺母子也母虛亦令子虛而生粘痰胃虛則能生風風能動

能開故其症目偏喜開痰滯咽喉如牽鋸狀口鼻氣冷唇緩面青涎流口角

將復痲痺是也治宜祛風活痰健脾生胃不可妄用腦麝色粉等藥其有眼

閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危篤速用回陽之藥手足漸溫復以醒脾散

理之其服藥不効太衝脉尚有者灸百會穴但面黯神慘魚口鴉聲脾痛脇

動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘噎尺臥唇縮氣麓者不治

加味和中散

治小兒慢驚風

人參

白朮

去蘆各一錢

白茯苓

去皮

陳皮

各五分

半夏

七分

全蝎

炒五分

天麻

七分

細辛

三分

甘草

右剉一劑生薑棗煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默默不食宜

醒脾散

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

木香

全蝎

僵蚕

白附子

天麻

甘草

○一方去天麻僵蚕加泡南星半夏麩陳倉米二百粒水煎熟旋服之

右剉生薑二片棗一枚水煎服

各錢半防

風一錢半

連翹黃芩

防風荆芥

射干各一

錢銀花錢

半薄荷八

分川連甘

草各五分

壁錢散

六七月取

有子壁錢

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏憤急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可遂無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用

紫金錠子

人參

白朮去苦

白茯苓去皮

白茯神去皮

山藥炒

乳香

赤石脂醋炒

辰砂各三錢

麝香一錢

右為細末以糕一兩為丸如彈子大金箔為衣每一粒薄荷湯研化服

○一小兒嘔吐不食手足搐搦痰涎上壅手足指冷額黑唇青此腎水勝心火

也用五味異功散加木香炮姜頓安乃去炮姜再劑而愈

○一小兒潮熱發搐痰涎上湧手足指冷左腮至申酉時青中隱白手足時搐

此肝經虛弱肺金所勝而潮搐脾上虛弱而手足冷也用補中益氣湯以調

補脾肺用六味地黃丸以滋補肝腎而愈蓋病氣有餘當認為元氣不足若

用瀉金伐肝清熱化痰則誤矣

○一小兒慢驚睡多驚啼凡面黃脉細者難治用此藥與乳母服

七箇老蟾 釀乳法 木香 沉香 藿香 丁香

子兩箇髮 紫好用明 礬七分鎔 化以紫好 之壁錢大 鎔攀黏足 燈火炙透 研粉凡熱 痛喉證用 吹最效

陳皮 人參 神曲 炒 麥芽 炒 右剉每服四錢紫蘇十葉生薑十片棗二枚水煎先令乳母食後捏去宿乳

汁服之即便臥雲時令藥入乳之脉次令兒吮不可過飽亦良法也

五味異功散 方見脾胃 補中益氣湯 方見脾胃 六味地黃丸 方見諸疳

慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頰嘔腥臭噤口咬牙

兩手足微搐不收或身冷或身温而四肢冷其脉沉微陰氣極盛胃氣極虛

十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極總歸虛處惟脾所受故曰慢

脾風若逐風則無風可逐療驚則無驚可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所

謂慢驚難療者慢脾風是也宜服

加味四君子湯 人參一錢 白茯苓五分 蒼朮三分 炮乾姜四分

白朮炒六分 製附子一分 羌活三分 炙甘草四分

硼砂雄精

壽世保元 五集卷八

川連兒茶

人中白冰

片薄荷黃

藥各等分

大破珠滅

半各為極

細末治牙

疔牙根紅

腫口喉刀

點以散吹

○

赤霜散

○

紅棗一枚

右劉生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚慢脾危惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太衝脉即

灸百會穴三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

○一論小兒慢脾風內虛昏迷不醒宜

加味大醒脾散

人參

白朮去芦炒

白茯苓去皮

橘紅

丁香

南星炮

全蝎去毒炒

天麻煨

木香

白附子煨

山藥

石蓮肉去殼

石菖蒲

肉豆寇

砂仁

甘草

○一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言

天南星一箇炮去皮為末每半字五歲兒半錢獾猪胆汁調食煎服

○一論治慢驚慢脾之聖藥也一錠即有起死回生之功頃刻奏效故名回生

錠真海上仙方也急驚亦効

回生錠

人參五錢

白朮去芦油

白茯苓去皮

懷山藥

桔梗各一兩

甘草三錢

胆星五錢

赤石脂煨五錢

辰砂三錢

去核入紅

穉如黃豆

一粒紫好

瓦上炭炙

至棗炭上

起白色煙

盡為度蓋

熄俟冷加

入冰片一

分研專治

走馬牙疳

延腫穿腮

危險不堪

之證吹之

乳香二錢

蒙石三錢

牛黃一錢

麝香一錢

右為末五月五日午時取杆搗勻印作錠子金箔為衣陰乾每服三五分薄

荷湯化下

諸疳

脉訣啟蒙曰小兒脉單細為疳勞○虎口紋白色白色者為疳

夫疳者甘肥無節乳哺不調或稟賦怯弱血氣不足蓋十五歲已前為疳已後

為勞也書載五疳病關五臟要亦脾家有一臟有積失治而傳其餘也脾家

病去餘臟皆已症雖分乎冷熱治當以神為先宜用地黃丸五疳膏肥兒丸

○一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋大便色疳白小便渾濁或澄之如

消疳湯

山查

白芍炒

黃連姜汁

白茯苓

白朮去芦

澤瀉各一錢

青皮四分

甘草生三分

右剉一劑薑棗煎服

○一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴

消疳退熱飲

山查去子

烏藥

燈心

竹茹

檳榔尖

效速如神

八爛之孔

生肌亦速

又方○

白馬前躡

修下腳皮

炭炙存性

為末入水

片少許吹

患處立癒

南星散

史君子去殼

蕪黃仁

淮木通

黑牽牛

大黃

柴胡

莪朮煨

枳殼去穰

黃芩

甜葶藶

右剉水煎溫服

○一論肝胆經熱毒瘰癧或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下注囊癰

便毒腫潰或小腹脇股結核凡肝胆經都分一切瘡瘍發熱並用之

九味柴胡湯

柴胡

黃芩炒各五分

人參

山梔

半夏

龍胆草

當歸

芍藥各三分

甘草二分

水煎服

○一論小兒肝疳白膜遮睛肝經虛熱血燥或風客淫氣而患瘰癧結核或四

肢發搐眼目抽動痰涎上壅凡傷損出血多抽搐發熱又治腎疳腦熱消瘦

手足如冰寒熱往來滑泄肚脹口臭乾渴齒齲潰爛爪黑面鰲遍身兩耳生

瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗使血諸血失瘡或小便淋閉咳嗽吐血或

咽喉燥痛口舌瘡裂或稟腎不足肢體瘦弱解顛鶴節五遲五軟或畏明下

竄或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎肝諸虛不足之症皆宜用此以

滋化源其功不能盡述

六味地黃丸

懷生地黃

酒浸砂鍋內滋碗盛蒸至極黑搗入石臼內搗如泥成膏八兩

山茱萸

酒蒸去核取肉

南星一枚

空入雄

黃一塊麥

麪包裹火

燒俟雄鎔

以杯合定

遠火俟冷

去麪研末

加麝香專

治牙蝕因

患骨槽風

以致牙蝕

透骨穿腮

拂之數日

乾山藥各四兩牡丹皮去骨白茯苓去皮澤瀉去毛各三兩

右忌鐵器為細末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服三五十九空心白

滾水下

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴肚大青筋手足如柴精神困倦歷試有

效無疾預服此藥則諸疾不生元氣虛弱者服半月身體健壯

保嬰五疳膏

青皮炒二錢

橘紅五錢

白朮去芦

白茯苓七錢半

麥門冬去心

史君子肉炒七錢

山查肉四錢

麥芽炒五錢

金櫻子肉略炒五錢

芡實仁二錢

蓮肉心隔紙炒

甘草一錢半

其為細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚間

各服一二茶匙溫水漱口○身熱咳嗽加地骨皮百部○肚腹膨脹大便稀

水腹鳴作聲或蟲出不知加檳榔二錢木香一錢稟受氣弱加人參一錢半

○一論消疳化積磨癖清熱伐肝補脾進食殺虫潤肌膚養元氣真王道也

肥兒丸

人參三錢半

白朮去芦

白茯苓去皮各三錢

黃連姜炒三錢

胡黃連五錢

史君子去殼

神曲炒

麥芽炒

出查肉各三錢半

痛○

骨鯁方

縮砂草果

威靈仙清

水沙餽共

煎連服三

四椀骨化

為涎○

刻歡丸

又名過

街笑○

蟾酥一錢

陳酒化透

甘草

炙三錢

蘆薈

三錢

中四面

穀糠

火燻透用

右為末黃米糊為餅白湯化下或作丸黍米大每服二三十丸看兒大湯下

癖疾

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦關格以致停滯腸胃不得宣通初得為積久則氣血與痰裹積塞子腹脇及瘧家縱飲生冷漿水亦能成之其症作痛有時面黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消堅散結和脾益胃之劑理之更用灸法貼藥久之自効

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒口乾小便赤或大便稀澇或腹脹腫滿或痰嗽喘熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症

淨府湯

柴胡一錢

黃芩八分

半夏八分

人參三分

白朮

去苦炒

白茯苓

去皮

猪苓

五分

澤瀉

二錢

三稜

煨七分

莪朮

煨七分

山查肉

一錢

胡黃連

三分

甘草

三分

右到一劑生薑三片棗二枚水煎溫服

入五靈脂 ○一論小兒癖積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肚大青筋發熱口

麝香各一 乾肚腹脹滿

錢研和為 抑肝扶脾散 人參五分 白朮八分 茯苓八分 陳皮六分

丸二白粒 青皮香油炒六分 龍胆草酒洗八分 白芥子炒八分 柴胡三分 山查肉八分

新零綢包 神曲炒六分 連錢炒一月 黃連三分 甘草三分

絲線紮固 右剉一劑 片棗一枚水煎溫服

藏寶瓶每 黃龍丸 扶溝劉小亭傳 雄黃一錢半 蜈蚣二條沙鍋內炒去頭足

取一丸咬 蘆薈三分 阿魏三分 牛黃二分 天竺黃三分

於痛牙丸 右為末化黃蠟一兩為丸如棗豆大先服七丸則熱退次服九丸則塊消三

化全瘡○ 服十一丸則病根除每用黃蠟煎雞子清入藥于內黃酒下

固齒散 肥兒丸 方見前疳門 治癖疾如神

○一專貼癖積氣塊身體發熱口内生疳此藥用狗皮攤貼患處每箇重七錢

取老鼠頭 貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血為驗大有神效忌生冷腥葷

骨牙同鹽 發物百日

煨存性研
神仙化癖膏

細以擦動

牙牙即收

上不搖○

取齒丹

活脚魚一

條每重十

兩以自碗

一錢入腹

放無風無

貓犬處七

日魚身發

白毛用雞

真香油二斤
秦芹五錢

黃柏五錢
穿山甲十四片
當歸三錢

大黃三錢
蜈蚣五錢
木鱉子七箇

右將藥入油內煎黃色為度濾去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文武火熬

槐柳條不住手攪黑烟起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並

入搗爛粗渣於內

真阿魏一兩
乳香五錢

沒藥五錢
麝香一錢
皮硝三錢風化為末

攪勻以磁器內盛之如用坐水中鎔開不可火上化如有馬刀櫃子瘡加琥

珀一兩在內無不效驗

○一將軍百戰百勝膏

貼癖如神
三稜
莪朮各一兩
木鱉子十箇
蜈蚣十條

巴豆十箇
草麻子一百五
梔子五箇
黃連五錢
槐柳條三百寸

香油二斤人藥熬黑色去渣濾淨再加黃丹一斤熬點水成珠再加血竭五錢
蘆蒼錢五
天竺黃錢五
輕粉錢五
阿魏錢五
麝香分五
胡黃連錢二
硼砂錢二
為末下油為妙

三稜五錢

莪朮五錢

木鱉子七箇

黃丹一斤二兩水飛

通妙紫色

全蝎十四個

白芷各二兩

穿山甲十五片

大黃

黃連五錢

槐柳條三百寸

麝香一錢

皮硝三錢風化為末

為末下油為妙

毛拂下以

少許膏藥

明自化癍丹

牛黃一分

片腦一分

熊胆一分

麝香三厘

乳香三厘

收之每遇

病牙取些

些膏藥貼

齒片刻牙

即落下○

舌上出

血或鼻

衄方○

茅柴根車

前子血餘

三物爲末

吹擦即止

○一治小兒癍疾發熱之甚及眼瞼方

右共爲細末

先將乳汁於銅杓中炭火上滾黃色下前藥急取出攪勻於油

單紙上丸如米粒大男左女右臥時點入大眼角內合眼自化頭上出汗至

胸前第二丸汗至臍上第三丸汗至臍下再點三二丸腹痛下膿血即愈妙不可言

化癍金丹

內閣秘傳

蟾酥水泡

黃蠟各二錢

羚羊角

牛黃各五分

麝香三分

巴豆肉一錢

硃砂

冰片各二分

右爲末丸如菜子大每用一粒用扁頭針在患處刺破皮入之用膏藥貼上

一伏時揭起其癍化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈

○一論小兒患癍年深不愈諸醫以攻尅殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗儘

脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色痿黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促泄

瀉腹脹浮腫不思飲食遂以補中益氣湯久服而愈

熱證

以前服治

溺血鼻衄

龍骨未吹

入立止○

小兒口

疳方○

生香附生

半夏等分

爲末雞子

白調作如

餅貼男左

女右湧泉

穴一周時

瘡如小兒

小兒之病惟熱居多夫熱有虛有實實則面紅目赤氣麤口乾燥渴小便赤澀

大便堅閉五心煩熱日夜焦啼發壯熱宜大連翹飲主之虛則面白眼青氣

微口中清冷恍惚神緩大便稀而小便頻夜則盜汗發虛熱宜惺惺散主之

其有身體乍冷乍熱怫鬱驚惕上盛下虛此冷熱不調候也如熱在表宜汗

在裏宜下表裏俱熱則宜解散其或表裏已解熱又時來此表裏俱虛氣不

歸元而陽浮於外不可再服涼藥必使陽斂於內身體自涼宜參苓白朮散

主之又有潮熱則發熱有熱驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未盡

食熱肚腹先發熱疳熱骨蒸盜汗壯熱一向不止煩熱心燥不安積熱頰赤

口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定癖熱涎嗽飲水寒熱發

如瘧狀血熱已午時發熱瘡疹熱耳鼻尖冷十六者大同而小異諸症得之

各有所歸其間或有三兩症交互者宜隨其輕重而處治之蓋小兒氣稟純

陽臟腑生熱陰陽氣變薰蒸於外致令身熱也若肝熱則兩眼赤痛流淚羞

明或生翳瘴心熱則口內生瘡小便赤腫淋瀝不通肺熱則鼻衄不止大腑

閉結脾熱則多涎沫口內長流心脾熱則生重舌木舌冒熱則作口鼻腎熱

口内生毒 則耳聾或出膿汁此五臟所生主熱各不同是不可以概論也大抵熱則生

塊不能食 風風則悸矣

乳俗名螻 〇一論小兒心經邪熱心與小腸受盛乃水竇之處常宜通利壅則結滑則脫

蝦子用生 熱則熾盛則淋平涼心火三焦自順不待疾作而解證成而療者疎待有之

地酒浸搗 矣一十五味加湯使用纔覺蘊熱客熱寒邪風邪胃之肺經心將受之不受

爛塗男左 觸傳于小腸或閉或澀或赤或白淋瀝不通榮衛不通壅之作疾其發多端

女右腳心 以致膈熱眼目赤腫唇口白瘡津液不生涕唾稠盛須在表裏俱得其宜驚

自瘡〇 風悉能散之痰熱亦自消除連翹之功可謂大矣

口舌藥 大連翹飲 連翹 藎麥穗 滑石 車前子 牛旁子

方〇 赤芍藥各八分 山梔子 木通 當歸 防風各四分

荆芥梔子 黃芩一分 錢一 柴胡 甘草各一分 錢一 荆芥穗一分 蟬退五分

仁黃連黃 右剉作一劑竹葉十箇燈草十莖水煎服〇風痰熱變蒸熱加麥門冬〇實

苳連翹大 熱丹熱加大黃〇胎熱瘡疹餘毒加薄荷葉〇癰疽毒熱如大黃芩硝

力子薄荷〇一論小兒蘊積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭頰熱咽乾煩燥不寧并

通草各一

錢燈芯一

撮甘草四

分蒲黃一

錢為末擦

上即瘡又

天蘇冬豕

蔓去心

元淺等分

為九彈子

大日取一

丸噙化又

舌鞭生衣

用犀黃硃

痘瘡餘毒未解或頭面身體多生瘡癩宜

五福化毒丹

犀角 鎊三錢 桔梗 一兩

生地黄 酒浸 赤茯苓 去皮

鼠粘子

微炒各五錢 粉草

朴硝 各三錢

連翹

玄參 各六錢

青黛 二錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯研化下兼有驚加朱砂為衣

○一論小兒變蒸一症乃小兒蒸皮長骨變幻精神不須服藥其有兼傷風咳

嗽痰涎鼻塞聲重變蒸發熱宜服此方

惺惺散

人參

白朮 去苦

白茯苓 去皮炙

桔梗

白芍 炒

天花粉

細辛

薄荷葉

右剉每服三錢水煎溫服

感冒

○小論小兒感冒或冒寒

用老葱三四根春極爛以手抹來相搽滿掌烘溫暖向病者遍身擦之通氣

處再偏擦幾遍暖處出汗立愈又不相妨

出痘疹屢驗絕妙

砂各一分

元精石二

兩研末刺

出舌尖黑

紫血用藥

撒須臾

舌輒○

楊梅瘡

敷藥○

人指甲頭

髮瓦上依

存性研粉

每一兩加

麝香一錢

○一治小兒面青身冷默默不語用燈火遍身手足按穴爆之立醒

○一論小兒傷寒頭痛壯熱惡寒咳嗽鼻寒聲重痘疹欲出發搐驚風喘嗽手足搐搦等症宜服

足搐搦等症宜服

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

白茯苓

川芎

薄荷葉

人參

甘草

右剉姜葱煎服

○一論小兒風寒外感驚風內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱搐搦并痘疹初作

羌活膏

人參

羌活

獨活

前胡

川芎

桔梗

天麻 各五錢

薄荷

地骨皮 各三錢

甘草 二錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一丸姜湯研化下

○一論小兒四時感冒傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐

蠱毒中暑并瘡疹欲出發搐皆可服之壯實小兒三五日服一丸可免驚風

痰嗽等疾宜

抱龍丸

南星 為末入蟬月黃牛膽中陰乾 百日取卅八錢

天竺黃

可研和日
敷○

千金內

托散○

人葶黃芪

防風官桂

白芷厚朴

川芎桔梗

甘草不用

引○

二陳湯

○

橘紅五錢

半夏二錢

雄黃

辰砂研各四錢

麝香一錢

右為細末煮甘草膏為丸如皂角子大每服一丸薄荷湯研化下百辟內者
作三服或用臘雪水煮甘草膏汁和藥尤佳

○按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱實宜用此方若初冒風
寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作也先用十一味參蘇飲若邪既解而腹脹
吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛也用四君子湯加陳皮各異功散
切忌祛痰表散若過服而致前症者尤宜補溫脾肺

參蘇飲方見咳嗽

脾胃

○一論小兒諸病因藥攻伐元氣虛損脾胃衰憊惡寒發熱肢體倦怠飲食少
思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱右關寸獨
甚亦宜用之大凡久病或過服剋伐之劑虧損元氣而諸症悉具者最宜此
湯調補若無有前症致積此患者尤宜用之

茯苓一錢 補中益氣湯

黃芪蜜水炒 揀參各八分 白朮去油 當歸身 酒洗各一錢

甘草加白

陳皮

甘草炙各五分 升麻

柴胡各二分

芥子二錢

右剉薑棗煎空心溫服

炒研○

○一論小兒脾胃虛弱或因尅伐之過致飲食少思或食而難化或欲作嘔或

四物保

大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用

元湯○

四君子湯

人參

白朮去苳炒

白茯苓去皮

甘草炙各等分

川芎當歸

右剉薑棗煎服

白芍熟地

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色痿黃卽四君

人蔞黃芪

子湯加陳皮半夏

炙草○

○一論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或驚搐痰盛或睡而露睛手足指冷或脾肺

又保元

虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌流涎若母有疾致兒患此者母

湯○

亦當服之

肉桂生薑

異功散

人參

白茯苓去皮

白朮去苳炒

甘草炙

陳皮各等分

莖生甘草

右剉姜棗煎服

外科登合

卷之三

卷之三

○ 加味四

物湯○

川芎當歸

白芍熟地

黃生甘草

炒白芷茯苓

苓五味子

八瀆肉桂

○

十全大

補湯○

八瀆白朮

漂淨土炒

傷食

經云脉滑者有宿食也○虎口脉紋黃色為脾家有積○小兒脉沉者為乳滯
 夫小兒傷食皆因乳哺不節過食生冷堅硬之物脾胃不能剋化積滯中脘外
 為風寒所搏或因夜臥失蓋以致頭疼身熱面黃目胞微腫腹痛腸脹足冷
 肚熱喜睡神昏不思飲食或惡食或惡心或嘔或噎或口噤酸氣或大便敗
 卵臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆為陳積所傷也
 宜以萬億丸利之若內停於食或外又感寒邪者則人迎氣口俱緊盛頭疼
 惡寒拘急兼前等症宜以太和散主之葛氏曰乳者奶也哺者食也乳後不
 可與食食後不可與乳緣小兒脾胃怯弱乳食易傷難以消化初得成積久
 則成癥成疳變為百病可不慎乎

萬億丸 方見通治 治傷食百病

○一論內傷乳食吐腹脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

太和丸 紫蘇 陳皮 香附 羌活 蒼朮 川芎

焦茯苓

甘草熟地

白芍川芎

當歸黃芪

肉桂

六味地

黃湯

熟地山藥

澤瀉山萸

肉茯苓丹

皮

龍膽瀉

肝湯

龍膽草當

枳殼

山查

神曲

麥芽

甘草

生薑

三片水煎服

○一治小兒食積腹痛膨脹肚硬青筋

塔山王景明傳

黑丑

牛生牛

檳榔

各三錢

木香

五分

右為細末每服五分黑砂糖調入滾水服立消

○一論小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之

消食餅

蓮肉

去皮

山藥

炒

白茯苓

去皮

芡實

去殼炒

神曲

炒

麥芽

炒

扁豆

炒

山查

去子

右各等分為末每四兩入白麩一斤水同和烙焦餅用

○一論此藥消食止泄止吐消疳消黃脹定肚痛益元氣健脾胃

啟脾丸

人參

白朮

去芦炒

白茯苓

去皮

山藥

蓮肉

去心皮

山查肉

陳皮

澤瀉

甘草

炙各五錢

右為末煉蜜為丸如菉豆大每三四十九空心米湯送下小兒常患傷食諸

疾服之立愈

○一論小兒傷肚大腹脹

歸尾各一

錢銀花

粉黃芩連

翹各錢半

知母甘草

丹皮防風

木通各一

錢○

敗毒湯

○

運翹赤芍

銀花歸尾

黃芩花粉

各一錢甘

用做酒小曲一枚為末打入雞子一箇攪勻入鹽少許蒸熟食之每早服一
次可數次而愈

○一論健脾胃進飲食消積滯殺疳蟲長肌肉乃保嬰第一方也

臨川徐培鴻試驗

人參三錢

白朮去芦五錢

橘紅剉淨五錢

白茯苓去皮四分

甘草炙二錢

青皮去穢三錢

砂仁二錢半

木香二錢五分

山藥五錢

蓮肉去皮心三錢

史君子去殼三錢

山查肉三錢

三奇神曲炒三錢

右共為細末用生荷葉包粳米煮熟去荷葉將米杵爛以淨布扭出再煮成

糊為丸如麻仁大每二十五丸或三十五丸至五十九丸陳米炒熱煎湯不向時服

○一小兒食粽後咬牙欲吐頃間腹脹昏瞶鼻青黃赤此脾土傷而心肝所動

食積發厥也先令雞翎探吐出酸物頓醒節其飲食勿藥而愈

○一小兒好吃粽成腹脹痛用白酒麩末同黃連末為丸服之愈

○一小兒因停食腹痛服峻利之藥後患瘡日補而作此元氣下陷以補中益

氣湯治之

草節一錢 千金肥兒餅 小兒無病日常食三五餅可防患於未然妙不可言

煎湯送下 嬰兒恒闕乳 飲食不消停 脾胃一傷損 吐瀉兩相併

消丸唯疔 痰嗽加吭喘 熱積致疳驚 面黃肌瘦削 腹脹吐青筋

毒忌酒此 赤子焦啼叫 慈母苦傷情 吾心懷幼切 家蓮子茯苓

外藥內不 芡實乾山藥 扁豆薏苡仁 已上各四兩 神曲麥芽陳

可缺酒水 人參史君子 山查國老并 六味每二兩 古糯米二升

各一梳煎 藥米均為末 布裹甑內蒸 白糖二斤半 調和餅印成

半服小孩 每食二三餅 諸病即安寧 肥兒王道藥 價可擬千金

瀉半煎化 丸服○

吐瀉

雜證○ 夫小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失常乳食不節遂使脾胃虛

外科之治 弱清濁相于蘊作而然大概有冷有熱有食積三者之不同也蓋冷者脾胃

去並藥方 虛寒水穀不化小便白而大便青或如糠粕手足厥冷或吐或瀉宜助胃營

業已和盤 主之如上之症或兼有外感風寒內傷生冷身熱在源作熱作吐瀉者宜藿

托出尙有

雜證亦藥

到病療萬

無一失者

盡列於左

○

調經種

子方○

當歸身川

芎吳葉莖

各一錢熟燒

地香附各

一錢五分

白芍茯苓

香正氣散主之熱者脾胃有濕大便黃而小便赤口乾煩渴四肢溫暖或吐或瀉宜甘露散主之如上之候有兼中暑受熱作吐瀉者宜荝苓湯主之或益元散亦可食積者因傷食通多積滯脾胃則肚脹發熱若吐如酸醜氣若瀉如敗卵臭宜萬億丸微利即愈利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃膏主之凡吐瀉初起即服燒針丸鎮固之即効大抵吐瀉之症多因乳食過傷脾胃乳食傷胃則為嘔吐乳食傷脾則為泄瀉吐瀉不止漸至日深導其胃氣之虛慢驚之候自此而得可不慎乎

吐瀉不治症

小兒瀉不定精神好者脾敗也○吐瀉唇深紅者內熱故也不退必死○面黑氣喘者不治也○大渴不定止之又渴腎敗也○遺瀉不覺者死

各一錢熟燒針丸

治吐瀉如神

黃丹水飛

朱砂

白礬

火煨各等分

右為末棗肉為丸如黃豆大每服三四丸戳針尖上放燈焰上燒過存性研爛涼米泔水調服瀉者食前吐者無時外用荝豆粉以雞子清和作膏塗兩脚心如瀉塗顛門止則去之

丹皮各八

分延胡索

廣陳皮各

七分若經

水先期者

必色紫加

條苓八分

過期者必

色淡加官

桂乾薑熟

艾各五分

不論先期

落後每服

加生薑二

○一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃氣

五味異功散

人參

白朮

去苳

茯苓

去皮

陳皮

甘草

炙

右劉散姜棗煎服

○一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脇脹滿腸鳴久瀉虛寒等症

助胃膏

人參

白朮

炒

白茯苓

去皮

丁香

香

木香

砂仁

白豆蔻

肉豆蔻

官桂

藿香

甘草

各一錢

陳皮

四

山藥

四錢

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸米湯化下兼治嘔乳便青或時夜

啼胎寒腹痛

○一論四時不正之氣寒疫時氣出嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛冒風吐瀉

中濕身重泄瀉脾胃不和或飲食停滯復感外寒頭疼增寒嘔逆惡心胸膈

痞悶或發寒熱無汗

藿香正氣散

藿香

一錢

紫蘇

八分

陳皮

厚朴

姜炒

半夏

姜炒

白朮

去苳炒

白茯苓

去皮

桔梗

大腹皮

片水一椀

白芷

甘草各五分

右剉一劑姜棗煎服

半煎八分○一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴

俟經水至加減茹苓湯

猪苓

澤瀉七分

白朮去苦五分

赤茯苓去皮一錢

目空心服

黃連五分

香茹

乾葛七分

天花粉二錢

甘草五分

起渣再煎

臨臥服一

右剉生姜煎服○如熱極加石膏知母○瀉極加升麻○腹痛加炒白芍一錢桂三分寒痛亦加

日一劑服

○一論小兒五種泄瀉赤白痢疾宜用

至經止兩

鐵門拴

文合一兩炒白礬一錢半

黃丹二錢

三日交媾

右為未用黃蠟一兩化開為丸如菉豆大每服大人十五丸小兒五七丸用

即孕經期

茶一錢姜二錢煎湯下

準而不孕

○一小兒水瀉痢疾用蜜三匙枯礬末三錢蘿蔔汁調服出微汗忌醋

看照後方

○一論小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭發熱煩渴多燥但欲飲

服四劑下

水乳食不進羸困失治變成慢驚風癇不問陰陽虛實並宜服之

期再服而

七味白朮散

人參去苦炒

白茯苓去皮

藿香

木香

孕婦斷沙

菱杜仲當

歸益母各

二錢川芎

一錢砂仁

炒研五分

香附二錢

橘紅一錢

紅花三分

凡痛經不

受胎者取

丹葭曬乾

磨粉日以

二錢温陳

白木

乾葛

甘草

右劉姜棗煎服。如小兒頻瀉利將成慢驚加山藥扁豆肉豆寇各一錢

姜汁一匙煎服。若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎二箇白附子八分

若小兒冬月吐瀉多是胃寒胃虛所致加丁香二粒。若胃虛不能食而大

渴不止者不可用淡滲之藥但胃元氣少故也以白木散補之。如不能食

而渴者倍乾葛加天花粉。如能食而渴者白虎湯加人參

一論小兒嘔吐不止宜

金棗丸

木香

半夏

南星

湯泡透姜汁炒

丁香

陳皮

各二錢

砂仁

藿香

各五錢

人參

一錢半

右為細末薑汁打糊和成錠辰砂為衣淡姜湯送下

一論小兒久瀉久痢不止及滿口生瘡白爛如泥痛哭不已諸醫罔效

巴豆

去殼一箇

瓜子仁

七箇

燒紙錢

一箇

共搗一處如泥津調貼在兩眉間

正中待成泡揭去即愈

一論小兒泄瀉用巴豆研末為膏貼在顛門上燒線香一炷未盡即去巴豆

酒送服兩

月內即孕

無有不靈

○

求嗣得

嗣法○

背緒澄言

男精洩於

先而女精

後至則陰

裏陽主男

孕如女精

洩於先而

男精後至

○ 小兒泄瀉不止用山藥炒為末不拘多少入粥同食之立止

○ 小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即

嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯後用五味異功散及四

神丸調治其母不兩月而子母俱痊

○ 小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱涼血之藥又大便下血唇

色白而或青問其故於余余曰此脾土虧損肝木所乘而然也令空心用補

中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使涎血各歸其源而愈

○ 小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省人事用此四肢漸暖神

回陽散 天南星為末每服三錢入京棗三枚同煎溫服

○ 一治小兒吐不定

五倍子二箇一生一熟甘草一握用濕紙裹炮過同為末每服半錢米泔水調下

痢疾

夫小兒欠痢者乃饑飽勞役風寒暑濕因觸冒天地八風之邪而得故以命名

則陽裏陰

生女孕又

言月信初

盡其濁氣

未清而交

接即女務

待經止兩

足日則女

體虛而滯

氣盡再男

人保養月

餘陽勝於

陰定成男

孕又論于

也大抵多由脾胃不和飲食過度停積於脾胃不能剋化又為風寒暑濕于

之故為此疾傷熱則赤傷冷則白傷風則純下青血傷溫則下如豆汁冷熱

交并赤白兼下若下迫後重裏急窘迫急痛者火性急速而能燥物故也或

夏末秋初忽有暴折於盛熱無所發散客搏肌膚之中發於外則為瘧發於

內則為痢內外俱發則為瘧痢凡痢病久則令腫滿下焦偏令上焦偏結則

為上實下虛若脾胃濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而噤口之症

又有一方一家之內上下傳染長幼相似是疫毒痢也當先推其歲運以平

其外察其鬱結以調其內審其所傷別其虛實冷熱以治之條然明白不致妄投也

痢疾不治症

凡小兒下痢如豆腐色者死○下如屋漏水者死○下痢日久大孔如孔者死

○下痢如竹筒注水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤澁腹痛發

熱唇紅舌胎氣促心煩坐臥不安狂渴飲水穀道傾陷時復面容似粧飲食

全不進者並不治

清熱化滯湯

治痢主方

黃連吳茱萸煎湯

白芍藥

宮左右如

男精洩於

婦人之左

生男右則

生女此男

清女濁男

左女右陽

壯陰衰之

至論也凡

疾風暴雨

或醉飽或

服春藥而

受胎者多

天必俟天

陳皮

白茯苓去皮枳殼去殼炒黃芩

甘草

右劉生薑一片水煎空心溫服○初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒

炒黃芩當歸地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花

滑石陳皮乾薑炒黑○白痢久虛加白朮黃芪茯苓去苓連枳殼○赤痢久

虛下後未愈去苓連加川歸白芍白朮川芎阿膠珠○裏急後重加木香枳

榔○腹痛加白芍川歸玄胡索枳殼○小便赤少加水通猪苓澤瀉○下如

豆汁加白朮蒼朮防風○食積加山查枳實麥芽神曲○久痢氣血兩虛加

人參黃芪當歸川芎升麻肉蔻○下後二便流利惟後重不去者氣陷于下

也以升麻提之

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白痢加滑石末同煎

開板丹

黃丹飛過二兩黃蠟一兩

乳香一錢

沒藥一錢

杏仁去皮尖

巴豆去油八箇

右將四味為細末將黃蠟溶開後將末藥同蠟拌勻攪冷成塊丸如黃豆大

氣晴明日

暖風和明

星朗月而

受胎者多

富貴儻時

令不正或

迷霧氣怒

而受胎者

多愚蠢貧

賤或雷電

之後而受

胎者定生

怪狀一物

凡求嗣者

每服一丸空心服紅痢冷甘草湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷米湯下忌生油膩

○一治休息痢及疴瀉日久不能安

用雞子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內鎔以雞子拌和炒熟空心食之

○一治小兒痢疾方

用雞子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小鐘和

勻與兒服之不用茶神効

○一治小兒患痢脫肛色赤或痛以補中益氣湯送香連丸而愈後傷食作瀉

復脫肛不入仍以益氣湯服更以草麻仁研塗頂門

○一治小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷皆胃氣虛寒下陷也以補中

益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

○一治紅痢及噤口

用田螺搗爛盒臍中填刻効

○一治痢不拘赤白

白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙効

須知

黎洞丸

牛黃冰片

各一錢阿

魏雄黃各

一兩大黃

乳香沒藥

兒茶天竺

黃蘗三七

血竭各二

兩山羊血

五錢前藥

各為末取

○一治小兒噤口痢用甜梨一箇空空入蜜填滿紙包火煨熟吃立止

○一治噤口痢湯飲米穀不下者
石蓮子去殼并內紅皮及心為細末每服量兒大小或五分或一錢二三錢
用陳倉米湯調下如嘔加生姜汁一二匙

○一治血痢用苦參炒為末每服三分或五分米湯調下

○一治白痢用肉豆蔻麩包煨乳香一粒其為末每服二三分米湯調服

○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯一服立止○一方用莧菜煎湯服効

○一治瀉痢久不止不肯服藥用肉豆蔻煨去油為末三錢麥麩四兩同和切

麩入葱鹽煮如常食之

瘧疾

夫瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱者名
寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不寒者名癰瘧不寒而
熱者名瘧疾前身受暑復感自干暑濕者名濕瘧瘧氣吞酸胸膈不利者名食瘧

山羊血拌

曬乾再磨

爲末加藤

黃二兩隔

湯煮十餘

液去淨淨

賦入末爲

丸如芡實

大饑藥乾

少加熟薑

可也丸宜

陰乾以黃

蜡包裏珍

藏臨用破

一日一發受病一月間日一發受病半年連發二日間一日者氣血俱病也

起于三陽者多熱而發于日起于三陰者多寒而發于夜發于日者隨症而

治發于夜者加血藥并用升提暫瘧可截久瘧加補經久不愈一兒飲水結

癖中脫名曰瘧母此最難痊一二發間用截太早必變浮腫疔痢之疾然嬰

兒之瘧自飲食得之居多治須以消導扶胃氣爲本此秘訣也

○一論食瘧嘔吐痰沫及時行瘧瘧不問先寒後熱諸瘧通用

清脾引 青皮 厚朴姜炒 草果 白朮去苳

白茯苓去皮 柴胡 黃芩 半夏姜炒 甘草

右剉棗煎服○小傾赤加猪苓澤瀉

○一論停食感寒發瘧及中皖虛寒嘔送惡心等症

養胃湯 蒼朮米泔浸 厚朴姜汁炒 陳皮 半夏姜汁炒

白茯苓去皮 人參 草果 藿香 甘草

右剉烏梅一箇生姜水煎服

截瘧飲 白朮去苳 蒼朮米泔浸 陳皮 青皮去穢

白朮去苳 蒼朮米泔浸 陳皮 青皮去穢

蜡殼取丸

陳酒化服

專治腫毒

跌打危重

之證內服

外敷皆效

○

祛風逐

溼散○

番木鱉甲

尾各精製

淨末二兩

川附二兩

共為末專

柴胡

黃芩

猪苓

澤瀉

常山

甘草

右剉薑棗水煎露一宿溫服○有汗而熱多者加人參黃芪前胡知母○無汗熱多者加乾葛紫蘇○寒多加乾姜草果○痰多加半夏貝母○食積加枳實山查神曲麥芽○夜發者為陰分加當歸升麻○二日三日一發者加人參黃芪白朮烏梅去蒼朮○單寒加乾姜附子人參去柴苓猪苓澤瀉○腹痛加厚朴板榔○室女熱入血室加小柴胡湯

截瘧仙丹

五月五日午時用黃黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研爛入人言五分同搗為丸如黃豆大雄黃一錢為衣陰乾收貯臨發熱早晨面東無根水下

○一丸忌熱酒熱物一時仍忌魚腥生冷之物三日黑豆圓者是

川芎

當歸

白芍藥各一錢半陳皮

半夏

炒苓各一錢半甘草

右作一服姜三片煎下幣帛末半錢

○一治鬼瘧邪瘧用天靈蓋燒存性為末每服三釐溫酒調下立止

治手足不仁骨節麻

木每服七

分用好陳

酒五鼓送

下醉蓋取

汗服至痛

處更痛麻

處更麻頭

眩背汗昏

沈四五刻

即定定則

全瘳如服

後不覺痛

痰喘

痰者風之苗熱生於心痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於肺金水澄則清水沸則渾小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停蓄肺膈寒化為熱必生痰喘咳逆上氣肺脹胸脇俗為馬脾風又為喉風若不速治立見危奪命丹 治小兒風涎灌膈利痰去風

青蒙石煨為末煉蜜為丸如棗豆大每七八丸薄荷湯下

○一小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 人多看作風喉 大黃板榔二牽牛 人參分兩等勻

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一字將咽喉 不用神針法灸

右其證肺脹喘滿胸高氣急兩脇煽動陷下作坑兩鼻竅張闊亂嗽渴聲噴

不鳴痰涎潮塞俗云馬脾風若不急治死于旦夕也

定喘湯 治胸喘氣急

麻黃 六分 杏仁 生夏 六分 甘草 水泡 黃芩 微炒 三分

麻必要日

服至知覺

方止○

化痰膏

○人參款花膏

凡患瘡癬

之處肌膚

定無毫毛

須看準以

筆圈記用

香油一斤

蜜陀僧六

兩阿魏五

錢羌活一

桑白皮蜜炙六分蘇子

欵冬花六分甘草二分

白果五枚去殼打碎炒黃

右剉水煎溫服不必用生姜

○一論小兒脾胃虛寒久嗽不已咽膈滿悶咳嗽痰涎嘔逆惡心肚腹膨脹腰

背倦痛虛勞冷嗽諸藥無效者服

人參款花膏

人參八錢

紫苑一兩

欵冬花去梗八錢

桑白皮炒一兩

貝母二錢

桔梗炒二錢

紫蘇五錢

檳榔五錢

木香五錢

杏仁去皮八錢炒

五味子八錢

馬兜苓二錢

右為末煉蜜為丸如龍眼大每一丸姜湯化服

○一論小兒喉中痰壅喘甚神効方

用巴豆搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下

咳嗽

夫咳嗽者肺為嬌臟外主身之皮毛內為五臟華蓋形寒飲冷燥熱鬱蒸皆為傷也而肺實肺虛皆能壅痰而發咳也咳嗽二症難作一塗咳謂無痰有聲

兩水紅花

子麝香各

三錢熬膏

退火攤貼

近取一膏

可消年久

雨張而瘡

內服尅堅

酒用水紅

花子研末

三錢浸火

酒一斤時

刻呷至瘡

乃止○

肺氣傷而不清嗽謂無聲有痰脾濕動而生痰咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣兼動脾濕也其症感風寒者鼻塞聲重停寒者悽慘怯寒夾熱者則焦煩受濕者爲纏滯停水者則怔忡若痰飲則咳有痰聲痰出咳止火極則咳聲不轉面赤痰結肺氣則喘滿氣結息重風痰壅盛則咳至極頻吐乳食與痰俱盡方得少息而或實或虛則視痰之黃白唾之稀稠而可知也以一歲論之春乃上升之氣夏乃火氣炎上秋由濕熱傷肺冬則風寒外束以一日論之清晨本曰痰火午痰皆曰陰虛夜間或有食積其咳而吐膿血者肺熱感也久痰不已必傷驚悸頑涎甚至眼眶紫黑如物傷損血珠紅赤如血大可異人治法風寒宜疎散煩熱宜清利受濕用勝濕之藥停水宜瀉水之劑痰飲卽豁痰火極則降火肺脹則養血疎肝風痰壅盛宜養胃而去風痰也况肺生胃門更能溫中與姜順助其氣滋潤肺經和順三焦一將見氣壯則咳漸減胃復則痰不生肺滋則咳不有乳母節飲食慎風寒咳何從而生乎

○一論春夏秋傷風咳嗽痰熱喘急并夾驚傷寒等症宜

雄朱丸

牛膽南星

天花粉略

薄荷

荊芥

防風

三日大

瘡方○

瘡未至之

先用陽和

解凝膏布

攤貼背心

用常山雲

苓官桂甘

草檳榔各

二錢小果

豆四十九

粒酒水各

二椀煎至

二椀當晚

羌活

天麻

朱砂

雄黃各六錢麝香三分

右爲細末粳米飯爲丸薄荷湯送下

○一論冬月感寒咳嗽夜不得睡以此發之

九寶飲

薄荷

紫蘇

大腹皮

麻黃

桂枝

桑白皮

杏仁

陳皮

甘草

右劉生薑三片烏梅一箇水煎溫服

○一論小兒四時感冒發熱頭疼咳嗽喘急痰涎壅盛鼻塞聲重涕唾稠粘及

內傷外感一切發熱等症宜服

參蘇飲

紫蘇

陳皮

桔梗

前胡

半夏

乾葛

人參

木香

枳殼去穢

白茯苓去甘草

右劉生薑煎服

○一論小兒咳嗽吐痰

用甜梨一箇挖小孔入硼砂一分燒熟與服或搗汁亦可

○一論小兒一切咳嗽不已用

寧嗽膏

麻黃

杏仁去皮

桔梗去苦

甘草

知母

款冬花

貝母

黃芩

紫苑各五錢

黃連四錢

香附童便炒

牛膽南星一兩

先服一椀

蓋暖而眩

留一椀次

日約進至

兩箇時前

頓熱服蓋

臥待瘧

至瘧至亦

輕亦有當

日而瘧瘧

後忌房事

戎食生冷

刀碌風霜

忌食雞羊

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每用一丸白湯食後化下

○一論小兒身熱感冒鼻流清涕或鼻塞咳嗽吐痰輕者不藥候一二日自愈

重者服此方治痰爲主輕輕解之

白朮

去芩一錢

白茯苓

去皮七分

桑白皮

蜜炙七分

川芎

五分

桔梗

五分

橘紅

五分

半夏

泡五分

防風

四分

甘草

三分

薄荷

三分

枯苓

炒三分

右剉一劑生薑水煎服

○一治小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑如喘促出汗此脾肺氣虛以補中益氣湯加五味子

發沙

小兒發沙有陰有陽陰沙則腹痛而手足冷陽沙則腹痛而手足溫或其症似

寒非寒似熱非熱四肢懈怠飲食不思容顏慘起爲症不一俗呼爲沙病非

沙也多由感冒風寒而受水傷濕得之其治之法宜用熱水蘸搭臂膊將苧

麻頻頻刮之候紅色出爲度其者宜以針刺其十指背近爪處一分許仍先

將兒兩手自臂將下令血聚指頭方刺或視其身背有紅點以燈草蘸油

牛肉雞子
鴨卵白藕
○點燈燎之已上諸法使腠理開通寒邪易散氣血通暢而已矣

○一論小兒攪腸沙心腹腰諸痛用

豆半月末
火龍丹
雄黃
焰硝各二錢

○截不發
愈瘡
○共研細末每用簪挑些點眼角大皆男左女右立愈

通治

神仙萬億丸
朱砂
巴豆去殼
寒食麵

紅棗三斤
豬板油一
斤陳酒三
斤共入沙
鍋內煮乾
加水三斤
煮至一半
不時取食

右先將朱砂研爛即將巴豆同研極細却以寒食麵好酒打成糕入藥中仍同研百餘下再揉和為丸如黍米大凡所服不過三五七丸而已看虛實加減照後引下

一感冒風寒姜葱湯下出汗

一心痛艾葉煎湯入醋少許送下

一心膨氣脹淡薑湯送下

一痢疾空心茶清下

一內傷飲食茶清下

一伏暑熱冷水送下

一霍亂吐瀉薑湯下

一肚腹痛熱茶送下

食完瘡癩

如暑天分

作五六次

煮食○

黃疸立

效八○

氏患黃疸

者眼白黃

小便赤身

體軟倦取

黃豆生嚼

不惡心者

是用蒼耳

子薄荷木

一瘧疾薑湯下

一切雜症茶清下

太乙混元丹

紫河車

焙乾二錢

滑石

六兩用牡丹皮二兩煎水去丹皮煮水乾為度

粉草

一兩半生半熟甘草四錢

山藥

姜汁炒二錢半人參去芦一錢

遠志

甘草水泡去心一錢半

牛黃

二分天竺黃一錢

右共為細末煉蜜為丸如龍眼大金箔為衣每服量兒大小加減大人婦女

諸病並皆治之

一中風痰厥不省人事薑湯研下

一傷寒夾驚發熱薑葱湯研下宜出汗

一停食嘔吐腹脹使酸臭姜湯下

一急慢驚風薄荷湯下

白梅花

三錢

辰砂

一兩甘草一兩水煎半日去甘草

菝葜

火煨三錢砂仁去皮三錢

黃芪

蜜水炒一錢白茯苓

桔梗

去芦一錢木香一錢

一方無混元衣梅花麝香三分

益智

去殼六錢

白茯苓

去皮木二錢半

通絲茵陳

各三錢要

用無毫水

之陳酒一

斤煎一椀

衝炒砂仁

末三錢服

小便赤如

血者加川

連一錢同

煎屢用瘡

人有日癰

痲黃疽皆

淫證應忌

泄瀉米湯下

咳嗽喘急麻黃杏仁湯下

蟲痛苦練根湯下

夜啼不止燈草灰湯下

慢驚人參白朮湯下

小便不通車前子湯下

發熱金錢薄荷湯下

中暑煩渴燈心湯下

疳熱身瘦肚大手足細或淋或瀉或腫或脹或喘或嗽陳倉米湯下

論小兒諸病百餘壯盛者宜服萬億丸小兒諸病不足虛弱者宜服混元

丸

雄黃解毒丸

雄黃二錢半 鬱金二錢半 巴豆二十四箇去殼

右為末醋煮糊為丸如菜豆大每服七丸熱茶清吞下

霍亂紫蘇木瓜湯下

赤白痢疾陳倉米湯下

積聚腹痛姜湯下

疝氣偏墜大小茴香湯下

急驚搐搦薄荷湯下

大便去血槐花陳倉米湯下

夜出盜汗浮小麥湯下

痘疹不出升麻湯下

酒殊不知

酒本溼也

今做緝溼

捕善識溼

穴領藥戰

溼非酒不

可如經滴

水不效者

何也酒被

水解捕循

賊阻也○

紅白痢

及麻息

痢方○

一 中風卒然倒仆牙關緊急角弓張不省人事茶清吞下

一 小兒急驚風痰熱等症加牛黃五分硼砂一錢水糊丸薄荷湯下

一 纏喉風急喉閉每七丸研化以熱水研白梅花調下或熱茶下卽甦熱則流

通之意纏喉風卒死心頭猶溫者灌下卽甦

一 瘧疾中有癖用沉香磨水送下泄下黑血如泥極臭立効

一 諸積下痢煎五苓散送下

一 疔瘡加全蝎一錢皂角一錢麝香少許滴水丸每服二十九丸茶下若始不覺

是疔瘡不曾發汗過數日方覺則寒熱體痛背罷毒氣入裏須用利藥使內

中毒氣下泄此藥主之

一 癩癧瘡加斑猫七箇去翅足糯米冷茶下

一切熱毒壅盛又能取積消食下熱茶下

小兒初生

小兒五宜

凡痢不拘

紅白忌服

川連服則

倒胃不生

腹痛而痢

者後方一

服立瘡儻

增減定不

效車前草

炒研二錢

檳榔厚朴

山楂陳皮

滑石甘草

各一錢紅

一 小兒分婉初離母體口有穢毒啼聲未發急用軟綿裹指拭去口中惡汁倘

或不及預煎甘草黃連濃汁灌之待吐出惡沫方與乳吃或用好朱砂水飛

過煉白蜜調和成膏如小豆大乳汁化服三日內止進三粒以除胎之患也

一 初生三五日宜紉縛令臥勿堅頭抱出免致驚癇

一 乳與食不宜一時混吃兒生疳癥痞積

一 兒衣宜用年老人舊裙舊褲改作小兒衣衫令兒有壽雖富貴之家切不可

製紵絲綾羅氈絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一 兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀粥哺之周歲以前切不可吃

葷腥并生冷之物令兒多疾若待二三歲後臟腑稍壯方與葷腥庶可若到

五歲後食之尤嘉 一云小兒水無雜疾大忌雞肉絕妙

洗兒法

一 初生兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍瘡等

症浴兒調和湯水須看冷熱得宜不可久浴久浴則傷風寒夏不可久浴久

浴則傷熱浴時當護兒背免風邪內入不使發熱成癩疾用五根湯洗以免

三錢炒
瘡疥之患

澤瀉枳實
五根湯

各一錢燈
桃根

柳根

梅根

桑根

槐根

心一撮同

加苦參

白芷同煎碎諸不詳

煎另以木

右每味一兩洗淨切碎用水煮去渣加猪膽汁一枚候水溫洗放金銀銅器

香六分酒

則辟諸惡邪之氣

磨衝藥而

斷臍法

服有等腹

一小兒初生洗訖斷臍不可用刀割以軟絹裹臍或隔單衣咬斷蓋臍不可令

不作痛惟

長又不可太短只取兒足掌長如長引外風則成臍風之患短則傷臍內痛

痢膿血兼

面青啼呼臍帶中有穢蟲宜急撥去不然入腹成疾

流黃漿此

係平素愛

變蒸論

食冷茶水

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之候變者異

酒乃滑腸

常也蒸者發熱也所以變生五臟蒸養六腑須要變蒸多遍則骨節臟腑由

床息痲積

溼之證取

活鱖魚去

腸雜切段

放瓦上炙

炭研粉每

服三錢黃

糖拌熱陳

酒送下數

服全瘡不

拘老幼滑

腸久痲者

神效忌食

水菓水酒

是而全胎毒亦因變而散氣血方榮性情有異後來出痘亦輕可也自生之日始每三十二日一變凡人有一百六十五骨除手足四十五碎骨外止有三百二十骨自生下骨而上一日十骨三十二日爲一變骨氣始全一變生一臟或一腑十變則臟腑始足每變輕則發熱微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日解重則八日解凡小兒之病無不由變蒸而得也而不熱不驚無他病候是暗變者多矣此受胎氣壯故也凡變蒸須看兒唇口如上唇微腫有如臥蚕或有珠抱子者是真變蒸之候也此則決不可妄投針灸藥餌若誤之則爲藥引人各經證遂難識而且纏綿不脫反爲藥之所害也如或因傷食因傷風因驚嚇等項夾雜相作而發令人疑惑亦須守候二三日俟其病勢其的是食則消食是風則行痰是驚則安神隨症調治或非變蒸時而得傷寒時行瘟病則口上無白泡其診皆相似惟耳及尻通熱此爲他病可作餘治業幼科者奚可不詳究耶

小兒初生雜證論方

生冷海參

海蛇等性

寒之菜○

癡癩證

方○

凡患癡癩

或羊頭風

等證緣心

竅中痰迷

所致取概

攬十斤敲

損入沙鍋

煮數滾去

核入石目

夫小兒初出腹骨氣未斂肌肉未成猶尙是血凝則堅而成肌肉也書云如

水上之泡草頭之露夫初生一臘之內天地八風之邪豈能速至良由在胎

之時母失愛護或勞動氣血相于或坐臥飢飽相投飲酒食肉冷熱相制恐

怖驚撲血脉相亂蘊毒于內損傷胎元而降生之後故有胎熱胎寒胎肥胎

怯胎驚胎黃諸症生焉外因浴洗拭口斷臍灸顙之不得法或綁抱驚恐乳

哺寒溫之垂其宜致令噤口臍風銷肚不乳等症病而致此亦難治療良可

哀憫小兒雜病諸方悉陳于後

胎熱 胎寒 胎肥 胎怯 胎黃 胎驚 鎖肚 不乳 臍風 撮口

噤風 客忤 不尿 夜啼 中惡 天弔 鷺口 口瘡 重舌 木舌

弄舌 牙疳 吃泥 丹毒 赤遊 喉痺 乳蛾 眼疾 耳聾 鼻瘡

頭瘡 臍瘡 蟲痛 尾骨痛 陰腫 疝氣 盤腸 氣痛 脫肛 遺尿

尿濁 便血 下淋 吐血 衄血 小便閉 大便秘 水腫 黃疸 汗症

解顙 鶴節 行遲 諸遲 語遲 齒遲 龜胸 龜背 滯頤 顙陷

顙填 手拳 膝拳 痘瘡 麻疹

擗爛仍入

原湯煎膩

出汁易水

再煎煎至

無味去渣

以汁共歸

一鍋煎濃

成膏用白

明礬八錢

研粉入膏

攪和每日

早晚各取

膏三錢開

水送服或

胎熱

○一論胎熱因母孕時食熱毒之物過多令兒生下身熱面赤眼閉口中氣熱焦啼燥渴或大小便不通法當漸次解熱先令乳母服藥見服乳即解決不可速効以涼藥攻之必致嘔吐而成大患也慎之慎之

釀乳方

生地黃

一錢澤瀉二錢

猪苓

去黑皮

赤茯苓

去皮

天花粉

各一錢半

茵陳

甘草

各二錢

右劉散每服三錢水一盞煎七分令乳母捏去宿乳却服藥少頃乳之

胎寒

○一論胎寒乳母孕時受寒生下再感外邪令兒面色青白四肢厥冷大便青黑口冷腹痛身起寒慄等症即宜當歸散服之

當歸散

當歸炒

黃芪

蜜炙

桂心

黃芩

細辛

龍骨

細研

赤芍

各二錢

初起輕者

取椒檳咬

損一頭離

禁未入口

嚼噉椒檳

之味更美

至瘡乃止

○

吐血立

瘡方○

凡吐血多

者覓三四

兩重大當

歸一隻全

右為末每服一字以乳汁調下日進三服仍看兒大小加減

胎肥

○一論胎肥小兒生下肥肉厚徧身血色紅滿月以後漸漸羸瘦目白睛粉紅色五心煩熱大便難時時生涎當浴體更別父母肥瘦肥不可生瘦瘦不可肥

胎怯

○一論胎怯小兒面無精光肌肉薄弱大便白水身無血色時時硬氣多噦目無精彩宜以浴體法主之

浴體法

天麻末二錢 蝎稍去毒

朱砂各半錢 白礬

青黛各二錢

烏蛇肉二錢酒浸焙為末

麝香一字

右同研勻每用三錢水三碗桃枝一握并葉五七箇同煎至十沸溫熱浴之

浴時勿浴背

用切細取
好陳酒一

斤漫火煎

至一滿椀

頓於鍋中

以溫為妙

候將要吐

尚未吐口

中有血含

住取藥一

口連血嘔

下即此一

劑而瘡後

不再發旬

胎黃

○一論胎黃者皆因乳母受熱而傳於胎也見生下遍體面目皆黃狀如黃金
色身上壯熱大便不通小便如梔子汁乳食不思啼哭不止宜以地黃湯主
之

生地黃

赤芍

川芎

當歸

天花粉

猪苓

澤瀉

赤茯苓

茵陳

甘草各等分

右剉每服五錢水煎食前乳母服并略滴些少與兒口中

胎驚

○一論胎驚者由胎婦調適乖常飲食嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或
外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下即病也其候月內溫壯奮眼握拳噤
口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搖擗驚啼腮縮顙開或頰赤或面青眼合其有
著噤撮口之類亦此一種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯

者醫家吐

云吐血尚

要戒酒豈

可酒煮當

歸而服服

則血噴不

止如之何

殊不知當

歸二字之

解當者當

其時歸者

引血歸經

也全用定

血此方乃

青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出外者不治治宜解散風邪利驚

化痰順氣青金丸主之慎不可作慢驚而用溫藥也

青金丸

人參

天麻煨

白伏神去皮

白附子炮

牛膽南星各二錢

青黛一錢

朱砂水飛半錢

麝香一分

甘草炙一錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大用鈎藤皂莢子煎湯研化不拘時服

鎖肚

○一論鎖肚者由肚中受熱毒壅盛結於肚門大小便閉而不通腹脹欲絕者

急令婦人以溫水先漱了口吸咂兒前後心并臍下手足心其七處每一處

凡三五次漱口吸咂取紅赤為度須臾自通不爾無生意若有此症知此法可得再生

不乳

○一論不乳者謂初出胞胎而不吮乳也嬰兒初出胎時其聲未發急以手拭

其口令惡血淨盡不得下咽即無他病若拭口不全惡穢人腹則令腹滿氣

余家世傳

活人多多

從無一誤

短不能吮乳或產母取冷過度胎中受寒致令兒腹痛也宜用

茯苓丸

赤茯苓去皮

川黃連夫毛

枳殼去穰炒各等分

右為末煉為丸如梧子大每服一丸乳汁化下

痰中有

立方○

活雄鴨一

百隻每日

清晨空腹

時以一隻

殺血碗內

即取呷嚙

忌加鹽百

日而食百

撮口

○一論撮口者由胎氣挾熱風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青聚口啼

聲不出者當視其齒齦之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸青熟綿布裹

手指輕輕擦破即開口便安甚者用牛黃三分竹瀝一蜆殼調勻滴入口中即愈

噤風

○一論噤風者眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐白沫

大小便皆通自滿月一百二十日見此名曰犯風噤可急看兒上脘有點子

先以指甲輕輕刮破次服定命散如口噤不開諸藥不效者生南星去皮臍

研為極細末龍腦少許和勻指蘸生姜汁於大牙齦上擦之立開凡臍風撮

鴨之血不

可隔斷食

完全瘡○

瀾血頭

痛如裂

方○

當歸一兩

酒一斤煎

成一椀一

服即瘡○

遍身瘡

痛方○

當歸肉桂

延胡索天

口噤風三者雖異其受病之原則一也大抵裏氣鬱結壅閉不通並宜服淡

豆豉汁與吃取下胎毒千金云小兒初生其氣高盛若有微患即須下之若

不下時則成大疾難為療矣紫霜丸量而與之

定命散

治初生小兒口噤不開

蟬退

十四箇
去紫脚

全蝎

十四箇
去毒

右為細末入輕粉少許和勻乳汁調乳服

臍風

○一論臍風多因斷臍為風濕所乘或者胎元有熱毒則兒下胎時視其臍必

硬直定有臍風必自臍發出青一道行至肚却生兩岔行至心者必死於青

筋初發急用燈心蘸香油內燈於青筋頭并岔行盡虛燬之以截住不致攻

心更以艾灸中脘三壯內服萬億丸二三粒以泄其胎毒也

○一治小兒臍風撮口用完全生葱搗汁用直姜蚕三箇研末調塗母乳頭上

令兒吮之或用乳調蚕末灌之兒口即開

一治臍風撮口用田螺搗爛入麝香一分再搗塗臍上立効

麻等分爲
經驗五通膏治小兒臍風撮口

末酒送五

服瘡○

手足骨

筋疼痛

方○

熟地四兩

搗爛浸入

滴花燒酒

二斤隔湯

煨熱以竹

筋攪勻候

冷隨量日

飲至瘡取

生地黄 生姜 葱白 蘿蔔子 田螺肉 各等分

右共搗爛搭臍四圍一指厚抱住候一時許有屁下泄愈

○一治臍風用螻蛄一條將尾鬚二根剪斷自然出水滴入臍內少頃即愈其

蟲只在多年墻孔內取人家水缸底亦有

一秘方治臍風撮口 姜蚕末三分 牛黃六厘 冰片

麝香各一厘 先將姜蚕搽上次將片麝用蝦蟆胆抹之

一小兒犯撮口風荷包風鵝口風臍風等項并牙齦邊生白點名爲馬牙作痛

啼哭不吃乳即看口內堅硬之處或牙齦邊白點將針挑破出血用好墨調

薄荷湯以手指攪過再用其母油髮蘸墨徧口擦之仍用青絹蘸新汲井水

客忤

○一論客忤者初生兒因別房異戶外人來氣息忤之一名中人是爲客忤也
及家人或乘馬行得馬汗氣息或衣染穢暴之氣未盟洗易衣便向兒邊皆

所浸熱地

過酒○

箭風痛

方○

延胡索桂

心五靈脂

木香白芷

防風各一

錢酒煎食

遠服三日

三服瘡○

雷頭風

方○

諸藥不瘡

令忤也小兒衣布帛中不得有頭髮履中亦爾白衣青帶青衣白帶皆令中忤亦能驚兒致病欲防之法從外來所忌之物當將避之勿令兒見慎護一歲之內方無忌也

不尿

○一論小兒初生不尿者皆因在胎之時母食糟煎炙等毒之物熱氣流入胎中兒因飲血是以生下肚腹膨脹腎腫如覺臍四傍有青黑色及口撮即不可救也如有青黑色不飲乳者服葱乳湯
葱白切作四散用乳汁半小盞同煎片時分作四次服即通不飲乳者即飲

夜啼

○一論小兒夜啼者此是邪熱乘心也宜

化火膏 用燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

○一治小兒觸犯禁忌而夜啼者宜醋蒸蘇合丸

○一方用火柴頭一箇長四五寸削平一面朱砂寫云撥火杖撥火杖差來捉

之證惟用

山羊矢炒

炭研粉酒

送二錢立

效○

偏正頭

風方○

白芷三錢

天麻一錢

磨細防風

荆芥錢半

煎水衝服

○

疳膨食

神將捉著夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○又方治夜啼不止用朱砂書甲寅二字貼床頭即止

○一治小兒夜啼用竹園內無葉之竹名爲仙人杖取三尺於兒睡處勿使人知即時愈

○一治小兒夜啼不止作心經有熱有虛治

安神散

人參

黃連

姜汁炒各一錢

甘草五分

右剉竹葉二十片生姜一片

水煎服○一方治驚啼用亂髮燒灰酒調服

○一論小兒夜啼狀若鬼祟

蠟退七箇半截爲末初生抄一字薄荷湯入酒少許調下或者不信將上半

截爲末依前湯調下復啼如初古人立法莫知其妙

○一治夜啼用朱砂筆寫在小兒臍上

子

臍

午

○一治夜啼用尿潑杓水洗淨莫令人知覆在兒床下即止

中惡

積方○一論中惡天弔者胃犯邪氣也小兒卒中惡毒心腹刺痛悶亂欲死等症

雞裏金三 辟邪膏 治中惡 降真香 白膠香 沉香

十箇忌經 虎頭骨 鬼臼 龍胆草 人參 白茯苓 去皮各五錢

水瓦上炙 右為細末入雄黃五錢麝香一錢煉蜜為丸乳香湯下

無臭氣成

炭存性磨

粉車前子

四兩炒磨

粉二物和

勻以米糖

鎔化與食

食完全瘡

忌食炒豆

熬油結硬

天弔

○一治小兒天弔潮熱

鈎藤散

鈎藤

人參

犀角

鑄屑各五錢

全蝎

各二分

天麻各二分

炙甘草

四劑水煎服

鵝口

○一論小兒鵝口口瘡者胃中濕熱也小兒口中百病鵝口口瘡重膳不能吮

乳及咽喉腫塞一切熱毒

牛黃散

牛黃

冰片

硼砂

辰砂

研各一分

雄黃

青黛各二分

牙硝一分半

黃連末八分

黃柏末八分

等物通治

傷目○

又方○

田雞白水

煮熟薑末

少許淡食

至瘡乃止

○

閃頸促

腰方○

礪砂研粉

以骨簪蘸

津黏粉點

兩目淚出

右其入乳鉢內研勻每用少許傳入口內

○一治小兒鵝口不能食乳用地龍搗水塗瘡即愈即塵蟲也

口瘡

○一治口瘡

瀉心湯

用川黃連淨為細末每服一字蜜水調下

○一論小兒口舌生瘡乃心脾受熱口瘡赤心臟熱口瘡白脾臟冷口瘡黃脾

吳茱萸末醋調傳脚心移夜即愈藥性雖熱能引熱下行其功至良

○一論治小兒滿口白爛生瘡口糜

白木 猪苓 澤瀉 木通 生地 赤苓 肉桂 甘草 各等分水煎

服

○一論小兒白口瘡 黃丹巴豆仁同炒焦去豆用丹摻瘡上立已

咽喉并口瘡 我也有妙方 白礬二錢許 礪砂一錢強

咽痛用吹入 口瘡蜜調當 一次若不愈 再用保安康

稱熱連點

三次立時

全瘡○

赤眼淹

纏方○

杜仲厚朴

桑白皮檳

榔各一錢

取雄雞肝

一箇忌經

水去紅筋

入白酒釀

六兩隔湯

頭熱去渣

重舌

○一論重舌者脾經實火也小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰重舌及唇口兩傍生瘡

當歸連翹湯 治重舌

歸尾

連翹

白芷

各三錢

大黃

煨

甘草

各一錢

右剉作二劑水煎食後頻服

○一方治重舌用蒲黃塗之○一方用胆礬研細敷之

○一治小兒重舌木舌乃舌下生舌也

用三稜針於舌下紫脉刺之即愈又宜竹瀝調蒲黃末敷之舌上

○一治小兒絆舌用布針舌下針數下以唐雞屎一搽即愈

○一治小兒絆舌不語啼哭用布針蘸桐油燒紅針下頰挨骨邊一針即已

木舌

○一論木舌乃舌腫硬不柔和脾經右實火也

以湯肝食 瀉黃散 治木舌弄舌 藿香葉 七分 山梔 一錢 軟石膏 五分 防風 四分

下隔兩日 甘草 七分半 右剉一劑水煎不拘時服

再服三次 百草霜 芫硝 滑石 為末酒調傳之

全瘳○

胃脘痛

弄舌

方○

○一論小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用補脾散補之舌舒長而收

活乳汁草

緩名吐舌乃心脾積熱少用前瀉黃散主之兼口舌生瘡作渴飲冷胃經實

即蒲公英

熱用瀉黃散作渴畏冷屬脾經虛熱用四君子湯食少作渴或大便不實脾

放瓦上炙

胃虛弱也用吐瀉門七味白朮散若午後甚者脾血虛也四物湯多加參朮

枯黑存性

茯苓末應用內傷門補中益氣湯大病未已而弄舌者凶

研末每取

弄舌微微露胃收 得於病後最難瘳 出長收緩名舒舌

五分燒酒

熱在心脾不用憂

調九口含

補脾散 治弄舌

人參

白朮 去苦各一錢 白芍 酒炒

再以燒酒

白茯苓 各八分 陳皮

川芎 各六分

黃芪 蜜炙 當歸 酒洗

送嚙痛息

接服五日

全瘡戒食

生冷○

又方○

紅坊內好

紅花四分

棗頭十枚

水二椀煎

至棗熟去

花食湯棗

連服二十

日永遠除

根○

甘草炙各四分

右剉每劑三錢生薑煎服

牙疳

○一論牙疳者陽明之熱也小兒齒腫流涎腮腫走馬牙疳等症

清胃升麻湯

升麻

川芎

白朮

白芍

半夏湯泡各七分

乾葛

防風去芳

黃連酒炒

生甘草各五分

軟石膏煨一錢

白芷三分

右剉水煎熱服能漱即含漱而吐之漱藥不用白朮半夏

○一治小兒走馬牙疳一時腐爛即死用婦人溺桶白垢火煨一錢許入銅錄

三分麝香一分半敷之立効

立効散 治走馬牙疳

青黛

黃柏

枯礬

五倍子各一錢

右為細末用米泔水先漱口內摻入患處

○一論小兒走馬牙疳牙齦臭爛侵蝕唇鼻先用甘草湯洗皮令血出塗之亦

理身上肥瘡但是疔瘡用之立効

夢遺方

玉蟾散

蚶皮即蝦蟇不鳴不跳者是用黃泥畏火煨焦二錢半黃連二錢半

青黛二錢麝香少許右為細末濕則乾摻乾則香油調抹之

六味地黃

湯減去澤

葛增龍骨

三錢生研

水飛蓮鬚

一兩芡實

二兩線膠

四兩用杜

蠟熟粉炒

膠成珠去

嚼磨粉同

前藥蜜丸

吃泥土

○一論小兒愛吃泥土乃脾虛胃熱所致面色青黃或是蟲動此藥皆治若不

急療癖症生焉

清脾養胃湯

軟石膏

黃芩

陳皮

白朮去苦

白茯苓去皮甘草

胡黃連

使君子去殼

右劉等分水煎溫服或為細末放干飲食內令兒服之

黃金餅 治好吃泥土

乾黃土為末濃煎黃連汁和為餅服之立愈

丹毒

○一論小兒丹毒赤腫風熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶咽喉腫痛九道有血妄行偏身丹毒及痘瘡已出未出不能快透或已出熱不解急宜服

每日早晚

犀角消毒飲

牛旁子

荆芥穗

防風

黃芩各一錢

各取四錢

犀角鎊

甘草各五分

右剉水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

鹿含草煎

泥金膏

治丹毒赤遊風

湯送服

陰地上蚯蚓糞熟皮硝蚯蚓糞三分之二共一處研細新汲井水濃調厚

白濁方

敷患處乾則再上

牛舌頭草

喉痺

根即野甜

○一論小兒喉痺曾厭兩傍腫者為雙乳蛾易治一傍腫者為單乳蛾難治乳

菜又名禿

蛾差小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫透於外名纏喉風喉痺暴發暴

菜根近水

死者名走馬喉風宜後方

池處最多

甦危湯

主方

桔梗二錢

山豆根一錢

牛旁子一錢

荆芥穗八分

煎湯當茶

玄參八分

升麻三分

防風八分

生甘草一錢

竹葉五箇

飲或以湯

水煎頻服外用硼砂一味噙化嚥下降痰消腫

煮粥喫至

○碧雪

碧雪真青黛

硼砂與焰硝

盆過

蒲黃甘草末

俱生

等分摻咽喉治

瘡乃止○ 咽喉腫痛水漿不下或生瘡重舌木舌

欬嗽神 ○ 一治喉痺乳蛾氣絕者即時返活

效方○ 單乳蛾用巴豆一粒去殼打碎入綿蠶殼內塞鼻在左塞左在右塞右若雙

杏仁一兩 乳蛾用二粒塞兩鼻

泡去皮尖 ○ 一喉痺乳蛾風口舌生瘡用黑牛胆一箇入生白礬末二兩銀硃五錢入胆

內有雙仁 內陰乾取出研末每少許吹入喉內神效

眼疾

研捶將杏 ○ 一論小兒兩眼腫痛上焦火盛也

仁搗爛如 吹鼻散 暴病赤痛

乳香 沒藥各五分 雄黃三分

泥分為三 火焰一兩 黃丹水飛一分 右為細末每少許吹兩鼻孔

服每內加 ○ 一論小兒未周患兩眼腫痛

冰餽三錢 拔毒膏 用黃連為末水調敷脚心手心自愈如腫痛難開加姜黃牙皂朴硝

共入薑梘 為末同敷太陽穴手心足心加葱搗爛敷之尤妙

用泉水煎
一治小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火上炎也宜用

一治小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火上炎也宜用

一治小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火上炎也宜用

一治小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火上炎也宜用

連杏仁末

服下早晚

各一次三

服而瘡如

以杏仁同

煎無效○

天絲入

目方○

捉肥蟲二

十餘將蟲

耳疾

一論小兒耳腫耳痛耳停乃三陽風熱壅遏所致宜升陽散火湯加黃柏知

母晚服兼服金花丸

一論小兒耳熱出汗作痒乃痰也腎火上炎也宜用

清腎湯

防風

天花粉

貝母

黃柏 鹽水炒 白茯苓

玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏 泡各五分

生甘草 二分

生姜 三片 水煎服

一治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合猪脂敷之

令人仰臥
捏蝨血滴
入眼內少

刻天絲灰
抱蝨血而
出○

塵屑入
目方○

吐津於石
硯上以人
指甲磨濃

汁用骨簪
蘸點眼內

不一刻一

○一小兒患潰耳出膿水成瘡以蚯蚓糞末吹耳中
○又方治膿耳

羽澤散

枯礬為末少許吹入耳中即止

○一方用五倍子燒存性為末吹入耳亦効

○一方用泡出雞卵殼炒黃色為細末香油調灌耳內即時痛止

鼻瘡

○一論小兒鼻瘡熱壅傷脾肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍瘡濕痒爛是名鼻匿其瘡不痛汗所流處又成瘡澤瀉散注

澤瀉散 治鼻瘡

澤瀉

鬱金

山梔仁

甘草

炙各一錢

右為細末用甘草煎湯調食後臨臥服

○一治久患鼻瘡膿極臭者用百草霜研細每服五分冷水調服

抹而出○

跌打骨

斷方○

綠礬一斤

煎湯粗紙

浸透裏傷

處手執燈

心然火不

住紙上灸

紙溫即易

火熄換然

再灸二者

相際效速

斷骨處用

頭瘡

○一論小兒頭生肥瘡或多生虱子搔痒成瘡膿水出不止

一掃光

細茶

一錢口

水銀

入茶內研一錢

牙皂

花椒各二錢

為末香油調搽

○一小兒瘡痛經年不瘥者

白礬

二錢

胡粉

一兩

水銀

一兩

黃連

一兩半

黃芩

一兩

大黃

一兩半

苦參

一兩半

松脂

一兩半

蛇床子

十八粒

右為細末以臘月猪脂和研水銀不時敷之

○一小兒頭瘡胎毒諸風熱惡瘡痘瘡

黃柏

黃連

白芷

五倍子

各等分

右為細末用井花水調稀稠得所塗開在碗內覆架兩磚上中空處灼艾煙

薰蒸以黑乾為度仍取下前藥再研作末清油調塗如有虫則用煎油調搽

立効

竹片綁紮
七日全瘡

冷哮方

淡豆豉一

兩白礮一

錢皆為末

用飯三錢

研爛入末

為丸如蘿

蔔子大每

取七粒白

湯送下童

○一小兒頭生禿瘡用通聖散酒拌除大黃另用酒炒其為末再以酒拌焙乾
每服一錢水調服外以白炭燒紅淬入水中乘熱洗之更以胡荽子伏龍肝
懸龍尾黃連白礮為末油調敷之

臍瘡

○一論小兒因剪臍外傷於風邪以致臍瘡不乾用

礮龍散

枯礮

龍骨煨各五分

其為細末每用少許乾摻臍上

○一小兒臍中汁出并痛用枯礮末乾敷○又方黃柏末敷之○又方蚕鹽殼
燒灰存性摻之亦可

虫積

○一論小兒蟲積痛凡腹疼口中出清水者蟲積也

追蟲散

使君子二錢
檳榔一錢

作一劑水煎食遠服

子服可除

使君散

使君子

去殼一錢

檳榔

一錢

雄黃

五分

根有年者

經寒即發

服可把定

不啼

腸紅方

右為末每服一錢苦煉根皮煎湯調下

○一治小兒蟲積腹痛用巴豆一枚去殼槌去油以朱砂一粒同研勻用雞子

一箇開頂微去白入藥在內攪勻仍將紙糊口用稗圈坐於鍋內水煮熟令

兒食之或以茶清送下即打下所積蟲效極捷

○一治小兒吐蚘蟲

蚘蟲出口有三般 口鼻中來大不堪 如或白蟲兼黑色

取花椒子

炒磨粉每

服三錢用

靈丹縱服病難安

練陳湯

苦練根皮 二錢

陳皮

半夏 姜炒

白茯苓

去皮各一錢

甘草 五分

黃糖拌白

右劉一劑生姜煎服

湯送下服

至癩止

○一女子肚大腹脹蟲積瘦弱用馬慈一名地梨食之打下虫來肚腹立消

○一治小兒冬月吐蚘蟲多是胃寒胃虛所致

胃寒嘔

錢氏白朮散

人參

白朮

去苦

白茯苓

去皮

藿香

吐黃水

方○

生薑一斤

擣取汁椀

許入廣膠

乳香沒藥

末各五錢

同煎膠化

離火取藥

攤作三四

大膏令貼

胃脘痛處

以絹紉縛

三箇時然

木香

乾葛

甘草各二錢

丁香二粒

每服三錢水煎服

尾骨痛

○一論小兒尾骨痛者乃是陰虛痰火所致也

滋陰化痰湯

當歸酒炒

川芎

白芍酒炒

熟地黃

黃柏酒炒

知母酒炒

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

甘草各等分

右剉少用官桂為引或以前胡木香為引如痛不止加乳香沒藥

陰腫疝氣

○一論小兒陰腫疝氣者寒邪所鬱也五倍子燒存性為末好酒調服出汗而愈

○一治疝氣偏墜腫痛不可忍者槐子炒為末每服一錢入鹽三分黃酒調下立止

○一治小兒疝氣小腹引腰脊彎曲身不能值

京師傳

青皮

陳皮

三稜

莪朮炮

木香

檳榔

後取周歲

孩鞋兩隻

鑊上烘極

熱輪馭馭

至膏硬再

易膏貼再

鄉三時馭

至瘡而止

後服慙胃

丸○厚朴

三斤切片

蘆三斤蘆

帶原皮五

升水煮去

川練肉

莖花

醋炒各五錢

辣桂

牽牛

生取末各三錢

巴豆肉

不去油一錢

右為細末麩糊為丸如麻子大每三丸空心一服午前一服薑湯下

○一治小兒陰囊忽腫或坐地多時或風邪或蟲蟻吹者

蟬退半兩水一大碗煎湯洗腫處其痛立止若不消再煎再洗內服五苓

散燈草煎服 方見中暑

○又方用葱園內蚯蚓糞以甘草汁調塗腫處或薄荷汁調亦可

盤腸氣

○一論小兒盤腸氣者則腰曲乾啼額上有汗是小兒為冷氣所搏而然其口

閉脚冷或大便青色不實上唇乾者是也此多因生下洗遲感受風冷而致

也急用葱湯淋洗其腹揉葱熨臍腹間良久尿且湧出其痛自止

乳香散

治盤腸氣痛

乳香

沒藥

各等分

其為細末以木香煎湯調服

脫肛

蘆留朴焙

乾生甘草

二兩乾薑

四兩依前

再煮煮乾

去草留薑

朴炒燥共

為細粉黑

棗薑湯煮

取棗擣為

丸曬乾服

○

翻胃初

起法○

○一論小兒脫肛皆因久患瀉痢所致大腸頭自糞門出而不收是也月葱湯

薰洗令軟送上或以五倍子末敷而頻托入又以五倍子煎湯先之亦可

○又方以鱉頭燒存性為末香油調敷一云以此物燒烟薰之久久自收

○又以陳壁土泡湯先薰後洗亦効

提氣散方見脫肛門治小兒肛門脫下極効

遺尿

○一論小兒遺尿失禁者膀胱冷弱也

益智仁七箇桑螵蛸七箇為末酒調服用熟白果七箇送下

故紙散 用破故紙炒為末每服一錢熱湯調下

○一治小兒遺尿六味丸加破故紙益智仁人參肉桂

○一治小兒睡中遺尿不自覺者

官桂為末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下每日進三服

○一治小兒遺蠶用枯礬牡蠣煨等分為末米湯調下

陳皮土炒

黃皮起炮

為粉每空

心服三錢

○

烏沙瘕

方○

丁香雄精

蒼朮硃砂

各等分為

末取蟾酥

亦等分切

片酒浸研

漿和前末

尿濁

○一論小便尿濁澄之如米泔水也

澄清飲

白朮 去苦

白茯苓 去皮 白芍炒

黃連 姜汁炒 澤瀉

山查 去子 各錢 青皮 四分

甘草 生五分

右剉一劑水煎空心服

○一治小兒尿濁如米泔水

江南做酒小麴炒為末每服五分調酒下三服效

便血

○一論便血者熱傳心肺也凡初生嬰兒七日之內大小便有血出者此由胎氣熱盛之所致也謂母食酒麴炙燻熱毒等物流入心肺兒在胎內受之熱毒亦傳於心肺且女子熱入於心故小便有之男子熱入於肺故大便有之治法生地黃取自然汁入蜜少許和勻溫服男女皆效

搏為丸如
芥子細曬
乾藏貯每
取七粒溫
茶送嚥立
甦○
水瀉立
瘡方○
焦白朮蒼
朮各二錢
山槿厚朴
廣陳皮土
炒黃芩各
一錢車前
○一治小兒吐血不止

○一方用生蒲黃油頭髮燒灰各一錢為末生地黃汁或米飲乳汁調同服

下淋

○一論小兒下淋乃膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁或如砂石或

冷淋如膏如熱淋尿血

五淋散

赤茯苓去皮二分 山梔子二分 條芩三分 當歸

甘草各五分 一方加生地澤瀉木通滑石車前子各二分

右剉一劑燈心一團水煎溫服

吐血

○一論小兒吐血衄血下血宜用

黃金丸

黃芩不拘多少為末煉蜜為丸如雞頭實大三歲兒每一丸塩湯化下

二錢焙搗

同煎

黃連末一錢淡豆豉二十箇水一盞煎六分去渣溫服量兒大小加減

○一治吐血衄

大麻風

柏枝散

柏枝晒乾

藕節晒乾

各等分爲末三歲兒服半錢藕汁和蜜一匙白

用粗如酒

湯調下

杯之蛇一

條竹刀破

腹去雜切

寸段取瓦

放於炭火

上以蛇段

豎放瓦上

蛇段跌倒

者無毒棄

便閉

○一小兒初生大小便不通腹脹欲死急令人以溫水漱口淨口吸啞兒前後心并臍下手足心共七處每一處凡三五次漱口吸啞取紅赤爲度須臾自通不爾則無生意

○一論小兒小便不通者膀胱火盛也

神通散

小便閉澁不堪言 爲用兒茶末一錢 篇蓄煎湯來送下

霎時溲便湧如泉

之其不倒
者有毒用
○一治小便不通腹脹欲死野地蒺藜子不拘多少倍黃色爲末温酒調服通

炙存性磨
○又方用火麻燒灰酒調服
○一論小兒大便不通者臟腑有毒也小兒風與熱滯留蓄上焦胸膈高起大便不通

沒藥散

沒藥

大黃

枳殼炒

桔梗各二錢木香

甘草各一錢右剉每二錢姜三片水煎服

白毛鴨一

隻與食次

日鴨毛盡

脫殺鴨石

鍋內煮爛

勻作四五

日食凡食

鳴第一頓

其腫者更

○一治新生小兒二三日不大小便用葱汁人乳各半調勻抹在口中同乳帶下即通

○一掩臍法治小兒大小便不通

取連根葱白一莖生姜一塊淡豆豉二十粒鹽一小匙同研爛捏作餅子貼

臍中烘熱貼之用絹帛扎定良久氣透自通不通再易一餅

二妙散○ 六七月間尋牛糞中有蟻螂不拘多少用線穿起陰乾收貯用時

取一箇要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上

半截小便閉用下半截二便俱閉全用爲細末新汲水調服

腫滿

腫第二三

頓牧小食

完而瘡潰

爛不堪及

初起未爛

者治法同

效○

狗咬方

○

番木鱉切

片瓦上炙

炭存性研

末撒上二

三日可以

○一論小兒腫滿土虧水旺也并四肢腫滿陽水陰水皆可服

加味五皮散

五加皮

地骨皮

生姜皮

大腹皮

茯苓皮

錢各一

加姜黃

木瓜

各一錢

剉散水煎服○一方去五加皮加

陳皮桑白皮

○一治小兒諸般腫脹

黑牽牛半生半炒取頭細末每服一二匙桑白皮煎湯磨木香汁調服

黃疸

○一論小兒黃疸寒熱嘔吐而渴或飲冷水身體面目俱黃小水不利不得安

臥不思飲食

茯苓滲濕湯

茯苓

茵陳

山梔

黃連

黃芩

防己

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳殼

猪苓

各一錢澤瀉

水煎徐徐溫服○如

小便不通加水通如傷食不思飲食加神曲麥芽砂仁

收功如爛

潰日久者

半月收功

○

小兒冷

疔方○

小兒面黃

腹大名曰

冷疔證多

不瀉食多

吐用丁香

七枚研末

乳蒸三四

次瀉湯頓

汗症

○一論小兒盜汗潮熱往來

胡黃連柴胡各等分爲細末煉蜜爲丸如雞頭子大每一丸至三丸銀器中用酒少許化開更人水五分重湯煮二三十沸放溫食後和渣服

○一治小兒虛汗或心血液盛亦發爲汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸各三錢

右細剉用雄猪心一箇切三片每服二錢猪心一片并水一盞半煎食前作兩次服

○一治小兒盜汗因食生冷之物過多或熱水淘飯大能損土爲水之所傷則不能制其津液故成汗自出也

牡蠣

煨二錢 黃芪 蜜炙

生地黃 各一兩

剉散水煎服

○一治小兒盜汗用五倍子爲末津液調塗臍中一宿卽止○又方用何首烏

爲末津液調塗內効

服若吐瀉

相兼者橘

紅分等蜜

丸如黃豆

大米湯下

不瀉僅吐

者半夏薑

湯浸蒸臞

乾磨粉對

丁香橘紅

末薑汁糊

九薑湯送

下吐立止

解顛

○一論小兒解顛者生下顛門不合也長必多愁少笑目白睛多面色眊白肢體消瘦皆腎虛也

○一治小兒顛顛開解頭縫不合此乃腎氣不盛腎主骨髓而腦髓海腎氣不盛所以腦髓不足故不能合○丹溪治解顛以八物湯有熱加酒炒黃連生黃芩甘草水煎服外用布帛緊束及以白芩末傅之

人參地黃丸

人參二錢

懷熟地黃四錢

嫩鹿茸

山藥

白茯苓

去皮 牡丹皮

山茱萸

酒蒸去核各三錢

右為細末煉蜜為丸如芡實大用人參煎湯研化食遠服

鶴節

○一論小兒鶴節因血氣不充故肌瘦薄骨節呈露如鶴之膝

雷歸地黃丸

懷熟地黃

酒蒸八錢

山茱萸

酒蒸乾山藥

小兒蟲

證方○

檳榔六兩

黑牽牛仁

二兩白牽

牛仁二兩

為未用烏

梅兩枚花

椒三十粒

煮湯吞服

二錢如腸

鳴久瀉用

青皮棟樹

根肉蒸透

澤瀉去毛

牡丹皮去梗

白茯苓去皮

當歸酒洗各二錢

一方加鹿茸酥炙

朱膝去苦酒洗名二錢

右為細末煉蜜丸艾實大每用熟水研化食前服仍以天南星炮去皮臍研細末入米醋調敷絹帛上烘熱貼之亦良法也

行遲

○一論小兒行遲肝腎虛弱骨髓不充不能行步

加味地黃丸

懷熟地黃八錢

山藥四錢

山茱萸酒蒸去核四錢

白茯苓去皮

牡丹皮

澤瀉各三錢

嫩鹿茸酥炙二錢

懷牛膝去苦酒洗三錢

五加皮三錢

右為細末煉蜜為丸黍米大每服一錢空心鹽湯送下

○一論小兒稟受元氣不足顛顛開解肌肉消瘦腹大面腫語遲行遲手足如筒神色昏慢牙齒生遲諸虛

調元散

乾山藥五錢

人參

白茯苓去皮

白茯苓去皮木各二錢

白朮去芦二錢

石菖蒲一錢

白芍藥炒

熟地黃

罐乾再蒸

白饴拌每

服一錢○

夜啼兒

方

因穿蓋過

暖竝父母

同牀熱極

所致諺云

若要小兒

安當帶二

分飢與寒

取雞矢塗

兒臍中男

當歸

川芎

黃芪

蜜炙各二錢半

甘草

炙一錢半

右劉姜棗煎不拘時服嬰兒乳母同服

語遲

○一論小兒語遲者心氣不足也

菖蒲丸

石菖蒲

人參

麥門冬去心

川芎

遠志

甘草水

當歸

乳香

朱砂另研各一錢

右為末煉蜜為丸黍米六每服十九食遠梗飲送下

齒遲

○一論小兒齒遲者腎不足也

芎藭散

川芎

乾山藥

當歸

白芍

炒

甘草

炙各二錢半

右為細末每服二錢白湯調下食後服將此乾藥末擦牙齦即生

雌女雄最
妙或用真

龜胸

犀黃飛硃
砂各五釐

○一論小兒龜胸者因肺熱脹滿攻於胸膈即成龜胸也又云綠乳母食麩熱物五辛轉更胸起高也

研和塗舌

龜胸丸

川大黃煨六分

天門冬去心 百合

杏仁去皮尖麩炒

上立止○

木通

去節

枳殼麩炒

桑白皮蜜炙

甜葶藶隔紙炒

軟石膏各一錢

砂雪丸

○急漫驚風

右為細末煉蜜為丸菘豆大每服五丸溫水化下食後臨臥服仍宜灸兩耳前各一寸半上兩行三骨罅間六處各灸三壯春夏從下灸起秋冬從上灸起依法灸之

用青蒿節

龜背

開蟲狀如

小蠶七月

○一論小兒龜背者由兒生下風邪客入於脊入於骨髓致成龜背也龜胸龜

內有久亦

背並用龜尿點其骨節自愈取龜尿法用青蓮葉安龜在上用鏡照之其尿自出

成蛾將蟲

龜背丸

枳殼麩炒

防風去節

獨活

大黃煨

七箇擣和

硃砂輕粉

各五分丸

粟粒大一

歲一丸乳

汁調服詩

云一半硃

砂一半雪

其功全在

青蒿節任

教死去也

還魂服時

須用親娘

血○

前胡去苦

當歸

麻黃去節各三錢

右為細末麪糊為丸如黍米大每服十五六丸看兒大小以米湯下食後服
 仍灸肺俞穴在椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在
 七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節為一寸艾炷以小麥大灸五壯愈
 ○一治小兒龜背兒生下客風入脊遂於骨髓即成龜背治以龜尿點骨節即
 平取龜尿法用連葉置龜于上尿自出

諸遲

○一論小兒行遲齒遲解顛顛填五軟鶴膝腎疳齒豁睛白多愁凡此皆因稟
 受腎氣不足當以六味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御女以通多致頭
 目眩暈作渴吐痰或發熱作熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾
 難以名狀余常用六味丸八味二丸及補中益氣之劑加減用之無不奏效
 ○一小兒五歲不能言咸以為廢人矣但其形瘦痿乃肺腎不足遂用六味丸
 加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發一二言

啞驚丹 至年許始聲音明朗 方見補益

方○

天竺黃二

錢麝香犀

黃各四分

雄黃一錢

琥珀六分

殭蠶一錢

陳膽星四

錢各為末

用甘草鈞

藤鈞煎膏

為丸硃砂

一錢為衣

滯頤

○一論滯頤乃涎流出而潰于頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎自流不能收約法當溫脾為主宜服

溫脾丸

半夏

姜汁炒

木香 五錢

丁香 二錢

白姜

炒五錢

白朮

去苦炒一兩

青皮

去穰五錢

陳皮 五錢

右為細末姜汁打稀糊丸麻子大每三三十九丸米飲送下

頤陷

○一論頤陷乃臟腑有熱渴飲水漿致成泄痢久則血氣虛弱不能上交腦骨

故頤如坑不得滿平宜用

黃狗頭骨炙黃為末雞蛋清調敷之即合

外加赤金

每料勻作

四十九每

服研一丸

用燈心炭

四錢薄荷

湯送下神

效又方用

大蜘蛛一

箇豕粉調

豬乳灌之

立刻音出

顛填

○一論顛填者顛門腫起也脾主肌肉乳食不常飢餓無度或熱或寒兼于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹顛突而高如物堆塚毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牽鞭熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重

手拳

○一論手拳不展稟受肝氣怯弱致筋脉攣搐兩手伸展無力宜服

當歸

薏苡仁

秦朮

苡米仁

棗仁

防風

羌活各等分

右為末煉蜜為丸如雞頭實大麝香湯化下量兒大小服之

脚拳

○一論脚拳不展所稟腎氣不足榮氣未充脚指拳縮無力不能伸放宜服

小兒目

疾方○

黃連一錢

人乳調塗

湧泉穴男

左女右紅

赤自無○

又方○

痘後眼內

有星翳取

杭州騰脂

泡水鋪紙

水上以新

筆在紙上

蘸水一日

川牛膝去酒洗山茱萸肉

人參

當歸身酒洗牡丹皮

懷生地黃補骨脂

右為末煉蜜為丸如芡實壺心湯送下

○一治富翁子八歲不能步履皆因看得太嬌放不落手兒身未得土氣以致肌肉軟脆筋骨薄弱用黃土入于夾襖內與穿內服地黃丸加人參鹿茸牛膝虎脛骨服末半料兒能行矣

○一治小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節皆露名節疔六味丸加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若顛解不合牙齒不生眼睛不黑腿軟難行最宜此藥

痘瘡

夫痘瘡者乃胎毒之所致也嬰兒在胎之時感其穢毒之氣藏于臟腑之中發時有近遠之不同耳若值寒暄不當之候痘疹由是而發因其所受淺深而為稀稠焉大抵始發之時有因外感風寒而得者有因內傷飲食而得者有

拂三次三

日瘡遲治

帶疾○

小便閉

方○

此證乃氣

閉非大小

便不分也

往往醫家

用澤瀉木

通車前豬

苓等藥全

無一效以

歸身一兩

因時氣傳染而得者有因跌撲驚恐而得者大凡初起未見紅點與傷寒相類發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎等症身熱未明疑似之間急須表散可服敗毒散以微發其汗則胎毒隨汗而解而痘疹亦隨發而出矣痘苗一見之際則禁表藥恐發得表虛故也雖視痘之稀稠稀者輕不須用藥而稠者重宜以九味神功散以化其毒痘自出至齊宜此加減用之能除諸病毒已解盡又看痘之起脹何如如痘不起脹此元氣虛也宜以保元湯主之而痘必起脹又看痘之貫膿何如如痘不貫膿此氣血虛也宜內托散加人乳好酒此貫膿之巧法也貫膿已滿又看收靨何如若當靨不靨灰陷黑陷嘔吐白沫爲表虛且木香散治之若當靨不靨寒戰咬牙痒癩泄瀉爲裏虛宜異功散治之有過服熱藥以致熱毒猖狂血氣彌盛痘爛不靨者宜小柴胡湯豬尾膏解之收靨已畢又看痘後有無餘毒若餘毒盛必因過服附子熱毒失解聚而不散以致渾身手足赤腫成癩毒也宜消毒飲五福化毒丹治之又有毒攻發爲諸病宜隨症而療之大凡痘瘡七日以前爲裏實不可投溫燥之藥能助毒九八日以後爲裏虛不可投寒

川芎五錢

柴胡升麻

各二錢半

水二椀煎

八分一服

卽通曾救

多人或孕

婦及老年

之人加人

薄荷一錢

老年便

燥方○

老年人或

患癰毒大

涼之劑能伐生氣也但世俗不分寒熱得見痘出不快舉手悉用陳氏治虛寒熱藥殊不知痘瘡屬燥熱者多急以丹溪涼血解毒治之若槩投熱劑豈無死者今不知致病之因又不求立方之意倉卒之際據症檢方漫爾一試設有不應并其書而廢之不思之甚也余觀陳氏其意大率歸重于太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于外感脾土惡濕而無物不受觀其用丁香姜桂所以治肺之寒用朮附半夏所以治脾之濕使肺果有寒脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今徒見瘡之出遲者身熱者泄利者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛熱卒投木香散異功散間有偶中隨有獲効設或誤投禍不旋踵何者古人用藥製方有嚮導有監制有反佐有因用陳氏之方其時必痘瘡而挾寒者其用燥熱補之故其宜也今未挾寒而用一偏之方寧不過於熱乎余嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也若痘瘡虛寒淡白色痒瘍屬虛寒者宜用之若發熱壯盛齊勇紅紫色燥痒此屬熱毒宜涼血自陳氏方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然

優燥結取

杏仁松子

仁火麻子

仁柏子仁

各三錢搗

爛滾水衝

蓋片刻當

茶卽便如

熱甚者加

甘蔗汁半

杯衝服○

小兒浮

腫方○

一童十一

氣血虛則又送毒氣不出及不能成就故陳氏之法旣行而解毒之旨遂隱
只顧救其虛寒之痘而不能治其燥熱之瘡也子思治法陳氏與丹溪寒熱
兼用俱不可廢如痘瘡陷頂灰白色寒戰悶亂腹脹泄瀉者屬虛寒只用異
功等方治之如熱甚紅紫燥痒屬熱毒者急用涼血之藥消毒等散相兼而
用之豈有不中其病耶予謂痘疹乃小兒之酷疾生死反掌古人論之不一
有見於寒者有見於熱者學者不可執一而誤亦子之生何也蓋痘疹乃胎
毒所致初生小兒失於拭去口中穢毒者一誤也及長失於末用預解胎毒
免痘之方者二誤也初起發熱有當汗而不汗者三誤也將出之際有不當
汗而汗者四誤也旣出之後有毒盛當解毒而不解者五誤也起脹貫膿之
時有當補虛而不補虛者六誤也有首尾証平不當下而下者七誤也有首
尾實熱當下而不下者八誤也有首尾虛寒當溫補而不溫補者九誤也有
過服熱藥致痘瘡後餘毒當解毒而不解毒者十誤也凡此十誤當預慎之
務加通變故曰寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之又曰化而裁之神
而明之若斯治者庶免小兒天枉之禍耶

歲手足脣

腿及指頭

面徧身浮

腫數日後

日增沉重

以致氣喘

不能眠一

客令寬黃

皮柑子一

枚同酒釀

三斤煎至

將乾去柑

內核取柑

連酒釀食

視痘顏色輕重之法

空谷而響應形動而影隨夫痘瘡之發也內熱和緩達於外者必輕便閉煩燥彰於外者必重有諸中形諸外理勢之自然也夫顏色貴潤澤而嫌昏暗貴光彩而嫌枯澁貴淡紅而嫌黑帶貴圓淨而嫌破損貴高聳而嫌平塌貴結實而嫌虛薄貴稀疎而嫌稠密根策收緊痘分陰陽見點動活更怕臉浮出要參差血宜歸附耳後心喉少於他處為佳眉稜兩顴額前光潤不泄為妙一發熱便出者重瘡夾疹者半輕半重裏外微紅者輕外黑裏赤者微重外赤裏黑太重瘡內黑點如針孔者勢極青乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹啼喘大小便閉者困也善治者觀其形色而辨之輕者獲安重能取效矣

痘疹辨疑賦

始毒蓄積發於痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水克于丙丁

後歸陽明血水化為膿漿勢若燃眉變若反掌若救焚兮徒薪何如焦額如

落水兮拯溺不及褰裳欲知表裏虛實須明寒熱溫涼證候殊形臟腑易狀

肝火激成水泡肺主涕而膿漿心班紅紫脾疹赤黃腎經居下不受汗濁為

食二次全

瘡○

製藥○

用藥如用

兵也兵有

勇猛藥有

燥烈烈藥

經製則純

勇兵經練

則精兵精

破賊不難

烈藥治病

易瘡苟於

製不妥猶

變黑而可防觀其內症推乎外臟呵欠煩悶兮肝水之困咳嗽涕噴嚏兮肺
金之象目帶赤兮心火延於胸膈手足厥冷而昏睡兮脾土困于中央且尻
屬腎溫暖如常二處煩熱痘疹乎張先分部位次察災祥陽明從目落鼻太
陽形於頭上心火交熱則舌乾面赤肺金鬱結則胸膈先傷手足屬乎脾胃
肝膽主脇肋之傍頸項三陽交會腰背統乎膀胱外症明分用心想像世者
邪盛于下吐者邪甚于上氣逆而腹脹隱隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚
搐胃邪實而癩狂口燥咽乾肺受火邪而液竭便閉尿澁腎因火旺而津亡
欲識痘之輕重當觀熱于形狀毒甚兮心如炎上毒微兮內外清涼寒熱往
來神氣爽定知痘出必禎祥數番漸出兮春回陽谷一齊湧出兮火烈崑岡
蚕蟲蚤班刻期而歸陰府蛇皮蟬退引日而返泉鄉雖怕紫紅最嫌灰白最
宜淡紅滋潤切忌黑陷乾黃色要明潤兮猶恐薄嫩之易破痘貴乾結兮又
愁痒塌之難當面頰稀而磊落清安可保胸膈密而連串吉凶難量頂要尖
圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空瘡皮喜老而愁嫩膚愛活而怕光結貫高聳
始終無慮丹浮皮肉必主形傷唇面預腫兮八九如何可過腰痛胃爛兮一

勇兵之武

藝未備也

今人不精

於製而視

性之列燥

者長如蛇

蠟護之曰

一效難求

余初讀藥

性繼攻炮

製然藥之

性古今之

識未遠炮

製之法卻

切定主災殃瘡堆口舌毒纏頸項咽瘡喉腫飲食難嘗世痢膿血毒甚無漿
人力難盡天命匪張痘瘡焦落辨別陰陽人中上下先磨為良足腰先若黑
靨多凶而少吉祥

神斷秘訣

細嫩無分地 粘連一片紅 七朝虛痒場 乾燥定無膿 皮膚無光亮

胸前不空閑 一身紅紫泡 九日往西天 痘腫皮不腫 眼開口又開

陰陽俱無縫 六日一場空 滿面皆稠密 仔細看陰陽 天庭漿不足

此兒必有傷 頭身色不潤 膿綠臭難當 此般脾氣絕 不久命須亡

初起瘡貼肉 起後肉難通 寒熱不分別 痒場七朝中 見點如肝樣

焦枯黑陷傷 心腎二經絕 此痘火中央 頭面方見大 頃刻又尖長

此般形像見 不羨有奇方 十四痂堪落 依然乾燥膿 沉沉睡不食

延日不能生 目中光射斗 手足亂搖搖 若逢有此疾 不日命須傾

五經穴痘上 斜視腫不分 總然與解毒 遲日一場空 舌尖上見黑

心經尅肺經 皮紅胭脂樣 半月此兒亡 目白睛紅赤 唇紅痘三般

自不同余

語心四十

餘年深得

製度烈藥

之法用之

功靈效速

萬無一失

方悉烈藥

之力如勇

兵製藥猶

如演武也

因古書獨

於烈藥之

處未詳是

黃漿胃先腐

焦烈飲茶終

初見雲中月

雲中隱隱丹

兩朝二日後

兒命待西天

膿黃色不活

乾極腳攤紅

牙疳瀉不食

半月命須終

臍凸四肢浮

睛黃赤鼻頭

類般顏色異

十五命難留

仔細看身疔

咽喉前後心

陰陽并腦後

腎舌頂陰生

十四痲該落

膿瘡食不進

無神死蛇臭

兒命必身速

見點如肝樣

針苗接一連

乾紅王絕水

十命九難延

目定神昏熱

喉痰膝下冰

飲湯并下瀉

頃刻命難存

舌上浮血點

喉瘡嘔不清

皮紅痘不起

心經尅肺經

如神真秘訣

學者要精明

預解胎毒免痘門

延生第一方

○一論小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放地土

上用瓦盞之類蓋之存性研為末預將朱砂透明者為極細末水飛過臍帶

若有五分重朱砂用二分五釐生地黃當歸身煎濃汁一二蜆殼調和前二

味抹兒口上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次日大便遺下穢汚濁

○

○

○

○

○

以錄登是

集為炮製

之補遺云

爾○

銅青○

酸平微毒

治惡瘡疔

瘡殺蟲吐

風痰○

鉛粉○

酸冷無毒

消中風痰

止驚吐逆

○

垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子十分妙法也

○一論小兒未出痘疹者每遇交春分秋分時服一丸其痘毒能漸消化若只

服一二次者亦得減少其毒盡能消化必保無虞此方神秘本不欲輕傳但

怒幼之心自不能已願與四方君子共之

神効消毒保嬰丹

纏豆藤

一兩五錢其藤八月間收取毛豆梗上纏莖細紅絲者是採陰乾妙在比藥為主

黑豆 三十粒

赤豆

七十粒

山查肉

一兩

新升麻

七錢五分

荆芥

五錢

防風 五錢

生地黄

一兩

川獨活

五錢

甘草

五錢

當歸

酒洗五錢

赤芍 五錢

連翹

七錢五分

黃連

五錢

桔梗

五錢

辰砂

水飛另研一兩

苦絲瓜

二箇長五寸隔年經霜者方妙可燒存性

右為極細末和勻淨砂糖拌丸李核大每服一丸濃煎甘草湯化下○其前

項藥須預辦精料遇春分秋分或正月十五日七月十五日修合務在精誠

忌婦人猫狗合時向太陽祝藥曰神仙真藥體合自然嬰兒吞服天地齊年

吾奉 太上老君急急如律令勅一氣七遍

全生保安散

麻黃

羌活

防風

升麻

黃丹○

臨用炒紫

色舖入膏

內生肌療

浮紗疥癬

蟲○

蜜陀僧

○

研水浸煮

澄去水日

乾入膏消

瘡殺蟲○

鐵鏽○

殺疥蟲○

生地黃

黃柏

酒浸各五分

川芎

藁本

乾葛

蒼朮

黃芩

酒浸

生芩

柴胡

各二分

紅花

細辛

蘇木

白朮

陳皮

各一分

甘草

歸身

黃連

各三分

連翹

吳茱萸

各半分

右判一劑立春立夏立秋立冬之日水煎露一宿次早溫服如一年之內依

時服此四服神效永不出痘

穢免痘湯 太尹王天中傳自方上異人

十月經霜後取練樹子一升收貯到正月初一日半夜子時父母只令一人

知將練子入鍋內用水煮湯待溫洗兒全身永不出痘真仙方也

鄉隣出痘預服禁方

一凡鄉隣覺有時行痘疹可以預防宜節其飲食謹其起居加減衣服預其藥餌亦制節謹度順天之道也

麻油擦法

用麻油每夜臨臥時以手中三指蘸油擦兒頭額項背腰兩手腕兩足腕然後

丹砂○

研粉水飛

養神安魄

除中惡腹

痛驚癩胎

毒○

水銀○

應依方製

用有微毒

治惡瘡白

秃下死胎

○

輕粉○

有毒除爛

睡卽可以使輕此亦暢達流通升脫凝滯之義也

三豆湯

大黑豆

赤小豆

菉豆

各一盞甘草一兩細切每日用四味瓦罐水煨熟爛連豆帶湯與兒食之黑
豆解腎經之毒制相火也赤小豆解心經之毒制君火也菉豆解陽明經之
毒制胃火也用豆者又以形治以類從也易簡而使里閉食治以便童稚其
爲神巧矣乎

永不出痘二五散

賈蘭峰傳

用有雄雞蛋七枚內取一枚開一孔去清黃淨貫入鮮明好朱砂四錢九分
其孔以紙糊用雞抱出雞雛將朱砂採日精月華各七日夜收貯聽用再用
起頭結絲瓜一個俟老成種乾燒灰存性爲末每服朱砂五分絲瓜灰五分
爲細末蜂蜜水調服服過三次永不出痘疹鄰家出痘就宜服之

油飲子

若遇痘疹行時左右隣家有出者可預服之用真香油一斤煎熟遂日與兒

飲盡永不出痘

孔毒根驚

癩瘡瘡惡

瘡癩癬○

銀朱○

有微毒瘵

疥癬殺蟲

止癢殺蟲

○

雄黃○

名腰黃透

明者佳水

飛治惡瘡

死肌消癰

毒化腹中

看耳後筋紋斷法

凡耳後經文似水紅色爲上赤紅色次之大紅色宜退火紫黑青色皆不治又須條均直上耳尖而無分枝者爲上若分枝纏繞者雖淡紅亦凶其或過髮際者多不可救

紙撚照法

用學書竹紙或燒錢草紙烘乾作撚子如小指大蘸香油于燈上往來薰炙令紙條無泡不濕咤又飽蘸油又薰炙令油無泡卽點撚子將患者房內窗門閉令黑暗有光處以蔽之看其左顴有何色點右顴有何色點中庭有何色點觀兩顴宜以撚子在兩耳邊及鼻邊平照觀中庭宜以撚子在兩目角平照看其皮中厯厯可指是赤是紫是塊是點曉然明白若是疥疹則浮于皮外肉內無根若是痘疹根在肉內極深若以撚子當顴及中庭正照則黯而不見撚子有灰眇卽指去令明如此照之病情在內可以預見若日間以天日光觀之則不見矣

初起發熱治法

瘀血○

滑石○

丹皮對分

煎透取石

研水飛通

九竅利六

腑生津液

分水道行

積滯逐凝

血降心火

解暑熱○

礞石○

經製無毒

不傷人畜

一論發熱之初急宜表汗使臟腑胎毒及外感不正之氣增寒壯熱頭疼腰痛

腹脹或喘嗽痰涎鼻流清涕或因驚恐跌盪而發搐搦角弓反張上宮天弔

一切內外所感盡從汗散則痘出自然稀少但熱甚者其毒亦甚熱微者其

毒亦微然表藥必在紅點未見之前可服

敗毒散

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

羌活

防風

荆芥

前胡

薄荷

桔梗去芦

枳殼去穢

牛蒡子

蟬退

山查肉

地骨皮

甘草

右剉一劑生姜一片水煎臨服加葱白汁五匙熱服○一方無乾葛加紫草

○如熱甚加柴胡黃芩○冬加麻黃○暑月加香薷○瀉加茯苓澤瀉

○一論小兒痘瘡纔覺發熱者服之不出見苗者服之出稀陷伏者服之起脹

神效復生丸 方伯王如水傳

當歸身

川芎

升麻

乾葛

白芍

人參

黃芪

甘草

辰砂錢

紫草茸一兩

同鉛入器

內碗放鉛

底火鎔煙

盡為度鉛

上刮下者

名金頂碗

取香油一

兩生碗一

錢研入油

煎沫盡煙

絕擦搗掌

風取紅棗

去核以礬

代核髮紫

右為末糯米粽為丸如雞頭子大每服一丸河水煎滾入黃酒少許送下

○一論痘初發熱一服即輕百發百中

預服萬靈丹

紫草茸

一兩

山豆根

五錢

升麻小者

葛根

蟬退

淨者

姜蚕炒去絲

白附子

連翹

去心各一錢

全蝎

去毒十個

生甘草

五錢

雄黃

五分

麝香

一錢

蟾酥

一錢

好酒頓化如蜜

右十二味為末用蟾酥丸如皂角子大每服一丸紫草湯下

○一論痘瘡初出先用此藥塗面若用之早則痘瘡不生於面用之遲雖出亦

玉顏膏

黃柏去皮一兩

聚豆粉

四兩

甘草

生四兩

紅花

二兩

右為末香油調成膏從耳前眼唇面上並塗之曰三五度

出痘治法

避穢氣

腋下狐臭氣

房中淫液氣

行遠勞汗氣

溝糞濁惡氣

婦人經候氣

諸瘡腥臭氣

硫黃蚊煙氣

吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣

柴烟魚骨氣

葱蒜韭薤氣

煎炒油烟氣

入炭火煨
至煙盡取
研細粉名
赤霜治走
馬牙疳久
潰不斂者
撒上數次
收功生者
可療冷瘡
不傷人畜

又禁忌

生人往來 冒罵呼怒 對梳頭 對搔痒 勿掃地 勿對荒言

勿飲食諍樂 勿僧道師巫入房

以上穢氣禁忌諸條謹之則重可變輕不謹則輕變重矣

○一論外解諸方凡被房事經水生產之穢所犯者以大棗燒烟解之

凡被五辛厭者以生薑燒烟解之凡被酒厭者以葛根茵陳蒿燒烟解之

凡被死屍之氣及厲氣所犯者以大黃蒼朮燒烟解之

凡被胡臭犬羊厭者燒楓毬解之 ○凡遇風雨燒蒼朮楓毬避之

凡一切惡氣通以乳香燒烟薰之仲景曰小兒痘時宜燒乳香辟諸惡氣蓋

榮衛遇香則行遇臭則凝故也

世俗煮醋薰豆謂其能活血然醋主收斂故婦人血崩者用薰之痘毒欲升

發而不欲收斂故不宜耳嘗見用醋薰豆發痒搔破而敗事者慎之

一論痘疹初出時宜用此酒遍噴四面床壁及與患者服役人皆飲能辟穢

○ 鹹溫無毒

元精石

治小兒驚

毒又以淨胭脂點兩眼角防痘入眼

癩硬舌

○胡荽酒

胡荽三兩細切以酒二鍾煎沸用紙密封勿令氣出候冷去渣從頂

寒水石

至頤頰微微塗之更噴背脊胸腹及兩脚皆遍再用滿房壁門戶遍酒之尤妙

○

○一論痘瘡欲出已出熱尙未解毒氣太盛稠蜜成片急進此三四服快透消

性寒火煨

毒如神專治內蘊邪熱咽隔不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫壅毒聚

用治潮熱

遍身風疹痺毒赤痛等症

中暑牙疼

消毒散

牛旁子

微炒四錢

荆芥

一錢

甘草

一錢

防風 去芦半錢

○

一方加黃芩

一錢

犀角

鎊五分

右剉水煎溫服

○

○一論痘瘡已出痘毒太盛以此消毒或出不快皆宜服之一云痘瘡欲出渾

性暖止嗽

身壯熱不思飲食若服此一劑即內消已有一兩顆出即解其半若全出即

療喉去翳

當日頭焦只三服瘥子每用此治壯盛小兒痘出毒盛殊效若虛者宜神切散尤妙

口齒諸瘡

化毒湯

紫草茸 五錢

川升麻

甘草 各二錢半

津薰熱目

右剉每服二錢糯米五十粒同煎服

立瘡閃頸

○一論痘出毒氣太盛血紅一片不分地界如蛟蚕種或諸失血或吐瀉七日

促腰○

硫黃○

敲細粒以

蘿蔔糜爛

絞汁煮再

換紫背浮

萍湯煮再

煎角刺湯

飛過去盡

毒臭日乾

研粉色白

取豬臟淡

煮爛熟每

日早晚各

以前諸症可服解毒神効

九味神功散

黃芪

人參

白芍

紫草

紅花

生地黃

牛蒡子

各等分

前胡

甘草

錢半

右剉水煎溫服渣再煎服○熱甚者加黃連黃芩各一錢未退再加大黃○有驚加蟬退去頭足○若頭粒淡黑色者有寒乘之加桂一錢○如大便閉

加大黃

一痘發渴服神功散當不渴或猶渴者用紅花子一味煎湯飲無子即用紅花亦好加牛蒡子九妙蓋能散胃口之瘀血故也切不可用荔枝棗能助陽經之火大發渴者用真黃土百沸湯碗蓋泡取出水少加沙糖飲之立止

一痘出三日內頂陷者非虛也用神功散活血退火

一四日以前有寒症其色黑慘保元湯加桂

一色白光者寒乘之神功散加桂

一腹痛者毒盛也神功散主之

一面紅不退地界不分者神功散倍前胡

取一段酥

粉分餘食

治久痢滑

瀉命門不

足虛損洩

精壯陽道

補筋骨殺

臟蟲長肌

肉治陰蝕

生用殺瘡

蟲瘡癩雞

○

白礬○

透明者佳

一吐者毒盛乘火炎而宜也神功散主之

一泄瀉者火盛而奔越也神功散加升麻以提之

一身已涼汗不止者血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢酸棗仁炒三錢作一

劑水煎服立止

一有痰用白附子磨服切不可用二陳湯使燥陽明經使孤陽無陰不能施化

一嗽用杏仁煎湯磨白附子服即止

一遍身疼痛以木香一味磨服即止

一漿行作痒此內熱而外為風寒所乘用荆芥穗紙裹緊米糊粘住紙頭令不

散燈上燒了却于卓上擦去灰快放手指定痒痘頭點痒處一下即放退每

痒痘點之立止

一行漿漿足而發疔認定是黑疔痘或黑而硬或有紅絲或為大紫泡未曾解

毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃煎服却用點法雄黃一錢研胭脂

重浸水令濃調雄黃末點疔頭上立時即紅活亦神法也蓋雄黃能解毒腥

脂能活血也

蝕惡肉同
一痘九日十日作瀉先失解毒者宜用

齒以橄欖定中湯

蘇食味佳

瘡癩證解

腸中毒治

癰痔頑痰

○

綠礬即

皂礬○

療疔黃胖

燥脾溼化

痰○

伏龍肝

真正黃土一大塊碗盛百沸湯泡即以碗蓋少頃出用如冷頃於盞內外

以熱水盪之加入雄黃一錢朱砂五分二味為末和勻以黃土湯兩盞少加

沙糖溫服二服立止

○一論痘瘡腹脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身溫渴者或

身熱面眊白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止

者已上九證即非熱也乃脾胃肌肉虛津液衰小故也木香散主之如不愈

更加丁香官桂多煎服丁香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致痒塌喘

渴而死矣

一痘十一二日當靨不靨發熱蒸蒸者宜用

甘露回天湯

沙糖半酒鍾

百沸湯調一大碗溫服立時熱退痘靨百發百

中真有回天之力也

看痘不治法

○

即蠶心土

再燒紅研

水飛日乾

乳調立療

湯火爛孔

甘草○

切三寸以

段水浸透

放炭火鐵

篩漫炙炙

至汗將出

即取離火

暫冷再炙

初出湧壯者不治○出如蚕種者不治○隨出隨沒者不治○如蚊蟲咬者不

治○氣血相失者不治○倒出者不治○飲水如促鼻者不治與肺疏理也

看痘輕重歌

輕者熱輕痘亦稀 小大後先出不齊 根窠紅活瘡肥滿

飲食如常勿藥宜 重者熱中瘡並出 蜜如蚕種若胭脂

根白頂紅並紫黑 若逢血活倘堪醫

起脹治法

保元湯

人參 去芦二錢

嫩黃芪 三錢

甘草 一錢

右剉一劑生薑一片水煎溫服○一當起脹而不起用川山甲炒成珠研末

二錢酒調服○一血弱不起根底淡薄以保元湯加丁香三粒肉桂一錢當

歸二錢川芎一錢水煎溫服

二口初出圓暈成形乾紅少潤毒雖犯上其氣血未離以俟其氣血交會也

然毒尚淺急以保元湯加桂兼活血勻氣之劑如毒若盛兼解毒之藥治血

加當歸五分白芍一錢勻氣加陳皮五分解毒加玄參七分牛蒡子炒七分

炙甘草 水一盞煎七分温服

去皮切片 二三日根窠雖圓而頂陷者血亦難聚為氣虛弱不能領袖其氣也以保元湯

熟者健脾 加川芎官桂扶陽抑陰豈有不痊者哉

和中甘平 四五月根策雖起色不光澤生意猶存為氣弱血盛以保元湯加芍藥官桂糯

之品乃九 米助衛制榮斯為調燮之妙也

土之精生 五六月氣盈血弱色昏紅紫以保元湯加木香當歸川芎助血歸附氣位以全

者化百毒 中和之道也

和藥性潤 六七日氣交不旺血雖歸附不能成漿為氣血少寒不能制急投保元湯加官

肺解瘡道 桂糯米助其成漿而收濟惠之偉功斯為治矣

胎毒利咽 七八日毒雖化漿而不滿為氣血有凝不能大振以保元湯加官桂糯米發陽

喉○ 助漿斯可謂保全生命矣

黃芪○ 一痘至此專主貫膿膿已滿雖有他症亦不壞事若痘無膿灰暗雖無他症亦

去心蜜水 一痘瘡至八九十日視痘頂心上有一點如水珠見出此痘漏無藥可醫死

潤炙如入 八九日漿不冲滿血附線紅氣弱而險也以保元湯加糯米以助其氣而駕其

補腎藥以

鹽水潤炙

切片灸為

補氣藥生

有托毒功

○

人蔘○

補氣獨入

肺經肺主

諸氣蓋肺

旺則四臟

皆旺精自

生而形自

盛補中益

血斯漿成矣

十一二日氣血冲滿血盡漿足濕潤不斂者內虛也以保元湯血亦有力加白

米茯苓助其收斂而結痂也

十三四日毒雖盡解漿老結痂之際或有雜症相仍以保元湯隨症加減不可

峻用寒涼大熱之劑恐致內損之患故也

十四五日痂落潮熱唇紅口渴不食以四君子湯加陳皮山查黃連如渴甚

以參苓白朮散如熱不解以大連翹飲去黃芩主之症去之後多有內損或

餘毒未解此則尤為難治也

凡痘瘡發渴者為虛弱而津液枯竭也保元湯加麥門冬五味子即止如不止

以參苓白朮散一二劑即止

凡痘瘡不起發膿漿不厚保元湯加川芎五分丁香四分夏月二分糯米二百

粒煎熟加好酒入乳各半盞同服

若頭額不起脹加川芎六分為引○若面部不起脹加升麻四分為引○若胸

膈不起脹加桔梗四分為引○若兩膝不起脹加牛膝四分為引○若兩手

氣一切虛

證。

沙蔞。

清肺火益

心治久嗽

肺痿消癰

排膿。

桔梗。

去頭枝浮

皮泔水浸

一宿切片

微炒職稱

肺經消痰

理欬清上

不起脹加桂枝二分爲引

○一論痘瘡胃虛不進飲食或口乾發渴或吐瀉等症

參苓白朮散

人參

白朮去芦炒

白茯苓去皮

甘草炙

白扁豆炒

山藥炒各一錢五分

蓮肉去心

桔梗八分

薏苡仁八分

砂仁七分

右爲細末每服五六分或一錢紅棗煎湯調下或姜湯亦可

胃膿治法

○一論痘瘡血氣虛損或風邪穢毒冲觸使瘡毒內陷伏而不出或出參差而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

內托散

黃芪

人參

當歸各二錢

川芎

防風

桔梗

厚朴姜汁炒

白芷

甘草各一錢

木香

官桂各三分

右方如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩用此藥調穿山甲

炒成珠爲末五分同服

若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂救表○當貫膿而不貫膿者倍參芪當歸煎熟臨服入人乳汁好酒同參服此貫膿之巧法也○泄

焦熱治咽

喉排膿口

鼻諸證○

知母○

去尾切片

上行酒潤

焙下行鹽

水潤焙瀉

有餘之相

火多服令

人洩○

白朮○

浸一宿切

片土拌蒸

瀉加丁香乾薑肉豆蔻

○一論痘瘡已成出齊而難脹或已脹齊而難壓者由內虛故耳益痘既出灰

白色及頂平不起或陷伏者氣血大虛也宜此方

歸茸湯

嫩鹿茸

酥炙

當歸身

酒洗

每剉五錢好酒煎溫服

○一論痘屬虛寒八九日色白如水泡頂陷根白痒塌寒戰咬牙等症

回陽湯

鹿茸

酥炙

大附子

麩包煨

嫩黃芪

當歸

酒洗

右剉好酒煎溫服

○一論痘出至貫膿收靨之時倒塌陷伏心慌喘急悶亂死在須臾

好揀參一兩水煎濃汁灌下即甦

○一論灰白黑陷嘔吐白沫為表虛

木香散十一味

木香

前胡

甘草

赤茯苓

訶子

煨去肉

大腹皮

人參

陳皮

肉桂

丁香

堆者五

半夏

姜製下

右剉一劑生姜三片水一鍾煎八分溫服○嘔吐甚加白豆蔻去殼

透去土勿
○一論寒戰咬牙痒場泄瀉為裏虛

炒於尤浸

異功散

十二味

當歸酒洗

肉豆蔻

煨去油

陳皮

白朮

去芦炒

刮飯上蒸

白茯苓

去皮

大附子

麩包煨去

半夏

姜汁炒

厚朴

曬如棗黑

肉桂

各八分

人參

五分

小丁香

七粒

木香

磨八分

黃土炒於

右剉一劑生姜三片棗一枚水一鍾煎至八分溫服○泄瀉甚加訶子肉煨

尤功勝白

○一論此方解毒發痘之聖藥也治紅班黑陷項不起痘疔一切惡症危者用

尤乃中宮

此立見起死回生之功也

和氣補脾

小靈丹

雄黃

朱砂

各二錢

乳香

沒藥

各一錢五分

之藥○

大蟾蜍

取心肝瓦焙乾五錢

麝香

二分

蒼朮○

右研細末取猪心血雞冠血丸如皂子大每服一丸身無大熱生酒化下熱

泔水浸去

甚不飲酒者紫草燈心湯下即時紅活而起如服此不効者决無可生之也

粗皮切片

○一論痘瘡初出光壯忽然黑陷心中煩燥氣急喘滿狂言妄語如見鬼神急

日乾土炒

宜治之不然毒氣入臟必死

炭治脾胃

人牙散

人牙

燒存性

為細末每一箇作一服酒調下立効

寒溼清痰

逐水不伏

水土止瀉

痢霍亂久

服延年○

元漫○

蒸曬忌銅

器消癰滋

陰降火利

咽喉通小

便○

地榆○

水洗去骨

切曬磨粉

又秘方用人牙一箇火煨

宋砂三分

雄黃三分

為細末先用甘草為末

熬成膏調入三味再用無灰好酒調稀灌下治惡症痘疹不發危急之甚服

無價散

治症同前

人牙

猫牙

猪牙

犬牙

右等分各將炭火燒留烟瓦碗蓋蔽存性為末每五六歲服三四分好熱酒

調下痒場寒戰泄瀉者煎異功散調下若無猫牙用前人牙一味亦好但不

如四牙全方

○一論痘瘡咬牙寒戰六七日陷而不發不貫膿陷入黑色氣欲絕者神效有

瀉者不宜服

三仙散 楚黃賓江傳

穿山甲半斤用好漿兒酒一斤以山甲微火炙乾再浸再炙以酒乾為度

穿山甲一兩

麝香一分

朱砂以麻黃水
煮過一錢

右為細末每服五七分或一錢溫酒調下

○一方治前症單用穿山甲用炭火炒成珠為末每服五七分木香湯調服亦

○一論痘瘡紫黑乾枯變黑歸腎身如火炙之熱不瀉者可服

瘡惡肉湯 犀羚散 吳竺陽傳

火膿血犬

傷○

丹蔘○

色赤酒潤

炒血分藥

也補心血

養神志生

新血安生

胎落死胎

為胎前產

後要藥每

晚酒送末

二錢連服

烏犀角 羚羊角 二味磨涼水服之有回生之妙

烏犀角

羚羊角

二味磨涼水服之有回生之妙

○一論痘瘡不出黑陷於死者可服

萬金散

人猫猪犬腦晨燒

少許微將蜜水調

百者救生無一死

黃金萬錠也難消

右將前四物的糞於腦月早晨日未出時貯於銀鍋內用炭火燒令烟盡為

度但是瘡發不快倒靨黑陷者及一切惡瘡每用一字蜜水調服其効如神

○一論痘瘡自出至收靨時理不宜下者用此導之若既靨之後有前症者又當下也

○一論痘瘡中有長大紫黑者為疔毒把住痘不起發急用簪挑破維入後藥

四聖散

珍珠三五粒鐵器上

菟豆四十九粒

頭髮燒存性不拘多少

右為細末用擦面油胭脂調成膏子將兒在温煖處安存忌風寒穢氣先尸

簪尖平撥開疔口將藥絀入疔內即變紅色餘瘡皆起但挑破出黑血或挑

開口嘔去黑血或用綿裹指搯去黑血即愈蓋破疔而毒氣即散也

四十日可

療痛經即

孕○

白芨○

療瘡嚼塗

手足燥裂

○

三七

止血定痛

癰腫蛇傷

○

黃連○

大寒治實

火凡痢疾

○一女子出痘至脹滿將貫膿時忽紫黑抵破流血此痘屬熱毒太盛用皮硝不拘多少入花椒一撮水煎用青布蘸搭患處頻頻良久即起脹如舊

收靨治法

○一凡痘十日十一二日痘漸收靨自上而下為順自下而上為逆其遍身皆靨雖數顆不靨尙能殺人猶蛇退皮雖一節被傷不能退者是亦死也

○一十日至十一日當靨不靨其身不壯熱悶亂不寧臥則哽氣煩渴咬牙異功散加木香當歸以救陰陽表裏若以蜜水西瓜紅柿等冷物食之速死

○一凡當靨不靨泄瀉寒戰咬牙抵破此虛寒也宜異功散

○一凡過服熱藥以致熱毒猖狂血氣彌盛痘爛不靨者內服小柴胡湯猪尾膏解之外用敗草散付之

○一凡痘不收靨氣急上痰聲啞目閉無神者死靨後癍紅者吉白無血色者毒氣歸內也恐生餘症

一治痘瘡抵搔成膿血淋漓宜

敗草散

用蓋房多年爛草或蓋墻爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之

目疾非實
火誤服致

命為倒胃

之藥唯驚

能療解巴

豆輕粉之

毒胡黃連

性同○

黃芩○

苦寒風痰

骨蒸喉臙

攤毒發陰

退陽○

秦朮○

氣并解瘡毒其功不能盡述取草不拘多少晒乾或焙乾為末乾貼瘡上
若渾身瘡破膿水不絕粘貼衣裳難以坐臥可用二三升攤於席上令兒
坐臥其效如神仍服木香散加丁香官桂同煎服

硝膽膏

硝膽膏醫口不收

瘡癩臭爛血膿流

宜研猪膽芑硝細

患處塗之病自瘳

猪尾膏

龍腦牛字

研細旋滴猪心血為丸辰砂為衣紫草湯化下

○一治痘疹抓破稀爛

用墮孔內入土蜜新瓦上焙乾燒灰存性為末如濕乾摻如乾香油調搽效

○一小兒三歲者發熱七日瘡出倒靨色黑唇口冰冷危症也祈福求神無所

不至遇逢一士曰此疾有藥可起以少許俾服之移時即紅活如常不吝費

求方其法用狗蠅七枚搗細和醋酒少許調服蠅夏月極多易得冬月藏於

耳中不可不知此蠅夏月狗身上飛者是也

○一痘瘡屬虛寒者直可延至十數日後方死屬毒盛轉色者不過七八日蓋

痘是胎毒自內出外一二三日方出齊毒氣尚在內出至六日則當盡出於

去毛浸一

宿曬乾切

片搜肝膽

伏風養血

榮筋理肢

節痠麻不

遂大便滑

泄者忌用

○

天麻○

酒浸透以

粗紙黏餘

酒裏煨切

生酒用治

外七八九日藏膿而結痂矣若毒氣盛不能盡出過六日毒反入內臟腑故須以六日以前毒氣該出之時急服涼血解毒之藥以驅出之六日以後醫無及矣故其死最急若虛弱毒氣少者只是氣血不足不能貫膿成就故綿延日久而後死此虛實輕重之分也

痘後餘毒

小兒痘疹餘毒輕則肌表津淫瘙痒重則肢節壅腫作痛若發熱而大便閉結者消毒飲發熱而大便調和者清熱消毒散大便調和而渴者麥門冬飲腫痛發熱而渴者仙方活命飲大凡根赤而作痒者血虛也四物湯加牡丹皮色白而作痒者氣虛也四君加當歸芍藥色赤而作痛者血熱也四物湯加連翹金銀花色白而不焮痛者血氣虛也託裏散不成膿或不腐血氣俱虛也八珍湯膿既潰而不斂脾氣虛也六君子湯按之隨指復起者內有膿也卽刺之勿使內攻膿出兒安不必服藥如膿稀清或反作痛或倦怠熱渴或作痛等症皆屬氣血虛甚急以參芪犀朮之類補之若虛中見惡症者不可

攻實中無惡症者多自愈

風溼四肢

活命飲

托裏散

方見癰疽

拘攣助陽

通血脈利

腰膝強筋

頭風眩暈

○柴胡○

去皮切忌

經火苦寒

行兩脇入

膽經腸氣

血肩背痛

銀柴胡亦

同勞羸者

○

○一論痘後餘毒或先服附子熱毒失解聚而不散以至頭頂胸背手足肢節

赤腫成癰毒者宜消毒飲或五福化毒丹

消毒飲

鼠粘子炒

荆芥穗

甘草

防風各五分

犀角

鎊末二

金銀花三分

右剉水煎服

○一論痘後餘毒未解頭面身體多生瘡癩上焦熱壅唇口腫破生瘡牙齦出

血口臭咽喉腫痛口渴等症

五福化毒丹

犀角 鎊三錢

桔梗 一兩

生地黄

赤茯苓

牛旁子

各五錢

連翹 六錢

玄參 三錢

青黛 二錢

朴硝

粉草 各三錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯化下兼有驚朱砂為衣

○一論痘後不同痘毒發於何經初起紅毒時却用黑棗赤三豆以酸醋浸研

漿時時以雞翎刷之隨手退去其效如神

○一論一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

尤宜根上
清熱消毒散

連翹

山梔

黃連

當歸各五分

升稍下行

川芎

芍藥炒

生地黃

各六分

金銀花

二錢

甘草

一分

右判一劑水煎服

○ 前胡

○ 一論痘毒發熱作渴咽痛

麥門冬飲

麥門冬

去心四分

黃芩

三分

甘草

五分

人參

去淨皮鬚
入竹瀝內

玄參 各三分

金銀花

五分

右判水煎服

○ 咽痛加桔梗

五分

○ 一論痘後失音不出

天花粉

桔梗

白茯苓

去皮

肝膽中風

訶子肉

石菖蒲

甘草

痰非此不

右為末水調半匙右碗內外以小竹七莖黃荆七條縛作一束點火在碗內

療柴胡主

煎臨臥時服

升前胡主

○ 一論痘瘡愈後瘡痂雖落其癩猶點或凸或凹用白蜜塗於瘡上其痂易落

降散風祛

且無疤痕亦不臭穢

熱消痰下

○ 一論痘瘡後身體及肢節生疔蝕瘡膿水不乾用出蚕蛾綿罯不拘多少用

氣開胃化

食止嘔喘

嗽安胎治

小兒夜啼

○

防風○

甘温走勝

肱瀉肺實

火頭風眼

淚祛溼而

黃芪得之

其功愈大

乃相畏而

相使也○

白礬研碎塞於壘內令滿以炭火燒候白礬汁乾取出研入麝少許每用乾

貼瘡上若不早治則潰難消

○一痘瘡入眼成翳用蟬退為細末羊肝煎湯調化食後服

○一痘瘡後眼生翳膜○凡痘瘡不可食雞鴨卵即時育瞳子其應如神不可

撥雲丹

兔糞芒花芦花
色者佳

蟬退

本通

白蒺藜各二兩炙甘草一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服八十九食後白湯下日進三服以命為度

○一論痘後餘毒眼生翳瘡

通明散

當歸

川芎

芍藥

生地黄

防風

乾葛

菊花

蟬退

天花粉各等分

穀精草焙

右剉散水煎服眼赤腫加黃連梔子翳厚加木賊

秘方

黃丹

輕粉各一錢

右為末用鵝管吹如左眼患吹入右耳右眼患吹入左耳一日吹三次兼服一

蕪落羌

落○

去皮焙用

治一切痛

風散癘毒

惡血腎閒

邪風○

升麻○

內白外黑

者佳治脫

肚遺濁小

便閉塞用

此提氣下

元虛者忌

通明散或用雌雄檳榔磨水服之効

一治痘疹傷眼有白翳

用青果核磨水點之立去

○一論痘餘毒在脾肺者則發咳嗽宜服

清金散

陳皮中

半夏姜製中

貝母上

天花粉上

麥門冬去心 桔梗上

梔子炒

黃芩各等分 甘草生下

右剉水煎食遠服

○一論小兒痘後咳嗽不拘遠年近日者有此失治乃貽終身患也

白砒一錢 雄黃

枯礬

鵝管石

石黃

寒水石火煨各一錢

右研細末用棗豆粉打糊丸棗豆大每服三丸臨臥并水送下忌熱物一晝夜即效

補遺

益府秘傳冲虛至寶丹

一治痘初起氣血兩虛倒塌黑陷不分地界或咳或瀉兼治

用○

○苦蔓

泪水浸煮

切曬乾主

風熱蠱證

腸風血精

下痢治大

麻風虛弱

忌服○

一延胡索

○

破血利氣

○

經止痛

紫草茸 八兩
荆穗 八兩

當歸 四兩

鮮筍 一片

紅花

木通

麻黃

白芷

白芨

牡丹皮

赤芍

懷生地

牛旁子

甘草 各四兩

右共咀片用水三十碗鍋內煎去二分起來再入水十碗煎至五碗去渣其

前汁煎滴水成珠加蜂蜜四兩再熬成珠為度聽用

梅花蕊 一個
蟾酥 三錢

紫河車 一具
酒煮成膏聽用

姜蚕 炒一兩

全蝎 酒洗

穿山甲 炒

川黃連 酒炒

杏仁 去皮尖
另研

黃芩

蜂房 炒

連翹 炒

地膚子 炒

大胡麻 已上各一兩

右為細末煎膏一半為丸如龍眼大每用一丸鮮雞湯下立起分地而出

奪命象皮丸

益藩傳

治氣不足空殼無膿一丸即有

象皮

一兩酒炒
磨下用

穩小鷲

即鷲蛋抱臨出死於殼內者是
用一箇蜜帛封皮焙黃色為度

大附子

五錢童便煮

黃花地丁

淨花二兩

人參 五錢

血蝎

五錢 沉香 二錢

麝香 三分

冰片 一錢

馬板榔 五錢

牛黃 五分

黃芪 蜜炙 五錢

細辛 五錢

射干 一兩

官桂 一錢

紅花○

層洗焙少

用通經活

血多用破

血去瘀血

○

水紅花

子○

研損用剋

堅消痞痰

積惡滯○

苒母○

去心糯米

沙黃合抽

鹿茸 五錢

辰砂 三錢

鎖鎖葡萄 小小者無核是一兩

木香 一錢

白附子 二錢

仙茅 一兩黑 甘草 五錢

右為末白酒醇打粳米糊為丸如龍眼大每二丸酒化下立起

神效救苦丹 益潘傳

治痘初起三五日熱不出又瀉又嗽喉嚨痛腰痛或痘或驚皆可治如痘初

出葱白湯下驚風泄瀉咳嗽痰喘如神

白附子

五錢山東者佳

天竺黃 二錢

全蝎 二錢

膽星 一兩

姜蚕 炒一兩

肉豆蔻

五錢

訶子 奶包煨去核五錢

麝香 一分

麝子 五錢

蒲公英花 五錢

朱砂 一錢

雄黃 二錢

川黃連 二錢

右為細末煎膏為丸如龍眼大金箔為衣滾水化下

起死回生散

治痘瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身搨破吭喘死在須臾眼此從新

另發出立可回生

扶瀉趙神仙傳

當歸

川芎

白芍

生地黃

升麻

家燥痰敷

惡瘡浙貝

去心炒專

消癰疽毒

痰○

茅根○

甘寒入胃

治內熱煩

渴利小便

止喘黃疸

○ 龍膽草

○ 去頭鬚切

紅花

上陷加白芷

下陷加牛膝

遍身黑陷加麻黃 象蓂微炒如一歲兒用二錢大則用到三五錢者

右剉一劑半水半酒煎服從新發出脚下有黑疔至七八日用針挑去以太

乙膏貼之即拔去毒連進二三服

麻疹

古謂麻即疹也疹出如麻成朵痘出如痘成粒皆象其形而名也夫胎毒一也

痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有也疹出於六

腑腑屬陽陽主氣故疹有形而無漿其形多實熱而無箕也為症既異則治

法亦殊痘宜內實可用補劑疹忌內實只宜解散惟初熱發表略相似耳既

出之後痘則補氣以生血疹宜補陰以制陽何也蓋疹熱甚則陰分受其熬

煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不可少動其氣所以人參白朮半

夏若燥悍之劑首尾當深忌也世知痘證所繫之重而不知疹之殺人尤甚

方書多忽而不備良可太息矣

細甘草湯

○一論疹發熱之初多似傷風惟疹子則咳嗽噴嚏鼻流清涕眼胞腫其淚汪

拌曬味瀟

汪而浮腫雙腮赤惡心乾嘔為異耳但見此候既是疹子便宜謹避風寒戒

大寒相火

暈腥厚味用藥以表散之使皮膚通暢腠理開而疹毒易出也

寄在肝膽

○一論疹之初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜

瀉肝膽勝

升麻葛根湯

升麻

乾葛

白芍各十分 甘草五分

肱之熱火

右劉生薑水煎服加紫蘇葱白以解肌切忌大汗斑不紅者亦宜乃麻疹初

療咽喉○

起之神方也

細辛○

○一論麻疹既出一日而又沒者乃為風寒所冲麻毒內攻若不治胃爛而死

去頭爪水

消毒飲

鼠粘子四錢

荆芥三錢

甘草生二錢 防風去苜五分

浸一宿切

右劉水煎服加烏犀角尤妙

曬治牙疼

○一論麻疹已出而復沒或出不盡心慌哭啼不止十分危急死在須臾或不

頭風通疔

痢腹痛可用

痰○

二仙湯

鄆陵劉孟門傳

當歸○

黃芩去朽

白芍藥生用

各等分水煎溫服如神

酒浸曬乾

○一論麻疹已出識語煩燥作渴者可用

切用上部

白虎解毒湯

石膏

知母

黃連

黃芩

用頭中部

黃柏

梔子

甘草

右劉水煎服

用身下部

○一論麻疹已出大小便閉可服

防風通聖散

方見中寒門

用梢頭身

○一論麻疹已出識語小便閉者宜

活血梢破

道赤散

生地黃

木通

甘草

淡竹葉七片

水煎服

血全用定

○一論麻疹已出泄瀉不止可服

血引血歸

四苓散

猪苓

澤瀉

白朮

去芦

白茯苓各等分

煎服如小便如泔者或

經除頭痛

小便不通者加車前木通

和血補血

○一論麻疹已出寒熱似瘧可服

潤腸胃筋

柴苓湯

柴胡

黃芩

半夏

減半

猪苓

澤瀉

白朮

去芦

骨皮膚排

白茯苓

甘草

右劉姜棗煎服

膿止痛

○一論麻疹已出大便下血或小便下血此血衄血或二便閉澁瘡疹同蜜熱

芎藭

犀角解毒湯

真犀角

一錢如無生麻代

生地黃

五分

牡丹皮

一錢

赤芍

一錢

不油者佳

忌獨用主

一身氣血

開鬱去瘀

血調經種

子排膿生

肌頭風目

淚多涕去

淫○

白芷○

水浸去灰

切炒消癰

飽膿頭風
中風解確

黃連

枯黃芩

黃柏

梔子

右剉水煎服

如吐血衄血加炒山梔子童便和服

○一論麻疹前後有熱潮不退等症並為血虛血熱可服

四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

血虛用熟地黃
血熱用生

右剉水煎服○發渴加麥門冬犀角汁○嗽加瓜藹霜○有淡加貝母陳皮去白

○一論麻疹止出之時雖不進飲食者但得麻疹淡紅潤澤真正不為害也蓋

熱毒未解內蘊實熱自不必食退後若不食當隨用四物湯加神麩砂仁一

二貼决能食矣如胃氣虛者忌少下地黃

○一論麻疹既出之時如色紅紫乾燥暗晦乃火盛毒熾宜四物湯用生地黃

加紅花酒炒黃芩

○一論麻疹既出已過三日不能投者乃內有虛熱宜用四物湯進之如失血

之症如犀角汁解之

○一論麻症退後若有牙根腐爛鼻血橫行並為失血之症急用四物湯加茵

陳木通生犀角之類以利小便使熱下行如疳瘡色白者為胃爛不治之也

毒○

白芍○

外科用酒

炒固勝收

飲○

赤芍○

消癰腫破

堅積惡血

下氣生肌

止痛○

丹皮○

酒拌蒸籠

後要藥治

骨蒸鈔裏

○一論麻退之後須避風寒戒水濕如或不謹遂致終身之咳嗽患瘡無有也
○一論麻疹前後大忌猪肉魚酒雞子之類恐惹終身之咳只宜用老雞精肉
煮食少助滋味可也

○一論孕婦出麻當以四物湯倍加白朮條芩艾葉安胎清熱為上則胎決無
厄而麻疹易出矣如胎氣上冲急用芎根艾葉煎湯磨生枳榔服之更以四
物湯大進之

○一論疹子沒後餘熱內攻循衣摸床讖言妄語神昏喪志者死如熱輕餘毒
未除必先見諸氣色雖預防之始終以升麻葛根湯為主或消毒飲解毒湯
隨症選用仍忌魚腥葱蒜之物

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

水煎溫服

補遺

十仙湯

序班孫雙泉傳

治疹後餘毒

柴胡

葛根

玄參

黃連

黃芩

梔子

陳皮

茯苓

枳殼

生地黃

煨熟厚大

腸○

木香○

下降癥腫

毒止吐痢

消積止腹

痛統理氣

分○

高良薑

○

土炒療寒

邪痞癖瘕

瘕宿積○

縮砂仁

右劉生薑煎服

○一小兒疹後咳嗽肢脹喘急煩燥泄瀉聲啞唇口青黑賈蘭峯傳

黃連

黃芩

連翹

玄參

知母

桔梗

杏仁

白芍

麻黃

牛蒡子

乾葛

陳皮

厚朴

甘草

右劉水煎服

○ 順氣開鬱

結炒研安

胎產後停

惡露小腹

作痛生研

六錢滾水

衝蓋溫服

立療○

香附○

去反童便

浸水洗曬

搗醋鹽水

拌炒解鬱