


欽定四庫全書

子部

備急千金要方卷十四

二至





詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

備急千金要方卷十二

唐 孫思邈 撰

小兒疳方

宋 林億等 校正

欽定第六

小兒出胎二百日許日頭身患小瘡治護小瘡復發五

月中患小瘡嗽微溫和治之因變癩一日二十過發

四肢縮動并脊身跳眼反須臾氣絕良久復蘇已與常

治痢湯得快吐下經日不間爾後單與竹瀝汁稍進一日一夕中合進一升許發時小踈明日與此竹瀝湯得吐下發便大折其間猶稍稍與竹瀝汁

竹瀝湯方

竹瀝

五合

黃芩

三十銖

木防已

羚羊角

白朮

各六銖一作白鮮

大黃

二兩

茵芋

三銖

麻黃

白薇

桑寄生

草薺

甘草

各半兩

右十二味㕮咀以水二升半煮取藥減半內竹瀝煎
取一升分服二合相去一食久進一服一方無
革薺
紫菀湯治小兒中冷及傷寒暴嗽或上氣咽喉鳴氣逆
或鼻塞清水出方

紫菀

杏仁

黃芩

當歸

甘草

橘皮

青木香

麻黃

桂心

各六
銖

大黃

一
兩

右十味㕮咀以水三升煮取九合去滓六日至百

日兒一服二合半一百日至二百日兒一服三合

五味子湯治小兒風冷入肺上氣氣逆面青喘迫欬嗽

晝夜不息食則吐不下方

五味子

當歸

各半兩

麻黃

乾薑

桂心

人參

紫苑

甘草

各六兩

細辛

款冬花

各二銖

大黃

一兩半

白朮

右十二味以水二升半煮取九合去滓兒六十

日至百日一服二合半一百日至二百日一服三合其

大黃別浸一宿下

一方無欬冬花大黃有大棗三枚

治小兒大人欬逆短氣胸中吸吸呵出涕唾嗽出臭膿

方

燒淡竹瀝煮二十沸小兒一服一合日五服大人一

升亦日五服不妨食息乳哺

治小兒寒熱欬逆膈中有癖乳若吐不欲食方

乾地黃

四兩

麥門冬

五味子

蜜

各半升

大黃

消石

各一兩

右六味呔咀以水三升煮取一升去滓內消石蜜煮
令沸服二合日三胸中當有宿乳汁一升許出大者
服五合

射干湯治小兒欬逆喘息如水雞聲方

射干

麻黃

紫苑

甘草

生薑

兩各一

半夏

枚五

桂心

寸五

大棗

枚二十

右八味呔咀以水七升煮取一升五合去滓內蜜五
合煎一沸分溫服二合日三

又方

半夏

四兩

紫苑

桂心

生薑

細辛

阿膠

甘草

各二兩

款冬花

二合

蜜

一合

右九味㕮咀以水一斗煮半夏取六升去滓內諸藥
煮取二升五合五歲兒服一升二歲服六合量大小
多少加減之服之立効

杏仁圓治大人小兒欬逆上氣方

杏仁三升熟搗如膏蜜一升為三分以一分內杏仁搗令強更內一分搗之如膏又內一分搗熟止先食已含咽之多少自在日三每服不得過半方寸匕則利

又方

半夏 二斤去皮河水洗六七度完用

白礬 一斤為末

丁香

甘草

草豆蔻

川升麻

縮砂 各四兩粗搗

右七味以好酒一斗與半夏拌和勻同浸春冬三七

日夏秋七日密封口日足取出用冷水急洗風吹乾
每服一粒嚼破用薑湯下或乾喫候六十日乾方得

服疑非孫思邈方

八味生薑煎治少小嗽方

生薑七兩

乾薑四兩

桂心二兩

甘草

款冬花各三兩

紫苑各三兩

杏仁

蜜各一升

右合諸藥為末微火上煎取如飴鋪量其大小多少
與兒含咽之百日小兒如棗核許日四五服甚有驗

四物款冬圓治小兒嗽晝瘥夜甚初不得息不能復啼
方

款冬花

紫莞

各一兩半

桂心

兩半

伏龍肝

六銖

右為末蜜和如泥取如棗核大傅乳頭令兒飲之日

三傳之漸漸令兒飲之

菖蒲圓治小兒暴冷嗽及積風冷嗽兼氣逆鳴方

菖蒲

烏頭

杏仁

礬石

細辛

皂莢

各六銖

款冬花

乾薑

桂心

紫苑

各十
八銖

蜀椒

五銖

吳茱萸

六合

右十二味為末蜜丸如梧子三歲兒飲服五丸加至
十九日三兒小以意減之兒大以意加之暴嗽數服
便瘥

桂枝湯治少小十日已上至五十日卒得聲欬吐乳嘔
逆暴嗽晝夜不得息方

桂枝

半兩

甘草

二兩
半

紫苑

十八銖

關

麥門冬

一兩十
八銖

右四味呿咀以水二升煮取半升以綿著湯中捉綿滴兒口中晝夜四五過與之節乳哺

麻黃湯治少小卒肩息上氣不得安此惡風入肺方

麻黃四兩 甘草一兩 桂心五寸 五味子半升

半夏 生薑各二兩

右六味呿咀以水五升煮取二升百日兒服一合大

小節度服之便愈

癖結脹滿第七 方灸法

霍亂附

雙紫圓治小兒身熱頭痛食飲不消腹中脹滿或小腹
絞痛大小便不利或重下數起小兒無異疾惟飲食過
度不知自止哺乳失節或驚悸寒熱惟此丸治之不瘥
更可重服小兒欲下是其蒸候哺食減少氣息不快夜
啼不眠是腹內不調悉宜用此丸不用他藥數用神驗

千金不傳方

臣億等詳序例中凡云服紫丸者即前變
蒸篇中四味者是也云服紫丸不下者服

赤丸赤丸差駛病重者當用之方中並無赤丸
而此用朱砂又力緊於紫丸疑此即赤丸也

巴豆

蕤核仁

各十
八銖

麥門冬

十
銖

甘草

五
銖

甘遂

朱砂

各二銖

牡蠣

蠟

各八銖

右八味以湯熟洗巴豆研新布絞去油別擣甘草甘遂牡蠣麥門冬下篩訖研蕤核仁令極熟乃內散更擣二千杵藥燥不能相丸更入少蜜足之半歲兒服如葶子一雙一歲二歲兒服如半麻子一雙三四歲者服如麻子二丸五六歲者服如大麻子二丸七歲八歲服如小豆二丸九歲十歲微大於小豆二丸常以雞鳴時服至日出時不下者熱粥飲數合即下丸

皆雙出也下甚者飲以冷粥即止

治小兒胎中宿熱乳母飲食粗惡辛苦乳汁不起兒乳
哺不為肌膚心腹痞滿萎黃瘦瘠四肢痿躄繚戾服之
可令充悅方

芍藥

柴胡 各二兩

大黃

人參 各一兩

乾薑

加熟以枳實代

甘草 各半兩

鼈甲

茯苓 各一兩半

右八味為末蜜丸如大豆服一丸一歲已上乳服三
丸七歲兒服十丸日二

牛黃圓治小兒宿乳不消腹痛驚啼方

牛黃三銖

附子二枚

真珠

巴豆

杏仁各一兩

右五味搗附子真珠為末下篩別搗巴豆杏仁令如

泥內藥及牛黃搗一千二百杵藥成若乾入少蜜足

之百日兒服如粟米一丸三歲兒服如麻子一丸五

六歲兒服如胡豆一丸日二先乳哺了服之膈上下

悉當微轉藥完出者病愈散出者更服以藥完出為

度

芒硝紫圓治小兒宿食癖氣痰飲往來寒熱不欲食消

瘦方

芒硝

大黃

各四兩

半夏

甘遂

各二兩

代赭一兩

巴豆

二百枚

杏仁

一百二十枚

右七味為末別搗巴豆杏仁治如膏旋內藥末搗三

千杵令相和合强者內少蜜百日兒服如胡豆一丸

過百日至一歲服二丸隨兒大小以意節度當候兒

大便中藥出為愈若不出更服如初

治八歲已上兒熱結痰實不能食自下方

芍藥

梔子

知母

大黃

各二兩

柴胡

二兩六銖

升麻

黃連

黃芩

各二兩半

竹葉

切一升半

桔梗

一兩半

細辛

十五銖

右十一味呶咀以水六升煮取一升八合去滓分四服十歲兒為三服一本有枳實杏仁各一兩半而無

桔梗黃連

治十五已下兒熱結多痰食飲減自下方

大黃

柴胡

黃芩 各三兩

枳實 一兩十八銖

升麻

芍藥

知母

梔子 各二兩半

生薑 十八銖

杏仁 三兩

竹葉 切一升半

右十一味以水六升半煮取二升十歲至十五

者分三服

牛黃雙圓治小兒結實乳食不消心腹痛方

牛黃

太山甘遂 各半兩

真珠 六銖

杏仁

芍藥

黃芩

兩各一

巴豆

銖十八

右七味為末蜜丸一歲兒飲服如麻子二丸但隨兒

大小加減之

牛黃鼈甲圓治少小癖實壯熱食不消化中惡忤氣方

牛黃

厚朴

茯苓

桂心

芍藥

乾薑

各半兩

鼈甲

麥麩

柴胡

大黃

枳實

芍藥

各一兩

右十二味為末蜜丸如小豆大日三服以意量之

芫花圓治小兒心下痞痰癖結聚腹大脹滿身體壯熱不欲哺乳方

芫花

黃芩

各一兩

大黃

雄黃

各二兩半

右四味為末蜜和更搗一千杵三歲兒至一歲已下服如粟米一丸欲服丸內兒喉中令母與乳若長服消病者當以意消息與服之與乳哺相避

真珠圓治小兒痰實結聚宿癖羸露不能飲食方

真珠

半兩

麥門冬

一兩

麩仁

二百枚

巴豆

四十枚

右四味為末蜜丸菴歲兒服二丸如小豆大二百日
兒服如麻子二丸漸增以知為度當下病赤黃白黑
葵汁下勿絕藥病盡下自止久服使小兒肥白已試

驗

鼈甲圓治少小腹中結堅脅下有疹手足煩熱方

鼈甲

芍藥

大黃

各三
十銖

茯苓

柴胡

乾薑

各二十
四銖

桂心

六銖

廣蟲

蟻螯

各二
十枚

右九味為末蜜和服如梧子七丸漸漸加之以知為度

鼈頭圓治小兒痞氣脅下腹中有積聚堅痛方

鼈頭

一枚

甘皮

兩半

蝨蟲

廣蟲

桃仁

各十八銖

右五味為末蜜丸服如小豆二丸日三大便不利加大黃十八銖以知為度

治小兒羸瘦懈懈宜常服不妨乳方

甘草五兩為末蜜丸一歲兒服如小豆十九日三服
盡即更合

桂心橘皮湯治小兒五六日不食氣逆方

桂心

人參 各半兩

橘皮 三兩

黍米 五合

成擇薤 五兩

右五味呔咀以水七升先煮藥煎取二升次下薤米

米熟藥成稍稍服之

地黃圓治少小胃氣不調不嗜食生肌肉方

乾地黄

大黄

各一兩
六銖

茯苓

十八銖

當歸

柴胡

杏仁

各半
兩

右六味為末以蜜丸如麻子大服五丸日三

馬通栗圓治少小脅下有氣內痛喘逆氣息難往來寒

熱羸瘦不食方

馬通中栗

十八銖

杏仁

紫苑

細辛

各半
兩

五味子

石膏

秦朮

半夏

茯苓

各六
銖

金匱要略卷十二
右丸味為末蜜丸服如小豆十丸日三不知加至二十丸

治小兒下痢腹大且堅方

以故衣帶多垢者切一升水三升煮取一升分三服

又方

腹上摩衣中白魚亦治陰腫

治少小腹脹滿方

燒父母指甲灰乳頭上飲之

又方

韭根汁和猪脂煎細細服之

又方

車轂中脂和輪下土如彈丸吞之立愈

又方

米粉鹽等分炒變色腹上摩之

治小兒癖

灸兩乳下一寸各三壯

當歸圓治小兒胎寒嘔啼腹中痛舌上黑青涎下方一名

丸黑

當歸

狼毒

各九銖

吳茱萸

一作杏仁

蜀椒

各半兩

細辛

乾薑

附子

各十銖

巴豆

十枚

豉

七合

右九味搗七種下篩秤藥末令足研巴豆如膏稍稍
內末搗令相得密和桑杯盛蒸五升米飯下出搗一
千杵一月兒服如黍米一丸日一夜二不知稍加以

知為度亦治水癖

馬齒礬圓治小兒胎寒嘔啼驚癇腹脹不嗜食大便青黃并大人虛冷內冷或有實不可吐下方

馬齒礬一斤燒半日以棗膏和大人服如梧子二丸日三小兒以意減之以腹內溫為度有實實去神妙

治小兒忽患腹痛夭矯汗出名曰胎寒方

煮梨葉濃汁七合可三四度飲之

半夏圓治小兒暴腹滿欲死方

半夏隨多少微火炮之擣末酒和服如粟米粒大五

丸日三立愈

治小兒霍亂吐痢方

人參一兩

厚朴

甘草各半兩

白朮十八銖

右四味以水一升二合煮取半升六日兒服

一合百日兒分三服暮歲分二服中間隔乳服之乳

母忌生冷油膩等一方加乾薑一分或加生薑三分

藿香湯治毒氣吐下腹脹逆害乳哺方

藿香

一兩

生薑

三兩

青竹茹

甘草

各半兩

右四味㕮咀以水二升煮取八合每服一合日三有熱加升麻半兩

治孩子霍亂已用立驗方

人參

蘆薈

各半兩

菹豆藤

二兩

倉米

一撮

右四味㕮咀以水二升煮取八合分溫服

又方

人參

一兩

木瓜

一枚

倉米

一撮

右三味呿咀以水煮分服以意量之立効

治小兒霍亂方

研尿滓乳上服之

又方

牛涎灌口中一合

治少小吐痢方

亂髮半兩
燒灰

鹿角六
銖

右二味為末米汁服一合圭日三服

又方

熱牛尿含之一作牛膝

又方

燒特猪尿水解取汁少小服之

備急千金要方卷十二

欽定四庫全書

備急千金要方卷十三

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

癰疽瘰癧第八

論方
灸法

漏蘆湯治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癰方

漏蘆

連翹

肘後用
白薇

白欬

芒硝

肘後用
芍藥

甘草

各六
銖

大黃

一兩

升麻

枳實

麻黃

黃芩

各九銖

右十味㕮咀以水一升半煎取五合兒生一日至七

日取一合分三服八日至十五日取一合半分三服

十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日

取三合分三服三十日至四十日取五合分三服肘後

治大人各用二兩大黃三兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針鏡去血經心錄無連翹有知母芍

藥犀角各等分

五香連翹湯治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰癧

附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白軫瘰不已方

青木香

薰陸香

雞舌香

沉香

麻黃

黃芩

各六
銖

大黃

二
兩

麝香

三
銖

連翹

海藻

射干

升麻

枳實

各半
兩

竹瀝

三
合

右十四味呿咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合兒生百日至二百日一服三合二百日至暮歲一服五合一方不用麻黃

連翹圓治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結核

癰癧及心腹脇背裏有堅核不痛名為結風氣腫方

連翹

桑白皮

白頭翁

牡丹

防風

黃蘗

桂心

香豉

獨活

秦朮

各一兩

海藻

半兩

右十一味為末蜜丸如小豆三歲兒飲服五丸加至

十丸五歲已上者以意加之

治丹毒大赤腫身壯熱百病不折方

寒水石

十六銖

石膏

十三銖

藍青

十二銖用乾者

犀角

柴胡

杏仁

各八銖

知母

十銖

甘草

五銖

羚羊角

六銖

芍藥

黃芩

各七銖

梔子

十一銖

竹瀝

一升

生葛汁

四合澄清

蜜

二兩

右十五味以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏仁脂葛汁蜜微火煎取二升一二歲兒服二合大者量加之

麻黃湯治小兒丹腫及風毒風疹方

麻黃 一兩半

獨活

射干

甘草

桂心

青木香

石膏

黃芩 各一兩

右八味以水四升煮取一升三歲兒分為四服

日再

又方治小兒惡毒丹及風疹方

麻黃

升麻

葛根 各一兩

射干

雞舌香

甘草 各半兩

石膏 半兩

右七味以水三升煮取一升三歲兒分三服日

三

撮湯治小兒數十種丹方

大黃

甘草

當歸

芍藥

白芷

獨活

黃芩

芍藥

升麻

沉香

青木香

木蘭皮

各一兩

芒硝

三兩

右十三味哎咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒

硝以綿搵湯中適寒溫撮之乾則易之取瘥止

治小兒溺竈丹初從兩股及臍間起走入陰頭皆赤方
桑根皮切一斗以水二斗煮取一斗以洗浴之

治小兒丹毒方

擣慎火草絞取汁塗之良其丹毒方具在別卷

治小兒赤遊腫若徧身入心腹即能殺人方

擣伏龍肝為末以雞子白和傅乾易之

又方白豆末水和傅之勿令乾

治小兒半身皆紅赤漸漸長引者方

牛膝

甘草

右二味㕮咀合得五升以水八升煮三沸去滓和伏龍肝末傅之

治小兒身赤腫起者方

熬米粉令黑以唾和傅之

又方

伏龍肝

亂髮灰

右二味為末以膏和傅之

治小兒卒腹皮青黑方

以酒和胡粉傅上若不急治須臾便死又灸臍上下

左右去臍半寸并鳩尾骨下一寸凡五處各三壯

五香枳實湯治小兒著風熱痞癰堅如麻豆粒瘡癢搔

之皮剝汁出或徧身頭面年年常發者方

青木香

九銖

麝香

六銖

雞舌香

薰陸香

沉香

防風

秦朮

漏蘆

各半兩

升麻

黃芩

白欬

麻黃

各一兩

枳實

一兩半

大黃

一兩十八銖

右十四味以水五升煮取一升八合紀五六歲

者一服四五合七八歲者一服六合十歲至十四五

者加大黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服

治小兒火灼瘡一身盡有如麻豆或有膿汁乍痛乍癢

方

甘草

芍藥

白斂

黃芩

黃連

黃蘗

苦參

各半兩

右七味為末以蜜和傅之日二夜一亦可作湯洗之

治小兒瘡初起燥漿似火瘡名曰燥瘡亦名爛瘡方

桃仁熟搗以面脂和傅之亦治徧身赤腫起

又方馬骨燒灰傅之

水銀膏治小兒熱瘡方

水銀

胡粉

松脂

各三兩

右三味以豬脂四升煎松脂水氣盡下二物攪令勻

不見水銀以傅之

治小兒上下徧身生瘡方

芍藥

黃連

黃芩

各三兩

苦參

八兩

大黃

二兩

蛇床子

一斤

黃蘗

五兩

拔藜

一斤

右八味哎咀以水二斗煮取一斗以浸浴兒

苦參湯浴小兒身上下百瘡不瘥方

苦參

八兩

地榆

黃連

王不留行

獨活

艾葉

各五兩

竹葉

二升

右七味哎咀以水三斗煮取一斗以浴兒瘡上浴訖

傅黃連散

治三日小兒頭面瘡起身體大熱方

升麻

柴胡

石膏

各六銖

甘草

當歸

各十銖

大黃

黃芩

各十銖

右七味㕮咀以水四升煮取二升分服日三夜一量

兒大小用之

治小兒身體頭面悉生瘡方

榆白皮隨多少曝令燥下篩醋和塗綿以傅瘡上蟲

自出亦可以猪脂和塗之

枳實圓治小兒病風瘙癢痛如疥搔之汁出徧身痞癩
如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細黃及
肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛極體當風風相
薄所得也不早治之成大風疾方

枳實

一兩

菊花

蛇床子

防風

蒺藜子

白薇

浮萍

各一兩

天雄

麻黃

漏蘆

各半兩

右十味為末蜜和如大豆許五歲兒飲服十丸加至二十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服
治小兒風癢癭疹方

蒴藿

防風

羊桃

石南

秦椒

升麻

苦參

茵芋

芫花

一云芫蔚

蒺藜

蛇床子

枳實

礬石

各一兩

右十三味㕮咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令

小沸浴之

又方牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不瘥搗末傅之亦
主骨疽癩疾瘰癧絕妙

澤蘭湯主丹及癭疹入腹殺人方

澤蘭

芎藭

附子

茵芋

藁本

莽草

細辛

各十
二銖

右七味以咀以水三升煮取一升半分四服先與此
湯然後作餘治

治小兒手足及身腫方

巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿內湯中拭病上隨手消并治癧疹

又方以小便溫暖漬之良

論曰小兒頭生小瘡浸淫疽癢黃膏出不生痂連年不瘥者亦名妬頭瘡以赤龍皮湯及天麻湯洗之內服漏蘆湯不宜傳飛烏膏散及黃連胡粉水銀膏散方具在

別卷

藜蘆膏治小兒一切頭瘡久即疽癢不生痂方

藜蘆

黃連

雄黃

黃芩

松脂

各二兩

猪脂

半斤

礬石

五兩

右七味為末煎令調和先以赤龍皮天麻湯洗訖傳

之

赤龍皮槲木皮是也

治小兒頭瘡經年不瘥方

松脂

苦參

黃連

各一兩半

大黃

胡粉

各一兩

黃芩

水銀

各一兩六銖

礬石

半兩

蛇床子

十八銖

右九味為末以臘月猪脂和研水銀不見傳之

又方取屋塵末和油瓶下滓以皂莢湯洗傳之

又方取大蟲脂傳之亦治白禿

又方髮中生瘡頂白者皆以熊白傳之

治小兒頭瘡方

胡粉

一兩

黃連

二兩

右二味為末洗瘡去痂拭乾傳之即瘡更發如前傳

之

又方

胡粉

連翹

各一兩

水銀

半兩

右三味以水煎連翹內胡粉水銀和調傅之

又方

白松脂

胡粉

各二兩

水銀

一兩

猪脂

四兩

右四味合煎去滓內水銀粉調傅之大人患同

苦參湯治小兒頭瘡方

苦參

黃芩

黃連

黃蘗

甘草

大黃

芍藥

各一兩

蒺藜子

三合

右八味以水六升煮取三升漬布搨瘡上日數

過

治小兒頭上惡毒腫瘰諸瘡方

男子屎尖燒灰和臘月猪脂先以酢泔清淨洗拭乾

傳之

治小兒秃頭瘡方

取雄雞尿陳醬汁苦酒和以洗瘡了傳之

又方芫花臘月猪脂和如泥洗去痂傳之日一度

千金翼治

白

治小兒頭禿瘡方

葶藶子細末先洗傳之

又方不中水蕪菁葉燒作灰和猪脂傳之

治小兒頭禿瘡無髮苦癢方

野葛末

猪脂

羊脂

各一兩

右三味合煎令消待冷以傅之不過三上

治少小頭不生髮一物楸葉方

楸葉搗取汁傅頭上立生

治小兒頭不生髮方

燒鯽魚灰末以醬汁和傅之

治小兒瘰瘡方

冢中石灰傅之厚著之良

又方燒桑根灰傅之并燒烏羊角作灰相和傅之

治小兒疽癩方

丹砂

大黃

各三
十銖

雄黃

蘭茹

漆頭
者

雌黃

各二十
四銖

礬石

馬齒
者

莽草

各十
八銖

黃連

三十
六銖

右八味㕮咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去滓下諸色末攪凝傅之

治小兒惡瘡方

熬豉令黃為末傅瘡上不過三傅愈

治小兒疽極月初即生常有黃水出方

酢和油煎令如粥及熱傅之二日一易欲重傅則以
皂莢湯洗瘡乃傅之

治小兒月蝕瘡隨月生死方

以胡粉和酥傅之五日瘡

治月蝕九竅皆有瘡者方

燒蚯蚓屎末和猪膏傅之

又方水和粉傅之

治小兒浸淫瘡方

竈中黃土 髮灰

右二味各等分為末以豬脂和傅之

治小兒黃爛瘡方

四交道中土

竈下土

右二味各等分為末以傅亦治夜啼

又方燒艾灰傅之

又方燒牛屎傅之亦可滅癩

治小兒疥方

燒竹葉為灰雞子白和傅之日三亦治疥瘡

又方燒亂髮灰和臘月猪脂傅之

又方以臭酥和胡粉傅之

治小兒頭面瘡疥方

麻子五升為末以水和絞取汁與蜜和傅之若有白
犬膽傅之大佳

治小兒濕癬方

枸杞根搗作末和臘月猪膏傅之

又方桃青皮擣末和醋傅之日二

又方煎馬尿以洗

又方指破以牛鼻上津傅之

又方燒狗屎灰和猪脂塗之

治小兒身上生赤疵方

取馬尿洗日四五度

治小兒身上有赤黑疵方

針父脚中取血貼疵上即消

又方取狗熱尿傅之皮自卷落

治小兒疣目方

以針及小刀子決目四面令血出取患瘡人瘡中汁黃膿傅之莫近水三日即膿潰根動自脫落

備急千金要方卷十三

欽定四庫全書

備急千金要方卷十四

唐 孫思邈 撰

宋 林億等 校正

少小嬰孺方

小兒雜病第九

方
灸法

治小兒臍中生瘡方

桑汁傅乳上使兒飲之

又方飲殺羊乳及血

金匱要略卷十四
治小兒風臍遂作惡瘡歷年不瘥方

取東壁上土傅之大佳若汁不止燒蒼耳子粉之

又方乾疥螬蟲末粉之不過三四度瘥

治小兒臍不合方

取車轄脂燒灰日一傅之

又方燒蜂房灰為末傅之

治小兒臍中生瘡方

燒甌帶灰和膏傅之

治小兒臍赤腫方

杏仁兩半

猪頰車髓十八

右二味先研杏仁如脂和髓傳臍中腫上

白石脂散治小兒臍汁不止兼赤腫方

以白石脂細研熬令微暖以粉臍瘡日三四度

治小兒鵝口不能飲乳方

鵝屎汁瀝兒口中

又方黍米汁塗之

又方取小兒父母亂髮淨洗纏桃枝沾取井花水東向向日以髮拭口中得口中白乳以置水中七過瀝洗三朝作之

治小兒心熱口為生瘡重舌鵝口方

柘根剉五升無根弓材亦佳以水五升煮取二升去滓更煎取五合細細傅之數次良

治口瘡白漫漫方

先以父淨髮拭口次取桑汁塗之

治重舌舌強不能收唾方

鹿角末如大豆許安舌下日三四度亦治小兒不能
乳

又方取蛇蛻燒末以雞毛蘸醇醋點藥掠舌下愈

治小兒重舌方

取田中蜂房燒灰酒和塗喉下愈

又方衣魚塗舌上

又方竈月下黃土末苦酒和塗舌上

又方二家屠肉切令如指大摩舌上兒立能啼

又方赤小豆末醋和塗舌上

又方燒簸箕灰傳舌下

又方黃蘗以竹漚漬取細細點舌上良

治重舌方

灸行間隨年壯穴在足大趾岐中

又灸兩足外踝上三壯

治小兒舌上瘡方

蜂房燒灰屋間塵各等分和勻傅之

又方桑白汁塗乳與兒飲之

又方羊蹄骨中生髓和胡粉傅之

治舌腫強滿方

滿口含糖醋良

又方飲殺羊乳即瘥

治小兒口瘡不得吮乳方

大青

銖十八

黃連

銖十二

右二味呔咀以水三升煮取一升二合一服一合日
再夜一

又方

蜜二升

甘草

如指大
三寸

臘月猪脂

斤一

右三味合煎相得含如棗大稍稍咽之日三

又方礬石如雞子大置醋中塗兒足下二七遍愈

治小兒燕口兩吻生瘡方

燒髮灰和猪脂傅之

治小兒口下黃肌瘡方

取殺羊鬣燒作灰和臘月豬脂傅之角亦可用

治口傍惡瘡方

亂髮灰

胡絮灰

黃連

乾薑

右四味等分為散以粉瘡上不過三遍

治口噤赤者心噤白者肺噤方

雞屎白棗大綿裝以水一合煮二沸分再服

治小兒口噤方

鹿角粉

大豆末

右二味等分和乳塗乳上飲兒

又方

驢乳

猪乳

各二升

右二味合煎得一升五合服如杏仁許三四服瘥
雀屎圓治小兒卒中風口噤不下一物方

雀屎如麻子丸之飲下即愈大良雞屎白亦佳

治小兒口中涎出方

以白羊尿內口中

又方以東行牛口中沫塗口中及頤上又桑白汁塗之
癢

治小兒卒毒腫著喉頸肚熱妨乳方

升麻

射干

大黃

各一兩

右三味呔咀以水一升五合煮取八合一歲兒分三
服以滓薄腫上冷更暖以薄大兒以意加之

升麻湯治小兒喉痛若毒氣盛便咽塞并治大人咽喉

不利方

升麻

生薑

射干

各二兩

橘皮

一兩

右四味以水六升煮取二升去滓分三服

治小兒喉痺腫方

魚膽二七枚以和竈底土塗之瘥

治小兒喉痺方

桂心

杏仁

各半兩

右二味為末以綿裹如棗大含咽汁

治小兒解顛方

熬蛇蛻皮為末和猪頰車中髓傳頂上日三四度

又方猪牙頰車髓傳顛上瘥

治小兒腦長解顛不合羸瘦色黃至四五歲不能行半

夏熨方

半夏

生薑

芎藭

各一升

細辛

三兩

桂心尺一

烏頭

十枚

右六味以酒五升漬之晷時煮三沸絞去

滓以綿一片浸藥中適寒温以熨顙上冷更温之復

熨如前朝暮各三四熨乃止二十日可愈

治小兒解顙用生蟹足傳方

生蟹足

白斂

各半兩

右二味擣末以乳汁和傳顙上立愈

治小兒解顙細辛傳方

細辛

桂心

各半兩

乾薑

十八銖

右三味為末以乳汁和傳顙上乾復傳之兒面赤即

愈

治小兒顛開不合方

防風 一兩半

栢子仁

白芨 各一兩

右三味為末以乳和傅顛上日一十日知二十日愈

又方取猪牙車骨煎取髓傅顛上愈

小兒顛陷方

灸臍上下各半寸及鳩尾骨端又足太陰各一壯

治小兒狐疝傷損生癩方

桂心十八銖

白朮一兩十八銖

地膚子二兩半

右三味為末以蜜和丸白酒服如小豆七丸日三治亦

大人

又方

芍藥

茯苓各十八銖

防葵一作防風

大黃各半兩

半夏

桂心

蜀椒各六銖

右七味為末蜜和服如大豆一丸日五服可加至三

丸

五等圓治小兒陰偏大又卵核堅癩方

黃蘗

香豉

牡丹

防風

桂心 各二兩

右五味為末蜜丸如大豆兒三歲飲服五丸加至十丸兒小以意酌量著乳頭上服之

治小兒卵腫方

取雞翅六莖燒灰服之隨卵左右取翮

古今錄驗云治陰大如斗

治小兒氣癩方

土瓜根

芍藥

當歸

兩各一

右三味以水二升煎取一升服五合日二

又方三月上除日取白頭翁根搗碎隨偏處傳之一宿
作瘡二十日愈

治氣癩方

灸足厥陰大敦左灸右右灸左各一壯

治小兒陰瘡方

以人屎灰傳之又狗屎灰傳之又狗骨灰傳之又馬

骨末傳之

治小兒岐股間連陰囊生瘡汁出先癢後痛十日五日
自瘥或一月或半月復發連年不瘥者方

灸瘡搔去痂帛拭令乾以蜜傳更洩麩作燒餅熟即
以錫塗餅上熨之冷即止再度瘥

治小兒陰腫方

狐莖炙搗末酒服之

又方灸大敦七壯

又方斫桑木白汁塗之

又方搗蕪菁薄上

又方搗垣衣傅之又以衣中白魚傅之

又方猪屎五升水煮沸布裹安腫上

治小兒陰瘡方

取狼牙濃煮汁洗之

又方黃連胡粉等分以香脂油和傅之

治小兒核腫壯熱有實方

青木香

甘草

石膏

甘遂

各十銖

麝香

三銖

大黃

前胡

各一兩

黃芩

半兩

右八味㕮咀以水七升煮取一升九合每服三合日

四夜二

鼈頭圓治小兒積冷久不瘥後餘脫肛不瘥腹中冷肛中疼痛不得入者方

死鼈頭

二枚炙令焦

磁石

四兩

桂心

三兩

小蛻皮

一枚炙令焦

金匱要略卷十四
右四味為末蜜丸如大豆兒三歲至五歲服五丸至
十丸日三兒年大以意加之

小兒脫肛方

灸頂上旋毛中三壯即入又灸尾翠骨三壯又灸臍
中隨年壯

治小兒疳濕瘡方

鐵衣著下部中即瘥

又方灸第十五椎俠脊兩傍七壯未瘥加七壯

治小兒疳瘡方

以猪脂和胡粉傅之五六度

又方嚼麻子傅之日六七度

又方羊膽二枚和醬汁於下部灌之猪脂亦佳

治濕瘡方

濃煮地榆汁洗浴每日二度

治小兒久痢膿濕墜方

艾葉五升以水一斗煮取一升半分為三服

除熱結腸圓斷小兒熱下黃赤汁沫及魚腦雜血肛中
瘡爛坐墜生蟲方

黃連

藥皮

苦參

鬼臼

獨活

橘皮

芍藥

阿膠

各半兩

右八味為末以藍汁及蜜丸如小豆日服五丸至十

丸

冬無藍汁可用藍子一合春蜜和丸

治小兒虻蟲方

削棟木上蒼皮以水煮取汁飲之量大小多少為此

有小毒

治小兒羸瘦有虻蟲方

藿蘆二兩以水一升米二合煮取米熟去滓與服

又方蒹蓄三兩水一升煮取四合分服之搗汁服亦佳

又方

桃白皮

三兩

東引吳茱萸根白皮

四兩

右二味㕮咀以酒一升二合漬之一宿漸與服取瘥

又方取猪膏服之

一云治虻蟲

又方擣槐子內下部中瘥為度一云治
蛻蟲

又方棟實一枚內孔中一云治
蛻蟲

治寸白蟲方

東行石榴皮一把水一升煮取三合分服

又方桃葉擣絞取汁服之

治小兒三蟲方

雷丸 芎藭

右二味各等分為末服一錢七日三

治大便竟出血方

鼈頭一枚炙令黃黑為末以飲下五分匕多少量兒
大小日三服

又方燒車釭一枚令赤內一升水中分二服

又方燒甌帶末傅乳頭上令兒飲之

治小兒尿血方

燒鵲巢灰并花水服之亦治夜尿牀

又方尿血灸第七椎兩傍各五寸隨年壯

治小兒遺尿方

瞿麥

石韋

龍膽

皂莢

桂心

兩各半

雞腸草

人參

兩各一

車前子

一兩六銖

右八味為末蜜丸每食後服如小豆大五丸日三加

至六七丸

又方小豆葉搗汁服

又方燒雞腸為末漿水服方寸匕日三一云面北斗服

又方灸臍下一寸半隨年壯又灸大敦三壯亦治尿

血

地膚子湯治小兒熱毒入膀胱中忽患小便不通欲小便則澁痛不出出少如血須臾復出方

地膚子

瞿麥

知母

黃芩

枳實

升麻

葵子

猪苓

各六銖

通草

海藻

橘皮

各三銖

大黃

十八銖

右十二味咬咀以水三升煮取一升一日至七日兒服一合為三服八日至十五日兒一合半為三服十

金匱要略卷十四
六日至二十日兒二合為三服四十日兒以此為準
五十日已上七歲已下以意加藥益水

治小兒淋方

車前子一升水二升煮取一升分服

又方煮冬葵子汁服之

又方取蜂房亂髮燒灰以水服一錢七日再

治小兒小便不通方

車前草切一升小麥一升

右二味以水二升煮取一升二合去滓煮粥服日三
四

又方冬葵子一升以水二升煮取一升分服入滑石末
六銖

治小兒癩方

蜥蜴一枚燒末酒服之

治小兒吐血方

燒蛇蛻皮末以乳服之并治重舌

又方取油三分酒一分和之分再服

治小兒鼻塞生息肉方

通草

細辛

各一兩

右二味擣末取藥如豆著綿纏頭內鼻中日二

治小兒鼻塞不通濁涕出方

杏仁

半兩

蜀椒

附子

細辛

各六銖

右四味以醋五合漬藥一宿明日以猪脂五合

煎令附子色黃膏成去滓了更以塗絮導鼻孔中日

再兼摩頂

治小兒聾耳方

末石硫黃以粉耳中日一夜一

治小兒耳瘡方

燒馬骨灰傅之

又方燒雞屎白筒中吹入

治小兒齒落久不生方

以牛屎中大豆二七枚小開豆頭以注齒根處數度

金匱要略卷十四
卷十四
即生

又方取雄鼠屎二七枚以一屎拭一齒根處盡此上二
十日即生雄鼠屎頭尖

治小兒四五歲不語方

未赤小豆酒和傅舌下

又方灸足兩踝各三壯

治小兒數歲不能行方

取葬家未開戶盜食來以哺之日三便起行

治小兒不能乳方

雀屎四枚為末著乳頭飲兒兒大十枚

蒲黃湯治小兒落床墮地如有瘀血腹中陰陰寒熱不肯乳哺但啼哭叫喚方

蒲黃

麥門冬

大黃

黃芩

各十銖

甘草

八銖

芒硝

七銖

黃連

十二銖

右七味呔咀以水二升煮取一升去滓內芒硝分三服消息視兒羸瘦半之大小便血即愈忌冷食

金匱要略卷之十四
治小兒食不知饑飽方

鼠屎二七枚燒為末服之

治小兒食土方

取肉一斤繩繫曳地行數里勿洗火炙與食

治小兒噦方

生薑汁

牛乳

各五合

右二味煎取五合分為二服

又方取牛乳一升煎取五合分五服

治小兒疰方

竈中灰鹽等分相和熬熨之

治小兒悞吞鍼方

取磁石如棗核大或吞或含其針立出

治小兒悞吞鐵物等方

艾蒿一把剉以水五升煮取一升服之即下

治小兒蠿蝮咬遶腹匝即死方

搗蒺藜葉傳之無葉子亦可

又方取鷲窠中土猪脂和傅之乾即易之



備急千金要方卷十四

總校官中書臣朱 鈐

校對官中書臣胡紹基

謄錄舉人臣汪師曾