

臨證指南醫案

臨證指南醫案卷五

古吳葉 桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九全較

暑濕熱

〔痢〕

沈 暑必扶溼。傷在氣分。古稱滯下。此滯字非停滯飲食。言暑濕內侵。腑中流行阻遏。而為滯矣。消導升舉。溫

補。暑邪無有出路。胸痞不饑不食。粘膩未已。而肛門沈墜裏結。三焦皆受邪蒸。上下渾如雨。截延為休。自痢

疾纏綿展轉。豈旦晚驟愈之病。淡乾薑 斷香用煎 連不能散也 小川連 人參 枳實

徐 夏季痢症多是濕熱食積。初起宜分消其邪。但肌柔白嫩。乃氣虛之質。且性情畏寒。只宜少與勿過。

檳榔汁 青皮 陳皮 厚朴 川連 黃芩 木香 炒黑山查

又 溼熱下痢。必用苦辛寒為治。粟殼瀉腸止瀉。久痢成方。當此熱邪未清。宣通斯滯。可去因色白氣弱。未敢

峻攻耳。厚朴 黃芩 川連 木香汁 查肉 炒銀花 麥芽

盧 痢症濕熱。皆是夏令伏邪。但以攻消。大傷胃氣。不能去病。今微嘔不飢不寐。大便欲解不通。是尤數六腑

不和。總是胃病。人參 吳萸炒川連 泡淡生乾薑 茯苓 川棟子肉 生白芍

某女 古色灰黃。渴不多飲。不飢惡心。下利紅白積滯。小溲不利。此暑溼內伏。三焦氣機不主宣達。宜用分理氣

血。不必見積。以攻滌下藥。 飛滑石 川通草 豬苓 茯苓皮 藿香梗 厚朴 白蔻仁 新會皮

陸氏 經來暑穢。痧脹心煩。自利黑痰。淡黃芩 枳實 川連 石菖蒲 鬱金 橘紅

陳 瀉痢兩月。肢體浮腫。高年自屬虛象。但胸脘痞悶。納穀惡心。每朴必先腹痛。是夏秋暑熱鬱滯於中。虛體

挾邪焉有補瀉可去。邪扶正之理。恐交節令。變症明是棘手重症矣。

人參 茯苓 川連 淡乾薑 生白芍 枳實

某 臍上青筋突痛。太陰脾受傷。此前症也。近日腹痛白積。兩旬不已。是新受夏秋暑氣。與病異歧。先理新病。

增品登旨有書案 卷五 痢 龍文書局校印

論是方非

此乃正法 何與前方 不類也

樂語極明 此方與集 相反何故

導氣分消主之 藿香 厚朴 廣皮 茯苓皮 川連 木香 木瓜 扁豆
某 痰喘宿病正在初秋而發又值寒熱下痢血積腹痛吐逆脈來右弦左弱目黃蓋明必是暑濕凝滯着裏
以補虛之中佐以清邪乃通劑法

溼熱

王 痢疾古稱滯下乃是溼熱氣薄腸胃阻閉氣分故利仍不爽河間丹溪僉用清熱導氣者為此
黃芩 川連 草決明 炒黑查肉 生白芍 石蓮 丹皮 廣木香汁
倪六 面垢舌白心下脘中淒淒痛窒至圍復便不爽此水穀之溼內蒸為熱氣道阻閉上熱下冷若外受客邪
既過幕原必有寒熱矣 淡黃芩 川連 淡竹葉 檳榔 白芍 厚朴 廣皮白

某 溼溫下痢脫肛 五苓散加寒水石
江 食物不調腸胃蘊蓄鬱積聚而滯下三月不愈清疎帶補之
人參 川連 炒白芍 炒查肉 廣皮 茯苓 炒當歸 烏梅

陸 溼熱內纏中焦痞結陽氣虛體質溼注自利不爽神識昏亂將變呆癡
炒半夏 人參 枳實 川連 乾薑 黃芩 薑汁

顧 得湯飲腹中漉漉自利稀水平昔酒客留溼溼勝內蘊腸胃不爽疑積東垣清暑益氣亦為溼熱傷氣而
設但脾胃久病仍能納食當苦味堅陰芳香理脾
生茅朮 兩 炒黑黃柏 兩 炒黑地榆 兩 猪苓 兩 澤瀉 兩 水法丸服三錢

葛 酒客大便久瀉腸上曾發癘瘍春夏腸下有形腹形滿脹此久蘊溼熱癘膿自利未能泄邪腸胃氣壅利
頻不爽法當分消以去溼熱若攻切太過必傷脾胃議用丹溪小温中丸早進二錢五分夜進二錢五分三兩

某 湖熱自利腹痛 黃芩 生白芍 枳實 桔梗 檳榔汁 木香汁
徐 龍食腹痛下痢兼和其陰 人參 生白芍 枳實 黃芩 檳榔汁 川連 乾薑

此扶飲之
前方極靈

久痢可用赤當歸之

某汁溼熱內蒸下痢紅積

炒黑神麩 炒黑查肉 茯苓皮 飛滑石 新會皮 厚朴 淡竹葉 扁豆葉

祝八十年久痢須推飲食避忌酒客溼滯腸中非風藥之輔佐苦味入腸何以勝溼逐熱久病飲食不減腸中

病也 此非煎藥所能治者 綿茵陳 香白芷 北秦皮 茯苓皮 黃柏 薑香

某形瘦陰虧溼熱下痢誤投消食反劫津液邪未盡津先耗咽喉痛且噎蚊所謂溼未罷已上燥矣

川連 銀花 通草 黃芩 川貝 茯苓皮

某溼熱內阻氣分腹痛下痢目昏黃舌光不渴議清裏泄濕熱

黃芩 寒水石 川連 厚朴 秦皮 鬱金

山五溼鬱腹痛痢紅如豆汁 生茅術 炒山查 厚朴 紅麩 廣皮 猪苓

某夏秋痢疾固是溼熱傷氣脾胃氣滯後重裏急不爽古方香連丸取其清裏熱必佐理氣謂氣行斯溼熱

積聚無容留矣知母生地滋陰除熱治陰分陽亢之火與痢門溼熱大異蓋滋則呆滯氣鈍室塞宜乎欲使

不出究竟溼熱留邪仍在桂附熱燥又致肛墜痛如刀割補中益氣東垣成法僅僅升舉下焦清陽未能直

透腸中再用大黃重藥兼知母生地等味更令傷及下焦書義謂諸痢久都屬腎傷小腹墜忌冷顯然是下

症議與升陽亦須下治 人參 茯苓 澤瀉 又草 防風根 羌活 細辛 生薑 大棗

某古白濁不欲飲心腹熱每痢必痛肛墜痢又不爽微嘔有痰口味有痰頭中空痛兩頰皆赤此穀氣蒸濕

熱鬱於腸胃清濁交混忽加煩燥難鳴苦况法當苦寒泄熱苦辛香流氣滲泄利溼蓋積滯有形溼與熱本

無形質耳 川連 黃芩 鬱金 厚朴 猪苓 槐米 秦皮

包先厥下利膿血腹痛嘔惡乃寒熱互傷

沒黃苓 川連 丹皮 生芍 炮薑 炒銀花

陳氏溫邪經自不解發熱自利神識有時不清此邪伏厥陰恐致癩瘕

白頭翁 川連 黃芩 北秦皮 黃柏 生白芍 白頭翁湯加苓芍

又 溫邪誤表劫津神昏恐致痙厥 炒生地 阿膠 炒麥冬 生白芍 炒丹皮 女貞子

邱 姬進潤劑痛緩積稀知厥陰下利宜柔宜通血虛有風顯狀

生地 阿膠 丹皮 生白芍 銀花 小黑穠豆皮

某 熱漸入裏胸痞便泄議酸苦泄熱

黃芩 川連 枳實 白芍 廣皮白 滑石 甘草 穀芽

協熱 蔡 內虛邪陷協熱自利脈左小右大病九日不減是為重症議白頭翁湯方加黃芩白芍

潘 時令暑溼都從口鼻而受氣鬱則營衛失於轉運必身熱無汗其邪自上以及中必循募原致腸胃亦鬱

腹痛瀉積無非濕熱之化此分消利溼則可若以表藥則傷陽氣矣

茯苓 陳皮 厚朴 木香 炒扁豆 炒山查

又 協熱下痢沾膩血水是腸胃中濕熱之化也

北秦皮 白頭翁 茯苓 澤瀉 炒銀花 益元散 生白芍 炙草

某 春溫內陷下痢最易厥脫 川連 阿膠 淡黃芩 炒生地 澤瀉 木瓜 炙草

王 熱毒逗留不化潮熱下利 川連 黃芩 炒白芍 茯苓 澤瀉 木瓜

血痢 張三 江南地薄氣弱夏季食物內蘊時令熱迫內聚溼熱赤痢入冬不愈皆飲食不忌之累宜淡薄滋味

生芩朮 厚朴 南山查 草果仁 檉根皮 槐花 廣皮 銀花

又 痢血三月晝痢夜止肛門欲墜以氣陷門戶不藏

人參 當歸 白芍 肉桂 炙草 白朮 廣皮 煨薑 南棗

某 血痢半載少腹痛 六味地黃加炒查肉炒延胡

某 血積痛痢起於夏令秋半不減明是濕熱滯於腸胃久延面色消奪右脈搏大乃痢症所大忌稍通積聚

此非無劑之方更用熱藥以括其血

兼以和血 酒炒大黃 川連 黃芩 丹皮 肉桂 歸身 白芍 生甘草
袁七久痢腹疼下血 生黃芪三錢 生白木三錢 炒歸身一錢 炒查肉二錢 炒地榆半錢 廣皮一錢 厚朴一錢

朱心下痢帶瘀血 肛中氣墜 腹不痛 炒黑檇根皮一兩 生茅朮錢 生黃柏錢 炒黑地榆半錢 炒黑銀花半錢 赤苓三錢 猪苓半錢 炒黑地榆半錢 炒黑查肉三錢

某痛痢不爽已有血下 著濕不獨在氣分且積滯茹素攻奪宜慎
當歸 白芍 南山查 厚朴 草果 炮薑

勝虛 氣滯

某脈緩臍上痛 便稀溺短 此乃濕鬱脾胃之陽 致氣滯裏急 宗古人導滯分消意

生茅朮 廣皮 厚朴 官桂 飛滑石 茯苓 猪苓 澤瀉 炒山查 五苓散加

張五脈沉伏 久痢腹痛畏寒 少食氣弱腸滯 以溫通方法

熟附子 生茅朮 生大黃 茯苓 厚朴 木香

又溫下相投 腸滯不通 皆因腑陽微弱 古腎治痢 不離通瀉二法

當歸 肉桂心 茯苓 厚朴 南山查 生麥芽

王六平昔溫補相投 是陽不足之體 聞患痢兩月 不忌食物 脾胃滯壅 今加嘔惡 夫六腑宜通 治痢之法 非通

即瀉 肚腸結閉 陽虛者以溫藥通之 熟附子 製大黃 厚朴 木香 茯苓皮

范七痢稱滯下 謂有滯必先痛 後下 况病起不慎 口腹 陽氣窒塞 積聚留着 試閱前方 宣通者有效 守補則病

劇 六腑皆以宣通為用 附子 大黃 茯苓 厚朴 生草果 廣皮

又溫下已效 腸胃留滯 都因陽不主運 再佐理氣兼之

附子 製大黃 茯苓 廣皮 厚朴 生益智 木香 猪苓

李痢將兩月 目微黃 舌白 口乾唇燥 赤腹滿 按之軟 竟日小便不通 病者自述 肛門窒塞 努掙不已 僅得進

出粘積點滴。若有稀糞。自必傾腸而多。思夏秋間暑溼內着為痢。軒岐稱曰。滯下謂滯着氣血。不獨食滯一因。凡六腑屬陽。以通為用。五臟皆陰。藏蓄為體。先瀉後痢。脾傳腎則逆。即土尅水意。然必究其何以傳尅之由。蓋伏邪垢滯。從中不清。因而下注矣。遷延日久。正氣因虛。仲景論列三陰。至太陰篇中。始舉出腹滿字樣。脾為柔臟。惟剛藥可以宣揚驅濁。但今二腸窒痺氣不留行。理中等法。決難通腑。考內經二虛一實者。治其實。開其一面也。然必溫其陽。佐以導氣逐滯。欲圖扭轉機關。捨此更無他法。

製附子

生厚朴

木香

製大黃

炒黑大茴

又

懈弛半月。脾腎復備。脾敗不主健運。納食皆變痰沫。腎真失司。納氣水液上泛阻咽。皆痢傷濁壅變。脈未傳。脈見弦勁。是無胃氣。小愈變病。最屬不宜。入冬為藏陽之令。今陽漸清散。而陰液枯槁。渴不多飲。飲不解渴。治陽必用剛藥。其陰更涸矣。轉展無可借者。勉與脾腎分調。脾陽動則冀運。腎陽靜可望藏。王道固難速。

功揆之體用。不可險藥。早服炒焦腎氣丸。午服參苓白朮散。加益智仁。三勞倦咳嗽失血。仍然不避寒暑。食物腹中瀉痢病上加病。後感法當先治。以分病有新舊。

陽虛許

厚朴

益智

廣皮

茯苓皮

白芍

炙草

木瓜

炒扁豆

又

咳嗽瀉痢。藥治相背。治肺礙脾。治脾礙肺。方今交冬。治痢為要。病人說早食相安。晚食脹滿。脾胃陽氣已乏。勿徒消滯寒尅矣。白芍。推。益智。廣皮。茯苓。焦白朮。炙草。穀芽。砂仁。散。

張

下痢瀉泄之後。診脈右弦大。胃虛少納。陽弱不司運化。法當通腑之陽。人參。益智仁。炒。絲餅。炒砂仁末。茯苓。廣皮白。

陸

六腹滿自痢。脈來濡小。病在太陰。況小便清長。非腑病溼熱之比。法當溫之。生於朮。附子。茯苓。厚朴。乾薑。

許

二痢疾一年。已浮腫溺瀉。古稱久痢必傷腎。月前用理陰煎不應。詢及食粥吞酸。色痒脈濡。中焦之陽日德。水穀之溼不運。仍辛溫以甦脾陽。佐以分利。用胃苓湯去甘草。加益智。

陳痢積雖然少緩諸款不減面色青晦四肢厥冷仍在險途懸益黃散法

人參 煨益智仁 公丁香 茯苓 廣皮 青皮 木瓜 炒冬米

某脈微細肢厥下痢無度吳茱萸湯但能止痛仍不進食此陽敗陰濁腑氣欲絕用桃花湯

赤石脂 乾薑 白粳米

某痢後大便不實食不健運色脈俱是虛象此清陽失曠於中陰氣先走泄於下先理中焦再當攝陰

人參 白木 茯苓 炙草 廣皮 炮薑 益智

某自痢不渴者屬太陰呃忒之來由乎胃少納穀衝氣上逆有土敗之象勢已險篤議金匱附子粳米湯

人參 附子 乾薑 炙草 粳米

某長齋有年土薄氣餒加以久痢少穀欲嘔脾胃之陽衰矣由夏及今半載不痊倘忽腫脹何法施治

人參 白木 乾薑 炮薑 丁香 茯苓

袁中下陽微嘔呃下利温中不應恐延衰脫夫陽宜通陰宜守此關闢不致潰散春回寒谷生氣有以把握

候王先生主議 人參 附子 炮薑 炒粳米 赤石脂 生白芍

某春痢入冬痢止腹痛食少童年那有淫慾之擾此係寒熱不和脾胃受傷也六君子湯加肉桂

當歸頭 白芍 炮薑 炙草 茯苓 益智

唐氏下痢四十餘日形寒腹痛炒當歸 生白芍 肉桂 炒山查 青皮 茯苓

陽明不關脾腎 沈議堵截陽明一法人參 炒白粳米 炮薑 赤石脂

兼虛 某四六高年下痢疲多舌乾脈右空大神困音低乃脾腎兩虧二氣交虛有年致此恐非所宜

人參 錢半 菟絲子 錢半 赤石脂 錢三 炮薑 錢半 茯苓 錢三 木瓜 錢一

王伍久痢久瀉為腎病下瀉久而陰傷氣墜四神凡治脾腎晨泄辛温香燥皆剛佐入五味酸柔不過稍製其

久痢志陰 又屬有年 豈可再滋 其津液 不應 温中自然

痢傷陰液

雄烈。此肛墜尻疲。乃腎液內少。而氣陷矣。腥油肉食須忌。熟地 禹餘糧石 五味子

蔣一久痢用辛甘溫而效。是脾陽久傷。治由東垣法極。是迷食血腥。滑必便澹。四肢忽有肉疹。營衛內應脾胃。氣血未得充復。五旬外下亦法。用脾腎兩補。

人參 山藥 茯苓 湖蓮 艾實 補骨脂 菴蓉 黃肉 五味 巴戟 菟絲 覆盆子

某 下痢腹痛舌乾肛墜痢傷陰也。熟地炭 炒歸身 炒白芍 炒山肉 茯苓 艾草

某 滯濁下行痛緩。議養陰通腑。生地 阿膠 丹皮 山梔 猪苓 澤瀉

孫 脈左數下利腹不甚痛。暮夜微熱。所伏暑熱。乘陰虛下陷。是清熱理脾。不效當攝陰升陽。

熟地炭 當歸炭 山查炭 炒黑麥芽 炙黑甘草 防風根 炒黑升麻

又 照方去山查麥芽。加人參。焦白芍。

又 瀉痢久必陰損。液耗。此口渴微咳。非實火客邪。與甘酸化陰。

人參 山藥 炙草 炒烏梅 木瓜 炒胡蓮肉

蔡 脈右數左細數。面垢舌燥。白苔點點。肌膏甲錯。左脇動氣。伏暑當秋涼而發。初病如瘡。當從苦辛寒法。裏

邪熾烈。變為下痢。胃津液劫。陰液大耗。昔賢於熱病受涸。急以救陰為務。苟胃關得甦。漸以冀安。否則犯喻

氏所指客邪內陷。液枯致危之戒矣。復脈湯去薑桂麻。炙草 麥冬 木瓜

又 酸甘化陰法。人參 生地 烏梅 炙草 麥冬 木瓜

鮑 痢久陰液消亡。無以上承。必唇燥舌乾。奈胃關不和。善噫難飢。此由陰膩柔劑所致。擇其不膩滯者調之。

人參 炙草 炒白芍 炒烏梅肉 炒麥冬 茯苓

周十五 痢後氣墜。都主陰陽。但嗔恐不已。木犯土。致病留連。攝陰之中。聊佐和肝。

某 陰液涸則小水不通。胃氣逆則厭食欲嘔。此皆痢之款症也。治以中下二焦為主。宜理陰煎。

此為正論

熟地

白芍

附子

五味

炮薑

茯苓

吳三痢久陰傷。腹痛肛門墜脹。秋病入冬不愈。已屬休息症。和陰劑中。仍有升

椒東垣法。

炒熟地

炒當歸

炒白芍

炙草

生山查

生穀芽

陳三瀉痢久則傷腎。多見下焦沉墜。先傷在陰。剛藥不效。

人參

鹿茸

羌絲子

茯苓

柏茴香

製補骨脂

砂仁

張五畏泄痢血屬腎病。無痛墜等因。用黑地黃丸。

范瀉痢起於長夏。醫謂時令溼熱。胃苓湯為法。固非謬說。因高年腎陽肝陰先虧。使客氣內擾。阻遏中流。

乏砥柱坐鎮。致在瀾滔天耳。病經兩旬不減。重陰無陽。驗諸神識甚清。其外邪為少。而內損為多。八脈無權。

下無收攝。漏卮不已。理必生陽泄下焦冷。此皆陰陽二氣微絕。治病則務治本則宜。非置之不理。實究天人。

而已。

人參

鹿茸

炒黑當歸

生杜仲

生沙苑

茯苓

李五自痢五六年。即周身痛痺。蓋腸胃病致經絡筋骨藩籬疎懈。陽失衛。藥難效靈。書此代煎。

又於木

茯苓

熟附子

河水煎

吳九治痢大法。無過通塞二義。夏秋濕熱固多。初痢不痛。已非溼熱。色滯者。腸中陳腐也。至今痛而痢。痢後復

痛。按之痛減。屬虛。小不愈。陽不來復。久痢治腎。然非滋膩。先用苓薑朮桂湯。

某氏治痢古法。不越通瀉。經停有痕。腹浮腫。八脈之病。醫惑於見痢。認為脾胃。症議用濟生腎氣丸。

朱五痢久肛墜。是下焦腎虛。失於收納。治脾胃藥無功。

熟地炭

炒歸身

赤石脂

五味子

炒查肉

周六痢久必傷腎陰。八脈不固。腸膩自滑而下。但執健脾無用。病不在中。納穀遲。下焦陽亦衰。用三神丸。

五味子

補骨脂

肉果

某痢久陰陽兩傷。少腹肛墜。連兩腰胯。脊髀痠痛。由臟腑絡傷。已及奇經。前議輕劑升陽頗效。仍從下治。

補骨脂

肉果

增補全書

增補全書

增補全書

增補全書

休息痢必
有伏邪沈

痢症絕不
宜用熱藥
犯者不死
即日遷延

痢症不現
虛之不用
參

人參 鹿茸 附子 炒當歸 茴香 菟絲子 杜仲
轉方柔集相安。顯然久痢傷及腎陰。當用理陰煎。兼用禹糧石脂丸以攝回腸中。

熟地炭 歸身炭 人參 炙甘草 五味子 炒查肉 兼服禹糧赤石脂丸
金氏脈數動。下痢腹鳴。痛後墜。臥則氣衝。咳嗽吐粘涎。產後過月。顯是下損至中。納穀日少。形神日衰。勢已延

成。養勞難期速功。此金氏不謂與參相 伏神 炒山藥 建蓮 赤石脂
某氏休息痢經二年。明是下焦陰陽皆虛。不能收攝。經期不來。小腹撫摩有形。上行似乎微瘕。其實氣結。若不

急進溫補。恐滋擾腫脹之累也。 人參 附子 茯苓 炙草 五味 白芍
某 氣虛下陷。門戶不藏。 人參 黃芪 廣皮 炙草 歸身 炒白芍 防風 升麻
某 痢經五十日來。小愈再發。獨見後重下墜。此為氣陷。則門戶不藏。亦胃弱內風乘襲。議陷者舉之。

人參 歸身 白芍 炙草 升麻 荷葉
石 瘕邪熱氣內陷。變痢延已三月。脾胃氣衰。面浮肚膨。仍有裏急欲墜之象。中虛伏邪。進以和解。

黃芩 柴胡 人參 丹皮 炒當歸 白芍 殺芽 炒山查
蔡 神氣索然。腹中動氣。舌紅噤乾。寒熱日遲。平素積勞致虛。邪伏厥陰。脈促細堅。溫清難用。勉議復脈。湯存

陰勿潤布圖援救。復脈湯
又 兩投復脈。色脈略轉。所言平素積虛。不但瘕邪內陷。陽結於上。則胸痞。陰走於下。則頻利。非徒開泄攻邪

也。 救逆湯去薑 又 奔脈動氣。皆是陽虛濁泛。當和營理陽。

人參 茯苓 歸身 炙草 桂心 牡蠣 煨薑 大棗
又 衝氣填塞。邪陷下痢。勢非輕小。用瀉心法。

人參 淡乾薑 熟附子 川連 黃芩 枳實
又 人參 淡乾薑 生地 炒桃仁

張氣衰熱。伏腹痛下痢。脫中痞悶。不欲納食。由瘧變痢。經邪入腑。斯病勢已重。清理濕熱。以開痞。延久必須

扶正。淡黃芩。川連。人參。生白芍。乾薑。枳實。

某邪陷瘧後變痢。傷及厥陰。症見氣上撞心。飢不能食。乾嘔腹痛。全是肝病。肝為至陰之臟。相火內寄。仲景

治法不用純剛燥熱之藥。以肝為剛臟故也。今正交土旺。土木為讎。五日內未為捷當。

人參。炒當歸。炒白芍。炒烏梅肉。茯苓。淡吳萸。生香附汁。真北秦皮。

腸風

孫下痢血積。肛墜。腸間汨汨有聲。此屬腸風。當用攝固。

熟地炭。黃肉炭。炒歸身。炒杞子。川斷。北味肉。煎藥送赤石脂丸三錢。

某當年痢久。用三神丸得效。是脾腎兩困。兼理氣分之滯。體質陽虛。遇冷病加。今病起長夏。小水不通。必係

夏熱阻其宣化。久則氣血凝著。而為腸紅。先與桂苓甘露飲。分消其濕。

於木。茯苓。豬苓。澤瀉。滑石。桂心。宜炮薑。

痢噤口

包川連。人參。黃芩。白芍。草決明。炒山查。炒銀花。

又噤口痢。乃熱氣自下上衝。而犯胃口。腸中傳導皆逆阻。以閉。腹痛在下尤甚。香連梅芍。僅宣中焦。未能泄

下熱燔燎。若不急清陰液。同歸於盡。姑明其理。以俟高明備採。白頭翁湯。

又脈左細數。右弦乾。嘔不能納。穀腹痛裏急後重。痢積不爽。此暑溼深入著臍。勢屬噤口痢疾。症非輕渺。議

用苦寒清解熱毒。必痛緩胃開。方免昏厥之變。

川連。黃芩。銀花。炒山查。與健胃用方見。乾薑。白芍。木香汁。

又下午病劇。乃陰氣消亡之徵。若但陰柔。恐生生不至。疎補胃藥。正宜進商。

生地。阿膠。人參。生白芍。炒山查。炒銀花。

齋初起無寒熱。即瀉痢嘔惡不食。乃噤口痢重病。夫暑邪之傷。由口鼻吸氣而入。邪與水穀交混。蒸變溼熱。

釀為積滯膿血。腸胃氣窒。欲解不能通爽。遂致裏急後重。香連苦辛。理氣導溼清熱。初用頗是。皆緣勞碌之

人非膏梁溫養之質。淡薄積勞。中氣易傷。四十日來。積少痛緩。醫稱病解而食不下咽。不知飢飽。診得脈弦形衰。舌白。不渴。飲水日瀉數行。全屬胃倒氣奪。中宮損極。下關不攝。穀不能咽。焉能承受湯藥。藥味氣劣。胃衰必惡。久痢久瀉。務在能食。古人非醒脾胃。即安腎攝納。再詢粉漿下咽。或嗆或噎。議以上脘宜通其清陽。下焦當固攝其滑脫。做古方中參苓白朮散末。當以米飲日服二次。間以不膩滑之物。食此少勿多。以示胃之所喜為補。必須胃氣漸醒。方可轉危為安。

人參錢二 焦朮錢半 茯苓錢半 炙甘草錢五 炒扁豆錢二 苡仁錢半 桔梗錢一 砂仁炒 炮薑炭錢一

肉豆蔻錢一 右藥研細秤准分兩。每次用香梗米湯調服一錢五分。須日進二次。

鮑 舌心黃微白。渴飲水漿。停胃脫。乾嘔微微冷呃。自利稀水。小便不利。診脈堅勁不和。八旬又二。暑濕熱邪內著。必脾胃氣醒。始可磨耐。以高年不可過清過消。用清暑益氣方法。

川連 黃芩 石蓮子 環乾葛 青皮 人參 茯苓 厚朴 猪苓 澤瀉

又 口中乾燥。小水全無。泉源已竭。陰液無以上承。痢症噤口。都是溼熱壅於胃口。下元衰敗。衝脈氣震高突。此攻病保真。理難捉摸矣。 川連 黃芩 草決明 石蓮子 烏梅 白芍

痢症古名滯下。惟夏秋暑溼挾積者居多。其次則風淫火迫寒侵也。推之燥氣。獨不為患。故前法悉有定例。不必再述。至於暑者有陰暑陽暑之分。其邪必兼乎濕。夫陰暑由於人之陽氣先虧。加以貪涼喜冷。鬱折生陽。故主於溫。陽暑由於天之熱。伏阻氣化。濁則重於清。而醫之下手工夫。於此須細心認定。但邪之來也。似水之流。臟腑間一有罅隙。則乘虛而著。故有在氣在血之分。傷臟傷腑之異。若表之邪鬱。而氣機下流不息者。喻氏論人參敗毒散。裏之積壅。而寒熱交粘者。潔古立芍藥湯。在氣分有苦辛調氣。與辛甘益氣等法。在血分有酸苦行血。及鹹柔養血諸方。若表症急從乎三陽。有桂枝湯。葛根芍藥湯。小柴胡湯。裏勢實。專究脾胃。有小承氣湯。溫脾湯。總之治腑。以三焦見症為憑。治臟。以三陰為要。領辨得虛實之青形。酌以或通或壅之去。則臨症權宜。庶乎不錯矣。但是症不治之條甚多。最難愈者。莫如休息痢。及補

大有陰暑 木用食 病根在此 陰暑二字 不通已極 其用熱藥

得古方服 藥之法

溼熱

便血

鄭 夏至後溼熱內蒸腸風復來議酸苦法

川連 黃芩 烏梅肉 生白芍 廣皮 厚朴 荊芥炭 菊花炭 又駐車丸二錢

某 脈右數形色蒼黑體質多熱復受長夏濕熱內蒸水穀氣壅血從便下法以苦寒佐以辛溫薄味經月可

冀病愈 茅朮 川連 黃芩 厚朴 地榆 槐米

程 年前痰飲哮喘不得安卧以辛溫通陽切飲而愈知脾陽內弱運動失職水穀氣蒸飲邪由溼而成溼蓄

陰又鬱化熱熱入絡血必自下但體質仍屬陽虛凡腸紅成方每多苦寒若臟連之類於體未合毋欲速也

生於木 茯苓 澤瀉 地榆炭 桑葉 丹皮

陽虛 寒溼

俞 陽虛腸紅洞瀉議劫胃水 理中換生茅朮生厚朴附子炭炮薑
程 脈既糞後下血少年淳朴得此乃食物不和腸絡空際所滲與升降法

之法非一予亦不贅最危險者莫如噤口痢却有兩端若因暑溼外充格拒三焦者氣機皆逆傳而閉上

下之勢渾如雨截若治不得其要則邪無出路正立消亡此丹溪立法最高後世都宗其旨先生又借用

半夏瀉心湯減去守中之品取補以運之卒以開之苦以降之與病情尤為允協所以先生之見長是集

之奧妙每每在此又因脾腎之陽素虛陰邪從中而下者先傷太陰繼傷少陰關開大開痛泄無度戊癸

少化火之機命陽無蒸變之力此不飢不食為嘔為脹理宜然矣與邪多積熱之候相比絕然不同參之

仲景理中湯腎氣丸及景岳理陰煎胃關煎等法可也吾鄉姚頤真先生化出捷徑良法以大劑茯苓配

入參歸薑附桂製白芍之類治之靡不應手而愈想從蒼之性溫能達下鹹可利胃質之柔順以補陽中

之陰較地黃阿膠尤勝與之腸膏竭盡絡脈結滯而痛者堪稱神品自此推廣用活甚多若曰某方某藥

但治某症不知活用反稱杜撰則禁絕後人靈活之心無從施發矣即新甫○傳人三陰之病不同案中合論者

亦甚多一遇老年及久痢即混入陰經治法并參附烏梅五味等全不對症隨筆亂書并與案中論

亦自己相背想是習氣使然抑此中實無定見也後人竟用溫補以為本之此老般人無算矚目傷懷

此乃痔血
不持此者
名譽無一
知者我見
以百計可
為一刺

茅木 厚朴 廣皮 炮薑 炙草 升麻 柴胡 地榆

又脈緩濡弱。陽氣不足。過飲溼勝。大便澹滑。似乎不禁。使後血色紅紫。兼有成塊而下。論理是少陰腎臟失

司固攝。而陽明胃脈但開無合矣。從來治腑以通為補。與治臟補法迥異。先擬暖胃通陽一法。

生茅木 人參 茯苓 新會皮 厚朴 炮附子 炮薑炭 地榆炭

濕暈 脾陽 程一食入不化。飲酒厚味即瀉。而腸血未已。蓋陽微健運夫職。酒食氣蒸。溼聚陽鬱。脾陽清陽日陷矣。議用東

垣升陽法。人參 茅木 廣皮 炙草 生益智 防風 炒升麻

中虛 濕下 某 陽虛體質。食入不化。飲酒厚味即瀉。而腸血未止。蓋陽微健運夫職。酒食氣蒸濕聚。脾陽清陽日陷矣。當

從謙甫先生法。人參 乾薑 附子 茅木 升麻 歸身 白木 厚朴 茯苓 廣皮 炙草 葛根 白芍 益智

地榆 神麴 右藥各製薑棗湯丸 炙草 防風根 煨薑根 乾荷葉

溫 溼勝中虛便紅。魚木 炒當歸 炒白芍 炙草 防風根 煨薑根 乾荷葉

劉六鬱怒。腸紅復來。木火乘腑絡。腹中微痛。議與和陰。冬桑葉 丹皮 生白芍 黑山梔 廣皮 乾荷葉邊 生穀芽

張 二年前衝氣入脘。有形痛嘔。囊前後有血。此屬厥陽擾絡。風動內燥。頭顛皆眩痛。每日用龍薑丸。

葉 噴怒動肝。絡血乃下。按之痛減為虛。夫肝木上升。必犯胃口。遂脹欲嘔。清陽下陷。門戶失藏。致裏急便血。

參 麥米炮薑。辛甘溫暖。乃太陰脾藥。烏能和及肝胃。丹溪云。上升之氣。自肝而出。自覺冷者。非真冷也。駐車丸。

程 少陽絡病。必犯太陰。脾陽衰微。中焦痞結。色痿加痺。便後有血。論脾乃柔臟。非剛不能避陽。然鬱勃致病。

濕燥難投。議補土泄木方法。人參 當歸 枳實汁 炒半夏 桑葉 丹皮 參歸養脾

木鬱 主中 某 凡有痔疾。最多下血。今因噴怒。先腹滿。隨瀉血。向來冀前。近日便後。是風木鬱於土中。氣滯為膨。氣走為

之營。枳半通陽明之滯。桑丹泄少陽之鬱。

此何以竟道著

大腸熱

瀉議理中陽泄木佐之

人參 附子

炮薑 茅朮

厚朴 地榆

升麻 醋炒

柴胡 醋炒

某便紅脈數 生地錢三

程二脈數能食腸紅陰自下泄腸腑熱熾所致非溫補之症

黃芩錢一 白芍半錢

槐花錢一

某七內熱腸紅發痔當清陰分之熱

丹參 黃柏 黑穉豆皮

地榆炭 柿餅炭

槐花 金石斛

汪嗽血已止 薑中見紅中焦之熱下移腸胃屬腑止血亦屬易事花甲以外年歲熱移入下到底下元衰矣

生地 炒丹皮 酒炒黃芩

炒黑槐花 柿餅炭

元參 銀花

黑山柅

趙六勞倦便後血 炒黑檣根皮兩一

炒黑地榆錢三 炒黑丹皮錢一

五加皮錢三 炒黑銀花半錢

錢十陰虛內熱腸紅不止 炒黑檣根皮兩一

炒生地錢三 炒銀花錢一

炒黑地榆錢二 歸身錢一

蔡三脈濡小食少氣衰春季便血大便時結時澹思春夏陽升陰弱少攝東垣益氣之屬升陽恐陰液更損議

以甘酸固澇闡明為法 人參 炒粳米 禹糧石 赤石脂 木瓜 炒烏梅

某能食腸血脈細色痿肛痔下墜議酸苦熄風堅陰

黃柏炭 地榆炭 禹糧石 赤石脂

吳八中滿過於消尅便血食入易滯是脾胃病血統於脾脾健自能統攝歸脾湯嫌其守疎腑養臟相宜

九蒸白朮 南山楂 茯苓 廣皮 穀芽 麥芽 薑棗湯法

脾胃氣滯

某二便血如注面黃脈小已經三載當益胃法

焦朮錢三 茯苓錢三 炙草五 木瓜錢一 炮薑五

便血

木瓜錢一 炮薑五

龍文書局校印

凡痔血內痔少而外痔多

增補登百回醫書

卷五

便血

龍文書局校印

者甚多
血則年久
者甚多

補血諸法
卷五

心脾
營損

李三上年夏季絡傷下血是操持損營治在心脾 歸脾飴糖丸
朱入暮腹痛鳴響畢丸久已偏墜春正下血經月顏色鮮明此痛決非傷於積聚乃營損寒乘木來侮土致

十四載之纏綿調營培土以甘泄木散鬱宜辛節口戒慾百天可效

人參 炒當歸 炒白芍 肉桂 炮薑 茯苓 炙草 南棗

又 細推病情不但營氣不振而清陽亦傷洞泄不已而辛潤宜減甘溫宜加從桂枝加桂湯立法

人參 桂枝 茯苓 生白芍 炙草 肉桂 炮薑 南棗

又 仍議理營 人參 於朮 茯苓 炮薑 桂心 白芍 真武丸二錢

其小便後下血此遠血也 焦朮 炒白芍 炮薑 炙草 木瓜 炒荷葉邊二錢

方 脈小左數便實下血乃肝絡熱騰血不自甯醫投參芪歸桂甘平溫煖昧於相火寄藏肝膽火燄風翔上

蒙清空鼻塞頭暈嗆咳不已一誤再誤遺患中厥夫下虛則上實陰傷陽浮陰乃一定至理

連翹心 竹葉心 鮮生地 元參 丹皮 川斛

又 下血陰傷是泄虛陽上升頭上清霧參芪木桂辛甘助上致鼻塞耳聾用清上五六日右脈已小左仍細

數乃陰虧本象下愈虛則上愈實議以滋水制火之方

生地 元參 天冬 川斛 茯神 炒牛膝 又虎潛丸羊肉膠丸

又 脈左數耳聾腸痛木來水涵養以致土泛用補陰丸 補陰丸五錢

某 腸紅粘滯四年不痊陰氣致傷肛墜刺痛大便不爽藥難驟功當以潤劑通腑

生地 稽豆皮 查肉 麻仁 冬葵子 歸類

勞傷下血絡脈空乏為痛營衛不主循序流行而為偏寒偏熱診脈右空大左小促通補陽明使開闔有

唐切內經以陰絡傷則血內溢蓋燒酒氣雄擾動臟絡聚血之所難得小愈而神采爪甲不榮猶是血脫之色

脾腎
營衛

陰虛
血滯

脾不
統血
陰陽
上虧

肛墜便甚。治在脾腎。以脾為攝血之司。腎主攝納之柄。故也。晚歸脾去木香。

早六味去丹澤加五味芡實蓮肉阿膠丸。

沈五 酒溼汚血。皆脾腎柔膩主病。當與剛藥。黑地黃丸。

凡脾腎為柔臟。可與剛藥。心肝為剛臟。可受柔藥。不可不知。謙甫治此症。立法以平胃散作主。加桂附乾薑歸芍。重加炒地榆。以收下溼。用之神效。即此意也。

吳二 腹痛下血。食^{清升}薺豆漿而愈。乃泄肺導溼之藥。既愈以來。復有筋骨痠。寒熱夜臥。口乾。乃溼去氣泄。陽

明脈之。不主用事。營衛失度。津液不升之象。天真丸王之去人參。

支六 痔血久下。肌肉痠黃。乃血脫氣餒。漸加喘促浮腫。再延腹脹。便不可為。此症臟陰有寒。腑陽有熱。詳於金

匱穀疸篇中。極難調治。人參 焦木 茯苓 炒菟絲子 廣皮 生益智 木瓜

腎陽

楊八 中年形勞氣餒。陰中之陽不足。且便血已多。以溫養固下。男子有年。下先虛也。

人參 茯苓 歸身 淡從蓉 補骨脂 巴戟 炒遠志 生精羊肉鬚膏丸服五錢

田三 久矣。晨泄腹痛。近日有紅積。此屬腎虛。補骨脂 大茴香 五味 茯苓 生菟絲

陳七 脈左虛瀼。右緩大。尾閭痛連脊骨。便後有血。自覺惶惶欲暈。兼之納穀最少。明是中下交損。八脈全虧。早

進青靈斑龍丸。峻補玉堂關元。暮服歸脾膏。涵養營陰。守之經年。形體自固。

鹿茸^{生切薄} 鹿角霜^{另研} 鹿角膠^{鹽湯} 柏子仁^{去油} 熟地^九 韭子^{鹽水} 菟絲子^{另磨}

赤白茯苓^蒸 補骨脂^{胡桃肉搗爛蒸} 右浴膏煉蜜為丸。每服五錢。鹽湯送。

鹿茸壯腎脈之陽。鹿茸通督脈之氣。鹿膠補腎脈之血。骨脂獨入命門。以收散越陽氣。柏子涼心。以益腎

熟地味厚。以填腎。韭子菟絲。就少陰。以升氣固精。重用茯苓淡滲。本草以陽明木藥。能引諸藥入於至陰

之界耳。不用萸味之酸。以酸能柔陰。且不能入脈耳。

胡八 上下失血。先瀉血後便瀉。踰月陰傷液耗。胃納頗安。且無操家之勞。安養閒坐百日。所謂靜則陰充。

又須成虛 連及腰腎 此方可用 尤為膏丸 以食之法 方大無理

汪腎虛當春陽氣動咳嗽止聲音未震。黃有血陰難充復不肯工。承用陰藥固攝。
 熟地 黃肉 茯神 山藥 五味 龍骨
 非數藥

陳仁腎陰虛絡中熱肝風動腸紅三載不已。左脇及腹不爽少陽亦逆多以補中調攝。故未見奏功。姑用疎補。
 為益臟通腑 熟地炭 炒當歸 炒查肉 炒地榆 炒丹皮 冬桑葉

又益陰泄陽四劑血止。但腰痠脫中痺咽燥喜涼飲。肝熱若火。培陽不和平。仍是陰精失涵。用虎潛法。
 熟地炭 白芍 當歸 地榆炭 龜膠 知母 黃柏 猪脊髓丸

某沫血鮮紅凝塊紫黑。陰絡傷損。治在下焦。况少腹疝癢。肝腎見症。前此精濁日久。亦令陰傷於下。
 人參 茯神 熟地炭 炒黑杞子 五味 炒地榆 生杜仲

又左脈小數。堅肛墜脈。人參 茯神 湖蓮肉 艾實 熟地炭 五味
 奇脈 陳氏脈小瀉血有二十年。經云陰絡傷血內溢。自病起十六載。不得孕育。述心中痛墜血下。不論薑前薑後。問

脊椎腰尻痠楚。而經水仍至。跗膝常冷。而骨髓熱灼。由陰液損傷。傷及陽不固密。閱頻年服藥。歸芪雜入涼。
 肝馬是連古治病議從奇經升固一法。鹿茸 鹿角霜 枸杞子 歸身 紫石英 沙苑

生杜仲 炒大茴 補骨脂 禹餘糧石 蒸餅漿丸
 傷力 張三勞力見血。胸背脇肋諸脈絡牽掣不和。治在營絡。

人參 歸身 白芍 茯苓 艾草 肉桂
 血瘀 計三五瘀血結在絡。絡反腸胃。而後乃下。此一定之理。平昔勞形奔馳。寒暄飢飽致傷。苟能安逸身心。瘀不復聚。

不然年餘再瘀。不治。旋覆花 新絳 青蔥 桃仁 當歸鬚 柏子仁
 宋氏當年腸紅繼衄血喉痛。已見陽氣乘絡。絡為氣乘。漸若懷孕者然。氣攻則動如拔。與胎動迥異。倘加勞怒。

必有污濁暴下。推理當如是觀。柏子仁 澤蘭 卷柏 黑大豆皮 茯苓 大腹皮

即非痔血 總宜陰藥

以上諸藥 俱不能分 別入參薑

此一概也
此症危與
人不少
無知誤

半中不但
混入腸一
痔血其為
即知其為
痔血矣而
痔血之病

又不得與
腸紅方等
蓋另有治
又不得與

使血腸中
處諸人所
謂腸有氣
便血殺人

是也當知
今惟知用
填糞之法

及五味等
燻熱助收
之藥助其

之後更劫
其陰非劫
其疾矣

當有外治
之法

此乃大腸

增

便血一症。古有腸風。臟毒。脈痔之分。其見不外乎風淫腸胃。溼熱傷脾二義。不若內經謂陰絡受傷。及結
陰之旨。為精切。仲景之先便後血。先血後便之文。尤簡括也。陰絡即臟腑下之絡。結陰是陰不隨陽之
微。以先後分別其血之遠近。就遠近可決其臟腑之性情。庶不致氣失統攝。血無所歸。如漏卮不已。肺
病致燥。瀉宜潤。宜降。如桑麻丸。及天冬地黃銀花柿餅之類是也。心病則火熾。血沸。宜清。宜化。如竹葉地
黃湯。及補心丹之類是也。脾病必溼滑。宜燥。宜升。如茅木理中湯。及東垣益氣湯之類是也。肝病有風陽
痛迫。宜柔。宜泄。如駐車丸。及甘酸和緩之劑是也。腎病見形。消瘦折。宜補。宜填。如虎潛丸。及理陰劑之類
是也。至膽經為樞機。逆則木火煽營。有桑葉山梔柏子丹皮之清養。大腸為燥腑。每多溼熱。風淫如卒涼
苦燥之治。胃為水穀之海。多氣多血之鄉。臟病腑病。無不兼之。宜補。宜和。應寒應熱。難以拘執而言。若勞
力損傷者。通補為主。膏粱纏積者。清疎為宜。痔瘡則滋燥兼投。中毒須知寒熱。餘如黑地黃丸。以治脾溼
腎燥。失真凡以大補真氣。真精。平胃地榆之升降。脾胃。歸脾之守補。心脾。斑龍以溫煦奇督。建中之復生
陽。枳實之疎補。中土。禹糧赤脂以堵截陽明。用五仁湯復從前之腸液。養營法善病後之元虛。此皆先生
祖古方而運以匠心。為後學之津梁也。一邵新甫

脫肛

翁六 溼熱皆主傷氣。氣下陷。墜肛而痛。瘦弱後陰囊筋牽著於肛。其痛為甚。夫厥陰肝脈。遠陰。按脈濡弱。決非

疎泄主治。議追陷者舉之。從東垣補中益氣湯。

孫 面色痿黃。腹痛下血。都因飲食。重傷脾胃。氣下陷為脫肛。經月不愈。正氣已虛。宜甘溫益氣。少佐酸苦。務

使中焦生旺。而穉年易虧之陰。自堅。冀有向安之理。

人參 川連 炒歸身 炒白芍 又草 廣皮 石蓮肉 烏梅

又 肛翻純血。不但脾弱。氣陷下焦之陰。亦不攝固。面色唇爪。已無華色。此益氣乃一定成法。攝陰亦 可少

然幼穉補藥。須佐宣通。以易虛易實之體也。

龍文書局校印

腎氣不攝

人參 焦朮 廣皮 白芍 炙草 歸身 五味 升麻醋炒 柴胡醋炒
某 便後少腹痛肛墜溺則便滑腎虛不攝 熟地炭 五味 萸肉炭 茯苓 炒遠志 炒菟絲子
某 肛墜尻痛利多傷陰 熟地炭 五味 茯苓 炒山藥 炒查肉 炒菟絲子 煎送禹糧石脂丸

王六陽氣下陷腎氣不攝肛墜氣泄如風向老下元陽憊非升柴能舉其陷
人參 鹿茸 補骨脂 炒大茴香 茯苓 調入陽起石三分

吳五脫肛漏血過勞即發病經十六載色痿黃背脊痛診脈尺中下垂法當升陽攝陰兼理奇脈
斑龍丸加五味子蜜丸

脫肛一症其因不一有因久痢久瀉脾腎氣陷而脫者有因中氣虛寒不能收攝而脫者有因酒溼傷脾
色慾傷腎而脫者有因腎氣本虛關門不固而脫者有因溼熱下墜而脫者又肛門為大腸之使大腸受

寒受熱皆能脫肛老人氣血已衰小兒氣血未旺皆易脫肛經云下者舉之徐之才曰瀆可去脫皆治脫
肛之法也觀先生治脫肛之症亦不越乎升舉固攝益氣三法如氣虛下陷而脫者宗東垣補中益氣湯

舉陷為主如腎氣不攝而脫者宗仲景禹糧石脂丸及熟地五味菟絲葷固攝下焦陰氣為主如肝弱氣
陷脾胃氣虛下陷而脫者用攝陰益氣兼以酸苦泄熱為主如老年陽氣下陷腎真不攝而脫者又有鹿

茸陽起石等提陽固氣一法汪詒菴云有氣熱血熱而肛反挺出者宜用苓連槐柏及四物升柴之類愚
謂即或聞有此症終非可訕之法存之以質君子御滋丸○脫肛多由濁氣下降溼痰毒火合併為害故

外治之藥以收之無不立愈其有虛人病後清氣下陷則用補中益氣之法以提之十不得一者也不論
何因俱用升提之法肛門之疾火濁氣將升提而置之何地耶又脫肛之疾屬熱多○又用溫燥更非所宜

肺熱 湯六有年偏痿日瘦色蒼脈數從金匱肺熱葉焦則生痿屢論
症其實屬陽明居多

五竹 大沙參 地骨皮 麥冬 桑葉 苦百合 甜杏仁
徐三面癩跖爽此屬肺熱痿躄連翹 花粉 黑山梔 赤小豆 桑葉 白通草

肺熱 葉焦

補腎丸 卷五

溼大

溼中伏熱沈著下焦用苦勝溼辛通氣分然必循經入絡漸次達及陽明

綿茵陳錢 生茅木五 黃柏錢 晚蠶沙錢 寒水石錢 茯苓皮錢

又色蒼脈實體質堅壯雖年逾四旬氣元充旺詢知平日善喫酒醴甘肥此釀成溼火蘊結下焦今少腹微腫硬二便帶濇自覺少腹氣脹上冲兩足沉重艱於步履腿股皮中甚熱即內經所云溼熱不攘大筋綆短小筋弛長綆短為拘弛長為痿也更述曾因熬煉膏藥中有蘆蟲蜈蚣等物吸受穢濁毒氣未始非與溼熱糾蓄沉伏下焦前議苦辛寒燥茲再佐以搜逐絡隧然此病從口而入必茹素戒飲一二年之久病根可拔當恪守勿懈為要 綿茵陳錢 黃柏錢 川草解錢 茯苓皮錢 金鈴子錢 穿山甲錢 大抵椰汁錢

又綿茵陳 草解 茯苓皮 黃柏八兩 蠶沙 漢防已 龍膽草 山柰 青黛

又病去七八常服二妙丸可也

黃柏八兩 茅山木米泔浸切片同艾麻拌飯上蒸三五次去艾麻焙乾三兩 二味研末水法凡空心服三錢開水下

吳仁雨溼泛潮外來水穀聚溼內起兩因相湊經脈為痺始病繼以瘡癢漸致痿綆筋弛氣隧不用溼雖阻氣而熱蒸鑠及筋骨久延廢棄有諸 大豆黃卷 飛滑石 杏仁 通草 木防已

廉三診脈論體從遺精漏瘍繼而環跳穴痛遂不堪行走臟陰傷及膈陽陽氣日加窒塞經脈不司舒展食入壅脫欲吐大便旬日不通痞阻日甚而為痿疴內經論治痿獨取陽明無非流通胃氣蓋胃脈主手束筋骨利機闕竅也議用加味溫胆湯此症乃精血枯而有留邪之症此方無著

又大便旬日不通用更衣丸取意小腸火腑非苦不通非下不奪也

某五歲頭目口鼻鳴邪繼而足痿此邪風入絡所致

羚羊角 犀角 元參 細生地 黃柏 川斛 川草解

俞五旬又四陽氣日薄陽明脈絡空乏不司束筋骨以流利機關肩痛肢麻頭目如蒙行動痿弱無力此下

虛上竇絡熱內風沸起當入夏陽升為甚燥溼利疾必不應病議清營熱以填內風

大腸丸治
凡開藥
潤腸
此方不論
也

邪風

陽明

虛營

動內風

增亮登... 龍文書局校印

犀角 鮮生地 元參心 連翹心 冬桑葉 丹皮 鉤藤 明天麻

肝胃 虛內 風動 陳陽明脈空。厥陰風動。自右肩臂漸及足跗痿。長夏氣泄。秋半不主收肅。顯然虛症。先用通攝方法。

淡從蓉 熟地 杞子 川牛膝 川斛 茯苓 遠志 炒黑 石菖蒲

胃陽 皆虛 夏四 自稱壯失血遺精。兩交夏月。四肢痿癱。不得轉動。指節亦不能屈曲。凡天地開冬主收藏。夏主發洩。內損

多年不復。元陽明脈衰所致。當歸 羊肉膠 杞子 鎖陽 菊花炭 茯苓 青鹽

胃陽 皆虛 吳九 下焦痿。先有遺泄。溼瘍頻進。滲利。陰陽更傷。雖有參芪。不養脾肺。以益氣。未能救下。即如畏冷陽微。幾

日飯後吐食。乃胃陽頓衰。應乎外衛失職。但下焦之病。多屬精血受傷。兩投柔劑。溫通之補。以腎臟惡燥。久

病宜通任督。通攝兼施。亦與古賢四斤金剛健步諸法互參。至於胃藥。必須另用。夫胃腑主乎氣。氣得下行

為順。東垣有升陽益胃之條。似乎相悖。然苓連非苦降之氣味乎。凡吐後一二日。暫停下焦。血分藥。即用扶

陽理胃二日。俾中下兩固。經旨謂陽明之脈束筋骨以利機關。諒本病必有合矣。

鹿茸 淡從蓉 當歸 杞子 補骨脂 巴戟天 牛膝 柏子仁 茯苓 川斛

溼熱 肝胃 虛 吐後開服大半夏湯。加淡乾薑薑汁。

沈 長夏溼熱。經脈流行氣鈍。兼以下元絡脈已虛。痿弱不耐步趨。常似酸楚。大便或結或澹。都屬肝腎為病。

然益下必佐宣通脈絡。乃正治之法。倘徒呆補。恐季夏後溼熱還擾。須為預理。

鹿角霜 當歸 生茅木 熟地 薑汁 茯苓 桑椹子 茯苓 巴戟 遠志

小茴 金毛狗脊 三觔酒 蒸水 熬膏 和丸 淡鹽湯 送下

李九 痿躄在下。肝腎病多。但素飲必有溼熱。熱痰溼滯。氣血不行。筋縮。肌肉不仁。體質重者難移。無非溼邪之

深沉也。若論陽虛。不該大發瘡痍。但久病非速攻。莫計效遲。方可愈疾。

細生地 鹹從蓉 當歸鬚 牛膝 黃柏 生刺藜 川斛 草解

已五 履食如常。脈沉而緩。關兩腿內外肌肉麻木。五旬又三。陽脈斬衰。踰維不為用。事非三氣雜感也。溫通以

兩下之法 此方最穩

佐脈絡之流暢。做古賢四斤金剛之屬。

淡從蓉 枸杞子 牛膝 茯苓 白蒺藜 木瓜 草薢 金毛狗脊膏丸

郭 兩足痿弱。遇冷筋掣。三年久病。藥力馬能速拔。况不明受病何因。徒見病而治。難期速功。據云精滑溺後。

通納下焦為宜。淡從蓉 茯苓 川斛 生茅朮 生杜仲 金毛狗脊

沈 眩暈怔忡。行走足肢無力。肌肉麻木。骨節色變。早晨腹鳴。痲泄。此積勞久傷。陽氣肝風內動。勢欲痿厥。法

當脾腎雙補。中運下攝。固體治病。脾腎雙補丸。山藥粉丸。穆仲淳方。

沈 六寢食如常。儀容日瘦。語言出聲。舌絡牽強。手足痿弱。不堪動作。是肝腎內損。漸及奇經諸脈。乃痿痺之症。

席 雨水後。診得右脈頗和。左關尺大。堅搏不附骨。春陽初動。裏真漏泄。有風動枯痿之虞。議乙癸同涵意。

熟地 淡從蓉 杞子 五味 黃肉 牛膝 川斛 茯神 菊花 山藥膏丸

李氏 右肢跗足無力如痿。父子夜痰多。嗆嗽。帶下且頻。是衝脈虛寒。浮火上升。非治救清熱。夫衝為血海。隸於

陽明。女科八脈奇經最要。內經論之。女子五七年。歲陽明日衰。今天癸將絕。年歲脈絡少氣。非見病治病。唐

淺之見。愚意通陽攝陰。以實奇脈。不必縷治。薛氏加減八味丸。二兩勻七服。鹽湯送下。

許 金瘡去血。乃經脈營絡之傷。若損及臟腑。倏忽莫救。後此噴然動肝。屬五志中陽氣逆逆。與客邪化火。兩

途。苦平泄氣。頻服既多。陽遂發泄。形雖若豐盈。而收藏固攝失職。少腹約束。陽道不舉。背脊喜靠。步履無力。

皆是痿弱症端。漸至痿廢。議以通納之法。專事涵養生真。冀下元之陽。八脈之氣。收者收。通者通。庶乎近理。

鹿角霜 淡從蓉乾 生羌絲粉 生杜仲粉 歸身 五味 大茴香 遠志

家韭子 覆盆子 雲茯苓 益汁泛丸

唐 脈左沉。右弦。兩足腰膝痠更無力。舌本腫脹。刺頸轟然蒸熱。痰涎湧出。味鹹。此腎虛收納少權。督脈不

司約束。陰火上泛。內風齋煽。久延痿厥沉疴。病根在下。通奇脈以收拾散越之陰陽為法。

奇經即八
此必衝
二子之

奇腎
兼虛

衝脈
虛寒

肝腎
虛

脾腎
虛

下焦陰虛

萬 虎潛去知柏歸加枸杞青鹽羊肉膠丸
脈濡弱右大心熱煩渴兩足膝腰髀伸縮不得自如此乃下焦陰虛熱鑠筋骨而為痿躄

骨痿

黃四冬藏精氣既少當春夏發泄失血遺精筋弛骨痿不堪行走精血內法奇脈中少氣三年久損若不絕終

安開有僂發難狀之疾 鹿筋膠 羯羊肉膠 牛骨髓 猪脊髓 鯨魚膠 菴蓉乾
紫巴戟 枸杞子 茯苓 沙苑子 牛膝 青鹽

某 病後陰傷骨痿 生杜仲 熟地 龜甲 黃柏 虎骨 牛膝 當歸 巴戟

骨 難與攻

骨 難與攻 砲 議香茸丸 温通太陽督脈 症如歷節但汗出筋縱而痛冬月為甚腰脊偃僂形俯據述未病前夢遺已久是精血內損無以營養筋

鹿茸 生當歸 麝香 生川烏 雄羊腎 三對酒者爛搗丸

經云肺熱葉焦則生痿躄又云治痿獨取陽明以及脈痿筋痿肉痿骨痿之論內經於痿症一門可謂詳

審精密矣奈後賢不解病情以諸痿一症或附錄於虛勞或散見於風溼大夫經旨賴丹溪先生特表而

出之惜乎其言之未備也夫痿症之旨不外乎肝腎脾胃四經之病蓋肝主筋肝傷則四肢不為人用而

筋骨拘攣腎藏精精血相生精虛則不能灌溉諸末血虛則不能營養筋骨肺主氣為高清之臟肺虛則

高源化絕化絕則水涸水涸則不能濡潤筋骨陽明為宗筋之長陽明虛則宗筋縱宗筋縱則不能束筋

骨以流利機關此不能步履痿弱筋縮之症作矣故先生治痿無一定之法用方無獨執之見如衝任虛

寒而成痿者通陽攝陰兼實奇脈為主溼熱沈著下焦而成痿者用苦辛寒燥為主腎陽奇脈兼虛者用

通納八脈收拾散越之陰陽為主如下焦陰虛及肝腎虛而成痿者用河間飲子虎潛諸法填納下焦和

肝熄風為主陽明脈空厥陰風動而成痿者用通攝為主肝腎虛而兼溼熱及溼熱蒸灼筋骨而成痿者

益下佐以温通脈絡兼清熱利溼為主胃虛室塞筋骨不利而成痿者用流通胃氣及通利小腸火腑為

主。胃陽腎皆虛者。兩國中下為主。陽明虛營絡熱。及內風動而成痿者。以清營熱。熈內風為主。肺熱筋
焦。而成痿者。用甘寒清上熱為主。邪風入絡而成痿。以解毒宣行為主。精血內奪。奇脈少氣而成痿者。以
填補精髓為主。先生立法精詳。真可垂諸不朽矣。邪滋丸
補亦有未到之處。此等方起於宋而盛於明。古人不如是也。
下體痿弱。確是屬虛者。多藥中多溫補。肝腎亦不為過。但其中必兼有風痰寒溫一味。變

周痺

吳 風溼相搏。一身盡痛。加以墮水。外寒裏熱。痛極發厥。此屬周痺。

- 桂枝木 片薑黃 羚羊角 海桐皮 花粉 白蒺藜

又 照前方去薑黃白蒺。加大豆黃卷木防己。

鮑四 風溼客邪留於經絡。上下四肢流走而痛。邪行觸犯。不拘一處。古稱周痺。且數十年之久。豈區區湯散可

效。凡新邪宜急散。宿邪宜緩攻。方不以此後。蛇蟻蟲。右藥製末。以無灰酒者。黑大豆汁泛丸。 全蠍 地龍 穿山甲 蜂房 川烏 麝香

乳香 久病宜養血。風之品。何以用此。此屬以傷正氣。

杜三 溫暖開泄。驟冷外加。風寒溼三氣交傷為痺。遊走上下為楚。邪入經隧。雖汗不解。貴乎宣通。

- 桂枝 杏仁 滑石 石膏 川草薺 漢防己 苡仁 通草

又 經脈通而痛痺滅。絡中虛則痿弱無力。周身汗出。陽泄已多。豈可再用苦辛。以傷陽泄氣乎。內經以筋緩

為陽明脈。虛當此宗旨。黃芪 防風 白朮 茯苓 炙草 桂枝 當歸 白芍 苡仁

又 大凡邪中於經為痺。邪中於絡為痿。今痿痛全止。行走痿弱無力。經脈受傷。陽氣不為護持。法當溫養通

補。經旨春夏養陽。重在扶培生氣耳。黃芪 茯苓 炙草 桂枝 當歸 白芍 苡仁

- 牛膝 仙靈脾 虎骨膏 金毛狗脊 茯苓 生白朮 炙草 淡從蓉 當歸

劉三 瀕海颶風潮溼。著於經脈之中。此為周痺。痺則氣血不通。陽明之陽不主司事。食腥膩遂不化為溘瀉。病

有六七年。正虛邪實。不可急攻。宜緩。生白朮 生黃芪 海桐皮 川桂枝木 羌活 防風

行痺

周 痛勢流走而腫後感外邪。參藥不可與也。從行痺治。

羌活 木防己 石膏 生甘草 海桐皮 杏仁

吳 寒入陰分。筋骨痛。此為痺。遺泄內虛。忌用表散。劫真。

當歸 沙苑 北細辛 桂枝木 生白朮 茯苓

又 虎骨 當歸 北細辛 生白朮 茯苓

又 行痺入左足。生虎骨 防己 草薢 豉仁 半夏 茯苓

某氏風濕發熱。萃於經脈。腫痛遊走。病名行痺。世俗呼為歷節風是也。

桂枝 羌活 石膏 甘草 杏仁 防風

又 行痺。腹中痛。便難不知飢。瓜蒞皮 紫苑 杏仁 鬱金 半夏 山柰 桑枝

肢痺

俞 肩胛連及臂指。走痛而腫一年。乃肢痺也。絡虛留邪。和正祛邪。

黃芪 防風 海桐皮 生白朮 歸身 川羌活 片薑黃 白蔘

李四脈小弱。當長夏四肢痺痛。一止之後。筋骨不甚舒展。此衛陽單薄。三氣易襲。先用陽明流暢氣血方。

黃芪 生白朮 漢防己 川獨活 豉仁 茯苓

朱三肢痺痛頻發。羚羊角 木防己 川桂枝尖 晚蠶沙 川草薢 白通草 生豉仁 茯苓

汪 冬月溫暖。真氣未得潛藏。邪乘內虛而伏。因驚。墊節。春陽內動。伏氣乃發。初受風寒。已從熱化。兼以夜坐。

不眠。身中陽氣亦為泄越。醫者但執風寒溼三邪合成為痺。不曉病隨時變之理。羌防葛根。再泄其陽。必致。

增劇矣。烏望痛。緩議用仲景木防己湯法。木防己 石膏 桂枝 片薑黃 杏仁 桑皮

又 氣中伏邪得宣。右肢痺痛已緩。血分留熱。壅著左肢。痛勢未衰。足微腫。體質陰虛。仍以宣通輕劑。

羚羊角 桂枝木 片薑黃 花粉 木防己 杏仁 桑皮

顧 溼熱流著。四肢痺痛。川桂枝 木防己 蠶沙 石膏 杏仁 威靈山

寒濕

其左脈如刀。右脈緩澁。陰虧本質暑熱為瘧。水穀溼風下墜。肢末遂成痺痺。今已便瀉。減食畏冷。陽明氣衰。

極矣。當緩調勿使成疾。生白木 狗脊 獨活 茯苓 木防己 仙靈脾 防風 威靈仙

又濕痺。脈絡不通。用苦溫溼濕小效。但汗出形寒。泄瀉。陽氣大傷。難以溼甚。生熱。例治通陽宣行。以通脈絡。

生氣周流亦却病之義也。生於木 附子 狗脊 苡仁 茯苓 草解

徐寸長夏溼勝氣阻不飢不食。四肢痺痛。痛甚於午後。子前乃陽氣被陰溼之過。色痿黃。脈小澁。以微通其陽。

忌投劫汗。茯苓 草解 木防己 晚蠶沙 澤瀉 金毛狗脊

黎肢膝麻痺。足膝為甚。當歸 杞子 生虎骨 油松節 略二 川芎 狗脊 草解

准牛膝 仙靈脾 檀香泥 白茄根 沙苑 兩各一 火酒醇酒各半浸七日

某三寒溼滯於經絡。身半以下。筋骨不舒。二便不爽。若非迅疾飛走。不能效。觸痛丹

某勞力感溼。腰痺酸痛。四肢乏力。生杜仲 生苡仁 沙苑子 茯苓 粗桂枝木 金毛狗脊 晚蠶沙 木防己

其十五年中。痺痛三發。述痛久流及肢節。骨節屈曲之所。皆腫赤。此寒溼變熱。為欲解。病在軀殼筋骨。無害

命之理。但病深沉下甚。已屬陰邪。小腹脹。小溲全無。川獨活 漢防己 川熟附 粗桂枝木 錢 茯苓 錢 五 川草解 錢 一 木猪苓 錢 一

又生白木 錢 三 茯苓 錢 三 川熟附 錢 一 川獨活 錢 五 北細辛 錢 一 漢防己 錢 五 猪苓 錢 半 澤瀉 錢 一

又陽虛溼痺。痺愈下焦無力。用斡旋其陽。茯苓 錢 四 生白木 錢 二 泡淡生乾薑 兩 肉桂 錢 五

已上四味生研末。滾水泛丸。每早服三錢。開水下。

何六脈沉目黃舌腫。周身四肢疹發。胃痛肢末皆腫強。遇冷飲涼即病。此久服溼邪。陽氣傷損。議溫氣分以通

周行之脈。川烏頭 生白木 桂枝木 茯苓 半夏 薑汁

唐壘右後脇痛連腰胯。發必惡寒逆冷。暖護良久乃溫。此脈絡中氣血不行。遂至凝塞為痛。乃脈絡之痺症。從

...

...

...

風溼 陽維陰維論病 鹿茸霜 小茴香 當歸 川桂枝 沙苑 茯苓
 王 努力經氣受傷。客邪乘衛陽之疎而入。風濕阻遏。經隧為腫為痛。大汗連出。痛仍不止。而大便反滑。其溼邪無有不傷陽氣者。固衛陽以却邪。古人正治以溼家忌汗耳。

生於木錢 防風根五 生黃芪錢 片薑黃錢 桂枝木五 海桐皮錢 羌活分 獨活分

又 人參錢 生於木二 黃芪錢 炒當歸錢 炙甘草五 川桂枝錢 煨薑分 南棗枝

又 風溼腫痺。舉世皆以客邪宜散。愈治愈劇。不明先因勞倦內傷也。蓋邪之所湊。其氣必虛。參朮益氣。佐以

風藥。氣壯托出其邪。痛斯止矣。病人自云手足如墮如無。詎非陽微不及行乎。四末乎。此皆誤治。致參藥過

費耳。人參錢 生於木二 黃芪錢 歸身錢 肉桂分 炙草分 煨薑錢 南棗枝

又 遺泄陰傷。兼以斂攝。此等方其加痛乎。人參錢 生於木三 黃芪錢 歸身錢 熟地錢 茯苓錢 五味分 白芍錢 炙草分

又 人參兩 黃芪兩 茯苓兩 杞子兩 鹿角霜兩 鹿茸兩 歸身三 炙草兩 菊花炭兩 陳蜜丸

又 風溼痺痛。防已 生於木 川獨活 茯苓 炒黃柏 生苡仁

又 痺在四肢。羚羊角 白蒺藜 海桐皮 滑石 大豆黃卷 苡仁

又 照前方去蒺藜。苡仁。加連翹。青菊葉。花粉。海桐皮 大豆黃卷 花粉 薑黃 金銀花

又 羚羊角 犀角 連翹 海桐皮 大豆黃卷 花粉 薑黃 生石膏 木通

又 風溼熱走痛。二便不通。此痺症也。杏仁 木防已 寒水石 鬱金 生石膏 木通

又 風溼肌腫而痛。畏熱。炒黃柏 茅木 製蒺藜 木防已 秦光 鈎藤

又 黃柏 防已 茯苓 苡仁 萆薢 虎骨

又 楊 四肢流走。痺痛。風勝移走。溼凝為腫。下焦為甚。邪入陰分。蠲痛丹

將氏便唐食少。腰腹以下骨節肢節尤痛。

以上諸方皆不中病

人參

生於木

製白松香

茯苓

漢防己

北細辛

川獨活

苡仁

王 身半以上屬陽。風溼雨露從上而受。流入經絡。與氣血交混。遂為痺痛。經月來外邪已變。火化攻散諸法。

不能取效。急宜宣通清解。毋使布及流注。防己 薑黃 蠶沙 杏仁 石膏 滑石

毛氏風溼相搏。一身腫痛。周行之氣血為邪阻蔽。倣仲景木防己湯法。

木防己

石膏

杏仁

川桂枝

威靈仙

羌活

溼熱

洪四溼盛生熱。生痰。漸有痿痺之狀。乃陽明經隧為壅。不可拘熱。左屬血。右屬氣也。全匱云。經熱則痺。絡熱則痿。今有痛處。治在氣分。生於木錢 生黃芪錢 片薑黃錢 川羌活錢 半夏錢 防風錢 加桑枝錢

又 芪木固衛升陽。左肩胛痛未已。當治營中。以辛甘化風法。

黃芪

當歸

炙草

防風

桂枝

肉桂

張 骨節走注行痛。身體重著。不能轉舒。此為溼痺。但陽虛之質。忌辛散苦寒藥。

桂枝木

木防己

苡仁

羚羊角

大豆黃卷

杏仁

橘紅

方 左脈弦大。面赤痰多。大便不爽。此勞怒動肝。令陽氣不交於陰。陽維陽蹻二脈無血營養。內風燥筋。附瀝

痺痛。暮夜為甚者。厥陰旺時也。病在脈絡。

金斛

晚蠶沙

漢防己

黃柏

半夏

草薢

大栝榔汁

又 痛右緩左痛。溼熱未盡。液虛風動也。生地 阿膠 龜版 稽豆皮 茯苓 通草

某叶 舌白。目彩油光。腰痺痛。溼邪內蘊。尚未外達。必分利溼邪為主。

杏仁

蘇梗

木防己

厚朴

茯苓皮

花粉

晚蠶沙

茵陳

吳氏風溼化熱。蒸於筋絡。周身痺痛。舌乾咽燥。津液不得升降。營衛不肯宣通。怕延中痿。

生石膏

杏仁

川桂枝

苡仁

木防己

又 石膏

杏仁

木防己

炒半夏

橘紅

黑山梔

薑汁

竹厯

增補... 龍文書局校印

石脈數右大溫漸化熱灼及經絡氣血交阻而為痺痛陽邪主動自為遊走陽動化風內腠浮腫俗諺稱謂

白虎歷節之謂 川桂枝 木防己 杏仁 生石膏 花粉 鬱金

又照前方去鬱金加寒水石晚蠶沙通草

又脈大已減右數象未平痛緩什七肌膚甲錯發癢腹微滿大便不通陽明之氣未化熱未盡去陰已先虛

不可過劑 麻仁 鮮生地 川斛 丹皮 寒水石 鈎藤

某久痺釀成歷節舌黃痰多由溼邪阻著經脈

漢防己 嫩滑石 晚蚕沙 寒水石 杏仁 苡仁 茯苓

宋病者長夏靈天奔走內踝重墜發斑下焦痛起繼而筋掣及於腰窩左臂經云傷於溼者下先受之夫下

焦奇脈不流行內踝重著陰維受邪久必化熱燥血風動內舍乎肝膽所謂少陽行身之側也診得右脈緩

左脈實溼熱混處血絡之中搜逐甚難此由溼痺之症失治延為痿廢沈疴矣三年病根非倉猝迅攻姑進

先通營絡泰之奇經為治考 聖治痿痺獨取陽明惟通則留邪可拔耳

鹿角霜 生白朮 桂枝 茯苓 撫芎 歸鬚 白蒺藜 黃荊花

某初病溼熱在經久則痰熱入絡膿瘍日多未已漸而筋骨疼痛全匱云經熱則痺未見此大絡熱則痿數年宿病勿

事速攻 夜服蒺藜丸 犀角 元參 連翹心 野赤豆皮 細生地 丹參 薑黃 桑枝

張九四肢經隧之中遇天冷陰晦疼痛拘攣癰疽瘍潰膿其病不發瘍愈病復至抑且時常呶呶經以風寒溼

三氣合而為痺然經年累月外邪留著氣血皆傷其化為敗痰凝痰混處經絡蓋有諸矣倘失其治年多氣

衰延至廢棄沉疴 當歸鬚方無者 乾地龍兩 穿山甲兩 白芥子兩 小撫芎兩 生白蒺藜兩 酒水各半法丸

沈從來痺症每以風寒濕三氣雜感主治召恙之不同由于暑暄外加之溼熱水穀內蘊之濕熱外來之邪

著於經絡內受之邪著於腑絡故年解汗出熱痛不減余以急清陽明而致小愈病中腹反者口鼻復及暑

暑傷 氣滯 熱入

痰血 經絡 經塞

溼熱 入血

此正方也

衛陽 絡邪入

肝陰 虛邪入絡

熱入 下焦血分

風寒 溼入下焦經隧

熱也是兩後宜薄味使陽明氣爽。斯清陽流行不自。肢節脈絡舒通而痺痿之根盡拔。至若溫補而圖速效。又非壯盛所宜。

人參 茯苓 半夏 廣皮 生於木 枳實 川連 澤瀉 竹瀝薑汁法丸 暮服白茯苓丸

某 冬月溫舒陽氣疎豁。風邪由風池風府流及四末。古為痺症。忽上忽下。以風為陽。陽主動也。診視鼻明。陽明中虛可見。却邪之劑。在乎宜通經脈。

桂枝 羚羊角 杏仁 花粉 防己 桑枝 海桐皮 片薑黃

又 症已漸安。脈絡有流通意。仲景云。經熱則痺。絡熱則痿。知風淫於內。治以甘寒。寒可去熱。甘味不傷胃也。

甜杏仁 連翹 元參 花粉 萊豆皮 梨汁

又 餘熱尚留。下午足寒。晨餐頸汗。胃未調和。食不甘味。因大便微澹。不必過潤。

北沙參 麥冬 川貝 川斛 陳皮 穀芽

沈三 用養肝血熄風方。右指仍麻。行走則屈伸不舒。戊亥必心熱煩蒸。想前法不效。杞歸辛溫。陽動風亦動矣。

議去辛用鹹。若疑慮逢次瘡邪未盡。致脈絡留滯。兼以通逐。緩攻亦妙。

熟地 龜膠 阿膠 秋石 天冬 麥冬 五味 茯苓 蜜丸晨服

桃仁 穿山甲 乾地龍 撫芎 歸鬚 丹皮 紅花 沙苑 香附汁丸夜服

某 仲景以經熱則痺。絡熱則痿。今痺痛多日。脈中筋急。熱入陰分血中。致下焦為甚。所謂上焦屬氣。下焦屬

血耳。柏子仁 當歸 丹皮 鉤藤 川斛 沙苑

又 痺痛右膝甚。生虎骨 柏子仁 牛膝 葶藶 茯苓 茯苓

某 八 脈弦勁。右足踝腫痛。得暖得摩稍適。此風寒溼三氣混入經隧。而為痺也。當用辛溫宣通經氣為要。

活絡丹一丸。陳酒下。川烏 全蝎 地龍 山甲 大黑豆皮

某 痺痛在外。踝筋骨。妨於行走。邪留經絡。須以搜剔動藥。

氣滯
熱鬱

某病後過食肥膩氣滯熱鬱口膩粘涎指節常有痺痛當從氣分宣通方法

蘇梗 杏仁 薑皮 鬱金 半夏麴 橘紅

肝胃
虛滯

陳五勞動太過陽氣頻蒸中年液衰風旋周身痺痛此非客邪法宜兩調陽明取陰

黃芪 生白朮 製首烏 當歸 白茯苓 黑糯米皮

肝膽
風熱

張三煩勞鬱勃之陽發現熱氣內風內經以熱淫風消必用甘寒前議謂酒客不喜甘味且痰多食少亦忌甘膩滋滯用清少陽膽熱者酒氣先入肝膽也酒汁淫著腸胃受之理明以通胃胃腸氣機流行食加滑泄頗膩今者氣熱當午上冒經絡痺痛亦減於平日主以和陽甘寒宣通經脈佐之

童桑 羚羊角 天門冬 枸杞子 白茯苓 丹皮 茯苓 霍山石斛 共熬膏

某氏血虛風痺骨節腫痛 羚羊角 細生地 元參 當歸 桂枝 桑枝 白茯苓

金三痺痛在下重著不移論理必係寒溼但左脈搏數經月遺泄三四痛處無形豈是六淫邪聚然隧道深遠藥餌未易奏功佐以艾火冀得效靈

枸杞子 肉苁蓉 虎骨膠 麋角膠 杜仲 桑椹子 天冬 沙苑 茯苓 溶膠丸

氣虛 孫 脈右大陽明空氣短閃鑠欲痛 人參 生黃芪 熟白朮 炙草 廣皮 當歸 白芍 半夏 防風根 羌活

又 益氣頗安知身半已上痺痛乃陽不足也 人參 黃芪 熟於木 炙草 桂枝 歸身 白芍 川羌

營虛 王 沈 痺痛在右氣弱有痰 生於木 川桂枝 川獨活 片薑黃 白茯苓 陳防己

辛香走竅宣通經髓理結氣分之有却病之能無補虛之益大凡藥餌先由中宮以布諸經中焦為營氣之本營氣失養轉旋自鈍然攻病必藉藥氣之偏朝夕更改豈是去疾務盡之道另於暮夜進營養一貼

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

人參 茯苓 桂枝木 炙草 當歸 炒白芍 南棗

筋痺 吳六筋縱痛甚邪留正痺當此天暖問用針刺以宣脈絡初補氣血之中必佐宣行通絡之治

生黃芪 防風 桂枝 炒黑常山 歸身 青荊葉汁

某 痺痛偏左入夜尤甚血中之氣不行 歸鬚 桑枝 苡仁 白蒺藜 薑黃 木防己

劉三周禮採毒藥以供醫事蓋因頑鈍沉痾著於驅殼非臆腑虛損故必以有毒攻拔使邪不留存凝著氣血乃效既效矣經云大毒治病十去其五當此只宜愛護身體勿勞情志便是全功道理愚人必曰以藥除根不知天地之氣有勝有復人身亦然穀食養生可御一生藥餌偏勝豈可久服不觀方士煉服金石丹藥疽發而死者比比 何首烏 黑芝麻 桑枝桂枝湯泛丸

某 脈沉小數營中留熱筋骨尚有微疼宜通經絡佐清營熱

鉤藤 細生地 當歸鬚 白蒺藜 丹皮 薑黃片

此症與風病相似但風則陽受之痺則陰受之故多重著沉痛其在內經不越乎風寒溼三氣然四時之令皆能為邪五臟之氣各能受病其實痺者閉而不通之謂也正氣為邪所阻臆腑經絡不能暢達皆由氣血虧損腠理疎豁風寒溼三氣得以乘虛外襲留滯於內致濕痰濁血流注凝滯而得之故經云三氣雜至合而為痺又云風勝為行痺寒勝為痛痺溼勝為著痺以及骨痺筋痺脈痺肌痺皮痺之法可知痺病之症非偏受一氣足以致之也然而病症多端治法亦異余亦不能盡述茲以先生治痺之法為申明一二有衛陽疎風邪入絡而成痺者以宣通經脈甘寒去熱為主有經脈受傷陽氣不為護持而為痺者以溫養通補扶持生氣為主有暑傷氣溼熱入絡而為痺者用舒通脈絡之劑使清陽流行為主有風溼腫痛而為痺者用參朮益氣佐以風藥壯氣為主有濕熱傷氣及溫熱入血絡而成痺者用固衛陽以却邪及宣通營絡兼治奇經為主有肝陰虛癯邪入絡而為痺者以鹹苦滋陰兼以通逐緩攻為主有寒溼入絡而成痺者以微通其陽兼以通補為主有氣滯熱鬱而成痺者從氣分宣通為主有肝胃虛滯而成痺者以兩補取陰陽明為治有風寒溼入下焦經隧而為痺者用辛溫以宣通經氣為主有肝膽風熱而

凡屬形體之疾當外治之法服外

既知風寒溼為痺則可知而用溫補之藥者恐有留邪之患

明理之論

藥多重複可刪

增亮登百有

卷五 痺 瘧 瘧

龍文書局校印

龍文書局校印

龍文書局校印

龍文書局校印

龍文書局校印

龍文書局校印

痰火
上開
前厥

成痺者用甘寒和陽宣通脈絡為主。有血虛絡澇及營虛而成痺者。以養營養血為主。又有周痺行痺。肢痺筋痺。及風寒溼三氣雜合之痺。亦不外乎流暢氣血。祛邪養正。宣通脈絡諸法。故張景岳云。治痺之法。祇宜峻補真陰。宣通脈絡。使氣血得以流行。不得過用風燥等藥。以再傷陰氣。亦見道之言也。鄒滋九

〔痲厥〕此病壞者居多。愈者絕少。

李

某

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

又

體中
熱鬱
心蒙

腎厥

腎厥。由背脊而升。發時手足逆冷。口吐涎沫。喉如刀刺。蓋足少陰經脈上循喉嚨。挾舌本。陰濁自下上犯。必循經而至。做許學士極附意通陽以泄濁陰耳。

此病此症

炮附子

某

盛

若非

淡乾薑 川椒 胡蘆巴 半夏 茯苓 薑汁泛丸

腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

四九 臍上心下熱熾 咽喉間陳腐氣逆 神昏仆厥 經時汗出而醒 病來口湧血沫 乃臆中熱擁 以致心蒙受蒙

若非芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

細生地

元參

龜膠

阿膠

淡萊

蚌水

不復

液涸

又

又

又

又

又

元參 龜膠 阿膠 淡萊 蚌水

液涸消渴 都是臟陰為病 前議填陰藥汁濃膩 不能多進 但胃口不醒 生氣何以再振 陽明陽土 非甘涼

不復肝病治胃 自來有諸 人參 麥冬 川斛 新會皮 白粳米 乾佩蘭葉

又 一經云 煩勞則張 精絕辟積於夏 令人煎厥 夫勞動陽氣弛 張則陰精不司 留戀 其陽雖有 若無 故曰 絕積

之既 又逢夏季 陽正開泄 五志火動 風生 若煎熬者 然斯為 暈厥耳 治法以清心益腎 使肝膽相火內風不

為暴起 然必薄味 靜養為穩 連翹心 元參心 竹葉心 知母 細生地 生白芍 切病

腎厥 由背脊而升 發時手足逆冷 口吐涎沫 喉如刀刺 蓋足少陰經脈上循喉嚨 挾舌本 陰濁自下上犯

必循經而至 做許學士極附意通陽以泄濁陰耳

此病此症 炮附子 淡乾薑 川椒 胡蘆巴 半夏 茯苓 薑汁泛丸

某 腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

盛 四九 臍上心下熱熾 咽喉間陳腐氣逆 神昏仆厥 經時汗出而醒 病來口湧血沫 乃臆中熱擁 以致心蒙受蒙

若非 芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

若非 芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

體中
熱鬱
心蒙

腎厥

腎厥。由背脊而升。發時手足逆冷。口吐涎沫。喉如刀刺。蓋足少陰經脈上循喉嚨。挾舌本。陰濁自下上犯。必循經而至。做許學士極附意通陽以泄濁陰耳。

此病此症

炮附子

某

盛

若非

淡乾薑 川椒 胡蘆巴 半夏 茯苓 薑汁泛丸

腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

四九 臍上心下熱熾 咽喉間陳腐氣逆 神昏仆厥 經時汗出而醒 病來口湧血沫 乃臆中熱擁 以致心蒙受蒙

若非芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

細生地

元參

龜膠

阿膠

淡萊

蚌水

不復

液涸

又

又

又

又

又

元參 龜膠 阿膠 淡萊 蚌水

液涸消渴 都是臟陰為病 前議填陰藥汁濃膩 不能多進 但胃口不醒 生氣何以再振 陽明陽土 非甘涼

不復肝病治胃 自來有諸 人參 麥冬 川斛 新會皮 白粳米 乾佩蘭葉

又 一經云 煩勞則張 精絕辟積於夏 令人煎厥 夫勞動陽氣弛 張則陰精不司 留戀 其陽雖有 若無 故曰 絕積

之既 又逢夏季 陽正開泄 五志火動 風生 若煎熬者 然斯為 暈厥耳 治法以清心益腎 使肝膽相火內風不

為暴起 然必薄味 靜養為穩 連翹心 元參心 竹葉心 知母 細生地 生白芍 切病

腎厥 由背脊而升 發時手足逆冷 口吐涎沫 喉如刀刺 蓋足少陰經脈上循喉嚨 挾舌本 陰濁自下上犯

必循經而至 做許學士極附意通陽以泄濁陰耳

此病此症 炮附子 淡乾薑 川椒 胡蘆巴 半夏 茯苓 薑汁泛丸

某 腎厥氣逆至頭 玉貞丸二十粒

盛 四九 臍上心下熱熾 咽喉間陳腐氣逆 神昏仆厥 經時汗出而醒 病來口湧血沫 乃臆中熱擁 以致心蒙受蒙

若非 芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

若非 芳香清透 不能宣通絡中痰痺 天竺黃兩 丹參兩 鬱金兩 雲茯苓兩 石菖蒲五

謝女熱鬱於內則機戾不靈春令升泄木火化風旋擾瘳癢播搗有癩癩之慮不可遲遲經再劫其陰液

細生地 鬱金 犀角 丹參 石菖蒲 生白芍 竹瀝

又火淫於內治以苦寒佐以鹹寒

黃連 黃芩 黃柏 黑山梔 牡蠣 生地 沖入方諸水

又脈左堅經阻半載戊亥陰時厥逆肢掣逾時方甦即欲渴飲龍奮宣敷鹹苦清火未效且大便兩旬不解

定是熱結在血做古人厥應下之義用張子和玉燭散 玉燭散

羅溫邪內陷津液被劫厥陽扶內風上逆遂致痙厥

生牡蠣 阿膠 熟地炭 生白芍 炒遠志 石菖蒲

又厥陰誤進剛藥五液劫盡陽氣與內風鳴張遂變為痙平昔內損繼以暴邪本屬難調此陰氣竭絕戊亥

當防 此症 熟地炭 磁石 生白芍 木瓜 遠志 茯神

毛瘦人而病溫熱神呆舌赤診脈時兩手牽掣震動此津液受劫肝風內鼓是發痙之原議以養胃汁煨肝

風務在存陰耳用仲景復脈湯法去參薑桂

余脈細促神迷舌縮言謇耳聾四肢牽引牙關不緊病已月餘乃溫邪劫液陽浮獨行內風大震變幻痙厥

危疴議以育陰熄風法必得痙止神清方有轉機

阿膠錢 雞子黃枚 人參 天冬錢 細生地錢 白芍錢 方不切病

又神氣稍甦脈來斂靜五液交潤風陽尚動滋液救其焚燎清補和陽去熱用藥全以甘寒津液來復可望

向安 阿膠 人參 淡菜 鮮生地 天冬 川斛

毛少陰不藏溫邪深入喘促汗出渴不多飲舌辛似縮症非輕小擬用復脈湯為邪少虛多之治去薑

又舌鋒汗泄齒燥痰膩熱劫津液最防痙厥 復脈湯去薑桂

唐積勞伏暑欲寐時心中轟然上升自覺神魂縹緲此皆陽氣上胃內風鼓動所以陡然昏厥

溫邪劫液 上風逆陽

暑邪

內服
閉結

定之理

石膏

知母

甘草

梗米

生地

麥冬

竹葉心

方 執閉神狂。因乎食復。畏人與股筋牽動。仍屬暑病變。瘧通三焦。以清神明。冀有轉機。紫雪丹二錢。

又 舌欲痿。膚燥筋掣。熱劫脂液。殆盡為瘧。用河開甘露飲。再服紫雪丹一錢。

楊 暑由上受。先入肺絡。日期漸多。氣分熱邪。逆傳入營。遂逼心胞絡中。神昏欲躁。舌音縮。手足牽引。乃暑熱

深陷。謂之發瘧。熱閉在裏。肢體反不發熱。熱邪內閉。則外脫。豈非至意。考古人方法。清絡熱。必兼芳香開裏

竅。以清神識。若重藥攻邪。直走腸胃。與胞絡結閉。無干涉也。

犀角

元參

鮮生地

連翹

鮮菖蒲

銀花

化至寶丹四丸

全 暑熱結聚於裏。三焦交阻。上則神呆不語。牙關不開。下則少腹衝氣。小溲不利。邪結皆無形之熱閉塞。漸

有瘧厥之狀。昨大便既下。而現此象。豈是垢滯。議芳香宣敷。通解在裏蘊熱。

紫雪丹一錢五分開水化勻三服

鮑 舌白渴欲冷飲。氣促。嗆咳而呃。胸悶昏謔。此暑風溼熱。穢濁痺塞。宿垢尚在小腸。旬日漸變瘧厥。是為

險機。議逐穢結。以冀消清。

大杏仁

連翹心

竹葉心

川貝母

菖蒲根汁

辰砂益元散

煎藥化牛黃丸一服

蔡 暑溼熱都著氣分。乃消食苦降。滋血亂治。熱熾津涸。舌板成瘧。究竟邪閉阻。勢屬不穩。

人參

生甘草

石膏

知母

梗米

肝風 潘八 肝陽化風。上冒為厥。風陽內燥。脂液涸而作痛。此非實症。剛燥忌用。

生地

阿膠

牡蠣

天冬

茯神

生白芍

夏五 中年以後。陽氣日衰。是下焦偏冷。陽不及護。衛周身。氣分更虛。右肢如痿。當春地氣上升。身中肝風天震。

心嘈噴怒。痰湧音啞。乃厥象也。皆本氣自病。最難見效。

熟地

熟地

牛膝炭

炒麥冬

遠志炭

茯苓

馬面青眊白入夜顫顫漸赤耳聾舌心乾板而縮並不渴飲聞有寒戰後熱此厥陰肝臟液涸風旋勢成痲厥危症勉從經旨之訓辛苦當食甘以緩之甘麥大棗湯加阿膠

陸面青頭痛動搖手足搐搦牽掣驚嚇惱怒病從肝起如饑求食晝夜無寐都是肝風盤旋鼓舞漸為痲厥此乃五志之病阿膠 牡蠣 生地 天冬 小麥 生白芍

某衝氣巔脹厥龍薈丸一錢二分

顧此痿厥也蓋厥陰風旋陽胃神迷則為厥陽明絡空四末不用而為痿厥午後黃昏乃厥陰陽明旺時病機發現矣凡此皆屬絡病全匱篇中有之仲景云諸厥宜下下之利不止者死明不下降之藥皆可止厥但不可銷黃再傷陰陽耳但積年沉痾非旦夕速效可知矣

活蠶甲 真阿膠 方諸水 鮮生地 元參 青黛

又照前方去元參加天冬厥從肝起其病在下木必得水而生陰水虧斯陽風燥筋而絡中熱沸即厥拙

擬血屬介類味鹹入陰青色入肝潛陽為法

又陰絡空隙厥陽內風披然鼓動而為厥余用鹹味入陰和陽介類有情之潛伏頗見小效但病根在下深遠湯劑輕浮焉能填隙改湯為膏取藥力味重以填實之亦止厥一法

鮮蠶甲 敗龜版 猪脊髓 羊骨髓 生地 天冬 阿膠 淡菜

熬膏早服七錢午服四錢

林據說六七年驚駭起病氣從左脇有紋在中有聲及胸膈心中脹極氣降脹減必汗出溲濁此屬肝厥凡煩勞

動怒即刻舉發肝木風火內寄其來必驟且有聲音久恙非湯藥可投緩調須用丸藥更發作自必輕減

人參 乾薑 附子 桂枝 川椒 小川連 川棟子 當歸 白芍 烏梅肉丸

顧平昔腸紅陰絡久傷左脇下宿痲肝家風氣易結形瘦面青陰虛陽氣易冒血絡不得凝靜諸陽一并遂為厥衝氣自下犯胃為呃症似蓄血為狂奈脈細勁咽喉皆痛真陰枯槁之象水液無有風木大震此剛劑

強鎮不能熄其厥胃耳。生雞子黃一枚。真阿膠二錢。淡菜五錢。龜板五錢。沖入熱童便一杯。

戴。酒客中虛多溼。陽明素虛。厥陰來乘。當穀雨土旺用事。風木與陽俱升。逆鬱胃而厥。此平昔積勞內因。與

外邪無涉。閱醫多用風藥。是再傷肌表。護衛之陽。乃召風以致中耳。

方中仍兼治風痰故妙

川桂枝

羚羊角

炒半夏

橘紅

明天麻

茯苓

當歸

吳三。肝風癩厥。迅發莫制。都因腎真內法。平素多遺。診脈孔弱。議用固本丸。

固本加五味黃肉龍骨金箔蜜丸

謝八。有年下虛。春木自地而升。陽浮上蒙清竅。經云。下虛上實為厥癩疾。肝風內震。倘加惱怒。必致厥仆。痲中。

大忌攻痰祛風藥。熟地。天冬。黃肉。五味。牛膝。龜甲。磁石。茯苓。遠志。

夏九。少腹氣攻有形。嘔吐頭脹。陰脈不至。頭而厥。陰脈上至巔頂。四肢逆冷。即厥象也。不是瘧母宿冷。肝脈環

遠陰氣為遺洩。炒黑川椒

川棟子

炒橘核

青木香

小茴香

茯苓

王。右脈已伏。左小緊。四肢冰冷。乾嘔煩渴。厥陰濁泛。胃陽欲絕。此屬痛厥。姑以辛熱泄濁通陽。

泡淡吳萸

製附子

川棟子

延胡索

淡乾薑

茯苓

又。脈微為無陽。下利冷汗。嘔逆不食。肢厥不肯回陽。一團濁陰阻蔽。却有閉脫之危。議四逆之屬。護陽驅濁。

人參

淡附子

枳實

茯苓

生淡乾薑

又。肢厥惡心吞酸胸滿。大便不通有六日。

川連

淡乾薑

人參

枳實

陳皮

半夏

茯苓

宜用

史。溫熱已入厥陰。陰傷致風。陽上巔。遂為瘧厥。厥發丑寅。陽明少陽之陽震動。昨進鹹苦。清其陰分之熱。已

效。今複入鎮陽以止厥。

生地

天冬

阿膠

雞子黃

生龍骨

小麥

將。眩暈心痛。脹嘔吐涎沫。周身麻木。此厥陰肝臟中陽過胃貫膈。逆衝不已。有瘧厥之意。

川連

乾薑

川棟子

烏梅

牡蠣

白芍

又開泄和陽入陰已效當停前藥。龍奮丸
程厥邪熱深。生薑性辛溫大泄肝陰。陽遂上胃。心熱量厥。但陰虛熱熾。苦寒不可多進。以滋陰却熱為穩。

生薑甲

鮮生地

生白芍

知母

山柰

橘紅

張

未病先有驚恐。先寒戰。後發熱。心中極熱。乾嘔煩躁。渴冷飲。仍不解渴。診脈小弦。舌白無胎。曾肢冷如水。此熱邪已入厥陰肝經。所謂熱深厥深也。病全入裏。極為棘手。議用紫雪丹。開深伏之熱。結取其芳香宣竅。冀得躁擾勢緩。方有轉機。紫雪丹二錢。

王 心中疼熱。耳聾自利。熱邪已入厥陰。三日不厥。方有好音。

鬱金

川連

秦皮

黃芩

連翹心

石菖蒲汁

肝風
燧陰

某 先發水痘。已感冬溫。小愈。不忌葷腥。餘邪復熾。熱不可遏。入夜昏煩。輒云頭痛。邪深走厥陰。所以發厥。診脈兩手俱細。是陽極似陰。鼻煤舌乾。目眇黃。多屬邪閉。壞敗。諒難挽回。用涼膈散。

伍 女室女經來。衝脈自動。動則陽升。內風遠旋不息。為薄厥煎厥。陽明虛。胃失降。厥陰熱。肝愈橫。風陽上胃。清空神迷。諸竅似阻。皆入夏大地發泄之徵。本虛表實。先理其實。議用局方龍奮丸。純苦直降。非湯飲。雷連腸胃之比。每服三錢。不拘二三次。分服。按用復脈法。去參薑桂。

施 氏諸厥屬肝。肝病犯胃。為嘔逆腹痛。乃定例也。診脈虛小。望色晄白。據述懷妊。病竟不發。思中流砥柱。斯肝木凝然。則知培植胃土。乃治病法程矣。六君子去木皮。加芍藥。木瓜煨薑。南棗。

某 氏厥屬肝病。幾番病發。都因經水適來。夫血海貯聚。既下。斯衝脈空乏。而風陽交動。厥之暴至之因由也。鹹寒濡潤。亦和陽泄內風之義。治之未應。下焦獨冷。喉啞胸痺。思衝脈乃陽明所屬。陽明虛則失闔。厥氣上犯。草邊內經治肝不應。當取陽明制其侮也。暫用通補入腑。取乎腑以通為補。小半夏湯加白糯米。

龔 三諸厥皆隸厥陰。疝瘕。心熱。脇脹。中消便難。乃肝陽內風妄動。消燥。犯及陽明矣。經言。治肝不應。當取陽明。

肝胃一臟一腑相對。不耐溫補者。是肝用太過。肝體不及也。

怒

奇脈 虛風 陽動

陳

噎怒微厥。肝陽升舉。宜益胃陰以制伏。

九孔石決明

淮小麥

清阿膠

細生地

天冬

茯神

人參

麥冬

茯神

鮮蓮子

竹葉心

生甘草

微溫服

葉氏脈右大熱升風動鬱胃為厥宗陳無擇羚羊角散方

羚羊角

小生地

元參

丹參

連翹

黑豆皮

又厥後驚陽汗泄。陽風無制。都緣陰枯不主。總陽。議用六味益陰和陽。炒六味去山藥加人參秋石。

又渴不欲飲。陰不上乘。沉寐醒神識不靜。易驚汗出。法當斂補。

人參

黃肉炭

熟地

茯神

遠志

又半月經水兩至。痛自下焦衝突而厥。病由陰維衝任。蓋八脈所司也。此養營僅到中宮。所以無病。

從容

鹿角霜

當歸

柏子霜

桂枝木

茯神

又前法已中病情。須從奇經治義。照前方去桂枝木加鹿角膠。

又病去八九。僅以溫補下元為法。不必窮治。淡從容 炒杞子 當歸 柏子仁 茯苓 小茴香

陶氏脈數厥止熱在營中。屏角 元參 丹參 連翹心 膽星 橘紅

王口鼻觸入異氣。胃傷嘔吐。上衰則木起。肝風內橫。三蟲擾動為痛。從疔厥論治。

川楝

乾薑

桂枝木

川楝子

人參

川連

烏梅

生白芍

黃仁據述十一年前。夏秋間多用井水鹽梅。因此昏厥。已後三五日一發。病愈雖醒。日瘦日減。間有語言不自。

接續想其生理。水鹽梅酸。大泄肝腎臟陰。厥者陽氣逆。亂胃神潰。勢成沉痾。非癰厥門治痰。治火清痰者。

是臟陰受病。臟主乎藏畜。醫偏搜逐劫燥。凡陰涸欲絕。譬諸油盡燈焰。忽明忽昏。撲然息矣。先聖先賢從無。

成法。未敢委藥欺人。常用人乳一杯。不服。

此老動云 奇經之溢 二 經也 十 者能統之 惟血脈則 子街脈及 帶水全 可于不 治法若 有他藥 以老欲 以不知 經立說 而奇 食之 動云 奇 經并 知 物真 一

營 熱 疔 嘔吐 陰涸 欲絕

所見病源無非陽動變化內風而為厥故凡屬厥症多隸厥陰肝病考內經治肝不外平以理用酸以治甘以緩急令精彩散失鎮固收攝猶慮弗及而方書泄肝平肝抑肝方法儘多至於補法多以子母相生為治此病全以肝腎下焦主法為正所服醫藥並無師古之方未識何見

阿膠

雞子黃

人參

生地

金箔

肝腎
虛衝
氣逆

某

冷是足上貫於心初起周身麻木今則口鼻皆是冷氣病起驚恐內傷肝腎為厥衝脈隸於肝腎二臟夫藏衝氣沸亂其脈由至陰而上故多冷耳

淡菴

熟地炭

五味子

紫石英

茯苓

牛膝

痛厥
汪

胃陽傷殘濁氣上攻將為痛厥當治陽明之陽

粳米

照前方去吳萸加廣皮

瘧厥
某

熱甚而厥其熱邪必在陰分古稱熱深厥深病中遺泄陰傷邪陷發表攻裏斷難施用和正托邪是為正法

草果

知母

人參

半夏

薑汁

烏梅

厥者從下逆上之病也瘧者明其風強之狀也所以二字每每並言原與傷寒門所載者有間想是症總由氣血日偏陰陽一并而成譬如風雷之猛烈鬱極而發也若發而漸復者猶可轉危為安若發而轉逆者必至直拔根莖乃已斯存亡之機在乎命臟之盈虧耳考方書之名目不一致病之因由亦繁太抵可吐者如痰食填塞於胸中用瓜蒂散之類及燒鹽探引方法可清可折者如厥陽壯火升逆而莫制用玉女煎及宣明龍薈丸法可開可降者如氣厥薄厥而形氣暴絕有五磨飲子及薄荷酒法穢濁蒙神而昏亂無知有牛黃至寶及蘇合香丸之兩法飛尸卒厥先宜酒醴以引導并可按穴而施鍼法及灸法若從虛而論者如內奪而厥則為瘖瘖有地黃飲子之通攝下焦法煩勞陽張令人前厥有人參固本加入金箔方諸水為壯水制火法血厥而陽騰絡沸參乎從陰從陽法色厥而精絕於下急與大劑挽元法腎厥宗許學士之椒附以通陽蛭厥有仲景之安蛭法陽極用救陰峻劑陰極有扶陽方法種種規模已為全

備及秦案中。先生於是症獨重在肝。蓋肝者將軍之官。善干他臟者也。要知肝氣一逆。則諸氣皆逆。氣逆則痰生。遂火沸風旋。神迷魂蕩。無所不至矣。若犯於上者。不免凌金燥液。有門冬湯。及瓊玉膏之補。金系制法。若犯於中。而為嘔為脹者。用六君去木。加木瓜。薑芍之類。及附子。梗米湯。加人參。為補胃健脾法。若震及心脾。而為悸為消者。用甘麥大棗湯。合龍蠅之屬。為緩急重鎮法。若挾少陽之威。而乘巔搖絡者。用羚羊鈎藤。元麥連翹之劑。為熄風清絡法。若本臟自病。而體用失和者。以椒梅桂芍之類。為益體宣用法。若因母臟之虛。而擾及子臟之位者。用三才配合。龜甲磁珠。及復脈減辛味。復入雞黃之屬。為安攝其子母法。至於痿厥之治。尤覺神奇。取血肉介類。改湯為膏。謂其力味重實。填隙止厥最速。此豈非補前人之未備。開後學之法門者乎。參是案者。幸毋忽諸。邵新甫

案中所載甚雜。或有癩症。或有瘰癧。或有怔忡症。或有火鬱症。或有驚恐症。或有痰迷症。皆謂之厥。此編書者之過也。至于當用人參。則厥症于不得一者。乃居其三。四。恐邪留之害。必有受之者矣。

氣逆

某 驚則氣逆。陽泄為汗。用重鎮壓驚。

川桂枝木五分

黃芪去心

人參錢一

龍骨錢半

左顧牡蠣錢半

某 驚恐傷神。不語。

建蘭根汁

薑汁

金汁

共和一處。隔湯燉徐徐服。

某 因驚水瀾。見症神法欲迷。已經肢厥。冷汗怕動。做鎮法理虛。

人參 茯神 棗仁 生龍骨 石菖蒲 炙草 南棗 陳淮小麥 早上服

楊氏 經血期至。驟加驚恐。即病寒熱。心博不寐。此驚則動肝。恐則傷腎。最慮久延。臟燥。即有肝厥之患。

淮小麥 天冬 龍骨 杜蠟 白芍 茯神

陳心 心中若煙霧。暖則氣散。少頃即聚。易驚恐畏懼。嘔逆不渴。自述雞鳴。苦況瀉後。亡陰熱藥。劫陰。前議和胃。

不應。主以鎮之攝之。足甘草當再氣分藥 淮小麥 大棗 棗仁 青龍骨

肝腎

陰虛甚 驟驚陽逆。暴厥為肝。臆病。晝則心悸。是陽動。夜則氣墜。屬陰虧。用收固攝肝可效。

青龍骨

此等症心
宜服鎮心
清痰等丸

陽浮

生地錢

黃肉錢

龍骨錢

牡蠣錢

五味錢

真金箔

生地錢。黃肉錢。龍骨錢。牡蠣錢。五味錢。真金箔。經云驚則傷膽。恐則傷腎。大凡可畏之事。猝然而至者。謂之驚。若從容而至。可以宛轉思維者。謂之恐。是

驚急而恐緩也。夫驚症大人亦有之。小兒最多。因其神志未堅。膽氣未充。故每遇稍異之形聲。即陡然而

驚。驚之所傷。由心猝及乎膽。由膽即及乎肝。遂致心主君火。兼肝膽中相火。風木驟然而起。症現搐搦

癱瘓。神昏譫妄。肢冷厥逆。吐乳身熱。目竄口噤。種種所患。無非心肝膽之現症。而實毫無外感之風邪。此

因外受之驚。而動內之木火風也。故但當以一驚字立為病名。斯乃切當。因其內風沸起。遂加一風字。因

病來迅速。又加一急字。故遂有急驚風之病名。此已屬牽強附會矣。至於今之混稱為急驚風者。更屬背

謬。總因小兒陰氣未充。外感之風。溫風熱風火。以及寒邪化熱。并燥火諸症。最易傷陰。陰傷則血不營筋

液。傷則脈絡滯滯。熱盛亦能使內之木火風相繼而起。所現之症。與受驚者類亦相同。然實非因受驚而

起。其所治之法。大有區別。如果因驚者。治宜安養心神。鎮驚定法。甘涼清內熱。柔潤熄肝風。或少佐芳香

通其數絡。舒其結閉。至於剛熱燥瀆。表散之藥。概不可用。若無驚。而但感外邪者。有宜於涼散。有宜於溫

散。有宜於苦寒。青火。有宜於甘溫扶陽。或補或瀉。自當按六淫之邪而施治。與驚字毫無關涉。奈今之醫

者。每遇非驚之症。因不能辨明六氣中所傷何氣。却定不出病名。遂強將一驚字混入。藉口漫稱為驚。驚

風症。掩飾欺人。病家亦酷信之。以為小兒防範難週。焉有無驚之理。其所訂之方。錯雜游移。不知治驚。總

以心肝膽為主。若治時邪。須兼脾胃脾腎三焦。營衛經絡而論。大不相同也。更有一種稱慢驚風之病。名

者。尤屬怪誕。不經。必當亟為駁正。有論在幼科吐瀉之後。宜合觀之。華雲岫

亦風字最妙。凡肝膽之疾。無不因風。肝為風臟。經云風者百病之長也。不但外風。石風。即內風

升痰火

孫八

癩痢

神呆脈沉。因驚恐。以致癩疾。語言不甚明了。此痰火阻其靈竅。深戒酒肉厚味。靜室善調。經年可愈。

黃連

黃芩

山梔

枳實

橘紅

膽星

菖蒲

遠志

陳 動怒驚觸乃外加擾內致五志陽越莫制古人集癩癩狂辨以陽併於陰陰併於陽互異今以陽逆狂亂非苦藥之降未能清爽其神識也 當歸龍薈丸三錢

倪 驟然驚湯陽氣上逆遂神呆不寐條籟喊叫不食不飢不便有癩癩之象 龍薈丸三服 盧叶疾病已成癩疾難愈 竹節白附子 又竺黃 陳膽星 石菖蒲 川連 鬱金 茯神 橘紅 汪 驚恐陽升風動宿癩遂發吐痰嘔逆不言絡脈失利也

羚羊角 石菖蒲 膽星 遠志 連翹 鈎藤 天麻 橘紅 曹叶 春病及長夏癩厥屢發前用龍薈丸意苦泄肝膽初服即瀉此久病陰分已虛議理陰和陽入酸以約束之 生雞子黃 阿膠 川連 黃柏 生白芍 米醋 切方不

金仁 癩厥神呆肢強 犀角 羚羊角 元參 菖蒲 炒半夏 炒遠志 鬱金 橘紅 吳 驚狂乃木火擾動雖得平靜仍心悸怔忡夜卧不寐診脈虛細如絲己非疫火有餘議補心丹以理心之用 人參 茯神 棗仁 元參 丹參 天冬 麥冬 生地 川連

柏子仁 菖蒲 桔梗 遠志 葉氏 每遇經來紫黑癩疾必發暮夜驚呼聲震蓋則神呆面青多笑火風由肝而至泄膽熱以清神再商後法 丹皮 丹參 細生地 黑山梔 羌蔚子 胡黃連 調入琥珀末 張二 入冬不寐癩疾遂發此陽不潛藏治在肝腎 用虎潛法

某 癩疾脈不鼓指識交心腎益神志 生地 龜甲 黃柏 川連 炒 菖蒲 茯神 遠志 山梔 竹葉 勞心 先以極苦之藥莫其亢陽潛降 生地 龍膽草 丹參 木通 山梔 蘆薈 青黛 薄荷 大過 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷斬新神志恍惚有以癩癩其病不在一臟

木火 鬱血 滯 肝腎 陽升 大鬱 心腎 不交 風陽 陽亢 勞心 大過 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷斬新神志恍惚有以癩癩其病不在一臟

木火 鬱血 滯 肝腎 陽升 大鬱 心腎 不交 風陽 陽亢 勞心 大過 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷斬新神志恍惚有以癩癩其病不在一臟

木火 鬱血 滯 肝腎 陽升 大鬱 心腎 不交 風陽 陽亢 勞心 大過 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷斬新神志恍惚有以癩癩其病不在一臟

木火 鬱血 滯 肝腎 陽升 大鬱 心腎 不交 風陽 陽亢 勞心 大過 某 平昔操持身心皆動悲憂驚恐情志內傷斬新神志恍惚有以癩癩其病不在一臟

癩癩症
用通神明
鎮其方甚
多非尋常
清火通氣
之藥可愈
見諸方也

論三症治
法頗異

二千年來從未有一方包羅者。然約旨總以陰陽迭偏為定評。凡動皆陽。當宗靜以生陰。是誠陽乘於絡脈。陰不安。斂鎮攝固。久進可效。家務見聞。必宜屏絕。百日為期。

人參 廉珠 茯神 棗仁 炙草 生龍骨 萸肉 五味 金箔

天地一陰陽也。陰陽和則天清地甯。一有偏勝。遂有非常之變。人身亦一陰陽也。陰陽和則神清氣定。一有偏勝。自致不測之疴。故內經曰：重陽者狂，重陰者癩。癩與癩。其原則同也。古人集癩癩狂辨。以為陽併於陰。陰併於陽。此誠不刊之論。言乎現症。狂則少卧不餓。妄言妄笑。甚則上屋踰牆。其候多躁而常醒。癩則或歌或哭。如醉如癡。甚至不知穢潔。其候多靜而常昏。癩則發作無時。卒然昏仆。筋脈痠痲。口中作聲。後人因其聲似分馬。癩牛癩猪。癩牛癩雞。癩五名。其候經時而必止。推其病因。狂由大驚。大怒。病在肝膽。胃經三陽。并而上升。故火熾則痰湧。心竅為之閉塞。癩由積憂積鬱。病在心脾。胞絡三陰。蔽而不宣。故氣鬱則痰迷。神志為之混淆。癩病或由驚恐。或由飲食不節。或由母腹中受驚。以致內臟不平。經久失調。一觸積痰厥氣。內風猝焉暴逆。莫能禁止。待其氣反然後已。至於主治。察形證診脈候。以辨虛實。狂之實者。以承氣白虎。直折陽明之火。生鐵落飲。重制肝膽之邪。虛者當壯水以制火。二陰前之類。主之。癩之實者。以滾痰丸。開痰壅閉。清心丸。洩火鬱勃。虛者當養神而通志。歸脾。枕中之類。主之。癩之實者。以攻風控涎丸。以劫痰。龍奮丸。以瀉火。虛者當補助氣血。調攝陰陽。養營陽。河車丸之類。主之。狂癩三症。治法大旨。不越乎此。今如肝風痰火者。苦辛以開泄。神虛火炎者。則清補並施。肝膽厥陽化風旋逆者。以極苦之藥。主之。神志兩虛者。用交心腎法。勞神太過者。宗靜以生陰。意為斂。補鎮攝。方藥雖未詳備。而零珠碎玉。不悉堪為世寶哉。醫者惟調理其陰陽。不使有所偏勝。則鬱逆自消。而神氣得反。其常焉矣。醫商年

溫邪某
風溫某

溫邪血
風溫血

連翹
丹皮

淡黃芩
連翹

黑山梔皮
赤芝

杏仁
茅花

鬱金
黑梔皮

元參
元參

濕熱 胃火 上蒸 肺火 上升 心營 熱

陰虛 陽胃

酒熱 傷胃

活明諸方 為中 提當

某三 此熱蒸於水穀之溼。齟血。歠血。納穀如音。治在陽明。熟地 知母 石膏 元參 牛膝
陳女 常有衄血。今夏忽起神識。如呆。診脈直上魚際。大忌驚恐惱怒。天癸得通可愈。

犀角 丹參 元參 生地 連翹 知母

林六 陽升。鼻衄不止。細生地 烏犀角 炒知母 牛膝 黑山梔 川斛 丹皮 炒黑側柏葉

某 努力傷陽。逆鼻衄。犀角 半錢 細生地 三錢 炒丹皮 錢 元參 錢 炒牛膝 錢

黑山梔 錢 炒黑側柏葉 錢 臨服沖鮮荷葉汁一小杯

趙仁 脈左數。鼻血火升。生地 阿膠 天冬 麥冬 淡菜 生白芍 茯神 炒山藥

程 從前衄血。都以養陰益氣而愈。知非實熱。皆勞役陽胃。以致陰血之動也。今壯年肌肉不充。身動氣促。如

喘。口中膩涎。濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保養。遂戒酒色。猶可向安。

熟地 人參 黃肉 湖蓮 芡實 補骨脂 山藥粉丸

朱九 脈數。陰虧。陽升。頭暈。心中煩雜。鼻衄。生地 元參 金銀花 川斛 丹皮 石決明

某 咳逆失音。衄血。生地 龜板 丹皮 牛膝 山藥 茯苓

某 歲十。鼻衄時發。生地 元參 丹皮 山藥 茯苓 澤瀉 黃柏 人中白

某 食燒酒。辛熱。及青梅酸。泄。遂衄。血咳嗽。心腹極熱。五味偏勝。腑陽臟陰為傷。此病以養胃陰和法。

生白扁豆 北沙參 麥冬 白粳米

血行清道。從鼻而出。古名曰衄。與濁道之吐咯者不同。清道即指志高之分。由山根以上。睛明之次。而來也。其穴乃手足太陽足陽明陰陽踰五脈之會。及衝脈交會其間。可見諸經皆能為衄。不獨肺胃而然。諸書難以詳明。推景岳辨之尤切。但衄之為患。總由乎火。外為六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日為錯亂。陰陽為之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛。或於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之太意。若溫風暑熱。拂鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑。認定經絡之高下。若火邪極甚。而載血上泛者。

濁陰
凝聚
肝絡

有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法也。至於類尤曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火。風上灼者。甘鹹柔婉。理所必需。多勞過熱。病及天一之真。陽浮引陰。血以胃上竅者。滋潛厚味。法從峻補。血脫則挽回元氣。格陽則導火歸源。因酒用和陽消毒之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學者須審內外兩因。庶于施治無誤矣。即新甫

症

某 七麻治法。最祥子和。其旨辛香以泄肝。得氣疎泄。而病緩矣。按法調理不愈。七味導引納腎。益氣升舉。脾陽而墜氣仍然。艾炙蒸臍。原得小安。內經任脈為病。男子內結七疝。女子帶下痕聚。同為奇經主之。故疎泄諸方。能治氣實。參朮升補。僅治中虛下陷。與元海奇經中病無補。壯歲至老。病根不輟。下焦日衰。可知升陽一法。體症頗合。衰年僅可撐持。勿使病加可矣。

朱二 勞傷溫裏已效。臍旁動氣。少腹結疝。畢丸偏隊。皆陽氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。
生鹿茸錢三 鹿角霜錢一 當歸錢二 生菟絲子錢五 沙蒺藜錢一 川桂枝尖五分 飢時服

當歸 船茴香 淡菴蓉 枸杞子 安息香 茯苓

孫 疝墜於右筋。縮連小腹。痛此寒主收引。議進溫通厥陰之絡。川棟子兩 穿山甲二兩 乳香錢五

炮黑川烏五錢 炒黑小茴香兩 橘核炒兩 用老韭白根汁泛丸 飢時服二錢五分

明 臍下少腹。形象橫梗。發必痛繞脇腰。以及陰囊。此乃厥陰肝氣不宣。議以苦辛加左金。佐通經脈之凝滯。

川連 吳萸 穿山甲 青木香 金鈴子 延胡 青橘葉湯丸

郁計肝病。絡虛氣聚。少腹滯脹。前用河間金鈴子散。加牡蠣橘葉。合鹹苦辛勝法。小效。如食。迷飢則脇腹鳴。盛而濁氣下泄。頗安。乃絡虛不足中之有餘。形質瘦怯。不可純攻。

桃仁 當歸稍 炒小茴 橘核 郁李仁 南山查 葱白汁丸

謝七 疝皆肝。少腹堅聚。有形。是閉塞不通之象。百日久恙。血絡必傷。古人治疝。必用辛香。助燥氣勝之品。宜

樂味切病
方本宜
如是人
無不然也

補醫言

緩商矣。歸鬚。杜牛膝根。小茴香。川棟子。穿山甲。柏子仁。

林脈右注。左瀆當臍。痛連少腹。已屬凝聚有形。嘔吐黃濁。大便欲解不通。若患處漉漉有聲。痛勢稍減。惟外

著體不轉移。其痛更加。此屬肝氣疝。疝。辛香流氣。所稱通則不痛耳。

炒桃仁。炒橘核。金鈴子。炒延胡。韭白汁。兩頭尖。小茴。青皮。

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走。至陰之域。以子和方合

奉議意。

施八立冬前一日。寒戰後熱。屬厥陰。食蠅鹹寒。沈墜。浮腫。囊大。溲溺甚少。至晚腫脹愈。加顯然。陽微濁聚。治從

氣分。開泄冷溼。粗桂枝。吳茱。川棟子。茯苓。生牡蠣。澤瀉。磨青皮汁十匙。

唐六寒溼已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊莖腫。五苓散加獨活。漢防己。

某肝風筋疝。怒勞致傷。宜通補熄風。

茯苓。補骨脂。歸鬚。小茴。韭子。茯苓。胡桃肉。青鹽。羊肉腎蒸熟和丸。

朱動氣疝。癢繞臍。汨汨有聲。男子精氣不充。是下焦損傷。溫補勿過剛燥。須察八脈。以推病情。

淡茯苓。歸身。炒枸杞。小茴。炒沙苑。茯苓。紅棗肉。

汪自云。鬱怒不已。夏季忽起腹脹。醫以快氣疏滯湯藥。其脹竟入小腹下墜。青筋外突。脹甚。延及腎囊。乃肝

疝之症。議子和法。歸鬚。橘核。青木香。小茴。黑山梔。青葱管。

周六三。久勞怒。肝木內震。腸中少腹。皆肝脈遊行之所。氣凝聚為脹。聚久結形為疝。情懷憂鬱。永不能痊。以

內起情志不昂。草木微功耳。炒小茴。黑山梔。川棟子。延胡。青木香。青皮。生香附。橘核。

吳六味。酸食不化。湧吐。迷少腹。厥氣上冲。下有宿疝。以肝濁攻胃。經云。食出完穀。是無陽也。

生炮黑附子。生淡乾薑。猪胆汁。吳萸。川棟子。吳仁。結少腹。按之堅。凡過飢必衝突至腕。吐酸腹脹。迷病從怒鬱而得。內應乎肝。肝逆犯胃。凡則置再行矣。

上暖下洩氣則滅 肉桂 真補核 青木香

項 寒勝疝墜亦屬厥陰。蓋陽明衰厥邪來乘須胃陽復辟。凝寒自罷。

人參 炮烏頭錢一 淡乾薑錢一 吳萸泡淡 茯苓錢三

朱 七疝在肝。內經謂衝脈為病。但衝脈隸於陽明。肝木必乘剋胃土。胃翻湧逆致吐蛇嘔吐。湯飲不入。呃忒

不止皆逆亂無已為厥厥危疝矣。肝體本剛相火內寄。一派熱燥藥餌以剛濟剛竟有缺折之虞。欲泄其濕

擬用朱南陽法。韭白根 兩頭尖 金鈴子 延胡 歸鬚 肉桂心

毛 疝發已過肢冷潮熱其納食減半濁陰內迫犯胃無發汗攻表之理議泄厥陰以安陽明

人參 炒黑川椒 附子 茯苓 川棟子 胡盧巴

詹 老年久疝因嗔怒而腫大熱痛肝失疎泄火腑溼熱蘊結不通溫補升陽固謬蓋肝性主剛濕閉以從燥

化此龍膽苦堅不應議柔苦制熱反佐辛熱以開血中鬱痺用東垣滋腎丸

戴 二溼熱下注久則囊腫形堅下焦血多氣少予和法中原有虎潛諸論後醫棄置不用惜哉

龍膽草 黃柏 蘆薈 山梔 知母 海金沙 豬苓 澤瀉 細辛

陳 五疝多肝病宜乎辛泄但形體參脈是溼熱內蘊阻塞二便不為通爽先以通太陽方

寒水石 海金沙 豬苓 澤瀉 通草 木香汁

倪 疝多結聚少腹大便閉阻小溲短澇舌白渴飲不能納穀無對症方藥姑與滋腎丸嘗服千粒十服

許 三久有疝症十年來寒熱勞形則右胸脇中一股氣墜直走少腹凡大小便用力皆然面赤亮痰多食腥膩

更令病加此溼熱久壅隧中緩攻為宜 控涎丹四分開日服十服

又 脈沉痰多手滯赤瘡宿疝在下右脇氣墜少腹前議控涎丹逐痺未應想久聚溼熱沉痼非皮膜經脈之

壅用瀉川丸四十粒勻二服間日一進竟通腑聚然後再議

又 通腑宣壅祛痰既下其疝仍聚於右且盛於寒天冬月卧安必有聲自能行走勞動必有形直墜陰囊久

久疝 溼熱 鬱

病急攻無效議辛甬化風方法。古人以疝為肝病。什居八九。

當歸 鹿角 桂枝 肉桂 小茴 川芎 炙草 茯苓 生薑 羊肉膠丸

張五痛自腎囊。漸踞少腹之左。夫厥陰之脈繞乎陰器。操持謀慮。都主傷肝。一氣結聚。變幻形象而痛。病名曰疝。疝分有七。暴疝。多寒。久疝。多熱。泄氣痛緩。宣通可以却病。只因下焦乃深遠之鄉。氣熱溼鬱。概可知矣。

陳川連 小茴 黑山桅 橘核 川棟子 青木香 郁李仁 冬葵子
陳脈沉弦。舌灰邊白。腰跨氣痛。腎囊羣丸腫大。此溼熱為病。亂吃發散消導。溼熱下墜為疝。治當分消。

陳二辛香流氣以治疝。未嘗不通服之五日。遍身疼痛。下午四肢浮腫。肌膚漸見高突塊瘰。思走泄氣勝。都是陽傷。長附湯主之。生黃芪兩 附子錢二

朱五厥陰三瘧。久延邪攻肝經絡。脈少腹痛。漸硬氣串繞陰器。筋痛乃結疝。瘕之象。病久雖少壯不可弔於泄氣。溫腎宣肝為急。淡從蓉 歸身 枸杞子 炒黑小茴 穿山甲 全蝎

陸九瘧母十年。沈痼宿疴。藥不能效。夫瘧邪既久。邪與氣血兩凝。結聚絡脈。藥難入絡耳。瘧不離乎肝膽。疝不外乎肝病。七疝子和分部大著。虛質不可弔。以辛香下墜為甚。議有情溫通以培生氣。

赤淋酒一杯。瀉酒汁和丸。每服二錢。煖酒送。鹿茸 大茴香 穿山甲 當歸 水安息香 炮黑川烏 全蝎 用黑大豆炒

經云。任脈為病。男子內結七疝。女子帶下。瘕聚。又督脈生病。從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。又曰。脾傳之腎。病名曰疝。瘕。又曰。三陽為病。發寒熱。其傳為癩疝。又曰。邪客於足厥陰之絡。令人卒疝。暴痛。此素問言諸經之疝也。又經脈等篇云。足陽明之筋病。癢。疝。腹筋急。足太陽之筋病。陰器紐痛。下引臍。兩脇

痛。足厥陰之經筋病。陰氣不用。此靈樞言諸經之疝也。後人因有筋水。狐癩。氣血寒七疝之名。其主治各有專方。立法可謂久備。然其中不無錯雜之處。終非可訓之定法。惟仲景先生。獨以寒疝為名。其所出三

疎泄 傷街 陽 疝兼 瘕母

方亦以溫散祛寒調營補虛為主並不雜入氣分之藥而子和治法又以平香散為本此謂肝氣鬱結而
病愈矣其金鈴虎潛諸法可謂發前人所未備故疝病之本不離乎肝又不越乎寒以肝脈絡於陰器為
至陰之臟足太陽之脈屬腎絡膀胱為寒水之經故仲景所云寒疝腹中痛逆冷手足不仁腹滿脈弦而
緊惡寒不欲食繞臍痛及脇痛裏急是內外皆寒氣作主無復界限其烏頭二方專以破邪治標為急虛
實在所不論是急則治標之義也其當歸羊肉一方專以補虛散寒為主故以當歸羊肉辛甘重濁溫緩
下元而不傷陰佐以生姜隨血肉有情之品引入下焦溫散泣寒是固本不治標也子和所云疝不離乎
肝者以疝病有陰囊腫脹或痛而裏急筋縮或莖中作痛或牽引辜丸或少腹攻衝作痛或號笑忿怒而
致此皆肝經脈絡之現症其金鈴散一法以泄肝散逆為主故以川棟導膀胱小腸之熱元胡和一身
下諸痛以肝主疎泄故也其所取虎潛一法以柔緩導引為主故方中用虎骨煨肝風壯筋骨羊肉龜板
補髓填精佐以地黃補腎當歸補肝使以陳皮利氣疎肝芍藥通肝調營是治肝而顧及於腎也及觀先
生治疝之法又更有進焉者其旨以暴疝多寒久疝多熱為疝病之大綱其餘隨症施治如氣墜下結者
以鹿茸鹿角升陽為主其脈結有形痛甚於下者宗丹溪通陽泄濁為治其火臍溼熱鬱結不通者用桑
苦刺熱反佐辛熱以開血中鬱痺為主其寒溼下墜太陽之裏膀胱之氣不和二便不為通利者五苓散
加減通太陽膀胱為主其溼熱久聚氣墜少腹陰囊者用控涎丹瀉川丸等逐痺通腑分消兼辛甘化風
法為主如下焦陰陽兩虛者用有情溫通以培生氣兼通補熄風為主而先生於治疝之法可謂曲盡病
情諸法備矣仲景又有狐疝一方究非王道之品茲不具贅邪滋凡

（頭痛）

治疝之法大段亦不外此惟癩病血疝諸大
症尚未有治法想當時未及遇此等大症也

風火

徐六冬月嘔吐之後漸巔頂作痛下焦又有積疝痔瘍厥陰陽明偏熱凡陽氣過動變化火風迅速自為升

降致有此患

連翹心

元參心

桑葉

丹皮

黑山梔

荷葉汁

增亮登香月膏藥

卷五

頭痛

二十六

龍文書局校印

胡三脈左弦數右偏頭痛左齒痛

連翹 薄荷 羚羊角 夏枯草花 黑梔皮 鮮菊葉 苦丁茶 乾荷葉邊

某 高年氣血皆虛新涼上受經脈不和腦後筋掣牽痛倏起倏靜乃陽風之邪議用清散輕劑

荷葉邊 苦丁茶 蔓荊子 菊花 連翹

王三邪鬱偏頭痛 鮮荷葉邊 苦丁茶 連翹 黑山梔 蔓荊子 杏仁 木通 白芷

郁五風鬱頭痛 鮮荷葉 苦丁茶 淡黃芩 黑山梔 連翹 蔓荊子 木通 白芷

某七內風頭痛淚冷 有淚自 炒杞子 製首烏 柏子仁 茯神 炒菊花炭 小黑稽豆皮

沈氏痛在頭左腦後厥陽風木上觸 細生地 生白芍 柏子仁 炒杞子 菊花 茯神 木通

孫四暑伏寒熱頭痛 鮮荷葉邊 連翹 苦丁茶 夏枯草 山梔 蔓荊子 厚朴 木通

某 暑風溼熱混於上竅津液無以運行凝滯遂偏頭痛舌強乾涸治宜清散

連翹 石膏 生甘草 滑石 蔓荊子 羚羊角 荷梗 桑葉

程 既知去血過多為陰虛陽實之頭痛再加發散與前意相反矣 復脈去參薑桂加左牡蠣

又 脈數虛而動足微陰氣大傷陽氣浮越頭痛筋陽仍與鎮攝之法

牡蠣 阿膠 人參 生地 炙草 白芍 天冬

朱 據說就涼即安遇暖必頭痛筋掣外以厚拍可緩大凡肝風陽擾胃絡必虛食進不甘是中焦氣餒雖鹹

潤介屬潛陽獲效說來依稀想像諒非入理深談聊以代煎酸甘是商且五旬又四中年後矣況陰久進亦

有斷伐生氣之弊半月來之少診之功姑為認慎用固本膏

徐 當年下虛曾以溫腎涼肝獲效春季患目是陽氣驟升乃又夫藏聚水不生木之徵也頻以苦辛治目風

陽上聚頭巔肝木橫擾胃受戕賊至於嘔吐矣今心中乾燥如焚頭中岑岑震痛忽冷忽熱無非陰陽之逆

肝為剛燥溫燥決不相安况辛升散越轉內豈可再蹈前轍姑以鎮肝益虛冀有陽和風息之理

此風變火之症

阿膠

小麥

麥冬

生白芍

北沙參

南棗

又 倏冷忽熱心煩顛痛厥陽之逆已屬陰液之虧前案申明剛藥之非代赭味酸氣墜乃強鎮之品亦剛藥

也考七疝中子和慣投辛香走泄其中虎潛一法亦採可見疝門亦有柔法醫者執黨成法苟不潛心體認皆

希圖附會矣今嘔逆既止其陰藥亦有暫投即水生涵木之法議以固本成方五更時從陽引導可也加秋石

葉臨晚頭痛火升心嘈風陽上冒防厥 細生地 阿膠 牡蠣 茯神 麥冬 生白芍

史 頭形象天義不受濁今久痛有高突之狀似屬客邪蒙閉清華氣血然常餌桂附河車亦未見其害思身

半以上屬陽而元首更為陽中之陽大凡陽氣先虛清邪上入氣血痰痺其痛流連不息法當宜通清陽勿

事表散以艾熯按法灸治是一理也 孰半夏 北細辛 炮川烏 灸全蝎 薑汁

又 陽氣為邪阻清空機竅不宣考周禮採毒藥以攻病藉虫蠟血中搜逐以攻通邪結乃古法而醫人忽略

者今痛滋腦後心下嘔逆厥陰見症久病延虛攻邪須兼養正

川芎 當歸 半夏 薑汁 灸全蝎 蜂房

張二 太陽痛連額骨耳後牙跟夏令至霜降不症伏邪未解治陽明少陽

連翹 羚羊角 牛蒡子 葛根 赤芍 白芷 鮮菊葉

頭為諸陽之會與厥陰肝脈會於巔諸陰寒邪不能上逆為陽氣室塞濁邪得以據厥陰之風火乃能

逆上作痛故頭痛一症皆由清陽不升火風乘虛上入所致觀先生於頭痛治法亦不外此如陽虛濁邪

阻塞氣血痰痺而為頭痛者用蟲蟻搜逐血絡宣通陽氣為主如火風變動與暑風邪氣上壅而為頭痛

者用鮮荷葉苦丁茶蔓荊山梔等辛散輕清為主如陰虛陽越而為頭痛者用仲景復脈湯甘麥大棗法

加膠芍牡蠣鎮攝益虛和陽熄風為主如厥陽風木上觸兼內風而為頭痛者用首烏柏仁檀豆甘菊生

芍杞子輩熄肝風滋腎液為主一症而條分縷析如此詳明可謂手法兼到者矣 鄒時來 頭風一症往往本熱而標

厥陰 氣血 邪痺

厥胃 女邪

增補全書

心 痛

龍文書局校印

心痛

驚傷

勞傷

血滯

脾寒

厥

營絡

傷急

心痛

田斗脈細數聞雷被驚。心下漾漾作痛。道逆散去柴胡加鉤藤丹皮。當用鎮心方。

宋脈左清伏。心下痛甚。古白不能食。殺下咽阻隔。痛極昏厥。此皆積勞損陽。前者曾下瘀血。延綿經月不止。

此為難治。此為瘀血。生鹿角。當歸鬚。薑汁。官桂。桃仁。炒半夏。

譚五心痛引背。口湧清涎肢冷。氣塞脘中。此為脾厥。心痛病在絡脈。例用辛香。

此為痰當用其藥。高良薑。片薑黃。生芫朮。公丁香。枳。草果仁。厚朴。

朱重按痛勢稍衰。乃一派苦辛燥。劫傷營絡。是急心痛症。若上引泥丸。則大危矣。議用金匱法。

人參。桂枝尖。川椒。炙草。白蜜。

厥心痛一症。古人辨論者多且精矣。茲不復贅。但厥心痛。與胃脘痛情狀似一。而症實有別。世人因內經。

胃脘當心而痛一語。往往混而視之。不知厥心痛為五臟之氣厥。而入心胞絡。而胃實與焉。則心痛與胃。

痛。不得不各分一門。今先生案中。聞雷被驚者。用道遙散去柴胡加鉤藤丹皮治之。以其肝陽上逆。不容。

升達。為之養血以平調也。積勞損陽者。用歸鹿姜桂桃仁半夏治之。以其勞傷血痺。無徒破氣。為之通絡。

以和營也。脾厥心痛者。用良薑薑黃茅朮丁香草菓厚朴治之。以其痺寒氣厥。病在脈絡。為之辛香以開。

通也。重按而痛稍衰者。用人參桂枝川椒炙草白蜜治之。以其心營受傷。攻劫難施。為之辛甘以化陽也。

方案雖未全備。然其審病之因。製方之巧。無不一一破的。果能舉一反三。其義甯有盡乎。龍齋年。

心痛胃脘痛。唯是二病。然心痛絕少。而胃脘痛極多。亦有因胃痛而及心。痛者。故此二症。古人不分。二項醫者。細心求之。自能辨其輕重也。

胃脘痛

肝化

嚴仁胃痛半年。乾嘔。金鈴子。延胡。半夏。茯苓。山梔。生香附。

張衝氣上攻成形。痛嘔痛後則散。此厥陰順乘陽明。陽明虛。筋骨亦掣痛。安蚘丸三錢。四服。椒梅湯送。

某記。勞力氣阻胃痛。川棟子。延胡。炒半夏。烏藥。橘紅。生香附汁。

陳 宿病衝氣胃痛今飽食動怒痛發嘔吐是肝木侵犯胃土濁氣上踞脹痛不休逆亂不已變為先寒後熱煩躁面赤汗泄此為厥象厥陰肝臟之現症顯然在目夫痛則不通通字須究氣血陰陽便是着診要旨矣

議用瀉心法 乾薑 川連 人參 枳實 半夏 薑汁

吳七 食倉痛發嘔水涎沫六年久病入絡述大便忽閉忽瀉患處澀澀有聲議通胃陽兼制木侮

淡吳英 良薑 半夏 延胡 炮川烏 茯苓 蒲黃

李氏 舌白胸痞脫痛如束乾嘔便難氣阻疑痰聚膈當以泄降宣劑若竟攻蕩當夏熱土旺傷及大陰恐滋脹滿之憂 醋炒半夏 川棟子 延胡 橘紅 杏仁 厚樸

王氏 氣逆填胸阻咽脫痺而痛病由肝臟厥氣乘胃入膈致陽明經脈失和周身掣痛夜甚晝緩者戌亥至陰為肝旺時候也此症多從驚恐噴鬱所致失治變為昏厥

半夏 薑汁 金鈴子 延胡 杏仁 瓜蒌皮 香豉 白蔻

又 痛緩夜深復熾前後心胸板掣脈左數病在血絡中

金鈴子 延胡 桃仁 歸鬚 鬱金 白蔻仁

董氏 產後三年經水不轉胃痛得食必嘔汗出形寒腰左動氣悶燥大便七八日始通脈細弦右濇古白稍渴脫

中响動下行痛緩病屬厥陰順承陽明胃上久傷肝木愈橫法當辛酸兩和厥陰體用仍參通補陽明之陽俾濁

少工僭痛有緩期 人參 同前 開口吳英 滾水 泡洗 生白芍 三錢 良薑 分 熟半夏 二錢 雲茯苓 三錢

顧氏 天癸當絕仍來昔壯年已有頭暈七年前秋起胃痛若嘈今春悲哀先麻木頭眩痛發下部膝脛冷三日

病屬肝厥胃痛述痛引背膈是久病絡脈空隙厥陽熱氣因情志鬱勃拂逆氣攻乘絡內風旋動襲陽明致

嘔逆不能進食 九孔石決明 清阿膠 生地 枸杞子 茯苓 桑寄生 川石斛

某 腸痛入脘嘔吐黃濁水液因驚動肝肝風震起犯胃平昔液衰難用剛燥議養胃汁以熄風方

人參 茯苓 半夏 廣皮白 麥冬 白粳米

肝風 犯胃 液虛

肝犯胃 兼飲 胸痺

此仲聖之法也

肝火 犯胃

此症最難 其明何以 時時自發

鬱傷 脾胃 陽虛

陽虛 某

姚 胃痛久而屢發。必有疑。聚。聚。失年氣衰。病發日重。乃邪正勢不兩立也。今納物嘔吐甚多。味帶酸苦。脈得左大右小。蓋肝木必侮胃土。胃陽虛完穀而出。且呃逆沃以熱湯不減。其胃氣酸脹如沸。不嗜湯飲。飲濁瀰留脘底。用藥之理。遠柔用剛。嘉言謂能變胃而不受胃變。開得上關。再商治法。紫金丹含化一丸。日三次。議以辛潤苦滑。通胸中之陽。開滌濁涎結聚。古人謂通則不痛。胸中部位最高。治在氣分。

又 鮮薤白三錢 瓜蒌仁三錢 熟半夏三錢 茯苓三錢 川桂枝錢 生薑汁四分
古有薤露之歌。謂薤最滑。露不能留。其氣辛則通。其體滑則降。仲景用以主胸痺不舒之痛。瓜蒌苦潤。豁痰陷胸。湯以之開結。半夏自陽以和陰。茯苓淡滲。桂枝辛甘輕揚。載之不急下走。以攻病所。薑汁生用能通胸中痰沫。兼以通神明。去穢惡也。

某氏胃痛引脇。川棟子 柴胡 黑山梔 鉤藤 半夏 橘紅
朱氏苦寒辛通。川連 土瓜萋皮 白芥子 茯苓 炒半夏 薑汁 橘紅 竹茹
又 肝厥胃痛。兼有痰飲。只因誤用芪木人參。固守中焦。痰氣阻閉。致痛結痞脹。更醫但知理氣使降。不知氣閉熱自內生。是不中竅。前方嵩以苦寒辛通為法。已得效驗。況酸味亦屬火化。議河間法。

金鈴子 延胡 川連 黑山梔 橘紅 半夏
張 老年鬱勃。肝陽直犯胃絡。為心下痛。久則液枯氣結成格。全鈴子 延胡 黑山梔 淡豆豉 炒
張 壯年面色痿黃。脈濡小無力。胃脘常痛。情志不適。即發。或飲暖酒暫解。食物不易消化。脾胃之土受剋。却因肝木來乘。治清放懷。可愈此病。

人參 廣皮 半夏 茯苓 沒仁 桑葉 丹皮 桔梗 山梔 薑汁 水泛丸
味痰短氣。脘中微痛。人參 淡附子 桂枝 炒遠志 煨薑
積滯久著。胃腑不宣。不時脘痛。已經數載。陽傷矣疑。

炒半夏 淡乾薑 華發 草菓 黃芩 茯苓

經宜切胃
痛甚妙此
方則使為
壯陽耳

汪五診脈弦濇胃痛繞背飲食漸減病經數載已入胃絡姑與辛通法

張 陽微不司外衛脈絡牽掣不和胃痛夏秋不發陰內陽外也當寒驟加宜急護其陽用桂枝附子湯

戴九始於傷陰繼則陽損腕痛似乎拘束食物通時不運當理中焦健運二陽通補為宜守補則謬

余三胃疼發前後心冷嘔吐淡英莢炒半夏華椒淡乾薑草葉仁厚朴廣皮桂枝木

某 中州陽失健運腕中痛食不化 益智仁 穀芽 廣皮 炙草 茯苓 檀香汁 半夏麵 炒荷葉

顧五清陽失職腕中痺痛得暖曠達當辛以通之 薤白 半夏 桂枝 茯苓 乾薑

費九勞力氣泄陽傷胸腕痛發得食自緩已非質滯停蓄然初病氣傷久泄不止營絡亦傷古謂絡虛則痛也 攻痰破氣不去病即傷胃致納食不甘噎噎欲嘔顯見胃傷陽敗當以辛甘溫方

某 胃痛已久間發風疹此非客氣外感由于情懷鬱勃氣血少於流暢夫思慮鬱結心脾營血暗傷年前主

程氏脈更背寒食入腕痛 人參 茯苓 炙草 當歸 白芍 炙草 環薑 南棗

某氏形寒腕痛得食甚手按少緩非有餘邪病擬進和營衛法 歸桂枝去芍加茯苓

蔣 陽微氣阻右腕痛痺據云努力痛起當兩調氣血 延胡 半夏 厚朴 橘紅 桂枝木 良薑 瓜蒌皮 茯苓

胃脘痛 龍文書局校印

某二努力 飽失時好飲冷酒脈弦硬中脘痛

熟半夏三錢 雲茯苓三錢 桃仁去皮尖炒 良薑一錢 延胡一錢 紅薑寇一錢

丸 熟半夏炒 雲茯苓二兩 生厚朴二兩 小附子一兩 草薢仁去衣 高良薑半兩 老薑汁法丸每服三錢

朱痛固虛寒吐痰泄氣稍緩當通陽明勿雜多歧 人參 半夏 薑汁 淡附子 茯苓 淡乾薑

某 陽微痰滯胃痰痛脹 用阿魏丸六分

施二 胃痛濁痰上逆 代赭石 炒半夏 淡吳萸 淡乾薑 茯苓 廣皮 華撥 生益智仁

張四 陽微濁凝胃下痛 炒黑川椒去目 炒黑川烏錢 炮黑川附子錢 炮淡乾薑錢

高五 素多鬱怒陽氣窒痺濁飲凝注湯飲下咽吐酸水胃脘痛痺已經三載漸延噎膈先與通陽徹陰俾陽

氣得宣庶可向安 半夏 枳實皮 桂枝木 茯苓 淡乾薑

又 脈右弦不飢納穀不運吞酸濁飲尚阻陽仍不宣

半夏 良薑 桂枝木 茯苓 延胡 淡乾薑

高 脈虛瀉胃痛久治在血分 桃仁 當歸 桂枝 茯苓 遠志 炙草

錢六 酒肉滯氣胃痛鄉人稱為穿心箭風方書所無不可稽攷苦辛泄降可效

延胡 川棟子 桃仁 蒲黃 五靈脂

威三 胃痛喜得暖食腸中泄氣則安數年痛必入絡治在血中之氣

又 桂枝木 桃仁 韭白汁 歸鬚 茯苓塊

席 經幾年宿病病必在絡痛非虛症因久延體質氣餒遇食物不適或情懷鬱勃痰因氣滯氣阻血瘀諸脈

逆亂頻吐污濁而大便反秘醫見嘔吐肢冷認為虛脫以理中和附子溫裏護陽夫陽氣皆屬無形況乎病

發有因決非陽微故脫憶當年病來竟足肝病凡疏通氣血皆效其病之未得全好由乎性情食物居多

血絡 痰痺

陽虛 痰滯 陰濁 凝阻

方藥重視
可厭

氣火
不降

季端以太陰陽明通劑令痛處在腕久則痰濁復聚宜淡味薄味清養初三竹瀝淡煎飲服早上另通痰

方法 蘇木 人參 鬱金 桃仁 歸尾 柏子仁 琥珀 羌蔚 紅棗肉 凡早服二錢

秦 久有胃痛更加勞力致絡中血瘀經氣逆其患總在絡脈中痺室耳醫藥或攻裏或攻表置病不理宜乎

無效形瘦清減用緩逐其瘀一法 蛭螂蟲各一兩 廬蟲一兩 五靈脂炒一兩 桃仁一兩 川桂枝炙五錢

蜀漆炒三錢 用老韭根白搗汁泛丸每服二錢滾水下 此是去瘀之藥必實其真者積瘀乃可否則有偏勝之害

潘氏脈弦瀆經事不至寒熱胃痛拒格嘔惡不納此因久病胃痛瘀血積於胃絡議辛通瘀滯法

川棟子 延胡 桂枝木 五靈脂 蒲黃 香附

吳氏氣火鬱胃痛 川棟子 橘紅 炒查肉 鬱金 黑山梔 香附

江仁胃疼緩氣逆不降 鮮枇杷葉 杏仁 生香附 降香附 厚朴 橘紅 桔梗 白寇

范氏諸蓋皆能閉氣凝凝為腐宛是呆滯食物食已脘痞痛脹乃清氣之阻診脈小瀆舌白粘膩當理氣以開

曠胸中 杏仁 厚朴 老蘇梗 廣皮白 白寇仁 枳殼汁 桔梗汁

陽明乃十二經脈之長其作痛之因甚多蓋胃者彙也乃衝繫要道為患甚易虛邪賊邪之乘機竊發其

間消長不一習俗辛香溫燥之治斷不容一例而漫施然而病其要何在所云初病在經久病入絡以經

主氣絡主血則可知其治氣治血之當然也凡氣既久阻血亦應病循行之脈絡自痺而辛香理氣辛柔和

血之法實為對待必然之理又如飽食痛甚得食痛緩之類於此有宜補不宜補之分焉若素虛之體時就

煩勞水穀之精微不足以供其消磨而營氣日虛脈絡枯瀆求助於食者甘溫填補等法所宜頻進也若有

形之治堵塞其中容納早已無權得助而為實實攻之逐之等劑又不可緩也寒溫兩法從手喜暖喜涼滋

燥之殊詢其便瀆便滑至於飲停必吞酸食滯當啜腐厥氣乃散漫無形厥傷則定而有象蚊蟲動擾當頻

痛而吐沫痰溼壅塞必善吐而脈滑營氣兩虛者不離乎饒辣動悸肝陽衝冠者定狀煩渴而嘔逆陰邪之

勢其來必速鬱火之患由漸而劇也邵新甫 治胃腕之方大段亦不外此但痛必有外邪內積不宜輕 補而用人參甚多痛久則必熱而用薑附甚多俱為太過

肝鬱

腸痛

張五 腸脹夜甚。响動則降。七情致傷之病。橘葉 香附子 川棟子 半夏 茯苓 薑渣

陳 氣熱攻沖。擾腕入腸。川連 牡蠣 夏枯草 炒半夏 香附 炒白芥子

徐四 勞怒陽動。左腸閉。腹中微滿。診脈弦搏。左甚。當先用苦辛。

鬱金 山柅 半夏麴 降香末 橘紅 金石斛

金木

湯汁 氣逆咳血後。腸疼。瘀血

降香汁 川貝 鮮枇杷葉 白寇仁 杏仁 橘紅 當加血藥

濕熱

丁 由虛理痛起。左腸下。堅滿。脹及臍右。大便澀滯不爽。用緩攻方法。小温中丸

某 痰飲搏擊。腸痛。半夏 茯苓 廣皮 甘草 白芥子 刺蒺藜 鉤藤

痛兼

沈三 左腸下痛。食入則安。當歸桂枝湯加肉桂

朱五 左乳傍痛。繞腰腹。重按得熱少緩。此屬陰絡虛痛。十年不愈。愈亦痼疾矣。

當歸 肉桂 小茴 丁香皮 茯苓 淡乾薑 此非煎方所治

尤四 痛從中起。繞及右腸。胃之絡脈受傷。故得食自緩。但每痛發。必由下午黃昏。當陽氣漸衰。而衆是有取乎

辛温通絡矣。內有瘀血。當歸 茯苓 炮薑 肉桂 炙草 大棗

寒入

郭三 痛必右腸中有形攻心。嘔吐清涎。周身寒凜。痛止寂然。無踪。此乃寒入絡脈。氣乘填塞。阻逆。以辛香温通

法 單撥 半夏 川棟子 延胡 吳萸 良薑 蒲黃 茯苓

絡脈

汪六 嗔怒動肝。寒熱旬日。左季脇痛。難以舒轉。此絡脈瘀痺。防有見紅之事。靜調勿勞可愈。

桃仁 歸鬚 五加皮 澤蘭 丹皮 鬱金

又 桃仁 歸鬚 丹皮 桑葉 川棟子皮 黑山柅皮

又 格虛則氣液虧。則風動。痛減半。有動躍之狀。當甘緩理虛。炙甘草湯去薑桂

又痛止便難液耗風動為秘議用東垣通幽法

當歸 桃仁 柏子霜 大麻仁 郁李仁 松子肉 紅花

凌 肝著脇中痛勞怒致傷氣血 川棟子皮 炒延胡 歸鬚 桃仁 生牡蠣 桂枝木

沈二 初起形寒寒熱漸及脇肋腕痛進食痛加大便燥結久病已入血絡兼之神法瘦損辛香剛燥決不可用

白旋覆花 新絳 青蔥管 桃仁 歸鬚 柏子仁

王四 左前後脇板著食後痛脹令三年矣久病在絡氣血皆窒當辛香緩通

桃仁 歸鬚 小茴 川棟子 半夏 生牡蠣 橘紅 紫降香 白芥子 水泛丸

汪 痛在脇肋遊走不一漸至疫多手足少力初病兩年寢食如常今年入夏病甚此非臟腑之病乃由經脈

繼及絡脈大凡經主氣絡主血久病血瘀痰從便下諸家不分經絡但忽寒忽熱宜乎無效試服新絳一方

小效乃絡方耳議通少陽陽明之絡通則不痛矣

歸鬚 炒桃仁 澤蘭葉 柏子仁 香附汁 丹皮 穿山甲 乳香 沒藥 水泛丸

程四 診脈動而虛左部小弱左脇疼痛痛勢上引得食稍安此皆操持太甚損及營絡五志之陽動擾不息嗔

乾古燥心搏久痛津液致傷也症固屬虛但參朮歸芪諸方未能治及絡病內經肝病不越三法辛散以理

肝酸泄以體肝甘緩以益肝宣辛甘潤溫之補蓋肝為剛臟必柔以濟之自臻效驗耳

炒桃仁 柏子仁 新絳 歸尾 橘紅 琥珀

又痛緩時用丸方 真阿膠 小生地 枸杞子 柏子仁 天冬 刺蒺藜 茯神 黃菊^{好奇}花四兩丸

朱 肝絡凝痰脇痛須防動怒失血 旋覆花湯加歸鬚桃仁柏仁

李九 左脇痞積攻疼 生牡蠣 南山查 炒延胡 川棟子 炒桃仁 歸鬚 丹皮 桂枝木

蔣六 宿傷左脇腹背痛 炒桃仁 歸鬚 炒延胡 片薑黃 五加皮 橘紅 桂枝木 炒小茴

陰虛 沈 暮夜五心熱嗔乾左脇痛肝腎陰虧 人參 生地 天冬 麥冬 柏子霜 生白芍 不切病

肝風絡

黃 左脇骨痛。易飢。驅涎。肝風內震入絡。 生地 阿膠 生白芍 柏子仁 丹皮 澤蘭

又 照前方去白芍。澤蘭加桃仁桑枝。 肝胃絡虛。心嘈如饑。左脇痛。便燥少血。

生地 天冬 枸杞 桂圓 桃仁 柏仁 熬膏加阿膠收

膽絡血滯

程 脇下痛。犯中焦。初起上吐下瀉。春深寒熱不止。病在少陽之絡。

青蒿根 歸鬚 澤蘭 丹皮 紅花 鬱金

肝腎皆虛

胡三診脈右弦。左小弱。瀆病起積勞傷陽。操持索思。五志皆逆。而肝為將軍之官。謀慮出焉。故先脇痛。晡暮陽不用事。其病漸劇。是內傷症。乃本氣不足。日餌辛燥。氣泄血耗。六味滋柔。膩藥原非止痛之方。不過矯前藥之謬而已。內經肝病三法。治虛亦主甘緩。蓋病既久。必及陽明胃絡。漸歸及右。肝胃同病。人卧魂藏於肝。夢寐紛紜。傷及無形矣。議用甘藥。少佐攝鎮。

人參 棗仁 茯神 炙草 柏子仁 當歸 龍骨 金箔 桂圓肉煮濃汁搗丸

脇痛一症。多屬少陽厥陰。傷寒脇痛。皆在少陽膽經。以脇居少陽之部。雜症脇痛。皆屬厥陰肝經。以肝脈布於脇肋。故仲景旋覆花湯。河間金鈴子散。及先生辛溫通絡。甘緩理虛。溫柔通補。辛泄通痰等法。皆治肝著脇痛之劑。可謂曲盡病情。諸法畢備矣。然其症有虛有實。有寒有熱。不可驟論。苟能因此擴充。再加詳審。則臨症自有據矣。鄒時乘

腹中用藥頗能變通。思有不可及處。惟用補之處。未免太重耳。

腹痛

裴氏 脈數按之瀼。腹痛嘔吐。恐痧穢格拒。宜宣通氣分。

白蔻仁 桔梗 黑山梔 香豉 半夏 廣皮白

陽氣不通

某四腰腹痛。得冷愈甚。桂枝木 茯苓 蘄艾 生香附 青皮 炒小茴 吳三當臍微痛。手按則止。此絡空冷乘。陽氣又虛之質。自述戒酒穀增。不可因痛。再以破泄真氣。

上中二焦氣阻

症如此數
寒飲成素

此症中有
寒飲成素

鬱傷 脾陽 俞九腹痛六七年每冬必週身寒涼吐涎沫而痛止此諸氣鬱痺得湧則宣之象法當升陽散鬱

程 微濁阻遏中焦氣機不宣腹痛脘痺當用芳香逐穢兼以疏泄

鄭 脈沉微腹痛欲大便陰濁內凝乃陽氣積衰通陽必以辛熱

某 膈陽不通腹痛用禹餘糧丸暖下通消二便通脹緩腹反此無形之氣未振宜疎補醒中

某 氣結腹痛食少寒熱逍遙散去木加鬱金香附

某 肝鬱腹痛有形經不調香附 川芎 當歸 肉桂 五靈脂 木香 吳萸 炒白芍

某 小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脈來沈而結澁此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留勞

徐 痧發五六年形體畏寒病發身不大熱每大便腹痛裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求

某 勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊己調中

營分 虛寒 五當臍腹痛發於冬春深漸愈病發暖氣過飢勞動亦發宜溫通營分主治

茯苓 生薑 熟木 肉桂

半夏 草葉 全鈴子 延胡 厚朴 生薑 蘇梗

藿香 厚朴 杏仁 萊菔子 半夏 廣皮白 白則不看好奇矣

生白朮 吳萸 良薑 川熟地 茯苓 小茴

生白朮 厚朴 廣皮 半夏 茯苓 生益智 薑汁

某 氣結腹痛食少寒熱逍遙散去木加鬱金香附

某 肝鬱腹痛有形經不調香附 川芎 當歸 肉桂 五靈脂 木香 吳萸 炒白芍

某 小便自利大便黑色當臍腹痛十五年漸發日甚脈來沈而結澁此鬱勃傷及肝脾之絡致血敗瘀留勞

徐 痧發五六年形體畏寒病發身不大熱每大便腹痛裏急此皆氣血凝滯當以鬱病推求

某 勞力傷氣浮腫食入腹痛姑用戊己調中

營分 虛寒 五當臍腹痛發於冬春深漸愈病發暖氣過飢勞動亦發宜溫通營分主治

增定... 龍文書局校印

服痛久者
必有積滯
丸藥以漸
除之
愈久病
散絕妙

補腦汁百學云

腹脹三年時發時止面色明亮是飲邪亦酒濕釀成因怒左脇有形痛繞腹中及胸背諸俞乃絡空飲氣
遂攻入絡食辛熱痛止復痛蓋怒則鬱折肝用惟氣辛辣可解論藥必首推氣味

粗桂枝木錢 天南星薑汁浸炮 生左牡蠣五錢 真橘核炒香打 川棟子肉錢 李根東行皮錢
長夏腹脹減食微痛是暑傷在氣分東垣每調和脾胃疎泄肝木最屬近理若字中之補及膩滯血藥皆

腹處乎中痛因非一須知其無形及有形之為患而主治之機宜已先得其要矣所謂無形為患者如寒
凝火鬱氣阻營虛及夏秋著溼痧穢之類是也所謂有形為患者如蓄血食滯癥瘕疝繞內疝及干素偏

好成積之類是也審其痛勢之高下辨其色脈之衰旺細究其因確從何起大都在臟者以肝脾胃為主
在腑者以腸胃為先夫臟有賦尅之情非比腑病而以通為用也此通字勿執攻下之謂古之建中湯理

中湯三物厚樸湯及厚樸温中湯各具正理考先生用古若通陽而泄濁者如吳茱萸湯及四逆湯法清
大而泄鬱者如左金丸及金鈴散法開通氣分者如四七湯及五磨飲法宣攻營絡者如穿山甲桃仁歸

鬚非根之劑及下瘀血湯法緩而和者如芍甘湯加減及甘麥大棗湯法柔而通者如旋菴拍子肉桂當
歸之劑及復脈加減法至於食滯消之燭搜安之癥瘕理之內疝平之痧穢之候以芳香解之偏積之類

究其原而治之是皆先生化裁之法也若夫瘍科內癰婦科四症兼患是病者更於各門兼參其法而用
之則無遺蘊矣即新甫

肩臂背痛 此當并入風痺症不必另立一門

通日天令驟冷診左脈忽現芤濇痛時筋攣繞掣耳後此營虛脈絡失養風動筋急前法清絡涼劑不應
營虛不受辛寒做東垣舒筋湯意

痛繞
耳後

暑傷
入絡

左 人參

廣皮

白芍

茯苓

穀芽

生益智仁

- 當歸 生黃芪 片薑黃 桂枝 防風 生於木 前藥化活絡丹一丸
- 勞倦肩臂疼 川桂枝木 木防己 五加皮 茯苓 生以仁 炒白朮

塗二痛起肩脚。漸入環跳髀膝。是為絡虛。

黃芪錢

於木錢

當歸錢

防風根五

又照前方去防風羌活加杞子沙苑

鄒五旬又四陽明脈衰。肩脚筋緩。不舉而痛。治當通補脈絡。莫進攻風。

生黃芪

於木

當歸

防風根

薑黃

桑枝

王四陽明氣衰。厥陰風動。頭眩目昏。右肩痛麻。脇下有聚氣。足厥陰主治。

拘子四

歸身三

羚羊角二 研

白蒺藜二 剉

嫩黃芪皮四

胡天麻二 兩

菊花二 兩

桑枝四

熬汁丸

徐二左指脹痛引肩。男子血虛風動。病在肝。形脈不足。以桑葉溫養。

製首烏 枸杞子

歸身 三角胡麻 菊花炭

柏子仁

刺蒺藜

桑枝膏丸

俞堰高年陽明氣乏。肩脚痛難屈伸。法當理衛陽通補。

黃芪

桂枝

歸身

片薑黃

海桐皮

夏枯草

背痛

孫四腎氣攻背。項強溺頻且多。督脈不攝。腰重頭疼。難以轉側。先與通陽。宗許學士法。

川椒三分

川桂枝錢

川附子錢

茯苓錢

生白木錢

生遠志錢

凡衝氣攻痛從背而上者

汪二肝濁逆攻痛至背。淡乾薑八 炒黑川楝三 炒焦烏梅肉五 小川連三 川桂枝木五

北細辛二

黃柏五

川棟子肉

生白芍二

陳氏內經論諸痛皆寒。時當炙臍。口鼻受寒冷。阻氣隧之流行。痛自胸引及背。其則手足厥冷。只宜兩通氣。

血主治

川棟子

延胡

生香附

橘紅

吳萸

烏藥

紅花

沈氏脈花汗出。失血背痛。此為絡虛。

炒歸身

棗仁

炒白芍

艾草

茯神

莊三腎虛背痛。脊高突。生毛鹿角三 片

鹿角霜錢

杞子錢

歸身錢

生杜仲錢

沙苑錢 茯苓糝 青鹽調入

張三腎虛背痛遺洩 生毛鹿角 鹿角霜 生菟絲子 生杜仲 沙苑子 白龍骨 茯苓 當歸

肺朝百脈肺病則不能管攝一身致肺俞為病即肩背作痛又背為陽明之府陽明有虧不能束筋骨利機關即肩垂背曲至於臂經絡交會不一而陽明為十二經絡之表臂痛亦當責之陽明但痛有內外兩因虛實迥異治分氣血二致通補攸殊如營虛脈絡失養風動筋急者不受辛寒當做東垣舒筋湯之意佐以活絡丹勞倦傷陽脈絡凝滯肩臂作痛者以辛甘為君佐以循經入絡之品陽明氣衰厥陰風動右肩痛麻者用枸杞歸身黃芪羚羊桑枝膏為陽明厥陰營氣兩虛主治血虛風動者為陽明絡虛受肝臟風陽之擾用首烏枸杞歸身胡麻柏子仁刺蒺藜等味以柔甘為溫養失血背痛者其虛亦在陽明之絡用人參歸身棗仁白芍炙草茯苓神以填補陽明若腎氣上逆則腎虛為主病宜用奇經之藥以峻補真陽至於口鼻吸受寒冷阻鬱氣隧痛自胸引及背者宗內經諸痛皆寒之義以溫藥兩通氣血更有古法如防風湯散肺俞之風指迷丸治痰迷臂痛控涎丹治流痺牽引此皆從實証而治所謂通則不痛也醫者不拘守一法洞悉病源運巧思以製方而技於是進龔商年痛定於肩背此者痺之類必用外治之藥以攻之損之煎藥不能取效也

腰腿足痛

腰痛

曹九三溼鬱少腹痛引腰右腳痠 木防己 晚蠶沙 飛滑石 茯苓皮 杏仁 厚朴 草薢 草薢

俞五五勞倦挾溼腰疼 川桂枝尖 木防己 生苡仁 茯苓皮 晚蠶沙 草薢

何七四腰痛環跳穴痛痺 沙苑 桂枝木 小茴 茯苓 桑寄生 炒杞子

翁一三努力傷腰疼 當歸去瘀藥 生杜仲 當歸 五加皮 炒牛膝 枸杞子 茯苓 青鹽 生羊腰子

吳氏脈虛身熱腰髀皆痛少腹有形攻觸臍陰奇脈交傷不可作外感治

當歸 沙苑子 桂枝 茯苓 天草 煨薑 大棗

此等皆屬
法談無病
不可全用
其質治病
已下以多

汪三脈瀉。腰髀跳悉痛。煩勞即發。下焦空虛。絡脈不宣。所謂絡虛則痛是也。

歸身 挂枝木 生杜仲 木防己 沙苑 牛膝 菓解 小茴

某便溏。腰痛無力。 木菟丸方

朱脈細色奪。肝腎虛。腰痛。是絡病治法。 生羊肉腎 當歸 枸杞子 紫衣胡桃 小茴 茯神

汪堰老年腰膝久痛。牽引少腹。兩足不堪步履。奇經之脈。頽於肝腎為多。

鹿角霜 當歸 肉從蓉 薄桂 小茴 柏子仁

王五脈遲。緩飲酒便溏。遺精數年不己。近日腰髀足膝墜痛麻木。此溼凝傷其脾腎之陽。滋填固瀉。決不應病。

吳舌日乾涸。腕不知飢。兩足膝跗筋掣牽痛。雖有宿病。近日痛發。必挾時序。溫熱溼蒸之氣。阻其流行之脈。

理進宣通。莫以風藥。 飛滑石 石膏 寒水石 杏仁 防己 苡仁 仙威靈

蔣七足膝腫疼。久不止。內熱。 生虎骨 炒牛膝 萆薢 金毛狗脊 當歸 仙靈脾

又照前方。加生鹿角黃柏。

張四勞力傷左腿。骨麻疼。 生虎骨 當歸 五加皮 仙靈脾 牛膝 獨活

白茄根 油松節 金毛狗脊 當歸 五加皮 仙靈脾 牛膝 獨活

朱痛著右腿。身前肌肉不腫。必在筋骨。且入夜分勢篤。邪留於陰。間有偏墜。治從肝經。

勞無著 生杜仲 當歸 穿山甲 炒 小茴 香 炒 北細辛 乾地龍 炒

某嘔逆吐涎。衝氣攻心。足大拇指硬強而痛。 淡吳萸 熟附子 獨活 北細辛 當歸 漢防己

某兩足皮膜。撫之則痛。由厥陰犯陽明。胃厥所致。脈弦而數。治當疎泄。

川棟子 延胡 青皮 黑山梔 歸鬚 桃仁 橘紅 炒黑查肉

陸四飽食則噦。是為胃病。兩足骨節皆痛。陽明胃脈不司束筋骨攻痛。議轉旋陽氣法。 苓薑朮桂湯

腰膝痛

膝腿足痛

足痛

醫退足痛者痛

某

右足患處麻木筋強微腫老人血氣不得宣通冬病至長夏食不加餐脈小弱主以溫養 虎脛骨三錢 淮牛膝錢一 歸身炒錢 杞子炒錢 生杜仲錢三 川斛錢三 萆薢錢一 白茯苓去粗炒錢

腰者腎之府腎與膀胱為表裏在外為太陽在內屬少陰又為衝任督帶之要會則腰痛一症不得以

腎為主病然有內因外因不外因之別舊有五辨一曰陽虛不足少陰腎衰二曰風痺風溼者腰痛

三曰勞役傷腎四曰墜墮損傷五曰寢卧溼地其說已詳而景岳更增入表裏虛實寒熱之論尤為詳悉

夫內因治法腎臟之陽有虧則益火之本以消陰翳腎臟之陰內奪則壯水之源以制陽光外因治法寒

溼傷陽者用苦辛溫以通陽泄濁溼鬱生熱者用苦辛以勝溼通氣不外因治法勞役傷腎者以先後

天同治墜墮損傷者辨傷之輕重與痰之有無為或通或補若夫腿足痛外感者惟寒溼溼熱溼風之流

經入絡經云傷於溼者下先受之故當以治溼為主其間佐溫佐清佐散隨症以製方內傷則不外肝脾

腎三者之虛或補中或填下或養肝隨病以致治古來治腰腿足痛之法大略如此也然疝症必如燃摩

爛怪用藥尤貴以芥投針今閱案中有飲酒便溲遺精不已腰痛麻木者他人必用滋填固瀉等藥先生

斷以溼凝傷脾腎之陽用苓桂朮薑湯以驅溼暖土有老年腰痛者他人但撮幾味通用補腎藥以治先

生獨想及奇經之脈隸於肝腎用血肉有情之品鹿角當歸菖蓉薄桂小茴以溫養下焦有痛著右腿肌

肉不腫入夜勢篤者先生斷其必在筋骨邪流於陰用歸鬚地龍山甲細辛以辛香苦溫入絡搜邪有兩

足皮膜撫之則痛者似乎風溼等症先生斷其厥陰犯陽明用川棟延胡歸鬚桃仁青皮山梔以疎泄肝

臟有飽食則熾兩足骨節皆痛者人每用疏散攻劫先生宗陽明虛不能束筋骨意用苓薑朮桂湯以轉

旋陽氣種種治法非凡手所及要之治病固當審乎虛實更當察其虛中有實實中有虛使第虛者補而實

者攻誰不知之潛玩方案足以補後人之心智也豈淺鮮哉龔商年 凡有著之邪總以外攻內經有腰

諸痛病在何處立諸痛門 旋覆花 新絳 青蔥 炒桃仁 當歸尾 久痛必入絡氣血不行發熱非痘也 痛論一篇亦以服藥不作盡病也

龐四絡虛則痛有年色脈夏奪原非香冠劫散可效醫不明治絡之

炒桃仁 青葱管 桂枝 生鹿角 歸尾 此旋覆花湯之變制也去覆花之鹹降加鹿角

之上升方中惟有葱管通下餘俱平散橫行則絡中無處不到矣

辛潤通絡病愈念日因勞再發至於上吐下閉是關格難治矣且痛勢復來姑與通陽阿魏丸四錢分四服

手四積傷入絡氣血皆瘀則流行失司所謂痛則不通也久病當以緩攻不致重損

桃仁 歸鬚 降香末 小茴 穿山甲 白蒺藜 片薑黃 煨木香 韭白汁法丸

楊三由周身筋痛繞至腹中遂不食不便病久入絡不易除根

歸身 川桂枝 茯苓 柏子仁 遠志 青葱管

章痛乃宿病當治病發之由今痺塞脹悶食入不安得頻吐之餘疹形朗發是陳腐積氣膠結因吐經氣宣

通倣仲景胸中懊憹例用梔子豉湯主之

又胸中稍舒腰腹如束氣隧有欲通之象而血絡仍然固結就形體畏寒法冷乃營衛之氣失司非陽微惡

寒之比議用宣絡之法 歸鬚 降香 青葱管 鬱金 新絳 柏子仁

黃痛則氣亂發熱頭不痛不渴飲脈不浮非外感也暫用金鈴散一劑

金鈴子 炒延胡 炒桃仁 桂圓

又痛而重按少緩是為絡虛一則氣逆紊亂但辛香破氣忌進宗仲景肝著之病用全匱旋覆花湯法

旋覆花 新絳 青葱管 桃仁 柏子霜 歸尾

汪姬脈小漚久因悒鬱脫痛引及背脇病入血絡經年延綿更兼茹素數載陽明虛餒肩臂不舉倉猝難於奏

效是緩調為宜議通血絡潤補勿投燥熱劫液 歸鬚 柏子仁 桂枝木 桃仁 生鹿角 片薑黃

陰分 伏熱 未 頭巔至足麻木刺痛熱熾 滋腎丸

增 諸痛 龍文書局校印

張初受寒溼久則化熱深入陰分必暮夜痛甚醫用和血驅風焉能直入陰分議東垣滋腎丸搜其深藏伏

邪肉桂忌見火黃柏兩知母兩俱鹽水炒水泛丸

王脈數而細忽痛必熱腫且痛來迅速思五行六氣之流行最速莫如火風高年脂液久耗人身之氣必左

升右降相火寄於肝龍火起於腎並從陰發越本乎根蒂先虧內乏藏納之職司矣每日服東垣滋腎丸三

錢秋石湯送以瀉陰中伏熱肉桂非宜

許二痛為脈絡中氣血不和醫當分經別絡肝腎下病必留連及奇經八脈不知此旨宜乎無功

范鹿角霜桑寄生杞子當歸沙苑白薇川石斛生杜仲

病後精采未復多言傷氣行走動筋謂之勞復當與甘溫和養氣血下焦痛肝腎素虛也

人參小茴香拌炒當歸沙苑蒺藜茯神炒杞子菊花炭

經云諸痛癢瘡皆屬於心夫心主君火自當從熱而論然此乃但言瘡耳若瘍科之或癰或疽則有陰有

陽不可但執熱而論矣又如舉痛論中所言十四條惟熱留小腸一條則主乎熱餘皆主乎寒症故諸痛

之症大凡因乎寒者十之七八因於熱者不過十之二三而已如欲辨其寒熱但審其痛處或喜寒惡熱

或喜熱惡寒斯可得其情矣至於氣血虛實之治古人總以一通字立法已屬盡善此通字勿誤認為攻

下通利講解所謂通其氣血則不痛是也然必辨其在氣分與血分之殊在氣分者但行其氣不必痛輕

藥重攻動其血在血分者則必兼乎氣治所謂氣行則血隨之是也若症之實者氣滯血凝通其氣而散

其血則愈症之虛者氣餒不能充運血衰不能滋榮治當養氣補血而兼寓通於補此乃概言其大綱耳

若夫諸痛之症頭緒甚繁內因七情之傷必先臟腑而後達於肌軀外因六氣之感必先肌軀而後入臟

腑此必然之理也在內者考內景圖在外者觀經絡圖其十二經遊行之部位手之三陰從臟走手手之

三陽從手走頭足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹凡調治立方必加引經之藥或再佐以外治之

奇肝腎經脈不和肝腎痛

有疼痺痛則諸痛不外

前所載不無識者之至內經有之則論人痛

痺痧脹中惡諸痛須辨明證端不可混治今觀各門痛證諸案良法儘多難以概叙若撮其大旨則補瀉
寒溫惟用辛潤宣通不用酸寒飲瀉以留邪此已切中病情然其獨得之奇尤在乎治絡一法蓋久痛必
入於絡絡中氣血虛實寒熱稍有留邪皆能致痛此乃古人所未及詳言而先生獨能剖析明辨者以此
垂訓後人真不愧為一代之明醫矣蓋玉堂此等議論以為辨別稍詳分毫無誤其實皆浮泛之談無病
終身迷入此中其說愈繁而去道愈遠一派浮談而古昔聖賢治一病必有一主方千變萬化不脫根本此理遂消亡矣

補臨證相南醫寄

卷五

三

前文書局社印

增補

臨證指南醫案

陸

古吳葉 桂天士先生著

(耳)

風溫

某 溫邪上鬱耳聾右脹 薄荷 馬勃 桔梗此皆外台 連翹 杏仁 通草

某二 先起咳嗽繼而耳聾脹痛延綿百日不愈此體質陰虧觸入風溫未經清理外因傷及陰分少陽相火陡起故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

苦丁茶 鮮菊葉 金銀花 生萊豆皮 川貝母 鮮荷葉梗 益元散

某氏 風溫發熱左耳後腫痛 惡感外症

乾荷葉 苦丁茶 馬勃 連翹 杏仁 黑梳皮

畢三壯年脈來小促數自春月風溫咳嗽繼以兩耳失聰據述苦降滋陰不効是不明虛實經絡矣內經以春

病在頭膏梁之質厚味酒醴助上痰火固非治腎治肝可效每晚臥時服茶調散一錢

又 鮮荷葉 羚羊角 石膏末 連翹 元參 鮮菊葉 牛蒡子

又 照前方去牛蒡菊葉加鮮生地鮮銀花

葉 火風侵竅耳聾 連翹 薄荷 甘菊 淡黃芩 苦丁茶 黑山梳

顧二暑邪鬱閉耳失聰

鮮荷葉 鮮菊花葉 苦丁茶 夏枯草 蔓荊子 連翹 淡黃芩 黑山梳

某心左耳聾痛舌白脈數體質陰虛挾受暑風上焦氣熱宜用辛涼輕藥

鮮菊葉 苦丁茶 黑山梳 飛滑石 連翹 淡竹葉

某三暑熱上鬱耳聾作脹咳喘當清氣熱 杏仁 連翹殼 淡竹葉 川貝 白沙參 六一散

頭重耳聾脹目微赤少陽相火上鬱以辛涼清解上焦

方極清和
可喜

鬱傷

心腎
磨火
上炎

腎虛
氣肝

連翹

羚羊角

薄荷梗

丹皮

牛蒡子

桑葉

以上俱
當外治

某 風木之鬱。耳脈欲閉。

連翹 羚羊角 薄荷梗

苦丁茶 夏枯草花 黑山桅皮 小生香附

倪十 因大聲喊叫。至右耳失聰。想外觸驚氣內應肝膽。膽脈絡耳。震動其火風之威。亦能鬱而阻竅。治在少陽。

忌食腥濁。青蒿葉 青菊葉 薄荷梗 連翹 鮮荷葉汁 苦丁茶

汪 耳聾咳嗽。形體日瘦。男子真陰未充。虛陽易升。乘竅書云。膽絡脈附耳。先議清少陽鬱熱。以左耳為其故也。

藥本益 丹皮 連翹 黑山桅 青蒿汁 蒙貝母

丁 腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。心腎兩虧。肝陽亢逆。故陰精走洩。陽不內依。是以耳鳴時閉。但病在心腎。其

原實由於鬱。鬱則肝陽獨亢。令膽火上炎。清晨服丸藥以補心腎。午服湯藥以清少陽。以膽經亦絡於耳也。

水煮熟地四兩 麥冬兩 龜板兩 牡蠣兩 白芍兩 北味兩 建連兩

磁石兩 茯神兩 沉香錢 辰砂錢 為丸

方煎 夏枯草二錢 丹皮錢 生地錢 山桅錢 女貞子錢 亦苓錢 生甘草分

姚十 氣閉耳鳴。宜外治通竅。鮮荷葉 杏仁 厚朴 廣皮 木通 連翹 苦丁茶 防己

金心 下虛耳鳴失聰。磁石六味去莖。加川斛龜甲。遠志

王 腎竅開耳。膽絡脈亦附於耳。凡本虛失聰。治在腎。邪于竅閉。治在膽。乃定例也。今年已六旬。脈形細數。是

皆腎陰久虧。肝陽內風上旋。蒙竅五行有聲。多動真氣火風。然非苦寒直降。可致填陰重鎮。滋水制木。佐以

鹹味入陰。酸以和陽。藥理當如是議。

某 八十耳聾。乃理之常。蓋老人雖健。下元已怯。是下虛上實。清竅不主流暢。惟固補下焦。使陰火得以潛伏。

磁石六味加龜甲五味。遠志 茯神 磁石 秋石 煑肉 五味 腎開竅於耳。心亦寄竅於耳。膽絡脈附於耳。體虛失聰。治在心腎。邪于竅閉。治在膽經。蓋耳為清空之竅。

清陽交會流行之所一受風熱火鬱之邪與水衰火實腎虛氣厥者皆能失聰故先生治法不越乎通陽鎮陰益腎補心清膽等法使清靜靈明之氣上走空竅而聽斯聰矣如溫邪著熱火風侵竅而為耳聾痛脹者用連翹山梔薄荷竹葉滑石銀花輕可去實之法輕清泄降為主如少陽相火上鬱耳聾腫脹者用鮮荷葉苦丁茶青菊葉夏枯草蔓荊子黑山梔羚羊丹皮平涼味薄之藥清少陽鬱熱兼清氣熱為主如心腎兩虧肝陽亢逆與內風上旋蒙竅而為耳鳴暴聾者用熟地磁石龜甲沉香二冬牛膝鎖陽秋石山萸白芍味厚質重之藥壯水制陽填陰鎮逆佐以酸味入陰鹹以和陽為主因症施治從虛從實直如庖丁之導竅矣鄒時乘

耳聾之法 喘然大段不過清上鎮下二條案中方極穩當至於外治之法及虛寒等症則不可不知也

風溫 某風溫上鬱目赤脈左弦當用辛以散之桑葉 夏枯草 連翹 草決明 赤芍
燥熱 某三失血後復受燥熱左目赤痛當以辛涼清之

鮮菊葉 冬桑葉 生甘草 赤苓皮 萊豆皮 櫓豆皮
鮑氏秋風化燥上焦受邪目赤珠痛 山梔 夏枯草 青菊葉 苦丁茶 桑皮
連翹 薄荷 黃芩

暑溼 席用淡滲漸安是暑入氣阻熱蒸溼鬱勿取大辛大苦之開池做清邪中上治法
冬桑葉 設精草 望月砂 苡仁 川通草 萊豆皮 茯苓

大火 顧四頭額悶脹目赤羚羊角 夏枯草 草決明 山梔皮 連翹 生香附
上鬱 戒飲濁減十四略可如穀近日竟夕無寐目珠赤痛陽井不交於陰暫停妙香散 此症宜養血

陸樞 鬱勃氣火翳遮目睛高年苦辛難進 桑葉 丹皮 夏枯草 黑山 川貝 苡仁

夏枯草 穀精草 草決明 望月砂 香附 連翹 山梔皮 丹皮
某頭面風腫。目起星。是氣中熱。

汪 羚羊角 夏枯草 薄荷梗 穀精草 生香附 小生地 丹皮 望月砂 連翹 山梔
脈左弦。左目赤痛。淚多。

王 桑葉 丹皮 草決明 小胡麻 夏枯草 穀精草 萊豆皮 黑檣豆皮
目痛偏左。翳膜紅綠。診脈左弦澇。由肝膽氣熱所致。

某十 肝火上升。目眶紅腫。連翹 赤芍 菊花葉 黑梔皮 苦丁茶 夏枯草
江 脈數右大。鬱久熟生。目障心痛。夏枯草花 小生香附 金石斛 半夏麩 茯苓 橘紅

王 高年目暗已久。血絡空虛。氣熱來其空隙。攻觸脈絡。液盡而痛。當夜而甚。乃熟氣由陰而上。想外科用酒
調末藥必係溫散攻堅。因此而痛。虛症可知。

葉 羚羊角 連翹心 夏枯草 青菊葉 全當歸 川桂枝 丹皮
微寒。汗大出。下有痔漏。左眼眶疼痛。此陰傷火鬱。不可作時邪泛治。

某三 右目多淚。背脹心嘈。雜陽明空虛。肝陽上擾使然。當調補肝胃。
六味去更加芍藥。荆子。丹皮。重用。

祝 四當夏形懶。不耐大氣發泄。入冬兩目無光。精氣無收藏。凡五臟精華。皆聚於目。失藏失聚。內之生真。不獨
一臟之損。當用養營焉。

某六 脈澇細。左目痛。淚熱翳膜。此肝陰內虧。厥陽上越所致。冬桑葉 炒枸杞 小胡麻
嫩黃芪 當歸 白芍 茯神 煨薑 南棗

肝陰 虛 營陰 虛 腎虛 肝風 陰虛 火鬱 脾肺 虛 絡 虛 熱 血 絡 虛 熱 脾 肺 虛 熱 絡 虛 熱

望月砂

製首烏

石決明

黃菊花

稽豆皮

某六目痛無光。製首烏

望月砂

刺蒺藜

冬桑葉

石決明

小胡麻

某皆脹目昏

心中嘈雜

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

石決明

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

茯苓

菊花

山藥

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

茯苓

菊花

山藥

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某六脈濇皆痛

右目當風多淚

當治肝腎

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

某二遺止心嘈目淚

仍是陽氣過動

當填陰和陽

熟地

桑椹子

沙苑子

茯苓

抄錄眼科
諸多識非
通套語以
批書之體

清邪
邪氣
邪氣
邪氣

為寒症。腫脹紅赤。眼珠刺痛。夜則尤甚。目不能開。而視物猶見者。為邪火熾盛。若白翳遮睛。珠不甚痛。或全不痛。目仍能開。而視物不見者。為真火不足。當細察其形。症色脈因。症而用藥。此內治之大法也。若日久失調。致血氣凝滯。火熱壅結。而為赤腫。腐爛翳膜遮蔽。致成外障。譬之鏡受污垢。必當濯磨。須用點藥。若但服藥。必不能愈。至於內障之症。但宜服藥。倘用點藥。徒傷其氣血。必無益而有損。更當知目皆白珠。屬陽。故書痛。點苦寒藥。則可致。腫子黑睛。屬陰。故夜痛。點苦寒藥。則反劇。是外治之治。亦當以陰陽區別也。若夫偏正頭風。屬氣虛痛者。朝重暮輕。血虛痛者。朝輕暮重。亦有外感內因之別。此症當以補養正氣為主。略兼治表。倘繁以風熱而論。專以表散。最易損目。更有肝陰虧耗。木火上炎。頭痛惡心。眉稜骨痛。不欲飲食。眼胞紅腫。暗珠刺痛。眵淚如膿。白睛如碇。目珠上竄不下。不得寤寐。甚至顛頂腦後。如破如裂。此內發之風也。夫肝屬木。木主風。熱盛化風。其體必本陰虧。男子或有遺精白濁。腸風痔漏。下血等疾。女子或犯淋帶崩漏諸症。此係陰傷陽升。內風沸起。大忌發散。宜用育陰熄風。柔肝滋腎等法。或可救十中之四五。凡羌活防風川芎細辛藁本升麻等藥。皆不可用。倘或失治。必致膏傷低陷。青黃牒出。致成痼疾。而不可救。專是科者。不可不留意焉。葉先生雖非眼科專科。觀其案內諸法。真補前賢之未備。較之慣用苦寒升散。及概用點藥者。不啻如霄壤之殊矣。學者當細心而參玩之。

眼科自有專家。其現症各有主治之方。案中雖未必切中。欲清淡和平。無苦寒溫補等。弊反勝于近日之名為眼科者。醫理苟明。則無不通矣。若欲深求。則有專門之書在。

鼻昇

鮑氏兩三年。鼻塞不聞。清涕由口噙出。而氣室仍然。大凡頭面諸竅。皆清陽交會通行之所。就外邪來乘。亦必霧露無質清邪。邪鬱既久。氣血失其流暢。進擊攻治。必不效驗。欲治其病。須查手太陰。自少商穴起。施鍼刺以泄邪流氣。乃一法也。無方

徐十頭面諸竅。皆清陽遊行之所。邪處於中。則為堵塞。陽氣不司流行。必畏寒形。頰內痺必鬱而成熱。有鼻柱軌阻矣。論理當用通聖散。遠處江外。倉猝就診。不可輕投。用輕可去實。

熱氣
肺氣
腦熱
鼻淵

精虛
鼻淵

此等方皆
有專治之
方大概以
清火驅風
保肺為治
子理無不
而藥不中
毀往住無
救所以醫
貴胸極群
書也

苦丁茶

乾荷葉邊

蔓荊子

連翹心

飛滑石

白芷

毛四熱壅肺氣失降鼻柱室痺

宜外治知母

水梨肉

川貝母

水煎膏

梅鹹降滋填鼻淵止得寐用虎潛法減當歸陳皮加天冬淡菜膠脊筋丸

沈氏素有痰火氣逆春令地中陽升木火化風上引巔頂腦熱由清竅以泄越耳鳴鼻淵甚於左者春應肝膽

氣火自左而升也宜清熱散鬱平涼達於頭而主治

羚羊角

黑山梔

苦丁茶

青菊葉

飛滑石 夏枯草花 又照方去滑石加乾荷葉生石膏

又性情燥急陽動太過氣火上升鬱於隧竅由春深加病失其調達之性輕言春氣病在頭也考五行六氣

迅速變化莫若火風腦熱暗泄而為鼻淵隧道失和結成癭核夫東垣升陽散火丹溪總治諸鬱咸取苦

辛為法然藥乃片時之效得能久安以怡悅心志為要旨耳

連翹心

土貝母

海藻

昆布

黑山梔

川芎

小生香附

鬱金

羚羊角

夏枯草

乾荷葉邊

生研末青菊葉汁法凡苦丁茶煎湯送二錢五分

汪形瘦尖長粟乎木火陰精不足腦髓不固鼻淵淋下並不腥穢暖天稍止遇冷更甚其為虛證顯然明白

醫者愈以風寒中腦主治發散滲泄愈耗正氣豈但欲愈勞怯是憂用天真丸

人參

黃芪

白木

山藥

茯苓

當歸

天冬

羊肉

經云肺和則鼻能知香臭矣又云膽移熱於腦令人辛頰鼻淵傳為衄衄瞑目是知初感風寒之邪久則

化熱熱鬱則氣痺而塞矣治法利於開上宣鬱如蒼耳散防風通聖散川芎茶調散菊花茶調散等類先

生則佐以荷葉邊苦丁茶蔓荊連翹之屬以治之此外感宜辛散也內熱宜清涼者如腦熱鼻淵用羚羊

山梔石膏滑石夏枯草青菊葉苦丁茶等類苦辛涼散鬱之法也久則當用鹹降滋填如虎潛減辛再加

鎮攝之品其有精氣不足腦髓不固淋下無腥穢之氣者此勞怯根萌以天真丸主之此就案中大概而

喉腫

氣分熱毒

陰虛火夫

楊 未病陰氣走泄為虛。搗上受則實。咽喉腫痛。上氣邪蒙。日暮昏燒。陰傷日熾。肌肉赤白。氣分不虛。此醫藥雖宜涼解清上。但不可犯及中下。

連翹 鬱金 馬勃 牛蒡子 竹葉心 黑山桅 杏仁 橘紅

又上焦之病。都是氣分。氣室則上下不通。而中宮遂脹。熱氣蒸灼。喉舌疳蝕。清氣之中。必佐解毒。皆受重藥之暴。瘁

銀花錢 川貝錢 馬兜鈴分 連翹心錢 川通草錢 白金汁杯 法水蘆根汁杯

又餘熱蒸痰壅氣當脫膈。因咳而痛。議以潤降清肅。甜杏仁 花粉 川貝 甘草 桔梗

孫四腎液不收。肝陽上越。顛脹流涕。咽喉微痛。六味加牛膝。專前五味

伍四咽喉痛。發時知有物阻隔。甚至痛連心下。每晚加劇。是陰液日枯。肝臟厥陽化火。風上灼。法以柔劑。微

甘以緩其急耳。此症必喉中有細瘰成不。但氣分室痺非藥無功。

細生地 天冬 阿膠 生雞子黃 元參心 糯稻根鬚

陳三陰陽交虛。營衛欹斜。為忽冷忽熱。周身骸骨皆痛。百脈皆損。秋奉天氣已降。身中氣反泄越。汗出喉瘡。陽

不入於陰。致自為動搏耳。夫咽喉之患。久則喉痺喉宣。妨阻受納。最不易治。從少陰咽痛例。用猪膚湯。旬日

喉痛得緩。對症轉方。李啟府非服藥所能治。

張三陰損三年不復。入夏咽喉拒納。寒涼清咽。反加泄瀉。則知龍相上騰。若雷光火灼。雖傾盆暴雨。不能撲滅。

必身中陰陽協和方息。此草木無情難效耳。從仲景少陰咽痛。用猪膚湯。主之。

又陰涸於下。陽熾於上。為少陰喉痛。乃損法之末傳矣。用猪膚甘涼益坎。有情之屬而效。今肉腠消燥殆盡。

下焦易冷。髓空極矣。治病無有不兼顧者。何暇以痰救為理。議滑瀉之補。味鹹入腎可也。

牛骨髓兩 羊骨髓兩 猪骨髓兩 麋角膠兩 用建連肉五兩 山藥五兩 芡實二兩 同搗丸

金四臟液不充。陽氣虛風鼓動。病起喉辣心震。頻頻舉發。多因勞怒。用內經甘緩一法。

人參 芡肉炭 白芍 炙甘草 茯神 小麥 又復脈湯去桂

內經云。一陰一陽結謂之喉痺。一陰者。手少陰君火。心之脈氣也。一陽者。手少陽相火。三焦之脈氣也。夫二經之脈并絡於喉。故氣熱則內結。結甚則腫脹。脹甚則痺。痺甚則不通而死矣。即今之所謂喉痺喉風喉蛾等類是也。夫推原十二經。惟足太陽別下項其餘皆湊咽喉。然內經獨言一陰一陽結為喉痺者。何也。蓋以君相二火獨勝則熱且痛也。愚歷攷咽喉湯方。皆用辛散鹹軟。去風疫解熱毒為主。如元參升麻湯。聖濟透關散。及玉鑰匙。如聖散。普濟消毒飲子。皆急於治標。而緩於治本。恐緩則傷人。故以治標為急耳。又嘗考仲景傷寒論。咽喉生瘡等症。每用甘草桔梗半夏散。及湯為主。一為少陰水虧不能上濟君火。以致咽喉生瘡。不能出聲。故以半夏之辛滑。佐雞子清利竅通聲。使以苦酒入陰。劫涎斂瘡。桂枝解肌。由經脈而出肌表。悉從太陽開發。而半夏治咽喉。可無燥津涸液之患。一為陰火上結。而為咽痛。故用生甘草甘涼泄熱。功在緩腎急。而救陰液。佐以桔梗開提。足少陰之熱邪。如腎液下泄。不能上蒸於肺。致絡燥而為咽痛者。仲景又有猪膚一法。潤燥解熱。緩中。使其陰陽協和。而後愈。是固本而兼治標者也。如風火上鬱。陰虧脈數。而為咽痛者。先生又有辛涼清上諸法。如咽喉緊痺。氣熱而為咽痛者。又有清肺中氣熱一法。如情志鬱勃。相火上炎。而為咽痛者。則又有降氣開濁一法。如腎液不收。肝陽上越。而為咽痛者。宗錢氏六味湯。如陰陽交虛。龍相上灼。而為咽痛者。宗仲景猪膚湯法。鄙滋丸。

瘡瘍

楊九瘡癩四肢偏多。長夏入秋。懶倦欲眠。乾咳無痰。頗知味所納已少。此陽明胃陰。因熱致耗。即熱傷元氣之徵。當與甘藥養胃陰。以供肺。如金匱麥門冬湯。去半夏。加黃芪皮。

吳十脈不浮。大來關外。風切起右掌二指。已不屈伸。頭面身半以上。常有瘡泡之形。此乃陽明脈絡內留溼熱。

若非厲氣吸入。定然食物中毒。括與宣解緩攻。

連翹 犀角 赤芍 酒煨大黃 荊芥 片薑黃

又能食。二便通調。臟腑無病。初因膿瘡。瘡愈有泡。自面及肢體。至於右指掌。屈伸皆痛。為脈絡留邪。以致隧

道為壅。前方辛涼入血。先升後降。已得小效。今製清脈絡。壅熱藉酒力以引導。通後營衛。亦一法也。

銀花 連翹 犀角 生大黃 荊芥 丹皮 黃芩 川芎 當歸 澤蘭

羚羊角 大豆黃卷 用無灰酒十觔浸

金四血含空隙。內風蠕動。外以熱湯泡洗。溼熱蒸襲肌竅。遂有裂膿流水。況周身漸加麻痺。陽脈亦衰。圖治之

法。清營以熄內風。疎利溼熱。以肅隧道。辛辣腥鮮勿進。尚可緩以計功。

製首烏 鮮生地 柏子仁 川斛 黑檀豆皮 虎骨 蠶沙 黃柏 草薢 熬膏

吳 瘡癢之後。溼熱未去。壅阻隧道。水穀下咽。亦化為痰。中焦受病。故不知飢餓。痰氣上干。漸至喘悶矣。但服

藥四十劑。純是破氣消疔。胃陽受傷。痰氣愈不得去矣。半夏 茯苓 紫老薑 炒粳米

又 瘡癢大發。營衛行動於脈中。脈外可免。腹滿之累矣。第穀食尚未安適。猶是苦劣多進之故。胃陽未復。仍

以通調利溼主之。半夏 故仁 金石 茯苓 澤瀉

秦以久熱瘡癢五六年。環口燥裂。溺瀆並痛。

鮮生地 熟首烏 丹皮 丹參 羌蔚子 銀花 地丁 紫草 共熬膏

王 血熱風動膚癢。荊芥 防風 地膚子 赤芍 銀花 小生地 木通 甘草

張三初因嘔吐。是肝胃不和致病。故辛香剛燥愈劇。然久病必入血絡。熱則久瘡不愈。夫木火皆令燥。液易

飢易飽。間有嘔逆。斯胃病仍在。凡呆滯藥味皆非對症。

三角胡麻 冬桑葉 生首烏 杏仁 鬱金 佩蘭葉 茯苓 汶仁 熬自然膏

楊五身瘦久瘡。血分有熱。精通之年。最宜安養。脈象非有病。生首烏 兩 三角胡麻 一兩五錢 搗碎水洗

細生地四兩 地骨皮二兩

金銀花二兩 丹皮二兩

生白芍二兩

生甘草一兩

蜜丸早服

王九脈來滯浮久瘡變幻未罷是衛陽疎豁不耐寒暄初受客邪不解混處氣血浸淫僅在陽分肌腠之患議

升舉一法氣壯斯風溼盡驅

人參

生黃芪

川芎

當歸

防風

僵蠶

蟬蛻

炙草

生薑

大棗

蔕四鼻瘡口瘡尿黃膚熱

冬瓜皮

連翹

赤芍

白蠶

白鮮皮

防風

升麻

滑石

酒浸大黃

鄒四痰因於溼久而變熱壅於經隧變現瘡疾疥癬已釀風溼之毒混在氣血之中邪正混處搜逐難驅四肢

為甚姑從陽明升降法

連翹

赤芍

白蠶

白鮮皮

防風

升麻

滑石

酒浸大黃

汪氏風熱既久未解化成瘡癩當以和血驅風

當歸

赤芍

川芎

夏枯草花

牛蒡子

製僵蠶

金頭巔熱癩未能泄邪此身熱皆成膿之象辛涼兼理氣血可愈

連翹

犀角

銀花

丹皮

元參

生甘草

青菊葉

某風熱毒閉項後腫

竹葉

滑石

蘆根

牛蒡

馬勃

薄荷葉

黑山梔

連翹

川貝

生甘草

王疔毒略血失血都是暑入陰傷

竹葉心

元參心

鮮生地

黑稽豆皮

夾冬

知母

當用解毒

護心丹丸

屠四秋痢半年未愈瘰癧堅硬痛癢膿鬱久成熟腑經病可冀其愈

夏枯草

香附

茯苓

苡仁

川貝

丹皮

澤瀉

茯苓

糜氏頸項結核脹膨足腫肝木犯中痰氣凝滯

半夏

厚樸

橘紅

神麩

生香附

一兩水磨汁泛丸

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

某氣鬱痰核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

瘰癧核

夏枯草

生香附

丹皮

山梔

連翹

鬱金

赤芍

橘紅

生鉤藤

乳

黑山梳雨 土貝母雨 生薄荷錢
陳躁急善怒。氣火結。癭。燥筋為痛。熱鬱化風。氣阻痺塞。則腹鳴腕脹。尚非開懷歡暢。不能向安。

沈凡肝氣鬱遏宿痞乳癰

川棟子

夏枯草

薄荷梗

丹皮

黑山梳

瓜蒞實

青橘葉

香附汁

劉凡乳房為少陽脈絡經行之所。此經血氣皆少。由情懷失暢。而氣血鬱痺。有形而痛。當治在絡。恐年歲日加。

竟成沈痼乳若之北也非離膿之症。以脈不浮數。在寒熱辨之。

柴胡不主痼之方

夏枯草

歸身

白芍

川貝

茯苓

甘草

某凡乳房結核。是少陽之結。此經絡氣血皆薄。攻之非易。恐產育有年。釀為瘍症耳。

青蒿不中病

香附

橘葉

青荊葉

丹皮

澤蘭

鬱金

當歸鬚

流注

孫因噴忿失血以來。致頸項左右筋腫痛連背部。此屬鬱傷氣血。經脈流行失司。已經百日不痊。竟有流注潰膿延綿之憂。治在少陽陽明。

小生香

夏枯草

鮮荊葉

薄荷梗

黑山梳

鈎藤

丹皮

鬱金

暑瘍

陳脈左數實。血絡有熱。暑風溼氣外加。遂發疹塊。壅腫搔癢。是屬暑瘍。

杏仁

連翹

滑石

寒水石

銀花

晚蠶沙

黃柏

防己

程瘍毒熱症。與參芪不效。即當清解。為是消導。亦是未合。今者身熱正晡。神識欲昏。便溇溺亦煩渴。是暑氣攻入內侵脾胃。有煙厥之變。昨用宣肺解毒。雖與暑邪無益。然亦無害。若加黃芪。又屬相反。大凡熱氣蒙閉。

清竅都令神昏。當以牛黃清心丸清痰氣之阻。使其竅開。況暑門中。大有是法。與解毒勿悖矣。

季四六初病溼熱在經。久則痰熱入絡。膿瘍日多。未已。漸至筋骨熱痛。金匱云。經熱則痺。絡熱則痲。數年宿病。勿

事速攻。

瘍

犀角 連翹心 元參 丹參 野赤豆皮 細生地 薑黃 桑枝 午服 夜服 莢藜丸
某三瘡瘍服涼藥陽傷氣阻悶不運腹膨最怕傷毒內閉急宜通陽

厚樸 廣皮 薑皮 茯苓皮 連皮杏仁 桂枝木 澤瀉 大腹皮

某 服瘍科寒凝之藥以致氣冲作脹喘急不卧無非濁陰上攻議求復丹

潰瘍

顧八脈微小潰瘍半月餘腫未消膿水清稀浮腫汗出嘔惡惡食此胃陽垂敗癰毒內攻欲脫夫陽失則則陰液不承元氣散則毒愈瀰漫清解若寒究竟斷伐生陽議甘溫胃受培植其本莫險者復振余非瘍醫按色

脈以推其理耳 加桂理中湯 非瘍科方大辨

挑拒潰瘍久不癒氣血耗盡中宮營液枯涸氣不旋轉得湯飲則痰涎上湧勢如壺膈沉久恙若是藥餌難挽

勉擬方 人參 炒麥冬 代赭石 化橘紅

胡 納食主胃運化主脾癰瘍痛潰臥床不得舒展臟腑氣機呆鈍何疑外科守定成方茂術歸地不能補托

氣血反雍滯於裏出納之權交失且是症乃水穀溼氣下垂而致結於足厥陰手陽明之界若溼熱不為盡

驅藉補托以冀生機養賊貽害馬能濟事

金石斛 槐米 金銀花 茯苓 晚蘇沙 寒水石

徐 營傷心竅納食無味此傷痛大虛當調其中

人參 歸身 炒白芍 木瓜 熟術 廣皮 茯神 炙草

某 膿血去多痛猶未息胃傷不嗜穀口無味左關尺細弱無力正虛之著據理進藥仍宜補托

人參 熟地 玉竹 相子仁 歸身 丹參 茯神 藜仁 遠志

某 瘍潰膿血去多元真大耗脈無力不嗜食惡心中州不振寐則驚惕神不守也以養營法

人參 熟術 廣皮 茯神 炙草 歸身 白芍 五味 藜仁

某八瘡瘻能食身熱六味湯加青蒿節

論極正
但方不其
切以此非
也傷科之故

曹三因瘍漏過進寒涼遂患腰痛牽引脊脊今晨起周身不得自如乃經脈絡脈之中氣血流行失暢為病該非攻逐議兩和方法 羚羊角 當歸 黃芪 白蒺藜

顧潰瘍不合成漏脂液滲去必腸絡空隙內風暗動攻胃則嘔逆奔酸腹痛泄瀉不食津液不升古焦黑不

渴飲內外兼病難治之症 人參同煎 炒烏梅肉五分 炒黑川椒分三 茯苓錢三 生淡薑分五 炒廣皮錢 白芍錢

顧久損漏瘍胃減腹痛議用戊己湯意 人參 茯苓 白芍 炙草 炒菟絲子

王四痛久屈伸不得自如經脈絡脈呆鈍氣痺血瘀鬱蒸上熱旬日頻頻大便必有血下復喘促煩燥不飢不

食並無寒熱汗出全是錮結在裏欲作內癱之象部位臍左之上內應乎肝癱者壅也血結必入於絡吐痰

口氣皆臭內癱已見一斑矣 此是腸癱 炒桃仁 新絳 降香末 野鬱金汁 紫苑 冬瓜子 金銀花

腸癱 某 臍旁紫黑先厥後熱小腹痛如刀刮二便皆瀉兩足筋縮有腸癱之慮 老韭白方不切腸癱 兩頭尖 小茴香 當歸鬚 茨山甲

某 舌焦黃小腹堅滿小便不利兩足皆痠溼熱結聚六腑不通有腸癱之慮 川棟子 小茴 丹皮 黑山梔 通草 青葱

某 壯熱旬日周身筋脈牽掣小腹堅硬小便淋漓忽冷忽熱欲釀膿血乃腸癱為病做孫真人牡丹皮大黃

湯主之 戴九痔瘡下血溼熱居多今色衰微顯是虛寒無速效法則當補脾胃因痔瘡猶痛腫勢尚存佐以淡滲通明

生於木 生菟絲粉 生象牙末 生白蠟 何氏膏

外症本有專科先生並非瘍醫然觀其總理立方已勝專科什伯矣惜其案無多法亦未備余不敏迷大

凡瘍症雖發於表而病根則在於裏能明陰陽虛實寒熱經絡俞穴大症化小小症化無善於消散者此

增 龍文書局校印

瘡瘍 詞經

卷六

龍文書局校印

愈後必當火消
毒清火刀
為合度平
中頭因非
專家則終
無把握早

厥數者不
宜用桂枝
腹中為設
腹近而設
仲是有明

補血言才

經血

後期
傷久
氣虛

肝犯

肝脾

為上工。其次能審明五善七惡。循理用藥。其刀鍼砭割。手法靈活。敷貼薰洗。悉遵古方。雖潰易斂。此為中工。更有不察症之陰陽虛實。及因鬱則營衛不和。致氣血凝滯。釀成瘍症。但知概用苦寒攻逐。名為清火消毒。實在敗胃戕生。迨至胃氣一敗。則變症蜂起矣。又有藉稱以毒攻毒秘方。類取毒藥合就丹丸。隨症亂投。希冀取效於目前。不顧貽禍於後日。及問其經絡部位。症之順逆。概屬茫然。此殆下工之不如也。至於外治之法。瘍科尤當究心。若其人好學深思。博聞廣記。隨在留心。一有所聞。即筆之於書。更能廣博醫籍。搜採古法。海上實有單方。家傳。豈無神機。其所製敷貼丹膏。俱臨症。歷試百治。百驗。能隨手應效者。即上工過之。亦當為之遜一籌矣。華玉堂

功理雖同而法各別如欲治外症不可不另有一番功夫也

張二經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎 當歸 肉桂 生艾 小茴 茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

姚二 久嗽背寒晨汗右卧咳甚經事日遲服如數而虛設減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草 南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則咳此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日遲不但氣血不流行血枯肝閉可想而知脈數虛火也虛則不可以清寒况設減不欲食中氣之緩已甚可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣而桂枝白芍非欲陰和血之妙品乎

秦二 氣衝心痛嘔涎氣逆少腹為滿經來後期其色或淡或紫病在衝脈從厥陰陽明兩治
川連 川棟子 歸尾 炒半夏 茯苓 桂枝 橘紅

華二 鬱傷肝脾是因懷抱不暢致氣血不和道遂散滅白朮加山查香附不欲其守中務在宣通氣血耳今經

補人全以
血為主治
法亦當以
血為事
處用茶
胡而近日
自附天士
之門者云
天士終身
不用柴胡
豈非藥境

血熱
帶脈
奇脈
虛寒

肝腎
虛寒

本日過勞痺宜通而氣弱不主統血况春深泄氣之候必佐益氣之屬方為合法 歸脾湯
又 向有鬱傷肝脾用逍遙散歸脾湯甚合今因動怒少腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此
皆肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動極之徵為肝用太過宜制其用前此茯苓木守補不
可用矣 安胃理中丸去黃柏細辛 此當兼用血藥

錢 脈瀆腕間減食經水來遲腹痛墜 柴胡 灼白芍 黃芩 鬱金 香附 茯苓 蘇梗 神麩

又 諸恙未減腹但痛不墜 逍遙散 白朮甘草加鬱金香附神麩

許 十經閉寒熱便瀉腹痛 加味道遙散去山梔

某 血虛內熱經不至 加味道遙散去木 涼膈去芒硝加丹皮赤芍
某 經遲腹痛風疹絡血不瀉久鬱成熱法當通利 歸建中湯

孫 九奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治法 歸建中湯
又 久嗽過勞寒熱 歸建中去薑
謝 三能食不運癍泄經事愆期少腹中乾澀而痛下焦麻痺衝心嘔逆腹鳴心辨八脈奇經交病

人參 茯苓 艾葉 製香附 淡茯苓 淡骨脂 肉桂 當歸 鹿角霜
小茴香 紫石英 益母膏丸

王 三脈右緩左瀆經水色淡後期嘔吐痰水食物畢咽三載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰
立方 半夏 廣皮 茯苓 厚朴 茅朮 淡吳萸 小香附 山查肉 薑汁法丸

又 三月中用辛溫宣鬱方痰痰自下胸次寬嘔逆緩今喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用
溫養衝任栽培生氣方法 八珍去朮地加小茴肉桂斬艾香附紫石英河車膠丸

朱 六經水一月兩到或幾月不來五年來孕不育下焦肢體常冷是衝任脈攝無有貯蓄煖益腎肝主之
人參 河車膠 熟地 砂仁製 歸身 白芍 川芎 香附 茯神 肉桂

此書理明詞達

此書海味也體機其常不遂入藉劑中欲常不遂入藉劑中欲

衝脈

肝脈

陰虛

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

程七十二年不孕育其中幻病非一病人迷經期遲至來期預先三日周身筋骨脈絡壅塞髮楚不得舒展凡

女人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脈也男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈痛也腹為

陰陰虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛損或見病治病之誤有終身不孕淹淹之累肝

血陰虛木火內寄古人溫養下焦必左涼肝堅陰勿執經後期為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

河津膠生地 枸杞 沙苑 生杜仲 白薇 山查 黃柏 白花益母草

朱經云陽維為病苦寒熱厥上年冰雪甚少失其藏春半湖溼地氣升池以肝腎血液久虧之質生力

淺入脈線子肝腎一身網維八脈之束固之司陰弱內熱陽微外寒矣脊脊常痛經事愆期血海漸涸久延

虛怯情景已露局方道遠散固女科聖藥大意重在肝脾二經因鬱致損木土交傷氣血痺阻和氣血之中

佐柴胡微升以引少陽生氣上中二焦之鬱勃可使條暢今則入暮病劇天曉安然顯是肝腎至陰陽傷八

脈不為約束故熱無汗至陰深遠古人謂陰病不得有汗也當宗仲景甘藥之例勿取氣辛助陽可定

此方無著 炙甘草 何膠 細生地 生白芍 麥冬 牡蠣 無汗不得用此

某陰虧內熱經事愆期 雄烏骨雞 小生地 阿膠 白芍 枸杞 天冬 茯苓 羌蔚子

女貞子 桂圓 右十味用青蒿汁童便醱酒熬膏加蜜丸

張三寒熱間日經來腹痛 小生地 丹皮 知母 花粉 生龍甲 澤蘭

某十二先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病與下焦痼泄則異

川芎 當歸 香附 煨廣木香 魚肉 茯苓 歸身 澤蘭 丹參 白芍 柏子仁 茯神 此方無著

某二寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢逆食物不思此鬱傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯

周七室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日為重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴忽瀉

忽結死脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而奇經衝任踰維脈皆肝胃屬臟脈不循序流行氣血日加阻痺失治必結癥聚疔瘡之累 南山查 生香附 延胡 當歸 青皮

三棗 蓬朮 牛膝 川棟子 澤蘭 肉桂 炒小茴 葱白汁
顧 經來筋掣腹痛常有心痛乾嘔此肝氣厥逆衝任皆病務在宣通氣血以調經溫燥忌用自可得效

川棟子 丹皮 炒查 胡連 延胡 澤蘭 歸鬚 生白芍
又 柏子仁丸 此衝任脈有寒 川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗

吳 鬱傷絡脈痛經 此衝任脈有寒 川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗
費 經水紫黑來時嘈雜脈絡收引而痛經過帶下不斷形瘦日減脈來右大左弱上部火升下焦冷徹骨中

陰陽乖違為得孕育閱醫都以補血瀆劑宜乎鮮效議通陽攝陰法 宜用溫經法
鮑魚 別有經用此 生地 淡從蓉 天冬 當歸 柏子仁

朱 脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性躁氣分有熱 炒山查 牛膝 茯苓 紅棗 新艾湯法丸

朱 細子 芍 白芍 黑山梔 鈎藤 茯苓 當歸鬚 香附 羌蔚子 桑枝
孝 酸澆入裏氣血呆鈍痛自心胸脹及少腹昔經行三日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經道

意以平勝酸主治但早氣最易入表當求其宣路者宜之
韭白汁 桃仁 延胡 小茴 當歸鬚 川棟子

王 苦辛泄降胸腕脹悶已舒此救血皆肝膽氣火上逆必經來可安

南山查 桃仁 黑山梔 丹皮 橘葉 降香末 老韭白汁

朱 當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔膩滯當停以理胃陽為務

經閉 木火 鬱熱 胃陽 虛

食酸 滯氣 熱 氣分

熱 氣分

脾胃陽虛

胃陽不運

濕滯腹痛

氣滯濕脹

人參 半夏麴 廣皮白 茯苓 生益智仁 煨薑 見寒症方可用
某脈數形疲咳經閉半年已經食減使溏浮腫無清嗽通經之理扶持中土望其加穀

四君子湯 效者小宜
某六經閉兩月腕痺嘔惡此氣室不宣胃陽礙鈍使然當用和中為主

半夏麴 老蘇梗 茯苓 廣皮 枳殼 川斛
某夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣血不和兼有時令濕邪

又 茯苓皮 大腹皮 生益智 厚朴 蓬莖朮 青皮子 炒研
服五劑後氣已略平 葱白丸 用生薑艾分 紅棗十五枚 煎清湯送

某 茯苓皮 大腹皮 青皮 小香附 延胡 炒山查 羌蔚子 炒砂仁
脈數經閉腹脹足腫 此為水病名為血分

而後腫脹者治者血分 失血是病名
顧 經停四月腹滿尻脾足肢盡腫食納脹悶不化大便溏瀉不實女料認為胎氣恐未必然方書謂先經斷

傳 生白朮 厚朴 大腹皮 羌蔚子 椒目 小黑稽豆皮
大凡痞滿在氣燥實在血腹脹經水仍來大便微溏固是氣分病也下之暫愈氣得泄也繼而腹脹經水

不來氣與血俱病也病非輕渺議中滿分消方法
生於朮 猪苓 澤瀉 椒目 雞內金 青皮汁 厚朴
鄒十腰已下腫經閉四月腹痛瀉不爽議開太陽導其氣阻水濕

何 牡蠣 澤瀉 猪苓 生白朮 防己 厚朴 椒目
經阻腹滿瀉後變痢 小温中丸
王三居經三月痞悶膨脹無任脈發現詢知勞碌致病必屬脾胃陽傷中氣愈餒衝脈之血眩注洵有諸矣

氣血

氣滯
血滯

大腹皮

半夏麩

老蘇梗

橘紅

炒山查

羌蔚子

又經停腹滿便秘。

都李仁

冬葵子

柏子仁

當歸鬚

鮮杜牛膝

王材服阿魏丸高突已平痛未全止經閉已有十餘月腹微膨全屬氣血凝滯若不經通病何以去

川芎

當歸

延胡

桃仁

查肉

香附

青皮

牛膝

益母膏丸

石二入肝必麻木諸厥皆厥陰心痛便燥氣痺血枯乃勞怒情志不遂起見

桃仁

當歸鬚

炒延胡

生香附

羌蔚子

南山查

又辛潤氣藥病減血虛氣滯當以調經為要見病理病為非

桃仁

當歸

山查

羌蔚子

澤蘭

柏子仁

某二心下有形不飢經水澆少漸閉由氣滯漸至血結左右隧道不行大便堅秘不爽當與通路

炒桃仁

炒五靈脂

延胡

蘇梗

生香附

木香汁

半夏

薑汁

血蠱

姚經閉一年腹漸大恐延血蠱沉疴况聚日久形寒跗腫議用大針砂丸每服一錢二分六服

桂枝

茯苓

澤瀉

牡蠣

金鈴子

延胡

吳仁經阻兩載少腹堅硬大便不爽不時咯出紫血塊此屬血蠱之象

鮮生地汁

熟大黃

澤桂心

老生薑渣

炒桃仁

都李仁

四服

某經閉腹脹漸成蠱香附木香青皮烏藥赤芍五靈脂延胡當歸鬱金

王仁脈右虛左虛弦數腹痛兩月胸痺咽阻冷汗周身刺痛寒慄此屬內損有經閉成勞之事

桂枝湯加茯苓

又照前方加當歸

膩燥

又內損情懷少暢非偏寒偏熱可以攻病方中溫養氣血以使條達非因寒投熱之謂開懷安養為宜勿徒恃藥繼此可進養營法歸桂枝去薑加茯苓

鬱損
營陰

潘二經水不來少腹刺痛鳴脹大便不爽心中熱痛食辛辣及酒其病更甚不敢通經與甘緩

甘麥大棗湯

某陽升風動助暈心悸鼻衄經停兩月

生地 阿膠 白芍 柏子仁 棗仁 茯神 炙草

顧心病起經阻形容日瘦嘈雜刻飢心腹常熱此乃悲悅離愁內損而勞成陰臟受傷陽脈不流難治之症必

得怡悅情懷經來可挽但通經敗血斷不可用 生地 人參 茯苓 沉香汁 琥珀末 調入

陳 自阻經寒熱延及浮腫腹膨小溲日少入暮心腹中熱此臟陰已涸腑陽日痺內因悒鬱成勞情志為病

當收肅司令而病日加增料難入冬無成法可遵勉擬回生丹每次服半丸冀通其壅痺氣血漫言治病也

徐二經水久不來寒熱喉痛痺鬱難取效 清阿膠丸 雞子湯送

董 脈數色奪久嗽經閉寒從背起熱過無汗此非瘧邪由于陰陽並損營衛循行失其常度經云陽維為病

苦寒熱矣症屬血痺成勞為難治痺阻氣分務宜宣通 生鹿角 川桂枝木 當歸 茯苓 炙草 薑 棗 另回生丹二服

仲二先因經阻繼以五心煩熱咳吐涎沫食減微嘔面腫色痒乃肝陽化風旋動不息乾血勞病醫治無益

阿膠 生地 麥冬 牡蠣 小麥

王 面色晄白脈來細促久嗽不已減食腹痛便澹經閉半載此三焦臟真皆損乾血勞怯之病極難調治俗

醫見嗽見熱多投清肺寒涼生氣斷盡何以挽回 歸建中湯去薑

尼七少年形色衰奪側眠咳血天柱骨垂經水已閉皆不治見症 歸建中湯去薑

某 脈弱無力發熱汗出久咳形冷減食過半顯然內損成勞大忌寒涼清熱治嗽姑與建中法冀行加殺經

行猶可調攝 桂枝分五 生白芍錢 炙草分五 棗肉錢三 飴糖錢 歸身洋錢

凡屬此症皆為肺家虛勞用建中湯及火氣不宜此光

陰虛 風動 營勞 陰虛 血痺 成勞 肝乾 動勞 血虛 乾勞 勞虛

不... 因以不相... 此時... 心也

與男子同... 治經帶之疾

婦人之疾... 任治衝任... 養血全古... 人立方無... 不以為藥... 中大便亦... 養血為先... 而未說益... 未得化料... 也

倒經

益母丸早晚服二三錢
某營虛寒熱咳血經閉 當歸 炒白芍 丹參 棗仁 遠志 茯苓 炙草 廣皮 桂圓肉
顧三潮熱經阻脈來弦數營血被寒熱交蒸斷其流行之機即為乾血勞瘵非小恙也

朱女冲年天癸未至春陽升動寒熱血平昔溺後腰痛耳目甚聰明先天質薄陰本難充易虧最多倒經之
慮 雄烏骨雞 生地 生白芍 茯神 天冬 知母 牛膝 羌蔚子 女貞子 阿膠
桂枝 白芍 阿膠 生地 炙草 麥冬 大杏仁

張 再入前藥汁收膏入阿膠收燉煖服五錢
十七歲天癸不至咳救失血乃倒經重症先以順氣導血
降香末 鬱金 鈎藤 丹皮 蘇子 炒山查 黑山柅

又 震動氣衝咳嗆失血 雞子黃 阿膠 鮮生地 天冬 生白芍 炒牛膝
又 脈細數腹痛管熱經不通 人參 天冬 鮮生地 白芍 丹參 調入琥珀末三分

易曰乾道成男坤道成女女子屬陰以血為主故女科治法首重調經經常也如潮汐之有信如月之盈虧不愆其期故曰經水又曰月事又曰月信內經云太衝脈盛月事以時下景岳云衝為五臟六腑之海臟腑之血皆歸衝脈可見衝脈為月經之本也然血氣之化由於水穀水穀所化而陽明胃氣又為衝脈之本也故氣亦衰是水穀之海又在陽明可見衝脈之血又總由陽明水穀所化而陽明胃氣又為衝脈之本也故月經之本所重在衝脈所重在胃氣所重在心脾生化之源耳心主血脾統血肝藏血凡傷心傷脾傷肝者均能為經脈之病內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲女子不月其傳為風消其傳為息責者死不
治不得隱曲言情欲不遂而病發心脾也風消者發熱消瘦胃主飢肉也息責者喘息上奔胃氣上逆也此雖言病發心脾而實重在胃氣因心為胃之母胃為脾之腑也內經又曰有病胸脇支滿者妨於食病

增... 經... 帶... 卷...

至則先聞腥臊臭。出清液。先唾血。四肢清。目眩。時時前後血。病名血枯。此得之年少時。有所大脫血。若醉入房中。氣竭肝傷。故月事衰少不來也。治之以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之。凡以雀卵大如小豆。以五丸為後飯。飲以鮑魚汁。利腸中。及傷肝也。此段經文。全重在氣竭肝傷四字。為通節之綱旨。胸膈肝部也。夫滿肝病也。妨於食。木邪凌土也。病則先聞腥臊臭。脾喜芳香。今脾土為木邪凌虐。病則先聞腥臊乃肝之旺氣也。出清液。脾虛不能敷化水精也。先唾血。脾傷不能統運營血也。四肢清。陽衰不能傍達四末也。目眩。陽不充。而水上溢於經也。前後血。陰受傷而血內溢於絡也。血枯。內有乾血。血不歸經。而結胞門也。良由年少不禁。氣竭肝傷。而致月事衰少。或不來也。治以烏鯁骨四分。取其味鹹走腎。性溫達肝。配以蘆茹一分。取其辛散內風。溫去惡血。一物并合。功專破宿生新。凡以雀卵。取其溫補助陽。能調子臟精血。以五丸為後飯者。先藥後飯。使藥徐行下焦。力貴專功。五丸不為少也。飲以鮑魚汁。利腸垢。和肝傷。取其臭穢之味。佐烏鯁骨。而辟宿積之血也。金匱要略言。調經之法甚詳。後世如黃節齋。薛立齋。諸賢論症透徹。用方精切。俱可為程式。茲不具贅。今觀葉先生案。奇經八脈。固屬扼要。其次最重調肝。因女子以肝為先天。陰性凝結。易於拂鬱。鬱則氣滯。血亦滯。木病必妨土。故次重脾胃。餘則血虛者養之。血熱者涼之。血瘀者通之。氣滯者疎之。氣弱者補之。其不治之症。直言以告之。誠一代之良工。文科之明鑑。學者當奉為典型。更能參考內經。仲景及諸賢案論。自然學業日進。登峯造極矣。秦天一

淋帶

溫邪 傷陰 胃虛 某 某

溫邪劫陰。帶下。火升胸痞。脈小數。生地 阿膠 牡蠣 川斛 小麥 茯苓
 陽明脈虛。手足冷。身動帶下。如注。用通攝方。

人參 桂枝木 桑蝶蛸 生杜仲 歸身 茯苓

胸中似冷。熱飲乃爽。照前方法。去杜仲。加白芍炮薑。

苦堅陰。生白芍。細生地。清阿膠。牡蠣。檫椒皮。黃柏。

入烏骨雞。生地。阿膠。牡蠣。天冬。白芍。白薇。杜仲。川斷。湖蓮。

將帶下不止。少腹內。蹀連痛。至不能伸縮。絡脈不宣。最有結癰綿纏。不可不慮。醫云。肝氣豈有是理。

桂枝。生沙苑。遠志。當歸。鹿角霜。杞子。茯苓。此方不切病。

翼。帶淋日久。脂液垂涸。奇脈俱傷。營衛亦偏。內風自動。則中焦氣奪。浮腫腹膨。為寒為熱矣。暫以鹹緩和陰。

阿膠。牡蠣。從蓉。柏子霜。郁李仁。

袁。古光赤頭。脹身熱。帶下如注。此五液走泄。陽浮熱蒸。當用攝劑。若與鹿角霜沙苑。仍是升舉動陽。則無效。

矣。熟地炭。阿膠。芡實。茯苓。湖蓮肉。炒山藥。

又。照前方。去阿膠。山藥。加桑螵蛸。煑肉炭。

吳。崩帶淋瀝。陰從下走。量厥汗出。陽從上冒。逢穀雨暴。凶。身中陰陽不相接續。怕延虛脫。皮寒時為劇。肝腎

病治。人參。阿膠。生龍骨。五味。茯苓。生牡蠣。

又。血液去。則臟除。失守。神不內附。致目中妄見。非鬼祟也。當先鎮陽神為主。若驟用陰藥。則有妨胃納矣。

人參。龍骨。五味。茯苓。芡實。建蓮肉。當用心經藥。

又。淋帶黃白。未淨。五更心悸。汗出。人參。炒枸杞。五味。茯苓。芡實。湖蓮肉。

某。五脈左細。前用通補。據述痛起。得按痛緩。八脈空虛。昭然。捨此補養。恐反增劇矣。

當歸。烏賊骨。紫石英。杜仲。杞子。柏子仁。沙苑。茯苓。

某。女科病多。倍於男子。而胎產調經為主要。淋帶瘕泄。奇脈虛空。腰背脊脊拳掣。似墜而熱。氣反升於上。從

左而起。女人以肝為先天也。醫人不曉八脈之理。但指其虛。剛如桂附。柔如地味。皆非奇經治法。先以震靈

丹固之。每服一錢五分。

又。淋帶瘕泄。諸液耗必陰傷。此參附薑桂劫陰不效。而膠地陰柔亦不能效。蓋脈隨氣散不攝。陰藥沉降。徒

虛奇脈

液涸 風動 陰虛 陽浮

授其滑耳。必引之收之固之。震靈丹意通則達下。澁則固下。惟其不受偏寒偏熱。是法效靈矣。後方常用。

人參錢一 鹿角霜錢 沙苑 桑螵蛸錢三 炒杞子錢 茯神錢三 炙草五分

方九 人參二兩 麋茸二兩切 生鬼絲子二兩 淡補骨脂兩半 生紫石英兩二 生餘糧石兩二

茯苓兩 炒黑小茴錢五 炒黑遠志錢五 晚服妙香三錢

桃五 自乳血耗 脈絡空豁 脊椎痺痠 帶下不已 問下部已冷 陰虛及陽 速連斷乳 不致延勞

徐四 經漏成帶 下焦畏冷 眩暈 肝臟陽升 八脈空乏 杜仲 茯苓 沙苑 白薇

當歸 炒白芍 炒黑枸杞 杜仲 海螵蛸 炒沙苑

楊三 寥居獨陰 自多愁煩 思鬱 加以針齋 目注疑神 陽上巔為眩暈 八脈無氣 自帶下 下冷 內風日動 癩疹麻

木常為隱現 以煖下柔劑 和其陰陽 可得小效

製首烏 三角胡麻 枸杞 甘菊花炭 用紅棗搗丸 早上服四錢

王二 產後漏淋 成帶 入暮溺頻 不爽 驚恐 神呆 骨節盡痛 是肝腎內損 漸及奇經 不司束固 是產後虛在下 甘

辛潤補肝腎 不與燥藥 以腎惡燥 肝忌剛也 枸杞子炒黑 鹿角霜 歸身 菟絲子炒香 生杜仲 炒苑子 茯苓 補骨脂鹽水煎淡

某 少腹拘急 大便燥艱 淋帶赤白 此屬液固 河車 當歸 柏子仁 都李仁

肉苁蓉 枸杞子 河車 當歸 柏子仁 都李仁

又 淋帶年久 少腹拘急 脹痛澀不爽 大便艱滯 得泄氣則脹寬 食物少 納腕中不降 必撫摩枱下 此病久臟

陰腑陽皆傷 熱藥難受 以通陽固陰 兼之

服早 人參此病宜通中氣之氣 歸身 炒杞子 茯苓 麋茸 河車 暮服震靈丹二十粒

帶下者 由濕度流 注於帶脈 而下濁液 故曰帶下 婦女多有之 赤者屬熱 兼實兼火 治之 白者屬濕 兼虛

驚肝脾 肝風 肝虛 胃陰 傷燥 虛奇 血脈

兼痰治之。年久不止。補脾腎。兼升提。大抵。臞人多火。肥人多痰。最要分辨。白帶白濁。白淫三種。三者相似。而迥然各別。白帶者。時常流出。清冷稠粘。此下元虛損也。白濁者。濁隨小便而來。渾濁如泔。此胃中濁氣。滲入膀胱也。白淫者。常在小便之後而來。亦不多。此男精不攝。滑而自出也。至於淋症。由腎虛膀胱積熱。所致。腎虛則小便數。膀胱熱則小便澇。淋有氣血砂膏勞五者之殊。皆屬濕熱。氣淋為病。小便澇滯。常有餘瀝不盡。血淋為病。過熱即發。甚則溺血。痛者為血淋。不痛者為尿血。砂淋為病。陰莖中有砂石而痛。溺不得卒出。砂出痛止是也。膏淋為病。溺濁如膏。敗精結者為砂。精結散者為膏。又黃海為鹽之義。勞淋遇勞即發。痛引氣衝。大約帶病為女子有之。淋濁男女俱有。景岳云。婦人淋帶。其因有六一。心旌搖。心火不靜。而帶下者。先當清火。而硃砂安神丸。清心連子飲之類。若無邪火。但心虛帶下。宜秘元煎。人參丸。茯苓丸之類。一欲事過度。滑泄不固。而帶下者。宜秘元煎。苓朮菟絲丸。濟生固精丸之類。一人事不暢。精道逆。而為濁。為帶者。初宜威喜丸。久宜固陰煎之類。一濕熱下流。而為濁帶。脈必滑數。煩渴多熱。宜保陰煎。加味逍遙散。若熱甚。兼淋而赤者。宜龍膽瀉肝湯。一元氣虛而帶下者。宜壽脾煎。七福飲。十全大補湯。若陽氣虛寒。脈微澇。腹痛多寒。宜加薑附家韭子丸。一脾腎氣虛。下陷多帶者。宜歸脾湯。補中益氣湯之類。以上淋帶辨症論治。彷彿已備。語云。鴛鴦繡出從君看。莫把金針度與人。若求金針暗度。全憑葉案搜尋。天泰

崩漏

徐三肝脾鬱損。血崩。人參道遠散。去柴朮。加桑螵蛸。杜仲。當用血藥。

某經漏不止。久風瘡洩。人參。茯苓。木瓜。炒烏梅。赤石脂。餘糧石。

龔脈數寒熱汗出。腹脇痛。病起經漏崩淋之後。是陰傷陽。乘消渴喜涼飲。不可純以外邪論。和營衛調中。甘

緩王治。當歸。白芍。淮小麥。炙草。南棗。茯苓。

文五產育頻多。衝任脈虛。天癸當止之年。有紫黑血如豚肝。暴下之後。黃水綿綿不絕。三年來所服歸脾。養

帶
漏之疾
宜用填補
大劑其法
不一學者
當深考也

帶
衝任
胃背
虛

髓虛
筋痛

衝任
陽虛

衝任
陰虛

但調脾胃補虛未嘗齒及奇經為病論女科衝脈即是血海今察黑成塊幾月一下必積貯之血久而瘀濁有不得不下之理此屬奇經絡病與臟腑無異考古云久崩久帶宜清宜通做此為法

經藥不能治重病

細生地

青蒿根

淡黃芩

澤蘭

樗根皮

接服斑龍丸

張十五旬天灸止而經淋周身壅掣右肢漸不能舉不但衝任督帶損傷陽明胃脈衰微少氣乃最難向安之病

人參

生黃芪

艾草

炒沙苑

炒杞子

炒歸身

未崩漏兩年先有帶下始而半月發病今夏季每交申酉其漏必至思下午為陽中之陰陰虛陽動衝脈任脈皆動下無隄防約束夫奇經肝腎主司為多而衝脈隸於陽明陽明久虛脈不固攝有關無合矣醫但以

瀋劑圖旦夕苟安未及按經論病宜毫無一致

海蝶蛸

鮑魚

茜草

生菟絲子

石穀廣蓮肉

按服烏賊魚骨丸

顧髓虛崩淋不止筋掣痛不能行

從蓉

枸杞

柏子仁

茯神

川斛

紫石英

羊肉腎

青鹽

成衝任二脈損傷經漏經年不痊形瘦膚乾畏冷由陰氣走乎陽位益氣以培生陽溫攝以固下真

人參

鹿角霜

歸身

蕪艾炭

茯神

炮薑

紫石英

桂心

張四經漏十二年五液皆涸衝任不用冬令稍安夏季病加心搖動腹中熱腰膝跗骨皆熱此皆枯槁日著方謂暴崩宜溫久崩宜清以血去陰耗耳

人參

生地

阿膠

天冬

人乳粉

柏子仁

茯神

棗仁

白芍

固補衝任涼肝寧血丸方

人參

生地

阿膠

天冬

人乳粉

柏子仁

茯神

棗仁

白芍

人參

生地

阿膠

天冬

人乳粉

柏子仁

茯神

棗仁

白芍

二膠如少可加蒸熱山藥搗漿為丸早服四錢參湯送晚服二錢

鮮河車膠

石穀建蓮肉

苦寒
陽中

不和
奇脈

虛寒
肝腎

液傷
絡熱
風消

陰虛
陽亢

半身前陽明脈空陽越衛疏陰火升舉當宗丹滋補陰凡或虎潛凡之屬久病後湯太過恐妨胃氣 每早服丹溪補陰丸四錢十服

黃 長齋有年脾胃久虛瘧由四末必犯中宮血海隸於陽明苦味辛散皆傷胃氣雖天癸久絕病邪藥味擾動血絡是為暴崩欲脫閱醫童便阿膠味鹹潤滑大便溏瀉豈宜潤下即熟地五味補飲陰液咽湯停脫頃欲吐淨滋膩酸濁之藥下焦未得其益脫中先已受戕議以仲景理中湯血脫有益氣之法坤土陽和旋轉喜其中流砥柱倘得知味納穀是為轉機重症之尤勿得忽視理中湯

某 鹿角霜 生杜仲 桂枝木 生沙苑 當歸 茯苓 紅棗
羅二病屬下焦肝腎內損延及衝任奇脈遂至經漏淋漓腰脊痠弱脈絡交空有終身不得孕育之事

製熟地 砂仁製 河車膠 當歸 白芍 人參 茯苓 於朮 炙草
斬艾炭 香附 小茴 紫英石

陳十五旬年歲經漏如崩繼以白帶綿綿昔形充今瘦損當年飲酒濕勝大便久溏自病經年病乾不爽夜熱多汗四肢皆冷氣短腹鳴上噫氣下泄氣腰足跗酸更無力食物日減不知其味此陽明脈衰厥陰風木由乎血去液傷衝任交損內風旋轉而為風消之象病在乎絡故令久延金匱謂絡熱則痿矣

張 外冷內熱食過即嘔身燥裂渴飲下漏漏多則陰虛陽亢便溏不實不可寒潤

又 消渴心悸 阿膠 生雞子黃 生地 天冬 生白芍 茯苓
胡 心痛如飢口吐膩涎濁沫直經來甚多因驚動肝陽化內風欲厥之象治以鹹苦佐以微辛使陰入和陽

阿膠 杜蠟 川棟子 小川連 川芎 當歸

奇經陰虛
風陽虛

又和陽固陰諸病大減因經漏陰傷陽易浮越心怔悸肢末痛內風未熄藥以甘柔使胃汁日充則砥柱中

流矣人參阿膠麥冬生白芍炙草茯神

邱四經漏成帶年餘醫瘥無功乃銜任督帶交病古稱久帶久崩宜清視其體豐髮奕陽氣久虧與內經血脫

方法烏鯽魚丸鮑魚汁丸又照前方加阿膠人中白

某經漏三年診色脈俱奪面浮跗腫肌之華色納穀日減便堅不爽自脊脊腰脾痠處如墮入夏以來形神

日羸思經水必諸路之血貯於血海而下其不致崩厥淋漓者任脈為之擔任帶脈為之約束剛維跨脈之

擁護督脈以總督其統攝今者但以衝脈之動而血下諸脈皆失其司症固是虛日餌補湯不應未達奇經

之理耳考內經於胸脇支滿妨食時時前後血特製烏鯽丸鹹味就下通以濟瀉更以穢濁氣味為之導引

同氣相需後賢謂暴崩暴漏宜溫宜補久漏久崩宜清宜通正與聖經相符况乎沃尤皆守不能入奇脈無

病用之誠是孖藥藉以調病焉克有濟夏之月天氣正在泄越脾胃主令歲氣天和保之最要議以早進通

陰以理奇經千餘天熱氣泄必加煩倦隨用清暑益氣之劑以順天氣以扶生生安穩百日秋半收肅令行

可望其藏聚氣交而奇絡漸固此久損難復非倖試速功矣

早上湯藥議以通陰潛陽方法早服

龜甲心秋石水浸鹿角霜真阿膠柏子霜生牡蠣鎖陽

另煎清人參湯入清藥煎水五十沸

鹿性陽入督脈龜體陰走任脈阿膠得濟水沉伏味鹹色黑熄肝風養腎水柏子芳香滑潤養血理燥牡

蠣去濕消腫鹹固下仲景云病人腰以下腫者牡蠣澤瀉湯鎮陽固下焦之陽氣乃治八脈之大意

烏鯽丸方烏鯽骨四分米醋炙去甲蘆茹一分

右為細末用雀卵量搗為丸每服三錢用藥煎先飲淡鮑魚湯一小杯為導引

進督易損投但在耳鳴甚腸中亦鳴肝陽內風升動未息感氣則用藥早服

二經之十二餘
經則奇經
內並無
之治約已
經之約也
此老好為
立異於此
說如無礙
則亦各咸
鹿茸治腎
脈龜膠治
任脈此非
想像其理
必其實不
必沉也
巧思又無
所結也
所倫也

真阿膠 柏子霜 天冬 女貞實 旱蓮草 另煎人參湯二錢加入濃清藥內再煎五十餘沸

入 兩進柔潤清補頗投詢知病由於悲哀煩勞調理向愈繼因目病服苦辛寒散太過遂經漏淋帶年前七

八日始淨今則兩旬而止此奇脈內之前議非誣據述周身累現癩疹瘡粟搔癢不甯想脂液久涿陰不內

營陽氣浮越衛怯少固容氣外來凡六淫客邪無有不從熱化內經以瘡癩諸病皆屬於火然內症為急正

不必以肌腠見病為治刻下兩三日間又值經至之期議進固脈實下佐以東垣瀉陰火意經至之先用此

方 龜甲心 真阿膠 人參 桑螵蛸 生白龍骨 旱蓮草 茯神 知母 早上服

又 當經行周身寒凜腰痠腿脹白疹大發議用固氣和血方 白芍 南山查 斷艾 早上服

又 經來腹墜腰痠疹現肌癢鼻孔竅皆然想陰血下注必陽氣鼓動內風沸起風非外來乃陽之化氣耳

昨因經至用膠艾四物湯和補固經今午診脈右大而濇左小數中有堅疾如及之象洵乎液枯風動初定

烏鰂魚丸當進其早上湯藥凡氣味之辛裁去雖為補劑勿取動陽耗液也 早上服

人參 生地 天冬 阿膠 生白芍 女貞子 旱蓮膏 地榆 早上服

又 兩日早進清補柔劑夕用通固下焦衝任是月經來甚少起居頗安與先哲云暴崩當溫濇久漏宜宣通

若合符節矣連次候脈必小弱為少安則知陽動不息內風必旋旋尤呆守歸艾平溫守則氣壅辛則陽動

皆不知變化之旨坐失機宜耳余未能久候焉有經年經月之病驟期速愈故丸藥創自內經七方之一世

多渺忽實出軒岐秘奧再議理陰熄風早用諒不致悞 擬長夏調理二法

晚服烏鰂丸三錢晨進養肝陰和陽熄風以安胃蓋衝脈即血海隸於陽明胃脈乃依經旨立方

人參 阿膠 白芍 生地 旱蓮膏 女貞子 桑寄生 鹹秋石 細子苓 三角胡麻

藥末膠膏再加熟蜜三兩搗千餘杵丸宜細光早上服四錢小暑至處暑生脈散送

又 此番經後帶下仍有久漏音脈少圍前案由說已著丸劑端司通攝衝任恪守定然必效但外來寒暄易

禦內因勞噴難調余諄諄相告者為此

人參 生地 阿膠 白芍 茯神 女貞子 早蓮草 小黑糯米皮 早上服 初十日

又 昨晚煩冗陽動氣升頭額震痛經再下注更定鎮攝一法久後亦可備用

人參 生地 阿膠 生牡蠣 天冬 黑殼建蓮 龜甲心

又 十二日午診脈仍用初十日早服方法去稽豆皮加生牡蠣

又 交小暑後驟熱午後另煎生脈散微溫服一次

虛 停經半載雨水節後忽然暴崩交春分節血止黃白淋漓自下寒則周身拘束熱時煩燥口乾晡至天明

汗出乃止寐必身麻如蟲行四肢骨節皆痛蓋血既大去衝任之脈傷損而為寒為熱陰損及乎陽位妄書

云崩中日久為白帶漏下多時骨髓枯由脂液蕩盡致形骸枯槁延為瘵疾矣天熱氣煖所當謹慎

烏鰂骨 阿膠 生地 生白芍 茜草 小麥

陽虛 程 暴冷陽微後崩 附子理中湯

崩如山冢峯崩言其血之橫決莫制也漏如漏卮難塞言其血之漫無關防也經云陰在內陽之守也氣

得之以和神得之以安毛髮得之以潤經絡得之以行身形之中不可斯須離也去血過多則諸病叢生

矣原其致病之由有因衝任不能攝血者有因肝不藏血者有因脾不統血者有因熱在下焦迫血妄行

者有因元氣大虛不能收斂其血者又有瘀血內阻新血不能歸經而下者醫者依此類推做葉氏用筆

靈活於崩漏治法無餘蘊矣 秦天一

胎前

秦天經停三月無寒熱診脈大係惡阻減食

細子登 知母 蘇梗 砂仁 橘紅 當歸 生白芍

肝氣

某 細子苓兩。蘇梗生研。砂仁鉅。白芍稍。熟白朮。當歸稍。青苔湯法丸。懷妊將三月。肝氣攻衝脇。嘔吐紅痰。

肝虛

程六 頭胎每三月。是肝虛。須胎多在月是血熱也。瓜蒞皮。半夏麩。橘紅。竹茹。生薑。

熱傷

錢三 上年夏產。過月經轉。今經停四個月。左脉弦滑流動。乃為妊象。此氣急脫。痞咳。熟氣上。乘迫肺之微形。肉日瘦。熱能燥陰。耗氣。議清金平氣。勿碍於下。

胃虛

楊 血液僅僅養胎。春陽升舉。上焦易燥。喉嚨心嘈。皆液虧陽亢。桑葉。川貝。桔梗。廣皮。黑山梔。地骨皮。茯苓。甘草。

咳逆

謝 始而熱入陰。傷少腹。痛溺不爽。秋暑再傷。霍亂繼起。今不飢不食。全是胃病。况懷妊五月。胎氣正吸脾胃。真氣津液重傷。致令咳逆。人參。知母。炒麥冬。木瓜。蓮子肉。茯苓。此病宜清胃氣。

熱邪

金 懷妊五月得熱病。久陰液。身中陽氣有升無降。耳竅失聰。便難艱澀。議用仲景復脈法。以生津液。炙甘草。人參。生地炭。阿膠。天冬。麥冬。生白芍。麻仁。

肝風

某 懷妊百日。丙丁養胎。胎熱從戌亥時升。耳前赤癩刺痛。當養陰制火。細生地。茯苓。生白芍。建蓮。桑葉。胸藤。

犯脾

某 脈右虛左弦。身麻肢冷。胎冲脹悶。五六月當脾胃司胎。厥陰內風暗動。不飢吞酸。全屬中虛。人參。枳殼。半夏。薑汁。桔梗。

閃動

胡 懷妊六月。陽明司胎。閃動絡脈。環跳痛連腰脊。最防胎氣。歸身。桂枝木。炒杞子。炙草。

絡脉

羊脛骨不入藥。白茯苓。

增補... 胎前... 龍文書局校印

某 氣逆壅熱於上。齟腫喉痺。胸悶腹腫。七月太陰司胎。法宜宣化清上。

汪 川貝 牛蒡子 連翹 蘇梗 杏仁 花粉 菊花 橘紅

黃芩 知母 橘紅 生白芍 當歸 砂仁

程 振八月。形寒氣逆。神煩倦無寐。乃肝陽乘中之徵。擬進熄風和陽法。

黃芩 當歸 生白芍 生牡蠣 橘紅 茯神

王 肝風眩暈。脈痺少寐。熟首烏 炒黑杞子 白芍 女貞子 茯神 黑櫨豆皮

養胎。上受熱氣。肺痺喘急。消渴胸滿便溺不爽。皆肺與大腸為表裏之現。症狀若繪矣。宜歸辛溫參朮守補肉桂沉香辛熱皆胎前忌用。致大熱煩悶。勢屬危殆。議以清肺之急。潤肺之燥。俾胎得涼。則安。去病身安。自為不補之補。古人先治其貴者邪也。

泡淡黃芩 知母 鮮生地 花粉 阿膠 天冬

又 喘熱減。四肢微冷。腹中不和。胎氣有上冲之慮。昨進清潤之方。熱勢有汗。可見辛燥耗血。便是助熱。今煩渴既止。問初病由悲哀驚恐之傷。養肝陰滋腎液為治。穩保胎元。病體可調。

復脈去桂麻薑棗加天冬知母子芩。

朱 脈右濇小數。左弦促。納食脫脹。常有甘酸濁味。微嘔吐清涎。旬朝始一更衣。仍不通爽。詢知病起情懷抑鬱。由氣化熱。如內經五志過極皆從火化。熟懷妊忌阻。按徐之才。逐月安養。亦在足少陽經。正取清鬱熱。養胎况肝膽相火內寄。非涼劑無以和平。古人治病以偏救偏。幸勿畏虛以貽患。

金石斛 黑山柁 茯苓 半夏麩 橘紅 竹茹 枳實

不可不知其名
得此真訣
然有時竟
不知何故
不與之相

上吐下瀉 必有邪氣 宜溫補 况胎前更 皆不宜服 平日持論 大相背矣 惡寒有邪

吐瀉 陽熱 泄瀉 寒邪 營虛 火夫 痢傷 胃陰

熱血 傷陰

熱邪 下痢 膿血

胎漏 觸胎 下血

竹葉 連翹 生甘草 黃芩 花粉 蘇梗 人參 於朮 茯苓 白芍

某 交節上吐下瀉况胎動不安脈虛唇白急用理中法 附子 炒白芍 炒廣皮 炒山查

周 病中懷狂泄瀉 焦朮 炒白芍 炒黃芩 炒廣皮 炒山查

金 懷狂若患時症古人重在保胎今者喜暖惡寒升則厥痛墜微便痛逸腹墮胎須避絡傷以及奇脈長慮 胎墜難挽辛香溫柔之補冀其止厥 鹿角霜 淡從蓉 炒杞子 柏子仁 當歸 炒沙苑 炒大茴 茯苓

某 固護胎元諸症俱減惟心嘈覺甚陰火上升營虛之微 人參 桑寄生 熟地 阿膠 綠綿灰 條芩 白芍 當歸 茯苓 香附

某 懷妊崩滯半月胃陰既虧陽氣上逆咽中阻飲水欲噦舌尖紅赤津液已耗燥補燥劫恐陰愈傷而胎元 不保議益胃和陽生津治之 熟地 烏梅 白芍 山藥 建蓮 茯苓 用川石斛煎湯代水

潘 血液護胎尚且不固心中如飢空洞食不能納况又戰慄嘔逆凡內外搖動都是動胎從來有胎而病外 感麻桂硝黃等劑必加四物是治病保胎第一要法 小生地 白芍 阿膠 知母 黃芩 青蒿根

王 臨月下痢膿血色紫形濃熱伏陰分議用白頭翁湯 苦味見效知溫熱熟血以小其製為劑可全功矣 黃芩 茯苓 青蒿根

某 胎漏鼻衄發疹而喘 淡黃芩 真阿膠 澤瀉 炒山查

某 觸胎下血腹痛而墜 人參 炒白芍 炙草 廣皮 熟地炭 炒砂仁末

又 照前方去熟地加炮薑熟朮 兩錢銀一二 兩青芩一兩

增 胎前 龍文書局校印

又人參 熟地 炒歸身 炒白芍 炙草 茯神 廣皮 炒砂仁
陸心形 脈數尺動不食惡心證象惡阻腰痛見紅為胎漏欲墜

某 三月胎漏用固下益氣 人參 熟地 熟地 阿膠 白芍 炙草 砂仁 艾炭
華 血下殞胎未下濁氣擾動量厥嘔逆腹滿少腹硬二便窒塞不通此皆有形有質之阻若不急為攻治濁
瘵上冒必致敗壞做子和玉燭散意

子腫 川芎 當歸 芒硝 芫蔚子 大腹皮 青皮 黑豆皮 調回生丹
程懷妊八月子腫腹漸墜正氣虛弱補劑必須理氣預為臨產之算

人參 茯苓 廣皮 大腹皮 蘇梗 砂仁末
易曰大哉乾元萬物資始此言氣之始也又曰至哉乾元萬物資生此言形之始也人得父母之氣以生
氣生形即稟此乾坤之氣也兩儀既兆五行斯彰故天一生水水屬腎腎臟先生地二生火火屬心心又
次生天三生木木屬肝肝又次生地四生金金屬肺肺又次生天五生土土屬脾脾又次生天既以五行
生五臟而仁義禮智信之五德亦即寓於其中朱夫子所云天以陰陽五行化生萬物氣以成形而理亦
賦焉此之謂也因此古人重胎教所以端其本也而今不復講矣然六淫之感七情之傷惟掃蕩氣有強
弱小兒胎元有靜躁故安胎之法不可不詳如惡阻胎淋胎暈胎腫胎懸及漏胎等症古人言之甚晰茲
不具贅今閱葉先生案胎前大約以涼血順氣為主而肝脾胃三經尤為所重因肝藏血血以護胎肝血
失榮胎無以陰矣肝主升肝氣橫逆胎亦上衝矣胎氣繫於脾如寄生之托於苞桑焉與女蘿之施於松
柏脾氣過虛胎無所附墮胎難免矣至於胃為水穀之海妊婦全賴水穀之精華以養身護胎故胃氣如
兵家之餉道不容一刻稍緩也其餘有邪則去邪有火則治火陰虛則清滋陽虛則溫補隨機應變無所

此皆舉者能引而伸之獨類而通之安胎之法可一以貫之無餘蘊矣秦天一

茶乃亦清 無大出入 然非補料 門多有 未求之處 雷更博求 之

說得大遠 此趨吾之 等談也

此老母症
見惜不全
耳

新產
惡露
瘀滯

體虛
兼瘀

鬱胃

欽 〔產後〕
初產汗出眩暈胸痞腹痛宜通惡露

炒山查

延胡

鬱金

赤芍

炒牛膝

香附

童便沖

益母草湯代水

又 腹痛少緩但胸痞痰多治從上焦

炒山查

鬱金

丹參

橘紅

炒川貝

甜花粉

程 衝脈為病男子內結七疝女子帶下癥聚故奇脈之結實者古人必用苦辛和芳香以通脈絡其虛者必
辛甘溫補佐以流行脈絡務在氣血調和病必全愈今產後體虛兼瘀而痛法當益體攻病日期已多緩治
為宜 生地 生薑 丹皮 琥珀末調入

此苦辛偶方如丹皮以通外琥珀以通內所以取效

又 回生丹

取乎醋煮大黃一味約入病所不礙無痛之所故亦效二法皆入絡藥

又 小生地 歸鬚 紅花 郁李仁 柏子仁 茯神 又照前方去紅花郁李仁加澤蘭

某二惡露淋漓痛由腰起攻及少腹此督帶空虛奇經氣阻疑奇經為病通因一法為古聖賢之定例

當歸

查肉炭

炒丹皮

澤蘭

川斷

製首烏

唐 產後驟脫參附急救是挽陽固氣方法但損在陰分其頭痛汗出煩渴乃陽氣上亢凡開泄則喪陽辛熱
則傷陰俱非新產鬱胃之治道嘗讀仲景書明本草意為是擬方於後亦非杜撰也

生左牡蠣

生地

上阿膠

炒黑查肉

羌蔚子

吳 新產陰氣下泄陽氣上冒日晡至戌或陽明胃衰厥陰肝橫肝血無藏氣衝擾膈致心下格拒氣扞膈中
神亂昏謔若惡露衝心則死矣均者亦就時復亦必不誤有天明再醒之理回生丹酸苦直達下焦血分用過不應諒非瘀痺想初
由汗淋發熱凡外感風邪邪滯汗解此熱昏亂即仲景之新產鬱胃也倘失治必四肢牽掣如驚似風癩則
危議從亡陽汗出謔語例用救逆法

生龍骨

生牡蠣

桂枝

淮小麥

炙甘草

南棗

再當加血藥

生龍骨錢三 生牡蠣錢三 桂枝分五 淮小麥粒百 炙甘草分三 南棗錢二 再當加血藥

又氣從湧泉小腹中直冲胸臆而心下痛。顛暈神迷。此肝腎內怯。無以收納自固。每假寐必魂魄飛越。驚恐

畏懼。必非一端。救逆法鎮陽頗應。但少補虛再神益之固之耳。

正當血藥 人參錢 龍齒三錢 棗仁錢 茯神錢 炒黑杞子錢 黑殼建蓮錢 紫石英一兩

用水三盞煎減半用以煎藥

又兩法皆效。下元虛損無疑。入脈無氣把握。帶下淋漓不止。夢魂跌仆。正經宜下虛則夢墜也。議鎮固奇脈

方。人參錢 龍齒錢 棗仁錢 茯神錢 桑螵蛸錢 炒黑遠志錢 用紫石英煎湯煎藥

又昨午夏悲嗔怒。大便後徒然頭暈。繼以嘔逆胸痞。止心洞嘈。雜仍不能食。子夜寒戰鼓慄。寅刻津津微熱。

神昏妄見。顛痛乳脹。腹鳴短氣。阿欠似乎數息之聲。此乃下元根蒂未堅。偶觸心機。諸陽神飛旋動。舞仲景

論先厥後熱。知飢不能食。乾嘔。列於厥陰篇中。蓋危病初效。未沾水穀精華。則胃土大虛。中無砥柱。俾厥陰

風木之威。橫衝震蕩。一如釋典。混沌劫於地水。大風卒水莫禦矣。當此醫藥全以護陽固陰。但血舍耗涸。剛

猛及滋膩。總在難施之例。無服理病存體為要。

沈 此產後陰虛瘧疾。鼻煤喉燥。舌乾脫居不飢。大便窒塞不通。乃陽明津枯。不上供肺。下少滋腸。風陽游行。

面腫耳聾。仲景謂陰氣先絕。陽氣獨發。後人以飲食消息。取義甘寒。則知辛溫逐瘀之誤。

人參錢 熟附子錢 川桂枝木錢 炮薑炭錢 炙黑甘草分 茯苓錢

又酸味泄肝。胃氣乃降。大便通後。汗大出。心中刺痛。皆營液內耗。陽氣衝突。仲景三病之鬱。冒見端矣。雖痰

吐咯。無苦燥耗氣之理。人參 阿膠 生地 麥冬 生白芍 炙草

張 產後鬱胃。汗出潮熱。腹痛。炒生地 炒山查 丹參 茯神 浮小麥 黑穉豆皮

吳 產後十二朝。先寒戰。後熱發。少腹痛。痛腹膨滿。下部腰肢不能轉側。伸縮。小溲濇少而痛。此敗血流入經

明知陰將 血而不用 血藥何也 能加血分 用血及散 內風之品 終不能有 根也

絡入敗 為經血

又 小生地 生薑 車前 牛膝 五靈脂 炒查肉 調入琥珀末一錢
十六朝諸症稍減。每黃昏戌刻時。衝氣自下而上。至胸中即脹悶。肢冷汗出。右腹板實。此厥陰肝臟。因驚
氣逆。今惡露未清。重鎮酸斂。均為暫忌。議和血調血為穩。

歸鬚 炒桃仁 延胡 炒查肉 官桂 香附 川棟 小茴
人參 當歸 白芍 炙草 茯神 香附 桂心 廣皮

又 程 脈濡惡露紫黑。痛處緊按稍緩。此屬絡虛。治在衝任。以辛甘理陽。
炒歸身 炒白芍 肉桂 茯苓 小茴 杜仲 炙草 桂心

又 又 脈濡空大。營絡虛冷。人參 炒歸身 炒白芍 茯神 炙草 桂心
當歸羊肉湯。加茯苓。茴香。

又 許 產後陰虛。肝風動。灼喉乾。噎咳。晚則頭暈。
阿膠 細生地 天冬 小麥 川斛 茯神 宜略加風藥

程 生葛過勞。肝風陽氣動。面浮氣短。腹膨。惡露未清。不可臑滯。須防瘕厥。
小生地 丹參 澤蘭 茯神 黑櫓豆皮 琥珀末

又 血分既虧。風陽動。泄。汗出。心悸。此辛氣走泄。須忌。所慮瘕厥。如已見端。議靜藥和陽意。
阿膠 雞子黃 細生地 生牡蠣 丹參 茯神

某 產後下焦陰虧。奇竅不固。陽浮乃升。風動則殮。泄。嘈雜液損。必消渴。骨熱。治在肝腎。靜藥固攝。
熟地 湖蓮 炙草 五味 芡實 山藥 早蓮 女貞

某 新產後陰分大虛。汗出。胸痞。潮熱。陽浮。衛不固。雖痰多。咳頻。忌用苦辛表散。恐久延。毒勞耳。
炒生地 炒麥冬 生扁豆 炙草 金石斛 丹參 茯神 甘蔗漿

某 產後身痛。少腹滿。
炒生地 炒麥冬 生扁豆 炙草 金石斛 丹參 茯神 甘蔗漿

營格 惡露 未清

陰虛 輒陽

陰虛 汗池

血虛

寒滯

氣滯
濕滯
兼血

氣滯
脹滿
陰虛
夾暑

暑傷
營陰

查肉 川芎 醋炒 延胡 醋炒 澤蘭 丹皮 艾葉 小茴 香附 醋炒 茯苓 益母膏丸

當歸 桂心 茴香 香附 紫石英 茯苓 羊肉膠丸

孫 產難傷力驚恐面微浮腹膨小便不爽

炒黑查肉 大黑豆皮 大腹皮 絨 生香附 茯苓 澤瀉 白花益母草煎湯代水

金 腹脹氣滯久瀉產後五日 於朮 厚朴 茯苓 澤瀉 南山查 延胡

一歲內經最虛之處便是容邪之處矣產科未明此旨徒曉產後逐痰成藥苦辛破血津液愈劫所伏暑熱

正知內經最虛之處便是容邪之處矣產科未明此旨徒曉產後逐痰成藥苦辛破血津液愈劫所伏暑熱

無由可驅六氣客邪內迫臟腑漸漸昏蒙內閉攻熱害正養正邪留藥難立方調治幼讀仲景揣摩聖誨惟

育陰可以除熱况乎暑必傷氣人參非益氣之聖藥乎大隊陰藥佐以人參誠為陰分益氣之法服之熱痛

累累而起惡露變緩而下扶正却邪竝行不悖今穀食已安諒無反覆難成易虧之陰須安養可望圖功倘

加情志感觸輕則奇損帶淋重則髓枯辱損莫道贈言之不詳也

雄烏骨雞一隻 人參 二兩 秋 鮮生地 兩 三 柏子仁 兩 天冬 兩 三 麥冬 兩 阿膠 兩 建蓮肉 兩

項 茯苓 兩 二 敷膏 初病舌赤神煩產後陰虧暑熱易深入此亟清營熱所謂瘦人慮虛其陰

竹葉 細生地 銀花 麥冬 五 連翹

張 產後十三朝舌黃邊赤口渴腕中緊閉不食不飢不大便此陰分已虛熱入營中狀如瘧症大忌表散清

射議滋清營熱救其津液為要

又 細生地 天冬 生薑甲 丹參 茯苓 宜略兼風藥

產後血絡空虛暑邪客氣深入慮乃間日而發嘔惡胸滿口渴皆暑熱燠胃津液也此虛人夾雜時氣只

產後血絡空虛暑邪客氣深入慮乃間日而發嘔惡胸滿口渴皆暑熱燠胃津液也此虛人夾雜時氣只

陽虛 脫

產後 陰虛 發厥

衝任 虛氣 上逆 脹痛

青蒿梗

淡黃芩

丹皮

鬱金

花粉

川貝

杏仁

橘紅

又脈暖熱止病減之象。但古色未淨大便未通。產後大虛不敢推蕩。勿進葷膩。恐滯蒸化熱。蔬粥養胃。以滋

清潤燥。便通更議補虛。生首烏 麥冬誤認七陽 麥水炒知母 蘇子 花粉

某濁陰上逆。惡心不食。冷汗煩燥。最防暴脫。不可但執惡露滯滿。而專瀉氣攻血也。

人參 乾薑 附子 澤瀉 入童便

某脈無神。神倦欲昏。汗出。乃陽氣走泄。瀉利係陰氣不守。產後見症是屬重虛。深恐節間暴脫。而寒熱胸痞

腹痛。豈違論及標末。人參 製附子 人尿 豬膽汁

某產後驟加驚恐。陽上督當為厥。左肢麻木。且竅失。殞皆陽挾內風。混入清竅。以上實下虛。鎮陽填陰。味厚

質靜之藥。熟地 龜甲心 天冬 莢肉 五味 磁石 茯苓 黑殼建蓮

某產後去血過多。陰虛陽實。頭中眩暈。汗出。肉瞤。驚畏身熱等症。最易昏厥。若辛氣味宜忌。

生地 小麥 炙黑甘草 麥冬 阿膠 茯神 生左牡蠣

顧三產後真陰不復。陽越風動。四肢麻木。先厥後熱。

熟地 阿膠 炒杞子 茯苓 菊花炭 生白芍

徐少腹衝心。下脫中痛而脹滿。若云肝氣犯胃。必有嘔逆。前法益陰和陽不應。顯是產後下虛。厥氣上攻。

議用柔陽之藥。炒歸身 茯苓 炒枸杞 柏子仁 小茴 茯神

又衝逆震動而痛。是產後衝任空乏。按定痛減。尤為虛象。緣胃弱減殺。未便湯劑之多。防胃倒耳。

當歸 茯苓 紫石英 茯苓 河車 鹿角霜

又衝脈逆。則諸脈皆動。天朗晴和少安。由陰分虛及陽分可徵。前法包舉大氣。溫養任通。是為終方。日來春

升。略有衄血。然無清寒可投。加鹹味佐其入陰。從產後下焦先傷耳。原方減鹿霜歸身。亦恐升陽也。加枸杞

桂圓以痛在左。故養肝是議。

陰虛 風陽 動

虞此有胃氣之象三背寒心熱天明汗出乃涼產後兩三月若此此屬下焦真陰已虧漸擾陽位二氣交乘並非客症頭暈耳鳴心悸寒熱後必瀉內風震動當與靜藥十日

人參

炙草

白芍

麥冬

炒生地

炒烏梅

又前法酸甘益陰和陽諸病皆減然此恙是產後下焦百脈空之謂之奪損填隙固髓為正治緣穀食未加

又

沉膩恐防胃口加餐可用丸藥初三月

人參

炙草

阿膠

生地

麥冬

又照前方加桂枝木茯苓南棗初七月產後都屬下焦先損百脈空際時序夏秋天腦溢泄加病此扶陽益陰得效今諸症向愈寢食已安獨經

水未至而衝任奇脈不振須臾陰沖旺脈中得以游溢耳

又

熟地水製

人參

阿膠

黃肉

遠志炭

山藥

茯神

建蓮

烏骨雞膏丸初一月

吳生尊過勞驚恐交迫真陰既傷經年不復目暗昏花煩動熱升皆陰腎不得自充何以涵養肝木厥仆眩

量陽挾肝風直上無制則當靜藥填陰佐酸以收攝熟地熟地之品能非治病之藥惟病後或可用耳阿膠五味黃肉北沙參茯神

陳心寒熱時作經歲不痊且產病後起陽難為病明矣歸桂枝湯

郭心產後下元陰分先傷而奇經八脈皆麗於下肝腎怯不固八脈咸失職司經旨謂陽維脈病苦寒熱陰維

脈病苦心痛下損及胃食物不減發產傷先傷真陰忌用桂附之剛溫煦陰中之陽能入奇經者宜之

人參鹿茸紫石英當歸補骨脂茯苓

陳四產後兩月腰痛牽引小腹冷汗不食當歸羊肉小茴桂枝木茯苓紫石英

沈產後動怒氣血皆逆痛嘔不臥不能仰面冷肢冷口鼻氣寒痛必自下衝上此屬痲瘋厥痛

淡吳夷非白兩頭尖川棟子桂枝木茯苓

吳一產後自日內右偏下少腹筋脈空無血氣

寒氣痛虛發路奇及下熱病陽

結氣

病矣 當歸 桂心 生桃仁 牛膝 山查 炒黑小茴
陸 產後邪深入陰。氣血膠結。遂有痲疝之形。身體偃僵。乃奇脈綱維不用。充形通絡可效。做仲景當歸羊肉

湯意 歸身 茯苓 枳子 小茴 茯苓 紫石英 羊肉膠丸
某 產後胞損溺淋。筋絡牽掣。治當攝下。 桑螵蛸 生沙苑 萸肉炭 炒黃柏 茯苓

馮 二產後兩月汗出身痛。歸芪建中湯
余 產後不復。心悸欲嘔。遇寒腹痛。先議進和營衛。繼當補攝。 歸桂枝湯加茯苓

吳 三胃痛三月不止。如素面黃。產後吞酸少食。中焦陽德。宜再加攻泄。與辛補血絡方。
桃仁 歸鬚 公丁香皮 川桂枝 半夏 茯苓

某 產虛下焦起病。久則延胃。不飢不食。乃陰損及陽。陽明脈空。厥陰風動。揪旋。而頭痛面浮。肢冷指麻。皆亡
血家見象。

人參 錢 枳子 炒焦 歸身 錢 牛膝 鹽水炒
人參 二兩 茯苓 二兩 萸肉 二兩 五味 兩 枳子 炒 二兩 浙江黃甘菊 花炭 五分 茯苓 錢

方 九 浙江黃菊 花炭 一分 蜜丸 早服 四錢 開水送
楊 三自幼作勞。即患頭眩。加之刮痧。一月之內。必發數次。前歲產後。體甚不健。右耳日夜响鳴。嗚即頭眩。神色

衰 奪唇黃舌白。帶下。手冷脚腫。脈右大。是陽明空。氣泄不固。煖下。温中。主之。
人參 二兩 桑螵蛸 三兩 鹿角霜 半兩 淡苳蓉 兩 炒枳子 二兩 柏子霜 兩 茯苓 兩 紫石英 兩 醋飛

白龍骨 兩 紅棗 四兩 蕪艾 五錢 水煮 搗丸 服 四錢
胃痛 欲嘔 肢冷 痛引 腰背 產後 病發 更甚
當歸 炒沙苑 炒黑枳子 炒黑小茴 鹿角霜 生精羊肉煎服

某 方 九 鹿茸 生杜仲 炒枳子 當歸 鹿角霜 茯苓 沙苑 小茴 羊腰子 蒸熟 搗丸

胃虛 下焦 虛寒 肥損 營衛 兼虛 陽虛 血絡 滯 陰損 及陽 肝風 犯胃

增 品 登 上 旨 白 蓮 膏 卷 六 二 龍 文 書 局 校 印

陰虛 陽浮 經漏 鄒三陽不入陰。不寐汗出。產傷陰先受損。繼而損至奇經。前主溫養柔補。謂陰傷不受桂附剛猛。開列病情。全是陰虛陽浮。漏經幾一月。尤為急治。夜進局方振靈丹五十粒。前方復入涼肝益陰配陽。是兩固法則。

人參 麋茸 枸杞 天冬 茯神 沙苑 某 產後淋帶。都是衝任奇脈內怯。最有崩漏勞損淹纏之慮。但固補竇下。須通奇經者宜之。

陳 產後百脈空。隙腰脊痛漏淋。桑螵蛸 人參 茯苓 生杜仲 沙苑 芡實 湖蓮

吳 閱病原產後陰虛液虧。加以平時嗔怒。陽氣暴升。絡血不寧。奇空衝任少貽。帶淋暗泄等症。阿膠 天冬 當歸 白芍 淡黃芩 青蒿膏 女貞子 茯神 烏骨雞炙 蜜丸

趙 養損八脈。經水不來。帶下頻頻頗多。產後下焦先虛。繼及中宮。乃血液脂膏之涸。桂附熟燥。更助劫燂。此溫藥是溫養之義。非溫熱之謂。人參 河車 麋茸 鹿角霜 歸身 茯苓 紫石英

楊 瘕泄起於產後。三年方愈。下損已極。經水幾月一至。來必衰頹如病。奇經衝任交空。下焦畏冷。食冷則瀉。心中疼熱。暖下溫經主之。

人參 鹿角霜 炒兔絲 生杜仲 炒杞子 熟白朮 淡骨脂 茯苓 蒸餅丸

金 心經後即背寒不熱。逾月不愈。嗽痰有血。自秋令產辱屢屢若傷風咳嗽。正月至穀減而產後不復。是下虛形寒減食。先調脾胃。即和營衛法。人參建中湯

某 易飢易怒。腹瀉氣墜。知飢不進食。自胎前至今。兩月不愈。竝非客邪。用固攝升陽。鹿茸 鹿角霜 熟地炭 當歸 桂枝 五味 茯苓

某 產後十年有餘。病發心頭垂脊痛。椎尻氣墜。心痛冷汗。此督任氣乘。躡維皆不用。是五液全涸。草木藥餌。十年之後不得。作產後治。總病無情。不能合情血之德。故無效。當以血肉充養。取其通補奇經。

陽虛腫脹

鹿茸 鹿角霜 鹿角膠 當歸 茯苓 杞子 柏子仁 沙苑 生杜仲 川斷

潘胎前水溢浮腫喘滿不得卧余用開太陽膀胱獲效既產浮腫自然漸退女科不明產後下虛常以破氣寬脹百日來腹大且滿按之則痛此皆氣散滯漫丸藥又補濇守中益助其鈍氣血凝滯經候不來為難治之病議腎氣湯煎藥成炭取其氣之通勿令味濁兼調琥珀末以調其血濇做古法中之所有非杜撰也

桂七味加車前牛膝炒炭水洗煎服調入琥珀末

徐三九年前名產後病則傷寒後九年亦可名傷寒後病火矣豈非笑話凡產後過百日而起者不作產後看

某產後血去過多下焦衝任空虛跗腫腹膨形寒面黃脈濡當用溫養

鹿角霜錢 補骨脂錢 紫石英錢 茯苓錢 桂心四 炒黑小茴分

方三脈沉濡產虛寒入痛脹腹鳴晨泄病人述心痛嘔逆其實治下為是

熟附子 胡蘆巴 良薑 炒黑茴香 茯苓 廣木香

朱四脈微弱形無華色據說病起產後食減吐瀉是下焦不復中焦又傷漸加浮腫脹滿倏甚忽平皆下焦厥

逆上衝也下虛於產後剛劑難以尚任是病之不易取效者在此

淡菴卷 炒黑杞子 當歸 小茴 茯苓 沙苑

又濟生腎氣丸一兩二錢

某四產後未滿百日胸脇骨節收引四肢肌肉麻木浮腫腹脹早輕夜重食減畏寒便澹脈得右遲左弦先與

理中健陽驅濁人參 炮薑 淡附子 焦白朮 枳實 茯苓

范病脹起於產後下焦先傷濁陰犯中不可以脹滿為實症夫腑陽不通腎氣散漫吸氣不入息音如喘此

身動便喘非外客之邪干肺春半溫氣外侵面腫頸項結核曾以夏枯荊葉辛解得效乃一時暴邪治法至

於本病之腹滿洞泄跗腫未經調理且脹勢侵晨至午頓減日暮黃昏脹形漸甚中焦陽微已見一斑愚見

脹滿在中而病根在下仲景於產後失調都從下虛起見閱文科湯藥一方殊屬不解思平居咽乾喉痺牙

宣。肝腎真陰下虧。不敢剛藥宣通。做薛氏腎氣法。減泄肝如牛膝肉桂之辛。不致劫陰。仍可通陽為法。

六味去萸加芍藥附子牡蠣炒炭煎

又 小滿節古云痛隨利減。今便利仍痛。非是實症。肝失調暢。當理用以益水母。不取芍藥之和陰。加當歸小

茴香拌炒焦黑。以通肝臟脈絡之陽。又辛散益腎也。照前方去芍。加茴香拌炒當歸。

其 產後腫脹不愈。顯是有瘀血不下者。下虛肝腎氣不收攝。形寒痞悶。食少瘦多。脈細內消。治從陰分。非分和攻消者。濟生

腎氣丸 沉香汁沖開水送 接服金匱腎氣丸

王 脹滿六年。產後小愈。今脹勢復甚。兼脫肛淋症。大腿熱如滾水。滾瀉。食入臍中作痛。議治其臍。

小温中丸 三錢六服

傳 風勝為腫。濕甚生熱。乃經脈為病。但產後百日。精神未復。不可過劫。

羚羊角

木防己

片薑黃

川桂枝

大杏仁

汶仁

方 產後腹大。半年不愈。近日有形衝突。臍如刀攪。據述坐蓐艱產。血去盈斗。而腹形即已脹滿。想入脈不用。

腎氣散 越不收。非瘀血精氣為病。議用大全方。烏雞煎丸。

烏骨雞

人參

蒼朮

附子

烏藥

肉桂

陳皮

蓬朮

川烏

延胡

白芍

木香

肉果

琥珀

即以雞搗去毛頭。嚼瓜腸雜。將藥放雞肚內。貯砂鍋中。以好酒一斗同煮。令乾去雞骨。以油罩盛。焙令乾。

為末蜜丸

范 衝任傷督帶損。皆由產時勞瘁。理難復元。固攝下真。兼理奇脈。治非背謬。但腹滿膨痛。若徒固補。不

調。恐滋脹腫。大意陽宜通。陰宜固。包舉形骸。和養脈絡。乃正治方法。病樣多端。紛紜難治。難以立方矣。

人參

鮮河車膠

淡茯苓

砂仁製熟地

鹿角霜

歸身

茯苓 紫石英

能此方出此等
用是此老
方是此老
出此等
上道不可
但有時過
此等病仍
知不能想
用藥亦有
出入時也

氣滯 腫痛 寒滯 厥下 脹滿 院痞

燥傷 肺氣 水阻 痺阻

痰飲 阻氣 不寐 下虛 飲逆 上逆

風濕 邪邪

某產後下虛血病為多。今脫中痞脹減食不適全是氣分之恙。但調氣寬中勿動下焦為穩。

香附 神麩 蘇梗 白蔻仁 茯苓 桔梗

朱十四產後冬月右腿浮腫按之自冷。若論敗血半年已成癱瘓。痛針刺泄氣其痛反加。此乃衝任先虛。踰維脈不

為用溫養下元。須通脈絡。然取效甚遲。恪守可望却病。

茯苓 鹿角霜 當歸 肉桂 小茴 牛膝 茯苓 鹿角膠 溶酒蜜丸

某產後必病。陰虛可知。兩足跗中筋掣疼。痛不耐走。趨當溫養肝腎。以壯筋骨。但食後院中痞阻。按之漉漉

有聲。手麻脇痛。心煩耳目昏眩。寃是陽氣不主流。行痰飲內聚之象。處方難以兼攝。議用分治法。

中焦藥日中服 桂苓六君子竹瀝薑汁法丸 下焦藥侵晨服從四斤丸金剛丸參寫

茯苓 牛膝 虎骨 生杜仲粉 天麻 木瓜 單解 蜜丸

程脈沉咳喘浮腫鼻竅黑唇舌赤。渴飲則脹急。大便解而不爽。此秋風燥化上傷。肺氣壅不降。水穀湯飲

之溼痺阻。經隧最多。生不得臥之慮。法宜開通太陽之裏。用仲景越婢小青龍合方。若畏產後久虛。以補溫

煖斯各氣散漫。三焦皆累。閉塞告危矣。

桂枝木 杏仁 生白芍 石羔 茯苓 炙草 乾薑 五味

陳三夏李坐蓐。秋月熱病半年來不寐。便無皮毛焦落之象。是痰飲為氣所阻。以致升降失常。乃痺之基也。

議宣肺以通腸 紫苑錢 杏仁錢 枳殼錢 桔梗錢 瓜蒌皮錢 鬱金錢

陸背寒。夜臥氣衝欲坐。乃下元虛之厥。濁飲邪皆令上泛。胎前僅僅支撐。產後變症蜂起。奈何庸庸者。流泄

肺冀其救。緩宜乎藥。增病勢矣。桂枝 茯苓 炙草 五味 淡乾薑

許實喘屬肺。虛喘屬腎。產後下虛最多。痰飲易於上泛。喘嗽食減。有浮腫脹滿不得臥之憂。不可小視。

茯苓 生白芍 乾薑 五味

王產後未復。風溫入肺。舌白面腫。喘咳泄瀉。小水漸少。必加腫滿。不易治之症。

生後

龍文書局校印

此老欲學
漢人往佳
方不此成
有明之方
未方之古
也立方之
意

上逆

蘆根 以仁 通草 大豆黃卷 此方聖藥矣 蘆根 以仁 大豆黃卷 木防已 茯苓
又 淡滲通泄氣分肺壅得開而卧再宗前議 通草 蘆根 以仁 大豆黃卷
又 過投絕產凝寒重藥致濕聚阻痰兩投通泄氣分已效再用暖胃滌飲法

熱濁 路不 肅降 暑傷 上焦 氣分 木火 盛心 營熱
又 支飲未盡澹瀉不渴神氣已虛用澤尤湯 生於朮 建澤瀉 茯苓 以仁
某 脈小左弦咳逆脫悶小便不利大便澹瀉不思納穀暖氣臭穢此皆胎前氣上逆衝濁得盤踞間肺失
清肅降令上竅痺致下竅不利湯食聚濕氣不宣行怕延出浮腫腹滿喘急不卧諸欸不獨以產後通瘀為
事 鬱金汁 杏仁 通草 桔梗 茯苓皮 以仁

沈 產後未復加以暑熱上干暑必傷氣上焦先受頭脹微微嘔惡脫悶不曉飢飽暑熱早涼汗泄不已經水
連至熱迫血絡妄動蓋陰虛是本病而暑熱係客氣清上勿得礙下便是理邪勿混亂首鼠致延暑損不復
矣 捲心竹葉 生地 炒川貝 連翹心 元參 地骨皮

袁 二神識不甚靈慧陡然狂亂入井夫暴病痰火風為多今診視色脈產後未滿百日多驚怕五味皆變厥陰
肝木順乘陽明古稱一陰一陽變亂為癎先以清心胞解營熱食進便通再酌調理
犀角 生地 芎藭 元參心 羚羊角 鬱金 竹葉心 連翹心

又 復脈湯去參薑桂
某 三產後不復元仍自乳撫育損不能復即是暑勞速速斷乳藥力可扶凡產必下焦先損必以形質血氣之
屬莫以心熱再用寒涼伐其生氣

人參 當歸 沙苑 杜仲 補骨脂 茯苓 羊肉腎二枚
沈 時熱屬上焦病逾時自解緣體質素薄長夏坐尊不但肝腎陰傷諸氣皆為發泄陰不主懸陽衝脈上冲

沈 時熱屬上焦病逾時自解緣體質素薄長夏坐尊不但肝腎陰傷諸氣皆為發泄陰不主懸陽衝脈上冲

此是痰飲
之症後方
不能中病

痛不宜
臥

秋收冬藏胃納有加庶乎漸安 鮮紫河車 人參 真秋石 茯神 水煎服地 歸身 五味

芡實 山藥 生羯羊肉膠共河車膠二共和丸

桃三面色少華。脈似數。按之沉澹。產後三年。從未經來。腹中有形。升送則痛。肩背映脹。卒痛難忍。咳吐都是涎沫。著枕氣衝。欲坐食減。便澹。身動語言喘急。此乃毒勞。損極不復。諒非草木可以圖倖。由下焦元海少振。驚恐。弱衝脈動。斯諸脈動。擬益元氣。充形骸。佐重鎮以理。怯護持體質之義。非治病方藥矣。

人參 杞子 白龍骨 茯苓 紫石英 羊肉

鄒心產後成勞損。先傷下焦血分。寒熱數發不止。奇經八脈俱傷。欲嘔不飢。肝腎及胃。有形疑癥。議柔劑。溫通補下。人參 當歸 小茴香 茯苓 沙苑 淡茯苓 杞子 鹿角霜 生紫石英

汪產後百日寒熱消渴。心痛惡食。澹瀉。此毒勞液涸。已屬病沉難治。擬酸甘化陰扶胃。望其小安而已。

人參 烏梅 炙草 赤石脂 木瓜 茯神 炒粳米

張二產後下虛。厥氣上衝。犯胃。食入嘔脹。脈絡日空。營衛兩怯。寒熱汗泄。淹淹為毒勞之病。最難調治。

淡吳萸 桂枝 茯苓 炮薑 炒木瓜 南棗

黃產後陡然驚恐。陰虧陽上逆。血湧吐痰。胸背脇下大痛。乃八脈空乏之徵。毒勞重症。延綿最難全好。議鎮固一法。熟地炭 炒杞子 五味 紫石英 茯神 牛膝炭 女貞子 芡實 茯神

又脈少。斂痛止血。暖仍用鎮納。熟地 炒杞子 五味 茯神 阿膠 萸肉 菊花炭 北沙參 芡實 茯神

又眩暈。腹鳴。腕痛。熟地 炒杞子 五味 茯神 阿膠 萸肉 菊花炭 北沙參 芡實 茯神

又烏骨雞 阿膠 熟地 杞子 五味 桂圓 茯神 建蓮 熬膏人參湯送

顧小產三日。脈數。頭痛。脫痞。小腹墜痛。欲厥。此屬鬱胃。

連翹 鬱金汁 丹皮 鈎藤 茯苓 炒山查 益母草湯煎

某二小產後惡露淋漓。營血內虧。厥陽由是鼓動。頭脹耳鳴。心中洞然。病在下焦矣。

小產 營胃 營血 壯陽

龍文書局校印

胃肝陽 風吐 嘔脫

陰虛 陽胃 成癩 痢

奇脈 陽虛 不升 固脈 奇脈 帶淋

下虛 上受 風溫

陽氣 虛火 瀉

暮勞 汪

朱 柏子仁錢 全當歸錢 白芍錢 稽豆皮錢 茯神錢 小半產一日舌白頻頻嘔吐青綠水汁涎沫左肢浮腫神迷如寐此胃陽大虛肝風內泛欲脫之象急護陽安胃冀得嘔緩再商治病

又 難得小效必三陰三陽一周扶過七日庶有愈理 人參 淡附子 炮薑 茯苓 南棗 煨老薑

某 小產不及一月忽有厥逆度潮此陰分既虛厥陽上冒今二便已通神志似屬惜散病雖已成癩癩却非 痰火有餘肝腎任遠治宜鎮補擬陳無擇琥珀散

孔 形畏寒凜凜忽熱轟熱腰膝墜脹帶下汪出由半產下焦之損致八脉失其擁護少腹不和通攝脈絡治 人參 白芍 鐵落 辰砂 磁石 遠志 菖蒲 牛黃 琥珀

陳 懷妊三月小產半年不復寒從背起熱起心胸經水後期不爽帶下脈脈不斂脊腰膝痠疼酸疼膝骨 附脛易冷無力由衝任督帶傷損致陰陽離隔不用調治非法有終身不肯孕育之累

顧 上年小產下虛不復冬令臧聚未固春夏陽升風溫乘虛上受清竅不利耳失聰鼻多塞咽燥痰稠悉見 上焦不清究竟下虛是本病議食後用清竅早上用鎮納 青菊葉錢 羚羊骨錢 黑梔皮錢

連翹心錢 元參心錢 苦丁茶錢 磁石六味加龜膠此味 久瀉延虛痛而後瀉氣弱不司運行病因小產而來法當中下兩調

人參 炒鬼絲子 木香 茯苓 炒白芍 炒補骨脂

小產後氣衝結痼是奇經八脈損傷醫謂病尚有形僉從痰血施治半年來肌肉大消內熱咯痰帶血食

瀉下大便崩漏蓋虛後下其真愈大虧收緊清熱氣味苦辛是重虛其虛藥先入胃既不中病先救胃口

方之重積
可厭

又

肝虛
血帶
液虛
風動

致令飲食廢矣陰虛成熱經閉以胃口傷外熱與濕之氣此症在經前經後皆宜
病之理見病治病貽害豈可再循前轍議肝胃兩和方法炒黑杞子錢 雲茯神錢 柏子仁錢

生沙苑錢焦當歸錢 小茴七分同當 紫石英五錢先煎 甘遂入藥

三次兩月胎漏而下是厥陰失養脈數又大腹痛惡露未盡

柏子仁炒查肉 丹皮 澤蘭葉 細生地 調入琥珀末

小產半月頗安忽然腰腹大痛或攢膝跗足底或引脇肋肩胛甚至湯飲藥餌嘔吐無存振去液傷絡空

風動皆腎謂按之痛緩屬虛勿道諸痛為實

宜草和血止痛之藥淮小麥 南棗 阿膠 細生地 生白芍

往常經候不調乃癥瘕為痛 葱白丸

金匱要略云新產婦人有三病一者病瘕二者病鬱骨三者大便難新產血虛多汗出善中風故令病瘕

亡血復汗寒多故令鬱骨亡津液胃燥故大便難心典云血虛汗出筋脈失養風入而益其勁此筋病也

亡陰血虛陽氣遂厥而寒復鬱之則頭眩而目昏此神病也胃藏津液而滲灌諸陽亡津液胃燥則大腸

失其潤而大便難此液病也三者不同其亡血傷津則一故皆為產後所有之病即此推之凡產後血虛

等諸症可以領而神會矣張路玉云產後元氣虧損惡露乘虛上攻眼花頭暈或心下滿悶神昏口紫或

痰涎壅盛者急用熱童便主之或血下多而暈或神昏煩亂者皆歸湯加人參澤蘭童便兼補而散之又

敗血上衝有三或歌舞談笑或怒罵坐臥甚則踰牆上屋此敗血衝心多死用花蕊石散或琥珀黑龍丹

如雖悶亂不致顛狂者失笑散加鬱金若飽悶嘔惡腹滿脹痛者此敗血衝胃五積散或平胃加薑桂不

應送來復丹嘔逆腹脹血化為水者金匱下瘀血湯若面赤嘔逆欲死或喘急者此敗血衝肺人參蘇木

甚則加芒硝滌湯之大抵衝心者十難救一衝胃者五死五生衝肺者十全一二又產後口鼻起黑色而

鼻衄者是胃氣虛敗而血帶也急用人參蘇木稍遲不救丹溪云產後當大補血氣即有雜症以求治之

近來諸醫
誤信產後
為寒之說
凡產後無
不用炮薑
熟地肉桂
人參等藥
不知產後
血脫孤陽
獨旺如石
燕竹茹石
景亦不禁
用而世之
庸醫反以
戕其陰而
不立斃我
見其多矣
中絕無此
弊足徵惟
有淵源惟

善用人參而少用血藥消痰清胃之法尚未見及則胎產之後大便由營虛有邪無邪必吞血為消痰去火驅風種種治法皆從出變中推離本宮業中諸方多有不見施竟後之方者此非專門之故也

陽維陰維陽蹻何陰蹻主之請教

治本病藥如神何藥

補臣言

一切病多是血虛皆不可發表。景岳云：產後既有表邪，不得不清，既有內傷停滯，不得開通消導，不可偏執。如產後外感風寒，頭痛身熱，便實中滿，脈緊數，洪大有力，此表邪實症也。又火盛者必熱渴煩燥，或便結腹脹，口鼻古焦黑，酷暑冷飲，眼眇尿痛，溺亦脈洪滑，此內熱實症也。又或因產過食，至停蓄不散，此內傷實症也。又或鬱怒動肝，胸脇脹痛，大便不利，脈弦滑，此氣逆實症也。又或惡露未盡，瘀血上冲，心腹脹滿，疼痛拒按，大便難，小便利，此血熱實症也。遇此等實症，若用大補，是養虎為患，誤矣。以上四家之論，俱屬產後治病扼要處。學者當細心體察，再參觀葉先生醫案，更能博考產書以治產後諸病，易如反掌矣。否則如眇能視，不足以有明也。如跛能履，不能與於行也。烏得稱司命哉。秦天一婦人善病，而病由產後者為更多，亦為更劇。產後氣血大虧，內而七情外而六氣，稍有感觸，即足致病，使治之失宜，為患莫測。朱丹溪曰：產後以大補氣血為主，雖有他症，以末治之。此語固為產後症之宗旨，而症實多端，論其常，未盡其變也。醫者惟辨乎脈候，以明內外之因，審乎陰陽，以別虛實之異，病根透徹，而施治自效。慎母以逐瘀為了事，亦毋以溫補為守經。今觀先生案中，凡內因之實症，未嘗不用攻治之劑。然如熱熾昏亂，有似惡露衝心者，先生則曰：陰氣下泄，陽氣上冒，從亡陽汗出，謔語，例為救逆法。如少腹冲及心脘痛而脹滿，有似肝氣犯胃者，先生則曰：產後下虛，厥氣上攻，惟用柔陽之藥，如頭痛汗出，煩渴，有似感冒風寒者，先生則曰：開泄則傷陽，辛熱則傷陰，從仲景新產鬱冒之治，以立方。至於奇經八脈，為產後第一要領，蓋八脈麗於下，產後陰分一傷，而八脈自失所司。溫補鎮攝，在所必先。無奈世人罕知，即有一二講論者，終屬影響模糊。惟先生於奇經之法，條分縷析，盡得精微。如衝脈為病，用紫石英，以為治鎮逆任脈為病，用龜板，以為靜攝督脈為病，用鹿角，以為溫煦帶脈為病，用當歸，以為宣補。凡用奇經之藥，無不如芥投針。若夫外因為病者，風溫入肺，用葶藶湯，甘寒淡滲，以通肺氣。遇寒腹痛，用當歸桂枝湯，辛甘化陽，以和營衛。暑氣上干，則陰虛是本病，暑熱是客氣，清上勿致礙下，便是理邪。如濕傷脾陽，而飲

營絡
結聚
瘕

之熱來陰虛而入營中則已未成瘕也。輕清和解為主。要之先生於內因之症。一尋源探本非同俗手。漫謂補虛於外因之端。種種番變。權不以產後自為荆棘。惟讀書多而胸具靈機。故於丹溪本末二字。尤為神化無迹。此所謂知其要者。一言而終。不知其要者。流散無窮也。案中諸症甚多。學者果能悟焉。則一以貫之矣。真商年

瘕瘕

張久痛在絡。營中之氣結聚成瘕。拾而夜發。繼而晝夜俱痛。陰陽兩傷。徧閱醫藥。未嘗說及絡病。便難液澀。

香燥須忌。青葱管。新絳。當歸鬚。桃仁。生鹿角。柏子仁。

朱六辛潤通絡。成形痰濁。吐出然痰。濁必下行。為順。上湧雖安。恐其復聚。仍宜緩通。以去痰生新為治。無取沉

降急攻。謂怒勞多令人傷陽耳。

當歸 桃仁 羌蔚子 製蒺藜 生鹿角 茯苓 香附汁法丸

周三瘕聚結左。肢節寒冷。病在奇脈。以辛香治絡。

鹿角霜 桂枝木 當歸 小茴 茯苓 香附 葱白

龔脈症向安。辛甘化風方法。非謬。據云。痛時少腹滿脹。其有形。瘕瘕。狀亦略小。法宜益營之中。再佐通泄。其

氣古稱通則不痛耳。人參 當歸 肉桂 吳萸 小茴 茯苓 青葱管

欽 瘕瘕。少腹痛。當歸 生薑 羊肉 桂枝 小茴 茯苓

又瘕痛已止。當和營理虛。歸身 紫石英 白芍酒炒 小茴 淡從蓉 肉桂

歸身 紫石英 白芍酒炒 小茴 淡從蓉 肉桂 丸方用養營去茂。木桂合杞圓膏

朱四瘕瘕。腹痛有形。用柔溫平補。當歸 生薑 羊肉

某右脇攻痛作脹。應時而發。是濁陰氣聚成瘕。絡脈病也。議溫通營絡。

當歸錢 小茴一錢 上肉桂錢 青葱管十

氣血
凝絡
經阻
痛

木火
鬱火
滯血
痰

腎氣
不攝
經阻
腹痛
脹
凝絡
肝逆
嘔痛

譚 痲聚有形高突痛在胃脘心下或垂界腰少腹重按既久痛勢稍定經水後期色多黃白此皆衝脈為病

絡虛則脹氣阻則痛非辛香何以入絡苦溫可以通降

延胡 川棟 香附 鬱金 茯苓 降香汁 羌蔚子 炒山查 烏藥

又 痲聚痲結痛脹防食得食不下痛甚今月經阻不至帶淋甚多病由衝任脈絡擾及肝胃之逆亂若不宣

暢經通日久延為瘰癧矣

炒桃仁 當歸鬚 延胡 川棟子 青皮 小茴 吳萸 紫降香 青葱管

柳二絡血不注衝脈則經阻氣攻入絡聚而為痲乃痛衝脈是陽明屬隸痛升於右脹及中脘作嘔清涎濁沫

操家煩怒犯胃莫如肝泄肝正救胃 金鈴子 炒延胡 蓬莪朮 青橘葉 半夏

厚朴 薑汁 茯苓 又葱白丸二錢艾葉湯送

某 臍下痲形漸大氣塞至心胸及咽喉飲不解渴遂氣攻至背部經水百餘日不來小溲得利大便不爽氣

滯血瘀皆因情志易鬱肝膽相火內灼衝脈之血欲涸丹溪謂氣有餘便是火口甜食後痞用苦辛清降

胡黃連八分 山梔仁半錢 南山查錢 蘆薈錢 雞肫皮不落水去垢 化服回生丹半丸

陸六經阻半年腹形漸大痛不拒按漫短便通據形色脈象不是用通經丸者下氣還攻於絡有形若癥瘕炒

枯腎氣湯

膠 脈弦左搏數年胃痛不痊發時手不可按脇中拘急少腹左傷素有痲聚之形氣自下焦衝起為脹為嘔

此乃驚憂嗔怒致動肝木乘其中土胃傷失降脈絡逆併痛勢為甚初起或理氣獲效久發中裏辛香氣燥

脾胃不勝克伐矣議疎肝木安土為法冀其漸緩再酌後法

川棟子 川連 乾薑 桂枝 當歸 川椒 生白芍 烏梅

又 少腹痲痲多年衝起散漫胃脘兩脇痛甚欲嘔年前用安胃泄肝頗效但下焦至陰足跗發癢裂水久留

濕熱厥留經脈絡中交病若非宣通氣血壅遏恐非至理

枳仁 枳子
為末用青葱管百莖加水一杯取汁法丸

其十數年左脇聚痰發作必嘔吐涎沫酸苦濁水寤不成寐便閉忽瀉始於悒鬱病由肝失暢達木必傳土胃

氣受侮病久入絡氣血兼有緩圖為宜急攻必變脹病 生牡蠣 川棟子肉 延胡 桃仁

半夏 茯苓 橘紅 白芥子 川連 吳萸 香附汁薑汁法丸

趙脈小身不發熱非時氣也凡經水之至必由衝脈而始下此脈胃經所管醫藥消導寒涼不能中病反傷

胃口致衝脈上冲犯胃為嘔攻胸痞塞升巔則昏厥經言衝脈為病男子內疝女子瘕聚今小腹有形兼有

動氣其病顯然夫曰結曰聚皆奇經中不司宣暢流通之義醫不知絡脈治法所謂愈窮矣

鹿角霜 淡菴蓉 炒當歸 炒小茴 生杜仲 茯苓 用紫石英一兩煎湯煎藥

蔣天登將止之年小腹厥陰部位起瘕動則滿腹脹痛形堅或時脊巔掣痛必有穢痰血筋吐出此起於鬱

傷久則液枯氣結內風陽氣煩蒸則心執痞結咽阻已屬痼疾治必無效倘腹大中滿則劇矣

牡蠣 生地 阿膠 小胡麻 茯苓 檀豆皮

沈四肢冷腹痛有形為瘕久瀉 當歸 小茴 黑炒 土肉桂 山查 黑炒 茯苓

又冷痢有瘕遇冷則嘔 吳萸 炒小茴 延胡 茯苓 川棟子 生香附

某脘中瘕聚 川棟子 延胡 吳萸 青皮 良薑 茯苓

林脈左強瀉少腹攻逆痛即大便肝氣不疎厥陰滯積 青皮 炒查肉 砂仁 穀 麥芽

又香附 雞肫皮 茯苓 香櫞皮 青皮 炒查肉 砂仁 穀 麥芽

程聚氣疝瘕大便不爽必腹中疴痛當通腑經氣分 葱白 九二錢五分紅棗湯送

川棟子 小茴 生牡蠣 桂枝 木 生白芍 青皮

藥中方論 平正清切 又極和潤 無燥烈 有刑等弊 多有不凝 者而不可 丸煎等膏 法必不則 味必則全

勞乾食寒腹温 血減熱脹熱 濕熱 痰氣 傷脾 傷胃

又 做朱南意以濁攻濁 韭白根去錢 兩頭尖粗 炒香橘核錢 小茴香分 金鈴子肉錢

又 瘕聚已解用八珍丸加香附小茴白花益母膏丸
某 瘕聚在左脇中肝病 桃仁 川棟子 延胡 當歸 橘紅 香附
王四 瘕聚李脇漸加煩倦減食入夏土旺氣泄用泄少陽補太陰方

周 痛久在路凝聚成形仍屬經病議用河間法 川棟子 瓜蒌皮 香附汁 延胡 生牡蠣
又 理氣豁痰痛止思食仍以前法參用 半夏 瓜蒌皮 香附汁 生牡蠣 橘紅 香豉

葛四 用丹溪小温中丸脹利自減知腸胃濕熱皆阻腑陽之流暢水穀之氣不主游溢瘕屬氣聚瘕為血結由
無形釀為有形攻堅過急藥先入胃徒致後天氣之恐脹病必至矣俗有痞散成蠱之說可以治此病之戒

律 老韭根生晒 桃仁兩 生香附兩 炒查肉兩 當歸鬚兩 山甲片兩 小茴香錢 桂枝木錢

胡二 少腹聚瘕能食便不爽腹微脹 小温中丸
王二 初病寒熱半年經水不來少腹已有瘕形食又減半當此年犯乾血勞慮

焦朮 茯苓 廣皮 香附 當歸 南山查 白石

夫瘕者徵也血食凝阻有形可徵一定而不移瘕者假也臟氣結聚無形成假推之而可動昔有七瘕八

瘕之說終屬強分名目不若有形無形之辨為明的也二症病在肝脾而胃與八脈亦與有責治之之法

即從諸經再究其氣血之偏勝氣虛則補中以行氣氣滯則開鬱以宣通血衰則養營以通絡血瘀則入

絡以攻痺此治瘕瘕之大略古方甚多而葱白丸烏雞煎丸尤為神效瘕瘕之外更有瘕痺腸覃石瘕內

疝等症古人論之已詳茲不必贅今參生方案如營傷氣阻者於益營之中佐通泄其氣如絡虛則脹

氣阻則痛者以辛香苦温入絡通降又如肝胃兩病者以泄肝救胃肝胃脾同病者則扶土制木肝臟之

斷不能除也
凡治病通
會語亦可
厭向人不
如此人有
近時之名
醫浙江則
有江則
不外人參
數味并此
亦不能知
若略知此
等議論者
屬陳言耳
此藥胡對
症為千古
一定之成
法舍此俱
為邪說
熱入血室
柴胡湯為
古方此十
定法不用
柴胡湯見
治痰疾亦
從不一用
口登聲
惟崇仲景
則親如伏
專與相背
真令人不

熱邪
內陷
液傷
發瘧

胃兩經主治以疎降溫通凡此悉靈機法取藥不安投總之治厥履之要用攻法宜後其曲用補法忌呆上逆則想肝臟衝病之源頭下垂則究中氣陰邪之衰旺吞酸吐水必兼剛藥液枯腸結當祖滋營再辨脈象之神力形色之枯澤致病之因而則治法自然無誤矣 醫商年

熱入血室

沈氏溫邪初發經水即至寒熱耳聾乾嘔煩渴飲見症已屬熱入血室前醫見咳救脈數古白為溫邪在肺用

辛涼輕劑而煩渴愈甚拙見熱深十三日不解不獨氣分受病况體質素虛面色黯慘恐其邪陷煙厥三日前已經發瘧五液暗耗內風掀旋豈得視為渺小之恙議用玉女煎兩清氣血邪熱仍有救陰之能

玉女煎加竹葉心武火煎五分

又 脈數色黯舌上轉紅寒熱消渴俱緩前主兩清氣血伏邪已得效驗大凡體質素虛驅邪及半必兼護養

元氣仍佐清邪腹痛便瀉和陰是急 白芍 炙草 人參 炒麥冬 炒生地

又 脈右數左虛臨晚微寒熱 復脈湯去薑桂

吳氏熱病十七日脈右長左沉古瘦飲冷心煩熱神氣忽清忽亂經來三日病患血舍內之熱氣乘空內陷當

以厥熱在裏論病但病已至危從蓄血如狂例

細生地

丹皮

製大黃

炒桃仁

澤蘭

人中白

攷熱入血室金匱有五法第一條主小柴胡因寒熱而用雖經水適斷急提少陽之邪勿令下陷為最第

二條傷寒發熱經水適來已現晝明夜劇謔語見鬼恐人誤認陽明實病故有無犯胃氣及上二焦之戒

第三條中風寒熱經水適來七八日脈遲身痛胸脇滿如結胸狀謔語者顯無表症全屬熱入血室之候

自當急刺期門使人知針力比擬 尤捷第四條陽明病下血謔語但頭汗出亦為熱入血室亦刺期門

汗出而愈仲景無非推廣其義教人當知通變第五條明其一症而有別因為言知痰潮上腕脊骨不知

當先化其痰後除其熱等語所謂急者先除也乃今人一遇是症不辨熱入之輕重血室之盈虧遽與小

解此老
皆用藥
胡湯置
於死深
抱死從
畏之如
不敗再
矣不何
遇至此
向時開
書觀此
案每多
借偏之
談而理
道亦有
不賞其
今所刻
案不但
理通蓋
之筆力
淨明近
日時文
亦不能
其萬一
知原文
未如是
也之案
孔雖不
宜絕大
以未飲
冷生疾
錄出諸
藥戒人
何輕用

茶胡湯貽害必多。要之熱甚而血瘀者與桃仁承氣及山甲歸尾之屬血含空而熱陷者用犀角地黃湯加丹參木通之屬表邪未盡而表症仍兼者當合乎和解熱輕而清藥過投氣機致鈍者不妨借溫通為使血結胸有桂枝紅花湯參入海蛤桃仁之治昏狂甚進牛黃膏調入清氣化結之前再觀案中有兩解氣血燔蒸之玉文法熱甚陰傷有育陰養氣之復脈法又有護陰滌熱之緩攻法先聖後賢其治總條分縷析學者審症製方慎毋拘泥乎茶胡一法也 邵新甫

幼科要畧

按穉穉小兒體屬純陽所患熱病最多世俗醫者固知謂六氣之邪皆從火化飲食停留鬱蒸變熱驚恐內迫五志動極皆陽奈今時治法初則發散解肌以退表熱仍混入消導繼用清熱苦降或兼下奪再令病家禁絕乳食每致胃氣索然內風來乘變見驚癇告斃甚多附記世俗通食之方藥於左不可不知不足取法

防風 荊芥 葛根 前胡 桔梗 木通 赤芍 藟子 厚朴 陳皮

山查 麥芽 枳殼 神麩 鈎藤 夏佐香蒿冬佐麻黃羌活

兩三日熱不解 茶胡 前胡 黃連 黃芩 山梔 連翹 薄荷 葛根

木通 鈎藤 厚朴 枳實 瓜蒞實 丸劑必用大黃

四五日不解但言食滯未盡表裏不和總以柴芩小陷胸若嘔逆煩渴用竹茹黃連半夏若痰多喘促即用

葶藶杏仁蘇子藟子膽星貝母甚者加牛黃此皆食法所當戒也

屢清消不愈便無方法苟不變驚必曰骨蒸孩勞所用藥餌不分氣血陰陽但知見症施治如早涼暮熱必

用地骨皮 丹皮 生地 元參 甘草 北沙參 石斛 知母

有痰加 蘇子 杏仁 貝母 橘紅 膽星 桔梗

其鈎藤石斛茯苓藟子之屬每劑必用總之取無故疲藥待其自愈倘有變症希冀掩飾而已愚按是兒肌肉未脫不耐風寒六腑五臟氣弱乳汁難化內外二因之病自多然有非風寒竟致外感不停滯

不出此語
則前後
相宜矣
知此等藥
總在不用
存則不
在則不
有出必
錄出必
及啟後
秘之也

皆止論也

已屬內傷其故何難言思人在氣交之中春夏地氣之升秋冬天令之降呼吸出入與時消息間有微瀆以入即是三焦受邪過募原直行中道必發熱煩燥倘幼醫但執前藥表散消導清火通便病輕或有倖成病重必然顛覆錢仲陽云真履不可近襪襪小兒余言非無據矣四十年來治效頗多略述其概云
夫春溫夏熱秋涼冬寒四時之序也春應溫而反大寒夏應熱而反大涼秋應涼而反大熱冬應寒而反大溫皆不正之乖氣也病自外感治從陽分若因口鼻受氣未必恰在足太陽經矣大凡吸入之邪首先犯肺發熱咳嗽口鼻均入之邪先上繼中咳嗽必兼嘔逆膈脹雖因外邪亦是表中之裏設宗世醫發散陽經雖汗不解幼穉質薄神怯日期多延病變錯綜茲以四氣常法列左

伏氣

春溫一症由冬令收藏未固昔人以冬寒內伏藏於少陰入春發於少陽以春木內應肝膽也寒邪深伏已經化熱昔賢以黃芩湯為主方若寒直清裏熱熱伏於陰苦味堅陰乃正治也知溫邪忌散不與暴感門同法若國外邪先受引動在裏伏熱必先新涼以解新邪繼進苦寒以清裏熱况熱乃無形之氣幼醫多用消滯攻治有形胃汁先涸陰液劫盡者多矣

備用方 黃芩湯

葱豉湯 新邪引動伏邪

涼膈散

清心涼膈散

風溫

春溫者春月受風其氣已溫經謂春氣病在頭治在上焦肺位最高邪必先傷此手太陰氣分先病失治則入手厥陰心胞絡血分亦傷蓋足經順傳如太陽傳陽明人皆知之肺病失治逆傳心胞絡幼科多不知者俗醫見身熱咳嗽不知肺病在上之旨妄投荆防柴葛加入枳朴杏蘇藟子查麥廣皮之屬亂云解肌消食有見痰喘便用大黃礞石滾痰丸大便數行上熱愈結幼穉穀少胃薄表裏苦辛化燥胃汁已傷復用大黃大苦沉降丸藥致脾胃陽和傷極陡變驚癇莫救者多矣
按此症風溫肺病治在上焦大風溫春溫忌汗初病投劑宜用辛涼若雜入消導發散不但與肺病無涉劫

正論

急救非此不可

大順散乃治暑月傷冷之方也何得連類及之

補臣言

盡胃汁肺之津液上供頭目清竅徒為熱氣薰蒸鼻乾如煤目瞑或上氣無淚或熱深肢厥狂躁瀉胸高氣促皆是肺氣不宣化之徵斯時若以肺藥少加一味清降使藥力不致直趨腸中而上痺可開諸竅自爽無如城市庸醫僉云結胸皆用連萸葉枳苦寒直降致閉塞愈甚告斃甚多

按此症初因發熱喘嗽首用辛涼清肅上焦如薄荷連翹牛蒡象貝桑葉沙參梔皮薑皮花粉若色蒼熱勝煩渴用石膏竹葉平寒清散痧症亦當宗此若日數漸多邪不得解於連涼膈亦可選用至熱邪逆傳入膈中神昏目瞑鼻竅無涕淚諸竅欲閉其勢危急必用至寶丹或牛黃清心丸病減後餘熱只甘寒清養胃陰足矣 備用方 葦莖湯 清心涼膈散 涼膈散 瀉白散

夏熱

葦蕒大葉湯 白虎湯 至寶丹 清心牛黃丸 竹葉石膏湯 喻氏清燥救肺湯

夏為熱病然夏至已前時令未為大熱經以先夏至病溫後夏至病暑溫邪前已申明暑熱一症幼醫易眩夏暑發自陽明古人以白虎湯為主方後賢劉河間創議迴出諸家謂溫熱時邪當分三焦投藥以苦辛寒為主若拘六經分症仍是傷寒治法致悞多矣蓋傷寒外受之寒必先從汗解辛溫散邪是已口鼻吸入之寒即為中寒陰病治當溫裏分三陰見症施治若夫暑病端方甚少皆因前人略於暑詳於寒且考古如金匱暑暈之因而潔古以動靜分中暑中熱各具至理茲不槩述論幼科病暑熱夾雜別病有諸而時下不外發散消導加入香薷一味或六一散一服考本草香薷辛溫發汗能泄宿水夏熱氣閉無汗渴飲停水香薷必佐杏仁以杏仁苦降泄氣大順散取義若此長夏濕令暑必兼濕暑傷氣分濕亦傷氣汗則耗氣傷陽胃汁大受劫燬變病由此甚多發泄司令裏真自虛張鳳達云暑病首用辛涼繼用甘寒再用酸泄酸飲不必用下可稱要言不煩矣然幼科因暑熱蔓延變生他病茲摘其要

受熱厥逆

夏令受熱昏迷若驚此為暑厥即熱氣閉塞孔竅所致其邪入絡與中絡同法牛黃丸至寶丹芳香刺激可救

神麩以後用清涼血分如連翹心竹葉心玄參細生地鮮生地二冬之屬此症初起大已風藥初病者氣傷寒也
氣竹葉石膏湯或清肺輕劑大凡熱深厥深四肢逆冷但看面垢齒燥二便不通或瀉不爽為是大忌誤認

〔疳〕

幼兒斷乳納食值夏月脾胃主氣易於肚膨泄瀉頭熱手足心熱形體日瘦或煩渴善食漸成五疳積聚當蓄
體之強弱病之新久有餘者當疏胃清熱食人糞色白或不化當健脾佐消導清熱或濕熱內鬱蟲積腹痛
導滯驅蟲微下之緩調用肥兒丸之屬

〔疔〕

夏季秋熱小兒泄瀉或初愈未愈滿口皆生疔蝕嘗有阻塞咽喉致危者此皆在裏濕盛生熱熱氣蒸灼津液
不升濕熱偏傷氣分治在上焦或佐淡滲世俗常刮西瓜翠衣治疔取其輕揚滲利也

〔脹〕

夏季濕熱鬱蒸脾胃氣弱水穀之氣不運溫着內蘊為熱漸至浮腫腹脹小水不利治之非法水濕久漬逆行
犯肺必生咳嗽喘促甚則坐不得卧俯不能仰危期速矣大凡喘必生脹脹必生喘方書以先喘後脹者治
在肺先脹後喘者治在脾亦定論也金匱有風水皮水石水正水黃汁以分表裏之治河間有三焦分消子
和有歷積逐水皆有與義學者不可不潛心體認難以繁述開近代世俗論水濕喘脹之症以內經開鬼門
取汗為表治分利小便潔淨府為裏治經旨病能篇謂諸濕腫滿皆屬於脾以健脾燥濕為穩治治之不效
技窮束手矣不知凡病皆本乎陰陽通表利小便乃宣經氣利肺氣是陽病治法暖水臟溫脾腎補方以驅
水是陰病治法治肺痺以輕開上治脾必佐溫通若陰陽表裏乖違臟真日瀉陰陽不運亦必作脹治以通
陽乃可奏績如局方禹餘糧丸甚至三焦交阻必用分消腸胃壅塞必用下奪然不得與傷寒實熱同例擅
投硝磺枳朴擾動陰血若大陰脾臟飲濕阻氣溫之補之不應欲用下法少少甘遂為丸可也其治實症選

諸方亦即
太極不可
輕用

古人治瘧
獨重柴胡
此老獨不
用柴胡次
夏此老亦
不用半夏
原古相傳
於定法即
此一端其

用方法備採 備用方 葶藶大棗湯 瀉白散 大順散 牡蠣澤瀉散 五苓散

越婢湯 甘遂半夏湯 控涎丹 五子五皮湯

子和桂苓湯 禹功丸 茯苓防已湯 中滿分消湯 小青龍丸 木防已湯

附記一徐姓小兒單脹數月。幼科百治無功。食用肥兒丸萬安散磨積丸殺蟲丸雞脆藥俱不效。余謂氣分不效宜治血絡。所謂絡瘀則脹也。用歸鬚桃仁延胡山甲蜈蚣麝香靈脂山查之類為丸。十日全愈。

吐瀉霍亂

吐瀉一症。幼兒脾胃受傷。隨變驚搐最多。若是不正穢氣觸入。或口食寒冷。套用正氣散六和湯五積散之類。正氣受傷。肢冷呃逆。嘔吐自利。即用錢氏益黃散。有痰用星附六君子湯。理中湯等。倘熱氣深伏。煩渴引飲。嘔逆者。連香飲黃連竹茹半夏橘皮湯。熱閉神昏。用至寶丹寒閉用來復丹。

食瓜果泄瀉

稱年夏月食瓜果水寒之濕。着於脾胃。令人泄瀉。其寒濕積聚。未能遽化熱氣。必用辛溫香散之氣。古方中消瓜果之積。以丁香肉桂或用麝香。今七香餅治瀉亦祖此意。其平胃散胃苓湯亦可。

瘧

瘧因暑發居多。方書雖有痰食寒熱瘧之互異。幼穉之瘧。都因脾胃受病。然氣怯神弱。初病驚癇。厥逆為多。在

夏秋之時。斷不可認為驚癇。大方瘧症須分十二經。與效症相等。若幼科庸俗。但以小柴胡去參。或香薷葛根之屬。不知柴胡動肝陰。葛根竭胃汁。致變屢矣。幼科純陽暑為熱氣症。必熱多煩渴。邪自肺受者。桂枝白

虎湯。二進必愈。其有冷食不運。有足太陽脾病見症。初用正氣。或用辛溫。如草果生薑半夏之屬。方書謂草果治太陰獨勝之寒。知母治陽明獨勝之熱。瘧久色奪。唇白汗多。餒弱。必用四獸飲。陰虛肉熱。必用驚甲首

烏口母。便漸瘳者。忌用。久瘧營傷寒。勝加桂薑。擬初由未瘧門用藥於左。

此一端其

宜辛涼輕劑 連翹 薄荷 赤芍 羚羊角 蔓荊子 滑石
粉 煩渴用竹葉石膏湯款甚則用黃芩黃連山梔

夏季身痛屬濕 羌防辛溫厚宜用木防已蚕沙

暑熱邪傷初在氣分日多不解漸入血分反渴不多飲唇舌絳赤黃芩青知不應必用血藥諒佐清氣熱一

味足矣 輕則用青蒿 丹皮 犀角 竹葉心 玄參 鮮生地 細生地

木通 亦能發汗 淡竹葉 若熱久痞結瀉心湯選用

又夏月熱久入血最多蓄血一症言語昏狂者法以小便秘清長者大便必黑為是桃仁承氣湯為要藥幼穉

瘧久面腫腹膨泄瀉不欲食或囊腫或跗腫必用東垣益氣以升陽倘脾陽消墮前方不應用理中湯或錢

氏益黃散得效二三日須投五苓散一二日再與異功參苓白朮散之類必全好 徐忠可註金匱有云幼

兒未進穀食者患瘧久不止用水糖濃湯余試果驗

瘧多用烏梅以酸泄木安土之意用常山草果乃劫其大陰之寒以常山極走使二邪不相併之謂用人參

生薑日露薑飲一以固元一以散邪取通神明去穢惡之氣總之久瘧氣餒凡壯膽氣皆可止瘧未必真有

瘧鬼又瘧邪既久深入血分或結瘧母驚甲煎丸設用煎方活血通絡可矣

痢疾一症古稱滯下蓋裏有滯濁而後下也但滯在氣滯在血冷傷熱傷而滯非一今人以滯為食但以消食

併令禁忌飲食而已

夫瘧痢皆起夏秋都因濕熱鬱蒸以致脾胃水穀不運濕熱灼氣血為粘膩先痛後痢痢後不爽若偶食瓜

果水寒即病未必即變為熱先宜辛溫疎利之劑若膿血幾十行疔痛後重初用宣通驅熱如芩連太黃必

加甘草以緩之非如傷寒裏堅須用芒硝礮以裏堅直走破泄至陰此不過苦能勝濕寒以逐熱足可却病

古云行血則便膿愈導氣則後重除行血涼血如丹皮桃仁延胡黑查歸尾紅花之屬導氣如木香檳榔青

幼科

龍文書局文印

皮枳朴廣皮之屬。世俗通套不過如此。蓋瘧傷於經。猶可延挨。痢關乎臟。慎治必危。診之大法。先明體質強弱。肌色蒼嫩。更詢起居致病因由。初病體堅。症實。前法可遵。久病氣餒神衰。雖有腹痛後重。亦宜詳審。不可藥以攻積。清查施治。聊附記一治驗備考。

施姓子年七歲。七月二十三日。天久雨陰晦。遂發泄瀉數次。越日腹痛。下痢紅白。延幼科二人調治。五六日至初二日。余診之。嘔逆不食。下痢無度。都是血水。其腹痛晝夜無寧。刻兩脈俱細。右瀆欲歇。坐次鼻聞藥氣。乃大黃氣。令其勿進。施云有二醫在。枉先生一商。何如。余咤之。人書室索方。一醫曰。下痢已來。全無糟粕。若非攻蕩去積。無別法可投。余曰。肢冷下血液。七八日痛不飲。水望面色枯白。中極氣黯。脈形細。要按之不鼓。明是冷濕中於太陰。仲景太陰九法。亦不用下。乃急煎人參炙草炮薑歸芍陳皮少佐肉桂二劑。垢滯得下。痛痢大減。繼以歸芍異功散。參苓白朮散。半月全安。

噤口不納水穀。下痢都因熱升濁攻。必用大苦如芩連石蓮清熱。人參參同道清熱之藥。用便為合度。輔胃益氣。熱氣一開。即能進食。藥宜頻頻進二三口。

小兒休息久痢。變為毒後下血。最難速愈。有因氣弱下陷者。補中益氣。虛寒飲食不化者。錢氏益黃散。濕熱未淨。氣分延虛者。清暑益氣湯。胃強善食者。苦寒清熱。更節飲食。須善調經月。

久瀉久痢。必傷及腎。以腎司二便也。必肛門後墜不已。與初病濕熱裏急下重不同。治以攝陰液。或佐疎補。久則純與攝納。

小兒熱病最多者。以體屬純陽。六氣著。氣血皆化為熱也。飲食不化。蘊蒸於裏。亦從熱化矣。然有解表已復熱。攻裏熱已復熱。利小便愈後復熱。養陰滋清熱亦不除者。張季明謂元氣無所歸著。濕淨則條熱矣。六神湯主之。

秋燥

此症乃因攻下之度正氣太虛。脾氣欲脫。故爾得效。今人於初病實症。即用此方。則大誤矣。若一概如此。則此老之罪人也。

秋燥

今感傷性任夏熱發泄之後其體質之虛實不同任滋

認暴感風寒混投三陽發散津劫燥甚喘急告危若果暴涼外束身熱痰嗽只宜蔥豉湯或蘇梗前胡杏仁

枳桔之屬僅一二劑亦可更有粗工亦知熱病與瀉白散加苓連之屬不知愈苦助燥必增他變當以辛涼

甘潤之方氣燥自平而愈慎勿用苦燥劫燥胃汁

秋燥一症氣分先受治肺為急若延綿數十日之久病必入血分又非輕浮肺藥可醫須審體質症端古謂

治兩當活潑潑地如盤走珠耳

翁姓子方數月秋燥潮熱咳嗽如瘧幼科用發散藥二日不效忙令禁乳更醫用瀉白散更加苓連二日晝

夜煩熱喘而不咳下痢粘膩藥後竟痢藥水延余診之余日穉年以乳食為命餓則胃虛氣餒肺氣更不爽

矣與五竹甘草炒廣皮竹葉心一劑熱緩繼與香粳米南棗廣皮甘草沙參二錢與乳少進合夜抱勿倒三

日全愈

〔冬寒〕

深秋入冬暴冷折陽外感發熱頭痛身痛嘔惡必從太陽若渴能飲水者裏熱見症即非純以表散傷寒每以

風傷衛用桂枝法寒傷營用麻黃法小兒肌疎易汗難任麻桂辛溫表邪太陽治用輕則紫蘇防風一二味

身痛用羌活然不過一劑傷風症亦肺病為多前杏枳桔之屬辛勝即是汗藥其葱豉湯乃通用要方若肢

冷寒戰嘔吐自痢或身無熱即從中寒裏症三陰須分但小兒科太陽中寒最多厥陰間有若冬令應寒氣

候溫煖當藏反泄即能致病名曰冬溫溫為欲熱之漸非寒症得汗而解若涉表邪一二裏熱必兼七八是

癰疹丹痧非徒風寒或外受之邪與裏邪相薄亦令鬱於經絡或飲醢厚味裏熱熾烈而胃氣不與營分相

和或不正直入內侵即有腹痛下痢諸症其治法按症必以裏症為主稍兼清散有諸設用辛溫禍不旋踵

矣至於痧痘時癘須分四氣也

〔看三關法〕

滑氏云小兒三歲已內者男左女右手虎口三節曰三關紋色紫熱紅傷寒青驚風白肝病黃色淡紅乃平常小恙其筋紋宜藏不宜暴露若見黑色則為危險再脈紋見下截風關為輕中截氣關為重上截命關為尤重耳直透三關為大危

痧疹 痧子 吳音 瘡子 浙江 疹 北音 丹

痧屬陽腑經邪初起必從表治症見頭痛喘急咳嗽氣粗嘔惡一日二日即發者輕三五日者重陽病七日外隱伏不透邪反內攻喘不止必腹痛脹秘悶危矣治法宜苦辛清熱涼膈去硝黃方書謂足陽明胃疹如雲佈密或大顆如痘但無根盤方書謂手太陰肺疹但有點粒無片片者用辛散解肌冬月無汗壯熱喘急用麻杏如華蓋散三拗湯夏月無汗用辛涼解肌葛根前胡薄荷防風香薷牛蒡枳桔木通之屬

古人以表邪口渴即加葛根以其升陽明胃津熱甚煩渴用石膏辛寒解肌無汗忌用凡瘡疹辛涼為宜連翹辛涼翹出眾草能升能清最利幼科能解小兒六經諸熱春令發痧從風溫濕夏季從暑風暑必兼熱秋令從熱燥燥氣冬月從風寒

痧宜通泄泄瀉為順下痢五色者亦無妨惟二便不利者最多必症治法大忌止瀉痧本六氣客邪風寒暑濕必從火化痧既外發世人皆云邪透孰謂出沒之際升必有降勝必有復常有痧外發身熱不除致咽啞齟腐喘急腹脹下痢不食煩燥昏沉竟以告斃者皆屬裏症不清致變須分三焦受邪孰多或兼別病累痺須細體認上焦藥用辛涼中焦藥用苦辛寒下焦藥用酸寒上焦藥氣味宜

以輕肺主氣皮毛屬肺之合外邪宜辛勝裏甚宜苦勝若不煩渴病日多邪鬱不清可淡滲以洩氣分中焦藥痧火在中為陽明燥化多氣多血用藥氣味苦寒為宜若日多胃津消燥苦則助燥劫津甘寒宜用

下焦藥鹹苦為主若熱毒下注成痢不必鹹以突堅但取苦味堅陰燥濕古人以痧為經腑之病忌溫忌瀉補所謂痘喜溫暖痧喜清涼也然常有氣滯體虛者散寒非去其

此是秘訣

雷用清滌邪之法

此老用藥

重氣味

經即神

本草亦

日列之但

當深知

功能然後
再於其中
擇氣味之
合者而用
之方得內
經本草之
旨若徒知
其氣味則
終無主見
也

小兒外治
之法最多

庸醫惟知
此二家

痘症因時
而變不但
歷代不同
隔數十年
亦有小變
錢仲陽時
所說痘症
症形與今
大不相同
其方亦迥
別神而明
代之言而
來觀之也

句句真傳

成損法。但陰傷為多。救陰必扶持胃汁。氣衰者亦有之。急當益氣。穉年陽體純剛之藥。忌用幼科方書歌括。曰。赤疹遇清涼。而消。白疹得溫暖而解。此溫字。即後人酒釀。檉木粗草紙木棉紗之屬。雖不可不知。然近年用者多無益。

痧疖。濕盛熱蒸。口舌咽喉疳蝕。若不速治。有空腮破頰。咽閉喘促告斃矣。治之宜早。外治亦另有竒方。若湯藥方法。必輕淡能解上病。或清散亦可。

痧痢乃熱毒內陷。與傷寒協熱邪盡則刺止同法。忌升提。忌補瀉。輕則分利宣通。重則苦寒解毒。

痘

論痘首推錢仲陽陳文中二家。錢用寒涼。陳用溫熱。確乎相左。丹溪祖錢非陳。分解毒和中安表為要。以犀角地黃湯為主方。舉世宗之。莫敢異議。後之萬民。以脾胃為主。魏氏以保元為主。皆從二家脫化。費建中救偏。悉以石膏大黃。胡氏輒投汗下。松江東地多宗秦鏡明。京口江甯咸推管樞保赤。吾蘇老道翁仲仁金鏡錄。可謂家喻戶曉者。其取長在者。不在乎治。看法精確。有可以前知之巧妙。後之翟氏聶氏。深以氣血盈虧解毒化毒。分晰闡揚。錢陳底蘊。超出諸家。因分別太多。讀者目眩心憤。不若翁仲仁芻蕘悅口也。然眼目之功。須宗翁氏而彙治。講究參之諸家可矣。姑舉看法。

大凡發熱三日而後見標。是其常。即以熱勢參詳見症。定其吉凶。翁仲仁金鏡錄甚明。茲不復贅。其未刻悉補入。傷寒邪由外入。痘子熱從內起。但時邪引動而出。與傷寒兩途。

週歲小兒。初熱即現。驚搐昏迷之狀。最多。世俗謂驚痘最好。此言未必皆然。方書云。先驚後痘者生。先痘後驚者死。頻頻驚厥。最多。悶痘。蓋痘由腎至肝。至心脾及肺。自裏至外。自深及淺。未發之前。痘熱先已內動。目現水晶光。芒。腎熱也。水生木而入肝。木生火而入心。火生土而入脾。土生金而入肺。其先天痘毒。從至陰以達陽。全藉身中元氣鎖載充長。以化毒為漿。漿必膿。厚蒼老而始結痂。毒已外洩。元氣內返。斯無變症。週歲已內身小元弱。常有熱一日即出。亦有慎痘。但須看神氣靜躁。熱勢輕重。見點徐徐而出。既出即長。熱緩安。

增
龍文書局校印

此乃痘中
兼症非明
於內外者
不能

乳便是好症若神氣雖安熱亦不盛痘點雖不多形呆色鈍或作頭尖足落脈懈不束筋骨隱隱數息或短氣如喘或嘔或瀉最多悶症

若三二日間痘苗已長色亦頗好竟夜終日煩燥不止最防隱處發疔及發斑夾疹等症

一發熱煩燥標點雖見熱躁愈加細詢無息再參兼症為六氣鬱遏者從時氣治為內傷停滯者從裏症治亦有表裏兩解治亦有下奪者但下法寒涼之中必須活血理氣防其凝滯冰伏

初起必三次而出熱止即齊其贈點亦有陸續發出者須省顏色靈活生氣頃刻轉機變化為要察形辨症治法用藥表藥活血疎肌次則涼血解毒實熱便閉者微下之虛弱氣怯者忌進疎解寒涼間有虛寒弱穉

初發身不大熱四肢皆冷吐乳瀉乳痘點不長聞聲恇憊欲絕望色慘淡無形恰在一二朝間余見程氏女年甫半齒佈痘極多痘形變色淡白前症迭見近地幼科僉用荆防姜蟬紅花查肉木通胡荽蒼朮之屬方雖寫而示以凶危延余診視余曰毒重氣虛法在不治但身無熱見症虛寒不因癘氣表邪焉用表藥若萬氏始終以脾胃為主以理中湯加丁桂與服一劑肢暖嘔止再服利緩痘起再用參歸鹿茸二服以錢氏異功散而愈

凡省痘先論兒體強弱辨肌色如色白多氣虛色蒼多血熱形象疔羸有宿病或渴乳肌柔白嫩者痘必鮮明蒼黑皮粗者色必暗晦羸瘦病質色燥形枯必須辨依期長養內症安和病軀出痘即平常無奇亦難調理歌訣云形體羸瘦骨如柴肌肉枯焦神思衰遍體鋪排如此痘縱能發足亦堪嗟

一初見腰痛足尖不能起立者死此毒伏於腎
一初見腹脹胸高續增喘噓者死
一初見目睛呆瞪或暗無光或黑白高低皆屬緊閉症
一初見痘煩躁不止即防疔斑疔必現於隱處多死

一初見腹脹胸高續增喘噓者死
一初見目睛呆瞪或暗無光或黑白高低皆屬緊閉症
一初見痘煩躁不止即防疔斑疔必現於隱處多死

必有此二
句後方可
用

一初見痘不續發。斑色深紫。漸變藍黑。六日內死。

一初見痘紫斑漸起。痘反隱伏。此名紫斑白悶。

一初見痘。痘斑間雜。若似洒珠點墨。必死。

已上皆論初見者法。以定凶危。發齊熱退後。皆無諸惡症。翁仲仁云。三日四日。痘出當齊。點至足心。勢方安靜。若論幼小之兒。氣血易週。常有未及三日而發齊者。年長之體。四日已外。猶有贈發者。痘子稀少。數不盈百。不必點至足心。仲仁大意。謂發齊安靜無慮。變症。然須辨明痘形。痘形是何等呈色。身體強壯。痘屬上中。方可許其無慮。倘幼小弱質。或病後。或帶別病。而後佈痘。未可見痘好浪許。再以冬夏氣候審詳。可以百千無誤。

今世用方 初見宜解肌疎表通套法十六味

荊芥四日不用

防風三日不用

前胡三日不用

牛蒡四日不用

紫草二三日便滑忌

本通

紅花

甘草

赤芍

天蟲

查肉

川芎

連翹

桔梗

廣皮

蟬蛻三四日不用

方書中未見點用升麻葛根湯。今人不用。伍氏方法。見點忌升麻。

後人謂葛根表疎亦忌。此輕揚升衣通套藥。若裏症急須兩解。

伍氏方。一二日羌防透肌湯。今人不用。惡其辛溫氣雄也。

一二日壯熱氣促。煩渴便秘。痘粒不發。翁仲仁云。若非風寒壅遏。定是氣虛不振。愚謂近世佈痘。每盛發於君相風木燥金司令。蓋非火不發也。火鬱發之升陽散火是已。但前痘若裏熱甚重。煎灼脂液。苟非苦寒下奪。佐以升表。不能用也。費建中方頗為中的。石

膏 大黃 連翹 赤芍 青皮腹痛用 查肉 花粉 紫草 木通 丹皮平涼入血 犀角平涼通血發齊

後用黃連

凡寒涼清火解毒。必佐活血疎暢。恐凝滯氣血也。實熱便秘通用

涼膈 通聖 前胡枳殼湯 四順清涼飲

幼科

龍文書局校印

痘四日發。是伍氏遵古方。用牛蒡熟末三分。用葶藶汁酒釀燉熟。調勻。臨服刺入生雞冠血十餘滴。與服毒輕者。即起光潤之色。世皆宗之。

發齊已四五日。用涼血解毒湯藥。伍氏名四聖飲。非扁鵲原方。

生地

連翹

銀花

紅花

甘草

天蟲

桔梗

紫草

便滑用

血熱加丹皮犀角

火盛加黃連石膏羚羊角

有斑加金汁元參

頭面不起加川芎雞冠血

咽喉

痛加射干元參山豆根

狂亂躁擾加地龍汁

毒重血凝加猪尾血冰片量兒大小用

近世涼血解毒多用地丁銀花湯煎藥

凡有痘。初起要根盤。其痘易長綻。倘尖瘦不肥。多險。成漿之後。務要根盤即化。一線圈紅紫附。頂滿滾圓。是為毒化。若頂陷頂皺。根盤點殞。其毒與血氣交凝。實宜攻虛宜補。

實火宜清。攻不宜早。者來火色大赤。痘形色濕潤。方可攻托。否則搔擦立至。乾剝毒陷不治。

虛有血虛氣虛之分。血虛為熱。氣虛為寒。但虛熱與實熱不同。虛熱用滋清方藥。

痘頂屬氣。根盤屬血。氣領血載。毒得煨煉化漿。凡體強質實者。多火。以清涼之劑。火解漿成。慢補則癰。癰者壅也。其氣虛血弱。色必淡白。形不雄偉。或頂陷。或皮皺。內症則惡心。少食便溏。年少未進穀食者。腸胃薄。為最多虛症。七日以來。元氣用事。不能勝毒。使之外出。多有內陷致變者。余最究心是症。調之應手取效。魏氏保元湯。聶氏參歸鹿茸湯。陳氏木香異功散。腸滑不禁。用七味豆蔻丸。白朮散。理中湯。多獲奇效。甚者必用三服。

大凡兒肌白嫩者。多虛症。蒼黑者。多實火。雖為大緊。亦屬至要。白嫩發痘。色必鮮豔。勿謂便是善症。蒼黑發痘。色必晦昧。勿便許為凶。總以神氣安靜。顏色日換。形象漸長。便吉。

六七日伍氏內托散

生黃芪 甘草 陳皮 川芎 當歸 白糯米 防風 天虫 角刺 銀花

三服

用補之方 盡在此矣

用補之方 盡在此矣

用補之方 盡在此矣

用補之方 盡在此矣

血熱者不用黃芪歸 表疎者去天虫角刺 血熱仍用丹皮黃紫草連翹羚羊猪尾雞冠雞鳴散
散表之藥。

保元湯 人參 黃芪 炙草 加川芎當歸名芎歸保元 虛寒加肉桂 升頂加鹿茸

氣滯正氣加廣皮厚朴 瀉加木香肉果 質弱加坎炁河車 嘔逆加丁香厚朴

參歸鹿茸湯 人參 當歸 鹿茸 黃芪 龍眼肉 炙草

木香散 人參 木香 丁香 大腹皮 桂心 青皮 訶子 半夏 甘草 前胡 赤茯苓

異功散 人參 木香 官桂 廣皮 當歸 茯苓 丁香 白朮 附子 肉桂 厚朴 半夏

荳蔻丸 肉果 木香 砂仁 枯礬 訶子 龍骨 赤石脂

白朮散 四君加藿香木香

七八九日頻用清涼痘火色既退漿不能透或有半漿頂有箬笠之形不克充灌今人多用毒蟲漿生用雞冠血生用同酒漿和服倘攻起少頃後呆滯者須用補託

伍氏攻發藥用老人牙煨研極細加麝香少許每服二三分名黑靈丹

右天蟲乃疎表風藥 山甲乃攻經降風藥一味為末酒漿服曰獨勝散

凡蟲蟻皆攻無血者走氣有血者走血飛者升地行者降凡漿足聲音啞者不妨驟常疾升者大忌翁仲仁云挫喉聲啞漿行飽滿亦無妨蓋痘漿因熱氣以煉成必升騰以達頭面肺位最高熱上蒸迫肺先受損是以聲出不揚倘喘急扶肚擡胸乃火毒歸肺必不治矣

火毒歸肺幼科每用珠子牛黃膏連之屬多不效余遵孫真人薑莖湯或仲景葶藶大棗湯間有效者肺氣壅遏苦寒直下已過病所致無效

方書以六七日已前寒戰屬肺熱六七日已後寒戰屬氣虛六七日已前咬牙屬胃熱六七日已後咬牙屬血虛亦屬定論

已過病所
真藥妙訣
須參之

喉中痘疔
聲亦高

八九日。癘塌咬牙。痘不起漿。或灰白。或涸或癘。危險極矣。速速溫補。亦可望生。翁仲仁云。塌陷咬牙。便響聲。清猶可治。聲清則上無熱壅。疾聚便實。則腑陽未至盡洩。所以溫補得效耳。木香散 異功散

八九日順痘。漿色蒼黃。毒氣悉化。亦云垂成。須謹防護持。播損流膿裂血。倘正氣大泄。毒從虛陷。常有不治之患。斯時預囑伴母勿懈。使如鷹乾結。肌肉完固。便是全功。若痘已破碎。聲不啞者。毒不陷也。無妨。

伍氏方用芍藥湯 炒白芍 苡仁 茯苓 地骨皮 銀花 百合 山藥 建蓮
十一二日漸次成痂之際。極好之症。必有咳嗽。或夜暮身熱。世俗幼科。僉云毒氣未盡。緊投苦寒。多有胃減廢食。釀成痘勞。童怯者。吾嘗論痘自腎臟骨髓之中。由肝主筋。心主血脈。脾主肌肉。肺主皮毛。從內之外。毒乃渙釋。收疔之時。真氣歸裏。肺合皮毛。是為未傳。處位高體清肅。從前灌脹成痂。蒸迫之氣。受虧已極。氣泄為咳矣。況投利濕下注藥。而結痂其上。焦已經轉燥。若毒仍留伏。焉能收靨。此斷斷然也。再論幼穉。陽壽有限。未克長。佈痘至於結痂。一身脂液大損。其陰氣告匱。可知。故暮夜屬陰時。為煩為熱者。正內經云。陰虛生內熱也。昔西郊吳氏女。年甫四歲。痘係順症。幼科調治至漿滿成痂之日。忽然煩燥。夜熱不寐。晨起安然。醫服保元及錢氏五味異功。加芍藥與服。熱躁益加。又更一醫。曰毒氣未盡。乃候補之。故用桑蟲漿。暨涼解毒藥。用後躁熱甚。而添泄瀉。邀余視之。靨漿如形色。詢平素起居。時日當午。即用六味地黃湯。一服而安。此二條人多忽而不究。故辨及之。旬朝後嗽。大法以甘寒生津胃藥。蔗漿 麥冬 沙參 萊豆皮 地骨皮

甘草 玉竹 甜杏仁

解餘毒藥全。以不傷胃氣為主。若用苓連。必須酒製。翟聶二氏辨之詳矣。平和無奇。斷不敢事。如三豆飲之。屬若金銀花一味。本草稱解毒不寒。余見脾胃虛弱者。多服即瀉。伍氏用連翹飲子。亦取平和。

痘毒癘瘍。熱症十有七八。虛寒十有二三。甚至骨出腐敗。亦有愈者。但外科大忌用火煉升藥。其診看之法。亦如瘍毒。須分陰陽耳。

痘疔濕盛生熱。強者用苦寒清降。以苦能去濕也。若阻咽廢食。以及穿腮破頰者。難治。

痘疔濕盛生熱。強者用苦寒清降。以苦能去濕也。若阻咽廢食。以及穿腮破頰者。難治。

痘疔濕盛生熱。強者用苦寒清降。以苦能去濕也。若阻咽廢食。以及穿腮破頰者。難治。

年長出痘。男女慾火已動。其初即現膝痛腰痠。咽喉室痛欲閉。苦辛寒藥必不效。驗宜甘鹹寒涼水。制火佐以解毒。六七日來。痛勢日緩。聶氏有參麥清補方。余每用錢氏六味加龜膠元參秋石。獲效者甚多。若漿不肯起。頻吐粘涎者凶。

凡惡痘凶危。時刻如諸悶症。不過三五日。已發而縮。其危最速。總在七日內。再若蒙頭鎖喉懸鏡。踉蹌如窠。蠶種等為十惡症。其表氏十八惡症。今人未嘗齒及。如此等痘。治之無益。徒招怨尤。更有糖少夾斑。十朝危期。又根枝雖好。佈於歲內。幼小之兒。必八九風波。不治半漿。毒臨之變。必斃於十一二四之期。若能食者。十救一二。痘至八九旬日外。無漿則裏毒不化。必倉啞搔癢。痰潮不食。眼開條欵。難以盡言。危期速矣。常有忽然連串片片之痘。裂水形如松脂。桃膠外。露轉眼堆聚。內在漸安。變凶轉吉。更有旬朝內外。乾板固如焦鍋。巴狀。毫無生氣。忽從地角承漿諸處。裂縫流血。漸升頭額。堆腫高厚。若糊臉。名曰發臭。毒泄即當補托。遲則氣脫。

〔驚〕

小兒倉猝驟然驚搖。古曰陽癇。從熱症治。古人用涼膈散為主方。

按急驚屬陽熱病。用涼膈。以清膈間無形之熱。膈上邪熱逼近臆中。絡閉則危殆矣。此宣通乃一定之法。然必詢病因察時候治之。

幼科以痰熱風驚四治。猶可說也。吾鄉有為科。立方鉤藤連翹木通薄荷前胡枳殼桔梗加入表散消食。多不效驗。

驚為七情內應乎肝。肝病發驚駭。木強火熾。甚病動不能靜。且火內寄肝膽。火病來必迅速。後世龍膏茶連必加水麩硝黃。取其苦寒直降。鹹苦走下。辛香通裏竅之閉也。如牛黃丸至寶丹。紫雪皆可選用。凡熱邪塞竅。神迷昏憤者。做此。

鉤藤丹皮之屬。僅泄少陽膽熱。與急驚暴熱內閉之症無益。若火熱劫燥血液。苦寒鹹寒。不中與也。宜用犀

角地黄湯之屬。方書有鎮墜金石之藥。有攻風劫痰之藥。雖非常用。不可不考。驚與厥。皆逆亂之象。仲景云。蛔厥都從驚恐得之。凡吐蛔腹痛嘔惡。明是肝木犯胃。幼醫亂治。束手告斃。余宗仲景法。每效。

慢驚苦稱癩。其治法急培脾胃。頤脾的理中湯為主方。有疾嘔吐。用南星白附子六君子湯。聲音不出。開竅如竹瀝。薑汁葛蒲根鬱金之屬。

是病皆他病致變。其因非一。有過飢禁食氣傷。有峻藥強灌傷胃。有暴吐暴瀉。脾胃兩敗。其症面青脫白。身無熱。雖熱不甚。短氣骨瘦昏倦。如寐皆溫補治之。惟嘔逆不受乳食。溫補反佐薑連。連理湯。

錢氏益黃散 錢氏異功散

疳 稱年五疳。猶大方之五勞。雖方書有五臟之分。是疳夏令為多。固從脾胃。蓋小兒乳食雜進。運化不及。初斷乳

後。果腥雜進。氣傷滯聚。致熱蒸於裏。肌肉消瘦。腹大肢細。名曰疳。或善食。或不嗜食。或渴飲無度。或便瀉。白色久延不已。多致凶危。宜忌食生冷腥肥凝滯。治法初用清熱和中。分利。次則疎補。佐運。常有繼病。治之無效。待妊婦產過自愈者。

夏季霍亂吐瀉。通用藿香止氣散。水瀉宜分利。四苓散。寒加薑桂。熱用苓連。腹痛宜疎氣調氣。用木香青皮。有滯加炒查肉厚朴。重則加萊菔子枳榔。

腹痛有熱。用芩芍枳實。有寒。則用草果砂仁吳萸。吐瀉後能食。便反秘結者。愈不能食。神怯色痿者。防慢驚。治法調中。溫中。若有餘熱煩渴。甘寒或甘酸投津。故木瓜之酸。制暑通用要藥。

春溫風溫

春月暴暖忽冷。先受溫邪。繼為冷束。咳嗽痰喘最多。平解忌溫。只用一劑。入心包。...

小兒為孕 婦所抱則 生繼病雖 不盡然却 竟有此病

三四日夫輕為咳重為喘喘急則鼻掀胸挺

春溫皆冬季伏邪詳於大方諸書幼科亦有伏邪治從大方然暴感為多如頭痛惡寒發熱喘促鼻塞身重

脈浮無汗原可表散春令溫舒辛溫宜少用陽經表藥最忌混亂至若身熱咳喘有痰之症只宜肺藥辛解

瀉白散加前胡牛蒡薄荷之屬消食藥只宜一二味若二便俱通者消食少用須辨表裏上中下何者為急

施治

春季溫暖風溫極多溫變熱最速若發散風寒消食劫傷津液變症尤速初起咳嗽喘促通行用

薄荷汁多連翹瀉不用象貝牛蒡花粉桔梗沙參木通枳殼橘紅桑皮甘草山梔

表解熱不清用黃芩連翹桑皮花粉地骨皮川貝知母山梔

裏熱不清早上涼晚暮熱即當清解血分久則滋清養陰若熱陷神昏痰升喘促急用牛黃丸至寶丹之屬

按風溫乃肺先受邪遂逆傳心胞治在上焦不與清胃攻下同法吾鄉幼科當此初投發散消食不應改用

柴芩瓜萸枳實川連再下奪不應多致危殆皆因不明手經之病耳

若寒疾阻閉亦有喘急胸高不可與前法用三白吐之或妙香丸

暑熱

暑邪必挾濕狀如外感風寒忌用柴葛羌防如肌表熱無汗辛涼輕劑無悞香薷辛溫氣升熱伏易吐佐苦

降如杏仁川連黃芩則不吐宣通上焦如杏仁連翹薄荷竹葉暑熱深伏熱煩渴白虎湯六一散

暑邪首用辛涼繼用甘寒後用酸泄斂津不必用下

暑病頭脹如蒙皆濕盛生熱白虎竹葉酒濕食滯加辛溫通裏

小兒發熱最多變蒸之熱頭緒煩不能戴詳於葉氏病源矣然春溫夏熱秋涼冬寒四季中傷為病當按時

論治其內傷飲食治法不宜混入表藥消滯宜用丸藥潔古東垣已詳悉

前卷是治法此卷是醫案

濕邪 熱邪 留肺 兩熱邪

毒火 未清

風溫 發疹

為

見點 悶症

此表亦是 治驗醫集

痧疹

袁 溫邪痰嗽氣喘肚膨四日不解防發痧 連翹 山梔 牛蒡 杏仁 石膏

汪 痧將退熱未去肺氣不清咳逆無痰 前胡 桑皮 杏仁 橘紅 桔梗 木通 蘇子 象貝

王 痧隱太早咳喘發熱宜開肺氣 薄荷 杏仁 象貝 連翹 桑皮 木通 紫苑 鬱金

某 溫邪發痧不透熱毒內陷深藏上薰肺為喘下攻腸則利皆冬溫火化之症經云火淫於內治以苦寒幼科不究病本不明藥中氣味愈治愈劇至此危

川連 黃芩 飛滑石 炒銀花 連翹 甘草 丹皮 地骨皮

蔣 喘為肺病脹乃肝病因時痧寒熱未解熱邪內陷所致王先生用苦辛酸法極通然浮腫腹痛未減得非

經腑之濕熱留著歟 木防己 石膏 杏仁 大豆黃卷 通草 苡仁 連翹

艾 痧退後呻吟不肯出聲涕淚皆無唇紫掀腫乃毒火未經清解上竅漸閉氣促痰鳴猶是溫邪客氣至此

自當清解務盡其神色自和奈何以畏虛滋肺邪火愈熾矣

川連 元參 杏仁 甘草 黃芩 連翹 桔梗 銀花

王 痧後及暮加喉痛咳 元參 犀角 鮮生地 連翹 花粉 丹皮

鄒 咽痛鼻塞唇腫自刺風溫熱化發疹上焦熱熾宜辛涼微苦以泄降

連翹 黃芩 犀角 桔梗 牛蒡 杏仁 元參 通草

譚 溫邪時癘觸自口鼻穢逆進行三焦而為麻疹自赤鼻煤吐蛔瀉蛔津津汗出而喘渴欲飲當與辛苦寒

劉 河間法世俗不知僉曰發痧但以荆防蠶殼升提火得風颺燭烈莫遏津劫至變矣

涼膈去硝黃加石膏牛蒡赤芍

張 歲手足煩熱時發赤塊 萊豆殼 捲心竹葉

程見點若隱若現神倦不寧勢如悶伏表裏俱不宣暢雙解固宜再佐以芳香燥心使蘊伏之毒透發為

紫雪丹

周熱閉心包絡中目綻口開舌縮兩手撮空發瘵漸通便瀉血分大傷九日險期按法圖倖勉與紫雪丹

錢開水調緩緩下用茶匙倘得神甦瘵舒方有生機

又神醒舌絳紫音縮渴飲不已心胞熱閉雖開而在裏脂液已涸古人以心熱消渴多係臟陰現症不可攻
奪明矣 鮮生地 竹葉心 元參 和母 銀花露 金汁 先用紫雪一錢