

漢科證治準繩 四之二



漢書門			
13010	二	三	號
130	冊	架	函

庫文閣內	
13010	漢
130	書
冊	架

內閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 ( 42 )
函號	001 64



下部十四

便毒

鬼遺云腿胫兩處起為便毒跨下兩臀尖下大道前

穀小道後道水成懸癰皆是虛極人患此癰近穀道左

右亦名痔癰宜急補脾臟及發處貼藥即用發穴散

破後用抽膿膏膿盡用合瘡口散合之慎勿過冬即

成冷漏難治 夫便毒生於小腹下兩腿合縫之間

其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作

強之官所藏者精與智也男女太慾不能直遂其志

故敗精搏血留聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹

下部便毒

小部十四

三

合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒涼之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣 孫按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此固一說而意猶未完果如此論當僧尼孀婦官人曠夫多有此患然予日擊商賈中野合不潔淫妓便搆此疾或疔瘡或楊梅者亦由慾火淫熾一旦交合不潔為淫火沖動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也

毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不可旬日便可奏功若曾已發汗利小便體厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後者也 薛便癰屬厥陰肝經內熱外寒或勞倦過度或房慾不節或慾心不遂或強固其精或肝經濕熱而致治法內熱外寒者雙解散勞倦過度者補中益氣湯房慾不節

者六味丸料慾心不遂者先用五苓散加大黃疎其精滯後用地黃丸以補其肝腎強固其精或濕熱壅滯者宜用龍膽瀉肝湯疎肝導滯夫便癰血疝也屬厥陰肝經之絡脉衝任督脉之隧道故婦人患此多在兩拘腫痛或腹中結塊小便澀滯苟治者得法患者又能調攝何難歛之有若槩用大黃等劑以求其內消或令膿從便下損其氣血及不慎起居飲食者皆為不治

**表** 一人腫痛發熱以荆防敗毒散一劑而止以雙解散一劑而消

荆防敗毒散治便癰發寒熱或拘急疼痛方見腫瘍  
**裏** 一人焮腫作痛大小便秘脉有力以玉燭散一劑頓退更以龍膽瀉肝湯四劑而消

子和玉燭散

即四物湯調胃承氣湯各半服之

**世** 又方

劉寄奴

王不留行

大黃

金銀花

木鼈子

右等分酒水煎露一宿五更服

**丹** 治便毒初起

射干貳寸

生薑

如指大搗細

右取順流水煎微沸服之以瀉為度又用牛皮膠

醋煮塗患處射干紫花者非是紅花者非

法已結成膿者

大黃半兩

枳實

厚朴各叁錢

甘草節壹錢

連翹半兩

桃仁泥貳拾壹枚

右分三服薑叁片水煎服

又治便毒

青皮

白芷

柴胡

赤芍藥

檳榔

朴硝

烏藥

木瓜

大黃

連翹

瓜蒌

生地黄

甘草節

黃芩

三稜

蓬朮

犀角

皂角刺

右為改咀以水叁碗煎至壹碗候大飢服以瀉為

度

三物湯 治便癰

牡蠣

大黃

山梔子各等分

右為末以酒水壹大盞煎至柒分露膏宿空心温

服

四神散

治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神效

下部便毒

下部

三

大黃

木鼈子

僵蠶

貝母 各貳錢半

用酒水各壹鍾煎至壹鍾食前熱服若得汗下為妙

雙解散 治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫

結疼痛

川大黃 叁錢

澤瀉

牽牛

白芍藥

桃仁 去皮尖

辣桂

甘草 各壹錢

右作一服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食前服

補骨脂散

破故紙 炒研

牛蒡子 微炒

牽牛 炒

大黃 酒拌炒

右為末每服壹兩酒調下

消毒五聖湯 治便毒腫疼神效

五靈脂

白僵蠶

鬱金

貝母

大黃 各叁錢

右酒水各半煎服連服三貼立愈

消毒飲 治便毒初發三四日可消

皂角針

金銀花

防風

當歸

大黃

甘草節

下部便毒

下部

下部

瓜蒌實 各等分

右咬咀水酒各半煎食前温服仍頻提掣頂中髮立効

又方 木鼈子大黃瓜蒌桃仁草龍膽咬咀濃煎露一宿清晨温服立愈

止痛妙絕飲 治便毒腫硬不消不潰疼痛無已此方一服立能止痛

人參

大黃 各伍錢

右用酒水各壹鍾煎至壹鍾入乳香沒藥各壹錢空心食前服

牡蠣散 治血疝卽便毒

當歸

酒拌

甘艸節

滑石 煨

牡蠣

煨各壹錢半

大黃

叁錢

木鼈子

伍枚

作一劑用水貳鍾煎壹鍾露壹宿五更頓服冬月火温服已未潰膿血從大便出

薛按此方乃鹹寒導滯之劑若久曠房室大小便秘發熱焮痛或交感強固精氣致精血交錯腫結疼痛便秘者宜用若勞倦之人不甚焮痛大小便如常或小便赤色發熱不作膿及潰而不斂宜用十全大補湯蓋此證多起於勞役不足或房勞過

下痢便毒

小斗四

已

度精氣俱虛之人俗云一石米瘡此言百日後可  
愈也若大補氣血不旬日而愈何用百日蓋瘡之  
收斂在乎血氣之盛也嘗治舉人凌待之虛而服  
尅伐藥幾致危殆予用托裏健脾藥而消秀才王  
文遠勞苦患之服小柴胡湯而表證散後用托裏  
藥膿成針之而旬日愈胡判官膿清脉弱以太補  
之藥而已愈因新婚復發自用連翹消毒散致瀉  
痢不止竟致不救可見此證屬不足多矣非補不  
可太抵便毒屬肝經初起堅硬肝主筋故也五七  
日後當赤軟膿成故也若尚堅硬乃元氣不能腐

化往往人見堅硬只欲肉消反服攻散藥多致虛  
虛之禍前所治者即其驗也

又方

山梔

大黃

乳香

沒藥

當歸

瓜蒌

代赭石

右作一服水煎

表裏

一人不慎房勞患此腫痛以雙解散上服其病  
即止更以補中湯數劑而膿成針之以八珍湯加五  
味麥門柴胡三十餘劑大抵便癰者血疝也俗呼

下便毒

小毒

一



爲便毒言於不便處患之故也乃足厥陰肝經絡及衝任督脉亦屬肝之旁絡也是氣血流通之道路今壅而腫痛此則熱毒所致宜先疎導其滯更用托裏之劑此臨證制宜也

防風通聖散 治瘡瘍便毒若瀉去芒硝大黃能解暑月熱毒或遍身頭面患瘡

芍藥 焙

芒硝

滑石 煨

川芎

大黃 煨

桔梗

石膏 煨

荆芥

麻黃 各肆分半

山梔

白木

連翹

當歸

薄荷

甘艸

防風

黃芩 焙各捌分

作一劑水貳鍾煎捌分服

愚按此方非表裏俱實大小便秘者恐不可用宜

審之通聖散合益元散名雙解散

蘇方散 治便毒

木鼈肉

當歸尾

芍藥

白芷

粉甘草

川芎

射干

忍冬 卽金銀花

大黃

沒藥

蘇木

穿山甲 煨火 各陸分

右細切作一服水酒各壹盞煎至壹盞食前服

**流氣活血**東垣青皮湯治便毒

青皮 防風 當歸身 甘草稍生各等分

右咬咀分作四服水壹小碗煎至捌分去粗大溫服空心日進三服

復原通氣散 便毒初發用此

南木香 延胡索 天花粉酒浸舶上蘘香炒

白牽牛炒白芷 當歸 甘草各壹兩

青木香半兩 穿山甲酒浸炙

右為細末每服貳錢食前溫酒調服木香湯亦可

**補虛**府庠沈尼文年二十左拗患之余以肝腎陰虛

先用托裏藥潰而將愈因入房發熱作渴右邊亦作

痛膿水清稀虛證悉至脉洪大而無力勢甚可畏用

十全大補加附子壹錢脉證頓退再劑全退後用大

補湯三十餘劑而痊一男子腫而不潰余謂此因

陽氣虛弱用參芪歸朮以補托元氣用白芷皂角刺

柴胡甘草節以排膿清肝數劑而潰以八珍加柴胡

補其氣血數劑而愈一人患便毒膿稀脉弱以十

全大補湯加五味麥門白斂三十劑稍愈更以參芪

歸朮膏而平因新婚復發聚腫堅硬四肢冷脉弱皮

六便毒

小年日

四三

寒飲食少思此虛極也仍用前藥加桂附三劑稍可  
彼欲速愈自用連翹消毒飲泄利不止而歿一人  
年踰四十素勞苦患便毒發寒熱先以小柴胡湯加  
青皮一服表證悉退次以補中益氣湯加穿山甲二  
劑腫去三四更以托裏之藥五六服膿成刺去旬日  
而斂一人腫而不潰以參芪歸朮甘草節皂角針  
白芷柴胡數劑而潰以八珍湯加柴胡數劑愈一人  
人潰而腫不消且不斂診之脈浮而瀦以豆豉灸更  
以十全大補湯月餘而愈

**消毒清火**

一儒者瘡痛便澀用八正散二劑清肝火

導濕熱而腫痛愈再以小柴胡加芩歸澤瀉山梔二  
劑清肝火補脾血而小便利 一男子潰而腫痛不  
止此餘毒未解用活命飲一劑而痛止再劑而腫消  
一男子痛甚發熱用前飲一劑痛止再以神效瓜  
萸散加山梔柴胡二劑而消 一男子已潰而痛不  
止小便秘澀此肝火未解也與小柴胡湯加黃蘗知  
母芩歸痛止便利更以托裏當歸湯而瘡斂若毒未  
解而痛不止者須用活命飲 一人膿未成大痛服  
消毒托裏肉疎藥不應脈洪大毒尚在以袖方活命  
飲一劑痛止又劑而消 一人潰而痛不止諸藥不

應診之脉大按之則數乃毒未解也以仙方活命飲而止又二劑而消一人腫痛日晡發熱以小柴胡加青皮天花粉四劑痛止熱退以神效瓜蒌散四劑而消

瓜蒌散 治便癰等惡瘡

瓜蒌 壹枚

金銀花

牛蒡子 炒各叁錢

生薑

甘草 各半兩

右將藥不犯銅鐵器搥碎用酒壹大升煎數沸空心温服

威靈仙散 治便毒

威靈仙

貝母

知母 各壹兩

右三味為末每服叁錢空心温酒調下如不散再服

薛按此方通經去膿消毒補虛益氣蓋此證多患於陰虛之人此方乃是一見也亦有焮痛小便數者宜先用加減龍膽瀉肝湯大小便秘焮腫作痛宜入正散增寒發熱荆防敗毒散然後用此方若不作膿或膿不潰宜用大補之劑潰而不斂者更用豆豉餅灸之

小便不利 一老婦腫痛膿未作小便滯肝脉數以加

減龍膽瀉肝湯加山梔黃藥四劑而消  
加減龍膽瀉肝湯

龍膽草酒拌炒

澤瀉酒拌炒 車前子炒

木通

生地黄

當歸尾

山梔炒

黃芩各壹錢

甘艸生用伍分

作一劑用米貳鍾煎至捌分食前服如濕盛加黃連大便祕加大黃

大便不實 一人服尅伐藥以求內消致瀉利少食以二神丸先止其瀉以十全大補倍加白木茯苓數劑而消 一人年踰四十患便毒尅伐太過飲食少思

大便不實遺精脉微東垣云精滑不禁大便不利腰脚沉重下虚也仲景曰微弱之脉主氣血俱虛以六君子加破故紙肉豆蔻煎服泄止食進更以十全大補湯加行經藥十餘劑而消

婦人 一婦素清苦因鬱怒患前症或用敗毒寒涼之藥反助熱內熱自汗盜汗月經不行口乾咽燥余謂此鬱氣傷脾因藥復損先以當歸湯數劑後兼逍遙散各五十餘劑而諸證皆愈 一婦小腹內如有所梗兩拗與人門俱腫小便淋瀝經候不調內熱作渴飲食少思腹內初如雞卵而漸大脉洪數而虛在關

尤甚屬肝脾鬱結之證也用加味歸脾湯肝火退而脾土健間以逍遙散下蘆薈丸而愈一婦兩拘腫痛腹內一塊不時上攻月餘不調小便不利余以為肝脾氣滯以四君加芍歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前證復作却兼胸脇脹滿盜汗此肝木甚而傷脾土用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊一婦小腹內或作痛或痞悶兩拘腫痛內熱寒熱胸膈不利飲食不甘形體日瘦此肝氣滯而傷脾氣朝用補中益氣湯夕用六味丸漸愈更用蘆薈丸而全愈一婦兩拘腫痛小腹痞脹小便時數白帶時下寒熱往來小水淋

瀝余謂脾氣滯而血病用龍膽瀉肝湯漸愈又用加味逍遙散六味丸而全愈一婦人患前證胸脇脹悶或小便不利或時作痛大便澀滯服疎氣豁痰等藥益甚余謂肝火氣分之病用龍膽瀉肝湯以清肝熱又用加味逍遙散以生肝血六味丸以滋腎水而愈一婦患前證余謂此肝脾鬱怒之證不信別服化痰利氣之劑胸腹脹悶又服峻利疎導之劑變脾虛發腫之證而歿一婦兩拘腫痛內熱作渴飲食不甘肢體倦怠陰中作梗小便赤澀為肝脾陰虛濕熱用加味歸脾湯而愈後因怒復作小腹腫脹小便

下部便毒

下部

四七

不利用小柴胡加山梔芩歸以清理肝火脹痛瘰癧止  
又以加味道遙散調補肝火而痊 一婦人兩拘腫  
痛寒熱內熱小便赤澀胸脇不利此肝火動而脾氣  
傷用補中益氣湯加茯苓數劑少愈又與加味歸脾  
湯諸證悉退再用加味道遙散而全愈 一婦小腹  
痞悶小便不利內熱體倦懶食此氣血虛而兼肝火  
用八珍湯加柴梔膽草治之而安 一婦陰中如梗  
兩拘腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以為肝  
脾鬱結所致先以補中益氣湯加山梔茯苓車前子  
青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯二十餘劑

調理脾鬱而愈

雜方退毒散 治便毒腫結

穿山甲

蘸醋炙  
焦伍錢

木猪腰子

醋微炙  
叁錢

為末每服貳錢食前老酒調下次以醋煮肥皂研

膏敷之妙

木猪腰子  
即木猪苓

立消散 消便毒癰腫如神

全蝎

炒

核桃

去壳肉只  
用隔膜炒

等分為末空心酒調下叁錢下午再服三日全愈

又方 白僵蠶槐花為末酒調服一方加酒大黃

外治敷藥方 治便毒腫痛

下部 便毒

小毒

日八

雄黃

乳香

各貳兩

黃礬

壹兩

右為細末用新汲水調敷腫處自消

丹又方用甘草節白芷黃連各等分如破者龍骨白  
枯礬赤石脂并用鐵圍散癰疽腫毒亦治用之效

乳香

沒藥

各半兩

大黃

黃連

黃礬

南星

半夏

防風

羌活

皂角刺

木鼈子

瓜蒌

甘草節

草烏尖

阿膠

右為細末醋調成膏入石器內火熬黑色為餅

傳之

○毛際瘍

或問小腹至陰之下玉莖之根痒極沸湯沃之稍止  
而復作有三四竅黃水淋漓何如曰此廣瘡結毒也  
詢之幼時曾生惡瘡旬日後大痛腫甚飲食少進作  
結毒治之

○囊癰

丹外科精要云癰疽入囊者死囊屬厥陰今以死言  
之將以為屬少陰腎經邪予親見入囊者七八人悉  
以濕熱入肝經施治而用補陰藥佐之雖膿潰皮脫

下部 囊癰

小丹四

四



畢九懸掛可畏者皆不死但不知下虛年老若如何耳  
囊癰濕熱下注也有作膿者此濁氣瀦下將流入  
滲道因陰道或虧水道不利而然膿盡自安不藥  
可也惟在善于調攝耳又有因腹腫漸流入囊腫甚  
而囊自裂開畢九懸掛水出以麩炭杉木末傳外以  
紫蘇葉包裹仰臥養之 大抵此證屬陰道虧濕熱  
不利所致故滋陰降濕藥不可缺常治腫痛小便秘  
滯者用除濕為主滋陰佐之腫痛已退便利已和者  
除濕滋陰藥相兼治之欲其成膿用托裏為主滋陰  
佐之候膿成即針之仍用托裏滋陰若濕毒已盡者

專用托裡如膿清或多或少或斂遲者用大補之劑或附  
子餅灸之 薛囊癰屬肝腎二經陰虛濕熱下注若  
小便瀦滯者先分利以泄其毒繼補陰以令其自消  
若濕熱退而仍腫痛宜補陰托裏以速其膿膿炊而  
便秘者熱毒壅閉也先用托裏消毒散後用針以泄  
之膿去即解若膿去而腫痛不減者熱毒未解也用  
清肝養榮湯口乾而小便數者腎經虛熱也六味丸  
內熱晡熱者肝經血虛也四物加參木體倦食少者  
脾氣虛熱也補中益氣湯膿水清稀者氣血俱虛也  
十全大補湯此證雖大潰而畢九懸露治得其法旬

不乃 囊癰 小十日

腫痛未作膿者肝者導濕

日肉漸生而愈若專攻其瘡陰道益虛則腫者不能  
潰潰者不能斂少壯者多成痼疾老弱者多致不起  
亦有患痔漏久而串及於囊者當兼治其痔切忌寒  
藥尅伐虧損胃氣

一人囊癰未作膿而腫痛以加減龍膽瀉肝湯二劑  
少愈更以四物加木通知母黃蘗而消 一人膿熟  
作脹致小便不利急針以小柴胡加黃蘗白芷金銀  
花四劑少愈更以托裡消毒散數劑而消 一人年  
踰五十陰囊腫痛得熱愈盛服蟠葱散不應肝脉數  
此囊癰也乃肝經濕熱所致膿已成急針之進龍膽

瀉肝湯脉證悉退更服托裏滋陰藥外敷杉木炭紫  
蘇末月餘而愈 一人年踰六十陰囊潰痛不可忍  
羣丸露出服龍膽瀉肝湯敷麩炭紫蘇末不應薛意  
此溼氣熾盛先飲槐花酒一碗次服前湯少愈更服  
托裏加滋陰藥而平設以前藥不應加之峻劑未有  
不損中氣以致敗也 一弱人腫痛未成膿小便赤  
澁以製甘草青皮木通黃蘗當歸麥門四劑少愈以  
清心蓮子飲四劑而消 一人焮腫痛甚小便澁發  
熱脉數以龍膽瀉肝湯倍車前木通澤瀉茯苓勢減  
半仍以前湯加黃蘗金銀花四劑又減二三便利如

下部

東夷瘡

卜半四

五十一

常惟一處不消此欲成膿再用前湯加金銀花皂角  
針白芷六劑微腫痛脉滑數乃膿已成針之腫痛悉  
退投滋陰托裏藥及紫蘇末敷之而愈一人病勢  
已甚脉洪大可畏用前湯二劑腫少退以仙方活命  
飲二劑痛少止脉洪數膿已成須針之否則陰囊皆  
潰彼不信更他醫果大潰羣丸掛復求治脉將靜以  
八珍湯加黃芪黃蘗知母山梔更敷紫蘇末數日而  
痊一人連日飲酒陰挺并囊溼痒服滋陰等藥不  
應薛謂前陰肝脉絡也陰氣從挺而出素有溼繼以  
酒為濕熱合于下焦而然經曰下焦如瀆又云在下

腫硬  
痰熱  
清肝  
降火

者引而竭之遂以龍膽瀉肝湯及清震湯而愈此或  
不應宜補肝湯及四生散治之 儒者陳時用考試  
不利一夕飲燒酒入房妻不納翌日陰囊腫脹焮痛  
遣人求治薛以除濕熱清肝火之劑城門夜閉不及  
歸服芫草報云夜來陰囊悉腐玉莖下面貼囊者亦  
腐此肝火挾酒毒而濕熱熾盛也仍以前藥加參芪  
歸朮四劑腐肉盡脫羣丸懸掛用大補氣血并塗當  
歸膏囊莖全復而愈  
一人患此腫痛發熱以小柴胡加青皮黃連四劑少  
愈更以龍膽瀉肝湯而消 給事陸貞山腫赤脹痛

下邪 囊癰

小便滯滯寒熱作渴此肝腎陰虛濕熱下注也當清  
肝火除溼毒遂用柴胡炒龍膽吳茱萸炒黃連當歸  
銀花皂角刺赤芍藥防風木通甘艸節一劑腫痛漸  
退少加防風木通川芎茯苓作飲下滋腎丸以補陰  
其熱腫俱退但內有一條筋不消此肝經血氣虛損  
也當滋腎水用六味丸料去茯苓加五味二劑再用  
補中益氣加茯苓作飲送滋腎丸筋頓消而愈  
加味瀉肝湯 治肝經濕熱不利陰囊腫痛或潰爛  
皮脫羣丸懸掛或便毒及下疳腫痛或潰爛並皆  
治之

龍膽草

酒拌炒

當歸尾

車前子

炒

澤瀉

生地黄

芍藥

炒

黃連

炒

黃蘗

酒拌炒

知母

酒拌炒

防風

各壹錢

甘草

稍伍分

作一劑水貳鍾煎分食前服外敷烏金散

滋

京兆朱二峰陰囊脹痛彼以為疝薛診其脉數而滑  
此囊癰也因肝腎二經陰虛濕熱所致膿已成矣服  
活命飲一劑而潰更用補陰托裏而斂 一膏染之  
客陰囊腫脹小便不利此中焦積熱乘虛下注先用  
龍膽瀉肝湯加黃蘗知母黃連牛膝四劑漸愈後用

下疳囊腫

小疝

補陰八珍湯加柴胡山梔而愈後不守禁忌前證復  
作仍用補陰八珍湯補中益氣湯六味丸而痊又因  
勞發熱自用四物黃蘗知母之類虛證悉具瘡口開  
大薛謂五臟氣血俱虛也朝用補中益氣夕用六君  
子加當歸各五十餘劑瘡口漸斂又用六味丸調補  
而愈一府庠李達御素腎虛發熱久服黃蘗知母之  
類形體漸瘦遺精白濁晡熱唾痰薛曰此腎水虧損  
虛火內熾用補中益氣之類加五味麥門前症將愈  
又別用清熱涼血之劑飲食少思唾痰不止薛以為  
脾肺復虛不能攝涎歸源仍用前湯加茯苓半夏而

愈後入房頭暈吐痰腰骨作痛大小便道牽痛薛曰  
此精已耗而復竭所致危殆之證也遂朝用前湯加  
麥門五味夕用六味丸料加五味子葶藶五十餘劑  
諸證頓退後又入房陰囊陰莖作痛別用淡滲之劑  
陰囊內潰薛用補陰托裏之劑出膿甚多喜腫消痛  
止竟不善調養以致大便不通小便如淋痰涎上涌  
薛曰腎虛之證復作矣誠為可慮有保其可生者用  
礞石滾痰丸牛黃清心丸之類吐痰愈加薛曰非惟  
無以保其生而反促其危矣固辭不治後果歿  
男子醉而入房陰囊腫脹大如斗小腹脹悶小水淋

赤發熱口乾痰涎壅甚此膀胱陰虛酒毒所乘也用  
 六味丸料加車前牛膝作飲下滋腎丸諸證頓退再  
 加五味麥門二劑而愈却以補中益氣加麥門五味  
 調理而康若用淡滲復損真陰決致不起  
 加味小柴胡湯 治囊癰腐爛或飲食少思日晡發  
 熱

柴胡 人參 黃芩炒 川芎  
 白朮炒 黃芪鹽水浸炒 當歸酒洗 黃蘗酒拌炒  
 知母酒拌炒 甘草各壹錢 半夏伍分  
 作一劑水貳鍾煎八分食前服 痛甚加黃連

腫而潰而  
 不潰而  
 不斂而  
 補者大  
 血氣

小便不利加木通

知州王汝道先晡熱發熱肢體倦怠入房則腿足酸  
 軟足心熱至腿膝六脉洪數兩尺為甚余以足三陰  
 虛欲滋補化源彼反服苦寒降火之劑後陰囊腫脹  
 用治疝之藥腫脹益甚形氣愈虛服溫補之劑腫痛  
 上攻小便不利兩尺脉洪滑按之虛甚余曰此囊癰  
 也因氣血虛而不能潰先用補中益氣湯加山藥山  
 茱萸車前子柴胡山梔一劑腫脹頓消隨用六味丸  
 料加車前牛膝柴胡山梔一劑小便漸通乃用活命  
 飲與前二藥消息兼用至二十餘劑囊裂出穢膿甚

多乃用托裏消毒散六劑膿穢清又用托裏散數劑  
膿水漸少更用補陰托裏散及十全大補湯五十餘  
劑而痊 一人年踰五十患此瘡口不斂診之微有  
濕熱治以龍膽瀉肝湯濕熱悉退乃以托裏藥及豆  
豉餅灸而愈次年復患濕熱頗盛仍用前湯四劑而  
退又以滋陰藥而消若潰後虛而不補少壯者成漏  
老弱者不治膿清作渴脉大者亦不治 一人患此  
久不斂以十全大補湯加五味麥門灸以豆豉餅灸  
餘而平 一病人膿熟脹痛太小便秘急針之膿出  
三椀許即斲睡覺神思少健但針遲故用托裏藥至

一音 外系四 五五

三十餘劑始差若服解毒藥即潰盡矣

**似是而非**

一人囊腫狀如水晶時痛時癢出水小腹  
按之作水聲小便頻數脉遲緩此醉後飲水入房汗  
出遇風寒濕毒乘聚于囊名水疝也先以導水丸二  
服腹水已去小便如常再以胃苓散倍白朮茯苓更  
用氣針引去聚水而差 一人年踰四十陰囊腫痛  
以熱手慰之少緩服五苓散不應尺脉遲軟此下虛  
寒邪所襲而然名曰陰疝非瘡毒也治以蟠蔥散少  
可更服葫蘆巴丸而平 一人年踰三十陰囊濕痒  
莖出白物如膿舉則急痛此肝疝也用龍膽瀉肝湯

下部 囊瘻 小疝四 五五

而愈陰莖或腫或縮或挺或痒皆宜此藥治之

治腎癰用石蠟熱水磨服

外治 石灰散 治腎漏陰囊先腫後穿破出黃水瘡如魚

口能致命

右用五倍子同石灰炒黃色去灰攤地出火毒砂

盆內研細末不犯銅鐵乾摻上五七次可

治外腎癰瘡

抱雞卵殼

鷹爪黃連

輕粉 各等分

右為細末用煎過清油調塗

烏金散

麩炭

紫蘇葉 各等分

右為末香油調搽

陰瘡

陰器屬足厥陰肝經任脉之會素問云厥陰之脉絡陰器繫於肝靈樞曰筋者聚於陰器而脉絡於舌本肝者筋之會也又屬督脉素問曰督脉者其絡循陰器合篡間是也至於足太陽外合清水內屬膀胱而通水道手太陽外合淮水內屬小腸而水道出焉則又屬手足太陽也腎主水則又屬足少陰也飲入於胃游溢精氣上輸於脾脾氣散精上歸於肺通調水

下部 囊癰

小疔口

五十二



道下輸膀胱則又屬手太陰也素問又謂前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合則又屬脾與胃矣癰瘡生其間須細心求而責之不可專主一厥陰肝經而惟清肝導濕之為事斯無誤矣 隱處瘙痒成瘡挾有耳鳴目痒鼻赤齒浮指縫白等症為腎臟風瘡生於陰頭為陰頭癰 生於竅口為下疳瘡 今但生於陰莖者皆為下疳姑從之

**腎臟風瘡**戴院使云癰風因精未調外為風濕所襲從陰囊濕汗作痒起流注四肢手叉白色悉生瘡瘍俗謂之腎臟風四生飲貳兩以竹刀細切猪腰壹對

銀石器中酒漉煮爛研細和藥為丸如梧子大如不可丸入酒醋少許每服五六十丸鹽酒空心下又用花蛇散和消風散酒調服或升麻和氣飲嚙烏頭煮鹽丸及烏荆丸或花蛇丸若癰常濕痒欲得淋洗則以蛇床子一味煎湯用之

三因四生散 治癰風上攻下注耳鳴目痒鼻赤齒浮或作口瘡下注陰濕四散搔痒通體生瘡及婦人血風等症

白附子

蒺藜

刺

黃芪

蜜炙

羌活

各等分

為末每服貳錢鹽酒調下 一人將猪腎破開入

鹽摻藥煨亦妙癩屬宗筋陽明養之故有是證

治腎臟風凡指縫白者只一二服効

黃芪壹兩 木通 甘草

黑牽牛各半兩

石四味細剉用蟹螯柒枚去翅同藥炒焦黑去蟹螯餘為末蒸餅糊為丸如桐子大空心鹽湯下參

拾丸

本事烏頭丸 治腎臟風上攻下注生瘡并癩

川烏頭

草烏頭二味以黑豆半升煮透軟去皮臍切晒各壹兩

天麻

地龍去土 白附子各半兩

右為末酒糊為丸如桐子大每服貳參拾丸空心食前鹽酒鹽湯任下

外治

腎臟風甘草節煎湯洗極効

腎臟風痒不可當者吳茱萸蛇床子等分煎湯洗神効

治腎臟陰汗生瘡用莧菜根莖葉燒灰存性研

細抓破傅之立愈又蒼耳草蛇床子煎湯洗之良

全蠍散 治腎臟風發瘡痒

全蠍叁枚焙 明硫黃貳錢研 生虢丹壹錢

輕粉半錢 雞心檳榔壹大箇破開好黃丹壹錢合內濕紙裏煨

麝香少許研

下部 腎風

小字四

五七

右為細末研勻磁盒收每一少許麻油調抹兩掌  
先以鼻嗅男以兩掌揜外腎女以兩掌揜兩乳各  
睡至醒次日依前再用藥屢効

牡蠣散

治陰囊兩傍生瘡或陰濕水出其痒甚苦

夜則抓之無足後必自痛或兩腋汗脚板心汗濕  
無可奈何此藥主之予親得此症受苦數十年得  
此方隨用二三日如法擦之二十餘年不發實為  
神効

牡蠣

黃丹

炒各  
貳兩

枯白礬

肆兩

右為細末遇夜睡時用手捏藥於陰痒處痛擦之

不一時又搽之三四次後頓減次夜再搽雖大減  
又搽後自然平復如腋汗亦有頓搽方可脚汗先  
搽後裝藥靴或鞋底上脚板上塗藥纏脚裹之亦  
可

浴毒湯

治小腸風陰瘡痒痛

木通

藁本

枳殼

貫衆

荆芥

甘松

薄荷

白芷

右剉碎用藥貳兩水五升芒硝半兩煎至參升  
去滓熱洗浴瘡

陰瘡膏 治男女陰瘡

米粉壹酒杯許芍藥

黃芩

牡蠣

附子

白芷各柒錢半

右六味為吖咀以不入水豬膏壹斤微火上煎三

上三下候白芷黃膏成絞滓去內白粉和取傳瘡

上

小浴方 治虛勞陰濕痒生瘡

川椒

苦參

蛇床子

各壹兩半

香附子

白礬

白芷

狗脊

細辛

各壹兩桂心叁分

右吖咀每用藥壹兩以水叁升煎至貳升去滓傾入盆子內但乘熱氣坐盆子上熏之良久通身便洗患處甚者不過三兩度

沐浴長春散

治男子下元陰濕久冷陰囊左右夜

痒抓之則喜住之則痛成瘡流水為害甚苦此藥

見効及治婦人下部陰濕胎元久冷

牡蠣

蛇床子

破故紙

紫稍花

官桂

乾荷葉各等分

右吖咀每用壹兩半水壹小鍋入葱白數莖煎至捌分去滓先薰後洗却用藥

枯礬 壹兩 黃丹 各半兩 蛤粉 各半兩

右件共研為細末熏洗了後以手捏藥末搽濕痒處

銅綠散 治男婦陰部濕淹瘡

銅綠 少許 白礬 壹錢 乳香 半錢 輕粉 壹字

五倍子 半兩 細研

右為細末洗淨搽之

有一婦人患臍下腹上連二陰遍滿生濕瘡狀如馬刀他處並無熱痒而痛大小便澁出黃汁食亦減身面浮腫醫作惡瘡治用鰻鱺魚松脂黃丹之類塗

灸

瘡一愈熱痛甚治不對故也細問之此人嗜酒貪啗喜魚蟹發風等物急令用溫水洗拭去膏藥尋馬齒莧肆兩研爛入青黛壹兩再研勻塗瘡上即時熱減痛痒皆去仍服八正散日三服發散客熱每塗藥一時久即乾又再塗新濕藥如此一日減三分之一五日減二自此二十日愈既愈乃問曰此瘡何緣至此曰中下焦畜風熱毒熱氣若不出當作腸癰肉痔仍須禁酒及發風物後不能禁酒果患肉痔世腎臟風瘡 血却 即百蟲窠右膝內廉 集腎臟風瘡 血却 即百蟲窠集針入 三陰交

下部 腎風

小斗四

三陰交

下疳瘡薛下疳瘡屬肝經溼熱下注或陰虛火燥治  
法腫痛發熱者血虛而有熱也四物湯加柴胡山梔  
腫痛寒熱者肝經濕熱也小柴胡湯加龍膽草黃連  
腫痛便澀者濕熱壅滯也龍膽瀉肝湯腫痛腐潰者  
氣血虛而有火也八物湯加山梔柴胡日晡熱甚者  
陰血虛而有熱也小柴胡湯加參朮芍歸日晡倦怠  
者陽氣虛而下陷也補中益氣湯其經久不愈而發  
寒熱者腎水不能生肝木也用六味丸若筋縮縱或  
為痔痛或出白津此筋疝也用龍膽瀉肝湯氣虛者  
補中益氣加炒山梔炒龍膽陰虛火燥者用六味丸

莖中痒出白津用補中益氣湯與清心蓮子飲間服  
蓋此證肝經陰虛為本腫痛寒熱等證為標須用六  
味丸以生肝血凡脾土虛不能生金水而見一切肝  
證者當佐以補中益氣湯加麥門冬以滋化源丹  
治男子恥瘡或痛在莖之竅或痛在莖之標皆手足  
太陽不利熱毒下傳入于足厥陰故變紫黑色作蝕  
瘡毀其莖而死宜以子和泄水丸散導濕毒無不愈  
者若已成瘡先泄其根次從標而治外以葱白黑豆  
汁漂洗拭乾以黃連木香蜜陀僧乾胭脂之類細末  
搽之如內潰膿不出以追膿散上之又用子和泄水

九如後竅膿少可用黃連木香胭脂等貼之  
人年三十性狡而躁素患下疳瘡或作或止夏初患  
白痢膈上微悶醫與理中湯四貼昏悶若死片時而  
甦予脉之兩手皆沉重取略弦似數予曰此下疳瘡  
之深重者與當歸龍薈丸去麝四貼而利減與小柴  
胡去半夏加黃連芍藥川芎生薑煎五六貼而安  
一男子近三十歲有下疳瘡雖屢求治以其不能忌  
口却之忽一日頭痛發熱自汗衆作傷寒陽證治之  
反劇予診其脉弦甚七至重按則澁予曰此證在厥  
陰藥與證不相應遂作小柴胡湯加草龍膽黃連胡

黃連帶熱服四劑而病脫然 婁嘗治一男子下疳  
瘡每恣飲酒則發醫與小柴胡湯加黃連數貼不効  
又與玉燭散下之反劇予以甘州節小建中湯各半  
煎服之下咽痛止後以四物湯建中甘草等分與之  
遂安 薛庶吉士劉華甫或莖中作痛或竅出白津  
或小便秘澁先用小柴胡湯加山梔澤瀉黃連木通  
膽草茯苓一劑以清肝火導濕熱諸證漸愈後因勞  
倦忽然寒熱此元氣復傷也用補中益氣湯而安又  
用六味丸生肝血滋腎水而全愈 州守姜節甫患  
前證膿水淋漓作渴吐痰午前惡寒午後發熱余曰

午前惡寒屬陽氣虛弱午後發熱屬陰血不足不信  
反服一陳黃檗知母之類飲食益少大便不實又日  
晡熱渴小腹重墜患處焮痛恪用四物黃檗知母之  
類飲食亦不思余以脾氣虛而下陷先用補中益氣  
湯調養脾胃以升陽氣諸證漸愈又用六味丸滋補  
腎水以生肝血而痊 一小兒十五歲患前證雜用  
消毒之藥虛證悉具二年餘矣詢之乃稟所致用草  
薢湯月餘諸證漸愈又用補陰八珍補中益氣二湯  
而痊 一儒者莖中作痒發熱倦怠外皮浮腫二年  
矣用八珍加柴胡山梔及六味地黃丸而愈有兼陰

毛間生蟲作痒者用桃仁研爛塗之 一儒者因勞  
而患焮痛寒熱體倦頭疼小便赤澀用補中益氣湯  
加車前牛膝山梔而愈 一儒者陰莖腐爛腫痛不  
止日晡熱甚口乾體倦食少欲嘔此肝脾血虛也先  
用六君子加柴胡升麻脾胃醒而諸證退更以補中  
益氣加炒山梔肝火退而腫痛痊  
子和泄水丸 一名大智丸

- 大戟
- 芫花
- 甘遂
- 海帶 洗
- 海藻 洗
- 郁李仁
- 續隨子 各半
- 樟柳根 壹兩

下部 下府 小斗口



音

右為細末水煮東肉為丸如小豆大每服伍米  
拾丸熟水下按此藥太峻用者慎之

治下疳瘡先用張子和泄水去根後用此藥乾上

黃連

滑石 各半兩

定粉 三錢

輕粉少許

乳香 一錢

蜜陀僧 二錢

右細末乾上或加乾胭脂或加木香檳榔

大芩薈丸

一名九味  
芩薈丸

治肝火下疳潰爛或作痛爛

腫或治小兒疳膨食積口鼻生瘡下齧蝕爛

等証并麥蝕肛門痔痛

胡黃連

芩薈

黃連

木香

白蕪荑

青皮

白雷丸

鶴蝨艸 各壹兩

麝香 壹錢

為末蒸餅糊丸桐子大每服壹錢空心米飲下

入正散 治下疳便毒小便淋漓脉證俱實者

大黃

車前子

瞿麥

篇蓄

山梔

木通 各貳錢

滑石 貳兩

甘艸 壹錢

右水煎服

洗毒湯 治陰蝕瘡

苦參

防風

露蜂房

甘草 各等分

右吹咀水煎濃汁洗瘡

洗藥

下部 下疳

下部 下疳

金銀花散 治下疳瘡

金銀花

荆芥

朴硝

蛇床子

甘松

白芷

檳榔 各壹兩

右吹咀每用伍錢水伍椀加葱白參根同煎數沸  
盆盛水先熏後洗却上藥

洗藥 黃連 黃蘗 當歸 白芷 獨活 防風

朴硝 荆芥 各等分 入錢伍拾文烏梅伍箇鹽壹匙

入水同煎温洗日五七次敷下項藥

敷藥 木香 檳榔 黃連 銅青 輕粉 枯礬

海螵蛸 麝香 各等分 為極細末洗後至夜敷上

千金治丈夫陰頭癰師所不能醫用鼈甲壹枚燒末  
以雞子白和傅良

丹下疳瘡

蛤粉

臘茶

苦參

青黛

蜜佗僧

右用河水洗瘡淨臘豬脂調敷并治膝瘡

又方 青黛 海蛤 蜜佗僧 黃連共為末敷上

治一切熱毒惡瘡及下疳瘡用蜜佗僧黃蘗各壹分

半膩粉壹錢麝香少許乾洗瘡拭乾傅之甚者三

四次

治下疳瘡雄黃黃連等分為末濕者乾搽乾者油調  
傳先用荆芥射干煎湯洗却傳之妙一方用地  
骨皮末傳之神效

取膿

追膿錠子

海藏

膿內潰不出此藥追之

雄黃

貳錢

巴豆

壹錢半

輕粉

壹字

外臺秘要云陰頭瘡蜜煎甘艸傳之安

又方用頭髮用鹽水洗去垢膩淨再用米泔洗過又

用清湯洗晒乾燒灰傳瘡上硬結屬

又方蒼耳葉為末傳之

治下疳瘡黑彤兔

一名烏吊土一名孩兒沙

為末傳上神效

七寶檳榔散

治下元玉莖上或陰頭上有疳瘡漸

至蝕透久不愈者

檳榔

雄黃

輕粉

蜜陀僧

黃連

黃檗

朴硝

右為細末和勻先以葱白漿水洗淨軟帛搥乾如  
瘡濕乾搽如乾小油調塗

玉粉散

治下陰瘡疼不止

滑石

蜜陀僧

寒水石

煨各半兩

下部下疳

下部下疳

賦粉

麝香

右為細末油調傅或乾貼患處

蚯蚓散 治陰莖瘡

蚯蚓 貳分

豆粉 壹分

右用水研塗上乾又傅之一方用豉壹分

丹胞散 治玉莖上生瘡臭爛者

右以豬胞壹個連尿去一半留一半用新磚兩口炭火煨將豬胞連尿於磚上焙乾不住手一向移放於兩口磚上輪流不歇莫與火煨着胞待尿乾為度研為末入黃丹壹錢先用葱湯以鵝毛抹洗

以舊帛拭乾此藥搽三五次立見効

地連散 治玉莖上生瘡

右用地骨皮煎湯洗以訶子連核燒存性為末乾

川連散 治下部注瘡

右以宣連為細末漿水調成餅攤於碗面上內用艾及穿山甲參片燒烟覆碗熏成黑色再取下如是者五次以黃連餅黑色為度地上出烟毒再研細濕則乾塗乾則清油調塗三四次先用黃蘗藿香茵陳煎湯温洗

神妙方 治莖頭三五孔小漏瘡出血微膿

右用油髮燒作灰存性研細傳之乾則津唾調傳仍以米飲調髮灰食前服

麝香

黃礬

青礬

各等分

右為細末小便後用少許傳之

治陰濕生瘡黃水流注

用白礬不以多右研為末以冷水洗瘡淨後傳之

津調散 治妬精瘡膿汁淋漓臭爛

黃連

款冬花

各等分

麝香

少許不用

右為細末先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津調傳之忌生湯洗

胭脂散 治陰瘡

坯子胭脂

真菜豆粉

各等分

右同研勻傳之

蟹蟄散 治陰濕欲盡瘡痛甚者

蟹蟄

壹枚

兔糞

壹兩

右同研細每用少許傳瘡上日三四次截疔散 治年深疔瘻瘡大効

白芨

白斂

黃丹

蜜陀僧 各壹兩  
黃連 兩  
輕粉 壹錢

冰片 麝香 各半錢

右為細末和勻每用或摻或紙瘡中以膏藥貼之  
甘石散 治下部疔瘡

爐甘石 蜜陀僧 各壹錢半  
輕粉 壹分  
椽斗子 燒灰存 龍骨 半錢  
麝香 少許

右為細末先用荆芥杜仲川椒煎湯放溫洗罷次  
用藥些少乾貼

梔子散 治下疔瘡  
右用梔子一枚去穰入明礬末麵糊封合口火燒

存性為末乾摻上隨效

銀粉散 治下疔陰頭生瘡

右用墻上白螺螄殼不以多少火內煨酥為末水  
內飛過先去土石麤者次用輕粉隨分兩入在末  
內每以少許乾貼在瘡上

治下疔瘡

右以孩兒茶研為細末先洗瘡淨乾則小油調傅  
濕則乾摻之神效

博金散 治下疔瘡臭爛腫痛

白礬 與蜜作僧同為末相和入  
於沙鍋內火上燒汗盡  
蜜陀僧 伍錢

白堊

貳錢

黃丹

輕粉

已上各壹錢

乳香

伍分

麝香

壹字

右為細末先須另用槐枝葱白鹽甘草熬湯淋濕洗一二時挹乾摻上項藥每用藥先須洗濕然後摻藥甚者三五次瘥

勝金散

治下疳潰爛或疼痛

黃連

黃礬

輕粉

銀硃

孩兒茶

各伍分

冰片

壹分

為細末香油調搽內服加味瀉肝湯

治下疳瘡久不愈椽斗子貳個各盛黃丹令滿相合

以亂髮纏定燒烟盡為度同研為末先以葱白熬

漿水洗瘡膿盡次上藥甚者不過三次如神

療人陰生瘡膿出成坎取高昌白礬麻仁等分研煉

豬脂相和成膏槐白皮煎湯洗瘡拭乾即塗膏然

後以楸葉貼其上不過三五度瘥

下疳瘡用五倍子末傅之

○婦人陰瘡

運氣陰瘡皆屬寒經云太陽之勝陰中乃瘍隱曲不利治以苦熱是也

仲景云少陰脉滑而數者陰中即生瘡陰中蝕爛者

下疳婦人陰瘡

外科

三三

狼牙湯洗之用狼牙貳兩以水肆升煮取半升以綿  
纏筋如繭浸湯瀝陰中日三遍

洗榻散全大治陰蝕瘡

甘草 乾漆各壹兩 黃芩

當歸 地黄 芍藥各貳兩

龜甲伍兩

右細切以水柒升煮取壹半去查以綿帛內湯中  
用榻瘡處良久即易日二度每榻湯可作十里許  
即挹乾捻取甘濕散薄傅瘡上使徧可經半日又  
以湯榻榻訖如前傳藥

甘濕散

蝮蛇膽真者 青木香 石硫黃

鐵精 麝香各肆分臨時入用緣麝辟

右各等分爲末更研細有患取如三碁子大和井  
花水日再服訖先令便利了即以後方桃枝先薰  
下部訖然後取藥如碁子安竹管裏內下部中日  
再度老少量減其薰法每日一度不用再

桃枝薰法 取東南桃枝伍柒枝輕打頭使散以綿  
纏之又搗石硫黃爲末將此綿纏桃枝撚轉之令  
末少厚又截一竹筒先內下部中仍以所撚藥桃



枝燒着薰之

蛇床子散 濕陰中主藥

用蛇床子仁一味末之以白粉少許和令相得如棗大綿裹內之自然濕散

補遺治陰瘡搗新桃葉綿裹內陰中日三兩易餘詳女科前陰諸疾

○穿襠發 銳疽 涌泉疽

或問背之下極發疽何如曰此名穿襠發屬督脉及太陽經由勞傷憂思積鬱所致活命飲加羌活黃蘗內托羌活湯主之及勝金丹神仙追毒丸壯實者八

陣散一粒金丹下之老弱者十全大補湯人參養榮湯此證宜速治稍緩則潰爛難收斂成漏者多麻木黑陷泄瀉嘔噦疲倦者不治

靈樞曰發於尻名曰銳疽其狀赤堅大急治之不治三十日死矣

鬼遺云涌泉疽腫起發太陰太陰尻尾前是也如伏鼠二十日不穴死十日可刺發清膿赤黑者死白者可治

○醫癰

或問醫上生癰何如曰腫高根淺為癰腫平根深為疽俱屬足太陽經濕熱所致宜服內托羌活湯內托

下部 醫癰

小科四

三五

復煎散加羌活主之勝金丹黃芪木香散選用壯實者一粒金丹八陣散下之老弱者十全大補湯人參養榮湯先賢云此瘡當服補養之劑若無補養之功其禍多在結痂之後治之難愈切須戒謹勿輟大補之劑腫而不潰者服臺閣紫微丸 薛醫膀胱經部分也居小腹之後此陰中之陰其道遠其位僻雖太陽多血氣連難及血亦罕到中年後尤慮此患治者毋傷脾胃毋損氣血但當固根本為主若腫硬作痛者形氣虛而邪氣實也用托裏消毒散主之微腫微痛者形氣病氣俱虛也用托裏散補之欲作膿用托

裏羌活湯若痛甚用仙方活命飲大勢既退亦用托裏消毒散若脾虛不能消散或不潰不斂者六君加芎歸黃芪若陰虛不能消散或作渴便淋者六味丸加五味子陽虛不能潰或膿清不能斂者補中益氣湯氣血俱虛者十全大補湯若腫硬未成膿者隔蒜灸活命飲潰後豆豉餅補中益氣十全大補二湯若灸後太勢已退餘毒未消頻用葱熨以補氣消餘毒而善 巡撫陳和峰脾胃不健服消導之劑左腿股及醫患腫余曰此脾氣虛而下注非瘡毒也當用補中益氣倍加白朮彼惑於衆論云白朮能潰膿乃專

以散腫消毒為主而腫益甚體益倦余用白朮一味煎飲而消。儒者楊啓元左醫患此敷貼涼藥腫徹內股服連翹消毒散左體皆痛余以為足三陰虧損用補中益氣湯以補脾肺六味丸加五味子以補肝腎股內消而醫間潰又用十全大補湯而瘡口斂。一儒者腫焮痛甚此邪毒壅滯用活命飲隔蒜灸而消後因飲食勞倦腫痛仍作寒熱頭疼此元氣虛而未能復也與補中益氣湯頻用葱熨法兩月而愈。一男子漫腫而色不變脈滑數而無力膿將成矣余用托裏而欲針彼畏針而欲內消誤用攻伐之劑頓

加惡寒發熱自汗等證余用十全大補湯數劑腫起色赤仍外針內補而愈。吳輔之父患此內潰腫脹發熱口乾飲食少思此脾胃虛弱也先用六君加芎歸芪數劑而潰又用十全大補湯倍加參芪五十餘劑而愈。一人年三十脈如屋漏雀啄腫硬色天膿水清稀誤服敗毒之藥余曰此足三陰虧損而藥復傷也余用六君加歸芪附子壹錢二劑腫潰色赤又減附子伍分數劑元氣復而瘡愈。一男子硬痛發熱此膀胱氣虛而濕熱壅滯用內托羌活湯二劑熱痛悉退後用托裏消毒散而潰又用托裏散四十餘

劑而歛 一上舍患痔外敷寒涼內服消毒攻潰於  
斃膿水清稀脉洪大而數寒熱作渴余辨不治果歿  
此足三陰虧損之證失滋化源以致真氣益虛邪氣  
愈甚矣不死何俟

內托羌活湯 治尻醫生癰堅硬腫痛大作

羌活

黃檗酒製各貳錢

防風

當歸尾

藁本

連翹

蒼朮

陳皮

甘草炙各壹錢

肉桂叁分

黃芪壹錢半

右作一服水壹鍾酒半鍾煎至捌分食前服

○懸癰

懸癰生於篡間謂前陰之後後陰之前屏翳處也即  
會陰穴屬任脉別絡俠督脉衝脉之會癰生其間人  
起立則若懸然故名懸癰屬足三陰虧損之證輕則  
為漏瀝盡氣血而亡重則內潰而即隕若初起濕熱  
壅滯未成膿而作痛或小便澀滯用龍膽瀉肝湯腫  
焮痛甚仙方活命飲並以製甘草佐之如此雖患亦  
輕雖潰亦淺若不能成膿或膿成不潰者八珍散補  
之若膿已成者急針之欲其生肌收斂腎虛者六味  
地黃丸血虛者四物加參朮氣虛者四君加芎歸脾

下音 卷之四  
虛者補中益氣湯氣血俱虛者八珍湯并十全大補湯若用寒涼消毒則誤矣 薛懸癰原係肝腎二經陰虛雖一干補猶恐不治况膿成而又剋伐不死何待常治初起腫痛或小便赤澀先以製甘艸一二劑及蒜灸更飲龍膽瀉肝湯若發熱腫痛者以小柴胡加車前黃蘗芍歸膿已成卽針之已潰用八珍湯加製甘草柴胡稍酒炒黃蘗知母小便澀而脈有力者仍用龍膽瀉肝湯加製甘草小便澀而脈無力者用清心蓮子飲加製甘艸膿清不斂者用大補劑間以豆豉餅或久而不斂者亦用附子餅灸並效 尚寶

鮑希傳足發熱服四物黃蘗知母之類年餘患懸癰唾痰作渴飲湯其熱至膝更加芩連二陳熱痰益甚謂余曰何也余曰此足三陰虧損水泛爲痰寒涼之劑傷胃而甚耳遂先用補中益氣夕用六味丸間佐以當歸補血湯半載乃愈 趙州守患此證腫多作痛五月餘矣晡熱口乾盜汗食少體倦氣短脈浮數而無力此足三陰氣血虧損用補中益氣加製甘艸五味麥門三十餘劑食進勢緩又用六味丸料五十餘劑膿潰瘡斂後因怒作痛少食脇痛發熱仍用前藥賴其稟實慎疾而愈 通府張敬之患前證久不

愈日晡熱甚作渴煩喘或用四物湯黃蘗知母之類  
前症益甚更體倦少食大便不實小便頻數謂余曰  
何也余曰此脾虛之症前藥復傷而然也遂用補中  
益氣加茯苓半夏數劑飲食漸進諸症漸愈更加麥  
門五味調理乃痊經云脾屬至陰為陰土而主生血  
故東垣先生云脾虛元氣下陷發熱煩渴肢體倦怠  
等證用補中益氣湯以升補陽氣而生陰血若誤認  
為陰虛輒用四物黃蘗知母之類反傷脾胃生氣是  
虛其虛矣况黃蘗知母乃瀉陽損陰之劑若非膀胱  
陽火盛而不能生陰水以致發熱者不可用也

儒者患此服坎離丸及四物黃蘗知母之類不應肌  
浮洪按之微細余以為足三陰虛用托裏散及補陰  
托裏散漸愈又用六味丸補中益氣湯調補化源半  
載而痊大凡瘡瘍等症若腎經陽氣亢盛致陰水不  
能化生而患陰虛發熱者宜用坎離丸取其苦寒能  
瀉水中之火令陽氣衰而水自生若陽氣衰弱致陰  
水不能化生而患陰虛發熱者宜用六味丸取其酸  
溫能生火中之水使陽氣旺則陰自生况此證屬腎  
經精氣虧損而患者十有八九屬腎經陽氣亢盛而  
患者十無一二然江南之人患之多屬脾經陰血虧

損元氣下陷須用補中益氣湯升陽補氣使陽生而  
陰長若嗜慾過多虧損真水者宜用六味丸補腎經  
元氣以生精血仍用補中益氣湯以培脾肺之生氣  
而滋腎水經云陰虛者脾虛也但多誤以為腎經火  
症用黃蘗知母之類復傷脾肺絕其化源反致不起  
惜哉上上舍劉克新潰後作痛發熱口乾小便赤澀  
自用清熱消毒之藥不應左尺洪數余以為陽氣成  
而陰氣虛也先用四物湯加黃蘗知母等諸劑瀉其  
陽氣使陰自生服數劑諸證漸愈後用補中益氣湯  
六味地黃丸補脾肺滋腎水而瘡口愈 一儒者小

便赤澀勞則足軟腫痛發熱口乾舌燥食少體倦日  
晡益甚此氣血虛而未能潰也遂用八珍加麥門山  
藥倍用製甘草數劑諸證悉退但患處腫痛此膿內  
焮也又五劑膿自涌出又五十餘劑而瘡口將完又  
因勞役且停藥寒熱作渴腫痛膿多用補中益氣湯  
加炒山梔二劑少愈又以八珍湯加麥門五味百餘  
劑腫痛悉去喜其慎起居節飲食常服補劑而安但  
勞則出膿一二滴後惑於他言內用降火外用追蝕  
必其收斂致患處大潰幾至不起仍補而瘡  
甘草膏 治水穀道前後生癰謂之懸癰及肛門前

陰囊後生核子如橄欖樣或如梅李狀初不作痛至旬月漸熟不早治瘡潰膿血出日數箇至有腸腐而大便從瘡口出者其苦不可言近亦數月遠至一二年亦愈須是作核未痛以前治之不過一二服便自消此病初發如松子大漸如蓮子數十日後始覺赤腫如桃李即破若破則難治服此藥雖不能急消過二十餘日必消盡矣投兩服亦無害林院判康朝嘗患此疾已破服此藥兩服瘡即合甚妙

右用粉草半斤內用無節者四兩如箒子樣劈破

取泉石間長流水以甘草入水中浸透以炭火將甘草蘸水焙炙以二盃水盡為度不可急性劈開却將所炙甘草另用泉水三盞無灰好酒五盞用瓦罐煎至三之一如膏一起服之立愈另用有節甘草四兩仍用泉水隨罐大小煎湯澆洗患處三遍其効如神水冷再溫洗

丹騎馬癰用大粉草帶節四兩長流水壹盃以粹浸水盡為末入皂角灰少許作四服湯調頓服立効薛大抵此證屬陰虛故不足之人多患之寒涼之劑不可過用恐傷胃氣惟製甘草一藥不損氣血



不動臟腑其功甚捷

加味小柴胡湯 方見前

清心蓮子飲 治懸癰勢退惟小便赤澀

黃芩 伍錢 黃芪 蜜炙 石蓮肉 去心

人參 赤茯苓 各半 車前子 炒

麥門冬 去心 甘州炙 地骨皮

製甘草 法見前

每服壹兩用水貳鍾煎至捌分食前服 如發熱

加柴胡薄荷

加味托裏散 治懸癰不消不潰

人參 黃芪 鹽水炒 當歸 酒拌

川芎 麥門冬 去心 知母 酒拌

黃蘗 酒拌炒 芍藥 炒 金銀花

柴胡 製甘草 法見前

作一劑用水貳鍾煎前捌分食前服

加味十全大補湯 治懸癰潰而不斂或發熱飲食

少思

人參 黃芪 鹽水炒 白朮 炒

茯苓 熟地黃 酒拌中 當歸 酒拌

川芎 芍藥 炒 各壹錢 肉桂

麥門冬

去心

五味子

搗炒

甘草

各伍分

作一劑用水貳鍾煎壹鍾食前服

莖腫加青皮

熱加黃芩柴胡

日晡熱加柴胡地骨皮小

便赤加酒製知母黃蘗

小便澀加車前子山梔

子俱炒

雞內金散

治穀道邊生瘡久不愈者

雞胗胗

不拘多少即是雞胗內去下黃皮

右件燒灰存性研為極細末每用少許乾貼之如

神

治穀道中瘡

以水中荇葉細搗綿裹內下部日三

治肝内生癰腫痛方

蜈蚣

穿山甲

蛤粉

血餘

帶血管鷲毛

生鹿角

已上各藥俱煨存性研細等分和勻每服伍錢空

心好酒下

勿誤取

口上各藥所製不與西藥等公以形勢相異

效効

藥山甲

公係

血補

此藥內中藏血補

