



傷寒

素問

素熱論篇帝曰：今夫熱病者，皆傷寒之類也。或愈或死，其死皆以六七日之間，其愈皆以十日以上者，何也？岐伯對曰：巨陽者，諸陽之屬也。其脈連於風府，故為諸陽主氣也。人之傷於寒也，則為病熱。熱雖盛，不死，其兩感於寒而病者，必不免於死。帝曰：願聞其故。岐伯曰：傷寒一日，巨陽受之，故頭項痛，腰脊強。二日，陽明受之，陽明主肉，其脈俠鼻，絡於目，故身熱目疼，而鼻乾不得卧也。三日，少陽受之，少陽主膽，其脈循脇，絡於耳，故胸脇痛，而耳聾。三陽經絡皆受其病，而未入於臟者，故可汗而已。四日，太陰受之，太陰脈布胃中，絡於嗑，故腹滿而嗝乾。五日，少陰受之，少陰脈貫腎，絡於肺，繫舌本，故口燥舌乾而渴。六日，厥陰受之，厥陰脈循陰器而絡於肝，故煩滿而囊縮。三陰三陽五臟六腑皆受病，榮衛不行，五臟不通，則死矣。陰皆連五臟，故曰入臟。非風寒直入臟中也。其不兩感於寒者，七日，巨陽病衰，頭痛少愈。八日，陽明病衰，身熱少愈。九日，少陽病衰，耳聾微聞。十日，太陰病衰，腹減如故，則思飲食。十一日，少陰病衰，渴止不滿，舌乾已而嚏。十二日，厥陰病衰，囊縱，少腹微下，大氣皆去，病日已矣。帝曰：治之奈何？岐伯曰：治之各通其臟脈，病日衰已矣。其未滿三日者，可汗而已。其滿三日者，可泄而已。水熱穴論，帝曰：人傷於寒，而傳為熱，何也？岐伯曰：夫寒甚則生熱也。

兩感 素熱論，帝曰：其病兩感於寒者，其脈應與其病形何如？岐伯曰：兩感於寒者，病一日，則巨陽與少陰俱病，則頭痛口乾而煩滿。二日，則陽明與太陰俱病，則腹滿身熱，不欲食，語言。三日，則少陽與厥陰俱

病則耳聾囊縮而厥陰水漿不入不知人六日死帝曰五臟已傷六腑不通榮衛不行如是之後三日乃死何也岐伯曰陽明者十二經脈之長也其血氣盛故不知人三日其氣盡故死兩感則表裏同病

溫病暑病 素熱論凡病傷寒而成溫者先夏至日者為病溫後夏至日者為病暑暑當與汗皆出勿止

陰陽交 素評熱病論帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾不為汗衰狂言不能食病為何岐伯曰

病名陰陽交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉

而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗出者精氣也今汗出而輒復熱

者是邪勝也不能食者精無俾也病而留者其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛者死今脈

不與汗相應此不勝其病也其死明矣狂言者是失志失志者死今見三死不見一生雖愈必死也

遺證 素熱論帝曰熱病已愈時有所遺者何也岐伯曰諸遺者熱盛而強食之故有所遺也若此者皆

病已衰而熱有所藏因其穀氣相薄兩熱相合故有所遺也帝曰善治遺奈何岐伯曰視其虛實調其逆

從可使必已矣帝曰病熱當何禁之岐伯曰病熱少愈食肉則復多食則遺此其禁也

難經

傷寒有幾其脈有變不然傷寒有五有中風有傷寒有濕溫有熱病有溫病其所苦各不同中風之脈陽

浮而滑陰濡而弱濕溫之脈陽濡而弱陰小而急傷寒之脈陰陽俱盛而緊瀉熱病之脈陰陽俱浮浮之

而滑沉之散瀉溫病之脈行在諸經不知何經之動也各隨其經所在而取之傷寒有汗出而愈下之而

死者有汗出而死下之而愈者何也然陽虛陰盛汗出而愈下之即死陽盛陰虛汗出而死下之而愈陽

陰盛者風傷衛而汗自洩寒氣在內而未出也陽盛陰虛者身熱汗開燥火內結津液乾枯陰氣欲竭也此以有邪處為虛無邪處為盛

傷寒論六經脈證

太陽病脈浮頭項強痛而惡寒 尺寸俱浮者太陽受病也其脈上連風府故頭項痛腰脊強 發熱汗出惡風脈緩者名曰中風 惡寒體痛嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒 發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六也

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脈浮而緊疑寒未陽明病若能食名中風不能食名中寒 尺寸俱長者陽明受病也其脈俠鼻絡於目故身熱目夜鼻乾不能卧 陽明外證身熱汗自出不惡寒反

惡熱也邪氣已離太陽故不惡寒陽明脈大以上皆陽病有太陽陽明有正陽陽明有少陽陽明此三條皆傳脈之證太陽陽明者脾約是也 少陽陽明者發汗利小便已胃中燥煩實大便難是也 陽明之為病胃家實也此正陽陽明居中土也萬物所歸無所復傳始雖惡寒二日自止此為陽明病也

少陽之為病口苦舌乾目眩也 尺寸俱弦者少陽受病也其脈循脇絡於耳故胸脇痛而耳聾 少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚 傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽頭痛發熱與太陽同而脈之弦細獨異三陽合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗內熱傷寒六七日無大熱內熱輕則其人躁煩者此為陽去入陰也躁則病欲退矣傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此為三陰不受邪也

太陰之為病腹滿而嘔食不下自利益甚時腹自痛 尺寸俱沉細者太陰受病也其脈布胃中絡於嗑故腹滿而嗑乾 傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰同一太陰病而有沉細浮緩之殊蓋沉細乃太陰病脈浮緩乃太陰本脈也自利不渴者屬太陰以臟有寒故也當溫之宜服四逆輩此自利而不渴寒入中焦也

少陰之為病脈浮細但欲寐也衛氣行於陽則寐行於陰則寐少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也 尺寸俱沉者少陰受病也以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴

傷寒 卷三 傷寒 二

厥陰之為病消渴氣上撞心中夜熱飢而不欲食食則吐蛇下之利不止尺寸俱微緩者厥陰受病也以其脈循陰器絡於肝故煩滿而囊縮厥陰中風脈微浮為欲愈不浮為未愈

傷寒傳足不傳手經脈此本陶節庵最為明辨

足太陽脈起於目內眦從頸下後項連風府行身之後終於足其外證頭疼項強腰脊痛骨節痛惡心發熱惡寒標病宜發汗但太多則亡陽筋惕肉瞤小便不利者當利自利者不可利之引熱入膀胱其人如狂不可下下之為結胸

足陽明脈起於鼻頰絡於目循面下人迎入缺盆下膈屬胃行身之前終於足之厲兌穴故其證目痛鼻乾不得眠頭頰痛身熱微惡寒無汗者屬標病宜解肌身熱發渴汗出屬本病宜清熱解肌若惡熱自汗發渴去衣被發斑發黃發狂大便祕腹滿此正陽明胃腑病也宜下之

足少陽脈起於目銳眦上抵頭循角絡耳中循胸脇行身之側終於足故頭角痛目眩耳聾脇疼心下痞寒熱往來嘔而口苦膽熱也此經無標本只有小柴胡一湯和解隨證加減有三禁汗之犯太陽下之犯陽明利之犯少陰脈弦數者是本經證

足太陰為三陰經首其脈始於足大指上行至腹絡於喉連舌本行身之前也故腹滿自利咽乾嘔吐腹滿邪入脾也嘔吐脾氣不和也自利挾熱下利也咽乾脾脈連喉也頭不皮陰脈至頸而還也身微熱手足溫表邪解而傳入裏也身自俱黃標病宜平熱腹滿硬痛渴而喉乾小便赤大便難本病雖宜下然當

分寒熱施治足少陰脈始於足心上行貫脊循喉絡舌本下注心膈行身之後也其病手足乍冷乍溫身不熱者標病二便不通舌乾口燥者本病此經本熱而標寒也宜急下以存腎水雖自利此是飲湯水所致不可疑為寒也初病大熱至此變為厥冷者是熱深厥亦深也急下之至陰又難拘定法因分直中者

寒證傳經者熱證大抵六經中惟此難辨有直中真陰者有夾陰中寒者有夾陰傷寒者有虛陽伏陰者有陰極發躁者有漏底傷寒者前二證身不熱厥冷全似少陰傳經而冷者後四證身熱面赤又全似陽大要口燥舌乾渴而譫語大便實者傳經熱證也足冷嘔吐瀉痢不渴或惡寒腹痛者直中真寒證也足厥陰脈始於足大指上循陰器抵小腹循脇上口唇與督脈會於顛項行身之側也其證煩躁囊拳消渴舌捲譫語大便不通而頭疼手足乍冷乍溫者此是陽經傳來熱邪本病宜急下若發熱惡寒狀如瘧疾此是熱邪在經標病宜和解若不嘔便清當有大汗至而自愈頭疼者以督脈會於顛頂故也大抵熱深厥亦深則舌捲囊縮肝主筋也陰寒冷極亦捲縮須以口渴不渴足冷不冷脈沉實沉細別之厥陰屬設人無算熱證傷寒論自知

傷寒六經治法方諸方精義俱詳余所著傷寒類方中不更贅

桂枝湯與本傷寒論治太陽中風頭疼發熱汗出惡風

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右五味以水七升微火煮取三升去滓

適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許通身絳絳微似有汗者益佳不可令如水流瀉病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服當小

促其間半日許令三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出者乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麪五辛酒酪臭惡等物此服外感風寒之藥服法俱當如此

麻黃湯治太陽中寒頭身俱痛發熱無汗惡風而喘

麻黃三兩桂枝二兩甘草一兩杏仁七十個湯去節右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將息

蘭臺執範

卷三 傷寒

桂枝麻黃各半湯 治傷寒向愈脈微緩惡寒身癢

桂枝一兩十六芍藥酒洗生薑切甘草炙麻黃各一兩大棗四枚杏仁二十四個湯浸去皮尖及兩仁者右

七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫納諸藥煮取一升八合去滓溫服六合令微汗則愈

桂枝加葛根湯 治太陽病項背強八八反汗出惡風

葛根四兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚桂枝三兩右六味以水一斗先煮葛根減二

升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法本方無麻黃若加麻黃則為葛根湯矣陳

無己本誤如

葛根湯 治太陽病項背強無汗惡風者又治太陽陽明合病自下利者

葛根四兩麻黃二兩桂枝二兩芍藥二兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右七味以水一斗

先煮麻黃葛根減二升去沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法將

息及禁忌

葛根黃芩黃連湯 治太陽證誤下利遂不止喘而汗出者此主之

葛根半斤甘草炙黃芩略二黃連三兩右四味以水八升先煮葛根減二升入諸藥煮取二升

去滓分溫再服

桂枝加芍藥湯 治太陽誤下腹滿時痛屬太陰也此主之太實痛者加大黃一兩即桂枝加大黃湯

桂枝三兩芍藥六兩甘草二兩生薑三兩大棗十二枚右五味以水七升微火煮取三升去滓

適寒溫服一升此即桂枝湯加芍藥一倍即另成一方而以之治太陰證分兩輕重之所關如此太陰病必腹滿

大青龍湯 治太陽中風脈浮緊惡寒發熱身疼不汗出而煩躁者

麻黃去節桂枝去皮甘草炙杏仁四十粒生薑切大棗十二枚石膏如雞子右七味以水九升

先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者

一停後服。汗多亡陽。遂虛。惡風。煩躁不得眠也。此風寒兩傷之方。按載大青龍何以不載小青龍蓋小青龍治傷寒不解。心下有水氣之證。非傷寒正方也。

桂枝加桂湯 治燒針令其汗。針處被寒核起。微赤。必發奔豚。灸其核上各一壯。與此湯。即桂枝湯加

桂二兩

小柴胡湯 治少陽中風。往來寒熱。胸脇苦滿。心煩喜嘔。腹痛。心悸。頭汗出。舌上胎白。及婦人熱入血室

等證

柴胡半斤黃芩半斤人參甘草芍藥三兩半夏半升生薑切大棗十二枚右七味水一斗二升。煮

取六升。去滓。再煎。取三升。溫服一升。日三服。若胸中煩而不嘔。去半夏。人參。加枳實一枚。若渴

者。去半夏。加人參。合前成四兩半。括薑根四兩。若腹中痛者。去黃芩。加芍藥三兩。若脇下痞鞭。去

大棗。加牡蠣四兩。若心下悸。小便不利者。去黃芩。加茯苓四兩。若不渴。外有微熱者。去人參。加桂

三兩。溫覆。取微汗。愈。若欬者。去人參。大棗。生薑。加五味子半升。乾薑二兩。此方如成法須細審

大柴胡湯 治傷寒十餘日。柴胡證仍在。嘔而心下急。心中痞鞭。而熱結在裏。往來寒熱等證。

柴胡半斤黃芩三兩芍藥三兩半夏半升生薑切枳實四枚大棗十二枚右八味以水

一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

大承氣湯 治傷寒十餘日。吐下後不解。晡時發潮熱。獨語如見鬼狀。尋衣摸牀。胃中有燥屎也。此下之

大黃四兩厚朴半斤枳實五枚芒硝三合右四味以水一斗。先煮二物。取五升。去滓。納大黃。煮取

二升。去滓。納芒硝。更上微火。一兩沸。分溫再服。得下。餘勿服。謂中非存燥屎之所。此言胃中者。指足陽

蘭臺執範 卷三 傷寒 四

小承氣湯 治汗多微發熱下惡寒或小便數而大便鞕譏語者與此湯微和胃氣

大黃四兩 厚朴二兩去 枳實三枚

右三味以水四升煮取一升二合去滓分溫二服初服湯當更

衣不爾者盡飲之若更衣者勿服之

調胃承氣湯 治胃氣不和惡寒但熱腹微滿而煩與此湯

大黃四兩去皮 甘草二兩 芒硝半斤

右三味以水三升先煮大黃甘草取一升去滓納芒硝

更上大微者令沸少少溫服不惡寒乃外邪已盡方

桃核承氣湯 治太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者愈其外不解者尚未可攻宜先與桂枝

解外外解已但小腹急結此主之

桃仁五十個 桂枝二兩 大黃四兩 芒硝

甘草二兩 右五味以水七升煮取二升半去滓納芒

硝更上大微沸下火先令溫服五合日三服當微利

抵當湯 治傷寒六七日少腹鞕小便不利其人如狂喜忘大便黑此有蓄血

水蛭熬 蠱蟲各三十個 桃仁三十個 大黃三兩

右四味為末以水五升煮取三升去滓溫服一

升不下再服

抵當丸 治傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當下之不可餘藥

水蛭二十個 蠱蟲二十個 桃仁二十個 大黃三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之

晡時當下血若不下者更服

大陷胸湯 治表未解而醫反下之胃虛而陽氣內陷心下有鞕舌上燥渴小有潮熱心上至少腹痛不

可近

大黃去皮芒硝一升甘遂一錢右三味以水六升先煮大黃取二升去滓納芒硝煮一兩沸納甘

遂末溫服一升得快利止後服結胸乃水飲為患傷寒論云此為水結故用甘遂

大陷胸丸 治病發於陽而反下之熱入因作結胸病發於陰而反下之因作痞所以成結胸者以下之

太早故也

大黃半斤葶藶子煮芒硝 杏仁去皮尖右四味搗篩二味納杏仁芒硝合研如脂和散

取如彈丸一枚別搗甘遂末一錢匕白蜜二合水二升煮取一升溫頓服之一宿乃下如不下更服取

下為效

小陷胸湯 治病在心下按之則痛脈浮滑者

黃連一兩半夏半升栝婁實大者右三味以水六升先煮栝婁取三升去滓納諸藥煮取二升去

滓分溫三服

白虎湯 治脈滑而厥裏有熱也 又治三陽合病腹滿身重譫語遺尿自汗出者

知母六兩石膏一斤甘草二兩粳米六合右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

陽極於內發散則路遠故從小便去之

麻黃附子細辛湯 治少陰始得病反發熱脈沉者

麻黃去節細辛略二兩附子一枚泡去皮破八片右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫納藥煮取三升

去滓溫服一升日三服

四逆散 治少陰傳經熱邪四逆或欬或悸或小便利或腹中痛或泄痢下重者

甘草炙枳實破水漬柴胡 芍藥各十右四味搗篩白飲和服方寸匕日三服欬者加五

味子乾薑各五分并主下痢 悸者加桂枝五分 小便不利者加茯苓五分 腹中痛者加附子一

枚炮令拆 泄利下重者先以五升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸匕納湯中煮取一升半

分温再服熱和入深乃見四逆誤認為寒胎害匪細 薤白能治下重以能瀉大腸之氣也

四逆湯 治脈沉體痛温温欲吐下利清穀手足厥冷内寒外熱脈微欲絕等證

甘草二兩 乾薑一兩 附子一枚生用去 右三味咬咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服強

人可大附子一枚乾薑三兩四逆湯不可輕用一症不具即當 細審必諸症皆全方可决用無疑

四逆加人參湯 治痢後亡血 本方加人參

通脈四逆湯 治下痢清穀脈絕汗出而厥 本方加乾薑一倍

通脈四逆加豬膽汁湯 治汗出而厥脈絕拘急 本方加豬膽汁

當歸四逆湯 治手足厥冷脈細欲絕脈浮革因而腸鳴者

當歸 桂枝 芍藥各三兩 細辛二兩 大棗二十枚 甘草 通草各二兩 右七味以水八升煮取

三升去滓温服一升日三服此四逆症乃從太陽誤下所致非厥陰 故仍以桂枝湯為主

理中丸及湯 治霍亂頭痛發熱身皮痛寒多不用水者理中湯若大病瘥後喜唾久不了了胃上有寒

者用理中丸

人參 甘草炙 白朮 乾薑各三兩 右四味搗篩為末蜜丸如雞子黃大以沸湯數合和一

丸研碎温服之日三服夜二服腹中未熱益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水八升煮

取三升去滓温服一升日三服四逆乃温下焦中焦之法理中為 温上焦中焦之法各有部位也

附子瀉心湯 治心下痞而復惡寒汗出

大黃二兩 黃連

黃芩各一兩 附子一枚 炮去皮

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去

滓納附子汁分溫再服

治上焦用生藥故漬而不煎 附子能回陽止汗

梔子豉湯 治汗吐下後虛煩不得眠及大下之後身熱未去心中結痛或微煩者

梔子十四枚 擘香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半納豉煮取一升半去滓分為二服溫

進一服得吐者上後服即在至高之分以此吐之所謂在上者

真武湯 治太陽汗出不解仍發熱心忪頭眩身攣動振振欲倒地者 又治少陰至四五日小便不利

四肢沉重痠痛自下痢此為有水氣

茯苓 芍藥

生薑各三兩 白朮二兩 附子一枚 炮去皮破八片

右五味以水八升煮取三升去滓溫服

七合日三服此治水逆

若欬者加五味半升細辛乾薑各一兩 若小便利者去茯苓 若下痢者

去芍藥加乾薑二兩 若嘔者去附子加生薑足前成半斤

大黃黃連瀉心湯 治傷寒脈浮緊而復下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳此主之

大黃二兩 黃連一兩

右二味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓分溫再服凡治下焦之補劑當多煎劑當不煎以生為主 此亦治至高之熱邪故亦用生藥

白通湯 治少陰下痢

葱白四莖 乾薑一兩 附子一枚 生用去皮破八片

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服此為寒劑

白通加豬膽汁方

治服白通湯利不止汗出而厥逆無脈乾嘔而煩服湯後脈暴出者死微續者生

即白通湯煎成納人尿五合豬膽汁一合分溫再服

豬膚湯 少陰病下利咽痛胸滿心煩者此主之

豬膚湯 少陰病下利咽痛胸滿心煩者此主之

豬膚一斤 右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬香和令相得温分六服陰之虛火下達

甘草湯桔梗湯 治少陰咽痛先與甘草湯不瘥與桔梗湯

甘草二兩 右一味以水二升煮減半去滓温服七合日二服 桔梗湯加桔梗一兩煎法同此方

陰在上之大

瓜蒂散 治太陽病胸中痞鞭氣上冲脚不得息此胸中有寒也又或手足厥冷脈乍緊心中煩滿不能食病在胸中並當吐之

瓜蒂煮 赤小豆各一 右二味各別搗篩為散已合治之取一錢匕以香豉一合用熱湯七合煮作稀糜去滓取汁和散温頓服之不吐者少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

麻黃升麻湯 治傷寒六七日大下後厥逆寸脈沉遲下部脈不至咽喉不利吐膿血泄瀉為難治主之

麻黃二兩半去節升麻 當歸各一分 知母 黃芩 姜蕤各八銖石膏碎綿裹白朮 乾薑

芍藥 天冬去心桂枝 茯苓 甘草炙各六銖 右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫納諸藥者取三升去滓分温三服令汗出愈

旋覆代赭湯 治傷寒汗出吐下後心下痞鞭噎氣不除此主之

旋覆花三兩 人參二兩 生薑切兩半夏洗升代赭石一兩 大棗擘甘草炙兩 右七味以水一斗

煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

苦酒湯 治少陰病咽中生瘡聲不出者

半夏洗破十枚雞子一枚去黃納 右二味納半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令三沸去

滓少少含燕之不差更作三劑服之製法

枳實梔子豉湯 治大病瘥後勞復

枳實三枚 梔子十四枚 豉一升 右三味以清漿水七升空煮取四升納枳實梔子煮取二升下豉更

煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚大病後勞復庸醫必作虛治乃純用降氣

清火之品 當細參之

竹葉石膏湯 治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者方見通治 壯大食氣 故少氣者多屬大症

燒視散 治陰陽易病其人身重少氣少腹裏急陰中拘攣熱上衝胸頭重不舉眼中生花膝脛拘急

右取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服方寸匕日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子視

當燒灰

豬膽導法 以豬膽汁加醋納穀道中

蜜煎導法 以蜜煎老棗作指大一條納穀道中以手按之

右二方俱治傷寒大發汗小便利津液內竭大便雖鞕不可攻之用此法

治男子新病起房內復者方針 取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方針 取所交接婦人衣服以覆男子立愈

竹皮湯針 治交接勞復卵腫腹痛便絕欲死

青竹皮一升 右一味水三升煮五六沸絞汁頓服立愈此方范汪亦治大便後勞復

療食勞方針 杏仁五十枚 右一味以酢二升煎取服之取汗則差

治結胸灸法本方

巴豆四黃連皮附連 右搗細末用津唾和成膏填入臍心以艾灸其上腹中有聲其病去矣不

拘壯數以病退為度纏冬便以溫湯浸手帕拭之恐生瘡也此法最穩凡胸中病俱可依此法治

鵲石散林事 治傷寒發狂棄衣奔走踰牆上屋

黃連 寒水石石略等 右為細末每服二錢濃煎甘草汁調服

驚甲散話人 治傷寒八九日不瘥名曰壞證傷寒不能治者宜此療之

升麻 前胡去蘆烏梅去核枳實楚妙犀角鎔黃芩略半生地黃切兩甘草一分驚甲去粗米

用半兩 右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服

升麻驚甲湯醴 陽毒之為病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血五日可治七日不可治此湯主之

升麻 二兩 當歸 一兩 蜀椒 炒去汗 甘草 二兩 驚甲 一指大雄黃 研兩 右六味以水四升煮取一升

頓服之老小再服取汗

升麻驚甲去雄黃蜀椒方 陰毒之為病面目青身痛如被杖咽喉痛五日可治七日不可治升麻驚甲

湯去雄黃蜀椒主之 肘後千金方陽毒用升麻湯無驚甲有桂陰毒用甘草湯即本方無雄黃活人

陽毒升麻湯用犀角射干黃芩人參無當歸蜀椒驚甲雄黃蜀椒辛熱之品陽毒用而陰毒反去之疑誤活人書加犀角等四味類切當

梔子仁湯話人 治陽毒傷寒壯熱百節疼痛

梔子仁 一兩 柴胡 半兩 升麻 黃芩 略二 赤芍 一兩 大青 一兩 石膏 二兩 知母 一兩 甘草 半兩

杏仁雙仁者妙炒微黃 右件搗為粗末每服抄四錢以水一盞入生薑半分豉一百粒煎至六

分去滓不計時候溫服

還陽湯林事 治陰毒面色青四肢逆冷心燥腹痛用硫黃末新汲水調下良久或寒一起或熱一起

更看緊慢再服一二錢則為汗出在

姜麩湯活人書

治風溫兼瘧冬溫及春月中風傷寒發熱頭眩痛喉咽乾舌強胸內疼痞滿背強

姜麩 三分 石膏 一兩 碎 白薇

麻黃 湯泡焙 川芎

葛根 生者可兩用 尤妙 大羌活 去蘆 甘草 炙

杏仁 去皮尖雙仁

青木香 一分 冬一兩 始 春用半兩 炒

右判如麻豆大每服五錢水一盞半煎一盞日三四服

此清散之劑可治時疫

白虎加蒼木湯本事方

治濕溫多汗

知母 五兩 甘草 二兩

石膏 一斤 蒼朮

粳米 各三

右為末每服四錢水一盞半煎至七分去滓

取汁溫服

黑膏活人書

治溫毒發斑

好豉 一升 生地黃 半斤

右二味以豬膏二斤合露之煎令三分減一絞去滓用雄黃麝香如大豆

者內中絞和盡服之毒便從皮中出則愈

凡外感之症治之得宜六七日間無不愈者過期不愈皆治

治法千端聚訟不息故仲景傷寒論治傷寒之方不過數首餘皆誤治之變症故取治雜病之方隨

症救療也按傷寒為外感之總名傳變出入千頭萬緒仲景傷寒論一字不可遺漏今止舉六經本

症及六經主方數首以存大畧不可以此而廢全書也能將傷寒全書熟讀而

百合病

金匱

論曰百合病者百脈一宗悉致其病也意欲食復不能食常默然欲卧不能卧欲行不能行飲食或有美

時或有不用聞食臭時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能治得藥則劇吐利如有神靈者身形

如和其脈微數每溺時頭痛者六十日乃愈若溺時頭不痛漸然者四十日愈若溺快然但頭眩者二十

日愈其證或未病而預見或病四五日而出或病二十日或一月微見者各隨證治之

百合病見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此為逆見陰攻陽乃復下之

此亦為逆此等症病後得之者甚多醫者不知多方誤治以致病氣日深不可救療始終無一人能識之者遍地皆然也百脈一宗悉病蓋肺朝百脈故以百合治肺為主藥

百合病方

百合知母湯金匱 百合病發汗後者主之

百合七枚知母三兩 右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓

別以泉水二升煎知母取一升去滓後合和煎取

滑石代赭湯金匱 百合病下之後者主之

百合七枚滑石三兩代赭石如彈丸大一 右先以水洗下合漬一宿當白沫出去其水更以泉

水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫服

百合雞子湯金匱 百合病吐之後者主之

百合七枚雞子黃一枚 右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去

滓內雞子黃攪勻煎五分溫服

百合地黃湯金匱 百合病不經吐下發汗病形如初者主之

百合七枚生地黃汁一升 右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升

去滓內地黃汁煎取一升五合分溫再服中病勿更服大便當如漆

百合洗方金匱 百合病一月不解變成渴者主之

百合一升以水一斗漬之一宿以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

栝萋牡蠣散金匱 百合病渴不差者主之

栝萋根 牡蠣熬等 右為細末飲服方寸匕日三服

百合滑石散金匱 百合病變發熱者一作發熱主之

百合一兩 滑石二兩 右為散飲服方寸匕日三服當微利者止服熱則除

感冒方附

九味羌活湯張元素方 四時發散

羌活 防風 川芎 白芷 細辛 蒼朮 黃芩 甘草 生地 右加生

薑三片葱白三莖水煎服此外感之總方惟生地不若易當歸為佳此方

敗毒散活人書 治傷寒瘟疫風濕風眩拘蹇風疾頭痛目眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 白茯苓 桔梗 人參各一兩

甘草五錢 右為細末每服二錢水一盞入生薑三片煎七分溫服或沸湯點服 煩熱口渴加黃芩

參蘇飲醫方 治感冒風寒頭痛發熱憎寒咳嗽涕唾稠黏胸膈滿悶脈弱無汗

人參 蘇葉 乾葛 前胡 陳皮 枳殼 茯苓 半夏各八分 桔梗 木香

甘草各五片 生薑五片 大棗一枚 右十三味水煎熱服取汗以上三方乃感冒風寒之總法其病

能傳變大段驅散太陽陽明之風寒足矣其有食者則兼用消食之品可也此等症四時皆有南方最多

寒熱

靈素

靈口問篇帝曰人之振寒者何氣使然岐伯曰寒氣客於皮膚陰氣盛陽氣虛故為振寒寒慄

素逆調論黃帝問曰人身非常溫也非常熱也為之熱而煩滿者何也岐伯對曰陰氣少而陽氣勝故熱而煩滿也帝曰人身非衣寒也中非有寒氣也寒從中生者何岐伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出帝曰人有四肢熱逢風寒如炙如火者何也岐伯曰是人者陰氣虛陽氣盛四肢者陽也兩陽相得而陰氣虛少少水不能滅盛大而陽獨治獨治者不能生長也獨勝而止耳逢風寒如炙如火者是人當肉爍也帝曰人有身寒湯火不能熱厚衣不能溫然不凍慄是為何病岐伯曰是人者素腎氣勝以水為事太陽氣衰腎脂枯不長一水不能勝兩大腎者水也而生於骨腎不生則髓不能滿故寒甚至骨也所以不能凍慄者肝一陽也心二陽也腎孤臟也一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺是人當攣節也帝曰人之肉前者雖近於衣絮猶尚奇也是為何病岐伯曰榮氣虛衛氣實也榮氣虛則不仁衛氣虛則不用榮衛俱虛則不仁且不用肉如故也人身與志不相有曰死

移熱移寒 素氣厥論黃帝問曰五臟六腑寒熱相移者何岐伯曰腎移寒於脾癰腫少氣脾移寒於肝癰腫筋攣肝移寒於心狂隔中心移寒於肺肺消飲一洩二死不治肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裏漿水之病也脾移熱於肝則為驚衄肝移熱於心則死心移熱於肺傳為鬲消肺移熱於腎傳為柔痊腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治胞移熱於膀胱則癰溺血膀胱移熱於小腸鬲腸不便上為口糜小腸移熱於大腸為虛癢為沉大腸移熱於胃善食而瘦又謂之食亦胃移熱於膽亦曰食亦膽移熱於腦則辛頰鼻淵鼻淵者濁涕下不止也傳為衄衄瞑目故得之氣厥也

難經

寒熱之病候之如何也然皮寒熱者皮不可近席毛髮焦鼻衄者得汗肌寒熱者皮膚痛唇口紫無汗骨

寒熱者病無所安汗注不休蓋掌痛陽維為病苦寒熱

傷寒論

病人身大熱反欲近衣者熱在皮膚寒在骨髓也身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

此種寒熱既非感冒亦非傷寒其淺深有皮膚骨髓之殊其久暫有歲月之異輕者有似感冒重者即變骨蒸所以內經以後諸書寒熱自有方論不入傷寒等法大段以清營中之熱為主其或有風有疾有積有痰者則隨症有息之可也

寒熱方

四時加減柴胡湯治五臟寒熱

柴胡 白朮各八分大腹楨榔四枚并陳皮五分生薑五分桔梗七分以上冬三月柴胡稍多春三

月減白朮增枳實夏三月又增甘草仍用枳實白朮秋三月同冬三月惟陳皮稍多右各咬咀分為

三貼一貼以水三升煮取二升分溫三服如人行四五里進一服渣再合煎一服治寒熱總不能外柴積帶分讀去聲寒熱久者必有

二錢半為一分

天行熱病方外臺療天行三日外至七日不歇內熱令人更相染者主大青消毒湯

大青四兩香豉八合乾葛 梔子各四兩生地一升芒硝三兩右六味切以水五升煮取二升

半去滓下芒硝分三服

一方有石膏八兩忌蕪蕪熱麩酒蒜等物此方專清湯明之熱

苦參湯針療天行熱病五六日以上宜服

苦參三兩黃芩二兩生地黃八兩右三味切以水八升煮取二升去滓溫服半升日再服忌蕪蕪

凝雪湯外臺療天行毒病七八日熱積胸中煩亂欲死

芫花一升 右一味以水三升煮取一升半漬故布薄胸上不過再三薄熱則除當溫四肢護厥逆

也按本草芫花能治蠱毒消胸中痰水

大黃湯外臺 療天行五六日不解頭痛壯熱四肢煩疼不得飲食

大黃 胃黃連 心肝黃柏 腎 梔子 肺各半 兩擘 右四味以水八升煮六七沸內豉一升葱白七莖煮取三

升去滓分三服此許推然方神良又療傷寒已五六日頭痛壯熱四肢煩疼取汗並宜老小忌猪肉冷

水此三黃湯之變能除六經之熱

桃葉重身法外臺 水一石煮桃葉取七斗以薦席自圍衣被蓋上安桃湯於牀簣下取熱自重停少時當

雨汗汗遍去湯待歇連粉之并灸大椎則愈 按寒熱之因千變萬殊有屬外感有屬內傷而外感內傷之中又各不同其外有屬痰飲有屬瘀血有屬積聚

有屬敗症不可勝舉其治法各詳於本病條下當細讀之此只錄時行熱病之數方耳

霍亂附轉筋

傷寒論

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名

霍亂自吐下又利止復更發熱也 傷寒其脈微澀者本是霍亂今是傷寒卻四五日至陰經上轉入陰

必利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡

故也下利後當便鞭鞭則能食者愈今反不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日當愈不愈

者不屬陽明也吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣也 此霍亂是傷寒變症與霍亂本症微別

病源

霍亂者由人溫涼不調陰陽清濁二氣有相干亂之時其亂在於腸胃之間者因遇飲食而變發則心腹

絞痛其有先心痛者則先吐先腹痛者則先利心腹並痛者則吐利俱發披風而實者身發熱頭痛體疼而復吐利虛者但吐利心腹刺痛而已亦有飲酒食肉腥膻生冷過度因居處不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃脾胃得冷則不磨不磨則水穀不消化亦令清濁二氣相干脾胃虛弱便則吐利水穀不消則心腹脹滿皆成霍亂 霍亂脈大可治微細不可治霍亂吐下脈微遲氣息劣口不欲言者不可治 此霍亂之正病言之最詳 乾霍亂者是冷氣搏於腸胃致飲食不消但腹滿煩亂絞痛短氣其腸胃先挾實故不吐利名為乾霍亂也 霍亂而轉筋者由冷氣入於筋故也冷入於足之三陰三陽則腳轉筋入於手之三陰三陽則手轉筋隨冷所入之筋筋則轉轉者皆由邪冷之氣擊動其筋而移轉也 按轉筋之病金匱有雞屎白散一方附脚氣條下而轉筋之症不一有平時常轉筋者有霍亂而轉筋者并有轉筋入腹者當用木瓜吳茱萸黃芩等藥及外治湯熨之法以備選擇

霍亂轉筋方

五苓散 霍亂頭痛發熱多欲飲水者主之寒多不用水者理中丸主之 二方俱傷寒論見通治

理中丸 此是寒霍亂之方百不得一者也誤用者害不旋踵

加減法 若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩 吐多去朮加生薑三兩 下多者還用朮 悸者

加茯苓二兩 渴欲得水者加朮足前成四兩半 腹中痛者加人參足前成四兩半寒者加薑成四

兩半 腹滿者去朮加附子一枚 服湯後如食頃飲熱粥一升許微自溫勿發揭衣服

霍亂轉筋入腹作極鹹鹽湯於糟中煖漬之則差針 又方 以醋煮青布搗脚膝冷復易之

又方 千金 治霍亂轉筋兩臂及脚胸脇諸轉筋並主之

香薷一把水煮令極濃服二三升即差青木香亦佳

廣濟高良薑湯 外臺 治霍亂吐痢轉筋入腹

高良薑四兩 桂心四兩 右二味以水七升煮取二升去滓分三服此亦治寒霍亂之方

霍亂轉筋入腹方外 木瓜子根皮合煎湯服之

茱萸湯外 療霍亂轉筋不止

吳茱萸一升 甘草 乾薑各二兩 麥子一把 亂髮燒兩 桂心二兩

合去滓分溫三服

灸法外 以手拘所患脚大母指當脚心急筋上七壯 又灸當足大母指聚筋上七壯 又灸足大母

指下約中一壯 又灸湧泉入腹者灸臍左二寸十四壯 又灸股中大筋上陰一寸 轉筋四逆者

灸兩乳根黑際各一壯 轉筋欲死者灸臍上一寸十四壯

藿香正氣散局 一元散局 蘇合香丸局 香薷飲局方俱見通治

症

金匱

太陽病發熱無汗反惡寒者名曰剛瘧一作瘧 太陽病發熱汗出而不惡寒名曰柔瘧 太陽病發熱脈

沉而細者名曰瘧為難治 太陽病發汗太多因致瘧 夫風病下之則瘧復發汗必拘急 瘧家雖身

疼痛不可發汗汗出則瘧 病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖卒口噤背反張

者瘧病也若發其汗者寒濕相得其表益虛即惡寒甚發其汗已其脈如蛇 暴腹脹大者為欲解脈如

故反伏弦者瘧 夫瘧脈按之緊如弦直上下行 瘧病有灸瘡難治 太陽病其症備身體強八八然

脈反沉遲此為瘧 太陽病無汗而小便反多氣上衝胸口噤不得語欲作剛瘧 瘧為病胸滿口噤臥

不着席脚攣急必不齒

瘥方

括萹桂枝湯金匱 太陽病其症備身體強八然脈反沉遲此湯主之

括萹根二兩 桂枝 芍藥各三兩 甘草二兩 生薑三兩 大枣十二 右六味以水九升煮取三升分

温三服取微汗汗不出食頃啜熱粥法

麻黄加獨活防風湯金匱 治剛瘥

麻黄 桂枝各一兩 芍藥三兩 甘草半兩 獨活 防風各一兩 右六味每服一兩水煎

瘥病乃傷寒壞症小兒得之猶有愈者其餘則百難瘥其

葛根湯金匱 大承氣湯金匱 桂枝加葛湯傷寒門 小續命湯見中風門

瘥閉利林

靈素

靈本輸篇三焦手少陽之脈入絡膀胱約下焦實則閉瘥虛則遺溺 五味篇酸走筋多食之令人瘥

素宣明五氣論膀胱不利為瘥不約為遺溺 氣厥論胞移熱於膀胱則瘥溺血 骨空論督脈為病瘥

痔遺溺

金匱

淋之為病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中 淋家不可發汗發汗則必便血 熱在下焦者則尿血亦

令淋秘不通 小便不利者有水氣其人若渴

病源

石淋 淋而出石也腎主水水結則化為石

氣淋 腎虛膀胱熱氣脹所為也

膏淋 淋而有肥狀似膏故謂之膏淋亦曰肉淋此腎虛不能制於肥液故與小便俱出也

勞淋 熱淋之甚者則尿血心主血血之行身通通遍經絡循環腑臟勞甚則散失其常經溢滲入胞而成

血淋也

胞轉 其病狀臍下急痛小便不通是也或因小便應下而強忍之或為寒熱所迫此二者俱合水氣還

上氣於胞使胞屈別不得充張外水應入不得入內澁應出不得出外內相壅塞故令不通病至四五日

乃有致死者飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急疾走或忍水入房皆令胞轉或胞落並

致死數便為產絕
不便為胞轉

尿床 小便乃水液之餘從膀胱入於胞夜卧則陽氣衰伏不能制於陰所以陰氣獨發於眠睡不覺尿

出也

癰閉利淋方

括萹瞿麥圓金匱 小便不利者有水氣其人苦渴此主之

括萹根 二兩 茯苓 三兩 薯蕷 三兩 附子 泡 一枚 瞿麥 一兩 右五味末之煉蜜丸梧子大飲服三丸日

三服不知增至七八丸以小便利腹中溫為知

滑石白魚散金匱 主小便不利

滑石 二分 亂髮燒 二分 白魚 二分 右三味杵為散飲服半錢七日三服

茯苓戎鹽湯金匱 小便不利主之

茯苓 半斤 白朮 二兩 戎鹽 一枚彈丸大 右三味以水五升煮取三升溫三服

豬苓湯金匱 脈浮發熱渴欲飲水小便不利者主之

豬苓去皮茯苓 阿膠 滑石 澤瀉各一 右五味以水四升先煮四味取二升去滓內

膠煇消溫服七合日三服此蓄飲之症

治諸種淋方千金

葵根八兩 茅根 石首魚頭口各三兩宜用頭中骨 甘草一兩 通草二兩 貝子五合 天麻根五兩 右七味

咬咀以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋治石淋尤切

石葦散千金 治血淋

石葦 當歸 蒲黃 芍藥 右四味各等分治下篩酒服方寸匕日三

胞轉方千金 治丈夫女人胞轉不得小便八九日者

滑石一斤 寒水石碎一兩 葵子一升 右三味以水一斗煮取五升盡服即利

療小便難方本事 治便難小腹痛不急治殺人

用葱白二斤細剉炒令熟以帕子裹分作二處更替運臍下即通

石葦散扁鵲 治膀胱有熱淋瀝不宣或尿如豆汁或便出砂石並治之

木通剉二兩 石葦二兩去毛 滑石 白朮 瞿麥 芍藥 葵子各三兩 當歸 甘草炙

王不留行 右為細末每服二錢小麥湯調下食前日二三服

藕蜜煎饘老 治老人淋病小便不利痛悶之極

藕汁五合 白蜜五合 生地黃汁一升 右相和微火煎之令如錫空心含半匙漸漸下飲食忌熱食

采肉此方亦治血淋

治石淋方千金翼

車前子二升絹袋貼以水八升煮取三升空腹頓服之須臾當下石子宿勿食服之良

治熱淋方千金翼白茅根四斤以水一斗五升煮取五升每服一升日三夜一

四汁飲 治熱淋小便赤澀痠痛

葡萄取自生藕取汁生地取汁白蜜各五合右和勻先把一盞銀器石器內慢火煮沸不拘時溫服

牛膝膏 治死血作淋

桃仁去皮歸尾各一兩牛膝四兩酒一服赤芍各一兩生地各一兩水十鍾微火煎至二碗入麝香少許分四

次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

八正散續 治諸淋

瞿麥 梔子 萹蓄 大黃 滑石 木通 車前子 甘草各一錢 加燈心一

錢煎服

治小便失禁方針 以水三升煮雞腸取一升分三服

家韭子丸 治遺溺及陽氣衰敗白濁遺精

家韭子炒六兩鹿茸四兩肉苁蓉酒浸牛膝酒浸熟地當歸各二兩兔絲子酒浸巴戟各一兩杜仲

石斛 桂心 乾薑各一兩右為末酒糊丸桐子大每服五十九加至百丸食前鹽湯溫酒任

下小兒遺尿者多因胞寒亦陽氣不足也別作小丸服

夜多小便方千金翼 治膀胱冷故小便至夜獨多

雞腸五兩羊腎一具去脂赤石脂六兩龍骨三兩肉苁蓉四兩川連五兩桂心二兩右七味為

末每服方寸匕日二服五日中作羊腎臭一劑十日外作羊腎腫香味如常食飽與之

豬肚丸 治小腹頻數

豬肚一個蓮子一升同煮一舶上茴香五錢破故紙一兩鹽川棟子酒炒去核一兩母丁香三兩加桑螵蛸

一兩尤效蜜丸梧子丸每服五十丸空心温酒送下

縮泉丸 治脬氣不足小便頻多

烏藥 益智仁各等右二味為末酒煮山藥糊丸如梧子丸每服五十丸空心鹽湯送下一方有覆盆子

治尿床針 取雞肚脰一具并腸燒末酒服男雌女雄

威喜丸規通蒲葢散規水龍腦雞蘇丸治五淋血

吳江徐靈胎洞溪著

濕

全賈

太陽病關節痠痛而煩脈沈而細者此名濕痺濕痺之候小便不利大便反快但當利其小便 濕家之為病一身盡疼發熱身色如薰黃也此黃與黃濕家其人但頭汗出背強欲得被覆向大若下之早則噦或胸滿小便不利舌上如胎者以丹田有熱胸上有寒渴欲得飲而不能飲則口燥煩也 濕家下之頰上汗出微喘小便利者死若下利不止者亦死 風濕相搏一身盡痠痛法當汗出而解值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者何也蓋發其汗汗大出者但風氣去濕氣在是故不愈也若治風濕者發其汗但微微欲出汗者風濕俱去也 濕家病身發熱面黃而喘頭痛鼻塞而煩其脈大自能飲食腹中和無病病在頭中寒濕故鼻塞納藥鼻中則愈納鼻之藥全賈未載俟廣求其法以補之亦不過牙兒疳疳之類

濕方

麻黃加朮湯金匱 濕家身煩疼可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可以大攻之

麻黃三兩 桂枝二兩 甘草一兩 杏仁七十個 白朮四兩 右五味以水九升先煮麻黃減二升去上

沫納諸藥者取二升半去滓溫服八合覆取微似汗此濕家發汗之主方

防己黃耆湯金匱 風濕脈浮身重汗出惡風者此湯主之

防己一兩 甘草二兩 白朮七錢 黃耆一兩一分 去蓋 右剉麻豆大每抄五錢七生薑四片大棗一

枚水盞半煎八分去滓溫服良久再服 喘者加麻黃半兩 胃中不和者加芍藥三分 氣上衝者

加桂枝三分。下有陳寒者加細辛三分。服後當如蟲行皮中。從腰下如冰。後坐被上。又以一被繞腰下。溫令微汗差。

麻黃杏仁薏苡甘草湯金。病者一身盡疼。發熱日晡所劇者。各風濕。此病傷於汗出當風。或久傷取冷所致也。

麻黃詳兩去甘草一兩薏苡仁半兩杏仁十個去右剉麻豆大。每服四錢水一盞半。煮八分。去滓。溫服。有微汗避風。

桂枝附子湯金。傷寒八九日。風濕相搏。身體疼煩。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澹者。桂枝附子湯主之。若大便堅。小便自利者。去桂加白朮湯主之。

桂枝四兩生薑三兩附子三枚泡去甘草二兩大棗十二枚擘右五味以水六升。煮取二升。去滓分溫三服。

白朮附子湯金。白朮二兩附子一枚半泡去皮甘草一兩生薑半兩大棗六枚右五味以水三升。煮取一升。去滓分溫三服。一服覺身熱。半日許再服。三服多盡。其人如冒狀。勿怪。即是白朮附子湯。逐水氣未得除。故耳。

甘草附子湯金。風濕相搏。骨節皮煩。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出短氣。小便不利。惡風不欲去衣。或身微腫者。此湯主之。

甘草二兩附子二枚泡去皮白朮二兩桂枝四兩右四味以水六升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。

初服得微汗。則解。能食。汗出復煩者。服五合。恐一升多者。服六七合為妙。此風濕而乘寒者

二妙散治筋骨皮痛因濕熱者。如有氣加氣藥。如血虛加血藥。如痛甚。以薑汁熱辣服之。

黃柏炒 蒼木炒去皮 右為末生薑研沸湯調服如表實氣實者少酒佐之在表之濕當散之在裏

不外乎此

黑地黃丸動視

喝

金匱

太陽中喝發熱惡寒身重而疲痛其脈弦細孔遲小便已灑灑然毛聳手足逆冷小有勞身即熱口開前板齒燥若發其汗則惡寒甚加溫針則發熱甚若下之則淋甚此中喝乃中時行之熱氣與卒然中暑病象如霍亂者不同當別之

喝方

白虎人參湯醎 太陽中熱者喝是也汗出惡寒身熱而渴此湯主之

知母六兩 石膏一斤 甘草二兩 粳米六合 人參三兩 右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一

升日三服熱入裏則外惡寒清裏熱則惡寒自解然亦須詳審有表無表方為精密况凡屬汗出多之病無不惡寒者以其惡寒汗出而誤認為寒用大順散等熱劑則立危矣

一物瓜蒂散全 太陽中喝身熱夜重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮中所致也

瓜蒂二十個 右剉以水一升煮取五合去滓頓服此方服之當吐

香薷飲碯 治暑熱乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏頭痛發熱惡寒煩躁口渴腹滿吐瀉者

香薷一斤 厚朴薑汁炒 白扁豆炒各半斤 右水煎浸冷服此治時行暑病之主方其分兩則五錢至一兩止

十味香薷飲 即前方加人參甘草黃耆木瓜陳皮白木茯苓

黃連香薷飲 即香薷飲加黃連四兩薑汁同炒黃色

枇杷散碯 治中暑伏熱煩渴引飲嘔逆惡心頭目眩暈

枇杷葉 陳皮 丁香 厚朴各五錢 白茅根 麥冬 木瓜 甘草受各一兩 香茹半錢

右為末每二錢薑三片煎湯調服溫服亦可如煩躁井水調下小兒三歲以下服五分量大小加減

蟾酥丸方

茅末 雄黃各一錢 辰砂五錢 麝香一錢 丁香 牙兒各三錢 蟾酥五錢 右用火酒化蟾酥打丸

如鳳仙子大辰砂為衣放舌底化下重者二三丸

千金丹秘方即人馬平安散

麝香 冰片各二錢 硃砂五錢 雄黃 硼砂 硝各一兩 金箔一百張或加牛黃 右七味為末或水服

二三分或嗅少許於鼻內

又刮痧法 用薄錢蘸香油刮胸背及臂股灣令色紫疹起為度或用婦人縛髮油繩蘸油刮亦可

紫金錠 蘇合丸各 藿香正氣散各 生脈飲 六一散以上俱見通治

痲瘡

素問

瘡論黃帝問曰夫痲瘡皆生於風其畜作有時者何也岐伯曰瘡之始發也先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頤腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭暈如暈渴欲冷飲帝曰何氣使然岐伯曰陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽井於陰則陰實而陽虛陽明虛則寒慄鼓頤也巨陽虛則腰背項痛三陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱外內皆熱則喘而渴故欲冷飲也此皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也此令人汗孔疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之以浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行於陰此氣得陽

而外出得陰而內薄內外相薄是以日作帝曰其間日作者何也岐伯曰其氣之舍深內薄於陰陽氣獨發陰邪內著陰與陽爭不得出是以間日而作也帝曰其作日晏與日早者何氣使然岐伯曰邪氣客於風府循督而下衛氣一日一夜大會於風府其明日日下一節故其作也晏此先客於脊背也每至於風府則腠理開腠理開則邪氣入邪氣入則病作以此日作稍稍益晏其出於風府日下一節二十五日下至脈骨二十六日入於脊內注於伏膂之內其氣上行九日出於缺盆之中其氣日高故作日益早其間日發者由邪氣內薄於五臟橫連募原其道遠其氣深其行遲不能與衛氣俱行不得皆出故間日乃作也帝曰夫子言衛氣每至於風府腠理乃發發則邪氣入入則病作今衛氣日下一節其氣之發也不當風府其日作者奈何岐伯曰此邪氣客於頭項循督而下者也故虛實不同邪中異所則不得當其風府也故邪中於頭項氣至頭項而病中於背氣至背而病中於腰脊氣至腰脊而病中於手足氣至手足而病衛氣之所在與邪氣相合則病作故風無常府衛氣之所發必開其腠理邪氣之所合則其府也帝曰善夫風之與瘧也相似同類而風獨常在瘧得有時而休者何也岐伯曰風氣留其處故常在瘧氣隨經絡沈以內薄故衛氣應乃作帝曰瘧先寒而後熱者何也岐伯曰夏傷於大暑其汗大出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷於寒而後傷於風故先寒而後熱病以時作名曰寒瘧帝曰先熱而後寒者何也岐伯曰此先傷於風而後傷於寒故先熱而後寒亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩冤手足熱而欲嘔名曰瘧瘧而論此等極多不獨論瘧為然故學者當以意會也岐伯曰瘧之且發也陰陽之且移也必從四末始也陽已傷陰從之故先其時堅束其處令邪氣不得入陰氣不得出審候見之在孫絡盛堅而血者皆取之此真往而未得并者也帝曰時有間二日或至數日發或渴或不渴其故何也岐伯曰其間日

者邪氣與衛氣客於六腑而有時相失不能相得故休數日乃作也 其以秋病者寒甚以冬病者寒不甚以春病者惡風以夏病者多汗 瘧脈緩大虛便宜用藥不宜用鍼凡治瘧先發如食頃乃可以治過之則失時也諸瘧而脈不見刺十指間出血血去必已先視身之赤如小豆者盡取之瘧疾藥當在未來時前服刺瘧之法簡易可學不必習針法皆能之亦治瘧之要訣也

風瘧 素生氣通天論魄汗未盡形弱而氣燠心膈以閉發為風瘧 又云夏傷於暑秋為痲瘧二日一發瘧者為痲瘧

痲瘧與瘧同

似瘧 素生真要大論帝曰火熱復惡寒發熱如有瘧狀或一日發或間數日發其故何也岐伯曰勝復之氣會合之時有多少也陰氣多而陽氣少則其發日遠陽氣多而陰氣少則其發日近此勝復相搏盛衰之節瘧亦同法瘧亦同法則非瘧可知

全價

師曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者下之差弦遲者可溫之弦緊者可發汗針灸也浮大者可吐之弦數者風發也以飲食消息止之但熱不寒者邪氣內藏於心外舍分肉之間令人消燼肌肉

牡瘧 瘧多寒者名曰牡瘧似當作牝字諸本皆作牡存考

瘧方

鼈甲煎丸金 病瘧以月一日發當以十五日愈設不差當月盡解如其不差當云何師曰此結為癥瘕

名曰瘧母急治之宜此方

鼈甲一分 烏扇三分 黃芩三分 柴胡六分 鼠婦三分 乾薑三分 大黃三分 芍藥五分 桂枝五分

亭蔴一分 石韋三分 厚朴三分 牡丹五分 瞿麥二分 紫葳三分 半夏一分 人參一分 蟻蟲五分

煎丸

煎丸

煎丸

煎丸

阿膠三分 螿巢四分 赤消十二分 蜣螂六分 桃仁二分 右二十三味為末取燉蠶下灰一斗清酒一

斛五斗浸天候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁納諸藥煎為丸如梧子大空心服七

丸日三服

白虎加桂枝湯金匱 溫瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時吐此湯主之

知母六兩 甘草二兩 石膏一斤 粳米二合 桂枝三兩 右剉每五錢水一盞半煮至八分去滓溫服

汗出愈內經以先熱後寒為溫瘧但熱不寒為瘧瘧

蜀漆散金匱 瘧多寒者名曰牡瘧此湯主之牡宜作北

蜀漆洗去腥 雲母燒二日夜 龍骨等分 右三味杵為散未發前以漿水服半錢匕 溫瘧加蜀漆半分臨

發時服一錢匕

柴胡去半夏加栝蒌湯金匱 治瘧病發渴者亦治勞瘧

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三兩 栝蒌根四兩 生薑二兩 大棗十二枚 右七味以水一斗二

升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日二服

柴胡桂薑湯金匱 治瘧寒多微有熱或但寒不熱

柴胡半斤 桂枝三兩 乾薑二兩 栝蒌根四兩 黃芩三兩 牡蠣二兩 甘草二兩 右七味以水一斗二

升煮取六升去滓再煎取三升日三服初服微煩復服汗出便愈

蜀漆丸針 主痰瘧連年不差服三七日定差方

蜀漆 知母 白薇 地骨皮 麥門冬去心 升麻各五兩 恒山一兩 石膏二兩 香豉一合

姜糖 烏梅肉 鼈甲 甘草各一兩 右十三味搗篩為末煉蜜和丸如桐子大空腹飲服

十九日再加至二十二十九日此方治三

陵鯉湯針 主瘡疾江南瘡瘡方

陵鯉甲 四十枚 烏賊魚骨

附子 炮各一兩 兩去皮 恒山 三兩

右五味以酒三升漬一宿未發前稍稍

啜之勿絕吐之并塗五心一日斷食過時久乃食 用生藥探吐法

瘡瘡病醫不能救者方 千金

外治截瘡法

以繩量病人脚圍繞足跟及五指一匝訖截斷繩取所量

繩置項上著反向背上当繩頭處中脊骨上灸三十壯則定候看復惡寒急灸二十壯則定候至過發

一炊久候之雖飢勿與食盡日此神驗男左足女右足

瘡瘡常山湯 外 吐法

常山 三兩

右一味切以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服之後微吐差止忌生葱生菜

牡蠣湯 外 治牡瘡

牡蠣 四兩 麻黃 四兩 去節 甘草 二兩 蜀漆 二兩

右四味以水八升先煮蜀漆麻黃去上沫得六升納諸

藥煮取二升溫服一升若吐則勿更服

清脾湯 濟 治熱多陽瘡

青皮 厚朴 柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮 草果 煨 右九

味加薑三片水煎服

常山飲 局 治疾瘡

常山 炒 酒 知母 貝母 草果 欖榔 各一 烏梅 三個 右六味加薑棗煎瘡未發時面東

溫服

烏梅引子 療溫瘧瘧瘧

烏梅七個 桃柳心各七莖 葱白七莖 豆豉一合 甘草四分 柴胡四分 知母四分 大黃三分 右八味各

細對以童子小便兩茶椀宿浸明且早煎三二沸去滓頓服差未差更作服三服永差忌海藻松菜

集驗瘧必從四肢始療方 先其時一日頃用細左索繩繫束其手足十指過發時乃解之此即內經之法

四獸湯治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏 人參 茯苓 白朮 橘紅 草果 生薑 烏梅 大棗

甘草各等分 右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四錢溫服

小柴胡湯寒傷 治瘧之法不外諸方惟三日瘧則煎劑不能取效宜病日用煎方以驅邪餘兩日用溫

補以扶元氣又加避風靜養則庶幾矣

痢

素問

通評虛實論帝曰腸澼便血何如岐伯曰身熱則死寒則生帝曰腸澼下白沫何如岐伯曰脈沈則生脈

浮則死帝曰腸澼下膿何如岐伯曰脈懸絕則死滑大則生帝曰腸澼之屬身不熱脈不懸絕何如岐伯

曰滑大者曰生懸瀉者曰死以臟期之 氣厥論腎移熱於脾傳為虛腸澼死不可治 大奇論腎脈小

搏沈為腸澼下血血溫身熱者死心肝澼亦下血二臟同病者可治其脈小沈瀉為腸澼其身熱者死

太陰陽明論犯賊風虛邪陽受之飲食不節起居不時者陰受之陽受之則入六腑陰受之則入五臟入

六腑則身熱不時卧上為喘呼入五臟則填滿閉塞下為殞泄久為腸癰此俗所謂腸病也

全匱

六腑氣絕於外者手足寒上氣脚縮五臟氣絕於內者痢不禁下甚者手足不仁下痢脈沈弦者下重脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不死下痢手足厥冷無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死少陰負跌陽者為順也下痢有微熱而渴脈弱者令自愈下痢渴者自愈以陽氣復而寒邪去也下痢脈數有微熱汗出令自愈設脈緊為未解下痢脈數而渴者令自愈設不差必清膿血以有熱故也下痢氣者當利其小便下痢清穀不可攻其表汗出必脹滿下痢脈沈而遲其人面少赤身有微熱下痢清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所以然者其面帶陽下虛故也下痢後脈絕手足厥冷晬時脈還手足溫者生不還者死下痢腹脹滿身體疫痛者先溫其裏乃攻其表以上諸證皆屬陰寒之痢非暑毒之痢也治法大相懸殊

病源

痢而赤白者是熱乘於血血滲於腸內則赤也冷氣入腸搏腸間津液凝滯則白也冷熱相交故赤白相雜重者狀如膿涕而血雜之輕者曰膿上有赤脈薄血狀如魚脂腦世謂魚腦痢也血痢者熱毒折於血入大腸故也休息痢者胃腕有停飲因痢積久或冷氣或熱氣乘之氣動於飲則飲動而腸虛受之故為痢也痢如膏由臟腑虛冷氣入於大腸成痢冷氣積腸又虛滑脂凝如膏也蟲蛀痢毒氣侵於臟腑如病蠱蛀之家痢血雜膿來黑有片如雞肝與血俱下是也雜痢謂痢色無定或水穀或膿血或青或黃或赤或白變雜無常或雜色相兼而痢也挾熱則黃赤熱甚則變膿血也冷則白冷甚則青黑皆由飲食不節冷熱不調胃氣虛故變易

痢方

桃花湯一斤下痢便膿血者此湯主之

赤石脂一斤半半斤乾薑一斤粳米一斤

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合納赤石脂

末方寸匕日三服若一服愈餘勿服此治下焦滑脫之痢

白頭翁湯金匱 熱痢下重者此湯主之

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮略三 右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈再服

紫參湯金匱 下痢肺痛此湯主之

紫參半斤 甘草三兩 右二味以水五升先煮紫參納甘草煮取一升半分溫三服紫參疑即爛上赤色者

訶梨勒散金匱 治氣痢

訶梨勒十枚 右一味為散粥飲和頓服

甘草瀉心湯傷寒論 傷寒中風醫反下之其人下痢日數行穀不化腹中雷鳴心下痞鞭而滿乾嘔心煩

不得安此湯主之

甘草四兩 黃芩兩 乾薑兩 半夏半升 黃連一兩 大棗十二枚 右六味以水一斗煮取六升去滓

再煎取三升溫服一升日三服此治上焦

黃芩湯傷寒論 太陽與少陽合病自下痢者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯若傷寒本自寒下

醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即吐乾薑黃連黃芩人參湯主之

黃芩三兩 甘草兩 芍藥兩 大棗十二枚 右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一

服此熱痢之主方

黃芩加半夏生薑湯傷寒論 即前方加半夏半升 生薑三兩 煎服法同

乾薑黃連黃芩人參湯傷寒論

乾薑 黃連 黃芩 人參略三 右四味以水六升煮取二升分溫再服瀉心湯以下四方皆以黃芩為

主而因證加減此痢疾之正方也

赤石脂禹餘糧湯論傷寒傷寒服湯藥下痢不止心下痞硬服瀉心湯已復以他藥下之痢不止醫以理

中湯與之痢甚理中者理中焦此痢在下焦此湯主之

赤石脂碎禹餘糧碎各一斤以上二味以水六升煮取二升去滓三服下焦乃大腸之底也

雄黃丸 夷堅甲志云晉虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄瀉連月夢壁間有韻語方一紙讀之數

遍其詞曰毒暑在脾濕氣連脚不泄則痢不痢則瘡獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治

瘡醫家大錯如方製藥服之遂愈此方治暑毒痢

柴胡加芒硝湯論傷寒治傷寒胸滿而嘔日晡所發潮熱已而微痢先以小柴胡解外後以此主之即

柴胡湯加芒硝二兩 右先煮柴胡湯去滓納芒硝分溫再服不解更作

瓜蒌散 治五色痢久不愈者

瓜蒌一個以炭火煨存性蓋地上出火毒右研細溫酒服盡

瘡熱毒痢血片臍下絞刺痛方臺外

升麻 地榆 茜草 黃連各六厘犀角四分生地八分梔子 薤白 香豉各二右

九味水六升煮取一升五合分溫三服日再此血痢之主方

主赤白痢方臺外

黃連二兩阿膠四片右二味以酒二升合黃連煎十五沸去滓然後納阿膠令烊溫服三升此治血熱之痢

療五疳蒸下痢方臺外

苦參 青箱 甘草各三兩右三味以水四升煮取二升半分三擲即愈凡蒸但服地汁即差

此藥治蟲

薤白湯

活人書 傷寒下痢如爛肉汁赤白帶下伏氣腹痛諸熱毒並皆治之

改半斤薤白一把七枚大者破之

下豉煎取一升二合去滓每服一湯盞

訶梨勒丸

治腸胃積寒久痢純白或有青黑日夜無度

肉豆寇去皮木香

乾薑泡各二兩縮砂仁

訶梨勒皮

川烏頭泡去皮臍白礬煨各十分龍骨洗

赤石脂各八兩

右為末用粟米飯為丸如梧子大每服二十九丸至三十九丸溫粟米飲下食前服甚者

可倍加丸數此溫瀉之劑

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

當歸四逆湯

大承氣湯

小承氣湯

四逆散

四逆湯

白通加豬膽汁湯

白通湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

豬膚湯

陽毒升麻湯

以上十三方俱見傷寒門生薑瀉心湯吐衄門烏梅丸方見威喜丸方見

此方和劑名威應丸

癩狂癩

靈素

靈癩狂篇狂始生先自悲也喜忘苦怒善恐者得之憂飢狂始發少卧不飢自高賢也自辯智也自尊

貴也善罵詈日夜不休狂言驚善笑好歌樂忘行不休者得之大恐狂目妄見耳妄聞善呼者少氣

之所生也狂者多食善見鬼神善笑而不發於外者得之有所大喜

骨癩靈癩狂篇骨癩疾者顛蓋諸膾分肉皆滿而骨居汗出煩晚嘔多沃沫氣下泄不治

筋癩疾靈癩狂篇筋癩疾者身倦變急嘔多沃沫氣下泄不治

脈癩疾 靈癩狂為脈癩疾者暴仆四肢之脈皆脹而縱脈滿盡刺之出血嘔多沃沫氣下泄不治

素生氣通天論陰不勝其陽則脈流薄疾并乃狂 宣明五氣論五邪所亂邪入於陽則狂 調經論血

并於陰氣并於陽故為驚狂 至真要大論諸躁狂越皆屬於火 通評虛實論帝曰癩疾何如岐伯曰

脈搏大滑久自已脈小堅急死不治 帝曰癩疾之脈虛實何如岐伯曰虛則可治實則死 陽明脈解篇

岐伯曰四肢者諸陽之本陽盛則四支實實則能登高也 帝曰其棄衣而走者何也岐伯曰熱盛於身故

棄衣欲走也 帝曰其妄言罵詈不避親疎而歌者何也岐伯曰陽盛則使人妄言罵詈不避親疎而不欲

食不欲食故妄走也

陽厥怒狂 素病能論帝曰有病怒狂者此病安生岐伯曰陽氣者因暴折而難決故喜怒也病名曰陽

厥帝曰治之奈何岐伯曰奪其食即已使之服以生鐵洛為飲夫生鐵洛飲者下氣疾也

胎病 素奇病論帝曰人生而有病癩疾者病名曰何安所得之岐伯曰病名為胎病此得之在母腹中

時其母有所大驚氣上而不下精氣并居故令子發為癩疾也

難經 癩疾始發意不樂僵仆直視其脈三部陰陽俱盛是也 重陽者狂重陰者癩

病源

風癩 風癩者由氣血虛邪入於陰經故也 又人在胎其母卒大驚精氣并居令子發癩其發則仆地吐

涎沫無所覺是也 此俗名羊頭瘋

五癩 五癩者一曰陽癩發如死人遺尿食頃乃解 二曰陰癩初生小時臍滄未愈數洗浴因此得之三

曰風癩發時眼目相引牽縱反強羊鳴食頃方解 四曰濕癩眉頭痛身重坐熱木頭濕結腦肺未止得之

五曰馬癩發作時時反目口噤手足相引身體皆然

鬼魅 凡人有為鬼物所魅則好悲而心自動或心亂如醉狂言驚怖向壁悲啼夢寤喜慶或與鬼神交

通病苦乍寒乍熱心腹滿短氣不能飲食此魅之所持也 十歲以上為癩十歲以下為癩大體不外三

種風驚食是也

千金

驚癩 癩分心肝脾肺腎膈腸之病及馬牛羊猪犬雞之別其象各有所似

癩狂方

生鐵洛為飲素問

生鐵洛即爐冶間鎚落之鐵屑用水研浸可以為飲其屬金其氣寒而重最能墜熱開結平水火之邪

故可以下氣疾除狂怒也凡藥中用鐵精鐵華粉鐵砂鐵銹水之類皆同此意此治怒狂之方以鎮肝為主

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯傷寒論 治傷寒脈浮醫以火迫劫之亡陽必驚狂起卧不安者

即桂枝湯去芍藥加蜀漆三兩洗去腥牡蠣五兩熬龍骨四兩 右七味以水一斗者取二升先煮蜀漆納

諸藥者取三升去渣温服一升

柴胡加龍骨牡蠣湯傷寒論 治傷寒下之驚煩小便不利譫語身重不能轉側此湯主之

柴胡 龍骨 人參 茯苓 鉛丹 黃芩 桂枝各兩半 半夏 二合 大黃 二兩

牡蠣一兩生 生薑一兩半 大棗 六枚 右十二味以水八升煮取四升納大黃更煮去滓温服一升

治癩狂百病千金翼

大麻子四升上好者 以水六升煮令芽生去滓煎取二升空腹頓服或多言語勿怪但使人摩手足煮法奇

真岩子散外 治五癩

猪卵一具陰乾 真岩子三斤 牛黃八分 鯉魚膽五分 桂心研一兩 右五味以清酒一升漬真岩子暴

令乾盡酒止搗合下篩酒服五分日再當醉不知稍增

抱膽丸類 治一切癩癩風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪

蘊結

水銀 硃砂細研各二兩 黑鉛半一兩 乳香一兩 右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下硃砂乳香

乘熱用柳木搥研勻丸雞豆大每服一丸并花水吞下病者得卧切莫驚動覺來即安再服一丸除根

琥珀毒星丸類 治心膽被驚神不守舍或疾迷心竅恍惚健忘妄言妄見

天南星一斤掘坑深二尺用炭火五升於坑內燒紅取出炭掃淨用好酒一斤 琥珀四兩 硃砂研一兩

為衣 右和猪心血三個生薑汁打麩糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如桐子大每服五十丸煎

人參湯下日三

控涎丹類 治諸癩久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏用生半夏湯洗 白殭蠶炒各半兩生薑汁浸一宿 鐵粉三錢 全蠍 甘遂各二錢半 右為細末生薑自

然汁為丸如菜豆大硃砂為衣每服十五丸食後生薑湯下忌食甘草

獨效苦丁香散 治忽患心疾癩狂不止得之驚憂疾氣上犯心包當治其源

以苦丁香即瓜蒂半兩為末每服一錢并花水調滿蓋投之得大吐熟睡勿令人驚起

甘遂散類 治癩狂及婦女心風血邪

甘遂末一錢用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在內合之編縛外用皮紙

裹濕慢火煨熟勿令焦取藥細研碾入辰砂末一錢和勻令作四丸每服一丸將所煨猪心煎湯化下
再服用別猪心過半日大便下惡物後服調和胃氣丸此病乍作乍醒者勉不食迷癡者不治

苦參丸臺外治狂邪發惡或披頭大叫欲殺人避水火以苦參為末蜜丸桐子大每服十丸薄荷湯下

礞石滾痰丸養生主論蘇合香丸局方至寶丹以上三方俱見通治按癩癩一證其輕者不拘何方可愈重者必用煨煉祕方僅能有效

痰飲

金匱

問夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰何以異師曰其人素盛今瘦水走腸間漑
漑有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身體疼
重謂之溢飲欬逆倚息氣短不得卧其形如腫謂之支飲水在下心下堅築短氣惡水不得飲水在
肺吐涎沫欲飲水水在脾少氣身重水在肝脇下支滿嘔而痛水在腎心下悸夫心下有留飲
其人背寒冷如水大留飲者脇下痛引缺盆欬嗽則輒已胸中有留飲其人短氣而渴四肢歷節痛
脈沈者有留飲膈上病痰滿喘欬吐發則寒熱背痛腰痠目眩自出其人振振身瞤劇必有伏飲夫
病人飲水多必暴喘滿凡食少飲多水停心下甚者則悸微者短氣脈雙弦者寒也皆大下後喜虛脈偏
弦者飲也病痰飲者當以溫藥和之溫藥和之治飲總訣夫有支飲家久欬數歲其脈弱者可治實大數者死其
脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家夫短氣有微飲當從小便去之病溢飲者當
發其汗水在中當利小便水在四肢當發汗此亦總訣嘔家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也假令瘦人臍下有
悸吐涎沫而顛眩此水也先渴後嘔為水停心下此屬飲家全卸內經無一痰字然世間痰飲之病最
多惟仲景大創厥論而後萬世治痰之法

始備

病源

癖飲 由飲水多。水停聚兩脇之間。遇寒氣相搏。則結聚成塊。在脇下。弦亘起。按之作水聲。飲成形者為癖
酒癖 因大飲酒後。渴而引飲無度。酒與飲停滯在脇肋下。結聚成癖。時時作痛。其狀脇下氣急而痛。
膈痰 謂痰水結於胸膈之上。又犯大寒。使陽氣不行。令痰水結聚不散。而陰氣逆上。上與風痰相結。上衝於頭。即令頭痛。或數歲不已。久之腦痛。故云膈痰頭痛。若手足寒至節。即死。

痰飲方

苓桂甘木湯金匱 心下有痰飲。胸脇支滿。目眩。此方主之。短氣有微飲。當從小便去之。此主之。腎氣丸亦

主之。

茯苓四兩 桂枝兩 白朮各三兩 甘草一兩 右四味以水六升。煮取三升。分溫三服。小便則利。

甘遂半夏湯金匱 病者脈伏。其人欲自利。利反快。雖痢心下續堅滿。此為留飲欲去故也。此湯主之。

甘遂大者三枚 半夏十二枚 芍藥五枚 甘草如指大一枚 右四味以水二升。煮取半升。去滓。以蜜半升和

藥汁煎取八合。頓服之。甘遂甘草同用下飲尤速

十棗湯金匱 脈沈而弦者。懸飲內痛。此方主之。欬家其脈弦。為有水。此主之。又支飲家。欬煩。胸中痛

者。不卒死。至一百日。或一歲。亦宜此湯。

芫花煮 甘遂大戟各等 右三味搗篩。以水一升五合。先煮芫花大棗十枚。取八合。去滓。納藥

末。強人服一錢匕。羸人服半錢。平旦溫服之。不下者。明日更加半錢。得快之後。糜粥自養。此以湯

小青龍湯金匱 治心下有水氣。乾嘔發熱。或欬。或痢。少腹滿而喘。

麻黃去節 芍藥各三兩 五味子半升 乾薑半升 甘草炙 細辛半升 桂枝去皮各三兩 半夏半升 湯洗右八味

以水一斗。先煮麻黃減二升。去上沫。納諸藥。煮取三升。去滓。溫服一升。若微痢者。去麻黃。加羌活如雞子大。熬令赤色。渴者去半夏。加括蕒根三兩。噎者去麻黃。加附子一枚。泡。小便不利。少腹滿。去麻黃。加茯苓四兩。喘者去麻黃。加杏仁半升。去皮尖。

木防己湯金 膈間支飲。其人喘滿。心下痞堅。面色黧黑。其脈沈緊。得之數十日。醫吐下之。不愈。此湯主之。虛者即愈。實者三日復發。復與不愈者。宜此湯去石膏。加茯苓芒硝湯主之。

木防己 三兩 石膏 十二枚 桂枝 二兩 人參 四兩 右四味以水六升。煮取二升。分溫再服。

木防己去石膏。加茯苓芒硝湯金 即前方去石膏。加茯苓 四兩 芒硝 三合 右五味以水六升。先煮四味。取二升。去滓。納芒硝。再微煎。分溫再服。微痢則愈。

澤瀉湯金 治心下有支飲。其人苦冒眩。

澤瀉 五兩 白朮 二兩 右二味以水二升。煮取一升。分溫再服。此亦從小便去之法也。

小半夏湯金 嘔家本渴。渴者為欲解。今反不渴。心下有支飲故也。此湯主之。

半夏 半升 生薑 半斤 右二味以水七升。煮取一升半。分溫再服。此專嘔之方。

小半夏加茯苓湯 治卒嘔吐。心下痞。膈間有水。眩悸者。此湯主之。即前方加茯苓三兩。一法煎法同。

加茯苓而眩悸愈知茯苓治水之力大矣。

葶藶大棗瀉肺湯金 治支飲不得息。

葶藶 煮冷黃色搗丸如彈子大 大棗 十二枚 右先以水三升。煮葶藶取二升。去棗。納葶藶。煮取一升。頓服。不得息肺病所以專治肺。

桂苓五味甘草湯金 欬逆倚息不得卧。服小青龍已。多唾。口燥。寸脈沈。尺脈微。手足厥逆。氣從小腹上衝胸咽。手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與此湯治其氣衝。

衝胸咽手足痺。其面翕熱如醉狀。因復下流陰股。小便難。時復冒者。與此湯治其氣衝。

茯苓四兩 桂枝四兩 甘草炙三兩 五味子半升 右四味以水八升煮取三升去滓分溫三服此方五

與乾薑同服因服小青龍之後發洩已甚而氣衝故專於斂肺也

苓甘五味薑辛湯金 衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去桂加薑辛以治其欬滿

茯苓四兩 甘草 乾薑 細辛各三兩 五味半升 右五味以水八升煮取三升去滓溫服半升日三

苓甘五味薑辛半夏湯金 欬滿即止而更復渴衝氣復發者以細辛乾薑為熱藥也服之當遂渴而渴

反止者為支飲也支飲者法當冒冒者必嘔嘔者復納半夏以去其水

茯苓四兩 甘草 細辛 乾薑各二兩 五味 半夏各半升 右六味以水八升煮取三升去滓

溫服半升日三

苓甘五味加薑辛半夏杏仁湯金 水去嘔止其人形腫者加杏仁主之其證應納麻黃以其人遂痺故

不納之若逆而納之者必厥所以然者以其人血虛麻黃發其陽故也 即前方加杏仁半升去皮尖煎服

法同

苓甘五味加薑辛半夏杏仁大黃湯金 若面熱如醉此為胃熱上衝薑其面加大黃以痢之 即前方

再加大黃三兩煎服法同以上五方因證加減精義當細參

厚朴大黃湯金 支飲胸滿者主之

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚 右三味以水五升煮取二升分溫再服傳治胸滿

疾飲頭痛往來寒熱方金

常山一兩 雲母粉二兩 右二味搗篩為散熱湯服方寸匕吐之止吐不盡更服

赤石脂散金 疾飲吐水無時其源為冷飲過度脾胃氣羸飲食入胃變冷水反吐不停

赤石脂 三升 右一味為散服方寸匕酒飲並可下漸加三七盡三斤終身不吐水又不下利補五

臟令人肥健有人患飲諸藥不瘥服此一斤即愈 本事方云此方試之神效

前胡九 治心頭痰積宿水嘔逆不下食

前胡 白木 甘草 各五分 麥冬 去心 旋覆花 三分 豆蔻 各三人 人參 六分 枳實 灸 大黃 各四分

右九味為末蜜丸桐子大空腹酒下二十九丸漸加至三十九丸忌李魚蒜等物

范汪大甘遂丸 外 治留水久癖

芫花 熬 甘遂 葶藶 煮 大黃 苦參 大戟 芒硝 貝母 桂心 各一

杏仁 三十枚 巴豆 三十枚 去皮心 去 烏喙 三分 泡 右十二味為末其巴豆杏仁搗如膏蜜丸如豆大服二丸

日三不知稍加以意將息之忌蘆葶猪肉生葱

礬石湯 外 治胸中痰癖頭痛不欲食及飲酒則阻痰

礬石 一兩 以水二升煮取一升納蜜半升頓服之須臾未吐飲少熱湯

金珠化痰丸 方 治胸膈煩悶涕唾稠黏痰實欬咽溢不利

辰砂 研飛 生白龍腦 細研 兒莢子 炒黃 白礬 光明者於礬石器內煎汁盡冷研 鈆白花 細研 天竺黃 研各一兩 金箔 二十片

衣半夏 湯洗七次用生薑一兩去皮 右以半夏兒莢子為末與諸藥研勻生薑汁煮麩糊丸如桐

子大每服十九丸至十五丸生薑湯下食後臨卧服 此方製半夏之法頗妙治上膈之疾最宜

葛花解醒湯 東垣 治酒傷而成飲癖

蓮花青皮 三分 木香 五分 橘皮 去白 白茯苓 人參 猪苓 各一分 神麩 炒 澤瀉 乾薑

白朮 銹 白豆蔻仁 葛花 砂仁 銹 五 右為細末和勻每服三錢白湯調下但得微汗酒

病去矣不可恃此過飢頻服取汗以損天年

大青龍湯金匱見 防己椒目葶藶大黃丸金匱見 五苓散金匱 二陳湯和 腎氣丸 青州白丸

六君子湯 二賢散見上六方 小青龍加石膏湯見效嗽 疾飲之證十居三四患之者無不胃疼嘔

效言之

咳嗽附肺

靈素

靈樞玉版篇咳脫形身熱脈小以疾是逆也不過十五日而死矣脈小以疾訣死之法盡此四字

素問咳論帝曰肺之令人欬何也岐伯曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也皮毛者肺之合也皮毛先受邪

氣邪氣以從其合也其寒飲食入胃從肺脈上至於肺則肺寒肺寒則外內合邪因而客之則為肺咳五

臟各以其時受病非其時各傳以與之肺欬之狀欬而喘息有音甚則唾血心欬之狀欬則心痛喉中介

介如梗狀甚則咽痛喉痺肝欬之狀欬則兩脇下痛甚則不可以轉轉則兩胠下滿脾欬之狀欬則右胠

下痛陰陰引肩背甚則不可以動動則欬劇腎欬之狀欬則腰背相引而痛甚則欬涎五氣之久欬乃

移於六腑脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔嘔甚則長蟲出肝欬不已則膽受之膽欬之狀欬嘔膽

汁肺欬不已則大腸受之大腸欬狀欬而遺矢心欬不已則小腸受之小腸欬狀欬而失氣氣與欬俱失

腎欬不已則膀胱受之膀胱欬狀欬而遺濁久欬不已則三焦受之三焦欬狀欬而腹滿不欲食飲此皆

聚於胃關於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也生氣通天論秋傷於濕上逆而欬臟氣法時論腎病

者腹大脛腫喘欬身重示從容論喘欬者是水氣并陽明也

金匱

久效數歲其脈弱者可治其脈虛者必苦冒其人本有支飲在胸中故也治屬飲家上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

外臺

十效一曰風效欲語因效言不得終也二曰寒效飲冷食寒因之而效也三曰支飲心下堅滿效引四肢痛脈反遲也四曰肝效效而引脇下痛也五曰心效效而吐血引手少陰也六曰脾效效而涎出續續不止下引少腹也七曰肺效效引頸項吐涎沫也八曰腎效宜聾無所聞引腰并膝也九曰膽效效引頭痛口苦也十曰厥陰效效引舌本也

效嗽方

射干麻黃湯金匱效而上氣喉中作水雞聲此湯主之

射干法十三兩麻黃一枚

生薑略四紫苑

款冬花各三兩五味子半升細辛三兩半夏八枚

大棗七枚

右九味以水一斗二升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥煮取三升分溫三服

皂莢丸金匱

效逆上氣時時唾濁但坐不得眠此方主之

皂莢八兩刮去皮酥炙

右一味末之蜜丸梧子大以棗膏和湯服三丸日三夜一服稠痰粘肺不能清稀非此不可

厚朴麻黃湯金匱效而脈浮者此主之

厚朴五兩麻黃四兩

石膏如雞子大杏仁

半夏各半升乾薑

細辛各二兩小麥一升五味子半升

右九味以水一斗二升先煮小麥熟去澤納諸藥煮取三升溫服一升日三服脈浮風邪在表

澤漆湯金匱效而脈沈者此主之

半夏半升

紫參五兩澤漆三斤以東流水五斗煮取一斗五升生薑

白前各五兩甘草

黃芩 人參

桂枝酪三 右九味咬咀納澤漆汁中者取五升温服五合至夜盡脈沈伏

越婢加半夏湯金 效而上氣此為肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者主之

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十五枚 甘草二兩 半夏半升 右六味以水六升先煮麻黃去上

沫納諸藥者取三升分温三服肺脹之喘最 多知者絕少

小青龍加石膏湯金 肺脹效而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水此主之 即小青龍加石膏二兩煎

法同小青龍湯 方見痰飲

杏仁煎外 主氣嗽

杏仁一斤去糖一合 糖一合 酥一合 生薑汁一合 蜜五合 貝母八合 另蘇子一升 水研七合 右七味先搗杏

仁如泥納後六味合煎如飴糖取如棗大含嚥之日三但嗽發細細含之蘇子絞汁 始有

十味丸外 治久嗽有聲成肺癰者

麻黃去節白前各二兩 桑皮六兩 射干四兩 白薇三兩 百部五兩 地黃六兩 地骨皮五兩 橘皮三兩

右為末蜜丸桐子大桑皮湯下十九日再服稍加至十五丸

療上氣方外

葶藶五合 桑白皮五合 大棗枚十 右三味以水四升煮取一升去滓納葶藶子泥如棗大煮

三分減一以快利為度

鯉魚湯外 治上氣

杏仁煮 貝母 桂枝酪三 橘皮 人參 甘草炙 厚朴炙 麻黃去節茯苓

胡麻 白前各二兩 生薑六兩 半夏五兩 鯉魚五斤 右以水二斗煮魚得一斗二升去魚納藥煎

取三升二合分四服按此方治咳嗽有水聲身浮腫最妙

觀音應夢散夷堅志 治老人虛嗽

人參一寸 胡桃二枚不去皮 右二味以棗二枚薑五片水煎服

補肺阿膠散錢乙 止嗽生津

阿膠一兩 馬兜鈴焙 惡實炒 甘草一兩 杏仁七錢 右加糯米一合水煎服按此方治小兒天哮最妙

清音丸統 治咳嗽失音

桔梗 訶子各一兩 甘草五分 硼砂三錢 青黛三錢 冰片三分 右為末蜜丸龍眼大噙化一丸

葶藶丸 治肺氣欬嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶隔紙炒 貝母煨黃 木通各一兩 杏仁 防己各二兩 右為末棗肉為丸桐子大桑白皮煎湯下

五十九

蘇子煎 治上氣欬嗽

蘇子 生薑汁 生地汁 白蜜 杏仁各一 右搗蘇子以地黃汁薑汁澆之以絹絞

取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去

滓納蜜合和置瓦器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜此治久嗽

蘇子降氣湯方局 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至效

蘇子 半夏各二兩 前胡 甘草炙 厚朴 陳皮各八分 當歸二錢 沉香七分 薑三片 右水

煎不拘時服若虛冷人加肉桂五分黃耆一錢

治久嗽上氣心胸煩熱吐膿血方

蘇子

鹿角膠炒

杏仁

炒各薑汁一合

白蜜

一盞

生地汁

一合

右將前三味搗令熟入薑汁

中惟咳嗽之病因各

諸病之

地黃汁蜜相和慢火熬成膏磁器中密封之每服半匙許溫粥飲調下日三四服

此治寒嗽

諸病之

能指手故所載之方至詳至悉學者當於此潛心參究勿輕視也

地黃汁蜜相和慢火熬成膏磁器中密封之每服半匙許溫粥飲調下日三四服

此治寒嗽諸病之能指手故所載之方至詳至悉學者當於此潛心參究勿輕視也

麥冬湯

金匱見

小青龙湯

葶藶大棗瀉肺湯

桂苓五味甘草湯

桂苓五味去桂加薑辛湯

又去桂加薑辛半夏湯

又去桂加薑辛半夏杏仁湯

又去桂加薑辛半夏杏仁大黃湯

上方皆金匱治痰飲之方俱載痰飲門

麻黃附子細辛湯

仲景方

烏梅丸

金匱見

金珠化疾丸

見疾人參蛤蚧散

寶鑑見

疝

靈素

靈經脈篇肝所生病為狐疝

足厥陰病丈夫癩疝婦人少腹腫

素骨空論任脈為病男子內結七疝

督脈為病從少腹上衝心而痛不得前後為衝疝

陰陽別論三陽為病發熱寒其傳為癰疝脈要精

微論診得心脈而急病名心疝少腹當有形也

病源

七疝 七疝者厥疝癰疝寒疝氣疝盤疝附疝狼疝此名七疝也厥逆心痛足寒諸飲食吐不下名曰厥

疝也腹中氣乍滿心下盡痛氣積如臂名曰癰疝也寒飲食即腸下腹中盡痛名曰寒疝也腹中乍滿乍

減而痛名曰氣疝也腹中痛在臍旁名曰盤疝也腹中臍下有積聚名曰附疝也小腹與陰相引而痛大

便難名曰狼疝也凡七疝皆由血氣虛弱飲食寒濕不調理之所生

飢疝 陰氣在內寒氣客於足陽明手少陽之絡令食竟必飢心為之痛名曰飢疝

外臺

痛達背脊名尸疝 心下堅痛不可手近名石疝 臍下結痛女子月事不時名血疝 少腹脹滿引膀胱急痛名脈疝 寒氣積於內上衝心如刀錐所刺四肢逆冷或脣口變青名心疝 癩疝堅大如斗諸疝唯癩疝最大而堅中起犯心即能殺人非癩黃不犯

疝方

烏頭桂枝湯金 治寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身皮膚多刺諸藥不能治者

烏頭大者五枚 煮去 以水二升煎減半去滓以桂枝湯五合解之取法 令得一升後初服二合不知

即服三合又不知復加至五合其知者如醉狀得吐者為中病

蜘蛛散金 陰狐疝氣者偏有小大時時上下此方主之

蜘蛛十四枚 桂枝半兩 右為散取八分一匕飲和服日再服蜜丸亦可俗名

大烏頭煎方 腹滿脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食邪正相搏即為寒疝連臍痛苦發

則白津出手足厥冷其脈沈緊者此主之

烏頭大者五枚 水二升煮取一升去渣納蜜二升煎令水氣盡又 取二升強人服七合弱人

服五合不知明日更服不可一日再服沉寒入裏非大熱之藥不治

洗陰腫核痛千金 治丈夫陰腫大如斗核中痛者

雄黃末 礬石研 甘草一尺 右以水一斗煮二升洗之神良

麝香大戟丸方 治陰癩腫脹或小腸氣痛

葫蘆巴四兩 麝香一錢 大戟半兩 茴香 川棟子各二兩 以好酒二升葱白七根長 木香

訶子酒浸 附子泡 檳榔各一兩 右九味為丸如桐子大或酒或薑湯下五十九丸此方通治疝氣

鹽牽牛等俱加入不必
因一二味之殊別各一方

濟生橘核丸 治四種癩病卵核腫脹偏有大小或堅硬如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成瘡時出黃水

或癰腫潰爛

橘核炒

海藻

昆布

海帶各泡

川棟肉炒

桃仁炒各

製厚朴

木通

枳實炒

延胡索炒

桂心

木香略一

右為細末酒丸桐子大每服七十九酒鹽湯下

此軟堅之藥

川棟子丸 治疝氣及一切下部之疾腫痛縮小雖多年服此藥永去病根

川棟子

淨為一斤分四處四兩用麩一合班貓四十九個同麩炒黃色去麩巴豆不用四兩用麩一合巴載一兩同麩炒黃色去麩

巴載不用四兩用鹽一兩茴香一木香見大破故紙香為度右為末酒糊丸如桐子大每五十

丸鹽湯下其者日進三兩服空心食前服

硃砂圓本事

有人貨疝氣藥日數千文有一國醫多金得之用之良驗

木香

沈香

巴豆肉略一

青皮二兩

銅青半兩

硃砂研一分

右上一香青皮三味細剉同巴

豆慢火炒令紫色為度去巴豆為末入青砂二味研勻蒸餅和丸如桐子大每服七丸至九丸鹽湯吞

下二三服空心食前服按此方法既有理而用銅青更奇此等所謂海上方也

蟬脫散 治疔囊腫小兒坐地為蟻或蟻吹卷

蟬脫半兩

水一椀煎湯洗再溫再洗仍與五艾散加燈心煎服或用石

當歸生薑羊肉湯通撞氣阿魏丸吐

蘭臺軌範卷四終

吳江徐靈胎洞溪著

喘

素問

經脈別論夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣善脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時勇者氣行則已怯者則着而為病也 陽明脈解篇陽明厥則喘而惋惋則惡人帝曰或喘而死或喘而生者何也岐伯曰厥逆連臟則死連經則生 脈要精微論肝脈搏堅而長因血在脇下令人喘逆 逆調論腎者水臟主津液主臥與喘也此句又為喘之總訣生氣通天論因於暑汗煩則喘喝靜則多言 陰陽別論陰爭於內陽擾於外魄汗未藏四逆而起起則熏肺使人喘鳴 水熱穴論水病者下為附腫大腹上為喘呼不得臥者標本俱病故肺為喘呼腎為水腫肺為逆不得臥

金匱

上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加刺尤甚

喘方

麥冬湯 火逆上氣咽喉不利止逆下氣此主之

麥冬七升 半夏一升 人參 甘草 粳米 三合 大棗 枚 二 右六味以水一斗二升煮取六升

溫服一升 日三夜一服 此即竹葉石膏湯去竹葉石膏加大棗也 傳清肺胃之火若火逆甚仍用竹葉石膏為妙

桂枝加厚朴杏子湯傷寒 喘家主之 於桂枝湯方內加厚朴二兩 杏仁五十個 去皮尖 餘依前法

麻黃杏仁甘草石膏湯傷寒 發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者此湯主之

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石膏半斤碎
右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫納諸

藥煮取二升去滓溫服一升即越婢湯加杏仁去薑棗

定喘湯振生方治肺寒膈熱哮喘

麻黃 欵冬花 半夏 桑皮各三錢蘇子二錢杏仁一錢白果二十一枚炒黃芩 甘草各一

右以水煎徐徐服

皺肺丸 治喘

欵冬花 知母 秦朮 百部去心紫苑 貝母 阿膠 糯米炒各一兩杏仁四兩

右為末將羊肺一具先以水灌洗看容得水多少即更添此看杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米

泔煮熱研爛成膏搜和前藥末杵數千下丸梧子大每服五十九丸食前桑白皮煎湯下

清燥救肺湯 治肺鬱喘嘔

桑葉三錢經霜者石膏二錢甘草一錢胡麻仁炒阿膠八分人參七分麥冬一錢杏仁七分去皮尖炒黃

枇杷葉毛蜜炙右九味以水一椀煎六分頻頻二三次滾熱服

小青龍加石膏湯 越婢加半夏湯俱見按此二方為喘之主方其餘方意不能

麻黃湯親傷資生腎氣丸 瀉白散錢乙黑錫丸俱見按黑錫丸鎮納元氣為治喘必備之藥當蓄在平時非一時所能驟合也

臑脹水腫

靈素

靈脹論黃帝問曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於臟腑之外四字總括明透排臟腑而郭胸脇脹皮膚故命曰脹帝曰未解其意岐伯曰夫胸腹臟腑之郭也臏中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送

也胃之五數者問里門戶也廉泉王英者津液之道也故五臟六腑者各有畔界其病各有形狀榮氣循脈衛氣逆為脈脹衛氣並脈循分為膚脹水脹篇黃帝問於岐伯曰水與膚脹臑脹腸覃石瘕石水何以別之岐伯答曰水始起也目窠上微腫如新卧起之狀其頸脈動時欬陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成矣以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也黃帝曰膚脹何以候之岐伯曰膚脹者寒氣客於皮膚之間皤皤然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹皆不起腹色不變此其候也臑脹何如岐伯曰腹脹身皆大與膚脹等也色蒼黃腹筋起此其候也腸覃何如岐伯曰寒氣客於腸外與衛氣相搏氣不得榮因有所繫癖而內著惡氣乃起瘰肉內生其始生也大如雞卵稍以益大至其成如懷子之狀久者離歲按之則堅推之則移月事以時下此其候也石瘕何如岐伯曰石瘕生於胞中寒氣客於子門門閉寒氣不得通惡血當瀉不瀉則留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下陰陽別論云陰陽結邪多陰少陽曰石水少腹腫邪氣臑病形篇督脈微大為石水起臑已下至小腹垂垂然上至胃脘死不治水為有形之物故按之即起膚脹為無形之氣故按之不起腸覃乃腸外惡氣在少腹之中水結不散之症若臑脹則非氣非水臑臑皮肉俱堅腫邪盛正衰難為治矣素腹中論黃帝問曰有病心腹滿且食則不暮食此為何病岐伯對曰名為臑脹帝曰治之奈何岐伯曰治之以雞矢醴一劑知二劑已水熱穴論黃帝問曰少陰何以主腎腎何以主水岐伯對曰腎者至陰也至陰者盛水也肺者太陰也太陰者冬脈也故其本在腎其末在肺皆聚水也腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也故凡水病下為跗腫大腹上為喘呼不得卧者標本俱病氣厥論肺移寒於腎為涌水涌水者按腹不堅水氣客於大腸疾行則鳴濯濯如囊裹漿水之病也陰陽應象大論濁氣在上則生腹脹

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證附腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證自喘石水其脈自沉外證腹滿不喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癱膿脈浮而洪浮則為風洪則為氣風氣相搏風強為隱疹身體為痒痒為泄風久為癩癩氣強則為水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此為風水不惡風者小便通利上焦有寒其口多涎此為黃汗寸口脈沉滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水視人之目裹上微擁如蠶新卧起狀其頸脈動時時咳按其手足上陷不起者風水太陽病脈浮而緊法當骨節疼痛反不疼身體反重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒者此為極虛發汗得之渴而不惡寒者此為皮水身腫而冷狀如周痺胸中窒不能食反聚痛暮躁不得眠此為黃汗痛在骨節欬而喘不渴者此為肺脹其狀如腫發汗即愈然諸病此者渴而下利小便數者皆不可發汗裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加白朮湯主之少陰脈緊而沉緊則為痛沉則為水小便即難脈得諸沉當貴有水身體腫重水病脈出者死夫水病人目下有卧蠶面目鮮澤脈伏其人消渴病水腹大小便不利其脈沉絕者有水可下之問曰病下痢後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也答曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈心水者其身重而少氣不得卧煩而躁其人陰腫肝水者其腹大不能自轉側脇下腹痛時時津液微生小便續通肺水者其身腫小便難時時鴨澇脾水者其腹大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難腎水者其腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷面反瘦師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈師曰寸口脈沉而遲沉則為水遲則為寒寒水相搏跌陽脈伏

水穀不化脾氣衰則驚漉胃氣衰則身腫少陽脈卑少陰脈細男子則小便不利婦人則經水不通經為血血不利則為水名血分 師曰寸口脈遲而澹遲則為寒澹為血不足跌陽脈微而遲微則為氣遲則為寒寒氣不足則手足逆冷手足逆冷則榮衛不和榮衛不和則腹滿脇鳴相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通即身冷陰氣不通即骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺不仁陰陽相得其氣乃行大氣一轉其氣乃散實則失氣虛則遺溺名曰氣分氣分非水病但此病無所附曰血分而類及之也然金匱云氣分心下堅大如盤水飲所作則氣分似為水在氣中之病

病源

水分候 水分者言腎氣虛弱不能制水令水氣分散流布四肢故云水分但四肢皮膚虛腫聶聶而動者名水分也

燥水候 燥水謂水氣溢於皮膚因令腫滿以指畫肉上則隱隱成文字者名曰燥水也水腫之病千頭而實內連臟腑不但難愈即愈最易復病復即更難再愈所以內經針水病之穴多至百外而調養亦須百日反不若臃脹之證一愈可以不發治此證者非醫者能審定病症神而明之病者能隨時省察潛心調攝鮮有獲全者

臃脹水腫方此卷載水腫之方最備但病情不同各有所宜當細辨之

雞矢醴方治心腹滿且食不暮食

錫雞矢炒焦 無灰酒 三碗 右共煎乾至一半許用布濾取汁五更熱飲則腹鳴辰巳時行二三

次皆黑水也次日覺足面漸有縞紋又飲一次則漸縞至膝上而病愈矣

防已茯苓湯皮水為病四肢腫水氣在皮膚中四肢聶聶動者主之

防已 黃耆 桂枝各三兩 甘草 二兩 茯苓 六兩 右五味以水六升煮取二升分溫三服

甘草麻黃湯裏水主之

甘草二兩 麻黃四兩 右二味以水五升。先煮麻黃去上沫。納甘草。煮取三升。溫服一升。重覆汗出。不汗再服。慎風寒。

麻黃附子湯 水之為病。其脈沉小。屬少陰。浮者為風。無水。虛脹者為氣。水發其汗。即已。脈沉者宜麻

黃附子湯。浮者宜杏子湯。金匱注云。杏子湯未見。恐是麻黃杏仁甘草石膏湯。

麻黃三兩 甘草二兩 附子一枚 右三味以水七升。先煮麻黃去上沫。納諸藥。煮取二升半。溫服八

分。日三服。發汗為治水要訣。此乃發腎水之汗也。

桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯 氣分心下堅大如盤。邊如旋杯。水飲所作。此方主之。

桂枝 生薑各三兩 甘草二兩 大棗十二枚 麻黃 細辛各二兩 附子一枚 右七味以水七升。先煮

麻黃去上沫。納諸藥。煮取二升。分溫三服。當汗出。如蟲行皮中。即愈。

枳朮湯 心下堅大如盤。邊如旋盤。水飲所作。此方主之。

枳實七枚 白朮二兩 右二味以水五升。煮取三升。分溫三服。腹中軟。即散。

蒲灰散 治小便不利。

蒲灰七分 滑石三分 右二味杵為散。飲服方寸匕。日三服。

己椒藶黃圓 腹滿口舌乾燥。此腸間有水氣。此方主之。

防己 椒目 葶藶 大黃 右四味末之。蜜丸如桐子大。先食飲服。一九日。三服。稍

增口中津液。渴者加芒硝半兩。此治腸間之水。外症不必有水象也。

牡蠣澤瀉散

牡蠣 澤瀉 括萁根 蜀漆 葶藶 商陸根 海藻 右七味異搗下

篩為散更入臼中治之。白飲和服方寸匕。小便利止後服。日三。

大腹水腫方針 治氣息不通。命在旦夕者。

牛黃二分 椒目三分 昆布 海藻 牽牛子 桂心各八 葶藶六分 右七味為末。別搗葶

藶如膏。合和丸如桐子。飲服十九日。二。稍加小便利為度。正觀九年。漢陽王惠水醫所不治。余處此方

日夜尿一二斗。五六日即瘥。

麻豆湯方 治遍身腫小便澀。

麻黃二升 烏豆一斗 桑根白皮切五 右三味以豆汁納藥。煮取六升。一服一升。日二服。

三日令盡。豆不多不。能取效。

十水丸 千金

第一之水。先從面目腫遍一身。名曰青水。其根在肝。大戟主之。第二之水。先從心腫。名曰赤水。其根

在心。葶藶主之。第三之水。先從腹腫。名曰黃水。其根在脾。甘遂主之。第四之水。先從腳腫。上氣而

欬。名曰白水。其根在肺。藜蘆主之。第五之水。先從足跌腫。名曰黑水。其根在腎。連翹主之。第六之

水。先從面至足腫。名曰元水。其根在胆。芫花主之。第七之水。先從四肢起。腹滿大身盡腫。名曰風水。其

根在胃。澤漆主之。第八之水。先四肢小腫。其腹獨大。名曰石水。其根在膀胱。桑根白皮主之。第

九之水。先從小腸滿。名曰暴水。其根在小腸。巴豆主之。第十之水。乍盛乍虛。乍來乍去。名曰氣水。其

根在大腸。赤小豆主之。右十病藥。皆等分。與病狀同者。則倍之。白蜜和先食服。一丸。如小豆。日三。欲

下病者。服三丸。弱者。當以意節之。十水之名。病源亦詳。載其狀。今立此。方想當時本有此分別也。姑存之。

舟車神祐方 治水腫水脹。形氣俱實者。

黑牽牛四兩 大黃二兩 酒浸甘遂一兩 麩橘紅 大戟 麩裏 芫花 醋炒 青皮 炒各一兩 木香 五錢 攢榔 五錢

輕粉一錢 右為末 水丸 每服五分 五更滾水下 大便利三次為度 若一二次不通利 次日漸加至

一錢 若服後大便利四五次 或形氣不支 則減其服 三分二分俱可 或隔一 二 三日服一次 以愈為度

甚者忌鹽醬百日

大聖濟川丸 方類

大黃 牽牛 郁李仁 各一 木香 芒硝 各三 甘遂 半錢 右為末 蜜丸 桐子大 諒人虛實

服之 此下水 之峻劑

木香散 方類 治單腹脹

木香 青皮 白朮 薑黃 豆寇 各半 阿魏 畢澄茄 各一 右為末 醋丸 如豆大

每服二十九 薑湯送下

葶應丸 外 治水腫及脚并虛腫

葶應子 半兩 牽牛子 熟各半 澤漆葉 海藻 洗去 昆布 如上 桑根白皮 炙 甘遂 熬 椒目

郁李仁 各三 桂心 一分 右為末 蜜丸 桐子大 一服十五丸 日再 加至二十九

療水病洪腫氣脹不消食方 外

香薷納釜中 以水淹之 出香薷上數寸 煮濃汁 去滓 煎令可 丸 桐子大 服五丸 日三 小便多為度 奴法

療患氣兼水身面腫垂死方 外

桑白皮 茯苓 郁李仁 各四 橘皮 二兩 海藻 洗 三兩 赤小豆 一升 右六味 以水八升 煮二升

半 分三服

五香散方 升降諸氣宣利三焦疏導壅滯發散邪熱治陰陽之氣鬱結不消諸熱蘊毒腫痛結核中脘不快心腹脹滿

木香 丁香 沉香 乳香 藿香等分 右為粗末每服三錢水一盞半煎八分去滓

食後溫服此方治氣分亦宜

五皮散方 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治皮水姪娠胎水

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓等分 右五味每三錢水煎熟服一方加

白朮磨沉香木香

治蠱脹方 雜抄 大麥粉 五錢

敷藥方 類 治腹滿堅硬如石陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟 芫花 甘遂 海藻各等 右為末用醋調麵和覆貼腫處仍以軟綿裹住

沉香琥珀丸 治水腫一切急難症小便不通

琥珀 杏仁 紫蘇 赤茯苓 澤瀉各五錢 葶藶 郁李仁去皮尖 沉香各兩半 陳皮

防己各七錢半 右為末蜜丸如梧子大以麝香為衣每服二十五丸加至五十丸空心人參湯送下量

虛實加減之

調榮飲 治瘀血流滯血化為水四肢浮腫皮血赤紋名血分

蓬朮 川芎 當歸 元胡索 檳榔 陳皮 赤芍 桑皮炒 大腹皮

赤茯苓 葶藶 瞿麥各一錢 大黃五分 細辛 官桂 甘草五分 右以薑棗水煎服分

之病金匱有病無方此為至當

烏鯉魚湯類 治水氣四肢浮腫

烏鯉魚 赤小豆 桑皮 白朮 陳皮 錢各三 葱白 五根 右以水三碗同煮不可入鹽

先喫魚後服藥不拘時

小胃丹

先花 醋炒過一宿瓦器內不住手 甘遂 麵裹長流水浸半 大黃 紙裹煨勿令焦焙乾切以 大戟 長流

洗酒乾五錢黃柏炒 右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯下取膈上濕痰

熱積以意消息之欲刺空心服 一方加木香檳榔各半兩此即十棗湯加黃黃柏

煨腎散 治腎家水腫

甘遂 三錢 豬腰子 一個 右細披破少鹽椒淹透搽藥末上荷葉包裹煨燒乾溫酒嚼服之

禹餘糧丸 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆治之許學士及丹溪皆云此治膨

脹之要藥即針砂丸又名蛇含石丸

蛇含石 大者三兩以新鐵銚盛入炭火中燒石與銚子一禹餘糧三兩真針砂五兩以水淘淨炒乾

二升託銚內煮醋乾為度後用銚并藥入炭火中燒紅銚出傾藥淨罈地上候冷研細以三物為主其次量人虛實入下項此三物既非大戟

扶持故虛人老人亦可用 羌活 木香 茯苓 川芎 牛膝 桂心 白豆蔻

大茴香 蓬朮 附子 乾薑 青皮 二稜 白蒺藜 當歸各半兩酒浸一宿 右

為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵為丸梧子大食前溫酒白湯任下三十丸至五十丸

最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動臟腑病日三服兼以溫和調

補氣血藥助之真神方也此方兼治有形之積塊

越婢湯越婢加朮湯風門五苓散見通甘草乾薑茯苓白朮湯金匱即腎著湯見腰痛十棗湯見痰防已黃耆湯

金匱見濕門

肺痿附肺癰

全匱

問曰熱在上焦者因欬為肺痿肺癰之病從何得之師曰或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下利重亡津液故得之曰寸口脈數其人嗽口中反有濁唾涎沫者何師曰為肺痿之病若口中辟辟燥欬即胸中隱隱痛脈反滑數此為肺癰欬唾膿血脈數虛者為肺痿數實者為肺癰問曰病欬逆脈之何以知此為肺癰當有膿血吐之則死其脈何類師曰寸口脈微而數微則為風數則為熱微則汗出數則惡寒風中於衛呼氣不入熱過於榮吸而不出風傷皮毛熱傷血脈風舍於肝其人則欬口乾喘滿咽燥不渴多唾濁沫時時振寒熱之所過血為之凝滯蓄結癰膿吐如米粥始明可救膿成則死肺癰之疾成膿亦有愈者全在藥變化漢時治法或未全耳上氣面浮腫肩息其脈浮大不治又加刺尤甚上氣喘而躁者屬肺脹欲作風水發汗則愈

肺痿方

甘草乾薑湯肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所以然者以上虛不能制下故也此

為肺中冷必眩多涎唾甘草乾薑湯以溫之若服湯已渴者屬消渴

甘草四兩乾薑二兩

右二味以水三升煮取一升五合去滓分溫再服此乃治肺冷之方非肺痿通用之方也不得誤用

桂枝去芍藥加皂莢湯針治肺痿吐涎沫

桂枝 生薑兩三 甘草二兩 棗枚五 皂莢一枚去皮 右五味以水七升煮取三升分三服肺症

不可

韋莖湯針 治效有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

韋莖二升 薏苡仁半升 桃仁五十枚 瓜瓣半升 右四味以水一升煮韋莖得五升去滓納諸藥煮取

二升服一升再服當吐如膿此方最穩

桔梗白散外臺 治效而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

桔梗 貝母各三分 巴豆一分去皮 右三味為散強人飲

血膈下者瀉出若下多不止飲冷水一杯則定肺癰全屬內症肺癰乃緣外科輕者煎藥可愈重者膿血已聚必得清火清毒提膿保肺等藥方能挽回否則

不治所以金匱云始萌可救膿成則死也

甘草湯治肺癰見傷寒 炙甘草湯見通 葶歷大棗瀉肺湯方見十味丸方

諸血

靈素

靈玉版篇嘔血胸滿引背脈小而疾是逆也 衄而不止脈大是逆也 熱病篇效而衄汗不出出不至

足者死

血枯 素腹中論帝曰有病胸脇支滿者妨於食病至則先聞腥臊臭出清液先吐血四肢清目眩時時

前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月

事少不來也

溺血 素氣厥論胞移熱於膀胱則癃溺血 痿論悲哀太甚則胞絡絕胞絡絕則陽氣內動發則心下

崩數洩血

金匱

夫吐血欬逆上氣其脈數而有熱不得卧者死 夫酒客欬者必至吐血此因極飲過度所致也 師曰尺脈浮目睛暈黃衄未止暈黃去目睛慧了知衄今止又曰從春至夏衄者太陽從秋至冬衄者陽明衄家不可汗汗出必額上陷脈緊急直視不能眴不得眠 病人面無血色無寒熱脈沉弦者衄浮弱手按之絕者下血煩欬者必吐血 亡血不可發其表汗出即寒慄而振 痰血 病人胸滿唇痿舌青口燥但欲嗽水不欲咽無寒熱脈微大來遲腹不滿其人言我滿為有痰血 病者如執狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰伏是痰血也當下之

病源

吐血有三種一曰內衄二曰肺疽三曰傷胃內衄者出血如鼻衄但不從鼻孔出是近心肺間津出還流入胃內出如豆汁或如衄血凝停胃裏因即滿悶便吐或去數升乃至一斛是也肺疽者言飲酒之後毒滿便吐吐已後有一合二合或半升一升是也傷胃者是飲食大飽之後胃內冷不能消化則便煩悶強嘔吐之所食之物與氣共上衝厥因傷損胃口便吐血色鮮正赤是也此三種皆吐血與咳血迥別凡吐血之後體恒惓惓然心裏煩燥悶亂紛紛顛倒不安寸口脈微而弱血氣俱虛則吐血關上脈微而孔亦吐血脈細沉者生喘欬上氣浮大者死久不瘥面色黃黑無復血氣時寒時熱此三者乃吐血症若欬血屬肺又是一症多難治

舌血 心臟有熱則舌上出血

九竅出血 榮衛大虛腑臟傷損血脈流散脈數不得卧者死

汗血 肝臟血心之液為汗肝心俱傷於邪則汗血

外臺

便血 先血後便為遠血 先便後血為近血

諸血方

血枯方 以四烏鯁骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯飲以鮑魚汁利腸中

及傷肝也

後飯先藥後飯也烏鯁即烏賊治女子赤白漏下令人有子蘆茹即葦草能益精通經雀卵即麻雀卵補精血治陰痿鮑魚即淡乾魚石首為勝能通血脈益陰氣

柏葉湯

治吐血不止

柏葉

乾薑各三艾三把

右三味以水五升取馬通汁一升合煮取一升分溫再服

瀉心湯

治心氣不足吐血衄血此湯主之

大黃 二兩 黃連

黃芩各一 右三味以水三升煮取一升頓服之

滋血潤腸湯

治血枯及死血在腸飲食不下大便燥

當歸 三錢 白芍 煨

生地各一紅花

桃仁 炒 大黃 酒煨

枳殼 各一 韭汁 酒半

右八味以水一

鍾半煎七分食前服

治吐血百治不瘥瘵十瘥神驗不傳方

地黃汁半升 大黃生末寸方

右二味煎地黃汁三沸納

大黃末調和空腹服之日三即瘥用大黃極少不過引生地下達耳

犀角地黃湯針

治傷寒及溫病應發汗而不汗之內蓄血者及鼻衄吐血不盡內餘瘀血大便黑面黃

消瘀血

犀角 一兩 生地黃 八兩 芍藥 三兩 丹皮 二兩

右四味以水九升煮取三升分三服喜妄如狂

者加大黃二兩黃芩三兩其人脈大來遲腹不滿自言滿者為無熱但依方二味不必加

犀角地黄湯 主脈浮客脈乳相合血積胸中熱之甚血在上焦此湯主之

犀角 大黃錢一 黃芩錢三 黃連錢二 生地錢四 右五味水煎食後服

四生丸類 治吐血衄血血熱妄行

生荷葉 生艾葉 側柏葉 生地等分 右搗爛丸如雞子大每服一丸水煎去滓服煎湯亦一法

白芨枇杷丸戴 治咯血

白芨一兩 枇杷葉去毛 藕節各五錢 右為細末另以阿膠五錢蛤粉炒用生地汁調之火上頓化入

前藥為丸如龍眼大每服一丸此治肺血之方枇杷藕節只宜作湯為丸非法

皮膚血汗方聖濟 郁李仁去皮研 以鵝梨搗汁調下

汗血方經驗 用人中白新瓦焙乾入麝香少許温酒調服立效

諸竅出血方聖惠 頭髮 敗椶 陳蓮蓬並燒灰 右三味每服三錢木香湯下

療舌上出血如孔鑽者針 煎香薷飲汁服

療舌血不止針 用槐花炒為末搽上蒲黃灰亦可搽

紫霜丸 治舌上出血竅如針孔

紫金砂即露蜂房頂上實處研一兩 蘆薈三兩 貝母四錢 右為細末蜜丸櫻桃大每服一丸煎化服吐血衄血

用温酒化服

療齒斷血出針 竹茹四兩醋浸一宿含之

療酒醉牙齒涌血外 燒釘赤炷血孔中即止此烙法也

雄黃麝香散 治牙斷腫爛出血

雄黃 血竭 白礬各一錢半 麝香一字 銅綠 輕粉 黃連 黃丹炒各一錢 右共為末

研勻敷患處

治牙縫出血方類 以紙紐子蘸乾蟾酥少許於血處按之立止

黃連散 治齒縫間出血吃食不得

黃連 白龍骨 牙硝各一兩 白礬一分 龍腦一錢 右為細末每用少許敷牙根上

瘡滿口齒血出 枸杞子為末煎湯漱之然後吞下立止根亦可 一方用子汁含滿口更後吃

治牙宣方 用棉花核燒灰擦

療鼻滬血三升氣欲絕方針 龍骨末一棗核許微以氣吹入鼻中即斷更出者更吹之

茅花湯活人書 治鼻衄 茅花每服三錢煎服不拘時

地黃散成 治鼻衄久不愈

生地 熟地 地骨皮 枸杞子 右等分焙乾為末蜜湯調下

療淋血方外臺 苧麻根十枚水五升煮取二升服神驗

療小便出血方外臺 龍骨末二方寸匕酒一升服之日三

瞿麥散奇效方 治血淋尿血

瞿麥穗 赤芍 車前子 白茅根 赤茯苓 桑白皮 石韋去毛 生乾地黃

阿膠炒 滑石 黃芩 甘草炙各二錢 右為細末每服二錢入血餘燒灰二錢調服

神效方 治血淋

海螵蛸 生乾地黄 赤茯苓等分 右為細末每服一錢用柏葉車前子煎湯下

髮灰散 治血淋小便出血如尿 用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調下

玉屑散 治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃耆 人參等分 右為末用蘿蔔大者切一指厚二指大四五片蜜奄少時醃蜜炙乾復醃復

炙盡蜜二兩為度勿令焦至熟醃黃耆人參末吃不拘時仍以鹽湯送下製法

鹿角膠生濟 治房勞傷小便尿血

鹿角膠半兩 沒藥另研 油頭髮繩各三 右為末茅根汁打麵糊丸桐子大每服五十九丸鹽湯下

黃土湯治下血 先便後血此遠血也

甘草 乾地黄 白朮 附子泡 阿膠 黃芩各三 灶中黃土半斤 右七味以水八

升煮取三升分溫三服

赤小豆當歸散治下血 先血後便此近血也

赤小豆三升浸令乾 當歸三兩 右二味杵散漿水服方寸匕日三服

牛角腮灰散治卒下血 黃牛角腮一具燒赤色為細末煮豉汁和二錢服重者日三

豬臟丸 治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急 先用海螵蛸炙黃去皮白者為末木

賊草煎湯調下三日後效後用黃連二兩嫩豬臟二尺去肥 右以黃連塞滿豬臟茶兩頭煮十分爛

研細添糕糊丸梧子大每服三五十九丸食前米飲送下此方治婦人血崩亦良

又豬臟丸 治痔漏下血

豬臟一條洗乾 槐花炒為末 填入臟內兩頭 右搗和丸如梧子大每服五十九丸食前當歸湯下

抵當湯

抵當丸

俱見 癩血桃核承氣湯治熱結膀胱小腸急結者以上三方俱見傷寒

大黃廔蟲丸

百花煎

人參蛤蚧散以上

俱見

瓊玉膏

龍腦雞蘇丸

千金地黃湯

治亡血脫血鼻唇色白無力者方以上三方俱見通治

噎膈嘔吐附關格

靈素

靈結根篇太陰為開厥陰為闔少陰為樞故開折則倉廩無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有餘不足

上膈篇黃帝曰氣為上膈者食飲入而還出余已知之矣盡為下膈下膈名盡以屬蟲為患當以治蟲之法治之

下膈者食

晬時乃出余未得其意願卒聞之岐伯曰喜怒不適食飲不節寒溫不時則寒汁流於腸中流於腸中則

蟲寒蟲寒則積聚守於下管則腸胃充郭衛氣不榮邪氣居之人食則蟲上食蟲上食則下管虛下管虛

則邪氣勝之積聚已留留則癰成癰成則下管約其癰在管內者即而痛深其癰在外者則癰外而痛浮

癰上皮熱五味篇苦走骨多食之變嘔苦入於胃令人五穀之氣皆不能勝苦苦入下脘三焦之道皆

閉而不通故變嘔四時氣篇善嘔嘔有苦長太息心中愴愴恐人將捕之邪在胆逆在胃胆液泄則口

苦胃氣逆則嘔苦故曰嘔經脈篇足太陰病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫足厥陰所生病者胸滿

嘔逆

素陰陽別論一陽發病少氣善欬善泄其傳為膈三陽結謂之膈至真要大論諸嘔吐皆屬於熱

關格六節臟象論人迎一盛病在少陽二盛病在太陽三盛病在陽明四盛以上為格陽寸口一盛病

在厥陰二盛病在少陰三盛病在太陰四盛以上為格陰人迎與寸口俱盛四格以上為關格關格之脈

羸不能極於天地之精氣則死矣此指關格之脈非病名也

金匱

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈 先嘔却渴者此為欲解先渴却嘔者為水停心下此屬飲家嘔家本渴今反不渴者以心下有支飲故也 問曰病人脈數數為熱當消穀引食而反渴者何也師曰以發其汗令陽微膈氣虛脈乃數數為客熱不能消穀胃中虛故也 跌陽脈浮而濇浮則為虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈緊而濇其病難治 病人欲吐者不可下之 嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治

傷寒論

脈上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗可治有汗者死 寸口脈浮而大浮則虛大為實。在尺為關。在下為格。關則不得小便。格則吐逆。跌陽脈伏而濇。伏則吐逆。水穀不化。濇則食不得入。名曰關格。此乃關格之病。按關格之證內經傷寒論所指不同內經所云是不治之論傷寒論所云則卒暴之疾當於通使止嘔方法隨宜施治可也。

千金

走哺 下焦熱氣逆不續嘔吐不禁

外臺

五噎 夫五噎謂一曰氣噎二曰憂噎三曰食噎四曰勞噎五曰思噎雖有五名皆由陰陽不和三焦隔絕津液不行憂恚嗔怒所生謂之五噎噎者噎塞不通也

氣噎 陰陽不和寒氣填於胸膈故氣噎不通令人喘胸背痛也

卒食噎 由臟冷而不理津液少而不能傳行飲食也

噎膈嘔吐方

茱萸湯 嘔而胸滿者此湯主之 乾嘔吐涎沫頭痛此亦主之

茱萸一升 人參三兩 生薑六兩 大棗廿二 右四味以水五升 煮取三升 溫服七合 日三服

生薑瀉心湯湯論寒 治胃中不和 心下痞鞭 乾噎 食臭 脇下有水 氣腹中雷鳴 下痢

生薑四兩 甘草炙 人參 黃芩各三兩 半夏 乾薑各一兩 大棗廿二 右七味以水一斗 煮取

六升 去渣 煎取三升 溫服一升 日三服 生薑乾薑同用 取辛以開之

半夏瀉心湯 嘔而腸鳴 心下痞者 此湯主之

半夏瀉心黃芩 乾薑 人參各三兩 黃連一兩 大棗廿二 甘草三兩 右七味以水一斗 煮取

六升 去滓 再煎取三升 溫服一升 日三服

黃芩加半夏生薑湯 乾嘔而利者 此湯主之

黃芩三兩 甘草炙 芍藥各二兩 半夏半斤 生薑三兩 大棗廿二 右六味以水一斗 煮取三升 去渣

溫服一升 日再夜一

猪苓散 嘔吐而病在膈上 後思水者 解 急與之 思水者 此湯主之

猪苓 茯苓 白朮各等分 右三味杵為散 飲服方寸匕 日三服 傷飲惡飲此乃常理若胸中

水但不能多飲耳

大半夏湯 反胃嘔吐者 此湯主之

半夏三升 洗 人參三兩 白蜜一升 右三味以水一斗二升 和蜜揚之二百四十遍 煮藥取二升半

溫服一升 餘分再服 其妙在用水

大黃甘草湯 食已即吐者 此湯主之

大黃四兩 甘草一兩 右二味以水三升 煮取一升 分溫再服 此治吐

茯苓澤瀉湯陰 胃反吐而渴欲飲水者此湯主之

茯苓半斤澤瀉四兩甘草三兩桂枝二兩白朮三兩生薑四兩 右六味以水一斗煮取三升納澤

瀉再煮取二升半温服八合日三服此治蓄飲之吐納澤瀉再煮似先煮五味後煮澤瀉

文蛤湯陰 吐後渴飲得水而貪飲者此湯主之兼主微風脈緊頭痛

文蛤五兩麻黃二兩甘草二兩生薑各三兩石膏五兩杏仁五十粒大棗枚十二 右七味以水六升煮取

二升温服一升汗出愈文蛤亦入煎劑

生薑半夏湯陰 病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦心中憤憤然無奈者此湯主之

半夏半斤生薑汁一斤 右二味以水七升煮取二升納生薑汁煮取一升半小冷分四服日三夜

一服止停後服此治寒飲之症納汁再煮似先煮半夏

半夏乾薑散陰 乾嘔吐逆吐涎沫此主之

半夏各等乾薑各等 右二味杵為散取方寸匕漿水一升半煎取七合頓服之此治胃寒之吐

葛根加半夏湯湯寒 太陽陽明合病不下痢但嘔者主之

葛根四兩麻黃三兩去節湯泡生薑三兩甘草二兩芍藥二兩桂枝二兩去皮大棗枚十二半夏半斤 右

八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去白沫納諸藥煮取三升去渣温服一升覆取微似汗

橘皮湯陰 乾嘔噦若手足厥者此湯主之

橘皮四兩生薑半斤 右二味以水七升煮取三升温服一升下咽即愈此治胃氣不通之吐

橘皮竹茹湯陰 噦逆者此湯主之

橘皮二升竹茹二升大棗枚十生薑半斤甘草五兩人參一兩 右六味以水一斗煮取三升温服

一升。日三服。

黃連丸傷寒論 傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。主之。

黃連 甘草炙 乾薑 桂枝去皮各兩 人參二兩 半夏半斤 大棗十二枚 右七味以水一斗。煮

取六升。去渣。溫服一升。日三夜一服。邪氣寒氣也。故寒熱並用。

昆布丸 治五噎咽寒。食飲不下。

昆布洗 麥冬 天冬 阿梨勒 木通 大黃 朴硝各一兩 郁李仁 桂心

百合各一兩 羚羊角 杏仁 蘇子 射干各半兩 柴胡 陳皮 檳榔各五分 右藥蜜

丸。桐子大。熱酒下。每服三十九。不拘時。

關格不通方千金

芒硝 芍藥 杏仁各四兩 枳實一兩 大黃半斤 地黃二兩 右藥以水七升。煮取三升。分三服。

千金理諸噎方 常食乾粳米飯。即不噎。

又方奇 炭末細羅。丸如彈子大。含少許。細細咽津。即下。

中風客熱噎方千金 竹茹四兩 生米五合 右二味以水六升。煮米熟。服之。

嘔噎方千金 蘆根五兩 以水五升。煮取三升。分三服。兼服小兒尿一二合。良。

消穀丸千金 主數年不能飲食。

小麥蘗 七月七日麴格一 乾薑 烏梅各四兩 右四味搗篩為末。煉蜜丸。如桐子大。空腹酒

服十五丸。日再。稍加至三十九。其寒在胸中。及反胃。翻心。皆差。

卒噎千金 男噎。女人丁壯。氣盛者。噓其肺俞。女子。男子。噓之。

廣濟檳榔散外臺 療吐酸水每食則變作醋水吐出

檳榔分六 人參六分 茯苓八分 橘皮六分 單撥六分 右五味搗篩為散平晨空腹生薑五六兩合

皮搗絞取汁溫納散方寸匕攪調頓服之日一服漸加至一匕半純薑汁服未藥斷難入口祇宜取薑汁一滴拌藥別飲送下為安

崔氏方外 療食則吐或朝食夜吐名曰胃反或氣噎不飲食數年羸削惟飲水亦同此方

半夏六兩 人參六兩 生薑一兩 橘皮二兩 牛涎一升 春杵頭糠一升 厚二兩 羚羊角三兩 右以

水八升煮取三升分溫三服頻服

深師治噎方外臺

羚羊角 前胡 甘草 人參 橘皮各二 右五味以水六升煮取三升分四服

反胃方本事 驢水即鹽小便 日服二合後食微吐一半晡時又服二合人定時食粥吐出便定

丁香柿蒂湯嚴氏 治寒呃

丁香 柿蒂各二 人參一錢 生薑五片 煎服

治冷呃方 刀豆子煨存 酒服錢許

撞氣阿魏丸局方 治五種噎疾九般心痛痞氣塊冷氣攻刺及脾胃停寒胸滿膨脹嘔吐酸水丈夫小

腸氣痛婦人氣血等疾

茴香炒香 陳皮去白 青皮 川芎 丁香皮 蓬莪朮泡 甘草泡各 縮砂仁 肉桂去粗皮各

醉生薑四兩 醃黑炒白芷兩 胡椒半 阿魏二錢 醋半 浸一 右為末用阿魏丸雞頭大每藥丸一斤用

硃砂七錢 為衣丈夫氣痛炒鹽湯下一粒至二粒婦人血氣醋湯下常服一粒爛嚼茶酒任下此方純用通氣

溫熱之藥有火者不宜服 此卷所載方論種種各殊然皆係嘔吐反胃水飲蟲積等症非真膈病也 膈病乃胃口枯槁之症百無一治論中雖有格脈格症而其形象俱未詳載必臨症多乃能識其真耳

旋覆代赭湯

四逆湯

小柴胡湯以上諸方俱見傷寒

小半夏湯方見痰飲竹葉石膏湯加生薑見通治

泄瀉

靈素

靈論疾診尺篇飡泄脈小者手足寒難已飡泄脈小手足溫泄易已玉版篇其腹大脹四末清脫形池

甚逆也諸病暴注下迫皆屬於熱素陰陽應象大論清氣在下則生飡泄春傷於風夏生飡泄

濕勝則濡池脈要精微論久風為飡泄平人氣象論泄而脫血難治玉機真臟論泄而脈大難治

難經

泄凡有五其名不同有胃泄有脾泄有大腸泄有小腸泄有大瘕泄名曰後重胃泄者飲食不化色黃脾

泄者腹脹滿泄注食即嘔吐大腸泄者食已窘迫大便色白腸鳴切痛小腸泄者溲而便膿血少腹痛逆

大瘕泄者裏急後重數至圜而不能便莖中痛此五泄之要法也

泄瀉方

溫脾湯本事方

主治錮冷在腸胃間泄瀉腹痛宜先取去然後調治不可謂虛以養病也

厚朴

乾薑

甘草

桂心

附子略二

大黃四錢

右六味咬咀取一兩水二鍾煎六

分頓服

不可謂虛以養病此干古之要訣後人反是

訶梨勒丸生濟

治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化

訶梨勒煨

附子泡

肉豆蔻煨

木香

吳茱萸炒

龍骨生用

白茯苓

萹撥等分

右為末生薑汁煮麵糊丸如梧子大每服七十九空心米飲下

香茸丸

治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲一二盞泄作幾年矣

嫩鹿茸酥炙 肉豆蔻煨各 生麝香另研

右為末。陳米飯為丸如梧子大每服五十九空心米飲下。

固腸丸得 治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸 御粟殼 黃連洛等 右為末醋糊丸如桐子大每服二十九空心米飲下

附子理中丸局 治脾胃冷弱心腹疼痛嘔吐瀉痢霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中

雷鳴飲食不進及一切沉寒錮冷並皆治之

人參一兩 附子泡一 乾薑泡 甘草炙各 白朮土 右為末蜜丸每樂一兩作十九每服一九以

水一盞化開煎至七分稍熱食前服

四君子湯局 六君子湯 歸脾湯 平胃散 補中益氣湯 枳實丸消痞積 瀉黃散 五苓散

四神丸 藿香正氣散局方 以上 四逆散治少陰 大承氣湯 小承氣湯 調胃承氣湯 敗毒

散 葛根湯 葛根黃芩黃連湯以上七方 厚朴七物湯方見腹痛門 按泄瀉乃一時寒暖不調水穀不

散之品一二劑即愈今所集方內多脾胃虛寒久病之方隨症酌用可也

蘭臺軌範卷五終