

R28/342
3

BRAND

千金翼方卷第五

婦人一

論曰婦人之病難療比之丈夫十倍費功所以古人別立婦人之方焉是以今方具在四卷一卷泛療婦人三卷專論產後好學者宜細意用心觀之迺得覩其深趣耳

婦人求子第一

論一首

方七首

論曰夫人求子者服藥須有次第不得不知其次第者男服七子散女服盪胞湯及坐藥并服紫石門冬丸則無不得效矣不知此者得力鮮焉

七子散主丈夫風虛目闇精氣衰少無子補不足方

牡荊子

五味子

菟絲子

車前子

新葷子

石斛

薯蕷

乾地黄

杜仲灸去皮

鹿茸灸

遠志各貳兩

附子炮去皮

蛇牀子

芎藭各壹兩半

山茱萸

天雄炮去皮

人參

茯苓

黃耆

牛膝各伍分

桂心貳兩

巴戟天參兩

肉苁蓉米分

鍾乳貳兩无

右貳拾肆味搗篩為散酒服方寸匕日二不知加至二匕以知為度忌生冷醋滑猪雞魚蒜油麪不能酒者蜜和丸服亦佳一方加覆盆子二兩行房法一依素女經女人月信斷一日為男二日為女三日為男四日為女以外無子每日午時夜半後行事生子吉餘時生子不吉

湯胞湯

主婦人斷緒二三十年及生來無子并數數失子服此皆有子長命無病方

朴消

桃仁去皮尖兩

茯苓

牡丹皮

大黃各參兩

人參

桂心

芍藥

厚朴炙

細辛

牛膝

當歸

橘皮各貳兩

附子壹兩半炮去皮

蟲蟲去翅水蛭各陸拾枚熬

右壹拾陸味咬咀以酒五升水六升合漬一宿煮取三升分肆服日叁夜一服每服相叁時辰少時更服如常覆被少取汗汗不出冬月著火籠必下積血及冷赤膿如赤小豆汁本為婦人子宮內有此惡物令然或天陰臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下盡氣力弱大困不堪更服亦一日二三服即止如大悶不堪可食酢飯冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能忍服盡大好一日後仍著導藥千金更有桔梗甘草各貳兩

坐導藥方

皂莢壹兩炙去皮子

五味子

乾薑

細辛各叁兩

葶藶子熬苦瓠各叁分千金作山菜莢

礬石曬半

大黃

戎鹽

蜀椒汗

當歸各貳兩

右壹拾壹味擣篩內輕絹袋子中如指許大長三寸盛藥
今滿內子門中坐卧任意勿行走急小便時即去之仍易
新者一日當下青黃冷汁汁盡止即可幸御自有子若未
見病出亦可至十日安之千金無意磨一本著藥後一日
廼服紫石天門冬丸

紫石天門冬丸

紫石英研之日

烏頭炮去皮天門冬各參兩

烏賊魚骨

牛膝兩人參兩牡丹皮

桑寄生 乾薑

細辛 厚朴炙 食茱萸

續斷各五 署預兩 柏子仁壹兩

牡荊子千金作

禹餘糧 紫葳 石斛

辛夷心 卷柏

當歸 芎藭 桂心

乾地黄 甘草炙

右貳拾陸味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服十九日

二稍加至參拾丸慎如藥法

白薇丸 主久無子或斷緒上熱下冷百病皆療方

白薇 車前子 各二三分 澤蘭 太一餘糧

赤石脂 細辛 人參 桃仁去尖 覆盆子

麥門冬心法 白芷各一兩半 紫石英 石膏研 藁本

菴藷子 卷柏各伍分 蒲黃 桂心各二兩半 當歸

芎藭 蛇牀子 各一兩 乾薑 蜀椒汗

乾地黄 各二兩 茯苓 遠志去心 白龍骨各二兩

橘皮 半兩

右貳拾捌味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子酒服拾伍丸日再增至肆拾丸以知為度亦可增至伍拾丸慎猪雞蒜生冷醋滑驢馬等肉覺有娠則止秘之勿妄傳也

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化施化無成方

覆盆子

五味子

各貳升

菟絲子

壹升

白朮

熬令色赤

石斛

各二兩

天雄

壹兩炮

天門冬

去心

紫石英

貳兩

桑寄生

肆兩

右玖味搗篩為散先食酒服方寸匕日二素不耐冷者去寄生加細辛肆兩陽氣不少而無子者去石斛加檳榔拾伍枚良

承澤丸

主婦人下焦三十六疾不孕絕產方

梅核仁

辛夷

各壹升

葛上亭長

柒枚

澤蘭子

溲疏

藁本

各壹兩

右陸味搗篩為末鍊蜜和丸如大豆先食酒服貳丸日三不知稍增之若腹中無堅積者去亭長加通草壹兩惡甘者和藥先以苦酒搜散乃內少蜜和為丸

婦人積聚第二

方一十三首

牡蒙丸 主男子疝瘕女子血瘕心腹堅積聚乳餘疾小腹堅滿貫臍痛熱中腰背痛小便不利大便難不下食有伏蠱臙脹腫久寒熱胃管有邪氣方

牡蒙

茯苓

烏喙

炮去皮

石膏

研

藜蘆 各三分

巴豆

陸拾枚去心皮熬

乾薑

桂心

各二分

半夏

五分洗

右玖味擣篩為末別擣巴豆如膏合諸藥令調和擣至熟以飲服如小豆貳丸日二如不相得入少蜜

烏頭丸

主心腹積聚膈中氣悶脹滿疝瘕內傷瘖血產乳衆

病及諸不足方

烏頭

炮去皮

巴豆

去心皮熬各半兩

人參

消石

各壹兩

大黃

二兩

戎鹽

犂兩

黃芩

麩蟲

熬

半夏

洗

桂心

各二分

右壹拾壹味擣篩為末內蜜青牛膽汁拌和擣二千杵丸

如梧桐子大宿不食酒服五丸卧須臾當下黃者心腹積也青如粥汁者膈上邪氣也下崩血如腐肉者內傷也赤如血者乳餘疾也如蠱刺者蟲也下已必渴渴飲粥飢食蘇麻三日後當温食食必肥濃四十日平復

乾薑丸 治婦人疲結脅肋下疾

乾薑壹兩 芍藥各貳兩 前胡熬 乾地黄熬

桃仁熬去皮尖 茯苓各壹兩 人參 當歸各叁兩

杏仁熬去皮尖 朴消 蜀椒汗 蟪螬熬

麤蟲熬 螭蟲去翅足熬 水蛭各壹人合熬

右壹拾陸味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子未食以飲服

參丸可增至拾九千金用大黃柴胡各貳兩無前胡地黄

生地黄丸 主婦人臍下結堅大如杯升月經不通發熱往來

下痢羸瘦此為氣瘕也若生肉癥不可瘥未生癥者可療方

生地黄 冬拾斤搗絞取汁

乾漆 壹斤熬搗為末

右二味相和微火煎令可圓藥成丸如梧桐子大食後以

酒服五圓 千金云服冬三圓集驗云至七八圓止

遼東都尉所上圓 主臍下堅癖無所不療

恒山 巴豆 去皮熬 大黃 各壹分 天雄 真故大者炮

龍盧 壹兩半一方貳兩 乾薑 人參 苦參

丹參 沙參 玄參 細辛 白薇 各叁分

龍膽 牡蒙 各壹兩 芍藥 附子 炮去皮 狼牙

牛膝 茯苓 各伍分

右貳拾味搗篩為末鍊蜜和丸宿勿食酒服伍圓日叁主

大羸瘦而黃月水不調當十五日服之下長蟲或下種種

病出二十五日腹中所苦悉愈肌膚充盛五十日萬病除

矣斷緒者皆有子也

五京圓 主婦人腹中積聚九痛七害久寒腰中冷引小腹害食苦下或熱痢得冷便下方

乾薑 參兩 黃芩 壹兩 吳茱萸 壹升

狼毒 當歸 牡蠣 各貳兩

附子 炮去皮

右柒味搗師為末鍊蜜和圓如梧桐子大酒日服伍圓加至拾圓此出京氏五君故名五京圓久患冷當服之

雞鳴紫圓 主婦人腹中癥瘕積聚

大黃 貳兩 前胡 人參 各肆兩 皂莢 炙去皮子 藜蘆

巴豆 法去皮心熬 礬石 鍊 烏喙 炮去皮各半兩

代赭 伍分

阿膠 壹兩半炙 桂心 壹分 杏仁 去皮炙 乾薑

甘草 各參分

右壹拾肆味搗師為末鍊蜜和圓雞鳴時飲服壹圓如梧桐子日益壹圓至伍圓止仍從壹圓起下白者風也赤者癥瘕也青者疝也黃者心腹病也如白泔爛腐者水也

炭皮圓 主婦人憂恚心下支滿膈氣腹熱月經不利血氣上
搶心欲嘔不可眠懈怠不勤

炭皮

芎藭

各壹分

桂心

乾薑

乾漆熬

白朮

各壹分半

蜀椒

汗

黃芩

芍藥

土瓜根

大黃

煨 蛭 蟲

各半兩去翅足熬

右壹拾貳味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子飲服五圓日

參不知稍增之

七氣圓

主婦人勞氣食氣胃滿氣吐逆大下氣其病短氣曾

脅滿氣結痛小便赤黃頭重方

葶藶子

熬

半夏

各壹兩洗

大黃

玄參

人參

苦參

麥門冬

去心

黃芩

乾薑

芎藭

遠志

去心各壹兩半

消石

壹兩

瞿麥

壹兩半

右壹拾參味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以酒服陸圓

日一服亦理嘔逆破積聚

半夏湯 主婦人胃滿心下堅咽中貼貼如有炙腐咽之不下

吐之不出方

半夏 壹升洗

生薑 伍兩

茯苓

厚朴 各肆兩

右肆味咬咀以水陸升煮取叁升分叁服 子金有蘇 無貳兩

厚朴湯 主婦人下焦勞冷膀胱腎氣損弱曰汁與小便俱出

厚朴如手大長肆寸去皮炙削以酒伍升煮兩沸去滓

取桂心壹尺絹篩內汁中調和宿勿食曉頓服之

溫經湯 主婦人小腹痛方

茯苓 陸兩

芍藥

土瓜根

各叁兩

薏苡仁 半升

右肆味咬咀以酒叁升漬一宿曉加叁升水煎取貳升分

再服之

大補內黃耆湯

主婦人七傷骨髓疼小腹急滿面目黃黑不

能食飲并諸虛不足少氣心悸不安方

黃耆

半夏

各參三兩洗

大棗

參拾枚

當歸

乾地黄

桂心

人參

茯苓

遠志

去心

芍藥

澤瀉

五味子

麥門冬

去心

白朮

甘草

各貳兩炙

乾薑

肆兩

右壹拾陸味咬咀以水壹斗半煮取貳升壹服五合日叁

婦人乳疾第二

方六首

治乳堅方

當歸

芍藥

黃耆

葵藜子

雞骨

附子

炮去皮

枳實

各貳兩炙

桂心

參兩

人參

薏苡仁

各壹兩

右壹拾味擣篩為散酒服方寸匕日三服

治乳癰始作方

大黃

棟實

芍藥

馬蹄

炙

右肆味等分搗篩為散酒服方寸匕取汗出差廣濟云治乳癰六堅
硬赤紫色衣不得近痛不可忍經宿乃消

排膿散 主乳癰方

鐵粉 細辛 芎藭 人參 防風

乾薑 黃芩 桂心 芍藥 茯苓各壹兩

當歸 甘草各伍分

右壹拾貳味搗篩為散酒服方寸匕日三夜一服加至一匕半服十日膿血出多勿怪是惡物除

生魚薄乳癰方

江鯽魚張五 伏龍肝 大黃 莽草各陸兩

右肆味別搗魚如膏下篩二物更搗令調以生地黃汁和如粥傳腫上日五六夜二三

治乳癰初有異則行此湯并將圓補之即愈方

麥門冬壹升 去心

黃芩

黃耆

芍藥

茯苓

甘草炙

通草各貳兩

桑寄生

防風

人參各參兩

糖捌兩

大棗拾枚

右壹拾貳味咬咀以水壹斗煮取參升去滓內糖分肆服

次服天門冬圓

天門冬伍兩 去心

通草

黃耆

防風

乾地黄

桑寄生

人參各貳兩

羌活參兩

大黃貳兩半

白芷壹兩半

升麻壹兩半

澤蘭

茯苓

天雄炮去皮

黃芩

枳實炙

五味子各壹兩

右壹拾柒味擣篩為末鍊蜜和圓酒服貳拾圓日二加至

參拾圓

婦人雜病第四

方一十三首

治婦人斷產方

醫方五

故蠶子布壹尺燒一味末酒下終身不復懷孕也
治婦人無故尿血方

龍骨 伍兩

又方
右壹味擣篩為散酒服方寸匕空腹服日三夕者貳拾服

鹿角 屑

大豆黃卷

桂心 各壹兩

又方
右叁味擣篩為散空腹酒服方寸匕日二服

又方
舂故茹為散酒服方寸匕日三服亦主遺尿
治婦人遺尿不知出時方

白薇

芍藥 各貳兩半

又方
右貳味擣篩為散酒服方寸匕日三服

礬石熬

牡蠣熬
各叁兩

右貳味搗篩為散酒服方寸匕亦治丈夫

治妊娠得熱病五六日小便不利熱入五藏方

葵子壹升

榆白皮壹把切

右貳味水伍升煮五沸服一升日三服

又方

葵子

茯苓各壹兩

右貳味搗篩為散水服方寸匕日三小便利則止

治婦人小便不通方

葵子貳升

朴消壹兩

右貳味以水五升煮取二升分再服

治婦人卒不得小便方

杏仁柒枚熬令變色去皮尖

右壹味擣篩為散以水服之立下

又方

紫苑為末井花水服二指撮立通

治丈夫婦人轉胞不得小便八九日方

滑石壹兩

寒水石壹兩

葵子壹升

右參味以水一斗煮取五升服一升即利

婦人經服硫黃圓忽患頭痛項冷冷歇又心曾煩熱眉骨眼
背癢痛有時生瘡喉中乾燥四肢痛癢方

栝樓根

麥門冬去心

龍膽各叁兩

土瓜根捌兩

大黃貳兩

杏仁壹升去小大皮兩仁熬

右陸味擣篩為末別擣杏仁如泥鍊蜜和圓如梧桐子大
飲下拾圓日三稍加至二十圓

婦人面藥第五

論一首

方二十九首

論曰面脂手膏衣香藻豆仕人貴勝皆足所要然今之醫門極爲祕惜不許子弟洩漏一法至於父子之間亦不傳示然聖人立法欲使家家悉解人人自知豈使愚於天下令至道不行擁蔽聖人之意甚可怪也

面脂主面及髮鬢黑疔凡是面上之病悉皆主之方

丁香拾分 零陵香 桃仁去皮 土瓜根 白斂

白及 拖子花 沈香 防風 當歸

辛夷 麝香研 芎藭 商陸各參兩 白芷

萎蕤 菟絲子 甘松香 藿香各拾分 蜀水花

青木香各貳兩 茯苓拾肆 木蘭皮 藁本

白僵各貳兩半 冬瓜仁肆兩 鵝脂 羊髓拾壹

羊腎脂壹升 猪脰陸 清酒伍升 生猪肪脂叁天升

右參拾貳味切以上件酒按猪脰汁漬藥一宿於脂中以

炭火煎三上三下白芷黃綿濾貯器中以塗面

面脂方

防風

芎藭

白正

白殭蠶

藁本

姜薤

茯苓

白斂

細辛

土瓜根

栝樓仁

桃仁去尖

蜀水花

青木香

當歸

辛夷各半兩

鵝脂壹升

羊腎脂壹升

猪脂貳升

右壹拾玖味細切綿裹酒二升漬一日一夜內脂中急火

煎之三上三下然後緩火一夜藥成去滓以寒水石粉半

兩內脂中以柳木篋熟攪任用之

又方

杏仁貳升去尖

白附子叁兩

蜜陀僧兩研

真珠拾肆枚

白鮮皮壹兩

生白羊髓貳升半

雞子白柒枚

胡粉兩

以綿縛重裹壹石

下陰乾

下陰乾

雞子白柒枚

胡粉兩

以綿縛重裹壹石

下陰乾

下陰乾

下陰乾

又方

右搗味以清酒貳升半先取杏仁盆中研之如膏又下雞子白研二百遍又下羊髓研貳百遍擣篩諸藥內之研五百遍至干遍彌佳初研杏仁即少少下酒薄漸漸下使盡藥成以指捻看如脂即可用也草藥絹篩直取細如粉佳

當歸

芎藭

細辛各伍 蜀水花

密陀僧

商陸

辛夷

木蘭皮

栝樓

白殭蠶

藁本

桃花

香附子

杜蘅

礞屎

零陵香

姜蕤

土瓜根各叁分

麝香

丁香各半

白木貳兩

白芷柒分 白附子

玉屑各壹兩

鵝脂在合

鹿髓壹升

白蠟肆兩

猪膏貳兩

羊髓壹升

右貳拾玖味細切醋浸密封一宿明曉以猪膏煎三上三下以白芷黃為藥成去滓攪數萬遍令色白傳面慎風日良

百膏方

杜蘅

牡蠣熬三云

防風

藁本

細辛

白附子

白芷

當歸

木蘭皮

白朮

獨活

姜藟

天雄

茯苓

玉屑各壹兩

菟絲子

防己

商陸

梔子花

橘皮一云橘仁

白欬

人參各參兩

甘松香

青木香

藿香

零陵香

丁香各貳兩

麝香半兩

白大脂

白鵝脂無鵝脂以羊髓代之

牛髓各壹升

羊脬叁具

右參拾貳味以水浸骨髓等五日日別再易水又五日日別一易水又十日二日一易水凡二十日止以酒壹升按羊脬令消盡去脉乃細切香於瓷器中浸之密封一宿曉以諸脂等合煎三上三下以酒水氣盡為候即以綿布絞去滓研之千遍待凝乃止使白如雪每夜塗面晝則洗却

更塗新者十日以後色等桃花外臺有冬瓜仁藥無花無白斂入參

面膏主有黥黷及瘡癩并皮膚皴癢方

防風 藁本 辛夷 芍藥 當歸

白芷 牛膝 商陸 細辛 蜜陀僧

芎藭 獨活 雞舌香 零陵香 姜蕤

木蘭皮 麝香 丁香 未穿真珠各壹兩

蕤仁 杏仁各貳兩 去皮尖 牛髓伍升 油壹升

臘月猪脂熬升 麀鹿腦各壹具若無麀鹿腦亦得

右貳拾伍味先以水浸腦髓使白藿香以上咬咀如麥片

乃於腦髓脂油內煎之三上三下即以綿裹搗去滓乃內

麝香及真珠末研之千遍凝即塗面上甚妙今據藥上二

藿香以上而方中無藿香必脫漏參味也

又方

香附子焙散白芷壹兩

零陵香貳兩茯苓壹大兩

蔓菁油臞脂代無即

牛髓羊髓各壹斗

白蠟剝兩麝香半兩

右玫瑰切以油髓微火煎五物令色變去滓內麝香研干
遍凝每澡豆洗面而塗之

面藥方

朱砂研雄黃研水銀霜酪半胡粉貳團黃鵠屎臞

右伍味合和淨洗面夜塗之以壹兩藥和面脂令稠如泥
先於夜欲卧時澡豆淨洗面并手乾拭以藥塗面厚薄如
尋常塗面厚薄乃以指細細熟摩之令藥與肉相入乃卧
一上經五日五夜勿洗面止就上作糝即得要不洗面至
第六夜洗面塗一如前法滿三度洗更不塗也一如常洗
面也其色光淨更未塗時百倍也

悅澤面方

雄黃研

朱砂研

白殭蠶各壹兩

眞珠拾枚研末

右肆味並粉末之以面脂和胡粉內藥和攪塗面作搨曉以醋漿水洗面訖乃塗之三十日後如凝脂五十歲人塗之面如弱冠夜常塗之勿絕

令面生光方

蜜陀僧研以乳煎之塗面即生光

令面白媚好方

白附子

白芷

杜若

赤石脂

白石脂

杏仁去尖皮

桃花

瓜子

牛膝

雞矢白

姜麩

遠志去心

右壹拾貳味各三分擣篩為末以人乳汁一升白蜜一升和空腹服柒圓日三服

鹿角塗面方

鹿角壹握

芎藭

細辛

白斂

白木

白附子

天門冬法

白芷

各貳兩

杏仁

貳柒枚 去皮尖

牛乳

叁升

右壹拾味鹿角先以水漬之百日令軟總內乳中微火煎之令汁竭出角以白練袋盛之餘藥勿收至夜取牛乳石上摩鹿角塗面曉以清漿水洗之令老如少也一方用酥叁兩

急面皮方

大猪蹄一具治如食法水二升清漿水一升不渝釜中煎成膠以洗面又和澡豆夜塗面曉以漿水洗令面皮急矣

治婦人令好顏色方

女苑貳兩半

鉉丹伍分

右貳味擣篩為散酒服一匕圭日再服男十日女二十日

知則止黑色皆從大便出色白如雪

又方

白瓜子伍分 白楊皮叁分 桃花壹兩

右叁味搗篩為散以飲服方寸匕日三服三十日面白五
十日手足白一云欲白加瓜子欲赤加桃花

令人面手白淨澡豆方

白鮮皮 白殭蠶 白附子 鷹矢白 白芷

芎藭 白朮 青木香一方用葉本 甘松香

白檀香 麝香 丁香各叁兩 桂心陸兩

瓜子壹兩一方用土瓜根 杏仁叁拾枚去皮尖 猪脰叁具

白梅叁兩 冬瓜仁伍兩 雞子白叁枚 麩叁升

右貳拾味先以猪脰和麩暴令乾然後合諸藥搗篩為散

又和白豆屑二升用洗手面十日內色白如雪二十日如

凝脂千金有棗參三拾枚無桂心

又方

麝香貳分猪脰兩具大豆黃卷壹升桃花壹兩

菟絲子叁兩冬葵子伍合白附子貳兩

木蘭皮叁兩姜麩貳合栝子花貳兩

首宿壹兩

右壹拾壹味以水浸猪脰三四度易水血色及浮脂盡乃擣諸味為散和令相得暴擣篩以洗手面面淨光潤而香一方若無前件可得者直取首宿香一升土瓜根商陸青木香各一兩合擣為散洗手面大佳

澡豆方

細辛半兩白朮叁分栝樓貳枚土瓜根叁分皂莢伍挺

商陸壹兩冬瓜仁半合雀矢半合菟絲子貳合猪脰壹具

藁本 防風 白芷 白附子 茯苓

杏仁去皮尖 桃仁去皮尖 豆末肆升 麩壹升

右壹拾玖味擣細篩以麩將煮猪脰壹具令爛取汁和散作餅子暴之令乾更熟擣細羅之以洗手面甚佳

又方

丁香 沈香 青木香 桃花 鍾乳粉

真珠 玉屑 蜀水花 木瓜花各叁兩 椀花

梨花 紅蓮花 李花 櫻桃花 白蜀葵花

旋復花各肆兩 麝香壹銖

右壹拾柒味擣諸花別擣諸香真珠玉屑別研成粉合和
大豆末柒合研之千遍密貯勿洩常用洗手面作搽一白
日其面如玉光淨潤澤臭氣粉滓皆除咽喉臂膊皆用洗
之悉得如意

治面疱瘡癩三十年以上并冷瘡蟲癩令滅方

斑猫去翅足熬

巴豆去心皮熬

胡粉

鵝脂

金泚沙

蜜陀僧

高良薑

海蛤

各參三兩

右搗味為粉以鵝脂和夜半塗曉以甘草湯洗之

治面疔黧方

礬石燒

硫黃

白附子

各壹兩

右參味細研以大醋一盞浸之一宿淨洗面塗之慎風

治面疱方

白附子

青木香

麝香

由跋

細辛

各貳兩

右五味細末水和之塗面日三外臺方無細辛

又方

木蘭皮

伍兩取厚者

梔子仁

陸兩

右貳味為散以蜜漿服方寸匕日三服

治面疱甚如麻豆痛癢搔之黃水出及黑色黯黯不可去方

冬瓜子

柏子仁

茯苓

冬葵子

右肆味等分搗篩飲服方寸匕日二服外臺方無冬瓜子

白膏

主面瘡疱疥癰惡瘡方

附子拾伍枚

蜀椒一升

野葛

一尺伍寸

右參味切醋漬一宿猪膏一斤煎附子黃去滓塗之日二

施子圓

治酒瘡鼻疱方

施子仁參升

芎藭肆兩

大黃

陸兩

好豉

熬參升

木蘭皮

半斤

甘草

肆兩

右陸味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子以飲服拾圓日三

服稍加至貳拾伍圓

又傳方

蒺藜子

施子仁

豉

各一兩

木蘭皮

半斤

右肆味為末以醋漿水和之如泥夜塗上日未出時以煖水洗之亦滅癩痕

又方

鷓鴣矢 一斤

右壹味擣篩臘月猪脂和如泥夜塗之

飛水銀霜方

水銀 一斤

扑消 捌兩

大醋 半升

黃礬 拾兩

錫 貳拾兩成鍊二遍者 玄精 陸兩

鹽花 叁斤

右柒味先鍊錫訖又溫水銀令熱乃投錫中又擣玄精黃礬令細以絹篩之又擣錫令碎以鹽花并玄精等合和以醋拌之令濕以鹽花壹斤藉底乃布藥令平以扑消蓋上訖以盆蓋合以鹽灰為泥泥縫固際乾之微火三日武火四日凡七日去火一日開之掃取極須動心守勿令須臾

問懈慢大失矣

鍊粉方

胡粉二大升盆中盛水投粉於中熟攪以雞羽水上掃
取以舊破雞子拾枚去黃瀉白於瓷椀中以粉置其上
以瓷椀密蓋之伍升米下蒸之乃暴乾研用傳面百倍
省面有光

滅癩方

衣魚二枚白石脂壹分鴈屎三分白附子一分白殭蠶兩
右伍味為末臘月猪脂和傳慎生冷風日令肌膩

滅癩方

丹參

羊脂

右貳味和煎傳之滅癩神妙

又方

以蜜塗之佳

又方

取禹餘糧半夏等分搗末以雞子黃和先以新布拭癩
上令赤以塗之勿見風塗之二十日十年癩並滅

手膏方

桃仁

杏仁各貳拾枚
去皮尖

橘仁壹合赤芍拾枚

大棗

三拾枚

辛夷

芍藥

當歸

牛腦

羊腦

白狗腦絡貳兩亦得

右壹拾壹味先以酒漬腦又別以酒陸升煮赤肉以上藥
令沸停冷乃和諸腦等然後碎辛夷二味以綿裹之去棗
皮核合內酒中以瓷器貯之五日以後先淨訖取塗手甚
光潤而忌近火炙手

治手足皴裂血出疼痛方

取猪脰著熱酒中以洗之即瘡

治冬月冒涉凍凌面目手足瘰癧及始熱疼痛欲瘡方

取麥窠煮取濃汁熱漬手足兼洗之二三五即度瘡

治手足皴凍欲脫方

椒

芎藭略半

白芷壹分

防風一分

薑作鹽

右伍味以水肆升煎令濃塗洗之三數遍即瘡

治凍傷十指欲墮方

取馬矢叁升煮令麻沸清冷易之半日愈

熏衣浥衣香第六

方六首

熏衣香方

薰陸香捌兩

藿香

覽探各二兩 一方無 甲香貳兩

詹糖伍兩

青桂皮伍兩

右陸味末前件乾香中先取硬者黏濕難碎者各別擣或

細切咬咀使如黍粟然後一一薄布於盤上自餘別擣亦
別布於其上有須篩下者以紗不得太細別煎蜜就盤上
以手搜搗令勻然後擣之燥濕必須調適不得過度太燥
則難圓太濕則難燒濕則香氣不發燥則煙多煙多則惟
有焦臭無復芬芳是故香復須麤細燥濕合度蜜與香相
稱火又須微使香與綠煙而共盡

泥衣香方

沈香

首宿香 各伍兩

丁香

甘松香

藿香

青木香 艾納香

雞舌香

雀腦香 略壹

麝香 半兩

白檀香 叁兩

零陵香 拾兩

右壹拾貳味各擣令如黍粟麩糠等物令細末乃和令相
得若置衣箱中必須綿裹之不得用紙秋冬猶著盛熱暑
之時令香速泥凡諸旱香不但須新及時乃佳若欲少作

者準此為大率也

乾香方

丁香 壹兩 麝香

白檀

沈香 各半兩

零陵香 伍兩

甘松香 柒兩

藿香 捌兩

右柒味先擣丁香令碎次擣甘松香合擣訖乃和麝香合

和浥衣

五香圓

并湯主療一切腫下氣散毒心痛方

丁香

藿香

零陵香

青木香

甘松香 各叁兩

桂心

白芷

當歸

香附子

檳榔 各壹兩

麝香 壹銖

右壹拾壹味擣篩為末鍊蜜和擣千杵圓如梧子大含咽

令津盡日二夜一一日一夜用拾貳圓當即覺香五日身

香十日夜被香忌食五辛其湯法取檳榔以前隨多少皆

等分以水微微火上煮一炊久大沸定內麝香末壹銖勿去滓澄清服壹升凡丁腫口中喉中脚底背甲下癰疽痔漏皆服之其湯不瘥作圓含之數以湯洗之一方有豆蔻無麝香

十香圓

令人身體百處皆香方

沈香 麝香 白檀香 青木香 零陵香

白芷 甘松香 藿香 細辛 芎藭

檳榔 豆蔻各壹兩 香附子半兩 丁香叁分

右壹拾肆味擣篩為末鍊蜜和綿裹如梧子大日夕含之咽津味盡即止忌五辛

香粉方

白附子 茯苓 白朮 白芷 白斂

白檀各壹兩 沈香 青木香 雞舌香 零陵香

丁香 藿香各貳兩 麝香壹分 粉英陸升

右壹拾肆味各細擣篩絹下以取色青黑者乃麤擣紗下貯粉囊中置大合子內以粉覆之密閉七日後取之粉香至盛而色白如本欲為香粉者不問香之白黑悉以和粉粉雖香而色至黑必須分別用之不可悉和之粉囊以熟帛雙紉作之

令身香第七 方一十三首

香身方

甘草

伍分

芎藭

壹兩

白芷

叁分

右參味擣篩為散以飲服方寸匕日三服三十日口香四
十日身香

又方

瓜子

松根白皮

大棗

各壹兩

右參味為散酒服方寸匕日二服百日夜被皆香

又方

瓜子

芎藭

藁本

當歸

杜蘅

細辛

防風 各壹分

右柒味擣篩為散食後以飲服方寸匕日三服五日口香
十日身香二十日肉香三十日骨香五十日遠聞香六十
日透衣香 一方有白芷

治諸身體臭方

竹葉 拾兩

桃白皮 肆兩

右貳味以水壹石貳斗煮取五斗浴身即香也

治諸腋臭方

伏龍肝為末和作泥傅之瘡

又方

牛脂和胡粉參合煎令可圓塗之

又方

三年苦酒和石灰塗之

又方

赤銅屑以大醋和銅器中炒令極熟以布裹熨腋下冷則易之瘥

又方

青木香貳兩

附子

石灰各壹兩

礬石燒

米粉壹升

右伍味擣篩為散如常粉服良

又方

馬齒草壹束擣碎以蜜和作團紙裹之以泥紙上厚半寸暴乾以火燒熟破取更以少許蜜和仍令熟勿使冷也先以生布揩之然後藥夾腋下令極痛亦忍不能得

然後以手巾勒兩臂著身即瘥

石灰散方

石灰

壹升

青木香

楓香

薰陸香

丁香

陽起石

各貳兩

橘皮

貳兩

礬石

肆兩

右搗味並熬擣篩為散以綿作袋麤如肆指長四寸展使著藥先以布揩令痛夾之也

又方

石灰

伍合

馬齒草

貳兩

礬石

叁兩

甘松香

壹兩

右肆味合擣篩先以生布揩病上令黃汁出拭乾以散傅之滿三日瘥永除

又方

二月社日盜取社家糜饋一團猥地摩臑下二七遍擲著五道頭勿令人知永瘥人知即不效

生髮黑髮第八

方一十九首

治髮薄不生方

先以醋泔清洗禿處以生布揩令火熱臘月脂并細研鐵生煎二沸塗之日三遍

生髮鬚膏方

附子

荊實

各貳兩

松葉

柏葉

各叁兩

烏雞脂

叁合

右伍味咬咀合盛新瓦瓶中陰乾白日出擣以馬鬣膏和如薄粥塗頭髮如澤法裏絮中無令中風三十日長

生髮膏

令髮速長而黑傳藥時特忌風方

烏喙

莽草

續斷

皂莢

澤蘭

白朮

細辛

竹葉

各壹兩

防風

辛夷

各壹兩

柏葉

肆兩

杏仁

別擣

松葉

各叁兩

猪脂

叁升

右壹拾肆味切先以三年大醋叁升漬令一宿內藥脂中

煎三上三下膏成去滓塗髮及頂上石鹼有

生髮膏 主髮鬢髮九落不生方

升麻

養危

各貳兩

莽草

白芷

防風

各壹兩

蟻娘

肆枚

馬鬃脂

驢鬃脂

雄雞脂

熊脂

猪脂

狗脂

各伍合

右拾壹味藥伍味脂取成煎者並切以醋漬一宿曉合煎之沸則停火冷更上一沸停三上三下去滓傳頭以膏澤用之三十日生矣

又方 羊矢灰濯取汁洗之三日一洗不過十洗即生矣

治髮落方

柏葉

切壹升

附子

貳兩

右貳味擣篩猪脂和作叁拾圓洗髮時即內壹圓泔中髮不落其藥以布裹密器貯勿令洩氣

長髮方

蔓荊子 叁升

大附子 叁枚

右貳味咬咀以酒壹斗貳升漬之成糜瓦瓶中封頭二十日
取雞肪煎以塗之澤以汁櫛髮十日長一尺勿逼面塗

又方

麻子仁 叁升

秦椒 叁升

右貳味合以泔漬一宿以沐髮長矣

又方

麻子 貳升

白桐葉 壹把

右貳味以米泔汁煮去滓適寒温沐二十日長矣

治髮落方

石灰叁升水拌令濕炒令極焦停冷以絹袋貯之以酒
叁升漬之密封冬二七日春秋七日取酒温服一合常

令酒氣相接七日落止百日服之終身不落新髮生也

又方 桑白皮壹石以水壹石煮三沸以沐髮三過即止

令白髮還黑方

隴西白芷 旋復花 秦椒 各壹升 桂心 壹尺

右肆味搗篩為散以井花水服方寸匕日三服三十日還

黑髮亦房室

又方 烏麻九蒸九暴搗末棗膏和圓久服之

又方

八角附子 壹枚 大酢 半升

右貳味於銅器中煎取兩沸內好礬石大如碁子壹枚消

盡內脂參兩和之相得下之攪至凝內竹筒中拔白髮以

膏塗上即生黑髮

髮黃方

臘月猪膏和羊天灰蒲灰等分傳之二日一為取黑止
又方 以醋煮大豆爛去豆前冷稠塗髮

又方

熊脂塗髮梳之散頭牀底伏地一食頃即出形盡當黑
用之不過一升

泥染髮方

石榴參顆皮葉亦得針沙如棗核許大醋陸升水參升
和藥合煮得壹千沸即熟灰汁洗乾染之

瓜子散

治頭髮早白又主虛勞腦髓空竭胃氣不和諸藏虛

絕血氣不足故令人髮早白少而筭髮及憂愁早白遠視眩
眈風淚出手足煩熱恍惚忘誤連年下痢服之一年後大驗

瓜子壹升

白芷

去皮

當歸

芍藥

甘草

各貳兩

右伍味擣篩為散食後服方寸匕日二酒漿湯飲任性服

千金翼方卷第六

婦人二

產後心悶第一

方四首

治產後心悶眼不得開方

當產婦頭頂上取髮如指大令人用力挽之眼即開

單行羚羊角散

治產後心悶是血氣上衝心方

羚羊角

壹枚燒成灰

右壹味擣篩為散取東流水服方寸匕若不瘥須臾更服取瘥止

單行羚羊角散

治產後心悶方

羚羊角

燒作灰

右壹味擣篩為散以溫酒服方寸匕若不瘥須臾更服取瘥止亦治產難

單行生赤小豆散 主產後心悶方

赤小豆

右壹味搗篩為散以東流水服方寸匕不瘥須臾更服即愈

產後虛煩第二 方一十三首

薤白湯 治產後胃中煩熱逆氣方

薤白切 半夏洗去 人參 甘草炙 知母各貳兩

麥門冬拌心 石膏肆兩打 碎綿裹 栝樓叁兩

右捌味咬咀以水壹斗叁升煮取肆升分為五服日三夜

再熱甚者加石膏知母各壹兩

竹根湯 主產後虛煩方

竹根細切壹斗伍升

右以水貳斗煮取柒升去滓內小麥貳升大棗貳拾枚復
煮麥熟又內甘草壹兩炙麥門冬壹升去心湯成去滓温

服伍合不瘥更服取瘥若短氣亦服之極佳

人參當歸湯

主產後煩悶不安方

人參

當歸

芍藥

麥門冬

去心

粳米

壹升

乾地黄

桂心

各壹兩

大棗

貳拾枚
去核

淡竹葉

切叁升

右玖味咬咀以水壹斗貳升先煎竹葉及米取捌升去滓內藥煮取叁升適寒温分叁服若煩悶不安者當取貳壹升以水叁升煮取壹升盡服之甚良

甘竹筴湯

主產後內虛煩熱短氣方

甘竹筴

人參

茯苓

黃芩

甘草

各壹兩

右伍味咬咀以水陸升煮取貳升分叁服

知母湯

主產後乍寒乍熱通身温熱膏心煩悶方

知母

叁兩

黃芩

芍藥

各壹兩

桂心

甘草

各壹兩

右伍味咬咀以水伍升煮取貳升伍合分為叁服

一方不用慧
加生地黃

竹葉湯 主產後心煩悶不解方

生淡竹葉切 麥門冬去心 小麥各壹升 大棗拾肆枚擘

茯苓 生薑略叁兩 甘草貳兩

右柒味咬咀以水一斗先煮竹葉小麥取捌升內諸藥煮取叁升分為叁服若心中虛悸者加人參貳兩若其人食少無氣力者可更加白粳米伍合氣逆者加半夏貳兩

淡竹茹湯 主產後虛煩頭痛短氣欲死心中悶亂不起方

生淡竹茹壹升 麥門冬伍合 小麥伍合 大棗拾肆枚 石膏壹斤

生薑叁兩切 甘草壹兩

右陸味咬咀以水捌升煮竹茹小麥減壹升仍內諸藥更煮取貳升分為貳服羸人分為三服若有人參內壹兩若無人參內茯苓壹兩半亦佳人參茯苓皆治心煩悶及心驚悸安定精神有即為良無自依本方服一劑不瘥更作

服之若逆氣者加半夏貳兩洗去滑

單行白犬骨散主產後煩悶不食方

白犬骨燒之擣篩以水和服方寸匕

單行小豆散治產後煩悶不能食虛滿方

小豆叁柒枚燒作屑以冷水和頓服之

單行蒲黃散治產後苦煩悶方

蒲黃

右壹味以東流水和服方寸匕極良

治產後虛熱往來心育中煩滿骨節疼及頭痛壯熱晡時輒甚又似微瘧方

蜀漆葉

黃芩

桂心

甘草炙

各壹兩

生地黃壹斤黃耆

蜩母各叁兩

芍藥貳兩

右捌味咬咀以水壹斗先煮地黃取柒升去滓下諸藥煮

取貳升伍合分參服湯治寒熱不損人

芎藭湯 治產後虛熱頭痛方

白芍藥

乾地黄

牡蠣各伍兩

桂心參兩

右肆味咬咀以水伍升煮取參升半分三服湯不損人無毒亦治腹中急痛若通身發熱更加黃芩貳兩大熟即除

鹿角屑散湯

主婦人墮身血不盡去苦煩悶方

鹿角

屑壹兩

香豉

壹升半

右貳味以水參升先煮豉二沸去滓內鹿角屑攪令調頻服須臾血下

陰脫第三

方八首

灰坐漬法主產後陰道不閉方

石灰

壹升熬令能燒草

右壹味以水貳斗投灰中適寒溫入汁中坐漬之須臾復

易如常法此是神秘方不傳已治人有驗

當歸散 治婦人陰脫

當歸

黃芩各貳兩

芍藥伍分

蛻皮半兩

牡蠣貳兩半

右伍味搗篩為散酒服方寸匕日三服禁舉重良

黃芩散 治婦人陰脫

黃芩

蛻皮各半兩

芍藥壹兩

當歸叁分

牡蠣熬

松皮及實

百加日陰乾燒灰方用狐並

竹皮

各貳兩半

右柒味搗篩為散飲服方寸匕日三服禁勞勿冷食

硫黃散 治婦人陰脫

硫黃半兩

烏賊魚骨半兩

五味子叁銖

右叁味搗下篩以粉其上良日再二粉之

治婦人陰脫鐵精羊脂傳方

羊脂煎訖適冷煖塗上以鐵精傳脂上多少令調以火

灸布温以熨上漸推内之末磁石酒服方寸匕日二服
亦治脱肛

治婦人陰癢脱方

樊石熬

右壹味末之每日空腹酒和服方寸匕日三服

又方 取車軋脂傳之即愈

當歸湯

治婦人產後藏中風陰重洗方

當歸

獨活

各叁兩

白芷

地榆皮

樊石

熬貳兩

右伍味咬咀以水壹斗伍升煮取壹斗貳升以洗浴之

惡露第四

方一十八首

治產後瘕病燒秤錘酒方

鐵秤錘燒令極赤投於酒壹升中浸令無聲出錘頓服
之不瘥更作

紫湯 治產後惡露未盡又兼有風身中急痛

取大豆壹升先取新布搯之令光生熬令豆不復聲纔斷以清酒壹升投豆中停三沸漉去滓每服壹升日三夜一服

乾地黄湯 治產後惡露不盡除諸疾補不足

乾地黄各壹兩 芎藭 桂心 黃耆 當歸各叁兩

細辛 人參 茯苓 防風 芍藥

甘草各壹兩

右壹拾壹味以水壹斗煮取叁升分為三服日再夜一

桃仁湯 主產後往來寒熱惡血不盡方

桃仁五兩去皮尖及雙仁 吳茱萸臚 黃耆 當歸

芍藥各壹兩 生薑 柴胡去苗 百鍊蘇各捌兩

右捌味以酒壹斗水貳升合煮取叁升絞去滓

適寒溫先食服一升日三服

厚朴湯 主產後腹中滿痛惡露不盡方

厚朴炙 乾薑炮 桂心各肆兩 黃芩 芍藥

乾地黃 茯苓 大黃各叁兩 桃仁去尖皮 蝨蟲熬去足

甘草炙各兩 芒消壹兩 枳實炙 白木各伍兩

右壹拾肆味以水壹斗清酒叁升合煮取叁升絞去

滓下芒消令烱適寒溫服壹升日三方用 拾肆枚

澤蘭湯 主婦人產後惡露不盡腹痛不除小腹急痛引腰

背少氣力方

澤蘭 生地黃 當歸各貳兩 生薑 芍藥各

大棗拾枚 甘草壹兩半

右柒味切以水玖升煮取叁升分為叁服隨身欲死者服

之亦瘥

甘草湯 治產後餘血不盡逆搶心宵手足冷脣乾腹脹短氣

甘草炙 芍藥 桂心各參兩 大黃肆兩 阿膠參兩

右伍味㕮咀以東流水壹斗煮取參升絞去滓內阿膠令烱分為二服一服入腹面即有顏色一日一夜盡此三服即下惡血將養如新產婦也

大黃湯 治產後惡露不盡

大黃 當歸 生薑 牡丹去心 芍藥

甘草炙 吳茱萸壹升

右柒味㕮咀以水壹斗煮取肆升分為肆服一日令盡極佳加人參貳兩名人參大黃湯

當歸湯 治產後血留下焦不去

當歸 桂心 甘草炙 芍藥 芎藭 芍藥各參兩

乾地黄肆兩

右陸味咬咀以水壹斗煮取伍升分為五服

柴胡湯 治產後往來寒熱惡露不盡

柴胡 去苗 生薑 各半斤 枳實 五枚 芍藥 五兩 黃芩 半斤 甘草 二兩 大棗 十枚 當歸 半斤

芍藥 黃耆 各半斤 吳茱萸 一升

右柒味咬咀以清酒壹斗參升煮取參升先食服壹升日

三服 千金以水煮

大黃湯 主產後餘疾有積血不去腹大短氣不得飲食上衝

心胃時時煩憤逆滿手足煩疼胃中結熱

大黃 黃芩 甘草 各二兩 蒲黃 半兩 大棗 十枚

右伍味咬咀以水參升煮取壹升清朝服至日中當利若

下不止進冷粥半升即止若不下與少熱飲自下人羸者

半之 有芒消壹兩 湯

梔子湯 治產後兒生處空留血不盡小腹絞痛

梔子參拾枚以水壹斗煮取陸升內當歸芍藥各叁兩
蜜伍合生薑伍兩羊脂壹兩於梔子汁中煎取貳升分
為三服

大黃湯 產後血不流方

大黃 黃芩 當歸 芍藥 芒消

甘草壹兩 桃仁 杏仁各叁拾枚 去皮尖

右捌味咬咀以水壹斗煮取叁升去滓內芒消令烺分為
肆服法當下利利若不止作白粥飲一盃煖服去一炊久
乃再服

生地黄湯 治產後三日或四五日腹中餘血未盡絞痛強滿

氣息不通

生地黄伍兩 生薑叁兩 大黃 細辛 甘草炙

桂心 黃芩 茯苓 芍藥 當歸各壹兩半

大棗貳拾枚 擘手

右壹拾壹味 咀以水捌升 煮取貳升 伍合 分為二服 禁生冷等良

大黃乾漆湯

治新產後有血腹中切痛

大黃

乾漆熬

乾地黄

乾薑

桂心

各壹兩

右伍味 咀以水清酒各五升 煮取叁升 去滓 溫服壹升 血當下 若不下 明日更服壹升 滿三服 病無不瘥

麻子酒

治產後血不去

麻子伍升 擣以酒壹斗 漬一宿 明日去滓 服壹升 先食 服不瘥 復服壹升 不吐下 不得與男子交通 一月將養 如初產法

升麻湯

治產後惡物不盡 或經一月 半歲 一歲

升麻叁兩 以酒伍升 煮取貳升 分再服 當吐下惡物 莫

恠之極良

大黃苦酒

治產後子血不盡

大黃捌銖切以苦酒貳升合煮取壹升適寒溫服之即

血下甚良

心痛第五

方四首

羊肉桂心湯

主產後虛冷心痛方

羊肉

叁斤

桂心

肆兩

當歸

乾薑

甘草

各叁兩

吳茱萸

人參

芎藭

乾地黄

各貳兩

右玖味咬咀以水壹斗煮肉取汁伍升去肉內藥煮取貳升半分為叁服一方有桔梗叁兩

蜀椒湯

主產後心痛此大寒冷所為方

蜀椒

貳合汗去

當歸

半夏

洗去

桂心

甘草

茯苓

人參

各貳兩

芎藭

叁兩

蜜

壹升

生薑汁伍合

右壹拾味咬咀以水玖升煮椒令沸然後內藥煮取貳升
半去滓內薑汁及蜜復煎取壹升半一服伍合漸加至陸
合盡勿喫冷食佳

治產後心痛方一云大
巖蜜湯

乾地黄 當歸

獨活

芍藥

細辛

桂心 乾薑

小草

甘草

炙各
參兩

吳茱萸

壹升

右壹拾味咬咀以水玖升煮取叁升分二服千金用
蜜五合

芍藥湯 主產後心痛此大寒冷所為方

芍藥

桂心

各參
兩

當歸

半夏

洗去
滑

茯苓

各貳
兩

蜀椒

生薑汁

伍
合

蜜

壹升

右捌味咬咀以水柒升煮取貳升去滓內薑汁及蜜復煎
取貳升伍合壹服五合漸加至陸合其服藥每相去一炊

久再服忌冷食

腹痛第六 方一十六首

乾地黄湯 主產後兩脅滿痛兼除百病

乾地黄 芍藥各貳兩 生薑伍兩 當歸 蒲黃各叁兩

桂心陸兩 大棗貳拾枚 甘草壹兩

右捌味咬咀以水壹斗煮取貳升半分叁服

芍藥湯 主產後腹痛

芍藥肆兩 茯苓叁兩 人參 乾地黄 甘草各貳兩

右伍味咬咀以清酒兼水各陸升煮取叁升分服日二

猪腎湯 治產後腹痛

猪腎壹枚 茱萸壹升 黃耆 當歸 芎藭

人參 茯苓 乾地黄各貳兩 生薑切

厚朴炙 甘草各叁兩 桂心肆兩 半夏伍兩洗

右壹拾叁味咬咀以水貳斗煮猪腎令熟取壹斗吹去肥膩又以清酒貳升煮取叁升分為肆服日三夜一服又方

羊肉犢斤葱白壹斤乾薑壹斤當歸各半兩桂心各叁兩

芍藥壹斤芎藭壹斤乾地黄壹斤甘草各貳兩

右玖味咬咀先以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取三升分為肆服一日令盡

吳茱萸湯主婦人先有寒、心胃痛或心腹刺痛或嘔吐或食少或腫生後益劇或寒或下更劇氣息綿惛欲絕皆主之

吳茱萸兩防風兩桔梗兩乾薑兩乾地黄兩

當歸兩細辛兩甘草各半兩

右捌味咬咀以水肆升煮取壹升伍合分為三服

緩中葱白湯主產後腹痛少氣

葱白

當歸

人參

半夏

細辛

各兩

天門冬法芍藥

乾薑

甘草

炙各兩

生地黄

取汁

吳茱萸

各壹升

右壹拾壹味咬咀以水柒升煮取貳升壹服壹升日夜服之令盡

羊肉當歸湯

主產後腹中心下切痛不能食往來寒熱若中

風之氣力方

羊肉

叁斤去脂

當歸

貳兩

黃芩

壹方用

芍藥

防風

各壹兩方用人參

生薑

伍兩

芍藥

甘草

各叁兩

右捌味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗出肉內諸藥煎取叁升分為三服

蒲黃湯

主產後餘疾胃中少氣腹痛頭疼餘血未盡除腹中

脹滿欲絕方

蒲黃

生薑

生地黃 各伍兩

芒消 貳兩

桃仁 貳拾枚 去皮尖

芎藭

桂心 各壹兩

大棗 拾伍枚 擘

右搗味咬咀以水玖升煮取貳升伍合去滓內芒消分為三服良驗

敗醬湯

主產後疾痛引腰腹如錐刀刺方

敗醬 叁兩

右壹味切以水肆升酒貳升微火煎取貳升滴寒溫服七

合日二食前服之大良 千金有桂心芎藭各壹兩半當歸壹兩為肆味

芎藭湯 主產後腹痛

芎藭 貳兩

女萎 伍分

黃芩

前胡

桃仁 去皮尖

桂心 各壹兩

芍藥

大黃 各壹兩半

蒲黃 伍合

生地黃 切壹兩半

甘草 貳兩

當歸 叁分

右壹拾貳味咬咀以水壹升酒叁升合煮取叁升分為肆

服日二夜一服千金有黃

獨活湯主產後腹痛引腰脊拘急方

獨活

當歸

芍藥

生薑

桂心

各參兩

大棗

壹拾枚

甘草

貳兩

右柒味咬咀以水捌升煮取參升分參服相去如十里久進之

芍藥黃耆湯

治產後心腹痛方

芍藥

肆分

黃耆

參兩

白芷

桂心

生薑

甘草

各貳兩

大棗

拾枚

右柒味咬咀以酒并水各伍升合煮取參升空服壹升日參服千金有人參當歸芍藥地黃茯苓為拾貳味

桃人為藥湯

治產後疾痛方

桃仁

半升去尖皮

芍藥

參兩

芎藭

當歸

乾漆熬

桂心

甘草

炙各
貳兩

右藥味咬咀以水捌升煮取參升分為參服服別相去一
炊久再服

單行茱萸酒

治產後腹內疼痛方

吳茱萸壹升以酒參升漬壹宿煎取半升頓服之亦可
再服之

單行桂酒

主產後疾痛及卒心腹痛方

桂心參兩切以酒參升煮取貳升分為參服

單行生牛膝酒

主產後腹中甚痛方

生牛膝根伍兩切以酒伍升煮取貳升分為貳服若用
乾牛膝須以酒漬之然後可煮

虛損第七

方一十七首

羊肉黃耆湯

主產後虛乏當補益方

羊肉參斤黃耆

麥門冬各參兩

大棗參拾枚

乾地黄 茯苓

當歸 芍藥

桂心

甘草炙各貳兩

右壹拾味，咬咀，以水貳斗，煮肉取壹斗，去肉，內藥，煎取叁升，分為叁服，大良。

鹿肉湯 主產後虛悶勞損補之方

鹿肉肆斤 乾地黄 芍藥 黃耆

麥門冬法 甘草略貳兩 芎藭 當歸 人參各參兩

生薑陸兩 大棗貳拾枚 半夏壹升

右壹拾叁味，咬咀，以水叁斗，煮肉取貳斗，去肉，內藥，煎取

叁升，分為肆服，日三夜一服。

麀骨湯 治產後虛乏五勞七傷虛損不足藏腑冷熱不調方

麀骨壹具 遠志去心 黃耆 芍藥 橘皮

茯神

厚朴灸

芎藭

甘草灸各兩當歸

乾薑

防風

獨活略貳

生薑切

桂心略肆

右壹拾伍味以水參斗煮麞骨取壹斗去滓內藥煮

取參升分為肆服

羊肉湯

主產後及傷身大虛上氣腹痛兼微風方

羊肉

貳斤無羊肉用麞肉代

麥門冬柒合

生地黃伍兩

大棗

拾貳枚黃耆

人參

獨活

桂心

茯苓

甘草灸各貳兩

右壹拾味以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煮取參

升半分為肆服日三夜一服千金有乾薑

羊肉生地黃湯

主產後三日補中理藏強氣力消化血方

羊肉

貳斤芍藥叁兩

生地黃切貳升

當歸

芎藭

人參

桂心

甘草灸各貳兩

右捌味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取叁升
分爲肆服日三夜一服

羊肉杜仲湯治產後腰痛欬嗽方

羊肉肆斤杜仲炙紫苑桂心當歸

白朮略叁細辛五味子欬冬花厚朴炙

附子炮去草薺人參芎藭黃耆

甘草貳兩生薑捌兩大棗叁拾枚

右壹拾捌味咬咀以水貳斗煮肉取壹斗去肉內藥煎取

叁升分温三服

當歸建中湯治產後虛羸不足腹中疾痛不止吸吸少氣或

若小腹拘急攣痛引腰背不能飲食產後一月日得服四五

劑爲善令人強壯內補方

當歸肆兩桂心叁兩甘草貳兩芍藥陸兩生薑叁兩

大棗拾貳枚

右陸味咬咀以水壹斗煮取參升分為參服一日令盡苦
大虛內飴糖陸兩作湯成內之於火上煖令飴糖消若無
生薑則以乾薑參兩代之若其人去血過多崩傷內衄不
止加地黃陸兩阿膠貳兩合搗種作湯成去滓內阿膠若
無當歸以芍藥代之

內補芎藭湯

主婦人產後虛羸及崩傷過多虛竭腹中疾痛

芎藭

乾地黃各肆兩

芍藥

伍兩桂心貳兩

大棗

肆拾枚乾薑

右柒味咬咀以水壹斗貳升煮取參升分為參服若不差
更作至參劑若有寒苦微下加附子參兩炮主婦人虛羸
少氣七傷損絕腹中拘急痛崩傷虛竭面目無色及唾血
甚良

大補中當歸湯

治產後虛損不足腹中拘急或溺血小腹苦

痛或從高墮下犯內及金瘡血多內傷男子亦宜服之

當歸

乾薑

續斷

桂心略

乾地黄

陸兩

芍藥

肆兩

芎藭

麥門冬心法

白芷

甘草

各貳兩

大棗

肆拾枚

吳茱萸

壹升

右壹拾貳味咬咀以酒壹斗漬藥一宿明日以水捌升合

煮取伍升去滓分溫伍服日三夜二服有黃耆入貳兩為佳

緩中湯

主婦人產後腹中拘急及虛滿少氣產後諸虛不足

寬中補寒

吳茱萸

壹升 乾薑

當歸

白芷

人參

甘草

各貳兩

麥門冬

心法

半夏

洗去滑各參兩

芍藥

陸兩

細辛

壹兩

生地黄

壹斤

右壹拾壹味咬咀以水壹斗煮取三升去滓內地黃汁更

上火合煎二兩沸温服壹升日三服若無當歸以芎藭肆兩代之

大補湯 治產後虛不足少氣乏力腹中拘急痛及諸疾痛內崩傷絕虛竭裏急腰及小腹痛

當歸 乾地黄 半夏洗去 桂心略叁 吳茱萸壹升

人參 麥門冬法 芎藭 乾薑 甘草炙

白芷各貳兩 芍藥肆兩 大棗肆拾枚

右壹拾叁味以水壹斗煮取三升分三服

當歸芍藥湯 治產後虛逆害飲食方

當歸壹兩 芍藥 人參 桂心 生薑切

甘草壹兩 乾地黄貳兩 大棗貳拾枚

右捌味以水柒升煮取三升分為二服

鮑魚湯 主產後腹中虛極水道閉絕逆脹咽喉短氣方

鮑魚鱗片 麻子仁 細辛 茯苓 生薑切

五味子 各壹兩 地黃 伍兩

右柒味咬咀以水壹斗煮鮑魚如食法取汁柒升內藥煎取叁升分為叁服大有神驗

厚朴湯 主產後四日之中血氣口乾噓吸方

厚朴灸 枳實灸 生薑略 芍藥 五味子

茯苓 前胡略 壹人參半兩 大棗貳拾枚

右玖味咬咀以水陸升煮取貳升伍合分為叁服適寒溫服禁冷物

生地黃湯 主產後虛損少氣方

生地黃 人參 知母 桂心 厚朴灸

甘草貳兩 赤小豆升

右柒味咬咀以水貳斗伍升煮地黃取壹斗去滓內藥煎

取參升分為參服

氣貫湯

主婦人貫豚氣積勞藏氣不足胃中煩燥關元以下

如懷五千錢狀方

厚朴炙

當歸

細辛

芍藥

桔梗

石膏碎

桂心各參兩

大黃伍兩

乾地黄兩肆 乾薑

澤瀉

黃芩

甘草各伍兩

右壹拾叁味以水壹斗煮取參升分溫叁服服叁劑

佳千金有吳茱萸無大黃

杏仁湯

治產後虛氣方

杏仁去皮尖雙仁者

蘇葉各壹

半夏壹兩洗

生薑拾兩

桂心肆兩 人參

橘皮

麥門冬去心

白前各參兩

右玖味以水玖升煮取貳升伍合分參服

千金翼方卷第六

千金翼方卷第七

婦人三

虛乏第一

拍子人圓主婦人五勞七傷羸弱瘦削面無顏色飲食減少
貌失光澤及產後半身枯悴傷墜斷絕無子令人肥白能久
服夫婦不相識神方

拍子人

白石英

鍾乳

乾薑

黃耆

澤蘭

九分取
葉熬

藁本

燕美

各參二
分

芎藭

防風

伍分

蜀椒

壹兩半去目
及開口者汗

人參

紫石英

石斛

赤石脂

乾地黄

芍藥

五味子

秦艽

肉苁蓉

厚朴

龍骨

防葵

細辛

獨活

杜仲

白芷

茯苓

桔梗

白朮

桂心

當歸

甘草

各壹兩

右參拾參味搗篩為末練蜜和圓如梧子空肚煖酒服十

圓不知稍增至叁拾圓以知為度禁食生魚肥猪肉生冷
千金有烏頭无秦
芫龍骨防葵茯苓

小澤蘭圓 治婦人產後虛損補益方

澤蘭 九分取
葉熬 蕪荑 熬

藁本 厚朴 灸

細辛

人參 柏子人

白朮 各叁分

蜀椒 去目開
口者汗

白芷 乾薑

食茱萸

防風 各壹兩

石膏 貳兩

桂心 半兩 當歸

芎藭

甘草 炙各
柒分

一方有芍藥壹兩

右壹拾捌味擣篩為末鍊蜜和圓梧子大溫酒服貳拾圓

漸加叁拾圓日叁服忌食生魚肥猪肉 千金无乾
姜有茯苓

大五石澤蘭圓 主婦人產後虛損寒中腹中雷鳴緩急風頭

痛寒熱月經不調繞臍惻惻痛或心下石堅逆害飲食手足

常冷多夢紛紜身體痺痛榮衛不和虛弱不能動搖方

澤蘭

九分取
葉熬

石膏

乾薑

白石英

陽起石

各貳兩

芎藭

當歸

人參

石斛

烏頭

炮去

白朮

續斷

遠志

防風

紫石英

禹餘糧

厚朴

拍子人

乾地黃

五味子

細辛

蜀椒

龍骨

桂心

茯苓

各壹兩半

紫苑

山茱萸

各壹兩

白芷

藁本

蕪荑

各叁兩

鍾乳

黃耆

甘草

各貳兩半

右參拾叁味搗篩為末鍊蜜和圓如梧桐子酒服貳拾圓

漸加至參拾圓

千金無
陽起石

小五石澤蘭圓

主婦人勞冷虛損飲食減少面失光色腹中

冷痛月候不調吸吸少氣無力補益溫中方

澤蘭

九分取
葉熬

藁本

拍子人

厚朴

白朮

各壹兩

芍藥

蜀椒

去目閉
口者汗

山茱萸

人參

各伍分

紫石英

鍾乳

白石英

肉蓯蓉

礬石燒

龍骨

桂心各壹兩半

石膏

乾薑

陽起石略貳

蕪荑叁分

赤石脂

當歸

甘草各柒分

右貳拾叁味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓加至叁拾圓日叁服

大補益當歸圓

治產後虛羸不足背中少氣腹中拘急疼痛

或引腰背痛或產後所下過多不止虛竭之氣腹中痛晝夜不得眠及崩中面目失色脣口乾燥亦主男子傷絕或從高墮下內有所傷之處或損血吐下及金瘡等方

當歸

芎藭

續斷

乾薑

阿膠炙

甘草各肆兩

附子炮去皮

白芷

吳茱萸

白朮各叁兩

乾地黄拾兩

桂心貳兩

赤芍藥貳兩

右壹拾叁味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日叁夜壹漸加至伍拾圓若有真蒲黃可加壹升為善

白芷圓 治婦人產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣面目失色腹中痛方

白芷 續斷 乾薑 當歸各叁兩 附子壹兩炮去皮

乾地黄兩 阿膠叁兩

右柒味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子酒服貳拾圓日四五服無當歸用芎藭代之亦可加蒲黃壹兩為善無續斷用大薊根代之

甘草圓 主婦人產後心虛不足虛悸少氣心神不安或若恍恍惚惚不自覓方

甘草叁兩 人參 澤瀉 桂心各壹兩 大棗伍枚

遠志去心 茯苓 麥門冬去心 菖蒲 乾薑各貳兩

右壹拾味擣篩為末鍊蜜和圓如大豆許酒服貳拾圓日
四五服夜貳服不知稍增若無澤瀉用木代之若胃中冷
增乾薑

大遠志圓主婦人產後心虛不足心下虛悸志意不安時復
憤憤腹中拘急痛夜卧不安胃中吸吸少氣藥內補傷損益
氣安志定心主諸虛損方

遠志

去心

茯苓

桂心

麥門冬法澤瀉

乾薑

人參

當歸

獨活

阿膠炙

菖蒲

甘草炙

白木

各參兩

乾地黄

伍兩

署預貳兩

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和圓如梧子空腹溫酒服貳
拾圓日參服不知稍加至參拾圓大虛身體冷少津液加
鍾乳參兩為善鍾乳益精氣安心鎮志令人顏色美至良
人參圓主產後大虛心悸志意不安恍惚不自覺心中恐懼

夜不得眠虛煩少氣方

人參 茯苓

麥門冬去心 甘草炙 桂心壹兩

大棗伍拾枚

芎藭 澤瀉 署預

乾薑各貳兩

右壹拾味擣篩為末鍊蜜棗膏和圓如梧子大空腹酒下貳拾圓日叁夜壹服不知稍增至叁拾圓若有遠志得貳兩內之為善氣絕內當歸獨活各叁兩更善此方亦治男子虛心悸不定至良

生地黄 治婦人產後虛羸短氣曾脅逆滿風寒方

生地黄剉 茯苓

麥門冬各壹斤

桃仁半升 去皮尖

甘草壹尺

人參叁兩

石斛

桂心

紫苑各肆兩

右玖味合擣篩以生地黄汁捌升淳清酒捌升合調銅器中炭火上內鹿角膠壹斤數攪之得壹升次內飴叁升白

蜜參升於銅器中釜湯上煎令調藥成先食服如彈丸壹枚日參不知稍加至貳圓

地黃羊脂煎

治產後諸病羸瘦欲令肥白食飲平調方

生地黃汁壹斗

生薑汁

白蜜格伍

羊脂貳斤

右肆味先煎地黃汁令得伍升次內羊脂煎令減半內薑汁復煎令減內蜜著銅器中重湯煎如飴狀取煎如雞子大壹枚投溫酒中飲日參服

生飲白草汁

治產後勞復及腎勞方

白草壹把

右壹味擣絞取汁頓服差勞復生蟲去滓取汁洗眼中蟲出又屋漏水洗赤蟲出

盜汗第二

方四首

鯉魚湯

主婦人體虛流汗不止或眠中盜汗方

鯉魚貳斤

葱白切壹升

升

豉壹升

乾薑

桂心

壹兩

右伍味先以水壹斗煮魚取六升去魚內諸藥微火煮取貳升分再服取微汗即愈

竹皮湯

治婦人汗血吐血尿血下血

竹皮

參升

乾地黄

肆兩

人參

半兩

芍藥

當歸

桔梗

桂心

兩

芎藭

甘草

各貳兩

右玖味以水柒升煮取參升分參服

吳茱萸湯

治婦人產後虛羸盜汗時瀉瀉惡寒

吳茱萸

參兩

右壹味以清酒參升漬之半日所煮令蟻鼻沸減得貳升

分服壹升日再間日飲

猪膏

治婦人產後體虛寒熱自汗出

猪膏

生薑汁

白蜜

各壹斤

清酒

壹斗

右肆味合煎令調和五上五下膏成隨意以酒服差當用炭火上煎

下乳第三方一十六首

鍾乳湯

治婦人乳無汁

鍾乳

白石脂

消石各一

通草

生桔梗各一

右伍味以水伍升煮三上三下餘壹升去滓內消石令烊絞服無多少若小兒不能乳大人啜之

漏蘆湯

治婦人乳無汁

漏蘆

通草各貳

鍾乳壹兩

黍米壹升

右肆味以咀黍米宿漬搗撻取汁參升煮藥參沸去滓飲之日參服

鯽魚湯

婦人下乳汁

鯽魚長菜

猪肪半斤

漏蘆

鍾乳各貳

右肆味咬咀藥切猪脂魚不須洗清酒壹斗貳升合煮魚
熟藥成去滓適寒温分五服即乳下良飲其間相去須更
一飲令藥力相及

又方

通草

鍾乳

栝樓實

漏蘆

各叁兩

右肆味咬咀以水壹斗煮取叁升去滓飲壹升日叁服

又方

通草

鍾乳

各肆兩

右貳味切以酒五升漬一宿明日煮沸去滓服壹升日叁
服夏冷服冬温服之

又方

石膏肆兩碎以水貳升煮參沸稍稍服一日令盡

又方

枯樓實壹枚青色大者無大者用小者兩枚無青色者
黃色者亦好

右一味熟搗以白酒壹斗煮取肆升去滓服壹升日叁服
又方

鬼箭伍兩

右一味切以水陸升煮取肆升壹服捌合日叁服亦可燒
灰水服方寸匕

鼠肉臙方治婦人乳無汁

鼠肉五兩 羊肉陸兩 麀肉半斤

右叁味作臙勿令疾者知之

鮑魚大麻子藥治婦人產後下乳

鮑魚肉叁斤 麻子壹斤

右貳味與鹽鼓葱作羹任意食之

又方

通草

鍾乳

右貳味等分擣篩作麩粥服方寸匕日三服百日後可兼養兩兒通草橫心白者是勿取羊桃根色黃者無益

又方

麥門冬法鍾乳

通草

理石

右肆味等分擣篩空腹酒服方寸匕日叁服

又方

漏蘆

叁分

鍾乳

栝樓根

合伍分

蟻螬

叁合

右肆味擣篩先食糖水方寸匕日叁服

又方

栝樓根

叁兩

鍾乳

肆兩

漏蘆

滑石

通草

各貳兩

白頭翁

兩

右陸味擣篩為散酒服方寸匕日再服

又方

鍾乳

通草各五

雲母貳兩

屋上敗草貳把燒

作灰

甘草壹兩

右五味擣篩為散食後以溫酒蘆水服方寸匕日叁服乳下為度

又方

麥門冬法鍾乳

通草

理石

乾地黄

土瓜根

蟻螬並等

右柒味擣篩為散食後酒服方寸匕日叁服

中風第四方一首

甘草湯

治產後在褥中風背強不能轉動名曰風痊

甘草炙

乾地黄

麥門冬法前胡

黃芩

麻黃 去節 栝樓根 各貳兩

芎藭 壹兩 葛根 半斤

杏仁 五十枚去皮尖雙入

右壹拾味 咀以水壹斗酒五升 合煮葛根取捌升去滓
內諸藥煮取貳升分再服一劑不差更作之大良 千金無前胡

羌活湯 治產後中風身體痺疼痛

羌活 防風 烏頭皮 炮去 桂心 芍藥

乾地黃 各叁兩 防己 女萎 麻黃 去節各壹兩

葛根 半斤 生薑 各陸兩 甘草 貳兩

右壹拾貳味 咀以水玖升清酒叁升 合煮取叁升服五
合日三夜壹服極佳

治產後中風時煩方

知母 石膏 碎 芍藥 甘草 各貳兩 半夏 壹升

生薑 切 防風 白木 各叁兩 獨活 肆兩 桂心 肆兩

右壹拾味 以水壹斗 清酒五升 合煮取叁升 分叁服
獨活湯 治產後中風 口噤不得言

獨活 五兩 防風 秦艽 桂心 當歸

附子 炮去皮 白朮 甘草 炙各貳兩 木防己 兩

葛根 生薑 各叁兩

右壹拾壹味 以水壹斗 貳升 煮取叁升 分叁服

竹葉湯 治產後中風 發熱面正赤 喘氣頭痛

淡竹葉 葛根 各叁兩 人參 壹兩 防風 貳兩 大附子 壹枚 炮

生薑 五兩 大棗 拾伍枚 枳梗 桂心 甘草 炙各壹兩

右壹拾味 以水壹斗 煮取貳升 半分貳服 溫覆使汗出 頸項強 用大附子煎藥 揚去沫 若嘔者 加半夏半升 洗

防風湯 治產後中風 裏急短氣

防風 葛根 當歸 芍藥 人參

乾薑

甘草

炙各兩

獨活

五兩

右捌味咬咀以水玖升煮取參升分為參服

治產後覺言鬼語由內虛未定外客風邪所干方

羊心燻

遠志去心

芍藥

黃芩

牡蠣熬

防風

甘草

炙各兩

乾地黄

人參各參兩

右玖味咬咀以水壹斗煮羊心取五升去心內諸藥煎取

參升分為參服

鹿肉湯

治產後風虛頭痛壯熱言語邪僻

鹿肉

炙斤

半夏

壹升洗去滑

乾地黄

阿膠炙

芎藭

各貳兩

芍藥

獨活

生薑切

黃耆

黃芩

人參

甘草

炙各兩

桂心

貳兩

秦芫

五兩

茯神

肆兩

右壹拾伍味咬咀以水貳斗煮肉得壹斗貳升去肉下藥

煎取參升內膠令烊分肆服日參夜壹服

防風酒 治產後中風

防風

獨活 各壹

女萎

桂心 各貳

茵芋 壹兩

石斛 伍兩

右陸味咬咀以清酒貳斗漬參宿初服壹合稍加至參肆
合日參服

木防己膏 治產後中風

木防己 半斤 茵芋 五兩

右貳味切以苦酒玖升漬壹宿猪膏肆升煎三上三下膏
成炙手摩之千遍佳

獨活 壹斤 桂心 參兩 秦朮 伍兩

右叁味咬咀以酒壹斗伍升漬參日飲伍合稍加至壹升
不能飲隨性多少

心悸第五方四

治產後忽苦心中衝悸或志意不定恍恍惚惚言語錯謬心虛所致方

人參

茯苓

各各

茯神

肆兩

大棗

各拾

生薑

捌兩

芍藥

當歸

桂心

甘草

各貳

右玖味以水壹斗煮取叁升分服日叁

治產後忽苦心中衝悸不定志意不安言語誤錯惚惚憤憤不自覺方

遠志

去心

人參

麥門冬

去心

當歸

桂心

甘草

各貳

茯苓

伍兩

芍藥

壹兩

生薑

陸兩

大棗

貳拾

右壹拾味以水壹斗煮取叁升分叁服日叁服者分

肆服產後得此是心虛所致無當歸用芎藭若其人心曾

中逆氣則加半夏叁兩洗去滑

治產後暴苦心悸不定言語謬誤恍恍惚惚心中憤憤此是

心虛所致方

茯苓 五兩

芍藥

桂心

當歸

甘草

炙各參兩

生薑

陸兩

大棗

三枚

麥門冬

去心升

右捌味以水壹斗煮取參升分參服無當歸用芎藭代若苦心不定加人參遠志各貳兩若苦煩悶短氣加生竹葉壹升先以水壹斗參升煮竹葉取壹斗內藥若有微風加獨活參兩麻黃貳兩桂心貳兩用水壹斗五升若頸項苦急背中強者加獨活葛根麻黃桂心各參兩生薑捌兩以水壹斗五升煮取參升半分四服日參夜壹服治產後心衝恐悸不定恍恍惚惚不自知覺言誤錯誤虛煩短氣志意不定此是心虛所致方

遠志

去心貳兩

人參

茯神

當歸

芍藥

甘草

炙各參兩

大棗

三枚

麥門冬

去心升

右搗味呔咀以水壹斗煮取叁升分叁服若苦虛煩短氣者加生淡竹葉壹升以水壹斗貳升煮取壹斗乃用諸藥
肯中少氣者益甘草壹兩為善

下痢第六方

阿膠湯治產後下痢

阿膠

當歸

黃蘗

黃連

各壹兩

陳廩米

壹升

蠟如碁子
叁枚

右陸味呔咀以水搗升煮米蟹目沸去米內藥煮取貳升
去滓內膠蠟令烺分肆服一日令盡

桂心湯治產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時

下血

桂心

甘草

各貳兩

白蜜

壹升

乾薑

貳兩

當歸

叁兩

赤石脂

拾兩綿裹

附子

壹兩炮
去皮破

右柒味咬咀以水陸升煮取參升內蜜再沸分參服

羊脂湯 治產後下痢諸療不斷

羊脂五兩 當歸 乾薑 黃蘗 黃連各參三

右伍味咬咀以水玖升煮取參升去滓內脂令烊分參服

治產後下痢虛乏羸瘦方

黃雌雞一隻治如食注去藏勿中水 赤小豆貳升 吳茱萸

獨活 人參 黃連 甘草各貳兩 黃耆

麥門冬去心 當歸各參三 大棗參拾枚擘

右壹拾壹味咬咀以水貳斗煮雞豆令餘壹斗去雞豆澄

清內藥煮取參升分參服雞買成死者

治產後寒熱下痢方

鹿肉參斤 葱白壹把 人參 當歸 黃芩

桂心 甘草各壹兩 芍藥貳兩 豉壹升 生薑切

乾地黃各三兩

右壹拾壹味以水貳斗煮取壹斗內諸藥煮取叁升分叁服

當歸湯治產後下痢腹痛

當歸

龍骨各叁兩 乾薑

白朮各貳兩 芎藭貳兩

熟艾

附子炮去皮壹兩 甘草各壹兩

右捌味以水陸升煮取叁升分叁服一日令盡

甘草湯治產後下痢兼虛極白頭翁加阿膠

白頭翁貳兩

秦皮

黃蘗各叁兩

加阿膠

甘草各貳兩

右陸味以水柒升煮取叁升去滓內膠令烊分叁服

鼈甲湯治產後早起中風冷洩痢及帶下

鼈甲如手大壹兩

白頭翁壹兩 當歸

黃連

乾薑兩 黃蘗長壹尺廣三寸

右陸味咬咀以水柒升煮取參升分參服子金無白頭翁

乾地黃湯 治產後下痢

乾地黃兩 白頭翁 乾薑

黃連各壹兩 蜜蠟方寸

阿膠如手掌一枚

右陸味咬咀以水五升煮取貳升半去滓內膠蠟令烊分

參服相去一炊頃千金無乾薑

生地黃湯 治產後忽著寒熱下痢

生地黃兩 黃連

桂心

甘草略壹 淡竹皮貳升

大棗貳拾枚 赤石脂貳兩

右柒味咬咀以水壹斗煮竹皮取柒升去滓內藥煮取貳

升伍合分為參服

藍青丸 治產後下痢

藍青熬

鬼臼各壹兩半

附子炮壹兩

蜀椒汗壹兩半

黃連去毛五兩

龍骨

當歸各參兩

黃蘗

人參

茯苓各壹兩

厚朴炙

阿膠炙

艾

甘草炙各兩

一方用赤石脂肆兩

右壹拾肆味搗篩為末鍊蜜和丸如梧子空腹以飲服貳

拾圓

赤石脂圓

治產後下痢

赤石脂兩

當歸

黃連

乾薑

秦皮

白朮

甘草炙各兩

蜀椒汗

附子炮壹兩

去皮

右玖味搗末鍊蜜和圓如梧子大飲服貳拾圓日叁服

治產後下痢赤散方

赤石脂

參兩 桂心壹兩

代赭貳兩

右叁味搗篩為散酒服方寸匕日叁夜壹服拾日當愈

治產後下痢黑散方

麻黃

去節

貫眾

桂心

各壹兩

乾漆

熬

細辛

各貳兩

甘草

炙

右陸味搗篩為散麥粥服伍指撮日再五日當愈

治產後下痢黃散方

黃連

大黃

各貳兩

黃芩

廬蟲

熬

乾地黄

各壹兩

右伍味搗篩為散酒服方寸匕日參服拾日愈

千金無大黃

治姙娠及產後寒熱下痢方

黃蘗

壹斤

黃連

壹升

梔子

貳拾枚

右參味以水五升漬一宿煮三沸服壹升壹日壹夜

令盡嘔者加橘皮壹把生薑貳兩

治婦人痢欲痢輒先心痛腹脹滿日夜五六十行方

神麴

熬

石榴皮

各捌兩

黃蘗

切

黃連

切

烏梅肉 艾葉各壹升 防己貳兩 附子五兩 乾薑

阿膠各叁兩

右壹拾味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子大飲服貳拾圓
日參漸加至叁拾肆拾圓

淋渴第七方一首

桑螵蛸湯治產後小便數

桑螵蛸拾枚

鹿茸灸

黃耆各叁兩

生薑肆兩

人參

牡蠣熬

甘草貳兩

右柒味以水陸升煮取貳升半分叁服

栝樓湯治產後小便數兼渴

栝樓根

黃連

麥門冬去心各貳兩

桑螵蛸拾枚

人參

生薑切

甘草各兩

大棗拾伍枚

右捌味以水柒升煮取貳升半分叁服

雞臍脰湯 治產後小便數

雞臍脰具貳拾 雞腸參具洗 厚朴灸 人參各貳兩 生薑五兩

麻黃肆兩去節 大棗貳拾枚擘 當歸 乾地黄 甘草各炙兩

右壹拾味 以水壹斗 煮雞臍脰腸棗子柴升 去滓內藥煎取參升半 分參服

治婦人結氣成淋 小便引痛 上至少腹 或時溺血 或如豆汁 或如膠飴 每發欲死 食不生肌 面目萎黃 師所不能療方

貝齒肆枚燒 葵子壹升 滑石兩參 石膏五兩

右肆味 以水柒升 煮取貳升 去滓內猪肪一合 更煎三沸 適寒溫 分參服 病不差 更合服

石韋湯 治產後卒淋血淋氣淋

石韋去毛 黃芩 通草各壹兩 榆皮五兩 大棗參拾枚擘

葵子升貳 生薑切 白朮各參兩方用芍藥 甘草壹兩炙

右玖味咬咀以水捌升煮取貳升半分參服

葵根湯 治產後淋澀

葵根切壹升一云 車前子 亂髮燒 大黃

桂心 滑石各壹兩 通草三兩 生薑陸兩

右捌味咬咀以水柒升煮取貳升半分為參服千金有冬瓜汁柒合

茅根湯 治產後淋

白茅根壹斤 桃膠 甘草各壹兩 鯉魚齒壹斤

生薑陸兩 人參 地麥各貳兩 瞿麥 茯苓各肆兩

右玖味咬咀以水柒升煮取貳升半分參服

鼠婦散 治產後小

鼠婦七枚熬以酒服之

滑石散 治產後淋

滑石五兩 通草 車前子 葵子各壹兩

右肆味搗篩為散以醋漿水服方寸匕稍加至貳匕

竹葉湯 治產後虛弱少氣力

竹葉

茯苓

甘草

各壹兩

大棗

拾肆枚擘

麥門冬

五兩

小麥

五合

生薑

切

半夏

洗各叁兩

右玖味㕮咀以

玖升煮竹葉小麥取柒升去滓內藥更

煮取貳升半服三合日叁夜壹服

栝樓湯 治產後渴不止

栝樓根

肆兩

人參

麥門冬

各叁兩去心

大棗

叁拾枚擘

土瓜根

兩

乾地黄

甘草

貳兩

右柒味㕮咀以水捌升煮取貳升半分叁服

千金翼方卷第七

千金翼方卷第八

婦人四

崩中第一方三十六首

治婦人五崩身體羸瘦欬逆煩滿少氣心下痛向上生瘡腰
大痛不可俛仰陰中腫如有瘡之狀毛中癢時痛與子藏相
通小便不利常頭眩頸項急痛手足熱氣逆衝急煩不得卧
腹中急痛食不下吞酢噫苦腸鳴漏下赤白黃黑汁大臭如
膠汚衣狀熱即下赤寒即下白多飲即下黑多食即下黃多
藥即下青喜怒心中常恐一身不可動搖大惡風寒
鼈甲散方

鼈甲炙

乾薑各參分

芎藭

雲母

代赭各壹兩

烏賊魚骨

龍骨

伏龍肝

白堊

蝟皮各壹分生鯉魚頭

桂心

白朮各半兩

白殭蠶半分

右壹拾肆味搗篩為散以淳酒內少蜜服方寸匕日三夜
貳服久病者十日差新病者五日差若頭風小腹急加芎
藭桂心各壹兩佳忌生冷猪雞魚肉

治婦人崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人面黑無顏色
皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或苦絞痛上至於
心兩脅腫脹令人倚坐氣息乏少食不生肌膚腰背疼痛痛
連兩脚不能久立但欲得卧神驗大慎火草散方

慎火草

白石脂

鼈甲炙

黃連

細辛

石斛

芎藭

乾薑

芍藥

當歸

熟艾

牡蠣煮

禹餘糧略貳

桂心壹兩

薔薇根皮

乾地黄各肆兩

右壹拾陸味搗篩為散空腹酒服方寸匕日叁服稍增至

貳匕若寒多加附子及椒用椒當汗去目閉口者熱多加
知母黃芩加石斛兩倍白多加乾薑白石脂赤多一方云青黑
加桂心代赭各貳兩

治婦人崩中及痢一日夜數十起大命欲死多取諸根煎丸
得入腹即活若諸根難悉得者第一取薔薇根令多多乃合
之遇有酒以酒服無酒以飲服其種種根當得貳斛為佳
薔薇根煎方

薔薇根

柿根

菝葜

懸鈎根

各壹斛

右肆味皆剉合著金中以水淹使上餘肆伍寸水煮使參
分減壹去滓無大金稍煮如初法都畢會汁煎如飴可為
丸如梧桐子大服拾丸日叁服

治婦人崩中去赤白或如豆汁伏龍肝湯方

伏龍肝

如彈丸大柒枚

赤石脂

桂心

艾

甘草

炙各兩

生地黄

切肆

生薑

貳兩

右柒味咬咀以水壹斗煮取參升分肆服日叁夜壹服

治婦人崩中血出不息逆氣虛煩熟艾湯方

熟艾

壹升

蟹爪

壹升

淡竹筴

壹升

伏龍肝

半斤

蒲黃

貳兩

當歸

壹兩

乾地黄

芍藥

桂心

阿膠

茯苓

各貳兩

甘草

伍寸

右壹拾貳味咬咀以水壹斗玖升煮艾取壹斗去滓內藥

煮取肆升內膠令烊盡壹服壹升壹日令盡羸人以意消

息之可減伍陸合

治婦人崩中漏血不絕地榆湯方

地榆根

拍葉

各捌兩

蟹爪

竹筴

各壹升

漏蘆

叁兩

茯苓

壹兩

蒲黃

叁合

伏龍肝

半斤

乾薑

芍藥

當歸

桂心

甘草

各貳兩

右壹拾叁味咬咀以水壹斗伍升煮地榆根減叁升內諸藥更煮取肆升分服日叁夜壹服

治婦人產後崩中去血逆氣盪心肯生瘡煩熱甘草芍藥湯方

甘草炙

芍藥

當歸

人參

白朮

各壹兩

橘皮擘

大黃

兩

右柒味咬咀以水肆升煮取貳升分再服相去一炊頃

治婦人崩中下血檉柳葉湯方

檉柳葉

叁斤

麥門冬

心法

乾薑

兩

大棗

拾枚

甘草

壹兩

炙

右伍味咬咀以水壹斗煮檉柳葉取捌升去滓內諸藥又

煮取叁升分叁服

治婦人暴崩中去血不止薊根酒方

大小薊根

各壹斤切

右二味以酒壹斗漬五宿服之隨意多少

治婦人崩中赤白不絕困篤禹餘糧圓方

禹餘糧兩伍烏賊魚骨參兩

白馬蹄拾兩炙

龍骨參兩鹿茸貳兩

右伍味擣篩鍊蜜和丸如梧子酒服貳拾丸日貳服不知稍加至參拾丸

治婦人積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重虛極大牛角中人散方

牛角中人壹枚

防風貳兩

乾地黄

桑耳

蒲黃

乾薑

赤石脂

禹餘糧

續斷

附子炮去皮

白朮

龍骨

礬石燒

當歸各參兩

人參壹兩

右壹拾伍味擣篩為散溫酒服方寸匕日參服不知漸加之治婦人崩中下血虛羸少力調中補虛止血方

澤蘭熬分 蜀椒去汗開分

代赭 藁本

桂心 細辛

乾薑 防風各壹兩 乾地黄

牡蠣熬各壹兩半

栝子仁 厚朴各壹兩 當歸

芎藭

甘草殺絡 山茱萸

蕪荑各半兩

右壹拾柒味 擣篩為末 鍊蜜和丸 如梧子 空腹酒服 拾九

日參服 漸加至貳拾丸 神效方用白芷龍骨各叁分參柒分為貳拾味

治婦人崩中下血 切痛不止方

桑耳色

牡蠣熬各叁兩變色

龍骨貳兩

黃芩

芍藥

甘草各壹兩

右陸味 擣篩為散 酒服方寸匕 日參服 稍增以知為度

治婦人傷中崩中 絕陰使人怠惰 不能動作 背脊心腹四肢

滿而身寒熱甚 溺血 桑根煎方

桑根白皮 細切壹斗 麻子仁 參升 淳清酒 參斗 煮得壹

斗絞去滓大棗百枚去皮核飴伍升阿膠伍兩白蜜叁
升復煎得玖升下乾薑末厚朴闊貳寸長貳尺末蜀椒
末叁味各壹升桂心長壹尺貳寸甘草捌兩蘗米末壹
升乾地黄肆兩芍藥陸兩玄參伍兩九如彈丸日叁枚
又方

小薊根葉

祥母拾伍斤

右壹味以水伍斗合釜中煮爛熟去滓內銅器中煎餘肆
升分肆服壹日令盡碎字未詳
不取升正

治婦人崩中方

白茅根伍斤

小薊根伍斤

右貳味切以水伍斗合煎取肆升分稍稍服之

治婦人崩中去血及產後餘病丹參酒方

丹參

地黄

忍冬

地榆

艾伍斤

右五味先燥熟春之以水漬三宿去滓煮取汁以黍米壹
斛釀如酒法熟初服肆合稍增之神良

治婦人崩中去赤白方

取倚死竹蛭燒末飲服半方寸匕神良

治婦人崩中漏下方

取梧桐木長壹尺燒作灰擣篩為散以溫酒服方寸匕

日參服

治婦人白崩中方

芎藭瀕 乾地黃 阿膠 赤石脂 桂心

小薊根略真

右陸味咬咀以酒陸升水四升合煮取參升去滓內膠令

烱盡絞去滓分參服如雞子大 柴龍肝

治婦人白崩中馬通汁方

白馬通汁續

乾地黃兩

芎藭

阿膠

小薊根

白石脂

桂心兩

伏龍肝

如雞子大七枚

右搗味咬咀以酒柒升合馬通汁煮取叁升去滓內膠令烊盡分叁服

治婦人帶下五賁一曰熱病下血二曰寒熱下血三曰月經未斷為房室即漏血四曰經來舉重傷妊脉下血五曰產後藏開經利五賁之病外實內虛小牛角鯁散方

小牛角鯁兩

龍骨兩

禹餘糧

乾薑

當歸兩

續斷兩

右柒味搗篩為散空腹酒服方寸匕日叁服

魚骨為拾味

治婦人縵下十二病絕產一曰白帶二曰赤帶三曰經水不利四曰陰胎五曰子藏堅六曰子藏僻七曰陰陽患痛八曰

腹強一作強九曰腹寒十曰五藏閉十一曰五藏酸痛十二曰

夢與鬼為夫婦龍骨散方續下千金

龍骨兩

白殭蠶伍烏賊魚骨

代赭各肆兩

半夏洗

桂心

伏龍肝

乾薑

黃蘗各貳兩

石韋祛

滑石各壹兩

右壹拾壹味擣篩為散溫酒服方寸匕日三服多白加烏賊魚骨白殭蠶各貳兩多赤加代赭伍兩小腹寒加黃蘗貳兩子藏堅加薑桂各貳兩各隨疾增之服藥二月有子住藥藥太過多生兩子當審方取藥寡婦童女不可妄服治產後下血不止方

葛蒲伍兩

右壹味以清酒伍升煮取貳升分貳服

治婦人下血阿膠散方

阿膠

剗兩

烏賊魚骨

貳兩

芍藥

肆兩

當歸

壹兩

右肆味搗節為散以蜜溲如麥飯先食以葱羹汁服方寸

匕日叁夜壹服

一方桑耳壹兩

治諸去血蠱方

鹿茸

多當歸剗叁

瓜子

伍蒲黃兩

右肆味搗節為散酒服方寸匕日叁服不知稍增

治婦人漏血崩中鮑魚湯方

鮑魚

當歸剗叁

阿膠

肆艾如雞子大叁枚

右肆味以酒叁升水貳升合煮取貳升伍合去滓內膠烱

令盡壹服剗合日叁服

治婦人叁拾陸疾胞中病漏下日不絕白堊丸方

邯鄲白堊

牡蠣

熬禹餘糧

白芷

烏賊魚骨

乾薑

龍骨

白石脂

桂心 瞿麥 大黃 石韋去毛 白斂

細辛 芍藥 黃連 附子炮去皮 鍾乳

茯苓 當歸 蜀椒炒去口者 黃芩

甘草炙

右貳拾叁味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子大酒服伍丸日貳不知漸加至拾丸

治婦人漏血不止大崩中方

龍骨 芎藭 附子炮去皮 芍藥 禹餘糧

乾薑各參兩 赤石脂肆兩 當歸 桂心略壹兩 甘草伍分

右壹拾味擣篩為散以温酒服方寸匕日叁服稍加至貳

匕白多更加赤石脂壹兩

治婦人漏血積月不止馬通湯方

赤馬通汁檀升取新馬矢絞取汁乾者 當歸

阿膠炙

乾薑各壹兩

生艾壹把

書墨半斤

右陸味咬咀以水捌升清酒貳升合煮取參升去滓內馬

通汁及膠微火煎取貳升適寒溫分再服相去壹炊頃飲之

治婦人白漏不絕馬蹄屑湯方

白馬蹄炙

赤石脂各伍兩

禹餘糧

烏賊魚骨

龍骨

牡蠣熬

乾地黃

當歸各肆兩

附子參兩炮去皮

白僵麤蠱壹兩

甘草貳兩

右壹拾壹味咬咀以水壹斗陸升煮取參升半分肆服日

參夜壹服

治婦人漏血不止方

乾地黃

大黃各陸兩

芎藭四兩

阿膠伍兩

人參

當歸

甘草各兩

右柒味咬咀以酒壹斗水伍升合煮取陸升去滓內膠烱

令盡壹服壹升日叁夜壹服

治婦人白漏不絕馬蹄丸方

白馬蹄肆兩炙

烏賊魚骨

白殭蠶

赤石脂兩炙

禹餘糧

龍骨兩叁

右陸味擣篩為末鍊蜜和丸如梧子酒服拾丸不知漸加至貳拾丸

治婦人漏下慎火草散方

慎火草拾兩炙

當歸

鹿茸鹿一解

阿膠肆兩

龍骨貳分

右伍味擣篩為散先食酒服方寸匕日叁服

治婦人漏下不止蒲黃散方

蒲黃兩

當歸兩貳

右叁味擣篩為散酒服半方寸匕日叁服不知漸加至壹

方寸匕

治婦人胞落不安血漏下相連月水過度往來或多或少小
腹急痛上捨心脅脹食不生肌方

蟬甲叁兩

禹餘糧

乾地黄

各陸兩

蜂房

炙

蛇皮

壹兩 蝟皮

壹具

乾薑

防風

烏賊魚骨

桑螵蛸

炙 蜃蟲

熬

甘草

炙 各

貳兩

右壹拾貳味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒服
拾九日參服漸加至貳拾九

月水不利第二方參拾肆首

治婦人月水不利閉塞絕產十八年服此藥二十八日有子
金城太守白薇丸方

白薇

細辛

人參

杜蘅

半夏

洗

厚朴

白殭蠶

牡蒙

牛膝

沙參

乾薑兩半 附子兩半 秦苧兩半

當歸分

蜀椒兩半 紫苑分

防風兩

右壹拾柒味擣篩鍊蜜和為丸如梧桐子先食酒服叁九
不知稍增至肆伍九此藥不用長服覺有身則止崔氏有

參各叁分

治經年月水不利胞中有風冷故須下之大黃朴消湯方

大黃 牛膝兩伍 代赭 乾薑 細辛兩壹

水蛭熬 蝨蟲去翅足熬 芒消兩各貳 桃仁叁升去皮尖雙入者

麻子仁伍 牡丹皮 紫葳各叁兩 甘草叁兩

朴消兩叁

右壹拾肆味咬咀以水壹斗煮取叁升去滓內消烱令盡
分叁服五更即服相去壹炊頃自下之後將息勿見風

治婦人月水不利小腹堅急大便不通時時見有物下如鼻

淨或如雞子白皆胞中風冷也方

大黃兩

吳茱萸兩芍藥兩

當歸

乾地黄

黃芩

乾薑

芍藥

桂心

牡丹皮

芒消

人參

細辛

甘草兩水蛭兩

蝨蟲各伍拾枚

桃仁伍拾枚黃雌雞壹隻治如食

右壹拾捌味以清酒伍升漬藥壹炊又又別以水貳

斗煮雞取壹斗去雞下藥合煮取參升絞去滓內芒消烺

令盡攪調適寒温服壹升日叁服

治月水不利小腹痛方

牡丹皮

當歸

芍藥

黃芩

大黃

乾薑

人參

細辛

消石

芍藥

桂心

甘草兩水蛭兩

蝨蟲伍拾枚桃仁伍拾枚

蟻拾叁枚乾地黄兩黃雌雞壹隻治如食法

右壹拾捌味咬咀以清酒伍升漬壹宿別以水貳斗煮雞
取壹斗伍升去雞內藥煮取叁升去滓內消石烱令盡適
寒温壹服壹升日叁服

治久寒月水不利或多或少方

吳茱萸叁升生薑壹斤

桂心壹尺

大棗

貳拾枚桃仁伍拾枚
去皮尖

人參

芍藥

小麥

半夏

壹升牡丹皮兩

牛膝貳斤

水蛭熬

蟾蟲熬

蝨蟲

去翅甘草壹兩
炙

右壹拾伍味咬咀以清酒叁升水壹斗煮取叁升去滓適
寒温服壹升日叁服不能飲酒者以水代之湯臨欲成乃
內諸蟲病人不耐藥者則飲柒合

治婦人月水不利腹中滿時自減并男子膀胱滿急抵党湯

方

大黃貳斤

桃仁

叁拾枚去皮尖

水蛭

壹斤虎杖壹斤
去

右肆味咬咀以水叁升煮取壹升頓服之當即下血

又方

當歸

桂心

乾漆熬

大棗擘

蝨蟲去翅足熬

水蛭

各熬兩芍藥

細辛

黃芩

萎蕤

甘草

各兩吳茱萸

桃仁

各壹兩

右壹拾叁味咬咀以酒壹斗漬壹宿明日煮之取叁升分

叁服

治婦人月水不利方

當歸

芍藥

乾薑

芒消

吳茱萸各壹兩

大黃兩

桂心叁兩

甘草壹兩

桃仁去皮尖叁拾枚

右玖味咬咀以水玖升煮取叁升去滓內芒消烱令盡分

叁服

治婦人曾脅滿月水不利時繞臍立痛手足煩熱兩脚酸

益經丸方

乾薑

吳茱萸

附子炮去皮

大黃

芍藥各二兩

黃芩

乾地黄

當歸

桂心

白朮各二兩

人參

石韋各壹兩去毛

蜀椒壹合去目及閉口汗

桃仁柒拾枚去皮尖及雙仁熬

薏苡仁壹斤

右壹拾伍味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子先食酒服壹九日參服不知稍加之以知為度

治婦人月水不利手足煩熱腹滿不欲寐心煩柒熬丸方

大黃半兩熬

前胡

芒消各伍分

乾薑叁分

茯苓貳分

杏仁去皮尖雙仁壹分半熬

蜀椒去目及閉口汗

葶藶各貳分熬

桃仁貳拾枚去皮尖雙仁熬

水蛭半合熬

蠱蟲半合去足熬

右壹拾壹味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子飲服柒九日

參服漸加至拾九治寒先食服之千金有芎藭參分

治婦人帶下寒氣血積腰腹痛月水時復不調手足厥逆氣

上湯心害飲食方

茯苓

枳實炙

乾薑各半

芍藥

黃芩

桂心

甘草

各兩

右柒味咬咀以水肆升煮取貳升分貳服服別相去壹炊頃諸月水不調皆悉主之

治婦人月水不調或月前或月後或如豆汁腰痛如折兩脚疼胞中風冷牡丹大黃湯方

牡丹皮

各兩大黃

朴消各肆兩

桃仁

壹升去皮

陽起石

人參

茯苓

水蛭

熬

蝨蟲

去翅足熬

甘草

各兩

右壹拾味咬咀以水玖升煮取參升去滓內朴消令烺盡分參服服別相去如壹炊頃

治婦人月水不調或在月前或在月後或多或少赤白

陽起石湯方

陽起石兩 附子兩 炮

伏龍肝兩 生地黃兩 壹

乾薑 桂心 人參

甘草貳兩 續斷

赤石脂各參兩

右壹拾味 咀以水壹斗 煮取參升貳合 分肆服 日叁夜

壹服

治月水不調 或一月再來 或兩月三月一來 或月前或月後 閉塞不通 宜服杏仁湯方

杏仁雙仁 去皮尖

桃仁雙仁 去皮尖

蝨蟲足 去翅 熬

水蛭熬各叁拾枚

大黃兩叁

右伍味 咀以水陸升 煮取貳升 伍合 分為叁服 壹服其 病當隨大小便有所下 若下多者止 勿服若少者則盡貳服 治婦人產生餘疾 月水時來 腹中絞痛方

朴消

當歸

薏苡仁

桂心各貳兩

大黃肆兩

代赭

牛膝

桃仁去皮尖兩仁
熟各壹兩

右搗味擣篩為末鍊蜜和丸如梧桐子先食酒服伍九日
參服不知稍增之

治婦人經水來繞臍痛上捨心肯往來寒熱如瘧狀方

薏苡仁

代赭

牛膝各貳兩

茯苓壹兩

大黃捌兩

麩蟲貳拾枚

桃仁伍拾枚去皮
尖雙仁熟

桂心伍兩

右搗味擣篩為散宿不食明朝空腹溫酒服壹錢匕

治婦人月事往來腰腹痛方

麩蟲肆枚

女青

芎藭各壹兩

蜀椒去目及
閉口汗

乾薑

大黃各貳兩

桂心半兩

右柒味擣篩為散先食酒服壹刀圭服之拾日微去下善

養之佳

治婦人月事不通小腹堅痛不得近乾漆湯方

乾漆熬 大黃 黃芩 當歸 芒消

桂心略壹 附子壹枚炮 吳茱萸壹升

菱麩 芍藥 細辛 甘草貳兩

右壹拾貳味咀以清酒壹斗漬壹宿煮取參升絞去滓
內芒消烱令盡分參服服別相去壹炊頃

又方

大黃兩 桃仁壹升去皮 芒消 土瓜根

當歸 芍藥 丹砂研各

右柒味咀以水玖升煮取參升去滓內丹砂末及芒消
烱令盡為參服服別相去壹炊頃研令水

治月水不通心腹絞痛欲死通血止痛嚴蜜湯方

吳茱萸 大黃 當歸 乾薑 蠅蟲去翅

水蛭熬

乾地黄

芎藭各貳兩

梔子仁拾肆枚

桃仁壹斤

去尖熬

芍藥兩

細辛

甘草各壹兩

桂心壹斤

牛膝壹斤

麻仁半斤

右壹拾陸味咬咀以水玖升煮取貳升半分參服日參服服相去壹炊頃

治瘕月水瘀血不通下病散方

大黃

細辛

朴消各壹兩

消石

附子炮去

二蟲去翅足熬

黃芩

乾薑各壹兩芍藥

土瓜根

代赭

丹砂各壹兩

牛膝壹斤

桃仁貳斤

蟪貳斤

右壹拾伍味咬咀水酒各伍升漬藥壹宿明日乃煮取肆升去滓內朴消消石烱令盡分肆服服別相去如壹炊頃去病後宜食黃鴨羹

又方

水蛭熬

土瓜根

芒消

當歸各貳兩

桃仁壹升去皮尖

大黃

桂心

麻子

牛膝各叁兩

右玖味咬咀以水玖升煮取叁升去滓內芒消烱令盡分

參服服別相去壹炊頃

治月水不通結成癥堅如石腹大骨立宜破血下癥物方

大黃

消石熬令沸定各陸兩

蜀椒去目閉口汗壹兩

代赭

乾漆熬

芎藭

茯苓

乾薑

蝨蟲去翅足熬各貳兩

巴豆貳拾枚去皮心熬

右壹拾味擣篩為末別治巴豆令如脂鍊蜜丸如梧桐子

大酒服叁丸漸加至伍丸空腹為始日貳服千金有丹砂柴胡水蛭土

瓜根為壹拾肆味

治產後月水往來乍多乍少仍不復通裏急下引腰身重牛

膝丸方

牛膝

桂心

大黃

芎藭各二兩 當歸

芍藥

人參

牡丹皮

各二兩

水蛭熬

蝨蟲熬

去足

蟻蟲熬

蟻各

蜚蠊各

壹方 無

右壹拾叁味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹溫酒

下伍丸日叁服不知漸增至拾丸

治月水閉不通洒洒往來寒熱方

蝨蟲熬

去足

桃仁

各二兩去皮

桑螵蛸半

代赭

水蛭熬

蟻熬

芎藭

大黃熬

右柒味搗篩為末別搗桃仁如膏乃合藥鍊蜜和為丸如

梧桐子大酒服伍丸日貳服

治月水不通手足煩熱腹滿默默不欲寐心煩方

芎藭伍兩

芒消

柴胡各伍

茯苓貳兩

杏仁伍兩去皮

大黃壹 蜀椒去粗 附子開

水蛭熬

蝨蟲去翅足熬

桃仁壹百枚去皮

蟻蟲熬

牡丹皮各兩

乾薑兩

葶藶子伍合熬

右壹拾肆味搗篩為末別搗桃仁杏仁如泥鍊蜜和為丸

如梧桐子大空腹酒服柒九日參服不知稍增之前此方與

丸同多

治腰腹痛月水不通利方

當歸兩

芎藭

人參

牡蠣熬

土瓜根

水蛭各兩

蝨蟲去翅足熬

丹砂研

烏頭炮去

乾漆熬各壹兩

桃仁伍拾枚

去皮尖兩

右壹拾壹味搗篩為末鍊蜜和丸如梧桐子大空腹酒服

參九日參服

治月閉不通不欲食方

大黃壹斤

柴胡

芒消各伍兩

牡蠣熬壹兩

葶藶子

貳兩熬令紫色別擣

芎藭貳兩

乾薑叁兩

蜀椒

汗壹拾兩者及翹兩者

茯苓叁兩

杏仁伍兩合熬別擣如膏

蝮蟲

去足水蛭半兩

桃仁柒拾枚去皮尖雙

別擣如膏

右壹拾叁味擣篩為末和前件葶藶桃仁杏仁等脂鍊蜜

和為丸如梧桐子大飲服七九日再與七熱丸

治月水不通六七年或腫滿氣逆腹脹癥瘕服此方數有神

效大蝮蟲丸方

蝮蟲

肆百枚去翅足熬

水蛭

叁百枚熬 鱗壹升

乾地黄

牡丹皮

乾漆熬

土瓜根

芍藥

牛膝

桂心各肆

黃芩

牡蒙

桃仁熬去皮尖雙

茯苓

海藻各伍

葶藶伍合熬紫色

吳茱萸貳兩

右壹拾柒味擣篩為末別擣桃仁葶藶如脂鍊蜜和為丸

如梧桐子大酒服柒九日參服漸金有芒人參

治月水不通閉塞方

牛膝壹

麻子仁叁升

土瓜叁

桃仁貳升去尖雙仁

右肆味以酒壹斗伍升漬伍宿壹服伍合漸增至壹升日壹服多飲益佳

治婦人產後風冷留血不去停結月水閉塞方

菴藺子

桃仁去皮尖雙入熬

麻子仁碎各

右叁味以酒叁斗合煮至貳斗壹服伍合日叁服稍加至壹升佳

治月水閉不通結痲腹大如甌短氣欲死虎杖煎方

虎杖

壹伯斤去頭腦洗去土暴燥切土瓜根汁

牛膝汁各貳

右叁味以水壹斛漬虎杖壹宿明日煎餘貳斛內土瓜牛膝汁攪令調於湯器中煎使如飴糖酒服壹合日貳夜壹

服當下若病去但令服盡

治帶下月經閉不通方

大黃陸

朴消伍

桃仁去皮尖及雙仁

蝨蟲去翅足各壹升並熬

右肆味擣篩為末別擣桃仁如膏以淳苦酒肆升以銅鑪

著火上煎減壹升內藥參校之又減壹升內朴消煎如錫

可止丸如雞子投壹升美酒中當宿不食服之至日西下

或如豆汁或如雞肝凝血蝦蟇子或如膏此是病下也

治月水不通陰中腫痛芎藭湯方

芎藭

當歸略貳

葱白切小 吳茱萸

阿膠熬各壹兩

右伍味咬咀以水玖升煮取參升內膠烱令盡分為參服

損傷第三方七首

治婦人因其夫陰陽過度玉門疼痛小便不通白玉湯方

白玉貳兩

白朮

澤瀉略貳

肉蓯蓉

當歸略伍

右伍味咬咀先以水壹斗煮玉伍拾沸去玉內藥煎取貳升分參服每服相去壹炊頃

治婦人傷丈夫苦頭痛欲嘔心悶桑白皮湯方

桑白皮兩半乾薑壹斤桂心伍大棗貳拾枚

右肆味咬咀以水貳大升煮取捌合分貳服千金云以酒壹斗煮參肆

沸去滓分溫服之適衣無令汗出

治婦人嫁痛單行方

大黃叁分

右壹味切以好酒壹升煮十沸頓服

治婦人小戶嫁痛連日方

芍藥斛生薑切甘草炙絡桂心壹分

右肆味咬咀以酒貳升煮參沸去滓適寒溫分服

治婦人小戶嫁痛單行方

牛膝

伍兩

右壹味切以酒參升煮再沸去滓分參服

治婦人小戶嫁痛方

烏賊魚骨熨

右壹味燒成屑以酒服方寸匕日參服立差

治婦人姪身為夫所動欲死單行竹瀝汁方

取淡竹斷兩頭節留中節以火燒中央以器承兩頭得

汁飲之立差

千金翼方卷第八

千金翼方卷第九

傷寒上

論曰傷寒熱病自古有之名賢潛哲多所防禦至於仲景特
有神功尋思旨趣莫測其致所以醫人未能鑽仰嘗見太醫
療傷寒惟大青知母等諸冷物投之極與仲景本意相反湯
藥雖行百無一效傷其如此遂披傷寒大論鳩集要妙以爲
其方行之以來未有不驗舊法方證意義幽隱乃令近智所
迷覽之者造次難悟中庸之士絕而不思故使閭里之中歲
致夭枉之痛遠想令人慨然無已今以方證同條比類相附
須有檢討倉卒易知夫尋方之大意不過三種一則桂枝二
則麻黃三則青龍此之二三方凡療傷寒不出之也其柴胡等
諸方皆是吐下發汗後不解之事非是正對之法術數未深
而天下名賢止而不學誠可悲夫又有僕隸卑下冒犯風寒

天行疫癘先被其毒憫之酸心聊述茲意爲之救法方雖是舊弘之惟新好古君子嘉其博濟之利無咄誚焉

太陽病用桂枝湯法第一 伍拾柒證
方伍首

論曰傷寒與瘧病濕病及熱暍相濫故叙而論之

太陽病發熱無汗而反惡寒是爲剛瘧

太陽病發熱汗出而不惡寒是爲柔瘧 惡寒

太陽病發熱其脈沈細是爲瘧

太陽病發其汗因致瘧

病者身熱足寒頸項強惡寒時頭熱面赤目脈赤獨頭動搖

是爲瘧

右件瘧狀

太陽病而關節痠煩其脈沈緩爲中濕

病者一身盡痠煩日晡即劇此爲風濕汗出所致也

濕家之爲病一身盡疼發熱而身色似重黃也

濕家之爲病其人但頭汗出而背強欲得被覆若下之早即噦或背滿小便利舌上如胎此爲丹田有熱背上有寒渴欲飲則不能飲而口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利者死下利不止者亦死

問曰病風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨溜下不止師云此可發汗而其病不愈者何故荅曰發其汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風濕者發其汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

病人喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中獨和無病病在頭中寒濕故鼻塞內藥鼻中即愈

右件濕狀

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中也

太陽中暍發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細乳遲小便已洗然手足逆冷小有勞熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加温針發熱益甚數下之淋復甚

右件暍狀

太陽之為病頭項強痛而惡寒

太陽病其脉浮

太陽病發熱汗出而惡風其脉緩為中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病三四日不吐下見乳乃汗之

夫病有發熱而惡寒者發於陽也不熱而惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者其經竟故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡未

風家表解而不了了者十二日愈

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出漉漉惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出以救邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背強几几而反汗出惡風桂枝湯主之

本論云桂枝加葛根湯

太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病三日已發汗吐下溫針而不解此為壞病桂枝湯復不中與也觀其脈證知犯何逆隨證而治之

桂枝湯本為解肌其人脈浮緊發熱無汗不可與也常識此
勿令誤也

酒客不可與桂枝湯得之則嘔酒客不喜甘故也

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳

服桂枝湯吐者其後必吐膿血

太陽病初服桂枝湯而反煩不解者當先刺風池風府乃却

與桂枝湯則愈

太陽病外證未解其脈浮弱當以汗解宜桂枝湯

太陽病下之微喘者表未解故也宜桂枝湯黃湯 云麻

太陽病有外證未解不可下之下之為逆解外宜桂枝湯

太陽病先發汗不解而下之其脈浮不愈浮為在外而反下

之故令不愈今脈浮故在外當解其外則愈宜桂枝湯

病常自汗出此為榮氣和衛氣不和故也榮行脈中衛行脈

外復發其汗衛和則愈宜桂枝湯

病人藏無他病時發熱自汗出而不愈此衛氣不和也先其時發汗愈宜桂枝湯

傷寒不大便六七日頭痛有熱與承氣湯其大便反青此爲不在裏故在表也當發其汗頭痛者必衄宜桂枝湯

傷寒發汗已解半日許復煩其脉浮數可復發其汗宜服桂枝湯

傷寒醫下之後身體疼痛清便自調急當救表宜桂枝湯

太陽病未解其脉陰陽俱停必先振汗出而解但陽微者先汗之而解宜桂枝湯

太陽病未解熱結膀胱其人如狂其血必自下下者即愈其外未解尚未可攻當先解其外宜桂枝湯

傷寒大下後復發汗心下痞惡寒者不可攻痞當先解表宜

桂枝湯

桂枝湯方

桂枝

芍藥

生薑

各二兩 甘草

大棗

拾二枚

右五味㕮咀參味以水柒升微火煮取參升去滓温服壹升須臾飲熱粥壹升餘以助藥力温覆令汗出壹時許益善若不汗再服如前復不汗後服小促其間令半日許參服病重者壹日壹夜乃差當晬時觀之服壹劑湯病證猶在當復作服之至有不汗出當服參劑乃解

太陽病發其汗遂漏而不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯主之桂枝中加附子壹枚炮即是太陽病下之其脉促而滿者桂枝去芍藥湯主之若微寒者桂枝去芍藥加附子湯主之桂枝去芍藥中加附子壹枚即是

太陽病得之八九日如瘧發熱而惡寒熱多而寒少其人不能
嘔清便欲自可一日再三發其脉微緩者為欲愈脉微而
惡寒者此為陰陽俱虛不可復吐下發汗也面色反有熱
者為未欲解以其不能得汗出身必當癢桂枝麻黃各半
湯主之

桂枝

壹兩拾陸銖

芍藥

生薑

切甘草炙

麻黃

去節各壹兩

大棗

肆枚

杏仁

貳拾肆枚去皮尖兩仁者去

右棗味以水伍升先煮麻黃壹貳沸去上沫內諸藥煮取
壹升捌合去滓溫服陸合本云桂枝湯參合麻黃湯參合
併為陸合頓服

服桂枝湯大汗出若脉洪大與桂枝湯其形如瘧壹日再發
汗出便解宜桂枝貳麻黃壹湯方

桂枝

壹兩拾陸銖

麻黃

拾陸銖

生薑

切芍藥

陸銖

甘草壹兩貳銖灸

大棗五枚杏仁拾陸枚去皮尖兩仁者

右柒味以水柒升煮麻黃壹貳沸去上沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升日再服本云桂枝湯貳分麻黃湯壹分合為貳升分貳服今合為一方

太陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱則無陽也不可發汗桂枝二越婢一湯主之方

桂枝

芍藥

甘草灸

麻黃去節各拾捌銖

生薑銖切參

石膏貳拾肆銖碎

大棗肆枚

右柒味以水伍升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取貳升去滓溫服壹升本云當裁為越婢湯桂枝合之飲壹升今合為壹方桂枝湯貳分

服桂枝湯下之頸項強痛翕翕發熱無汗心下滿微痛小便不利桂枝去桂加茯苓白朮湯主之方

茯苓

白朮 各參

右於桂枝湯中惟除去桂枝壹味加此貳味為湯服壹升
小便即利本云桂枝湯今去桂枝加茯苓白朮

太陽病用麻黃湯法第二 方 陸澄

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊
為傷寒

傷寒一日太陽脉弱至四日太陰脉大

傷寒一日太陽受之脉若靜者為不傳頗欲嘔若躁煩脉數
急者乃為傳

傷寒其二陽證不見此為不傳

太陽病頭痛發熱身體疼重骨節疼惡風無汗而喘麻黃

湯主之

太陽與陽明合病喘而肯滿不可下也宜麻黃湯

病十日已去其脉浮細嗜卧此爲外解設昏滿脅痛與小柴胡湯浮者麻黃湯主之

太陽病脉浮緊無汗而發熱其身疼痛八九日不解其表證仍在此當發其汗服藥微除其人發煩自暝增劇者必衄衄乃解所以然者陽氣重故也宜麻黃湯

脉浮而數者可發其汗宜麻黃湯

傷寒脉浮緊不發其汗因致衄宜麻黃湯

脉浮而緊浮則爲風緊則爲寒風則傷衛寒則傷榮榮衛俱病骨節煩疼可發其汗宜麻黃湯

太陽病下之微喘者外未解故也宜麻黃湯壹云桂枝湯

麻黃湯方

麻黃去節桂枝兩

甘草壹兩

杏仁拾枚

去皮

右肆味以水玖升煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取貳

升半去滓温服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂枝法
太陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之方

葛根肆兩

麻黃參兩桂枝

芍藥

甘草炙各貳兩

生薑切參兩

大棗拾壹枚擘

右柒味以水壹斗煮麻黃葛根減貳升去上沫內諸藥煮

取參升去滓分温參服不須與粥取微汗

太陽與陽明合病而自利葛根湯主之

用上方一二云用後葛根黃芩黃連湯

不下利但嘔葛根加半夏湯主之葛根湯中加半夏半升洗
即是

太陽病桂枝證醫反下之遂利不止其脉促表未解喘而汗

出宜葛根黃芩黃連湯方

葛根半斤

甘草貳兩黃芩

黃連各參兩

右肆味以水捌升先煮葛根減貳升內諸藥煮取貳升去

淳分温再服

太陽病用青龍湯法第三方證首

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩大青龍湯主之若脉微弱汗出惡風者不可服之服之則厥筋惕肉瞤此為逆也方

麻黃陸兩桂枝貳兩甘草貳兩杏仁肆拾枚去皮

生薑陸兩切大棗拾枚石膏如雞子大碎綿裹

右柴味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取參升去滓温服壹升取微似汗汗出多者温粉粉之壹服汗者勿再服若復服汗出多亡陽逆虛惡風躁不得眠

傷寒脉浮緩其身不疼但重乍有輕時無少陰證者可與大青龍湯發之用上

傷寒表不解心下有水氣欬而發熱或渴或利或噎或小便

不利少腹滿或喘者小青龍湯主之方

麻黃去節芍藥

細辛

乾薑

甘草炙

桂枝兩

五味子

半夏各半

右搗味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取參升去滓溫服壹升渴則去半夏加栝樓根參兩微利者去麻黃加薤花壹雞子大熬令赤色噎者去麻黃加附子壹枚炮小便不利少腹滿去麻黃加茯苓肆兩喘者去麻黃加杏仁半升去皮

傷寒心下有水氣欬而微喘發熱不渴服湯已而渴者此為寒去為欲解小青龍湯主之方用上

太陽病用柴胡湯法第四方 證

血弱氣盡腠理開邪氣因入與正氣相搏在於脅下正邪分爭往來寒熱休作有時嘿嘿不欲食飲藏腑相連其痛必

下邪高痛下故使其嘔小柴胡湯主之服柴胡而渴者此
爲屬陽明以法治之

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再三下之不能食
其人脅下滿痛面目及身黃頸項強小便難與柴胡湯後
必下重本渴飲水而嘔柴胡復不中與也食穀者噦

傷寒四五日身體熱惡風頸項強脅下滿手足溫而渴小柴
胡湯主之

傷寒陽脉澀陰脉弦法當腹中急痛先與小建中湯不差與

小柴胡湯

小建中湯見
雜療門中

傷寒中風有柴胡證但見一證便是不必悉具也凡柴胡湯
證而下之柴胡證不罷復與柴胡湯解者必蒸蒸而振却
發熱汗出而解傷寒五六日中風往來寒熱脅苦滿嘿
嘿不欲飲食心煩喜嘔或脅中煩而不嘔或渴或腹中痛

或脅下痞堅或心下悸小便不利或不渴外有微熱或欬
小柴胡湯主之

柴胡八

黃芩

人參

甘草灸

生薑各三兩切

半夏

半升洗

大棗

拾貳枚擘

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎溫服壹升日

叁若脅中煩不嘔者去半夏人參加枳椇實壹枚渴者去

半夏加人參合前成四兩半腹中痛者去黃芩加芍藥三

兩脅下痞堅者去大棗加牡蠣陸兩心下悸小便不利者

去黃芩加茯苓肆兩不渴外有微熱者去人參加桂叁兩

溫覆微發其汗欬者去人參大棗生薑加五味子半升乾

薑貳兩

傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便

堅其脉細此為陽微結必有表復有裏沈則為病在裏汗出

亦為陽微假令純陰結不得有外證悉入在於裏此為半在外半在裏脈雖沈緊不得為少陰所以然者陰不得有汗今頭大汗出故知非少陰也可與柴胡湯設不了了者得屎而

解方上

傷寒十三日不解胃脅滿而嘔日晡所發潮熱而微利此本當柴胡下之不得利今反利者故知醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先再服小柴胡湯以解其外後以柴胡加芒消湯主之方

柴胡鬪兩拾

黃芩

人參

甘草炙

生薑略壹切

半夏壹合

大棗肆枚

芒硝貳兩

芒硝貳兩

芒硝貳兩

右柒味以水肆升煮取貳升去滓溫分再服以解其外不

解更作

柴胡加大黃芒消桑螵蛸湯方

右以前柒味以水柒升下芒消參合大黃肆分桑螵蛸伍枚煮取壹升半去滓温服伍合微下即愈本云柴胡湯再服以解其外餘貳升加芒消大黃桑螵蛸也

傷寒八九日下之肯滿煩驚小使不利譫語一身不可轉側柴胡加龍骨牡蠣湯主之方

柴胡肆兩

黃芩

人參

生薑切

龍骨

牡蠣熬

桂枝

茯苓

欽丹酪

大黃貳兩

半夏擘 枳實擘 大棗擘

右壹拾貳味以水捌升煮取肆升內大黃切如棊子大更煮壹兩沸去滓温服壹升本云柴胡湯今加龍骨等

傷寒六七日發熱微惡寒支節煩疼微嘔心下支結外證未去者宜柴胡桂枝湯

發汗多亡陽狂語者不可下以為可與柴胡桂枝湯和其榮

衛以通津液後自愈方

柴胡兩 黃芩 人參 生薑切 桂枝

芍藥兩 半夏半 甘草壹兩 大棗陸枚

右取味以水陸升煮取貳升去滓温服壹升本云人參湯
作如桂枝法加柴胡黃芩復如柴胡法今用人參作半劑
傷寒五六日其人已發汗而復下之背脊滿微結小便不利
渴而不嘔但頭汗出往來寒熱而煩此為未解柴胡桂枝乾
薑湯主之方

柴胡兩 桂枝兩 乾薑兩 栝樓根兩 黃芩兩

牡蠣貳兩 甘草貳兩

右柴味以水壹斗貳升煮取陸升去滓更煎温服壹升日
貳服初服微煩汗出愈

太陽病過經十餘日反再三下之後四五日柴胡證續在先

與小柴胡湯嘔止小安其人鬱鬱微煩者為未解與大柴胡湯下者止

傷寒十餘日和氣結在裏欲復往來寒熱當與大柴胡湯

傷寒發熱汗出不解心中痞堅嘔吐下利者大柴胡湯主之

病人表裏無證發熱七八日雖脈浮數可下之宜大柴胡湯

方

柴胡

兩

枳實

肆枚

生薑

兩

黃芩

兩

芍藥

兩

半夏

半升

大棗

拾枚

右柒味以水壹斗貳升煮取陸升去滓更煎溫服壹升日

叁服壹方加大黃貳兩若不加恐不名大柴胡湯

太陽病用承氣湯法第五

方證

發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜

小承氣湯

太陽病未解其脈陰陽俱停必先振汗出而解但陽微者先

汗出而解陰微者先下之而解宜承氣湯

柴胡湯

傷寒十三日過經而譫語內有熱也當以湯下之小便利者

大便當堅而反利其脈調和者知醫以丸藥下之非其治也

自利者其脈當微厥今反和者此為內實宜承氣湯

太陽病過經十餘日心下溫溫欲吐而胃中痛大便反溏其

腹微滿鬱鬱微煩先時自極吐下者宜承氣湯

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絳絳汗出大便難譫語

者下之愈宜承氣湯

太陽病三日發其汗不解蒸蒸發熱者調胃承氣湯主之

傷寒吐後腹滿者承氣湯主之

太陽病吐下發汗後微煩小便數大便因堅可與小承氣湯

和之則愈

承氣湯方

大黃肆兩

厚朴捌兩

灸

枳實伍枚

灸

芒消叁合

合

右肆味以水壹斗先煮貳味取伍升內大黃更煮取貳升去滓內芒消更煎壹沸分再服得下者止

又方

大黃肆兩

肆兩

厚朴貳兩

灸

枳實大者叁枚

灸

叁

右叁味以水肆升煮取壹升貳合去滓溫分再服初服譖語即止服湯當更衣不爾盡服之

又方

大黃肆兩

肆兩

甘草貳兩

灸

芒消半兩

兩

右叁味以水叁升煮取壹升去滓內芒消更壹沸頓服

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下者即愈其外不解尚未可攻當先解其外外解少腹急結者乃可攻之宜桃

核承氣湯方

桃仁伍拾枚
去皮尖

大黃兩肆

桂枝兩

甘草兩

芒消兩壹

右伍味以水柒升煮取貳升半去滓內芒消更煎壹沸分

温叁服

太陽病用陷胃湯法第六參拾壹證
方壹拾陸首

問曰病有結胃有藏結其狀何如答曰按之痛其脉寸口浮
關上自沈為結胃何謂藏結曰如結胃狀飲食如故時下利
陽脉浮關上細沈而緊名為藏結舌上白胎滑者為難治藏
結者無陽證不往來寒熱其人反靜舌上胎滑者不可攻也
夫病發於陽而反下之熱入因作結胃發於陰而反汗之因
作痞結胃者下之早故令結胃結胃者其項亦強如柔痊狀
下之即和宜大陷胃丸
結胃證其脉浮大不可下之下之即死

結背證悉具煩躁者死

太陽病脈浮而動數浮則爲風數則爲熱動則爲痛數則爲虛頭痛發熱微盜汗出而反惡寒其表未解醫反下之動數則遲頭痛即眩胃中空虛客氣動膈短氣躁煩心中懊懷陽氣內陷心下因堅則爲結背大陷背湯主之若不結背但頭汗出其餘無汗齊頸而還小便不利身必發黃

傷寒六七日結背熱實脈沈緊心下痛按之如石堅大陷背湯主之

但結背無大熱此爲水結在背脅頭微汗出大陷背湯主之太陽病重發汗而復下之不大便五六日舌上燥而渴日晡如小有潮熱從心下至少腹堅滿而痛不可近大陷背湯主之若心下滿而堅痛者此爲結背大陷背湯主之

大陷背丸方

大黃

捌兩

葶藶子

煮杏仁

去皮芒消

絡半

右肆味和擣取如彈丸壹枚甘遂末壹錢匕白蜜壹兩水

貳升合煮取壹升溫頓服壹宿乃下

大陷胃湯方

大黃

兩

甘遂

末壹錢匕芒消

壹升

右參味以水陸升先煮大黃取貳升去滓內芒消煎壹兩

沸內甘遂末分再服壹服得快利止後服

小結胃者正在心下按之即痛其脉浮滑小陷胃湯主之

黃連

兩

半夏

半升栝樓實

大者壹枚

右參味以水陸升先煮栝樓取參升去滓內諸藥煮取貳

升去滓分溫參服

太陽病貳參日不能卧但欲起者心下必結其脉微弱者此

本寒也而反下之利止者必結胃未止者四五日復重下之

此為挾熱利

太陽少陽併病而反下之結胸心下堅下利不復止水漿不肯下其人必心煩

病在陽當以汗解而反以水啜之若灌之其熱却不得去益煩皮粟起意欲飲水反不渴宜服文蛤散方

文蛤 伍兩

右壹味擣為散以沸湯伍合和服壹方寸匕若不差與五苓散

五苓散方

猪苓 拾捌銖 去黑皮 白朮 拾捌銖 澤瀉 壹兩 陸銖 茯苓 拾捌銖 桂枝 半兩

右伍味各為散更於臼中治之白飲和服方寸匕日叁服多飲煖水汗出愈

寒實結胸無熱證者與三物小白散方

桔梗

拾捌

巴豆

陸銖去皮心蒸赤黑研如脂

貝母

拾捌

右參味擣為散內巴豆更於臼中治之白飲和服強人半

錢匕羸者減之病在上則吐在下則利不利進熱粥一杯

利不止進冷粥一杯水一云身熱皮粟不解欲引衣自覆

若以水嚙之洗之更益令熱却不得出當汗而不汗即煩

假令汗出已腹中痛與芍藥參兩如上法

太陽與少陽併病頭痛或眩冒如結背心下痞而堅當刺肺

俞肝俞大椎第一閒慎不可發汗發汗即譫語譫語則脉弦

五日譫語不止當刺期門

心下但滿而不痛者此為痞半夏瀉心湯主之

半夏

洗

黃芩

乾薑

人參

甘草

各參兩炙

黃連

壹兩

大棗

拾貳枚擘

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日參服

脉浮緊而下之緊反入裏則作痞按之自濡但氣痞耳
太陽中風吐下嘔逆表解乃可攻之其人漉漉汗出發作有
時頭痛心下痞堅滿引脅下嘔即短氣此為表解裏未和十
棗湯主之方

芫花熬

甘遂

大戟各等分

右叁味擣為散以水壹升伍合先煮大棗拾枚取捌合去
棗強人內藥末壹錢匕羸人半錢匕温服平旦服若下少
不利者明日更服加半錢得快下糜粥自養

太陽病發其汗遂發熱惡寒復下之則心下痞此表裏俱虛
陰陽氣併竭無陽則陰獨復加燒針背煩面色青黃膚瞶此
為難治今色微黃手足温者愈

心下痞按之自濡關上脉浮者大黃黃連瀉心湯主之方

大黃瀉

黃連壹兩

右貳味以麻沸湯貳升漬之須臾去滓分溫再服此方必

心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之方

附子壹枚炮別

大黃壹兩

黃連壹兩

黃芩各壹兩

右肆味以麻沸湯貳升漬之須臾去滓內附子汁分溫再服
本以下之故心下痞與之瀉心其痞不解其人渴而口燥煩
小便不利者五苓散主之一方言忍之一日乃愈用上

傷寒汗出解之後胃中不和心下痞堅乾噫食臭脅下有水
氣腹中雷鳴而利生薑瀉心湯主之方

生薑肆兩

半夏半升

乾薑兩

黃連兩

人參

黃芩

甘草略炙

大棗拾枚擘

右捌味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日叁服

傷寒中風醫反下之其人下利日數拾行穀不化腹中雷鳴
心下痞堅而滿乾嘔而煩不能得安醫見心下痞為病不盡

復重下之其痞益甚此非結熱但胃中虛客氣上逆故使之
堅甘草瀉心湯主之方

甘草肆兩 黃芩

乾薑各參 黃連壹

半夏半升

大棗

拾貳枚擘

一方有人參

參兩

右陸味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日參服

傷寒服湯藥下利不止心下痞堅服瀉心湯復以他藥下之
利不止醫以理中與之而利益甚理中治中焦此利在下焦
赤石脂禹餘糧湯主之方

赤石脂壹斤

太一禹餘糧壹斤

右貳味以水陸升煮取貳升去滓分溫參服若不止當利
小便

傷寒吐下發汗虛煩脈甚微八九日心下痞堅脅下痛氣上
衝喉咽眩冒經脈動惕者久而成痿

傷寒發汗吐下解後心下痞堅噫氣不除者旋復代赭湯主之

旋復花參 人參貳 生薑伍兩 代赭壹兩 甘草參兩

半夏半升 大棗拾貳枚

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓溫服壹升日參服

太陽病外證未除而數下之遂挾熱而利不止心下痞堅表

裏不解桂枝人參湯主之

桂枝肆兩 別切甘草肆兩 白朮 人參 乾薑各貳兩

右伍味以水玖升先煮肆味取伍升去滓內桂更煮取參

升去滓溫服壹升日再夜壹服

傷寒大下後復發其汗心下痞惡寒者表未解也不可攻其

痞當先解表表解乃攻其痞宜大黃黃連瀉心湯胡上

病如桂枝證頭項不強痛脈微浮背中心下痞堅氣上衝喉咽不

得息此為首有寒當吐之宜瓜蒂散方

瓜蒂熬

赤小豆各壹

右貳味搗為散取半錢匕豉壹合湯柒合漬之須臾去滓
內散湯中和頓服之若不吐稍加之得快吐止諸亡血虛
家不可與瓜蒂散

太陽病雜療法第七

方壹拾壹首

中風發熱六七日不解而煩有表裏證渴欲飲水水入而吐
此為水逆五苓散主之筋見結悶中

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之方

桂枝兩

甘草貳兩

芍藥兩

生薑參兩

大棗拾壹

枚擘

膠飴壹升

右陸味以水柒升煮取參升去滓內飴溫服壹升嘔家不
可服以甘故也

傷寒脉浮而醫以火迫劫之亡陽驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之方

桂枝

生薑切

蜀漆

各參兩洗去腥

甘草

貳兩

牡蠣

伍兩

龍骨

貳斤

大棗

拾貳枚擘

右柒味以水捌升先煮蜀漆減貳升內諸藥煮取參升去

滓温服壹升

一法以水壹斗貳升煮取伍升

燒針令其汗針處被寒核起而赤者必發奔豚氣從少腹上衝者灸其核上一壯與桂枝加桂湯方

桂枝

伍兩

芍藥

生薑

各參兩

大棗

拾貳枚擘

右伍味以水柒升煮取參升去滓温服壹升本云桂枝湯

今加桂滿伍兩所以加桂者以能洩奔豚氣也

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之方

桂枝

壹兩

甘草

龍骨

牡蠣

各貳兩

熬

右肆味以水伍升煮取貳升去滓溫服捌合日叁服

傷寒加溫針必驚

太陽病六七日出表證續在脉微而沈反不結背其人發狂者以熱在下焦少腹堅滿小便自利者下血乃愈所以然者以太陽隨經瘀熱在裏故也宜下之以抵當湯

太陽病身黃脉沈結少腹堅小便不利者為無血小便自利其人如狂者血證諦也抵當湯主之

傷寒有熱少腹滿應小便不利今反利者為有血也當須下之不可餘藥宜抵當丸

抵當湯方

大黃貳兩破陸片

桃仁貳拾枚去皮尖熬

蟅蟲去足翅熬

水蛭各叁升各熬

右肆味以水伍升煮取叁升去滓溫服壹升不下更服

抵當丸方

大黃醃

桃仁

貳拾伍枚
去皮尖熬

蟅蟲

去足
翅熬

水蛭

各貳拾
枚熬

右肆味搗分為肆丸以水壹升煮壹丸取柒合服晡時當

下不下更服

婦人中風發熱惡寒經水適來得七八日熱除而脉遲身涼
首脅下滿如結背狀謔語此為熱入血室當刺期門隨其虛
實而取之

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱
入血室其血必結故使如瘧狀發作有時小柴胡湯主之方

柴胡湯
門

婦人傷寒發熱經水適來晝日了了暮則謔語如見鬼狀此
為熱入血室無犯胃氣及上二焦必當自愈

傷寒無大熱口燥渴而煩其背微惡寒白虎湯主之

傷寒脉浮發熱無汗其表不解不可與白虎湯渴欲飲水無表證白虎湯主之

傷寒脉浮滑此以表有熱裏有寒白虎湯主之方

知母陸兩

石膏壹斤碎

甘草貳兩炙

粳米陸合

右肆味以水壹斗煮米熟湯成去滓温服壹升日叁服

又方

知母陸兩

石膏壹斤碎

甘草貳兩炙

人參陸兩

粳米陸合

右伍味以水壹斗煮米熟湯成去滓温服壹升日叁服立夏後至立秋前得用之立秋後不可服春二月病常苦裏冷白虎湯亦不可與之與之即嘔利而腹痛諸亡血及虛家亦不可與白虎湯得之則腹痛而利但當温之

太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者與黃芩加半

夏生薑湯

黃芩湯方

黃芩參

芍藥

甘草

各貳兩

大棗

壹拾貳枚

右肆味以水壹斗煮取參升去滓温服壹升日再夜壹服

黃芩加半夏生薑湯方

半夏

半升

生薑

壹兩半切

右貳味加入前方中即是

傷寒胃中有熱胃中有和氣腹中痛欲嘔吐黃連湯主之方

黃連

甘草

炙

乾薑

桂枝

人參

各口參兩

半夏

半升

大棗

拾貳枚擘

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓温分伍服晝叁夜貳服

傷寒八九日風濕相搏身體疼煩不能自轉側不嘔不渴下

已脉浮而緊桂枝附子湯主之若其人大便堅小便自利木

附子湯主之方

桂枝兩

附子參枚

生薑參兩

大棗拾貳枚

甘草貳兩

右伍味以水陸升煮取貳升去滓分溫參服

木附子湯方於前方中去桂加白木肆兩即是壹服覺身痺

半日許復服之盡其人如冒狀勿怪即是附子木併走皮

中逐水氣未得除故使之耳法當加桂肆兩以大便堅小

便自利故不加桂也

風濕相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣

小便不利惡風不欲去衣或身微腫甘草附子湯主之方

甘草貳兩

附子貳枚

白木參兩

桂枝肆兩

右肆味以水陸升煮取參升去滓溫服壹升日參服初服

得微汗即止能食汗止復煩者將服伍合恐壹升多者

後服陸柒合愈

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方

傷寒脉結代心動悸炙甘草湯主之方

甘草肆兩桂枝

生薑略切麥門冬去心

麻子仁舂人參

阿膠略貳大棗參拾枚生地黄壹斤

右玖味以清酒柒升水捌升煮取參升去滓內膠消烺盡

溫服壹升日叁服

陽明病狀第八柒拾伍證方壹拾壹首

陽明之為病胃中寒是也

問曰病有太陽陽明有正陽陽明有微陽陽明何謂也答曰

太陽陽明者脾約是也正陽陽明者胃家實是也微陽陽明

者發其汗若利其小便胃中燥便難是也

問曰何緣得陽明病答曰太陽病發其汗若下之亡其津液

胃中乾燥因為陽明不更衣而便難復為陽明病也

問曰陽明病外證云何答曰身熱汗出而不惡寒但反惡熱

問曰病有得之一日發熱惡寒者何答曰然雖二日惡寒自

罷即汗出惡熱也曰惡寒何故自罷答曰陽明處中主土萬物所歸無所復傳故始雖惡寒二日自止是爲陽明病

太陽初得病時發其汗汗先出復不徹因轉屬陽明

病發熱無汗嘔不能食而反汗出濇濇然是爲轉在陽明

傷寒三日陽明脉大

病脉浮而緩手足溫是爲繫在太陰太陰當發黃小便自利者不能發黃至七八日而堅爲屬陽明

傷寒傳繫陽明者其人濇然後汗出

陽明中風口苦咽乾腹滿微喘發熱惡寒脉浮若緊下之則腹滿小便難也

陽明病能食爲中風不能食爲中寒

陽明病中寒不能食而小便不利手足濇然汗出此爲欲作堅痲也必頭堅後溱所以然者胃中冷水穀不別故也

陽明病初爲欲食之小便反不數大便自調其人骨節疼翁翁如有熱狀奄然發狂澼然汗出而解此爲水不勝穀氣與汗共并堅者即愈

陽明病欲解時從申盡戌

陽明病不能食下之不解其人不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也其人本虛攻其熱必噦

陽明病脈遲食難用飽飽即微煩頭眩者必小便難此欲作穀疸雖下之其腹必滿如故耳所以然者脈遲故也

陽明病久而堅者陽明病當多汗而反無汗其身如蟲行皮中之狀此爲久虛故也

冬陽明病反無汗但小便利二三日嘔而欬手足若厥者其人頭必痛若不嘔不欬手足不厥者頭不痛

冬陽明病但頭眩不惡寒故能食而欬者其人咽必痛若不

欬者咽不痛

陽明病脈浮而緊其熱必潮發作有時但浮者必盜汗出

陽明病無汗小便不利心中懊懣必發黃

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄

陽明病本自汗出醫復重發其汗病已差其人微煩不了了此大便堅也必亡津液胃中燥故令其堅當問小便日幾行若本日三四行今日再行者必知大便不久出今爲小便數少津液當還入胃中故知必當大便也

夫病陽多者熱下之則堅汗出多極發其汗亦堅

傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也

陽明病當心下堅滿不可攻之攻之遂利不止者利止者愈陽明病合色赤不可攻之必發熱色黃者小便不利也

陽明病不吐下而煩者可與承氣湯

陽明病其脉遲雖汗出不惡寒其體必重短氣腹滿而喘有潮熱如此者其外爲解可攻其裏手足濇然汗出此爲已堅承氣湯主之

若汗出多而微惡寒外爲未解其熱不潮勿與承氣湯若腹大滿而不大便者可與小承氣湯微和其胃氣勿令至大下陽明病潮熱微堅可與承氣湯不堅勿與之

若不大便六七日恐有燥屎欲知之法可與小承氣湯若腹中轉失氣者此爲有燥屎乃可攻之若不轉失氣者此但頭堅後溏不可攻之必腹脹滿不能食欲飲水者即噦其後發熱者必復堅以小承氣湯和之若不轉失氣者慎不可攻之

夫實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語是也直視譫語喘滿者

死下利者亦死

陽明病其人多汗津液外出胃中燥大便必堅堅者則譫語承氣湯主之

陽明病譫語妄言發潮熱其脉滑疾如此者承氣湯主之因與承氣湯壹升腹中轉氣者復與壹升如不轉氣者勿與之明日又不大便脉反微澀此為裏虛為難治不得復與承氣湯

陽明病譫語有潮熱反不能食者必有燥屎五六枚若能食者但堅耳承氣湯主之

陽明病下血而譫語者此為熱入血室但頭汗出者當刺期門隨其實而寫之澱然汗出者則愈

汗出而譫語者有燥屎在胃中此風也過經乃可下之若早語言必亂以表虛裏實下之則愈宜承氣湯

傷寒四五日脉沈而喘滿沉為在裏而反發其汗津液越出大便為難表虛裏實又則讖語

陽明病下之心中懊懷而煩胃中有燥屎者可攻其人腹微滿頭堅後溏者不可下之有燥屎者宜承氣湯

病者五六日不大便繞臍痛躁煩發作有時此為有燥屎故使不大便也

病者煩熱汗出即解復如瘧狀日晡所發者屬陽明脉實者當下之脉浮虛者當發其汗下之宜承氣湯發汗宜桂枝湯

方見桂枝湯門

大下後六七日不大便煩不解腹滿痛者此有燥屎所以然者本有宿食故也宜承氣湯

病者小便不利大便乍難乍易時有微熱怫鬱不能卧有燥屎故也宜承氣湯

得病二三日脉弱無太陽柴胡證而煩心下堅至四日雖能食以小承氣湯少與微和之令小安至六日與承氣湯壹升不大便六七日小便少者雖不大便但頭堅後溏未定成其堅攻之必溏當須小便利定堅乃可攻之宜承氣湯
傷寒七八日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者此為實急下之宜承氣湯

陽明病發熱汗多者急下之宜承氣湯
發汗不解腹滿痛者急下之宜承氣湯
腹滿不減減不足言當下之宜承氣湯

陽明與少陽合病而利脉不負者為順滑而數者有宿食宜承氣湯

方並見承氣湯門

陽明病脉浮緊咽乾口苦腹滿而喘發熱汗出不惡寒反偏惡熱其身體重發汗即躁心中憤憤而反譫語加溫針必怵

惕又煩躁不得眠下之胃中空虛客氣動膈心中懊懷舌上胎者梔子湯主之

陽明病下之其外有熱手足温不結背心中懊懷若飢不能食但頭汗出梔子湯主之方

梔子拾肆枚擘

香豉綿裹

右貳味以水肆升先煮梔子取貳升半内豉煮取壹升半去滓分再服温進壹服得快吐止後服

三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁言語向經譫語遺尿發汗則譫語下之則額上生汗手足厥冷白虎湯主之按諸本皆

云向經不

若渴欲飲水口乾舌燥者白虎湯主之方見雜

若脉浮發熱渴欲飲水小便不利猪苓湯主之方

猪苓去黑皮

茯苓

澤瀉

阿膠

滑石碎各壹兩

右伍味以水肆升先煮肆味取貳升去滓內膠烱消溫服
柴合日參服

陽明病汗出多而渴者不可與猪苓湯以汗多胃中燥猪苓
湯復利其小便故也

胃中虛冷其人不能食者飲水即噦

脉浮發熱口乾鼻燥能食者即衄

若脉浮遲表熱裏寒下利清穀四逆湯主之方

甘草續兩

乾薑壹兩

附子壹枚

生法
皮破捌片

右參味以水參升煮取壹升貳合去滓分溫再服強人可
大附子壹枚乾薑叁兩

陽明病發潮熱大便溏小便自可而曾脅滿不去小柴胡湯
主之

陽明病脅下堅滿不大便而嘔舌上胎者可以小柴胡湯上

焦得通津液得下胃氣因和身灑然汗出而解

陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿脅下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗其人嗜卧一身及目悉黃小便難有潮熱時時噦耳前後腫刺之小差外不解病過十日脉續浮與小柴胡湯但浮無餘證與麻黃湯不溺腹滿加噦不治湯觀脉陽明病其脉遲汗出多而微惡寒表為未解可發汗且桂枝湯

陽明病脉浮無汗其人必喘發汗即愈宜麻黃湯助並上

陽明病汗出若發其汗小便自利此為內竭雖堅不可攻當須自欲大便宜蜜煎導而通之若土瓜根猪膽汁皆可以導

方 蜜柒合

右壹味內銅器中微火煎之稍凝如飴狀攪之勿令焦著欲可丸捻如指許長貳寸當熱時急作令頭銳以內穀道

中以手急抱欲大便時乃去之

又方

大猪膽壹枚瀉汁和少法醋以灌穀道中如一食頃當大便出宿食惡物已試甚良

陽明病發熱而汗出此為熱越不能發黃也但頭汗出其身無有齊頸而還小便不利渴引水漿此為瘀熱在裏身必發黃茵陳湯主之

傷寒七八日身黃如橘小便不利其腹微滿茵陳湯主之 **方**

茵陳陸

梔子

拾肆枚

大黃貳兩

右參味以水壹斗貳升先煮茵陳減陸升內貳味煮取三升去滓分溫參服小便當利溺如皂莢沫狀色正赤壹宿黃從小便去

陽明證其人喜忘必有畜血所以然者本有久瘀血故令喜

志雖堅大便必黑抵當湯主之

病者無表裏證發熱七八日雖脉浮數可下之假令下已脉

數不解而合熱消穀喜飢至六七日不大便者有瘀血抵當

湯主之若數不解而下不止必挾熱便膿血方見雜

食穀而嘔者屬陽明茱萸湯主之方

吳茱萸壹升 人參叁兩 生薑陸兩 大棗拾貳枚

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服柒合日叁服得湯

反劇者屬上焦也

陽明病寸口緩關上小浮尺中弱其人發熱而汗出復惡寒

不嘔但心下痞此為醫下之也若不下其人復不惡寒而渴

者為轉屬陽明小便數者大便即堅不更衣十日無所苦也

渴欲飲水者但與之當以法救渴宜五苓散方見瘵

脉陽微而汗出少者為自如汗出多者為太過太過者陽絕

於內亡津液大便因堅

脈浮而芤浮為陽芤為陰浮芤相搏胃氣則生熱其陽則絕
跌陽脈浮而澀浮則胃氣強澀則小便數浮澀相搏大便即
堅其脾為約麻子仁丸主之方

麻子仁熇升去皮芍藥

枳實熇各大黃熇

厚朴熇

杏仁熇升去皮別作脂

右陸味蜜和丸如梧桐子大飲服拾圓日參服漸加以知
為度

傷寒發其汗則身目為黃所以然者寒濕相搏在裏不解故
也傷寒其人發黃梔子蘘皮湯主之方

梔子拾伍

甘草

黃蘘拾伍

右參味以水肆升煮取貳升去滓分溫再服

傷寒瘵熱在裏身體必黃麻黃連翹赤小豆湯主之方

麻黃去節 連翹各壹兩 杏仁叁兩 煨煨 赤小豆一升

大棗拾貳枚 生梓白皮切壹兩 甘草二兩

一方生薑兩

右柒味以水壹斗煮麻黃壹貳沸去上沫內諸藥煮取叁升去滓温服壹升

少陽病狀第九 玫瑰

少陽之為病口苦咽乾目眩也

少陽中風兩耳無所聞目赤脅中滿而煩不可吐下吐則

悸而驚

傷寒病脉弦細頭痛而發熱此為屬少陽少陽不可發汗發

汗則譫語為屬胃胃和即愈不和煩而悸

太陽病不解轉入少陽脅下堅滿乾嘔不能食飲往來寒熱

而未吐下其脉沈緊可與小柴胡湯若已吐下發汗温針

譚語柴胡證罷此爲壞病知犯何逆以法治之

三陽脉浮大上関上但欲寐目合則汗

傷寒六七日無大熱其人躁煩此爲陽去入陰故也

傷寒三日三陽爲盡三陰當受其邪其人反能食而不嘔此

爲三陰不受其邪

傷寒三日少陽脉小欲已

少陽病欲解時從寅盡辰

千金翼方卷第九

人言其大矣

此其所以為難者也

謝安之曰少卿神小也

謝三金不受其財

謝安之曰三卿為甚三金當受其財其人又謂金而不取也

謝安之曰甘與大燔其入無餘也

謝安之曰天土陵土田為其自合限也

謝安之曰民之難也



千金翼方卷第十

傷寒下

太陰病狀第一

捌證方貳首

太陰之為病腹滿吐食不下下之益甚時腹自痛宜下堅結

太陰病脉浮可發其汗

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長為欲愈

太陰病欲解時從亥盡丑

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也當溫之宜四逆輩

傷寒脉浮而緩手足溫是為繫在太陰太陰當發黃小便自

利利者不能發黃至七八日雖煩暴利十餘行必自止所以

自止者脾家實腐穢當去故也

本太陽病醫反下之因腹滿時痛為屬太陰桂枝加芍藥湯

主之其實痛加大黃湯主之方

桂枝陸

芍藥陸

生薑陸

甘草陸

大棗陸

右伍味以水柒升煮取叁升去滓分温叁服

加大黃湯方

大黃陸

右於前方中加此大黃貳兩即是

人無陽證脉弱其人續自便利設當行大黃芍藥者減之其人胃氣弱易動故也

少陰病狀第二

四拾伍證
方壹拾陸首

少陰之為病脉微細但欲寐

少陰病欲吐而不煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰虛故引水自救小便白者少陰病形悉具其人小便白者下焦虛寒不能制溲故白也夫病其脉陰陽俱緊而反汗出為陽屬少陰法當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利譫語是爲被火氣劫故也小便必難爲強責少陰汗也

少陰病脉細沈數病在裏不可發其汗

少陰病脉微不可發其汗無陽故也陽已虛尺中弱澀者復不可下之

少陰病脉緊者至七八日下利其脉暴微手足反溫其脉緊反去此爲欲解雖煩下利必自愈

少陰病下利若利止惡寒而蹇手足溫者可治

少陰病惡寒而蹇時自煩欲去其衣被不可治

少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈

少陰病欲解時從子盡寅

少陰病八九日而一身手足盡熱熱在膀胱必便血

少陰病其人吐利手足不逆反發熱不死脉不足者灸其少

陰七壯

少陰病但厥無汗強發之必動血未知從何道出或從口鼻

目出是為下厥上竭為難治

少陰病惡寒踈而利手足逆者不治

少陰病下利止而眩時時自冒者死

少陰病其人吐利躁逆者死

少陰病四逆惡寒而踈其脈不至其人不煩而躁者死

少陰病六七日其息高者死

少陰病脈微細沈但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利

復煩燥不得卧寐者死

少陰病始得之反發熱脈反沈者麻黃細辛附子湯主之方

麻黃貳兩去節

細辛貳兩

附子壹枚炮去皮破八片

右參味以水貳斗先煮麻黃減壹升去上沫內諸藥煮取

三升去滓溫服一升

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無證故微發汗方

麻黃二兩去節

附子一枚炮去皮破八片甘草二兩炙

右三味以水七升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取二升半去滓溫服八合

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧者黃連阿膠湯主之方

黃連四兩

黃芩一兩

芍藥二兩

雞子黃一枚

阿膠三挺

右五味以水六升先煮三味取二升去滓內膠烊盡內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之方

附子 二枚炮去皮破八片 茯苓 三兩 人參 二兩

白朮 四兩 芍藥 三兩

右五味以水八升煮取三升去滓分溫三服

少陰病下利便膿血桃花湯主之

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利不止而便膿血者

以桃花湯主之方

赤石脂 一斤 一半

乾薑 一兩 粳米 一升

右三味以水七升煮米熟湯成去滓溫取七合內赤石脂

末一方寸匕一服止餘勿服

少陰病下利便膿血者可刺

少陰病吐利手足逆煩躁欲死者茱萸湯主之方方見陽

少陰病下利咽痛背滿心煩猪膚湯主之方

猪膚一斤

右壹味以水壹斗煮取五升去滓内白蜜壹升白粉五合熬香和令相得温分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差可與桔梗湯方

甘草

右壹味以水叁升煮取壹升半去滓温服七合日再服

桔梗湯方

桔梗一大枚 甘草二兩

右貳味以水叁升煮取壹升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出苦酒湯主之方

雞子

壹枚去黃内好上啣酒於殼中

半夏

洗破如棗核十四枚

右貳味内半夏著苦酒中以雞子殼置刀環中安火上令

三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑愈

少陰病咽中痛半夏散及湯方

半夏洗

桂枝

甘草炙

右參味等分各異擣合治之白飲和服方寸匕日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩方寸匕更煮三沸下火令小冷少少含嚥之半夏有毒不當散服

少陰病下利白通湯主之方

附子

壹枚生去皮破八片乾薑一兩

葱白

四莖

右參味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

少陰病下利脉微服白通湯利不止厥逆無脉乾煩者白通

加猪膽汁湯主之方

猪膽汁

一合人尿五合

右貳味內煎湯中和令相得溫分再服若無膽亦可用服

湯脉暴出者死微續者生

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沈重疼

痛而利此為有小氣其人或欬或小便不利或下利或嘔玄武湯主之方

茯苓

芍藥

生姜

略白朮

附子

壹枝炮去皮破

剝片

右伍味以水捌升煮取叁升去滓溫服柒合欬者加伍味子半升細辛壹兩乾薑壹兩小便自利者去茯苓下利者去芍藥加乾薑貳兩嘔者去附子加生薑足前為半斤利不止便膿血者宜桃花湯

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反惡寒其人面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或利止而脈不出通脈四逆湯主之方

甘草

貳兩

附子

大者壹枚生去皮破剝片

乾薑

叁兩強人可肆兩

右叁味以水叁升煮取壹升貳合去滓分溫再服其脈即出者愈面赤者加葱白九莖腹痛者去葱加芍藥貳兩嘔

者加生薑貳兩咽痛者去芍藥加桔梗壹兩利止脉不出者去桔梗加人參貳兩病皆與方相應者乃加減服之少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或洩利下重四逆散主之方

甘草灸

枳實灸

柴胡

芍藥各拾

右肆味搗為散白飲和服方寸匕日叁服欬者加五味子乾薑各伍分兼主利悸者加桂伍分小便不利者加茯苓伍分腹中痛者加附子壹枚炮洩利下重者先以水伍升煮薤白三升取二升去滓以散三方寸匕內湯中煮取一升半分温再服

少陰病不利六七日欬而嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之方

陽明門

少陰病得之二三日口燥咽乾急下之宜承氣湯

少陰病利清水色青者心下必痛口乾燥者可下之宜承氣

湯柴胡一大

少陰病六七日腹滿不大便者急下之宜承氣湯方見承氣中

少陰病其脈沈者當溫之宜四逆湯

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之

手足寒脈弦遲此胃中實不可下也當逐吐之若膈上有

寒飲乾嘔者不可吐當溫之宜四逆湯方見陽明

少陰病下利脈微澀者即嘔汗者必數更衣反少當溫其上

灸之陰一云灸厥陰伍拾壯

厥陰病狀第三伍拾陸證方柒首

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食甚者則欲

吐衄下之不肯止

厥陰中風其脈微浮為欲愈不浮為未愈

厥陰病欲解時從丑盡卯

厥陰病渴欲飲水者與水飲之即愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

傷寒先厥後發熱而利者必止見厥復利

傷寒始發熱六日厥反九日而下利厥利當不能食今反能食恐爲除中食之黍餅不發熱者知胃氣尚在必愈恐暴熱來出而復去也後日脈之其熱續在期之旦日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日復發熱二日并前六日亦爲九日與厥相應故期之旦日夜半愈後三日脈之數其熱不罷此爲熱氣有餘必發癰膿

傷寒脈遲六七日而反與黃芩湯徹其熱脈遲爲寒與黃芩湯復除其熱腹中冷當不能食今反能食此爲除中必死傷寒先厥發熱下利必自止而反汗出咽中強痛其喉爲痺

發熱無汗而利必自止便膿血便膿血者其喉不痺

傷寒一二日至四五日厥者必發熱前厥者後必熱厥深熱

亦深厥微熱亦微厥應下之而發其汗者口傷爛赤

凡厥者陰陽氣不相順接便為厥厥者手足逆者是

傷寒病厥五日熱亦五日設六日當復厥不厥者自愈厥不

過五日以熱五日故知自愈

傷寒脉微而厥至七八日膚冷其人躁無安時此為藏寒虵

上入其膈虵厥者其人當吐虵令病者靜而復時煩此為

藏寒虵上入其膈故煩須臾復止得食而嘔又煩者虵聞

食臭必出其人常自吐虵虵厥者烏梅丸主之方又主

烏梅參百

細辛陸

乾薑拾

黃連拾陸

當歸肆

蜀椒肆兩

汗兩

附子陸兩

桂枝陸兩

人參陸兩

黃蘗陸兩

右壹拾味異擣合治之以苦酒漬烏梅一宿去核蒸之伍

斗米下擣成泥和諸藥令相得曰中與蜜杵千下丸如梧
桐子大先食飲服拾九日參服少少加至貳拾九禁生冷
滑物臭食等

傷寒熱少微厥稍頭寒嘿嘿不欲食煩躁數日小便利色白
者熱除也得食其病為愈若厥而嘔者煩滿其後必便

血

稍頭一作指頭

病者手足厥冷言我不結者少腹滿按之痛此冷結在膀胱
關元也

傷寒發熱四日厥反三日復發熱四日厥少熱多其病當愈
四日至六七日不除必便膿血

傷寒厥四日熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣
退故為進

傷寒六七日其脈數手足厥煩躁陰厥不還者死

傷寒下利厥逆躁不能卧者死

傷寒發熱下利至厥不止者死

傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無

陽故也

傷寒五六日不結胸腹濡脈虛復厥者不可下之下之亡血死

傷寒發熱而厥七日下利者為難治

傷寒脈促手足厥逆者可灸之

傷寒脈滑而厥者其表有熱白虎湯主之表熱見裏方見雜療中

手足厥寒脈為之細絕當歸四逆湯主之方

當歸兩參

桂心兩參

細辛兩參

芍藥兩參

甘草兩參

通草兩參

大棗兩參 擘

右柒味以水捌升煮取參升去滓温服壹升日參服

若其人有寒當歸四逆加吳茱萸生薑湯主之方

吳茱萸 貳兩

生薑 捌兩

右前方中加此貳味以水肆升清酒肆升和煮取參升去

滓分溫肆服

大汗出熱不去拘急四肢疼若下利厥而惡寒四逆湯主之

大汗出若火下利而厥四逆湯主之 陽明

病者手足逆冷脈乍緊者邪結在胃中心下滿而煩飢不能

食病在胃中當吐之宜瓜蒂散 方見療

傷寒厥而心下悸先治其水當與茯苓甘草湯却治其厥不

爾其水入胃必利茯苓甘草湯主之 方

茯苓 兩 甘草 兩 桂枝 兩 生薑 兩

右肆味以水肆升煮取貳升去滓分溫參服

傷寒六七日其人大下後脈沈遲手足厥逆下部脈不至咽

喉不利唾膿血洩利不止為難治麻黃升麻湯主之 方

麻黃去節 兩半

知母括捌

菱莖拾捌

黃芩拾捌

升麻

壹兩 陸銖

當歸

壹兩 陸銖

芍藥

桂枝

石膏

碎綿

乾薑

白朮

茯苓

麥門冬法

甘草

陸銖

右壹拾肆味以水壹斗先煮麻黃貳沸去上沫內諸藥煮取參升去滓分溫叁服壹炊間當汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趣少腹為欲自利

傷寒本自寒下醫復吐之而寒格更逆吐食入即出乾薑黃

苓黃連人參湯主之

乾薑

黃苓

黃連

人參各叁兩

右肆味以水陸升煮取貳升去滓分溫再服

下利有微熱其人渴脉弱者自愈

下利脉數若微發熱汗出者自愈設脉復緊為未解

下利手足厥無脉灸之不溫反微喘者死少陰負趺陽者為

順

下利脉反浮數尺中自澀其人必清膿血

下利清穀不可攻其表汗出必脹滿

下利脉沈弦者下重其脉大者為未止脉微弱數者為欲自止雖發熱不死

下利脉沈而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必鬱冒汗

出而解其人微厥所以然者其面戴陽下虛故也

下利脉反數而渴者今自愈設不差必清膿血有熱故也

下利後脉絕手足厥時脉還手足温者生不還者死

傷寒下利日十餘行其人脉反實者死

下利清穀裏寒外熱汗出而厥通脉四逆湯主之方見少陰門

熱利下重白頭翁湯主之

下利欲飲水者為有熱白頭翁湯主之方

白頭翁

貳兩

黃蘗

參兩

黃連

參兩

秦皮

參兩

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服壹升不差更服

下利腹滿身體疼痛先温其裏乃攻其表温裏宜四逆湯攻

表宜桂枝湯

方並見上

下利而譫語為有燥屎小承氣湯主之

方見承氣門

下利後更煩按其心下濡者為虛煩也梔子湯主之

方見陽明門

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

嘔而發熱小柴胡湯主之

方見柴胡門

嘔而脉弱小便復利身有微熱見厥難治四逆湯主之

方見陽明門

乾嘔吐涎沫而復頭痛吳茱萸湯主之

方見陽明門

傷寒大吐下之極虛復極汗者其人外氣怫鬱復與其水以

發其汗因得噦所以然者胃中寒冷故也

傷寒噦而滿者視其前後知何部不利利之則愈

傷寒宜忌第四十五章

忌發汗第一

少陰病脉細沈數病在裏忌發其汗

脉浮而緊法當身體疼痛當以汗解假令尺中脉遲者忌發

其汗何以知然此爲榮氣不足血氣微少故也

少陰病脉微忌發其汗無陽故也

咽中閉塞忌發其汗發其汗即吐血氣微絕逆冷

厥忌發其汗發其汗即聲亂咽嘶舌萎

太陽病發熱惡寒寒多熱少脉微弱則無陽也忌復發其汗

咽喉乾燥者忌發其汗

亡血家忌攻其表汗出則寒慄而振

衄家忌攻其表汗出必額上促急

汗家重發其汗必恍惚心亂小便已陰疼

淋家忌發其汗發其汗必便血

瘡家雖身疼痛忌攻其表汗出則瘡

冬時忌發其汗發其汗必吐利口中爛生瘡效而小便利若

失小便忌攻其表汗則厥逆冷

太陽病發其汗因致瘧

宜發汗第二

大法春夏宜發汗

凡發汗欲令手足皆周漉漉一時間益佳不欲流離若病不

解當重發汗汗多則亡陽陽虛不得重發汗也

凡服湯藥發汗中病便止不必盡劑也

凡云宜發汗而無湯者丸散亦可用然不如湯藥也

凡脉浮者病在外宜發其汗

太陽病脉浮而數者宜發其汗

陽明病脉浮虛者宜發其汗

陽明病其脉遲汗出多而微惡寒者表爲未解宜發其汗

太陰病脉浮宜發其汗

太陽中風陽浮而陰濡弱浮者熱自發濡弱者汗自出漉漉惡寒淅淅惡風翕翕發熱臯鳴乾嘔桂枝湯主之

太陽頭痛發熱身體疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘麻黃湯主之

太陽中風脉浮緊發熱惡寒身體疼痛不汗出而煩躁大青龙湯主之

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗

忌吐第三

太陽病惡寒而發熱今自汗出反不惡寒而發熱關上脉細而數此吐之過也

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之
手足寒脉弦運若膈上有寒飲乾嘔忘吐當溫之
諸四逆病厥忘吐虛家亦然

宜吐第四

大法春宜吐

凡服吐湯中病便止不必盡劑也

病如桂枝證其頭項不強痛寸口脉浮胃中痞堅上撞咽喉
不得息此爲有寒宜吐之

病胃上諸實胃中鬱鬱而痛不能食欲使人按之而反有涎
唾下利日十餘行其脉反遲寸口微滑此宜吐之利即止
少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐宜吐之
病者手足逆冷脉乍緊邪結在胃中心下滿而煩飢不能食
病在胃中宜吐之

宿食在上管宜吐之

忌下第五

咽中閉塞忌下下之則上輕下重水漿不下諸外實忌下下之皆發微熱亡脉則斃

諸虛忌下下之則渴引水易愈惡水者劇

脉數者忌下下之必煩利不止

尺中弱澀者復忌下

脉浮大醫反下之此爲大逆

太陽證不罷忌下下之爲逆

結胸證其脉浮大忌下下之即死

太陽與陽明合病喘而背滿者忌下

太陽與少陽合病心下痞堅頸項強而眩忌下

凡四逆病斃者忌下虛家亦然

病欲吐者忌下

病有外證未解忌下下之爲逆

少陰病食入即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒
脉弦遲此皆中實忌下

傷寒五六日不結胸腹濡脉虛復厥者忌下下之亡血則死

宜下第六

大法秋宜下

凡宜下以湯勝丸散

凡服湯下中病則止不必盡叁服

陽明病發熱汗多者急下之

少陰病得之二三日口燥咽乾者急下之

少陰病五六日腹滿不大便者急下之

少陰病下利清水色青者心下必痛口乾者宜下之

下利三部脈皆浮按其心下堅者宜下之
下利脈遲而滑者實也利未欲止宜下之

陽明與少陽合病利而脈不負者為順脈數而滑者有宿食
宜下之

問曰人病有宿食何以別之荅曰寸口脈浮大按之反澀尺
中亦微而澀故知有宿食宜下之

下利不欲食者有宿食宜下之

下利差至其時復發此為病不盡宜復下之

凡病腹中滿痛者為寒宜下之

腹滿不減減不足言宜下之

傷寒六七日目中不了了睛不和無表裏證大便難微熱者
此為實急下之

脈雙弦而遲心下堅脈大而緊者陽中有陰宜下之

傷寒有熱而少腹滿應小便不利今反利此爲血宜下之
病者煩熱汗出即解復如瘧日晡所發者屬陽明脈實者當
下之

宜溫第七

大法冬宜服溫熱藥

師曰病發熱頭痛脈反沈若不差身軀更疼痛當救其裏宜
溫藥四逆湯

下利腹脹滿身軀疼痛先溫其裏宜四逆湯

下利脈遲緊爲痛未欲止宜溫之

下利脈浮大者此爲虛以強下之故也宜溫之與水必噦

少陰病下利脈微澀嘔者宜溫之

自利不渴者屬太陰其藏有寒故也宜溫之

少陰病其人飲食入則吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之

手足寒脉弦遲若膈上有寒飲乾嘔宜溫之
少陰病脉沈者宜急溫之

下利欲食者宜就溫之

忌火第八

傷寒加火針必驚

傷寒脉浮而醫以火迫劫之亡陽必驚狂卧起不安

傷寒其脉不弦緊而弱弱者必渴被火必譫語

太陽病以火熏之不得汗其人必躁到經不解必清血

陽明病被火額上微汗出而小便不利必發黃

少陰病效而下利譫語是為被火氣劫故也小便必難為強

責少陰汗也

宜火第九

凡下利穀道中痛宜灸枳實若熬鹽等熨之

忌灸第十

微數之脈慎不可灸因火為邪則為煩逆

脈浮當以汗解而反灸之邪無從去因火而盛病從畧以下必重而痺此為火逆

脈浮熱甚而反灸之此為實實以虛治因火而動咽燥必唾血

宜灸第十一

少陰病一二日口中和其背惡寒宜灸之

少陰病吐利手足逆而脈不足灸其少陰七壯

少陰病下利脈微澀者即嘔汗者必數更衣反少者宜溫其

上灸之一云灸厥陰伍拾壯

下利手足厥無脈灸之主厥厥陰是也灸不溫反微喘者死

傷寒六七日其脈微手足厥煩躁灸其厥陰厥不還者死

脉從手足厥者宜灸之

忌刺第十二

大怒無刺

新内無刺

大勞無刺

大醉無刺

大飽無刺

大渴無刺

大驚無刺

無刺熇熇之

熱無刺淥淥之汗無刺渾渾之脉無刺病與脉相逆者

上工刺未生其次刺未盛其次刺其衰工逆此者是謂伐形

宜刺第十三

太陽病頭痛至七日自當愈其經竟故也若欲作再經者宜

刺足陽明使經不傳則愈

太陽病初服桂枝湯而反煩不解宜先刺風池風府乃却與

桂枝湯則愈

傷寒腹滿而譫語寸口脉浮而緊者此為肝乘脾名曰縱宜

刺期門

傷寒發熱漉漉惡寒其人太渴欲飲截漿者其腹必滿而自汗出小便利其病欲解此爲肝乘肺名曰橫宜刺期門陽明病下血而譫語此爲熱入血室但頭汗出者刺期門隨其實而寫之

太陽與少陽合病心下痞堅頸項強而眩宜刺大椎肺俞肝俞勿下之

婦人傷寒懷身腹滿不得小便加從腰以下重如有水氣狀懷身七月太陰當養不養此心氣實宜刺寫勞宮及關元小便利則愈

傷寒喉痺刺手少陰穴在腕當小指後動脈是也針入叁分補之

少陰病下利便膿血者宜刺

忌水第十四

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

下利其脉浮大此為虛以強下之故也設脉浮革因爾腸鳴

當溫之與水必噦

太陽病小便利者為水多心下必悸

宜水第十五

太陽病發汗後若大汗出胃中乾燥煩不得眠其人欲飲水

當稍飲之令胃氣和則愈

厥陰渴欲飲水與水飲之即愈

嘔而吐膈上者必思煮餅急思水者與五苓散飲之水亦得也

發汗吐下後病狀第五 參拾證 方壹拾伍首

發汗後水藥不得入口為逆

未持脉時病人手自冒心師因教試令效而不即效者此必兩耳無所聞也所以然者重發其汗虛故也

發汗後身熱又重發其汗胃中虛冷必反吐也

大下後發汗其人小便不利此亡津液勿治其小便利必自

愈

病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者以醫發其汗陽氣

微膈氣虛脉則為數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐

也

病者有寒復發其汗胃中冷必吐衄

吐逆云

發汗後重發其汗亡陽譫語其脉反和者不死服桂枝湯汗

出大煩渴不解若脉洪大與白虎湯

方見雜

發汗後身躄疼痛其脉沈遲桂枝加芍藥生薑人參湯主之

方

桂枝

芍藥

生薑

甘草

大棗

拾貳枚擘

人參

右陸味以水壹斗貳升煮取參升去滓温服壹升本云桂

枝湯令加芍藥生薑人參

太陽病發其汗而不解其人發熱心下悸頭眩身潤而動振

振欲擗地者玄武湯主之方見少陰門

發汗後其人齊下悸欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯主之

方 茯苓半斤 桂枝肆兩 甘草壹兩 大棗拾伍枚擘

右肆味以水壹斗先煮茯苓減貳升內諸藥煮取叁升去

滓溫服壹升日叁服

發汗過多以後其人叉手自冒心心下悸而欲得按之桂枝

甘草湯主之**方**

桂枝四兩 甘草貳兩

右貳味以水叁升煮取壹升去滓頓服即愈

發汗脈浮而數復煩者五苓散主之方見中經

發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘草人參湯主之**方**

厚朴

半斤

生薑

半斤

半夏

半升

甘草

貳兩

人參

壹兩

右伍味以水壹斗煮取叁升去滓温服壹升日叁服

發其汗不解而反惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之

芍藥

甘草

各叁兩

附子

壹枚炮去皮破六片

右叁味以水叁升煮取壹升貳合去滓分温叁服

不惡寒但熱者實也當和其胃氣宜小承氣湯

承氣湯

傷寒脉浮自汗出小便數煩復微惡寒而脚攣急反與桂枝

欲攻其表得之便厥咽乾煩躁吐逆當作甘草乾薑湯以

復其陽厥愈足温更作芍藥甘草湯與之其脚即伸而胃

氣不和可與承氣湯重發汗復加燒針者四逆湯主之甘

草乾薑湯

方

甘草

四兩

乾薑

貳兩

右貳味以水參升煮取壹升去滓分溫再服

芍藥甘草湯方

芍藥

甘草四兩

右貳味以水參升煮取壹升半去滓分溫再服

凡病若發汗若吐若下若亡血無津液而陰陽自和者必自

愈

傷寒吐下發汗後心下逆滿氣上撞胃起即頭眩其脈沈緊

發汗即動經身為振搖茯苓桂枝白木甘草湯主之方

茯苓四兩

桂枝兩

白木

甘草貳兩

右肆味以水陸升煮取參升去滓分溫參服

發汗吐下以後不解煩躁茯苓四逆湯主之方

茯苓四兩

人參兩

甘草兩

乾薑壹兩

附子壹枚

生去皮破八片

右伍味以水伍升煮取貳升去滓溫服柒合日參服

發汗吐下後虛煩不得眠劇者反覆顛倒心中懊懣梔子湯
主之若少氣梔子甘草湯主之若嘔者梔子生薑湯主之

梔子湯方
見陽明門

梔子甘草湯方

於梔子湯中加甘草貳兩即是

梔子生薑湯方

於梔子湯中加生薑伍兩即是

傷寒下後煩而腹滿卧起不安梔子厚朴湯主之方

梔子拾肆
枚擘

厚朴肆兩

枳實肆枚

右參味以水參升半煮取壹升半去滓分貳服温進壹服

快吐止後服

下以後發其汗必振寒又其脉微細所以然者內外俱虛故也

發汗若下之煩熱背中空者屬梔子湯證

下以後復發其汗者則晝日煩躁不眠夜而安靜不嘔不渴而無表證其脉沈微身無大熱屬附子乾薑湯方

附子壹枚生去皮破剝片 乾薑壹兩

右貳味以水參升煮取壹升去滓頓服即安

太陽病先下而不愈因復發其汗表裏俱虛其人因冒冒家當汗出自愈所以然者汗出表和故也表和故下之

傷寒醫以丸藥太下後身熱不去微煩施子乾薑湯主之方

施子拾肆枚擘 乾薑兩

右貳味以水參升半煮取壹升半去滓分貳服温進壹服得快吐止後服

脉浮數法當汗出而愈而下之則身體重心悸者不可發其汗當自汗出而解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津液自和自汗出愈

發汗以後不可行桂枝湯汗出而喘無大熱與麻黃杏子石

膏甘草湯

麻黃

肆兩 去節杏仁 伍拾枚 去皮

石膏

半斤 碎甘草 貳兩

右肆味以水柒升先煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮取

叁升去滓溫服壹升本云黃耳杯

傷寒吐下後七八日不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大

渴舌上

乾燥而煩欲飲水數升白虎湯主之

方見雜 療中

傷寒吐下後未解不大便五六日至十餘日其人日晡所發

潮熱不惡寒猶如見鬼神之狀劇者發則不識人循衣妄

掇怵惕不安微喘直視脉弦者生澀者死微者但發執謔

語與承氣湯若下者勿復服

大下後口燥者裏虛故也

霍亂病狀第六

壹拾貳 方參首

問曰病有霍亂者何也答曰嘔吐而利此為霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼痛惡寒而復吐利當屬何病答

曰當為霍亂霍亂吐下利止復更發熱也

傷寒其脉微澀本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若其人即欲大便但反失氣而不利者是為屬陽明必堅十二日愈所以然者經竟故也

下利後當堅堅能食者愈今反不能食到後經中頗能食復一經能食過之一日當愈若不愈不屬陽明也惡寒脉微而復利利止必亡血四逆加人參湯主之

四逆湯中加人參壹兩即是

霍亂而頭痛發熱身體疼痛熱多欲飲水五苓散主之寒多不用水者理中湯主之

方 五苓散見
結骨門

人參

乾薑

甘草炙

白木各參

右肆味以水捌升煮取參升去滓溫服壹升日參服齊上
築者爲腎氣動去木加桂肆兩吐多者去木加生薑參兩
下利多者復用木悻者加茯苓貳兩渴者加木至肆兩半
腹中痛者加人參至肆兩半寒者加乾薑至肆兩半腹滿
者去木加附子壹枚服藥後如食湏飲熱粥壹升微自溫
暖勿發揭衣被壹方蜜和丸如雞黃許大以沸湯數合和
壹丸研碎溫服日參夜貳腹中未熱益至參肆丸然不及湯
吐利止而身體痛不休當消息和解其外宜桂枝湯小和之
吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥四逆湯主之既吐且
利小便復利而大汗出下利清穀裏寒外熱脈微欲絕四
逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢不解脈微欲絕通脈四逆加豬膽

湯主之方

於通脉四逆湯中加猪膽汁半合即是服之其脉即出
無猪膽以羊膽代之

吐利發汗其人脉平而小煩此新虛不勝穀氣故也

陰易病已後勞復第七附熾熾方四首

傷寒陰易之為病身躄重少氣少腹裏急或引陰中拘攣熱
上衝肯頭重不欲舉眼中生花痲胞赤膝脛拘急燒禪散主
之方

婦人裏禪近隱處燒灰

右壹味水和服方寸匕日叁小便即利陰頭微腫此為愈
大病已後勞復枳實梔子湯主之方

枳實參枚

豉續煎

梔子拾肆枚

右叁味以酢漿菜升先煎取肆升次內貳味煮取貳升內

豉煮五六沸去滓分温再服若有宿食內大黃如博棊子
大五六枚服之愈

傷寒差已後更發熱小柴胡湯主之脉浮者以汗解之脉沈

實一作緊者以下解之

大病已後腰以下有水氣牡蠣澤瀉散主之方

牡蠣熬

澤瀉

蜀漆洗

商陸

葶藶熬

海藻洗

栝樓根各等分

右柒味擣為散飲服方寸匕日參服小便即利

傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹葉石膏湯主之方

竹葉膩

半夏洗升 麥門冬壹升去心

甘草炙

人參各貳兩 石膏壹斤碎 粳米半升

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓內粳米熟湯成温服壹

升日參服

大病已後其人喜唾久久不了肯上有寒當溫之宜理中丸
病人脈已解而日暮微煩者以病新差人強與穀脾胃氣尚
弱不能消穀故令微煩損穀即愈

雜方附

華佗曰時病差後七日內酒肉五辛油麪生冷醋滑房室皆
斷之永差

書生丁季受殺鬼丸方

虎頭骨多丹砂

真珠

雄黃

雌黃

鬼臼 曾青

女青

皂莢去皮桔梗

蕪荑 白芷

芎藭

白朮

鬼箭削取皮

鬼督郵 藜蘆

昌蒲以上各貳兩

右壹拾捌味擣篩蜜和如彈丸大帶之男左女右

劉次卿彈鬼丸方

雄黃

丹砂各貳兩

石膏肆兩

烏頭

鼠負各壹兩

右伍味以正月建除日執厭日亦得擣為散白蠟伍兩銅器中火上消之下藥攪令凝丸如棟實以赤穀裹壹丸男左女右肘後帶之

度瘴散方

麻黃去節

升麻

附子炮去皮

白木略壹兩

細辛

乾薑

防己

防風

桂心

烏頭炮去皮

蜀椒汗

桔梗略貳兩

右壹拾貳味擣篩為散密貯之山中所在有瘴氣之處旦空腹飲服壹錢匕覆取汗病重稍加之

老君神明白散方

白朮

附子炮去皮各貳兩

桔梗

細辛各壹兩

烏頭炮去皮肆兩

右伍味麤擣篩絳囊成帶之所居閭里皆無病若有得疫者温酒朝壹方寸匕覆取汗得吐即差或經三四日者以參方寸匕内伍升水中煮令沸分温三服

太一流金散方

雄黃兩

雌黃

殺羊角兩

各實

礬石

壹兩燒令汁盡

鬼箭

削取皮羽壹兩半

右伍味擣篩為散以細密帛裹之作參角絳囊盛壹兩帶心前并挂門閣窓牖上若逢大疫之年以朔旦平明時以青布裹壹刀圭中庭燒之有病者亦燒熏之若遭毒螫者以唾和塗之

務成子螢火丸主辟疾病惡氣百鬼虎狼蛇虺蜂蠆諸毒五兵白刃盜賊凶害昔冠軍將軍武威太守劉子南從尹公受得此方以求平十二年於北界與虜戰敗績士卒略盡子南

被圍矢下如雨未至子南馬數尺矢輒墮地虜以為神人乃解圍而去子南以方教子及諸兄弟為將者皆未嘗被傷累世祕之漢末青牛道士得之以傳安定皇甫隆隆以傳魏武帝乃稍有人得之故一名冠軍丸一名武威丸方

螢火

鬼箭削取皮羽蒺藜略壹

雄黃

雌黃

礬石略瀝翻

殺羊角

鍛竈交

鐵錘柄入鐵處燒焦略

右以味擣篩為散以雞子黃并丹雄雞冠壹具和之如杏仁大作參角絳囊盛伍九帶左臂若從軍繫腰中勿離身若家挂戶上甚辟盜賊絕止也

千金翼方卷第卅一