

大德重校聖濟總錄卷第三十四



中暍門

中熱暍

中暍悶絕

瘧病門

寒瘧

溫瘧

寒熱往來瘧

瘧瘧

中暍門

中暍統論

論曰盛夏炎熱人多冒涉路途熱毒入傷微者客於陽經令人嘔逆頭眩心神懊悶汗出惡寒身熱發渴卽時不治乃至熱氣伏留經絡歲久不除遇熱卽發俗號暑氣甚者熱毒入內與五藏相并客邪熾盛鬱癥不宜致陰氣卒絕陽氣暴隔經絡不通故奄然悶絕謂之中暍此乃外邪所擊眞藏未壞若遇救藥氣通則甦但治熱暍不可以冷物得冷則不救蓋外以冷觸其熱蕪積於內不得宣發故也

中熱喝

論曰熱喝之病由冒犯暑熱邪氣也其脉絃細孔遲其狀汗出惡寒身熱而渴體重疼痛小便已則洒洒然毛聳四肢厥冷微勞動即熱口開齒燥經所謂脉虛身熱是為傷暑此不可汗下汗之則惡寒甚加溫鍼則發熱甚數下之則淋甚宜以除去熱邪之藥治之

治中熱喝頭痛汗出惡寒發熱而渴白虎湯方

知母陸兩

石膏碎壹斤

甘草貳兩

粳米陸合

右四味咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎米

熟湯成去滓溫服日三一方加人參三兩

治伏暑吐逆小香薷湯方

香薷貳兩

人參壹兩

白藕豆兩半

右三味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不拘時候

治傷暑中暈解毒丸方

半夏

醋浸青宿瀝出暴乾

甘草炙剉各壹斤

赤茯苓

去黑皮貳兩

右三味搗羅為細末生薑自然汁和丸如梧桐子大每服四丸加至八丸新汲水下如昏悶不省者生薑

自然汁下

治傷暑煩渴不止竹筴湯方

竹筴竹者

合新甘草壹分

烏梅兩枚

右三味同用水一盞半煎取八分去滓放溫時細

呷

治伏暑頭痛心胸煩悶旋運惡心不思飲食小抱龍丸

方

半夏

醋浸壹宿銀石器中煮醋盡焙

甘草壹分

右二味搗羅為細末生薑自然汁煮稀麩糊丸如梧

桐子大陰乾每服十九新汲水下食後臨臥服

治中暑煩躁香薷散方

香薷貳兩

右一味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎取七分不

去滓溫服不拘時候

治中暑煩躁多困乏力消暑散方

人參

末搗

白麩等分

右二味和勻每服二錢匕新水調下不拘時候

治暑氣每到夏月卽發四肢無力不思飲食檳榔餅方

檳榔剉

瞿麥穗

懷香子炒

荆芥穗

麥藍子

大黃煨剉各

右六味搗羅為末用麩三錢和作六餅慢火燒熟每

日空心爛嚼一餅溫酒下

治暑氣日露散方

黃連去須剉 吳茱萸半兩

右二味同炒以茱萸黑色為度放地上出火毒不用

茶葉將黃連搗羅為細散每服半錢匕食後茶清或

新水調下

治一切伏熱煩躁困悶菝葜散方

菝葜 貫衆摘碎刮去手各膏兩 人參

甘草炙剉各半兩

右四味搗羅為散每服二錢匕水一盞煎至七分溫

服如熱渴即冷作飲

治傷暑胸膈躁悶昏運倒仆欲死解毒散方

商陸根切開如血色者陰乾

右一味搗羅為散每服一錢匕新汲水調下牛馬馱

驟喘急熱發倒仆調三錢灌之立止

治暑毒及心經積熱大黃丸方

大黃剉 甘草炙 黃連去

惡質微炒 荆芥穗等分

右五味搗羅為末鍊蜜丸梧桐子大每服二十九溫

水下食後服若為散水調亦得

治暑毒燥悶甘露丸方

寒水石

火煨候冷夾絹袋盛井底浸染日取出令乾研肆兩

天竺黃兩半

馬牙消兩

研貳 甘草壹兩

龍腦錢

右五味爲末糯米粥丸雞頭大每服一丸生薑蜜水

磨下

治暑毒抱龍丸方

黃芩

去黑心

大黃炒

黃藥子

生乾地黃焙

藍根

甘草炙各壹兩

雄黃兩半

龍腦研

麝香研各壹錢

右九味爲細末牛膽汁和丸如彈子大每服一丸冷

鹽湯嚼下

治暑毒煩渴狂躁嘔吐頭疼困倦不灰木散方

不灰木兩

滑石

寒水石

甘草剉各壹兩

蓼藍根壹兩半

右五味並生搗羅爲散每服二錢匕研生粟米泔入

沙糖一棗大同化服不拘時候合時避日色火氣

治暑毒救生散方

脂麻新者參兩

右一味炒令黑色取出盤內攤冷碾爲細末新汲水

調下三錢匕或丸如彈子大新水化下一丸凡著熱外不得以冷物逼外得冷即斃

治中暍解暑毒煩躁水壺散方

不灰木燒

玄精石生

金星石

銀星石

馬牙消生各半兩

甘草炙剉壹兩

消石壹分

右七味各搗研為散先將甘草鋪在鉢內次入諸藥炒良久移放地上以鉢冷為度重研過每服一錢匕新汲水調下或生薑汁水調下

治中熱暍方

右用生麩一匙沸湯調及半椀紙蓋椀口少時微熱呷之大効

中暍悶絕

論曰中暍之病令人悶絕者熱毒傷藏也蓋心藏神而惡熱若冒觸暑毒蘊積於五藏則陰陽不能升降經絡不得宣通故奄然悶絕然真藏未壞救療有方得氣宜即甦亦不可待其自甦又不可犯冷若外犯冷則與熱氣相拒氣愈不通而斃矣

治熱暍欲死悶亂方

生地黃汁膏盡

右一味旋旋灌之

治中暑毒熱暈不省方

白麩不拘多少

右一味用熱湯調二錢匕灌之

中熱暈不省方

大蒜

不拘多少
去皮搗爛

右一味用新水調勻灌之

治中熱暈不省方

右以泥周遶暈人臍使三四人溺其中亦可屈革帶
或扣漆椀底或脫車釭安著臍上令溺不使流去然

此謂路途無湯可用乃令人溺取溫若有湯不必溺
也仲景不云泥及車釭蓋此物必冷暈人忌冷若得
熱湯和泥及火燒車釭方可用也

又方

右取生菖蒲不拘多少搗絞取汁微溫一盞灌之

又方

右先掘地作坑取蜜半盞傾坑中以新汲水兩盞投
之攪勻澄取漿一盞灌之

又方

右以物斡開口煖湯徐徐灌之仍少舉其頭令湯入

腹即蘇

又方

右取生蓼不拘多少用水濃煮絞汁一二盞灌之

治中熱渴死方

右取路上熱塵土以壅其心冷復易候氣通乃止

治熱渴欲死悶亂方

右以口噓其心上便擣地黃汁一盞灌之仍灸兩乳

頭各七壯

治中熱渴垂死備急陳橘皮湯方

陳橘皮

湯浸去白焙

乾薑

炮

甘草

炙

石三味各等分麤擣篩每服三錢匕以水一盞煎五

七沸去滓稍稍令噓勿頓與之以蘇為度

治中渴垂死備急救生丸方

乾薑

炮

甘草

炙

黃藥子

板藍根

各肆兩

犀角

鎊壹兩

右五味為細末鍊蜜丸如彈子大每服一丸熱湯化

服立効

治心中熱則精神昏悶黃連散方

黃連

雜瓜者不拘多少去須

右一味為細散每服三錢匕濃煎燈心湯調下得溲

則愈蓋心惡熱苦入心熱傳小腸則氣下通故得洩
則愈燈心通利小便故也

治中暑暈毒悶亂昏沉凝水石丸方

凝水石 甄子內燒
過如粉

乾薑 燒灰各
壹兩

甘草 炙叁
錢 甜消 半
兩

右四味搗羅爲末鍊蜜丸如彈子大每服一九生薑

湯化下

治中暑毒悶亂不省人事萬金散方

硫黃 研 蛤粉 各壹
兩

右二散研爲細末每服一錢匕新汲水調下

治中暈冒悶吐逆頭痛出冷汗玉珠散方

硫黃 舶上
者 滑石 色白
者 凝水石 燒各
壹兩

右三味搗研爲散每服二錢匕艾湯調下

瘧病門

諸瘧統論

論曰夏傷於暑秋成瘧瘧該於時而作也方夏之時陰
居於內暑雖入之勢未能動候得秋氣陽爲之變汗出
遇風乃成此疾故曰瘧瘧皆生於風蓄作有時其氣陰
陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽并於陰則陰實
而陽虛陽明虛則寒慄鼓領巨陽虛則腰背項痛三

陽俱虛則陰氣勝陰氣勝則骨寒而痛寒生於內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱內外皆熱則喘而渴故欲冷飲皆得之夏傷於暑熱氣盛藏於皮膚之內腸胃之外此榮氣之所舍也令人汗空疎腠理開因得秋氣汗出遇風及得之於浴水氣舍於皮膚之內與衛氣并居衛氣者晝行於陽夜行於陰此氣得陽而外出得陰而內薄內外相薄是以日作其間日作者其氣之所舍深也其作之早晏者隨風府日下一節也是以或先寒後熱或先熱後寒或但熱無寒又或本於痰或本於瘴或本於鬼神或本於邪氣大槩外傳經絡內入五藏

證既不同治法亦異治瘡者不辨陰陽虛實槩以吐藥投之有非痰實而真氣受弊者固多矣內經論五藏諸經之瘡本以刺法補寫其寒熱先後與夫發止早晏又皆不同明邪氣所傳不可一概論今備載諸證參以治法之輕重要在隨證而治庶乎無一曲之蔽也

寒瘡

論曰寒瘡之狀內經所謂先寒後熱病以時作是也蓋傷暑汗出腠理開發因遇夏氣淒滄之水寒其氣藏於腠理皮膚之中秋傷於風則病成矣其證先起於毫毛伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊俱痛寒去則內外皆熱頭痛

飲冷是也

治寒瘧先寒後熱頭痛不可忍熱極即汗出煩渴吳茱

萸湯方

吳茱萸

湯浸焙炒壹兩

羌活

去虛頭半兩

甘草

剉

半夏

湯洗去

乾薑

炮

芎藭

細辛

去苗葉

麻黃

去節

高良薑

藁本

去土

桂

去粗皮各壹分

右一十一味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分

去滓未發前溫服

治寒瘧神効檳榔湯方

檳榔

剉

桂

去粗皮

常山

陳橘皮

湯浸去白炒

甘草

炙剉各等分

右五味麤搗篩每服三錢匕酒半盞水一盞煎至一

盞去滓未發前溫服

治寒瘧不差橘皮散方

陳橘皮

湯浸去白焙壹兩

牡蠣

熬參

桂皮

剉

常山

各半兩

右四味爲細散每服三錢匕溫酒調下未發前併三

服

治瘧先寒戰寒解即壯熱龍甲常山酒方

龍甲

去裙襴醋炙壹分

淡竹葉

壹兩

甘草

炙到各分

右四味麤搗篩每服五錢匕酒半盞浸藥蓋於地上
一宿次日添水一盞煎至七分去滓未發前溫服得
吐爲驗

治瘡寒多熱少芫胡桂薑湯方

芫胡

去苗肆兩

桂

去麤皮

黃芩

去心各壹兩半

栝樓根

牡蠣

甘草

炙各壹兩

乾薑

炮各兩

右七味麤搗篩每服三錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服初服微煩汗出卽愈

治寒瘧蜀漆散方

蜀漆

洗去腥焙

雲母

燒壹晝夜

龍骨

各壹兩

右三味爲細散每服半錢匕未發前漿水調下

治寒瘧草豆蔻飲方

草豆蔻

去皮

高良薑

常山

青橘皮

湯浸去白焙

陳橘皮

湯浸去白焙各壹分

生薑

半分

淡竹葉

壹握

黑豆

伍拾粒

右八味咬咀如麻豆都用水三盞煎至一盞半去滓
未發時通口分溫二服

治寒瘧牡蠣湯方

牡蠣熬

麻黃

去根節 各肆兩

甘草

炙剉 兩

蜀漆

洗去腥 焙參兩

右四味麤搗篩每服四錢匕水一盞半煎至一盞去

滓未發前溫服

治寒瘧胸滿人參湯方

人參半兩

蜀椒

去目及閉口 者出汗壹分

乾薑

炮壹兩

阿魏

參分酒浸去砂 石麩和作餅炙

右四味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

溫服不拘時

治寒瘧烏梅丸方

烏梅肉炒

桃人

去皮尖雙 人炒研

常山

豉

參各 參分

升麻

肉苁蓉

酒浸 切焙

桂

去麩 皮

人參

甘草

炙剉各 半兩

右九味爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服二十九空

心未發前溫酒下日二加至三十九

治寒瘧先寒後熱常山湯方

常山

甘草

生

乾薑

炮各 壹分

附子

炮裂去 皮臍

芫胡

去苗各 半兩

右五味咬咀如麻豆每以五錢匕酒一盞半煎至一

盡去滓分爲二服空心未發前并食後各一服

治寒瘧無間遠近虎骨丸方

虎頭骨

酥炙

烏梅肉

炒

桂

去麩皮

甘草

剉

人參

各半

桃人

去皮尖雙炒研

常山

升麻

肉蓯蓉

酒浸切焙各參分

附子

炮裂去皮臍半兩

麝香

研壹錢

豉

炒壹合

右一十二味除桃人外搗羅爲末和勻鍊蜜丸如梧
桐子大每服三十九未發前米飲下

治寒瘧不痊二薑散方

乾薑

炮

高良薑

各壹分

右二味炒令黑色搗羅爲散每服一錢匕未發前溫
酒調下日三不拘時

治寒瘧塗方

鼈甲

去裙襴醋炙半兩

烏賊魚骨

去甲

附子

炮裂去皮臍切

甘草

剉

常山

各壹兩

右五味搗羅爲末每服五錢匕酒一盞半煎十數沸
留一宿次日以酒先塗手足并背上如不發卽止如

發卽飲此酒一盞

治寒瘧塗之方

附子

壹枚生去皮臍

右一味搗羅爲末未發時用苦酒和塗病人背上佳
溫瘧

論曰溫瘧之狀內經所謂先傷於風後傷於寒其證先熱後寒病以時作是也蓋風爲陽氣寒爲陰氣風氣先勝故先熱而後寒得之冬中風寒氣藏於腎內至骨髓至春陽氣大發邪氣不能自出至夏大暑腦髓爍肌肉消腠理發泄或有所用力邪氣與汗俱出故氣從內之外也其法宜先治其陽後治其陰也

治溫瘧初發身熱頭痛不可忍臨醒時卽寒慄戰動麻黃湯方

麻黃

去根節煎
採去沫焙羌活去蘆頭

牡丹去心

獨活

去蘆頭

梔子去皮

芫胡去苗

桔梗剉

升麻

荆芥穗

大黃炒

半夏洗去滑焙

木香

知母焙

黃芩去黑心各半兩

右一十四味蠲瘧節每服三錢匕水一盞入生薑二片同煎取七分去滓未發時服

治溫瘧初壯熱後寒戰骨節痠痛口乾煩渴蘆根湯方

蘆根剉

麥門冬去心

升麻

葛根剉

山梔子去皮

石膏剉

右六味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片煎取一盞去滓溫服未發前連三服

治溫瘧骨節疼痛時嘔朝發暮解暮發朝解知母湯方

知母

焙乾
參分

甘草

炙剉
兩

石膏

碎參
兩

粳米

壹
合

桂

去麤皮
半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎取一盞去

滓溫服未發前不拘時候

治溫瘧壯熱憎寒不能食地骨皮湯方

地骨皮

知母

剉焙各
參分

龍甲

去襍補醋
浸炙黃

常山

剉各
半兩

石膏

碎壹
兩

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半入竹葉十片

煎至一盞去滓未發前溫服

治溫瘧寒少熱多冬瓜湯方

常山

細剉
壹兩

甘草

炙剉
半兩

右二味麤搗篩每服二錢匕用冬瓜汁一盞煎七分

放溫未發前服

治溫瘧常山湯方

常山

剉半
兩

龍甲

去襍補醋
浸炙黃

甘草

生剉各
壹兩

車前草

壹握切或
用子參合

右四味麤搗篩每服三錢匕用漿水一盞浸藥一宿

當發前一日以急火煎取七分去滓溫服

治溫瘧熱渴體痛松蘿湯方

松蘿兩半

烏梅肉炒

梔子去心

龍甲

去裙襴醋浸炙黃各半兩

升麻分

右五味麤搗篩每服三錢匕水一盞入茶末半錢七

煎至七分去滓未發前空腹溫服水一盞煎小分

治溫瘧常山丸方

常山剉

烏梅肉炒

豉炒

天靈蓋

酥炙黃各參分

丹砂研

知母切

蜀漆各半

酒洗去腥

右七味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空腹

以溫酒下三十九漸加至三十九日三並未發前服

治溫瘧壯熱微寒常山飲方

常山剉半兩

淡竹葉剉壹握

小麥壹合

右三味以水三盞漬藥一宿明旦煎取二盞去滓未

發前逐旋溫服

治溫瘧日漸羸瘦欲成骨蒸常山湯方

常山剉

猴骨炙黃各參分

烏梅肉炒

甘草炙剉各半兩

車前葉壹握

天靈蓋燒作灰壹分

右六味麤搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

瘧未發前溫服微吐為効

寒熱往來瘧

論曰陰陽相勝而寒熱互作者以邪氣相并也故氣并於陰則為寒氣并於陽則為熱寒則振慄鼓頷以陰實陽虛故也熱則渴而飲冷以陰衰陽勝故也

治瘧發寒熱芫胡桂枝湯方

芫胡 去苗 肆兩

桂 去蠶 皮

黃芩 去黑 心

芍藥

人參 各壹 兩半

甘草 炙壹 兩

半夏

湯洗柒遍 壹兩壹分

右七味廬掃篩每服六錢匕水二盞入生薑一棗大

拍碎棗二枚擘破煎至一盞去滓溫服

治瘧壯熱憎寒大便秘澀鼈甲湯方

鼈甲

醋炙去 裙隔

赤芍藥

桃人 去皮尖雙 人炒研

當歸 切 焙

大青

天靈蓋 酥炙別 搗末

知母

焙各 參分

牽牛子

參分炒令 半生半熟

乾薑 焙半 兩

右九味除天靈蓋外廬搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓調天靈蓋末一錢匕未發前溫服仍留其滓重煎若先自利去牽牛子

治諸瘧疾先熱後寒頭痛四肢煨倦麻黃湯方

麻黃去根

烏梅肉炒

秦艽去苗

茈胡去苗

甘草炙

麥門冬去心

犀角劔谷

青蒿子壹兩

常山壹兩

右九味蠶搗篩每用五錢七水一盞半入桃柳枝心各七枚細剉豉五十粒煎至一盞入朴消少許更煎一二沸去滓分二服早晨及臥時溫服之

治瘡先寒後熱四肢黃瘦頭痛常山飲方

常山壹兩

豉壹合

葛根剉

此胡去苗

升麻

牡蠣熬

大黃剉

前胡去蘆

知母焙

山梔子人

枳殼去瓢麩炒

半夏湯洗柒偏去滑炒

麥門冬去心

桃人去皮尖

甘草炙

犀角劔各

右一十六味咬咀如麻豆大每用五錢七水一盞半入葱薤白各三寸切碎煎取一盞去滓分二服發前及發時熱服之

治瘡寒熱作時面色黃人參湯方

人參

常山各半

甘草生參

陳橘皮湯浸去白

右四味蠶搗篩每服五錢七水一盞半入茶末半錢

七燈心五莖煎至七分去滓入酒半盞和勻候温未發前頓服取吐如未吐再服以痰出盡爲度

治瘧經吐下後寒熱頭痛煩渴岸角湯方

岸角 鎊

甘草 炙各半兩

麥門冬 去心焙

升麻

知母 焙

龍甲 醋炙去襍
襍各參分

石膏 碎壹兩

右七味麤搗篩每服五錢七水一盞半煎至一盞去

滓食前温服未發前再服

治瘧疾寒熱丹砂丸方

丹砂

雄黃 各壹兩

砒霜 半兩

桃人 去皮尖雙人麩炒貳拾壹枚

麝香

阿魏 各壹錢

安息香 壹分

右七味各研極細再合研勻用糯米粥和丸如雞頭大每服半丸細嚼新汲水下取吐卽愈

治諸瘧發歇寒熱不定二豆丸方

菜豆

黑豆 去皮

丹砂 研各壹分

砒霜 研半兩

右四味先研二豆如麩入砒拌勻滴水丸如梧桐子大丹砂爲衣每服一九發前收桃心七箇爛嚼冷水吞下如無桃心取桃枝煎湯放冷下

治諸瘡寒熱往來止而復發常山散方

常山末壹兩

砒霜研壹分

丹砂研壹錢

右三味研勻入白麪糊和作餅子油內煮焦黑為度再研極細每服半錢匕夜半冷茶清調下

治瘡疾作發寒熱三聖丸方

凝水石貳兩

砒霜兩壹

膩粉壹分

右三味研細用陳粟米飯和作挺子以濕紙十重裏慢火內燒令焦黑再研為末粟米飯和丸如菜豆大每服三丸夜半桃心水下

治諸瘡寒熱不已日漸萎黃常山飲方

常山兩壹

烏頭炮裂去皮甘草生用壹分

蒜壹顆捌瓣

糯米炒壹合

豉炒壹合

甌帶壹寸

右七味廬搗篩以酒一升二合浸月下露一夜橫刀一口置藥上俟天明煎取五合去滓空心頓服良久吐出惡痰即愈如吐不已煮漿水粥止之

治寒熱往來瘡久不差甌甲大黃丸方

甌甲去裙襴

大黃生

常山

人參

蜀漆

甘草炙

附子炮裂去皮臍

白薇各壹分

右八味嚮羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸淡竹葉湯下平旦一服食後良久再服

治諸瘡寒熱往來附子丸方

附子炮裂去皮 大黃剉妙各 常山

蜀漆各壹兩宜分

右四味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三九

米飲下未發一服臨發再一服

瘰癧

論曰瘰癧之狀內經所謂但熱不寒陰氣先絕陽氣獨發少氣煩寃手足熱而欲嘔是也得之邪熱留於身中

厥逆上衝中氣實而不外泄因用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間而發發則陽氣盛不及於陰故但熱不寒氣內藏於心外舍於分肉之間令人消燬脫肉名之曰瘰癧以單陽無陰故也

治瘰癧發作有時但熱不寒頭痛不安通身俱黑大腸

秘熱小便黃赤茵陳蒿湯方

茵陳蒿 山梔子皮 茈胡去

黃芩去黑心 桔梗炒 牡丹皮

貝母去心 荊芥穗去 升麻

杏仁湯浸去皮尖 雙人炒 半夏湯洗柒偏去滑切焙 羌活去

獨活頭去蘆

麻黃去根節煎去沫焙各半兩

細辛去苗葉壹分

右一十五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞生薑二片煎一沸急瀉出臨發熱頭痛時去滓熱服仍須食後但此瘡止發熱并初發時先壯熱者可服

治瘰癧上焦熱身重目黃茵陳枳殼湯方

茵陳蒿取葉

枳殼去瓢麩炒各壹兩 桔梗剉炒參分

大黃剉微炒

甘草象令黃各半兩

右五味蠶搗篩每服三錢匕水一盞煎至六分去滓

溫服不計時候

治瘰癧陰氣孤絕陽氣獨發脉微其候少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉者白虎加桂湯方

石膏碎壹兩陸錢

知母陸錢

甘草炙貳錢

粳米合半

右四味除粳米外咬咀拌勻以水一升煮藥五錢匕以米爛為度去滓加桂末三錢匕煎取四合作一服覆令汗先寒發熱汗出者愈

治瘰癧但熱不寒嘔逆不下食香豉飲方

豉合半

蔥白柒莖切

常山分

升麻壹兩

龍甲醋炙令黃去裙襴 知母焙

生地黃各壹兩半

檳榔煨叁分

右八味剉如麻豆每以十錢匕以水三盞於星月下浸一夜橫刀一口安在藥上早晨煎取一盞半去滓空腹分為二服重者不過兩劑差

治瘰癧積熱痰盛寒少熱多但熱不寒煩躁引飲大青

飲方

大青壹兩莖葉紫者是不紫即是遠志不可用也如無真者以青黛代之

大黃醋炒

赤芍藥

常山細剉炒

甘草炙

龍膽去土各半兩

右六味麤搗篩每服五錢匕用水一盞半煎至八分去滓溫服氣盛熱多宜服得利或熱稍退即止人宿有冷疾年四十以上者雖有熱證不宜多服

治瘰癧發熱不止常山散方

常山剉壹兩

升麻叁分

龍甲去裙襴剉任用

山梔子去皮各半兩

右四味搗雜為散每服三錢匕未發前用溫水調下

取吐即差

治瘰癧豉心飲方

豉心壹合

雄鼠糞末炒貳錢七 童子小便伍合

甘草炙半兩 龍甲醋炙去兩 菟胡去苗各分兩

山梔子去皮參分 烏梅宋枚去核 桃心握壹

柳心握壹 生地黃汁合貳 生薑分壹

右一十二味除鼠糞地黃汁小便外餘並細剉入小便中浸一宿明日煎取八合去滓下鼠糞并地黃汁

分爲三服空心一服食後再服

治瘰癧熱甚不差梔子湯方

梔子人兩壹 常山剉參分 車前葉炙乾兩

粳米粳拾粒

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服未發前一服臨發一服以吐利爲度利若不

止以冷飯止之

治瘰癧石膏湯方

石膏碎貳兩 白秫米伍拾粒 常山剉參分

右三味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半入淡竹葉

七片細剉煎至一盞去滓空腹溫飲一服欲發時一

服正發時一服三服訖淨室中臥勿與人語過發時

後卽得洗手面及飲食七日內禁房室及酒麪久瘡

不過再劑一方加烏梅肉二七枚

治瘰癧麻黃丸方

麻黃

去根節 壹兩

常山

剉 各

知母

剉 乾

甘草

炙

大黃

生剉 各 半兩

右五味搗羅爲細末鍊蜜和丸如梧桐子大每服五丸溫水下未發前服日二服不差稍增之

治瘧瘵壯熱不止渴欲飲水車前草湯方

車前草

常山

剉

升麻

豉

炒

甘草

生各 半兩

白粳米

半

右六味麤搗篩每五錢匕以水二盞宿浸藥於星月下橫一小刀於藥上入五更煎取一盞去滓分溫二服空腹及未發前各一服良久卽吐吐定食少漿水

粥

治瘧瘵但熱不寒煩渴不止常山飲方

常山

剉 半兩

甘草

剉 壹分

烏梅

染枚 椎碎 去核 焙

青蒿

焙 壹分

右四味麤搗篩都以小便一盞水一盞酒一盞煎至一盞去滓當發日空心服

大德重校聖濟總錄卷第三十四

大德重校聖濟總錄卷第三十五

瘡病門

間日瘡

痰瘡

疥瘡

勞瘡

久瘡

鬼瘡

瘡母

間日瘧

論曰間日瘧者邪氣著於陰不得與陽氣俱出也衛氣
晝行於陽邪氣不得出故必再會而後發是以間日乃
作也

治間日瘧先寒戰後壯熱常山湯方

常山

甘草

炙各參兩

鼈甲

去裙襴醋炙各兩

淡竹葉

切參升洗

右四味咬咀以酒三升漬之上覆頭安露地明旦以
水七升重湯內煮水過半爲度其酒分五服未發飲
之當吐吐已不必盡劑

治間日瘧醇醪湯方

大黃劉妙

甘草衆

常山各壹分半

右三味咬咀以水三盞煎取一盞去滓更以水一盞煎滓取七分未發先服醪藥是後煎者相次服醇藥是前煎者差

治間日瘧常山酒方

常山壹兩

蒜獨頭者壹顆去根並橫切糯米

黑豆各壹佰粒

右四味咬咀以清酒一升病未發前一日以酒浸藥於椀中以白紙覆之椀上橫一刀欲發時三分飲一

分如未吐更服一分得吐則差

治間日瘧備急一元散方

右燒黑牛尾作灰酒服方寸匕日三

治間日瘧發寒熱常山湯方

常山

竹葉細切各參分

秫米伍拾粒糯米亦得

石膏碎貳兩

右四味廬搗篩每服五錢匕以水一盞半浸藥宿明旦煎至一盞去滓溫服未發前一服臨發再服當日勿洗漱勿飲食并用餘藥汁塗五心及胸前頭面藥滓置枕邊

治間日瘧糯米煮散方

糯米肆拾粒

常山剉

烏梅肉炒

竹葉剉

甘草炙各半兩

石膏壹兩半碎

右六味搗羅為散每服五錢匕以水一盞半煎至七

分去滓未發前溫服

治瘧間日發大黃湯方

大黃生半兩

甘草炙

常山剉

桂去麤皮各壹分

右四味廔搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去

滓未發前溫服

治間日瘧神聖丸方

黑豆小者試拾壹粒水浸去皮

砒霜研壹錢

大棗壹枚煮去皮核

右三味須於重午七夕日修合同研丸如豌豆大以

丹砂為衣合時忌婦人雞犬見於發日早晨將藥一

丸面北香上度過用冷茶清下忌熱物一復時

痰瘧

論曰痰瘧之狀胸中不利頭痛振寒怵慄而不能食食即嘔寒去則內外皆熱寒熱更作心下支滿痰積胸中

氣逆煩嘔故謂之痰瘧

治痰瘡發作有時熱多寒少頭痛額角并胸前肌肉腫動食纔入口卽吐出面色帶赤半夏散方

半夏湯洗去滑爲末生薑汁和作餅暴乾

藿香梗去

羌活去蓋

芎藭

牽牛各半兩

右五味搗羅爲細散每服三錢匕食後白湯調下以吐爲度未吐再服

治一切痰瘡石膏飲方

石膏碎

淡竹葉各參兩

常山

甘草生剉

烏梅各貳兩

粳米合

右六味礪搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服吐痰卽差如熱盛大黃一兩

治一切瘡及吐一切痰疾胡粉丸方

胡粉研

砒霜研

寒水石煨研各壹兩

石三味合研勻滴水丸如雞頭大發前新汲水吞下

一丸卽大吐至來日困睡爲驗

治痰瘡吐膈細辛湯方

細辛去苗葉

松蘿

犀角屑

甘草生各參分

常山

升麻各壹兩壹分

梔子人

玄參各壹兩

大八味麝搗篩每服三錢匕水一盞煎七分去滓溫

服以叶爲度

治痰瘧吐痰犀角飲方

犀角屑鎔

升麻

玄參

常山各半兩

松蘿

甘草生

細辛去苗葉

山梔子人各壹分

右八味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓空心徐徐溫服取叶爲度

治痰瘧寒熱溫疫等防葵飲方

防葵

龍甲醋炙去襍

松蘿

甘草生各半兩

常山分

右五味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至八分去

滓未發前徐徐溫服取吐爲度

治痰瘧鼓心丸方

鼓微炒合

大黃生用壹兩半

常山分

升麻半兩

附子少者炮裂去皮臍壹枚

右五味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服七丸

發前米飲下吐後更乾嘔七丸

治痰逆多時久瘧不差及面目四肢黃腫蜀漆丸方

蜀漆葉

牡蠣燒

黃芩去黑心各壹兩

大黃生

甘草炙

犀角屑各分

知母焙半兩

右七味麝羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九

空心溫水下

治痰實瘧發歇不止常山酒方

常山參分

烏梅肉生用

甘草生用各半兩

右三味細剉以酒二盞浸一宿早晨去滓煎溫服一

盞良久以筋入喉中引之吐痰卽差

治痰瘧發作無時升麻常山湯方

升麻壹兩

常山貳兩

蜀漆葉壹兩

右三味麝搗篩每服四錢匕井華水一盞半煎至一

盞空心頓服良久卽吐吐定食漿水粥和之

治痰瘧吐不出烏頭湯方

烏頭炮裂去皮臍

半夏湯洗去滑焙

桂去麤皮

芫花醋炒

常山各半兩

豉炒壹合

右六味剉如麻豆每服三錢匕酒一盞煎至七分去

滓發前溫服相次再服取吐爲度

治痰瘧寒熱常山甘草飲方

常山

甘草炙

大黃剉各壹兩

桑根白皮

剉壹兩半

烏梅伍枚去核

杏仁湯去皮尖雙

黃連壹兩

羌活去薑頭壹兩半

黃芩去黑心半兩

芎藭

枳殼去麩

赤茯苓去黑皮

旋復花熬半兩

芫胡去苗壹兩半

附子炮裂去皮

牽牛子炒壹兩半

桂去麩皮壹兩

虎頭骨牙齒

兩半

右一十八味剉如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至

八分去滓溫服

痰瘡

論曰痰瘡者以瘡發該時或日作或間日廼作也入衛氣流行合於晝夜陰陽邪氣內舍於榮隨衛氣以出入而應於風府其作早晏皆以時發也寒溫瘡瘡動皆該

時故內經統謂之痰瘡其狀伸欠乃作寒慄鼓頷腰脊痛寒去則內外皆熱頭痛如破渴欲冷飲

治痰瘡寒瘡溫瘡瘰癧悉治之丹砂丸方

丹砂研壹分

常山搗末壹分

右二味研令勻鍊蜜和丸梧桐子大午時發者平旦

米飲服三九辰時已時及臨發時各服三九至夜然

後得食

治痰瘡連年不差蜀漆丸方

蜀漆葉

烏梅肉炒

白薇

升麻

地骨皮

知母帶

麥門冬

去心冬 半兩 嵩山 剉

龍甲

開各 參分

麥蕤

半兩

豉

壹合 微炒

石膏

研壹 兩

甘草

壹分

右一十三味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服

十九未發前米飲下臨發再服加至二三十九醋湯

下亦得

治痰癘麻黃丸方

麻黃

去根節湯掠 去沫壹兩

常山

剉

知母

半兩

甘草

壹分

大黃

主用各 半兩

右五味搗羅爲細末鍊蜜丸如梧桐子大每服五丸

未發臨發各一服未差漸增九數

治痰癘以時發龍甲漬酒方

龍甲

醋炙 半兩

烏賊魚骨

去 甲

常山

各貳 兩

附子

炮裂去 皮臍

甘草

各 壹兩

右五味剉如麻豆每服五錢匕以酒一盞半漬藥一

宿明日以酒先塗五心過發時瘡斷若不斷可飲藥

酒一二盞卽差

治痰癘先寒戰動寒解壯熱日發及間日發常山酒方

常山

淡竹葉

切洗 壹兩

龍甲

主初瀉 參分

甘草

參分

右四味麩搗篩分五錢七以酒半盞浸藥覆安露
地一宿明旦以水一盞煎至七分去滓未發前溫服
盡當吐既效不必盡劑過發時良久方可食
治痰瘧霜墨丸方

砒霜

壹錢

墨

蓐草灰

各半錢

菜豆粉

壹分

右四味一處細研爲末用糯米粥和丸如小豆大每
服兩丸未發前一時辰醋湯下端午日未出時而東
修合不得言語勿令婦人雞犬見
治瘧及有孕婦人患者無不愈如聖飲方

甘草

壹兩

芫胡

去苗

常山

烏梅

去核各半兩

右四味剉碎用銀器或沙石銚當發日絕早以好酒
二升慢火熬至一盞濾去滓放溫作一服飲盡良久
吐涎卽愈如尚覺有寒氣未退候五七日再服
治一切瘧疾五行神驗丸方

澱花

貳兩東方

桂

壹兩南方

乾薑

壹兩西方

巴豆

壹兩北方

硫黃

壹兩中央

麝香

少許

右六味將五般藥於盤內據五方排定取四月二十
八日夜安卓子上於中庭露以香一鑪當虔心啓請

五行神天上五星神人間一切主契神請加備此五行法瘧丸露後取端午日修合當啟祝云廣施功德無所希求須夜夜志心再三啟祝至天明早收莫令雞犬飛鳥見安於高淨處亦依方所安著如是露七夜至午日將巴豆去殼湯煮三五十沸搗研餘藥為散入麝香以薄麵糊調澱花末為丸如櫻桃大合時忌女子等見丸了焙乾於合內盛不得觸汗莫令香歇唯在心法不得容易此方帶之無不神驗修合人當月忌眼見一切魔汗若俗人須解之宜加淨潔專志不然則藥無神効發日淨手取以綿裹香火炙令熱男左女右預前帶安耳中便利時除却淨手後再安耳中不得女子捨觸女子患男子為安日忌一切葷辛果子一九男度十人女度三人此方極神驗須將廣施若有希取即無効驗也

治諸瘧知母丸方

知母

烏梅肉妙各肉荑藜妙

常山

鼓妙各甘草妙

人參

桂去麝皮各壹兩半

右八味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸溫酒下

治一切瘡方

地黃汁升

砒霜研半

蠟許少

右三味先將地黃汁於瓷器中煖候沸入砒霜不住手攪煎令稠次入蠟相和丸如菉豆大每發時用井華水下一丸未差發前更服一丸

治瘡知母飲方

知母焙

龍甲醋炙去

桃人去皮尖

附子炮裂去

常山

狼牙各半

烏梅去核

右七味剉如麻豆每服五錢匕糯米四十九粒隔夜

浸至五更初同煎取七分去滓乘熱分作兩服未發時一服發時一服

治一切瘡無問遠近烏梅丸方

烏梅肉炒

桂去毒

甘草炙

虎頭骨酥炙各

桃人去皮尖雙

升麻

肉苳蓉酒浸切焙

附子炮裂去皮

麝香研壹分

人參

豉壹升

右一十二味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十九空腹飲下如虛勞加龍甲三兩

治瘡常山酒方

常山

龍甲

醋炙去裙各參分虎頭骨炙半兩

豉炒半分

桃枝壹握

柳枝壹握

桃人參柒枚去皮尖雙人炒

乾棗參枚去核

烏梅炙柒枚

右九味細剉以酒一升浸一宿明日入生薑五片煎

取五合去滓空心分為二服

治瘰癧捩虎膏方

烟脂

阿魏各壹大豆許同研

右二味同研以大蒜肉研和為膏用大桃核一枚劈

開去人取一片以藥膏子填在核內瘰癧發時用藥桃核覆在手虎口上男左女右令藥著肉以緋帛繫定經宿乃去疾更不發

勞瘡

論曰勞瘡者以久瘡不差氣血俱虛病雖閒歇勞動則發故謂之勞瘡邪氣日深真氣愈耗表裏既虛故食減肌瘦色悴力劣而寒熱如故也

治勞瘡毛髮枯焦寒熱不定飲食減少肌肉消瘦面色青黑兩足無力非時足冷小便頻數大便不調夜夢泄精龍甲煮散方

龍甲

去襖補醋炙半兩 羌活去蘆頭

獨活去蘆頭

此胡

去苗各壹分 黃耆剉半兩

赤茯苓去黑皮

生乾地黃焙

木香各壹分

牛膝酒浸切焙

天靈蓋酥炙

續斷

菟絲子酒浸別搗各半兩

芎藭

藿香葉

陳橘皮湯浸去白焙

山茱萸各壹分

麝香研壹錢

右一十七味搗羅爲散每服三錢匕水一盞入鹽少許同煎七分空心和滓服或鍊蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十九亦得

治勞瘵秦艽酒方

秦艽去苗土

此胡去苗

甘草炙

龍甲

去襖補醋炙各半兩 常山

葱白各貳兩

豉壹分

右七味剉如麻豆用無灰酒三升浸一宿於近火處

頓常令微溫每服一盞未發時不拘時服既服又添

酒一盞於藥中再添至三升卽止

治勞瘵久作不已日致憔悴勢漸危困龍甲散方

龍甲

去襖補醋炙

常山剉

蜀漆葉

烏賊魚骨

去甲

附子炮裂去皮臍各半兩 知母切焙

蜀椒去目及閉口炒

黃耆剉

此胡去苗各參分

石九味擣羅爲散每服三錢以酒一盞漬一宿平

旦溫服未發前再一服

治勞瘧此胡湯方

此胡去苗壹兩

人參

栝樓根

黃芩去黑心

甘草剉

黃耆剉各半兩

右六味廩擣篩每服五錢匕水一盞半生薑半分切

棗兩枚去核煎至一盞去滓溫服空腹欲發前各一

服

治勞瘧經年不差寒熱痿瘦祛勞湯方

茺胡去苗

常山剉

籠甲去裙襴醋浸炙

知母切

青蒿乾者

甘草炙

枳殼去穢炒

桂去麁皮各壹兩

木香半兩

右九味廩擣篩每服五錢匕水一盞半入柳枝心七

枚葱白三寸煎至一盞去滓空腹溫服

治勞瘧寒熱萎黃渴躁煩悶甘草湯方

甘草炙

蜀漆葉兩

天靈蓋酥炙兩

黑豆生

桃人湯浸去皮尖研

烏梅肉炒各壹分

右六味廩擣篩每服三錢匕水一盞入竹葉三片煎

至七分去滓空腹未發前一服臨發時再服

治勞瘧久不差熿熿發熱骨節痛不下食小便赤漸加瘦弱
此胡枳殼湯方

此胡去苗

枳殼去麩

升麻

麥門冬去心

驚甲指浸炙令黃去裙襴甘草炙

桃人湯浸去皮尖雙火別研各分

石七味蠶搏篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓

未發前不拘時溫服

治勞瘧熱多寒少知母湯方

知母切

常山細

松蘿

桔梗去蘆頭切炒

此胡去苗

鼈甲醋浸炙令黃去裙襴

橘葉各分

右七味蠶搏篩每服五錢匕水一盞柳枝心七枚童

子小便半盞煎至七分去滓未發前溫服

治勞瘧致心飲方

致心伍拾粒

甘草生用

鼈甲去裙襴

此胡去苗各兩

梔子去皮

烏梅肉棗

桃枝心棗

柳枝心棗

生地黄汁壹

雄鼠糞炒為末

右一十味除地黃鼠糞外蠶搏篩都用童子小便一

盞半浸藥一宿明旦煎取一盞去滓下鼠糞末半錢

地黃汁一合生薑汁一合分為兩服空心一服欲發前一服

治勞瘧并積勞寒熱常山丸方

常山細剉參分

烏梅肉炒

甘草炙

龍甲天裙欄醋浸炙

姜豉各半兩

石膏碎壹兩

知母焙

蜀漆葉

白薇

升麻

地骨皮

麥門冬去心焙各參分

豉妙壹合

右一十三味麝羅為末鍊蜜丸如菉豆大每服十九空腹米飲下未發前再服漸加丸數以差為度

治遠年勞瘧雄黃丸方

雄黃研

丹砂研

麝香研各半兩

木香

龜甲去裙欄醋浸炙

龍甲去裙欄醋浸炙

虎頭骨炙

羚羊角屑

犀角屑

白薇

玄參

當歸切焙

知母焙

防風

麻黃去根節

龍膽

牡蠣熬

豬苓去黑皮

芫胡去苗

茯神去木

升麻

檳榔微煨剉

地骨皮

赤芍藥

梔子人

黃連去須

烏梅肉炒

桃人湯浸去皮尖
人炒別研

阿魏醋研化人麩
調作餅炙

安息香入胡桂
人研 菱蕤

龍齒各參
分

右三十二味除研藥外搗羅爲末再同研勻鍊蜜丸
如梧桐子大每服二十九空腹白粥飲下發前再服

治積年勞瘡不差顏色羸瘦無力烏梅丸方

烏梅肉炒

甘草炙

升麻

人參

桂去麤皮
各半兩

肉蓯蓉酒浸
切焙

桃人湯浸去皮
尖炒別研 常山剉各
參分

豉微炒
青合

右九味除桃人外搗羅爲末入桃人再研勻鍊蜜丸
如梧桐子大每服二十九空腹溫米飲下發前再服

漸加至三十九

治勞瘡人參丸方

人參

烏梅肉炒

桃人湯浸去皮尖
人別研

常山剉

肉蓯蓉酒浸
切焙

升麻各參
分

杏人湯浸去皮尖
雙入別研

桂去麤皮
各半兩

籠甲去襍
醋浸炙 甘草炙各
參分

丹砂研

阿魏研

龍齒研各
分

右一十三味搗研爲末鍊蜜丸如梧桐子大每服二
十九空腹米飲下未發時併兩服

治勞瘡桂參丸方

桂去麤皮

肉苳蓉酒浸切焙半兩 豉微炒

麝香研壹錢

桃人湯浸去皮尖別研 烏梅肉炒

常山剉

人參各分

右八味搗研為末鍊蜜丸如梧桐子大每服空腹米飲下十九未發時再服漸加至二十九

治勞瘡豆桂丸方

巴豆去皮生研

桂去麤皮

澱花研

阿魏醋化麵調作餅炙

安息香入胡桃人研各壹分

右六味除研藥外搗羅為末再研勻用麪糊丸如梧桐子大每用綿裹一九香煙上度七徧安耳內男左

女右又帶之

治勞瘡瘡瘡積年不差烏梅丹砂丸方

烏梅肉炒半兩

丹砂研

鼈甲去裙襴醋浸炙各半兩

知母焙

常山剉

石膏研

甘草炙

升麻

蜀漆葉

白薇

地骨皮

萎蕤各壹分

牛黃研半分

豉炒壹合

麥門冬去心焙半兩

青蒿乾者半兩

麝香研半分

右一十七味除研藥外搗羅為末研勻鍊蜜丸如梧桐子大每服空心溫酒下二十九未發前再服漸加

至三十九或吐出痰即安

治勞瘧積時不斷眾治不効牛膝飲方

牛膝生者壹兩剉細

右一味用水二盞煎取一盞去滓分為二服未發前

一服臨發再服

治勞瘧經年不差常山湯方

常山

籠甲去裙襴醋炙黃

知母焙

茈胡去苗

青蒿焙

甘草炙

枳殼去麩麩炒

桂去麩皮各壹兩

桃枝

柳枝各壹握

右一十味麤搗篩每服五錢匕水三盞半入葱白菹

白各三寸切同煎至八分去滓溫服不拘時

治勞瘧累服藥不差經年羸劣狀如勞疾烏梅五補丸

五

烏梅肉煮貳兩

肉蓯蓉去鹹皮酒浸切焙

黃耆剉

桂去麩皮各貳兩

生乾地黄焙

茈胡去苗

常山

桃人去皮尖雙剉

升麻

當歸切

人參

赤茯苓去黑皮各壹兩

豉心壹合炒

麝香別研半兩

右一十五味除研外搗羅爲末入麝香桃入合研勻

鍊蜜和丸如梧桐子大每服空心酒下三十丸加至

三十九

治勞瘡久瘡連延不差阿魏丸方

阿魏

麝香

雄黃

丹砂

鹽味並研各半分

鼠骨

牛骨

虎骨

兔骨

龍骨

蛇骨

馬骨

羊骨

猴骨

雞骨

犬骨

豬骨

拾貳味並酒炙同爲末各壹分

右一十六味搗研爲末和勻取人日於北斗下以阿魏水煮糊丸如小豆大每服十五丸溫酒下空心服治久患勞瘡瘴瘧等勝金丸方

寒水石

參分細研

砒霜

壹兩細研

右二味以厚紙兩重糊黏於銚子底將砒安下次寒水石蓋上以匙緊按將蓋子蓋又以糊紙數重黏四畔令縫不得通氣以竹柴火燒令下面紙黃焦爲候待冷再研於地上出火毒一周時以粟米爲丸如大麻子大發日以冷醋湯下五丸如年深者先以五丸將熱茶下吐却痰後再以冷醋湯下三丸兼治積年

心痛發時冷薑醋湯下七丸立差

治勞瘧食減肌瘦二物湯方

童子小便壹升蜜參匙頭許

右二味相和分作三服每於銀石器內煎兩沸溫服

空心食前

久瘧

論曰久瘧者瘧久不差發汗吐下過甚真氣虛邪氣深
沉以內薄衛氣不應故積歲月而難治也雖有虛否不
可攻治當先其發時用湯液以發汗蓋浸漬熏蒸邪氣
方出出則微汗小便利者表裏俱和久瘧自差矣

治諸瘧久不差發動無節日漸虛困羸瘦烏梅丸方

烏梅肉微炒壹兩半籠甲酒浸去襍穢炙令黃色壹兩

天靈蓋塗酥炙令黃色壹兩

常山細剉壹兩 芫胡去苗壹兩

兩 蜀漆葉參分

甘草炙參分

豉半兩 黃

右一十四味除桃人外搗羅為細末與桃人相和鍊

蜜丸如梧桐子大每日空腹未發前以枳殼桑根白

皮湯下二十九漸加至三十九如差後覺冷損憊即

桃人貳拾枚 攷攷湯浸去皮尖雙人生別研

升麻參分

大黃剉半兩

知母剉焙乾參分

肉苳蓉去皺皮酒浸炙乾壹兩

虎頭骨酒浸炙令黃色壹兩

加生乾地黃防風黃耆桂各一兩豉心減半日一服

治瘧久不差鼈甲丸方

鼈甲醋浸炙令黃色
去裙襴壹兩

虎頭骨酒浸炙令
黃色叁分

烏梅肉炒令乾
叁分

麥門冬去心焙
壹兩

豉微炒
壹兩

石膏碎研
叁分

常山細剉
壹兩

白薇半
兩

萎蕤半
兩

升麻叁
分

人參壹兩
分

知母剉焙乾
叁分

地骨皮半
兩

右一十三味搗羅爲末鍊蜜丸如梧桐子大未發前
米飲服二十九明日早晨又服三十九如人行十里
卽食一椀白粥至臨發時又服三十九卽差不吐不

利差後三日內將息如常法

治久瘧不差發不以時或朝或夜肌瘦食少地骨皮湯
方

地骨皮

升麻

犀角鎊

玄參各叁
分

常山壹兩
細剉

石五味蠶搗篩每服三錢匕以水一盞煎至七分去
滓空腹未發前溫服欲吐須忍俟不能禁卽吐如此

吐下卽差

治久瘧四肢虛汗不止黃耆散方

黃耆去苗細
剉壹兩

牡蠣燒研如
粉壹兩

麻黃根壹
兩

知母 剉焙乾

人參 兩

右五味攪羅爲細末研令極細每服三錢匕用河水煎小麥湯未發前調下未差再服

治瘧久不差發歇無時漸至黃黑枯瘁成勞松蘿飲方

松蘿 分參

甘草 生半兩

常山 細剉半兩

鼈甲 去鱗鬚醋浸炙

竹葉 切半兩

右五味麤搗篩每服五錢匕以水一盞半煎至一盞去滓空心未發前溫服以吐爲差

治久瘧日多增寒壯熱不止渴飲水車前草湯方

車前草 半兩

常山 細剉半兩

升麻 半兩

白粳米 合

鼓 炒

甘草 生半兩

右六味麤搗篩每用三錢匕以水一盞半宿浸藥置於星月下橫一小刀子於藥上五更煎取七分去滓分溫二服空腹未發前一服相次再服良久得吐吐定卽得食漿水粥

治久瘧不差將成骨蒸勞寒熱無時茈胡飲方

茈胡 去苗

常山 分

甘草 生半兩

附子 炮裂去皮臍半兩 乾薑 炮裂

右五味剉如麻豆每用五錢匕用酒一盞半煎至一盞去滓分二服空心未發前一服食後再服

治瘧經年不差 梔子湯方

梔子人壹兩

常山細剉參分

車前葉鞣乾至一兩

粳米半合

右四味麤搗篩每服五錢匕水一盞半煎至一盞去

滓溫服未發前一服臨發一服以吐利為差利若不

止以冷飯止之

治久瘧黃連酒方

黃連去須壹兩剉

常山細剉壹兩

烏賊魚骨去甲參分

右二味以酒一升半浸之經宿向發煎取一盞發

三服臨發更一服有熱當吐有冷當下半

治瘧久難差 鮫鯉甲酒方

鮫鯉甲酒浸炙令黃色半兩

常山參分

龍甲去帶襴醋浸炙半兩

烏賊魚骨去甲參分

烏梅肉微炒壹分 桃人貳拾肆枚湯浸

竹葉壹握

豉壹合

葱白柒莖切

右九味剉如麻豆大用生絹袋盛以酒三升浸經一

宿每日空腹溫服半盞良久取吐如不吐至巳午時

再服三兩服如不差隔日更依前服之

治瘧久不差 龍甲酒方

龍甲去襴醋浸炙半兩

升麻壹分

附子炮裂去皮臍壹分常山參分

烏賊魚骨去甲壹分

右五味剉如麻豆大用生絹袋盛以酒三升漬之漸令近火一宿藥成初服半盞比至發時可數服快吐即差

治瘧久不差常山湯方

常山壹分

烏梅肉兩

甘草參分並生用

右三味麤搗篩每服二錢匕水一盞入生薑三片煎至六分去滓不計時溫服

治瘧百方不差宜服久瘧丸方

砒霜壹分

乳香半兩

半夏湯洗柒遍焙乾擘兩

右三味重午日合同搗羅爲末正午時粽子尖和丸如皂子大發時以醋湯下一丸更不再服如非重午日合藥須兩服差

治久瘧不差惡寒壯熱百節疼痛面色黃瘦神功丸方

阿魏研

丹砂研

雄黃研各壹兩

臘月狐肝焙研貳兩麝香研壹錢

右五味同研爲細末用重午日日未出時粽子丸如梧桐子大病者以緋線繫一九男左女右中指上未差桃人湯下一丸合藥時北面勿令雞犬婦女見治一切瘧疾經年不差常山飲方

當山

籠甲炙各壹兩 知母焙

白頭翁

甘草炙 羌胡去苗各

青蒿壹握

桃枝 柳枝各壹握

桂去麤皮半兩

右一十味麤搗篩每服四錢匕酒一盞半入葱白薤

白各三寸切浸一宿煎取八分去滓溫服空心服發

發時再服

治瘡久不差烏梅從蓉丸方

烏梅肉焙

肉從蓉酒浸切焙 附子炮裂去臍皮各貳兩

當山參兩

桃人去皮尖雙兩 豉參合

知母焙

虎頭骨炙各壹兩半 麝香研壹兩

桂去麤皮壹兩

右一十味搗羅爲末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下

鬼瘧

論曰鬼瘧者外邪之所乘也人真氣內虛神守不固則鬼邪投間而入故恍惚喜怒寒熱更作若有所持而屢發屢止也治法宜禳去之而兼以祛邪安神之劑

治鬼瘧乾桃丸方

樹上自乾桃子貳柒枚

黑豆壹握

巴豆染粒去皮
膜出盡油

右三味搗羅爲細末滴冷水丸如梧桐子大丹砂爲衣每服一九凌晨面東并華水吞下

治鬼瘡阿魏丸方

阿魏研

砒霜研

丹砂研各皂
子大

畫鍾馗紙燒灰試

右四味研爲細末用寒食麩丸如小豆大每服一九發時冷水下宜用正月十五日五月五日合

治鬼瘡丹雄丸方

丹砂研壹

膩粉參

巴豆染粒去皮
心膜出油

乳香研

麝香研

雄黃研

砒霜碎各
半錢

右七味研爲細末水浸炊餅心爲丸如梧桐子大每服一九發前新汲水下只一服差

治鬼瘡獨勝丸方

右以桃人一枚和皮尖雙人者擘作兩片一片內書奉勅斬鬼字一片內書奉勅殺鬼字却合作一枚以線繫定五更新汲水吞下

治鬼瘡三聖丸方

雌黃研

雄黃研

大黃生爲細末
各壹兩

右三味再研為細末水浸炊餅為丸如梧桐子大每服二九發日早晨面向東北新汲水下宜五月五日午時合

治鬼瘡經久不差阿魏雄黃丸方

阿魏研

雄黃研各半兩

柳枝

桃枝

各取向東者壹柴壹每壹長壹尺對冷搗為細末

丹砂研壹分

右五味再研為細末用三家粽子角為丸如梧桐子大別研丹砂為衣發時用淨盡摩一丸塗鼻尖并人中上未退以冷水服一丸仍須五月五日午時合

治鬼瘡萬安丸方

虎頭骨

酒炙參兩

藜蘆

兩

雄黃

研入或燻

鬼白

天雄炮裂去皮臍

蕪荑

炒

皂莢

酥炙去皮子各壹兩

右七味除雄黃外搗羅為末入研者雄黃和勻鍊蜜丸如彈子大令患者頭上戴一丸立差若除伏屍於房四角燒四粒若除疫氣於床前燒一粒或渡江海男左女右臂上帶一粒得渡不溺

治鬼瘡丹砂丸方

丹砂研

阿魏研各半錢

砒霜

研壹錢

致

肆拾玖粒湯浸去皮研

右四味再同研為細末滴水丸分作四十九丸每服
一九如脾寒取東南枝上桃心柳心各七枚煎湯放
冷面南吞之尋常瘡發時面北新汲水下

治鬼瘡被除丸方

雄黑豆

小者是壹百貳拾粒醋浸三日去皮研為膏

砒霜

研壹

雄黃

研半兩

右三味除黑豆外研令極細與黑豆膏同研丸如梧
桐子大丹砂為衣用素絹袋子盛掛於神室前有患
者取三丸未發時服一九面東新汲水下臨發時更
服一九婦人患即男子與藥男子患即婦人與藥仍

令患者閉目服須是端午日合若緩急即入節日合
亦得合藥時不得見雞犬婦人服了藥不得食熱物

一日

治鬼瘡鬼白丸方

鬼白

常山

甘草

藜豆粉

各壹兩

鼈甲

醋炙去裙襖參分

雄黑豆

貳佰伍拾粒湯浸去

糖皮

砒霜

半兩研生使

石七味搗羅為細末醋煮麪糊丸如梧桐子大丹砂
為衣每服一九日未出面東用桃心七枚同新汲水

下

治鬼瘧一字散方

鬼前羽

鱖鯉甲燒存性
各壹分

右二味搗羅為細散每服一字搐在鼻中臨發時用

治鬼瘧寒熱日發鬼箭羽散方

鬼箭羽

壹分
細末 砒霜研壹錢

五靈脂研壹兩

右三味再同研為細散每服半錢匕臨發時冷茶清

調下

治鬼瘧輔正丸方

天靈蓋

壹錢

砒霜研

丹砂研

麝香研

虎頭骨酒炙

鉛丹研

胡蠶頭骨

酒炙

菉豆粉各半兩

右八味搗羅為細末用粟米飯和研丸如梧桐子大

每服一丸未發前新汲水下或以手握之差有孕婦

人不得食小兒只可半丸以菉豆汁下其藥以五月

五日合面東搗之

治鬼瘧虎睛丸方

虎睛

壹對酒浸炙

丹砂研

麝香研

雄黃研

砒霜研

安息香

入胡桃和研

阿魏研

天靈蓋各壹分

右八味搗二味入研藥再研為細末用燒飯和研丸

如小豆大每月一丸未發前男左女右手把之一丸
可癩十入

瘡母

論曰瘡母者病瘡不差結爲癥瘕是也邪伏於陰故久而成形不治其母雖或時差已而復發其本未除故也
治宜以破結削瘕之劑除其病本

治瘡久不差結爲癥瘕名曰瘡母鼈肉煎丸方

生鼈肉

手斤治黃芩心去黑如食法

苳胡

去苗

蠅螂

去翅頭足各半兩鼠婦足炒去

乾薑

炮

大黃

生

海藻

洗去鹹

葶藶子

紙上

桂

去毒皮

牡丹皮

厚朴

去毒皮生薑汁炙

紫苑

切焙

瞿麥

半夏

湯洗去滑焙

人參

大戟

廣蟲

炒

射干

阿膠

桃仁

湯浸去皮尖雙入別研

石韋

去毛

赤芍藥

各壹分

桑螵蛸

炒壹兩

右二十四味搗羅爲細末取甞下灰三升酒二升淋
灰取灰汁先煮鼈肉令爛絞去鼈肉後入諸藥末內
鼈肉汁更煎成膏可丸卽止丸如梧桐子大每服二

十九丸未發前溫酒下

治一切遠年瘡結成癥瘕雄黃丸方

雄黃研

丹砂研

麝香

研各

木香

龜甲

炙

龍甲

醋炙去

虎骨頭炙酒

羚羊角

劈

犀角

劈

白薇

玄參

當歸

切

知母焙

防風

去

麻黃

去根

龍膽

去苗

牡蠣

煨

豬苓

去黑

茈胡

去苗

茯神

去木

升麻

檳榔

制

地骨皮

赤芍藥

梔子人

黃連

去須

烏梅肉

炒

阿魏

研

桃人

湯浸去皮尖

雙人炒研

安息香

剉

養老

龍齒

各參

右三十二味除別研外搗羅為細末合研勻鍊蜜九

如梧桐子大每服二十九白粥飲下未發前服

治瘡母黃丸方

右以生砒黃豆黃末各一兩以醞醋二升一處煎成

膏可丸取出別入丹砂確黃麝香各一錢研細和搗

衆手為丸如菉豆大每服五丸未發前煎生薑湯下

治瘡母至妙瘡丹方

砒霜

研半兩

寒水石

研壹兩

右二味先用研了砒在生鐵銚內用寒水石末圍之

以瓷碗合定濕紙封於碗上燒候煙出熏紙黃色卽
止取出以紙襯於地上上火毒須臾細研爲末入研
了丹砂龍腦麝香各半錢許和勻湯浸炊餅丸如梧
桐子大以丹砂作衣每服一九於未發前早晨面北
用井華水下忌喫熱物一時辰

治瘡母丹砂丸方

丹砂

研

菘豆

去皮
研粉

砒霜

研各
半兩

右三味於端午日靜室內面向東南用乳鉢先將菘
豆研細次入砒霜丹砂研一千徧用稀米粥丸如梧
桐子大陰乾每服一九未發前五更時井華水面北

燕下少頭方可食

治瘡疾結成癥瘕如聖丸方

巴豆

參粒
去殼

黑豆

肆拾
玖粒

砒霜

研半
兩

右三味將巴豆黑豆用米醋浸一宿去皮膜入乳鉢
內順研一百匝入砒又逆研一百匝丸如小豆大用
丹砂爲衣每服一九取嫩桃葉七片水一盞煎數沸
傾入盞內用醋一二滴打勻通口令病人面向東方
吞下如無桃葉以桃枝七寸煎湯代之