

陳氏  
藏本

張氏醫通

上海廣益書局  
印行



中華民國十四年四月付印

中國華民二十二年七月三版

陳氏藏本  
張氏醫通

全書二十冊 定價四元

# 版權

原著者 長洲 張 璞

校正者 青浦 陳蓮舫

發行者 廣益書局

印刷者 廣益書局

總發行所 廣益書局

上海棋盤街

廣益書局

分發行所

廣州 永漢北路 南昌  
北平 楊梅竹斜街 長沙  
漢口 級一街 開封  
中山馬路  
南陽街  
書店街

廣益書局

陳氏本經逢原卷四

藏本

長洲石頑張璐路玉父纂述

青甫東蓮房文正

蟲部

蜂蜜 甘平無毒。入調補藥用白蜜。瀉火藥用赤蜜。味酸者不堪入口。下元氣者同食。令人下利。凡煉蜜炭火慢煉掠去浮沫。至滴水成珠為度。煉成每斤入陳酒四兩。再熬。和藥丸。勸藥力易化。本經主心腹邪氣諸驚癇瘓。安五藏。補不足。益氣補中止痛解毒除衆病。和百藥久服強志輕身不饑不老。發明 蜂米無毒之花醞釀而成。生則性涼清熱。故能治心腹之邪氣。熟則性溫補中安五藏諸不足。甘而和平。故能解毒柔而潤澤。故能潤燥緩以去急。故能主心腹肌肉瘡陽之痛。仲景治陽明結燥大便不通。用蜜煎導法。取其能通結燥而不傷腸胃也。凡滋補藥俱用煉白蜜丸取其和脾潤肺也。赤蜜味酸。食之令人心煩。惟降火藥用之。白蜜雖補脾肺。然性涼潤。脾胃不實。腎氣虛滑。及濕熱痰滯。胸痞不寬者。咸須忌之。故瓊玉膏用糖霜。枳朮丸用荷葉裹飯。佐金丸用米飯。牛黃丸用蒸餅。黑錫丹用酒糊。慈殊丸用神麴。虎潛丸用酒。青連丸用醋。草珠丹用紅棗。滾燙丸用水泛。各有所宜。今人修製丸劑。概用蜂蜜。殊失先哲用方之義。

蜜蠟 淡平無毒。本經主下痢膿血。補中續絕。傷金瘡。益氣不饑耐老。發明 蜜成於蠟。萬物之至味。莫甘於蜜。莫淡於蠟。得非厚此薄彼耶。仲景治痢有調氣飲。于金治痢有膠蠟湯。蓋有見於

本經之義也。淡為五味之本。胃為五藏之源。故能補中續傷。益有得於太極也。甄權治孕婦胎動下痢。食入即吐。用白蠟方寸匙。雞子黃一枚。石蜜苦酒髮灰。黃連末各半。雞子殼。先煎蜜蠟苦酒雞子四味令勻。乃納連末。髮灰。熬至可丸乃止。二日服盡神効。

露蜂房 苦鹹平有毒。本經主驚癇瘧疾。寒熱邪氣。癲疾鬼精。蠱毒腸痔。火熬之良。發明 露蜂房陽明藥也。本經治驚癇瘧疾。寒熱邪氣。蠱毒腸痔。以其能祛滌痰垢也。瘡瘍齒痛及他病用之者。皆取其以毒攻毒殺蟲之功耳。

蠅蠅一名果蠅  
細腰蜂也 辛平小毒。本經治久聾厥逆毒氣。出刺出汗。發明 詩言蠅蛉有子。蜾蠃負之。言細腰之蜂。取青蟲之子。教祝變化成子也。大明治嘔逆。生研能置竹木刺。即本經出刺出汗。取其毒之銳。以出其刺也。

蟲白蠟 甘溫無毒。發明 蠟樹屬金。性專收斂。堅強之氣。其葉能治瘡腫。蟲食其葉而成。與桑螵蛸無異。為外科之要藥。取合歡皮同入長肉膏中。神效。今人治下疳服之。未成即消。已成即斂。以半兩入鯽魚腹中煮食。治腸紅神效。

紫鉢即紫草草 甘鹹平小毒。發明 紫鉢乃駢麟竭樹上蟻壤。聚其脂液而成。與蜂釀蜜無異。出希臘為上。波斯次之。古方治五藏邪氣。金瘡崩漏。破積血。生肌止痛。今人專治痘瘡。有活血起脹之功。無齶寒作濁之患。其功倍於紫草。故以紫草耳呼之。實非紫草同類也。

五倍子即蛤

川

苦酸鹹平無毒產川蜀如菱角者佳法釀過名百藥煎每五倍末一斤入桔梗甘草真茶各一兩為末入哮槽二兩拌和置糠中窖待起如發虧狀即成矣作餅晒乾用。發明川文蛤善收頑痰解熱毒黃昏欬嗽乃火氣浮於肺中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之若風寒外觸暴嗽及肺火實盛者禁用以其專收而不能散也故痰飲內盛者誤用則聚斂於中往往令人脹閉而死為末收脫肛及子腸墜下百藥煎性浮味帶餘甘治上焦痰嗽熱渴諸病含噙尤宜煅過主下血烏鬚髮消腫毒斂金瘡治喉痹口瘡擦之便可進食也。

桑螵蛸 甘鹹平無毒桑枝上螳螂子也火炙黃用。本經主傷中疝瘕陰痿益精生子。女子月閉腰痛通五淋利小便水道。發明 桑螵蛸肝腎命門藥也功專收濇故男子虛損腎衰陽痿夢中失精遺溺白濁方多用之本經又言通五淋利小便水道蓋取以泄下焦虛滯也。桑螵蛸散治小便頻數如稠米泔心神恍惚瘦悴食少得之女勞者方用桑螵蛸遠志龍骨菖蒲人參茯苓當歸龜甲各一兩。卧時人參湯調下二錢如無桑樹上者以他樹上者濃煎桑白皮汁佐之若陰虛多火人誤用反助虛陽多致溲赤莖痛強中失精不可不知研爛塗之出箭鏃。

雀癢一名蟣螂 俗名蟻毛 甘平小毒。本經主寒熱結氣蠭毒兔疰小兒驚癇。發明 雀癢蟣螂殼也其蟲夏生葉上背上有刺螫人故名蟻毛秋深葉盡欲老口吐白沫凝聚漸硬在中成蛹如蠭至夏羽化而出其形有似蜻蜓而翅黑稍闊放于葉上而生蟣螂謂雀癢者以雀好食其蛹也入藥惟取石榴樹上者連蛹炙焙用之蘇頌曰今醫家治小兒驚癇用雀癢子連蟲同白僵蠭全歌各三枚微炒

搗末煎麻黃湯調服一字日三服大效藏器治小兒撮口不得飲乳但先努口候見血以雀糞打破取汁塗之。

原蠶蛾 鹹溫小毒取朱砂雄蛾紙封焙乾拌椒密藏則不蛀。本經主心腹邪氣起陰痿益精氣強志生子。好顏色補中輕身。發明 蠶之性稟淫火力專助陽其子在臘月中非以重鹽鹽透水漬曝乾則繭不能繅絲出子之後非桑不食本經主心腹邪氣皆桑之餘力猶殼蠶之治風疾蠶繭之療癰腫蠶沙之去風濕耳其起陰痿益精氣強志生子即別錄之益精氣強陰道交精不倦亦能止精若合符節好顏色令人面色好之互辭補中輕身者以其善補真陽陽主輕捷故也詳參經旨洵為原蠶主治無疑奈何集本草者悞列樗雞之下敢力正之。

白殼蠶 鹹辛平無毒色白者良入藥惟取直者為雄去黑口及絲炒用。本經主小兒驚癇夜啼去三蟲減黑點令人面色好男子陰瘍病。發明 殼殼蠶之病風者也功專去風化痰得乎桑之力也本經治驚癇取其散風痰之力也去三蟲減黑點男子陰瘍取其滌除浸淫之濕三蟲亦濕熱之蟲也凡咽喉腫痛及喉痺用此下咽立愈其治風痰結核頭風皮膚風疹丹毒作癢治蝕金瘡疔腫風疾皆取散結化痰之義。

蠶繭 甘溫無毒 發明 蠶繭治癰腫無頭燒灰酒服次日即破煮湯治消渴繅絲湯及絲綿煮汁功用相同。

蠶退即馬明退 甘平無毒即老蠶眠起所蛻皮入藥微炒用今以出過蠶之紙為馬明退非也。發明

蠶非桑葉不生。得東方木氣之全。故能治風病血病。而蛻治目中翳障較之蟬蛻更捷。惜乎時難見。  
蠶沙 甘辛溫無毒。微炒用。發明 蠶沙療風濕之專藥。有人病風痺。用此焙熟。絹包熨之。治爛弦風眼。以麻油浸蠶沙二三宿。研細塗患處。過宿即愈。蠶沙置酒罇上。泥好色清味美。然惟晚者為良。早蠶者不堪入藥。以飼時火烘。故有毒也。

九香蟲 酸溫無毒。發明 九香蟲產貴州。治膈胱滯氣。脾胃虧損。壯元陽攝生方烏龍丸用之。  
雪蠶即雪姐 甘寒無毒。發明 雪姐生峨眉山北。積雪歷年不消。其中生此。大如黍粒。味極甘美。故能解內熱渴疾。方物中之最益人者也。

蜻蛉一名蜻蜓 赤者名赤卒。微寒無毒。發明 蜻蜓生水中。而能煖水藏。強陰蓄精。而赤者性尤壯。熱助陽藥用之。

樗雞即紅娘子 苦平有毒。不可近目。去翅足同糯米炒去米用。發明 櫁雞厥陰經藥。也能活血散血。治目翳。撥雲膏中與芫青斑蝥同用。亦是活血散結之義。能通血閉。行瘀血。主癰瘡。辟邪氣。療猘犬傷。治偏頭風。用紅娘子青娘子各七枚。去翅足炒為末。同葱薑搗塗痛處。周時起泡去之。孫一奎治血蠱。用抵當丸。以樗雞易水蛭。三服血下脹消。形神自復。與薛新甫治水腫。椒仁丸中芫青不殊。一走血而下瘀。一走氣而破水。皆峻劑也。綱目以本經原蠶蛾主治。誤列於此。今正之。

芫青即青娘子 辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明 芫青居芫花上。而色青。故能泄毒攻積。破血墮胎。功同斑蝥。而毒尤猛。芫花有毒故也。其治瘋犬傷。消目翳。刮偏頭風。塞耳聾。皆取其毒銳。

也。又治月閉水腫。椒仁丸方用之。

斑蝥。辛鹹溫有毒。去翅足同糯米炒熟。或醋煮用之。本經主寒熱鬼疰蟲毒。亂癰瘡疽。蝕死肌破石瘡。發明。斑蝥人獲得時。尾後惡氣射出。莫不可聞。其性專走下竅。利小便。故本經言破石瘡能攻實結。而不能治虛祕。不過引藥行氣。以毒攻毒而已。但毒行小便必澀痛。當以木通滑石導之。其性猛。毒力能墮胎。虛者禁用。風火傷。先於患人頭上拔去血髮二三莖。以斑蝥七枚。去翅足炙黃。同蟾蜍搗汁服之。瘡口於無風處糊去惡血。小便洗淨。髮灰敷之。服後小便當有於毒泄出。三四日後當有肉狗形。三四十枚為盡。如數少再服七枚。若早服雖無狗形。永不發也。

葛上亭長。辛溫有毒。去翅足同糯米炒去米用。發明。亭長太毒。善通淋及婦人經脈不通。以五枚研末服三分。空心甘草湯下。須臾臍腹急痛以黑豆煎湯服之即通。此蟲五六月為亭長。頭赤身黑。七月斑蝥。九月為地膽。隨時變化。其毒可知。

地膽。辛溫有毒。同糯米炒去米用。本經主鬼疰寒熱。鼠登惡瘡死肌。破癰瘕墮胎。發明。地膽有毒。而能攻毒。性專破結墮胎。又能除鼻中瘻。內下石淋。功同斑蝥。力能上涌下泄。

蜘蛛。微寒有毒。其種類不一。惟用懸網者入藥。發明。仲景治陰狐疝氣偏有大小時時上下者。蜘蛛散主之。以其入肝。性善循絲上下。故取以治睾丸上下之病。別錄治大人小兒瘻瘍。又治乾霍亂。服之能令人利。其邪得以下泄也。搗汁塗蛇傷效。

壁錢。無毒。發明。生壁間似蜘蛛而形扁。其膜色白如錢。故名。治鼻衄及金瘻出血不止。取蟲

汁注鼻中及點瘡上同人中白等分燒研治疳又治喉癧。

蠍 幸平有毒。被蟻者以木搘合之即愈。去毒及足用。亦有獨用其尾者。其功尤捷。滾醋泡去鹹炒乾用。發明 蠍產於東方。色青屬木。治厥陰諸風掉眩。及小兒胎驚。發搐。最為要藥。左半身不遂。

口眼喎斜。語言蹇濁。手足抽掣。瘧疾寒熱。耳聾無聞。疝氣帶下。無不用之。蠍尾膏治胎驚。發搐。用蠍梢二十一枚。麝香少許。屢效。東垣治月事不調。寒熱帶下。有丁香柴胡湯。方用羌活柴胡當歸生地丁香全蠍。蓋取以散血分之風熱耳。

水蛭 鹹苦平有毒。水蛭是小長色黃。挑之易斷者勿誤用。泥蛭頭圓身闊者服之。令人眼中如生烟。漸至枯損。凡用水蛭曝乾。猪油熬黑。令研極細。倘火不透。雖為末。經年得水猶活。入腹尚能復生。凡用須預先熬黑。以少許置水中。七日內不活者方可。用之。本經逐惡血瘀。血月閉。破血瘕積。聚無子。利水道。發明 鹹走血。苦勝血。水蛭之鹹苦。以除畜血。乃肝經血分藥。故能通肝經。聚血攻一切惡血。堅積。本經言無子。是言因血瘕積聚而無子也。別錄云墮胎性劣可知。昔人飲水誤食水蛭。腹痛面黃。飲泥漿水數碗乃得下。蓋蛭性喜泥。得土氣隨出。或用牛羊熱血同猪脂飲亦下。或以梅漿水多飲。則蛭溶化而出也。

蛆 苦寒無毒。漂淨炙黃。擣細末。同糖霜食之。發明 蛆出糞中。故能消積治小兒諸疳積滯。取消積而不傷正氣也。一法用大蝦蟆十數隻。打死置罇內。取糞蛆不拘多少。河水漬養三五日。以食盡蝦蟆為度。用麻布紮住罇口。倒懸活水中。令污穢淨。取新瓦燒紅。置蛆於上。焙乾治小兒疳積。腹

大脚弱腎膜遮睛。每服一二錢量兒大小服之。無不驗者勿以其鄙而忽諸。  
狗蠅 鹹溫無毒。發明 蠕食狗血。性熱而銳力能拔毒外出。故治痘瘡倒疊色黑。腎口冰冷之證。以數枚搗細。醋酒少許調服。聞人規方也。

蟾蜍 鹹微溫有毒。本經主惡血。血瘀。脾氣破折。血在腸下堅滿。通月閉。目中淫膚。青腎白膜。發明 蟾蜍穴土而居。與蚯蚓不異。故本經所治皆瘀血之證。金匱治虛勞瘀血。大黃䗪蟲丸方用之。取其去腸下堅滿也。許學士治筋急。養血地黃丸中用之。亦取其治血瘀也。取汁滴目去翳障散血止痛。十金研末敷小兒臍瘡。加豬脂調治小兒脅緊。經驗方治癰。傷腫。痛。肘後擣塗。竹木刺蘇頌擣汁點喉痺。得下即開。藏器塗遊風丹疹。又治麥芒入眼。以蟾蜍在目上隔布摩之。芒著布上即出。桑蠶蟲 甘溫小毒。色白帶黃。而腹中無穢。接之無水者為真。若頭硬而腹中不淨者。即雜樹內蠹也。如一時難覓真者。則以裁毛殼。煅灰存性代之。發明 桑蠶蟲食本柔能勝堅。故治痘瘡毒盛。不救。不可不慎。十金治崩中漏下赤白。桑蠶燒灰溫酒服。亦治胎漏下血效。桃蠹蟲 幸溫無毒。本經殺鬼邪惡不祥。發明 桃實中蟲食之令人美顏色。與桃蠹不異。其蟲屎能辟溫疫。今不相染為末水服方寸匕。

蚱蟬 鹹甘寒無毒。本經主小兒驚癇夜啼。癲病寒熱。發明 蟬主產難下胎衣。取其能蛻之義。聖惠治小兒發癩。有蚱蟬湯散丸等方。令人只知用蛻。而不知用蟬也。

蟬蛻。鹹甘寒無毒。去翹足用。

發明

蟬蛻去醫膜。取其蛻義也。治皮膚瘡風熱。破傷風者。炒研一錢。酒服神效。痘後目翳。羊肝湯服二錢。則翳漸退。更主痘瘡發癢。若氣虛發癢。又當禁不服。小兒夜啼。取蟬蛻四十九枚。去前截。用後截為末分四服。鈎藤湯服之。即止。驚啼加硃砂二字。若用上截即復啼也。小兒驚瘡夜啼。瘡病寒熱。並用蟬腹。取其利竅通聲。去風豁痰之義。較蛻更捷。

蟬蛻

鹹寒有毒。去足火炎用。勿置水中。令人吐。

本經主小兒驚瘡癰癰。腹脹寒熱。大人癲疾狂

瘡。發明

蟬蛻手足陽明足厥陰藥也。本經等治。總不離三經之證。其治暴嘔吐。食用二枚。入生

薑內煨。以陳橘皮二錢同巴豆炒過。去巴豆。將蟬蛻陳皮為末。每服二分。吹入喉中。吐痰二三次。即愈。又治箭鏃入骨。用巴豆微炒。同蟬蛻搗塗。痛定必癒。忍之待極癢不忍。乃撼動拔之。又燒灰入冰片少許。治大腸脫肛。捲上托入擣丸塞下部。引痔蟲出。盡永瘥。其蟬蛻心貼疔瘡拔疔貼半日許。血盡根出則愈。然蟬蛻最畏羊肉。食之即發。

天牛。甘溫小毒。

發明

天牛乃木中靈蟲所化。楊樹中最多。桑樹中獨勝。長鬚如角。故有天牛

之名。利齒善齒。是有齒桑之號。其性最銳。取治疔腫惡瘡。出箭鏃竹木刺最捷。與蠟蚧不殊。一嗑木而飛。一穴土而出。其穎脫之性。則一如無齒桑。他樹上者亦可。焙乾為末。蜜調傅之。

蠟蚧

鹹寒小毒。去翅足炒用。本經主產難。出肉中刺。去潰腫。下哽噎。解毒除惡瘡。發明

蠟蚧

性善穴上。故能治水腫。自腰以前甚濤。能止大小便。自腰以後甚利。能通大小便。取以治水最効。但其性急。虛人戒之。本經治難產者。取其下半煮湯服之。則下也。出肉刺。潰癰腫。惡瘡者。生搗塗之。

肉刺即出。瘡腫即潰也。下哽噎者。灸末吹之。哽噎即下。非噎膈之謂也。千金治箭鏃入肉以蠅姑杵汁滴上三五度。自出。延年方治胎衣不下。以蠅姑一枚。水煮數沸。灌下。入喉即出。小兒臍風。蠅姑甘草等分。為末。敷之。効。

螢火即熠耀本經名夜光

辛溫無毒

本經明目

發明

螢火本腐草所化得大火之餘氣而成。入胞絡

三焦。能辟邪明目。取其照幽夜明之義。務成子螢火丸。辟五兵。白刃虎狼蛇虺之毒。惡鬼疫癘之邪。龐安常亦極言其効。惜乎世鮮備用。

衣魚即蠹魚

鹹溫無毒。即衣帛書畫中之蠹。碎之如銀有粉者是。

本經主婦人疝瘕。小便不利。小兒中風項強。背起摩之。

發明 衣魚主中風項強。摩之即安。

驚癇。天吊。口喝。淋閉。服之即愈。皆手足太陽經病。乃神農本經之藥。古方盛用。今人罕知。合鷺屎白殼蠶數粒。研滅。

鼠婦本經名蜘蛛

酸鹹無毒。

發明 金匱治久瘻。鼈甲煎丸中用之。以其主寒熱去瘀積也。古

方治驚癇。血病多用之。厥陰血分藥也。千金治產難遺尿。以鼠婦七枚。熬研溫酒服之。痘瘡倒盛。為末。酒服一字。即起。又解射干蜘蛛毒。

麿蟲本經名地蠶

鹹寒有毒。或去足炒用。或酒醉死。去足搗汁用。

本經主心腹寒熱。酒洒血積癥瘕。

破堅下血閉。

發明

麿蟲伏土而善攻隙穴。傷之不死。與陵鯉不殊。故能和傷損散陽明積血。本

經治心腹寒熱。酒洒亦是積血所致。金匱大黃麿蟲丸。用水蛭麿蟲取其破堅。下積血耳。無實結者勿用。跌撲重傷。焙乾為末。酒服二錢。接骨神効。

蟲蟲即蜚

苦微寒有毒。即噉牛血，蠅去翅足炒用。本經逐瘀血，破血積，堅瘡，微瘕，寒熱，通利血脈。

九竈。發明。蟲食血而治血，因其性而為用。肝經血分藥也。本經治癥瘕寒熱，是因癥瘕而發寒熱。與蟻螂治腹脹寒熱不殊。仲景抵當湯丸水蛭蟲蟲雖當並用。二物之純陰懸殊。其治經閉用四物加蜚蟲作丸服甚良。以破瘀而不傷血也。苦走血，血結不行者，以苦攻之。其性雖緩，亦能墮胎。蟾蜍。皮平涼微毒。肉甘平無毒。捕取風乾泥固煅存性用。其目赤嘴赤者有毒。○一種色青而生陂澤中者曰鼈。與此不同。發明。蟾蜍土之精也。習土道者賴之。其形大而背多瘤磊者是土性厚重，其行極遲。土生萬物，亦能化萬物之毒。故取以殺疳積。治鼠癰、陰蝕、疽癰。燒灰傅惡瘡並效。弘景治溫病發斑困篤，用以去腸。生搗一二枚，啜其汁，無不瘥者。治瘍大傷，先於頂心拔去血髮三四莖，即以蟾蜍一二枚搗汁生食，小便內見沫，其毒即解。又破傷風用二枚，生切如泥，入椒一兩同酒炒熟，入酒二盞，乘熱飲之。少頃通身汗出而愈。發背疔腫初起，以活蟾一隻，繫定放腫上半日，蟾必昏憊，即放水中以救其命，再換一隻如前。蟾必踉蹌，再易一枚，其蟾如舊，則毒散矣。其金蟾丸治腫脹腹滿，并治小兒疳勞。腹大脰細，方用大蟾一隻，以砂仁入腹令滿，鹽泥固濟煅存性，黑糖調服一錢七。下盡青黃積糞即愈。未盡過二三日再服。以腹減熱除為度。若真不能濾注，而滴淋不前者，此元氣告匱，不可救也。

蟾酥。辛溫有毒。發明。蟾酥辛溫，其性最烈。凡用不過一分。齒縫出血及牙疼，以紙紝少許，撲之即止。蟾酥丸治發背疔腫。一切惡瘡，拔取疔瘡最捷。入外科有奪命之功。然輕用能爛人肌肉。

蝦蟆

甘寒小毒。本經主邪氣。破癰堅壅。腫陰瘡。服之不患熱病。

發明 蟑蜍蝦蟆同類異種。

故其功用亦不甚相遠。服之不患熱病。即弘景治溫病發斑困篤之意。時珍言古方多用蝦蟆。近方多用蟾蜍。蓋古人通稱蟾為蝦蟆。而蝦蟆不復入藥矣。

蠅蛙俗作 甘寒無毒。

發明 時珍曰。蠅產於水。與螺蚌同性。故能解熱毒。利水氣。但係濕生之物。

其骨性復熱。食之小便苦淋。妊娠食蛙令子壽夭。小蛙多食令人尿閉。脣下酸痛。擂車前水飲之可解。戴厚禮云。凡渾身水腫。或單腹脹者。以青蛙一二枚去皮炙熟食之。則自消也。嘉謨曰。時行面赤項腫。名蝦蟆瘡。以金線蠅搗汁。水調空腹頓飲極效。

蝌斗 發明 蝌斗生水中。蝦蟆子也有尾如魚。漸大則脚生尾脫。因其所烹之毒未化。故藏器取治火颶熱毒及腫瘍瘡。並搗碎傅之。或化水塗之。或配入敷藥中並效。又得效方。多用蝌斗陰乾待桑椹熟等分置瓶中。密封懸屋東。或搗汁浸埋東壁下。百日化泥。取塗鬚髮。永黑如漆。

蜈蚣 辛溫有毒。火炙去足用。本經主鬼疰蠱毒。噉諸蛇蟲魚毒。殺鬼物老精。除溫瘡。去三蟲。

發明 盖行而疾者。惟風與蛇。蜈蚣能制蛇。故亦能截風厥陰經藥也。嶺南有蛇瘴。項大腫痛。連喉用赤足蜈蚣二節研細水下即愈。又破傷風欲死。研末擦牙邊。去涎沫立瘥。本經言噉諸蛇蟲魚毒。悉能解之。萬金散治小兒急驚。蜈蚣一條去足炙黃。入硃砂輕粉乳汁為丸。服少許即安。雙金散治小兒天吊。日久不下。口噤反張。蜈蚣一條。酥炙去頭足。入麝香為末。以少許吹鼻至眼合乃止。若眼未下再吹之。小兒撮口。刮破舌瘡。蜈蚣末敷之。千金治射工毒瘡。蜈蚣炙黃為末敷之。小兒充瘡。蜈蚣

浸油漆之。直指方治痔瘡疼痛。蜈蚣炭末入片腦少許。唾調敷之。急救方治溫瘻。洒酒時醫涼膈散。加蜈蚣蠍尾服之。摘要治婦人趾瘡。甲內雞眼及惡肉突出。蜈蚣一條去頭足焙研入麝香少許。去硬蓋。攤烏金紙留孔貼上一夕即效。如有惡肉外以南星末醋和傅四圍其祛毒之功無出其右。蚯蚓即地龍。鹹寒小毒。白頭者良。解熱毒入鹽化水用。通經絡。采乾用。本經主蛇瘕。去三蟲伏尸。鬼疰鹽毒。殺長蟲。發明。蚯蚓在物應土德。在星為軫。水體雖卑伏而性善穴竄。專殺蛇鹽三蟲。伏尸諸毒。解濕熱療黃疸。利小便。通經絡。故活絡丸以之為君。地龍湯治痘瘡。脾腎虛熱。嬌紅。五六日漸變乾紫。伏陷者。同茅薺搗和酒釀服之即起。若乾紫色黯皮堅。為肝脾血熱。即宜犀角紫草黃連清解。非地龍所宜。溫病大熱狂妄。天行大熱。和人尿搗絞服之。熱毒從小便而去也。小便暴祕不通。亦宜用之。入葱化為水療暴聾。

蠍牛。鹹寒小毒。發明。蟾蜍蠍牛。生下濕地。陰雨即出。至陰類也。治諸腫毒。痔漏。制蜈蚣蠍薑諸毒。研爛塗之。取其解熱消毒之功耳。其形尖小而緣桑土者。謂之緣桑蠍。治大腸脫肛。和豬脂塗之立縮。此蠍諸木上皆有。獨取桑土者。正如桑螵蛸之義。

### 龍蛇部

龍骨。甘平無毒。粘舌色白者良。煅赤水飛用。飛之不細。粘著腸胃。令人寒熱。本經主心腹鬼疰精物者。魅逆泄利。膿血。女子漏下。徵瘕堅結。小兒熱氣驚癇。發明。瀆可以去脫龍骨入肝斂魂收斂浮越之氣。本經主心腹鬼疰精魅諸病。以其神靈能辟惡氣也。其治魅逆泄利。膿血。女子漏

下。取濬以固上下氣血也。其性雖濬而能入肝破結。癥瘕堅結皆肝經之血積也。小兒熱氣驚癇亦制伏之也。其性收陽中之陰。耑走足厥陰經兼入手足少陰治夜夢鬼交。多夢紛紜多寐泄精。衄血吐血。胎漏腸風。益腎鎮心為收斂精氣要藥。有客邪則兼表藥用之。故仲景治太陽證火劫亡陽驚狂有救逆湯。火逆下之因燒針煩躁有桂枝甘草龍骨牡蠣湯。少陽病誤下驚煩有柴胡龍骨牡蠣湯。金匱治虛勞失精有桂枝加龍骨牡蠣湯。十全方同遠志酒服治健忘心忡以二味蜜丸硃砂為衣治勞心夢泄梅師同桑螵蛸為末鹽湯服二錢治遺尿淋瀝又主帶脈為病故崩帶不止腹滿腰溶溶若坐水中止濬藥中功用之止陰瘧收濕氣治休息痢久痢脫肛生肌斂瘡皆用之但收濬太過非久痢虛脫者切勿妄投火盛失精者誤用多致溺赤濬痛精愈不能收攝矣。

龍齒 濬平無毒煅赤醋淬七次水飛用形如筆架重數兩外光澤如甕碎之其理如石內如龍骨舐之粘舌者真亦有微黑而煅之色如翡翠者為蒼龍齒較白者更勝其小如筭尖或如指狀者海鰄齒及骨也叢生如貫眾根者海馬齒也舐之亦能粘舌世多以等類偽充不可不辨 本經主殺精物大人驚癇諸瘻癩疾狂走心下結氣不能喘息小兒五驚十二癇發明 龍者東方之神故骨與齒皆主肝病許叔微云肝藏魂能變化故遊魂不定者治之以龍齒古方有遠志丸龍齒清魂散平補鎮心丸皆收攝肝氣之劑也又龍骨以白者為上取固上氣以攝下脫齒以蒼者為優生則微黑煅之翡翠可愛較白者功用更捷產後血暈為要藥取其直入肝藏也予聞神龍蛻骨之說初

未之信及從藥肆選覓龍齒見其骨有變化未全者半與牛骨無異始知宇宙之大無所不有即如蛇蟲之屬皆能蛻形化體豈特雲龍風虎而已哉。龍稟東方純陽之氣故能興雲致雨。東方木氣主乎生也其耳獨不司聽者陽神別走於角也春夏發現而秋冬潛伏者隨陽氣之鼓舞也虎稟西方陰暴之性故嘯則生風西方金令主乎殺也其項獨不能仰者陰威併振於尾也晝潛伏而宵奮迅者乘陰氣之暴虐也以是推之則虎骨能搜風氣健筋骨療痰重睛能定人魄魄者陰之精也龍骨能燭精氣收神識止滑脫齒能清人魂魂者陽之神也然龍性飛騰而骨獨粘者正以其滯而欲斂之始得飛沖御天非飛沖後而蛻其骨也觀本經驚癇癲疾結氣甄權鎮心安魂魄等治總皆入肝斂魂用以療陽神之脫同氣相求之妙許叔微云肝藏魂能變化故魂遊不定者治之以龍齒時珍曰龍者東方之神故其骨與齒皆主肝病。

龍角 甘平無毒 發明 龍稟東方木氣而角又督脈所發故治驚癇癲疾神魂不甯龍火上逆身熱如火及邪魅不祥深師五邪丸用之而千金治心病有齒角同用者

鼈甲本經名  
鼈魚 酸微溫小毒 本經治心腹癥瘕伏堅積聚寒熱女子小腹陰中相引痛崩中下血五色及瘡疥死肌 發明 本經鼈甲所主之證多屬厥陰其功在平肝木治血殺蟲與鼈相類亦能治陰瘻千金有鮀甲煎今藥肆多懸之云能辟蟲亦殺蟲之意

陵鯉甲俗名字  
山甲 酸微寒小毒或酥炙或黃土或蛤粉炒發鬆研用尾甲更勝 發明 穿山甲入厥陰陽明及陰陽二躋通經下乳瘻瘡癰腫發痘為要藥蓋其穴山而居寓水而食出陰入陽能竄

經絡達於病所。凡風濕冷痹之證。因水濕所致。渾身上下。強直不能屈伸。痛不可忍者。於五積散內加穿山甲七片。全蠍炒十個。葱薑水煎。熱服取汗。避風甚良。癰疽潰後不宜服。

石龍子。鹹溫小毒。綱目作鹹寒。誤產平陽山谷荆襄等處。其類有四。一種生岩石間。頭扁身長尾與身等長七八寸。大者尺餘。其狀若蛇而脚似梅花。鱗目五色者為雄。色黃身短者為雌。此物最惜鱗甲。故見人不動。捕之亦不蟄人。以其生岩石間。故本經謂之石龍子。以其善於變易。吞霆吐電。有陰陽析易之義。故字林謂之蜥蜴。楚人名為蟠螭。實一物也。入藥雌雄並用。去頭足酒浸酥炙用之。入傳屍藥。醋炙用之。一種生草澤間。頭大尾短。身粗。其色青黃。有傷則啞。草自敷。故謂之蛇醫。母能入水與石斑魚合。故又名水蜥蜴。不入藥用。一種生人家屋壁。形小身細。長三四寸。色褐斑黑者。謂之蝘蜓。吳俗名為壁虎。以其居壁而善捕蠍蠅也。或云飼之以朱點宮娥臂。故名守宮。一種似守宮而頭圓身細。長五六寸。色白如銀。通身細鱗。雌雄上下相應而鳴。情洽乃交者。蛤蚧也。荆襄領澤皆有。而西川產者最勝。捕得成對線纏炙乾。捲榕樹皮中者是也。以此明辨方無悞用之失。發明

石龍子為本經中品。而綱目主治中有別錄而無本經。豈本經之文有所殘缺歟。抑本經之文誤註別錄歟。其治五癃邪結氣利小便水道。破石淋下血者。以蜥蜴能吐電。析雨。故治癃淋利水道。是其本性。十金治癥結水腫屍疰。留飲有蜥蜴丸外臺治陰癀方用之。皆取其長於利水道耳。按蜥蜴即是石龍今房術藥中用之。以其興發助陽而無止滯之患也。

守宮一名蝘蜓

鹹寒小毒

發明

守宮食蠍薑。蠍薑乃治風要藥。詳守宮所治風症驚癇諸病。

猶蜈蚣之性能透經絡也。且入血分，故又治血病瘡瘍。以毒攻毒，皆取其尾。善動之義，麻城移痘方。治痘出眼目及正面稠密，用以移痘於不傷命處。其効最捷。觀術士以守宮尾杵為細末，彈熟肉上，其肉便翕翕蠕動，移痘方得非從此悟出？陶弘景云：蝘蜓喜緣離壁間，以硃飼之，滿三斤研乾末，以塗婦人臂，有交接事便脫，故名守宮。蘇恭曰：飼硃點婦人臂，誤說也。張華言必別有術，今不傳矣。時珍曰：守宮祛風石龍利水，功用自別，不可不知。

蛤蚧 甘鹹溫小毒。生嶺南城垣榕樹間，及粵西橫州等處者，長七八寸。蜀中產者，不過五寸。頭圓肉滿，鱗小而厚，形似守宮，鳴則上下相呼，雌雄相應，情洽乃交。兩相抱負，自墮於地。人往捕之，亦不知覺，以手劈之，至死不開。取以曝乾，為房中要藥。即尋常捕得者，功用亦相仿佛。但驗其圓圖成對，捲榕樹皮中者，即真無疑。入藥去頭留尾，酥炙用之，口含少許，疾走不喘者，是其益氣之驗也。發明 蛤蚧味鹹歸腎經，性溫助命門，色白利肺氣，功兼人參，年內之用，而治虛損痿弱，消渴喘嗽，肺癆吐沫等證，專取爻合腎肺之氣，無以逾之。愚按蛤蚧龍子，性皆溫補助陽，而舉世藥肆中皆混稱不分。醫者亦不辨混用。龍子剖開如皮，身多赤斑，偏助壯火，陽事不振者宜之。蛤蚧則纏束成對，通身白鱗，專溫肺氣，虛喘之者宜之。虛則補其母也。

蛇蛻 鹹甘平小毒，火熬用之。本經主小兒二十種驚癇，蛇癇，癲癇，安胎，癥瘕，弄舌，搖頭寒熱，腸痔，丹毒。發明 蛇蛻屬巽走肝，故本經治小兒驚癇等病，一皆風毒襲於經中之象。其入藥有四義。一能辟惡，取其性靈也。故治邪辟鬼魅，蠭瘞諸疾。二能驅風，取其性竄也。故治驚癇，癰駁，偏正頭風，喉

舌諸疾。三能殺蟲。故治惡瘡。疔瘻。癰。諸疾。用其毒也。四有蛻義。故治眼目。瞼膜。胎衣不下。皮膚之疾。會意以從其類也。

蚺蛇膽即南蛇 甘苦寒小毒。發明 蛇產嶺南。稟已土之氣。其膽受甲乙風水。其味苦中有甘。所主皆厥陰太陰之病。其治心腹蠶痛者。蟲在內攻噬也。下部蠶瘡者。蟲在外侵蝕也。濕熱則生蟲。燥濕則殺蟲。內外施之。皆可取用。更能散腫消血。故直諫之臣受廷杖者。臨服少許。則血不凝滯於內。又能明目涼血。除疳殺蟲。惜乎難得真者。

白花蛇 甘鹹溫有毒。產蘄州者良。禁犯鐵。凡用去頭尾。酒浸酥炭火緩焙。去盡皮骨。此物甚毒。不可不防。腸有方勝尾。上有拂者真。發明 蛇性竄能引藥至於風痰處。故能治一切風病。其風善行數變。蛇亦善行數蛻。所以能透骨搜風。為大風白癩風。風癬驚搐。癲癇惡瘡要藥。取其內走藏府。外徹皮膚。無處不到也。陰虛血少。內熱生風者。非其所宜。凡服蛇酒藥。切忌見風。開蟬時須避其氣。免致面目浮腫。凡癰風曾服过大楓子仁者。服白花蛇無效。

烏梢蛇 甘平無毒。劍脊細尾者佳。忌犯鐵器。發明 蛇性主風。而黑色屬水。故治諸風。頑癱。皮膚不仁。風瘡癰疹。疥癬熱毒。眉鬚脫落。癥瘕等瘡。但白花蛇主肺藏之風。為白癩風之專藥。烏蛇主腎藏之風。為紫雲風之專藥。兩者主治懸殊。而烏蛇則性善無毒耳。

蝮蛇 肉大熱。膽微寒。並有毒。發明 諸蛇皆是卵生。惟蝮蛇破母腹出。惡毒尤烈。故以蝮名。其狀較諸蛇迥異。形短而粗。嘴尖鼻反。故又名反鼻蛇。有頭斑身赤如錦紋者。有黃黑青黑而斑白者。

皆蝮蛇也。有頭扁與土同色而無紋者。土虺也。亦名曰蛇。字形相類之誤也。時珍曰。蝮大虺小。其毒則一。抱朴子言。蛇類最多。惟虺中人甚急。即時以刀割去瘡肉。投之於地。其熟如火。須臾毒盡。人乃得活。一種形如蜥蜴。長一二尺者。千歲蝮也。年久脚生。能跳上樹。噉人。噉已還樹。垂頭聽人哭聲。頭尾相類。大如搗衣杵。俗名望板歸。言被其噉必死。專望板歸以備殮具也。蘇頌以細辛。雄黃等分為末。內瘡口中。日易三四次。又以枯蔓根桂末著管中。密塞勿令走氣。佩之中。其毒者急敷之。野談翁方。急以黃荆葉搗爛敷之上。皆解救之法。然有用其毒以攻疾厄之毒者。別錄取蝮蛇肉釀酒以療癩癰。蝮蛇膽磨汁以塗蠱瘡。總取殺蟲攻毒之用耳。竊謂攻毒急救之藥頗多矣。必藉此而為異端之術哉。姑存以備解救之法可也。

魚部

鯉魚 甘平無毒。其目能瞤動者有毒。藥中有天門冬者勿犯。天行病後勿食。發明 魚性逆水而上。動關翅尾。其力最勞。且目不夜瞑。故釋氏雕木象形。以警世之昏惰者。鯉性跳躍急流。故取以治水腫之病。河間云。鯉之治水鷺之利水。因其氣相感也。黃鱈脚氣濕熱。孕婦身腫宜之。使血同白蠟煮食。腦髓治耳卒聾。齒治石淋。瘡治目赤腫痛。取汁點之。鱗治產婦滯血。燒灰治吐血崩中。十灰散中用之。

鱣魚本名鯢魚  
鯢音潭 甘溫無毒。發明 鮓魚多蓄池中。飼草而長。與青鯉混雜。故名曰鮓。江湖亦皆有之。食品之長味也。時珍言。暖中和胃。此指池中蓄者而言。李廷飛言。能發諸瘡。此指湖中獲者而

言各有至理。膽味苦寒能出一切竹木刺在喉中。以酒化二三枚。溫呷取吐即出。

青魚 肉甘平。膽苦寒無毒。發明 東方色青。入通於肝。開竅於目。故膽有點目治體之功。肉有補肝逐水之用。同韭白煮食。治脚氣浸腫。目睛生汁注眼。能黑夜視物。以其好噉螺蜆。螺蜆能明日也。乾青魚膽。水磨點喉。痔瘡與熊膽同功。

鱠魚本名鰐魚 甘溫無毒。發明 池魚大都無毒。兼此魚恒食諸魚之遺。其毒雖少。不無助長濕熱之虞。有皂白二種。皂者頭大白者腹腴。雖食品之下。而有溫中益氣之功。與鱠魚無異也。

閼口魚本名鮓魚 甘溫無毒。發明 鮓生海中。與石首同類。以之剖腹曝乾亦與石首作煮無異。以其領下有骨撐開。故有閼之稱。能開胃進食。下膀胱水氣。病人食之。無發毒之慮。食品中之有益者也。鯿魚古名鮀魚 甘溫無毒。發明 鯿魚縮項。性不喜動。嚴冬喜息土中。故食之能調胃氣。而無動風發熱之慮。與白魚之性相仿。但無利水之功耳。

白魚 甘平無毒。發明 白魚入肺利水。開胃下氣。金匱治淋病小便不利。滑石白魚散用之。取其佐滑石以利氣。兼亂髮以破血。血氣通調。而淋濤止矣。同棗食之。令人腰痛。以其滲泄脾胃也。石首魚俗名鯉魚 甘平無毒。乾者名曰鯷。發明 石首魚生鹹水中。而味至淡。故諸病食之。無助火之虞。與河豚之性稟陰毒迥殊。腦中石鯪主石淋。腦骨為末。入有嘴壺中。薰腦漏然。惟暴患得效。痢疾切忌油膩。惟白煮食之最宜。

鰻膠 鹹平無毒。凡用入丸。切作小塊。蛤粉炒成珠方可磨末。煉蜜調劑。須待涼用。又不可搗。搗則

粘。穀難為丸矣。發明 諸魚之鱗皆可為膠而石首魚者膠物甚固故貴精方用之合沙菟蒺藜名聚精丸為固精要藥。丹方又以一味炒研砂糖調日服一錢治痔最良。經久痔自枯落燒灰治產後風癩破傷風瘻取其滋榮經脈而虛風自息也。

勒魚 甘平無毒。發明 勒魚腹下有骨勒人因以得名以其甘溫開胃有宜於老人之說作薑尤良脊骨治瘻以一寸入七寶飲酒水各半煎露一宿服之。

鯿魚 甘溫無毒。發明 鯿魚性補溫中益虛而無發毒之慮。其生江中者大而色青味極甘美。生海中者小而色赤味亦稍薄觀其暗室生光迥非常魚可比其鱗用香油熬塗湯火傷效。

嘉魚 甘溫無毒。發明 此魚食乳水功用同乳食之令人肥健悅澤腎虛消渴勞瘦虛損者食之最宜。

鯧魚 此魚骨柔肉脆能益胃氣食之令人肥健腹中子性寒有毒多食令人痢下。

鯽魚 甘溫無毒。烏背者其味最美以其居濁水中雖肥不無小毒然此恒用食品未嘗見其有毒傷人。發明 諸魚性動屬火惟鯽魚屬土有調胃實腸之功故有反厚朴之戒以厚朴泄胃氣鯽魚益胃氣故大明言溫中下氣保昇言止痢厚腸皆言其補益之功也。生搗塗疾核乳癰堅腫以猪脂煎灰服治腸癰合赤小豆煮汁食消水腫。炙油調塗婦人陰瘡同白礬燒研治腸痔血痢入綠礬泥固煅治反胃吐食與胡蒜煨治膈氣痞滿凡蝦俱不可去鱗以鱗有止血之功也。

石斑魚 有毒。發明 石斑魚生南方溪澗水石處長數寸大不過尺餘有雌無雄二三月與蜥

蟇交合水上。其子毒人。今人吐渴。醫說云。用魚尾草汁少許解之。

鯽殘魚俗名銀魚

甘平無毒。發明

鯽殘魚出蘇松浙江大者不過三四寸。身圓無鱗潔白如銀。小

者尤勝。鮮食最美。曝乾亦佳。作羹食之。寬中健胃而無油膩傷中之患。

海粉 鹹寒無毒。發明

海粉色碧微鹹。專行肝腎。云是海中介處。得東南水土之氣而成。與蜂

之釀蜜無異。土人採得而貨之。以供食品能散癰瘤。解毒熱。但性寒滑。脾胃虛人勿食。

燕窩 甘平無毒。發明

鳥啣海粉作窩。得風日陽和之氣化鹹寒為甘平。能使金水相生。腎氣

上滋於肺。而胃氣亦得以安。食品中之最馴良者。惜乎本草不收。方書罕用。令人以之調補虛勞。咳吐紅痰。每兼冰糖煮食。往往獲效。然惟病勢初淺者為宜。若陰火方盛。血逆上奔。雖用無濟。以其幽柔無剛毅之力耳。

鱸魚 甘平小毒。發明

鱸魚鬆脆。與石首魚相類。補五臟益筋骨。和腸胃。治水氣多食宜人。作

鮮尤良。

鯔魚 甘平小毒。發明

鯔性疎利。有補虛益胃去腹內惡血小蟲之功。醫說有邵氏女年十八。

病勞瘵累年。偶食鯔魚羹遂愈。正與補勞益胃殺蟲之說相符。膽治骨鯔及竹木刺入咽喉。不拘大人小兒。或入腹刺痛。服之皆出。臘月收大鯔魚膽懸北簷下。陰乾遇有梗者。用皂子大酒研溫服。得吐則梗隨涎出。未出再服。以出為度。酒隨量飲無不出者。如無鯔魚膽。鮀魚膏。魚鯉魚膽用鮮者。酒

調服之亦出。

鯉魚即鱸魚俗名里魚

甘寒無毒。發明

體性伏土而能勝水。故治水腫療五痔。治濕痹主脚氣。妊娠

面浮脚腫者。合赤小豆煮食甚効。丹方治水腫腹大。用活鯉魚去腹垢入獨顆蒜令滿外塗濕黃泥炭火炙食屢効。有瘡者不可食。令辦白。

鰻鰐魚。甘平。小毒。閼嘴者為鰻。尖嘴者為鰐。發明。鰻魚雖有毒。性能補虛益陰。久病勞瘵宜之。大便濡泄勿用。其功專在滋補真陰。殺勞瘵蟲與蛇同類。故主治亦近之。

鱠魚。甘大溫無毒。發明。鱠魚稟已土之氣。能補中益血。婦人產後恐露淋溼。腸鳴濕痹。並宜食之。暴乾煅灰存性。治老人虛痢。大鱠魚重筋骨者。能助勢力。食後遍體疲脹。盡力起之。大力丸。用熊筋虎骨。當歸人參等分為末。酒蒸大鱠魚取肉搗爛為丸。每日空腹酒下兩許。氣力驟長。鱠魚血力能助陽。壯年陽道不長。育龜丸用之。方用石龍子。蛤蚧。生犀角。生附子。草烏頭。乳香。沒藥。血竭。細辛。黑芝麻五倍子。陽起石等分為末。生鱠魚血為丸。硃砂為衣。每日空心酒下百丸。曾有人服此。得以嗣續宗祧者。不可以妄術論也。其尾血療口眼喎斜。同麝少許。右喝塗左。左喝塗右。正即洗法。其骨燒灰。香油調塗流火甚效。

甲魚本名鱣魚

甘溫小毒。發明

鱣魚無鱗而有脚。故俗名為著甲。江淮黃河遼海水深處皆有之。

長二三丈。通上龍門能化為龍。味極肥美。但發氣動風。和耆參食令人失音。其肝味勝河豚。食之令人血膚乾脫。亦動風之驗也。

鱈魚本名鮑魚。生江中長丈餘身。無鱗鼻與身等亦鱈屬也。

甘平無毒。發明

此魚味雖美。而發諸藥毒動風氣。發一切

瘡疥。久食令人腰痛。服丹石人忌之。勿與乾筍同食。發癰瘍風。小兒食之。成欬嗽及癩瘕。作鮓雖珍。亦不益人。

鯪魚本名鯪魚  
即鮎魚 甘溫小毒。赤目赤鬚無腮者殺人。不可合牛肝食。反荆芥。發明。鯪魚類蛇故能治風。凡口眼喎斜。切活鮎魚尾尖。朝吻貼之即正。

黃頰魚 甘平微毒。反荆芥。發明。無鱗之魚不益人。發瘡疥。不獨黃頰為然。

江鱲一名鱠魚 甘平小毒。發明。諸魚皆用翅尾游行。惟鱲不勞翅尾。逐隊齊行。故以命名。種類不一。獨產江水中者。應春而起。味極鮮美。性專降泄。故敗疽痔漏人忌食。諸鱲皆然。

河豚 甘溫有毒。海中者大毒。江中者次之。淡水中者又次之。有大小二種。大者謂之河豚。背淡青黑。無赤斑。腹白而翅傍色黃者可食。小者名斑魚。背脊黑。有丈點多赤色。其毒最甚。以稟蛟龍之氣最盛也。海人言三月後班魚得木氣全盛之時。尤不宜食。其雙尾獨目。翅赤嘴赤異常。背有赤印。領內無腮。腹中多血。獨眼無膽。皆大毒傷人。製食之法。須去其子與嘴目。及脊中肝內惡血。并去周身脂膜。則不氣腥。煮忌煤火及煤冶落入。與荆芥桔梗菊花甘草附子烏頭相反。故食河豚一日內不可服藥。河豚子必久瀆石灰水中。而後煮食。曾見水浸一夜。大如芡實也。中其毒。則昏古麻聾。頭旋目眩。足不任履。行步欹側。急宜探吐隨覓萩芽。或蘆根。搗汁灌之。橄欖汁。甘草汁。皆可解。又槐花乾。胭脂等分為末。水調服之。若腹中絞痛。昏迷倒仆者。急用真清灌之。遲則不救。發明。凡物之美者。謂之尤物。靡不賣毒傷人。如妲己亡殷。夷光傾吳。蒙其禍而不自覺也。河豚嗜鹹。內藏信智。外顯

丈刺罕口巨腹陰毒內蓄可知。凡陰毒之物必藉陽氣而為鼓舞。得春升之令而浮游水面。非信而何。散子必入淡水。既生必歸巨海。非智而何。得鹹則肥。得淡則瘦。所以淡水中者其毒漸解而不致傷人之甚也。以其味美。人爭食之。春初最為貴品。其腹腴呼為西施乳。南人有云。凡魚之無鱗無腮。無膽有聲。目能瞶者皆有毒。河豚目能開闔。觸之則曳曳有聲。嗔怒則腹脹如毬。浮起水面。故人得以取之。其毒入肝助火。莫有甚於此者。患癰瘍脚氣。一切不可食。助濕發毒動風。其患最速。惟取其子。同蜈蚣燒研。香油調搽疥癬有効。抉其目。拌輕粉埋地中化水。拔婦人脚上雞眼瘡。可以脫根。江豚 鹹腥無毒。發明 江豚形如水牛。藏器雖有飛屍蠱毒。瘡瘻之治。從未見有用之者。以之熬油點燈。照樗蒲則明。讀書紡織即暗。俗言嬾婦所化也。

比目魚 甘平無毒。發明 比目形如箸葉。故俗以是稱之。爾雅所謂東方有比目者是也。各魚一目。相並而遊。今吳中崑山最多。蓋說雖有補中益氣之說。而多食動氣。亦是助濕生熱之故。此必溺於伉儷者之所化也。

鮫魚一名沙魚 甘鹹平無毒。發明 鮫魚生南海。背皮粗錯。可飾刀靶。其肉作膾。補五藏。皮治屍疰。蠱毒。燒灰解鯁魚毒。

烏賊骨即烏鰐骨俗名海鰓鰓

鹹微溫無毒。發明

烏鰐骨。砍陰血分之藥。兼入少陰。其味鹹而走血。故

治血枯血瘕。經閉崩帶。陰蝕腫痛。丈夫陰腫。下痢疳疾。厥陰本藥也。寒熱瘧疾。蘿癰。少腹痛。陰病也。目晝流淚。厥陰敷病也。厥陰為藏血之室。少陰為隱曲之地。故諸血病陰病皆治之。按素

問云。有病胸脇支滿。妨於食。病至則先聞腥臊臭。出清液。吐血。四肢清目眩。時時前後。病名曰血枯。得之年少時。有所大脫血。或醉入房中。氣竭肝傷。月事衰少不來。治之以四烏鰌骨一蕙茹為末。丸以雀卵大如小豆。每服五丸。飲以鮑魚汁。所以利腸中及傷肝也。觀此入厥陰血分可知。

鮑魚 辛溫無毒。發明 鮑魚腥穢可淡曝。而不可著鹽。乾則形如塊肉。耑取腥穢。以滌一切瘀積。同氣相感也。入肝散血。煮汁送四烏鰌一蕙茹丸。治女子血枯經閉。內經用以療傷肝利腸而不傷伐元氣。惜乎世罕用之。今危人用以煮肉。則脂沫盡解。滌除垢膩之驗也。秦始皇死沙丘。會暑屍腐。令輶車載鮑魚。以亂其臭。始皇本呂不韋萌孽。溷則宮幃。非取其滌除遺臭之義歟。

海馬 甘溫無毒。發明 海馬雌雄成對。其性溫暖。有交感之義。故孕婦帶之於身。臨時蝦末服之。并手握之。云易產。又陽虛房術多用之。可代蛤蚧之功也。

鰐俗作鰐 甘溫小毒。鰐無鬚。腹下通黑色者。食之傷人。發明 鰐性跳躍。生青熟赤。風火之象。生搗敷小兒赤白遊風。絞汁入藥。托腫吐風痰。皆取風能勝濕也。製藥壯陽。取熱能助火也。白者下乳汁。專入氣分也。

### 介部

龜板本經名。神屋 鹹 甘平小毒。入藥取腹去背。酒浸酥炙。或熬膠用。色黑產水中者為水龜。其色黃出山者為秦龜。秦龜不入補腎藥。一種呷蛇腹折。見蛇則呷而食之。其性最毒。不可誤用。方書皆用灼過敗龜之版。取其用過。無關生命也。世以自死龜殼為敗。既死精氣已脫。取用何益。悞服反受其

毒。以其為蛇虺所傷也。今藥肆所賣龜膠。每以鹿角膠脚冲入則易凝結。亦有以黃明膠和入者。凡製膠須去背甲。以淨腹版水浸去外衣。則膠無腥濁之氣。本經主漏下赤白。破癰疽瘻瘍。五痔陰蝕。濕痹四肢重弱。小兒顛不合。發明 龜稟北方之氣而生。乃陰中至陰之物。耑行任脈。上通心氣。下通督經。故能補陰治血。治勞大凡滋陰降火之藥多寒涼損胃。惟龜版炙灰則益大腸。止泄瀉。故漏下赤白亦能療之。其治小兒顛不合。專取滋水堅骨之功。吁。龜之所主。其破癰疽瘻瘍。五痔陰蝕。濕痹重著。皆秦龜之功用。以能入脾經。治風濕也。時珍云。龜鹿靈而壽。龜首常藏向腹。能通任脈。故取其腹。以補心補腎補血。皆養陰也。鹿鼻常反向尾。能通督脈。故取其角。以補命門。補精補氣。皆養陽也。觀龜甲所主之病。皆屬陰虛精弱。腰脚痠痿可心解矣。燒灰酒服。治痘瘡。又合鹿角灰等分。入四物湯。服治血崩。災末酒服。主風痹脚弱。燒灰傅。小兒頭瘡。婦人陰瘡。鱗魚血調塗流火濕瘡。但胃虛少食。大便不實。及妊娠禁用。以其無陽生之力耳。膽汁苦寒。治痘後目腫。經月不開。取汁點之良。溺滴耳治聾。點舌下治大人中風舌瘡。小兒驚風不語。摩胸背治龜胸龜背。欲取其溺。以猪鬃刺其鼻即出。

玳瑁即碧 甘寒無毒。入藥生者良。發明 玳瑁入心主血。有解毒清熱之功。故蘇頌以之磨汁服。解蠱毒。日華破癥結。消癰毒。止驚癇。士良療心風。解煩熱。行血氣。利大小腸。時珍治傷寒熱結狂言。鮮毒清熱之功。等於犀角。同犀角解痘毒。痘瘡黑陷。乃心熱血凝。用生犀玳瑁磨汁。入猪心血少許。紫草湯調服。則熱解血和。而臨痘起矣。但虛寒而臨者勿用。

鼈甲一名上甲 鹹平無毒。九肋七肋者佳。以其得陽數也。然多有摘去下肋。僞充七肋者。亦有半邊隻肋。半邊雙肋者。此團魚與鼈交合而生。不若純隻肋者為優。醋蝦酥火。各隨本方。治瘧母。淋灰湯煮麋如飴用。龜用大者力勝。鼈用小者力優。妊婦勿食鼈肉。與莧菜鴨卵合食尤忌。本經主心腹癥瘕。堅積寒熱。去痞疾。息肉。陰蝕痔核惡肉。發明。鼈色青入厥陰肝經及衝脈。為陰中之陽。陽奇陰偶。故取隻肋為肝經之嚮導。其所主者。瘻瘍瘡母。虛勞寒熱。癰瘕痞疾。經水陰瘡。不出本經主治也。凡骨蒸。勞熱。自汗皆用之。為其能滋肝經之火也。與鼈甲同類。並主陰經血分之病。龜用腹。腹屬腎。鼈用肋。肋屬肝。然究竟是削肝之劑。非補肝藥也。妊婦忌用。以其能伐肝破血也。肝虛無熱禁之。蝦灰研極細末。療湯火傷。皮綻肉爛者並効。乾則麻油調敷。濕則乾擦。其痛立止。其解火毒。療骨蒸。殺瘵蟲之功。可默悟矣。鼈頭燒灰。酒服療小兒脫肛。婦人陰脫下墜。取其善縮之性也。生血塗尤效。沈聖符曰。食品中惟鼈最為巨測。其間多有大毒。不減河豚者。如三足兩頭。人所共棄。項強腹赤。毒可傷人。予隣余子坦。曾見蛇盤屢跌而成鼈者。四生之中。物物皆有變化。無足異也。且有鼈寶生鼈。腹中之說。說者以為誕妄。姑置罔聞。近日楓江吳氏。買一鼈烹之。輒作人言。其家以為怪也。添火烹之。剖腹果得一物。約長三寸。鬚眉宛然。聖符邀予往看。驗其鼈形。背高聳起。稍異尋常。聖符屬筆命記。以為嗜味傷生之警。

鼈甲 甘平無毒。發明。龜甲。米黃酒浸。治療瘻殺蟲。逐風惡瘡。痔瘻風頑。疔瘡。功同鼈甲。但鼈走肝。而龜走脾。故其主治稍有不同。

蟹。鹹寒小毒。未被霜者有毒。多食腹痛泄瀉。生薑紫蘇。或汁蘆根汁。並可解之。其性喜入蛇穴。得其毒則驟長。故重一動以上者。誤食殺人。又兩目相向。足班目赤者。大毒不可食。本經主胸中邪氣。熱結痛。喝僻面腫。能敗漆燒之致鼠。發明。蟹之外骨內肉。生青熟赤。陰包陽象無疑。性耑破血。故能續斷絕筋骨。本經主胸中邪氣。熱結痛。喝僻面腫。皆是瘀血為患。性能敗漆。今人生搗治漆瘡。塗火燙。皆取散血之意。日華治筋骨折傷。生搗署之。藏器云。能續斷筋。去穀用黃。搗爛微炒。納入食。令人泄瀉發癥瘕。妊娠忌食。以其性專逆水橫行也。其爪為催生下死胎胞衣專藥。千金神造湯治子死腹中。并雙胎一死一生。服之令死者出生者安。神驗方也。但以一邊運動。一邊沈著者。即是無疑。方用蟹爪一升。甘草一尺。東流水一斗。以葷薪煮至二升。去滓。入真阿膠二兩。令烊頓服。或分二服。若人因不能服。灌入即活。取蟹之散血而爪觸之即脫也。然必生脱者。運足用之。丹方治蓄血發黃。胸腸結痛。而不浮腫者。蟹殼煅存性。黑糖調無灰酒下三錢。不過數服效。若浮腫者為氣病。無藉於蟹之散血也。婦人乳癰硬腫。蟹殼灰一服即散。又以塗硃燒烟辟臭蟲薰之。即斃。則殺蟲之功從可知矣。○蟹之相類多種。如蝤蛑擁劍不常見外。其蟛蜞蟛蜞。春時甚多。蟛蜞螯毛無毒。可醯而食。蟛蜞螯毛有毒。慎食。令人吐下。又有一種生沙穴中。見人則避者。沙狗也。時珍雖言不可食。今海錯中用之。非蟛蜞之可比也。

蠻。半鹹平微毒。發明。蠻善候風。外殼內肉。與蟹無異。其血蒼色。其肉鬆脆。亦如蟹脣。能散肝

腎結血故產後痢不止及腸風瀉血崩中帶下用尾燒灰米飲服即止聖惠方治積年效噏呀呻作聲用鱉魚殼半兩貝母桔梗入牙皂末少許蜜丸噙一丸嚥汁服三丸即吐出惡涎而瘥。

牡蠣 鹹平微寒無毒煅赤用左顧者良。本經主傷寒寒熱溫瘡酒洒驚恚怒氣除拘緩鼠癰女子帶下赤白。發明 牡蠣入足少陰為軟堅之劑以柴胡引之去脇下痛以茶引之消項上結核以大黃引之消股間腫以地黃引之益精收濬止小便。腎經血分藥也。本經治傷寒寒熱溫瘡酒洒是指傷寒發汗後寒熱不止而言非正發汗藥也。仲景少陽病犯本有柴胡龍骨牡蠣湯金匱百合病變渴有枯萎牡蠣散用牡蠣以散內結之熱即溫瘡之熱從內蘊驚恚之怒氣上逆亦宜鹹寒降泄為務其拘緩鼠癰帶下赤白總由痰積內滯端不出軟堅散結之治耳今人以牡蠣濁精而治房勞精滑則慮其鹹降治亢陽精傷又恐其斂濁惟傷寒亡陽汗脫溫粉之法最妙其肉糟製即蠣黃醬也。

蚌 肉甘寒鹹寒無毒。發明 蚌與蛤皆水產而蛤則生鹹水色白入肺故有軟堅積化頑痰之功。蚌生淡水色蒼入肝故有清熱行濕治雀目夜盲之功。蓋雀目則肝腎之病也。初生小兒啞驚活蚌水磨墨滴入口中少頃下黑糞而愈。生蚌采水治湯火傷甚效古方用方諸水清神定魄以大蚌向月取水是也。

真珠 鹹甘寒無毒。發明 珍珠入手足厥陰二經故能安魂定魄明日退翳解痘疔瘡及痘瘡入眼治耳暴聾出水研細末吹之待其乾脫自愈煅灰入長肉藥及湯火傷敷之最妙然不可著水。

著水則反爛肉。

石決明一名珍珠母

鹹平無毒。丸孔者佳。麵裹煨熟水飛用。反雲母。發明 石決明味鹹軟堅。入肝

腎二經。為磨腎消障之專藥。又治風熱入肝。煩擾不寐。遊魂無定。本事方珍珠母丸。與龍齒同用。取散肝經之積熱。須與養血藥同用。不宜久服。令人寒中。非其性寒。乃消乏過當耳。

丈蛤 鹹平微寒無毒。即蛤蜊之殼厚口。光有紫斑文者。用酸漿水或醋煮半日許。搗粉用。

本經

主惡瘡蝕五痔。

發明 文蛤鹹寒。走足少陰經。為潤下之味。故能止渴利小便。別錄治欬逆胸悶。

腰痛。腸急。鼠瘻崩中。即本經主惡瘡蝕五痔之義。取鹹能軟堅。入血分也。仲景傷寒太陽病。用水割益煩。意欲飲水。反不渴者。及金匱渴欲飲水不止。並用丈蛤散。其治反胃吐後。渴欲飲水而貪飲者。則有丈蛤湯。總取鹹寒滌飲之義。

蛤蜊 鹹寒無毒。紫口者良。大都鹹寒之物。皆能清熱。開胃止渴。其殼煅赤朴粉。能清肺熱。滋腎燥。降痰清火。止欬定喘。消堅癖。散癰瘤。無不宜之。炒阿膠鱠膠用之。以其味鹹。能發滯性也。單方治乳癰。每三錢入皂角刺末半錢。溫酒調服。治肺癰。一味童便煅研。甘桔湯日進三服。屢驗。然須冬時取枯裏實。和穰子同搗。仍入殼中。懸當風處陰乾。以供一歲之用。否則難於取應也。

螺 甘平無毒。發明 螺生江湖中。與蚌蛤相類。閩人以田種之。謂之螺田。其肉可為淡乾。腸鼻糟之。以充海錯。婦人產後虛熱宜之。

魁蛤殼俗名蚶子 即瓦橘子

肉甘平。殼鹹平無毒。

發明 蝦肉僅供食品。雖有溫中健胃之功。方藥曾未

之。其殼蝦灰。則有消血塊散瘀積。治積年胃脫麻血疼痛之功。與鼈甲蟲蟲同為消瘧母之味。獨用醋丸。則消胃脫疾積。觀製蚶餅者。以蚶殼灰泡湯。搜糯米粉。則發鬆異常。軟堅之力可知。車螯一名蜃 鹹冷無毒。發明 車螯是海中大蛤。以其吐氣成樓。故名曰蜃。所謂雀入淮為蛤。鴟入海為蜃者是也。其肉解酒毒消渴。殼治瘡腫癰毒。燒赤醋淬為末。同甘草等分酒服。并以醋調敷之。日華法也。

貝子 鹹平小毒。燒赤搗細如麵。以清酒淘過用。白者入氣分。紫者入血分。花者兼入血氣。本經主目腎五癃。利水道。鬼疰蟲毒。腹痛下血。發明 貝生南海。雲南極多。土人用為錢貨交易。因其味鹹軟堅。故本經專主目腎。其治五癃等病。取鹹潤走血之力。十金脚氣丸中用。專取鹹能破堅之意。雖數十年之疾。靡不克效。以其透入骨空。搜逐濕淫之氣。和諸藥蒸作汗。次第而解之。古方點目用貝子粉。入龍腦少許。有癰肉。加珍珠末吹點。亦入老腎諸方。紫貝治小兒癰疹目腎。今人用以研紙。謂之研蠶。大者曰珂。亦名馬軒螺。治目消腎。去筋膜努肉。與貝子相類。分紫白蝦灰用之。石蠶一名龜腳 甘鹹無毒。發明 石砌生東南海中石上。蚌蛤之屬形。如龜腳。殼似海螯。與吐蚨等同為海錯。而此稍遜然。其有利小便之功。吐蚨不如也。

淡菜 甘溫無毒。發明 淡菜生鹹水而味不沾鹹。為消癰之善藥。兼補陰虛勞傷。精血衰少。及婦人帶下。理腰脚氣。不宜多食。久食令人陽痿不起。及脫人髮。一切海中苔菜皆然。不獨淡菜也。海蠃鷗名 鹹甲香 甘寒。食之能止心痛。生螺汁洗眼止痛。經二三十年者。輒

應入黃連末點之尤良。○屬性閉藏能斂香氣經月不散獨燒則臭與沈麝諸香及諸花和蠟煎成者曰甲煎可作口脂十金方用之唐李義山詩所謂沈香甲煎為庭燎者是也其殼五色璀璨為鉅最精燒過點眼能消宿翳惜乎專目科者罕知。

蠃即螺

甘寒無毒發明

蠃蚌蛤蟹龜鼈之類

皆外剛內柔稟離火之象雖居泥水而性寒治火熱之毒最捷用珍珠黃連嵌入良久取汁注目中止熱壅目痛生搗絞汁和無灰酒飲治黃輝小便不利田中大螺去掩入冰片少許埋土中一伏時化水療痔瘡又搗爛和麝香貼臍上引濕熱下行治噤口痢土牆上爛殼燒灰敷痘瘡及臍瘡濕毒生田中者得土氣多而形大生水中者得水氣多而形小其治水腫黃輝自亦腫痛痔脫肛消渴解酒之功則一座徽州溪澗中者其肉青碧可愛土人取肉焙乾以充方物但性冷利人過食令人腹痛泄濁急磨木香酒解之。

寄居蟲 甘溫無毒發明 藏器曰寄居蟲在螺殼間非螺也候螺蛤開即自出入螺蛤欲令已還殼中海族多被其寄南海一種似蜘蛛入螺中負殼而行觸之即縮入螺火炙乃出婦人難產以七枚擣酒服之或臨產兩手各握一枚與相思子無異弘景云食之益顏色美心志惜乎一時不易得也。

郎君子即相思子 發明 相思子狀如螺中之子大如小豆藏篋笥積歲猶活置醋中即盤旋不已婦人難產手把之便生屢驗。

鶴頂 辛溫大毒。發明 鶴食蛇虺而頂血大毒力能殺人。人之欲求自盡者，服之即斃。而嘉祐又以鶴血益氣力。補虛乏去風益肺。恐未必然。肫中砂石子磨水服能解蠱毒。

鶴骨 甘寒小毒。發明 鶴骨治尸疰喉痺蛇虺傷專用其毒以攻伏匿之毒也。嘴及脚骨尤良。卵能預解痘毒。水煮一枚與兒啖之。今不出痘或出亦稀。與鶴卵同功。

鵝鵝即鵝 鹹寒無毒。發明 鵝鵝好啖魚蛇及烏鵲故治痞積有鳴鵝丸用之為君。治食魚鼈成瘕者尤效。其骨酥尖和南蓬砂吹喉治骨硬忍之須臾輕輕咯之骨與痰涎俱出。

鵝鵝即鵝 鹹溫滑無毒。發明 淘鵝油性走能引諸藥透入病所拔毒。故治聾牌腫毒諸病。其舌治疗瘡取入心拔毒外出也。

鵝白者甘平無毒。蒼者有毒。嫩者尤劣。發明 鵝氣味俱厚。發風發瘡莫此為甚。別錄謂其性涼利五藏。是指蒼者而言。韓氏謂其疎風。是言白者之性耳。昔人治癰風方中取純白鵝通身之毛及嘴足之皮與肫肝內皮同固濟。煅灰存性。和風藥用之為風藥之嚮導也。然不可遺失一處。其處即不能愈。又不可用雜色者。若有一處色蒼。風愈之後。其處肌膚色黑。此與蛇發風毒。白花蛇善解風毒之義不殊。白鵝脂祛風潤燥。解譽石毒。血龍涌吐胃中瘀結。開血膈吐逆。食不得入。乘熱沒飲即能嘔出病根。以血引血。同氣相求之驗也。中射工毒者飲之。并塗其身即解。以其能食此蟲也。尾脾內耳中治聾。及聰耳。取以達三焦之氣也。涎治誤吞稻芒。亦物性之相制耳。白鵝屎絞汁治小兒鵝口瘡。蒼鵝屎傅蟲蛇咬毒。

雁 甘溫無毒。本經主風攀拘急偏枯。血氣不通利。發明 雁為信鳥。豈宜食之。故道家謂之天厭。性善通利血氣。風攀拘急偏枯。取肉炙熟帖之。昔黃帝製指南於鴈脰骨空中製鍼。取其能定南北也。但覓之不易。今人於鯉魚腦中製之。以其性專伏土定而不移。可定水土之方向也。

鷺即鴨

甘溫無毒。嫩者有毒。老者無毒。發明

鷺之逼火而生。唼水而長。未出卵時。先得火氣。

故不憚冰雪。偏喜淫雨。而尾脾燭濁最甚。故羣雌一被其氣。皆得生化之機。不待鷺尾之遍也。溫中補虛。扶陽利水。是其本性。男子陽氣不振者。食之最宜。患水腫。人用之最妥。黑嘴白毛者。治腸胃久虛。葛可久白鳳膏用之。取金水相生之義。綠頭老鴨治陽水暴腫。外臺鴨頭丸用之。取通調水道之義。白鴨生血。能補血解毒。勞傷吐血。衝熱酒調服屢効。中射工溪毒及野葛。砒霜毒灌之即解。悞吞金銀入腹。乘熱頓飲數升。其金即下。諸鴨涎治穀麥芒入喉。及小兒痙風反張。滴之即消。卵能閉氣。以混沌未分。塞人體慧。諸病忌食。而滯下尤禁。白鴨通殺石藥毒。凡服藥過劑。昏迷眩暈者。取白鴨通一合。湯瀆澄清。服之即解。勿以其穢而棄諸。

鳬即野鴟

甘平無毒。發明 鳩逐羣飛。夏藏冬見。與鴻雁不異。其在九月以後。立春以前。味極甘美。病人食之。全勝家鴨。以其肥而不脂。美而易化。故滯下泄濁。喘嗽上氣。虛勞失血。及產後病後。無不宜之。雖有安中利水之功。而方藥曾未之及。孟說除十一種蟲等治。未能深信。摘立方解。挑生蠱毒。取生鳩血熱飲探吐。於此可悟。生鵝血可吐胸腹諸蟲血積。總以血引血。同氣相應之力耳。

雞 甘平小毒。諸雞有五色者。黑雞白首者。六指者。死足不伸者。並不可食。發明 雞屬巽而動。

本草綱目卷之四  
風外應乎木。內通乎肝。得陽氣之最早。故先寅而鳴。鳴必鼓翅。火動生風之象。風火易動而易散。人之陽事不力者。不宜食雞。是以昔人有利婦人不利男子之說。而東南之人。肝氣易動。動則生火。生瘧。病邪得之為有助也。北方陽氣潛伏。最宜發越。病邪得之。便能作汗。以其能助肝氣也。姑以物性之常變言之。諸雞中惟烏骨白絲毛者最良。異家變坎。得水木之精氣。肝腎血分病宜之。烏骨雞丸治經發胎產虛熱諸病。以其峻補肝血也。今人治賊風痛癥。專取五爪烏骨雄雞。置病人痛處。任其鳴啄。少頃其痛自止。雞之五爪皆有毒。此專取其毒。以引其毒外泄也。丹雄雞治女人崩中漏下。赤白沃通神明。殺惡毒辟不祥。中惡魔魅。以血灌鼻。即鯀中風口眼喎斜。乘熱塗患處。即正難冠血。和酒釀調陵鯀甲末。治痘瘡肝熱毒盛。而變青乾紫黑陷伏黃雌雞。治產後虛羸。煮汁煎藥。最宜黑雌雞。治妊娠胎息不安。泰和老雞內托小兒痘瘡。近世治產後虛羸寒熱。亦取用之。以其能助肝經生氣也。雄雞肝。取不落水者。研爛和蜂蠟酒釀頓熟。治小兒疳積壞眼。日服無間。醫盡為度。雞肫胫俗名雞內金。治食積腹滿。反胃泄利。及眼目障翳。雞卵治傷寒發狂。欬嗽失音。並生食之。以其能助肝經。生損勿令清漏。浸尿中。冬三夏一日。取煮食之。治哮喘風痰。雞子清。治伏熱目赤喉痛。雞子黃。治產後胞衣不下。並用生者。又以煮熟去白取黃。同亂髮香油熬化。塗裏孩胎毒熱瘡。抱出卵殼研細為末。去目中障翳。燒灰蜜調塗。嬰兒頭身諸瘡。卵殼中白皮。同麻黃紫苑。治久欬氣結。煅雞子乃不孚之卵。取以同犬屎敷腫瘍。其痛立止。千金方也。雞矢白為散。無灰酒下一錢。七治鹽脹腹滿。內經雞矢醴也。唐矢和石灰末塗疔腫。半日許即能拔出。

雉即野雞

甘酸溫小毒。發明

埤雅云。蛇交雉則生蜃。蜃為雉入大水所化。推其變化之源。必由

異氣所感。水經云。蛇雉遺卵於地而為蛟。其卵遇雷則入地。不遇雷則仍為雉。於此可悟。其化蜃總由靈蛇之性未泯。不得山靈之氣。遂其飛騰。則得滄溟之氣。恣其吞吐。是與虹蜺奚擇哉。別錄言其補中益氣力。止泄痢。除蟻瘞。此指異常之雉而言。千金以之治蟻瘞。因其喜於食蟻。乃用以制之也。周禮庖人供六禽。雉是其一。亦食品之貴。然有毒不可常食。有病人尤非所宜。而春夏不可食者。以其食蟲蟻也。時珍曰。雉屬離火。雞屬巽木。故煮雞則冠變。煮雉則冠紅。火性暴烈。發痔發瘍。與家雞子同食。令人發疽。週身疼痛。為患種種。恐得謂之無毒乎。

烏鵲 酸甘平無毒。種類有四。小而純黑者為烏。大嘴而腹下白者為鵲。並入藥用。其項白而大者為燕。烏嘴赤而小者為山烏。皆不入藥。發明 慈烏反哺。性稟孝慈。嘉祐雖有補勞治瘦之功。骨蒸羸弱。欲嗽之治。然血肉之中。豈無他味。而忍傷孝慈之物哉。烏鵲嘴大。貪戾傷生。時珍取治暗風癇疾。勞傷吐血。欲嗽殺蟲等病。專取搜逐風毒之用。與慈烏之調補虛羸。各有仁慈剛暴之用。奚啻

天淵。

鵲巢  
鵲重

甘寒無毒。發明 鵲性靈慧。能知吉凶。觀其營巢開戶。必背太歲而向太乙。非鶴鳩之可比。別錄用之為下石淋專藥。以其鳴必掉尾。取其週身之氣。悉向下通也。藏器有云。燒灰淋汁飲之。令人淋石自下。蘇頌言。婦人不可食。以其相視情通。音感而孕也。其腦燒之。入酒同飲。令人相思。蘇頌之說得非緣此。○鵲重巢日華取多年者燒之。療頭狂鬼魅。及蠱毒。仍呼祟物名號。亦敷瘡瘍。

千金治婦人難產。取多年生育相安之義。

鷓鴣 甘溫小毒。發明 此物食烏頭半夏苗。好啖此者多發咽喉頭腦腫痛。甘草生薑並可解之。唐本言鷄鴣治嶺南野葛菌子生金毒及溫瘡久病欲死者。合毛熬酒漬服之。或生搗汁服取良。日華云酒服主蠱氣欲死。孟說云能利五藏益心力令人聰明。

鶉 甘平無毒。發明 鶉主腹大如鼓。鮮熟結療小兒疳。按鶉乃蛙化氣性相同。蛙與蝦蟇皆解熱結。治疳利水消腫。則鶉之消鼓脹。蓋亦同功。食後下如鶉脂數次即愈。

鴿 鹹平無毒。發明 鴿之品類頗多。惟白者入藥能解諸藥毒。久患虛羸者食之有益。調精益氣。治惡瘡疥癬風瘡。白癩風癩瘻瘍風煮熟酒服無不宜之。鴿卵能稀痘。其矢氣嗅之能殺瘧蟲。虛勞家咸多畜之。

鶯俗作鶯。即黃鸝。月令名倉庚。

甘溫無毒。發明 此鳥感春陽先鳴。故能補益陽氣。食之令人不妒。以陽和

之氣能勝陰毒也。按陽變止妒論云。梁武帝御后性妒。或言倉庚為膳療治。遂令食之。如果減半。雀卵 甘溫無毒。服术人忌食。發明 雀屬陽而性淫。故能強壯陽事火。衰陰痿精寒者最宜。陰虛火盛者禁用。雀卵治血枯。素問有四鳥。飼骨一薦茹丸。用之最妙。如無雀卵。生雀肝代之。頭血主雀目。腦用綿裹塞耳治聾。雄雀屎名白丁香。去目中腫膜及面上黑。但取直者即雄。與假鼠糞無異。入藥有効。

伏翼即蝙蝠屎。夜明沙。

鹹平無毒。伏翼煅灰用。夜明砂淘淨焙用。本經主目瞑癢痛。明日夜視有精光。

其屎治面癰。腫皮膚洗洗時痛。腹中血氣破寒熱積聚。除驚悸。發明 本經治目暎。瘡痛。用伏翼。近世目科惟用夜明砂。鮮有用伏翼者。要皆厥陰肝經血分藥也。其伏翼屎能破結血消積。故目醫盲障。瘡。髓。淋。帶。凜。瘡。癰。疽。皆用之。然蝙蝠食之大能利人。稍虛者不可輕用。

五靈脂即寒號蟲失

苦酸寒小毒。研細酒飛去砂石晒乾。生用則破血。炒用則和血。發明 鳴

鳴候時鳥也。晉地有之。春夏羽儀豐盛。冬時裸形。晝夜哀鳴。故楊氏丹鉛錄謂之寒號蟲。屎名五靈脂。謂狀如凝脂。而受五行之靈氣也。其氣腥穢。其味苦酸。大傷胃氣。綱目言其甘溫。恐非正論。雖有治目翳中脫。疼痛之功。惟藜藿麻可應用。縱非膏粱所宜。同蒲黃名失笑散。治一切心胸腹腸少腹諸痛。及產後結血。血崩。目中生翳。住來不定。其性入肝。散血最速。但性極羶惡。脾胃虛者不能勝其氣也。

斑鳩 甘平無毒。發明 斑鳩補腎。故能明目。治虛損益氣。食之令人不噎。目科斑鳩丸。錦鳩丸。用之取氣血為引導。以助補腎明目之功也。

伯勞 平有毒。發明 方藥未有用者。其毛治小兒繼病。俗作鵙病。取毛帶之。繼病者母有娠。乳兒病如瘧痢。他日相繼腹大。或瘻或發。他人有娠相近。亦能相繼也。北人未識此病。

鶲鴒俗名八哥 甘平無毒。發明 鶲鴒目和乳汁滴目。令人目明。能見宵外之物。甚言明目之効耳。肉治噎逆。及五痔止血。並炙熟食之。

啄木鳥 甘酸平無毒。形色與畫眉鳥相似。但頭頂有紅毛一片。嘴與爪皆堅銳如鐵。故能啄木取

蟲不可不辨。發明 啮木性專殺蟲。故能治人藏府積蟲之患。時珍治勞瘵癰瘍。皆取制蟲之義。燒灰存性。治痔漏。蟲管納孔中。不過二三次愈。丹方治噎膈。諸藥不效。以之敷膏。入麝香一錢。七晝夜六時嗅之。膈塞自開。蓋噎膈多有因鬱積所致。以其善聞木鬱之邪也。

鷓鴣即水老鴟 酸鹹溫微毒。或云鹹寒誤。發明 鷄鴣性寒。利水。能治腹大如鼓。體寒者。以鷄鴣燒存性為末。米飲服之。其骨煅灰蜜調綿裹。治魚骨梗。與白鷺骨同功。嘴骨尤効。○鷄鴣屎多在石上。色紫如花。就石刮取。名蜀水花。能去面上黓黑蠻痣。減瘢痕。及湯火瘡痕。和豬脂敷疔瘡。

鷹屎白 微寒無毒。本經主傷撻滅瘢。發明 虎嘯則風生於地。鷹揚則風動於天。具體雖殊。機應則一。鷹具雄健之翮。不能長恃無虞。至秋火伏金生。令行改革。勁翮漸弱。翎未振。即有雄風。未遂奮揚。是以衆鳥侮之。月令所謂鷹乃祭鳥是也。古聖觸物致思。專取鷹之屎白。減傷撻痕。雖取穢惡滌清。實取其翮之善脫也。後人推而廣之。用以滌除目中宿翳。吹點藥中。咸取用之。其屎中化未盡之毛。謂之鷹條。入陰丹陽丹。不特取其翮之善脫。以治難脫之病。并取其屎中未化之羽。以消目中未脫之翳。頴脫之妙用。崇古未宣。因顯示後起。毋失本經取用之義。

鷗 溫小毒。發明 鷗鷂鷗骨。皆能接骨。以鷗鳥之力在骨。故以骨治骨。從其類也。折傷斷骨。燒灰每服二錢酒下。在上食後。在下食前。骨即接如初。但在三日內者易治。三日外則難治。以氣血凝滯。不能合轍也。

鷗 鹹平小毒。發明 鷗頭治頭風目眩。顛倒癇疾。千金治頭風眩轉。面上游風。有鷗頭酒。聖惠

治旋風眩冒有鵝頭丸。總取旋風健搏之力。

鵝 甘溫小毒。發明 鴟治風癆噎食。取初生無毛者一對黃泥固濟。煅存性為末。每服一匙。溫酒服之。頭主痘瘡黑陷。用臘月者燒灰。酒服之當起。

鵝鵠俗呼貓頭鷹 酸微鹹小毒。發明 鴟鵠不祥之物。古方罕用。近世治傳屍勞瘵專取陰毒之味。以殺陰毒之蟲也。方用鵝鵠酒煮焙乾同大蠻鱠七條攤薄荷上蒸爛和薯蕷一觔。搗焙細末為丸。空腹酒下三錢。功用與獺肝彷彿。方士用以昏夜露煮。以聚鬼魅。是以至陰之味誘至陰之物也。鵝 大毒。發明 鴟產蠭毒瘴癘之鄉。鍾毒最烈。非宿檳榔不能自安。以其無枝人莫能捕也。人欲求自盡者。以翅羽調酒服之立斃。與鵠頂之毒無異。別錄云鵠喙殺蝮蛇毒時珍言。蝮蛇中人刮末塗之即愈。如極惡之人有以用之。未嘗不解危救急也。

### 獸部

猪 甘平無毒。同驢馬肉食之。令人霍亂。同年肝食之。令人心悶。與生胡荽同食傷人臍。發明

猪屬水獸。性嬾善淫。飽食無所用力。周身脂膏不流。故人食之助濕生痰。莫此為甚。而肥盛之人尤非所宜。一種蹄甲白者。有金水相生之象。稍異尋常。鹽漬風乾製為南腿。有補養脾胃之能。病人食之略無妨礙。良非鮮者之比。丹溪云。豬肉補陽。陰虛者切宜少食。蓋肉性入胃。使作濕熱生痰。疾生則氣不降。而諸證作矣。故疾嗽家最忌。然肺燥乾咳。及火嗽痰結者。食之痰即易出。其嗽便止。但不宜過鹹耳。當知助濕生痰。惟中間膘脂一層。專助脾濕。若皮則走肺。益氣精者補肝益血。但嫌難尅。

化耳。其汁則全是膘脂鎔化食之滲入經絡故東垣言之頗詳。千金治打傷青腫。尖精豬肉搗之。小兒火丹。生豬肉切片貼之。漆瘡作瘻宜啖豬肉。并以豬脂塗之。男女陰蝕肥豬肉煮汁洗之。不過三十劙瘡山行石蛭著人足則穿肌入肉。但以臘脂膏和鹽塗足胫趾即不著人也。急救方治竹木刺入肉。以多年熏肉切片包裹即出。其腎性堅難化且藏淫火最不益人而治腎虛腰痛。豬腎切開入人參末一錢濕紙裹煨。每日空心嚼一枚或入青娥丸中煮食並効。其治水脹用豬脂丸。便血用藏連丸皆以為引藥入病處耳。心血治驚風癲癇。蓋以心歸心以血導血之意得冰片入心經也。卒中惡死尾血灌之。取其動而不息之意并縛豚枕之即活。蛇入人孔割母猪尾血滴入即出。用肝者。肝主藏血。血病用為嚮導。故脫肛肝虛雀目用之。胆即三焦能滌除腎藏邪毒垢膿故同胡黃連等藥治徽瘡最捷。用膽者取其濁肝膽之火。故仲景白通湯用為嚮導。蓋寒能勝熱滑能潤燥苦能入心也。傷寒熱邪燥結有豬膽導法。又膽汁和香油等分亦治徽瘡結毒清晨連服七日大便下泄邪食日日服之稍或遲延氣血衰冷不可療矣齒治驚癇乳能斷酒。十金方用之。其膚者皮上白膏是也。取其鹹寒入腎用以調陰散熱故仲景治少陰病下利咽痛胸滿心煩有豬膚湯予嘗用之其効最捷。豚卵治陰莖中疫驚癇鬼氣蠱毒除寒熱貢豚五瘡邪氣攀縮。豬蹄煮湯去油煎催乳藥及熊洗潰瘍有効。蹄甲本經治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕今日瘡外瘡亦用之。豬腦治風眩腦鳴凍瘡癰疽塗紙上貼乾則易之。禮記云食豚去腦。孫真人食忌云。豬腦損男子陽道酒後尤不可食。延壽

書云以鹽酒食豬腦。是自引賊也。豬骨燒存性為末。水服方寸匕。治食諸果中毒。又解馬肝漏脯等毒。豬毛燒灰。麻油調塗。湯火傷。留竅出毒則無痕。豬屎古方取用頗多。千金治患霧氣。心煩少氣。頭痛項急。起則目眩。欲倒戰掉。不安。憎寒微熱。心中欲吐。吐時無物。用新豬屎二升半。內好酒一觶。攬令散。以生布絞取汁。更以綿濾頓服之。即地鋪暖覆卧面前。著火常令汗出。得汗待其自乾乃起。亦治風勞鹽毒。燒灰治痘瘡黑陷。無價散用之。又衝沸湯薰麻疹。隔伏即起。總取穢惡以辟不祥之氣。同氣相應之用耳。

狗 鹹酸溫無毒。熱病後忌食。妊婦食之。令子無聲。發明 狗屬土而有火。故久人履其地。雖卧必省。天時亢熱。則卧陰地下。元虛人食之最宜。但食後必發口燥。惟啜米湯以解之。敗瘡稀水不斂。日噉狗肉最佳。痔漏人歲久不愈。日食自瘥。凡食犬肉不消。心下堅。或腹脹。口乾大渴。心急發熱。妄語如狂。或洞下泄。以杏仁一升。合皮熟研。沸湯三升。和取汁。分三服。利下肉片大驗。狗膽本經主明日。取其夜能見物也。陰莖治傷中陰痿不起。除女子帶下十二疾。狗頭骨煅末。止婦人崩中下痢。取其溫而能散也。狗屎中米名戌腹糧。又名白龍砂。主噎膈風病。及痘瘡倒點性。用此堆漿為最。取其性溫熱也。若乾紫黑焦為血熱毒盛。慎勿誤用。其血能破妖邪。以性屬陽。陰邪不能勝之也。

羊 甘溫有毒。羊類多種。惟白羯者良。胡羊毛捲。洮羊毛豐。肉厚皮薄。並可為裘。咩羊墳首。繙羊色黃。形羸味薄。不堪供饌。凡煮羊忌用銅器。有宿熟者不可食。大病食之必發熱。瘡家及痼疾家食之必發。以其食百草之毒也。羊肉不可共生魚鮓食。能害人。白羊黑首。食其腦作腸癰。羊肝共生椒食

之傷人五藏。羊蹄中有白珠者。名羊懸。食之令人癲。羊獨角及四角者。闊外有之。皆有毒不宜食。發明。羊為肺家之獸。目無瞳子。周身之氣皆聚於肺。故其氣最腥膻。而性味甘溫。色白。補肺。是以昔人有人參補氣。羊肉補形之說。金匱治產後腹中虛痛。及少腹寒疝。並用當歸生薑。羊肉湯。專取羊肉之甘溫。煮湯去滓。以助當歸生薑。辛散之力。虛滯得以開矣。羊腎治腎虛膀胱熱。胞婢小便淋瀝。夜脹。千金腎瀝湯以之為主。羊石子。即羊之外腎。治腎虛精滑。本事金鎖丹用之。羊脬治下虛遺溺。溫水漂淨。入補骨脂。焙乾為末。卧時溫酒服半兩。不過四五服。即瘥。羊肝補肝。專主肝經受傷。目無精光之病。膽治青盲目暗。膽闢數於目。膽汁充則目明。膽汁減則目暗。古方碧雲膏。膽月取羯羊膽。以蜜盛滿。懸簷下。待霜出。取藏。點眼神効。羊乳潤而且補。反胃人宜時時食之。取開胃脫潤大腸之燥也。青羊者尤良。羊肺治嗽止渴。久嗽肺虛者宜之。羊肺主反胃止汗。治虛羸小便數。羊脂。生主下痢脱肛。取潤以導之。補中寓濡也。熟主賊風癩。潤肌膚。入膏透經絡。風熱毒氣。婦人產後腹中絃痛。丸劑中最宜。羊脂條除藏府垢膿。與豬脂同功。而入肺祛痰尤捷。羊骨稟西方堅勁之氣。最銳得火服以濟之。可以消銅鐵。故悞吞銅鐵者用之。觀磨鏡者。非此不明。其治賊風癩。同虎骨煅灰酒服。皆隨痛處取用。羊鬚燒灰敷小兒頸癧。并療蠭蛇尿瘡。羊胎糞乾入藥。亦能補人。與鹿胎紫河車同入六味地黃丸中。名三胎丸。調補腎虛羸瘦。最為得力。羊血解石藥毒。外臺云。凡服丹石人。忌食羊血。十年一食。前功盡亡。凡服石藥覺毒發。刺羊血熱飲一升。即解。服地黃何首烏補藥者忌之。

羖羊角

羖音古  
黑羊也

鹹平無毒。

本經主青盲明目。止驚悸寒泄。久服安心益氣輕身。殺蟲入山燒

之辟惡鬼虎狼。

發明

羖羊與羚羊俱是野獸。羖則雄猛倍甚。角亦起稜。與羚羊不殊。但色黑如漆。

故專伐腎邪。辟不祥。與羚羊大都彷彿。互參本經。此言青盲明目。即羚羊之專主明目也。此言止驚

悸。即羚羊之治驚寐也。此言止寒泄。即羚羊之去惡血注下也。此言久服安心益氣輕身。即羚羊之益

氣起陰氣也。此言殺毒蟲。辟惡鬼虎狼。即羚羊之辟蟲毒惡鬼不祥也。但此主寒泄。本于腎虛不能

攝津。彼主惡血注下。係于肝傷。不能統血。而別錄治蟲毒吐血。又與羚羊主治相符。究其大綱。此專

補救瞳人。彼專消磨醫障。一皆證治之常。至於燒之辟惡鬼虎狼。如此奇突。迥出意表。非尋常之可

擬也。

牛 甘溫無毒。同豬肉食之。生寸白蟲。獨肝牛善噉蛇。食之傷人。春月自死牛肉。及生疔牛肉食之。令人瘧急。以生甘草煮汁解之。剥瘧牛傷手足者。令人脹滿。宜解之。遲則不救。發明 黃牛肉補氣。與黃耆同功。觀丹溪倒倉法論。而引伸觸類。則牛之補土可心解矣。又以黃牛肉取四蹄各五斤。熬膏去滓。收乾。如鹿膠法。名霞天膏。主中風偏廢。口眼歪斜。痰涎壅塞。五藏六府留瘀宿飲。辟塊。手足皮膚中疾核。及大病後極虛羸瘦。每斤入茯苓四兩。煖溶。空腹酒服三四錢。肥盛多疾者。每斤入半夏糊四兩。廣皮二兩。九服大效。牛本屬坤土。而膽主風木。故能鎮肝明目。臘月用釀南星末。陰乾。歲久多製。則苦潤不燥。治經絡風疾。及小兒驚瘧。其功不減牛黃。牛骨髓。補中填骨髓。久服增年。能潤澤肌膚。黃牛腦和藥。治頭風腦漏。牛角膠。本經下閉血瘀。血疼痛。女人帶下血崩。燔之酒服。宗

奭曰。燒灰主婦人血崩。大便下血。血痢。牛血性溫能補脾胃諸虛。治便血血痢。一切病後羸瘦。咸宜食之。其屬乃肺系肉團。瓦上焙乾為末。酒服治喉痹。氣燙。古方多用之。或以製藥益佳。取引入肺經。以通氣結耳。與猪羊膚療治不殊。牛齒燒灰治小兒癆。牛乳補虛羸。止渴。噎膈反胃。大便燥者宜之。入生薑蔓白。止小兒風熱吐乳。牛馬肉共生魚食之成鼈瘕。牛尿治水腫。但胃虛少食人勿用。牛屎燒灰傳小兒痘瘡潰爛。產寶治子死腹中。以濕牛糞塗之。牛齒草絞汁治反胃噎膈。取其沾涎之多也。馬半溫有毒。綱目作甘涼。非馬腳無夜眼。白馬黑頭。白馬青蹄者皆不可食。鞍下肉食之殺人。肝亦不可食。以鞭驅之傷。皆聚於肝也。食馬肉中毒欲死。以香豉杏仁各二兩。蒸熟杵末服之。或煮蘆根汁飲之。發明 按靈樞經云。卒口僻急者。目不合。執則筋縱目不開。頰筋有寒則急。引頰移口。有熱則弛緩。緩不勝收。故僻治之以馬膏。膏其急頰。以白酒和桂塗其緩頰。以桑鈎勾之。即以生桑灰置之坎中。高下以坐。等以膏熨急頰。且飲美酒。噉炙肉。不飲酒者自強也。為之三拊而已。世多不知此方之妙。竊謂口頰喝僻。乃風中血脉也。手足陽明之經絡於口。會太陽之經絡於目。寒則筋急而僻。熱則筋緩而縱。故左中寒則逼熱於右。右中寒則逼熱於左。寒者急而熱者緩也。急者皮膚頑瘠。營衛凝滯。治法急者緩之。緩者急之。故用馬膏之甘平柔緩。以摩其急。以潤其痺。以通其血脉。用桂酒之辛熱急束。以塗其縱。以收其縱。以和其營衛。以通其筋絡。桑能治風痹。通節竅也。病在上者。酒以行之。甘以助之。故飲美酒。噉炙肉。云耳。馬白睛。治癲癧時。發十金方用之。馬心食之善忘。馬肺食之寒熱萎陽。馬鞍下肉食之。傷人五藏。馬乳祛風止渴。白馬蹄本經主驚邪癥。從乳難辟鬼氣鬼。

毒。鹽牽不祥。別錄止劙內崩齷齒。白馬者。治婦人白崩。赤馬者。治婦人赤崩。鬚毛主小兒驚癇。女子崩中赤白。隨其色用之。燒灰止血塗惡瘡。尾主女人崩中小兒客忤。白馬陰莖。本經主傷中絕脈。陰不起。強志益氣。長肌肉。肥健生子。野馬陰莖食之。令人陰萎。野馬肉食之成馬癟。筋脈不能自收持。馬溺微寒小毒。治癰疽有驗。反胃有蟲積者。亦能治之。潰瘍著肉腐爛徹骨。每能傷人。馬矢悶風癥藥酒。取其透達。直入病所也。馬通止血解毒。李金梅師治吐血劙血。肘後治半中惡吐利不止。經驗治綠腸沙腹痛欲死。俱絞汁服之。又肘後治久痢赤白。聖惠治傷寒勞復。俱燒灰服之。十金治筋骨破傷。以熱馬屎敷之。又治破傷腫痛。以馬屎燒烟熏之。聖惠治疗腫傷風腫痛。以馬屎炒熟熨之。靈樞椒薑桂酒置馬矢燭中。助一切藥力也。今人以馬屎煨烟熏鼈蟲臭蟲。無不斃者。食馬肉心煩者。飲美酒則解。飲濁酒則劇。

驢 甘溫無毒。綱目作甘涼誤。發明 驢肉食之動風。脂肥尤甚。日華子言治一切風。是指烏驢而言。烏驢皮治風補血。東魯阿井水煎膏用之。驢薯膏。能長髮髮。與馬薯同功。驢莖。強陰壯筋。與白馬莖同功。驢乳療黃疸濕熱止渴。驢尿專於殺蟲。利水止脹。其治噎膈或單服或入四物湯服之。劙驢屎炒熨風腫漏瘡。絞汁主心腹疼痛。治水腫服五合良。

駝峯 甘溫無毒。發明 駝峯八珍之一味。雖極美。但能動風。宿有風氣人勿食。駝脂摩風去頑皮死肌。取熱氣透肉也。

酪 甘平無毒。發明 凡牛羊駝馬之乳。並可作酪。南人惟知熟酒冲食。北人必以熬熟冲茶漿。

服大能清胃。不助濕熱。止煩解渴。除心膈熱悶。潤腸胃燥結。厚腫生精血。補虛損。壯顏色。戴原禮云。乳酪血液之屬。血燥者宜食。較之人乳尤勝。以其無怒火淫毒也。華元化云。蛭蛇入耳。以酪灌入即出。酥一名醍醐 甘寒利下無毒。酥酪不可與生魚膾同食。令人腹內生蟲。發明 酥酪醍醐性皆滑潤。故血熱枯燥之人。咸宜用之。又傷熱失音。用以通聲最妙。凡失一切氣血堅斂筋骨藥俱不可少。但脾胃虛滑者禁用。

阿膠 甘平微溫無毒。辨真偽法。以頂有鬃丈。極圓整者為真。折之沉亮。不作屑。不作皮。其蛤粉炒成珠。經月不軟者為佳。東阿產者。雖假猶無妨害。其水膠入木煤質造。有傷脾氣。慎不可用。本經主心腹內崩。勞極酒洒如瘧狀。腹痛四肢酸疼。女子下血安胎。久服輕身益氣。發明 阿井本淄水之源。色黑性輕。故能益肺補腎。煎用為驢必陽。谷山中驗其舌黑。其皮表裏通黑者。用以熬膠。則能補血止血。本經治心腹內崩。下血安胎。為諸失血要藥。勞證咳嗽喘急。肺痿肺癰。潤燥滋大腸。治下痢便腹血。所謂陰不足者。補之以味也。

黃明膠即廣 甘平無毒。發明 明膠治吐血衄血下血。血淋血痢。妊娠胎動下血。風濕走注疼痛。打撲傷湯火傷。一切癰疽腫毒。治血止痛潤燥利大小腸。皆取其有滋益之功。無滑利之患。

牛黃 苦平小毒。試真假法。揩摩透甲。其體輕氣香。置舌上先苦後甘。清涼透心者為真。喝迫而得者。名生神黃。圓滑外有血絲。嫩黃層多者為上。剝後取者其形雖圓。下面必扁者次之。在角中者名角黃。心中剝得者名心黃。膽中得之名膽黃。則又次之。產西戎者為西黃。產廣東者為廣黃。本經

主驚癇寒熱。熱盛狂瘲。除邪逐鬼。  
發明 牛有黃。是牛之病也。因其病之在心及肝膽之間。凝結成黃。故遷治心及肝膽之病。本經治驚癇寒熱。狂瘲邪鬼。皆痰熱所致。其功長於清心化熱。利痰涼驚。安神辟惡。故清心牛黃丸以之為君。其風中心藏者亦必用之。若中經中府者誤用。引邪深入。如油入麵。莫之能出。宜詳審而用可也。

狗寶 甘苦溫小毒。狀如白石。微帶青色。擊碎其理。如蟲白臘者真。  
發明 狗寶專治噎膈反胃之病。取苦能下降。溫能開結也。予嘗推廣其用。凡癰疽潰瘍不收。癩狂冷瘻積無不可用。惟鬱結傷脾氣血枯槁者。誤投則有負薪救火之厄。

獅油 辛溫有毒。色微黑者真。  
發明 獅為百獸之長。性最難馴。一吼則百獸辟易。爾雅言其食虎豹熊。太古言其乳入牛羊馬乳中。皆化成水。西域人捕得。取其油入煎。以供宮人滌除衣垢之用。又能去紙上墨跡。刮少許隔紙熨之即脫。予嘗試用。垢雖去而衣易毀。紙易脆。僅供一時之用。雖係方物。方藥罕用。近世醫師以之治噎膈病。蓋噎膈皆鬱瘻瘀積所致。用取滌垢之意。試之輒驗。由是方家爭為奇物。但性最猛烈。力能墮胎。孕婦忌用。象油 亦能去垢滌痰。但不能去墨跡耳。

虎骨 平微熱無毒。骨取黃潤者良。若帶青黑色乃藥箭射者。有毒勿用。酥炙黃脆用之。  
發明 虎陰也。風陽也。虎金也。風木也。虎嘯風生。木承金制。陽出陰藏之義。故骨能追風定痛。強筋壯骨。風病掣急。骨節風毒為之要藥。虎之一身。節節氣力皆出前足。故膝胫為勝。而前左胫尤良。以卧必用左胫為枕也。然按病之前後左右取用。其效尤捷。入陰陽二躋。虎睛定魄。千金治狂邪。有虎睛湯丸。

並酒浸災乾用。一時不可得。以珍珠煅末代之。總取定魄之用也。虎膽治反胃吐食。新瓦上煅存性入平胃散末。和勻。空腹白湯服三錢效。虎頭骨治頭風藥中浸酒服。作枕止瘡。虎長牙辟邪殺蟲。傳尸方用之。

象皮 鹹溫無毒。發明 象東西方金氣。金令主藏。不宜擅鳴。鳴主金象。大非所宜。其皮專於收斂。其肉壅腫。人以斧刀刺之。半日即合。故治金瘡不合者。用其皮煅存性敷之。若入長肉諸膏藥。切片酥拌炙之。象牙甘寒。能解癰腫諸毒。磨水服之。造筋磨礪之末。生蜜調塗。治諸鍼雜物入肉。舊梳刮薄片屑。溫湯頻服。治竹木刺。及諸魚骨梗。即時吐出。不吐再服。以吐出為度。非刮下薄片。不能應手也。

犀角 苦微鹹。大寒無毒。鎔成以熱手掌摸之。香者為真。臭者即假。忌酒鹽鳥附。孕婦勿服。能消胎氣。發明 犀之精靈。皆聚於角。足陽明胃為水穀之海。飲食藥物必先受之。故犀角能涼血散血。及畜血驚狂。斑痘之證。皆取以通利陽明血結耳。別錄治傷寒溫疫。頭痛寒熱諸毒。抱朴子云。犀食百草之毒。及衆木之棘。所以能解毒。凡蠱毒之人。遇有飲食。以犀筋攬之。有毒則生白沫。無毒則否。宗奭曰。鹿取草。犀取尖。其精銳之力。盡在是也。其治吐血衄血。大小便血。犀角地黃湯為之專藥。若患久氣虛。又為切禁。以其能耗散血氣也。痘瘡之血熱毒盛者。尤為必需。然在六七日灌漿之時。又為切禁。以其能化膿為水也。而結痂後餘毒癰腫。則又不忌。惟氣虛毒盛之症。切不可犯。其性大寒。無大熱邪者。慎不可用。凡中毒箭。以犀角刺瘡中立愈。又感山風瘡氣。射工溪毒。用生犀磨汁服之。

即解。

熊脂肉

甘溫無毒。本經主風痹不仁筋急。五藏腹中積聚。寒熱羸瘦。頭瘡白禿。面上癰胞。發

明。能稟雄毅之性。故其脂可開風痹不仁等疾。可服可摩。但不可作燈。烟氣薰目。使人不能遠視。本經所主。不出風痹筋急之用。風為陽邪。熊為陽獸。其性溫潤。能通行經絡。開通血氣。也能筋。亦能壯筋強力。與虎骨之搜風壯骨無異。熊肉振羸。其氣有餘。瘤病人食之。終身不愈。

能膽苦寒無毒。試法取少許研滴水中。掛下如線。直至水底不散者為真。發明。能膽苦入心。寒勝濕。手少陰足厥陰藥也。其性潔不染塵。故能清心平肝。為時氣熱盛變為黃疸之要藥。又能殺蟲明目。除翳障。消痔。蟲牙蛇痛。小兒驚癇癲癥。以竹瀝化豆大許服之。去心中涎。痔瘡赤腫。水化點之。即消。凡實熱之證。用之咸宜。苟涉虛家。便當嚴禁。

麝羊角即羚羊角

鹹寒無毒。鎊碎胸前煨熱令脆。研如粉。不則粘人腸胃。本經主明目益氣起陰。去

惡血注下。辟蠱毒惡鬼不祥。魘寐。發明。羚羊屬木。入足厥陰。伐肝最捷。目暗翳障。而羚羊角能平之。痘瘡正面稠密。不能起發。而羚羊能分之。小兒驚癇。婦人子癧。大人中風搐搦。及筋寒麻節痛。而羚羊角能舒之。驚駭不寧。狂越魘寐。而羚羊角能安之。惡鬼不祥。而羚羊角能辟之。惡血注下。蠱毒疝腫。瘡腫癰癧。產後血氣。而羚羊角能散之。濕熱留滯。陽氣不振。陰器衰痿。而羚羊角能起之。煩憊氣逆。噎塞不通。鬱為寒熱。而羚羊角能降之。詳本經所主。皆取散厥陰血結耳。愚按諸角。皆能入肝散血解毒。而犀角為之首推。以其專食百草之毒。兼走陽明。力能祛之外出也。故痘瘡之血熱毒。

盛者為之必需。若痘瘡之毒。并在氣分。而正面稠密。不能起發者。又須羚羊角。以分解其勢。使惡血流於他處。此非犀角之所能也。人但知羚羊角能消目翳。定驚癇。而散痘瘡惡血之功。人所共昧。殺白羯羊角。亦能消乳癖。而方家每用琉璃角燈。磁片刮取薄屑。置胸中候脆。杵細酒服。方寸匙屢效。專取宿腐之味。以消陳積之垢也。其鹿角刮屑。善消虛人乳腫。未潰即消。已潰即斂。即本經主漏下惡血之治。龍角治神魂不寧。功用與龍齒畧同。十金方中有齒角並用者。牛角腮專主閉血。崩牛之一身。惟此無用。而本經特為採錄。千金尤為崩漏要藥。可見天地間無棄物也。

山羊血 鹹溫無毒。苗人以麋竹通節。削鋒利活刺。心血收乾者良。罕取者不堪用。發明 山羊產滇蜀諸山中。性善走逐。好鬪。肉能療冷勞。山風瘧痢。婦人赤白帶下。其心血綱目失載。性溫味鹹。為和傷散血之神藥。其治跌撲損傷。單用酒服。取醉醒其骨自續。每用不過分許。不可多服。雖不傷耗元氣。而力能走散陰血。然必初患便服。得效最速。若過三五日。血凝氣滯。無濟於治矣。但舉世用者絕罕。間有收取而市者。其價重等於牛黃。且心血絕不易得。滲血丹用之。真虛勞失血之續命丹也。

鹿茸 甘溫無毒。形如茄子。色如瑪瑙者良。紫潤圓短者為上。毛瘦枯絛者為下。酥炙酒炙。各隨本方。但不可過焦。有傷氣血之性。火後去頂骨用耳。本經主漏下惡血。寒熱驚癇。益氣強志。生齒不老。發明 鹿是山獸屬陽。性淫而遊山。夏至得陰氣而解角。從陽退之象。麋是澤獸屬陰。性淫而遊澤。冬至得陽氣而解角。從陰退之象。鹿茸功用專主傷中勞絕。腰痛羸瘦。取其補火助

陽生精益髓。強筋健骨。固精攝便。下元虛人。頭旋眼黑。皆宜用之。本經治漏下惡血。是陽虛不能統陰。即寒熱驚癇。皆肝腎精血不足所致也。角乃督脈所發。督為腎藏外垣。外垣既固。腎氣內充。命門相火。不致妄動。氣血精津。得以凝聚。扶陽固陰。非他草木可比。八味丸中加鹿茸五味子。名十補丸。為峻補命門真元之專藥。傳尸癆瘍。脊中生蟲。晝夜痒痛。淅浙作聲者。同生犀蠶甲。入六味丸中。其殺蟲之力。與天靈蓋同功。近世鹿茸與麋茸。罕能辨别。大抵其質粗壯。而腦骨堅厚。其毛蒼鷺。而雜白毛者。為麋茸。其形差瘦。而腦骨差薄。其毛黃澤。而無白毛者。為鹿茸。鹿茸補督脈之真陽。麋茸補督脈陰中之陽。不可不辨。

鹿角膠 甘微鹹溫無毒。河南者味甘溫為上。泊上者味鹹辛為下。又生取成對者力勝。解下單角力薄。凡角大而毛色淡白者。即為麋角。能補陽中之陰。熬膠法。取角寸截。用長流水浸三日。刮淨。入黃蠟煮三日夜乾。即添水三日夜足。去角取汁重煎。滴水不化。膠成切片。陰乾不可日晒。晒則融化成水矣。今市者多以黃明膠加楮實偽充。不可不察。取嫩角寸截。置小罈中。洒水相和。盆蓋泥封。糠火煨三伏時。搗細如霜。名鹿角霜。本經主傷中勞絕。腰痛羸瘦。補中益氣力。婦人血閉無子。止痛安胎。久服輕身延年。發明 鹿角生用則散熱行血。消腫辟邪。熬膠則益陽補腎。強精活血。總不出通督脈補命門之用。但膠力稍緩。不能如茸之力峻耳。互參二條經旨。乃知茸有交通陽維之功。膠有緣合衝任之用。然非助桂以通其陽。不能除寒熱驚癇。非龜鹿二膠並用。不能達任。而治羸瘦腰痛。非輔當歸地黃。不能引入衝脈。而治婦人血閉胎漏。至若膠治傷中絕勞。即茸主漏下惡血也。

膠之補中益氣力。即草之益氣強志也。膠之輕身延年。即草之生齒不老也。歷攷別錄外臺千金等方。散血解毒居多。非如近世耑一溫補為務。殊失聖賢一脈相傳之義。○鹿角霜。治火不生土。脾胃虛寒。食少便溏。胃反嘔逆之疾。取溫中而不粘滯也。古方多製應用。令人每以煎遇膠者代充。其膠既去。服之何益。○生角鎌尖屑。消乳癰腫毒。煅灰行崩中積血。○鹿骨。安胎下氣。作酒主內虛。續絕傷。補骨除風。千金鹿骨丹用之。

鹿胎 甘溫無毒。其嘴尾蹄合。與生鹿無異者為真。其色淡形瘦者為鹿胎。若色深形肥者為麋胎。慎勿誤用。能損真陽。又獐胎與鹿胎相類。但色皎白。且其下唇不若鹿之長於上唇也。其他雜獸之胎。與鹿胎總不相似也。入藥取真者。酥炙黃用。發明 鹿性補陽益精。男子真元不足者宜之。不特茸角莖胎入藥。而全鹿丸合大劑參者桂附。大壯元陽。其胎純陽未散。宜為補養天真。滋益少火之良劑。然須參耆河車輩佐之。尤為得力。如平素虛寒。下元不足者。入六味丸中。為溫補精血之要藥。而無桂附辛熱傷陰之患。但慎勿悞用麋胎。反傷天元陽氣也。

麋茸 甘溫無毒。修治與鹿茸同。發明 瘿肉大寒。食之令人陽痿。而麋茸大益陽道。以其陽精都聚於角也。其角煎膠勝於鹿角。茸亦勝於鹿茸。然鹿之茸用補陽。右腎精氣不足者宜之。麋之茸角補陰。左腎血液不足者宜之。此乃千古微旨。治虛損有二至丸兩角並用。但其藥性過溫。偏於補陽。非陰虛者所宜。其麋膠主治。與鹿膠無異。而兼補陰血之功。過於鹿膠。但驗其角大而毛者即是。惜乎本經但言麋脂療癰腫惡瘍死肌。寒熱濕痹。四肢拘緩不收。風頭腫氣通腠理。從無及于茸角。

之用。彭錢延齡方有麋角粉。千金變為麋角丸。以麋性喜食菖蒲。故修鍊服食方用之。金匱云。麋脂及梅子。若妊婦食之。令子青盲。男子傷精。皆性冷傷厥陰肝經之驗也。

麋鹿肉。麋肉甘寒。鹿肉甘溫無毒。發明 凡獸之有角者。皆能助肝腎腎力。而麋鹿之角多歧。故力能拒虎。為角獸之冠。則鹿肉之補陽。麋肉之益陰。所不待言。鹿之一身所稟皆陽。最能益人。以陽氣為主也。麋之一身所稟皆陰。惟角為陰中之陽。較之鹿角純陽無陰。倍勝。而週身血肉筋骨。皆不足。取鹿肉之生者。主中風口僻不正。剗碎薄貼僻上。正急去之。不爾復牽向不僻處矣。○鹿血起陰器。止腰痛。療折傷。和酒服治肺痿崩中。諸氣刺痛。飲之立愈。鹿筋大壯筋骨。食之令人不畏寒冷。但須辨骨細者為鹿。粗者即是麋筋。慎食多致陰痿。○凡服丹石藥人勿食鹿肉。以其食百草之毒。善解諸藥之性也。

麈 甘寒無毒。發明 麈之性怯畏人。以其膽白易驚也。其肉雖肥。但能悅澤人面。不能助人脊力。以其善躍而無久常之力也。膽能治人粗豪之氣。若人素常膽怯者。為之切禁。其骨主虛羸泄精。麈之稟偏陰。而骨主精氣也。綱目言其甘溫。安有膽白易驚。而性甘溫之理。

麝 脣辛溫無毒。不可犯火。妊婦禁用。力能墮胎。今人以荔枝核燒灰。入燒酒拌和混充。不可不察。本經辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠭蟲。溫瘡驚癇。發明 麝香辛溫芳烈。為通關利窍之專藥。凡邪氣著人。淹伏不起。則闕竅閉塞。辛香走竅。自內達外。則毫毛骨節俱開。從此而出。故本經有辟惡氣。殺鬼精物。去三蟲蠭蟲。諸治也。其主溫瘡驚癇者。借其氣以達病所也。嚴氏言。風病必先用麝香。丹

溪謂風病必不可用。皆非通論。蓋麝香走竅入筋。能通筋竅之不利。開經絡之壅遏。若諸風諸氣諸血諸病。驚癇癲瘕諸病。經絡壅閉。孔竅不利者。安得不用為引導。以開之通之。惟中風表證未除。而悞用之。引邪入犯。如油入麵。莫之能出。致成痼疾。為之切戒。而救苦丹治壅腫結塊方。用硫黃辰砂入麝烊化。隔紙壓成薄片。以少許灸患處。無不立應。濟生方治食瓜菓成積作脹。及飲酒成消渴者。皆用之。蓋果得麝則壞。酒得麝則敗。此得用麝之理也。

貓 甘酸溫無毒。發明 貓捕生鼠虎噉生人大小雖異。稟性不殊。虎嘯風生。而治風痹腫痛。貓聲鼠竅。而主鼠瘻寒熱。故肘後方取貓肉作羹。消鼠瘻結核。已潰未潰皆愈。但助濕發毒。有濕毒人忌之。其頭骨及腦眼酥火。亦治瘰疬鼠瘻。其毛煅存性。傳瘰疬潰爛。貓尿治蟬蛇入耳。滴入即出。以薑擦貓鼻。或生葱刺鼻取之。屎治痘瘡倒臨。臘月取乾者燒存性。用之。貓胞治噎膈反胃。以純陽之性未散。故取以開陰邪之結也。方用一具。酥火為末。入腦麝牛黃鬱金各少許。津唾化服之。予嘗以格致之理論物類。貓之體陽而用陰。性稟陰賊機。竊地支。故其目夜視精明。而隨時收放。善跳躍而嗜腥。生不熱食。而能消化血肉生物。一皆風火用事。得雪水則蠢動。以雪之體陰而用陽。物類相感之應。若此。而食江中鱗魚之骨。其胎必墮。按異物志云。鱗是鰐鳥所化。故腹內尚有鳥腎二枚。與雀入淮水為蛤無異。其肉中細骨如毛。粘腸不脫。而致傷胎。物類感觸之應。則又如此。

狸 甘溫無毒。發明 狸之與貓。同類異種。以性溫散。故其骨火灰。善開陰邪鬱結之氣。鼠瘻寒熱。為之專藥。千金以肉治遊風。蘇頌作臙治鼠瘻。元化取頭骨。千金用陰莖。總取攻毒破結之義。時

珍曰。狸骨貓骨性皆相近。可通用之。

狼肉鹹熱無毒。發明。狼脂摩風首推。而本草不錄。亦一欠事。狼肉補五藏。厚腸胃。填骨髓。有冷積人宜食。○狼性追風逆行。故其矢燒烟能逆風而上。燒灰水服治骨鯁。以其性專逆行。而無阻滯也。

兔辛平無毒。妊娠忌食兔肉。合乾薑食之成霍亂。發明。兔無脾。故善走。二月建卯木位。木克戊土。故無脾。其肉性寒。能治胃熱嘔逆。腸紅下血。其腦為髓之精。性善滑胎。故兔腦丸為催生首藥。然須臘月取活兔用之始驗。○兔肝明日。目屬肝。稟氣獨勝。且得至陰之精。可救目暗之疾。其屎謂明月沙。又名望月沙。治目中浮翳。痘瘡患眼。但瞳人無損者。用以煅灰存性。日甘服之。其翳自退。又方。兔屎一味為末。生雞肝搗爛為丸。空腹穀精湯服之。醫厚加雞內金尤捷。兼治勞瘵五疳痔瘻。殺蟲解毒。黃帝曰。兔肉和獺肝食之成通口。

狐陰莖甘平有小毒。發明。狐屬陰類。故其莖主女子絕產。陰中癢。小兒陰瀨卵腫。以狐陰善縮入腹也。

水獺肝甘鹹平小毒。發明。獺者水獸。水性靈明。故其性亦多智詭。性專嗜魚。魚之生氣都聚於肝。是以獺肝專主傳尸癆瘵。殺蟲之性。與獺之捕魚不殊。蘇頌曰。諸畜之肝皆有定數。惟獺一月一葉。十二葉間有退葉。斗柄建寅之月。值其氣退之時。反諸為魚所蝕。月令所謂獺祭魚是也。以其台榮同食。文中景台令勞。有獺肝丸。崔氏治鹽痔。亦有獺肝丸。孟說云。疰病一門患者。以獺肝一

具火采水服方寸七日再服之。葛洪言尸疰乃五疰之一。病則使人寒熱沉沉默默不知病之所苦。無處不惡。積月累年。淹滯至死。死後復傳他人。乃至滅門。覺有此候。惟以獺肝一具。陰乾為末。水服方寸七日三以瘥為度。如無獺肝。獺爪亦可應用。小兒鬼疰及諸魚骨梗。皆燒灰酒服。獺肝之用。當不出乎此也。

山獺莖 甘熟無毒。發明 山獺票南與純陽之氣。故其性最溫。專主陽虛陰痿精寒。山中有此。凡牝獸皆避去。獺無偶。則抱木而枯。凡女春時入山。獺聞婦人氣。躍來抱合。牢不可脫。因扼殺而取之也。

膾肺臍一名海狗腎

鹹大熱無毒。以漢椒樟腦同收則不壞。發明 和劑局方治諸虛損。有膾肺臍

丸。滋陰丸。藥中用之。精不足者。補之以味也。今人多於房術方中用之。亦可同糯米法麴釀酒服。但功專補陽。陰虛切忌。此物牝者最多。而牡者絕少。海州人捕得牝者。以家狗外腎。用筋縫上。熨貼。如生成無二。然牝戶與穀道連合為一。雖用生筋縫熨。其孔較牡者大而且長。以此辨之。最為有據。壯鼠 甘溫無毒。取膽法用活鼠繫定。熱湯浸死。破喉取膽。真紅色者是也。誤食鼠噉之餘。令人發瘻瘡。以貪慾之火。蘊積饒涎也。發明 癸水位在於子。通氣於腎。其日夜明。其精在膽。故膽能治耳聾目盲。睛能明目。骨能生齒。皆益腎之驗。肘後方治三十年老聾。卒聾不過三度即愈。令人側卧。瀝膽汁入耳。盡膽一枚。須臾汗從下耳出。初時益聾。十日後乃瘥也。生鼠血。蘸青鹽擦牙宣有効。初生小鼠。香油浸腐化。取塗火燙效。少水能制壯火也。若生毛則不能消融矣。壯鼠糞。俗名兩頭尖。驗

其真者。方是牡鼠之矢。入足厥陰少陰。故煮服治傷寒勞復陰陽易腹痛。研末服治乳癰。燒灰存性。傅折傷疔腫。所主皆破陰血分之病。又犬咬先洗去牙垢惡血。用鼠糞炒研。黑糖調塗即愈。  
猾皮 苦平無毒。細剉炒黑。或酥尖用。本經主五痔陰蝕。下血不止。陰腫痛引腰背。酒煮殺之。  
發明 猥者胃之獸也。故肉治反胃胃脘痛最捷。其皮除目中障。本經主五痔陰蝕。取其銳利破血也。酒煮治陰腫痛引腰背。取筋脈能收斂也。南方金蠶鹽用猾皮為末。酒服探吐之。猾腦猾肝。治療瘻瘍狼漏。于金方用之。但不可食其骨。令人瘦劣。

人部

髮 苦微溫無毒。揀去白者。先用滾水洗淨。入煬成罐。外用鹽泥固濟。候内外罐通。紅冷定研末。置地去火毒用。本經主五瘡闊格不通。利小便水道。療小兒驚。大人瘻。仍自遠神化。發明 髮者血之餘。故能治血病。雖曰補真陰。療驚癇。理欬嗽。固崩帶止血暈。而實消瘀生新。能去心竅惡血。並煅過服。若煅之不透。反能動血。合雞子黃香油煎之。消化為水。則治小兒胎驚。及塗癩瘡有效。用入膏藥中。則長肉消瘀。本經治五瘡闊格不通。利小便水道。皆取其利竅散瘀之功。其療小兒驚。大人瘻。以能達肝心二經。開通瘀血之滯也。仍自遠神化者。言服自己之髮。則勝用他人之髮也。但胃虛人勿用。以其能作嘔瀉也。亂髮功用。與此不殊。而剃下者尤勝。取長之速也。小兒胎髮煅灰。大解胎毒。而補先天血氣。以純陽未離也。

頭垢 鹹苦溫小毒。發明 頭垢乃相火之餘氣結成。專開鬱結之氣。乳癰初起。煅灰酒服即消。

以其善祛胃中積垢也。

人乳汁 甘鹹平無毒。發明 乳汁治目之功甚捷。目得血而能視。乳即血之源也。用以點眼。豈不相宜。老人服食尤良。但脾虛易瀉者勿食。日中曝乾。入參苓丸服。尤為合宜。

爪甲 甘鹹小毒。發明 爪乃肝氣之餘。其性銳利。故能催生下胞。衣利小便。治尿血及陰陽易病。破傷風去目翳。刮末治鼻衄。噙之立止。又能治乳蛾。用爪指甲不拘多少。煅為末。蓬砂白礬各一錢。西牛黃一分。烏梅白梅肉各五枚。共搗如泥。含彈大一丸。痰大湧出三四丸即愈。但其方酸收太速。不無萌發之患。莫若探吐頑痰。迅掃病根為愈。

人牙 甘鹹熱有毒。發明 牙乃腎之標骨之餘。痘瘡倒蹙。用人牙散。因痘瘡為風寒穢氣所觸。而變黑倒蹙。用此煅灰。以酒麝達之。竄入腎經。發出毒氣。乃劫劑也。若伏熱在心。寄冒不省人事。及氣虛色白。瘡塌不能作膿。熱癰紫泡之證。正宜涼血解毒。苟誤用之。則鬱悶聲啞。反成不救。臨證審諸。人中黃 甘鹹寒無毒。造法用大竹截段兩頭留節。削去外皮。傍鑽一孔。用甘草細末入滿於中。以蕉扇柄削圓塞孔。冬至浸大糞池內。立春後取出。懸風處晒乾取用。又法如前製竹。不入甘草。但用蕉扇柄或杉木塞孔。浸糞池中。以取其汁。與金汁無異。僅供一時取用。不能久藏。糞清亦解溫熱諸毒。又誤食毒菌。楓樹上菌。及遇食銀杏。脹閉欲死者。悉能解之。并解砒石野葛野芋等毒。即家芋三年不收花開如蓮者。亦能殺人。急取灌吐。方可得生。發明 人中黃取糞土之精。以解天行狂熱。溫毒發斑最捷。然汁則性速。而能下泄。甘草製者。則性緩。而能解毒。兼治河豚菌毒。一切惡瘡災病。

用人中黃酒大黃末等分。無灰酒服。須臾濁利。毒即隨出。雖大渴不可飲水。飲水則毒邪不散而難救也。急切不可得。以真坑垢代之。

金汁。苦寒無毒。臘月取糞。置罈中。埋土內越三年。取出如水者是。發明。金汁得土氣最久。大解熱毒。故溫熱時行。昏熱勢劇者。用以灌之下咽。其勢立減。初生小兒。週時內毒邪不散。服一二合。勝化毒丹。胎毒盡解。無痘疹患。此屢驗者。但胎稟虛寒。體瘦色白者。不可誤用。誤用反奪天真。多致夭枉。不可不慎。因豐用以灌諸草木。即花葉茂盛。且無過壅傷花之患。

乾糞灰。鹹平無毒。發明。人屎取乾者煅灰。治小兒痘瘡黑陷。解時行大熱狂走。蜜調塗疔腫。拔毒出根。總取解毒之迅耳。

溺。鹹寒無毒。童子者佳。不可見火。見火則腥臊難服。發明。人溺療寒熱頭疼。取其鹹寒降泄。也有客邪。冲熱葱頭湯服之。汗出即止。而童子小便性純。一切熱勞吐衄。陰虛火動。骨蒸勞瘵。用以降火最速。產後血暉。溫飲一杯。壓下敗血惡血即解。蓋漫溺滋陰降火。消瘀血。止吐衄諸血。每用蓋許。入薑汁一二匙。徐徐服之。久自有效。然須乘熱服之。以接生陽之氣。冷則生氣散矣。時珍云。童便入胃。隨脾氣上歸於肺。通調水道。下輸膀胱。乃其舊路也。故能清肺。導火下行。若多服久服。亦能損胃滑腸。故食少便溏者禁用。傷寒少陰證下利不止。厥逆無脈。乾嘔欲飲水者。加人尿。猪膽汁。鹹苦寒物。於白通湯。瀉附藥中。其氣相從。可無格拒之患。但胃虛欲作嘔者勿與。恐助嘔勢。反致不測也。

溺白堊即人

鹹平無毒。煅過用。發明。人中白能濁肝火膀胱火。從小便中出。蓋膀胱乃其故

道也。今人病口舌諸瘡。用之有効。降火之驗也。但積垢之滓。僅堪滌熱。略無益陰之功耳。

秋石 鹹溫無毒。陰煉淡秋石法。將大缸一隻。近底三寸許。艾火燒三十餘炷。打成一孔杉木塞之。秋月取童子溺入缸內。衝河水攬澄定。去木塞放去上水。每日增童便河水。如前攬之。只留缸底者。積至月餘。用絹篩。襯紙瀝乾收之。○又陰收秋石法。將鉛越大小數十枚。俱兩片合。成多鑽孔眼。入尿桶中浸。每日傾去宿尿。換溺浸之。經秋收取。置鉛罐藏之。此法最勝。○陽煉秋石。將草鞋數百隻。舊者尤佳。長流水漂曬七日。去黃色。浸尿桶中。日晒夜浸。一月許曬乾。烈日中燒灰。須頻挑撥令燒盡。滾湯淋汁澄數日。鍋內燒乾。重加雨水煮溶。箋窮紙數重。瀝淨再澄。半月餘銀缶器內煮乾。色白如霜。鉛罐收之。○又陽煉法。以童子小便入鍋熬乾。其鍋先燒通紅。香油數盞。洗淨則不粘帶傷鍋。初如油脚。入燶成罐。或小鐵金申燶通紅。用熱水熔化。置有嘴壺中。將草掩塞壺口。徐徐傾出。下以竹箬。襯紙瀝清。再以文火收乾。鉛罐收之。則不溶化。○又煉秋冰法。以秋石入秋露水煮化。入燶成罐。內新鐵蓋。蓋固濟。昇打三炷香。取出再研。如前昇打。蓋內用水徐徐塗之。水不可多。多則不結。又不可少。少則不昇。從辰至未。退火冷定。蓋上昇起者為秋冰。乃秋石之精英。真虛羸之神丹也。○凡人力製造之藥。每多偽充。而秋石之真者。尤不易得。有以食鹽濾水煮成者。有以朴硝溶化製造者。有以硝石樣化傾成錠式者。其偽不一。苟非雇庸督製。總難輕用也。試真偽法。入滾豆腐漿中。不結腐花者為真。若結者即鹽之偽充也。入口令人作渴。入滾豆腐漿中。起水紋而微苦者。即立明粉之偽充也。入腹令人作渴。其傾成錠式。入熱水不易化者。即硝石之偽充也。下咽令人發熱。又以秋

石化水入青菜葉。有頃色不變者為真。又以少許入眼不滯痛者。必真無疑。其淡秋石入滾水不化者。即熟石膏末及滑石末混充也。發明 秋石以秋命名。專取秋氣下降之意。他時製者。功力則殊。製法以童溺煅煉去其鹹寒。轉成溫補。能滋陰降火而不傷胃。補益下元真火。散瘀血。助陰精。降邪火歸真陽。止虛熱。嗽血骨蒸勞瘵之仙品也。火盛者宜生宜淡。陰虛者宜熟宜鹹。凡勞瘵陰火亢極而不受參耆補益者。立秋石丸三方。次第施治。或服或噙。則喘欬氣息漸平。痰亦易出。嗽亦省力。以其性味鹹降而無上逆之患也。先用薑汁炒魚大黃淨末與秋石等分。煮紅棗肉為丸。空心服三錢。清熱散血。次用貝母秋石各等分。生甘草末減半。仍用紅棗肉為丸。服之以止嗽消痰。後用人參秋石等分。炙甘草末減半。亦棗肉丸以補氣安神。製劑之多少。隨瘀熱元氣而施。不可限以分兩。其陰煉淡者。性最下滲。苟非陰分熟極。難以輕投。陰虛多火。小便頻數。精氣不固者誤服。令人小便不禁。甚則令人夢泄。其鹹者可代鹽蘸物食之。喘欬煩渴不得寐者。以半錢匙衝開水服之。即得安寐。覺時滿口生津。亦不作渴。補陰之功可知。陰煉淡秋石。治夏暑熱淋。小便不通。及濁淋沙石淋肉。淋老人絕慾太早。小便淋澀滴痛。一服即效。

紅鉛 鹹大溫無毒。即室女初通經水中之結塊。如櫻桃者是也。發明 紅鉛流穢之餘。其性大熱峻補命門淫火。陳酒服一枚。少頃蒙昧如醉。若連服二枚。則邪火內拒。令人暴亡。壯火食氣之驗也。天靈蓋 鹹溫小毒。制法以香水滌淨。酥火杵細入藥。或煎酒。或煅末。隨證取用。忌鐵器。發明 腦為髓海。諸陽之會。能辟一切陰邪不正之氣。故曰天靈。凡人身中氣血安和。諸邪不能侵犯。陰陽

乖戾則尻庄之氣。得以乘虛襲入。是即瘵蟲之根氣也。若其人平昔陽衰。則蟲攻脊脈。脊中淫淫作癢。隱隱作痛。轉側不能自安。或時漂漂畏寒。或時翕翕發熱。手足四末常清。脈來弦細之力。非天靈蓋散。不能療之。若其人素稟陰虛。則蟲蝕藏府。胸中嘈雜如饑。默默不知所苦。無處不苦。動則時呕。時嘔。靜則善寐。善忘。面上忽時烘熱。脈多弦勁搏指。此屬懶肝丸證。非天靈之所宜。其天靈散方。用采淨三指大一片。赤蠅榔三枚。白甘遂麝香真安息各三分。阿魏二分。辰砂一分。擣羅為散。桃枝煎湯。五更調進一服。約人行十里。項蟲不下。再進一服。天明進第三服。取下蟲物。急擒入油鑄熬之。其蟲嘴黃赤者。可卜病人血氣未艾。治之可愈。青黑白者。血氣已竭。治之難已。然亦得斷傅染之病。凡修合勿令病人知。擇僻淨處。只雞犬婦人孝服者。見蟲下後。忌肥鮮及鹽半月。白粥調養漸安。如病久不勝。甘遂阿魏等攻逐。只以天靈蓋。香水滌淨。仰置銀缶器內。盛以醇酒。隔水煮。一官香。酒耗旋添。候一炷香足。取酒服之。少頃頭旋顱脹。察蟲隨嘔吐出。即以燼火燎之。將養三日後。取前蓋骨。製服如前。蟲盡即以蓋骨。仍埋舊處。其采淨細末。并治小兒痘瘡反白。陷伏不長。煩躁不寧。酒服四、五分即起。然皆不得已而用之。至於傅下部膿。入枯痔散。乃以人之至高之骨。置之污下不潔之處。雖極其神驗。殊非仁人君子之用心。舍此豈無他藥可治乎。

人胞即紫河車

甘鹹溫無毒。取厚小色鮮者。挑去血絡。漂淨血水。入椒一握。沸湯泡去腥水。以蜂蜜和長流水於舊錫器內。隔水文火煮爛如糜。綿絞去滓。代蜜糊丸藥良。發明。紫河車稟受精血。結孕之餘液。得母之氣血居多。故能峻補營血。用以治骨蒸羸瘦。喘嗽虛勞之疾。是補之以味也。自丹

溪極言其功。而吳球創大造丸。雖世所推重。然方中生地黃柏。天冬麥冬龜版。一派滋膩傷胃之品。雖有人參一味。反助羣陰之勢。服之每致傷中嘔泄。未見其可。惟水類鈴方。河車丸方。用人胞一具。山藥二兩。人參一兩。茯苓五錢。酒糊為丸。近世改用鮮者。隔水煮搗作丸。尤為得力。即虛人服之。未嘗傷犯胃氣。

胞衣水 鹹潤微涼無毒。臘月取紫河車置有蓋瓦罐內。深埋土中。臨用取出。不可留久。久即乾矣。或與生甘草末同入罐中。埋於土中。三五年後掘出。即為藥也。發明 胞衣之性本熱。而得土氣之化。善能攝火歸元。小兒丹毒。諸熱毒發。寒熱不歇。狂言妄語。頭上無禿髮。虛症等證。天行熱疾。咽痛及虛勞咽痛。飲之立効。反胃久病。飲一鍾。當有蟲出。

初生臍帶 發明 脐帶者。人之命蒂也。用以煅末。入硃砂少許。蜜水調服。以解本嬰之胎毒。與內傷之用骨灰無異。

胎元 鹹大溫小毒。發明 胎元雖墮下胎息。淫火未離。天真未剖。較河車之性倍甚。古方鮮用。惟金剛丸用之。惟以人補人。然獸相食。且人惡之。況人食人。能無惻怛之念乎。